

APÉNDICE 1.

CATÁLOGO DE LAS PLANTAS VASCULARES DEL CONO SUR (ARGENTINA, SUR DE BRASIL, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY)

JUNIO 2025

LYCOPHYTA Y
MONILOPHYTA

ANEMIACEAE**Anemia** Sw., nom. cons.

Anemia australis (Mickel) M. Kessler & A.R. Sm.

Sin.: *Anemia tomentosa* (Savigny) Sw. var. *australis* Mickel

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Anemia ferruginea Kunth var. **ahenobarba** (Christ) Mickel

Sin.: *Anemia ahenobarba* Christ

Hierba terrestre. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR).

Anemia ferruginea Kunth var. **ferruginea**

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAA).

Anemia herzogii Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY).

Anemia imbricata Sturm

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Anemia lanata Mickel

Hierba rupícola. Nativa. 0-700 m

Países: BRA(PAR).

Anemia mandioccana Raddi

Hierba rupícola o terrestre. Nativa. 0-700 m

Países: BRA(PAR, SCA).

Anemia myriophylla H. Christ

Sin.: *Hemianemia myriophylla* (Christ) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(CEN, COA, PAI).

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. **phyllitidis**

Sin.: *Anemia fraxinifolia* Raddi, *Anemia haenkei* C. Presl, *Anemia longifolia* Raddi, *Anemia phyllitidis* (L.) Sw. var. *fraxinifolia* (Raddi) Hassl., *Anemia phyllitidis* (L.) Sw. var. *longifolia* (Raddi) Hassl., *Anemidictyon phyllitidis* (L.) J. Sm., *Osmunda phyllitidis* L.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, PAI). URY(ART, CLA).

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. **pluripinnae** Mickel

Hierba terrestre. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. **tweedieana** (Hook.) Hassl.

Sin.: *Anemia tweedieana* Hook.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(CAN). URY(RIV, TYT).

Anemia raddiana Link

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anemia simplicior (H. Christ) Mickel

Sin.: *Anemia alfredi-rohrii* Brade, *Anemia anthriscifolia* Schrad. var. *simplicior* H. Christ, *Hemianemia anthriscifolia* (Schrad.) C. F. Reed var. *simplicior* (H. Christ) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 600 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA).

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. **anthriscifolia** (Schrad.) Mickel

Sin.: *Anemia anthriscifolia* Schrad., *Anemia ferruginea* Kunth var. *anthriscifolia* (Schrad.) Kunze, *Hemianemia anthriscifolia* (Schrad.) C. F. Reed

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, ÑEE).

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. **tomentosa**

Sin.: *Anemia anthriscifolia* Schrad. var. *rotundata* Lindm., *Anemia cheilanthoides* Kaulf., *Anemia deltoidea* (Cav.) Sw., *Anemia fulva* (Cav.) Sw., *Anemia villosa* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *deltoidea* (Cav.) C. Presl, *Hemianemia anthriscifolia* (Schrad.) C. F. Reed var. *rotundata* (Lindm.) C.F. Reed, *Osmunda deltoidea* Cav., *Osmunda fulva* Cav., *Osmunda tomentosa* Savigny

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAN, COA, PAI). URY(ART, CLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TAC).

Anemia trichorhiza Gardner ex Hook. var. **paraguariensis** Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, GUA).

Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.

Hierba. Nativa. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anemia warmingii Prantl

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anemia wettsteinii H. Christ

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

ASPLENIACEAE

Asplenium L.

Asplenium abscissum Willd.

Sin.: *Asplenium firmum* Kunze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, SPE). URY(CLA, RIV, ROC, TAC, TYT).

Asplenium achalense Hieron.

Hierba epífita o epipéfrica. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(COR, SAL, SLU, TUC).

Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech.

Sin.: *Asplenium nigricans* Kunze, *Asplenium praemorsum* Sw., *Trichomanes aethiopicum* Burm. f.

Hierba epífita o epipéfrica. Nativa. 800-1600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(SCA).

Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium argentinum Hieron.

Hierba terrestre. Endémica. 1600-1800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC).

Asplenium atlanticum Lino & L. Sylvestre

Hierba terrestre. Endémica. 800-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium auriculatum Sw.

Sin.: *Asplenium auricularium* Desv., hom. illeg., *Asplenium gibbosum* Fée, *Asplenium pimpinellifolium* Fée & W. Schaffn., *Asplenium semicordatum* Raddi

Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN).

Asplenium auritum Sw.

Sin.: *Asplenium auritum* Sw. var. *recognitum* (Kunze) Griseb., *Asplenium auritum* Sw. var. *rigidum* (Sw.) Hook., *Asplenium rigidum* Sw., *Asplenium sulcatum* Lam. var. *recognitum* (Kunze) Hicken

Hierba epífita o epipéfrica. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, SPE).

Asplenium balansae (Baker) L. Sylvestre

Sin.: *Antigramma balansae* (Baker) L. Sylvestre & P.G. Windisch, *Phyllitis balansae* (Baker) C. Chr., *Scolopendrium balansae* Baker

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAN, COA, PAI).

Asplenium bradei Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Asplenium brasiliense Sw.

Sin.: *Antigramma ambigua* (Raddi) Tardieu, *Antigramma brasiliensis* (Sw.) T. Moore, *Antigramma oblongata*

(Schrad.) C. Presl, *Antigramma repanda* (C. Presl) C. Presl, *Antigramma subsessilis* Fée, *Asplenium dubium* Gaudich., nom. illeg., *Phyllitis brasiliensis* (Sw.) Kuntze, *Phyllitis brasiliensis* (Sw.) Kuntze var. *decurrens* Sehnem, *Scolopendrium ambiguum* Raddi, *Scolopendrium brasiliense* (Sw.) Kunze, *Scolopendrium oblongatum* Schrad., *Scolopendrium repandum* C. Presl

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, GUA, PAI).

Asplenium campos-portoi Brade

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Asplenium castaneum Schltdl. & Cham.

Hierba. Nativa. 0-4700 m.

Países: ARG(MEN).

Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd.

Sin.: *Asplenium radicans* L. var. *cirrhatum* (Rich. ex Willd.) Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Asplenium clausenii Hieron.

Sin.: *Asplenium bangii* Hieron., *Asplenium clausenii* Hieron. f. *nigricans* Hieron., *Asplenium clausenii* Hieron. f. *angustifolium* Hieron., *Asplenium clausenii* Hieron. f. *latifolium* Hieron., *Asplenium fluminense* (Lindm.) Hieron., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *commune* Lindm.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(TAC).

Asplenium cristatum Lam.

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Asplenium cuspidatum Lam.

Sin.: *Asplenium auritum* Sw. var. *bipinnatifidum* Kunze, *Asplenium auritum* Sw. var. *bipinnatisectum* Mett., *Asplenium auritum* Sw. var. *mexicanum* (M. Martens & Galeotti) Hieron., *Asplenium fragrans* Sw. var. *mexicanum* (M. Martens & Galeotti) Christ., *Asplenium lacerum* Schltdl. & Cham., *Asplenium mexicanum* M. Martens & Galeotti, *Asplenium pyramidatum* Liebm., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL, TUC).

Asplenium dareoides Desv.

Sin.: *Asplenium concisum* Desv., *Asplenium dareoides* Desv. var. *dentatum* G. Kunkel, *Asplenium magellanicum* Kaulf., *Asplenium philippii* Gand.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Asplenium depauperatum Fée

Sin.: *Asplenium gibertianum* Hook., *Asplenium inciso-alatum* T. Moore, nom. nud., *Asplenium micropteron* Baker, *Asplenium schiffneri* H. Christ, *Asplenium spinescens* Mett. ex Kuhn
Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Asplenium drepanophyllum Kunze

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(PAI, SPE).

Asplenium feei Kunze ex Fée

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Asplenium flabellulatum Kunze

Sin.: *Asplenium flabellulatum* Kunze var. *partitum* Klotzsch, *Asplenium paraguariense* Hieron., *Asplenium radicans* L. var. *partitum* (Klotzsch) Hieron.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

Asplenium formosum Willd.

Sin.: *Asplenium mexiae* Copel., *Asplenium nanum* Willd., *Asplenium subalatum* Hook. & Arn.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). PRY(CAN).

Asplenium gastonis Fée

Sin.: *Asplenium auritum* Sw. var. *diversifolium* Rosenst., *Asplenium divergens* Mett. ex Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CEN, GUA, PAI, SPE). URY(CLA, CLA, RIV, TAC, TYT).

Asplenium gilliesii Hook.

Sin.: *Asplenium debile* Fée, *Asplenium gilliesianum* Hook. & Grev., nom. illeg.
Hierba saxícola. Endémica. 400-4200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC). CHL(TAR).

Asplenium harpeodes Kunze

Sin.: *Asplenium araucarieti* Sehnem, *Asplenium pendulum* Fée
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium inaequilaterale Willd.

Sin.: *Asplenium brachyotus* Kunze
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, PAI). URY(TAC).

Asplenium incurvatum Fée

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium kunzeanum Klotzsch ex Rosenst.

Sin.: *Asplenium pteropus* var. *radicans* Mett.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium lacinulatum Schrad.

Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Asplenium lilloanum de la Sota

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 700-2500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Asplenium lorentzii Hieron.

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Asplenium macrosorum Bertero ex Colla

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Asplenium martianum C. Chr.

Sin.: *Asplenium angustatum* Kunze var. *langsdoeffii* Mart., *Asplenium langsdoeffii* (Mart.) Sehnem
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium monanthes L.

Sin.: *Asplenium macrocarpum* Desv.,
Asplenium menziesii Hook. & Grev.,
Asplenium monanthemum Murray,
 hom. illeg.

Hierba terrestre o saxícola. Nativa.
 1000-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI,
 SAL, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA).
 URY(MAL).

Asplenium mucronatum C. Presl

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(APA, CAU, CAN, SPE).

Asplenium muellerianum Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Asplenium obtusatum G. Forst. var.
obtusatum

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(IDE, IPA).

Asplenium obtusatum G. Forst. var.
sphenoides (Kunze) C. Chr. ex
Skottsbl.

Sin.: *Asplenium chondrophyllum* Bertero
 ex Colla, *Asplenium obliquum* G.
 Forst. var. *chondrophyllum* (Bertero ex
 Colla) Mett., *Asplenium obliquum* G.
 Forst. var. *sphenoides* (Kunze) Mett.,
Asplenium sphenoides Kunze

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
 BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Asplenium oligophyllum Kaulf.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(CEN).

Asplenium otites Link

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

Asplenium palmeri Maxon

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 400-
 1500 m.

Países: ARG(COR, LRI, SAL, TUC).

Asplenium papaverifolium (Kunze)
Viane

Sin.: *Asplenium subglandulosum* (Hook. &
 Grev.) Salvo, *Prada* & Díaz subsp.
papaverifolium (Kunze) Salvo, *Prada* &
 Díaz, *Gymnogramma chilensis* Brack.,
Gymnogramma papaverifolia Kunze,
Pleurosorus immersus Fée,
Pleurosorus papaverifolius (Kunze)
 Fée var. *hirsuta* Villagran, *Pleurosorus*
papaverifolius (Kunze) Fée var. *nana*
 Villagran, *Pleurosorus papaverifolius*
 (Kunze) Fée var. *papaverifolius*,
Pleurosorus papaverifolius (Kunze)
 Fée var. *spagazzinii* Hicken

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
 SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO,
 MAU, BIO, AIS, MAG, RME).

Asplenium patagonicum R. Rodr. & R.
Guzmán

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(ARA, LSR, LLA, MAG).

Asplenium peruvianum Desv.

Sin.: *Asplenium fragile* C. Presl,
Asplenium fragile C. Presl var.
lomense Weath.

Hierba saxícola. Nativa. 200-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(ANT).

Asplenium polyodon G. Forst. var.
squamulosum (C. Chr.) R. Rodr.

Sin.: *Asplenium adiantoides* (L.) C. Chr.
 var. *squamulosum* C. Chr.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(IPA).

Asplenium pseudonitidum Raddi

Sin.: *Asplenium ovaescens* Fée

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium pteropus Kaulf.

Hierba epífita. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Asplenium pulchellum Raddi

Sin.: *Asplenium holmbergii* Hicken,
Asplenium serronii Glaz. ex Fée

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Asplenium pumilum Sw.

Sin.: *Asplenium anthriscifolium* Jacq.,
Asplenium pumilum Sw. var.
anthriscifolium (Jacq.) Wherry

Hierba terrestre. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Asplenium raddianum Gaudich.

Sin.: *Asplenium brasiliense* Raddi, hom.
 illeg.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium radicans L.

Sin.: *Asplenium alloopterum* Kunze ex
 Klotzsch, *Asplenium cyrtopterum*
 Kunze, *Asplenium radicans* Sw. var.
alloopterum (Kunze ex Klotzsch) C.
 Chr., *Asplenium rhizophorum* L., nom.
 illeg., *Asplenium rhizophorum* L., nom.
 illeg. var. *alloopterum* (Kunze ex
 Klotzsch) Baker, *Asplenium*
rhizophyllum L., nom. illeg.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA).

Asplenium resiliens Kunze

Sin.: *Asplenium lealii* Alston, *Asplenium*
parvulum M. Martens & Galeotti, hom.
 illeg.

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-
 1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(COL, RNO, SAO).

Asplenium scandicinium Kaulf.

Sin.: *Asplenium adiantoides* Raddi, hom. illeg., *Asplenium chaerophylloides* Fée
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium sellowianum C. Presl ex Hieron.

Sin.: *Asplenium lunulatum* Sw. var. *sellowiana* Hieron., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *tenerrima* Hieron., *Asplenium sellowianum* C. Presl, nom. nud., *Asplenium ulbrichtii* Rosenst. var. *sellowianum* (Hieron.) Osten & Herter, *Asplenium ulbrichtii* Rosenst. var. *tenerrimum* (Hieron.) Osten & Herter
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA). URY(ART, CLA, CLA, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Asplenium serra Langsd. & Fisch.

Sin.: *Asplenium progrediens* Fée, *Asplenium serra* Langsd. & Fisch. var. *woodwardioidea* (Gardner) Hieron., *Asplenium woodwardioideum* Gardner, *Chamaefilix serra* (Langsd. & Fisch.) Farw.
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 100-1700 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, TYT).

Asplenium serratum L.

Sin.: *Asplenium integrum* Fée, *Asplenium longifolium* Schrad., *Asplenium schomburgkianum* Klotzsch,

Asplenium serratum L. var. *blanchetianum* Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN).

Asplenium squamosum L.

Sin.: *Asplenium jamesonii* Hook., *Asplenium tucumanense* Hieron.
Hierba terrestre. Nativa. 1100-1200 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC). BRA(SCA).

Asplenium stellatum Colla

Sin.: *Asplenium fernandezianum* Kunze, *Asplenium lunulatum* Sw. var. *stellatum* (Colla) C. Chr.
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(JFE).

Asplenium stuebelianum Hieron.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, CAA).

Asplenium sylvestre Arana, Ganem & Luna

Sin.: *Asplenium sylvaticum* Arana, Ganem, Giudice & Luna, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL). BRA(RGS).

Asplenium trilobum Cav.

Sin.: *Asplenium parvulum* Hook., *Asplenium trapezoides* Sw., *Asplenium trilobum* Cav. var. *trapezoides* (Sw.) G. Kunkel
Hierba terrestre o epífita. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Asplenium triphyllum C. Presl

Sin.: *Asplenium imbricatum* Hook. & Grev., *Asplenium rhomboideum*

Brack., *Asplenium tenue* C. Presl, *Asplenium ternatum* C. Presl
Hierba saxícola. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

Asplenium ulbrichtii Rosenst.

Sin.: *Asplenium ulbrichtii* Rosenst. var. *majus* Rosenst., *Asplenium ulbrichtii* Rosenst. var. *serrato-dentatum* Rosenst.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Asplenium uniseriale Raddi

Sin.: *Asplenium amabile* Liebm., *Asplenium ballivianii* Rosenst., *Asplenium radicans* L. var. *uniseriale* (Raddi) L.D. Gómez, *Asplenium radicans* L. var. *uniseriale* (Raddi) Lellinger, comb superfl.
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA, PAI).

Asplenium wacketii Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Ceterach Willd.

Ceterach officinarum Willd.

Hierba terrestre. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, SFE).

Hymenasplenium Hayata

Hymenasplenium laetum (Sw.) L.
Regalado & Prada

Sin.: *Asplenium laetum* Sw.

Hierba terrestre. Nativa. 100-1400 m.

Países: ARG(MIS, SAL, TUC).
BRA(RGS). PRY(CAN, CON).

Hymenasplenium triquetrum (N. Murak. & Moran) L. Regalado & Prada

Sin.: *Asplenium triquetrum* N. Murak. & R.C. Moran

Hierba. Nativa. 100-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

Phyllitis Hill

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

Sin.: *Asplenium scolopendrium* L.,
Scolopendrium vulgare Sm.

Hierba terrestre o saxícola. Introducida.
0-200 m.

Países: ARG(TDF).

Notas: Introducida en las Islas
Malvinas.

ATHYRIACEAE

Athyrium Roth

Athyrium dombeyi Desv.

Sin.: *Asplenium dombeyi* (Desv.) Mett.,
Athyrium filix-femina (L.) Roth var.
dombeyi (Desv.) Hieron., *Athyrium*
filix-femina (L.) Roth var. *incisa* (Fée)
Hieron., *Polypodium filix-femina* L.
Hierba terrestre. Nativa. 700-3200 m.
Países: ARG(BAI, COR, SAL, TUC).
BRA(RGS, SCA).

Deparia Hook. & Grev

Deparia petersenii (Kunze) M.Kato

Sin.: *Asplenium petersenii* Kunze,
Athyriopsis petersenii (Kunze) Ching,
Diplazium intercalatum H. Christ,
Diplazium japonicum (Thunb.) Bedd.,
Diplazium petersenii (Kuntze) H.
Christ, *Lunathyrium petersenii* (Kunze)
H. Ohba

Hierba rupícola. Introducida. 100-1000
m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).
PRY(CAA).

Diplazium Sw.

Diplazium ambiguum Raddi

Sin.: *Asplenium radicans* Schkuhr var.
ambiguum (Raddi) Baker, *Athyrium*
ambiguum (Raddi) Milde, *Diplazium*
brasiliense Rosenst. var.
grossedentata Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAU, COA, PAI).

Diplazium asplenioides C. Presl

Sin.: *Allantodia asplenioides* Kunze,
Diplazium ambiguum Raddi var.
pubescens Rosenst., *Diplazium*
brasiliense Rosenst.

Hierba. Nativa. m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Diplazium brachycarpum Mynssen & L.
Sylvestre

Hierba. Nativa. 400-1500 m.

Países: BRA(SCA).

Diplazium celtidifolium Kunze

Sin.: *Diplazium celtidifolium* Kunze var.
puberulum Stolze
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Diplazium cristatum (Desr.) Alston

Sin.: *Asplenium arboreum* Willd.,
Asplenium shepherdii Spreng.,
Diplazium arboreum (Willd.) C. Presl,
Diplazium shepherdii (Spreng.) Link,
Meniscium cristatum Desr.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS,
SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAN).

Diplazium divergens Rosenst.

Hierba. Nativa. 1000-1700 m.

Países: ARG(JUJ).

Diplazium fuenzalidae Espinosa

Hierba. Endémica. 200-400 m.

Países: CHL(IPA).

Diplazium herbaceum Fée

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Diplazium hians Kunze ex Klotzsch

Hierba. Nativa. 200-400 m.

Países: PRY(CAN).

Diplazium leptocarpon Fée

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Diplazium lilloi (Hicken) R.M. Tryon & A.
F. Tryon

Sin.: *Athyrium lilloi* (Hicken) Alston,
Athyrium lilloi (Hicken) C.V. Morton,
comb. superfl., *Dryopteris lilloi*
(Hicken) Hicken, *Nephrodium lilloi*
Hicken

Hierba terrestre. Nativa. 400-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Diplazium lindbergii (Mett.) H. Christ

Sin.: *Asplenium lindbergii* Mett.

Hierba terrestre. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Diplazium mattogrossense A. Samp.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR).

Diplazium moccennianum (Sodirot) C. Chr.

Sin.: *Asplenium moccenianum* Sodirot

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(MIS).

Notas: Citada para el Sur de Brasil (Arana et al., 2016: 60)

Diplazium mutilum Kunze

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Diplazium plantaginifolium (L.) Urb.

Sin.: *Asplenium plantaginifolium* L.,

Diplazium acuminatum Raddi

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Diplazium riedelianum (Bong. ex Kuhn)

Kuhn ex C. Chr.

Sin.: *Asplenium riedelianum* Bong. ex Kuhn, *Diplazium riedelianum* Kunze, hom. illeg.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Diplazium rostratum Fée

Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Diplazium striatastrum Lellinger

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Diplazium striatum (L.) C. Presl

Sin.: *Asplenium striatum* L.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). URY(CLA, TAC).

Diplazium tabalosense Hieron.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Diplazium tamandarei Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Diplazium turgidum Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Diplazium urticifolium H. Christ

Hierba terrestre. Nativa. 100-400 m.

Países: PRY(CAN).

BLECHNACEAE

Austroblechnum Gasper & V.A.O.

Dittrich

Austroblechnum × rodriguezii (Aguar, Quintanilla & Amigo) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum x rodriguezii* Aguar, Quintanilla & Amigo

Hierba. Endémica. 100-600 m.

Países: CHL(LSR, LLA).

Austroblechnum asperum (Klotzsch)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum asperum* (Klotzsch) J.W. Sturm, *Lomaria aspera* Klotzsch

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Austroblechnum corralense (Espinosa)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum corralense* Espinosa

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(LSR, LLA).

Austroblechnum divergens (Kunze)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum divergens* (Kunze) Mett., *Lomaria divergens* Kunze

Hierba. Nativa. 100-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Austroblechnum fernandezianum

(Looser) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum blechnoides* (Bory) Keyserl. var. *fernandezianum* Looser, *Blechnum mochaenum* G. Kunkel var. *fernandezianum* (Looser) de la Sota

Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 100-1100 m.

Países: CHL(JFE).

Austroblechnum lechleri (T. Moore)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum mochaenum* G. Kunkel var. *mochaenum*, *Lomaria lechleri* T. Moore

Hierba. Nativa. 500-1800 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, TUC). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Austroblechnum lehmannii (Hieron.)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum lehmanii* Hieron., *Blechnum mexiae* Copel.,

Struthiopteris mexiae (Copel.) Ching

Hierba terrestre. Nativa. 100-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Austroblechnum leyboldtianum (Phil.)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum blechnoides* Keyserl., *Blechnum lomarioides* Mett., hom. illeg., *Blechnum valdiviense* C. Chr., *Lomaria leyboldtiana* Phil., *Spicanta leyboldtiana* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Austroblechnum microphyllum

(Goldm.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum andicola* (Phil.) C. Chr., *Blechnum araucanum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm, *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm f. *germainii* (Hook.) Looser, *Blechnum germainii* (Hook.) H. Christ, *Blechnum microphyllum* (Goldm.) C.V. Morton, *Blechnum poeppigianum* J.W. Sturm, *Lomaria andicola* Phil., *Lomaria araucana* Phil., *Lomaria australis* Kunze, *Lomaria gayana* J. Remy, *Lomaria germainii* Hook., *Lomaria microphylla* Goldm.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Austroblechnum organense (Brade)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum organense* Brade

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Austroblechnum penna-marina (Poir.)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum alpinum* (R. Br.) Mett., *Blechnum alpinum* Mett. var. *elongatum* Mett., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn f. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn subsp. *alpina* (R. Br.) T.C. Chambers & P.A. Farrant, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *bolivianum* Rosenst. ex Looser, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) Looser, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var.

uliginosum (Phil.) C. Chr., *Blechnum uliginosum* (Phil.) C. Chr., *Lomaria alpina* (R. Br.) Spreng., *Lomaria antarctica* Carmich., *Lomaria penna-marina* (Poir.) Trevis, *Lomaria polypodioides* Desv. ex Gaudich., *Lomaria uliginosa* Phil., *Lomaria uliginosa* Phil. var. *magellanica* Phil., *Polypodium penna-marina* Poir., *Stegania alpina* R. Br., *Struthiopteris penna-marina* (Poir.) Maxon & C.V. Morton

Hierba. Cosmopolita. 0-4500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Austroblechnum squamipes (Hieron.)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum lanceolatum* (R. Br.) J.W. Sturm var. *squamipes* Hieron., *Blechnum mochaenum* G. Kunkel subsp. *squamipes* (Hieron.) Prada & Rolleri, *Blechnum mochaenum* G. Kunkel var. *squamipes* (Hieron.) de la Sota, *Blechnum squamipes* (Hieron.) M. Kessler & A.R. Sm.

Hierba. Nativa. 800-1800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA).

Austroblechnum vallegrandense (M.

Kessler & A.R. Sm.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum blechnoides* (Bory) Keyserl. var. *achalense* (Hieron.) Looser, *Blechnum lanceolatum* (R. Br.) J.W. Sturm var. *achalense* Hieron., *Blechnum mochaenum* G. Kunkel subsp. *achalense* (Hieron.) Prada & Rolleri, *Blechnum mochaenum* G. Kunkel var. *achalense* (Hieron.) de la Sota, *Blechnum vallegrandense* M. Kessler & A.R. Sm.

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 500-800 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Blechnum L.

Blechnum arcuatum J. Remy ex Gay

Sin.: *Blechnum acuminatum* J.W. Sturm, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Blechnum asplenioides Sw.

Sin.: *Blechnum ceteracinum* Raddi, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var. *pallidum* Rosenst., *Blechnum unilaterale* Sw., nom. superfl.

Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN, COA).

Blechnum auriculatum Cav.

Sin.: *Blechnum australe* L. f. *mucronatodentata* Rosenst., *Blechnum australe* L. subsp. *auriculatum* (Cav.) de la Sota, *Mesothema auriculatum* (Cav.) C. Presl

Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, MIS, RNE, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, RIV, SJO, TAC, TYT).

Blechnum austrobrasilianum de la Sota

Sin.: *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link subsp. *austrobrasilianum* (de la Sota) Prada & Rolleri, *Blechnum rosenstockii* de la Sota, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 200-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).
URY(LAV, TYT).

Blechnum x caudatum Cav.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Blechnum gracile Kaulf.

Sin.: *Blechnum diploxycum* Fée,
Blechnum subdimorphum Copel.
Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, PAI).

Blechnum hastatum Kaulf.

Sin.: *Blechnopteris hastata* (Kaulf.) Trevis., *Blechnum auriculatum* Cav. f. *parvula* (Phil.) C. Chr. & Skotts., *Blechnum auriculatum* Cav. f. *remotum* (C. Presl) C. Chr. & Skotts., *Blechnum auriculatum* Cav. var. *hastatum* (Kaulf.) Looser, *Blechnum auriculatum* Cav. var. *parvulum* (Phil.) Looser, *Blechnum auriculatum* Cav. var. *trilobum* (C. Presl) Osten & Herter, *Blechnum australe* L. f. *trilobum* (C. Presl) Rosenst., *Blechnum australe* L. subsp. *hastatum* (Kaulf.) Prada & Roller, *Blechnum australe* L. var. *hastata* (Kaulf.) Hieron., *Blechnum australe* L. var. *triloba* (C. Presl) Hieron., *Blechnum brevifolium* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel f. *acuminatum* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel f. *imbricatum* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel f. *nervosum* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel f. *semidecurrens* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel subsp. *parvulum* (Phil.) G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *valdiviense* G. Kunkel, *Blechnum*

ciliatum C. Presl, *Blechnum hastatum* Kaulf. f. *alternatum* G. Kunkel, *Blechnum hastatum* Kaulf. f. *punctatum* (Looser) G. Kunkel, *Blechnum hastatum* Kaulf. var. *minus* Hook., *Blechnum hastatum* Kaulf. var. *trilobum* (C. Presl) G. Kunkel, *Blechnum parvulum* Phil., *Blechnum remotum* C. Presl, *Blechnum trilobum* C. Presl, *Lomaria hastata* (Kaulf.) Kunze, *Lomaria triloba* (C. Presl) Fée, *Mesothema hastatum* (Kaulf.) C. Presl, *Mesothema remotum* (C. Presl) C. Presl, *Parablechnum ciliatum* (C. Presl) C. Presl, *Spicanta hastata* (Kaulf.) Kuntze, *Struthiopteris hastata* (Kaulf.) Trevis., *Struthiopteris remota* (C. Presl) Trevis., *Struthiopteris triloba* (C. Presl) Trevis., *Taenitis sagittaefera* Bory

Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE).

Blechnum laevigatum Cav.

Sin.: *Blechnum distans* C. Presl, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var. *distans* (C. Presl) C. Chr., *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var. *meridionale* (C. Presl) Sehnem, *Blechnum juergensii* Rosenst., *Blechnum occidentale* L. var. *distans* (C. Presl) Baker

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, SLU). BRA(PAR, RGS). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLO, MAL, RIV, SOR, TAC).

Blechnum lanceola Sw.

Sin.: *Blechnum integerrimum* Spreng., *Blechnum lanceola* Sw. f. *minus* Hassl., *Blechnum lanceola* Sw. var. *trifoliatum* (Kaulf.) C. Presl, *Blechnum lanceolatum* Raddi, *Blechnum minutulum* H. Christ, *Blechnum plantagineum* (C. Presl) Hook., *Blechnum trifoliatum* Kaulf., *Mesothema plantagineum* C. Presl, *Spicantha lanceola* (Sw.) Kuntze

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(APA, CAN, COA, GUA).

Blechnum x leopoldense (Dutra) V.A.O. Dittrich & Salino

Sin.: *Blechnum occidentale* L. var. *leopoldense* Dutra
Hierba terrestre. Endémica. 100-600 m.
Países: BRA(RGS).

Blechnum ludificans Herter

Hierba terrestre. Endémica. 100-200 m.
Países: URY(DUR).

Blechnum malacothrix Maxon & C.V. Morton

Hierba. Nativa. 1700-1800 m.
Países: ARG(SAL).

Blechnum occidentale L.

Sin.: *Blechnum appendiculatum* Willd., *Blechnum campylotis* (Kunze) J. Sm., *Blechnum cartilagineum* Schkuhr, *Blechnum cognatum* C. Presl, *Blechnum distans* C. Presl var. *meridionale* (C. Presl) Rosenst., *Blechnum flaccisquama* A. Rojas, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var. *elongatum* Kunze, *Blechnum lomarioides* Sodiro, *Blechnum meridionale* C. Presl, *Blechnum mucronatum* Fée, *Blechnum*

occidentale L. var. *caudatum* (Cav.) Hook., *Blechnum occidentale* L. var. *lacerata* Rosenst., *Blechnum occidentale* L. var. *pubirhachis* Rosenst., *Blechnum scaberulum* Sodiro, *Blechnum suburbicum* Vell., *Lomaria campyloides* Kunze, *Mesothema campyloides* (Kunze) C. Presl

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Notas: Citada para Chile por Dittrich et al. (2015) sin citar localidad ni ejemplar de referencia

Blechnum x pampasicum de la Sota & Durán

Hierba. Endémica.

Países: ARG(BAI, COR, SAL, SLU). URY.

Blechnum polypodioides Raddi

Sin.: *Asplenium blechnoides* Lag. ex Sw., *Blechnum angustifrons* Fée, *Blechnum blechnoides* (Lag. ex Sw.) C. Chr., comb. illeg., *Blechnum pohlianum* C. Presl, *Blechnum scabrum* Liebm., *Blechnum unilaterale* Sw. f. *maius* Sehnem

Hierba terrestre. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA).

Cranfillia Gasper & V.A.O. Dittrich

Cranfillia caudata (Baker) V.A.O. Dittrich & Gasper

Sin.: *Blechnum sprucei* C. Chr., *Cranfillia sprucei* (C. Chr.) Gasper & V.A.O. Dittrich, nom. superfl., *Lomaria caudata* Baker

Hierba. Nativa. 1400-2400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Notas: Citada para el sur de Brasil (Tryon & Stolze, 1993) sin indicar localidad o material de referencia.

Cranfillia longicauda (C. Chr.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum longicauda* C. Chr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Cranfillia mucronata (Fée) V.A.O. Dittrich & Gasper

Sin.: *Blechnum sampaioanum* Brade, *Cranfillia sampaioana* (Brade) Gasper & V.A.O. Dittrich, nom. superfl., *Lomaria mucronata* Fée

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). URY(CLA).

Doodia R. Br.

Doodia paschalis C. Chr.

Sin.: *Blechnum paschale* (C. Chr.) Christenh.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(IPA).

Lomaria Willd.

Lomaria spannagelii (Rosenst.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum spannagelii* Rosenst., *Blechnum spannagelii* Rosenst. f. *pectinata* Rosenst.

Hierba. Nativa. 400-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lomaridium C. Presl

Lomaridium plumieri (Desv.) C. Presl

Sin.: *Lomaria plumierii* Desv.

Hemiepífita. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

Notas: Citada para Paraguay por Dittrich et al. (2017) sin citar localidad ni ejemplar de referencia

Lomaridium schottii (Colla) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum schottii* (Colla) C. Chr., *Lomaria bella* Phil., *Lomaria fernandeziana* Phil., *Lomaria schottii* Colla

Hierba hemiepífita. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(JFE).

Lomariocycas (J. Sm.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Lomariocycas cycadifolia (Colla) Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum cycadifolium* (Colla) J.W. Sturm, *Blechnum lanuginosum* (Kunze) J.W. Sturm, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *cycadifolium* (Colla) C. Chr., *Lomaria cycadifolia* Colla, *Lomaria lanuginosa* Kunze, *Struthiopteris cycadifolia* (Colla) Ching

Arborescente. Endémica. 100-1200 m.

Países: CHL(JFE).

Lomariocycas magellanica (Mett.) Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett., *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. f. *kochii* G. Kunkel, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *angustiseta* (Bory ex d'Urv.) C.V. Morton, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *bipinnatifidum* G. Kunkel, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *setigerum* (Gaudich.) C. Chr., *Blechnum tabulare* (Thunb.) Kuhn var. *setigerum* (Gaudich.) Capurro, *Lomaria*

magellanica Desv., *Lomaria magellanica* Desv. var. *angustiseta* Bory ex d'Urv., *Lomaria setigera* Gaudich.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Lomariocycas moritziana (Klotzsch) Gabriel y Galán & Vicent.

Sin.: *Blechnum moritzianum* (Klotzsch) Hieron., *Blechnum yungense* Ramos Giacosa, *Lomaria moritziana* Klotzsch, *Lomariocycas yungensis* (Ramos Giacosa) Gasper & A.R. Sm.

Hierba. Nativa. 1600-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Lomariocycas obtusifolia (Ettingsh.) Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum obtusifolium* Ettingsh.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN, PAI). URY(CAS, CLA, MAL, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Notas: Citada por Peña-Chocarro (1999) para Argentina y por Tryon & Stolze (1993) para Brasil sin indicar localidad o material de referencia.

Lomariocycas schomburghii (Klotzsch) Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum bradei* Markgr., *Blechnum exiguum* Dutra, *Blechnum imperiale* (Fée & Glaz.) H. Christ, *Blechnum schomburghii* (Klotzsch) C. Chr., *Blechnum tabulare* (Thunb.) Kuhn var. *imperiale* (Fée & Glaz.) Luetzelb., *Lomaria imperialis* Fée & Glaz., *Lomaria schomburghii* Klotzsch, *Struthiopteris imperialis* (Fée & Glaz.) Ching

Hierba. Nativa. 100-1800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, GUA).

Neoblechnum Gasper & V.A.O. Dittrich

Neoblechnum brasiliense (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnopsis brasiliensis* (Desv.) C. Presl, *Blechnum brasiliense* Desv., *Blechnum brasiliense* Desv. var. *angustifolium* Sehnem, *Blechnum corcovadense* Raddi, *Blechnum fluminense* Vell., *Blechnum nigrosquamatum* Gilb., *Blechnum nitidum* C. Presl

Arborescente. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, SPE). URY(CLA, CLA, TAC, TYT).

Parablechnum C. Presl

Parablechnum brasiliense (Raddi) M.T. Medeiros & Schwartsb.

Sin.: *Lomaria brasiliensis* Raddi

Hierba. Nativa.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Parablechnum chilense (Kaulf.) Gasper & Salino

Sin.: *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett., *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. var. *reedii* (Phil.) Looser, *Blechnum reedii* (Phil.) Espinosa, *Lomaria chilensis* Kaulf., *Lomaria reedii* Phil.,

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Parablechnum cordatum (Desv.) Gasper & Salino

Sin.: *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. f. *imbricatum* G. Kunkel, *Blechnum cordatum* (Desv.) Hieron., *Blechnum euraddianum* Brade, nom. inval., *Blechnum gilliesii* (Hook. & Grev.) Mett., *Blechnum macahense* Brade, *Blechnum ornifolium* (C. Presl) Ettingsh., *Blechnum raddianum* Rosenst., *Blechnum regnellianum* (Kunze) C. Chr. var. *elatus* Sehnem, *Blechnum arborescens* (Klotzsch & H. Karst.) Hieron., *Blechnum peruvianum* Hieron., *Lomaria arborescens* Klotzsch & H. Karst., *Lomaria brasiliensis* Raddi, hom. illeg., *Lomaria cordata* Desv., *Lomaria gilliesii* Hook. & Grev., *Lomaria ornifolia* C. Presl, *Lomaria serrulosa* Desv., *Struthiopteris brasiliensis* (Raddi) Maxon & C.V. Morton

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(CAU, COA, SPE). URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO, TAC).

Parablechnum regnellianum (Kunze) G.M.O. Machado & Gasper

Sin.: *Blechnum regnellianum* (Kunze) C. Chr., *Blechnum simile* Sehnem, *Lomaria regnelliana* Kunze

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).

Parablechnum usterianum (Christ) Gasper & Salino

Sin.: *Blechnum usterianum* (Christ) C. Chr., *Lomaria usteriana* Christ

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Salpichlaena J. Sm.

Salpichlaena papyrus G.G. Cárdenas,
Tuomisto & Lehtonen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J. Sm.
Sin.: *Blechnum scandens* Bory, *Blechnum*
volubilis Kaulf., *Salpichlaena scandens*
(Bory) C. Presl
Hierba. Nativa. 200-1900 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Telmatoblechnum Perrie, D.J.
Ohlsen & Brownsey

Telmatoblechnum serrulatum (Rich.)
Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey
Sin.: *Blechnopsis serrulata* (Rich.) C.
Presl, *Blechnum angustatum* Schrad.,
Blechnum angustifolium Willd.,
Blechnum calophyllum Langsd. &
Fisch., *Blechnum molucanum* Desv.,
Blechnum serrulatum Rich., *Blechnum*
serrulatum Rich. var. *stierii* (Rosenst.)
Rosenst., *Blechnum stagninum* Raddi,
Blechnum stierii Rosenst., *Spicanta*
serrulata (Rich.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CEN, COA, PAI, SPE). URY(RIV).

CULCITACEAE**Culcita** C. Presl

Culcita coniifolia (Hook.) Maxon
Sin.: *Balantium coniifolium* (Hook.) J. Sm.,
Dicksonia coniifolia Hook.
Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CYATHEACEAE**Alsophila** R. Br.

Alsophila capensis (L. f.) J. Sm. subsp.
capensis
Sin.: *Polypodium capense* L. f.
Arborescente. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Alsophila capensis (L. f.) J. Sm. subsp.
polypodioides (Sw.) D.S. Conant
Sin.: *Cyathea polypodioides* Sw.,
Hemitelia gardneriana C. Presl
Arborescente. Endémica. 900-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Alsophila cuspidata (Kunze) D.S.
Conant
Sin.: *Cyathea cuspidata* Kunze, *Cyathea*
hassleriana H. Christ var. *hassleriana*,
Cyathea hassleriana H. Christ var.
rojasii H. Christ, *Nephelea cuspidata*
(Kunze) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 100-1000 m.
Países: PRY(CAA, CAN, COA).

Alsophila elata O.G. Martínez
Arbolito. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Alsophila odonelliana (Alston) Lehnert
Sin.: *Cyathea odonelliana* Alston
Arborescente. Nativa. 900-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Alsophila setosa Kaulf.
Sin.: *Alsophila dorsalis* (Fée) H. Christ,
Cyathea leucosticta Fée, *Cyathea*
setosa (Kaulf.) Domin, *Hemitelia*
beyrichiana C. Presl, *Hemitelia setosa*
(Kaulf.) Mett., *Hemitelia setosa* Kaulf.

var. *crenata* Rosenst., *Lophosoria*
dorsalis Fée, *Nephelea setosa* (Kaulf.)
R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,
COA, PAI, SPE).

Alsophila sternbergii (Pohl ex Sternb.)
D.S. Conant
Sin.: *Cyathea acanthomelas* Fée, *Cyathea*
rojasii C. Chr., *Cyathea sternbergii*
Pohl ex Sternb., *Nephelea sternbergii*
(Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon,
Nephelea sternbergii (Pohl ex Sternb.)
R.M. Tryon f. *acanthomelas* (Fée)
Brade, *Nephelea sternbergii* (Pohl ex
Sternb.) R.M. Tryon var. *acanthomelas*
(Fée) Gastony
Arborescente. Nativa. 100-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAA,
CAN, COA, PAI).

Cyathea Sm.

Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.)
Domin
Sin.: *Alsophila atrovirens* (Langsd. & +
Fisch.) C. Presl, *Alsophila compta* (Mart.)
Mart., *Alsophila dryopteroides* Domin
var. *fallacina* Domin, *Alsophila*
hookeriana Hook., *Alsophila kleinii*
Sehnem, *Alsophila leptocladia* Fée,
Alsophila miquelii Kunze ex Rosenst.,
Alsophila proceroides Rosenst.,
Alsophila radens Kaulf., *Alsophila*
trichophlebia Baker, *Alsophila*
verruculosa Rosenst., *Cyathea compta*
Mart., *Cyathea radens* (Kaulf.) Domin,
Polypodium atrovirens Langsd. &
Fisch., *Trichipteris atrovirens* (Langsd.
& Fisch.) R.M. Tryon, *Trichipteris*
compta (Mart.) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin
Sin.: *Alsophila campestrum* Sehnem, *Alsophila corcovadensis* (Raddi) C. Chr., *Alsophila elegans* Mart. var. *crenato-serrata* Sehnem, *Polypodium corcovadense* Raddi, *Trichipteris corcovadensis* (Raddi) Copel., *Trichipteris elegans* Fée
Arborescente. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyathea delgadoi Pohl ex Sternb.
Sin.: *Cyathea feei* Glaz. ex Fée, *Cyathea hirtula* Mart., *Cyathea schanschin* Mart., *Cyathea vestita* Mart.
Arborescente. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA, PAI, SPE).

Cyathea dichromatolepis (Fée) Domin
Sin.: *Alsophila dichromatolepis* Fée, *Alsophila serrae* Sehnem, *Trichipteris dichromatolepis* (Fée) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyathea feeana (C. Chr.) Domin
Sin.: *Alsophila elegans* Mart., *Alsophila feeana* C. Chr., *Alsophila glaziovii* Baker, hom. illeg., *Trichipteris feeana* (C. Chr.) Copel.
Arborescente. Nativa. 500-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyathea hirsuta C. Presl
Sin.: *Alsophila hirta* Kaulf.
Arborescente. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyathea leucofolis Domin
Sin.: *Alsophila leucolepis* Mart., *Alsophila nigrescens* (Hook. ex Baker) Sehnem, *Alsophila paleolata* Mart. var. *nigrescens* Hook. ex Baker, *Cyathea axillaris* (Fée) Lellinger, *Phegopteris axillaris* Fée, *Polypodium axillare* Raddi, *Trichipteris leucolepis* (Mart.) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyathea microdonta (Desv.) Domin
Sin.: *Polypodium microdontum* Desv.
Arborescente. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Cyathea x miersii (Hook.) Domin
Sin.: *Alsophila acantha* Sehnem, *Alsophila decipiens* Fée, *Alsophila miersii* Hook.
Arborescente. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Cyathea myriotricha (Baker) R.C. Moran & J. Prado
Sin.: *Polypodium myriotrichum* Baker
Arborescente. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cyathea phalerata Mart.
Sin.: *Alsophila iheringii* Rosenst., *Alsophila phalerata* (Mart.) Mart., *Alsophila reitzii* Sehnem, *Cyathea iheringii* (Rosenst.) Domin, *Trichipteris phalerata* (Mart.) Barrington
Arborescente. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyathea poeppigii (Hook.) Domin
Sin.: *Alsophila impressa* Fée, *Alsophila plagiopteris* Mart., *Alsophila poeppigii* Hook., *Alsophila tijucensis* Fée, *Cyathea plagiopteris* (Mart.) Domin, *Sphaeropteris elongata* (Hook.) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(COA).

Cyathea praecinta (Kunze) Domin
Sin.: *Alsophila praecinta* Kunze
Arborescente. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyathea uleana (Samp.) Lehnert
Sin.: *Hemitelia uleana* Samp.
Arborescente. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Cyathea villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Alsophila cipoensis* Sehnem, *Alsophila rigidula* Mart., *Alsophila villosa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Desv., *Trichipteris villosa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sphaeropteris Bernh.

Sphaeropteris gardneri (Hook.) R.M. Tryon
Sin.: *Alsophila gardneri* Hook., *Cyathea gardneri* Hook.
Arborescente. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

CYSTOPTERIDACEAE

Cystopteris Bernh.

Cystopteris apiiformis Gand.
Sin.: *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. var. *apiiformis* (Gand.) C. Chr. ex Blasdel
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(AYP, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Cystopteris diaphana (Bory) Blasdel
 Sin.: *Asplenium diaphanum* (Bory) Lojac.,
Athyrium fumarioides C. Presl,
Cystopteris canariensis C. Presl,
Cystopteris emarginulata C. Presl,
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp.
diaphana (Bory) Litard., *Cystopteris*
fumarioides (C. Presl) Kunze,
Polypodium diaphanum Bory
 Hierba terrestre. Nativa. 200-2000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, FOR,
 JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS,
 SCA). URY(CLA, RIV).

DENNSTAEDTIACEAE

Blotiella R.M. Tryon

Blotiella lindeniana (Hook.) R.M. Tryon
 Sin.: *Lonchitis lindeniana* Hook.
 Hierba. Nativa.
 Países: BRA(SCA).

Dennstaedtia Bernh.

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore
 Sin.: *Dennstaedtia decomposita* (H.
 Christ) H. Christ, *Dennstaedtia*
rubiginosa (Kaulf.) T. Moore,
Dicksonia angustidens C. Presl,
Dicksonia apiifolia Sw. var. *dissecta*
 Desv. ex Kunze, *Dicksonia cicutaria*
 Sw., *Dicksonia decomposita* H. Christ,
Dicksonia rubiginosa Kaulf.
 Hierba. Nativa. 200-2000 m.
 Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
 CAA, COA).

Dennstaedtia cornuta (Kaulf.) Mett.
 Sin.: *Dicksonia cornuta* Kaulf.
 Hierba. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Dennstaedtia dissecta (Sw.) T. Moore
 Sin.: *Dennstaedtia erosa* (Kunze) T.
 Moore, *Dennstaedtia obtusifolia*
 (Willd.) T. Moore, *Dicksonia dissecta*
 Sw., *Dicksonia erosa* Kunze,
Dicksonia obtusifolia Willd.,
Polypodium dissectum Sw., hom. illeg.
 Hierba. Nativa. 300-2600 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(CEN, COA, MIE, PAI).

Dennstaedtia glauca (Cav.) C. Chr. ex
 Looser
 Sin.: *Davallia glauca* Cav., *Dennstaedtia*
lambertiana (J. Remy) C. Chr.,
Dicksonia lambertiana J. Remy
 Hierba. Nativa. 300-3200 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
 TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
 RME).

Histiopteris (J. Agardh) J. Sm.

Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.
 Sin.: *Histiopteris incisa* (Thunb.) J. Sm.
 var. *flavescens* (Colla) C. Chr.,
Litobrochia appendiculata (Kaulf.) J.
 Remy, *Litobrochia incisa* (Thunb.) C.
 Presl, *Pteris flavescens* Colla, *Pteris*
incisa Thunb.,
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 CHL(LLA, AIS, MAG, JFE).

Hypolepis Bernh.

Hypolepis acantha Schwartsb.
 Hierba. Nativa. 0-100 m.
 Países: BRA(PAR, RGS).

Hypolepis hostilis (Kunze) C. Presl
 Sin.: *Cheilanthes hostilis* Kunze
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Hypolepis mitis Kuhn
 Hierba. Nativa. 200-1100 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypolepis poeppigii (Kunze) R. Rodr.
 Sin.: *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. var.
pubescens Phil., *Dryopteris sturmii*
 (Phil.) C. Chr., *Hypolepis poeppigii*
 (Kunze) Mett. ex Maxon, comb. illeg.,
Hypolepis rugosula (Labill.) J. Sm. var.
poeppigii (Kunze) C. Chr., *Hypolepis*
rugosula (Labill.) J. Sm. var. *poeppigii*
 (Kunze) C. Chr. & Skottsb., nom. illeg.,
Phegopteris poeppigii (Kunze) Fée ex
 Gay, *Phegopteris sturmii* Phil.,
Polypodium poeppigii Kunze
 Hierba. Nativa. 0-2800 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
 TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
 BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME,
 JFE).

Hypolepis repens (L.) C. Presl
 Sin.: *Cheilanthes repens* (L.) Kaulf.,
Lonchitis repens L.
 Hierba. Nativa. 300-700 m.
 Países: PRY(AMA, CON).

Hypolepis rigescens (Kunze) T. Moore
 var. *paranaensis* Schwartsb.
 Hierba. Endémica. 200-300 m.
 Países: BRA(PAR).

Hypolepis rigescens (Kunze) T. Moore
 var. *rigescens*
 Sin.: *Cheilanthes rigescens* Kunze,
Polypodium punctatum Thunb. f.
rigescens (Kunze) Baker
 Hierba. Nativa. 400-2000 m.
 Países: BRA(PAR).

Hypolepis rugosula (Labill.) J. Sm.
subsp. **poepigiana** (Mett.)
Schwartzb. & J. Prado

Sin.: *Hypolepis chilensis* Fée, nom. illeg.,
Hypolepis hauman-merckii Hicken,
Hypolepis poepigiana Mett.,
Phegopteris poepigii (Kunze) Fée ex
Gay var. *hirsuta* Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LSR, LLA,
AIS, MAG, JFE).

Hypolepis rugosula (Labill.) J. Sm.
subsp. **pradoana** Schwartzb.
Hierba. Nativa. 1200-2600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypolepis stolonifera Fée var.
delasotae Arana, A. Yañez &
Schwartzb.
Hierba. Endémica. 400-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Hypolepis stolonifera Fée var. **nebularis**
Schwartzb.
Hierba. Nativa. 1300-2400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hypolepis stolonifera Fée var.
stolonifera
Hierba. Nativa. 300-2300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Microlepia C. Presl

Microlepia speluncae (L.) T. Moore
Sin.: *Polypodium speluncae* L.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(SCA). PRY(APA, CEN,
GUA, PAI).

Microlepia strigosa (Thunb.) C. Presl
Sin.: *Trichomanes strigosum* Thunb.

Hierba. Nativa. 100-300 m.
Países: CHL(IPA).

Mucura L.A. Triana & Sundue

Mucura globulifera (Poir.) L.A. Triana &
Sundue

Sin.: *Dennstaedtia bradeorum* Rosenst.,
Dennstaedtia exaltata (Kunze) Hieron.,
comb. illeg., *Dennstaedtia globulifera*
(Poir.) Hieron., *Dennstaedtia gracilis*
A. Rojas & Tejero, *Dennstaedtia*
lagerheimii (Sodirol) C. Chr.,
Dennstaedtia tamandarei Rosenst.,
Dennstaedtia tenera (C. Presl) Mett.,
Dennstaedtia tenera (C. Presl) Mett.
var. *dentata* Hieron., *Dicksonia*
altissima Sm., nom. superfl., *Dicksonia*
exaltata Kunze, nom. superfl.,
Dicksonia globulifera (Poir.) Kuntze,
Dicksonia lagerheimii Sodirol,
Dicksonia tenera C. Presl, *Polypodium*
globuliferum Poir.

Hierba. Nativa. 200-2300 m.

Países: ARG(CHA, COR, JUJ, MIS,
SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAA, CAN, COA).
URY(CLA, PAY, RIV, TAC).

Paesia J. St.-Hil.

Paesia glandulosa (Sw.) Kunth
Sin.: *Cheilanthes glandulifera* Fée,
Cheilanthes glandulosa Sw.
Hierba. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pteridium Gled. ex Scop., nom. cons.

Pteridium esculentum (G. Forst.)
Cockayne var. **paedomorphicum**
Schwartzb. & J. Prado
Hierba. Nativa.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, PAI). URY(ART).

Pteridium esculentum (G. Forst.)
Cockayne subsp. **arachnoideum**
(Kaulf.) J.A. Thomson

Sin.: *Aspidium brasilianum* C. Presl,
Cheilanthes aquilinaris Fée,
Cystopteris brasiliana (C. Presl) C.
Presl, *Filix-foemina aquilina* (L.)
Farwell var. *arachnoidea* (Kaulf.)
Farwell, *Hypolepis aquilinaris* (Fée)
Christ, *Hypolepis brasiliana* (C. Presl)
Kuhn, *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn f.
arachnoideum (Kaulf.) Hieron.,
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp.
psittacinum (C. Presl) C. Chr.,
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var.
arachnoideum (Kaulf.) Brade,
Pteridium arachnoideum (Kaulf.)
Maxon, *Pteridium caudatum* (L.)
Maxon subsp. *arachnoideum* (Kaulf.)
Lellinger, *Pteridium psittacinum* (C.
Presl) Maxon, *Pteris aquilina* L. var.
arachnoidea (Kaulf.) Eaton, *Pteris*
aquilina L. var. *psittacina* (C. Presl)
Baker, *Pteris arachnoidea* Kaulf.,
Pteris esculenta G. Forst., *Pteris*
psittacina C. Presl

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAU, CAA, CAN, COA, PAI).
URY(ART, CLA, FLO, LAV, MAL,
ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Pteridium esculentum (G. Forst.)
Cockayne subsp. **gryphus** Schwartzb.
Nativa. 3000-3500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL).

DICKSONIACEAE

Dicksonia L'Hér.**Dicksonia berteriana** (Colla) Hook.

Sin.: *Balantium berterianum* Kunze,
Davallia berteriana Colla
 Arborescente. Endémica. 200-700 m.
 Países: CHL(JFE).

Dicksonia externa Skottsb.

Sin.: *Dicksonia berteriana* (Colla) Hook.
 var. *virgata* C. Chr. & Skottsb.
 Arborescente. Endémica. 200-700 m.
 Países: CHL(JFE).

Dicksonia sellowiana Hook.

Sin.: *Balantium sellowianum* (Hook.) C.
 Presl
 Arborescente. Nativa. 0-1300 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(APA). URY(CLA, TAC,
 TYT).

Lophosoria C. Presl**Lophosoria quadripinnata** (J.F. Gmel.) C. Chr.

Sin.: *Alsophila pruinata* (Sw.) Kaulf. ex
 Kunze, comb. superfl., *Alsophila*
quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.,
Cyathea discolor Bory, *Lophosoria*
pruinata (Sw.) C. Presl, comb. superfl.,
Polypodium cinereum Cav.,
Polypodium glaucum Sw., hom. illeg.,
Polypodium pruinatum Sw., hom.
 illeg., *Polypodium quadripinnatum* J.F.
 Gmel.

Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
 BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU,
 BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

DIDYMOCHLAENACEAE**Didymochlaena** Desv.**Didymochlaena truncatula** (Sw.) Sm.

Sin.: *Adiantum lunulatum* Houtt., hom.
 illeg., *Aspidium truncatulum* Sw.,
Didymochlaena lunulata Desv., nom.
 superfl., *Didymochlaena sinuosa*
 Desv., *Didymochlaena sinuosa* Desv.
 var. *microtheca* Fée
 Hierba. Nativa. 200-1400 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN,
 GUA). URY(TAC).

DRYOPTERIDACEAE**Arachniodes** Blume**Arachniodes denticulata** (Sw.) Ching

Sin.: *Polypodium denticulatum* Sw.,
Polystichum denticulatum (Sw.) J. Sm.
 Hierba. Nativa. 1600
 Países: BRA(PAR, SCA).

Bolbitis Schott**Bolbitis curupirae** (Lindm.) Ching ex C. Chr.

Sin.: *Acrostichum curupirae* Lindm.,
Acrostichum sculptaratum Lindm.,
Leptochilus curupirae (Lindm.) C. Chr.
 Hierba terrestre. Nativa. 0-200 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Bolbitis serratifolia (Mert. ex Kaulf.) Schott

Sin.: *Acrostichum contaminoides* (Christ)
 Lindm., *Acrostichum pervium* Lindm.,
Acrostichum serratifolium Mert. ex
 Kaulf., *Bolbitis crenata* (C. Presl) C.
 Chr., *Gymnopteris contaminoides*
 Christ, *Heteroneuron serratifolium*

(Mert. ex Kaulf.) Fée, *Leptochilus*
contaminoides (Christ) C. Chr.,
Leptochilus crenatus (C. Presl) C.
 Chr., *Leptochilus serratifolius* (Mert. ex
 Kaulf.) C. Chr., *Poecilopteris crenata*
 C. Presl

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
 BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA,
 GUA).

Ctenitis (C. Chr.) C. Chr.**Ctenitis abyssii** (Sehnem) Salino & Morais

Sin.: *Dryopteris abyssii* Sehnem
 Hierba rupícola. Endémica. 600-700 m.
 Países: BRA(RGS).

Ctenitis ampla (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching

Sin.: *Aspidium nemophilum* Kunze,
Ctenitis nemophila (Kunze) Ching,
Dryopteris nemophila (Kunze) C. Chr.,
Polypodium amplum Humb. & Bonpl.
 ex Willd.

Hierba terrestre. Nativa. 400-1800 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Ctenitis anniesii (Rosenst.) Copel.

Sin.: *Dryopteris anniesii* Rosenst.,
Dryopteris anniesii Rosenst. var.
ottonis Rosenst.

Hierba terrestre. Endémica. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ctenitis aspidioides (C. Presl) Copel.

Sin.: *Polypodium aspidioides* C. Presl
 Hierba terrestre. Endémica. 100-1000
 m.
 Países: BRA(PAR).

Ctenitis bigarellae Schwartsb., Labiak & Salino

Hierba rupícola. Endémica.

- Países: BRA(PAR).
- Ctenitis deflexa** (Kaulf.) Copel.
Sin.: *Dryopteris deflexa* (Kaulf.) C. Chr.,
Nephrodium vestitum Baker,
Polypodium deflexum Kaulf.
Hierba terrestre. Endémica. 900-1200 m.
Países: BRA(SCA).
- Ctenitis distans** (Brack.) Ching var. **distans**
Sin.: *Aspidium ctenitis* Link, *Dryopteris ctenitis* (Link) Kuntze, *Lastrea distans* Brack.
Hierba terrestre. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Ctenitis distans** (Brack.) Ching var. **isabellina** (Fée) R.S. Viveros & Salino
Sin.: *Aspidium isabellinum* Fée
Hierba terrestre. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Ctenitis eriocaulis** (Fée) Alston
Sin.: *Aspidium eriocaulon* Fée
Hierba terrestre. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAA, CAN).
- Ctenitis falciculata** (Raddi) Ching
Sin.: *Aspidium falciculatum* Raddi
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).
- Ctenitis fenestralis** (C. Chr.) Copel.
Sin.: *Dryopteris fenestralis* C. Chr.
Hierba terrestre. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Ctenitis flexuosa** (Fée) Copel.
Sin.: *Aspidium flexuosum* Fée
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(SCA).
- Ctenitis glandulosa** R.S. Viveros & Salino
- Hierba terrestre. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR).
- Ctenitis laetevirens** (Rosenst.) Salino & Morais
Sin.: *Dryopteris laetevirens* Rosenst.
Hierba terrestre. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).
- Ctenitis nervata** (Fée) R.S. Viveros & Salino
Sin.: *Aspidium nervatum* Fée, *Aspidium pedicellatum* H. Christ, *Ctenitis pedicellata* (H. Christ) Copel., *Dryopteris indecora* Rosenst., *Dryopteris pedicellata* (H. Christ) C. Chr.
Hierba terrestre. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Ctenitis paranaensis** (C. Chr.) Lellinger
Sin.: *Dryopteris falciculata* (Raddi) Kuntze var. *paranaensis* C. Chr., *Dryopteris paranaensis* (C. Chr.) Sehnem
Hierba terrestre. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) C. Chr. var. **tenuifolia** (C. Presl) R.S. Viveros & Salino
Sin.: *Lastrea tenuifolia* C. Presl
Nativa. 300-400 m.
Países: BRA(PAR).
- Ctenitis submarginalis** (Langsd. & Fisch.) Ching var. **submarginalis**
Sin.: *Ctenitis submarginalis* (Langsd. & Fisch.) Copel., comb. superfl., *Dryopteris collina* Christ, *Dryopteris sellowii* Hieron., *Dryopteris soriloba* Christ, *Dryopteris submarginalis* (Langsd. & Fisch.) C. Chr., *Nephrodium caripense* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hook., *Nephrodium submarginale* (Langsd. & Fisch.) A.
- Braun, *Polypodium submarginale* Langsd. & Fisch.
Hierba terrestre. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CLA, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
- Cyclodium** C. Presl
- Cyclodium meniscioides** (Willd.) C. Presl
Sin.: *Aspidium confertum* Kaulf., *Aspidium meniscioides* Willd., *Cyclodium confertum* (Kaulf.) C. Presl, *Dryopteris meniscioides* (Willd.) Kuntze, *Dryopteris meniscioides* (Willd.) Kuntze var. *conferta* (Kaulf.) C.V. Morton, *Nephrodium confertum* (Kaulf.) J. Sm., *Nephrodium meniscioides* (Willd.) J. Sm., *Stigmatopteris meniscioides* (Willd.) K.U. Kramer
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(AMA, CAN, ITA).
- Cyrtomium** C. Presl
- Cyrtomium falcatum** (L. f.) C. Presl
Sin.: *Aspidium falcatum* (L. f.) Sw., *Dryopteris falcata* (L. f.) Kuntze, *Phanerophlebia falcata* (L. f.) Copel., *Polypodium falcatum* L. f., *Polystichum falcatum* (L. f.) Diels
Hierba terrestre. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI).
- Dryopteris** Adans., nom. cons.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray

Sin.: *Dryopteris spinulosa* (O.F. Müll.)
Watt subsp. *dilatata* (Hoffm.) C. Chr.,
Polypodium dilatatum Hoffm.
Hierba terrestre. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).
Notas: Introducida en las Islas Malvinas
(Argentina)

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Sin.: *Aspidium filix-mas* (L.) Sw.,
Dryopteris patagonica Diem, *Filix filix-*
mas (L.) Farw., *Lastrea filix-mas* (L.)
C. Presl, *Nephrodium filix-mas* (L.)
Rich., *Polypodium filix-mas* L.,
Polystichum filix-mas (L.) Roth
Hierba terrestre. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).
Notas: Asilvestrada en Valdivia (Chile)

Dryopteris patula (Sw.) Underw.

Sin.: *Aspidium patulum* Sw., *Lastrea*
patula (Sw.) T. Moore, *Nephrodium*
patulum (Sw.) Baker
Hierba terrestre. Nativa. 400-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
BRA(RGS).
Notas: Citada para Paraguay sin indicar
material de referencia.

Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl.

Sin.: *Aspidium filix-mas* (L.) Sw. var.
parallelogrammum (Kunze) Hillebr.,
Aspidium paleaceum Lag. ex Sw.,
Aspidium parallelogrammum Kunze,
Aspidium wallichianum Spreng.,
Dichasium parallelogrammum (Kunze)
Fée, *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott
subsp. *parallelogramma* (Kunze)
Christ, *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott
var. *parallelogramma* (Kunze) Christ,
Dryopteris filix-mas (L.) Schott var.
parallelogramma (Kunze) Conz.,
comb. superfl., *Dryopteris paleacea*
(Sw.) C. Chr., nom. illeg., *Dryopteris*
parallelogramma (Kunze) Alston,

Lastrea filix-mas (L.) C. Presl var.
parallelogramma (Kunze) Bedd.,
Lastrea paleacea (Lag. ex Sw.) C.
Chr., comb. illeg., *Nephrodium filix-*
mas (L.) Rich. var. *paleaceum* (Sw.)
Mett., *Nephrodium filix-mas* (L.) Rich.
var. *parallelogrammum* (Kunze) Hook.,
Nephrodium parallelogrammum
(Kunze) C. Hope

Hierba terrestre. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum Schott ex J. Sm.,
nom. cons.

Elaphoglossum acutum (Fée) Brade

Sin.: *Acrostichum acutum* Fée
Hierba rupícola. Nativa. 1000
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum alpestre (Gardner) T.
Moore

Sin.: *Acrostichum alpestre* Gardner
Hierba. Nativa. 1400-1700 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum auricomum (Kunze) T.
Moore

Sin.: *Acrostichum auricomum* Kunze,
Acrostichum chrysolepis Fée,
Elaphoglossum chrysolepis (Fée)
Alston
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Elaphoglossum balansae C. Chr.

Sin.: *Elaphoglossum altosianum* H. Christ
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA,
CAU, PAI).

Elaphoglossum beaurepairei (Fée)
Brade

Sin.: *Acrostichum beaurepairei* Fée

Hierba. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum brachyneuron (Fée) J.
Sm.

Sin.: *Acrostichum brachyneuron* Fée,
Acrostichum lineare Fée,
Elaphoglossum lineare (Fée) T. Moore
Hierba. Nativa. 900-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum brevipes (Kunze) T.
Moore

Sin.: *Acrostichum brevipes* Kunze
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum burchellii (Baker) C.
Chr.

Sin.: *Acrostichum burchellii* Baker,
Acrostichum praelongum Fée,
Acrostichum tenerum Baker, hom.
illeg., *Elaphoglossum burchellii* (Baker)
C. Chr. var. *major* Rosenst.,
Elaphoglossum dusenii H. Christ,
Elaphoglossum praeslongum (Fée)
Brade
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAA, CAN).

Elaphoglossum crassinerve (Kunze) T.
Moore

Sin.: *Acrostichum crassinerve* Kunze
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum crassipes (Hieron.)
Diels

Sin.: *Acrostichum crassipes* Hieron.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa.
1000-3300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Elaphoglossum decoratum (Kunze) T.
Moore

Sin.: *Acrostichum decoratum* Kunze
Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum didymoglossoides C. Chr.
Hierba rupícola. Nativa. 1200-2000 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum dutrae Brade
Hierba terrestre. Endémica. 1000
Países: BRA(RGS).

Elaphoglossum edwallii Rosenst.
Sin.: *Elaphoglossum reitzii* Brade
Hierba. Nativa. 900-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum fonkii (Phil.) T. Moore
Sin.: *Acrostichum fonkii* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(LSR, LLA).
Notas: Citada como probable en Neuquén y Río Negro en la Argentina (de la Sota et al., 1998).

Elaphoglossum gayanum (Fée) T. Moore
Sin.: *Acrostichum gayanum* Fée, *Acrostichum leptophyllum* Fée, hom. illeg., *Elaphoglossum unduaviense* Rosenst. var. *leptophylloides* Rosenst.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS). URY(MAL).

Elaphoglossum glaziovii (Fée) Brade
Sin.: *Acrostichum glaziovii* Fée
Hierba epífita. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum hassleri H. Christ
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAN, COA).

Elaphoglossum horridulum (Kaulf.) J. Sm.

Sin.: *Acrostichum horridulum* Kaulf., *Acrostichum raddianum* Hook. & Grev., *Acrostichum spathulinum* Raddi
Hierba. Nativa. 900
Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum hybridum (Bory) Brack
Sin.: *Acrostichum hybridum* Bory, *Acrostichum lindbergii* Mett. ex Kuhn, *Elaphoglossum lindbergii* (Mett. ex Kuhn) Rosenst.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum iguapense Brade
Sin.: *Elaphoglossum acutifolium* Brade & Rosenst., nom. illeg.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum itatiayensis Rosenst.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 100
Países: BRA(SCA).

Elaphoglossum lagesianum Rosenst.
Hierba. Endémica. 900-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Elaphoglossum langsdorffii (Hook. & Grev.) T. Moore
Sin.: *Acrostichum langsdorffii* Hook. & Grev.
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum lindenii (Bory ex Fée) T. Moore
Sin.: *Acrostichum lindenii* Bory ex Fée, *Acrostichum squamatum* Sw., hom. illeg., *Acrostichum squamosum* Cav.,

Elaphoglossum squamatum (Sw.) T. Moore

Hierba. Nativa. 400 m.
Países: CHL(JFE).

Elaphoglossum lingua (C. Presl) Brack.
Sin.: *Acrostichum produens* Fée, *Olfersia lingua* C. Presl
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum lorentzii (Hieron.) H. Christ
Sin.: *Acrostichum lorentzii* Hieron.
Hierba. Nativa. 1000-3200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Elaphoglossum luridum (Fée) H. Christ
Sin.: *Acrostichum luridum* Fée, *Acrostichum schomburgkii* Fée, *Elaphoglossum schomburgkii* (Fée) T. Moore
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum macahense (Fée) Rosenst.
Sin.: *Acrostichum macahense* Fée
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum macrophyllum (Mett. ex Kuhn) Fée
Sin.: *Acrostichum hymenodistrum* Fée, *Acrostichum macrophyllum* Mett. ex Kuhn, *Elaphoglossum hymenodistrum* (Fée) Brade, *Elaphoglossum macrophyllum* (Mett. ex Kuhn) Fée var. *schmalzii* (Rosenst.) Alston, *Elaphoglossum schmalzii* Rosenst.
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum montanum Kieling-Rubio & P.G. Windisch
Hierba. Endémica. 600-1400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Elaphoglossum nigrescens (Hook.) T. Moore ex Diels
Sin.: *Acrostichum flaccidum* Fée var. *pallidum* Baker, *Acrostichum nigrescens* Hook., *Elaphoglossum wacketii* Rosenst., *Elaphoglossum williamsii* Vareschi
Hierba epífita. Nativa. 100-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum pachydermum (Fée) T. Moore
Sin.: *Acrostichum pachydermum* Fée, *Elaphoglossum gertii* Sehnem
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum papyraceum (Fée) F.B. Matos & R.C. Moran
Sin.: *Acrostichum papyraceum* Fée
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum paulistanum Rosenst.
Sin.: *Acrostichum wettsteinii* Christ.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum porteri Hicken
Sin.: *Elaphoglossum rudolphii* Espinosa
Hierba. Endémica. 600-900 m.
Países: CHL(LLA).

Elaphoglossum rigidum (Aubl.) Urb.
Sin.: *Acrostichum flaccidum* Fée, *Elaphoglossum flaccidum* (Fée) T. Moore, *Polypodium rigidum* Aubl.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum rubicundum (Pohl ex Ettingsh.) Alston
Sin.: *Acrostichum latifolium* Sw. var. *rubicundum* (Pohl ex Ettingsh.) Baker, *Acrostichum rubicundum* Pohl ex Ettingsh.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum schwackeanum Brade
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Elaphoglossum sellowianum (Klotzsch ex Kuhn) T. Moore
Sin.: *Acrostichum brasiliense* Spreng. ex Kuhn, *Acrostichum sellowianum* Klotzsch ex Kuhn
Hierba epífita o epipétrica. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum skottsbergii Krajina
Hierba. Endémica. 400-500 m.
Países: CHL(IPA).

Elaphoglossum spathulatum (Bory) T. Moore
Sin.: *Acrostichum jamesonii* Hook. & Grev., *Acrostichum piloselloides* C. Presl, *Acrostichum spathulatum* Bory, *Elaphoglossum jamesonii* (Hook. & Grev.) T. Moore, *Elaphoglossum piloselloides* (C. Presl) T. Moore, *Elaphoglossum spathulatum* (Bory) T. Moore var. *piloselloides* (C. Presl) C. Chr.
Hierba terrestre. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TAC).

Elaphoglossum squamipes (Hook.) T. Moore

Sin.: *Acrostichum craspedariaforme* Fée, *Acrostichum squamipes* Hook., *Elaphoglossum craspedariaforme* (Fée) Brade ex Alston
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 1000-1400 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum strictum (Raddi) T. Moore
Sin.: *Acrostichum strictum* Raddi
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum subarborescens Rosenst.
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum subcochleare H. Christ
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, COA, GUA, PAI).

Elaphoglossum tectum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) T. Moore
Sin.: *Acrostichum tectum* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Hierba. Nativa. 500-600 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum ulei C. Chr.
Sin.: *Elaphoglossum spannagelii* Rosenst.
Hierba. Endémica. 900-1100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Elaphoglossum vagans (Mett.) Hieron.
Sin.: *Acrostichum ovatum* Fée, *Acrostichum vagans* Mett., *Elaphoglossum bicolor* Rosenst., *Elaphoglossum schiffneri* C. Chr.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum yungense de la Sota
Hierba epífita o epipéfrica. Nativa. 800-1700 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Lastreopsis Ching

Lastreopsis amplissima (C. Presl) Tindale
Sin.: *Aspidium amplissimum* (C. Presl) Mett., *Aspidium latissimum* Fée, *Aspidium macrum* Fée, *Ctenitis amplissima* (C. Presl) Copel., *Dryopteris amplissima* (C. Presl) Kuntze, *Dryopteris amplissima* (C. Presl) Kuntze var. *subeffusa* C. Chr., *Nephrodium amplissimum* (C. Presl) Hook., *Polystichopsis amplissima* (C. Presl) Abbiatti, *Polystichum amplissimum* C. Presl, *Rumohra amplissima* (C. Presl) Ching
Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN).

Megalastrum Holttum

Megalastrum abundans (Rosenst.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Dryopteris abundans* Rosenst., *Dryopteris martiana* Rosenst.
Hierba terrestre. Nativa. 600-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Megalastrum adenopteris (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis adenopteris* (C. Chr.) Ching, *Dryopteris adenopteris* C. Chr., *Dryopteris oreocharis* Sehnem var. *canescens* Sehnem, *Dryopteris villosa* (L.) Kuntze var. *tomentosa* Rosenst.
Hierba terrestre. Nativa. 700-2100 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
BRA(RGS, SCA).

Megalastrum albidum R.C. Moran, J. Prado & Labiak
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAA).

Megalastrum brevipubens R.C. Moran, J. Prado & Labiak
Hierba. Nativa. 200-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, GUA).

Megalastrum ciliatum M. Kessler & A.R. Sm.
Hierba. Nativa. 1600-1900 m.
Países: ARG(JUU).

Megalastrum connexum (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis connexa* (Kaulf.) Copel., *Dryopteris connexa* (Kaulf.) C. Chr., *Nephrodium connexum* (Kaulf.) Hicken, *Phegopteris connexa* (Kaulf.) Fée, *Phegopteris late-adnata* H. Christ, *Polypodium connexum* Kaulf.
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, PAI). URY(CLA, RIV, TAC).

Megalastrum crenulans (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Aspidium crenulans* Fée, *Ctenitis crenulans* (Fée) Ching, *Dryopteris crenulans* (Fée) C. Chr., *Dryopteris crenulans* (Fée) C. Chr. f. *glandulosa* (Rosenst.) C. Chr., *Dryopteris villosa* (L.) Kuntze var. *glandulosa* Rosenst.
Hierba. Nativa. 600-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN).

Megalastrum fugaceum R.C. Moran, J. Prado & Sundue

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Megalastrum glabrieus (C. Chr. & Skottsb.) Sundue, Rouhan & R.C. Moran
Sin.: *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr. var. *glabrieus* C. Chr. & Skottsb.
Hierba terrestre. Endémica. 200-600 m.
Países: CHL(JFE).

Megalastrum inaequale (Kaulf. ex Link) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis macrosora* (Fée) Ching, *Dryopteris macrosora* (Fée) C. Chr., *Polypodium inaequale* Kaulf. ex Link
Hierba. Nativa. 100-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Megalastrum inaequalifolium (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis inaequalifolia* (Colla) Ching, *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr., *Dryopteris skottsbergii* C. Chr., *Dryopteris villosa* (L.) Kuntze var. *berteroana* (Hook.) C. Chr., *Polypodium berterioanum* Hook., nom. illeg., *Polypodium inaequalifolium* Colla
Hierba terrestre. Endémica. 200-600 m.
Países: CHL(JFE).

Megalastrum masafueriae Sundue, Rouhan & R.C. Moran
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(JFE).

Megalastrum oreocharis (Sehnem) Salino & Ponce
Sin.: *Ctenitis oreocharis* (Sehnem) R.M. Bueno & R.M. Senna, *Dryopteris connexa* (Kaulf.) C. Chr. var. *minor* D. Legrand, *Dryopteris oreocharis* Sehnem
Hierba terrestre. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, TAC).

Megalastrum spectabile (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Sin.: *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel, *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel var. *philippiana* (C. Chr.) R. Rodr., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr., comb. superfl., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr., comb. superfl., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr. var. *philippiana* C. Chr., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) Macloskie & Dusén, *Megalastrum spectabile* (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. *philippianum* (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran, *Phegopteris spectabilis* (Kaulf.) Fée, *Phegopteris vestita* Phil., *Polypodium contractum* Desv., *Polypodium spectabile* Kaulf., *Polypodium vestitum* (F. Phil.) Hook. Hierba terrestre. Endémica. 0-900 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Megalastrum substrigosum R.C. Moran, J. Prado & Labiak
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Megalastrum umbrinum (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Dryopteris umbrina* C. Chr.
Hierba. Nativa. 100-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Megalastrum wacketii (Rosenst. ex C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis wacketii* (Rosenst. ex C. Chr.) Ching, *Dryopteris wacketii* Rosenst. ex C. Chr.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mickelia R.C. Moran, Labiak & Sundue

Mickelia guianensis (Aubl.) R.C. Moran, Sundue & Labiak

Sin.: *Acrostichum guianense* (Aubl.) Baker, *Acrostichum scandens* Raddi, *Bolbitis guianensis* (Aubl.) K.U. Kramer ex Vareschi, *Leptochilus guianensis* (Aubl.) C. Chr., *Lomagramma guianensis* (Aubl.) Ching, *Polypodium guianense* Aubl.
Hierba voluble. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Olfersia Raddi

Olfersia cervina (L.) Kunze

Sin.: *Osmunda cervina* L., *Polybotrya cervina* (L.) Kaulf., *Polybotrya cervina* (L.) Kaulf. f. *transitoria* Rosenst.
Hierba. Nativa. 100-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Citada para Paraguay (Hassler, 1928) sin indicar localidad o material de referencia.

Parapolystichum (Keyserl.) Ching

Parapolystichum effusum (Sw.) Ching
Sin.: *Aspidium effusum* (Sw.) Griseb., *Ctenitis effusa* (Sw.) Copel., *Ctenitis effusa* (Sw.) Copel. var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Proctor, *Dryopteris effusa* (Sw.) Urb., *Dryopteris effusa* (Sw.) Urb. var. *tenuis* (Hicken) Hassl., *Lastreopsis effusa* (Sw.) Tindale subsp. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Tindale, *Lastreopsis effusa* (Sw.) Tindale subsp. *effusa*, *Lastreopsis effusa* (Sw.) Tindale var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Proctor, *Nephrodium effusum* (Sw.) Baker,

Nephrodium effusum (Sw.) Baker var. *tenuis* Hicken, *Parapolystichum effusum* (Sw.) Abbiatti var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Abbiatti, *Phegopteris effusa* (Sw.) Fée, *Polypodium divergens* Willd. ex Schkuhr, *Polypodium effusum* Sw., *Polystichum effusum* (Sw.) Keyserl.

Hierba terrestre. Nativa. 300-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, ITA, PAI, SPE).

Polybotrya Humb. & Bonpl. ex Willd.

Polybotrya cylindrica Kaulf.

Hierba hemiepífita. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polybotrya goyazensis Brade

Sin.: *Polybotrya macedoi* Brade
Hierba hemiepífita. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Polystichum Roth, nom. cons.

Polystichum andinum Phil.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Polystichum caudescens Dutra

Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Polystichum chilense (H. Christ) Diels

Sin.: *Aspidium aculeatum* (L.) Sw. var. *chilense* Christ, *Aspidium bridgesii* (Schott) J.W. Sturm, *Aspidium paucispis* J.W. Sturm, *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *chilense* (H. Christ) C. Chr., *Polystichum bridgesii*

- Schott, *Polystichum chilense* (H. Christ) Diels var. *dusenii* (C. Chr.) Looser ex R. Rodr., *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *dusenii* C. Chr.
Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).
- Polystichum laniceps** Rosenst.
Hierba. Nativa. 1000
Países: BRA(RGS).
- Polystichum lionellii** O.G. Martínez & M.A. Hern.
Hierba. Endémica. 3100-3700 m.
Países: ARG(SAL).
- Polystichum mohrioides** (d'Urv.) C. Presl
Sin.: *Aspidium mohrioides* d'Urv., *Nephrodium mohrioides* (d'Urv.) Desv.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(TDF).
- Polystichum montevidense** (Spreng.) Rosenst.
Sin.: *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron. f. *imbricata* Hieron., *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron., hom. illeg., *Phegopteris montevidensis* (Spreng.) Salomon, *Polypodium montevidense* Spreng., *Polystichum aculeatum* (L.) Roth var. *montevidense* (Spreng.) C. Chr., *Polystichum microsorum* Fée, *Polystichum montevidense* (Spreng.) Hieron., hom. illeg., *Polystichum platyphyllum* (Willd.) C. Presl var. *kurtziana* Hicken
Hierba. Nativa. 700-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, PAI). URY(MAL).
- Polystichum multifidum** (Mett.) T. Moore
Sin.: *Aspidium multifidum* Mett., *Aspidium pearcei* (Phil.) F. Phil., *Dicksonia andina* Phil., *Dryopteris metteniana* Kuntze, *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *autranii* Hicken, *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *pearcei* (Phil.) R. Rodr., *Polystichum nahuelhuapiense* Diem, *Polystichum pearcei* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).
- Polystichum orbiculatum** (Desv.) J. Rémy & Fée
Sin.: *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron. f. *squamulosa* Hieron., *Aspidium orbiculatum* Desv., *Aspidium pycnolepis* Kunze ex Klotzsch, *Polystichum montevidense* (Spreng.) Rosenst. var. *squamulosa* (Hieron.) Hieron., *Polystichum pycnolepis* (Kunze ex Klotzsch) Hieron.
Hierba. Nativa. 1800-4000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
- Polystichum platylepis** Fée
Sin.: *Polystichum aculeolatum* Fée, *Polystichum giganteum* Fée, *Polystichum longecuspis* Fée, *Polystichum tijucense* Fée
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Polystichum platyphyllum** (Willd.) C. Presl
Sin.: *Aspidium platyphyllum* Willd., *Nephrodium platyphyllum* (Willd.) Desv., *Phegopteris platyphylla* (Willd.) Mett., *Polypodium platyphyllum* (Willd.) Hook., *Polystichum lanosum* Fée, *Polystichum opacum* Rosenst., *Polystichum polystichoides* Klotzsch
- Hierba. Nativa. 200-2500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, SPE).
- Polystichum plicatum** (Poepp. ex Kunze) Hicken ex Hosseus
Sin.: *Aspidium elegans* (J. Remy) J.W. Sturm, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *laxum* Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *rigidum* Kunze, *Polystichum elegans* J. Remy, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl f. *genuina* Hicken, nom. inval., *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *elegans* (J. Remy) C. Chr., *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *plicatum* (Poepp.) C. Chr., *Polystichum mohrioides* (d'Urv.) C. Presl f. *latifolia* Hicken, nom. inval.
Hierba. Endémica. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).
- Polystichum subintegerrimum** (Hook. & Arn.) R. Rodr.
Sin.: *Aspidium brongniartianum* (J. Remy) J.W. Sturm, *Aspidium subintegerrimum* Hook. & Arn., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *brongniartianum* (J. Remy & Fée) C. Chr., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *subintegerrimum* (Hook. & Arn.) C. Chr., *Polystichum brongniartianum* J. Remy
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).
- Polystichum tetragonum** Fée
Hierba. Endémica. 200
Países: CHL(JFE).

Rumohra Raddi**Rumohra aconquijana** Arana, Bulacio & Slanis

Hierba. Endémica. 700-1500 m.

Países: ARG(TUC).

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching
var. **adiantiformis**

Sin.: *Aspidium capense* Willd., hom. illeg., *Aspidium coriaceum* (Sw.) Sw., *Aspidium discolor* Langsd. & Fisch., *Aspidium ferrugineum* (Cav.) Sw., *Aspidium remotum* (Fée) Christ & Schwacke, nom. illeg., *Dryopteris adiantiformis* (G. Forst.) Kuntze, *Hypopeltis coriacea* (Sw.) Bory, *Lastrea adiantiformis* (G. Forst.) Vareschi, *Nephrodium duriusculum* C. Presl, *Polypodium adiantiforme* G. Forst., *Polystichum adiantiforme* (G. Forst.) J. Sm., *Polystichum coriaceum* Schott, *Polystichum coriaceum* Schott var. *acuminatum* Fée, *Polystichum coriaceum* Schott var. *callochlamys* Fée, *Polystichum coriaceum* Schott var. *platychlamys* Fée, *Polystichum discolor* (Langsd. & Fisch.) Brack, *Polystichum remotum* Fée, *Rumohra aspidioides* Raddi, *Tectaria calahuala* Cav., *Tectaria coriacea* (Sw.) Link, *Tectaria ferruginea* Cav.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, MIS, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG). URY(CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching
var. **laciniata** C.A. Brussa & J. Prado

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: URY(MAL).

Rumohra berteroa (Colla) R. Rodr.

Sin.: *Aspidium berteroa* Colla, *Aspidium flexum* Kunze, *Polystichum berteroa* (Colla) C. Chr.

Hierba terrestre. Endémica. 200-1200 m.

Países: CHL(JFE).

Rumohra ponceana Arana, Luna & Giudice

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Rumohra quadrangularis (Fée) Brade

Sin.: *Polystichum quadrangulare* Fée, *Rumohra turficola* R.M. Senna

Hierba. Nativa. 2000-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stigmatopteris C. Chr.**Stigmatopteris brevinervis** (Fée) R.C. Moran

Sin.: *Phegopteris brevinervis* Fée, *Stigmatopteris bradei* Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stigmatopteris caudata (Raddi) C. Chr.Sin.: *Polypodium caudatum* Raddi

Hierba terrestre. Nativa. 100-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stigmatopteris heterocarpa (Fée) Rosenst.

Sin.: *Phegopteris heterocarpa* Fée, *Polypodium carrii* Baker, *Stigmatopteris heterocarpa* (Fée)

Rosenst. var. *basilaris* Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stigmatopteris ulei (C. Chr.) SehnemSin.: *Phegopteris ulei* C. Chr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(SCA).

EQUISETACEAE**Equisetum** L.**Equisetum bogotense** Kunth

Sin.: *Equisetum bogotense* Kunth var. *flagelliforme* Kunze, *Equisetum rinihuense* G. Kunkel, *Equisetum stipulaceum* Vaucher

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Equisetum giganteum L.

Sin.: *Equisetum araucanum* Phil., *Equisetum bolivianum* Gand., *Equisetum brasiliense* Milde, *Equisetum giganteum* L. var. *caracasenum* (DC.) Milde, *Equisetum giganteum* L. var. *chilense* Milde, *Equisetum giganteum* L. var. *digitaliferum* Pastore, *Equisetum lechleri* Milde, nom. illeg., *Equisetum martii* Milde, *Equisetum philippi* Gand., *Equisetum pyramidale* Goldm., *Equisetum ramosissimum* Humb. & Bonpl. ex Willd., hom. illeg., *Equisetum schaffneri* Milde, *Equisetum tarapacanum* Phil., *Hippochaete gigantea* (L.) Holub

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME). PRY(AMA, CAA,

CAN, CEN, GUA, ITA, PHA).
URY(ART, CAS, COL, MAL, RNO,
RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Equisetum xylochaetum Mett.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

GLEICHENIACEAE

Dicranopteris Bernh.

Dicranopteris discolor (Schrad.) Nakai

Sin.: *Mertensia discolor* Schrad.
Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Dicranopteris flexuosa (Schrad.)
Underw.

Sin.: *Dicranopteris rigida* (Kunze) Nakai,
Gleichenia flexuosa (Schrad.) Mett.,
Gleichenia rigida (Kunze) J. Bommer
& H. Christ, *Mertensia flexuosa*
Schrad., *Mertensia rigida* Kunze
Hierba. Nativa. 100-2000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,
CAA, CAN, COA, PAI).

Dicranopteris nervosa (Kaulf.) Maxon

Sin.: *Gleichenia gaenslyi* Rosenst.,
Gleichenia nervosa (Kaulf.) Spreng.,
Mertensia latissima Fée, *Mertensia*
neglecta Sturm, *Mertensia nervosa*
Kaulf., *Sticherus gaenslyi* (Rosenst.)
Nakai
Hierba. Nativa. 600-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Citado para Paraguay (Hassler,
1928) sin indicar material de
referencia.

Gleichenella Ching

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching

Sin.: *Dicranopteris pectinata* (Willd.)
Underw., *Gleichenia pectinata* (Willd.)
C. Presl, *Mertensia brasiliana* Desv.,
Mertensia emarginata Raddi,
Mertensia glaucescens Humb. &
Bonpl. ex Willd., *Mertensia pectinata*
Willd.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CLA).

Sticherus C. Presl

Sticherus bifidus (Willd.) Ching

Sin.: *Dicranopteris bifida* (Willd.) Maxon,
Dicranopteris pubescens (Willd.)
Conz., *Gleichenia bifida* (Willd.)
Spreng., *Gleichenia pubescens*
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth,
Mertensia bifida Willd., *Mertensia*
pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd.,
Sticherus pubescens (Willd.) Nakai
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, PAI). URY(RIV).

Sticherus cryptocarpus (Hook.) Ching

Sin.: *Dicranopteris cryptocarpa* (Hook.)
Looser, *Gleichenia cryptocarpa* Hook.,
Mertensia cryptocarpa (Hook.) Gay
Hierba. Endémica. 0-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS,
MAG).

Sticherus decurrens (Raddi) J. Gonzales

Sin.: *Gleichenia trifurcans* (Fée) C. Chr.,
Mertensia decurrens Raddi, *Mertensia*
trifurcans Fée, *Sticherus trifurcans*
(Fée) Ching
Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sticherus ferrugineus (Desv.) J.

Gonzales
Sin.: *Mertensia ferruginea* Desv.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sticherus gracilis (Mart.) Copel.

Sin.: *Mertensia gracilis* Mart.
Hierba terrestre. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sticherus lanuginosus (Fée) Nakai

Sin.: *Gleichenia lanuginosa* Fée,
Gleichenia pennigera (Mart.) Moore
var. *lanuginosa* (Fée) T. Moore
Hierba. Nativa. 500-1900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,
CAN, COA, PAI).

Sticherus lepidotus (R. Rodr.) R. Rodr.
& Ponce

Sin.: *Gleichenia lepidota* R. Rodr.
Hierba. Endémica. 500-1100 m.
Países: CHL(JFE).

Sticherus litoralis (Phil.) Nakai

Sin.: *Dicranopteris litoralis* (Phil.) Looser,
Dicranopteris pedalis (Kaulf.) Looser
var. *litoralis* (Phil.) Looser, *Gleichenia*
litoralis (Phil.) C. Chr., *Mertensia*
litoralis Phil.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

Sticherus nigropaleaceus (J.W. Sturm)
J. Prado & Lellingner

Sin.: *Gleichenia bifida* (Willd.) Spreng. var.
nigropaleacea (J.W. Sturm) Rosenst.,
Mertensia nigropaleacea J.W. Sturm,
Sticherus longipinnatus (Hook.) Ching
var. *nigropaleaceus* (J.W. Sturm)
Nakai
Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sticherus pruinus (Mart.) Ching

Sin.: *Dicranopteris pennigera* (Mart.) Maxon, *Dicranopteris pruinosa* (Mart.) Maxon, *Gleichenia angusta* (Klotzsch) Sehnem, *Gleichenia longipes* (Fée) H. Christ, *Gleichenia pennigera* (Mart.) Moore, *Gleichenia pruinosa* (Mart.) Mett., *Gleichenia revoluta* Kunth var. *angusta* (Klotzsch ex Sturm) C. Chr., *Mertensia angusta* Klotzsch ex Sturm, *Mertensia longipes* Fée, *Mertensia penniger* Mart., *Mertensia pruinosa* Mart., *Mertensia revoluta* (Kunth) Desv., *Sticherus longipes* (Fée) Copel., *Sticherus penniger* (Mart.) Copel.

Hierba. Nativa. 100-2500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sticherus quadripartitus (Poir.) Ching

Sin.: *Dicranopteris quadripartita* (Poir.) Looser, *Gleichenia acutifolia* Hook., *Gleichenia bibraeae* Mett. ex Kuhn, *Gleichenia quadripartita* (Poir.) T. Moore, *Mertensia acutifolia* (Hook.) J. Remy, *Mertensia magellanica* Desv., *Mertensia quadripartita* (Poir.) Poir., *Polypodium quadripartitum* Poir., *Sticherus bibraeae* (Mett. ex Kuhn) Ching, *Sticherus quadripartitus* (Poir.) Ching f. *bipartitus* G. Kunkel

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Sticherus squamosus (Fée) J. Gonzales

Sin.: *Gleichenia paulistana* Rosenst., *Sticherus paulistanus* (Rosenst.) Copel.

Hierba. Nativa. 600-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai
var. **gunckeliana** (Looser) R. Rodr. & Ponce

Sin.: *Dicranopteris squamulosa* (Desv.) Looser var. *gunckeliana* Looser, *Gleichenia squamulosa* (Desv.) T. Moore var. *gunckeliana* (Looser) Duek Enredadera o liana. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LRI, LLA).

Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai
var. **squamulosus**

Sin.: *Dicranopteris oligocarpa* (F. Phil.) Looser, *Dicranopteris pedalis* (Kaulf.) Looser, *Gleichenia oligocarpa* (F. Phil.) C. Chr., *Gleichenia pedalis* (Kaulf.) Spreng., *Gleichenia squamulosa* (Desv.) T. Moore, *Mertensia oligocarpa* Phil., *Mertensia pedalis* Kaulf., *Mertensia squamulosa* Desv., *Sticherus oligocarpus* (F. Phil.) Nakai, *Sticherus pedalis* (Kaulf.) Ching, *Sticherus squamulosus* (Desv.) Nakai var. *glaber* (T. Moore) Nakai
Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, JFE).

HEMIDICTYACEAE

Hemidictyum C. Presl

Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl

Sin.: *Asplenium marginatum* L., *Diplazium marginatum* (L.) Diels, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

HUPERZIACEAE

Huperzia Bernh.

Huperzia catharinae (Christ) Holub

Sin.: *Lycopodium catharinae* Christ
Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(SCA).

Huperzia fuegiana (Roiv.) Holub

Sin.: *Lycopodium fuegianum* Roiv., *Urostachys fuegianus* (Roiv.) Herter
Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(AIS, MAG).

Huperzia saururoides (Bory & d'Urv. ex Baker) Rothm.

Sin.: , *Lycopodium selago* L. var. *saururoides* Bory, *Urostachys saururoides* (Bory & d'Urv. ex Baker) Herter ex Nessel, *Urostachys selago* (L.) Herter var. *aschersonianus* Herter ex Nessel & d'Urv. ex Baker, *Urostachys selago* (L.) Herter var. *hessei* Nessel, nom. inval.

Hierba. Endémica. 100-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF).

Phlegmariurus (Herter) Holub

Phlegmariurus acerosus (Sw.) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia acerosa* (Sw.) Holub, *Lycopodium acerosum* Sw., *Urostachys acerosus* (Sw.) Herter ex Nessel

Hierba. Nativa. 300-2600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Phlegmariurus aristei (Nessel) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia aristei* (Nessel) Rolleri & Deferrari, *Huperzia sotae* (Rolleri) Holub, *Lycopodium aristei* (Nessel) Rolleri, *Lycopodium sotae* Rolleri,

- Phlegmariurus sotae* (Rolleri) B. Øllg.,
Urostachys aristei Nessel
Hierba epífita. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Phlegmariurus badinianus** (B. Øllg. & P.G. Windisch) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia badiniana* B. Øllg. & P.G. Windisch
Hierba. Endémica. 2300-2400 m.
Países: BRA(SCA).
- Phlegmariurus biformis** (Hook.) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia biformis* (Hook.) Holub, *Lycopodium biforme* Hook., *Urostachys biformis* (Hook.) Herter
Hierba. Nativa. 800-2400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Phlegmariurus christii** (Silveira) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia christii* (Silveira) Holub, *Lycopodium christii* Silveira
Hierba. Nativa. 800-2500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Phlegmariurus comans** (Nessel) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia comans* (Nessel) B. Øllg. & P.G. Windisch, *Lycopodium comans* H. Christ, *Urostachys comans* Nessel
Hierba. Nativa. 1500-1700 m.
Países: BRA(PAR).
- Phlegmariurus flexibilis** (Fée) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia flexibilis* (Fée) B. Øllg., *Lycopodium flexibile* Fée, *Lycopodium linifolium* L. var. *sanguineum* Spring, *Lycopodium linifolium* L. var. *subaristatum* Christ
Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Phlegmariurus fontinaloides** (Spring) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia fontinaloides* (Spring) Trevis., *Lycopodium fontinaloides* Spring, *Lycopodium fontinaloides* Spring var. *brasiliense* Spring, *Lycopodium serpyllifolium* Fée, *Urostachys fontinaloides* (Spring) Nessel, *Urostachys fontinaloides* (Spring) Nessel var. *serpyllifolius* (Fée) Nessel & Hoehne, *Urostachys gehrtii* Nessel, *Urostachys serpyllifolius* (Fée) Herter
Hierba epífita. Endémica. 500-2400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Phlegmariurus friburgensis** (Nessel) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia friburgensis* (Nessel) B. Øllg. & P.G. Windisch, *Lycopodium friburgense* (Nessel) Rolleri, *Urostachys friburgensis* Nessel, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter var. *friburgensis* (Nessel) Nessel
Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 500-2000 m.
Países: BRA(PAR).
- Phlegmariurus heterocarpon** (Fée) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia heterocarpon* (Fée) Holub, *Huperzia longearistata* (Christ) Holub, *Lycopodium heterocarpon* Fée, *Lycopodium longearistatum* Christ, *Urostachys dichotomus* (Jacq.) Herter var. *spiegazzinii* (Nessel) Nessel, *Urostachys heterocarpus* (Fée) Herter, *Urostachys heterocarpus* (Fée) Herter var. *longearistatus* (Christ) Nessel, *Urostachys longearistatus* (Christ) Herter ex Nessel, *Urostachys portoanus* Nessel, *Urostachys spiegazzinii* Herter ex Nessel
Hierba epífita. Nativa. 500-1600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Phlegmariurus hexastichus** (B. Øllg. & P.G. Windisch) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia hexasticha* B. Øllg. & P.G. Windisch
- Hierba epífita. Endémica. 1000-2400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Phlegmariurus linifolius** (L.) B. Øllg.
Sin.: *Lycopodium linifolium* L.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).
- Phlegmariurus loefgrenianus** (Silveira) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia loefgreniana* (Silveira) B. Øllg. & P.G. Windisch, *Lycopodium loefgrenianum* Silveira, *Urostachys loefgrenianus* (Silveira) Herter
Hierba epífita. Nativa. 1200
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Phlegmariurus mandiocanus** (Raddi) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia mandiocana* (Raddi) Trevis., *Lycopodium dichotomum* Jacq. var. *mandiocanum* (Raddi) Rosenst., *Lycopodium mandiocanum* Raddi, *Lycopodium mandiocanum* Raddi var. *brasiliense* Spring, *Lycopodium pithyoides* Schldl. & Cham., *Lycopodium pseudomandiocanum* Herter, *Urostachys mandiocanus* (Raddi) Herter, *Urostachys mandiocanus* (Raddi) Nessel var. *brasiliensis* (Spring) Herter ex Nessel & Hoehne, *Urostachys pseudomandiocanus* (Herzog) Herter ex Nessel
Hierba epífita. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).
- Phlegmariurus mollicomus** (Spring) B. Øllg.
Sin.: *Lycopodium mollicomum* Spring
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Phlegmariurus phyllicifolius** (Desv. ex Poir.) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia phyllicifolia* (Desv. ex Poir.) Holub, *Lycopodium congestifolium* Spring, *Lycopodium nubigenum* Herzog, *Lycopodium phyllicifolium* Desv. ex Poir., *Urostachys nubigenus* (Herzog) Herter ex Nessel, *Urostachys phyllicifolius* (Poir.) Herter ex Nessel
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Phlegmariurus pungentifolius (Silveira) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia pungentifolia* (Silveira) B. Øllg., *Lycopodium ouopretanum* Christ, *Lycopodium pungentifolium* Silveira, *Urostachys hennebergorum* Nessel, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter var. *pungentifolius* (Silveira) Nessel
Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 1200-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Phlegmariurus quadrifariatus (Bory) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia aschersonii* (Herter) Holub, *Huperzia quadrifariata* (Bory) Rothm., *Lycopodium aschersonii* Herter, *Lycopodium fontinaloides* Spring var. *coronata* Fée, *Lycopodium quadrangulare* Spring, *Lycopodium quadrifariatum* Bory, *Urostachys aschersonii* (Herter) Nessel, *Urostachys fontinaloides* (Spring) Nessel var. *coronatus* (Fée) Nessel, *Urostachys quadrangularis* (Spring) Nessel, *Urostachys quadrifariatus* (Bory) Nessel
Hierba epífita. Nativa. 100-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phlegmariurus reflexus (Lam.) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia bifida* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Holub, *Huperzia densifolia* (Baker) Rolleri & Deferrari, *Huperzia mexiae* (Copel.) Rolleri & Deferrari,

Huperzia reflexa (Lam.) Trevis., *Huperzia reflexa* (Lam.) Trevis. var. *bifida* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Trevis., *Huperzia reflexa* (Lam.) Trevis. var. *minor* (Spring) B. Øllg., *Lycopodium bifidum* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Lycopodium brutum* Herter, *Lycopodium densifolium* (Baker) Underw. & Lloyd, *Lycopodium mexiae* Copel., *Lycopodium reflexum* Lam., *Lycopodium reflexum* Lam. var. *caesium* Vareschi, *Lycopodium reflexum* Lam. var. *densifolium* Baker, *Lycopodium reflexum* Lam. var. *majus* Spring, *Lycopodium reflexum* Lam. var. *minus* Spring, *Lycopodium reflexum* Lam. var. *rupestre* Hassl., *Lycopodium reversum* C. Presl, *Lycopodium stellae-polaris* (Herter) C.V. Morton, *Phlegmariurus reflexus* (Lam.) B. Øllg. var. *minus* (Spring) B. Øllg., *Plananthus reflexus* (Lam.) P. Beauv., *Urostachys bifidus* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Herter ex Nessel, *Urostachys brutus* (Herter) Herter, *Urostachys densifolius* (Baker) Herter, *Urostachys intermedius* (Spring) Herter var. *cipoanus* Nessel, *Urostachys jergii* Nessel, *Urostachys parvifolius* Nessel & Hoehne, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter var. *densifolius* (Baker) Herter ex Nessel & Hoehne, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter var. *minor* (Spring) Herter ex Nessel, *Urostachys reflexus* Lam. var. *brutus* (Herter) Nessel, *Urostachys reflexus* Lam. var. *parvifolius* (Nessel & Hoehne) Nessel, *Urostachys reversus* (C. Presl) Herter, *Urostachys stellae-polaris* Herter
Hierba. Nativa. 600-2300 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Phlegmariurus saururus (Lam.) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia andina* (Rosenst.) Holub, *Huperzia axillaris* (Roxb.) Rothm., *Huperzia sanctae-barbarae* (Rolleri) Rolleri & Deferrari, *Huperzia saururus* (Lam.) Trevis., *Lycopodium andinum* Rosenst., *Lycopodium axillare* Roxb., *Lycopodium breve* Herter, *Lycopodium elongatum* Lag. ex Sw., *Lycopodium sanctae-barbarae* Rolleri, *Lycopodium saururus* Lam., *Plananthus saururus* (Lam.) P. Beauv., *Urostachys andinus* (Rosenst.) Herter ex Nessel, *Urostachys axillaris* (Roxb.) Herter ex Nessel, *Urostachys brevis* (Herter) Herter ex Nessel, *Urostachys elongatus* (Sw.) Herter, *Urostachys saururus* (Lam.) Herter
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Phlegmariurus sellowianus (Herter) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia sellowiana* (Herter) B. Øllg., *Lycopodium sellowianum* Herter
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 200-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phlegmariurus silveirae (Nessel & Hoehne) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia silveirae* (Nessel & Hoehne) B. Øllg. & P.G. Windisch, *Urostachys silveirae* Nessel & Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 800-2400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phlegmariurus taxifolius (Sw.) A. Löve & D. Löve

Sin.: *Huperzia passerinoides* (Kunth) Trevis., *Huperzia passerinoides* (Kunth) Trevis. var. *nitens* (Schltdl. & Cham.) Trevis., *Huperzia taxifolia* (Sw.) Trevis., *Lycopodium herminieri* Spring, *Lycopodium nitens* Schltdl. &

Cham., *Lycopodium passerinoides*
Kunth, *Lycopodium schwendeneri*
Herter, *Lycopodium taxifolium* Sw.,
Lycopodium taxifolium Sw. var.
passerinoides (Kunth) Baker,
Urostachys nitens (Schltdl. & Cham.)
Herter, *Urostachys passerinoides*
Kunth var. *nitens* (Schltdl. & Cham.)
Herter ex Nessel, *Urostachys*
rubiginosus Herter ex Nessel,
Urostachys schwendeneri (Herter)
Herter, *Urostachys schwendeneri*
(Herter) Herter var. *nitens* (Schltdl. &
Cham.) Herter ex Nessel, *Urostachys*
taxifolius (Sw.) Herter
Hierba epífita. Endémica. 800-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Crepidomanes pyxidiferum (L.)
Dubuisson & Ebihara var.
pyxidiferum

Sin.: *Polyphlebium pyxidiferum* (L.)
Ebihara & Dubuisson, *Trichomanes*
cavifolium Müll.Berol., *Trichomanes*
eximium Kunze ex J.W. Sturm, nom.
illeg., *Trichomanes pyxidiferum* L.,
Vandenboschia pyxidifera (L.) Copel.
Hierba saxícola. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Didymoglossum Desv.

Didymoglossum angustifrons Fée
Sin.: *Trichomanes angustifrons* (Fée)
Wess.Boer, *Trichomanes mosenii*
Lindm.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (PAR). PRY(COA, PAI).

Didymoglossum hymenoides (Hedw.)
Copel.
Sin.: *Didymoglossum sociale* Fée,
Trichomanes apodum Hook. & Grev.,
Trichomanes hymenoides Hedw.,
Trichomanes hymenoides Hedw. f.
pseudo-reptans Rosenst.,
Trichomanes muscoides Sw.,
Trichomanes pabstianum C.A.Mull.,
Trichomanes pseudo-reptans
(Rosenst.) Sehnem, *Trichomanes*
sociale (Fée) Lindm.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA).
URY(CLA, ROC, TAC).

Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.)
C. Presl

Sin.: *Trichomanes acrocarpon* Fée,
Trichomanes krausii Hook. & Grev.
Hierba saxícola. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Didymoglossum ovale E. Fourn.

Sin.: *Trichomanes fontanum* Lindm.
Hierba saxícola. Nativa. 200
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Didymoglossum punctatum (Poir.)
Desv.

Sin.: *Trichomanes punctatum* Poir.,
Trichomanes sphenoides Kunze var.
minor Rosenst.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Didymoglossum pusillum (Sw.) Desv.

Sin.: *Trichomanes pusillum* Sw.
Hierba epipétrica. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl
Sin.: *Trichomanes montanum* Hook.,
Trichomanes quercifolium Hook. &
Grev., *Trichomanes reptans* Sw.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Citado para Paraguay (Mickel &
Smith, 2004) sin indicar material de
referencia. El material citado bajo *T.*
montanum Hook. para ese país en
Hassler (1928) no fue localizado.

Hymenophyllum Sm.

Hymenophyllum asperulum Kunze

Sin.: *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm.
var. *asperulum* (Kunze) Diem & J.S.
Licht.
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-
800 m.

HYMENOPHYLLACEAE

Abrodictyum C. Presl

Abrodictyum rigidum (Sw.) Ebihara &
Dubuisson

Sin.: *Trichomanes bifidum* Vent. ex Willd.,
Trichomanes daucoides C. Presl,
Trichomanes dregei Bosch,
Trichomanes mandiocanum Raddi,
Trichomanes rigidum Sw.
Hierba. Nativa. 100-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN, PAI, SPE).

Crepidomanes (C. Presl) C. Presl

Crepidomanes pyxidiferum (L.)
Dubuisson & Ebihara var. **australe**
Ponce & Dubuisson

Sin.: *Trichomanes emarginatum* C. Presl,
hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, JFE).

Hymenophyllum asplenioides (Sw.) Sw.

Sin.: *Mecodium asplenioides* (Sw.) Copel.,
Trichomanes asplenioides Sw.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum caespitosum Gaudich.

Sin.: *Hymenophyllum densifolium* Phil.,
Hymenophyllum dusenii H. Christ,
Leptocionium caespitosum (Gaudich.)
C. Presl, *Serpyllopsis caespitosa*
(Gaudich.) C. Chr. var. *caespitosa*,
Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C.
Chr. var. *densifolia* (Phil.) C. Chr.,
Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C.
Chr. var. *dusenii* (H. Christ) C. Chr.,
Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C.
Chr. var. *elongata* (Hook.) C. Chr.,
Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C.
Chr. var. *fernandeziana* C. Chr. &
Skottsb., *Trichomanes caespitosum*
(Gaudich.) Hook., *Trichomanes*
caespitosum (Gaudich.) Hook. var.
elongatum Hook.
Hierba terrestre. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG,
JFE).

Hymenophyllum capurroi de la Sota

Hierba epífita. Nativa. 1200-1700 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Hymenophyllum caudatum Bosch

Sin.: *Hymenophyllum caudiculatum* Mart.
var. *caudatum* (Bosch) Hook. & Baker,
Hymenophyllum caudiculatum Mart.
var. *productum* (C. Presl) C. Chr.,
Hymenophyllum martii J.W. Sturm,
Hymenophyllum patagonicum Gand.,
Hymenophyllum productum (C. Presl)
J. W. Sturm, hom. illeg., *Mecodium*

caudiculatum (Mart.) Copel. f. *nanum*
G. Kunkel, *Mecodium caudiculatum*
(Mart.) Copel. f. *productum* (C. Presl)
G. Kunkel, *Sphaerocionium productum*
C. Presl

Hierba epífita. Endémica. 800-1600 m.
Países: ARG(CHU). CHL(BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Hymenophyllum caudiculatum Mart.

Sin.: *Mecodium caudiculatum* (Mart.)
Copel., *Sphaerocionium caudiculatum*
(Mart.) C. Presl
Hierba epífita. Nativa. 100-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum cordobense (Hieron.)

C. Larsen & Arana

Sin.: *Hymenophyllum peltatum* (Poir.)
Desv. var. *achalense* (Hieron.)
Capurro, *Hymenophyllum tunbrigense*
(L.) Sm. var. *cordobense* Hieron.,
Hymenophyllum wilsonii Hook. var.
achalensis Hieron.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 1200-
3800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
TUC).

Hymenophyllum crispum Kunth

Sin.: *Hymenophyllum brasilianum* (Fée)
Rosenst., *Hymenophyllum constrictum*
H. Christ, *Hymenophyllum crispum*
Kunth var. *brasilianum* Fée,
Sphaerocionium crispum (Kunth)
Klotzsch
Hierba saxícola. Nativa. 800-2300 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR,
RGS, SCA).

Hymenophyllum cruentum Cav.

Sin.: *Hymenoglossum cruentum* (Cav.) C.
Presl
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Hymenophyllum cuneatum Kunze var.
cuneatum

Sin.: *Hymenophyllum cumingii* C. Presl,
Mecodium cuneatum (Kunze) Copel.
Hierba epífita. Endémica. 400-1000 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG, JFE).

Hymenophyllum cuneatum Kunze var.
rarifforme C. Chr. & Skottsb.

Sin.: *Hymenophyllum cuneatum* Kunze f.
imbricata C. Chr. & Skottsb.,
Hymenophyllum terminale Phil.
Hierba epífita. Endémica. 300-500 m.
Países: CHL(JFE).

Hymenophyllum darwinii Hook. f. ex
Bosch

Sin.: *Hymenophyllum rarum* R. Br. var.
darwinii (Bosch) Neger,
Hymenophyllum skottsbergii C. Chr.
Hierba epífita o epipétrica. Endémica.
0-1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, MAG).

Hymenophyllum delicatulum Sehnem

Hierba epífita. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum dentatum Cav.

Sin.: *Hymenophyllum bridgesii* Hook.,
Hymenophyllum trichocaulon Phil.,
Leptocionium dentatum (Cav.) Bosch,
Sphaerocionium bridgesii (Hook.)
Klotzsch
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).
CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Hymenophyllum dicranotrichum (C.
Presl) Hook. ex Sadeb.

Sin.: *Hymenophyllum chiloense* Hook.,
Leptocionium dicranotrichum C. Presl,
Trichomanes spinulosum Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Hymenophyllum elegans Spreng.

Sin.: *Hymenophyllum filmenofilicum* Christenh. & Schwartsb., *Sphaerocionium elegans* (Spreng.) Copel.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hymenophyllum falklandicum Baker

Sin.: *Hymenophyllum caespitosum* Christ, hom. illeg., *Hymenophyllum falklandicum* Baker f. *andinum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum falklandicum* Baker var. *elongatum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum glebarium* C. Chr.
Hierba epífita o epipétrica. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Hymenophyllum ferrugineum Colla subsp. **berteroi** R. Rodr. & Penneck.

Sin.: *Hymenophyllum ferrugineum* Colla var. *donatii* Looser, *Sphaerocionium ferrugineum* (Colla) Copel. var. *donatii* (Looser) G. Kunkel
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Hymenophyllum ferrugineum Colla subsp. **ferrugineum**

Sin.: *Hymenophyllum berteroi* Hook., nom. illeg., *Hymenophyllum subtilissimum* Kunze, hom. illeg., *Sphaerocionium ferrugineum* (Colla) Copel.
Hierba terrestre o epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: CHL(MAG, JFE).

Hymenophyllum fragile (Hedw.) C.V. Morton

Sin.: *Sphaerocionium fragile* (Hedw.) Pic.Serm., *Trichomanes fragile* Hedw.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum fuciforme Sw.

Sin.: *Hymenophyllum fucoides* Cav., hom. illeg., *Hymenophyllum semiteres* Colla, *Leptocionium fuciforme* (Sw.) C. Presl
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw.

Sin.: *Trichomanes fucoides* Sw.
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.

Sin.: *Hymenophyllum ciliatum* (Sw.) Sw., *Sphaerocionium ciliatum* (Sw.) C. Presl, *Sphaerocionium hirsutum* (L.) C. Presl, *Trichomanes ciliatum* Sw., *Trichomanes hirsutum* L.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum krauseanum Phil.

Sin.: *Hymenophyllum dichotomum* Cav. var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *Hymenophyllum magellanicum* (Desv.) Willd. ex Kunze var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. var. *krauseanum* (Phil.) Looser, *Meringium krauseanum* (F. Phil.) G. Kunkel
Hierba epífita o epipétrica. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Hymenophyllum magellanicum (Desv.) Willd. ex Kunze

Sin.: *Didymoglossum magellanicum* Desv., *Hymenophyllum attenuatum* Hook., *Hymenophyllum bibraianum* J.W. Sturm, *Hymenophyllum seselifolium* C. Presl, *Leptocionium attenuatum* (Hook.) Bosch, *Leptocionium magellanicum* (Desv.) Bosch, *Leptocionium seselifolium* (C. Presl) Bosch, *Meringium magellanicum* (Desv.) Copel., *Ptychophyllum magellanicum* (Desv.) Klotzsch

Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Hymenophyllum microcarpum Desv.

Sin.: *Mecodium microcarpum* (Desv.) Copel., *Sphaerocionium microcarpum* (Desv.) Copel.
Hierba epífita. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hymenophyllum nahuelhuapiense Diem & J.S. Licht.

Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 200-800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Hymenophyllum pectinatum Cav.

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-3600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv.

Sin.: *Hymenophyllum megachilum* C. Presl, *Hymenophyllum menziesii* C. Presl, *Hymenophyllum mettenii* Bosch, *Hymenophyllum meyeri* C. Presl, *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *elegans* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv.

- var. *elongatum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv.
 var. *imbricatum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv.
 var. *minor* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv.
 var. *patagonicum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm.
 var. *wilsonii* (Hook.) Sadeb., *Hymenophyllum unilaterale* Bory ex Willd., nom. illeg., *Hymenophyllum wilsonii* Hook., *Trichomanes peltatum* Poir.
 Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-1400 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).
- Hymenophyllum plicatum** Kaulf.
 Sin.: *Hymenophyllum nigricans* Colla, *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. var. *quadrifidum* (F. Phil.) Looser, *Hymenophyllum quadrifidum* Phil., *Hymenophyllum quadrivalve* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Meringium plicatum* (Kaulf.) Copel., *Ptychophyllum plicatum* (Kaulf.) C. Presl
 Hierba terrestre. Endémica. 0-800 m.
 Países: ARG(NEU, RNE, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).
- Hymenophyllum plumosum** Kaulf.
 Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 1100
 Países: BRA(PAR).
- Hymenophyllum polyanthos** (Sw.) Sw.
 Sin.: *Hymenophyllum clavatum* (Sw.) Sw., *Hymenophyllum sturmii* Bosch, *Hymenophyllum viridissimum* Fée, *Mecodium polyanthos* (Sw.) Copel., *Trichomanes clavatum* Sw., *Trichomanes polyanthos* Sw.
 Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Hymenophyllum pulchellum** Schtdl. & Cham.
 Sin.: *Hymenophyllum lineare* (Sw.) Sw. var. *brasiliense* Rosenst.
 Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Hymenophyllum quetrihuense** Diem & J.S. Licht.
 Sin.: *Hymenophyllum quetrihuense* Diem & J.S. Licht. f. *nanum* Diem & J.S. Licht.
 Hierba. Endémica. 300-1000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
- Hymenophyllum rufum** Fée
 Sin.: *Sphaerocionium rufum* (Fée) Copel.
 Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Hymenophyllum rugosum** C. Chr. & Skottsb.
 Sin.: *Hymenophyllum rugosum* C. Chr. & Skottsb. f. *lanceolatum* C. Chr. & Skottsb.
 Hierba. Endémica. 400-700 m.
 Países: CHL(JFE).
- Hymenophyllum secundum** Hook. & Grev.
 Sin.: *Hymenophyllum serra* C. Presl, *Meringium secundum* (Hook. & Grev.) Copel.
 Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-1200 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).
- Hymenophyllum tortuosum** Hook. & Grev.
 Sin.: *Hymenophyllum skottsbergii* Gand., hom. illeg., *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *beckeri* (Krause ex Phil.) Espinosa, *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *bustillosii* Espinosa, *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *glomeratum* Diem & J.S. Licht., *Leptocionium tortuosum* (Hook. & Grev.) Bosch, *Meringium tortuosum* (Hook. & Grev.) Copel., *Myrmecostylum tortuosum* (Hook. & Grev.) C. Presl, *Trichomanes beckeri* Krause ex Phil.
 Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).
- Hymenophyllum trichophyllum** Kunth
 Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).
- Hymenophyllum umbratile** Diem & J.S. Licht.
 Hierba. Endémica. 0-600 m.
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LRI, LLA, AIS).
- Hymenophyllum undulatum** (Sw.) Sw.
 Sin.: *Trichomanes undulatum* Sw.
 Hierba. Nativa. 1000
 Países: BRA(PAR, SCA, RGS).
- Hymenophyllum venustum** Desv.
 Sin.: *Hymenophyllum fragile* (Hedw.) C.V. Morton var. *venustum* (Desv.) C.V. Morton, *Hymenophyllum raddianum* Müll.Berol.
 Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Hymenophyllum vestitum** (C. Presl) Bosch

Sin.: *Hymenophyllum ciliatum* (Sw.) Sw. f. *tuberosum* Rosenst., *Hymenophyllum elatius* H. Christ, *Hymenophyllum ulei* H. Christ & Giesenh., *Sphaerocionium vestitum* C. Presl
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 900-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polyphlebium Copel.

Polyphlebium angustatum (Carmich.) Ebiara & Dubuisson
Sin.: *Trichomanes angustatum* Carmich., *Trichomanes fulvum* Klotzsch, *Trichomanes tenerum* Spreng., *Vandenboschia angustata* (Carmich.) Copel., *Vandenboschia tenera* (Spreng.) Copel.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, PAI). URY(CLA, CLA, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).

Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebiara & Dubuisson
Sin.: *Trichomanes diaphanum* Kunth, *Trichomanes tranninense* Fée
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Polyphlebium exsectum (Kunze) Ebiara & Dubuisson
Sin.: *Trichomanes exsectum* Kunze, *Vandenboschia exsecta* (Kunze) Copel.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(MAU, LSR, LLA, JFE).

Polyphlebium hymenophylloides (Bosch) Ebiara & Dubuisson
Sin.: *Trichomanes hymenophylloides* Bosch

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polyphlebium ingae (C. Chr.) Ebiara & Dubuisson
Sin.: *Trichomanes ingae* C. Chr., *Vandenboschia ingae* (C. Chr.) Copel.
Hierba epífita o epipétrica. Endémica. 100-400 m.
Países: CHL(JFE).

Polyphlebium philippianum (J.W. Sturm) Ebiara & Dubuisson
Sin.: *Trichomanes dichotomum* Phil., *Trichomanes philippianum* J.W. Sturm, *Vandenboschia philippiana* (J.W. Sturm) Copel.
Hierba. Endémica. 500-700 m.
Países: CHL(JFE).

Polyphlebium serratifolium (Rosenst.) Gonzatti & Windisch
Sin.: *Trichomanes serratifolium* Rosenst.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Trichomanes L.

Trichomanes anadromum Rosenst.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, TAC).

Trichomanes cristatum Kaulf.
Sin.: *Trichomanes sellowianum* C. Presl
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA).

Trichomanes elegans Rich.
Sin.: *Davalliopsis elegans* (Rich.) Copel., *Trichomanes prieurii* Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Trichomanes lucens Sw.
Sin.: *Trichomanes auratum* Fée, *Trichomanes kaulfussii* Hook. & Grev.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Trichomanes pellucens Kunze
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 400-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Trichomanes pilosum Raddi
Sin.: *Trichomanes langsdorffii* Bosch
Hierba saxícola. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, GUA, PAI). URY(TAC).

Trichomanes polypodioides L.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(TAC).

Vandenboschia Copel.

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel.
Sin.: *Trichomanes collariatum* Bosch, *Trichomanes kunzeanum* Hook., *Trichomanes radicans* Sw., *Trichomanes repens* Schott ex Sturm, *Trichomanes repens* Schott ex Sturm var. *stipitatum* Sturm, *Vandenboschia collariata* (Bosch) Ebiara & K. Iwats
Hierba saxícola. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA, PAI).

Vandenboschia rupestris (Raddi) Ebiara & K. Iwats.
Sin.: *Hymenophyllum rupestre* Raddi, *Trichomanes rupestre* (Raddi) Bosch
Hierba saxícola. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, PAI).

ISOETACEAE

Isoetes L.**Isoetes alcalophila** Halloy

Hierba. Endémica. 4200-4300 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Isoetes araucaniana Macluf & Hickey

Hierba. Endémica. 800-1500 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Isoetes brasiliensis H.P. Fuchs

Hierba acuática. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Isoetes candelariensis C.C. Macluf &

G.J. Marquez

Hierba acuática. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(MIS).

Isoetes chubutiana Hickey, Macluf &

W.C. Taylor

Hierba acuática. Endémica. 700-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).**Isoetes ekmanii** U. Weber

Hierba. Endémica. 300-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

Isoetes escondidensis Halloy

Hierba. Endémica. 4300-4400 m.

Países: ARG(TUC).

Isoetes fuscomarginata H.P. Fuchs

Hierba palustre. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(RGS).

Isoetes gardneriana Kunze ex Mett.Sin.: *Calamaria gardneriana* (Kunze ex Mett.) Kuntze

Hierba acuática. Nativa.

Países: ARG(COS, MIS).

Isoetes hieronymi U. Weber

Hierba acuática. Endémica. 1000

Países: ARG(COR, RNE). CHL(COQ).

Isoetes maxima Hickey, Macluf & Link-

Pérez

Hierba acuática. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(RGS).

Isoetes mourabaptistae J.B.S. Pereira,

P.G. Windisch, M.L. Lorscheitter & Labiak

Hierba. Endémica. 900-1100 m.

Países: BRA(RGS).

Isoetes naipiana P.G. Windisch, M.L.

Lorscheitter & Nervo

Hierba acuática. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(RGS).

Isoetes panamensis Maxon & C.V.

Morton

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAU).

Isoetes pedersenii H.P. Fuchs ex E. I.

Meza Torres & Macluf

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(COS).

Isoetes quiririensis J.B.S. Pereira &

Labiak

Hierba acuática. Endémica. 1000-1100 m.

Países: BRA(SCA).

Isoetes ramboi Herter

Hierba acuática. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Isoetes savatieri Franch.Sin.: *Calamaria savatieri* (Franch.) Kuntze,*Isoetes lechleri* Mett. var. *savatieri* (Franch.) L.D. Gómez

Hierba acuática. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Isoetes sehnemii H.P. Fuchs

Hierba acuática. Endémica. 400-500 m.

Países: BRA(RGS).

Isoetes smithii H.P. Fuchs

Hierba acuática. Endémica. 1000-1600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Isoetes spannagelii H.P. Fuchs

Hierba acuática. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Isoetes weberi Herter

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(ROC).

LINDSAEACEAE

Lindsaea Dryand. ex Sm.**Lindsaea arcuata** KunzeSin.: *Lindsaea horizontalis* Hook.,*Lindsaea lancea* (L.) Bedd. var.*arcuata* (Kunze) Rosenst., *Lindsaea**trapeziformis* Dryand. var. *arcuata*

(Kunze) Baker

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lindsaea bifida (Kaulf.) Mett. ex KuhnSin.: *Davallia bifida* Kaulf., *Odontosoria**bifida* (Kaulf.) J. Sm.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lindsaea botrychioides A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryand.
subsp. **guianensis**
Sin.: *Adiantum guianensis* Aubl.
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryand.
subsp. **lanceastrum** K.U. Kramer
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Lindsaea lancea (L.) Bedd.
Sin.: *Adiantum lancea* L.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAA, CAN, COA, SPE).

Lindsaea ovoidea Fée
Sin.: *Lindsaea christii* Rosenst.
Hierba. Nativa. 200-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lindsaea portoricensis Desv.
Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 100-300 m.
Países: PRY(CAN).

Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. **quadrangularis**
Sin.: *Lindsaea lancea* (L.) Bedd. var. *quadrangularis* (Raddi) Rosenst.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. **terminalis** K.U. Kramer
Sin.: *Lindsaea quadrangularis* Raddi var. *pallescens* Sehnem, *Lindsaea terminalis* (K.U. Kramer) A. Rojas
Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA).

Lindsaea stricta (Sw.) Dryand.
Sin.: *Adiantum strictum* Sw., *Lindsaea brasiliensis* Desv., *Lindsaea guianensis* (Aubl.) Dryand. f. *stricta* (Sw.) Lindm., *Lindsaea stricta* (Sw.) Dryand. var. *microphylla* (C. Presl) Hassl.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

Lindsaea virescens Sw. var. **catharinae** (Hook.) Baker
Sin.: *Lindsaea catharinae* Hook., *Odontosoria virescens* (Sw.) Rosenst. var. *catharinae* (Hook.) Rosenst., *Stenoloma catharinae* (Hook.) Sehnem
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lindsaea virescens Sw. var. **virescens**
Sin.: *Stenoloma virescens* (Sw.) C. Chr.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

LOMARIOPSIDACEAE

Lomariopsis Fée

Lomariopsis marginata (Schrad.) Kuhn
Sin.: *Acrostichum erythrodes* Kunze, *Lomaria fraxinifolia* Raddi, *Lomaria marginata* Schrad., *Lomariopsis elongata* Fée, *Lomariopsis erythrodes* (Kunze) Fée, *Lomariopsis lanceolata* Klotzsch ex Holttum, *Lomariopsis speciosa* Klotzsch ex Holttum, *Stenochlaena erythrodes* (Kunze) Underw., *Stenochlaena marginata* (Schrad.) C. Chr.

Hierba hemiepífita. Nativa. 200-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

LYCOPODIACEAE

Austrolycopodium Holub

Austrolycopodium alboffii (Rolleri) Holub
Sin.: *Lycopodium alboffii* Rolleri, *Lycopodium clavatum* L. f. *nanum* Albov, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *maius* Herter ex Nessel, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *nanum* (Albov) Looser, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *pusillum* Herter ex Nessel, *Lycopodium nanum* Herter, *Lycopodium urani* Herter
Hierba. Endémica. 100-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

Austrolycopodium confertum (Willd.) Holub
Sin.: *Lycopodium barrosii* (Looser) Herter, *Lycopodium chonoticum* Phil., *Lycopodium confertum* Willd., *Lycopodium confertum* Willd. var. *barrosii* Looser
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

Austrolycopodium erectum (Phil.) Holub
Sin.: *Austrolycopodium assurgens* (Fée) Holub, *Lycopodium assurgens* Fée, *Lycopodium assurgens* Fée var. *schwackei* Christ, *Lycopodium erectum* Phil., *Lycopodium fastigiatum* R. Br. var. *assurgens* (Fée) Nessel, *Lycopodium looseri* Herter, nom. superfl., *Lycopodium magellanicum* (P.

Beauv.) Sw. var. *erectum* (Phil.)
Looser, *Lycopodium schwackei*
(Christ) Herter

Hierba. Nativa. 1200-2800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ,
NEU, RNE, SAL). BRA(RGS, SCA).
CHL(ARA, LSR, LLA, MAG).

Austrolycopodium magellanicum (P.
Beauv.) Holub

Sin.: *Lepidotis magellanica* P. Beauv.,
Lycopodium magellanicum (P. Beauv.)
Sw., *Lycopodium pichinchense* Hook.,
Lycopodium spurium Willd.

Hierba. Nativa. 300-1600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, MAG, JFE).

Austrolycopodium paniculatum (Desv.
ex Poir.) Holub

Sin.: *Lycopodium dendromorphum* Kunze,
nom. illeg., *Lycopodium paniculatum*
Desv. ex Poir.

Hierba. Endémica. 700-900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, JFE).

Diphasiastrum Holub

Diphasiastrum falcatum B. Øllg. & P.G.
Windisch

Hierba. Nativa. 1300-2400 m.

Países: BRA(PAR).

Diphasiastrum thyoides (Humb. &
Bonpl. ex Willd.) Holub

Sin.: *Lycopodium complanatum* L. var.
adpressifolium Spring, *Lycopodium*
complanatum L. var. *thyoides* (Humb.
& Bonpl. ex Willd.) Christ, *Lycopodium*
complanatum L. var. *tropicum* Spring,
Lycopodium complanatum L. var.
validum Weath., nom. illeg.,
Lycopodium comptonioides Desv.,

Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl.
ex Willd.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA,
MAL).

Diphasium C. Presl ex Rothm.

Diphasium gayanum (J. Rémy ex Gay)
Holub

Sin.: *Lycopodium gayanum* J. Rémy ex
Gay, *Lycopodium scariosum* G. Forst.
f. *skottsbergii* Herter ex Nessel,
Lycopodium skottsbergii (Herter ex
Nessel) Herter

Hierba. Endémica. 300-1300 m.

Países: ARG(SCR). CHL(BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Diphasium jussiaei (Desv. ex Poir.) C.
Presl ex Rothm.

Sin.: *Lycopodium jussiaei* Desv. ex Poir.

Hierba terrestre. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lycopodiella Holub

Lycopodiella duseniana (B. Øllg. & P.G.
Windisch) B. Øllg.

Sin.: *Lycopodiella alopecuroides* (L.)
Cranfill var. *duseniana* B. Øllg. & P.G.
Windisch

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lycopodiella geometra B. Øllg. & P.G.
Windisch

Sin.: *Lycopodium alopecuroides* L. var.
furcatum Fée, *Lycopodium*
alopecuroides L. var. *hoehneanum*
Nessel, *Lycopodium alopecuroides* L.
var. *nettoanum* Baker

Hierba. Nativa. 500-1300 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAU, SPE). URY(RIV).

Lycopodiella longipes (Hook. & Grev.)
Holub

Sin.: *Lycopodiella alopecuroides* (L.)
Cranfill var. *integerrima* (Spring) B.
Øllg. & P.G. Windisch, comb. illeg.,
Lycopodium alopecuroides L. f.
integrum Hassl., *Lycopodium*
alopecuroides L. f. *intermedium*
Hassl., *Lycopodium alopecuroides* L.
var. *divaricatum* Nessel, *Lycopodium*
alopecuroides L. var. *integerrimum*
Spring, nom. illeg., *Lycopodium*
alopecuroides L. var. *longipes* (Hook.
& Grev.) Rosenst., *Lycopodium*
longipes Hook. & Grev.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU,
CAN). URY(MON).

Lycopodiella tupiana (B. Øllg. & P.G.
Windisch) B. Øllg.

Sin.: *Lycopodiella alopecuroides* (L.)
Cranfill var. *tupiana* B. Øllg. & P.G.
Windisch

Hierba. Nativa. 0-2300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CAS, COL, MAL, MON, RIV,
ROC, SJO, TAC).

Lycopodium L.

Lycopodium clavatum L.

Sin.: *Lepidotis clavata* (L.) P. Beauv.,
Lycopodium aristatum Humb. & Bonpl.
ex Willd., *Lycopodium aristatum*
Humb. & Bonpl. ex Willd. var.
desvauxianum Spring, *Lycopodium*
aristatum Humb. & Bonpl. ex Willd.
var. *incurvum* Grev. & Hook.,
Lycopodium aristatum Humb. & Bonpl.

ex Willd. var. *robustus* Grev. & Hook., *Lycopodium clavatum* L. var. *aristatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring, *Lycopodium clavatum* L. var. *equisetoides* Nessel, *Lycopodium clavatum* L. var. *eristachys* (Fée) Nessel & Hoehne, *Lycopodium clavatum* L. var. *minarum* H. Christ, *Lycopodium clavatum* L. var. *piliferum* (Raddi) Nessel, *Lycopodium clavatum* L. var. *preslianum* Spring, *Lycopodium clavatum* L. var. *raddianum* Spring, *Lycopodium clavatum* L. var. *robustus* (Grev. & Hook.) Nakai, *Lycopodium clavatum* L. var. *trichophyllum* (Desv.) Nessel & Hoehne, *Lycopodium eristachys* Fée, *Lycopodium piliferum* Raddi, *Lycopodium preslii* Grev. & Hook., *Lycopodium serpens* C. Presl, *Lycopodium trichiatum* Bory var. *desvauxianum* Spring, *Lycopodium trichophyllum* Desv.

Hierba. Nativa. 2600-3800 m.

Países: ARG(COR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(DUR, MAL).

Palhinhaea Vasc. & Franco

Palhinhaea camporum (B. Øllg. & Windisch) Holub

Sin.: *Lycopodiella camporum* B. Øllg. & P.G. Windisch

Hierba. Nativa. 400-1800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN).

Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco

Sin.: *Lepidotis cernua* (L.) P. Beauv., *Lycopodiella cernua* (L.) Pic.Serm., *Lycopodium boryanum* A. Rich., *Lycopodium capillaceum* (Spring) Willd. ex Hieron., *Lycopodium cernuum* L., *Lycopodium cernuum* L. f. *sikkimense* (Müll. Hal.) H.S. Kung,

Lycopodium cernuum L. var. *capillaceum* Spring, *Lycopodium cernuum* L. var. *panamense* Wercklé ex Nessel, *Lycopodium cernuum* L. var. *sikkimense* (Müll. Hal.) C.B. Clarke, *Lycopodium cernuum* L. var. *watsonianum* Nessel, *Lycopodium cymosum* L' Herm. ex Hieron., *Lycopodium marianum* Willd., *Lycopodium moritzii* Müll.Berol., *Lycopodium sikkimense* Müll. Hal., *Palhinhaea capillacea* (Spring) Holub, *Palhinhaea cernua* (L.) Vasc. & Franco f. *sikkimensis* (Müll. Hal.) H.S. Kung, *Palhinhaea cernua* (L.) Vasc. & Franco var. *sikkimensis* (Müll. Hal.) Ching Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, COA, GUA). URY(CAS, CLA, MAL, RIV, TAC).

Pseudolycopodiella Holub

Pseudolycopodiella carnosa (Silveira) Holub

Sin.: *Lycopodium carnosum* Silveira

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PAR(AMA, CAU, SPE).

Pseudolycopodiella meridionalis (Underw. & F.E. Lloyd) Holub

Sin.: *Lycopodiella caroliniana* (L.) Pichi-Sermolli var. *meridionalis* (Underw. & F.E. Lloyd) B. Øllg. & P.G. Windisch, *Lycopodium carolinianum* L. var. *meridionale* (Underw. & F. E. Lloyd) Nessel, *Lycopodium meridionale* Underw. & F.E. Lloyd

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PAR(CAU, CAN). URY(CAS, MON, RIV, TAC).

LYGODIACEAE

Lygodium Sw., nom. cons.

Lygodium venustum Sw.

Sin.: *Hydroglossum hastatum* Willd., hom. illeg., *Hydroglossum hirsutum* Willd., nom. illeg., *Lygodium hastatum* (Willd.) Desv., nom. illeg., *Lygodium mucronulatum* Sturm, *Lygodium palmatilobum* Sturm, *Lygodium pohlianum* C. Presl, *Lygodium polymorphum* (Cav.) Kunth var. *hirsutum* (Willd.) Farw., *Lygodium volubile* Sw. var. *hirsutum* (Willd.) Bonap.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(PAI).

Lygodium volubile Sw.

Sin.: *Hydroglossum volubile* (Sw.) Willd., *Lygodium hirtum* Kaulf., *Lygodium micans*, *Lygodium puberulum* Sturm, *Lygodium volubile* Sw. var. *hirtum* (Kaulf.) Farw.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, PAI).

MARATTIACEAE

Danaea Sm., nom. cons.

Danaea moritziana C. Presl

Sin.: *Danaea excurrens* Rosenst., *Danaea moritziana* C. Presl var. *brasiliensis* Rosenst., *Danaea muelleriana* Rosenst., *Danaea polymorpha* Lepr. ex Baker

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY.

Danaea nodosa (L.) Sm.

Sin.: *Acrostichum nodosum* L., *Danaea cordata* Fée, *Danaea elliptica* Sm, *Danaea geniculata* Raddi, *Danaea polymorpha* Lepr. ex Baker, *Danaea sellowiana* C. Presl

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA).

Eupodium J. Sm.

Eupodium kaulfussii (J. Sm.) J. Sm.

Sin.: *Eupodium kaulfussii* (Hook.) J. Sm. var. *acuminatum* Fée, *Eupodium kaulfussii* (Hook.) J. Sm. var. *macropteron* Fée, *Gymnotheca raddiana* (Schott) C. Presl, *Marattia kaulfussii* J. Sm., *Marattia raddiana* Schott

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Marattia Sw.

Marattia cicutifolia Kaulf.

Sin.: *Gymnotheca cicutifolia* (Kaulf.) C. Presl, *Gymnotheca obtusidens* C. Presl, *Gymnotheca podolepis* de Vriese, *Gymnotheca polyodon* C. Presl, *Gymnotheca verschaffeltiana* de Vriese & Harting, *Marattia fraxinea* Raddi non Sm., nom. illeg., *Marattia juerguensis* Rosenst., *Marattia obtusidens* (C. Presl) Sturm, *Marattia podolepis* (de Vriese) Sturm, *Marattia polyodon* (C. Presl) Sturm, *Marattia raddii* Desv., *Marattia raddii* Desv. var. *juerguensis* (Rosenst.) Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

MARSILEACEAE

Marsilea L.

Marsilea ancylopoda A. Braun

Sin.: *Marsilea berteroi* A. Braun, *Marsilea concinna* Baker, *Marsilea ernestii* A. Braun, *Marsilea hickenii* Herter, *Marsilea mexicana* A. Braun, *Zaluzianskia ancylopoda* (A. Braun) Kuntze, *Zaluzianskia berteroi* (A. Braun) Kuntze, *Zaluzianskia concinna* (Baker) Kuntze, *Zaluzianskia ernestii* (A. Braun) Kuntze, *Zaluzianskia mexicana* (A. Braun) Kuntze

Hierba acuática. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SLU). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CHO, CON, ITA, ÑEE). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR, TAC).

Marsilea deflexa A. Braun

Sin.: *Zaluzianskia deflexa* (A. Braun) Kuntze

Hierba acuática. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS). PRY(APY, CON, ITA, PHA).

Marsilea mollis B.L. Rob. & Fernald

Sin.: *Marsilea punae* de la Sota

Hierba acuática. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(JUU, TUC). CHL(COQ, VAL).

Pilularia L.

Pilularia americana A. Braun

Sin.: *Calamistrum americanum* (A. Braun) Kuntze, comb. illeg., *Calamistrum mandonii* (A. Braun) Kuntze, comb. illeg., *Pilularia mandonii* A. Braun, *Pilularia valdiviana* Phil. ex Baker, nom. nud.

Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, NEU, RNE, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). URY(CAS).

Regnellidium Lindm.

Regnellidium diphyllum Lindm.

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA). URY(CLA, PAY, ROC, TYT).

NEPHROLEPIDACEAE

Nephrolepis Schott

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

Sin.: *Aspidium acutum* Schkuhr, *Aspidium biserratum* Sw.

Hierba epífita. Nativa. 100-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam.

Sin.: *Nephrodium brownii* Desv.

Hierba epífita Nativa.

Países: BRA(PAR).

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl

Sin.: *Aspidium cordifolium* (L.) Sw., *Aspidium tuberosum* Bory ex Willd., *Drynaria cordifolia* (L.) Fée, *Nephrodium cordifolium* (L.) Baker, *Nephrolepis auriculata* (L.) Trimen,

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl var. *tuberosa* (Bory ex Willd.) Baker, *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott var. *tuberosa* (Bory ex Willd.) Kuntze, *Nephrolepis tuberosa* (Bory ex Willd.) C. Presl, *Polypodium auriculatum* L., *Polypodium cordifolium* L., nom. cons. Hierba terrestre o epífita. Introducida. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN).

Nephrolepis exaltata (L.) Schott
Sin.: *Polypodium exaltatum* L.
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott
Sin.: *Aspidium pectinatum* Willd., *Nephrodium pectinatum* (Willd.) Link
Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Nephrolepis pendula (Raddi) J. Sm.
Sin.: *Aspidium pendulum* Raddi
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug
Sin.: *Polypodium rivulare* Vahl
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 400-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

OLEANDRACEAE

Arthropteris J. Sm. ex Hook. f.

Arthropteris altescandens (Colla) J. Sm.
Sin.: *Nephrolepis altescandens* (Colla) Baker, *Polypodium altescandens* Colla, *Polypodium procurrens* Kunze
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(JFE).

Oleandra Cav.

Oleandra australis Schwartsb. & J. Prado
Hierba epífita. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(PAR).

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium Sw.

Botrychium dusenii (Christ) Alston
Sin.: *Botrychium lunaria* (L.) Sw. var. *antarctica* Speg., *Botrychium lunaria* (L.) Sw. var. *dusenii* Christ, *Botrychium matricariaefolium* (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch subsp. *patagonicum* (Christ) R.T. Clausen, *Botrychium ramosum* (Roth) Asch. var. *patagonicum* Christ
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

Botrypus Michx.

Botrypus virginianus (L.) Michx.
Sin.: *Botrychium cicutarium* (Savigny) Sw., *Botrychium virginianum* (L.) Sw., *Osmunda cicutaria* Savigny, *Osmunda virginiana* L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL). BRA(RGS, SCA). URY(RIV).

Haukia Li Bin Zhang & Lian Zhang

Haukia crotalophoroides (Walter) Li Bing Zhang & Liang Zhang
Sin.: *Ophioglossum bulbosum* Michx., *Ophioglossum crotalophoroides* Walter, *Ophioglossum pusillum* Nutt., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *crotalophoroides* (Walter) D.C. Eaton
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CEN, COA). URY(ART, CAS, CLA, MON, SJO, TAC).

Haukia tuberosa (Hook. & Arn.) Li Bing Zhang & Liang Zhang
Sin.: *Ophioglossum crotalophoroides* Walter var. *nanum* J.S. Licht. ex Osten, *Ophioglossum stipatum* Miers ex Colla, *Ophioglossum tuberosum* Hook. & Arn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(BIO).

Ophioderma (Blume) Endl.

Ophioderma palmata (L.) Nakai
Sin.: *Cheiroglossa austrobrasiliensis* Brade, *Cheiroglossa palmata* (L.) C. Presl, *Ophioglossum palmatum* L.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Ophioglossum L.

Ophioglossum fernandezianum C. Chr.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(JFE).

Ophioglossum melipillense J. Rémy

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).
CHL(VAL, LBO, MAU, RME).**Ophioglossum nudicaule** L. f.Sin.: *Ophioglossum ellipticum* Hook. & Grev., *Ophioglossum nudicaule* L. f. var. *robustum* J.S. Licht., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *nudicaule* (L. f.) D.C. Eaton., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *surinamense* Luer.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CHO, COA, ITA, PHA). URY(MON).

Ophioglossum opacum Carmich.Sin.: *Ophioglossum crotalophoroides* Walter subsp. *robustum* R.T. Clausen, *Ophioglossum crotalophoroides* Walter var. *opacum* (Carmich.) J.S. Licht.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(MAG).**Ophioglossum reticulatum** L.Sin.: *Ophioglossum peruvianum* C. Presl, *Ophioglossum vulgatum* L. var. *reticulatum* (L.) Luer.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(COA). URY(RIV).

Ophioglossum vulgatum L.Sin.: *Ophioglossum valdivianum* Phil., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *valdivianum* (Phil.) J.S. Licht.

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(LSR, LLA, AIS).**Sceptridium** Lyon**Sceptridium australe** (R. Br.) LyonSin.: *Botrychium australe* R. Br. subsp. *austral*

Hierba. Nativa. 200-2000 m.

Países: ARG(BAI, COR, SLU, TUC).

Sceptridium negerii (Christ) HolubSin.: *Botrychium australe* R. Br. subsp. *negerii* (H. Christ) R.T. Clausen, *Botrychium negerii* H. Christ

Hierba. Endémica. 700-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

Sceptridium schaffneri (Underw.) LyonSin.: *Botrychium schaffneri* Underw.

Hierba. Nativa. 1500-2600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

OSMUNDACEAE**Osmunda** L.**Osmunda spectabilis** Willd.Sin.: *Aphyllocalpa regalis* (L.) Lag., *D. García & Clemente*, *Osmunda gracilis* Link, *Osmunda palustris* Schrad., *Osmunda regalis* L. subsp. *palustris* (Schrad.) A. Löve & D. Löve, *Osmunda regalis* L. subsp. *spectabilis* (Willd.) Á. Löve & D. Löve, *Osmunda regalis* L. var. *brasiliensis* (Hook. & Grev.) Kunze, *Osmunda regalis* L. var. *spectabilis* (Willd.) A. Gray, *Osmunda spectabilis* Willd. var. *brasiliensis* Hook. & Grev.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, SPE). URY(CAS, CLA, LAV, MON, RNO, ROC).

Osmundastrum C. Presl**Osmundastrum cinnamomeum** (L.) C. PreslSin.: *Anemia bipinnata* (L.) Sw., *Osmunda bipinnata* L., *Osmunda cinnamomea* L., *Osmunda cinnamomea* L. var. *imbricata* (Kunze) Milde, *Osmunda imbricata* Kunze

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, COA, SPE). URY(RIV).

PLAGIOGYRIACEAE**Plagiogyria** (Kunze) Mett.**Plagiogyria fialhoi** (Fée & Glaz.) Copel.Sin.: *Lomaria fialhoi* Fée & Glaz.

Hierba rupícola. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

POLYPODIACEAE**Adetogramma** (A. Anderson) Kuntze**Adetogramma chrysolepis** (Hook.) T.E. AlmeidaSin.: *Lepicystis chrysolepis* (Hook.) Diels, *Microgramma chrysolepis* (Hook.) Crabbe, *Polypodium bangii* Baker, *Polypodium chrysolepis* Hook.

Hierba epífita. Nativa. 1600-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Alansmia M. Kessler, Moguel, Sundue & Labiak

Alansmia reclinata (Brack.) Moguel & M. Kessler

Sin.: *Ctenopteris ciliaris* (Fée) Copel., *Ctenopteris reclinata* (Brack.) Copel., *Polypodium reclinatum* Brack., *Terpsichore reclinata* (Brack.) Labiak
Hierba epífita. Nativa. 500-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Campyloneurum C. Presl

Campyloneurum aglaolepis (Alston) de la Sota

Sin.: *Polypodium aglaolepis* Alston
Hierba epífita. Nativa. 1200-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée

Sin.: *Campyloneurum taeniosum* (Willd.) Fée, *Cyrtophlebium angustifolium* (Sw.) J. Sm., *Goniophlebium angustifolium* (Sw.) Brack, *Marginaria angustifolia* (Sw.) C. Presl, *Polypodium angustifolium* Sw., *Polypodium taeniosum* Willd.
Hierba epífita. Nativa. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Campyloneurum angustipaleatum (Alston) M. Mey. ex Lellinger

Sin.: *Polypodium angustipaleatum* Alston
Hierba. Nativa. 800-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Campyloneurum atlanticum R.C. Moran & Labiak

Hemiepífita. Nativa. 100-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, PAI).

Campyloneurum austrobrasilianum (Alston) de la Sota

Sin.: *Polypodium austrobrasilianum* Alston
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Campyloneurum crispum Fée

Sin.: *Campyloneurum acrocarpon* Fée
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Campyloneurum decurrens (Raddi) C. Presl

Sin.: *Aspidium pentaphyllum* Willd., *Cyrtophlebium decurrens* (Raddi) J. Sm., *Polypodium decurrens* Raddi
Hierba epífita o epipéfrica. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Campyloneurum fallax Fée

Sin.: *Polypodium longipetiolatum* Brade
Hierba epífita o terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Campyloneurum lapathifolium (Poir.) Ching

Sin.: *Polypodium lapathifolium* Poir.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA (PAR, RGS, SCA).

Campyloneurum lorentzii (Hieron.) Ching

Sin.: *Polypodium lorentzii* Hieron.
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, TUC). PRY(CAA).

Campyloneurum minus Fée

Sin.: *Campyloneurum herbaceum* (Christ) Ching, *Polypodium herbaceum* Christ
Hierba epífita. Nativa. 100-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(COA, GUA, ITA, PAI).

Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C. Presl

Sin.: *Campyloneurum leuconeurum* Fée, *Campyloneurum majus* (Hieron. ex Hicken) Lellinger, *Polypodium nitidum* Kaulf., *Polypodium phyllitidis* L. f. *majus* Hieron. ex Hicken, *Polypodium phyllitidis* L. f. *minus* Hieron.
Hierba epífita. Nativa. 300-1100 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CLA, CLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).

Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl

Sin.: *Polypodium repens* Aubl.
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Campyloneurum rigidum J. Sm.

Sin.: *Polypodium rigidum* (J. Sm.) Lowe
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Campyloneurum tucumanense (Hieron.) Ching

Sin.: *Polypodium tucumanense* Hieron.
Hierba terrestre. Nativa. 1000-1800 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).

Ceradenia L.E. Bishop

Ceradenia albidula (Baker) L.E. Bishop

Sin.: *Ctenopteris albidula* (Baker) Copel., *Polypodium albidulum* Baker, *Polypodium subinaequale* H. Christ
Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ceradenia maackii Labiak & J.B.S. Pereira

Hierba rupícola. Endémica. 1500-1600 m.
Países: BRA(PAR).

Ceradenia spixiana (Mart. ex Mett.) L.E. Bishop
 Sin.: *Grammitis transiens* (Lindm.) F. Seym., *Polypodium longipes* Fée, nom. illeg., *Polypodium radicale* Moritzi ex Baker, *Polypodium spixianum* Mart. ex Mett., *Polypodium transiens* Lindm.
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Cochlidium Kaulf.

Cochlidium punctatum (Raddi) L.E. Bishop
 Sin.: *Cochlidium paucinervatum* (Fée) C. Chr., *Grammitis paucinervata* Fée, *Grammitis punctata* Raddi, *Monogramma rudolfii* Rosenst., *Polypodium paucinervatum* (Fée) C. Chr., *Polypodium punctatum* (Raddi) Hook.
 Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E. Bishop
 Sin.: *Acrostichum serrulatum* Sw., *Asplenium serrulatum* (Sw.) Sw., *Grammitis serrulata* (Sw.) Sw., *Gymnopteris serrulata* (Sw.) Bernh., *Polypodium duale* Maxon, nom. superfl., *Polypodium serrulatum* (Sw.) Mett., comb. illeg., *Xiphopteris auyantepuiensis* Vareschi, *Xiphopteris extensa* Fée, *Xiphopteris serrulata* (Sw.) Kaulf.
 Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Grammitis Sw.

Grammitis fluminensis Fée
 Sin.: *Grammitis marginella* (Sw.) Sw. var. *castellensis* Brade, *Polypodium marginellum* Bory ex Willd. var. *brasiliense* Rosenst.
 Hierba epífita. Nativa. 1500
 Países: BRA(PAR, SCA).

Lellingeria A.R. Sm. & R.C. Moran

Lellingeria apiculata (Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran
 Sin.: *Ctenopteris apiculata* (Kunze ex Klotzsch) Copel., *Grammitis apiculata* (Kunze ex Klotzsch) F. Seym., *Polypodium apiculatum* Kunze ex Klotzsch, *Polypodium pecten* Fée, *Xiphopteris apiculata* (Kunze ex Klotzsch) Copel.
 Hierba epífita. Nativa. 800-1100 m.
 Países: BRA(PAR).

Lellingeria brevistipes (Mett. ex Kuhn) A.R. Sm. & R.C. Moran
 Sin.: *Ctenopteris brevistipes* (Mett. ex Kuhn) Copel., *Polypodium brevistipes* Mett. ex Kuhn, *Polypodium brevistipes* Mett. ex Kuhn var. *sebastianopolitanum* Baker
 Hierba epífita. Nativa. 400-1400 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lellingeria ciliolopsis (C. Chr.) A.R. Sm.
 Sin.: *Polypodium ciliolopsis* C. Chr.
 Hierba epífita. Nativa. 1600-3800 m.
 Países: ARG(SAL).

Lellingeria depressa (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
 Sin.: *Polypodium depressum* C. Chr., *Polypodium immersum* Fée
 Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Lellingeria itatimensis (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
 Sin.: *Ctenopteris itatimensis* (C. Chr.) Copel., *Polypodium itatimensense* C. Chr., *Polypodium saxicola* Rosenst.
 Hierba epífita. Nativa. 800-1200 m.
 Países: BRA(PAR, RGS).

Lellingeria tamandarei (Rosenst.) A.R. Sm. & R.C. Moran
 Sin.: *Ctenopteris tamandarei* (Rosenst.) Copel., *Polypodium tamandarei* Rosenst.
 Hierba. Nativa. 1500-2500 m.
 Países: BRA(SCA).

Leucotrichum Labiak

Leucotrichum organense (Gardner) Labiak
 Sin.: *Grammitis organensis* Gardner, *Grammitis reitzii* (Alston) Brade, *Lellingeria organensis* (Gardner) A.R. Sm. & R.C. Moran, *Polypodium organense* (Gardner) Mett., *Xiphopteris organensis* (Gardner) Copel., *Xiphopteris reitzii* Alston
 Hierba epífita. Nativa. 400-1500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leucotrichum schenckii (Hieron.) Labiak
 Sin.: *Grammitis schenckii* (Hieron.) Brade, *Polypodium schenckii* Hieron., *Xiphopteris schenckii* (Hieron.) Copel.
 Hierba epífita. Nativa. 400-1500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Melpomene A.R. Sm. & R.C. Moran

Melpomene albicans Lehnert
 Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Melpomene melanosticta (Kunze) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Grammitis melanosticta* (Kunze) F. Szym., *Polypodium calvum* Maxon, *Polypodium melanostictum* Kunze
Hierba rupícola. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR).

Melpomene peruviana (Desv.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenopteris peruviana* (Desv.) J. Sm., *Grammitis peruviana* (Desv.) C.V. Morton, *Polypodium peruvianum* Desv., *Polypodium stipitatum* Hook. & Grev.
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 500-4200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC). BRA(SCA).

Melpomene xiphopteroides (Liebm.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. **acrodontia** (Fée) Lehnert
Sin.: *Polypodium acrodontium* Fée
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Microgramma C. Presl

Microgramma geminata (Schrad.) A.F. Tryon & R.M. Tryon
Sin.: *Polypodium geminatum* Schrad.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR).

Microgramma lindbergii (Mett. ex Kuhn) de la Sota
Sin.: *Drynaria lindbergii* (Mett. ex Kuhn) Fée, *Polypodium lindbergii* Mett. ex Kuhn
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Microgramma mortoniana de la Sota
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(PAI). URY(ART, CLA, COL, PAY, RNO, SJO).

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota
Sin.: *Polypodium percussum* Cav.
Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Microgramma persicariifolia (Schrad.) C. Presl
Sin.: *Polypodium persicariifolium* Schrad.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAN, CON, SPE).

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota
Sin.: *Craspedaria grandis* Fée, *Pleopeltis squamulosa* (Kaulf.) C. Presl, *Polypodium squamulosum* Kaulf.
Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Microgramma tecta (Kaulf.) Alston
Sin.: *Polypodium tectum* Kaulf.
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.
Sin.: *Anapeltis vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) J. Sm., *Craspedaria cordifolia* Fée, *Craspedaria vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Link, *Goniophlebium vacciniifolium* (Langsd.

& Fisch.) J. Sm. ex Hook., *Lepicystis vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Diels, *Lopholepis vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) J. Sm., *Marginaria vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) C. Presl, *Niphobolus vacciniifolius* (Langsd. & Fisch.) Keyserl., *Polypodium vacciniifolium* Langsd. & Fisch.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CAN, CON, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).

Moranopteris R.Y. Hirai & J. Prado

Moranopteris achilleifolia (Kaulf.) R.Y. Hirai & J. Prado
Sin.: *Ctenopteris achilleifolia* (Kaulf.) J. Sm., *Grammitis achilleifolia* (Kaulf.) R.M. Tryon, *Micropolypodium achilleifolium* (Kaulf.) Labiak & F.B. Matos, *Polypodium achilleifolium* Kaulf., *Terpsichore achilleifolia* (Kaulf.) A.R. Sm.
Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Moranopteris gradata (Baker) R.Y. Hirai & J. Prado
Sin.: *Ctenopteris gradata* (Baker) Copel., *Ctenopteris schwackei* (H. Christ) Copel., *Grammitis gradata* (Baker) R.M. Tryon & A.F. Tryon, *Micropolypodium gradatum* (Baker) Labiak & F.B. Matos, *Polypodium gradatum* Baker, *Polypodium schwackei* H. Christ, *Terpsichore gradata* (Baker) A.R. Sm.
Hierba epífita. Nativa. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Moranopteris setosa (Kaulf.) R.Y. Hirai & J. Prado

Sin.: *Grammitis setosa* (Kaulf.) C. Presl, *Micropolypodium setosum* (Kaulf.) A.R. Sm., *Polypodium micropteris* C. Chr., *Xiphopteris setosa* Kaulf.

Hierba rupícola. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Niphidium J. Sm.

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger

Sin.: *Anaxetum crassifolium* (L.) Schott, comb. illeg., *Dipteris crassifolia* (L.) J. Sm., *Drynaria crassifolia* (L.) J. Sm., *Pessopteris crassifolia* (L.) Underw. & Maxon, *Phymatodes crassifolia* (L.) C. Presl, *Phymatodes porrecta* C. Presl, *Pleopeltis crassifolia* (L.) T. Moore, *Pleuridium crassifolium* (L.) Fée, *Polypodium crassifolium* L., *Polypodium porrectum* Willd.

Hierba epífita. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA). URY(CLA).

Niphidium rufosquamatum Lellinger

Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA).

Notogrammitis Parris

Notogrammitis angustifolia (Jacq.) Parris

Sin.: *Asplenium angustifolium* Jacq., *Grammitis araucana* Phil., *Grammitis billardieri* Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota, *Grammitis kerguelensis* Tardieu, *Grammitis magellanica* Desv., *Grammitis poeppigiana* (Mett.) Pic.Serm.,

Polypodium australe (R. Br.) Mett. f. *nanum* (Franch.) Macloskie, *Polypodium billardieri* (Willd.) C. Chr. f. *nanum* (Brack.) Franch. ex Skottsb., *Polypodium billardieri* C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr., *Polypodium gramineum* Poir., hom. illeg., *Polypodium magellanicum* (Desv.) Copel., *Polypodium magellanicum* (Desv.) J.W. Sturm

Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Notogrammitis crassior (Kirk) Parris

Sin.: *Grammitis armstrongii* Tindale, *Grammitis australis* R. Br. var. *nana* (Brack.) Franch., *Grammitis magellanica* Desv. f. *nana* (Brack.) de la Sota ex T.R. Dudley, *Grammitis nana* Brack., hom. illeg., *Polypodium australe* Fée var. *nanum* (Brack.) Macloskie, *Polypodium crassium* Kirk, *Polypodium nanum* (Brack.) J.W. Sturm

Hierba. Cosmopolita. 0-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Notogrammitis patagonica (C. Chr.) Parris

Sin.: *Grammitis patagonica* (C. Chr.) Parris, *Grammitis repanda* Kunze ex Mett., *Polypodium patagonicum* C. Chr.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

Pecluma M.G. Price

Pecluma barituensis O.G. Martínez & de la Sota

Hierba epífita. Endémica. 900-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Pecluma camptophyllaria (Fée) M.G. Price var. **lachnifera** (Hieron.) Lellinger

Sin.: *Polypodium camptophyllum* Fée var. *lachniferum* (Hieron.) A.M. Evans, *Polypodium lachniferum* Hieron.

Hierba epífita. Nativa. 0-400 m.

Países: PRY(CAN).

Notas: Citada para Brasil por (Peña-Chocarro et al. (1999) sin mencionar localidad o material de referencia.

Pecluma chnoophora (Kunze) Salino & F. Costa Assis

Sin.: *Polypodium chnoophorum* Kunze

Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Pecluma choquetangensis (Rosenst.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium choquetangense* Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 1600-2800 m.

Países: ARG(JUJ).

Pecluma filicula (Kaulf.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium elasticum* Rich. var. *filicula* (Kaulf.) Baker, *Polypodium filiculum* Kaulf.

Hierba epífita. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAA, CAN, PAI). URY(MAL, RIV, ROC).

Pecluma oranensis (de la Sota) de la Sota

Sin.: *Polypodium oranense* de la Sota

Hierba epífita. Nativa. 1500-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Pecluma paradiseae (Langsd. & Fisch.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium paradiseae* Langsd. & Fisch.

Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, TAC).

Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium microsorum* Lindm., hom. illeg., *Polypodium pectinatiforme* Lindm., *Polypodium pectinatiforme* Lindm. var. *hirsutum* Rosenst., *Polypodium pectinatum* L. f. *typicum* Rosenst., nom. inval., *Polypodium pectinatum* L. var. *truncatum* Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(RIV).

Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.G. Price

Sin.: *Ctenopteris plumula* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm., *Polypodium plumula* Humb. & Bonpl. ex Willd.

Hierba epífita. Nativa. 600-800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).

Pecluma recurvata (Kaulf.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium extensum* Fée, *Polypodium paraguayense* Baker, *Polypodium recurvatum* Kaulf., *Polypodium recurvatum* Kaulf. var. *paraguayense* (Baker) Hassl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, PAI).

Pecluma robusta (Fée) M. Kessler & A.R. Sm.

Sin.: *Pecluma ptilodon* (Kunze) M.G. Price var. *robusta* (Fée) Lellinger, *Polypodium ptilodon* Kunze var. *robustum* (Fée) A.M. Evans, *Polypodium robustum* Fée

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, SPE).

Pecluma sicca (Lindm.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium heteroclitum* Fée, hom. illeg., *Polypodium siccum* Lindm.

Hierba epífita. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA). URY(ART, CLA, MAL, RIV, TAC, TYT).

Pecluma singeri (de la Sota) M.G. Price

Sin.: *Polypodium gregale* Sehnem, *Polypodium pectinatum* L. var. *auritum* Rosenst., *Polypodium singeri* de la Sota

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA).

Pecluma truncorum (Lindm.) M.G. Price

Sin.: *Ceradenia glaziovii* (Baker) Labiak, *Ctenopteris glaziovii* (Baker) Copel., *Ctenopteris truncorum* (Lindm.) Copel., *Polypodium bakeri* Lindm., hom. illeg., *Polypodium elasticum* Bory ex Willd. var. *glaziovii* Baker, *Polypodium glaziovii* Baker, *Polypodium truncorum* Lindm.

Hierba epífita. Nativa. 200-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pecluma venturii (de la Sota) M.G. Price

Sin.: *Polypodium venturii* de la Sota

Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(CAA, COA, PAI).

Phlebodium (R. Br.) J. Sm.

Phlebodium areolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm.

Sin.: *Phlebodium aureum* (L.) J. Sm. var. *areolatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Farw., *Polypodium areolatum* Humb. & Bonpl. ex Willd.

Hierba epífita. Nativa. 200-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

Phlebodium aureum (L.) J. Sm.

Sin.: *Chrysopteris aurea* (L.) Link, *Polypodium aureum* L.

Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS, JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA).

Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm.

Sin.: *Polypodium decumanum* Willd.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON).

Phymatosorus Pic.Serm.

Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. Serm.

Sin.: *Microsorium scolopendria* (Burm. f.) Copel., *Polypodium scolopendria* Burm. f.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: CHL(IPA).

Pleopeltis Humb. & Bonpl. ex Willd.

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn.

Sin.: *Polypodium astrolepis* Liebm.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pleopeltis x cerro-altoensis Danton & Boudrie

Hierba. Endémica. 300-400 m.

- Países: CHL(JFE).
- Pleopeltis furcata** (L.) A.R. Sm.
Sin.: *Pteris furcata* L.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Pleopeltis glandulosa** Arana, Slanis & Bulacio
Hierba. Endémica. 2400-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Pleopeltis hirsutissima** (Raddi) de la Sota
Sin.: *Goniophlebium hirsutissimum* (Raddi) Brack., *Marginaria hirsutissima* (Raddi) Pic.Serm., *Polypodium hirsutissimum* Raddi, *Polypodium lepidopteris* (Langsd. & Fisch.) Kunze var. *rufulum* (C. Presl) Baker, *Polypodium raddii* Desv., nom. *superfl.*, *Polypodium rufulum* C. Presl, *Polypodium vexillare* H. Christ
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, SPE). URY(ART, CLA, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).
- Pleopeltis lepidopteris** (Langsd. & Fisch.) de la Sota
Sin.: *Acrostichum lepidopteris* Langsd. & Fisch., *Polypodium lepidopteris* (Langsd. & Fisch.) Kunze
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, CLA, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).
- Pleopeltis macrocarpa** (Bory ex Willd.) Kaulf.
Sin.: *Drynaria lanceolata* (L.) Fée, *Drynaria macrocarpa* (Bory ex Willd.) Fée, *Grammitis robusta* Phil., *Lepicystis lanceolata* (L.) Diels, *Marginaria lanceolata* (L.) Herter, *Niphobolus lanceolatus* (L.) Keyserl., *Phlebodium lanceolatum* (L.) J. Sm., *Pleopeltis lanceolata* (L.) C. Presl, hom. illeg., *Pleopeltis lanceolata* Kaulf., *Polypodium lanceolatum* L., *Polypodium lanceolatum* L. var. *araucanum* (F. Phil.) Looser, *Polypodium macrocarpum* Bory ex Willd., *Polypodium marginale* Bory ex Willd., nom. illeg.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(ANT, BIO, ARA, LSR, LLA, JFE). URY(MAL, ROC).
- Pleopeltis masafuerae** (Phil.) de la Sota
Sin.: *Polypodium masafuerae* Phil.
Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(JFE).
- Pleopeltis minima** (Bory) J. Prado & R.Y. Hirai
Sin.: *Goniophlebium incanum* J. Sm. var. *minus* Fée, *Marginaria dielsii* Herter, *Marginaria minima* Bory, *Pleopeltis squalida* (Vell.) de la Sota, *Polypodium incanum* Sw. var. *squalidum* (Vell.) Baker, *Polypodium microlepis* Fée, *Polypodium minimum* (Bory) Herter, comb. illeg., *Polypodium polypodioides* (L.) Watt var. *minimum* (Bory) Kuhlman & Kuhn, *Polypodium polypodioides* (L.) Watt var. *minus* (Fée) Weath., *Polypodium squalidum* Vell.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
- URY(ART, CLA, COL, CLA, FLA, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).
- Pleopeltis pinnatifida** Gillies ex Hook. & Grev.
Sin.: *Marginaria argentina* (Maxon) Pic. Serm., *Polypodium argentinum* Maxon, *Polypodium ratibori* Copel., *Polypodium ruiz-leallii* de la Sota
Hierba epífita o epipétrica. Endémica. 1500-3600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(AMA).
- Pleopeltis pleopeltidis** (Fée) de la Sota
Sin.: *Marginaria pleopeltidis* (Fée) Pic. Serm., *Polypodium pleopeltidis* Fée, *Polypodium typicum* Fée, nom. inval.
Hierba epífita. Nativa. 400-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pleopeltis pleopeltifolia** (Raddi) Alston
Sin.: *Drynaria raddiana* Fée, *Polypodium pleopeltifolium* Raddi
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
- Pleopeltis pycnocarpa** (C. Chr.) A.R. Sm.
Sin.: *Pleopeltis bryopoda* (Maxon) de la Sota, *Polypodium bryopodum* Maxon, *Polypodium pycnocarpum* C. Chr.
Hierba. Nativa. 2500-3900 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC). CHL(ANT).

Pleopeltis tweedieana (Hook.) A.R. Sm.
Sin.: *Marginaria tweedieana* (Hook.) Pic. Serm., *Polypodium macrocarpum* Bory de V. ex Willd. var. *unguiculare* Griseb., *Polypodium platybasis* Baker, *Polypodium tweedieanum* Hook.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 500-2400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Serpocaulon A.R. Sm.

Serpocaulon australe D. Sanín, J.C. Ospina, I.O. Moura & Salino
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.
Sin.: *Goniophlebium catharinae* (Langsd. & Fisch.) J. Sm., *Polypodium catharinae* Langsd. & Fisch.
Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA). URY(CAS, MAL, ROC, SJO, TYT).
Notas: Sanín et al. (2023) afirma que esta especie no se encuentra en la Argentina.

Serpocaulon fraxinifolium (Jacq.) A.R. Sm.
Sin.: *Polypodium fraxinifolium* Jacq., *Polypodium polystichum* Link, *Serpocaulon polystichum* (Link) A.R. Sm.
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Serpocaulon laetum (C. Presl) A.R. Sm. & Schwartsb.

Sin.: *Goniophlebium sehnemii* Pic.Serm., *Marginaria laeta* C. Presl, *Serpocaulon sehnemii* (Pic.Serm.) Labiak & J. Prado, nom. superfl.
Hierba epífita. Nativa. 600-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Serpocaulon lasiopos (Klotzsch) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium gilliesii* C. Chr., *Polypodium lasiopos* Klotzsch, *Polypodium pubescens* Hook. & Grev., nom. illeg., *Serpocaulon gilliesii* (C. Chr.) A.R. Sm.
Hierba. Nativa. 400-3000 m.
Países: ARG(BAI, COR, JUJ, SAL, SLU).
Notas: Posiblemente también presente en Uruguay (Sanín et al., 2018).

Serpocaulon latipes (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium laetum* Raddi, *Polypodium latipes* Langsd. & Fisch.
Hierba terrestre. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, PAI, SPE). URY(LAV, MAL, ROC).

Serpocaulon meniscifolium (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium meniscifolium* Langsd. & Fisch.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Serpocaulon rex Schwartsb. & A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium brasiliense* Poir. var. *pleiosorum* Rosenst. ex Hassl.
Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.
Países: PRY(AMA).

Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm.
Sin.: *Polypodium brasiliense* Poir., *Polypodium neriifolium* Schkuhr, *Polypodium triseriale* Sw.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Serpocaulon vacillans (Link) A.R. Sm.
Sin.: *Goniophlebium vacillans* (Link) Fée, *Polypodium hasslerii* H. Christ, *Polypodium latipes* Langsd. & Fisch. var. *hassleri* (Christ) Hassl., *Polypodium vacillans* Link
Hierba terrestre. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, SPE).

Stenogrammitis Labiak

Stenogrammitis wittigiana (Fée & Glaz. ex Fée) Labiak
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Synammia C. Presl

Synammia espinosae (Weath.) G. Kunkel
Sin.: *Polypodium espinosae* Weath.
Hierba terrestre. Endémica. 200-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Synammia feuillei (Bertero) Copel.
Sin.: *Goniophlebium synammia* Fée ex J. Remy, *Goniophlebium trilobum* (Cav.) T. Moore, *Grammitis triloba* (Cav.) Desv., comb. illeg., *Mecosorus trilobus* (Cav.) Klotzsch, *Polypodium feuillei*

Bertero, *Polypodium feuillei* Bertero f. *baiscopicum* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero f. *hastifolium* G. Kunkel, *Polypodium feuillei* Bertero f. *simplex* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero f. *trilobum* (Cav.) Looser, *Polypodium feuillei* Bertero f. *unilaterale* G. Kunkel, *Polypodium feuillei* Bertero var. *ibañezii* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero var. *minor* G. Kunkel, *Polypodium glaucescens* Bory, *Polypodium synammia* (Fée ex J. Remy) C. Chr., *Polypodium trilobum* Cav., hom. illeg., *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *baiscopicum* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *hastifolia* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *simplex* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *triloba* (Cav.) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. f. *unilaterale* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *minor* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia skottsbergii* G. Kunkel, *Synammia triloba* (Cav.) C. Presl., comb. illeg.

Hierba epífita o epipétrica. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Synammia intermedia (Colla) G. Kunkel subsp. *intermedia*

Sin.: *Goniophlebium translucens* (Kunze) Fée, *Polypodium intermedium* Colla, *Polypodium intermedium* Colla var. *basicompositum* C. Chr. & Skottsb., *Polypodium translucens* Kunze, *Synammia intermedia* (Colla) G. Kunkel subsp. *masatierrae* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Synammia intermedia (Colla) G. Kunkel subsp. *masafuerana* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel

Sin.: *Polypodium intermedium* Colla subsp. *masafueranum* C. Chr. & Skottsb.

Hierba epífita. Endémica. 200

Países: CHL(JFE).

Terpsichore A.R. Sm.

Terpsichore chryseri (Copel.) A.R. Sm.

Sin.: *Ctenopteris chryseri* Copel., *Grammitis chryseri* (Copel.) Proctor, *Polypodium confluens* Fée, *Polypodium repandum* Fée

Hierba epífita. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Zygophlebia L.E. Bishop

Zygophlebia longipilosa (C. Chr.) L.E. Bishop

Sin.: *Ctenopteris subcrassa* Copel., *Grammitis subcrassa* (Copel.) C.V. Morton, *Polypodium longipilosum* C. Chr.

Hierba epífita. Nativa. 700-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PSILOTACEAE

Psilotum Sw.

Psilotum nudum (L.) P. Beauv.

Sin.: *Lycopodium nudum* L., *Psilotum nudum* (L.) Griseb., comb. superfl., *Psilotum triquetrum* Sw., nom. illeg., *Psilotum triquetrum* Sw. var. *gracile* Hook. & Grev.

Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, MIS, SAL). BRA(RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE). URY(RIV, ROC).

PTERIDACEAE

Acrostichum L.

Acrostichum aureum L.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch.

Sin.: *Acrostichum excelsum* Maxon, *Acrostichum leptophlebium* Baker, *Acrostichum lomarioides* (Jenman) Jenman, *Chrysodium lomarioides* Jenman, *Chrysodium lomarioides* Jenman var. *hastatum* Christ

Hierba palustre. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(CHA, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

Adiantopsis Fée

Adiantopsis × australopedata Hickey, M.S. Barker & Ponce

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, COA, GUA).

Adiantopsis cheilanthoides R.M. Senna

Hierba. Endémica. 1000

Países: BRA(RGS).

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée

Sin.: *Cheilanthes brasiliensis* Raddi, *Cheilanthes chlorophylla* Sw.,

- Cheilanthes glaberrima* Fée,
Cheilanthes spectabilis Kaulf.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).
- Adiantopsis dichotoma** (Sw.) T. Moore
Sin.: *Cheilanthes dichotoma* Sw., *Cheilanthes flexuosissima* Baker, *Pellaea dichotoma* (Sw.) Prantl
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CEN, ITA, PAI). URY(MAL, RIV).
- Adiantopsis occulta** Sehnem
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Adiantopsis orbignyana** (Mett. ex Kuhn) Ponce & Scataglini
Sin.: *Cheilanthes orbignyana* Mett. ex Kuhn
Hierba. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(SAL, TUC). PRY(APY, PAI).
- Adiantopsis perfasciculata** Sehnem
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Adiantopsis radiata** (L.) Fée
Sin.: *Adiantum radiatum* L., *Cheilanthes radiata* (L.) J. Sm.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
- Adiantopsis recurvata** (Baker) Ponce & Scataglini
Sin.: *Cheilanthes recurvata* Baker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(PAI).
- Adiantopsis regularis** (Mett.) T. Moore
Sin.: *Cheilanthes regularis* (Kunze) Mett.
Hierba. Nativa. 0-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).
- Adiantopsis tweediana** (Hook.) Link-Pérez & Hickey
Sin.: *Cheilanthes tweediana* Hook.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS). PRY(APY, CAU, CEN, COA, ÑEE, PAI). URY(RNO).
- Adiantum** L.
- Adiantum abscissum** Schrad.
Sin.: *Adiantum brasiliense* Raddi
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Adiantum camptorachis** Sundue, J. Prado & A.R. Sm.
Hierba. Nativa. 1700-3400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Adiantum capillus-veneris** L.
Sin.: *Adiantum remyanum* Espinosa
Hierba. Introducida. 0-2100 m.
Países: BRA(RGS). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Adiantum chilense** Kaulf.
Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var. *glabrum* Kuntze, *Adiantum mochaenum* G. Kunkel
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
- Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TDF). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).
- Adiantum curvatum** Kaulf.
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Adiantum deflectens** Mart.
Sin.: *Adiantum deflectens* Mart. var. *tremulum* Kunze ex Hieron., *Adiantum dolabriforme* Hook., *Adiantum filiforme* Gardner, *Adiantum flagellum* Fée, *Adiantum glareosum* Lindm., *Adiantum subaristatum* Fée
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, COA, GUA, PAI, PHA).
- Adiantum delicatulum** Mart.
Hierba terrestre. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(APY, AMA, CEN, PAI).
- Adiantum digitatum** Hook.
Sin.: *Adiantum digitatum* C. Presl, nom. nud., *Adiantum palmatum* T. Moore, *Adiantum speciosum* Hook.
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, LAV, MAL, RNO, RIV, SAO, TAC).
- Adiantum excisum** Kunze
Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
- Adiantum gertrudis** Espinosa
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Adiantum glanduliferum** Link
Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) Kuntze,

- Adiantum chilense* Kaulf. var. *hirsutum* Hook. & Grev., *Adiantum pilosum* Fée, *Adiantum poiretii* Wikstr. f. *hirsutum* (Hook. & Grev.) Hicken, *Adiantum poiretii* Wikstr. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) R.M. Tryon, *Adiantum pubescens* C. Presl, *Adiantum thalictroides* Willd. ex Schldl. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) de la Sota
Hierba. Nativa. 1700-3400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, RME).
- Adiantum humile** Kunze
Hierba terrestre. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Adiantum incertum** Lindm.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY.
- Adiantum intermedium** Sw.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).
- Adiantum latifolium** Lam.
Sin.: *Adiantum denticulatum* Sw., *Adiantum fovearum* Raddi
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, CAN, CEN, GUA).
- Adiantum lorentzii** Hieron.
Sin.: *Adiantum cuneatum* Langsd. & Fisch. var. *veneris* Griseb.
Hierba. Nativa. 500-2900 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia.
- Adiantum macrophyllum** Sw.
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
- Adiantum mathewsianum** Hook.
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, CON).
- Adiantum obliquum** Willd.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Adiantum orbignyanum** Mett. ex Kuhn
Sin.: *Adiantum tenerum* Sw. var. *rhomboideum* Griseb.
Hierba. Nativa. 1700-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
- Adiantum pearcei** Phil.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(RME).
- Adiantum pectinatum** Kunze ex Baker
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).
- Adiantum pentadactylon** Langsd. & Fisch.
Sin.: *Adiantum trapeziforme* L. var. *pentadactylon* (Langsd. & Fisch.) C. Chr.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Adiantum peruvianum** Klotzsch
Hierba. Nativa. 1500-1600 m.
Países: ARG(SAL).
- Adiantum petiolatum** Desv.
Sin.: *Adiantum kaulfussii* Kunze, *Adiantum lucidum* (Cav.) Sw. var. *pinnatum* E. Fourn., *Adiantum oblongatum* Schrad.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(SCA). PRY(CAN).
- Adiantum philippianum** Espinosa
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO, RME).
- Adiantum platyphyllum** Sw.
Hierba. Nativa. 300-1000 m.
Países: PRY(AMA).
- Adiantum poiretii** Wikstr. f. **bottinoi** (Giudice & Nieto) Giudice
Sin.: *Adiantum thalictroides* Willd. ex Schldl. f. *bottinoi* Giudice & Nieto
Hierba. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, SLU, TUC).
- Adiantum poiretii** Wikstr. f. **poiretii**
Sin.: *Adiantum gratum* Fée, *Adiantum pellucidum* M. Martens & Galeotti, *Adiantum thalictroides* Willd. ex Schldl. var. *thalictroides*
Hierba. Nativa. 400-3200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(PAI). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, PAY, TAC, TYT).
- Adiantum pseudotinctum** Hieron.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
- Adiantum pulverulentum** L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).
- Adiantum raddianum** C. Presl
Sin.: *Adiantum aemulum* T. Moore, *Adiantum amabile* T. Moore, hom. illeg., *Adiantum colpodes* T. Moore, *Adiantum cuneatum* Langsd. & Fisch., hom. illeg., *Adiantum moorei* Baker
Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, GUA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Adiantum rodriguezii J. Prado, R.Y. Hirai & Sundue
Hierba. Endémica. 100-1200 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Adiantum scabrum Kaulf.
Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var. *scabrum* (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum chilense* Kaulf. var. *scabrum* (Kaulf.) Hicken, *Adiantum scabrum* Kaulf. var. *philippianum* (Espinosa) Looser
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Adiantum serrato-dentatum Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Adiantum obtusum* Desv.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, COA, PHA, SPE).

Adiantum sulphureum Kaulf. var. *majus* Hook.
Sin.: *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *cuneifolium* F. Meigen
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Adiantum sulphureum Kaulf. var. *sulphureum*
Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var. *sulphureum* (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum chilense* Kaulf. var. *subsulphureum* (J.

Remy) Giúdice, *Adiantum chilense* Kaulf. var. *sulphureum* (Kaulf.) Kuntze ex Hicken, *Adiantum poiretii* Wikstr. var. *sulphureum* (Kaulf.) R.M. Tryon, *Adiantum subsulphureum* J. Remy, *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *minus* Hook., *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *subsulphureum* (J. Remy) Looser
Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Adiantum terminatum Miq.
Sin.: *Adiantum hirtum* Klotzsch
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Adiantum tetraphyllum Willd.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Adiantum viscosum A. Cádiz-Véliz & A.E. Villarroel
Hierba. Endémica. 1300-1400 m.
Países: CHL(VAL).

Adiantum weatherbyanum Espinosa
Hierba. Endémica. 100-600 m.
Países: CHL(ANT, COQ).

Adiantum windischii J. Prado
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(CAN).

Anogramma Link

Anogramma leptophylla (L.) Link
Sin.: *Gymnogramma leptophylla* (L.) Desv., *Polypodium leptophyllum* L.
Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: CHL(MAU).

Anogramma lorentzii (Hieron.) Diels
Sin.: *Gymnogramma lorentzii* Hieron., *Gymnogramma regnelliana* Lindm.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COR, ERI, JUJ). BRA(RGS). PRY(CEN). URY(MON).

Argyrochosma (J. Sm.) Windham

Argyrochosma chilensis (Fée & J. Remy) Windham
Sin.: *Cincinalis chilensis* Fée & J. Remy, *Notholaena chilensis* (Fée & J. Remy) J.W. Sturm, *Pellaea chilensis* (J. Remy) C. Chr., *Pellaea chilensis* Fée, nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Argyrochosma flavens (Sw.) A.R. Sm. & M. Kessler
Sin.: *Acrostichum flavens* Sw., *Argyrochosma flava* (Hook.) M. Kessler & A. R. Sm., *Argyrochosma nivea* (Poir.) Windham var. *flava* (Hook.) Ponce, *Gymnogramma flavens* (Sw.) Kaulf., *Notholaena chrysophylla* Klotzsch, *Notholaena flavens* (Sw.) T. Moore, *Notholaena nivea* (Poir.) Desv. var. *flava* Hook., *Pellaea flavens* (Sw.) C. Chr., *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl f. *flavens* (Sw.) Hieron.
Hierba. Nativa. 400-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(SCA).

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham
Sin.: *Acrostichum albidulum* Sw., *Cincinalis nivea* (Poir.) Desv., *Cincinalis tarapacana* Phil., *Gymnogramma nivea* (Poir.) Mett., *Notholaena nivea* (Poir.) Desv., *Notholaena nivea* (Poir.) Desv. var.

oblongata Griseb., *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl, *Pteris nivea* Poir.

Hierba. Nativa. 200-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(SCA). CHL(AYP, TAR, ANT).

Argyrochosma tenera (Gillies ex Hook.) M. Kessler & A.R. Sm.

Sin.: *Argyrochosma nivea* (Poir.) Windham var. *tenera* (Gillies ex Hook.) Ponce, *Notholaena nivea* (Poir.) Desv. var. *tenera* (Gillies ex Hook.) Griseb., *Notholaena tenera* Gillies ex Hook., *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl f. *tenera* (Gillies ex Hook.) Hieron., *Pellaea tenera* (Hook.) Prantl

Hierba. Nativa. 200-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Astrolepis D.M. Benham & Windham

Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham

Sin.: *Acrostichum sinuatum* Lag. ex Sw., *Cheilanthes sinuata* (Lag. ex Sw.) Domin, *Gymnogramma sinuata* (Lag. ex Sw.) C. Presl, *Notholaena sinuata* (Lag. ex Sw.) Kaulf.

Hierba. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(TAR).

Ceratopteris Brongn.

Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron.

Sin.: *Ceratopteris lockhartii* (Hook. & Grev.) Kunze, *Ceratopteris parkeri* J. Sm., nom. superfl., *Parkeria lockhartii*

Hook. & Grev., *Parkeria pteridoides* Hook.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA).

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.

Sin.: *Acrostichum thalictroides* L., *Ceratopteris froesii* Brade, *Furcaria thalictroides* (L.) Desv.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Cheilanthes Sw., nom. cons.

Cheilanthes andina Hook.

Sin.: *Cheilanthes valdiviana* Phil.

Hierba. Nativa.

Países: CHL(LSR).

Cheilanthes arequipensis (Maxon) R.M.

Tryon & A. F. Tryon

Sin.: *Notholaena arequipensis* Maxon

Hierba. Nativa. 2300-4000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Cheilanthes buchtienii (Rosenst.) R.M.

Tryon

Sin.: *Cheilanthes boliviana* C. Chr., *Cheilanthes buchtienii* (Rosenst.) R.M.

Tryon var. *ventanensis* (Weath.)

Capurro, *Notholaena buchtienii*

Rosenst., *Notholaena buchtienii*

Rosenst. var. *ventanaensis* Weath.

Hierba. Nativa. 400-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Cheilanthes glauca (Cav.) Mett.

Sin.: *Acrostichum glaucum* Cav., *Allosorus hirsutus* C. Presl, *Cheilanthes chilensis* Fée, *Pellaea glauca* (Cav.) J.

Sm., *Pellaea hirsuta* (C. Presl) Hook., *Pteris glauca* (Cav.) Cav., *Pteris microphylla* Bertero ex Colla, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Cheilanthes hassleri (Weath.) Ponce

Sin.: *Notholaena hassleri* Weath.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: PRY(CON).

Cheilanthes hieronymi Herter

Sin.: *Cheilanthes marginata* Kunth var. *gracilis* Hieron.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(BAI, CAT, LPA, MEN). BRA(RGS). URY(LAV, RIV, SOR, TAC).

Cheilanthes hypoleuca (Kunze) Mett.

Sin.: *Cincinalis tomentosa* Desv., *Notholaena hypoleuca* Kunze, *Notholaena tomentosa* (Desv.) Desv., *Polypodium confluens* Colla, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, RNE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Cheilanthes juergensii Rosenst.

Sin.: *Cheilanthes juergensii* Rosenst. var. *thellungii* (Herter) D. Legrand & Lombardo, *Cheilanthes thellungii* Herter

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(RIV).

Cheilanthes micropteris Sw.

Sin.: *Notholaena micropteris* (Sw.) Keyserl.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, PAI). URY(LAV, SOR, TAC, TYT).

Cheilanthes mollis (Kunze) C. Presl

Sin.: *Cheilanthes doradilla* (Colla) Domin, *Notholaena doradilla* Colla, *Notholaena mollis* Kunze
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, LLA, RME).

Cheilanthes obducta Mett. ex Kuhn

Sin.: *Notholaena balansae* Baker, *Notholaena herzogii* Rosenst., *Notholaena obducta* (Mett. ex Kuhn) Baker
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY).

Cheilanthes pilosa Goldm.

Sin.: *Allosorus marginatus* J. Sm. var. *brevilobus* Kuntze, *Cheilanthes macleanii* Hook.
Hierba. Nativa. 800-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, MEN, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP).

Cheilanthes poeppigiana Mett. ex Kuhn

Sin.: *Cheilanthes cartilaginea* Griseb., *Cheilanthes cartilaginea* Griseb. var. *platyloba* Griseb., *Pellaea pearcei* Baker
Hierba. Nativa. 2000-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cheilanthes pruinata Kaulf.

Sin.: *Cheilanthes fasciculata* Goldm., *Cheilanthes mathewsii* Kunze, *Notholaena mathewsii* (Kunze) Griseb.
Hierba. Nativa. 2000-4800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Cheilanthes sarmientoi Ponce

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, LPA, MEN, SAL, SJU).

Cheilanthes squamosa Gillies ex Hook. & Grev.

Sin.: *Notholaena gilliesii* Fée, nom. illeg., *Notholaena lilloi* (Hicken) Hicken, *Notholaena squamosa* (Gillies ex Hook. & Grev.) Lowe, *Pellaea lilloi* Hicken
Hierba. Nativa. 200-4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Cheilanthes volcanensis de la Sota

Hierba. Nativa. 2300-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Cryptogramma R. Br.

Cryptogramma fumariifolia (Phil. ex Baker) Christ

Sin.: *Allosorus crispus* Bernh. ex Spreng. var. *chilensis* Christ, *Allosorus fumariaefolius* (Phil.) Kuntze, *Cryptogramma crispa* (L.) R. Br. var. *chilensis* (Christ) Looser, *Pellaea fumariifolia* Phil. ex Baker
Hierba. Endémica. 900-2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Doryopteris J. Sm., nom. cons.

Doryopteris acutiloba (Prantl) Diels

Sin.: *Pellaea acutiloba* Prantl
Hierba. Nativa. 600-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Doryopteris adornata J.C. Yesilyurt

Hierba. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

Doryopteris angustata Sehnem

Hierba. Endémica. 500-600 m.
Países: BRA(RGS).

Doryopteris arifolia Christ

Sin.: *Doryopteris majestosa* J.C. Yesilyurt
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, ITA).

Doryopteris collina (Raddi) J. Sm.

Sin.: *Doryopteris alpicornis* Diels var. *major* Christ, *Doryopteris euchlora* Klotzsch, *Pellaea collina* (Raddi) Prantl, *Pteris collina* Raddi, *Pteris pedata* L. var. *collina* (Raddi) Baker
Hierba. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(COA, GUA, PAI).

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn

Sin.: *Cheilanthes concolor* (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon & A. F. Tryon, *Pellaea concolor* (Langsd. & Fisch.) Baker, *Pteris concolor* Langsd. & Fisch.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, DUR, FLA, RNO, SAO).

Doryopteris lorentzii (Hieron.) Diels

Sin.: *Doryopteris juergensii* Rosenst., *Doryopteris lorentzii* (Hieron.) Diels f.

interrupta Rosenst., *Doryopteris pedata* (L.) Fée var. *lorentzii* (Hieron.) Hassl., *Doryopteris x scalaris* Sehnem, *Pellaea lorentzii* Hieron.

Hierba. Nativa. 500-2400 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA). URY(ART, CLA, PAY, RNO).

Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr.

Sin.: *Doryopteris elegans* Christ, *Doryopteris palmata* (Willd.) J. Sm. var. *patula* (Fée) Hassl., *Doryopteris patula* (Fée) Fée, *Doryopteris raddiana* (C. Presl) Fée var. *patula* Fée, *Litobrochia nobilis* T. Moore, *Pteris elegans* Vell., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, ITA, PAI, SPE). URY(RIV).

Doryopteris pentagona Pic.Serm.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, ÑEE, PAI, SPE).

Doryopteris rediviva Fée

Sin.: *Doryopteris angularis* Fée, *Doryopteris varians* (Raddi) J. Sm. var. *rediviva* (Fée) Luetzelb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Doryopteris rivalis Sehnem

Hierba. Endémica. 300-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Doryopteris sagittifolia (Raddi) J. Sm.

Sin.: *Pteris sagittifolia* Raddi

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Doryopteris stierii Rosenst.

Hierba. Endémica. 100-700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Doryopteris triphylla (Lam.) Christ

Sin.: *Adiantum triphyllum* Lam., *Bakeropteris triphylla* (Lam.) Kuntze, nom. superfl., *Cassebeera pedatifida* Christ, *Cassebeera triphylla* (Lam.) Kaulf., *Doryopteris pedatifida* (Christ) Christ, *Doryopteris triphylla* (Lam.) Christ var. *pedatifida* (Christ) Hassl., *Pellaea triphylla* (Lam.) Prantl

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, COA, PAI). URY(MAL, MON).

Doryopteris varians (Raddi) J. Sm.

Sin.: *Pteris varians* Raddi

Hierba rupícola. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gaga Pryer, F.W. Li & Windham

Gaga marginata (Kunth) F.W. Li & Windham

Sin.: *Allosorus marginatus* (Kunth) J. G. Sm., *Cheilanthes marginata* Kunth, *Pellaea marginata* (Kunth) Baker

Hierba. Nativa. 1600-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Gastoniella Li Bing Zhang & Liang Zhang

Gastoniella chaerophylla (Desv.) Li Bing Zhang & Liang Zhang

Sin.: *Anogramma chaerophylla* (Desv.) Link, *Gymnogramma chaerophylla* Desv., *Hemionitis chaerophylla* (Desv.)

Poir., *Pityrogramma chaerophylla* (Desv.) Domin

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PAI). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, PAY, SJO, SOR).

Hecistopteris J. Sm.

Hecistopteris pumila (Spreng.) J. Sm.

Sin.: *Gymnogramma insignis* Mett., *Gymnogramma pumila* Spreng., *Jamesonia insignis* (Mett.) Christenh.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hemionitis L.

Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi

Sin.: *Asplenium tomentosum* Lam., *Gymnogramma tomentosa* (Lam.) Desv., *Gymnopteris tomentosa* (Lam.) Underw.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, GUA, ÑEE, PAI).

Jamesonia Hook. & Grev.

Jamesonia osteniana (Dutra) Gastony

Sin.: *Anogramma osteniana* Dutra

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(CAS, SJO, TAC).

Lytoneuron (Klotzsch) Yesilyurt

Lytoneuron crenulans (Fée) Yesilyurt
Sin.: *Doryopteris crenulans* (Fée) H. Christ, *Pellaea crenulans* Fée
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lytoneuron lomariaceum (Klotzsch) Yesilyurt
Sin.: *Doryopteris lomariacea* Klotzsch, *Pellaea lomariacea* (Klotzsch) Hook. var. *septembola* Hook., *Pellaea lomariacea* (Kunze ex Klotzsch) Hook.
Hierba. Nativa. 200-2500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, SPE). URY(RIV).

Lytoneuron ornithopus (Mett. ex Hook. & Baker) J.C. Yesilyurt
Sin.: *Doryopteris ornithopus* (Mett.) J. Sm., *Pteris ornithopus* Mett.
Hierba. Nativa. 700-1800 m.
Países: BRA(PAR).

Mineirella Ponce & Scataglini

Mineirella goyazensis (Taub.) Ponce & Scataglini
Sin.: *Cheilanthes goyazensis* (Taub.) Domin, *Notholaena goyazensis* Taub.
Hierba rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Myriopteris Fée

Myriopteris aurea (Poir.) Grusz & Windham
Sin.: *Acrostichum bonariense* Willd., *Cheilanthes bonariensis* (Willd.) Proctor, *Cheilanthes ferruginea* Willd. ex Link, *Notholaena aurea* (Poir.) Desv., *Notholaena bonariensis* (Willd.)

C. Chr., *Notholaena ferruginea* (Willd. ex Link) Hook., *Notholaena rufa* C. Presl, *Notholaena rufa* C. Presl var. *major* C. Presl, *Notholaena rufa* C. Presl var. *minor* C. Presl, *Pteris aurea* Poir.

Hierba. Nativa. 600-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ANT).

Myriopteris microphylla (Sw.) Grusz & Windham

Sin.: *Adiantum microphyllum* Sw., *Allosorus microphyllus* (Sw.) Liebm., *Cheilanthes elongata* Willd. ex Kaulf., *Cheilanthes heterotricha* Andersson, *Cheilanthes microphylla* (Sw.) Sw., *Cheilanthes moritziana* Kunze, *Cheilanthes pubescens* Kunth, *Notholaena microphylla* (Sw.) Keyserl.
Hierba. Nativa. 1100
Países: ARG(SAL).

Myriopteris myriophylla (Desv.) J. Sm.
Sin.: *Cheilanthes elegans* Desv., *Cheilanthes laciniata* Sodiro, *Cheilanthes myriophylla* Desv., *Cheilanthes myriophylla* Desv. var. *elegans* (Desv.) Hicken, *Myriopteris elegans* (Desv.) J. Sm., *Myriopteris intermedia* E. Fourn., hom. illeg., *Notholaena myriophylla* J. Sm.
Hierba. Nativa. 200-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(SCA). CHL(AYP, JFE).

Myriopteris notholaenoides (Desv.) Grusz & Windham
Sin.: *Cheilanthes aspidioides* Fée, *Cheilanthes notholaenoides* (Desv.) Maxon ex Weath, *Pteris notholaenoides* Desv.
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Notholaena R. Br., nom. cons.

Notholaena sulphurea (Cav.) J. Sm.
Sin.: *Aleuritopteris cretacea* (Liebm.) E. Fourn., *Aleuritopteris sulphurea* (Cav.) Fée, *Cheilanthes borsigniana* Rchb. f. & Warsz. ex W. Koch, *Cheilanthes cretacea* (Liebm.) Mett., *Cheilanthes lepida* Phil., *Cheilanthes sulphurea* (Cav.) Mickel & Beitel, *Chrysochosma sulphurea* (Cav.) Kümmerle, *Notholaena lepida* (Phil.) Looser, *Notholaena sulphurea* (Cav.) J. Sm. var. *flava* Kuhn, *Pteris sulphurea* Cav.
Hierba. Nativa. 200-2500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SJU). CHL(ATA).

Pellaea Link, nom. cons.

Pellaea furcata M.A. Hern. & O.G. Martínez
Hierba. Endémica. 2300-4300 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Pellaea myrtillifolia Mett. ex Kuhn
Sin.: *Allosorus myrtifolius* (Mett. ex Kuhn) Kuntze
Hierba. Endémica. 100-2000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Pellaea ovata (Desv.) Weath
Sin.: *Allosorus flexuosus* (Kaulf. ex Schltdl. & Cham.) Kunze, *Pellaea flexuosa* (Kaulf. ex Cham. & Schltdl.) Link, *Platyloma flexuosa* (Kaulf. ex Schltdl. & Cham.) Sm., *Pteris flexuosa* Kaulf. ex Cham. & Schltdl., *Pteris ovata* Desv.
Hierba. Nativa. 800-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Pellaea sagittata (Cav.) Link

Sin.: *Pteris sagittata* Cav.

Hierba. Nativa. 2400-2600 m.

Países: ARG(SAL).

Pellaea ternifolia (Cav.) Link subsp. **ternifolia**

Sin.: *Allosorus ternifolius* (Cav.) Kunze ex Klotzsch, *Cassebeera ternifolia* (Cav.) Farw., *Cheilanthes ternifolia* (Cav.) T. Moore, *Notholaena ternifolia* (Cav.) Keyserl., *Platyloma ternifolia* (Cav.) Sm., *Pteris peruviana* Poir., *Pteris subverticillata* Sw., *Pteris ternifolia* Cav.

Hierba. Nativa. 200-4500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, VAL, LBO, BIO, ARA, LSR, LLA).

Pellaea ternifolia (Cav.) Link subsp. **weddelliana** (Fée) Arana

Sin.: *Cheilanthes weddelliana* (Fée) T. Moore, *Pellaea weddelliana* Fée

Nativa. 100-600 m.

Países: ARG(COR, SAL).

Pityrogramma Link

Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. **aureoflava** (Hook.) Weath. ex Bailey

Sin.: *Gymnogramma calomelanos* L. var. *aureoflava* Hook.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. **austroamericana** (Domin) Farw.

Sin.: *Pityrogramma austroamericana* Domin

Hierba. Nativa. 400-2800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). PRY(CAN).

Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. **calomelanos**

Sin.: *Acrostichum calomelanos* L., *Ceropteris calomelanos* (L.) Link, nom. superfl., *Gymnogramma calomelanos* (L.) Kaulf., *Gymnogramma calomelanos* (L.) Kaulf. var. *denudata* Harr.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RIV).

Pityrogramma ebenea (L.) Proctor var. **aurata** (T. Moore) Lellinger

Sin.: *Gymnogramma tartarea* (Cav.) Desv. var. *aurata* T. Moore, *Pityrogramma presliana* Domin, *Pityrogramma tartarea* (Cav.) Maxon var. *aurata* (T. Moore) R.M. Tryon

Hierba. Introducida. 600-1000 m.

Países: ARG(COR).

Pityrogramma trifoliata (L.) R.M. Tryon

Sin.: *Acrostichum trifoliatum* L., *Ceropteris trifoliata* (L.) Kuhn ex Hieron., *Gymnogramma trifoliata* (L.) Desv., *Trismeria argentea* Fée, *Trismeria aurea* Fée, nom. nud., *Trismeria microphylla* Fée, *Trismeria trifoliata* (L.) Diels

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(PAY).

Polytaenium Desv.

Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict

Sin.: *Antrophyum brasiliense* (Desv.) C. Chr., *Antrophyum cajenense* (Desv.) Spreng., *Hemionitis brasiliensis* Desv., *Hemionitis cajenensis* Desv., *Polytaenium brasiliense* (Desv.) Benedict

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Polytaenium citrifolium (L.) Schuettp.

Sin.: *Acrostichum citrifolium* L., *Anetium citrifolium* (L.) Splitg.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Polytaenium feei (W. Schaffin. ex Fée) Maxon

Sin.: *Antrophyum feei* W. Schaffin. ex Fée

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Polytaenium lineatum (Sw.) Sm.

Sin.: *Antrophyum lineatum* (Sw.) Kaulf., *Hemionitis lineata* Sw., *Polytaenium lanceolatum* (Sw.) Desv., *Vittaria lanceolata* Sw.

Hierba epífita. Nativa. 1000-1400 m.

Países: ARG(SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Pteris L.

Pteris altissima Poir.

Sin.: *Pteris macroptera* Link, *Pteris sterilis* C. Presl

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Pteris angustata (Fée) C.V. Morton

Sin.: *Litobrochia angustata* Fée, *Pteris paulistana* Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pteris berteriana J. Agardh

Sin.: *Litobrochia berteriana* (J. Agardh) Fée, *Pteris comans* G. Forst. var. *berteriana* (J. Agardh) Bonap.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Pteris biaurita L.

Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Pteris brasiliensis Raddi

Sin.: *Litobrochia brasiliensis* (Raddi) C. Presl, *Pteris denticulata* Sw. var. *brasiliensis* (Raddi) Baker
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN).

Pteris chilensis Desv.

Sin.: *Pteris fernandeziana* Phil., *Pteris tenera* Kaulf.
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

Pteris cretica L. var. **cretica**

Sin.: *Pycnodoria cretica* (L.) Small
Hierba. Introducida. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, SAL, TDF, TUC). PRY(GUA, ITA).

Pteris cretica L. var. **laeta** (Wall. ex Ettingsh.) C. Chr. & Tardieu

Sin.: *Pteris laeta* Wall. ex Ettingsh.
Hierba. Introducida. 1000-1100 m.
Países: ARG(COR).

Pteris decurrens C. Presl

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pteris deflexa Link

Sin.: *Litobrochia polita* (Link) J. Sm., *Pteris gaudichaudii* J. Agardh, *Pteris kunzeana* J. Agardh var. *polita* (Link) J. Bommer, *Pteris polita* Link
Hierba. Nativa. 500-2700 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(MON, TYT).

Pteris denticulata Sw. var. **denticulata**

Sin.: *Litobrochia denticulata* (Sw.) C. Presl, *Litobrochia dissimilis* Fée, *Pteris dissimilis* (Fée) Christ
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Pteris denticulata Sw. var. **tristricula** (Raddi) J. Prado

Sin.: *Litobrochia tristricula* (Raddi) C. Presl, *Pteris tristricula* Raddi
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(CEN).

Pteris ensiformis Burm. f. f. **victoriae** Baker

Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(MIS).

Pteris exigua O.G. Martínez & J. Prado

Hierba. Endémica. 1200-1800 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Pteris famatinensis de la Sota

Hierba. Endémica. 2400-2600 m.
Países: ARG(LRI).

Pteris inermis (Rosenst.) de la Sota

Sin.: *Pteris muricata* Hook. var. *inermis* Rosenst.
Hierba. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Pteris leptophylla Sw.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pteris multifida Poir.

Sin.: *Pycnodoria multifida* (Poir.) Small
Hierba. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, DFE, SAL). URY(MON).

Pteris nipponica W.C. Shieh

Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI).

Pteris organensis (Fée) J. Prado & R.Y.

Hirai
Sin.: *Litobrochia organensis* Fée
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Pteris plumula Desv.

Sin.: *Pteris edentula* Kunze
Hierba. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(RGS). PRY(AMA, CAN).

Pteris podophylla Sw.

Sin.: *Litobrochia podophylla* (Sw.) C. Presl, *Pteris luderwaldtii* Rosenst.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pteris propinqua J. Agardh

Sin.: *Pteris goeldii* H. Christ
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Pteris semiadnata Phil.

Sin.: *Pteris marattiifolia* Hook.
Hierba. Endémica. 500-800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Pteris sericea (Fée) H. ChristSin.: *Litobrochia sericea* Fée

Hierba. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pteris sotae O.G. Martínez

Hierba. Nativa. 900-1400 m.

Países: ARG(SAL).

Pteris splendens Kaulf.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY.

Pteris tremula R. Br.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI).

Pteris tripartita Sw.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Pteris vittata L.Sin.: *Pycnodoria vittata* (L.) Small

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, PAY, SAO).

Radiovittaria (J.E. Benedict) E.H.

Crane

Radiovittaria stipitata (Kunze) E.H.

Crane

Sin.: *Vittaria stipitata* Kunze

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Trachypteris André ex H. Christ**Trachypteris pinnata** (Hook. f.) C. Chr.Sin.: *Acrostichum aureonitens* Hook.,*Hemionitis pinnata* Hook. f.,*Neurocallis aureonitens* (Hook.) T.Moore, *Trachypteris aureonitens*

(Hook.) André ex Christ

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Tryonia Schuettp., J. Prado & A.T.

Cochran

Tryonia arenitcola (Schwartzb. &

Labiak) Schuettp., J. Prado & A.T.

Cochran

Sin.: *Eriosorus arenitcola* Schwartzb. &Labiak, *Jamesonia arenitcola*

(Schwartzb. & Labiak) Christenh.

Hierba epipétrica. Nativa. 1000

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tryonia myriophylla (Sw.) Schuettp., J.

Prado & A.T. Cochran

Sin.: *Eriosorus myriophyllus* (Sw.) Copel.,*Gymnogramma felipponei* Herter,*Gymnogramma myriophylla* Sw.,*Jamesonia myriophylla* (Sw.)

Christenh.

Hierba saxícola. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

Vittaria Sm.**Vittaria graminifolia** Kaulf.Sin.: *Vittaria filifolia* Fée, *Vittaria lineata*(L.) Sm. var. *graminifolia* (Kaulf.)

Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, ROC).

Vittaria lineata (L.) Sm.Sin.: *Pteris lineata* L.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, GUA, PAI, SPE). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC).

Vittaria scabrida Klotzsch ex Fée

Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

SACCOLOMATACEAE**Saccoloma** Kaulf.**Saccoloma catharinae** Schwartzb.

Hierba. Endémica. 100-600 m.

Países: BRA(SCA).

Saccoloma distans (Kaulf.) Schwartzb.Sin.: *Davallia distans* Kaulf., *Microlepia**brasiliensis* C. Presl, *Orthopteris**brasiliensis* (C. Presl) Sehnem,*Saccoloma brasiliensis* (C. Presl) Mett.

Subarborescente. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Saccoloma elegans Kaulf.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

SALVINIACEAE**Azolla** Lam.**Azolla cristata** Kaulf.Sin.: *Azolla mexicana* C. Presl, hom. illeg.,*Azolla portoricensis* Spreng.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, LPA, MEN, SAL, TUC). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN).

Azolla filiculoides Lam.

Sin.: *Azolla arbuscula* Desv., *Azolla bonariensis* Bertol., *Azolla caroliniana* Willd., *Azolla densa* Desv., *Azolla magellanica* Willd., nom. inval., *Azolla microphylla* Kaulf., *Azolla squamosa* Molina, nom. superfl., *Salvinia azolla* Raddi, nom. inval.

Hierba acuática. Nativa. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). PRY(APA, APY, CEN, COA, ITA, ÑEE, PHA). URY(MAL, MON, ROC).

Salvinia Ség.

Salvinia auriculata Aubl. var. **major** C.V. Miranda & Schwartzb.

Sin.: *Salvinia hispida* Kunth
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY, BOQ, CHO, ÑEE). URY(ART, ROC).

Salvinia biloba Raddi

Hierba acuática. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, MON, RNO, SJO).

Salvinia herzogii de la Sota

Hierba acuática. Nativa.
Países: ARG(COS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvinia minima Baker

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, ÑEE). URY(CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, RNO, SAO, TYT).

Salvinia molesta D.S. Mitch.

Hierba acuática. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvinia rádula Baker

Hierba acuática. Nativa.
Países: PRY.

SCHIZAEACEAE

Actinostachys Wall.

Actinostachys pennula (Sw.) Hook.

Sin.: *Schizaea pennula* Sw., *Schizaea trilobalis* Hook. & Grev.
Hierba. Nativa. 0
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(CAN).

Actinostachys subtrijuga (Mart.) C. Presl

Sin.: *Schizaea subtrijuga* Mart.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Microschizaea C.F. Reed

Microschizaea australis (Gaudich.) C.F. Reed

Sin.: *Schizaea australis* Gaudich., *Schizaea chilensis* Phil., *Schizaea fistulosa* Labill. var. *australis* (Gaudich.) Hook. f. *Schizaea*

valdiviana Phil. ex Hook. & Baker, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Schizaea Sm., nom. cons.

Schizaea elegans (Vahl) Sw.

Sin.: *Acrostichum elegans* Vahl, *Schizaea flabellum* Mart.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Schizaea fluminensis Miers ex J.W. Sturm

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

SELAGINELLACEAE

Selaginella P. Beauv., nom. cons.

Selaginella apoda (L.) C. Morren

Hierba. Introducida.
Países: CHL(BIO, LSR).

Selaginella contigua Baker

Sin.: *Selaginella callimorpha* Silveira, *Selaginella wettsteinii* Hieron.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Selaginella convoluta (Arn.) Spring

Sin.: *Lycopodium convolutum* Arn., *Lycopodium hygrometricum* Mart., *Lycopodium revolutum* Hook. & Grev., *Selaginella hygrometrica* (Mart.) Spring ex Mart., *Selaginella longispicata* Underw. ex Millsp., *Selaginella orbignyana* Spring ex Decne., nom. nud.

Hierba. Nativa. 200-1200 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR).
PRY(APY, COA, PAI).

Selaginella decomposita Spring

Sin.: *Selaginella assurgens* Baker,
Selaginella fusca Silveira, *Selaginella*
subsegregata Baker
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Selaginella erectifolia Spring

Sin.: *Selaginella camptostachys* Fée,
Selaginella glazioviana Hieron.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Selaginella flexuosa Spring

Sin.: *Selaginella bella* Fée, *Selaginella*
longicuspis Baker, *Selaginella*
macrorhyza Silveira
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-
1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun

Sin.: *Lycopodium kraussianum* Kunze,
Selaginella canescens Fée,
Selaginella hortensis Mett.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Selaginella macrostachya (Spring)
Spring

Sin.: *Selaginella ericoides* Fée,
Selaginella flexuosa Spring subsp.
macrostachya Spring, *Selaginella*
gardneri Spring, *Selaginella geminata*
Fée, *Selaginella henriqueana* Silveira,
Selaginella lindbergii Baker
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Selaginella marginata (Humb. & Bonpl.
ex Willd.) Spring

Sin.: *Lycopodium marginatum* Humb. &
Bonpl. ex Willd., *Selaginella breuensis*
Silveira, *Selaginella burchelli* Hieron.,
Selaginella chromatophylla Silveira,
Selaginella distorta (Spring) Spring,
Selaginella distorta (Spring) Spring
var. *major* Baker, *Selaginella distorta*
(Spring) Spring var. *minor* (Spring)
Spring, *Selaginella excurrens* Spring,
Selaginella herteri Hieron., *Selaginella*
marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.)
Spring var. *distorta* Spring, *Selaginella*
marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.)
Spring var. *minor* Spring, *Selaginella*
moseni Hieron., *Selaginella urbanii*
Hieron., *Selaginella wiewlewskii* Hieron.
ex Rosenst., *Selaginella ypiranguensis*
Hieron. ex Herter, *Selaginella*
ypiranguensis Hieron. ex Herter var.
riograndensis Herter
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CAU, CAN, GUA). URY(ART, LAV,
MAL, MON, RIV, TAC).

Selaginella microphylla (Kunth) Spring

Sin.: *Lycopodium microphyllum* Kunth,
Selaginella jamesonii Baker,
Selaginella thujifolia Spring
Hierba. Nativa. 700-2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
MIS, SAL, SLU, SDE, TUC).
BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PAI).
URY(LAV, TYT).

Selaginella muscosa Spring

Sin.: *Lycopodium albidulum* Sw. var.
majus Hook. & Grev., *Lycopodium*
brasiliense Raddi, *Lycopodium*
crassinervium Desv., *Selaginella*
anocardia A. Braun, *Selaginella apoda*
(L.) C. Morren var. *tetragonostachya*
Spring, *Selaginella beyrichii* A. Braun,
Selaginella brasiliensis (Raddi) Lindm.,
Selaginella brevipes Fée, hom. illeg.,

Selaginella crassinervia (Desv.)
Spring, *Selaginella deltoides* A. Braun,
Selaginella feei Hieron., *Selaginella*
niederleinii Hieron., *Selaginella*
polysperma Spring, *Selaginella*
trifurcata Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN, PAI). URY(MON, RNO).

Selaginella novae-hollandiae (Sw.)
Spring

Sin.: *Lycopodium novae-hollandiae* Sw.,
Selaginella ciliata A. Braun,
Selaginella increscentifolia Spring,
Selaginella tucumanensis Hieron.
Hierba. Nativa. 400-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Selaginella pallescens (C. Presl) Spring

Sin.: *Lycopodium pallescens* C. Presl
Hierba terrestre. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

Selaginella parviarticulata Buck

Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

Selaginella peruviana (Milde) Hieron.

Sin.: *Bryodesma peruvianum* (Milde)
Soják, *Selaginella peruviana* (Milde)
Hieron. var. *dombeyana* Hieron.,
Selaginella rupestris (L.) Spring f.
peruviana Milde, *Selaginella rupestris*
(L.) Spring var. *peruviana* (Milde)
Hieron.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, JUJ,
LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

Selaginella producta Baker

Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Selaginella sellowii Hieron.

Sin.: *Bryodesma sellowii* (Hieron.) Soják,
Selaginella amazonica (Milde) Hieron.,
 comb. illeg., *Selaginella arechavaletae*
 Hieron., *Selaginella mildei* Hieron.,
Selaginella montevidensis Hieron.,
Selaginella rupestris (L.) Spring f.
amazonica Milde,
 Hierba. Nativa. 0-3000 m.
 Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
 JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE,
 TUC). BRA(RGS). PRY(APY, COA,
 PHA). URY(COL, MAL, MON).

Selaginella suavis (Spring) Spring

Sin.: *Selaginella glaziovii* Fée, *Selaginella*
sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex
 Mart. subsp. *suavis* Spring
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.)

Spring ex Mart.
 Sin.: *Lycopodium sulcatum* Desv. ex Poir.,
Selaginella biauriculata Hieron.,
Selaginella caudorrhiza Baker,
Selaginella lorentzii Hieron.,
Selaginella rubescens Hieron.,
Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.)
 Spring ex Mart. var. *biauriculata*
 Hieron. ex Bonap., *Selaginella sulcata*
 (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. var.
cruenta Mart.
 Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(MIS, SAL, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
 CAN, MIE).

Selaginella tenuissima Fée

Sin.: *Selaginella papagaiensis* Silveira
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Selaginella valida Alston

Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.)

Baker
 Sin.: *Lycopodium willdenowii* Desv. ex
 Poir.
 Hierba. Introducida.
 Países: BRA(SCA).

TECTARIACEAE

Tectaria Cav.

Tectaria antioquoiana (Baker) C. Chr.

Sin.: *Aspidium buchtienii* Rosenst.,
Nephrodium antioquoianum Baker,
Tectaria buchtienii (Rosenst.) Maxon
 Hierba. Nativa. 0-100 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Tectaria incisa Cav.

Sin.: *Aspidium martinicense* Spreng.,
Nephrodium andinum Baker, *Tectaria*
andina (Baker) C. Chr., *Tectaria*
martinicense (Spreng.) Copel.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN,
 GUA).

Tectaria pilosa (Fée) R.C. Moran

Sin.: *Cardiochlaena pilosa* Fée
 Hierba. Nativa. 0-100 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

THELYPTERIDACEAE

Amauropelta Kunze

Amauropelta achalensis (Hieron.) Salino
 & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium achalense* Hieron.,
Aspidium siambonense Hieron.,

Dryopteris achalensis (Hieron.) C.
 Chr., *Dryopteris siambonensis*
 (Hieron.) C. Chr., *Nephrodium*
achalense (Hieron.) Hicken,
Nephrodium argentinum (Hieron.)
 Hicken var. *major* Hicken, *Nephrodium*
siambonense (Hieron.) Hicken,
Thelypteris achalensis (Hieron.)
 Abbiatti, *Thelypteris siambonensis*
 (Hieron.) Abbiatti
 Hierba terrestre. Nativa. 1300-2000 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
 TUC).

Amauropelta altitudinis (Ponce) Salino
 & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris altitudinis* Ponce
 Hierba terrestre. Endémica. 2000-2600
 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL,
 SJU).

Amauropelta amambayensis (Christ)
 Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris amambayensis* Christ,
Dryopteris diplazioides (Desv.) Proctor
 var. *amambayensis* (H. Christ)
 Rosenst., *Dryopteris diplazioides*
 (Desv.) Proctor var. *brevisora*
 Rosenst., *Dryopteris dutrae* C. Chr. ex
 Dutra, *Lastrea dutrae* (C. Chr. ex
 Dutra) Brade, *Thelypteris*
amambayensis (Christ) Ponce,
Thelypteris brevisora (Rosenst.)
 Ponce, *Thelypteris dutrae* (C. Chr. ex
 Dutra) Ponce
 Hierba. Nativa. 100-400 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA,
 PAI).

Amauropelta araucariensis (Ponce)
 Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris araucariensis* Ponce
 Hierba terrestre. Nativa. 900-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Amauropelta argentina (Hieron.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium argentinum* Hieron., *Aspidium galanderi* Hieron., *Aspidium lorentzii* Hieron., *Dryopteris argentina* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris argentina* (Hieron.) C. Chr. var. *lorentzii* (Hieron.) Osten & Herter, *Dryopteris galanderi* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris lorentzii* (Hieron.) C. Chr., *Lastrea argentina* (Hieron.) Copel., *Lastrea galanderi* (Hieron.) Capurro, *Nephrodium argentinum* (Hieron.) Hicken, *Nephrodium galanderi* (Hieron.) Hicken, *Nephrodium lorentzii* (Hieron.) Hicken, *Thelypteris argentina* (Hieron.) Abbiatti, *Thelypteris galanderi* (Hieron.) Abbiatti, *Thelypteris lorentzii* (Hieron.) Abbiatti

Hierba terrestre. Nativa. 0-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME). URY(DUR, RNO).

Amauropelta burkartii (Abbiatti) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris burkartii* Abbiatti

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).

Amauropelta cheilanthoides (Kunze) A. Löve & D. Löve

Sin.: *Aspidium cheilanthoides* Kunze, *Dryopteris cheilanthoides* (Kunze) C. Chr., *Lastrea cheilanthoides* (Kunze) T. Moore, *Thelypteris cheilanthoides* (Kunze) Proctor

Hierba. Nativa. 700-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Amauropelta concinna (Willd.) Pic. Serm.

Sin.: *Aspidium concinnum* (Willd.) Mett., *Dryopteris concinna* (Willd.) Kuntze,

Dryopteris concinna (Willd.) Kuntze var. *elongata* (E. Fourn.) C. Chr., *Phegopteris concinna* (Willd.) Fée, *Phegopteris elongata* E. Fourn., *Polypodium concinnum* Willd., *Thelypteris concinna* (Willd.) Ching, *Thelypteris concinna* (Willd.) Ching var. *elongata* (E. Fourn.) Reed

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).

Amauropelta decurtata (Link) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Asplenium decurtatum* Link, *Athyrium decurtatum* (Kunze) C. Presl, comb. illeg., *Athyrium decurtatum* (Link) Fée, *Thelypteris decurtata* (Link) de la Sota subsp. *decurtata*

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, COA). URY(CLA, ROC, TAC, TYT).

Amauropelta juergensii (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris juergensii* (Rosenst.) C. Chr., *Dryopteris juergensii* (Rosenst.) C. Chr. var. *hirsutula* Rosenst., *Lastrea juergensii* (Rosenst.) Copel., *Nephrodium juergensii* Rosenst., *Thelypteris juergensii* (Rosenst.) C.F. Reed, *Thelypteris platensis* Abbiatti

Hierba terrestre. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA).

Amauropelta jujuyensis (de la Sota) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris jujuyensis* de la Sota

Hierba. Endémica. 800-2300 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Amauropelta metteniana (Ching) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium palustre* Mett. ex Fée, *Dryopteris palustris* (Mett. ex Baker) Kuntze, *Dryopteris tenerrima* (Fée) Rosenst. var. *pubescens* Sehnem, *Lastrea mettenii* Copel., *Nephrodium palustre* Mett. ex Baker, *Thelypteris metteniana* Ching, *Thelypteris mettenii* (Copel.) Abbiatti

Hierba. Nativa. 100-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

Amauropelta mosenii (C. Chr.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris hassleri* H. Christ, *Dryopteris mosenii* C. Chr., *Dryopteris rojasii* H. Christ, *Lastrea mosenii* (C. Chr.) Copel., *Thelypteris mosenii* (C. Chr.) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(APA, AMA, CAU).

Amauropelta nubicola (de la Sota) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris nubicola* de la Sota

Hierba. Nativa. 1700-2500 m.

Países: ARG(JUU, TUC).

Amauropelta oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pic. Serm.

Sin.: *Aspidium oligocarpum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Humb. & Bonpl. ex Kunth var. *crassistipitatum* Hieron., *Dryopteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze, *Dryopteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze var. *crassistipitata* (Hieron.) Hicken, *Nephrodium oligocarpum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Desv. var. *crassistipitatum* (Hieron.) Hicken, *Polypodium oligocarpum* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Thelypteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching, *Thelypteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching var. *crassistipitata* (Hieron.) C.F. Reed

- Hierba. Endémica. 800-2500 m.
Países: ARG(JUU, TUC).
- Amauropelta opposita** (Vahl) Pic.Serm.
Sin.: *Dryopteris opposita* (Vahl) Urb.,
Lastrea opposita (Vahl) C. Presl,
Polypodium oppositum Vahl,
Thelypteris opposita (Vahl) Ching
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(AMA, CAA).
- Amauropelta pachyrhachis** (Kunze ex Mett.) O. Alvarez
Sin.: *Amauropelta vattuonei* (Hicken)
Salino & T.E. Almeida, *Aspidium helveolum* Fée, *Aspidium pachyrhachis* Kunze ex Mett.,
Aspidium platyrhachis Fée, *Dryopteris opposita* (Vahl) Urb. f. *major* Rosenst.,
Dryopteris pachyrhachis (Kunze ex Mett.) Kuntze, *Dryopteris riopardensis* Rosenst.,
Dryopteris vattuonei Hicken, *Lastrea pachyrhachis* (Kunze ex Mett.) T. Moore,
Lastrea riopardensis (Rosenst.) Copel., *Thelypteris catamarcensis* de la Sota,
Thelypteris pachyrhachis (Kunze ex Mett.) Ching, *Thelypteris vattuonei* (Hicken) Abbiatti
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN).
- Amauropelta patula** (Fée) Salino & T.E. Almeida
Sin.: *Aspidium glaziouvii* H. Christ, *Gymnogramma patula* Fée,
Thelypteris glaziouvii (H. Christ) C.F. Reed
Hierba terrestre. Nativa. 1000
Países: BRA(PAR, SCA).
- Amauropelta platensis** (Weath.) Ponce & Arana
Sin.: *Athyrium decurtatum* (Link) Fée var. *platense* Weath., *Thelypteris decurtata* (Link) de la Sota subsp. *platensis* (Weath.) de la Sota
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, ERI). URY(COL).
- Amauropelta pleiophylla** (Sehnem) Salino & T.E. Almeida
Sin.: *Dryopteris pleiophylla* Sehnem, *Thelypteris pleiophylla* (Sehnem) Ponce
Hierba. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Amauropelta podotricha** (Sehnem) Salino & T.E. Almeida
Sin.: *Dryopteris podotricha* Sehnem, *Thelypteris podotricha* (Sehnem) Ponce
Hierba. Endémica. 600
Países: BRA(RGS).
- Amauropelta ptarmica** (Kunze ex Mett.) Pic.Serm.
Sin.: *Aspidium ptarmicum* Kunze ex Mett., *Dryopteris ptarmica* (Kunze ex Mett.) Kuntze,
Lastrea ptarmica (Kunze ex Mett.) T. Moore, *Nephrodium ptarmicum* (Kunze ex Mett.) Baker,
Thelypteris ptarmica (Kunze ex Mett.) C.F. Reed
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Amauropelta raddii** (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida
Sin.: *Dryopteris raddii* Rosenst., *Dryopteris retusa* (Sw.) C. Chr. f. *denticulata* Rosenst.,
Dryopteris retusa (Sw.) C. Chr. var. *austrobrasiliensis* Rosenst., *Polypodium pubescens* Raddi,
Thelypteris raddii (Rosenst.) Ponce
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Amauropelta recumbens** (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida
Sin.: *Dryopteris recumbens* (Rosenst.) C.F. Reed var. *violacea* Rosenst.,
Dryopteris recumbens Rosenst., *Lastrea recumbens* (Rosenst.) Copel.,
Thelypteris recumbens (Rosenst.) C.F. Reed
Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).
- Amauropelta regnelliana** (C. Chr.) Salino & T.E. Almeida
Sin.: *Dryopteris regnelliana* C. Chr., *Lastrea regnelliana* (C. Chr.) Brade,
Thelypteris regnelliana (C. Chr.) Ponce
Hierba. Nativa. 600-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Amauropelta retusa** (Sw.) Pic.Serm.
Sin.: *Dryopteris retusa* (Sw.) C. Chr., *Lastrea retusa* (Sw.) Copel.,
Polypodium retusum Sw., *Thelypteris retusa* (Sw.) C.F. Reed
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Amauropelta rivularioides** (Fée) O. Alvarez
Sin.: *Aspidium arechavaletae* Hieron., *Aspidium pseudomontanum* Hieron.,
Aspidium rivularioides Fée, *Dryopteris arechavaletae* (Hieron.) C. Chr.,
Dryopteris pseudomontana (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris pseudothelypteris* (Rosenst.) C. Chr.,
Dryopteris rivularioides (Fée) C. Chr. ex Rosenst., *Dryopteris rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *arechavaletae* (Hieron.) C. Chr.,
Dryopteris rivularioides (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *pseudothelypteris* (Rosenst.) Osten & Herter,

Dryopteris rivularioides (Fée) C. Chr.
var. *crenata* (Rosenst.) Rosenst.,
Dryopteris sinuata Sehnem,
Nephrodium pseudomontanum
(Hieron.) Rosenst., *Nephrodium*
pseudothelypteris Rosenst.,
Nephrodium pseudothelypteris
Rosenst. var. *crenatum* Rosenst.,
Thelypteris rivularioides (Fée) Abbiatti,
Thelypteris rivularioides (Fée) Abbiatti
var. *arechavaletae* (Hieron.) Abbiatti,
Thelypteris rivularioides (Fée) Abbiatti
var. *pseudomontana* (Hieron.) Abbiatti
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,
CAA, CAN, COA, MIE, PAI).
URY(RIV).

Amauropelta sanctae-catharinae
(Rosenst.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris sanctae-catharinae*
Rosenst., *Dryopteris scariosa*
Rosenst., *Lastrea sanctae-catharinae*
(Rosenst.) Brade, *Lastrea scariosa*
(Rosenst.) Copel., *Thelypteris*
sanctae-catharinae (Rosenst.) Ponce,
Thelypteris scariosa (Rosenst.) C.F.
Reed
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Amauropelta saxicola (Sw.) Salino &
T.E. Almeida

Sin.: *Ceterach aspidioides* Raddi,
Gymnogramma asplenioides Sw.,
Polypodium saxicola Sw., *Thelypteris*
ptarmica (Kunze ex Mett.) C.F. Reed
var. *asplenioides*
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Amauropelta stierii (Rosenst.) Salino &
T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris stierii* (Rosenst.) C. Chr.,
Gymnogramma stierii Rosenst.,
Lastrea stierii (Rosenst.) Copel.,
Thelypteris stierii (Rosenst.) C.F. Reed
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, SAL,
TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CON).
URY(PAY, RNO, RIV).

Amauropelta tenerrima (Fée) Salino &
T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium elatior* Fée, *Aspidium*
tenerrimum Fée, *Dryopteris tenerrima*
(Fée) Rosenst., *Lastrea tenerrima*
(Fée) Copel., *Thelypteris tenerrima*
(Fée) C.F. Reed
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Amauropelta yabotiensis Ponce & A.
Yañez

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(MIS).

Christella H. Lév.

Christella conspersa (Schrader.) A. Löve &
D. Löve

Sin.: *Aspidium conspersum* (Schrader)
Kunze, *Cyclosorus hickenii* Abbiatti,
Cyclosorus urens (Rosenst.) Ching,
Dryopteris bangii C. Chr., *Dryopteris*
dentata (Forssk.) C. Chr. var. *urens*
(Rosenst.) Osten & Herter,
Dryopteris patens (Sw.) Kuntze var.
decrescens Rosenst., *Dryopteris urens*
Rosenst., *Lastrea urens* (Rosenst.)
Copel., *Nephrodium conspersum*
Schrader., *Thelypteris bangii* (C. Chr.)
R.M. Tryon, *Thelypteris conspersa*
(Schrader.) A.R. Sm., *Thelypteris*
hickenii (Abbiatti) C.F. Reed,
Thelypteris urens (Rosenst.) C.F.
Reed
Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS,
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN,
COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
URY(MAL, RIV, ROC).

Christella dentata (Forssk.) Brownsey &
Jermy

Sin.: *Aspidium molle* Sw., *Aspidium*
violascens Link, *Cyclosorus dentatus*
(Forssk.) Ching, *Cyclosorus dentatus*
(Forssk.) Ching var. *violascens* (Link)
Abbiatti, *Dryopteris dentata* (Forssk.)
C. Chr., *Dryopteris mollis* (Sw.)
Hieron., *Hemestheum molle* (Sw.)
Gand., *Nephrodium dentatum*
(Forssk.) Kümmerle, *Nephrodium*
molle (Sw.) R. Br., *Nephrodium*
violascens (Link) Fée, *Polypodium*
dentatum Forssk., *Polypodium molle*
Jacq., hom. illeg., *Polystichum molle*
(Sw.) Gaudich., *Thelypteris dentata*
(Forssk.) E.P. St. John, *Thelypteris*
dentata (Forssk.) E.P. St. John var.
violascens (Link) C.F. Reed
Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, MIS, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APA,
AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA,
PAI). URY(PAY, RIV, ROC).

Christella hispidula (Decne.) Holttum

Sin.: *Aspidium hispidulum* Decne.,
Cyclosorus hispidulus (Decne.) Ching.,
Cyclosorus quadrangularis (Fée)
Tardieu, *Dryopteris hispidula* (Decne.)
Kuntze, *Dryopteris mollis* (Sw.) Hieron.
var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hassl.,
Dryopteris parasitica (L.) Kuntze var.
glabrindusiata (Hieron.) Hicken,
Dryopteris parasitica (L.) Kuntze var.
glanduligera Rosenst., *Dryopteris*
quadrangularis (Fée) Alston,
Nephrodium hispidulum (Decne.)
Baker, *Nephrodium parasiticum* (L.)

Desv. var. *glabrindusiatum* (Hieron.)
Hicken, *Nephrodium quadrangulare*
Fée, *Thelypteris hispidula* (Decne.)
C.F. Reed, *Thelypteris quadrangularis*
(Fée) Schelpe, *Thelypteris*
quadrangularis (Fée) Schelpe var.
repens A.R. Sm.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CAU, CAA, CAN, CEN, COA, ITA,
PAI). URY(PAY, RNO).

Cyclosorus Link

Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Itô

Sin.: *Aspidium gongylodes* Schkuhr,
Aspidium pohlianum C. Presl,
Aspidium unitum Mett., *Cyclosorus*
gongylodes (Schkuhr) Link,
Cyclosorus tottus (Thunb.) Pic. Serm.,
Dryopteris gongylodes (Schkuhr)
Kuntze, *Dryopteris interrupta* (Willd.)
Ching, *Goniopteris macrocladia* Fée,
Nephrodium gongylodes (Schkuhr)
Schott, *Polypodium tottum* Thunb.,
Pteris interrupta Willd., *Thelypteris*
gongylodes (Schkuhr) Small,
Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats.,
Thelypteris totta (Thunb.) Schelpe

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APA,
CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI,
PHA, SPE). URY(RNO).

Goniopteris C. Presl

Goniopteris biformata (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris biformata* Rosenst.,
Thelypteris biformata (Rosenst.) R.M.
Tryon
Hierba terrestre. Nativa.
Países: ARG(SAL).

Goniopteris burkartii C. Chr. ex Abbiatti

Sin.: *Thelypteris abbiattii* C.F. Reed
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Goniopteris iguapensis (C. Chr.) Brade

Sin.: *Dryopteris iguapensis* C. Chr.,
Thelypteris iguapensis (C. Chr.) Salino
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Goniopteris paranaensis (Salino) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris paranaensis* Salino
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Goniopteris riograndensis (Lindm.) Ching

Sin.: *Dryopteris riograndensis* (Lindm.) C.
Chr., *Polypodium riograndense*
Lindm., *Thelypteris riograndensis*
(Lindm.) C.F. Reed
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CAA, COA, GUA, PAI). URY(CLA,
COL, MAL, TYT).

Goniopteris scabra (C. Presl) Brade

Sin.: *Aspidium caesianum* Christ,
Dryopteris pseudotetragona Urb. f.
major Rosenst., *Dryopteris*
pseudotetragona Urb. var. *foecunda*
Rosenst., *Dryopteris pseudotetragona*
Urb. var. *gemmulifera* Hieron. ex
Rosenst., *Dryopteris scabra* (C. Presl)
C. Chr., *Dryopteris scabra* (C. Presl)
C. Chr. var. *caesariana* (H. Christ) C.

Chr., *Dryopteris scabra* (C. Presl) C.
Chr. var. *incompleta* (Lindm.) C. Chr.,
Lastrea scabra (C. Presl) C. Presl,
Nephrodium etchichuryi Hicken,
Polypodium scabrum C. Presl,
Polypodium tetragonum Sw. var.
incompletum Lindm., *Thelypteris*
scabra (C. Presl) Lellinger
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
AMA, CAA, CAN, GUA, PAI).

Goniopteris tetragona (Sw.) C. Presl

Sin.: *Dryopteris tetragona* (Sw.) Urb.,
comb. illeg., *Nephrodium tetragonum*
(Sw.) Keyserl., comb. illeg.,
Polypodium tetragonum Sw.,
Thelypteris tetragona (Sw.) Small
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL).

Goniopteris tristis (Kunze) Brade

Sin.: *Polypodium triste* Kunze, *Thelypteris*
tristis (Kunze) R.M. Tryon
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(SAL).

Goniopteris vivipara (Raddi) Brack.

Sin.: *Polypodium viviparum* Raddi,
Thelypteris vivipara (Raddi) C.F. Reed
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Macrothelypteris (H. Itô) Ching

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching

Sin.: *Lastrea torresiana* (Gaudich.) T.
Moore, *Polystichum torresianum*
Gaudich., *Thelypteris torresiana*
(Gaudich.) Alston
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS,
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, CAN, COA, GUA, PAI).
URY(ART, RIV).

Meniscium Schreb.

Meniscium angustifolium Willd.

Sin.: *Dryopteris angustifolia* (Willd.) Urb.,
Thelypteris angustifolia (Willd.) Proctor
Hierba. Nativa. 100-400 m.
Países: PRY(AMA).

Meniscium longifolium Desv.

Sin.: *Dryopteris reticulata* (L.) Urb. var.
longifolia (Desv.) Rosenst., *Thelypteris*
longifolia (Desv.) R.M. Tryon
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Meniscium maxonianum (A.R. Sm.) R.S. Fern. & Salino

Sin.: *Dryopteris desvauxii* Mett. f.
glandulosa Maxon & C.V. Morton,
Thelypteris longifolia (Desv.) R.M.
Tryon f. *glandulosa* (Maxon & C.V.
Morton) C.V. Morton, *Thelypteris*
maxoniana A.R. Sm.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR).

Meniscium salzmännii Fée

Sin.: *Thelypteris salzmännii* (Fée) C.V.
Morton
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(CAU, CAA, COA).

Meniscium serratum Cav.

Sin.: *Dryopteris reticulata* (L.) Urb. var.
serrata (Cav.) Farw., *Dryopteris*
serrata (Cav.) C. Chr., *Meniscium*
dentatum C. Presl, *Meniscium palustre*
Raddi, *Nephrodium serratum* (Cav.)
Keyserl., hom. illeg., *Phegopteris*
serrata (Cav.) Mett., *Thelypteris*
serrata (Cav.) Alston
Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SAL). BRA(RGS, SCA).
PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN,
CON, COA, PAI, SPE).

Pelazoneuron (Holtum) A.R. Sm. & S.E. Fawc.

Pelazoneuron abruptum (C. Presl) A.R. Sm. & S.E. Fawc.

Sin.: *Aspidium abruptum* Kunze, hom.
illeg., *Dryopteris oligophylla* Maxon
var. *kunzeana* (C. Chr.) C. Chr.,
Lastrea abrupta C. Presl, *Nephrodium*
kunzeanum Hook., *Thelypteris grandis*
A.R. Sm. var. *kunzeana* (C. Chr.) A.R.
Sm., *Thelypteris invisa* (Sw.) Proctor
var. *kunzeana* (Hook.) C.V. Morton
Hierba. Nativa. 400-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Pelazoneuron berroi (C. Chr.) A.R. Sm. & S.E. Fawc.

Sin.: *Cyclosorus berroi* (C. Chr.) Abbiatti,
Dryopteris berroi C. Chr., *Thelypteris*
berroi (C. Chr.) C.F. Reed
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(SCA). PRY(AMA, CON, PAI).
URY(RIV).

Pelazoneuron patens (Sw.) A.R. Sm. & S.E. Fawc.

Sin.: *Aspidium macrourum* Kaulf.,
Aspidium patens (Sw.) Sw., *Aspidium*
stipulare Willd., *Christella patens* (Sw.)
Holtum, *Dryopteris patens* (Sw.)
Kuntze, *Dryopteris patens* (Sw.)
Kuntze var. *scabriuscula* (C. Presl) C.
Chr., *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze
var. *stipularis* (Willd.) Bonap.,
Dryopteris stipularis (Willd.) Maxon ex
Underw., *Lastrea patens* (Sw.) C.
Presl, *Lastrea scabriuscula* C. Presl,
Nephrodium macrourum (Kaulf.)

Schott, *Nephrodium patens* (Sw.)
Desv., *Nephrodium patens* (Sw.)
Desv. var. *stipulare* (Willd.) Baker,
Nephrodium stipulare (Willd.) Desv.,
Polypodium patens Sw., *Polystichum*
patens (Sw.) Bernh., *Thelypteris*
patens (Sw.) Small var. *patens*,
Thelypteris patens (Sw.) Small var.
scabriuscula (C. Presl) A.R. Sm.
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(SPE).

Pelazoneuron schizotis (Hook.) A.R. Sm. & S.E. Fawc.

Sin.: *Nephrodium schizotis* Hook.,
Thelypteris patens (Sw.) Small var.
smithiana Ponce, *Thelypteris schizotis*
(Hook.) M. Kessler & A. R. Sm.
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ,
MIS, SAL, TUC). PRY(GUA, PAI).

Steiropteris (C. Chr.) Pic.Serm.

Steiropteris decussata (L.) A.R. Sm. var. **brasiliensis** (C. Chr.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris brasiliensis* (C. Chr.) C.V.
Morton, *Dryopteris decussata* (L.) Urb.
var. *brasiliensis* C. Chr., *Thelypteris*
brasiliensis (C. Chr.) C.V. Morton,
Thelypteris decussata (L.) Proctor var.
brasiliensis (C. Chr.) A.R. Sm.
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Steiropteris gardneriana (Baker) Pic.Serm.

Sin.: *Dryopteris gardneriana* (Baker)
Kuntze, *Dryopteris supralineata*
Rosenst., *Nephrodium gardnerianum*
Baker, *Thelypteris gardneriana* (Baker)
C.F. Reed

Hierba. Nativa. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Steiopteris hatschbachii (A.R. Sm.)
Salino & T.E. Almeida
Sin.: *Thelypteris hatschbachii* A.R. Sm.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Steiopteris leprieurii (Hook.) Pic. Serm.
Sin.: *Nephrodium leprieurii* Hook.,
Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M.
Tryon
Hierba. Nativa. 100-600 m.
Países: PRY(CAN).

Thelypteris Schmidel, nom. cons.

Thelypteris browniana Ponce
Hierba terrestre. Nativa. 900-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Thelypteris confluens (Thunb.) C.V.
Morton
Sin.: *Dryopteris cabreræ* Weath., *Lastrea cabreræ* (Weath.) Capurro, *Pteris confluens* Thunb., *Thelypteris cabreræ* (Weath.) Abbiatti
Hierba terrestre. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, CHA).

Thelypteris lugubris (Mett.) R.M. Tryon
& A.F. Tryon
Sin.: *Aspidium lugubre* Mett., *Dryopteris bifrons* Christ, *Dryopteris scabra* (C. Presl) C. Chr. var. *bifrons* (Christ) Hassl.
Hierba. Nativa. 100-900 m.
Países: PRY(AMA, CAN, PAI, SPE).

Thelypteris patens (Sw.) Small var.
dissimilis (Schrad.) A.R. Sm.
Sin.: *Aspidium nephrodioides* Fée, hom. illeg., *Nephrodium dissimile* Schrad.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU).

Thelypteris rioverdensis (C. Chr.) Ponce
Sin.: *Dryopteris rioverdensis* C. Chr.,
Lastrea rioverdensis (C. Chr.) Brade
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR).

THYRSOPTERIDACEAE

Thyrsopteris Kunze

Thyrsopteris elegans Kunze
Sin.: *Dicksonia elegans* Mett.,
Panicularia berteroi Colla
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: CHL(JFE).

VITTARIACEAE

Haplopteris C. Presl

Haplopteris ensiformis (Sw.) E.H. Crane
Sin.: *Vittaria ensiformis* Sw.
Hierba. Nativa.
Países: CHL(IPA).

WOODSIACEAE

Physematium Kaulf.

Physematium hieronymi Ponce & Arana
Hierba. Nativa. 1200-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Physematium jujuiense (Copel.) Ponce & Arana

Sin.: *Woodsia jujuiense* Copel., *Woodsia montevidensis* (Spreng.) Hieron. var. *fuscipes* Hieron.
Hierba saxícola. Nativa. 2000-3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Physematium montevidense (Spreng.) Shmakov

Sin.: *Dicksonia montevidensis* Spreng., ,
Physematium cumingianum Kunze,
Physematium incisum (Gillies ex Hook. & Grev.) C. Presl, *Polypodium flabellatum* Klotzsch, *Woodsia crenata* (Kunze) Hieron., *Woodsia crenata* (Kunze) Hieron. var. *pallidipes* Hieron., *Woodsia cumingiana* (Kunze) Hook., *Woodsia incisa* Gillies ex Hook. & Grev., *Woodsia montevidensis* (Spreng.) Hieron.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).
BRA(RGS, SCA). URY(LAV, MAL, MIN, ROC, TYT).

Physematium pallidum (Copel.) Ponce & Arana

Sin.: *Woodsia pallida* Copel.
Hierba saxícola. Nativa. 3600-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

GYMNOSPERMAE

ARAUCARIACEAE**Araucaria** Juss.**Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze

Sin.: *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze f. *catharinensis* Mattos, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *alba* Reitz, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *caiova* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *caiuva* Mattos, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *indehiscens* Mattos, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *monica* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *nigra* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *sancti-josephi* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *semi-alba* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *striata* Reitz, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *vinacea* Mattos, *Araucaria bibbiana* Gordon, *Araucaria brasiliana* A. Rich., *Araucaria brasiliana* A. Rich. var. *elegans* (Hort ex Carrière) L.H. Bailey & Raffill, *Araucaria brasiliana* A. Rich. var. *ridolfiana* (Pi. Savi) Gordon, *Araucaria brasiliensis* A. Rich. var. *gracilis* Hort ex Carrière, *Araucaria brasiliensis* Lamb. ex Loudon, hom. illeg., *Araucaria brasiliensis* Loudon var. *saviana* (Parl.) DC., *Araucaria dioica* (Vell.) Stellfeld, *Araucaria elegans* Hort ex Carrière, *Araucaria gracilis* Hort ex Carrière, *Araucaria lindleyana* Gordon, *Araucaria ridolfiana* Pi. Savi, *Araucaria saviana* Parl., *Columbea angustifolia* Bertol., *Columbea brasiliensis* (A. Rich.) Carrière, *Columbea brasiliensis* (A.

Rich.) Carrière var. *ridolfiana* (Pi. Savi) Carrière, *Pinus dioica* Vell.
Árbol. Nativa. 400-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Araucaria araucana (Molina) K. Koch

Sin.: *Abies araucana* (Molina) Poir., *Araucaria chilensis* (Lam.) Mirb., nom. illeg., *Araucaria dombeyi* A. Rich., hom. illeg., *Araucaria imbricata* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Columbea imbricata* (Pav.) Carrière, *Columbea quadrifaria* Salisb., nom. superfl., *Dombeya chilensis* Lam., nom. illeg., *Pinus araucana* Molina
Árbol. Endémica. 600-1700 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, JFE).

CUPRESSACEAE**Austrocedrus** Florin & Boutelje

Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic.Serm. & Bizzarri
Sin.: *Austrocedrus chilensis* (D. Don) Florin & Boutelje, comb. illeg., *Libocedrus chilensis* (D. Don) Endl., *Thuja andina* Poepp. & Endl., *Thuja chilensis* D. Don, *Thuja chilensis* Hook.
Árbol. Endémica. 200-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Cupressus L.**Cupressus arizonica** Greene

Sin.: *Cupressus benthamii* Endl. var. *arizonica* (Greene) Mast.,

Hesperocyparis arizonica (Greene) Bartel
Árbol. Introducida.
Países: ARG(COR).

Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon

Sin.: *Callitropsis macrocarpa* (Hartw. ex Gordon) D.P. Little, *Hesperocyparis macrocarpa* (Hartw. ex Gordon) Bartel
Árbol. Introducida. 800-1300 m.
Países: ARG(COR).

Cupressus sempervirens L.

Árbol. Introducida.
Países: ARG(COR).

Fitzroya Hook. f. ex Lindl.

Fitzroya cupressoides (Molina) I.M. Johnst.
Sin.: *Fitzroya patagonica* Hook. f. ex Lindl., *Libocedrus cupressoides* (Molina) Kuntze, *Pinus cupressoides* Molina
Árbol. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LSR, LLA).

Juniperus L.**Juniperus communis** L.

Árbusto. Introducida.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Pilgerodendron Florin**Pilgerodendron uviferum** (D. Don) Florin

Sin.: *Juniperus uvifera* D. Don, *Libocedrus tetragona* (Hook.) Endl., *Libocedrus uvifera* (D. Don) Pilg., *Thuja tetragona* Hook.

Árbol. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

EPHEDRACEAE

Ephedra L.

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboldtii* Stapf, *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboldtii* Stapf, nom. illeg., *Ephedra breana* Phil.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-4300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Ephedra boelckei F.A. Roig

Arbusto o arbolito. Endémica. 500-600 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Ephedra chilensis C. Presl

Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *andina* (Poepp. ex C.A.Mey.) Stapf, *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *rupestris* (Benth.) Ball, *Ephedra andina* Poepp. ex C.A.Mey., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A.Mey. f. *abbreviata* Stapf ex Skottsb., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A.Mey. var. *humilis* (Wedd.) Parl., *Ephedra araucana* Phil., *Ephedra bracteata* Miers, *Ephedra chilensis* Miers, hom. illeg., *Ephedra dumosa* Miers, *Ephedra frustillata* Miers, *Ephedra humilis* Wedd., *Ephedra monticola* Miers, *Ephedra nana* Dusén, *Ephedra patagonica* Phil., *Ephedra rupestris* Benth.

Arbusto. Nativa. 0-4200 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Ephedra gracilis Phil. ex Stapf

Sin.: *Ephedra gracilis* Phil.

Arbolito. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Ephedra multiflora Phil. ex Stapf

Sin.: *Ephedra multiflora* Phil.

Arbolito. Endémica. 2300-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT).

Ephedra ochreatea Miers

Sin.: *Ephedra ochreatea* Miers var. *striata* Gillies ex Miers

Arbolito. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU). CHL(AIS).

Ephedra triandra Tul. emend. J.H. Hunz.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Ephedra trifurcata Zoellner

Subarbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: CHL(VAL).

Ephedra tweediana Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz.

Sin.: *Ephedra scandens* Miers, *Ephedra triandra* Tul.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, DFE, ERI, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(FLO, FLA, MAL, RNO, ROC, SJO).

PINACEAE

Pinus L.

Pinus caribaea Morelet

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pinus clausa (Chapm. ex Engelm.) Sarg.

Sin.: *Pinus inops* Aiton var. *clausa*

Chapm. ex Engelm.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Pinus contorta Douglas ex Loudon

Árbol. Introducida. 500-600 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, AIS).

Pinus elliottii Engelm.

Árbol. Introducida. 900-1500 m.

Países: ARG(COR). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pinus glabra Walter

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pinus halepensis Mill.

Árbol. Introducida. 800-900 m.

Países: ARG(COR).

Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Pinus patula Schltdl. & Cham.

Árbol. Introducida. 1200-1400 m.

Países: ARG(COR).

Pinus pinaster Aiton

Árbol. Introducida.

Países: CHL(BIO).

Pinus ponderosa P. Lawson & C. Lawson
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Pinus pseudostrobus Lindl.
Árbol. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Pinus radiata D. Don
Árbol. Introducida.
Países: ARG(COR, NEU, RNE).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, JFE).

Pinus taeda L.
Árbol. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pseudotsuga Carrière

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

PODOCARPACEAE

Lepidothamnus Phil.

Lepidothamnus fonkii Phil.
Sin.: *Dacrydium fonkii* (Phil.) Ball, comb. superfl., *Dacrydium fonkii* (Phil.) Benth. & Hook.
Arbolito. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

Podocarpus L'Hér. ex Pers., nom. cons.

Podocarpus brasiliensis Laubenf.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl.
Sin.: *Podocarpus angustifolius* Niederl., nom. nud.
Árbol. Nativa. 500-1700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Podocarpus nubigenus Lindl.
Árbol. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Podocarpus parlatorei Pilg.
Sin.: *Podocarpus angustifolius* Parl., hom. illeg.
Árbol. Nativa. 1200-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Podocarpus salignus D. Don
Sin.: *Podocarpus chilinus* Rich.
Árbol. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Podocarpus sellowii Klotzsch ex Endl.
var. **angustifolius** Pilg.
Árbol. Nativa. 800

Países: BRA(PAR).

Podocarpus sellowii Klotzsch ex Endl.
var. **sellowii**
Árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Prumnopitys Phil.

Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Sin.: *Nageia andina* (Poepp. ex Endl.) Kuntze, *Podocarpus andinus* Poepp. ex Endl., *Podocarpus spicatus* Poepp., *Podocarpus valdivianus* J. Nelson, *Prumnopitys elegans* Phil., *Prumnopitys spicata* (Poepp. ex Endl.) Molloy & M. Muñoz, nom. illeg., *Stachycarpus andinus* (Poepp.) Tiegh.
Árbol. Endémica. 500-1300 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

Saxegothaea Lindl., nom. cons.

Saxegothaea conspicua Lindl.
Árbol. Endémica. 100-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

ANGIOSPERMAE

ACANTHACEAE

Aphelandra R. Br.

Aphelandra chamissoniana Nees

Sin.: *Aphelandra chamissoniana* Nees
var. *paranaensis* Rizzini
Hierba o arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aphelandra hieronymi Griseb.

Sin.: *Odontophyllum hieronymi* (Griseb.)
Sreem.
Arbusto. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Aphelandra liboniana Linden ex Hook.

Sin.: *Aphelandra mirabilis* Rizzini
Arbusto. Endémica. 100-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aphelandra lilacina C. Ezcurra

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice

Sin.: *Geissomeria cincinnata* Nees,
Geissomeria dichroa Rizzini,
Geissomeria longiflora Lindl.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Aphelandra ornata (Nees) T. Anderson

Sin.: *Aphelandra venosa* Wassh. & L.B.
Sm., *Lagochilium ornatum* (Nees)
Nees, *Stenandrium venatum* Nees
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aphelandra schottiana (Nees) Profice

Sin.: *Geissomeria schottiana* Nees
Arbusto. Nativa. 100-700 m.
Países: BRA(PAR).

Avicennia L.

Avicennia germinans (L.) L.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Avicennia schaueriana Stapf & Leechm.

ex Moldenke
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Notas: Según Moldenke (1939: 336) la
especie llega hasta Uruguay

Barleria L.

Barleria repens Nees

Arbusto. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Clistax Mart.

Clistax brasiliensis Mart.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dicliptera Juss.

Dicliptera cabreræ C. Ezcurra

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Dicliptera cochabambensis Lindau

Sin.: *Diapedium multicaule* Rusby
Hierba. Nativa. 1800-2400 m.
Países: ARG(SAL).

Dicliptera jujuyensis Lindau

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Dicliptera paposana Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ANT).

Dicliptera scutellata Griseb.

Sin.: *Diapedium niederleinianum* (Lindau)
Kuntze, *Diapedium scutellatum*
(Griseb.) Kuntze, *Dicliptera*
niederleiniana Lindau
Subarbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
SAL, SDE, TUC).

Dicliptera squarrosa Nees

Sin.: *Diapedium tweedianum* (Nees)
Kuntze, *Dicliptera deltica* Bridar.,
Dicliptera imminuta Rizzini, *Dicliptera*
lutea Bridar., *Dicliptera pohliana* Nees,
Dicliptera sericea Nees, *Dicliptera*
suberecta (André) Bremek., *Dicliptera*
tweediana Nees, *Dicliptera tweediana*
Nees var. *flaviflora* Stuck., *Dicliptera*
tweediana Ness var. *microphylla* Ness,
Jacobinia suberecta André
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,
SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU,
CAA, CEN, CHO, COA, GUA, ITA,
MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(COL).

Dyschoriste Nees

Dyschoriste axillaris Wassh. & J.R.I.

Wood
Hierba. Nativa. 2000-2600 m.
Países: ARG(SAL).

Dyschoriste humilis (Nees) Lindau

Sin.: *Dyschoriste humilis* Lindau f.
variegata Stuck. ex Seckt, *Ruellia*
geminiflora Kunth var. *humilis* Griseb.,
nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(PAY).

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV).

Dyschoriste hygrophiloides (Nees) Kuntze
Sin.: *Calophanes hygrophiloides* Nees
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). URY(PAY, SAO).

Dyschoriste lavandulacea (Nees) Kuntze
Sin.: *Calophanes lavandulaceus* Nees, *Dyschoriste niederleinii* Lindau
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN).

Dyschoriste maranhonis (Nees) Kuntze
Sin.: *Calophanes maranhonis* Nees
Hierba. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Dyschoriste paraguariensis Kobuski
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).

Dyschoriste sagittata Kobuski
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Dyschoriste smithii Leonard
Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Dyschoriste trichanthera Kobuski
Sin.: *Dyschoriste ceciliae* Wassh. & J.R.I. Wood
Subarbusto. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, SPE).

Dyschoriste tweediana (Nees) Kuntze
Sin.: *Calophanes tweedianus* Nees

Dyschoriste venturii Leonard
Subarbusto. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Elytraria Michx.

Elytraria imbricata (Vahl) Pers.
Sin.: *Elytraria apargiifolia* Nees, *Elytraria fasciculata* Kunth, *Elytraria frondosa* Kunth, *Elytraria ramosa* Kunth, *Elytraria scorpioides* Roem. & Schult., *Elytraria squamosa* (Jacq.) Lindau, *Elytraria tridentata* Vahl, *Justicia imbricata* Vahl, *Verbena squamosa* Jacq.
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Hygrophila R. Br.

Hygrophila costata Nees & T. Nees
Sin.: *Hygrophila atricheta* Bridar., *Hygrophila brasiliensis* (Spreng.) Lindau, *Hygrophila conferta* Nees, *Hygrophila conferta* Nees var. *rubricaulis* Nees, *Hygrophila guianensis* Nees, *Hygrophila helodes* Nees, *Hygrophila latifolia* Nees, *Hygrophila longifolia* Nees, *Hygrophila pubescens* Nees, *Hygrophila verticillata* (Spreng.) Cabrera & G. Dawson., comb. superfl., *Hygrophila verticillata* (Spreng.) Herter, *Ruellia brasiliensis* Spreng., *Ruellia verticillata* Spreng.
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,

Hypoestes Sol. ex R. Br.

Hypoestes phyllostachya Baker
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Justicia L., nom. cons.

Justicia aequilabris (Nees) Lindau
Sin.: *Jacobinia aequilabris* (Nees) Lindau, *Jacobinia velutina* Lindau, *Justicia velutina* (Lindau) Lindau ex Hassl., *Orthotactus aequilabris* Nees
Subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Justicia axillaris (Nees) Lindau
Sin.: *Justicia campestris* (Nees) Lindau, hom. illeg., *Justicia reitzii* Leonard, *Rhytiglossa axillaris* Nees, *Rhytiglossa campestris* Nees
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, PAI). URY(CLA).

Justicia baenitzii (H. Winkl.) C. Ezcurra
Sin.: *Beloperone baenitzii* H. Winkl., *Beloperone viridissima* Rusby
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Justicia brandegeana Wassh. & L.B. Sm.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Justicia brasiliana Roth
Sin.: *Beloperone amherstiae* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var.

ciliaris Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *debilis* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *graciliflora* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *lanceolata* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *pubescens* Hassl., *Beloperone brasiliensis* (Roth) Bremek., *Dianthera nodosa* (Hook.) Benth. & Hook., *Jacobinia affinis* (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm., *Jacobinia festiva* Rizzini, *Justicia nodosa* Hook., *Sericographis affinis* Rizzini, *Sericographis squarrosa* Nees
Hierba o arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV, SAO).

Justicia carnea Lindl.

Sin.: *Amphiscopia ciliata* (Nees) Nees, *Cyrtanthera magnifica* Nees, *Cyrtanthera magnifica* Nees var. *minor* Nees, *Cyrtanthera pohliana* Nees, *Cyrtanthera pohliana* Nees var. *obtusior* Nees, *Cyrtanthera pohliana* Nees var. *velutina* Nees, *Ethesia carnea* (Lindl.) Raf., *Jacobinia carnea* (Lindl.) G. Nicholson, *Jacobinia magnifica* (Nees) Lindau, *Jacobinia magnifica* (Nees) Voss, *Jacobinia obtusior* (Nees) L.H. Bailey, *Jacobinia pohliana* (Nees) Lindau, *Jacobinia pohliana* (Nees) Voss, *Jacobinia velutina* (Nees) Voss, *Orthotactus ciliatus* Nees
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Justicia chacoensis Wassh. & C. Ezcurra

Sin.: *Beloperone riparia* S. Moore, hom. illeg., *Justicia riparia* S. Moore

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Justicia comata (L.) Lam.

Sin.: *Dianthera comata* L., *Ecbolium comatum* (L.) Kuntze, *Justicia humifusa* Sw., *Justicia parviflora* (Nees) Lindau, *Leptostachya comata* (L.) Nees, *Leptostachya martiana* Nees, *Leptostachya martiana* Nees var. *hispida* Nees, *Leptostachya martiana* Nees var. *macrophylla* Nees, *Leptostachya parviflora* Nees, *Psacadocalymma comatum* (L.) Bremek., *Rhytiglossa acuminata* Nees, *Spigelia beccabungoides* Kraenzl., *Stethoma comata* (L.) Britton, *Thalestris graminiformis* Rizzini
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RNO).

Justicia cordifolia (Rizzini) Funez & Braz

Sin.: *Sericographis cordifolia* Rizzini
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Justicia corumbensis (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra

Sin.: *Beloperone corumbensis* Lindau
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, PHA).

Justicia cuspidulata (Nees) Wassh.

Sin.: *Justicia praetermissa* Wassh. & J.R.I. Wood, *Rhytiglossa cuspidulata* Nees
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, COA).

Justicia dumetorum Morong

Sin.: *Beloperone albomarginata* Lindau, *Beloperone kerri* N.E. Br., *Justicia albomarginata* (Lindau) V.A.W. Graham, *Justicia squalida* Wassh. & J.R.I. Wood
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PHA).

Justicia dusenii (Lindau) Wassh. & L.B. Sm.

Sin.: *Aphelandra dusenii* Lindau
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Justicia floribunda (C. Koch) Wassh.

Sin.: *Jacobinia pauciflora* (Nees) Lindau, *Justicia pauciflora* (Nees) Griseb., comb. illeg., *Justicia rizzinii* Wassh., *Libonia floribunda* C. Koch, *Sericographis pauciflora* Nees, *Sericographis pauciflora* Nees var. *speciosior* Nees
Arbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Justicia gilliesii (Nees) Benth.

Sin.: *Adhatoda gilliesii* Nees, *Ecbolium gilliesii* (Nees) Kuntze, *Justicia echegarayi* Hieron., *Poikilacanthus gilliesii* (Nees) Lindau
Subarbusto. Endémica. 300-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS).

Justicia glaziovii Lindau

Sin.: *Justicia velascana* Lindau, *Lophothecium paniculatum* Rizzini, *Rhytiglossa paniculata* Nees
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Justicia glutinosa (Bremek.) V.A.W. Graham

Sin.: *Justicia sarotheca* V.A.W. Graham, *Sarotheca elegans* Nees, *Sarotheca glutinosa* Bremek.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(SAL). PRY(AMA).

Justicia goudotii V.A.W. Graham

Sin.: *Chaetothylax boliviensis* Lindau, *Chaetothylax umbrosus* Nees, *Chaetothylax vestitus* Rizzini, *Justicia araucariensis* Profice

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(CAN, CEN, CON, GUA, PHA).

Justicia hassleri (Lindau) V.A.W. Graham

Sin.: *Beloperone hassleri* Lindau, *Chaetochlamys marginata* Lindau, *Justicia paraguayensis* V.A.W. Graham

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA, PAI).

Justicia hatschbachii (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm. var. **catharinensis** (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm.

Sin.: *Amphiscopia hatschbachii* Rizzini var. *catharinensis* Rizzini

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Justicia hatschbachii (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm. var. **hatschbachii**

Sin.: *Amphiscopia hatschbachii* Rizzini

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Justicia hunzikeri Ariza

Arbusto. Endémica. 600-800 m.

Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

Justicia jujuyensis C. Ezcurra

Sin.: *Justicia leonardii* De Marco & T.

Ruiz, nom. illeg., *Justicia nemoralis*

Lillo, nom. nud., *Justicia nemoralis*

Lillo, nom. nud. var. *tomentosa* Lillo, nom. nud.

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).

Justicia kleinii Wassh. & L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Justicia kuntzei Lindau

Sin.: *Lophothecium boliviense* Bremek.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Justicia laevilinguis (Nees) Lindau

Sin.: *Dianthera graminifolia* Rusby, *Dianthera laevilinguis* (Nees) Durand & B.D. Jacks., *Dianthera obtusifolia* (Nees) Griseb., *Dianthera paludosa* S. Moore, *Justicia anagallis* (Nees) Lindau, *Justicia ascendens* Bridar.,

Justicia obtusifolia (Nees) Lindau,

Justicia obtusifolia (Nees) Lindau var.

hirsuticaulis Nees, *Justicia paludosa*

(S. Moore) V.A.W. Graham, *Justicia*

repens (Nees) Lindau, hom. illeg.,

Rhytiglossa anagallis Nees,

Rhytiglossa laevilinguis Nees,

Rhytiglossa laevilinguis Nees var.

longifolia Nees, *Rhytiglossa obtusifolia*

Nees, *Rhytiglossa obtusifolia* Nees

var. *hirsuticaulis* Nees, *Rhytiglossa*

repens Nees

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA,

CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA,

ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).

Justicia lilloana Ariza

Sin.: *Justicia platicarpa* Lillo, nom. nud.

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Justicia lilloi (Lotti) C. Ezcurra

Sin.: *Chaetochlamys lilloi* Lotti, *Chaetochlamys tucumanensis* Lillo, nom. nud.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY).

Justicia lythroides (Nees) V.A.W. Graham

Sin.: *Heinzelia lythroides* Nees, *Heinzelia ovalis* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CON).

Justicia mandonii (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra

Sin.: *Beloperone mandonii* Lindau, *Justicia odonelli* De Marco & T. Ruiz, *Justicia tucumanensis* Lillo, nom. nud.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Justicia oblonga (Nees) Lindau

Sin.: *Rhytiglossa oblonga* Nees

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, GUA). URY(SJO).

Justicia oranensis De Marco & T. Ruiz

Sin.: *Justicia schreiteri* Lillo, nom. nud.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Justicia parabolica (Nees) Profice

Sin.: *Jacobinia parabolica* (Nees) Lindau,
Sericographis lineolata Rizzini,
Sericographis parabolica Nees
 Liana. Nativa.
 Países: BRA(SCA).

Justicia pectoralis Jacq.

Sin.: *Rhytiglossa pectoralis* (Jacq.) Nees,
Stethoma pectoralis (Jacq.) Raf.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(FOR). BRA (PAR, SCA).
 PRY(APY).

Justicia phyllocalyx (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra

Sin.: *Poikilacanthus phyllocalyx* Lindau
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA).

Justicia polygaloides (S. Moore) Lindau

Sin.: *Dianthera polygaloides* S. Moore,
Justicia lutensis Wassh. & J.R.I. Wood
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(ERI). PRY(APY, CON,
 GUA, PAI, PHA, SPE).

Justicia pygmaea Lindau

Sin.: *Justicia catharinensis* Lindau
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Justicia ramulosa (Morong) C. Ezcurra

Sin.: *Beloperone cochabambensis* Rusby,
Beloperone pseudociliata Mildbraed,
Beloperone ramulosa Morong,
Beloperone tetrameroides Lindau,
Justicia cochabambensis (Rusby)
 V.A.W. Graham, *Justicia pseudociliata*
 (Mildbraed) V.A.W. Graham, *Justicia*
ramulosa (Morong) V.A.W. Graham,
 comb. illeg., *Justicia tetramerioides*
 (Lindau) V.A.W. Graham
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS,
 SAL). BRA(PAR). PRY(APA, AMA,

CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI,
 SPE).

Justicia riojana Lindau

Arbusto. Endémica. 1000-3500 m.
 Países: ARG(LRI, SJU).

Justicia rusbyi (Lindau) V.A.W. Graham

Sin.: *Beloperone matthewsii* Lindau,
Chaetochlamys rusbyi Lindau, *Justicia*
matthewsii (Lindau) Rusby ex Dyer,
Ruellia lanceolata Morong
 Subarbusto. Nativa. 200-800 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA,
 CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA,
 GUA, PAI, PHA, SPE).

Justicia saltensis T.Ruiz & De Marco

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC).
 PRY(APY).

Justicia schenckiana Lindau

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Justicia squarrosa Griseb.

Sin.: *Beloperone ciliata* (Nees) Hook. f.,
Beloperone squarrosa (Griseb.)
 Lindau, *Dianthera ciliata* (Nees) Benth.
 & Hook. f., hom. illeg., *Jacobinia ciliata*
 Nees
 Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1500
 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ,
 LRI, SAL, SDE, SLU, TUC). PRY(APY,
 PHA).

Justicia tocatina (Nees) V.A.W. Graham

Sin.: *Chaetothylax tocatinus* Nees
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(APY).

Justicia tweediana (Nees) Griseb.

Sin.: *Adhatoda tweediana* Nees,
Adhatoda tweediana Nees var.
angustifolia Nees, *Ecbolium*
lorentzianum (Lindau) Kuntze,
Ecbolium tweedianum (Nees) Kuntze,
Justicia campestris Griseb., *Justicia*
diamantina Lindau, *Justicia lorentziana*
 Lindau, *Justicia tweediana* (Nees)
 Benth., comb. illeg., *Poikilacanthus*
tweedianus (Nees) Lindau
 Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 ERI, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU,
 SLU, TUC). URY(MON, RNO).

Justicia xylosteoides Griseb.

Sin.: *Beloperone scorpioides* Nees,
Ecbolium xylosteoides (Griseb.)
 Kuntze, *Justicia scorpioides* (Nees)
 Griseb., hom. illeg.
 Arbusto. Nativa. 0-2300 m.
 Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL,
 SDE, TUC). PRY(APY).

Justicia yhuensis Lindau

Sin.: *Justicia hylobates* Leonard
 Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(FOR, MIS). BRA(RGS,
 SCA). PRY(AMA, CAU, CON, COA).

Lepidagathis Willd.

Lepidagathis alopecuroidea (Vahl) Griseb.

Sin.: *Ruellia alopecuroidea* Vahl
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA).

Lepidagathis alvarezia (Nees)

Kameyama ex Wassh. & J.R.I. Wood
 Sin.: *Lophostachys alvarezia* Nees,
Lophostachys conferta Rusby
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Lepidagathis diffusa (Nees) Lindau

Sin.: *Teliostachya diffusa* Nees

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lepidagathis meridionalis Kameyama

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mendoncia Vell. ex Vand.

Mendoncia puberula (Mart.) Nees

Sin.: *Mendozia puberula* Mart.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mendoncia velloziana (Mart.) Nees

Sin.: *Mendoncia coccinea* Vell., *Mendoncia fulva* Lindau, *Mendozia velloziana* Mart.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, PHA).

Odontonema Nees

Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze

Sin.: *Thysacanthus cuspidatus* Nees

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAN, PAI).

Oplonia Raf.

Oplonia jujuyensis Wassh. & C. Ezcurra

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Pachystachys Nees

Pachystachys azaleiflora (Rusby) A.L.A.

Côrtes

Sin.: *Schaueria azaleiflora* Rusby

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Pachystachys dubiosa (Lindau) A.L.A.

Côrtes

Sin.: *Odontonema dubiosum* Lindau, *Streblacanthus boliviensis* Lindau, *Streblacanthus dubiosus* (Lindau) V.M.Baum

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, APY, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

Poikilacanthus Lindau

Poikilacanthus glandulosus (Nees) Ariza

Sin.: *Adhatoda flexuosa* Nees, *Adhatoda umbrosa* Nees, *Beloperone spathulata* Nees, *Ecbolium flexuosum* (Nees) Kuntze, *Ecbolium umbrosum* (Nees) Kuntze, *Justicia flexuosa* (Nees) Wassh. & L.B. Sm., *Justicia spathulata* Nees & Mart., *Justicia umbrosa* (Nees) Lindau, hom. illeg., *Orthotactus glandulosus* Nees, *Poikilacanthus flexuosus* (Nees) Lindau

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(SAO).

Pseuderanthemum Radlk. ex Lindau

Pseuderanthemum australe M.C.

Rodrigues & M.C. Souza

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pseuderanthemum heterophyllum (Nees) Radlk.

Sin.: *Eranthemum heterophyllum* Nees

Arbusto a subarbusto. Nativa.

Países: BRA (SCA).

Pseuderanthemum riedelianum (Nees) Rizzini

Sin.: *Eranthemum riedelianum* Nees

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ruellia L.

Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo

Sin.: *Stephanophysum angustiflorum* Nees, *Stephanophysum quadrifarium* Nees

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RIV).

Ruellia brachysiphon (Nees) Hiern

Sin.: *Dipteracanthus brachysiphon* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAN).

Ruellia brevicaulis (Nees) Lindau

Sin.: *Dipteracanthus brevicaulis* Nees, *Dipteracanthus dissitifolius* Nees var. *humilior* Nees, *Ruellia dissitifolia* (Nees) Hieron. var. *humilior* Nees

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, MIE).

Ruellia brevifolia (Pohl) C. Ezcurra

Sin.: *Cyrtacanthus corymbosus* Nees, nom. nud., *Echinacanthus dichotomus* Kuntze, *Ruellia amoena* Nees, nom. nud., *Ruellia graecizans* Baker, *Ruellia longifolia* (Pohl) Griseb., hom. illeg., *Ruellia serratithea* Rusby, *Ruellia ventricosa* Kunth, nom. illeg., *Stephanophysum brevifolium* Pohl, *Stephanophysum longifolium* Pohl, *Stephanophysum macrandrum* Bremek., *Stephanophysum ventricosum* (Kunth) Nees
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, ÑEE, SPE).

Ruellia bulbifera Lindau

Sin.: *Dipteracanthus tuberosus* Nees, *Ruellia loefgrenii* Lindau
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Ruellia ciliatiflora Hook.

Sin.: *Arrhostoxylum ciliatiflorum* (Hook.) Nees, *Ruellia lorentziana* Griseb., *Ruellia lorentziana* Griseb. var. *paraguariensis* Hassl.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, CAN, CON, PHA).

Ruellia dissitifolia (Nees) Hieron.

Sin.: *Dipteracanthus dissitifolius* Nees
Hierba a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ruellia elegans Poir.

Sin.: *Arrhostoxylum elegans* (Poir.) Bremek., *Arrhostoxylum silvaccola* Nees var. *montanum* Nees
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ruellia epallocaulos Leonard ex C. Ezcurra & Wassh.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

Ruellia erythropus (Nees) Lindau

Sin.: *Blechum mexicanum* Oerst., *Blechum tweedii* Nees, *Pentstemonacanthus modestus* Nees, *Ruellia mattogrossensis* Lindau, *Ruellia pubiflora* Griseb., *Ruellia tweedii* (Nees) T. Anderson ex Morong & Britton, *Ruellia velascana* Lindau, *Siphonacanthus erythropus* Nees
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA, SPE).

Ruellia filicalyx Lindau

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL). PRY(APY).

Ruellia geminiflora Kunth

Sin.: *Copiloglossa pilosa* Miers, *Dipteracanthus geminiflorus* Nees var. *angustifolius* Nees, *Dipteracanthus geminiflorus* Nees var. *erectus* Nees, *Dipteracanthus geminiflorus* Nees var. *hirsutior* Nees, *Dipteracanthus geminiflorus* Nees var. *procumbens* Nees, *Dipteracanthus geminiflorus* Nees var. *subacaulis* Nees, *Dipteracanthus humilis* Nees, *Dipteracanthus porrigens* Nees,

Dipteracanthus vindex Nees, *Ruellia geminiflora* Kunth var. *hirsutior* Nees, *Ruellia hirsuta* Vell., *Ruellia lindmaniana* Fritsch

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Ruellia hygrophila Mart.

Sin.: *Cryphiacanthus udus* Nees, *Lychniothyrus hygrophilus* (Mart.) Bremek.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

Ruellia hypericoides (Nees) Lindau

Sin.: *Dipteracanthus hypericoides* Nees
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(MIE). URY(ART).

Ruellia kleinii C. Ezcurra & Wassh.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Ruellia longipedunculata Lindau

Sin.: *Stephanophysum brookeae* Bremek.
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Ruellia macrosolen Lillo ex C. Ezcurra

Hierba. Nativa. 300-900 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, PHA).

Ruellia magniflora C. Ezcurra

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, MIE).

Ruellia morongii BrittonSin.: *Cryphiacanthus acaulis* Nees

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, CON, PAI, SPE). URY(ART, PAY, SAO, TAC).

Ruellia multifolia (Nees) Lindau var. **multifolia**Sin.: *Dipteracanthus multifolius* Nees, *Ruellia multifolia* (Nees) Lindau var. *hirsuta* Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Ruellia multifolia (Nees) Lindau var. **viscosissima** (Nees) C. EzcurraSin.: *Dipteracanthus glanduloso-punctatus* Nees, *Dipteracanthus viscosissimus* Nees, *Ruellia glanduloso-punctata* (Nees) Lindau, *Ruellia viscosissima* (Nees) Lindau

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, SPE).

Ruellia nobilis (S. Moore) LindauSin.: *Salpingacanthus nobilis* S. Moore

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON).

Ruellia reitzii Wassh. & L.B. Sm.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ruellia sanguinea Griseb.Sin.: *Arrhostoxylum kuntzei* (Lindau) Bremek., *Ruellia kuntzei* Lindau

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-2000 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS).

Ruellia simplex C. WrightSin.: *Arrhostoxylum microphyllum* Nees,*Cryphiacanthus angustifolius* Nees,*Ruellia brittoniana* Leonard, *Ruellia**coerulea* Morong, *Ruellia ignorantiae*Herter, *Ruellia malacosperma*Greenm., *Ruellia microphylla* (Nees)Lindau, *Ruellia spectabilis* Britton,hom. illeg., *Ruellia tweediana* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, FLA, MON, RIV, TAC, TYT).

Ruellia solitaria Vell.Sin.: *Dipteracanthus calvenscens* Nees,*Dipteracanthus confinis* Nees,*Dipteracanthus schauerianus* Nees,*Ruellia calvenscens* (Nees) Lindau,*Ruellia confinis* (Nees) Lindau

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR).

Ruellia woolstonii C. Ezcurra

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAA, CAN, CON, SPE).

Schaueria Nees**Schaueria capitata** Nees

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(RGS).

Schaueria paranaensis (Rizzini) A.L.A. CôrtesSin.: *Duvernoia paranaensis* Rizzini, *Justicia paranaensis* (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Staurogyne Wall.**Staurogyne alba** Braz & Monteiro

Hierba. Endémica. 800-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Staurogyne eustachya Lindau

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Staurogyne mandioccana (Nees) KuntzeSin.: *Ebermaiera mandioccana* Nees,*Ebermaiera sanctae-catharinae* Ness

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Staurogyne sylvatica Lindau ex Braz & Monteiro

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stenandrium Nees**Stenandrium affine** S. Moore

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Stenandrium diphyllum NeesSin.: *Stenandrium breviflorum* Bridar.,*Stenandrium diphyllum* Nees var.*longiscapum* Nees, *Stenandrium**neesianum* Lindau

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Stenandrium dulce (Cav.) NeesSin.: *Gerardia dulcis* (Cav.) S.F. Blake,*Nierembergia prunellifolia* Dunal,*Ruellia dulcis* Cav., *Stenandrium**diphyllum* Nees var. *exscapum* Nees,*Stenandrium parodii* Bridar.,

Stenandrium platensis B.R. Arrill. & Olano, *Stenandrium trinerve* Nees
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(SAO, TAC).

Stenandrium mandioccanum Nees
Sin.: *Stenandrium gracile* Rizzini, *Stenandrium spathulatum* S. Moore
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA).

Stenandrium pohlii Nees var. **brevicapum** Nees
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Stenandrium pohlii Nees var. **pusillum** Nees
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Stenandrium tenellum Nees
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Thunbergia Retz.

Thunbergia alata Bojer ex Sims
Enredadera. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA).

Thunbergia fragrans Roxb.
Enredadera. Introducida. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Thunbergia grandiflora Roxb.
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA (PAR; RGS, SCA). PRY(SPE).

Thyrsacanthus Moric.

Thyrsacanthus boliviensis (Nees) A. Côrtes & Rapini
Sin.: *Anisacanthus boliviensis* (Nees) Wassh., *Anisacanthus caduciflorus* (Griseb.) Ariza, *Anisacanthus caducifolius* (Griseb.) Lindau, *Anisacanthus malmei* Lindau, *Anisacanthus ruber* Lindau, *Drejera boliviensis* Nees, *Jacobinia caducifolia* Griseb., *Schaueria caduciflora* Griseb.
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY, CON, PAI).

Thyrsacanthus sulcatus (Nees) C. Ezcurra & A.L.A. Côrtes
Sin.: *Carlowrightia sulcata* (Nees) C. Ezcurra, *Dianthera sulcata* Griseb., *Jacobinia sulcata* Nees, *Siphonoglossa gentianifolia* Lindau, *Siphonoglossa sulcata* (Nees) Lindau
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APA, APY, CHO, PHA).
Notas: También en el norte del Uruguay sin material de referencia. (Ezcurra et al. 2018)

ACHARIACEAE

Hydnocarpus Gaertn.

Hydnocarpus pentandrus (Buch.-Ham.) Oken
Sin.: *Chilmoria pentandra* Buch.-Ham.
Árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: PRY(CEN).

ACHATOCARPACEAE

Achatocarpus Triana

Achatocarpus balansae Schinz & Aufran
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(CAU, GUA, ÑEE).

Achatocarpus brevipedicellatus H. Walter
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, COA, PAI).

Achatocarpus hasslerianus Heimerl
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, CAU).

Achatocarpus microcarpus Schinz & Aufran
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CON, GUA, ÑEE).

Achatocarpus praecox Griseb. f. **obovatus** (Schinz & Aufran) Hauman
Sin.: *Achatocarpus obovatus* Schinz & Aufran
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(CEN, COA).

Achatocarpus praecox Griseb. f. **spinulosus** (Griseb.) Hauman
Sin.: *Achatocarpus spinulosus* Griseb.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, TUC).

Achatocarpus praecox Griseb. var.
bicornutus (Schinz & Autran) Botta
Sin.: *Achatocarpus bicornutus* Schinz &
Autran
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS,
SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY,
GUA, PHA).

Achatocarpus praecox Griseb. var.
praecox
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,
JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA
(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PAI).

AEXTOXICACEAE

Aextoxicon Ruiz & Pav.

Aextoxicon punctatum Ruiz & Pav.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR,
LLA).

AIZOACEAE

Aptenia N.E. Br.

Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes
Sin.: *Mesembryanthemum cordifolium* L. f.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, COR, MEN, SFE).

Carpobrotus N.E. Br.

Carpobrotus chilensis (Molina) N.E. Br.
Sin.: *Mesembryanthemum chilense* Molina

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU). CHL(ANT, ATA,
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LSR, JFE).

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.

Sin.: *Mesembryanthemum edule* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, SCA).
CHL(VAL, MAU, BIO, LSR).
URY(CAS, MAL, MON, ROC).

Cryophytum N.E. Br.

Cryophytum crystallinum (L.) N.E. Br.
Sin.: *Gasoul crystallinum* (L.) Rothm.,
Mesembryanthemum crystallinum L.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(ANT,
ATA, COQ, VAL, IDE).

Galenia L.

Galenia pubescens (Eckl. & Zeyh.)
Druce
Sin.: *Aizoon pubescens* Eckl. & Zeyh.
Hierba. Introducida. 400
Países: CHL(COQ, VAL).

Malephora N.E. Br.

Malephora purpureocea (Haw.)
Schwantes
Sin.: *Mesembryanthemum*
purpureocea Haw.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Mesembryanthemum L., nom.
cons.

Mesembryanthemum nodiflorum L.

Sin.: *Cryophytum nodiflorum* (L.) L. Bolus,
Gasoul nodiflorum (L.) Rothm.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(ATA, COQ).

Sesuvium L.

Sesuvium americanum (Gillies ex Arn.)
A.I. Jocu & C.R. Minué
Sin.: *Sesuvium revolutifolium* Vahl ex
Willd., nom. illeg., *Sesuvium*
verrucosum Raf., *Trianthema*
americana Gillies ex Arn.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI,
MEN, RNE, SJU, SLU). CHL(AYP,
VAL). PRY(PHA).

Sesuvium humifusum (Turpin) Bohley &
G. Kadereit
Sin.: *Cypselea humifusa* Turpin
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Sesuvium meizianum (K. Müll.) Bohley &
G. Kadereit
Sin.: *Cypselea meiziana* K. Müll.
Subarbusto. Endémica.

Sesuvium portulacastrum (L.) L.

Sin.: *Portulaca portulacastrum* L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE,
SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU,
TUC). BRA (RGS, SCA).

Sesuvium sessile Pers.

Sin.: *Sesuvium parviflorum* DC., *Sesuvium*
revolutifolium Lam., nom. illeg.,
Sesuvium revolutum Pers.
Hierba. Nativa.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(TAR). PRY(APY, CEN, PHA). URY(CAS, ROC).

Tetragonia L.

Tetragonia angustifolia Barnéoud

Arbolito. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Tetragonia copiapina Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Tetragonia crystallina L'Hér.

Hierba. Nativa. 900

Países: CHL(TAR).

Tetragonia espinosae Muñoz

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Tetragonia macrocarpa Phil.

Sin.: *Tetragonia pusilla* Phil.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, IDE).

Tetragonia maritima Barnéoud

Arbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Tetragonia microcarpa Phil.

Sin.: *Tetragonia kuntzei* Kuntze, *Tetragonia macrocarpa* Phil. var. *microcarpa* (Phil.) Reiche, *Tetragonia tenella* I.M. Johnst., *Tetragonia trigona* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Tetragonia ovata Phil.

Sin.: *Tetragonia robusta* Phil.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Tetragonia pedunculata Phil.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: CHL(ATA).

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze

Sin.: *Demidovia tetragonoides* Pall.,

Tetragonia expansa Murray

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, FOR, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LSR, LLA, IDE, JFE, IPA). URY(ROC).

Trianthema L.

Trianthema argentinum Hunz. & Cocucci

Hierba. Endémica. 400-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU).

Trianthema portulacastrum L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). CHL(IPA). PRY(APY).

ALISMATACEAE

Alisma L.

Alisma lanceolatum With.

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Alisma plantago-aquatica L.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(RNE). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Echinodorus Rich. ex Engelm.

Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett

Sin.: *Alisma berteroi* Spreng., *Echinodorus berteroi* (Spreng.) Fassett subsp. *patagonicus* (Speg.) Rataj, *Echinodorus patagonicus* Speg.

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(RNE). PRY(PHA).

Echinodorus floribundus (Seub.) Seub.

Sin.: *Alisma floribundum* Seub., *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. *aureus* (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels., *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *aureus* Fassett, *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *clausenii* (Seub.) Rataj, *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *floribundus* (Seub.) Micheli, *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *longibracteatus* Rataj, *Echinodorus macrophyllus* (Kunth) Micheli var. *muricatus* (Griseb.) Micheli, *Echinodorus muricatus* Griseb., *Echinodorus pubescens* (Mart.) Seub. var. *clausenii* Seub., *Echinodorus punctatus* Micheli

Hierba acuática. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli

Sin.: *Alisma grandiflorum* Cham. & Schltdl., *Echinodorus argentinensis* Rataj, *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *ovatus* Micheli, *Echinodorus pellucidus* Rataj

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

- Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, TYT).
- Echinodorus longipetalus** Micheli
Hierba palustre. Nativa. 100-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA).
- Echinodorus longiscapus** Arechav.
Sin.: *Echinodorus aschersonianus* Graebn. var. *nulliglandulosus* Rataj, *Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *longiscapus* (Arechav.) Hauman, *Echinodorus longiscapus* Arechav. var. *minor* (Buchenau) Herter, *Echinodorus sellowianus* Buchenau, *Echinodorus sellowianus* Buchenau var. *major* Buchenau, *Echinodorus sellowianus* Buchenau var. *minor* Buchenau
Hierba acuática. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA). URY(SOR, TAC).
- Echinodorus macrophyllus** (Kunth) Micheli
Sin.: *Alisma macrophyllum* Kunth
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Rataj (2004) cita la especie para Argentina sin indicar ejemplar de referencia
- Echinodorus paniculatus** Micheli emend. Rataj
Sin.: *Echinodorus paniculatus* Micheli emend. Rataj f. *latifolius* Chodat & Hassl., *Echinodorus paniculatus* Micheli emend. Rataj var. *brevifolius* Hauman
Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, PHA).
- Echinodorus reptilis** Lehtonen
Hierba acuática. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(MIE).
- Echinodorus scaber** Rataj
Sin.: *Echinodorus macrophyllus* (Kunth) Micheli subsp. *scaber* (Rataj) R.R. Haynes & Holm-Niels.
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COR, COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON).
- Echinodorus subalatus** (Mart.) Griseb.
Sin.: *Alisma intermedium* Mart., *Alisma subalatum* Mart., *Echinodorus intermedius* (Mart.) Griseb.
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN).
- Echinodorus uruguayensis** Arechav.
Sin.: *Echinodorus aschersonianus* Graebn., *Echinodorus horemanii* Rataj, *Echinodorus martii* Micheli var. *uruguayensis* (Arechav.) Hauman, *Echinodorus osiris* Rataj
Hierba palustre. Endémica. 100-2000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN). URY(ART, FLO, PAY, SAO, SJO, SOR).
- Helanthium** (Benth. & Hook. f.) Engelm. ex J.G. Sm.
- Helanthium bolivianum** (Rusby) Lehtonen & Myllys
- Sin.: *Alisma bolivianum* Rusby, *Alisma ranunculooides* L. var. *brasiliense* A. St.-Hil., *Echinodorus angustifolius* Rataj, *Echinodorus australis* Rataj, *Echinodorus austroamericanus* Rataj, *Echinodorus bolivianus* (Rusby) Holm-Niels., *Echinodorus quadricostatus* Fassett, *Echinodorus quadricostatus* Fassett var. *xinguensis* Rataj, *Echinodorus tenellus* (Mart.) Buchenau var. *latifolius* (Seub.) Fassett
Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).
- Helanthium tenellum** (Mart.) Britton
Sin.: *Alisma tenellum* Mart., *Echinodorus tenellus* (Mart.) Buchenau
Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAN, ITA, PAI). URY(ROC).
- Hydrocleys** Rich.
- Hydrocleys martii** Seub.
Sin.: *Hydrocleys uruguayensis* (Buchenau) Pedersen, *Ostenia uruguayensis* Buchenau
Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(COS). BRA(SCA). URY(DUR, ROC).
- Hydrocleys mattogrossensis** (Kunze) Holm-Niels. & R.R. Haynes
Sin.: *Hydrocleys cryptopetala* R.E. Fr., *Limnocharis mattogrossensis* Kuntze
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).
- Hydrocleys modesta** Pedersen
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(ÑEE, PAI).

Hydrocleys nymphoides (Willd.)
Buchenau

Sin.: *Hydrocleys commersonii* Rich.,
Limnocharis commersonii (Rich.)
Spreng., *Limnocharis nymphoides*
(Willd.) Micheli, *Stratiotes nymphoides*
Willd.

Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(VAL). PRY(APY, AMA,
CEN, CHO, CON, COA, ÑEE, NAS,
PHA). URY(ROC).

Limnocharis Bonpl.

Limnocharis flava (L.) Buchenau

Sin.: *Alisma flava* L.

Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, SAL).
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ,
CEN, PHA).

Limnocharis laforestii Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS). PRY(APY,
AMA, PHA).

Sagittaria L.

Sagittaria guayanensis Kunth

Sin.: *Alisma ancile* Mart. ex Steud., nom.
nud., *Alisma echinocarpum* (Mart.)
Seub., *Echinodorus guayanensis*
(Kunth) Griseb., *Lophiocarpus*
guayanensis (Kunth) Micheli,
Lophiocarpus guayanensis (Kunth)
Micheli f. *minor* Chodat, *Lophiocarpus*
seubertianus (Mart. ex Seub.) Micheli,
Lophotocarpus guayanensis (Kunth) J.
G. Sm., *Lophotocarpus guayanensis*

(Kunth) J. G. Sm. var. *echinocarpus*
(Mart.) Buchenau, *Lophotocarpus*
guayanensis (Kunth) J. G. Sm. var.
typicus Buchenau, nom. inval.,
Lophotocarpus seubertianus (Mart. ex
Seub.) Buchenau, *Sagittaria bracteata*
Willd. ex Seub., nom. nud., *Sagittaria*
echinocarpa Mart., *Sagittaria*
seubertiana Mart. ex Seub.

Hierba palustre. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR).
PRY(AMA, CAU, CON, COA).

Sagittaria lancifolia L.

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Sagittaria montevidensis Cham. &
Schltdl. subsp. **chilensis** (Cham. &
Schltdl.) Bogin

Sin.: *Sagittaria chilensis* Cham. & Schltdl.

Hierba palustre. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA,
LSR, LLA).

Sagittaria montevidensis Cham. &
Schltdl. subsp. **montevidensis**

Sin.: *Sagittaria andina* Phil., *Sagittaria*
montevidensis Cham. & Schltdl. f.
flaviflora Chodat, *Sagittaria multinervia*
Larrañaga, *Sagittaria pugioniformis* L.
f. *longipedicellata* Kuntze, *Sagittaria*
pugioniformis L. var. *montevidensis*
(Cham. & Schltdl.) Kuntze

Hierba palustre. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO,
LSR, LLA). PRY(AMA, CAU, CEN,
CON, GUA, ÑEE, PHA). URY(CAS,
CLA, COL, DUR, FLA, PAY, ROC,
SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Sagittaria rhombifolia Cham.

Sin.: *Sagittaria affinis* Seub., *Sagittaria*
amazonica Huber, *Sagittaria lagoensis*

Seub. & Warm., *Sagittaria*
pugioniformis L. f. *macrophylla* Chodat
& Hassl., *Sagittaria pugioniformis* L.
var. *affinis* (Seub.) Kuntze, *Sagittaria*
pugioniformis L. var. *platyphylla*
Micheli, *Sagittaria pugioniformis* L. var.
rhombifolia (Cham.) Kuntze, *Sagittaria*
rhomboidalis Micheli

Hierba palustre. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
JUJ, NEU, RNE, SAL). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CEN,
ÑEE).

ALSTROEMERIACEAE

Alstroemeria L.

Alstroemeria achirae M. Muñoz & Brinck

Hierba. Endémica. 1500-1900 m.

Países: CHL(MAU).

Alstroemeria albescens M.C. Assis

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: BRA(RGS).

Alstroemeria amabilis M.C. Assis

Hierba. Endémica. 1400-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Alstroemeria andina Phil. var. **andina**

Hierba. Endémica. 2900-3700 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria andina Phil. var. **venustula**
(Phil.) M. Muñoz

Sin.: *Alstroemeria andina* Phil. subsp.
venustula (Phil.) Ehr. Bayer,
Alstroemeria venustula Phil.

Hierba. Endémica. 2300-3700 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria angustifolia Herb. var. **angustifolia**

Sin.: *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *acuminata* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *conferta* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *intermedia* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *solliana* Herb.
 Hierba. Endémica. 0-1700 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Alstroemeria angustifolia Herb. var. **velutina** (Ehr. Bayer) M. Muñoz

Sin.: *Alstroemeria angustifolia* Herb. subsp. *velutina* Ehr. Bayer
 Hierba. Endémica. 500-2000 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Alstroemeria apertiflora Baker

Hierba. Nativa. 0-900 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, PAI).

Alstroemeria aurea Graham

Sin.: *Alstroemeria araucana* Phil., *Alstroemeria aurantiaca* D. Don, *Alstroemeria chiloensis* Phil., *Alstroemeria mutabilis* Kunze, *Alstroemeria stenopetala* Phil.
 Hierba. Endémica. 200-1900 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Alstroemeria bakeri Pax

Hierba. Endémica. 1600-2400 m.
 Países: ARG(CAT).

Alstroemeria citrina Phil.

Hierba. Endémica. 1500-1700 m.
 Países: CHL(COQ, VAL).

Alstroemeria crispata Phil.

Hierba. Endémica. 1100-3000 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Alstroemeria cummingiana Herb.

Sin.: *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *cummingiana* (Herb.) Ehr. Bayer
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL).

Alstroemeria cunha Vell.

Sin.: *Alstroemeria argentovittata* Lem., *Alstroemeria nemorosa* Gardner
 Hierba. Nativa. 1000-1700 m.
 Países: BRA(PAR).

Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp. **chrysantha** Ehr. Bayer

Hierba. Endémica. 0-400 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp. **diluta**

Hierba. Endémica. 300
 Países: CHL(LBO, MAU).

Alstroemeria esteparica Gl. Rojas

Hierba. Endémica. 700-800 m.
 Países: ARG(SCR). CHL(AIS).

Alstroemeria exserens Meyen

Sin.: *Alstroemeria diazii* Phil., *Alstroemeria pallens* Phil.
 Hierba. Endémica. 1500-2100 m.
 Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Alstroemeria garaventae Ehr. Bayer subsp. **garavantae**

Hierba. Endémica. 1200-2000 m.
 Países: CHL(VAL, RME).

Alstroemeria garavantae Ehr. Bayer subsp. **longaviensis** (Ravenna)

Muñoz-Schick & Eyzag.

Sin.: *Alstroemeria longaviensis* Ravenna
 Hierba. Endémica. 200-400 m.
 Países: CHL(MAU).

Alstroemeria graminea Phil.

Sin.: *Taltalia graminea* (Phil.) Ehr. Bayer

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Alstroemeria hookeri Sweet

Sin.: *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *hookeri*, *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *maculata* Ehr. Bayer, *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *recumbens* (Herb.) Ehr. Bayer, *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *sansebastianae* Baeza & E. Ruiz, *Alstroemeria hookeriana* Schult., *Alstroemeria recumbens* Herb., *Alstroemeria rosea* Hook.
 Hierba. Endémica. 0-300 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO).

Alstroemeria inodora Herb.

Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Alstroemeria isabellana Herb.

Sin.: *Alstroemeria butantanensis* Hoehne, *Alstroemeria campaniflora* Hand.-Mazz., *Alstroemeria chlorantha* Ravenna, *Alstroemeria isabellana* Herb. var. *longifolia* Seub. ex Schenk, *Alstroemeria regnelliana* Kraenzl., *Alstroemeria viridiflora* Ravenna, *Bomarea stricta* Pax
 Hierba. Nativa. 0-2700 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(TYT).

Alstroemeria kingii Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.
 Países: CHL(ATA).

Alstroemeria leporina Ehr. Bayer & Grau

Sin.: *Alstroemeria hirtella* Phil.
 Hierba. Endémica. 900-2000 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria ligtu L. subsp. **ligtu**

Sin.: *Alstroemeria chilensis* Lem., *Alstroemeria flava* Phil., *Alstroemeria*

- haemantha* Ruiz & Pav., *Alstroemeria lothian* Utinet
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).
- Alstroemeria ligtu* L. subsp. *simsii*** (Spreng.) Ehr. Bayer
Sin.: *Alstroemeria aurea* Graham var. *valparadisiaca* Herb., *Alstroemeria aurea* Meyen, hom. illeg., *Alstroemeria ciliata* Poepp., *Alstroemeria dentata* Klotzsch ex Kunth, *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav. var. *pilosa* (Lindl.) Herb., *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav. var. *simsiana* Herb., *Alstroemeria macraeana* Herb., *Alstroemeria pulchella* L. f. var. *pilosa* Lindl., *Alstroemeria quillotensis* Herb., *Alstroemeria simsii* Spreng.
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).
- Alstroemeria ligtu* L. subsp. *splendens*** M. Muñoz
Sin.: *Alstroemeria ligtu* L. subsp. *incarnata* Ehr. Bayer, nom. illeg.
Hierba. Endémica. 1100-1400 m.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).
- Alstroemeria lutea* M. Muñoz**
Hierba. Endémica. 300-800 m.
Países: CHL(TAR).
- Alstroemeria magnifica* Herb. var. *magenta*** (Ehr. Bayer) M. Muñoz
Sin.: *Alstroemeria magenta* Ehr. Bayer
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL).
- Alstroemeria magnifica* Herb. var. *magnifica***
Sin.: *Alstroemeria gayana* Phil., *Alstroemeria magnifica* Herb. subsp. *gayana* (Phil.) Ehr. Bayer
- Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).
- Alstroemeria magnifica* Herb. var. *sierrae*** (Muñoz) M. Muñoz
Sin.: *Alstroemeria sierrae* Muñoz
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).
- Alstroemeria magnifica* Herb. var. *tofoensis*** M. Muñoz
Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: CHL(COQ).
- Alstroemeria malmeana* Kraenzl.**
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Alstroemeria martcorenae* Negritto & Baeza**
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(VAL).
- Alstroemeria maxima* (Phil.) N. Villalobos & Baeza**
Sin.: *Alstroemeria magnifica* Herb. subsp. *maxima* (Phil.) Ehr. Bayer, *Alstroemeria pulchra* Sims var. *maxima* Phil., *Alstroemeria spectabilis* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Alstroemeria mollensis* M. Muñoz & Brinck**
Hierba. Endémica. 2000-2200 m.
Países: CHL(COQ).
- Alstroemeria monantha* Ravenna**
Sin.: *Alstroemeria aulica* Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).
- Alstroemeria pallida* Graham**
Sin.: *Alstroemeria albiflora* C. Presl, *Alstroemeria ligtu* L. var. *andina* Phil.,
- Alstroemeria nivalis* Phil., hom. illeg., *Alstroemeria nubigena* Phil., *Alstroemeria rosea* Phil.
Hierba. Endémica. 1100-2800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Alstroemeria parvula* Phil.**
Hierba. Endémica. 2200-2600 m.
Países: CHL(VAL, RME).
- Alstroemeria patagonica* Phil.**
Sin.: *Alstroemeria nana* Rendle, *Alstroemeria patagonica* Phil. f. *biflora* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).
- Alstroemeria pelegrina* L.**
Sin.: *Alstroemeria amoena* Salisb., *Alstroemeria gayana* Phil. var. *humilis* Phil., *Alstroemeria pelegrina* L. var. *albescens* Herb.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: CHL(COQ, VAL).
- Alstroemeria philippii* Baker var. *albicans*** M. Muñoz
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(ATA).
- Alstroemeria philippii* Baker var. *philippii***
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Alstroemeria piperata* A.R. Flores & J.M. Watson**
Hierba. Endémica. 1200-1500 m.
Países: CHL(VAL).
- Alstroemeria polyphylla* Phil.**
Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: CHL(ATA).

Alstroemeria presliana Herb. subsp.
australis Ehr. Bayer
Hierba. Endémica. 200-1500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Alstroemeria presliana Herb. subsp.
presliana
Sin.: *Alstroemeria chillanensis* Grau &
Ehr. Bayer, *Alstroemeria*
epulauquensis Ravenna
Hierba. Endémica. 1300-2300 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU,
BIO, ARA).

Alstroemeria pseudospathulata Ehr.
Bayer
Sin.: *Alstroemeria crocea* Phil., hom. illeg.,
Alstroemeria lacrima-solis Ravenna,
Alstroemeria oxyphylla Ravenna, nom.
superfl.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(LBO, MAU).

Alstroemeria psittacina Lehm.
Sin.: *Alstroemeria atrorubra* Ravenna,
Alstroemeria hassleriana Baker,
Lilavia psittacina (Lehm.) Raf.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
DFE, ERI, LPA, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU,
CAN, GUA). URY(CAS, MON).

Alstroemeria pulchra Sims subsp.
lavandulacea Ehr. Bayer
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Alstroemeria pulchra Sims subsp.
pulchra
Sin.: *Alstroemeria bicolor* Hook.,
Alstroemeria flos-martinii Ker Gawl.,
Alstroemeria tricolor Hook.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
RME).

Alstroemeria pygmaea Herb.
Sin.: *Schickendantzia hieronymi* Pax,
Schickendantzia pygmaea (Herb.)
Speg.
Hierba. Nativa. 3000-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Alstroemeria revoluta Ruiz & Pav.
Sin.: *Alstroemeria herbertiana* M. Roem.,
Alstroemeria inconspicua Phil.,
Alstroemeria reflexa Roem.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, RME).

Alstroemeria ribeirensis Ravenna
Hierba. Endémica. 200-600 m.
Países: BRA(PAR).

Alstroemeria schizanthoides Grau var.
alba M. Muñoz
Sin.: *Alstroemeria modesta* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Alstroemeria schizanthoides Grau var.
schizanthoides
Hierba. Endémica. 800-1900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria sellowiana Seub.
Hierba. Endémica. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Alstroemeria spathulata C. Presl
Sin.: *Alstroemeria spathulata* C. Presl var.
bridgesiana Herb., *Alstroemeria*
spathulata C. Presl var. *curbrana*
Herb.
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO).

Alstroemeria traudliae J.M. Watson &
A.R. Flores
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(COQ).

Alstroemeria umbellata Meyen
Sin.: *Alstroemeria sericantha* Schauer
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Alstroemeria urubiciensis L.P. Felix &
M. Guerra
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(SCA).

Alstroemeria versicolor Ruiz & Pav.
Sin.: *Alstroemeria meyeniana* Schauer,
Alstroemeria sotoana Phil.,
Alstroemeria tigrina Phil., *Alstroemeria*
xanthina Phil.
Hierba. Endémica. 200-2000 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA,
RME).

Alstroemeria violacea Phil.
Sin.: *Alstroemeria paupercula* Phil.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ,
VAL).

Alstroemeria werdermannii Ehr. Bayer
var. **flavicans** M. Muñoz
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria werdermannii Ehr. Bayer
var. **werdermannii**
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria zoellneri Ehr. Bayer
Hierba. Endémica. 1100-1800 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Bomarea Mirb.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Bomarea boliviensis Baker

Sin.: *Alstroemeria parviflora* Ravenna
Hierba. Nativa. 1500-3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Bomarea dulcis (Hook.) Beauverd

Sin.: *Alstroemeria dulcis* Hook.
Hierba. Nativa. 2500-5200 m.
Países: CHL(AYP).

Bomarea edulis (Tussac) Herb.

Sin.: *Alstroemeria edulis* Andrews ex Poir., nom. illeg., *Alstroemeria edulis* Tussac, *Alstroemeria salsilloides* Mart., *Bomarea macrophylla* Schenck ex Killip, nom. nud., *Bomarea spectabilis* Schenk
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Bomarea involucrosa (Herb.) Baker

Sin.: *Collania involucrosa* Herb.
Hierba. Nativa. 3500-3700 m.
Países: CHL(AYP).

Bomarea macrocephala Pax

Sin.: *Alstroemeria macrocephala* (Pax) Hunz., *Bomarea fiebrigiana* Kraenzl.,
Hierba. Nativa. 1800-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Bomarea ovallei (Phil.) Ravenna

Sin.: *Alstroemeria ovallei* (Phil.) Hunz., *Leontochir ovallei* Phil. var. *luteus* M. Muñoz, *Leontochir ovallei* Phil. var. *ovallei*
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).).

Bomarea ovata (Cav.) Mirb.

Sin.: *Alstroemeria ovata* Cav., *Bomarea polyphylla* Kraenz.

Bomarea salsilla (L.) Herb.

Sin.: *Alstroemeria oculata* Lodd., *Alstroemeria salsilla* L., *Bomarea oculata* (Lodd.) M. Roem.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Bomarea stans Kraenzl.

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Luzuriaga Ruiz & Pav., nom. cons.

Luzuriaga marginata (Gaertn.) Benth.

Sin.: *Callixene magellanicum* Raeusch., *Callixene marginata* (Gaertn.) Lam., *Enargea marginata* Gaertn.
Subarbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

Luzuriaga polyphylla (Hook.) J.F. Macbr.

Sin.: *Callixene polyphylla* Hook., *Enargea polyphylla* (Hook.) F. Muell., *Luzuriaga erecta* Kunth
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Luzuriaga radicans Ruiz & Pav.

Sin.: *Callixene radicans* (Ruiz & Pav.) Macloskie, *Enargea radicans* (Ruiz & Pav.) F. Muell.
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

AMARANTHACEAE

Achyranthes L.

Achyranthes aspera L.

Hierba. Introducida. 300-400 m.
Países: ARG(SAL).

Alternanthera Forssk.

Alternanthera albida (Moq.) Griseb.

Sin.: *Achyranthes seubertii* Standl., *Alternanthera albida* (Moq.) Griseb. f. *amentacea* Suess., *Alternanthera albida* (Moq.) Griseb. f. *globifera* Suess., *Alternanthera tomentella* Seub., *Telanthera albida* Moq.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, SDE, SLU, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, BOQ, GUA, PHA).

Alternanthera altacruzensis Suess.

Sin.: *Alternanthera piptantha* Pedersen
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY).

Alternanthera aquatica (D. Parodi) Chodat

Sin.: *Achyranthes hassleriana* (Chodat) Standl., *Alternanthera hassleriana* Chodat, *Mogiphanes aquatica* D. Parodi
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze var. **brasiliana**

Sin.: *Alternanthera dentata* (Moench) Scheygr., *Gomphrena brasiliana* L., *Gomphrena dentata* Moench,

Mogiphanes brasiliensis (Jacq.) Mart.,
Philoxerus brasiliensis (L.) R. Br.,
Telanthera dentata Moq.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, CEN).

***Alternanthera brasiliensis* (L.) Kuntze var.
villosa (Moq.) Kuntze**

Sin.: *Achyranthes ramosissima* (Mart.)
Standl., *Alternanthera brasiliensis* (L.)
Kuntze var. *moquinii* (Webb ex Moq.)
Uline & W.L. Bray, *Alternanthera*
brasiliensis (L.) Kuntze var. *strigosa*
(Hassk.) Kuntze, *Alternanthera*
moquinii (Webb ex Moq.) Dusén,
Alternanthera ramosissima (Mart.)
Chodat, *Alternanthera ramosissima*
(Mart.) Chodat var. *missionum*
Pedersen, *Alternanthera ramosissima*
(Mart.) Chodat var. *reptans* Pedersen,
Alternanthera strigosa Hassk.,
Gomphrena patula J.C. Wendl.,
Mogiphanes diffusa Mart., *Mogiphanes*
ramosissima Mart., *Mogiphanes villosa*
Mart., *Mogiphanes virgata* Schrad.,
Telanthera brasiliensis (L.) Moq. f.
grisea Chodat, *Telanthera brasiliensis*
(L.) Moq. var. *villosa* Moq., *Telanthera*
diffusa (Mart.) Moq., *Telanthera*
moquinii Webb ex Moq., *Telanthera*
ramosissima (Mart.) Moq., *Telanthera*
ramosissima (Mart.) Moq. var. *diffusa*
(Mart.) Seub., *Telanthera virgata*
(Schrad.) Moq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAN,
CEN, SPE).

***Alternanthera cana* Suess.**

Hierba o subarbusto. Endémica. 1000-
2500 m.

Países: ARG(SJU).

***Alternanthera caracasana* Kunth**

Sin.: *Achyranthes peploides* (Willd. ex
Roem. & Schult.) Britton,
Alternanthera achyrantha (L.) R. Br. ex
Sweet var. *dasyantha* Seub.,
Alternanthera achyrantha (L.) R. Br. ex
Sweet var. *parvifolia* Moq.,
Alternanthera macrorhiza Hauman,
Alternanthera parvifolia (Moq.) Fawc.
& Rendle, *Alternanthera peploides*
(Willd. ex Roem. & Schult.) Urb.,
Alternanthera villiflora Schelle, *Celosia*
humifusa Humb. & Bonpl. ex Schult.,
Illecebrum peploides Willd. ex Roem.
& Schult., *Telanthera caracasana*
(Kunth) Moq.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COR, JUJ, SAL,
SFE).

***Alternanthera cinerella* Suess.**

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

***Alternanthera collina* Pedersen**

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SDE).

***Alternanthera ficoidea* (L.) P. Beauv.**

Sin.: *Alternanthera ficoidea* (L.) R. Br. ex
Schult., *Alternanthera ficoidea* (L.)
Sm., *Alternanthera polygonoides* (L.)
R. Br. ex Griseb. var. *diffusa* (Moq.)
Hicken, *Alternanthera polygonoides*
(L.) R. Br. ex Griseb. var. *glabrescens*
Griseb., *Alternanthera tenella* Colla,
Bucholzia ficoidea (L.) Mart.,
Bucholzia polygonoides (L.) Mart. var.
diffusa Mart., *Gomphrena ficoidea* L.,
nom. cons., *Illecebrum ficoideum* (L.)
L., *Steiremis ficoidea* (L.) Raf.,
Telanthera ficoidea (L.) Moq.,
Telanthera polygonoides (L.) Moq. var.
brachiata Moq., *Telanthera*
polygonoides (L.) Moq. var. *diffusa*
(Mart.) Moq.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, APY, AMA, CEN, PHA).

***Alternanthera flavescens* Kunth**

Sin.: *Achyranthes capituliflora* Bertero,
Alternanthera coriacea Herzog,
Alternanthera praelonga A. St.-Hil. var.
australis Pedersen, *Alternanthera*
scandens Herzog, *Gomphrena*
brachiata Willd. ex Roem. & Schult.,
nom. illeg., *Mogiphanes flavescens*
(Kunth) Mart., *Telanthera brasiliensis*
(L.) Moq. f. *capitata* Chodat,
Telanthera capituliflora (Bertero) Moq.,
Telanthera floridana Chapm.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(RGS,
SCA). PRY(CAU, CAN).

***Alternanthera halimifolia* (Lam.) Standl.
ex Pittier**

Sin.: *Achyranthes halimifolia* Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

***Alternanthera hirtula* (Mart.) R.E. Fr. var.
hirsuta Pedersen**

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA, AMA,
CAN).

***Alternanthera hirtula* (Mart.) R.E. Fr. var.
*hirtula***

Sin.: *Achyranthes paraguayensis* Standl.,
Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr.
var. *atropurpurea* (Chodat) Chodat,
Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr.
var. *cinnabarina* (Chodat) Chodat,
Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr.
var. *pallens* (Chodat) Chodat,
Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr.
var. *robusta* Chodat, nom. inval.,
Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr.
var. *rosea* (Morong) Chodat,
Alternanthera malmeana R.E. Fr. var.

malmeana, *Alternanthera malmeana* R.E. Fr. var. *straminea* (Chodat) Pedersen, *Alternanthera rosea* (Morong) Uline & W.L. Bray, *Mogiphanes hirtula* Mart., *Mogiphanes rosea* Morong & Britton, *Telanthera hirtula* (Mart.) Moq., *Telanthera rosea* (Morong) Chodat, *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *atropurpurea* Chodat, *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *cinnabarina* Chodat, *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *pallens* Chodat, *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *straminea* Chodat, *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *typica* Chodat, nom. inval. Hierba. Endémica. 0-800 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr. var. ***nitens*** Pedersen Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: PRY(AMA, CAN).

Alternanthera inaccessa Pedersen Arbusto. Endémica. 700 Países: PRY(APY).

Alternanthera kurtzii Schinz ex Pedersen subsp. ***kurtzii*** Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, PAI, PHA). URY(ART, COL, PAY, RNO).

Alternanthera kurtzii Schinz ex Pedersen subsp. ***sclerosperma*** Pedersen Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: PRY(APY, CEN).

Alternanthera lanceolata (Benth.) Schinz Sin.: *Achyranthes lehmannii* (Hieron.) Standl., *Achyranthes mexicana* (Schltdl.) Standl., *Alternanthera lehmannii* Hieron., *Alternanthera meridensis* Stützer, *Alternanthera mexicana* (Schltdl.) Hieron., hom. illeg., *Alternanthera mexicana* (Schltdl.) Hieron. var. *gracilis* Suess., *Alternanthera mexicana* (Schltdl.) Hieron. var. *lehmannii* (Hieron.) Suess., *Alternanthera meyeriana* (Regel & Körn.) Suess., *Alternanthera microcephala* (Moq.) Schinz, *Alternanthera tucumana* Lillo, *Brandesia lanceolata* Benth., *Brandesia mexicana* Schltdl., *Mogiphanes soratensis* Rusby, *Telanthera lanceolata* (Benth.) Moq., *Telanthera meyeriana* Regel & Körn., *Telanthera microcephala* Moq. Hierba. Nativa. 500-2000 m. Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Alternanthera littoralis P. Beauv. ex Moq. var. ***maritima*** (Mart.) Pedersen Sin.: *Alternanthera maritima* (Mart.) A. St.-Hil., *Bucholzia maritima* Mart. Hierba. Nativa. 0-100 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Alternanthera micrantha R.E. Fr. Sin.: *Alternanthera friesii* Schinz, *Alternanthera rufescens* Suess. Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA).

Alternanthera microphylla R.E. Fr. subsp. ***maior*** (Suess.) N. Bayón, J. Vera Bahima & Giuliano Sin.: *Alternanthera microphylla* R.E. Fr. var. *major* Suess. Hierba. Endémica. 2000-3500 m. Países: ARG(JUJ).

Alternanthera microphylla R.E. Fr. subsp. ***microphylla*** Hierba. Nativa. 3000-4000 m. Países: ARG(JUJ).

Alternanthera nodifera (Moq.) Griseb. Sin.: *Telanthera nodifera* Moq. Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE).

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. subsp. ***chacoensis*** (Morong ex Morong & Britton) Pedersen Sin.: *Achyranthes chacoensis* (Morong) Standl., *Achyranthes morongii* (Uline) Standl., *Alternanthera chacoensis* Morong ex Morong & Britton, *Alternanthera ficoidea* (L.) Sm. subsp. *chacoensis* (Morong ex Morong & Britton) Pedersen, *Alternanthera morongii* Uline, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *chacoensis* (Morong ex Morong & Britton) Pedersen, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *ovata* Chodat, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *robusta* Chodat, *Gomphrena polygonoides* L. Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. subsp. ***paronychioides*** Sin.: *Achyranthes polygonoides* (L.) Lam., *Alternanthera polygonoides* (L.) R. Br. ex Griseb., *Alternanthera polygonoides* (L.) R. Br. ex Sweet, *Illecebrum polygonoides* (L.) L., *Telanthera polygonoides* (L.) Moq. Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, PAI).

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen

Sin.: *Achyranthes pilosa* (Moq.) Standl., *Alternanthera boliviana* Rusby subsp. *amentacea* Suess., *Alternanthera felipponei* Beauverd, *Alternanthera ficoidea* (L.) P. Beauv. f. *aberrans* (Pedersen) Pedersen, *Alternanthera ficoidea* (L.) P. Beauv. f. *pilosa* (Moq.) Pedersen, *Alternanthera ficoidea* (L.) Sm. subsp. *pilosa* (Moq.) Pedersen, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. f. *aberrans* Pedersen, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *amentacea* (Suess.) Suess., *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *pilosa* (Moq.) Suess., *Alternanthera pilosa* Moq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(RGS). PRY(APA, ITA). URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO).

Alternanthera pennelliana Pedersen

Sin.: *Telanthera geniculata* S. Moore

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, PHA).

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**

Sin.: *Achyranthes paludosa* Bunbury, *Achyranthes philoxeroides* (Mart.) Standl., *Alternanthera philoxerina* Suess., *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. f. *acutifolia* (Moq.) Pedersen, *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. f. *angustifolia* Suess.,

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. var. *acutifolia* (Moq.) Hicken, *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *lancifolia* Chodat, *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *luxurians* Suess., *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *obtusifolia* (Mart.) Hicken, *Bucholzia philoxeroides* Mart. var. *acutifolia* Mart., nom. nud., *Bucholzia philoxeroides* Mart. var. *obtusifolia* Mart., nom. illeg., *Bucholzia philoxeroides* Mart. var. *philoxeroides*, *Mogiphanes philoxeroides* D. Parodi, *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *acutifolia* Moq., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *denticulata* Seub., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *linearifolia* Chodat, *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *obtusifolia* (Mart.) Moq.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, MAL, MON).

Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze

Sin.: *Achyranthes porrigens* Jacq., *Alternanthera junciflora* (J. Remy) I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Alternanthera puberula (Mart.) D. Dietr.

Sin.: *Achyranthes puberula* (Mart.) Standl., *Alternanthera adscendens* Suess., *Alternanthera subumbellata* Suess., *Brandesia puberula* Mart., *Pfaffia puberula* (Mart.) Spreng., *Telanthera puberula* (Mart.) Moq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA).

Alternanthera pumila O. Stützer

Sin.: *Alternanthera pumila* O. Stützer var. *coarctata* O. Stützer

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Alternanthera pungens Kunth

Sin.: *Achyranthes leiantha* (Seub.) Standl., *Achyranthes lorentzii* (Uline) Standl., *Achyranthes mucronata* Lam., nom. illeg., *Achyranthes radicans* Cav., nom. illeg., *Achyranthes repens* L., *Alternanthera achyrantha* (L.) R. Br. ex Sweet, nom. illeg., *Alternanthera achyrantha* (L.) R. Br. ex Sweet var. *leiantha* Seub., *Alternanthera echinata* Sm., *Alternanthera leiantha* Alain, *Alternanthera lorentzii* Uline, *Alternanthera pungens* Kunth f. *pauciflora* Suess., *Alternanthera pungens* Kunth var. *leiantha* (Seub.) Suess., *Alternanthera repens* (L.) Link, comb. superfl., *Alternanthera thomensis* Gand., *Celosia echinata* Willd. ex Roem. & Schult., *Desmochaeta sordida* Bunbury, *Guilleminea procumbens* Rojas Acosta, nom. nud., *Illecebrum achyranthum* L., nom. illeg., *Illecebrum obliquum* Schumach. & Thonn., *Illecebrum pungens* (Kunth) Spreng., *Paronychia achyrantha* (L.) Desf., *Pityranthus crassifolius* Mart., *Pupalia sordida* (Bunbury) Moq., *Telanthera pungens* (Kunth) Moq.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APA, APY, CEN, COA, GUA, PHA). URY(MON, PAY).

Alternanthera reineckii Briq.

Sin.: *Achyranthes reineckii* (Briq.) Standl.,
Alternanthera pilosa Moq. f. *petiolata*
 Chodat, *Alternanthera pilosa* Moq. var.
microphylla Chodat
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
 FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN,
 COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI,
 SPE). URY(ART, PAY, RIV, SAO,
 TYT).

Alternanthera rufa (Mart.) D. Dietr.

Sin.: *Achyranthes rufa* (Mart.) Standl.,
Brandesia rufa Mart., *Pfaffia rufa*
 (Mart.) Spreng., *Telanthera rufa*
 (Mart.) Moq., *Telanthera rufa* (Mart.)
 Moq. var. *glabrata* Seub.
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Alternanthera serpens Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC.

Sin.: *Alternanthera denticulata* R. Br.,
Gomphrena sessilis L., *Illecebrum*
sessile (L.) L.
 Hierba. Nativa. 0-600 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(APY).

Alternanthera suessenguthii Covas

Sin.: *Alternanthera australis* Covas,
Alternanthera lorentzii Suess., hom.
 illeg., *Alternanthera negrensis* Suess.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COR, RNE, SLU).

Amaranthus L.

Amaranthus albus L.

Sin.: *Amaranthus graecizans* L. var.
pubescens Uline & W.L. Bray,
Amaranthus pubescens (Uline & W.L.
 Bray) Rydb.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA,
 RNE, SLU). CHL(COQ, RME).
 URY(ART, DUR, MON, PAY, RNO,
 SAO).

Amaranthus asplundii Thell. subsp.
asplundii

Sin.: *Amaranthus affinis* Thell.,
Amaranthus buchtienianus Thell.
 Hierba. Nativa. 2400-3600 m.
 Países: ARG(JUJ, SJU). CHL(LLA).

Amaranthus asplundii Thell. subsp.
australis (Hunz.) N. Bayón

Sin.: *Amaranthus asplundii* Thell. var.
australis Hunz.
 Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Amaranthus blitoides S. Watson

Sin.: *Amaranthus blitoides* S. Watson var.
crassius Jeps., *Amaranthus blitoides*
 S. Watson var. *densifolius* Uline &
 W.L. Bray
 Hierba. Introducida. 2900-3000 m.
 Países: ARG(LPA, RNE, TUC).

Amaranthus blitum L. subsp.
emarginatus (Uline & W.L. Bray)

Carretero, Muñoz Garmendia & Pedrol
 Sin.: *Amaranthus ascendens* Loisel.,
Amaranthus ascendens Loisel. var.
polygonoides (Moq.) Thell.,
Amaranthus blitum L. var. *emarginatus*
 (Uline & W. L. Bray) Lambinon,
Amaranthus blitum L. var.
polygonoides Moq., *Amaranthus*
emarginatus Moq. ex Uline & W.L.
 Bray, *Amaranthus lividus* L. subsp.
polygonoides (Moq.) Probst,

Amaranthus lividus L. var. *ascendens*
 (Loisel.) Thell., *Amaranthus lividus* L.
 var. *polygonoides* (Moq.) Thell.,
Euxolus viridis (L.) Moq. var.
ascendens (Loisel.) Moq.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
 FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,
 RGS, SCA). CHL(TAR, ANT).
 PRY(CEN, COA, MIE, PAI).
 URY(SJO).

Amaranthus blitum L. subsp.
pseudogracilis (Thell.) N. Bayón

Sin.: *Amaranthus blitum* L. var.
pseudogracilis (Thell.) Costea,
Amaranthus emarginatus Uline & W.L.
 Bray subsp. *pseudogracilis* (Thell.)
 Hügin, *Amaranthus lividus* L. f.
pseudogracilis Thell.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, LRI,
 SFE, TUC).

Amaranthus cardenasianus Hunz.

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.
 Países: ARG(SAL).

Amaranthus caudatus L.

Hierba. Introducida.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Amaranthus crispus (Lesp. & Thénau)

A. Braun ex J. M. Coult. & S. Watson
 Sin.: *Amaranthus crispus* N. Terracc.,
Amaranthus cristulatus Speg., *Euxolus*
crispus Lesp. & Thénau
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN,
 RNE, SLU). URY(MON).

Amaranthus deflexus L.

Sin.: *Albersia deflexa* (L.) Fourr.,
Amarantellus argentinus Speg.,
Euxolus deflexus (L.) Raf., *Glomeraria*
deflexa (L.) Cav.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, IDE, JFE). URY(MON).

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

Sin.: *Amaranthus dubius* Mart. ex Thell.
var. *crassispicatus* Suess.,
Amaranthus hybridus L. f. *acicularis* Suess.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(DFE).

Amaranthus hunzikeri Bayón

Hierba. Endémica. 3200-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).

Amaranthus hybridus L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.

Sin.: *Amaranthus cruentus* L., *Amaranthus flavus* L., *Amaranthus paniculatus* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). CHL(MAU, BIO, RME). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, GUA, PAI).

Amaranthus hybridus L. subsp. **hybridus**

Sin.: *Amaranthus bouchonii* Thell.,
Amaranthus chlorostachys Willd.,
Amaranthus hybridus L. subsp. *bouchonii* (Thell.) O. Bolòs & Vigo,
Amaranthus hybridus L. subsp. *incurvatus* (Gren. & Godr.) Brenan,
Amaranthus hybridus L. var. *bouchonii* (Thell.) Lambinon,
Amaranthus hybridus L. var. *chlorostachys* (Willd.) Thell.,
Amaranthus hybridus L. var. *hypochondriacus* (L.) Rob.,
Amaranthus hypochondriacus L. var. *hypochondriacus*,
Amaranthus incurvatus Gren. & Gordon,
Amaranthus patulus Bertol.,

Amaranthus powellii S. Watson subsp. *bouchonii* (Thell.) Costea & Carretero,
Galliardia hybrida (L.) Nieuwl., *Galliardia patula* Bubani

Hierba. Introducida. 0-2400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). PRY(APA, APY, AMA, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON).

Amaranthus hybridus L. subsp. **quitensis** (Kunth) Costea & Carretero

Sin.: *Amaranthus artineanus* Muschl.,
Amaranthus hybridus L. var. *quitensis* (Kunth) Covas,
Amaranthus quitensis Kunth,
Amaranthus quitensis Kunth var. *stuckertianus* Thell.,
Amaranthus retroflexus L. subsp. *quitensis* (Kunth) O. Bolòs & Vigo
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC).

Amaranthus kloosianus Hunz.

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU).

Amaranthus lividus L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(COA).

Amaranthus lombardoi Hunz.

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(CAS, SJO).

Amaranthus looseri Suess.

Hierba. Endémica. 500
Países: CHL(VAL, RME).

Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron.

Sin.: *Euxolus muricatus* Moq.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, PHA). URY(MON).

Amaranthus palmeri S. Watson

Hierba. Introducida.
Países: ARG(COR, LPA, SLU).

Amaranthus pedersenianus Bayón & C. Peláez

Hierba. Endémica. 2800-3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Amaranthus persimilis Hunz.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU).

Amaranthus peruvianus (Schauer) Standl.

Sin.: *Mengea peruviana* Schauer
Hierba. Nativa. 3500-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Amaranthus retroflexus L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, SFE). BRA(PAR, RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APY). URY(SOR).

Amaranthus rosengurtii Hunz.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(ART, FLO, FLA, LAV, RIV).

Amaranthus spinosus L.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, LPA, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, CON).

Amaranthus standleyanus Parodi ex Covas

Sin.: *Amaranthus parodii* Standl., hom. illeg., *Amaranthus vulgarissimus* Thell.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA). URY(MON).

Amaranthus viridis L.

Sin.: *Amaranthus gracilis* Desf. ex Poir., *Chenopodium caudatum* Jacq., *Euxolus caudatus* (Jacq.) Moq., *Euxolus viridis* (L.) Moq., *Glomeraria viridis* (L.) Cav.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, ARA). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Amaranthus vulgarissimus Speg.

Sin.: *Amaranthus ataco* Thell.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, SFE, SJU). URY(PAY).

Celosia L.

Celosia argentea L. f. *argentea*

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN).

Celosia argentea L. f. *cristata* (L.) Schinz

Sin.: *Celosia argentea* L. var. *cristata* (L.)

Kuntze, *Celosia cristata* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(SCA). PRY(AMA, CAN, CEN).

Celosia corymbifera Didr.

Sin.: *Celosia cymosa* Seub.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Celosia grandifolia Moq.

Sin.: *Celosia brasiliensis* Moq.

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chamissoa Kunth, nom. cons.

Chamissoa acuminata Mart.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, SPE).

Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth

Sin.: *Achyranthes altissima* Jacq., *Celosia major* Griseb., *Chamissoa altissima* (Jacq.) Kunth var. *laxiflora* Moq., *Chamissoa macrocarpa* Kunth, *Chamissoa maximiliani* Moq. var. *pubescens* Chodat, nom. nud.

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART).

Chamissoa maximiliani Moq.

Sin.: *Chamissoa acuminata* Mart. var. *maximiliani* (Mart.) Sohmer, *Chamissoa celosioides* Griseb., *Chamissoa maximiliani* Mart., nom. nud., *Chamissoa maximiliani* Moq. f. *celosioides* (Griseb.) Suess.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, GUA, PAI).

Cyathula Blume, nom. cons.

Cyathula prostrata (L.) Blume

Sin.: *Achyranthes prostrata* L.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Froelichia Moench

Froelichia chacoensis Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, BOQ, COA, PHA).

Froelichia paraguayensis Chodat

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: PRY(AMA, CEN, CON, PAI).

Froelichia procera (Seub.) Pedersen

Sin.: *Froelichia lanata* Moq. f. *albiflora* Chodat & Hassl., *Froelichia lanata* Moq. f. *roseiflora* Chodat & Hassl., *Froelichia lanata* Moq. var. *laciniata* Suess., *Froelichia lanata* Moq. var. *paraguayensis* Chodat, *Froelichia lanata* Moq. var. *procera* Seub.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Froelichia tomentosa (Mart.) Moq.

Sin.: *Froelichia tomentosa* (Mart.) Moq. var. *angustialata* Suess., *Oplotheca tomentosa* Mart.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(APY). URY(RNO).

Gomphrena L.**Gomphrena arborescens L. f.**

Sin.: *Bragantia vandelli* Roem. & Schult.,
Gomphrena officinalis Mart., *Xeraea*
arborescens (L. f.) Kuntze
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
 Países: PRY(APA, AMA, CAN).

Gomphrena boliviana Moq.

Sin.: *Alternanthera boliviana* (Moq.) Usteri,
Alternanthera boliviana Rusby,
Gomphrena acrotepala Suess.,
Gomphrena boliviana Moq. f. *leiantha*
 Pedersen, *Gomphrena boliviana* Moq.
 f. *robusta* (Hicken) Pedersen,
Gomphrena boliviana Moq. var.
tarijensis (R.E. Fr.) Pedersen,
Gomphrena globosa L. var. *albiflora*
 Moq., *Gomphrena lanceolata* R.E. Fr.,
Gomphrena tarijensis R.E. Fr., *Iresine*
heliotropifolia (Griseb.) Hicken f.
robusta Hicken, *Xeraea boliviana*
 (Moq.) Kuntze
 Hierba. Nativa.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
 MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
 PRY(APY, BOQ, NAS).

Gomphrena celosioides Mart. var. celosioides

Sin.: *Gomphrena celosioides* Mart. f.
aureiflora (Stuchlik) Pedersen,
Gomphrena celosioides Mart. f.
grandifolia Stuchlik, *Gomphrena*
celosioides Mart. f. *parvifolia* Stuchlik,
Gomphrena celosioides Mart. f.
roseiflora (Stuchlik) Pedersen,
Gomphrena celosioides Mart. f.
suberecta Stuchlik, *Gomphrena*
celosioides Mart. var. *aureiflora*
 Stuchlik, *Gomphrena decumbens*
 Jacq. f. *albiflora* Chodat & Hassl.,
 nom. nud., *Gomphrena decumbens*
 Jacq. f. *aureiflora* Chodat & Hassl.,
 nom. nud., *Gomphrena decumbens*

Jacq. f. *roseiflora* Chodat & Hassl.,
 nom. nud., *Gomphrena decumbens*
 Jacq. var. *albiflora* Stuchlik,
Gomphrena decumbens Jacq. var.
aureiflora Stuchlik, *Gomphrena*
decumbens Jacq. var. *genuina*
 Stuchlik, nom. inval., *Gomphrena*
decumbens Jacq. var. *parvifolia*
 Stuchlik, *Gomphrena decumbens*
 Jacq. var. *roseiflora* Stuchlik,
Gomphrena hygrophila Mart. f.
luteiflora Herzog, *Gomphrena*
hygrophila Mart. f. *subecristata*
 Herzog, *Gomphrena perennis* L. f.
ramosissima Stuchlik, *Xeraea*
celosioides (Mart.) Kuntze
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
 ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
 APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN,
 CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI,
 PHA, SPE). URY(TAC).

Gomphrena celosioides Mart. var. hygrophila (Mart.) Pedersen

Sin.: *Gomphrena hygrophila* Mart.
 Hierba. Nativa.
 Países: PRY(APY, AMA, CEN, CON,
 PAI).

Gomphrena cladotrichoides Suess.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.
 Países: ARG(SJU).

Gomphrena colosacana Hunz. & Subils var. andersonii Subils & Hunz.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
 Países: ARG(SLU).

Gomphrena colosacana Hunz. & Subils var. colosacana

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(LRI).

Gomphrena discolor R.E. Fr.

Hierba. Nativa.
 Países: PRY(APY).

Gomphrena elegans Mart. var. elegans

Sin.: *Gomphrena elegans* Mart. f. *nigro-*
virida Stuchlik, *Gomphrena elegans*
 Mart. var. *clausenioides* Suess.,
Gomphrena elegans Mart. var.
genuina Stuchlik, nom. inval.,
Gomphrena elegans Mart. var.
pseudocristata Stuchlik, *Gomphrena*
hilariana Moq., *Gomphrena viridifolia*
 Suess., *Xeraea elegans* (Mart.) Kuntze
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, SDE,
 TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(APA, APY, CAN, COA, GUA,
 PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA,
 FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SAO,
 SJO, TAC, TYT).

Gomphrena elegans Mart. var. mesopotamica Pedersen

Sin.: *Gomphrena elegans* Mart. var.
orientalis Pedersen
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).
 URY(ART, SAO).

Gomphrena ferruginea Pedersen

Sin.: *Gomphrena ferruginea* Pedersen var.
adusta Pedersen, *Gomphrena*
ferruginea Pedersen var. *rustica*
 Pedersen
 Hierba. Nativa. 1000-3000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gomphrena globosa L.

Sin.: *Xeraea globosa* (L.) Kuntze
 Hierba o subarbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(CAN, CEN).

Gomphrena graminea Moq.

Sin.: *Xeraea graminea* (Moq.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAU, CAN, COA, ITA, MIE, PAI).
URY(RIV).

Gomphrena guaranitica Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, PAI).

Gomphrena haenkeana Mart.

Sin.: *Gomphrena ligulata* Griseb.,
Gomphrena pulchella Mart. f. *nana*
Suess., *Gomphrena pulchella* Mart. f.
simplex Stuchlik, nom. superfl.,
Gomphrena pulchella Mart. var.
haenkeana (Mart.) Suess.,
Gomphrena pulchella Mart. var.
ligulata (Griseb.) Suess., *Gomphrena*
pulchella Mart. var. *rosea* Stuchlik,
Gomphrena pulchella Mart. var. *rosea*
Stuchlik

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,
JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SLU,
TUC). PRY(APY).

Gomphrena holosericea (Mart.) Moq.

Sin.: *Hebanthe holosericea* Mart., *Xeraea*
holosericea (Mart.) Kuntze

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Gomphrena macrocephala A. St.-Hil.

Sin.: *Gomphrena arborescens* L. f. f.
intermedia Stuchlik, *Gomphrena*
macrocephala A. St.-Hil. var.
pulcherrima Chodat, *Gomphrena*
pulcherrima (Chodat) Chodat & Hassl.,
Xeraea macrocephala (A. St.-Hil.)
Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA,
CAU, CAN, CON, GUA, SPE).

Gomphrena martiana Gillies ex Moq.

Sin.: *Gomphrena argentina* Seub.,
Gomphrena glutinosa R.E. Fr.,
Gomphrena martiana Gillies ex Moq. f.
austrina Pedersen, *Gomphrena*
martiana Gillies ex Moq. var. *glutinosa*
(R.E. Fr.) Pedersen, *Gomphrena*
martiana Gillies ex Moq. var.
microcephala Suess., *Iresine*
chenopodioides Chodat, *Philoxerus*
heliotropifolius Griseb., *Xeraea*
argentina (Seub.) Kuntze, *Xeraea*
martiana (Gillies ex Moq.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,
JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU,
SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Gomphrena mendocina (Phil.) R.E. Fr.

subsp. **australis** Pedersen

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU).

Gomphrena mendocina (Phil.) R.E. Fr.

subsp. **mendocina**

Sin.: *Chnoanthus mendocinus* Phil.,
Chnoanthus ovatus Phil., *Gomphrena*
ovata (Phil.) R.E. Fr., *Gomphrena*
tomentosa (Griseb.) R.E. Fr. var. *cana*
Suess., *Gossypianthus tomentosus*
Griseb., *Iresine tomentosa* (Griseb.)
Chodat & Wilczek

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI,
MEN, RNE, SJU).

Gomphrena meyeniana Walp. var.

caulescens E. Holz.

Sin.: *Gomphrena meyeniana* Walp. var.
tucumanensis Pedersen

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gomphrena meyeniana Walp. var.

flaccida Pedersen

Sin.: *Gomphrena meyeniana* Walp. f.
levitepala Pedersen

Hierba. Endémica. 3000-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Gomphrena meyeniana Walp. var.
meyeniana

Sin.: *Gomphrena acaulis* J. Remy,
Gomphrena conwayi Rusby,
Gomphrena meyeniana Walp. var.
acaulis (J. Rémy) Suess., *Gomphrena*
meyeniana Walp. var. *albiflora*
Stuchlik, *Gomphrena meyeniana*
Walp. var. *aureiflora* Stuchlik,
Gomphrena meyeniana Walp. var.
citrina Suess., *Gomphrena meyeniana*
Walp. var. *conwayi* (Rusby) Suess.,
Gomphrena meyeniana Walp. var.
genuina Stuchlik, *Xeraea acaulis* (J.
Remy) Kuntze

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Gomphrena pallida (Suess.) Pedersen

Sin.: *Gomphrena decumbens* Jacq. var.
boliviana Stuchlik, *Gomphrena*
oligocephala J. Remy var. *pallida*
Suess., *Gomphrena pallida* (Suess.)
Pedersen f. *calva* Pedersen,
Gomphrena pallida (Suess.) Pedersen
subsp. *munda* Pedersen, *Gomphrena*
pallida (Suess.) Pedersen var. *diffusa*
Pedersen

Hierba. Nativa. 2000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gomphrena paraguayensis Chodat

Sin.: *Gomphrena elegans* Mart. f.
microcephala Suess., *Gomphrena*
elegans Mart. var. *gracilior* Chodat &
Hassl., *Gomphrena elegans* Mart. var.
microcephala (Suess.) E. Holz.,
Gomphrena elegans Mart. var.
paraguayensis (Chodat) E. Holz.,

- Gomphrena paraguayensis* Chodat
subsp. *chacoensis* Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APY, CAU, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).
- Gomphrena paranensis** R.E. Fr. subsp. **paraguariensis** Pedersen
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(AMA, CEN, MIE, PAI).
- Gomphrena paranensis** R.E. Fr. subsp. **paranensis**
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).
- Gomphrena perennis** L.
Sin.: *Gomphrena cinnabarina* Suess., *Gomphrena perennis* L. f. *parvifolia* Stuchlik, *Gomphrena perennis* L. f. *villosa* (Mart.) Stuchlik, *Gomphrena perennis* L. subsp. *genuina* Stuchlik, nom. inval., *Gomphrena perennis* L. var. *matto grossensis* R.E. Fr., *Gomphrena perennis* L. var. *saxatilis* R.E. Fr., *Gomphrena perennis* L. var. *silenooides* (Chodat) E. Holz., *Gomphrena perennis* L. var. *suffruticosa* (Griseb.) R.E. Fr., *Gomphrena perennis* L. var. *valdecristata* Suess., *Gomphrena silenooides* Chodat, *Gomphrena suffruticosa* Griseb., *Gomphrena villosa* Mart., *Xeraea perennis* (L.) Kuntze, *Xeraea villosa* (Mart.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA). URY(ROC).
- Gomphrena phaeotricha** Pedersen
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Gomphrena platycephala** R.E. Fr.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).
- Gomphrena pohlii** Moq. var. **hasslerii** (Chodat) Pedersen
Sin.: *Gomphrena hasslerii* Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CON, GUA, SPE).
- Gomphrena portulacoides** (A. St.-Hil.) T. Ortuño & Borsch
Sin.: *Blutaparon portulacoides* (A. St.-Hil.) Mears, *Blutaparon portulacoides* (A. St.-Hil.) Mears var. *commersonii* (A. St.-Hil.) Mears, *Iresine portulacoides* (A. St.-Hil.) Moq., *Iresine portulacoides* (A. St.-Hil.) Moq. var. *commersonii* (A. St.-Hil.) Moq., *Philoxerus portulacoides* A. St.-Hil., *Philoxerus portulacoides* A. St.-Hil. var. *commersonii* A. St.-Hil., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *carnosa* Moq.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).
- Gomphrena pulchella** Mart.
Sin.: *Gomphrena perennis* L. var. *rosea* (Griseb.) Stuchlik, *Gomphrena pulchella* Mart. f. *linearifolia* Stuchlik, *Gomphrena pulchella* Mart. subsp. *albisericea* (E. Holz.) Pedersen, *Gomphrena pulchella* Mart. subsp. *rosea* (Griseb.) Pedersen, *Gomphrena pulchella* Mart. var. *albisericea* E. Holz., *Gomphrena pulchella* Mart. var. *bonariensis* Moq., *Gomphrena pulchella* Mart. var. *ecristata* Chodat, *Gomphrena pulchella* Mart. var. *rosea* Stuchlik, *Gomphrena rosea* Griseb.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
- Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO).
- Gomphrena pumila** Gillies ex Moq.
Sin.: *Gomphrena paramillensis* Suess., *Gomphrena pygmaea* Suess., *Xeraea pumila* (Gillies ex Moq.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2000-3600 m.
Países: ARG(MEN, RNE, SJU).
- Gomphrena radiata** Pedersen
Hierba. Endémica. 2600-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Gomphrena regeliana** Seub.
Sin.: *Gomphrena pulchella* Mart. f. *grandifolia* Stuchlik, *Gomphrena regeliana* Seub. f. *albiflora* R.E. Fr., *Xeraea regeliana* (Seub.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).
- Gomphrena riparia** Pedersen
Hierba o subarbusto. Endémica. 100-400 m.
Países: BRA(PAR).
- Gomphrena schlechtendalia** Mart.
Sin.: *Xeraea schlechtendalia* (Mart.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).
Notas: Citada para Uruguay (Siqueira, 1992) sin indicar distribución o material de referencia.
- Gomphrena sellowiana** Mart.
Sin.: *Gomphrena schinziana* Stuchlik, *Gomphrena selloi* Mart., *Xeraea sellowiana* (Mart.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Gomphrena tomentosa (Griseb.) R.E. Fr.
var. **ruiz-lealii** Subils & Hunz.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(COR, LPA, MEN, SJU, SLU).

Gomphrena tomentosa (Griseb.) R.E. Fr.
var. **tomentosa**
Sin.: *Gomphrena demissa* Mart. var. *incana* Moq., *Gomphrena tomentosa* (Griseb.) R.E. Fr. var. *monticola* Pedersen, *Guilleminea tomentosa* (Griseb.) Hosseus
Hierba. Endémica. 400-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Gomphrena triceps Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(TAC).

Gomphrena umbellata J. Remy
Sin.: *Gomphrena pearcei* Oliv., *Xeraea pearcei* (Oliv.) Kuntze, *Xeraea umbellata* (J. Remy) Kuntze
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(TAR).

Gomphrena uruguayensis Suess.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: URY(SAO).

Gomphrena vaga Mart.
Sin.: *Gomphrena gnaphiotricha* Griseb., *Hebanthe vaga* (Mart.) Benth. & Hook., *Xeraea vaga* (Mart.) Kuntze
Subarbusto. Nativa.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).

Gomphrena virgata Mart.
Sin.: *Xeraea virgata* (Mart.) Kuntze
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Gomphrena vitellina Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Guilleminea Kunth

Guilleminea chacoensis Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

Guilleminea densa (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.
Sin.: *Brayulinea australis* (Griseb.) Schinz, *Brayulinea densa* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Small, *Gossypianthus australis* Griseb., *Guilleminea australis* (Griseb.) Hook. f., *Guilleminea densa* (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq. var. *alsinifolia* Moq., *Guilleminea illecebroides* Kunth, *Guilleminea illecebrum* Spreng., *Illecebrum densum* Willd. ex Roem. & Schult.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, DFE, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY).

Guilleminea elongata Mears
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(DUR, SAO, TAC).

Guilleminea fragilis Pedersen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Guilleminea gracilis R.E. Fr.
Sin.: *Brayulinea gracilis* (R.E. Fr.) Schinz, *Guilleminea densa* (Willd. ex Roem. &

Schult.) Moq. var. *gracilis* (R.E. Fr.) Mears
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Guilleminea hirsuta Pedersen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL). PRY(APY).

Hebanthe Mart.

Hebanthe erianthos (Poir.) Pedersen
Sin.: *Gomphrena erianthos* (Poir.) Moq., *Gomphrena paniculata* (Mart.) Moq., *Gomphrena paniculata* (Mart.) Moq. f. *ovatifolia* Heimerl, *Gomphrena paniculata* (Mart.) Moq. var. *glabrata* Seub., *Hebanthe erianthos* (Poir.) Pedersen f. *ovatifolia* (Heimerl) Pedersen, *Hebanthe paniculata* Mart., *Hebanthe virgata* Mart., *Iresine erianthos* Poir., *Iresine paniculata* (Mart.) Spreng., hom. illeg., *Iresine virgata* (Mart.) Spreng., *Pfaffia erianthos* (Poir.) Kuntze, *Pfaffia laurifolia* Chodat, *Pfaffia paniculata* (Mart.) Kuntze, *Pfaffia paniculata* (Mart.) Kuntze f. *lanceolata* R.E. Fr., *Pfaffia paniculata* (Mart.) Kuntze f. *ovatifolia* (Heimerl) R.E. Fr., *Pfaffia paniculata* (Mart.) Kuntze var. *glabrata* (Seub.) O. Stützer, *Pfaffia paraguayensis* Chodat, *Pfaffia paraguayensis* Chodat var. *laurifolia* Chodat, nom. nud., *Pfaffia reticulata* (Seub.) Kuntze var. *strigulosa* Suess.
Liana. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, GUA, ITA, SPE).

Hebanthe occidentalis (R.E. Fr.) Borsch & Pedersen var. **bangii** (R.E. Fr.) Borsch & Pedersen
Sin.: *Pfaffia bangii* R.E. Fr.

Liana. Nativa.

Países: PRY(SPE).

Hebanthe occidentalis (R.E. Fr.) Borsch
& Pedersen var. **occidentalis**

Sin.: *Pfaffia brachiata* Chodat, *Pfaffia brachiata* Chodat var. *grandiflora* O. Stützer, *Pfaffia occidentalis* R.E. Fr., *Pfaffia occidentalis* R.E. Fr. var. *densiflora* R.E. Fr.

Liana. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHA, JUJ, SAL, TUC).
PRY(AMA, CAU, CON, SPE).

Hebanthe pulverulenta Mart.

Sin.: *Pfaffia pulverulenta* (Mart.) Kuntze, *Pfaffia pulverulenta* (Mart.) Kuntze var. *macrodonata* O. Stützer, *Pfaffia pulverulenta* (Mart.) Kuntze var. *rufescens* (Seub.) O. Stützer

Liana. Nativa. 200-3000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hebanthe spicata Mart.

Arbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Herbstia Sohmer

Herbstia brasiliana (Moq.) Sohmer

Sin.: *Banalia brasiliana* Moq., *Chamissoa brasiliana* (Moq.) R.E. Fr.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA).

Iresine P. Browne

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Celosia paniculata* L., *Iresine celosia* L., nom. illeg., *Iresine celosia* L. var. *diffusa* (Humb. & Bonpl.) Suess., *Iresine celosia* L. var. *nicotianoides*

Suess., *Iresine celosoides* L., nom. illeg., *Iresine celosoides* L. var. *macrophylla* Griseb., *Iresine diffusa* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *macrophylla* (Griseb.) Pedersen, *Iresine diffusa* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *spiculigera* (Seub.) Eliasson, *Iresine paniculata* (L.) Kuntze, hom. illeg., *Iresine polymorpha* Mart., *Iresine polymorpha* Mart. var. *effusa* Mart., *Iresine spiculigera* Seub.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, LAV, MAL).

Nitrophila S.Watson

Nitrophila atacamensis (Phil.) Hieron. ex Ulbr.

Sin.: *Glaux atacamensis* Phil.

Hierba. Endémica. 2300-4000 m.

Países: CHL(ANT).

Nitrophila australis Chodat & Wilczek
var. **australis**

Sin.: *Glaux mucronata* Phil., *Nitrophila mucronata* (Phil.) Ulbr.

Hierba. Endémica. 0-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU).

Nitrophila australis Chodat & Wilczek
var. **kunzei** (Ulbr.) A. Soriano

Sin.: *Glaux densiflora* Phil., *Nitrophila densiflora* (Phil.) Ulbr., *Nitrophila kunzei* Ulbr.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Pedersen Holub

Pedersen **hassleriana** (Chodat)
Pedersen

Sin.: *Iresine hassleriana* Chodat

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, COA).

Pedersen **macrophylla** (R.E. Fr.) Holub

Sin.: *Iresine guaranítica* Chodat, *Iresine hassleriana* Chodat var. *macrophylla* (R.E. Fr.) Suess., *Iresine macrophylla* R.E. Fr., *Trommsdorffia macrophylla* (R.E. Fr.) Pedersen

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, PHA).

Pfaffia Mart.

Pfaffia denudata (Moq.) Kuntze

Sin.: *Gomphrena denudata* Moq.

Hierba o arbusto. Nativa. 1000-1400 m.

Países: BRA(PAR).

Pfaffia fruticulosa Suess. var. **diffusa**
Pedersen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CON, SPE).

Pfaffia fruticulosa Suess. var. **fruticulosa**

Subarbusto. Endémica.

Países: PRY(APY).

Pfaffia glabrata Mart.

Sin.: *Gomphrena glabrata* (Mart.) Moq., *Gomphrena glabrata* (Mart.) Moq. var. *angustifolia* Seub., *Gomphrena glabrata* (Mart.) Moq. var. *latifolia* Seub., *Pfaffia glabrata* Mart. var. *angustifolia* (Seub.) O. Stützer, *Pfaffia glabrata* Mart. var. *latifolia* (Seub.) O. Stützer

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN).

Pfaffia gleasonii Suess.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, GUA, PAI).

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen

Sin.: *Alternanthera glauca* Hosseus, *Gomphrena dunaliana* Moq., *Gomphrena glauca* (Mart.) Moq., *Gomphrena luzuliflora* (Mart.) Moq., *Gomphrena stenophylla* Spreng., *Iresine glomerata* Spreng., *Iresine luzuliflora* (Mart.) Griseb., *Mogiphanes dunaliana* (Moq.) Griseb., *Mogiphanes glauca* (Mart.) Griseb., *Pfaffia divergens* O. Stützer, *Pfaffia dunaliana* (Moq.) Schinz, *Pfaffia glabrescens* Suess., *Pfaffia glauca* (Mart.) Spreng., *Pfaffia glomerata* (Spreng.) Pedersen var. *squarrosa* (O. Stützer) Pedersen, *Pfaffia iresinoides* (Kunth) Spreng. var. *angustifolia* O. Stützer, *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D. Dietr., *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D. Dietr. f. *gracilis* O. Stützer, *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D. Dietr. f. *virgata* O. Stützer, *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D. Dietr. subsp. *squarrosa* O. Stützer, *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D. Dietr. var. *elliptica* O. Stützer, *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D. Dietr. var. *microcephala* O. Stützer ex Suess., *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D. Dietr. var. *paniculata* O. Stützer, *Pfaffia stenophylla* (Spreng.) Stuchlik, *Pfaffia stenophylla* (Spreng.) Stuchlik var. *albiramea* Chodat, nom. nud., *Pfaffia stenophylla* (Spreng.) Stuchlik var. *basilignosa* Chodat, *Sertuenera glauca* Mart., *Sertuenera luzulaeflora* Mart.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(SJO).

Pfaffia gnaphaloides (L. f.) Mart.

Sin.: *Celosia gnaphaloides* L. f., *Gomphrena gnaphaloides* (L. f.) Vahl ex Roem. & Schult., *Gomphrena gnaphaloides* (L. f.) Vahl ex Roem. & Schult. var. *planifolia* Seub., *Gomphrena lanata* Poir., nom. illeg., *Gomphrena lanata* Poir. var. *latifolia* Seub., *Gomphrena lanata* Poir. var. *oblongifolia* Moq., *Gomphrena lanata* Poir. var. *parvifolia* Moq., *Gomphrena perennis* L. var. *brunnea* Stuchlik, *Gomphrena phagnaloides* Griseb., *Gomphrena poiretiana* Roem. & Schult., *Oplothea poiretiana* (Schult.) Mart., *Pfaffia gnaphaloides* (L. f.) Mart. var. *planifolia* (Seub.) O. Stützer, *Pfaffia lanata* Gibert, *Pfaffia lanata* Gibert f. *parvifolia* (Moq.) O. Stützer, *Pfaffia lanata* Gibert var. *discolor* Suess., *Pfaffia lanata* Gibert var. *latifolia* (Seub.) O. Stützer, *Pfaffia lanata* Gibert var. *oblongifolia* (Moq.) O. Stützer, *Pfaffia lanata* Gibert var. *peteriana* Kuntze, *Pfaffia poiretiana* (Schult.) Stuchlik, *Pfaffia tenuis* N.E. Br., *Pfaffia tomentosa* Mart., *Xeraea phagnaloides* (Griseb.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, ÑEE). URY(ART, LAV, MAL, MON, SJO, TAC).

Pfaffia helichrysoides (Mart.) Kuntze

Sin.: *Gomphrena gnaphaloides* (L. f.) Vahl ex Roem. & Schult. var. *floccosa* Seub., *Gomphrena helichrysoides* Moq., *Pfaffia gnaphaloides* (L. f.) Mart. f. *subferruginea* O. Stützer, *Pfaffia*

gnaphaloides (L. f.) Mart. var. *floccosa* (Seub.) O. Stützer

Hierba. Nativa.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAU, GUA).

Pfaffia jubata Mart.

Sin.: *Gomphrena jubata* (Mart.) Moq.

Hierba. Nativa. 500-1700 m.

Países: BRA(PAR).

Pfaffia ninae Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(ART).

Pfaffia nudicaulis Suess.

Hierba. Endémica. 400-700 m.

Países: PRY(AMA).

Pfaffia tuberosa (Spreng.) Hicken

Sin.: *Gomphrena sericea* Spreng., *Gomphrena tuberosa* Spreng., *Gomphrena tuberosa* Spreng. var. *glabrescens* (Mart.) Moq., *Gomphrena tuberosa* Spreng. var. *sericea* (Mart.) Seub., *Gomphrena tuberosa* Spreng. var. *vestita* (Mart.) Moq., *Pfaffia sericea* Mart., *Pfaffia sericea* Mart. f. *glabrescens* (Mart.) O. Stützer, *Pfaffia sericea* Mart. f. *vestita* (Mart.) O. Stützer, *Pfaffia sericea* Mart. var. *glabrescens* Mart., nom. illeg., *Pfaffia sericea* Mart. var. *paraguariensis* Chodat, *Pfaffia tuberosa* (Spreng.) Hicken f. *rubella* Pedersen

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, MAL, SAO, TAC).

Pseudoplantago Suess.

Pseudoplantago friesii Suess.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Quaternella Pedersen**Quaternella glabratoides** (Suess.) Pedersen

Sin.: *Gomphrena glabratoides* (Suess.) J.C. Siqueira, *Pfaffia glabratoides* Suess.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

AMARYLLIDACEAE**Agapanthus** L'Hér., nom. cons.**Agapanthus africanus** (L.) Hoffmanns.

Sin.: *Agapanthus umbellatus* L'Hér., *Crinum africanum* L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI).

Allium L.**Allium ampeloprasum** L.

Sin.: *Allium ampeloprasum* L. var. *porrum* (L.) J. Gay, *Allium porrum* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, ERI, LRI).

Allium cepa L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, COS, JUJ, SAL).

Allium schoenoprasum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, TDF).

Allium triquetrum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA).

Allium vineale L. var. **compactum** (Thuill.) Lej. & Courtois

Sin.: *Allium compactum* Thuill.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(ARA).

Allium vineale L. var. **vineale**

Hierba. Introducida.

Países: CHL(ARA).

Amaryllis L.**Amaryllis belladonna** L.

Sin.: *Amaryllis paranaensis* Traub, *Amaryllis rosea* Lam., *Brunsvigia rosea* (Lam.) Hannibal, *Hippeastrum paranaense* (Traub) Meerow

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, JFE). PRY(APY).

Atacamallium Nic. García**Atacamallium minutiflorum** R. Pinto & Nic. García

Hierba. Endémica. 700-1000 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Beauverdia Herter**Beauverdia dialystemon** (Guagl.) Sassone & Guagl.

Sin.: *Ipheion dialystemon* Guagl., *Nothoscordum dialystemon* (Guagl.) Crosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(FLA, MON).

Beauverdia hirtella (Kunth) Herter subsp. **glabrata** Deble

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Beauverdia hirtella (Kunth) Herter subsp. **hirtella**

Sin.: *Beauverdia subssesilis* (Beauverd) Herter, *Brodiaea hirtella* (Kunth) Baker, *Ipheion hirtellum* (Kunth) Traub, *Ipheion subsessile* (Beauverd) Traub, *Milla hirtella* (Kunth) Baker, *Nothoscordum canescens* Beauverd, *Nothoscordum hirtellum* (Kunth) Herter, *Nothoscordum subsessile* Beauverd, *Tristagma hirtellum* (Kunth) Traub, *Triteleia hirtella* Kunth

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(LAV, MAL, MON, RIV, ROC).

Beauverdia hirtella (Kunth) Herter subsp. **lorentzii** (Herter) Sassone & Guagl.

Sin.: *Beauverdia lorentzii* Herter, *Ipheion lorentzii* (Herter) Traub, *Nothoscordum felipponei* Beauverd subsp. *lorentzii* (Herter) Ravenna, *Nothoscordum hirtellum* (Kunth) Herter subsp. *lorentzii* (Herter) Ravenna, *Nothoscordum lorentzii* (Herter) Ravenna, *Tristagma lorentzii* (Herter) Traub

Hierba. Endémica.

Países: ARG(COS, ERI).

Beauverdia sellowiana (Kunth) Herter

Sin.: *Beauverdia felipponei* (Beauverd) Herter, *Brodiaea felipponei* (Beauverd) Herter, *Brodiaea sellowiana* (Kunth) Baker, *Ipheion felipponei* (Beauverd) Traub, *Ipheion sellowianum* (Kunth) Traub, *Milla sellowiana* (Kunth) Baker, *Nothoscordum felipponei* Beauverd,

Tristagma felipponei (Beauverd)
 Traub, *Tristagma sellowianum* (Kunth)
 Traub, *Triteleia sellowiana* Kunth
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(ERI). URY(FLA, LAV, MAL, MON, SJO, SOR).
 Notas: Cita dudosa para Brasil (Sassone et al., 2014)

Beauverdia vittata (Griseb.) Herter

Sin.: *Beauverdia lloydiflora* (Beauverd)
 Herter, *Brodiaea vittata* (Griseb.)
 Baker, *Ipheion lloydiflorum* (Beauverd)
 Traub, *Ipheion vittatum* (Griseb.)
 Traub, *Milla vittata* Griseb.,
Nothoscordum lloydiflorum Beauverd,
Nothoscordum uniflorum Baker,
Nothoscordum vittatum (Griseb.)
 Ravenna, *Tristagma lloydiflorum*
 (Beauverd) Traub, *Tristagma vittatum*
 (Griseb.) Traub
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).
 URY(CAS, LAV, MAL, MON, RNO, TAC).

Chlidanthus Herb.

Chlidanthus marginatus (R.E. Fr.)
 Ravenna
 Sin.: *Amaryllis marginata* (R.E. Fr.) Traub
 & Uphof, *Castellanoa marginata* (R.E. Fr.)
 Traub, *Hippeastrum marginatum*
 R.E. Fr., *Sanmartina marginata* (R.E. Fr.)
 Traub
 Hierba. Endémica. 3400-3600 m.
 Países: ARG(JUJ).

Chlidanthus yaviensis (Ravenna)
 Ravenna
 Sin.: *Castellanoa yaviensis* Ravenna
 Hierba. Endémica. 3300-3400 m.
 Países: ARG(JUJ).

Clinanthus Herb.

Clinanthus humilis (Herb.) Meerow
 Sin.: *Clitanthes humilis* Herb., *Crocopsis fulgens* Pax,
Stenomesson acaule Kraenzl., *Stenomesson humile* (Herb.)
 Baker, *Zephyranthes pseudocolchicum* Kraenzl.
 Hierba. Nativa. 3000-4200 m.
 Países: ARG(JUJ, TUC). CHL(TAR).

Crinum L.

Crinum americanum L.
 Sin.: *Crinum erubescens* Aiton, *Crinum salsum* Ravenna
 Hierba. Nativa. 100-1000 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PAI).

Crinum x powellii Hort. ex Baker
 Hierba. Introducida.
 Países: ARG(COR)

Gethyum Phil.

Gethyum atropurpureum Phil.
 Sin.: *Solaria atropurpurea* (Phil.) Ravenna,
Solaria major Reiche
 Hierba. Endémica. 300-1500 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Gethyum cuspidatum (Harv. ex Baker)
 M. Muñoz
 Sin.: *Ancrumia cuspidata* Harv. ex Baker,
Solaria cuspidata (Harv. ex Baker)
 Ravenna
 Hierba. Endémica. 100-200 m.
 Países: CHL(COQ, VAL).

Gilliesia Lindl.

Gilliesia dimera Ravenna
 Hierba. Endémica. 600-800 m.
 Países: CHL(MAU).

Gilliesia graminea Lindl.
 Sin.: *Gilliesia curicana* Ravenna, *Gilliesia gaudichaudiana* Kunth
 Hierba. Endémica. 0-900 m.
 Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Gilliesia isopetala Ravenna
 Hierba. Endémica. 1000-1700 m.
 Países: CHL(LBO).

Gilliesia montana Poepp. & Endl.
 Sin.: *Gilliesia monophylla* Reiche, *Gilliesia nahuelbutae* Ravenna,
Miersia scalae Gunkel
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Hieronymiella Pax

Hieronymiella aurea Ravenna
 Sin.: *Hieronymiella tintinensis* Hunz. & Cocucci
 Hierba. Endémica. 2000-3200 m.
 Países: ARG(SAL).

Hieronymiella cachiensis Ravenna
 Hierba. Endémica. 2900-3000 m.
 Países: ARG(SAL).

Hieronymiella caletensis Ravenna
 Hierba. Endémica. 2000-2800 m.
 Países: ARG(JUJ).

Hieronymiella clidanthoides Pax
 Hierba. Endémica. 500-2200 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Hieronymiella marginata (Pax) Hunz.Sin.: *Androstefanos tarijensis* Fern.Casas & R. Lara, *Eustephia argentina*Pax, *Eustephia latifolia* (R.E. Fr.)Traub, *Eustephia marginata* Pax,*Eustephia pamiana* Stapf,*Eustephiopsis latifolia* R.E. Fr.,*Eustephiopsis marginata* (Pax) R.E.Fr., *Eustephiopsis marginata* (Pax)R.E. Fr. subsp. *latifolia* (R.E. Fr.)Ravenna, *Hieronymiella angacoana*Ravenna, *Hieronymiella argentina*

(Pax) Hunz. & S.C. Arroyo,

Hieronymiella ferruginea Ravenna,*Hieronymiella latifolia* (R.E. Fr.) DiFulvio & Hunz., *Hieronymiella**marginata* (Pax) Hunz. var. *latifolia*(R.E. Fr.) Hunz., *Hieronymiella**pamiana* (Stapf) Hunz., *Hieronymiella**tarijensis* (Fern. Casas & R. Lara)

Fern. Casas

Hierba. Nativa. 1500-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,

TUC).

Hieronymiella speciosa (R.E. Fr.) Hunz.Sin.: *Eustephia speciosa* (R.E. Fr.) Traub,*Eustephiopsis speciosa* R.E. Fr.,*Hieronymiella vittata* Ravenna

Hierba. Endémica. 2600-3900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Hippeastrum Herb., nom. cons.**Hippeastrum aglaiae** (A. Cast.) Hunz. &

Cocucci

Sin.: *Amaryllis aglaiae* A. Cast.

Hierba. Endémica. 1200-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hippeastrum angustifolium PaxSin.: *Amaryllis angustifolia* (Pax) Traub &Uphof, *Amaryllis canterai* (Arechav.)Traub & Uphof, *Hippeastrum canterai*Arechav., *Sprekelia spectabilis*

Hoehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,

RGS). PRY(PAI). URY(RIV, TAC).

Hippeastrum argentinum (Pax) Hunz.Sin.: *Amaryllis argentina* (Pax) Ravenna,*Amaryllis candida* (Stapf) Traub &Uphof, nom. illeg., *Amaryllis**immaculata* Traub & Moldenke,*Amaryllis tucumana* (E. Holmb.) Traub& Uphof, *Crinum argentinum* Pax,*Hippeastrum candidum* Stapf,*Hippeastrum tucumanum* E. Holmb.

Hierba. Endémica. 600-2600 m.

Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL,

TUC).

Hippeastrum aulicum (Ker Gawl.) Herb.Sin.: *Amaryllis aulica* Ker Gawl., *Amaryllis**aulica* Ker Gawl. var. *platypetala*Lindl., *Amaryllis heuseriana* (H. Karst.)Ravenna, *Aulica platypetala* (Lindl.)Raf., *Hippeastrum heuserianum* H.

Karst.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citado para Paraguay (Traub &

Moldenke 1949) sin indicar localidad ni

material de referencia.

Hippeastrum blossfeldiae (Traub & L.J.

Doran) Van Scheepen

Sin.: *Amaryllis blossfeldiae* Traub & L.J.

Doran

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hippeastrum breviflorum Herb.Sin.: *Amaryllis breviflora* (Herb.) Traub &

Uphof

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Hippeastrum cybister (Herb.) Benth. ex

Baker

Sin.: *Lepidopharynx deflexa* Rusby,*Sprekelia cybister* Herb.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Hippeastrum escoipense Slanis &

Huaylla

Hierba. Endémica. 1800-1900 m.

Países: ARG(SAL).

Hippeastrum euryphyllum (Ravenna)

W.A. Medina & Roitman

Sin.: *Amaryllis euryphylla* Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Hippeastrum glaucescens (Mart. ex

Schult. & Schult. f.) Herb

Sin.: *Amaryllis aviflora* Ravenna, *Amaryllis**curitibana* Ravenna, *Amaryllis**glaucescens* Mart. ex Schult. & Schult.f., *Amaryllis hemographes* Ravenna,*Amaryllis iguazuana* Ravenna,*Amaryllis illustris* Vell., *Amaryllis**rubropicta* Ravenna, *Amaryllis**teyucuarensis* Ravenna, *Hippeastrum**aviflorum* (Ravenna) Dutilh,*Hippeastrum curitibanum* (Ravenna)Dutilh, *Hippeastrum hemographes*(Ravenna) Dutilh, *Hippeastrum**iguazuuanum* (Ravenna) T.R. Dudley &M. Williams, *Hippeastrum illustre*(Vell.) Dutilh, *Hippeastrum rubropictum*(Ravenna) Meerow, *Hippeastrum**teyucuarensis* (Ravenna) Van

Scheepen

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA).

Hippeastrum laklano Campos-Rocha &

M. Peixoto

Hierba. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Hippeastrum marumbiense (Ravenna) Van Scheepen
Sin.: *Amaryllis marumbiensis* Ravenna
Hierba. Endémica. 1300
Países: BRA(PAR).

Hippeastrum morelianum Lem.
Sin.: *Amaryllis moreliana* (Lem.) Traub
Hierba. Endémica. 900-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Hippeastrum multiflorum H. Büneker, K. Soares & L.C. Assis
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Hippeastrum papilio (Ravenna) Van Scheepen
Sin.: *Amaryllis papilio* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Hippeastrum parodii Hunz. & Cocucci
Sin.: *Amaryllis parodii* (Hunz. & Cocucci) Traub
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, SLU).

Hippeastrum psittacinum (Ker Gawl.) Herb.
Sin.: *Amaryllis psittacina* Ker Gawl.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Hippeastrum ramboi R. Bastian & H. Büneker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Hippeastrum reginae (L.) Herb.
Sin.: *Amaryllis reginae* L.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Hippeastrum reticulatum (L'Hér.) Herb.
Sin.: *Amaryllis reticulata* L'Hér.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Hippeastrum santacatarina (Traub) Dutilh
Sin.: *Amaryllis santacatarina* Traub
Hierba. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hippeastrum striatum (Lam.) H. E. Moore
Sin.: *Amaryllis arboricola* Ravenna, *Amaryllis argilgae* Traub, *Amaryllis flammigera* (E. Holmb.) Traub & Uphof, *Amaryllis gertiana* Ravenna, *Amaryllis petiolata* (Pax) Traub & Uphof, *Amaryllis rutila* Ker Gawl., *Amaryllis striata* Lam., *Hippeastrum arboricola* (Ravenna) Meerow, *Hippeastrum argilgae* (Traub) Dutilh, *Hippeastrum bulbulosum* Herb. var. *rutilum* (Ker Gawl.) Herb., *Hippeastrum flammigerum* E. Holmb., *Hippeastrum gertianum* (Ravenna) Dutilh, *Hippeastrum petiolatum* Pax, *Hippeastrum rutilum* (Ker Gawl.) Herb.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(COL, MON, RNO, SJO, SOR).

Hippeastrum verdianum H. Büneker & R. Bastian
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb.
Sin.: *Amaryllis guarapuavica* Ravenna, *Amaryllis harrisonii* Lindl., *Amaryllis lineata* Colla, *Amaryllis vittata* L'Hér., *Amaryllis vittata* L'Hér. subsp. *guarapuavae* Ravenna, *Amaryllis vittata* L'Hér. var. *tweediana* (Herb.) Traub, *Hippeastrum ambiguum* Herb.,

Hippeastrum ambiguum Herb. var. *tweedianum* Herb., *Hippeastrum arechavaletae* Baker, *Hippeastrum guarapuavicum* (Ravenna) Van Scheepen, *Hippeastrum harrisonii* (Lindl.) Hook. f.
Hierba. Nativa. 1000
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, GUA).

Ipheion Raf.

Ipheion recurvifolium (C.H. Wright) Traub
Sin.: *Brodiaea recurvifolia* C.H. Wright, *Brodiaea sessiliflora* (Baker) Baker, *Tristagma recurvifolium* (C.H. Wright) Traub
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, MON, SJO).

Ipheion setaceum (Baker) Traub
Sin.: *Milla setacea* Baker, *Nothoscordum setaceum* (Baker) Ravenna, *Tristagma setaceum* (Baker) Traub
Hierba. Endémica.
Países: ARG(TUC).

Ipheion tweedieanum (Baker) Traub
Sin.: *Brodiaea tweedieana* (Baker) Hicken, *Brodiaea uniflora* (Lindl.) Engl. var. *tweediana* (Baker) Baker, *Milla tweedieana* (Baker) Griseb., *Milla uniflora* (Lindl.) Graham ex Jameson var. *tweedieana* Baker, *Tristagma tweedieana* (Baker) Traub
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). URY(RNO).

Ipheion uniflorum (Graham) Raf.
Sin.: *Beauverdia uniflora* (Lindl.) Herter, *Brodiaea uniflora* (Lindl.) Engl., *Hookera uniflora* (Lindl.) Kuntze, *Leucocoryne uniflora* (Lindl.) Greene,

Milla bonariensis Gillies ex Baker,
Milla uniflora Graham, *Tristagma*
peregrinans Ravenna, *Tristagma*
uniflorum (Lindl.) Traub, *Triteleia*
uniflora Lindl.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS).
 URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON,
 RNO, RIV, ROC, SJO, SOR).

Latace Phil.

Latace andina (Poepp.) Sassone f. **andina**

Sin.: *Allium poeppigii* Kunth, *Latace*
volkmannii Phil., *Leucocoryne*
volkmannii (Phil.) Engl., *Leucocoryne*
volkmannii (Phil.) Engl. ex Traub,
 comb. superfl., *Nothoscordum*
andinum (Poepp.) Fuentes,
Nothoscordum brevispathum Phil.,
Nothoscordum poeppigii Fuentes,
Nothoscordum sellowianum Kunth var.
brevispathum (Phil.) Fuentes,
Nothoscordum strictum Gay,
Ornithogalum andinum Poepp.,
Zoellnerallium andinum (Poepp.)
 Crosa

Hierba. Endémica. 1500-3500 m.

Países: ARG(JUU, MEN, NEU, SJU).
 CHL(VAL, LBO, LLA, RME).

Latace andina (Poepp.) Sassone f. **lutea** (Ravenna) Sassone

Sin.: *Nothoscordum andinum* (Poepp.)
 Fuentes f. *luteum* Ravenna
 Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
 Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,
 RME).

Latace serenense (Ravenna) Sassone

Sin.: *Nothoscordum serenense* Ravenna
 Hierba. Endémica. 300-500 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Leucocoryne Lindl.

Leucocoryne alliacea Miers ex Lindl.

Sin.: *Leucocoryne angustipetala* Gay,
Leucocoryne reflexa Grau
 Hierba. Endémica. 900-2200 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
 BIO, ARA, LLA, RME).

Leucocoryne angosturae Ravenna

Hierba. Endémica.
 Países: CHL(RME).

Leucocoryne appendiculata Phil.

Hierba. Endémica. 400-800 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Leucocoryne arrayanensis Ravenna

Hierba. Endémica. 1700-2500 m.
 Países: CHL(RME).

Leucocoryne candida Ravenna

Hierba. Endémica. 700-800 m.
 Países: CHL(LBO).

Leucocoryne codehuensis Ravenna

Hierba. Endémica.
 Países: CHL(LBO).

Leucocoryne conconensis Ravenna

Hierba. Endémica. 0-100 m.
 Países: CHL(VAL).

Leucocoryne conferta Zoellner

Hierba. Endémica. 200-1200 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

Leucocoryne conostyla Ravenna

Hierba. Endémica.
 Países: CHL(COQ).

Leucocoryne coquimbensis F. Phil. ex Phil.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.
 Países: CHL(COQ, VAL).

Leucocoryne curacavina Ravenna

Hierba. Endémica.
 Países: CHL(RME).

Leucocoryne dimorphopetala (Gay) Ravenna

Sin.: *Leucocoryne gayii* Baker, nom.
 superfl., *Tristagma dimorphopetala*
 Gay
 Hierba. Endémica. 0-1200 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Leucocoryne editiana Ravenna

Hierba. Endémica. 2200
 Países: CHL(COQ).

Leucocoryne fragrantissima Ravenna

Hierba. Endémica. 1500
 Países: CHL(RME).

Leucocoryne fuscostriata Ravenna

Hierba. Endémica.
 Países: CHL(COQ).

Leucocoryne gilliesioides (Phil.) Ravenna

Sin.: *Erinna gilliesioides* Phil.
 Hierba. Endémica. 1400-1600 m.
 Países: CHL(RME).

Leucocoryne inclinata Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1000 m.
 Países: CHL(COQ).

Leucocoryne incrassata Phil.

Sin.: *Chrysocoryne incrassata* (Phil.)
 Zoellner, *Leucocoryne coronata*
 Ravenna, *Leucocoryne narcisoides*
 Phil., *Pabellonia incrassata* (Phil.)
 Quezada & Martic., *Stemmatium*
narcisoides Phil.
 Hierba. Endémica. 0-400 m.
 Países: CHL(ANT, ATA).

Leucocoryne ixioides (Sims) Lindl.

Sin.: *Brodiaea ixioides* Sims, *Leucocoryne pauciflora* Phil.

Hierba. Endémica. 800-1100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Leucocoryne leucogyna Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL).

Leucocoryne lilacea Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, VAL).

Leucocoryne lituensis Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO).

Leucocoryne lurida Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Leucocoryne macropetala Phil.

Sin.: *Chrysocoryne oxypetala* (Phil.) Zoellner, *Leucocoryne oxypetala* Phil., *Pabellonia oxypetala* (Phil.) Quezada & Martic.

Hierba. Endémica. 800

Países: CHL(ATA, COQ).

Leucocoryne mauleensis Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU).

Leucocoryne modesta Ravenna

Hierba. Endémica. 1300

Países: CHL(VAL).

Leucocoryne mollensis Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Leucocoryne montana Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL).

Leucocoryne odorata Lindl.

Sin.: *Leucocoryne foetida* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(VAL, MAU).

Leucocoryne pachystyla Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL).

Leucocoryne porphyrea Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1500 m.

Países: CHL(COQ).

Leucocoryne praealta Ravenna

Hierba. Endémica. 1000-1200 m.

Países: CHL(VAL).

Leucocoryne purpurea Gay

Sin.: *Leucocoryne ixioides* (Sims) Lindl. var. *purpurea* (Gay) Baker

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Leucocoryne quilmarina Ravenna

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(COQ).

Leucocoryne roblesiana Ravenna

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.

Países: CHL(VAL).

Leucocoryne rungensis Ravenna

Hierba. Endémica. 900-1100 m.

Países: CHL(RME).

Leucocoryne simulans Ravenna

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.

Países: CHL(COQ).

Leucocoryne subulata Ravenna

Hierba. Endémica. 2000

Países: CHL(RME).

Leucocoryne taguataguensis Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO).

Leucocoryne talinensis L. Mansur & M.

Cisternas

Hierba. Endémica. 200-300 m.

Países: CHL(COQ).

Leucocoryne tricornis Ravenna

Hierba. Endémica. 2000

Países: CHL(RME).

Leucocoryne unguifera Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO).

Leucocoryne valparadisea Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL).

Leucocoryne violascens Phil.

Hierba. Endémica. 300-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Leucocoryne vittata Ravenna

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Leucojum L.

Leucojum vernum L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(JFE).

Miersia Lindl.

Miersia chilensis Lindl.

Sin.: *Miersia chilensis* Lindl. var. *bicolor* M.

Muñoz, *Miersia major* Kunth, *Miersia*

minor Kunth, *Miersia myodes* Bertero,

Miersia rusbyi Britton

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

Miersia cornuta Phil.

Hierba. Endémica. 700-900 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Miersia leporina Ravenna

Hierba. Endémica. 500-800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Miersia putaendensis A. Cádiz-Véliz

Hierba. Endémica. 800-1000 m.

Países: CHL(VAL).

Miersia raucoana J.E. Sepúlveda & Nic.

García

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(MAU).

Miersia stellata C. Cuevas & Nic. García

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(RME).

Miersia tenuiseta RavennaSin.: *Miersia tenuiseta* Ravenna f. *castanea* Ravenna

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Nothoscordum Kunth**Nothoscordum achalense** Ravenna

Hierba. Endémica. 700-2300 m.

Países: ARG(COR).

Nothoscordum albitractum Ravenna

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(JUU).

Nothoscordum altillanense Ravenna & BiurrunSin.: *Nothoscordum famatinense* Ravenna

Hierba. Endémica. 1600-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).

Nothoscordum andicola KunthSin.: *Allium andicola* (Kunth) Regel, *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *andicola* (Kunth) Kuntze, *Milla andicola* (Kunth) Baker

Hierba. Nativa. 3000-4100 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Nothoscordum aparadense Ravenna

Hierba. Endémica. 1500

Países: BRA(SCA).

Nothoscordum arenarium Herter

Hierba. Endémica. 200-2500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LRI, SLU, SFE). URY(COL, MON, RNO, SJO).

Nothoscordum auratum Ravenna

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: URY(MON).

Nothoscordum balaenense Ravenna

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: URY(MAL).

Nothoscordum basalticum Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Nothoscordum bivalve (L.) Britton var. **bivalve**Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze, *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *sellowianum* (Kunth) Kuntze, *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *striatum* (Jacq.) Kuntze, *Allium ornithogaloides* Walter, *Allium striatum* Jacq., *Geboscon bivalve* (L.) House, *Nothoscordum flavescens* Kunth, *Nothoscordum sellowianum* Kunth, *Nothoscordum striatum* (Jacq.) Kunth, *Oligosma bivalve* (L.) Salisb., *Ornithogalum bivalve* L.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, NEU). CHL(VAL). URY(LAV, MON).

Nothoscordum bivalve (L.) Britton var. **nanum** (Griseb.) Guagl.Sin.: *Allium striatellum* Lindl. var. *nanum* Griseb.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI).

Nothoscordum boliviense Ravenna

Hierba. Nativa. 2300-3500 m.

Países: ARG(JUU, TUC).

Nothoscordum bonariense (Pers.) BeauverdSin.: *Gagea bonariensis* (Pers.) Roem. & Schult., *Nothoscordum spathaceum* (Poir.) Parodi, *Ornithogalum bonariense* Pers., *Ornithogalum spathaceum* Poir., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, NEU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, ROC, SOR).

Nothoscordum capivarinum Ravenna

Hierba. Endémica. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

Nothoscordum carambolense RavennaSin.: *Nothoscordum glareosum* Ravenna, *Nothoscordum tuyutiense* Ravenna, *Nothoscordum umburucuyanum* Ravenna

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(COS).

Nothoscordum catharinense Ravenna

Hierba. Endémica. 1700-1900 m.

Países: BRA(SCA).

Nothoscordum clevelandicum Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Nothoscordum conostylum Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.

- Países: ARG(ERI).
- Nothoscordum correntinum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum cuyanum** Ravenna
Hierba. Endémica. 1600-3000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
- Nothoscordum dynamiandrum** Ravenna
Sin.: *Nothoscordum tafiense* Ravenna
Hierba. Nativa. 1600-4000 m.
Países: ARG(JUU, TUC).
- Nothoscordum elongatum** Deble & B.P. Moreira
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum exile** Ravenna
Sin.: *Nothoscordum curvipes* Ravenna
Hierba. Endémica. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum gaudichaudianum** Kunth
Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *gaudichaudianum* (Kunth) Kuntze, *Nothoscordum beauverdianum* Herter, nom. nud., *Nothoscordum collinum* Ravenna, *Nothoscordum grossibulbum* Beauverd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(LAV, MAL, MON, ROC).
- Nothoscordum gibbatum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).
- Nothoscordum gracile** (Aiton) Stearn var. **gracile**
Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *fragrans* (Vent.) Kuntze, *Allium fragrans* Vent., *Allium gracile* Aiton,
- Geboscon fragrans* (Vent.) House, *Hesperocles fragrans* (Vent.) Salisb., *Maligia gracilis* (Aiton) Raf., *Nothoscordum borbonicum* Kunth, *Nothoscordum castilloi* T.M. Howard, *Nothoscordum fragrans* (Vent.) Kunth, *Nothoscordum inodorum* (Aiton) G. Nicholson, *Nothoscordum nidulans* Phil.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, RNE, SJU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(ITA). URY(COL, MAL, MON, SJO).
- Nothoscordum gracilipes** Ravenna
Sin.: *Nothoscordum ibiramense* Ravenna
Hierba. Endémica. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Nothoscordum gramineum** (Sims) Beauverd var. **gramineum**
Sin.: *Allium striatellum* Lindl., *Nothoscordum striatellum* (Lindl.) Kunth, *Ornithogalum gramineum* Sims
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(MAL).
- Nothoscordum gramineum** (Sims) Beauverd var. **philippianum** (Koch & Bouché) Beauverd
Sin.: *Nothoscordum philippianum* Koch & Bouché
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).
- Nothoscordum inundatum** Ravenna
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(COR, COS).
- Nothoscordum ipacarainum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
- Países: PRY(COA).
- Nothoscordum itatiense** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum izaguirreae** Crosa
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(LAV).
- Nothoscordum luteomajus** Ravenna
Hierba. Endémica. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum macrantherum** (Kuntze) Beauverd
Sin.: *Allium macrantherum* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, PAI).
- Nothoscordum macrostemon** Kunth
Sin.: *Milla macrostemon* (Kunth) Baker, *Milla macrostemon* (Kunth) Baker var. *gracilis* (Dryand. ex Aiton) Baker, *Nothoscordum gracile* (Aiton) Stearn var. *macrostemon* (Kunth) Guagl., *Nothoscordum inodorum* (Aiton) G. Nicholson subsp. *angustius* Ravenna, *Nothoscordum inodorum* (Aiton) G. Nicholson subsp. *nocturnum* Ravenna, *Nothoscordum inodorum* (Aiton) G. Nicholson var. *macrostemon* (Kunth) Beauverd, *Nothoscordum inodorum* (Aiton) G. Nicholson var. *uruguayense* Beauverd, *Nothoscordum planifolium* Ravenna, *Sowerbaea americana* Spreng. ex Baker
Hierba. Nativa. 200-1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA). URY(FLA, LAV, MAL, MON, RIV, SJO, TYT).
- Nothoscordum mahui** Traub
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(RME).

- Nothoscordum marchesii** Crosa
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ROC).
- Nothoscordum moconense** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS).
- Nothoscordum modestum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY.
- Nothoscordum montevidense** Beauverd
subsp. **latitepalum** (Guagl.) Ravenna
Sin.: *Nothoscordum montevidense*
Beauverd var. *latitepalum* Guagl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA). URY(FLA).
- Nothoscordum montevidense** Beauverd
subsp. **minarum** (Beauverd) Ravenna
Sin.: *Nothoscordum minarum* Beauverd,
Nothoscordum montevidense
Beauverd var. *minarum* (Beauverd)
Guagl.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, TAC).
- Nothoscordum montevidense** Beauverd
subsp. **montevidense**
Sin.: *Allium bonariense* (Pers.) Griseb.,
Allium bonariense (Pers.) Griseb. var.
flavum Kuntze, *Milla aurea* (Lindl.)
Baker, *Nothoscordum aureum* (Lindl.)
I.M. Johnst. & Parodi, *Triteleia aurea*
Lindl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SFE).
BRA(RGS). URY(COL, LAV, MAL, MON, RIV, SJO, SOR).
- Nothoscordum muscorum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum nublense** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).
- Nothoscordum nudicaule** (Lehm.)
Guagl.
Sin.: *Allium euosmon* Link & Otto, *Allium nudicaule* Lehm., *Nothoscordum entrerianum* Ravenna, *Nothoscordum euosmum* (Link & Otto) Kunth, *Nothoscordum inodorum* (Aiton) G. Nicholson var. *euosmum* (Link & Otto) Beauverd, *Nothoscordum rigidiscapum* Ravenna
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MEN). BRA(RGS). URY(LAV, MAL, MON, RIV, SJO).
- Nothoscordum nudum** Beauverd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). URY(LAV, MAL).
- Nothoscordum ostenii** Beauverd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(PAY).
- Nothoscordum pachyrhizum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CLA).
- Nothoscordum paradoxum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(DUR).
- Nothoscordum parvum** Deble & B.P. Moreira
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum patricium** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum pedersenii** Ravenna
Hierba. Endémica. 100-200 m.
- Países: ARG(COS).
- Nothoscordum portoalegrense** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum punillense** Ravenna
Hierba. Endémica. 1000-2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, SJU, SLU).
- Nothoscordum saltense** Ravenna
Sin.: *Nothoscordum calderense* Ravenna,
Nothoscordum vigilense Ravenna,
Nothoscordum yalaense Ravenna
Hierba. Endémica. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Nothoscordum scabridulum** Beauverd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(LAV).
- Nothoscordum sengesianum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum stenandrum** Ravenna
Sin.: *Nothoscordum cambarensense* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Nothoscordum tenuifolium** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).
- Nothoscordum tibaginum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum uruguaianum** Ravenna
Sin.: *Nothoscordum leptogynum* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum urutaense** Deble & H.A. Keller

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Nothoscordum velazcoense Ravenna

Hierba. Endémica. 2400-3500 m.
Países: ARG(LRI).

Nothoscordum yatainum Ravenna

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS).

Paposo Nic. García

Paposo laeta (Phil.) Nic. García

Sin.: *Amaryllis uniflora* (Phil.) Traub & Uphof, *Eremolirion laetum* (Phil.) Nic. García, *Hippeastrum uniflorum* (Phil.) Baker, *Rhodolirium laetum* (Phil.) Ravenna, *Rhodophiala laeta* Phil., *Rhodophiala uniflora* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Phycella Lindl.

Phycella amoena (Phil.) Nic. García

Sin.: *Placea amoena* Phil.
Hierba. Endémica. 800-2000 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Phycella angustifolia Phil.

Sin.: *Amaryllis philippiana* Traub & Uphof, *Hippeastrum angustifolium* (Phil.) Phil., comb. illeg.
Hierba. Endémica. 800-2200 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Phycella arzae (Phil.) Nic. García

Sin.: *Placea arzae* Phil., *Placea germainii* Phil. subsp. *arzae* (Phil.) Ravenna
Hierba. Endémica. 300-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Phycella australis Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Phycella chilensis (L'Hér.) Grau ex Nic. García

Sin.: *Amaryllis atacamensis* Traub & Uphof, *Amaryllis biflora* (Phil.) Traub & Moldenke, *Amaryllis chilensis* L'Hér., *Amaryllis coccinea* Molina, *Amaryllis linearifolia* Molina, *Amaryllis pratensis* Poepp., *Habranthus chilensis* (L'Hér.) Herb., *Habranthus pratensis* (Poepp.) Herb., *Habranthus speciosus* Herb., *Hippeastrum chilense* (L'Hér.) Baker, *Hippeastrum pratense* (Poepp.) Baker, *Myostemma pratensis* (Poepp.) Ravenna, *Placea pratensis* F. Phil., nom. nud., *Rhodolirium chilense* (L'Hér.) Ravenna, *Rhodolirium speciosum* (Herb.) Ravenna, *Rhodophiala biflora* Phil., *Rhodophiala chilensis* (L'Hér.) Traub, *Rhodophiala pratensis* (Poepp.) Traub, *Rhodophiala volckmannii* Phil.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, MAU, BIO, LLA).

Phycella cyrtanthoides (Sims) Lindl.

Sin.: *Amaryllis cyrtanthoides* Sims, *Amaryllis demissa* Steud., *Amaryllis ignea* Lindl., *Hippeastrum igneum* (Lindl.) Muñoz, *Phycella magnifica* Herb.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Phycella davidii (Ravenna) Nic. García

Sin.: *Placea davidii* Ravenna
Hierba. Endémica. 1300-1500 m.
Países: CHL(RME).

Phycella fulgens (Hook. f.) Nic. García

Sin.: *Amaryllis fulgens* (Hook. f.) Traub & Uphof, *Habranthus fulgens* Hook. f., *Hippeastrum fulgens* (Hook. f.) Phil., *Rhodolirium fulgens* (Hook. f.) Ravenna, *Rhodophiala fulgens* (Hook. f.) Traub
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(LLA).

Phycella germainii (Phil.) Nic. García

Sin.: *Placea germainii* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Phycella lutea (Phil.) Nic. García

Sin.: *Placea germainii* Phil. subsp. *lutea* (Phil.) Ravenna, *Placea lutea* Phil.
Hierba. Endémica. 700-1300 m.
Países: CHL(VAL).

Phycella maulensis (Ravenna) Nic. García & J.M. Watson

Sin.: *Famatina maulensis* Ravenna, *Miltinea maulensis* (Ravenna) Ravenna
Hierba. Endémica. 1500-2200 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU).

Phycella ornata (Miers) Nic. García

Sin.: *Placea grandiflora* Lem., *Placea ornata* Miers ex Lindl.
Hierba. Endémica. 900-1700 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Phycella scarlatina Ravenna

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Rhodolirium Phil.

Rhodolirium andicola (Poepp.) Ravenna

Sin.: *Amaryllis andicola* Poepp., *Amaryllis purpurata* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus andicola* (Poepp.) Herb.,

Hippeastrum andicola (Poepp.) Baker,
Hippeastrum purpuratum Phil.,
Rhodophiala andicola (Poepp.) Traub,
Rhodophiala purpurata (Phil.) Traub,
Zephyranthes andicola (Poepp.) Baker
 Hierba. Endémica. 1200-1800 m.
 Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO,
 ARA, LLA).

Rhodolirium montanum Phil.

Sin.: *Amaryllis popetana* (Phil.) Traub &
 Uphof, *Amaryllis rhodolirion* (Baker)
 Traub & Uphof, *Hippeastrum*
popetatum Phil., *Hippeastrum*
rhodolirion (Phil.) Baker, *Rhodolirium*
andinum Phil., *Rhodophiala popetana*
 (Phil.) Traub, *Rhodophiala rhodolirion*
 (Baker) Traub
 Hierba. Endémica. 2000-2700 m.
 Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO,
 MAU, RME).

Rhodophiala C. Presl

Rhodophiala bakeri (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis bakeri* (Phil.) Traub &
 Uphof, *Habranthus bakeri* Phil.
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(MAU, ARA).

Rhodophiala colonum (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis colonum* (Phil.) Traub &
 Uphof, *Hippeastrum colonum* Phil.
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(ARA).

Rhodophiala consobrina (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis consobrina* (Phil.) Traub &
 Uphof, *Hippeastrum consobrinum* Phil.
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(RME).

Rhodophiala flava (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis flava* (Phil.) Traub & Uphof,
Amaryllis solisii (Phil.) Traub & Uphof,

Habranthus flavus Phil., *Hippeastrum*
solisii Phil.

Hierba. Endémica. 2000

Países: CHL(MAU, BIO).

Rhodophiala lineata (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis lineata* (Phil.) Traub &
 Uphof, hom. illeg., *Habranthus lineatus*
 Phil., *Hippeastrum lineatum* (Phil.)
 Baker
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(RME).

Rhodophiala rosea (Sweet) Traub

Sin.: *Amaryllis barlowii* Traub & Moldenke,
Amaryllis rosea (Sweet) Traub &
 Uphof, *Habranthus roseus* Sweet,
Hippeastrum roseum (Sweet) Baker,
Zephyranthes purpurea Phil.
 Hierba. Endémica. 300-1800 m.
 Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Schickendantziella Speg.

Schickendantziella trichosepala (Speg.)

Speg.
 Sin.: *Schickendantzia trichosepala* Speg.
 Hierba. Nativa. 2500-3000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Solaria Phil.

Solaria curacavina Ravenna

Hierba. Endémica.
 Países: CHL(RME).

Solaria miersioides Phil.

Sin.: *Solaria attenuata* Ravenna, *Solaria*
brevicoalita Ravenna
 Hierba. Endémica. 900-2300 m.
 Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO,
 RME).

Speea Loes.

Speea humilis (Phil.) Loes. ex E.H.L. Krause

Sin.: *Speea triloba* Ravenna
 Hierba. Endémica. 600-1800 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Traubia Moldenke

Traubia modesta (Phil.) Ravenna

Sin.: *Amaryllis modesta* (Phil.) Traub &
 Uphof, *Hippeastrum modestum* (Phil.)
 Baker, *Lapiedra chilensis* F. Phil.,
Rhodophiala modesta Phil., *Traubia*
chilensis (F. Phil.) Moldenke
 Hierba. Endémica. 0-100 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

Tristagma Poepp.

Tristagma ameghinoi (Speg.) Speg.

Sin.: *Brodiaea ameghinoi* Speg.
 Hierba. Endémica. 0-3300 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).
 CHL(MAU, AIS, MAG).

Tristagma anemophilum Ravenna

Hierba. Endémica. 2200
 Países: ARG(MEN, NEU).

Tristagma berteroi (Kunth) S.C. Arroyo & Sassone

Sin.: *Brodiaea gaudichaudiana* (Kunth)
 Fuentes, *Tristagma berteroi* Phil., nom.
 nud., *Triteleia berteroi* Kunth, *Triteleia*
gaudichaudiana Kunth
 Hierba. Endémica. 0-800 m.
 Países: CHL(VAL).

Tristagma bivalve (Hook. ex Lindl.) Traub

Sin.: *Milla brevipes* (Kunze) Baker,
Tristagma brevipes (Kunze) Traub,
Triteleia bivalvis Hook. ex Lindl.,
Triteleia brevipes Kunze
 Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
 MAU, BIO, ARA, RME).

Tristagma circinatum (Sandwith) Traub
 Sin.: *Brodiaea circinata* Sandwith,
Tristagma sociale Ravenna
 Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
 Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO).

Tristagma gracile (Phil.) Traub
 Sin.: *Brodiaea philippiana* Baker, *Ipheion*
gracile (Phil.) Traub, *Triteleia gracilis*
 Phil.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(BIO, ARA).

Tristagma graminifolium (F. Phil. ex
 Phil.) Ravenna
 Sin.: *Garaventia graminifolia* (Phil.)
 Looser, *Nothoscordum graminifolium*
 (Phil.) Traub, *Steinmannia graminifolia*
 F. Phil. ex Phil.
 Hierba. Endémica. 600-700 m.
 Países: CHL(VAL, RME).

Tristagma nivale Poepp. f. **australe**
 (Neger ex Dusén) Ravenna
 Sin.: *Tristagma australis* Neger ex Dusén,
Tristagma inflatum Rendle, *Tristagma*
pulchella Speg.
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Tristagma nivale Poepp. f. **nivale**
 Sin.: *Milla nivalis* (Poepp.) Baker,
Tristagma chubutense Gand.,
Tristagma eremophillum Speg.,
Tristagma fragrans Ravenna,
Tristagma nivale Poepp. var.
angustifolia Neger, *Tristagma philippii*
 Gand.

Hierba. Endémica. 300-3200 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
 TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO,
 ARA, MAG, RME).

Tristagma patagonicum (Baker) Traub
 Sin.: *Brodiaea patagonica* (Baker) Baker,
Brodiaea patagonica Speg., hom.
 illeg., *Brodiaea spegazzinii* Macloskie,
Brodiaea viridior Killip, *Ipheion*
spegazzinii (Macloskie) Traub, *Ipheion*
viridius (Killip) Traub, *Milla patagonica*
 Baker, *Tristagma atreucoense*
 Ravenna, *Tristagma malalhuense*
 Ravenna, *Tristagma nahuelhuapinum*
 Ravenna, *Tristagma spegazzinii*
 (Macloskie) Traub, *Tristagma viridior*
 (Killip) Traub, *Triteleia patagonica*
 (Speg.) Speg. var. *angustiloba* Speg.,
Triteleia patagonica Speg.
 Hierba. Endémica. 0-3000 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
 SCR). CHL(LLA, AIS).

Tristagma poeppigianum (Gay) Traub
 Sin.: *Milla poeppigiana* (Gay) Baker,
Triteleia poeppigiana Gay
 Hierba. Endémica. 2400
 Países: CHL(RME).
 Notas: Cita dudosa para la Flora
 Argentina

Tristagma porrifolium (Poepp.) Traub
 Sin.: *Brodiaea porrifolia* (Poepp.) F.
 Meigen, *Milla porrifolia* (Poepp.)
 Baker, *Triteleia porrifolia* Poepp.
 Hierba. Endémica. 0-1100 m.
 Países: CHL(VAL, BIO).

Tristagma sessile (Phil.) Traub
 Sin.: *Brodiaea sessilis* (Phil.) F. Meigen,
Ipheion sessile (Phil.) Traub, *Milla*
leichtlinii Baker, *Tristagma leichtlinii*
 (Baker) Ravenna, *Triteleia sessilis*
 Phil.
 Hierba. Endémica. 1900-2100 m.

Países: CHL(MAU, RME).

Tristagma staminosum Ravenna
 Hierba. Endémica. 1800
 Países: CHL(LBO, MAU).

Tristagma violaceum (Kunth) Traub
 Sin.: *Brodiaea violacea* (Kunth) Baker,
Ipheion violaceum (Kunth) Traub, *Milla*
violacea (Kunth) Baker, *Triteleia*
violacea Kunth
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: CHL(BIO).

Zephyranthes Herb., nom. cons.

Zephyranthes advena (Ker Gawl.) Nic.
 García
 Sin.: *Amaryllis advena* Ker Gawl.,
Amaryllis valparadisiaca Steud.,
Chlidanthus cumingii C. Presl,
Habranthus hesperius Herb.,
Habranthus pallidus G. Lodd., nom.
 inval., *Hippeastrum advenum* (Ker
 Gawl.) Herb., *Myostemma advena*
 (Ker Gawl.) Ravenna, *Rhodophiala*
advena (Ker Gawl.) Traub
 Hierba. Endémica. 1400
 Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).

Zephyranthes amambaica (Ravenna)
 Nic. García & Meerow
 Sin.: *Habranthus amambaicus* Ravenna
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA).

Zephyranthes americana (Hoffmanns.)
 Ravenna
 Sin.: *Haylockia americana* (Hoffmanns.)
 Herter, *Haylockia americana*
 (Hoffmanns.) Traub, comb. superfl.,
Haylockia pusilla Herb., *Sternbergia*
americana Hoffmanns., *Zephyranthes*
pusilla (Herb.) D. Dietr.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI).
BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA,
MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO,
SOR, TAC, TYT).

Zephyranthes amoena Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Zephyranthes ananuca (Phil.) Nic.
García

Sin.: *Amaryllis ananuca* (Phil.) Traub &
Uphof, *Hippeastrum ananuca* Phil.,
Myostemma ananuca (Phil.) J.M.
Watson & A.R. Flores, *Rhodophiala*
ananuca (Phil.) Traub
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Zephyranthes andalgalensis (Ravenna)
S.C. Arroyo

Sin.: *Habranthus andalgalensis* Ravenna
Hierba. Endémica. 500-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, SJU).

Zephyranthes andina (R.E. Fr.) Traub

Sin.: *Haylockia andina* R.E. Fr.
Hierba. Nativa. 2500-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Zephyranthes araucana (Phil.) Nic.
García

Sin.: *Amaryllis araucana* (Phil.) Traub &
Uphof, *Hippeastrum araucanum* Phil.,
Myostemma araucana (Phil.)
Ravenna, *Rhodophiala araucana*
(Phil.) Traub
Hierba. Endémica. 900-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU,
BIO, ARA).

Zephyranthes aurata (Ravenna) Nic.
García & Meerow

Sin.: *Habranthus auratus* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(PHA).

Zephyranthes bagnoldii (Herb.) Nic.
García

Sin.: *Amaryllis bagnoldii* (Herb.) D. Dietr.,
Habranthus bagnoldii Herb.,
Hippeastrum bagnoldii (Herb.) Baker,
Hippeastrum bagnoldii (Herb.) Baker
var. *minor* Speg., *Myostemma*
bagnoldii (Herb.) J.M. Watson & A.R.
Flores, *Rhodophiala bagnoldii* (Herb.)
Traub
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Zephyranthes barrosiana (Hunz. & Di
Fulvio) S.C. Arroyo

Sin.: *Habranthus barrosianus* Hunz. & Di
Fulvio
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Zephyranthes berteriana (Phil.) Nic.
García

Sin.: *Amaryllis berteriana* (Phil.) Traub &
Uphof, *Habranthus berterianus* Phil.,
Hippeastrum berterianum (Phil.)
Baker, *Myostemma berteriana* (Phil.)
Ravenna, *Rhodophiala berteriana*
(Phil.) Traub
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO).

Zephyranthes bifida (Herb.) Nic. García
& Meerow

Sin.: *Amaryllis bifida* (Herb.) Spreng.,
Amaryllis bifida (Herb.) Spreng. var.
pulchra (Herb.) Traub & Moldenke,
Amaryllis bifida (Herb.) Spreng. var.
spathacea (Herb.) Traub & Moldenke,
Amaryllis bonariensis (Kuntze) Traub
& Uphof, *Amaryllis granatiflora* (E.
Holmb.) Traub & Uphof, *Amaryllis*
platensis (E. Holmb.) Traub & Uphof,
Amaryllis pulchra (Herb.) Traub &
Uphof, *Habranthus angustus* Herb.,
Habranthus bifidus Herb., *Habranthus*
pulcher Herb., *Habranthus spathaceus*

Herb., *Hippeastrum bifidum* (Herb.)
Baker, *Hippeastrum bonariense*
Kuntze, *Hippeastrum granatiflorum* E.
Holmb., *Hippeastrum platense* E.
Holmb., *Hippeastrum platense* E.
Holmb. var. *angustum* (Herb.) E.
Holmb., *Hippeastrum pulcher* (Herb.)
E. Holmb., *Myostemma bifida* (Herb.)
Ravenna, *Myostemma bifida* (Herb.)
Ravenna f. *granatiflora* (E. Holmb.)
Ravenna, *Phycella bonariensis*
(Kuntze) Traub, *Phycella granatiflora*
(E. Holmb.) Traub, *Rhodophiala bifida*
(Herb.) Traub, *Rhodophiala bifida*
(Herb.) Traub subsp. *aemantha*
Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.)
Traub subsp. *granatiflora* (E. Holmb.)
Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.)
Traub subsp. *purpurea* Ravenna,
Rhodophiala bifida (Herb.) Traub var.
pulchra (Herb.) Traub, *Rhodophiala*
bifida (Herb.) Traub var. *spathacea*
(Herb.) Traub
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(ITA). URY(CAS,
COL, CLA, MAL, MON, PAY, RNO,
ROC, SJO, TAC).

Zephyranthes blumenavia (K. Koch &
C.D. Bouché ex Carrière) Nic. García
& Dutilh

Sin.: *Amaryllis blumenavia* (K. Koch &
C.D. Bouché ex Carrière) Traub &
Uphof, *Amaryllis iguapensis* (R.
Wagner) Traub & Uphof, *Eithea*
blumenavia (K. Koch & C.D. Bouché
ex Carrière) Ravenna, *Griffinia*
blumenavia K. Koch & C.D. Bouché ex
Carrière, *Hippeastrum blumenavia* (K.
Koch & C.D. Bouché ex Carrière)
Sealy, *Hippeastrum iguapense* R.
Wagner
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Zephyranthes brachyandra (Baker) Backer
Sin.: *Habranthus brachyandrus* (Baker) Sealy, *Hippeastrum brachyandrum* Baker, *Zephyranthes porphyrospila* E. Holmb.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, MIS, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).

Zephyranthes caaguazuensis (Ravenna) Nic. García & Meerow
Sin.: *Habranthus caaguazuensis* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CON).

Zephyranthes caerulea (Griseb.) Baker
Sin.: *Amaryllis caerulea* Griseb., *Habranthus caeruleus* (Griseb.) Traub
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MAL, RNO, ROC, SAO, SJO).

Zephyranthes calderensis (Ravenna) Nic. García & S.C. Arroyo
Sin.: *Habranthus calderensis* Ravenna
Hierba. Endémica. 1200-1400 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Zephyranthes candida (Herb. ex Lindl.) Herb.
Sin.: *Amaryllis candida* Herb. ex Lindl., *Amaryllis nivea* Schult. f., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MON, SAO, SJO, SOR).

Zephyranthes capivarina Ravenna
Hierba. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(PAR).

Zephyranthes carinata Herb.
Sin.: *Amaryllis carinata* (Herb.) Spreng., *Zephyranthes grandiflora* Lindl., nom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, TUC).

Zephyranthes chacoensis (Ravenna) S.C. Arroyo
Sin.: *Habranthus chacoensis* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA). PRY(PHA).

Zephyranthes cisandina (Ravenna) Nic. García
Sin.: *Famatina cisandina* Ravenna
Hierba. Endémica. 1800-2200 m.
Países: CHL(MAU, RME).

Zephyranthes comunelloi R. Bastian & H. Büneker
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Zephyranthes concinna (Ravenna) R.S. Oliveira & Dutilh
Sin.: *Habranthus concinnus* Ravenna
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Zephyranthes correntina (Roitman, A. Castillo & M.R. Barrios) Nic. García & S.C. Arroyo
Sin.: A. Castillo & M.R. Barrios, *Habranthus correntinus* Roitman
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS).

Zephyranthes crassibulba (Ravenna) S.C. Arroyo
Sin.: *Habranthus crassibulbus* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SDE).

Zephyranthes diluta Ravenna
Hierba. Endémica. 700-2700 m.

Países: ARG(SJU).

Zephyranthes elwesii (C.H. Wright) Nic. García
Sin.: *Amaryllis elwesii* (C.H. Wright) Traub & Uphof, *Hippeastrum elwesii* C.H. Wright, *Myostemma elwesii* (C.H. Wright) Ravenna, *Rhodophiala elwesii* (C.H. Wright) Traub
Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU).

Zephyranthes estensis (Ravenna) Nic. García & S.C. Arroyo
Sin.: *Habranthus estensis* Ravenna, *Hippeastrum estense* (Ravenna) Christenh. & Byng
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: URU (MAL).

Zephyranthes filifolia Herb. ex Kraenzl.
Hierba. Endémica. 200-1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SFE).

Zephyranthes flavissima Ravenna
Sin.: *Zephyranthes fluvialis* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Zephyranthes gilliesiana (Herb.) Nic. García
Sin.: *Habranthus bagnoldianus* Herb. var. *gilliesianus* Herb., *Habranthus mendocinus* Phil., *Myostemma gilliesiana* (Herb.) Ravenna, *Rhodophiala mendocina* (Phil.) Ravenna, *Zephyranthes cuyana* Nic. García
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

Zephyranthes graciliflora (Herb.) Nic. García

Sin.: *Amaryllis gladioloides* (Hieron.) Traub & Uphof, *Amaryllis herbertiana* (Lindl.) Traub & Uphof, *Famatina herbertiana* (Lindl.) Ravenna, *Famatina saxatilis* Ravenna, *Habranthus gladioloides* Hieron., *Hippeastrum gladioloides* (Hieron.) Pax, *Hippeastrum herbertianum* (Lindl.) Baker, *Phycella graciliflora* Herb., *Phycella herbertiana* Lindl., *Rhodophiala gladioloides* (Hieron.) Traub, *Rhodophiala herbertiana* (Lindl.) Hunz., *Zephyranthes capitata* Nic. García, nom. superfl. & illeg. Hierba. Endémica. 1200-3200 m. Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Zephyranthes gracilifolia (Herb.) G. Nicholson

Sin.: *Amaryllis gracilis* Spreng., *Habranthus gracilifolius* Herb., *Hippeastrum gracilifolium* (Herb.) Baker, *Zephyranthes gracilifolia* (Herb.) G. Nicholson var. *bijou* E. Holmb., *Zephyranthes gracilifolia* (Herb.) G. Nicholson var. *bulula* E. Holmb. Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI, COR, COS, SFE). BRA(PAR, RGS). URY(MAL, RIV).

Zephyranthes gratissima Ravenna

Hierba. Endémica. 0-1000 m. Países: BRA(PAR).

Zephyranthes guachipensis (Ravenna) S.C. Arroyo

Sin.: *Habranthus guachipensis* Ravenna Hierba. Endémica. Países: ARG(SAL).

Zephyranthes ischihualasta (Ravenna) S.C. Arroyo

Sin.: *Habranthus ischihualastus* Ravenna Hierba. Endémica. Países: ARG(SJU).

Zephyranthes jamesonii (Baker) Nic. García & S.C. Arroyo

Sin.: *Amaryllis jamesonii* (Baker) Traub & Uphof, *Habranthus jamesonii* (Baker) Ravenna, *Habranthus melanopotamicus* (Speg.) Fabris, *Hippeastrum jamesonii* Baker, *Rhodophiala jamesonii* (Baker) Traub & Uphof, *Zephyranthes melanopotamica* Speg. Hierba. Endémica. 0-3000 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU).

Zephyranthes laeta (Phil.) Nic. García

Sin.: *Amaryllis laeta* (Phil.) Traub & Uphof, *Amaryllis tiltiensis* Traub & Moldenke, *Hippeastrum laetum* Phil., *Myostemma tiltiensis* (Traub & Moldenke) Ravenna, *Rhodophiala tiltiensis* (Traub & Moldenke) Traub Hierba. Endémica. 200-1200 m. Países: CHL(VAL, RME).

Zephyranthes lagesiana Ravenna

Hierba. Endémica. 1000 Países: BRA(SCA).

Zephyranthes leonensis (Ravenna) S.C. Arroyo

Sin.: *Habranthus leonensis* Ravenna Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: PRY(APY).

Zephyranthes longistyla Pax

Hierba. Endémica. 1000-1500 m. Países: ARG(COR, SDE, SLU).

Zephyranthes maculata (L'Hér.) Nic. García

Sin.: *Amaryllis maculata* L'Hér., *Myostemma maculata* (L'Hér.)

Ravenna, *Rhodophiala maculata* (L'Hér.) Ravenna Hierba. Endémica. 0-300 m. Países: CHL(ARA).

Zephyranthes magnoi (Ravenna) S.C. Arroyo

Sin.: *Habranthus magnoi* Ravenna Hierba. Endémica. Países: ARG(COR).

Zephyranthes martinezii (Ravenna) Nic. García

Sin.: *Habranthus martinezii* Ravenna Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI, ERI, SAL). Notas: Citada para Uruguay (Arroyo, 1990) sin indicar distribución o material de referencia.

Zephyranthes mataca (Ravenna) S.C. Arroyo

Sin.: *Habranthus matacus* Ravenna Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(FOR).

Zephyranthes mendocensis Baker

Sin.: *Habranthus mendocensis* (Baker) Sealy, *Habranthus reedii* Traub, nom. illeg. Hierba. Endémica. Países: ARG(MEN).

Zephyranthes mesochloa Herb.

Sin.: *Amaryllis entreriana* O. Hoffm., *Amaryllis hassleriana* Chodat & Lendn., *Amaryllis mesochloa* (Herb. ex Lindl.) Steud., *Habranthus jujuyensis* (E. Holmb.) Traub, *Zephyranthes acuminata* Herb., *Zephyranthes bakeriana* Morong, *Zephyranthes entreriana* (O. Hoffm.) Pax, *Zephyranthes flavescens* Herb., *Zephyranthes hassleriana* (Chodat & Lendn.) Traub, *Zephyranthes jujuyensis* E. Holmb., *Zephyranthes*

- jujuyensis* E. Holmb. var. *volcanica* E. Holmb., *Zephyranthes kurtzii* Hunz. & Cocucci, *Zephyranthes modesta* Ravenna, *Zephyranthes oxipetala* Speg., *Zephyranthes stenopetala* Baker, *Zephyranthes timida* E. Holmb. Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, COA, SPE). URY(ART, RIV).
- Zephyranthes microstigma** Ravenna Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: BRA(RGS).
- Zephyranthes minima** Herb. Sin.: *Amaryllis minima* (Herb.) Griseb., *Zephyranthes hieronymi* Pax, *Zephyranthes minima* Herb. subsp. *hexandra* Ravenna, *Zephyranthes rositae* Herter Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, DUR, FLA, MON, PAY, SJO).
- Zephyranthes moelleri** (Phil.) Nic. García Sin.: *Amaryllis moelleri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Hippeastrum moelleri* Phil., *Rhodophiala moelleri* (Phil.) Traub Hierba. Endémica. 900-1000 m. Países: CHL(ARA).
- Zephyranthes monantha** (Ravenna) Nic. García Sin.: *Myostemma monantha* Ravenna Hierba. Endémica. 0-1400 m. Países: CHL(LBO, MAU).
- Zephyranthes montana** (Phil.) Nic. García Sin.: *Amaryllis montana* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus montanus* Phil., *Hippeastrum montanum* (Phil.) Baker, *Myostemma montana* (Phil.) Ravenna, *Rhodophiala montana* (Phil.) Traub Hierba. Endémica. 1700-2200 m. Países: ARG(NEU). CHL(MAU, ARA).
- Zephyranthes neumannii** (Roitman, A. Castillo & Maza) Nic. García & S.C. Arroyo Sin.: *Habranthus neumannii* Roitman A. Castillo & Maza Hierba. Endémica. 400-600 m. Países: ARG(JUJ).
- Zephyranthes oranensis** (Ravenna) S.C. Arroyo Sin.: *Habranthus oranensis* Ravenna Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(SAL).
- Zephyranthes paranaensis** Ravenna Hierba. Endémica. 600-1100 m. Países: BRA(PAR).
- Zephyranthes pedunculosa** (Herb.) Nic. García & S.C. Arroyo Sin.: *Habranthus concordiae* Ravenna, *Habranthus holmbergii* (Hicken) Traub., *Habranthus juncifolius* Traub & W. Hayw., *Habranthus paxii* Traub, *Habranthus pedunculatus* Herb., *Habranthus teretifolius* (C.H. Wright) Traub & Moldenke, *Habranthus unifolius* (Arechav.) Traub, *Hippeastrum holmbergii* Hicken, *Hippeastrum pedunculatum* (Herb.) E. Holmb., *Hippeastrum teretifolium* C.H. Wright, *Hippeastrum tubispathum* Pax, hom. illeg., *Hippeastrum tubispathum* Pax var. *grandiflorum* Hicken, *Zephyranthes unifolia* Arechav. Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(GUA, MIE). URY(ART, MON, RIV).
- Zephyranthes philadelphica** (Ravenna) Nic. García & Meerow Sin.: *Habranthus philadelphicus* Ravenna Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: PRY(APY, BOQ).
- Zephyranthes phycelloides** (Herb.) Nic. García Sin.: *Amaryllis phycelloides* (Herb.) Steud., *Habranthus phycelloides* Herb., *Hippeastrum phycelloides* (Herb.) Baker, *Myostemma phycelloides* (Herb.) Ravenna, *Phycella phycelloides* (Herb.) Traub, *Rhodophiala phycelloides* (Herb.) Hunz. Hierba. Endémica. 0-2200 m. Países: CHL(ATA, COQ, MAU, RME).
- Zephyranthes picta** (Ravenna) S.C. Arroyo Sin.: *Habranthus pictus* Ravenna Hierba. Endémica. 800-1000 m. Países: ARG(CAT).
- Zephyranthes riojana** (Ravenna) S.C. Arroyo Sin.: *Habranthus riojanus* Ravenna Hierba. Endémica. Países: ARG(LRI).
- Zephyranthes robusta** (Herb. ex Sweet) Baker Sin.: *Amaryllis berterii* Spreng., *Habranthus cardenasianus* Traub & I.S. Nelson, *Habranthus cordobensis* Ravenna, *Habranthus maasii* Ravenna, *Habranthus niveus* Ravenna, *Habranthus oltanus* Ravenna, *Habranthus quilmesianus* Ravenna, *Habranthus robustus* Herb. ex Sweet, *Zephyranthes mesochloa* Herb. f. *rosea* Kuntze, *Zephyranthes tauberti* Harms Hierba. Nativa. 600-1300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Zephyranthes rubra (Ravenna) R.S. Oliveira & Dutilh
Sin.: *Habranthus ruber* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).

Zephyranthes ruizlealii (Ravenna) S.C. Arroyo
Sin.: *Habranthus ruizlealii* Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: ARG(LRI).

Zephyranthes salinarum (Ravenna) S.C. Arroyo
Sin.: *Habranthus salinarum* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Zephyranthes saltensis (Ravenna) S.C. Arroyo
Sin.: *Habranthus saltensis* Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: ARG(SAL).

Zephyranthes sanavirone (Roitman, A. Castillo, G.M. Tourn & Uria) Nic. García & S.C. Arroyo
Sin.: *Habranthus sanavirone* Roitman, A. Castillo, G.M. Tourn & Uria
Hierba. Endémica. 700-900 m.
Países: ARG(COR).

Zephyranthes sarae J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA).

Zephyranthes schulziana (Ravenna) S.C. Arroyo
Sin.: *Habranthus schulzianus* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS, SFE).

Zephyranthes seubertii E.P. Hume
Sin.: *Amaryllis parvula* Seub., *Zephyranthes parvula* (Seub.) Herter, *Zephyranthes stellaris* Ravenna
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(PAI). URY(SAO).

Zephyranthes spectabilis (Ravenna) S.C. Arroyo
Sin.: *Habranthus spectabilis* Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: ARG(JUJ).

Zephyranthes splendens (Renjifo) Nic. García
Sin.: *Amaryllis splendens* (Renjifo) Traub & Moldenke, *Habranthus splendens* Renjifo, *Hippeastrum splendens* (Renjifo) Renjifo ex Phil., *Rhodophiala splendens* (Renjifo) Traub
Hierba. Endémica. 800-1100 m.
Países: CHL(MAU).

Zephyranthes steyermarkii (Ravenna) S.C. Arroyo
Sin.: *Habranthus steyermarkii* Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: ARG (JUJ).

Zephyranthes tenuiflora (Phil.) Nic. García
Sin.: *Amaryllis gayana* (Kuntze) Traub & Uphof, *Amaryllis tenuiflora* (Phil.) Traub & Moldenke, *Bathya andina* (Phil.) Ravenna, *Bathya lucida* Ravenna, *Famatina andina* (Phil.) Ravenna, *Hippeastrum andinum* (Phil.) Phil., *Hippeastrum gayanum* Kuntze, *Hippeastrum tenuiflorum* Phil., *Phycella gayana* (Kuntze) Traub, *Rhodophiala andina* Phil., *Rhodophiala tenuiflora* (Phil.) Traub, *Zephyranthes philippiana* Nic. García
Hierba. Endémica.

Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Zephyranthes tubiflora (L'Hér.) Schinz
Sin.: *Amaryllis flammea* Ruiz & Pav., *Amaryllis tubiflora* L'Hér., *Pyrolirion flammeum* (Ruiz & Pav.) Herb., *Pyrolirion tubiflorum* (L'Hér.) M. Roem., *Zephyranthes flammea* (Ruiz & Pav.) Baker
Hierba. Introducida.
Países: CHL(TAR).

Zephyranthes tubispatha (L'Hér.) Herb.
Sin.: *Amaryllis andersonii* (Herb. ex Lindl.) Griseb., *Amaryllis tubispatha* L'Hér., *Habranthus andersonii* Herb. ex Lindl., *Habranthus andersonii* Herb. ex Lindl. var. *texanus* Herb., *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub f. *bicolor* (Ravenna) Traub, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub f. *roseus* (Ravenna) Traub, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub subsp. *macranthus* Ravenna, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub subsp. *variabilis* Ravenna, *Habranthus variabilis* (Ravenna) Ravenna, *Hippeastrum tubispathum* (L'Hér.) Baker, *Zephyranthes andersonii* (Herb. ex Lindl.) Baker, *Zephyranthes commersoniana* Herb.
Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). CHL(BIO). PRY(COA, PHA). URY(CAS, CLA, LAV, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).

Zephyranthes tucumanensis Hunz.
Hierba. Endémica. 300-2000 m.
Países: ARG(TUC).

Zephyranthes uruguaiánica Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Zephyranthes venturiana (Ravenna)
S.C. Arroyo

Sin.: *Habranthus venturianus* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SDE).

Zephyranthes versicolor (Herb.) G.
Nicholson

Sin.: *Amaryllis versicolor* (Herb.) Spreng.,
Habranthus longipes (Baker) Sealy,
Habranthus versicolor Herb.,
Hippeastrum versicolor (Herb.) Baker,
Zephyranthes longipes Baker,
Zephyranthes pluricolor Herter, nom.
illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MIS). PRY(APY).
URY(LAV, MAL, MON, SAO, SJO,
TYT).

ANACAMPSEROTACEAE

Anacampseros L., nom. cons.

Anacampseros kurtzii Bacigalupo
Hierba. Nativa. 1900-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Anacampseros vulcanensis Añon
Sin.: *Grahamia vulcanensis* (Añon) G.D.
Rowley, *Xenia vulcanensis* (Añón)
Gerbaulet
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Grahamia Gillies ex Hook. & Arn.

Grahamia bracteata Gillies ex Hook. &
Arn.
Subarbusto. Endémica. 200-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI,
MEN, NEU, SDE, SJU, SLU, TUC).

ANACARDIACEAE

Anacardium L.

Anacardium humile A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,
CAN, CON, SPE).

Astronium Jacq.

Astronium fraxinifolium Schott var.
fraxinifolium
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CEN, CON, COA).

Astronium fraxinifolium Schott var.
glabrum Engl.
Sin.: *Astronium fraxinifolium* Schott f.
glaberrimum Mattick, *Astronium*
fraxinifolium Schott f. *subglabrum*
Mattick
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(APY, CEN,
CON, PAI, PHA).

Astronium graveolens Jacq.
Sin.: *Astronium gracile* Engl., *Astronium*
gracile Engl. f. *acuminatum* Chodat &
Hassl., *Astronium gracile* Engl. var.
acuminatum (Chodat & Hassl.) F.A.
Barkley, *Astronium gracile* Engl. f.
serratum Mattick
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAN,
CEN, COA, PAI, SPE).

Haplorhus Engl.

Haplorhus peruviana Engl.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Lithraea Miers

Lithraea brasiliensis Marchand
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). URY(CLA, FLA, LAV,
MAL, MON, ROC, TAC, TYT).

Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn.
Sin.: *Laurus caustica* Molina, *Lithraea*
caustica (Molina) Hook. & Arn. f. *pilosa*
(Engl.) Cabrera, *Lithraea caustica*
(Molina) Hook. & Arn. var. *pilosa* Engl.
Árbol. Endémica. 0-2800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Lithraea molleoides (Vell.) Engl.
Sin.: *Lithraea gilliesii* Griseb., nom. illeg.
superfl., *Lithraea molleoides* (Vell.)
Engl. var. *lorentziana* Hieron. ex Lillo,
Lithraea ternifolia (Gillies ex Hook.)
F.A. Barkley, *Rhus clauseniana*
Turcz., *Schinus molleoides* Vell.,
Schinus terebinthifolia Raddi var.
ternifolia (Gillies ex Hook.) Marchand,
Schinus ternifolia Gillies ex Hook.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI,
SPE). URY(ART, CLA, DUR, FLA,
LAV, MON, PAY, RIV, SAO, SOR,
TAC).

Loxopterygium Hook. f.

Loxopterygium grisebachii Hieron. &
Lorentz ex Griseb.
Árbol. Nativa. 300-1300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE).

Mangifera L.**Mangifera indica** L.

Árbol. Introducida. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(COA).

Mauria Kunth**Mauria thaumatophylla** Loes.

Arbolito o árbol. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Myracrodruon Allemão**Myracrodruon balansae** (Engl.) Santin

Sin.: *Astronium balansae* Engl.

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA).

Myracrodruon urundeuva Allemão

Sin.: *Astronium candollei* Engl., *Astronium juglandifolium* Griseb., *Astronium urundeuva* (Allemão) Engl. var. *candollei* (Engl.) Hassl. ex Mattick, *Astronium urundeuva* (Allemão) Engl.

Árbol. Nativa. 400-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CHO, CON, COA, PAI, PHA, SPE).

Schinopsis Engl.**Schinopsis balansae** Engl.

Sin.: *Quebrachia morongii* Britton, *Schinopsis balansae* Engl. var. *pendula* Tortorelli

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SDE, SFE). PRY(APY, APA, CON, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Schinopsis boqueronensis Mogni & Oakley

Árbol. Nativa. 100-900 m.

Países: PRY(PHA).

Schinopsis brasiliensis Engl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Schinopsis cornuta Loes.

Árbol. Nativa. 200-500 m.

Países: PRY(APY).

Schinopsis glabra (Engl.) F.A. Barkley & T. Mey.

Sin.: *Schinopsis brasiliensis* Engl. var. *glabra* Engl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Schinopsis haenkeana Engl.

Sin.: *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. var. *marginata* (Engl.) Cabrera, *Schinopsis marginata* Engl.

Árbol. Nativa. 200-4050 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SDE, TUC).

Schinopsis heterophylla Ragonese & Castigl.

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SDE, SFE).

Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl.

Sin.: *Loxopterygium lorentzii* Griseb., *Quebrachia lorentzii* (Griseb.) Griseb.

Árbol. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CHO, NAS, PHA).

Schinus L.**Schinus areira** L.

Sin.: *Schinus molle* L. var. *areira* (L.) DC.

Árbol. Nativa. 1100-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APA, AMA, CEN, ITA). URY(MON, PAY, SJO, TAC, TYT).

Schinus bumelioides I.M. Johnst.

Sin.: *Moya ferox* Griseb.

Arbusto. Endémica. 300-1600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Schinus engleri F.A. Barkley

Sin.: *Schinus apparicana* Barroso

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(LAV, RIV, ROC, TAC).

Schinus fasciculata (Griseb.) I.M. Johnst.

Sin.: *Duvaua fasciculata* Griseb., *Duvaua praecox* Griseb., *Duvaua praecox* Griseb. f. *glomerata* Griseb., *Schinus huigan* Molina var. *heterophylla* Kuntze, *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera f. *fasciculata* (Griseb.) Cabrera, *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera f. *heterophylla* (Kuntze) Cabrera, *Schinus praecox* (Griseb.) Speg.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, SFE, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PHA).

Schinus ferox Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).
URY(CLA).

Schinus gracilipes I.M. Johnst.

Sin.: *Schinus gracilipes* I.M. Johnst. var.
pilosa F.A. Barkley
Arbusto o árbol. Endémica. 750-2900
m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Schinus johnstonii F.A. Barkley

Sin.: *Schinus dependens* Ortega . f.
arenicola Hauman, *Schinus fasciculata*
(Griseb.) I.M. Johnst. var. *arenicola*
(Hauman) F.A. Barkley, *Schinus*
polygama (Cav.) Cabrera f. *arenicola*
(Hauman) Cabrera
Arbusto. Endémica. 200-1860 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,
NEU, RNE, SJU, SLU, SCR).

Schinus kauselii F.A. Barkley

Arbusto. Endémica. 1400-1800 m.
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Schinus latifolia (Gillies ex Lindl.) Engl.

Sin.: *Duvaua latifolia* Gillies ex Lindl.,
Duvaua molle Bert. ex Steud., *Duvaua*
velutina Turcz., *Litrea molle* Gay,
Schinus chilensis Marchand, *Schinus*
chilensis Marchand var. *glabra*
Marchand, *Schinus dependens* Ortega
var. *latifolia* (Gillies ex Lindl.)
Marchand, *Schinus latifolia* (Gillies ex
Lindl.) Engl. var. *tomentosa* Fenzl ex
Engl., *Schinus velutina* (Turcz.) I.M.
Johnst.
Árbol. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
RME).

Schinus lentiscifolia Marchand

Sin.: *Schinus lentiscifolia* Marchand var.
angustifolia Chodat & Hassl., *Schinus*
lentiscifolia Marchand f. *flexuosa*

Chodat & Hassl., *Schinus lentiscifolia*
Marchand var. *microphylla* Chodat &
Hassl., *Schinus lentiscifolia* Marchand
f. *subobtusata* Chodat & Hassl., *Schinus*
lentiscifolia Marchand var. *pilosa*
Engl., *Schinus molle* L. var. *hassleri*
F.A. Barkley, nom. superfl., *Schinus*
weinmanniifolia Engl. var. *angustifolia*
F.A. Barkley, *Schinus weinmanniifolia*
Engl. var. *hassleri* (F.A. Barkley) F.A.
Barkley, nom. superfl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA,
CAN, CON, SPE). URY(CLA, LAV,
MON, RIV, SOR, TAC, TYT).

Schinus longifolia (Lindl.) Speg.

Sin.: *Duvaua longifolia* Lindl., *Schinus*
dependens Ortega var. *paraguariensis*
Hassl., *Schinus dependens* Ortega
var. *subintegra* Engl., nom. superfl.,
Schinus longifolia (Lindl.) Speg. var.
paraguariensis (Hassl.) F.A. Barkley,
Schinus paraguariensis (Hassl.) F.A.
Barkley

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CEN, CON, ITA).
URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR,
FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV,
ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Schinus marchandii F.A. Barkley

Sin.: *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera f.
australis Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(AIS).

Schinus meyeri F.A. Barkley

Árbol o arbusto. Nativa. 1100-2200 m.
Países: ARG(SAL).

Schinus molle L. var. **molle**

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR,
ANT, ATA). PRY(CAU, GUA, ITA,
MIE). URY(ART, CLA, LAV, PAY,
RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Schinus molle L. var. **rusbyi** F.A. Barkley

Árbol. Nativa. 2000-3000 m.

Países: CHL(TAR).

Schinus montana (Phil.) Engl.

Sin.: *Lithraea montana* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Schinus myrtifolia (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Cybianthus myrtifolius* Griseb.

Arbusto o arbolito. Nativa. 900-2600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Schinus odonellii F.A. Barkley

Sin.: *Duvaua dependens* (Ortega) DC.
var. *patagonica* Phil., *Schinus*
polygama (Cav.) Cabrera f. *patagonica*
(Phil.) Cabrera.

Arbusto. Endémica. 1300-3300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(MAG).

Schinus pampeana Bordinon & Vog.

Ely

Árbol. Endémica. 100-500 m.

Países: BRA(RGS).

Schinus patagonica (Phil.) I.M. Johnst.

ex Cabrera var. **crenuloides** (F.A.
Barkley) F.A. Barkley

Sin.: *Schinus montana* (Phil.) Engl. var.
crenuloides F.A. Barkley

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Schinus patagonica (Phil.) I.M. Johnst.

ex Cabrera var. **patagonica**

Sin.: *Duvaua patagonica* Phil., *Lithraea montana* Phil. var. *patagonica* (Phil.) Phil., *Lithraea patagonica* Phil., *Schinus crenata* Engl., *Schinus montana* (Phil.) Engl. var. *patagonica* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémica. 400-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Schinus pearcei Engl.

Árbol. Nativa. 1400-1500 m.

Países: CHL(ATA).

Schinus pilifera I.M. Johnst.

Sin.: *Schinus cabreræ* F.A. Barkley, *Schinus fasciculata* (Griseb.) I.M. Johnst. var. *boliviensis* F.A. Barkley, *Schinus pilifera* I.M. Johnst. var. *boliviensis* (F.A. Barkley) F.A. Barkley, *Schinus pilifera* I.M. Johnst. var. *cabreræ* (F.A. Barkley) F.A. Barkley

Arbusto. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Schinus polygama (Cav.) Cabrera

Sin.: *Amyris polygama* Cav., *Duvaua crenata* Phil., *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var. *obovata* Arechav., *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var. *ovata* Arechav., *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var. *parviflora* Arechav., *Duvaua ovata* Lindl., *Lithraea crenata* Phil., *Litrea crenata* Phil., *Schinus dependens* Ortega subsp. *crenata* (Phil.) Reiche, *Schinus dependens* Ortega var. *brevifolia* Fenzl ex Engl., *Schinus dependens* Ortega var. *crenata* Arechav., *Schinus dependens* Ortega var. *crenata* Engl., *Schinus dependens* Ortega var. *obovata* Engl., *Schinus dependens* Ortega var. *ovata* (Lindl.) Marchand, *Schinus dependens* Ortega var. *parviflora* Marchand,

Schinus polygama (Cav.) Cabrera f. *crenata* (Phil.) Cabrera, *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera f. *ovata* (Lindl.) Cabrera, *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera f. *parviflora* (Marchand) Cabrera, *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera var. *parviflora* (Marchand) F.A. Barkley

Arbusto. Nativa. 650-2600 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Schinus ramboi F.A. Barkley

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Schinus roigii Ruiz Leal & Cabrera

Sin.: *Schinus polygama* (Cav.) Cabrera f. *chubutensis* Cabrera

Arbusto. Endémica. 600-1900 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Schinus sinuata (Griseb.) Engl.

Sin.: *Duvaua praecox* Griseb. f. *hyemalis* Griseb., *Duvaua sinuata* Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(COS, ERI, SFE).

Schinus spinosa Engl.

Sin.: *Duvaua spinosa* (Engl.) Britt.

Arbusto o arbolito. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY.

Schinus subtridentata (Kuntze) Silva-Luz

Sin.: *Schinus andina* (Engl.) I.M. Johnst. var. *subtridentata* (Kuntze) F.A. Barkley, *Schinus huigan* Molina var. *subtridentata* Kuntze

Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.

Países: ARG(JUJ).

Schinus talampaya Fabbroni & M.A. Zapater

Sin.: *Duvaua praecox* Griseb. f. *montana* Griseb.

Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Schinus terebinthifolia Raddi

Sin.: *Schinus chichita* Speg., *Schinus rhoifolia* Mart., *Schinus terebinthifolia* Raddi var. *acutifolia* Engl., *Schinus terebinthifolia* Raddi var. *pohliana* Engl., *Schinus terebinthifolia* Raddi var. *rhoifolia* (Mart.) Engl.

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG (COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Schinus uruguayensis (F.A. Barkley) Silva-Luz

Sin.: *Schinus engleri* F.A. Barkley var. *uruguayensis* F.A. Barkley

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Schinus venturii F.A. Barkley

Árbol o arbusto. Nativa. 1200-2700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Schinus weinmannifolia Engl.

Sin.: *Schinus chebataroffii* Herter, *Schinus weinmannifolia* Engl. var. *dubia* F.A. Barkley, nom. superfl., *Schinus weinmannifolia* Engl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Schinus weinmannifolia* Engl. var. *intermedia* Chodat & Hassl., *Schinus weinmannifolia* Engl. f. *paucijuga* Chodat & Hassl., *Schinus weinmannifolia* Engl. var. *riedeliana* Engl.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, PAI, SPE). URY(CAS,
CLA, DUR, MAL, MON, PAY, RIV,
SAO, SJO, SOR, TAC).

Tapirira Aubl.

Tapirira guianensis Aubl.

Árbol. Nativa. 200-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

ANNONACEAE

Annona L.

Annona cacans Warm.

Sin.: *Annona amambayensis* Hassl. ex
R.E. Fr., *Annona cacans* Warm. var.
glabriuscula R.E. Fr.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAN).

Annona calophylla R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.

Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN,
CON, SPE).

Annona campestris R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: PRY(APA, AMA, CAU, PAI,
SPE).

Annona coriacea C. Mart.

Sin.: *Annona coriacea* C. Mart. var.
cuneata R.E. Fr.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,
SPE).

Annona cornifolia A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 100-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Annona crassiflora Mart.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Annona crotonifolia C. Mart.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Annona dioica A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 100-300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,
CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Annona dolabripetala Raddi

Sin.: *Annona neosericea* H. Rainer,
Rollinia dolabripetala (Raddi) R.E. Fr.
var. *sericea* R.E. Fr., *Rollinia laurifolia*
Schltdl., *Rollinia laurifolia* Schltdl. var.
divergens R.E. Fr., *Rollinia laurifolia*
Schltdl. var. *erecta* R.E. Fr., *Rollinia*
laurifolia Schltdl. var. *longipes* R.E. Fr.,
Rollinia laurifolia Schltdl. var. *reflexa*
R.E. Fr., *Rollinia sericea* (R.E. Fr.)
R.E. Fr., *Rollinia sericea* (R.E. Fr.)
R.E. Fr. var. *longisepala* R.E. Fr.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Annona emarginata (Schltdl.) H. Rainer

Sin.: *Rollinia emarginata* Schltdl., *Rollinia*
emarginata Schltdl. var. *longipetala*
(R.E. Fr.) R.E. Fr., *Rollinia*
glaucescens Sond., *Rollinia*
hassleriana R.E. Fr., *Rollinia*
hassleriana R.E. Fr. var. *vestita* R.E.
Fr., *Rollinia intermedia* R.E. Fr.,
Rollinia longifolia A. St.-Hil. var.
paraguariensis Chodat, *Rollinia*
longipetala R.E. Fr., *Rollinia odoriflora*
Rojas Acosta, *Rollinia sonderiana*
Walp., *Rollinia viridis* Bertoni

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA,
CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA,
MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(ART).

Annona glabra L.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Annona glaucophylla R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Annona maritima (Záchia) H. Rainer

Sin.: *Rollinia maritima* Záchia

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(ROC).

Annona montana Macfad.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Annona mucosa Jacq.

Sin.: *Rollinia mucosa* (Jacq.) Baill.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Annona neosalicifolia H. Rainer

Sin.: *Rollinia salicifolia* Schltdl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA,
PAI, SPE).

Annona nutans (R.E. Fr.) R.E. Fr.

Sin.: *Annona spinescens* Mart. var. *nutans*
R.E. Fr.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: PRY(APA, APY, AMA, CAA,
CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA,
MIE, NAS, PAI, PHA, SPE).

Annona paraguayensis R.E. Fr.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer
Sin.: *Rollinia glaziovii* R.E. Fr., *Rollinia occidentalis* R.E. Fr., *Rollinia rugulosa* Schltdl., *Rollinia rugulosa* Schltdl. subsp. *australis* R.E. Fr.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Annona sylvatica A. St.-Hil.
Sin.: *Annona fagifolia* A. St.-Hil. & Tul., *Rollinia fagifolia* A. St.-Hil., *Rollinia sylvatica* (A. St.-Hil.) Mart.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Duguetia A. St.-Hil.

Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Saff.
Sin.: *Annona furfuracea* A. St.-Hil.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, PHA, SPE).

Duguetia lanceolata A. St.-Hil.
Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Duguetia phaeoclados (C. Mart.) Maas & H. Rainer
Sin.: *Aberemoa laevis* R.E. Fr., *Annona phaeoclados* C. Mart.
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Guatteria Ruiz & Pav., nom. cons.

Guatteria australis A. St.-Hil.
Sin.: *Guatteria dusenii* R.E. Fr., *Guatteria dusenii* R.E. Fr. var. *subglabra* R.E. Fr., *Guatteria neglecta* R.E. Fr., *Guatteria parvifolia* R.E. Fr., *Guatteria polycarpa* R.E. Fr., *Guatteria salicifolia* R.E. Fr. var. *erosa* R.E. Fr.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Porcelia Ruiz & Pav.

Porcelia macrocarpa (Warm.) R.E. Fr.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Unonopsis R.E. Fr.

Unonopsis guatterioirdes (A. DC.) R.E. Fr.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Xylopia L.

Xylopia aromatica (Lam.) C. Mart.
Sin.: *Uvaria aromatica* Lam., *Xylopia grandiflora* A. St.-Hil.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, PHA, SPE).

Xylopia brasiliensis Spreng.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).

Xylopia langsdorfiana A. St.-Hil. & Tul.
Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR).

Xylopia sericea A. St.-Hil.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

APIACEAE

Ammi L.

Ammi majus L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(LSR, LLA, RME). URY(MON).

Ammoselinum Torr. & A. Gray

Ammoselinum rosengurtii Mathias & Constance
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(ART, CLA, FLA, PAY, RNO, SAO, SOR).

Anethum L.

Anethum graveolens L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(JFE).

Anthriscus Pers.

Anthriscus caucalis M. Bieb.
Hierba. Introducida. 0-1900 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Sin.: *Chaerophyllum sylvestre* L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(MAG).

Apium L., nom. cons.

Apium australe Thouars

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

Apium chilense Hook. & Arn.

Sin.: *Apium flexuosum* Phil., *Ligusticum dumetorum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, JFE).

Apium commersonii DC.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, SCR, SFE). URY(MON, SJO).

Apium fernandezianum Johow

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(JFE).

Apium graveolens L.

Hierba. Introducida. 0-3000 m.

Países: ARG(LPA, SJU, SLU). BRA(SCA). CHL(ANT, LSR, LLA, JFE). PRY(CEN).

Apium panul (Bertero ex DC.) Reiche

Sin.: *Apium andinum* Phil., *Apium angustilobum* (Phil.) Reiche, *Apium apioides* (Phil.) Reiche, *Apium humile* (Phil.) Reiche, *Apium panul* (Bertero ex DC.) Reiche var. *araucanum* (Phil.) Reiche, *Apium peucedanoides* (C. Presl ex DC.) Reiche, *Apium peucedanoides* (C. Presl ex DC.) Reiche var. *tenuifolium* (C. Presl ex DC.) H. Wolff, *Apium philippii* H. Wolff, *Carum pansil* (Bertero ex DC.) Griseb.,

Ligusticum angustilobum Phil., *Ligusticum apioides* Phil., *Ligusticum cahuilense* Phil. ex sched., *Ligusticum humile* Phil., *Ligusticum landbeckii* Phil., *Ligusticum nemorosum* Phil., *Ligusticum pansil* Bertero ex DC., *Ligusticum peucedanoides* C. Presl ex DC., *Pimpinella andina* Phil., *Pimpinella araucana* Phil., *Pimpinella macrophylla* Phil., *Pimpinella molleri* Phil., *Pimpinella navarii* Phil., *Pimpinella peteroana* Phil., *Pimpinella vidalii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.

Países: ARG(COR, MEN, NEU, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Apium pimpinellifolium (Phil.) Reiche

Sin.: *Ligusticum pimpinellifolium* Phil.

Hierba. Endémica. 1700-3800 m.

Países: CHL(LBO).

Apium prostratum Vent.

Sin.: *Apium australe* Thouars var. *latisectum* H. Wolff, *Apium dunicola* Pontiroli, *Apium maclovianum* Gand., *Wydleria humilis* Phil.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, BIO, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(ROC).

Apium sellowianum H. Wolff

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, SFE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Notas: Es dudosa la presencia de este taxón en Chile

Asteriscium Cham. & Schltdl.

Asteriscium aemocarpon Clos

Sin.: *Asteriscium haemocarpon* Clos var. *chlorocarpum* Phil., *Asteriscium ramosissimum* Phil., *Asteriscium verrucosum* Meyen

Hierba. Endémica. 2100-3500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Asteriscium argentinum Chodat & Wilczek

Sin.: *Asteriscium crambe* H. Wolff

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, SLU).

Asteriscium chilense Cham. & Schltdl.

Sin.: *Asteriscium chilense* Cham. & Schltdl. var. *haenkei* DC., *Asteriscium poeppigii* DC., *Asteriscium pozoides* Clos, *Eryngium tricuspidatum* Dombey

Hierba. Endémica. 100-2500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Asteriscium closii (Kuntze) Mathias & Constance

Sin.: *Asteriscium pungens* Drude, *Bustillosia chilensis* Clos, *Bustillosia chilensis* Clos var. *setacea* Phil., *Dipterygia closii* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Asteriscium famatinense Hieron. & H. Wolff

Hierba. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Asteriscium fimbriatum Speg.

Hierba. Endémica. 200-900 m.

Países: ARG(LPA, NEU, RNE, SCR).

Asteriscium glaucum Hieron. & H. Wolff

Hierba. Endémica. 600-2900 m.

- Países: ARG(JUU, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).
- Asteriscium novarae** Constance & Charpin
Hierba. Endémica. 2900-3000 m.
Países: ARG(SAL).
- Asteriscium vidalii** Phil.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ATA).
- Austropeucedanum** Mathias & Constance
- Austropeucedanum oreopansil** (Griseb.) Mathias & Constance
Sin.: *Peucedanum oreopansil* Griseb.
Hierba. Endémica. 1000-3200 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Azorella** Lam.
- Azorella acaulis** (Cav.) Drude
Sin.: *Huanaca acaulis* Cav., *Huanaca bergii* Hieron., *Huanaca cavanillesii* DC., nom. illeg., *Huanaca geraniifolia* DC., *Lechleria palmata* Phil., *Oenanthe huanaca* Spreng., nom. illeg., *Spananthe huanaca* Lag.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).
- Azorella albovaginata** (Gillies & Hook.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
Sin.: *Azorella albovaginata* (Gillies & Hook.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas var. *pauciflorum* (Reiche) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas, *Mulinum albovaginatum* Gillies & Hook., *Mulinum albovaginatum* Gillies & Hook. var. *pauciflorum* (Reiche) J.C. Zech, *Mulinum cryptanthum* Clos var. *pulvinaris* Chodat & Wilcz., *Mulinum pauciflorum* Reiche, *Mulinum reichei* H. Wolff, nom. inval.
Hierba. Endémica. 1500-4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, RME).
- Azorella ameghinoi** Speg.
Sin.: *Azorella transverse-striata* Hauman
Hierba. Endémica. 200-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR). CHL(AIS, MAG).
- Azorella andina** (Phil.) Drude
Sin.: *Azorella ranunculus* d'Urv. var. *trilobata* Dusén ex Macloskie, *Azorella trilobata* Dusén, *Huanaca andina* (Phil.) Phil., *Schizilema trilobatum* (Dusén) Domin, *Trisciadium andinum* Phil.
Hierba. Endémica. 600-2800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, MAG).
- Azorella biloba** (Schltdl.) Wedd.
Sin.: *Azorella biloba* (Schltdl.) Wedd. var. *strigosa* Wedd., *Azorella lehmannii* Hieron., *Fragosa biloba* Schltdl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 2500-5000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). CHL(ANT).
- Azorella boelckei** (Mathias & Constance) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
Sin.: *Huanaca boelckei* Mathias & Constance
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LLA, AIS).
- Azorella burkartii** (Mathias & Constance) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
Sin.: *Huanaca burkartii* Mathias & Constance
- Hierba. Endémica. 800-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(ARA, MAG).
- Azorella compacta** Phil.
Sin.: *Azorella columnaris* H. Wolff, *Azorella prismatoclada* Domin, *Azorella yareta* Hauman, *Laretia compacta* (Phil.) Reiche
Hierba o arbusto. Nativa. 3500-5200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).
- Azorella crassipes** Phil.
Hierba o arbusto. Endémica. 1700-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO).
- Azorella cryptantha** (Clos) Reiche
Sin.: *Mulinum cryptanthum* Clos, *Mulinum integrifolium* Hieron.
Hierba o subarbusto. Endémica. 2500-4300 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL).
- Azorella diversifolia** Clos
Sin.: *Azorella diversifolia* Clos var. *antillanca* J.C. Zech, *Azorella incisa* Wedd., *Pozoa incisa* Griseb.
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).
- Azorella echegarayi** (Hieron.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
Sin.: *Mulinum echegarayi* Hieron.
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
- Azorella filamentosa** Lam.
Sin.: *Azorella chamitis* Pers., *Chamitis integrifolia* Gaertn.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Azorella fuegiana Speg.

Sin.: *Azorella dusenii* H. Wolff, *Azorella mesetae* Skotts.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Azorella hallei (Skotts.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas

Sin.: *Mulinum hallei* Skotts.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Azorella lycopodioides Gaudich.

Sin.: *Azorella clandestina* Phil., *Azorella laevigata* Phil., *Azorella lycopodioides* Gaudich. var. *chilensis* Clos, *Azorella lycopodioides* Gaudich. var. *compacta* Phil., *Azorella nervosa* Phil., *Azorella philippi* Gand., *Azorella vaginata* Phil.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Azorella madreporica Clos

Sin.: *Azorella bolacina* Clos, *Azorella muscoides* Phil., *Azorella obtusiloba* Phil., *Azorella piligera* Phil.

Hierba o subarbusto. Endémica. 1800-3600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

Azorella microphylla (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas

Sin.: *Azorella morenonis* (Kuntze) Macloskie, *Diplaspis morenonis* (Kuntze) K. Schum., *Huanaca morenonis* Kuntze, *Mulinum microphyllum* (Cav.) Pers., *Mulinum morenonis* (Kuntze) Speg., *Selinum microphyllum* Cav.

Hierba. Endémica. 800-1400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Notas: La presencia de este taxón en Chile es dudosa

Azorella monantha Clos

Sin.: *Apleura nucamentacea* Phil., *Azorella apoda* A. Gray, *Azorella bryoides* Phil., *Azorella glacialis* Phil., *Azorella hookeriana* Clos, *Azorella nucamentacea* (Phil.) Hauman, *Azorella sessiliflora* Phil.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Azorella monteroi S. Martínez & Constance

Hierba. Endémica. 1800

Países: CHL(BIO, ARA).

Azorella nivalis Phil.

Sin.: *Mulinum leptacanthum* Phil., *Mulinum patagonicum* Speg.

Subarbusto. Endémica. 1400-2600 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LLA).

Azorella patagonica Speg.

Sin.: *Azorella patagonica* Speg. var. *compacta* Speg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
CHL(MAG).

Azorella prolifera (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas

Sin.: *Azorella echinus* (DC.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas, *Mulinum chillanense* Phil., *Mulinum echinus* DC., *Mulinum gandogerii* M. Hiroe, *Mulinum hirsutum* Phil., *Mulinum laxum* Phil., *Mulinum leoninum* Lorentz, *Mulinum ovalleanum* Phil., *Mulinum patagonicum* Gand., hom. illeg.,

Mulinum proliferum (Cav.) Pers., *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers., *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. f. *minus* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *chillanense* (Phil.) Reiche, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *laxum* (Phil.) Reiche, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *leoninum* (Lorentz) Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *longeinvolucratum* Hicken, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *minus* (Kuntze) J.C. Zech, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *proliferum* (Cav.) Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *quinquepartitum* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *trispinescens* Kuntze, *Selinum proliferum* Cav., *Selinum spinosum* Cav.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Azorella ranunculus d'Urv.

Sin.: *Schizeilema ranunculus* (d'Urv.) Domin

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Azorella ruizii G.M. Plunkett & A.N. Nicolas

Sin.: *Laretia acaulis* (Cav.) Gillies & Hook., *Selinum acaule* Cav.

Hierba o subarbusto. Endémica. 2000-3500 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, RME).

Azorella selago Hook. f.

Sin.: *Azorella antipoda* Gand., *Azorella macquariensis* Orchard, *Azorella selago* Hook. f. var. *compacta* Albov,

Azorella selago Hook. f. var. *pulvinaris* Albov
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Azorella spinosa (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Azorella pectinata* Phil., *Fragosa spinosa* Ruiz & Pav., *Mulinum clandestinum* Phil., *Mulinum cuneatum* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Azorella triacantha (Griseb.) Mart. Fernández & C.I. Calviño var. **famatinense** (H. Wolff) Mart. Fernández & C.I. Calviño
Sin.: *Mulinum famatinense* H. Wolff
Subarbusto. Endémica. 4000-4700 m.
Países: ARG(LRI).

Azorella triacantha (Griseb.) Mart. Fernández & C.I. Calviño var. **triacantha**
Sin.: *Mulinum axilliflorum* Griseb., *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *triacanthum* (Griseb.) Kuntze, *Mulinum triacanthum* Griseb.
Subarbusto. Nativa. 2200-4200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Azorella trifoliolata Clos

Sin.: *Azorella depauperata* Phil., *Azorella gayana* Phil., *Azorella pinnatiloba* Gand.
Hierba. Endémica. 500-3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers.

Sin.: *Azorella albida* Phil., *Azorella caespitosa* Cav., nom. illeg., *Azorella crassifolia* Pers., *Azorella gilliesii* (Hook.) Hook. & Arn., *Azorella rahmeri* Phil., *Azorella utriculata* Griseb., *Bolax gilliesii* Hook., *Chamitis tricuspidata* Gaertn., *Chamitis trifurcata* Gaertn.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

Azorella trisecta (H. Wolff) Mart. Fernández & C.I. Calviño

Sin.: *Azorella atacamensis* G.M. Plunkett & A.N. Nicolas, *Azorellopsis trisecta* H. Wolff, *Mulinum crassifolium* Phil.
Subarbusto. Endémica. 3700-4500 m.
Países: ARG(CAT, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA).

Azorella ulicina (Gillies & Hook.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas

Sin.: *Mulinum triacanthum* Griseb. var. *multiflorum* Hieron., *Mulinum ulicinum* Gillies & Hook., *Mulinum ulicinum* Gillies & Hook. var. *multiflorum* (Hieron.) J.C. Zech
Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT).

Azorella valentini (Speg.) Mart. Fernández & C.I. Calviño

Sin.: *Azorella concolor* Rendle, *Mulinum lycopodiopsis* Speg., *Mulinum valentini* Speg.
Hierba o subarbusto. Endémica. 300-1400 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Bolax Comm. ex Juss.

Bolax bovei (Speg.) Dusén

Sin.: *Azorella bovei* Speg., *Azorella gummifera* (Lam.) Poir., *Bolax caespitosa* Hombr. & Jacquinot ex Decne
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Bolax gummifera (Lam.) Spreng.

Sin.: *Azorella caespitosa* Vahl, *Azorella glebaria* (Comm. ex Gaudich.) A. Gray, *Bolax columnifera* Gand., *Bolax complicatus* Spreng., *Bolax glebaria* Comm. ex Lam., *Hydrocotyle gummifera* Lam.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Bowlesia Ruiz & Pav.

Bowlesia flabilis J.F. Macbr.

Hierba. Nativa. 2200-3900 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

Bowlesia hieronymusii H. Wolff

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Bowlesia incana Ruiz & Pav.

Sin.: *Bowlesia geraniifolia* Cham. & Schltdl., *Bowlesia incana* Ruiz & Pav. f. *tenera* (Spreng.) Urb., *Bowlesia nodiflora* DC., *Bowlesia rotundifolia* Phil., *Bowlesia tenera* Spreng.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,

SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(CEN, PAI). URY(CAS, COL, MON, SJO, SOR).

Bowlesia lobata Ruiz & Pav.

Sin.: *Bowlesia acutangula* Benth., *Bowlesia acutiloba* H. Wolff, *Drusa acutangula* (Benth.) Drude
Hierba. Nativa. 1300-4600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(TAR).

Bowlesia macrophysa Zoellner

Hierba. Endémica. 2900
Países: CHL(COQ).

Bowlesia paposana I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Bowlesia platanifolia H. Wolff

Hierba. Nativa. 600-2600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Bowlesia ruiz-lealii Mathias & Constance

Hierba. Endémica. 1700-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Bowlesia sodiroana H. Wolff

Hierba. Nativa. 200-500 m.
Países: CHL(COQ).

Bowlesia tropaeolifolia Gillies & Hook.

Sin.: *Bowlesia cirrosa* Phil., *Bowlesia flexilis* Meyen, *Bowlesia pulchella* Wedd., *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *cirrosa* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *gayana* Domin, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *heterophylla* Speg., *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *patagonica* Speg.
Hierba. Nativa. 100-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Bowlesia uncinata Colla

Sin.: *Bowlesia axilliflora* Phil., *Bowlesia dumetorum* Phil., *Bowlesia macrosperma* H. Wolff, *Bowlesia reichei* Phil., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos, *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *axilliflora* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *dumetorum* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *reichei* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *triloba* Reiche, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *tripartita* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 700-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Bowlesia venturii Mathias & Constance

Hierba. Endémica. 3200-3800 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Caucalis L.

Caucalis platycarpus L.

Sin.: *Caucalis daucoides* L., nom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN).

Centella L.

Centella asiatica (L.) Urb.

Sin.: *Centella biflora* (Vell.) Nannf., *Centella hirtella* Nannf., *Centella triflora* (Ruiz & Pav.) Nannf.,

Hydrocotyle asiatica L., *Hydrocotyle triflora* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(AMA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, MON, ROC, TYT).

Chaerophyllum L., nom. cons.

Chaerophyllum andicola (Kunth) K.F. Chung

Sin.: *Myrrhis andicola* Kunth, *Oreomyrrhis andicola* (Kunth) Hook. f., *Oreomyrrhis andicola* (Kunth) Hook. f. var. *tomentosa* Wedd., nom. illeg., *Oreomyrrhis daucoides* Urb.
Hierba. Nativa. 1700-4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Chaerophyllum daucoides (d'Urv.) K.F. Chung

Sin.: *Azorella daucoides* d'Urv., *Oreomyrrhis hookeri* Mathias & Constance
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Conium L.

Conium maculatum L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SLU, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(MON).

Coriandrum L.**Coriandrum sativum L.**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE, SLU). BRA(RGS, SCA). CHL(LLA, JFE). PRY(PAI).

Cyclosporum Lag.**Cyclosporum laciniatum (DC.) Constance**

Sin.: *Apium bitermum* (Phil.) Reiche, *Apium laciniatum* (DC.) Urb., *Apium laciniatum* (DC.) Urb. f. *deserticolum* H. Wolff, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *gracile* (Clos) Reiche, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *hispidulum* H. Wolff, *Helosciadium bitermum* Phil., *Helosciadium deserticolum* Phil., *Helosciadium gracile* Clos, *Helosciadium laciniatum* DC., *Helosciadium laciniatum* DC. var. *humile* Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME).

Cyclosporum leptophyllum (Pers.) Britton & P. Wilson var. leptophyllum

Sin.: *Apium ammi* Urb., *Apium ammi* Urb. f. *filamentosum* (Kuntze) H. Wolff, *Apium ammi* Urb. f. *pedunculata* Chodat, *Apium ammi* Urb. var. *filamentosum* Kuntze, *Apium ammi* Urb. var. *genuinum* H. Wolff, *Apium ammi* Urb. var. *latisectum* Urb. f. *nanum* Kuntze, *Apium ammi* Urb. var. *leptophyllum* (Pers.) Kuntze, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. f. *elatus* (Hook. & Arn.) H. Wolff, *Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell., *Apium*

ranunculifolium (DC.) Reiche, comb. illeg., *Helosciadium laciniatum* DC. var. *elatus* Hook. & Arn., *Helosciadium leptophyllum* (Pers.) DC., *Helosciadium ranunculifolium* DC., *Pimpinella leptophylla* Pers.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(APA, APY, BOQ, ÑEE, SPE). URY(ROC).

Cyclosporum leptophyllum (Pers.) Britton & P. Wilson var. multisectum (Mathias & Constance) Constance

Sin.: *Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell. var. *multisectum* Mathias & Constance

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Cyclosporum uruguayense (Mathias & Constance) Constance

Sin.: *Apium uruguayense* Mathias & Constance

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(COS). URY(SJO).

Daucus L.**Daucus carota L.**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, NEU, RNE, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, IPA). URY(MON).

Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Schult.

Sin.: *Daucus toriloides* DC.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LPA, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF). CHL(ANT, COQ, VAL, MAU, LLA, AIS, MAG, JFE).

Daucus pusillus Michx.

Sin.: *Daucus australis* Poepp. ex DC., *Daucus hispidifolius* Clos, *Daucus montevidensis* Link ex Spreng., *Daucus scaber* Larrañaga

Hierba. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SDE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, RME). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SAO, SJO, SOR, TAC).

Diposis DC.**Diposis bulbocastanum DC.**

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Diposis patagonica Skottsbo.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Diposis saniculifolia (Lam.) DC.

Sin.: *Hydrocotyle saniculaefolia* Lam.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: URY(CAS, DUR, MAL, MON, SOR).

Domeykoa Phil.**Domeykoa andina Saldivia & Faúndez**

Hierba. Endémica. 2600-3100 m.

Países: CHL(TAR).

Domeykoa oppositifolia Phil.

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

- Países: CHL(ANT, ATA).
- Domeykoa perennis** I.M. Johnst.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT, ATA).
- Eremocharis** Phil.
- Eremocharis confinis** I.M. Johnst.
Subarbusto. Nativa. 3100-3200 m.
Países: CHL(TAR).
- Eremocharis fruticosa** Phil.
Sin.: *Dipterygia philippiana* Kuntze, *Eremocharis flexuosa* Phil.
Hierba o arbusto. Endémica. 100-1800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).
- Eryngium** L.
- Eryngium absconditum** P. Esquivel
Mattos & C.I. Calviño
Hierba. Endémica.
Países: PRY(AMA).
- Eryngium agavifolium** Griseb.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR, SDE, SLU).
- Eryngium aloifolium** Mart. ex Urb.
Hierba. Nativa. 900
Países: BRA(PAR, SCA).
- Eryngium anomalum** Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 100
Países: CHL(COQ, VAL).
- Eryngium atacamense** A. Padín & C.I. Calviño
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).
- Eryngium balansae** H. Wolff
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(RGS). PRY(APA, CAU, GUA, PAI, SPE).
- Eryngium bupleuroides** Hook. & Arn.
Sin.: *Eryngium frutescens* Moris
Arbusto o árbol. Endémica. 400-900 m.
Países: CHL(JFE).
- Eryngium canaliculatum** Cham. & Schltdl.
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Eryngium cardosii** Clos
Hierba. Endémica. 400-1400 m.
Países: CHL(BIO, ARA).
- Eryngium cerradense** P. Esquivel Mattos & C.I. Calviño
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: PRY(CAU, CAN).
- Eryngium chamissonis** Urb.
Sin.: *Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltdl. var. *chamissonis* (Urb.) Mathias & Constance
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE). URY(ROC).
- Eryngium chubutense** Neger ex Dusén
Sin.: *Eryngium kurtzii* Hicken
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SFE, TUC).
- Eryngium ciliatum** Cham. & Schltdl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(SPE). URY(ART, RIV, TAC).
- Eryngium coquimbanum** Phil. ex Urb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ).
- Eryngium corallinum** Mathias & Constance
Hierba. Endémica. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Eryngium coronatum** Hook. & Arn.
Sin.: *Eryngium coronopifolium* Decne.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CEN, PHA).
Notas: Probablemente en Uruguay
- Eryngium crassifolium** A. Padín & C.I. Calviño
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA).
- Eryngium depressum** Hook. & Arn.
Sin.: *Eryngium arvense* Phil., hom. illeg., *Eryngium depressum* Hook. & Arn. var. *bridgesii* H. Wolff, *Eryngium depressum* Hook. & Arn. var. *flaccidum* Hook. & Arn., *Eryngium depressum* Hook. & Arn. var. *rigidum* Hook. & Arn., *Eryngium polyrhizum* Clos
Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
- Eryngium divaricatum** Hook. & Arn.
Sin.: *Eryngium flaccidum* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN). URY(RNO).
- Eryngium dorae** C. Norman
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(RNO, RIV).
- Eryngium dusenii** H. Wolff
Hierba. Endémica. 500-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eryngium ebracteatum Lam.

Sin.: *Eryngium ebracteatum* Lam. var. *poterioides* (Griseb.) Urb., *Eryngium poterioides* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAA, CAN, ÑEE, PHA). URY(MON).

Eryngium eburneum Decne.

Sin.: *Eryngium bracteosum* Griseb., *Eryngium cabreræ* Pontiroli

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, ÑEE). URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR, TAC).

Eryngium echinatum Urb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Eryngium ekmanii H. Wolff

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, PAI).

Notas: Cita dudosa para Uruguay

Eryngium elegans Cham. & Schltdl.

Sin.: *Eryngium elegans* Cham. & Schltdl. var. *genuinum* Urb., nom. inval., *Eryngium elegans* Cham. & Schltdl. var. *macrocephalum* Urb., *Eryngium elegans* Cham. & Schltdl. var. *microcephalum* Urb., *Eryngium elegans* Cham. & Schltdl. var.

uncinatum (Cham. & Schltdl.) Urb., *Eryngium uncinatum* Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, COL, MAL, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Eryngium eriophorum Cham. & Schltdl.

Sin.: *Eryngium eriophorum* Cham. & Schltdl. f. *vegetius* Cham. & Schltdl., *Eryngium eriophorum* Cham. & Schltdl. var. *setosum* H. Wolff, *Eryngium eriophorum* Cham. & Schltdl. var. *typicum* H. Wolff, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, TAC).

Eryngium eurycephalum Malme

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Eryngium falcifolium Irgang

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Eryngium fernandezianum Skottsbo.

Arbusto. Endémica. 400-700 m.

Países: CHL(JFE).

Notas: Probable híbrido entre *E. bupleuroides* y *E. inaccessum*.

Eryngium floribundum Cham. & Schltdl.

Sin.: *Eryngium floribundum* Cham. & Schltdl. var. *angustifolium* Urb., *Eryngium floribundum* Cham. & Schltdl. var. *pycnocephalum* Urb., *Eryngium floribundum* Cham. & Schltdl. var. *serroides* Urb.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE).

Eryngium glossophyllum H. Wolff

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Eryngium horridum Malme

Sin.: *Eryngium schwackeanum* Urb. ex H. Wolff

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SDE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA, ÑEE, PAI). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, SJO, SOR).

Eryngium humifusum Clos

Sin.: *Eryngium humifusum* Clos var. *pratense* (Phil.) Reiche, *Eryngium pratense* Phil., *Eryngium pratense* Phil. var. *depressum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Eryngium inaccessum Skottsbo.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(JFE).

Eryngium incantatum Lucena, Novara &

A.R. Cuezco (h)

Hierba. Endémica. 3000-3200 m.

Países: ARG(SAL).

Eryngium irgangii D.B. Lucas

Hierba. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(SCA).

Eryngium junceum Cham. & Schltdl.

Sin.: *Eryngium erosum* Urb., *Eryngium junceum* Cham. & Schltdl. subsp. *erosum* (Urb.) H. Wolff, *Eryngium junceum* Cham. & Schltdl. subsp. *setigerum* Urb.

- Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Cita dudosa para la Flora Argentina
- Eryngium juncifolium** (Urb.) Mathias & Constance
Sin.: *Eryngium junceum* Cham. & Schltdl. subsp. *juncifolium* Urb., *Eryngium junceum* Cham. & Schltdl. subsp. *lineare* Urb.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA).
- Eryngium koehneanum** Urb.
Hierba. Nativa. 800-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Eryngium lorentzii** H. Wolff
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUU, TUC).
- Eryngium luzulifolium** Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium hassleri* H. Wolff, *Eryngium nudum* Gillies & Hook.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU). URY(PAY, SAO, SOR).
- Eryngium macracanthum** Phil.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA).
- Eryngium megapotamicum** Malme
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).
- Eryngium mesopotamicum** Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, RIV, SJO, SOR).
Notas: Es probable que esté presente en Paraguay (Pedersen, 1997)
- Eryngium nudicaule** Lam.
Sin.: *Eryngium bellidifolium* Decne., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *bellidifolium* (Decne.) Urb., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *ctenodes* Griseb., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *peruvianum* Urb., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *pinnatifidum* Urb.
Hierba. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LRI, MIS, SFE, SLU). BRA(RGS, SCA). PRY(CEN, PAI). URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).
- Eryngium ombrophilum** Dusén & H. Wolff
Hierba. Endémica. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Eryngium pandanifolium** Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium decaisneanum* Urb.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ÑEE). URY(CAS, COL, MAL, MON).
- Eryngium paniculatum** Cav. & Dombey ex F. Delaroché
Sin.: *Eryngium delarocheanum* H. Wolff, *Eryngium paniculatum* Cav. & Dombey ex F. Delaroché var. *chilense* DC., nom. illeg.
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).
- Eryngium paraguariense** Urb.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).
- Eryngium plantaginifolium** H. Wolff
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU).
- Eryngium pohlianum** Urb.
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Eryngium pristis** Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium pristis* Cham. & Schltdl. var. *abbreviatum* H. Wolff, *Eryngium pristis* Cham. & Schltdl. var. *mitigatum* Malme
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA). URY(CLA, TYT).
- Eryngium pseudojunceum** Clos
Sin.: *Eryngium crantzoides* Griseb., *Eryngium fistulosum* Phil., *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *bracteosum* H. Wolff, *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *crantzoides* (Griseb.) Phil., *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *fistulosum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA).
- Eryngium pulchellum** Phil.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA).
- Eryngium ramboanum** Mathias & Constance
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Eryngium raulinii** Mathias & Constance
Hierba. Endémica. 1000

Países: BRA(SCA).

Eryngium regnellii Malme

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(BAI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(LAV, MAL, MON, RNO).

Eryngium rochei Constance

Hierba. Endémica. 600

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Eryngium rojasii H. Wolff

Hierba. Endémica. 100-300 m.

Países: PRY(AMA).

Eryngium rostratum Cav.

Sin.: *Eryngium amethystinodes* Kuntze, *Eryngium rostratum* Cav. var. *diversifolium* Phil. ex H. Wolff, *Eryngium unifolium* Clos

Hierba. Endémica. 200-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

Eryngium sanguisorba Cham. & Schltdl.

Sin.: *Eryngium sanguisorba* Cham. & Schltdl. var. *rosulatum* Urb.

Hierba. Nativa. 800-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, ITA, MIE, SPE). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, PAY, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Eryngium sarcophyllum Hook. & Arn.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Eryngium scirpinum Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 100-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eryngium sellowii H. Wolff

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eryngium serra Cham. & Schltdl.

Sin.: *Eryngium platyphyllum* Decne.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(CEN). URY(CAS, FLA, MAL, SJO, SOR).

Eryngium smithii Mathias & Constance

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Eryngium sparganioides Clos

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Eryngium stenophyllum Urb.

Sin.: *Eryngium stenophyllum* Urb. var. *corymbosum* Urb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, ITA). URY(ART, RIV).

Eryngium subinerme (H. Wolff) Mathias & Constance

Sin.: *Eryngium aquaticum* L. var. *subinerme* H. Wolff

Hierba. Nativa. 800-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eryngium urbanianum H. Wolff

Sin.: *Eryngium reitzii* Mathias & Constance

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Eryngium zosterifolium H. Wolff

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Foeniculum Mill.

Foeniculum vulgare Mill.

Sin.: *Anethum foeniculum* L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). PRY(APY). URY(CAS, CLA, MAL, MON).

Gymnophyton Clos

Gymnophyton dipterygia (DC.) C.A. Zanotti & Zuloaga

Sin.: *Asteriscium robustum* Baill. , *Gymnophyton robustum* Clos, nom. superfl., *Mulinum dipterygia* DC.

Arbusto. Endémica. 400-2500 m.

Países: CHL(TAR, ATA, COQ).

Gymnophyton flexuosum Clos

Sin.: *Asteriscium flexuosum* Drude, hom. illeg., *Dipterygia flexuosa* Kuntze, *Dipterygia kingii* (Phil.) Kuntze, *Gymnophyton kingii* Phil., *Gymnophyton robustum* Clos var. *kingii* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémica. 800-2600 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Gymnophyton foliosum Phil.

Sin.: *Dipterygia foliosa* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Gymnophyton isatidicarpum (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance

Sin.: *Asteriscium isatidicarpum* Hook. & Arn., *Asteriscium spinescens* (Phil.) Drude, *Dipterygia isatidicarpa* C. Presl ex DC., nom. nud., *Dipterygia spinescens* (Phil.) Kuntze,

Gymnophyton spinescens Phil.,
Mulinum isatidicarpum C. Presl ex DC.
Arbusto. Endémica. 800-3500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Gymnophyton polycephalum (Gillies & Hook.) Clos
Sin.: *Asteriscium anethoides* Turcz.,
Asteriscium polycephalum Gillies & Hook.,
Asteriscium polycephalum Hieron. ex H. Wolff, hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 1200-3200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

Gymnophyton spinosissimum Phil.
Sin.: *Asteriscium spinosissimum* (Phil.)
Drude, *Dipterygia spinosissima* (Phil.)
Kuntze
Arbusto. Endémica. 2800-4500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Helosciadium W.D.J. Koch

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch
Sin.: *Apium nodiflorum* (L.) Lag., *Apium nodiflorum* (L.) Lag. var. *vulgare* (F.W. Schultz) H. Wolff, nom. inval., *Sium nodiflorum* L.
Hierba. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE).
CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Heracleum L.

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
Hierba. Introducida.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Homalocarpus Hook. & Arn.

Homalocarpus bowlesioides Hook. & Arn.
Sin.: *Bowlesia cana* Phil., *Bowlesia elata* Clos, *Bowlesia elegans* Clos
Hierba. Endémica. 900-1900 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Homalocarpus dichotomus (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance
Sin.: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC.,
Bowlesia dichotoma Poepp. ex DC. var. *albosquamata* Phil., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *chrysocarpa* Phil., *Bowlesia multiradiata* Colla
Hierba. Endémica. 400-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Homalocarpus digitatus (Phil.) Mathias & Constance
Sin.: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *digitata* (Phil.) Domin, *Bowlesia digitata* Phil.
Hierba. Endémica. 800-1100 m.
Países: CHL(ATA).

Homalocarpus dissectus Mathias & Constance
Hierba. Endémica. 100-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Homalocarpus integerrimus (Turcz.) Mathias & Constance
Sin.: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *integerrima* (Turcz.) Domin, *Bowlesia integerrima* Turcz.
Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, LBO).

Homalocarpus nigripetalus (Clos) Mathias & Constance
Sin.: *Bowlesia nigripetala* Clos
Hierba. Endémica. 200-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Levisticum Hill

Levisticum officinale W.D.J. Koch
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(LLA, MAG).

Lilaeopsis Greene

Lilaeopsis attenuata (Hook. & Arn.) Fernald
Sin.: *Crantzia attenuata* Hook. & Arn.,
Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose var. *attenuata* (Hook. & Arn.) A.W. Hill
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA). URY(CLA, COL, FLA, MON, SOR).

Lilaeopsis brasiliensis (Glaz.) Affolter
Sin.: *Crantzia brasiliensis* Glaz., *Lilaeopsis carolinensis* J.M. Coult. & Rose var. *minor* A.W. Hill, *Lilaeopsis minor* (A.W. Hill) Pérez-Mor.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA). URY(MON, RIV, SJO, TAC).

Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose
Sin.: *Crantzia carolinensis* (J.M. Coult. & Rose) Chodat
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MEN, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, PAI). URY(COL, MON, SJO).

Lilaeopsis occidentalis J.M. Coult. & Rose

Sin.: *Crantzia lineata* (Michx.) Nutt. var. *subulata* Wedd., nom. illeg., *Crantzia macloviana* Gand., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill, *Lilaeopsis andina* A.W. Hill f. *subulata* (Wedd.) Pérez-Mor., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill var. *microcarpa* Pérez-Mor., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill var. *multivittata* A.W. Hill, *Lilaeopsis exigua* Pérez-Mor., *Lilaeopsis hillii* Pérez-Mor., *Lilaeopsis lineata* Green, *Lilaeopsis macloviana* (Gand.) A.W. Hill, *Lilaeopsis patagonica* Pérez-Mor., *Lilaeopsis sinuata* A.W. Hill

Hierba. Nativa. 0-4700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Lilaeopsis tenuis A.W. Hill

Hierba. Endémica. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Notiosciadium Speg.**Notiosciadium pampicola** Speg.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(BAI). URY(CAS, CLA, FLA, SAO, SJO, SOR, TYT).

Oenanthe L.**Oenanthe crocata** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI).

Oenanthe globulosa L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: URY(MON).

Oligocladus Chodat & Wilczek**Oligocladus patagonicus** (Speg.) Pérez-Mor.

Sin.: *Oligocladus andinus* Chodat & Wilczek, *Sanicula patagonica* Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Osmorhiza Raf.**Osmorhiza berteroi** DC.

Sin.: *Osmorhiza berteroi* DC. var. *gracilior* Phil., *Osmorhiza chilensis* Hook. & Arn., *Schudia chilensis* Molina ex Gay

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Osmorhiza depauperata Phil.

Sin.: *Osmorhiza obtusa* (J.M. Coult. & Rose) Fernald, *Washingtonia obtusa* J.M. Coult. & Rose

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, MAG).

Osmorhiza glabrata Phil.

Sin.: *Elleimataenia renjifoana* (Phil.) Koso-Poliansky, *Myrrhis renjifoana* Phil., *Uraspermum glabratum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Osmorhiza mexicana Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Pastinaca L.**Pastinaca sativa** L.

Sin.: *Anethum pastinaca* Wibel

Hierba. Introducida. 500-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME). URY(CAS, MON).

Petroselinum Hill**Petroselinum crispum** (Mill.) Fuss

Sin.: *Apium crispum* Mill., *Ligusticum fernandezianum* Phil. ex Urb.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COS, DFE, LPA, SCR). BRA(SCA). CHL(VAL, JFE).

Pimpinella L.**Pimpinella anisum** L.

Sin.: *Seseli gilliesii* Hook. & Arn.

Hierba. Introducida. 400-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pozoa Lag.**Pozoa coriacea** Lag.

Sin.: *Azorella coriacea* (Lag.) Kuntze, *Azorella hydrocotylifolia* (Bridges ex Gardner) Macloskie, *Pozoa denticulata* Meyen, hom. illeg., *Pozoa hydrocotylifolia* Bridges ex Gardner

Hierba. Endémica. 1000-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Pozoa volcanica Mathias & Constance

Sin.: *Azorella volcanica* (Mathias & Constance) M. Hiroe

Hierba. Endémica. 1200-2400 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Sanicula L.

Sanicula crassicaulis Poepp. ex DC.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE).

Sanicula graveolens Poepp. ex DC.

Sin.: *Sanicula macrorrhiza* Bertero ex Colla, *Sanicula macrorrhiza* Bertero ex Colla var. *andina* F. Meigen

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Scandix L.

Scandix pecten-veneris L.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(ERI, SFE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Seseli L.

Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch

Sin.: *Ligusticum divaricatilobum* Clos, *Seseli penganum* Phil.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(BIO).

Sium L.

Sium latifolium L.

Hierba. Introducida. 100-1300 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Spermolepis Raf.

Spermolepis castellanosii Pérez-Mor.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).

Tordylium L.

Tordylium maximum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, SFE).

Torilis Adans.

Torilis arvensis (Huds.) Link

Sin.: *Caucalis arvensis* Huds.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, MIS, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO). URY(CLA, LAV, RIV).

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

Sin.: *Tordylium nodosum* L.

Hierba. Introducida. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). URY(CAS, CLA, FLO, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).

Visnaga Mill.

Visnaga daucoides Gaertn.

Sin.: *Ammi visnaga* (L.) Lam., *Daucus visnaga* L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, SAL, SJU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,

VAL, LBO, MAU, ARA, RME, JFE). URY(MON).

APOCYNACEAE

Allamanda L.

Allamanda schottii Pohl

Sin.: *Allamanda cathartica* L. var. *schottii* (Pohl) L.H. Bailey & Raffill, *Allamanda neriifolia* Hook.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Araujia Brot.

Araujia angustifolia (Hook. & Arn.) Steud.

Sin.: *Lagenia angustifolia* (Hook. & Arn.) E. Fourn., *Physianthus angustifolius* Hook. & Arn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). URY(ART, PAY, SAO, SOR).

Araujia brachystephana (Griseb.) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia brachystephana* Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, NAS, PHA). URY(PAY).

Araujia hassleriana (Malme) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia hassleriana* Malme

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON).

Araujia herzogii (Schltr.) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia herzogii* Schltr.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL).

Araujia megapotamica (Spreng.) G. Don

Sin.: *Araujia fusca* Griseb., *Araujia fusca* Griseb. var. *pallidiflora* Griseb., *Lagenia megapotamica* (Spreng.) E. Fourn., *Physianthus megapotamicus* Spreng.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(MON, PAY, ROC, SAO).

Araujia odorata (Hook. & Arn.) Fontella & Goyder

Sin.: *Cynanchum odoratum* Hook. & Arn., *Morrenia odorata* (Hook. & Arn.) Lindl.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, COA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA). URY(COL, SJO).

Araujia plumosa Schltdl.

Enredadera. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI).

Araujia scalae (Hicken) Fontella & Goyder

Sin.: *Hickenia scalae* (Hicken) Lillo, *Morrenia scalae* (Hicken) Goyder, *Oxypetalum scalae* Hicken

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE).

Araujia sericifera Brot.

Sin.: *Araujia albens* (Mart.) G. Don, *Araujia hortorum* E. Fourn., *Araujia*

sericifera Brot. var. *hortorum* (E. Fourn.) Malme, *Physianthus albens* Mart.

Enredadera. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APA, GUA, ITA). URY(CAS, CLA, FLO, MON, RIV, SAO).

Araujia stormiana Morong

Sin.: *Morrenia incana* S. Moore, *Morrenia schulziana* T. Mey., *Morrenia stormiana* (Morong) Malme

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SFE). PRY(APY, CHO, CON, PHA).

Araujia stuckertiana (Kurtz ex Heger)

Fontella & Goyder subsp. **grandiflora** (Malme) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia grandiflora* Malme, *Morrenia stuckertiana* (Kurtz ex Heger) Malme subsp. *grandiflora* (Malme) Goyder

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, FOR, LRI, SAL, SDE, TUC).

Araujia stuckertiana (Kurtz ex Heger)

Fontella & Goyder subsp. **stuckertiana**

Sin.: *Choristigma stuckertianum* Kurtz ex Heger, *Morrenia stuckertiana* (Kurtz ex Heger) Malme

Enredadera. Endémica. 100-1000 m.

Países: ARG(COR, FOR).

Araujia variegata (Griseb.) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia connectens* Malme, *Morrenia connectens* Malme var. *hunzikeri* T. Mey., *Morrenia variegata* (Griseb.) T. Mey., *Morrenia variegata* (Griseb.) T. Mey. var. *hunzikeri* (T.

Mey.) T. Mey., *Oxypetalum variegatum* Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

Asclepias L.

Asclepias barjoniifolia E. Fourn.

Sin.: *Asclepias cochabambensis* Rusby, *Asclepias fiebrigii* Schltr., *Asclepias kuntzei* Schltr., *Asclepias ramosa* E. Fourn., *Asclepias subulata* Larrañaga, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 1400-2600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Asclepias bracteolata E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Asclepias candida Vell.

Sin.: *Asclepias aequicomu* E. Fourn., *Asclepias blanchetii* E. Fourn., *Asclepias campestris* Decne., *Asclepias marginata* Decne., nom. illeg., *Asclepias multinervis* E. Fourn., *Asclepias pallida* E. Fourn., *Asclepias selloana* E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SLU). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, PAI, SPE). URY(RIV).

Asclepias curassavica L.

Sin.: *Asclepias aurantiaca* Salisb., nom. inval., *Asclepias bicolor* Moench, nom. illeg., *Asclepias margaritacea* Hoffmanns. ex Schult., *Asclepias nivea* L. var. *curassavica* (L.) Kuntze

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, IPA). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Notas: Probablemente se encuentre también en Uruguay

Asclepias langsdorffii E. Fourn.

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Asclepias mellodora A. St.-Hil.

Sin.: *Asclepias campestris* Decne. var. *angustifolia* Kuntze, *Asclepias campestris* Decne. var. *schlechteri* Kuntze, *Asclepias curupi* E. Fourn., *Asclepias hassleriana* Malme ex Chodat & Hassl., *Asclepias jangadensis* S. Moore, *Asclepias marginata* Decne. var. *bodenbenderi* Kuntze, *Asclepias mellodora* A. St.-Hil. var. *minor* A. St.-Hil., *Asclepias nervosa* Decne., *Asclepias papillosa* Silveira, *Asclepias umbellata* Vell.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Asclepias pilgeriana Schltr.

Sin.: *Asclepias campestris* Decne. var. *flava* Kuntze, *Asclepias flava* Lillo, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Aspidosperma Mart. & Zucc.

Aspidosperma australe Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma australe* Müll. Arg. var. *estrellense* Hassl., *Aspidosperma*

australe Müll. Arg. var. *longipetiolatum* Hassl., nom. nud., *Aspidosperma missionum* Speg., *Aspidosperma occidentale* Malme, *Aspidosperma quirandy* Hassl. var. *angustifolium* Hassl., *Aspidosperma quirandy* Hassl. var. *campestre* Hassl., *Aspidosperma quirandy* Hassl. var. *quirandy*, *Aspidosperma quirandy* Hassl. var. *silvaticum* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

Aspidosperma camporum Müll. Arg.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aspidosperma cuspa (Kunth) S.F. Blake

Sin.: *Aspidosperma sellowii* Müll. Arg. var. *collinum* Hassl., *Conoria cuspa* Kunth

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma cylindrocarpon* Müll. Arg. var. *longepetiolatum* Hassl., *Aspidosperma cylindrocarpon* Müll. Arg. var. *macrophyllum* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CON).

Aspidosperma macrocarpon Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON).

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma dugandii* Standl., *Aspidosperma peroba* Allemão ex Saldanha, *Aspidosperma polyneuron* Müll. Arg. var. *longifolium* Hassl.,

Aspidosperma venosum Müll. Arg., *Thyroma polyneurus* (Müll. Arg.) Miers

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Aspidosperma pyricollum Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma olivaceum* Müll. Arg.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: PRY(CON).

Aspidosperma pyrifolium C. Mart.

Sin.: *Aspidosperma australe* Müll. Arg. var. *erythroxyllum* Hassl., nom. nud., *Aspidosperma guaraniticum* Malme

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CON, PHA).

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.

Sin.: *Aspidosperma crotalorum* Speg., *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. f. *malmeanum* Markgr., *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. f. *schlechtendalianum* Markgr., *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. f. *spiegazzianum* Markgr., *Aspidosperma quebracho-colorado* Schltdl. var. *pendulum* Speg., *Aspidosperma quebrachoideum* Rojas Acosta, *Macaglia quebracho* Kuntze, nom. superfl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO).

Aspidosperma ramiflorum Müll. Arg.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aspidosperma riedelii Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma reductum* (Hassl.) Woodson, *Aspidosperma riedelii* Müll.

Arg. f. *microphyllum* Hassl.,
Aspidosperma riedelii Müll. Arg.
 subsp. *reductum* Hassl.
 Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(CAU, CEN, CON).

Aspidosperma subincanum A.DC.
 Sin.: *Aspidosperma chodatii* Markgr.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Aspidosperma tomentosum Mart.
 Sin.: *Aspidosperma rojasii* Hassl.
 Árbol. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,
 CAN, SPE).

Aspidosperma triternatum Rojas Acosta
 Sin.: *Aspidosperma chakensis* Speg.,
Aspidosperma horko-kebracho Speg.,
Aspidosperma quebracho-blanco
 Schltl. subsp. *brevifolium* Hassl.,
Aspidosperma quebracho-blanco
 Schltl. var. *ellipticum* Markgr.
 Árbol. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL).
 PRY(APY, CON, PHA).

Austrochthamalia Morillo & Fontella

Austrochthamalia major (E. Fourn.)
 Morillo & Fontella
 Sin.: *Chthamalia major* E. Fourn.
 Subarbusto. Nativa.
 Países: PRY(CAU).

Austrochthamalia teyucuaensis H.A.
 Keller
 Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS).

Barjonia Decne.

Barjonia erecta (Vell.) K. Schum.
 Sin.: *Apocynum erectum* Vell., *Barjonia*
obtusifolia E. Fourn., *Barjonia*
racemosa Decne., *Barjonia warmingii*
 E. Fourn.
 Subarbusto. Nativa. 300-1400 m.
 Países: BRA(PAR).

Blepharodon Decne.

Blepharodon ampliflorum E. Fourn.
 Liana. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Blepharodon angustifolium Malme
 Enredadera. Nativa. 200-500 m.
 Países: PRY(COA).

Blepharodon bicuspidatum E. Fourn.
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
 Países: BRA(PAR).

Blepharodon lineare (Decne.) Decne.
 Sin.: *Matelea linearis* Decne.,
Nephradenia linearis (Decne.) Benth.
 ex E. Fourn.
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1400 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,
 PAI, SPE).

Blepharodon pictum (Vahl) W.D.
 Stevens
 Sin.: *Blepharodon nitidum* (Vell.) J.F.
 Macbr., *Cynanchum nitidum* Vell.,
Cynanchum pictum Vahl
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1800 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,
 CON, COA, PAI, SPE).

Blepharodon reflexum Malme
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(SPE).

Brargentina Morillo & H.A. Keller

Brargentina bornmulleri (Schltr. ex
 Malme) Morillo & H.A. Keller
 Sin.: *Gyrostelma bornmuelleri* Schltr. ex
 Malme, *Rojasia bornmuelleri* (Schltr.
 ex Malme) Fontella, S. Cáceres & R.
 Santos
 Hierba. Endémica. 100-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS). PRY(MIE).

Caa H.A. Keller & Liede

Caa balansae (Fontella & Morillo) H.A.
 Keller & Liede
 Sin.: *Matelea balansae* Morillo & Fontella
 Hierba o enredadera. Endémica. 300-
 800 m.
 Países: ARG(MIS). PRY(CAU).

Calotropis R. Br.

Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton
 Sin.: *Asclepias procera* Aiton, *Calotropis*
gigantea (L.) W. T. Aiton var. *procera*
 (Aiton) P. T. Li, *Madorius procerus*
 (Aiton) Kuntze
 Arbusto o arbolito. Introducida. 200-500
 m.
 Países: ARG(SAL). PRY(APY).

Catharanthus G. Don

Catharanthus roseus (L.) G. Don
 Sin.: *Ammocallis rosea* (L.) Small,
Lochnera rosea (L.) Rchb. ex Endl.,
 nom. inval., *Vinca rosea* L.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR,
 RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY,
 CEN, PAI). URY(SAO).

Condylorcarpon Desf.

Condylorcarpon isthmicum (Vell.) A.DC.
Sin.: *Condylorcarpon rauwolfiae* (A. DC.) Müll. Arg., *Condylorcarpon rauwolfiae* (A. DC.) Müll. Arg. var. *acuminulatum* Müll. Arg., *Condylorcarpon rauwolfiae* (A. DC.) Müll. Arg. var. *tomentosa* Müll. Arg., *Echites isthmicus* Vell., *Maycockia rauwolfiae* A. DC.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN). URY(ART, SAO).

Cristobalia Morillo, S.A. Cáceres & H.A. Keller

Cristobalia australis (Malme) H.A. Keller & Liede
Sin.: *Gonolobus australis* (Malme) Herter, *Matelea australis* (Malme) Pontiroli, *Pseudibatia australis* Malme
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(CAU). URY(LAV, RNO, TAC).
Notas: Es posible su presencia en Paraguay.

Cristobalia bella Morillo, H.A. Keller & S.A. Cáceres
Subarbusto. Endémica. 200-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Cristobalia hirsutissima (Schltr.) Morillo, S.A. Cáceres & H.A. Keller
Sin.: *Gonolobus hirsutissimus* Schltr., *Gonolobus lilloanus* T. Mey., *Matelea hirsutissima* (Schltr.) Goyder, *Matelea lilloana* (T. Mey.) Pontiroli
Subarbusto. Nativa. 1700-2700 m.
Países: ARG(SAL).

Cristobalia hispida (Hook. & Arn.) H.A. Keller & Liede
Sin.: *Gonolobus hispidus* Hook. & Arn., *Matelea hispida* (Hook. & Arn.) Bacigalupo, *Pseudibatia stuckertii* Malme
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, ERI, TUC). BRA. URU.

Cynanchum L.

Cynanchum caudiculatum Rapini
Sin.: *Cynanchum ekmanii* (Malme) Sundell, nom. illeg., *Roulinia ekmanii* Malme, *Telminostelma ekmanii* (Malme) Fontella & E.A. Schwarz
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). PRY.

Cynanchum montevidense Spreng.
Sin.: *Asclepias cordata* Vell., hom. illeg., *Asclepias foetida* Cav., *Cynanchum foetidum* (Cav.) Kunth, *Cynanchum tamifolium* Hook. & Arn., *Roulinia acuta* Decne., *Roulinia blanda* Decne., *Roulinia convolvulacea* Decne., *Roulinia cordata* J.F. Macbr., *Roulinia fluminensis* Decne., nom. illeg., *Roulinia mannii* Rusby, *Roulinia modesta* Decne., *Roulinia montevidensis* (Spreng.) Malme, *Roulinia riedelii* E. Fourn., *Roulinia selloana* E. Fourn., *Roulinia tamifolia* (Hook. & Arn.) Decne., *Roulinia versicolor* Lem., *Telminostelma foetidum* (Cav.) Fontella & E.A. Schwarz, *Vincetoxicum montevidense* (Spreng.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 200-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, APY, CEN, CON, COA, PHA, SPE). URY(MON, SJO).

Cynanchum rioparanense Sundell
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cynanchum roulinioides (E. Fourn.) Rapini
Sin.: *Telminostelma roulinioides* E. Fourn.
Enredadera. Nativa. 300
Países: PRY(AMA).

Diplolepis R. Br.

Diplolepis australis (Malme) Hechem & C. Ezcurra
Sin.: *Metastelma australe* Malme, *Tweedia australis* (Malme) C. Ezcurra, *Tweedia odonellii* T. Mey.
Hierba o subarbusto. Endémica. 300-1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Diplolepis biflora (Phil.) Hechem & C. Ezcurra
Sin.: *Cynanchum nummulariifolium* Hook. & Arn. var. *biflorum* (Phil.) Reiche, *Cynoctonum biflorum* Phil., *Diplolepis nummulariifolia* (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. *biflora* (Phil.) Hechem & C. Ezcurra, *Vincetoxicum biflorum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, BIO, ARA, RME).

Diplolepis boerhaviifolia (Hook. & Arn.) Liede & Rapini
Sin.: *Cynanchum boerhaviifolium* Hook. & Arn., *Cynoctonum boerhaviifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Oxypetalum parvifolium* Phil., hom. illeg., *Schizostemma kingii* Phil.

- Hierba o subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).
- Diplolepis bulligera** (Speg.) Hechem & C. Ezcurra
Sin.: *Cynanchum bulligerum* (Speg.) Macloskie & Dusén, *Vincetoxicum bulligerum* Speg.
Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: ARG(CHU).
- Diplolepis descolei** (T. Mey.) Liede & Rapini
Sin.: *Cynanchum descolei* T. Mey.
Enredadera. Endémica. 200-800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
- Diplolepis diemii** (T. Mey.) Hechem & C. Ezcurra
Sin.: *Cynanchum diemii* T. Mey.
Enredadera. Endémica. 600-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
- Diplolepis geminiflora** (Decne.) Liede & Rapini
Sin.: *Astephanus geminiflorus* Decne.
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).
- Diplolepis hieronymi** (Lorentz) Liede & Rapini
Sin.: *Astephanus fallax* (Hicken) T. Mey., *Astephanus hieronymi* (Lorentz) Malme, *Cynanchum fallax* Hicken, *Cynanchum hieronymi* (Lorentz) Hicken, *Grisebachella hieronymi* Lorentz
Arbusto. Endémica. 600-1800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU).
- Diplolepis menziesii** Schult. f.
Enredadera. Endémica. 300-900 m.
- Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Diplolepis mucronata** (Decne.) Hechem & C. Ezcurra
Sin.: *Cynanchum chilense* (Phil.) Malme, *Cynanchum mucronatum* (Decne.) Reiche, hom. illeg., *Cynoctonum mucronatum* Decne., *Holostemma chilense* Phil., *Vincetoxicum mucronatum* (Decne.) Kuntze
Enredadera. Endémica. 800-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).
- Diplolepis myrtifolia** (Hook. & Arn.) Hechem & C. Ezcurra
Sin.: *Cynanchum myrtifolium* Hook. & Arn., *Cynoctonum myrtifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Cynoctonum nemorosum* Phil., *Vincetoxicum nemorosum* (Phil.) Kuntze
Enredadera. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ARA, LSR, LLA).
- Diplolepis nummulariifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini
Sin.: *Cynanchum andinum* Liede, *Cynanchum nanellum* P.T. Li, *Cynanchum nanissimum* Liede, nom. illeg., *Cynanchum nanum* Skottsb., hom. illeg., *Cynanchum nummulariifolium* Hook. & Arn., *Cynanchum patagonicum* (Phil.) Malme, *Cynanchum undulatum* (Decne.) K. Schum., hom. illeg., *Cynoctonum nummulariifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Cynoctonum patagonicum* Phil., *Cynoctonum undulatum* Decne., *Vincetoxicum nummulariifolium* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Vincetoxicum patagonicum* (Phil.) Kuntze, *Vincetoxicum undulatum* (Decne.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 300-3000 m.
- Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).
- Diplolepis pachyphylla** (Decne.) Hechem & C. Ezcurra
Sin.: *Cynanchum acutifolium* (Phil.) Reiche, *Cynanchum chiloense* (Decne.) Malme, *Cynanchum lancifolium* Hook. & Arn., hom. illeg., *Cynanchum pachyphyllum* (Decne.) K. Schum., *Cynoctonum acutifolium* Phil., *Cynoctonum chiloense* Decne., *Cynoctonum pachyphyllum* Decne., *Vincetoxicum chiloense* (Decne.) Kuntze, *Vincetoxicum pachyphyllum* (Decne.) Kuntze
Enredadera. Endémica. 100-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).
- Diplolepis viridis** (Phil.) Hechem & C. Ezcurra
Sin.: *Cynanchum atacamense* Liede, *Cynanchum deserticola* A.R. Flores & J.M. Watson, *Cynanchum viride* (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Cynoctonum viride* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Ditassa** R. Br.
- Ditassa burchellii** Hook. & Arn.
Sin.: *Cynanchum bonariense* (Decne.) T. Mey., *Ditassa anomala* Mart., *Ditassa bonariensis* Decne., *Metastelma burchellii* (Hook. & Arn.) Rapini
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CON, PAI).
- Ditassa edmundoi** Fontella & C. Valente
Enredadera. Endémica. 700-1800 m.

Países: BRA(PAR).

Ditassa hispida (Vell.) Fontella

Sin.: *Amphistelma ferrugineum* E. Fourn., *Asclepias hispida* Vell., *Ditassa consanguinea* Decne., *Ditassa fulva* E. Fourn., *Ditassa guilleminiana* Decne., *Ditassa klotzschii* E. Fourn., nom. superfl., *Ditassa paranensis* Malme, *Ditassa riedelii* E. Fourn., *Ditassa rufescens* Decne., *Ditassa velutina* E. Fourn., *Metastelma hirsutum* Klotzsch
Enredadera. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Ditassa obcordata Mart.

Sin.: *Ditassa niruri* Decne.
Enredadera. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Ditassa racemosa Britton

Sin.: *Ditassa montana* Schtdl., hom. illeg., *Ditassa schlechteri* J.F. Macbr.
Enredadera. Nativa. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Ditassa tomentosa (Decne.) Fontella

Sin.: *Metastelma tomentosum* Decne.
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR).

Elytropus Müll. Arg.

Elytropus chilensis (A. DC.) Müll. Arg.

Sin.: *Echites chilensis* A. DC., *Echites heterophyllus* Miq., *Echites ptarmicus* Poepp., *Echites pubescens* Hook. & Arn., hom. illeg., *Elytropus heterophyllus* (Miq.) Miers, *Elytropus ptarmicus* (Poepp.) Miers
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Fischeria DC.

Fischeria stellata (Vell.) E. Fourn.

Sin.: *Cynanchum stellatum* Vell., *Fischeria acuminata* Decne., *Fischeria boliviana* S.F. Blake, *Fischeria calycina* Decne., *Fischeria hilariana* E. Fourn., *Fischeria martiana* Decne., *Fischeria multiflora* Decne., *Fischeria propingua* Decne., *Fischeria riedelii* E. Fourn., *Fischeria rotundifolia* Decne., *Fischeria warmingii* E. Fourn., *Gonolobus martianus* (Decne.) Hook.
Enredadera o liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, ITA).

Forsteronia G. Mey.

Forsteronia australis Müll. Arg.

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Forsteronia correntina C. Ezcurra &

Tressens
Liana. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Forsteronia glabrescens Müll. Arg.

Sin.: *Thyrsanthus glabrescens* (Müll. Arg.) Miers
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, SAO).

Forsteronia leptocarpa (Hook. & Arn.) A. DC.

Sin.: *Parsonsia leptocarpa* Hook. & Arn., *Thyrsanthus leptocarpus* (Hook. & Arn.) Griseb.
Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Forsteronia pubescens A.DC.

Sin.: *Thyrsanthus leptocarpus* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *pubescens* (A. DC.) Griseb., *Thyrsanthus placidus* Miers, *Thyrsanthus pubescens* (A. DC.) Miers
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Forsteronia refracta Müll. Arg.

Sin.: *Forsteronia floribunda* Müll. Arg., hom. illeg., *Forsteronia lagoensis* Müll. Arg., *Thyrsanthus myrianthus* Miers
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, PAI).

Forsteronia rufa Müll. Arg.

Sin.: *Forsteronia rufa* Müll. Arg. var. *subglabra* Malme, *Thyrsanthus rufus* (Müll. Arg.) Miers
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.

Sin.: *Echites thyrsoides* Vell., *Forsteronia multinervia* A. DC., *Forsteronia multinervia* A. DC. var. *glabriuscula* A. DC., *Forsteronia multinervia* A. DC. var. *ovalifolia* Müll. Arg., *Forsteronia thyrsoides* (Vell.) Müll. Arg. var. *glabriuscula* (A. DC.) Woodson, *Thyrsanthus multinervius* (A. DC.) Miers
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, PAI).

Forsteronia velloziana (A. DC.) Woodson

Sin.: *Echites vellozianus* A. DC.

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Funastrum E. Fourn.

Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.

Sin.: *Asclepias clausa* Jacq., *Ceramanthus bonariensis* (Hook. & Arn.) Malme, *Ceramanthus cuspidatus* (E. Fourn.) Malme, *Ceramanthus riparius* (Decne.) Malme, *Cynanchum clausum* (Jacq.) Jacq., *Funastrum apiculatum* (Decne.) Schltr., *Funastrum barbatum* (Mart. ex E. Fourn.) Schltr., *Funastrum bonariense* (Hook. & Arn.) Schltr., *Funastrum cuspidatum* (E. Fourn.) Schltr., *Funastrum fragile* Rusby, *Funastrum gardneri* (E. Fourn.) Schltr., *Funastrum glaziovii* (K. Schum.) Schltr., *Funastrum lanceolatum* Rusby, *Funastrum pallidum* (E. Fourn.) Schltr., *Funastrum pedunculatum* (E. Fourn.) Schltr., *Funastrum riparium* (Decne.) Schltr., *Funastrum schottii* (E. Fourn.) Schltr., *Philibertia pallida* (E. Fourn.) Schltr., *Philibertia riparia* (Decne.) Stuntz, *Philibertia bonariensis* (Hook. & Arn.) Malme, *Philibertia clausa* (Jacq.) K. Schum., *Philibertia cuspidata* (E. Fourn.) Malme, *Philibertia gardneri* (E. Fourn.) K. Schum., *Philibertia riparia* (Decne.) Malme, *Sarcostemma apiculatum* Decne., *Sarcostemma barbatum* E. Fourn., *Sarcostemma bifidum* E. Fourn., *Sarcostemma bonariense* Hook. & Arn., *Sarcostemma clausum* (Jacq.) Roem. & Schult., *Sarcostemma cuspidatum* E. Fourn., *Sarcostemma gardneri* E. Fourn., *Sarcostemma glaziovii* K. Schum., *Sarcostemma pallidum* E. Fourn., *Sarcostemma pedunculatum* E.

Fourn., *Sarcostemma riparium* Decne., *Sarcostemma schottii* E. Fourn.
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA). URY(ART).

Funastrum flavum (Decne.) Malme

Sin.: *Ceramanthus flavus* (Decne.) Malme, *Cystostemma umbellatum* E. Fourn., *Funastrum longifolium* (Arechav.) Schltr., *Philibertia longifolia* Arechav., *Philibertia stellaris* Griseb., *Sarcostemma flavum* Decne.
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, MON, SJO).

Funastrum gracile (Decne.) Schltr.

Sin.: *Amphistelma exsertum* Griseb., *Ceramanthus gracilis* (Decne.) Malme, *Philibertia exserta* (Griseb.) Schltr., *Sarcostemma carpophyloides* Morong, *Sarcostemma gracile* Decne.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY).

Gomphocarpus R. Br.

Gomphocarpus fruticosus (L.) W. T.

Aiton

Sin.: *Asclepias fruticosa* L., *Asclepias glabra* Mill., *Asclepias salicifolia* Salisb., nom. superfl.
Subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, SJU). BRA(PAR, SCA). URY(CAS, MON, SJO, TYT).

Gomphocarpus physocarpus E. Mey.

Sin.: *Asclepias brasiliensis* (E. Fourn.) Schltr., *Asclepias physocarpa* (E.

Mey.) Schltr., *Gomphocarpus brasiliensis* E. Fourn., *Gomphocarpus fruticosus* (L.) R. Br. f. *brasiliensis* (E. Fourn.) Briq.
Subarbusto. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Gonolobus Michx.

Gonolobus parviflorus Decne.

Sin.: *Exolobus selloanus* E. Fourn., *Gonolobus brittonii* Rusby, *Gonolobus floribundus* Malme, *Gonolobus selloanus* (E. Fourn.) Bacigalupo, *Pseudibatia herzogii* Schltr.
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA). URY(ART, PAY, SAO).

Gonolobus rostratus (Vahl) Roem. & Schult.

Sin.: *Cynanchum rostratum* Vahl, *Cynanchum rotatum* Vell., *Exolobus patens* (Decne.) E. Fourn., *Exolobus patens* (Decne.) E. Fourn. var. *paraguayensis* Malme, *Exolobus rotatus* (Vell.) E. Fourn., *Exolobus stenolobus* (Decne.) E. Fourn., *Gonolobus patens* Decne., *Gonolobus rotatus* (Vell.) Decne., *Gonolobus stenolobus* Decne.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, SPE).

Hancornia Gomes

Hancornia speciosa Gomes

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Hemipogon Decne.

Hemipogon acerosus Decne.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(AMA).

Hemipogon setaceus Decne.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Ibatia Decne.

Ibatia boliviensis (Schltr.) Morillo

Sin.: *Gonolobus boliviensis* (Schltr.) T. Mey., *Matelea boliviensis* (Schltr.)

Goyder, *Pseudibatia boliviensis* Schltr.

Enredadera. Nativa. 2000-2900 m.

Países: ARG(SAL).

Ibatia calchaquina (C. Ezcurra & Belgrano) H.A. Keller & Liede

Sin.: *Matelea calchaquina* C. Ezcurra & Belgrano

Subarbusto. Endémica.

Países: ARG(SAL).

Ibatia dummelii H.A. Keller

Hierba. Endémica. 1100-1200 m.

Países: ARG(SAL).

Ibatia fiebrigii (Schltr.) Morillo

Sin.: *Gonolobus argentinensis* T. Mey., *Gonolobus argentinensis* T. Mey. var.

macrophyllus T. Mey., *Gonolobus fiebrigii* Schltr., *Matelea argentinensis* (T. Mey.) Pontiroli, *Matelea fiebrigii* (Schltr.) Goyder

Enredadera. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Ibatia foetida (Griseb.) H.A. Keller & Liede

Sin.: *Gonolobus foetidus* Griseb., *Gonolobus lanatus* Griseb., *Matelea foetida* (Griseb.) C. Ezcurra & Belgrano, *Pseudibatia foetida* (Griseb.)

Malme, *Pseudibatia lanata* (Griseb.)

Malme

Subarbusto. Endémica.

Países: ARG(CAT, COR, LRI).

Ibatia friesii (Malme) Morillo

Sin.: *Gonolobus friesii* (Malme) T. Mey., *Matelea friesii* (Malme) Goyder, *Pseudibatia friesii* Malme

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL, TUC). PRY(PHA).

Ibatia hirta (Malme) H.A. Keller & Liede

Sin.: *Gonolobus hirtus* Griseb., hom. illeg., *Gonolobus hirtus* Griseb. var.

longipedunculatus T. Mey., *Matelea chacoensis* Goyder, nom. superfl., *Matelea hirta* (Malme) Goyder,

Pseudibatia hirta Malme

Enredadera. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Ibatia micrantha H.A. Keller

Hierba. Endémica. 1100-1200 m.

Países: ARG(SAL).

Ibatia schreiteri (T. Mey.) Morillo

Sin.: *Gonolobus schreiteri* T. Mey., *Matelea schreiteri* (T. Mey.) Pontiroli

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ibatia venturii (Malme) Morillo

Sin.: *Gonolobus venturii* Malme

Enredadera. Endémica. 1400-1500 m.

Países: ARG(TUC).

Jobinia E. Fourn.

Jobinia connivens (Hook. & Arn.) Malme

Sin.: *Cynanchum connivens* Hook. & Arn., *Jobinia hernandifolia* (Decne.) E. Fourn., *Metastelma hernandifolium* Decne., *Roulinia connivens* (Hook. & Arn.) Decne.

Enredadera. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TYT).

Jobinia fontellana Liede & Meve

Sin.: *Orthosia hatschbachii* Fontella & Goes

Enredadera. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Jobinia glossostemma (Lillo) Liede & Meve

Sin.: *Cynanchum glossostemma* Lillo

Enredadera. Endémica. 1600-2300 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Jobinia hatschbachii Fontella & E.A. Schwarz

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Jobinia latipes (Decne.) Liede & Meve

Sin.: *Cyathostelma latipes* (Decne.) E. Fourn., *Metastelma latipes* Decne., *Orthosia latipes* (Decne.) Malme

Enredadera. Nativa. 300-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Jobinia lindbergii E. Fourn.

Sin.: *Cyathostelma furcatum* E. Fourn., *Jobinia furcata* (E. Fourn.) Fontella

Liana. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Jobinia paranaensis Fontella & C. Valente

Enredadera. Nativa. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Jobinia samuelssonii (Malme) Liede & Meve

Sin.: *Cynanchum samuelssonii* Malme
Enredadera. Endémica. 1700-2400 m.
Países: ARG(JUU, TUC).

Jobinia trifurcata (Griseb.) Liede & Meve
Sin.: *Cynanchum argentinense* Liede, *Cynanchum trifurcatum* (Griseb.) Lillo, nom. illeg., *Metastelma trifurcatum* Griseb.

Enredadera. Nativa. 1000-2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SJU, SLU, TUC).

Macropharynx Rusby

Macropharynx meyeri (C. Ezcurra) Xifreda

Sin.: *Temnadenia meyeri* C. Ezcurra
Liana. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Macropharynx peltata (Vell.) J.F. Morales, M.E. Endress & Liede

Sin.: *Echites macrocalyx* Müll. Arg., *Echites peltatus* Vell., M.E. Endress & Liede, *Macropharynx macrocalyx* (Müll. Arg.) J.F. Morales, *Peltastes macrocalyx* (Müll. Arg.) Woodson, *Peltastes malviflorus* Woodson, *Peltastes peltatus* (Vell.) Woodson, *Peltastes stemmadeniiflorus* Woodson, *Stipecoma macrocalyx* (Müll. Arg.) Miers
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, ITA).

Macroscepis Kunth

Macroscepis dutrae (Malme) Morillo

Sin.: *Gonolobus dutrae* Malme
Liana. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Macroscepis elliptica N.E. Br.

Sin.: *Macroscepis magnifica* Malme
Liana. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, GUA).

Macroscepis grandiflora (Mart.) H.A. Keller & Liede

Sin.: *Araujia grandiflora* (Mart.) Morong, *Schubertia grandiflora* Mart., *Schubertia hamata* E. Fourn., *Schubertia muricata* E. Fourn.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Macroscepis hatschbachii Morillo

Liana. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Macroscepis schreiteri (Descole & T. Mey.) H.A. Keller & Liede

Sin.: *Schubertia peredoi* T. Mey., *Schubertia schreiteri* Descole & T. Mey.
Enredadera o liana. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(PAI).

Macroscepis selloana E. Fourn.

Liana. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Malouetia DC.

Malouetia cestroides (Nees) Müll. Arg.

Sin.: *Tabernaemontana cestroides* Nees
Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Mandevilla Lindl.

Mandevilla angustifolia (Malme)

Woodson
Sin.: *Dipladenia angustifolia* Malme, *Mandevilla minor* Woodson
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, CON, PAI, PHA).

Mandevilla atrovioleacea (Stadelm.)

Woodson
Sin.: *Echites atrovioleaceus* Stadelm.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mandevilla brachyloba (Müll. Arg.) K. Schum.

Sin.: *Amblyanthera brachyloba* Müll. Arg., *Echites brachylobus* (Müll. Arg.) Miers
Enredadera. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.)

Woodson
Sin.: *Dipladenia saponariae* A. DC., *Dipladenia xanthostoma* (Stadelm.) Müll. Arg., *Echites coccineus* Hook. & Arn., *Echites xanthostoma* Stadelm., *Rhodocalyx coccineus* (Hook. & Arn.) Miers, *Rhodocalyx ovatus* Miers, nom. superfl., *Rhodocalyx tweedii* Miers, nom. superfl., *Temnadenia xanthostoma* (Stadelm.) Miers
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA). URY(RIV, ROC, TAC).

Mandevilla emarginata (Vell.) C. Ezcurra

Sin.: *Echites emarginatus* Vell., *Echites erectus* Vell., hom. illeg., *Laseguea*

acutifolia A. DC., *Laseguea erecta* Müll. Arg., *Laseguea erecta* Müll. Arg. var. *acutifolia* (A. DC.) Müll. Arg., *Laseguea erecta* Müll. Arg. var. *glabra* (A. DC.) Müll. Arg., *Laseguea erecta* Müll. Arg. var. *scabrinervia* Müll. Arg., *Laseguea erecta* Vell. var. *guilleminiana* (A. DC.) Müll. Arg., *Laseguea glabra* A. DC., *Laseguea guilleminiana* A. DC., *Mandevilla erecta* Woodson
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA). URY(CLA, RIV).

Mandevilla funiformis (Vell.) K. Schum.
Sin.: *Echites funiformis* Vell.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mandevilla grata Woodson
Enredadera. Endémica. 200-500 m.
Países: ARG(COR, TUC).
Notas: Probable híbrido entre *M. laxa* y *M. pentlandiana*.

Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum.
Sin.: *Echites hirsutus* Rich.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Mandevilla illustris (Vell.) Woodson
Sin.: *Echites illustris* Vell.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Mandevilla immaculata Woodson
Enredadera. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson
Sin.: *Amblyanthera bridgesii* Müll. Arg., *Amblyanthera suaveolens* (Lindl.) Müll. Arg., *Echites laxus* Ruiz & Pav.,

Echites suaveolens (Lindl.) A. DC., *Mandevilla bridgesii* (Müll. Arg.) Woodson, *Mandevilla suaveolens* Lindl.
Enredadera o liana. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Mandevilla longiflora (Desf.) Pichon
Sin.: *Echites guaraniticus* A. St.-Hil., *Echites longiflorus* Desf., *Macrosiphonia guaranítica* (A. St.-Hil.) Müll. Arg., *Macrosiphonia longiflora* (Desf.) Müll. Arg., *Macrosiphonia longiflora* (Desf.) Müll. Arg. var. *guaranítica* (A. St.-Hil.) Malme
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Mandevilla pentlandiana (A. DC.) Woodson
Sin.: *Echites bracteatus* (Hook. & Arn.) Griseb., hom. illeg., *Echites tweedianus* Hieron., nom. superfl., *Laseguea bracteata* (Hook. & Arn.) K. Schum., *Laseguea hookeri* Müll. Arg., nom. superfl., *Laseguea pentlandiana* A. DC., *Parsonia bracteata* Hook. & Arn.
Enredadera o liana. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA).

Mandevilla petraea (A. St.-Hil.) Pichon
Sin.: *Echites grandiflorus* Hook. & Arn., hom. illeg. var. *minor* Hook. & Arn., *Echites petraeus* A. St.-Hil., *Echites pinifolius* A. St.-Hil., *Macrosiphonia balansae* Chodat, *Macrosiphonia petraea* (A. St.-Hil.) K. Schum.,

Macrosiphonia petraea (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *minor* (Hook.) Woodson, *Macrosiphonia petraea* (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *pinifolia* (A. St.-Hil.) Woodson, *Macrosiphonia pinifolia* (A. St.-Hil.) Malme, hom. illeg., *Macrosiphonia pinifolia* (A. St.-Hil.) Miers, *Macrosiphonia pinifolia* (A. St.-Hil.) Miers f. *glabrata* Chodat & Vischer, *Macrosiphonia pinifolia* (A. St.-Hil.) Miers f. *setosa* Chodat & Vischer, *Macrosiphonia verticillata* Müll. Arg., nom. superfl., *Macrosiphonia verticillata* Müll. Arg. var. *intermedia* Müll. Arg., *Macrosiphonia verticillata* Müll. Arg. var. *petraea* (A. St.-Hil.) Müll. Arg.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Mandevilla pohliana (Stadelm.) A.H. Gentry
Sin.: *Dipladenia gentianoides* A. DC., *Dipladenia gentianoides* A. DC. var. *velutina* Müll. Arg., *Dipladenia gentianoides* Müll. Arg. f. *obovata* Müll. Arg., *Dipladenia velutina* A. DC., *Echites pohlianus* Stadelm., *Echites velutinus* Mart. ex Stadelm., hom. illeg., *Mandevilla pohliana* (Stadelm.) A.H. Gentry var. *velutina* A.H. Gentry, *Mandevilla velutina* (Mart. ex Stadelm.) Woodson, comb. illeg., *Mandevilla velutina* (Mart. ex Stadelm.) Woodson, comb. illeg. var. *glabra* (Müll. Arg.) Woodson
Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).

Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K. Schum.

Sin.: *Echites scabra* Hoffmanns. ex Roem. & Schult.

Liana. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mandevilla sellowii (Müll. Arg.) Woodson

Sin.: *Dipladenia sellowii* Müll. Arg.

Enredadera. Nativa. 300-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mandevilla spigeliiflora (Stadelm.) Woodson

Sin.: *Echites spigeliiflorus* Stadelm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Mandevilla undulata (C. Ezcurra) A.O. Simões, Kin.-Gouv. & M.E. Endress

Sin.: *Macrosiphonia undulata* C. Ezcurra

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).

Mandevilla urophylla (Hook. f.) Woodson

Sin.: *Dipladenia urophylla* Hook. f.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mandevilla velame (A. St.-Hil.) Pichon

Sin.: *Echites velame* A. St.-Hil., *Macrosiphonia velame* (A. St.-Hil.) Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Mandevilla virescens (A. St.-Hil.) Pichon

Sin.: *Echites virescens* A. St.-Hil., *Macrosiphonia virescens* (A. St.-Hil.) Müll. Arg., *Macrosiphonia virescens*

(A. St.-Hil.) Müll. Arg. var. *missionum* Chodat

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Mandevilla widgrenii C. Ezcurra

Sin.: *Dipladenia linearis* Müll. Arg., *Mandevilla linearis* (Müll. Arg.)

Woodson, hom. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN).

Matelea Aubl.

Matelea denticulata (Vahl) Fontella & E.A. Schwarz

Sin.: *Cynanchum denticulatum* Vahl, *Cynanchum viride* Vell., *Gonolobus denticulatus* (Vahl) W.D. Stevens, *Gonolobus obtusiflorus* Decne., *Gonolobus stelliflorus* E. Fourn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Matelea dusenii Morillo

Enredadera. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Matelea glaziovii (E. Fourn.) Morillo

Sin.: *Phaeostemma glaziovii* E. Fourn.

Enredadera. Nativa. 400-600 m.

Países: BRA(PAR).

Matelea hatschbachii (Fontella & C. Valente) Morillo

Sin.: *Gonolobus hatschbachii* Fontella & C. Valente

Enredadera. Endémica. 300-1600 m.

Países: BRA(PAR).

Matelea orthosioides (E. Fourn.) Fontella

Sin.: *Gonolobus orthosioides* E. Fourn.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Matelea pyrrhotricha (Decne.) Fontella

Sin.: *Gonolobus pyrrhotrichus* Decne.

Liana. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Matelea reitzii Fontella

Enredadera. Endémica. 900

Países: BRA(SCA).

Mesechites Müll. Arg.

Mesechites mansoanus (A. DC.) Woodson

Sin.: *Echites mansoanus* A. DC.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CEN).

Mesechites trifidus (Jacq.) Müll. Arg.

Sin.: *Echites sanctae-crucis* S. Moore, *Echites trifidus* Jacq., *Echites trifidus* Jacq. var. *sanctae-crucis* (S. Moore) Malme, *Mesechites sanctae-crucis* (S. Moore) Woodson

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE).

Metastelma R. Br.

Metastelma fiebrigii Schltr.

Sin.: *Metastelma microgynostegia* Pontiroli

Enredadera. Nativa. 1300-2300 m.

Países: ARG(JUU).

Metastelma schlechteri J.F. Macbr.

Sin.: *Metastelma ditassoides* Schltr., hom. illeg., *Metastelma oranense* Lillo ex T. Mey.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

- Países: ARG(JUU, SAL).
- Metastelma tubatum** Griseb.
Sin.: *Metastelma herzogii* Schltr.
Subarbusto. Nativa. 1100-2900 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL).
PRY(APY).
- Minaria** T.U.P. Konno & Rapini
- Minaria acerosa** (Mart.) T.U.P. Konno & Rapini
Sin.: *Ditassa acerosa* Mart., *Ditassa ericoides* Decne.
Subarbusto. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).
- Nautonia** Decne.
- Nautonia nummularia** Decne.
Hierba. Nativa. 300-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, SPE).
- Orthosia** Decne.
- Orthosia congesta** (Vell.) Decne. subsp. **congesta**
Sin.: *Amphistelma streptolobum* E. Fourn., *Cynanchum congestum* Vell., *Gonolobus congestus* Decne., *Matelea congesta* (Decne.) Woodson, *Vincetoxicum congestum* (Vell.) Kuntze, *Vincetoxicum streptolobum* (E. Fourn.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, PAI).
- Orthosia congesta** Decne. subsp. **brachystephana** (Malme) Liede & Meve
Sin.: *Orthosia congesta* (Vell.) Decne. var. *brachystephana* Malme
Liana. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Orthosia dusenii** (Malme) Fontella
Sin.: *Metastelma dusenii* Malme
Enredadera. Endémica. 1000-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Orthosia florida** (Vell.) Liede & Meve
Sin.: *Amphistelma angulatum* E. Fourn., *Amphistelma aphyllum* E. Fourn., *Amphistelma chloranthum* A. Silv., *Cynanchum aphyllum* Vell., hom. illeg., *Cynanchum floridum* Vell., *Orthosia aphylla* Malme, *Tassadia subulata* (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. *florida* (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz, *Vincetoxicum aphyllum* (Vell.) Kuntze
Liana. Nativa. 0-2400 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, GUA, PAI). URY(MAL).
- Orthosia guilleminiana** (Decne.) Liede & Meve
Sin.: *Metastelma guilleminianum* (Decne.) Malme, *Vincetoxicum guilleminianum* Decne.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(AMA).
- Orthosia loandensis** Fontella & C. Valente
Enredadera. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(PAR).
- Orthosia paranaensis** Liede & Meve
Liana. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).
- Orthosia pearcei** (Rusby) Liede & Meve
Sin.: *Amphistelma pearcei* Rusby
Liana. Nativa.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
- Orthosia retinaculata** (Schltr.) Liede & Meve
Sin.: *Cynanchum trilobulatum* Lillo, *Metastelma retinaculatum* Schltr.
Liana. Nativa. 500-3200 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
- Orthosia scoparia** (Nutt.) Liede & Meve
Sin.: *Amphistelma scoparium* (Nutt.) Small, *Cynanchum scoparium* Nutt., *Cynoctonum scoparium* (Nutt.) Chapm., *Metastelma aphyllum* Decne., *Metastelma scoparium* (Nutt.) Vail, *Vincetoxicum scoparium* (Nutt.) A.W. Wood
Enredadera. Nativa. 0-2200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).
- Orthosia subulata** (Vell.) Liede & Meve
Sin.: *Amphistelma melantherum* (Decne.) E. Fourn., *Cynanchum melantherum* (Decne.) T. Mey., *Cynanchum subulatum* Vell., *Metastelma melantherum* (Decne.) K. Schum., *Orthosia melanthera* (Decne.) Malme, *Tassadia subulata* (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz, *Vincetoxicum melantherum* Decne.
Liana. Nativa. 600-1800 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Orthosia teodormeyeri** Liede & Meve
Liana. Endémica. 400-1800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Orthosia tomentosa (E. Fourn.) Malme
 Sin.: *Amphistelma tomentosum* E. Fourn.,
Tassadia subulata (Vell.) Fontella &
 E.A. Schwarz var. *tomentosa* (E.
 Fourn.) Fontella, *Vincetoxicum*
tomentosum (E. Fourn.) Kuntze
 Liana. Nativa. 900-1300 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Orthosia urceolata E. Fourn.
 Sin.: *Cynanchum urceolatum* (E. Fourn.)
 K. Schum., *Orthosia decaisnei* E.
 Fourn., *Vincetoxicum decaisnei* (E.
 Fourn.) Kuntze, *Vincetoxicum*
urceolatum (E. Fourn.) Kuntze
 Enredadera. Nativa. 0-1100 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA).

Orthosia virgata (Poir.) E. Fourn.
 Sin.: *Astephanus streptocarpus* E. Fourn.,
Cynanchum caudatum Vell.,
Cynanchum diffusum (Gillies ex Hook.
 & Arn.) Hook. & Arn., *Cynanchum*
multiflorum (E. Fourn.) K. Schum.,
Cynanchum pusillum Spreng., nom.
 nud., *Ionidium diffusum* Gillies ex
 Hook. & Arn., *Metastelma diffusum*
 (Gillies ex Hook. & Arn.) Decne.,
Metastelma virgatum (Poir.) Decne.,
Orthosia multiflora E. Fourn., *Periploca*
virgata Poir., *Streptocaulon virgatum*
 (Poir.) G. Don, *Vincetoxicum*
multiflorum (E. Fourn.) Kuntze,
Vincetoxicum virgatum (Poir.) Kuntze
 Enredadera. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
 ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(APY, AMA, BOQ, GUA, PAI).
 URY(LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

Oxypetalum R. Br.

Oxypetalum acerosum Malme
 Hierba. Endémica. 100-500 m.

Países: PRY(CAU).

Oxypetalum aequaliflorum E. Fourn.
 Sin.: *Gothofreda aequaliflora* (E. Fourn.)
 Kuntze, *Oxypetalum stenophyllum*
 Malme
 Hierba. Nativa. 100-600 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CON).

Oxypetalum alpinum (Vell.) Fontella &
 E.A. Schwarz var. **pallidum** (Hoehne)
 Fontella & E.A. Schwarz
 Sin.: *Oxypetalum umbellatum* Gardner
 var. *pallidum* Hoehne
 Enredadera. Nativa. 0-200 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxypetalum appendiculatum Mart.
 Sin.: *Gothofreda appendiculata* (Mart.)
 Kuntze, *Gothofreda siliculae* (E.
 Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum siliculae*
 E. Fourn.
 Enredadera. Nativa. 0-1800 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN,
 GUA, SPE).

Oxypetalum arenicola Hauman ex Lillo
 Hierba. Endémica. 0-200 m.
 Países: ARG(BAI).

Oxypetalum argentinum Malme
 Sin.: *Ditassa campestris* Griseb.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI).
 BRA(RGS).

Oxypetalum arnottianum H. Buek ex E.
 Fourn.
 Sin.: *Gothofreda arnottiana* (H. Buek ex E.
 Fourn.) Kuntze, *Gothofreda*
microstemma (E. Fourn.) Kuntze,
Oxypetalum capitatum Hook. & Arn.,
 nom. illeg., *Oxypetalum clavatum*
 Malme, *Oxypetalum microstemma* E.
 Fourn.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
 MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(APY, CAN, SPE).
 URY(MON).

Oxypetalum aurantiacum Malme ex
 Chodat & Hassl.
 Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500
 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA,
 CAU). URY.

Oxypetalum balansae Malme
 Sin.: *Gothofreda apoloensis* Rusby,
Oxypetalum apoloense (Rusby) Dorr,
Oxypetalum pauciflorum Occhioni
 Enredadera. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS,
 SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(CAN, CEN, CON, COA, GUA,
 ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Oxypetalum banksii Schult.
 Sin.: *Asclepias communis* Vell.,
Gothofreda banksii (Schult.) Kunth,
Oxypetalum maritimum Hook. & Arn.
 Enredadera. Nativa. 0-1800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxypetalum barberoanum T. Mey.
 Enredadera. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY).

Oxypetalum brachystemma Malme
 Sin.: *Corollonema boliviense* Schltr.,
Oxypetalum albiflorum Schltr.
 Enredadera. Nativa. 500-2000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Oxypetalum brachystephanum (Malme)
 Malme
 Sin.: *Oxypetalum arnottianum* H. Buek
 var. *brachystephanum* Malme
 Hierba o subarbusto. Endémica. 100-
 500 m.

- Países: PRY(CAN, CON, COA).
- Oxypetalum brussae** H.A. Keller & A. González
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: URY(RIV).
- Oxypetalum capitatum** Mart. subsp. **angustatum** Malme
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Oxypetalum capitatum** Mart. subsp. **capitatum**
Sin.: *Gothofreda andina* Rusby, *Gothofreda capitata* (Mart.) Kuntze, *Gothofreda consimilis* Rusby, *Gothofreda macroglossa* Rusby
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, PAI). URY(FLA).
- Oxypetalum capitatum** Mart. subsp. **mirabile** (Malme) Fontella & Farinaccio
Sin.: *Gothofreda proboscidea* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum hasslerianum* Chodat, *Oxypetalum hasslerianum* Chodat var. *mirabile* Malme, *Oxypetalum proboscideum* E. Fourn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, GUA, PAI, SPE).
- Oxypetalum ceratostemma** Malme
Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(CAU).
- Oxypetalum charrua** T. Mey.
Hierba. Endémica. 200-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).
- Oxypetalum chodatianum** Malme
Sin.: *Oxypetalum paranense* Malme
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN).
- Oxypetalum coalitum** E. Fourn.
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(RGS).
- Oxypetalum coccineum** Griseb.
Sin.: *Amblyopetalum coccineum* (Griseb.) Malme, *Gothofreda coccinea* (Griseb.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(COR, ERI, JUJ, MIS, SLU). BRA(RGS).
- Oxypetalum coeruleum** (D. Don ex Sweet) Decne.
Sin.: *Amblyopetalum coeruleum* (D. Don ex Sweet) Malme, *Tweedia coerulea* D. Don ex Sweet, *Tweedia versicolor* Hook.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).
- Oxypetalum commersonianum** (Decne.) Fontella & E.A. Schwarz
Sin.: *Melinia atropurpurea* Malme, *Melinia commersoniana* Decne., *Oxypetalum atropurpureum* (Malme) T. Mey.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(FLA).
- Oxypetalum confusum** Malme
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Oxypetalum cordifolium** (Vent.) Schltr. subsp. **pedicellatum** (Decne.) Fontella & Goyder
- Sin.: *Gothofreda pedicellata* (Decne.) Kuntze, *Oxypetalum pedicellatum* Decne.
Enredadera. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Oxypetalum corymbosum** (Malme) Liede & Meve
Sin.: *Melinia corymbosa* (Malme) Fontella & Farinaccio, *Melinia iberae* J.L. Fontana, *Widgrenia corymbosa* Malme
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA).
- Oxypetalum crispum** Wight ex Hook. & Arn.
Sin.: *Gothofreda crispa* (Wight ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda integriloba* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda oblongifolia* Morong, *Oxypetalum albiflorum* Decne., *Oxypetalum integrilobum* E. Fourn., *Oxypetalum kuntzei* Schltr., *Oxypetalum oblongifolium* (Morong) Lillo, *Oxypetalum pratense* Griseb., *Oxypetalum spegazzinii* Hauman ex Lillo, *Oxypetalum suaveolens* Speg., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(COL).
- Oxypetalum dusenii** Malme
Hierba o subarbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Oxypetalum erectum** Mart.
Sin.: *Asclepias arvensis* Vell., *Asclepias multicaulis* Vell., *Oxypetalum campestre* (Vell.) Decne., *Oxypetalum*

- erectum* Mart. subsp. *campestre* (Vell.)
Hoehne
Hierba. Nativa. 1300-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Oxypetalum erianthum** Decne.
Sin.: *Gothofreda eriantha* (Decne.)
Kuntze, *Oxypetalum aureum* Chodat
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN,
CON, COA, GUA, PAI).
- Oxypetalum fiebrigii** (Malme) Goyder &
Rapini
Sin.: *Schistogyne fiebrigii* Malme
Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Oxypetalum filamentosum** Malme
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA, ITA).
- Oxypetalum foliosum** Mart.
Hierba. Nativa. 1100-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Oxypetalum fontellae** S.A. Cáceres
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).
- Oxypetalum glabrescens** Malme
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU).
- Oxypetalum globosum** C. Ezcurra &
C.M. Martín
Hierba. Endémica. 2500-2800 m.
Países: ARG(SAL).
- Oxypetalum gracile** T. Mey.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS).
- Oxypetalum guaraniticum** (Malme)
Malme
- Sin.: *Calostigma guaraniticum* Malme
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).
Notas: Extinta (EX)
- Oxypetalum hilarianum** E. Fourn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR,
RGS, SCA).
Notas: Citada para Uruguay (Rambo,
1958b) sin indicar localidad o material
de referencia.
- Oxypetalum hoehnei** Malme
Sin.: *Calostigma dusenii* Hoehne
Enredadera. Nativa. 900-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Oxypetalum humile** (Morong) Hassl.
Sin.: *Ditassa humilis* Morong, *Gothofreda*
paraguayensis (Schltr.) Kuntze,
Oxypetalum paraguayense Schltr.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500
m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR,
SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, MIE,
PAI).
- Oxypetalum incanum** E. Fourn.
Sin.: *Gothofreda incana* (E. Fourn.)
Kuntze, *Oxypetalum tridens* Malme
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(CAU, CAN).
- Oxypetalum insigne** (Decne.) Malme var.
bresolinii Fontella
Enredadera. Endémica. 1000
Países: BRA(SCA).
- Oxypetalum insigne** (Decne.) Malme var.
burchellii (E. Fourn.) Fontella
Sin.: *Calostigma burchellii* E. Fourn.,
Oxypetalum burchellii (E. Fourn.)
Malme
Enredadera. Nativa. 400-1200 m.
- Países: BRA(PAR, SCA).
- Oxypetalum insigne** (Decne.) Malme var.
glabrum (Decne.) Fontella & E.A.
Schwarz
Sin.: *Calostigma glabrum* Decne.,
Oxypetalum glabrum (Decne.) T. Mey.,
Oxypetalum nitidum Malme
Enredadera. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Oxypetalum insigne** (Decne.) Malme var.
insigne
Sin.: *Calostigma insigne* Decne.,
Oxypetalum rariflorum Malme
Enredadera. Nativa. 0-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Oxypetalum joergensenii** T. Mey.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
- Oxypetalum kassneri** H.A. Keller &
Funez
Subarbusto. Endémica. 1200-1300 m.
Países: BRA(SCA).
- Oxypetalum kleinii** Fontella & Marquete
Enredadera. Endémica. 800-1300 m.
Países: BRA(SCA).
- Oxypetalum lineare** Decne.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA).
- Oxypetalum longipedunculatum**
(Malme) Goyder & Rapini
Sin.: *Schistogyne longipedunculata* Malme
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, SDE, TUC).
- Oxypetalum lynchianum** T. Mey.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).

Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.)
Decne.

Sin.: *Gothofreda macrolepis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum macrolepis* (Hook. & Arn.) Decne. var. *pilosum* Malme, *Tweedia macrolepis* Hook. & Arn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, MIE, SPE). URY(CAS, ROC, TYT).

Oxypetalum malmei Hoehne

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum marchesii C. Ezcurra & A. González

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(MAL, TYT).

Oxypetalum marginatum Malme

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN, SPE).

Oxypetalum marianae H.A. Keller & Funez

Subarbusto. Endémica. 1000-1200 m.

Países: BRA(SCA).

Oxypetalum martii E. Fourn. var. **martii**

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Oxypetalum martii E. Fourn. var. **nanum** (Malme) Fontella & S.A. Cáceres

Sin.: *Oxypetalum nanum* Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU).

Oxypetalum megapotamicum Spreng.

Sin.: *Ditassa megapotamica* (Spreng.) Malme, *Ditassa oxypetala* Decne.

Enredadera. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(SJO, SOR).

Oxypetalum microphyllum Hook. & Arn.

Sin.: *Gothofreda microphylla* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda ultima* Kuntze, nom. superfl., *Oxypetalum multicaule* E. Fourn.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, COL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Oxypetalum molle Hook. & Arn.

Sin.: *Gothofreda mollis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda nigrescens* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda suaveolens* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum campanulatum* Hand.-Mazz., *Oxypetalum henschenii* Malme, *Oxypetalum hirsutulum* K. Schum., *Oxypetalum nigrescens* E. Fourn., *Oxypetalum oblanceolatum* Farinaccio & Mello-Silva, *Oxypetalum oliganthum* Malme, *Oxypetalum suaveolens* E. Fourn.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Oxypetalum morilloanum Fontella

Hierba. Endémica. 900

Países: BRA(SCA).

Oxypetalum mosenii (Malme) Malme

Sin.: *Calostigma mosenii* Malme, *Schistogyne mosenii* (Malme) T. Mey.

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxypetalum muticum E. Fourn.

Sin.: *Oxypetalum curtiflorum* Malme, *Oxypetalum curtiflorum* Malme var. *indutum* Malme

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAU).

Oxypetalum nigricans (Decne.) Liede & Meve

Sin.: *Rhysostelma nigricans* Decne.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(LAV, MON).

Oxypetalum obtusifolium Malme

Enredadera. Endémica. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum ophiuroideum Malme

Hierba. Endémica. 200-500 m.

Países: PRY(CAN).

Oxypetalum ostenii Malme

Enredadera. Endémica. 200-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

Oxypetalum pachyglossum Decne.

Sin.: *Cystostemma glandulosum* Silveira, *Gothofreda coriacea* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda densiflora* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda luschnathii* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda pachyglossa* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda paludosa* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda selloana* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum coriaceum* Decne., *Oxypetalum densiflorum* Decne., *Oxypetalum luschnathii* E. Fourn., *Oxypetalum paludosum* Decne., *Oxypetalum selloanum* E. Fourn.

Enredadera. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum pachygynum Decne.

Sin.: *Oxypetalum vestitum* Malme

Enredadera. Nativa. 100-1300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, COA, SPE).

Oxypetalum pannosum Decne. var. **macranthum** Hoehne

- Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Oxypetalum pannosum** Decne. var. **pannosum**
Sin.: *Gothofreda pannosa* (Decne.) Kuntze, *Oxypetalum uruguayense* Arechav., hom. illeg.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA). URY(MON, RIV, TAC).
- Oxypetalum parviflorum** (Decne.) Decne. var. **kuhlmannii** Hoehne
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(SCA). PRY(APA).
- Oxypetalum parviflorum** (Decne.) Decne. var. **parviflorum**
Sin.: *Gothofreda parvifolia* (E. Fourn.) Kuntze, *Schizostemma parviflorum* Decne.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON). URY(CLA, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).
- Oxypetalum pubescens** (Malme) Goyder & Rapini
Sin.: *Schistogyne pubescens* Malme
Enredadera. Endémica. 200-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Oxypetalum radinsii** H.A. Keller
Subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: ARG(MIS).
- Oxypetalum reflexum** Malme
Hierba. Nativa. 200-700 m.
Países: PRY(AMA).
- Oxypetalum reitzii** Fontella & Marquete
Enredadera. Endémica. 800
- Países: BRA(SCA).
- Oxypetalum rojasianum** Malme
Hierba. Endémica. 200-700 m.
Países: PRY(AMA).
- Oxypetalum schulzii** Malme
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR). URY(ART, MON, RNO).
- Oxypetalum solanoides** Hook. & Arn.
Sin.: *Gothofreda solanoides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum tenuiflorum* Griseb., *Schizostemma longifolium* Decne., *Tweedia floribunda* Hort, *Tweedia solanoides* (Hook. & Arn.) Chittenden
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY. URY(CAS, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).
- Oxypetalum stipatum** Malme
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA).
- Oxypetalum subcapitatum** Malme
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA). PRY(CAN).
- Oxypetalum sublanatum** Malme
Enredadera. Nativa. 200-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Oxypetalum suboppositum** Malme
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU).
- Oxypetalum sylvestre** (Hook. & Arn.) Goyder & Rapini
- Sin.: *Oxypetalum karstenianum* Goyder & Rapini, *Schistogyne berroi* Arechav., *Schistogyne decaisneana* H. Karst., *Schistogyne sylvestris* Hook. & Arn., *Schistogyne sylvestris* Hook. & Arn. var. *chacoensis* Malme
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). URY(SAO).
- Oxypetalum teyucuareense** Farinaccio & H.A. Keller
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(MIS).
- Oxypetalum timbense** H.A. Keller
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(SCA).
- Oxypetalum tomentosum** Wight ex Hook. & Arn. var. **parvifolium** (E. Fourn.) Fontella & E.A. Schwarz
Sin.: *Oxypetalum parvifolium* E. Fourn.
Enredadera. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).
- Oxypetalum tomentosum** Wight ex Hook. & Arn. var. **tomentosum**
Sin.: *Gothofreda mucronata* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda tomentosa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum mucronatum* E. Fourn.
Enredadera. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, MON, ROC).
- Oxypetalum tubatum** Malme
Enredadera. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Oxypetalum tucumanense** (T. Mey.) Goyder & Rapini
Sin.: *Schistogyne tucumanensis* T. Mey.
Enredadera. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Oxypetalum venustum H.A. Keller
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS).

Oxypetalum warmingii (E. Fourn.)
Fontella & Marquete
Sin.: *Bustelma warmingii* E. Fourn.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Oxypetalum wightianum Hook. & Arn.
Sin.: *Gothofreda guilleminiana* (Decne.)
Kuntze, *Gothofreda squamulata* (E.
Fourn.) Kuntze, *Gothofreda wightiana*
(Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum*
guilleminianum Decne., *Oxypetalum*
squamulatum E. Fourn.
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAU, CAN).

Peplonia Decne.

Peplonia adnata (E. Fourn.) U.C.S. Silva
& Rapini
Sin.: *Ditassa adnata* E. Fourn.,
Macroditassa adnata (E. Fourn.)
Malme
Subarbusto apoyante. Nativa. 0-1000
m.
Países: BRA(PAR).

Peplonia axillaris (Vell.) Fontella &
Rapini
Sin.: *Asclepias axillaris* Vell.,
Gonioanthela acuminata (Decne.)
Malme, *Gonioanthela axillaris* (Vell.)
Fontella & E.A. Schwarz,
Gonioanthela odorata (Decne.)
Malme, *Metastelma acuminatum*
Decne., *Metastelma odoratum* Decne.
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peplonia hatschbachii (Fontella & De
Lamare) Fontella & Rapini
Sin.: *Gonioanthela hatschbachii* Fontella &
De Lamare
Enredadera. Nativa. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Petalostelma E. Fourn.

Petalostelma andinum Meve, Liede &
A.P.B. Santos
Enredadera. Nativa. 1000-1200 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Petalostelma garrapatense H.A. Keller
Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: ARG(SAL).

Petalostelma robertii (S. Moore) Liede &
Meve
Sin.: *Cynanchum robertii* (S. Moore)
Malme, *Metastelma robertii* (S. Moore)
Malme, *Vincetoxicum robertii* S. Moore
Liana. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY).

Petalostelma sarcostemma (Lillo) Liede
& Meve
Sin.: *Cynanchum sarcostemma* Lillo
Enredadera. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Phaeostemma E. Fourn.

Phaeostemma hatschbachii Morillo
Liana. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(PAR).

Phaeostemma kelleri Morillo
Liana. Nativa. 400-900 m.
Países: ARG(MIS).

Philibertia Kunth

Philibertia affinis (Griseb.) Goyder
Sin.: *Mitostigma affine* Griseb.
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL).

Philibertia barbata (Malme) Goyder
Sin.: *Mitostigma barbatum* Malme
Enredadera. Endémica. 1600-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Philibertia bicornuta (Griseb.) Goyder
Sin.: *Aphanostelma bicornutum* (Griseb.)
Malme, *Melinia bicornuta* Griseb.
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Philibertia boliviana (Baill.) Goyder
Sin.: *Amblystigma pilosum* Malme,
Amblystigma pilosum Malme var.
catamarcense T. Mey., *Amblystigma*
pilosum Malme var. *laticaudiculatum*
T. Mey., *Amblystigma pulchellum*
(Schltr.) T. Mey., *Podandra boliviana*
Baill., *Podandra pilosa* (Malme)
Morillo, *Steleostemma pulchellum*
Schltr.
Enredadera. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Philibertia boliviensis (Schltr.) Goyder
Sin.: *Mitostigma boliviense* Schltr.
Enredadera. Nativa. 1700-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Philibertia campanulata (Lindl.) G.
Nicholson
Sin.: *Philibertia hypoleuca* Schltr.,
Philibertia speciosa Malme, nom.
inval., *Philibertia splendens* Lillo,
Sarcostemma campanulatum Lindl.
Enredadera. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUU, TUC).

Philibertia candolleana (Hook. & Arn.) Goyder

Sin.: *Aphanostelma candolleanum* (Hook. & Arn.) Malme, *Astephanus cordifolius* Phil., *Astephanus fruticosus* Speg., *Brachylepis candolleana* Hook. & Arn., *Melinia candolleana* (Hook. & Arn.) Decne., *Mitostigma cordifolium* (Phil.) E. Fourn.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TUC). CHL(RME).

Philibertia castillonii (Lillo) Goyder

Sin.: *Amblystigma castillonii* Lillo, *Mitostigma castilloni* (Lillo) T. Mey. Enredadera. Endémica. 2000-2500 m. Países: ARG(JUU, SAL).

Philibertia cionophora (Griseb.) Goyder

Sin.: *Amblystigma cionophorum* (Griseb.) E. Fourn., *Mitostigma cionophorum* Griseb., *Podandra cionophora* (Griseb.) Morillo

Enredadera. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(JUU, TUC).

Philibertia coalita (Lillo) Goyder

Sin.: *Mitostigma caudatum* Malme, *Mitostigma coalitum* Lillo, *Mitostigma lilloi* T. Mey.

Enredadera. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Philibertia discolor (Schltr.) Goyder

Sin.: *Melinia discolor* Schltr.

Enredadera. Nativa. 2600-2800 m.

Países: ARG(SAL).

Philibertia escoipensis H.A. Keller

Enredadera. Endémica. 2400-2500 m.

Países: ARG(SAL).

Philibertia gilliesii Hook. & Arn.

Sin.: *Oxystelma gilliesii* (Hook. & Arn.) K. Schum., *Oxystelma violacea* (Phil.) K. Schum., *Philibertia canescens* Decne., nom. nud., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *albida* Stuck. ex Seckt, nom. nud., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *gracilis* (D. Don) T. Mey., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *grandiflora* (Hook.) T. Mey., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *mirabilis* T. Mey., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *parvicoronata* T. Mey., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *pubescens* Speg., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *vestita* Malme, *Philibertia gracilis* D. Don, *Philibertia grandiflora* Hook., *Philibertia grandiflora* Hook. f. *albida* Malme, *Philibertia incana* Decne., *Philibertia schreiteri* T. Mey., *Philibertia violacea* (Phil.) Schltr., *Sarcostemma donianum* Decne., *Sarcostemma gilliesii* (Hook. & Arn.) Decne., *Sarcostemma grandiflorum* (Hook.) Decne., *Sarcostemma incanum* Decne., *Zosima violacea* Phil. Enredadera. Nativa. 0-3200 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Philibertia latiflora (Griseb.) Goyder

Sin.: *Mitostigma latiflorum* Griseb.

Enredadera. Nativa. 500-2800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Philibertia longistyla Goyder

Sin.: *Mitostigma grandiflorum* Schltr.

Enredadera. Nativa. 1300-1800 m.

Países: ARG(SAL).

Philibertia lysimachioides (Wedd.) T. Mey.

Sin.: *Lugonia lysimachioides* Wedd., *Sarcostemma lysimachioides* (Wedd.) R.W. Holm

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Philibertia micrantha (Malme ex R.E. Fr.) Goyder

Sin.: *Aphanostelma micranthum* (Malme ex R.E. Fr.) T. Mey., *Lugonia micrantha* Malme ex R.E. Fr., *Melinia micrantha* (Malme ex R.E. Fr.) Krapov. & S.A. Cáceres

Subarbusto. Endémica. 3600-4000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Philibertia mitophora (Griseb.) Goyder

Sin.: *Astephanus mitophorus* Griseb., *Mitostigma mitophorus* (Griseb.) T. Mey., *Mitostigma rhynchophorum* Griseb., nom. superfl.

Enredadera. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(TUC).

Philibertia multiflora (T. Mey.) Goyder

Sin.: *Astephanus multiflorus* T. Mey.

Enredadera. Nativa. 1900-2900 m.

Países: ARG(SAL).

Philibertia nivea (Griseb.) Goyder

Sin.: *Mitostigma niveum* (Griseb.) Griseb., *Oxypetalum niveum* Griseb.

Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Philibertia parviflora (Malme) Goyder

Sin.: *Aphanostelma parviflorum* (Malme) Malme, *Melinia campanulata* Schltr., *Melinia parviflora* (Malme) Krapov. & S.A. Cáceres, *Mitostigma parviflorum* Malme

Subarbusto. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Philibertia picta Schltr.

Sin.: *Oxystelma vailiae* Rusby, *Philibertia albiflora* Lillo, *Philibertia vailiae* (Rusby) Liede, *Sarcostemma vailiae* (Rusby) R.W. Holm

Enredadera. Nativa. 500-3100 m.

- Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Philibertia solanoides** Kunth
Sin.: *Blepharodon rahmeri* Phil., *Philibertia rahmeri* (Phil.) Malme
Hierba o arbusto. Nativa. 2000-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Philibertia speciosa** (Malme) Goyder
Sin.: *Mitostigma herzogii* Schltr., *Mitostigma speciosum* Malme
Enredadera. Nativa. 500-1400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Philibertia stipitata** Lillo
Sin.: *Sarcostemma stipitatum* (Lillo) R.W. Holm
Enredadera. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Philibertia suberecta** Goyder
Sin.: *Mitostigma fiebrigii* Schltr.
Subarbusto. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Philibertia subnivea** (Malme) Goyder
Sin.: *Mitostigma subniveum* Malme
Enredadera. Endémica. 1700
Países: ARG(SAL).
- Philibertia tomentosa** (Decne.) Goyder
Sin.: *Mitostigma tomentosum* Decne.
Enredadera. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).
- Philibertia tubata** (Malme) Goyder
Sin.: *Aphanostelma tubatum* (Malme) Malme, *Melinia tubata* (Malme) Krapov. & S.A. Cáceres, *Mitostigma tubatum* Malme
Subarbusto. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
- Philibertia tucumanensis** (T. Mey.) Goyder
Sin.: *Mitostigma tucumanense* T. Mey.
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(TUC).
- Philibertia volcanensis** (T. Mey.) Goyder
Sin.: *Aphanostelma volcanense* T. Mey., *Melinia volcanense* (T. Mey.) Krapov. & S.A. Cáceres
Subarbusto. Endémica. 1800-2500 m.
Países: ARG(JUJ).
- Plumeria** L.
- Plumeria rubra** L.
Arbolito. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
- Prestonia** R. Br., nom. cons.
- Prestonia calycina** Müll. Arg.
Sin.: *Prestonia hirsuta* Müll. Arg., hom. illeg.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CAU, GUA, ITA, PAI, SPE).
- Prestonia coalita** (Vell.) Woodson
Sin.: *Echites coalitus* Vell., *Echites vauthieri* A. DC.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).
- Prestonia cyaniphylla** (Rusby) Woodson
Sin.: *Echites cyaniphyllus* Rusby, *Prestonia hassleri* Woodson
Enredadera o liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY,
- AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
- Prestonia dusenii** (Malme) Woodson
Sin.: *Echites dusenii* Malme
Enredadera. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Prestonia erecta** (Malme) J.F. Morales
Sin.: *Rhodocalyx erectus* Malme, *Rhodocalyx rotundifolius* Müll. Arg.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).
- Prestonia lagoensis** (Müll. Arg.) Woodson
Sin.: *Haemadictyon lagoense* Müll. Arg., *Haemadictyon lindmanii* Malme, *Prestonia lindmanii* (Malme) Hoehne
Enredadera. Nativa. 0-1300 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON).
- Prestonia quinquangularis** (Jacq.) Spreng.
Sin.: *Echites quinquangularis* Jacq., *Haemadictyon acutifolium* Müll. Arg., *Prestonia acutifolia* (Müll. Arg.) K. Schum., *Temnadenia quinquangularis* (Jacq.) Miers
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE).
- Prestonia tomentosa** R. Br.
Sin.: *Prestonia lanata* Müll. Arg., *Prestonia lutescens* Müll. Arg., *Prestonia sericocalyx* Malme
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
- Rauvolfia** L.

Rauvolfia ligustrina Willd. ex Roem. & Schult.

Sin.: *Rauvolfia divergens* Markgr., *Rauvolfia indecora* Woodson, *Rauvolfia mollis* S. Moore, *Rauvolfia parvifolia* Bertero ex Spreng., *Rauvolfia ternifolia* Kunth
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, BOQ, CON).

Rauvolfia schuelii Speg.

Sin.: *Rauvolfia boliviana* Markgr.
Arbusto o árbol. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Rauvolfia sellowii Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma pseudoquina* Hassl., nom. nud., *Aspidosperma spegazzinii* Molino ex T. Mey.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA).

Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.

Sin.: *Rauvolfia elliptica* Malme
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, SPE).

Rhabdadenia Müll. Arg.

Rhabdadenia madida (Vell.) Miers

Sin.: *Echites macrostomus* Benth., *Echites madidus* Vell., *Rhabdadenia latifolia* (Müll. Arg.) Malme, *Rhabdadenia latifolia* (Müll. Arg.) Malme var. *suberecta* (Müll. Arg.) Malme, *Rhabdadenia macrostoma* (Benth.) Müll. Arg., *Rhabdadenia macrostoma* (Benth.) Müll. Arg. var. *glabrata* Müll. Arg., *Rhabdadenia mamorensis* Rusby, *Rhabdadenia pohlii* Müll. Arg., *Rhabdadenia pohlii* Müll. Arg. var. *suberecta* Müll. Arg.,

Rhabdadenia pohlii Müll. Arg. var. *volubilis* Müll. Arg.

Hierba o enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL).

Rhabdadenia ragonesei Woodson

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL). PRY(CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Rhodocalyx Müll. Arg.

Rhodocalyx riedelii (Müll. Arg.)

J.F.Morales, M.E. Endress & Liede
Sin.: *Echites riedelii* (Müll. Arg.) Malme, *Haemadictyon riedelii* Müll. Arg., *Prestonia riedelii* (Müll. Arg.) Markgr., *Temnadenia riedelii* (Müll. Arg.) Miers
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Rojasia Malme

Rojasia gracilis (Morong) Malme

Sin.: *Gothofreda gracilis* Morong
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL). PRY(APY, PHA).

Ruehssia H. Karst.

Ruehssia altissima (Jacq.) F. Esp.Santo & Rapini subsp. **altissima**

Sin.: *Asclepias altissima* Jacq., *Cynanchum altissimum* (Jacq.) Jacq.,

Gonolobus altissimus (Jacq.) Schult., *Marsdenia altissima* (Jacq.) Dugand subsp. *altissima*, *Marsdenia burchellii* E. Fourn., *Marsdenia caulantha* S. Moore, *Marsdenia caurensis* Morillo, *Marsdenia ecorpuscula* Rusby, *Marsdenia imthurnii* Hemsl., *Marsdenia mollissima* E. Fourn.
Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(AMA, CON).

Ruehssia altissima (Jacq.) F. Esp.Santo & Rapini subsp. **faucinuda** (Dugand) Liede & H.A. Keller

Sin.: *Marsdenia altissima* (Jacq.) Dugand subsp. *faucinuda* Dugand
Liana. Endémica. 200-700 m.
Países: PRY(AMA).

Ruehssia brasiliensis (Decne.) F. Esp.Santo & Rapini

Sin.: *Marsdenia brasiliensis* Decne.
Enredadera. Nativa. 100-800 m.
Países: ARG(COS, MIS).

Ruehssia castillonii (Lillo ex T. Mey.) H.A. Keller & Liede

Sin.: *Marsdenia beckii* Morillo, *Marsdenia boliviana* Morillo, *Marsdenia castillonii* Lillo ex T. Mey.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, CHO).

Ruehssia guaranitica (Malme) Liede & H.A. Keller

Sin.: *Marsdenia guaranitica* Malme
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Ruehssia hassleriana (Malme) Liede & H.A. Keller

Sin.: *Marsdenia hassleriana* Malme
Enredadera. Nativa. 0-500 m.

- Países: PRY(CON).
- Ruehssia hatschbachii** (Morillo) F.
Esp.Santo & Rapini
Sin.: *Marsdenia hatschbachii* Morillo
Enredadera. Endémica. 1100-1800 m.
Países: BRA(PAR).
- Ruehssia hilariana** (E. Fourn.) F.
Esp.Santo & Rapini
Sin.: *Marsdenia hilariana* E. Fourn.,
Marsdenia manarae Morillo
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS).
- Ruehssia macrophylla** (Humb. & Bonpl. ex Schult.) H. Karst.
Sin.: *Asclepias macrophylla* Humb. & Bonpl. ex Schult., *Marsdenia macrophylla* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E. Fourn., *Marsdenia maculata* Hook., *Marsdenia warmingii* E. Fourn., *Ruehssia estebanensis* H. Karst., *Ruehssia maculata* (Hook.) H. Karst., *Ruehssia purpurea* Schtdl.
Enredadera. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, GUA, SPE).
- Ruehssia malmeana** (W. Rothe) F.
Esp.Santo & Rapini
Sin.: *Marsdenia malmeana* W. Rothe
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Ruehssia montana** (Malme) F.
Esp.Santo & Rapini
Sin.: *Marsdenia montana* Malme
Enredadera o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(TAC).
- Ruehssia paraguayensis** (Morillo) Liede & H.A. Keller
Sin.: *Marsdenia paraguayensis* Morillo
- Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, NAS).
- Ruehssia spiralis** (W. Rothe) Liede & H.A. Keller
Sin.: *Marsdenia spiralis* W. Rothe
Enredadera. Nativa.
Países: PRY.
- Ruehssia tressensiae** (S.A. Cáceres & Morillo) H.A. Keller & Liede
Sin.: *Marsdenia tressensiae* S.A. Cáceres & Morillo
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).
- Secondatia** A. DC.
- Secondatia densiflora** A. DC.
Sin.: *Secondatia densiflora* A. DC. var. *paraguariensis* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
- Skytanthus** Meyen
- Skytanthus acutus** Meyen
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Tabernaemontana** L.
- Tabernaemontana catharinensis** A. DC.
Sin.: *Peschiera affinis* (Müll. Arg.) Miers, *Peschiera australis* (Müll. Arg.) Miers, *Peschiera australis* (Müll. Arg.) Miers var. *hilariana* (Müll. Arg.) L. Allorge, *Peschiera catharinensis* (A. DC.) Miers, *Peschiera hilariana* (Müll. Arg.) Miers, *Tabernaemontana affinis* Müll. Arg., *Tabernaemontana affinis* Müll. Arg. var. *lanceolata* Müll. Arg., *Tabernaemontana australis* Müll. Arg., *Tabernaemontana hilariana* Müll. Arg.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, RNO, SAO).
- Tassadia** Decne.
- Tassadia berteriana** (Spreng.) W.D. Stevens
Sin.: *Metastelma berterianum* (Spreng.) Decne., *Oxypetalum berterianum* Spreng.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, CEN, SPE).
- Tassadia obovata** Decne.
Sin.: *Tassadia floribunda* E. Fourn., *Tassadia neovidensis* E. Fourn., *Tassadia poeppigiana* Decne., *Tassadia selloana* E. Fourn., *Tassadia turiformis* E. Fourn.
Enredadera. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Temnadenia** Miers
- Temnadenia odorifera** (Vell.) J.F. Morales
Sin.: *Echites odorifer* Vell., *Echites stellaris* Lindl., *Temnadenia stellaris* (Lindl.) Miers
Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Temnadenia violacea** (Vell.) Miers
Sin.: *Echites violaceus* Vell.

Liana. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Thevetia L., nom. cons.

Thevetia bicornuta Müll. Arg.

Sin.: *Thevetia paraguayensis* Britton
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, ÑEE, PHA, SPE).

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

Sin.: *Cascabela peruviana* (Pers.) Raf.,
Cerbera peruviana Pers.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CEN, COA).

Topea H.A. Keller

Topea micrantha (H.A. Keller) H.A. Keller

Sin.: *Aenigma micranthum* H.A. Keller
Enredadera. Endémica. 200-400 m.
Países: ARG(MIS).

Topea patens (H.A. Keller) H.A. Keller

Sin.: *Aenigma patens* H.A. Keller
Enredadera. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

Tressensia H.A. Keller

Tressensia viridis H.A. Keller & S.

Cáceres
Enredadera. Endémica.
Países: ARG(COS).

Tweedia Hook. & Arn.

Tweedia andina (Phil.) G.H. Rua

Sin.: *Oxypetalum andinum* Phil.,
Oxypetalum hookeri Decne.,

Oxypetalum moelleri Phil., *Tweedia hookeri* (Decne.) Malme

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Tweedia aucaensis G.H. Rua

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

Tweedia birostrata (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.

Sin.: *Cynanchum birostratum* Hook. & Arn., *Gonolobus obliquifolius* Colla, *Gonolobus voquicilla* Colla, *Gothofreda birostrata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda brevipes* (Phil.) Kuntze, *Gothofreda confertiflora* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda obliquifolia* (Colla) Kuntze, *Oxypetalum angustifolium* Phil., *Oxypetalum brevipes* Phil., *Oxypetalum confertiflorum* Decne., *Oxypetalum saxatile* Decne., *Tweedia brevipes* (Phil.) Malme, *Tweedia confertiflora* (Decne.) Malme, *Tweedia obliquifolia* (Colla) Malme
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Tweedia brunonis Hook. & Arn.

Sin.: *Gothofreda brunonis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum brunonis* (Hook. & Arn.) Decne., *Turrigera halophila* Griseb., *Turrigera inconspicua* Decne.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY).

Tweedia echegarayi (Hieron.) Malme

Sin.: *Oxypetalum echegarayi* Hieron., *Oxypetalum kingii* S. Moore
Hierba o subarbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Tweedia stipitata G.H. Rua & Liede

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Vallesia Ruiz & Pav.

Vallesia glabra (Cav.) Link

Sin.: *Rauvolfia glabra* Cav., *Vallesia cymbifolia* Ortega, *Vallesia dichotoma* Ruiz & Pav.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC). PRY(APY, PHA).

Vinca L.

Vinca major L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, TUC). BRA(SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). URY(MON, SOR).

APODANTHACEAE

Pilostyles Guill.

Pilostyles berteroi Guill.

Sin.: *Apodanthes berteroi* (Guill.) Gardner
Parásita. Nativa. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN, NEU, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME).

Pilostyles blanchetii (Gardner) R. Br.

Sin.: *Apodanthes blanchetii* Gardner, *Apodanthes calliandrae* Gardner, *Pilostyles calliandrae* (Gardner) R. Br., *Pilostyles stawarskii* Vattimo-Gil, *Pilostyles ulei* Solms
Parásita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, SCA). URY(ART, SAO).

APONOGETONACEAE

Aponogeton L. f.

Aponogeton distachyos L. f.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(LLA).

AQUIFOLIACEAE

Ilex L.

Ilex affinis Gardner

Arbusto o árbol. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, SPE).c

Ilex argentina Lillo

Sin.: *Ilex herzogii* Loes., *Ilex tucumanensis* Speg., nom. nud.
Árbol. Nativa. 900-2300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes.

Sin.: *Ilex brasiliensis* (Spreng.) Loes. f. *balansae* Loes., *Ilex brasiliensis*

(Spreng.) Loes. f. *typica* Loes., nom. inval., *Rhamnus brasiliensis* Spreng.

Arbusto o árbol. Nativa. 100-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, MIE, SPE).

Ilex brevicuspis Reissek

Sin.: *Ilex caaguazuensis* Loes.

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, ITA).

Ilex chamaedryfolia Reissek

Sin.: *Ilex chamaedryfolia* Reissek var. *mugiensis* Loes., *Ilex chamaedryfolia* Reissek var. *typica* Loes., nom. inval.
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ilex dumosa Reissek var. **dumosa**

Sin.: *Ilex amara* (Vell.) Loes. f. *microphylla* Reissek, *Ilex dumosa* Reissek var. *gomezii* Loes., *Ilex dumosa* Reissek var. *montevideensis* Loes., *Ilex dumosa* Reissek var. *mosenii* Loes.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, COA, MIE, SPE). URY(MON).

Ilex dumosa Reissek var. **guaranina** Loes.

Sin.: *Ilex dumosa* Reissek f. *angustifolia* Chodat & Hassl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Ilex integerrima (Vell.) Reissek

Sin.: *Ilex integerrima* (Vell.) Reissek var. *ebenacea* (Reissek) Loes., *Ilex integerrima* (Vell.) Reissek var. *schlenckiana* Loes., *Ilex integerrima*

(Vell.) Reissek var. *typica* Loes., nom. inval.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ilex microdonta Reissek

Árbol. Endémica. 100-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ilex paraguariensis A. St.-Hil.

Sin.: *Ilex curitibensis* Miers, *Ilex curitibensis* Miers var. *gardneriana* Miers, *Ilex domestica* Reissek var. *glabra* Reissek, *Ilex mate* A. St.-Hil., nom. superfl., *Ilex domestica* Reissek var. *pubescens* Reissek, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *confusa* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *dasyprionata* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *domestica* (Reissek) Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *latifolia* Chodat, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *parvifolia* Chodat, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *pubescens* (Reissek) Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *sorbilis* (Reissek) Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. var. *genuina* Loes., nom. inval., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. var. *ulei* Loes., *Ilex paraguayensis* A. St.-Hil. var. *dentata* Miers, *Ilex paraguayensis* A. St.-Hil. var. *idonea* Miers, *Ilex paraguayensis* A. St.-Hil. var. *usitata* Miers, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. var. *vestita* (Reissek) Loes., *Ilex sorbilis* Reissek, *Ilex theaezans* Bonpl. ex Miers, *Ilex vestita* Reissek
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, SPE). URY(MAL, TAC, TYT).

Ilex pseudobuxus Reissek

Sin.: *Ilex peduncularis* Reissek
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ilex taubertiana Loes.

Sin.: *Ilex kleinii* Edwin

Arbusto o arbolito. Nativa. 800-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ilex theezans Mart. ex Reissek

Sin.: *Ilex gigantea* Bonpl. ex Miers, *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *acrodonta* (Reissek) Loes., *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *fertilis* (Reissek) Loes., *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *typica* Loes., nom. inval.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

coriaceus Graham, *Pothos glaucus* Schott ex Kunth, *Pothos subcaulescens* Vell.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium gaudichaudianum Kunth

Sin.: *Anthurium chamissonis* Schott, *Anthurium gaudichaudianum* Kunth var. *chamissonis* (Schott) Engl., *Anthurium gaudichaudianum* Kunth var. *cuneifolium* Engl., *Anthurium gaudichaudianum* Kunth var. *libonianum* (Linden & Regel) Engl., *Anthurium libonianum* Linden & Regel

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium hatschbachii E. G. Gonç.

Hierba. Endémica. 800-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium loefgrenii Engl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium mareense Krause

Hierba. Nativa. 1000-1700 m.

Países: BRA(PAR).

Anthurium maximiliani Schott

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Anthurium paraguayense Engl.

Sin.: *Anthurium rodrigoii* A. D. Hawkes

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, TUC). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don

Sin.: *Anthurium caudatum* Kunth, *Anthurium quinquevulnerum* Schott ex Engl., *Anthurium smilaciforme* C. Koch, *Anthurium undatum* Schott,

Dracontium pentaphyllum Aubl., *Pothos undatus* Hort ex Kunth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium pilonense Reitz

Hierba. Endémica. 300

Países: BRA(SCA).

Anthurium plowmanii Croat

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, SPE).

Anthurium scandens (Aubl.) Engl.

Sin.: *Anthurium scandens* (Aubl.) Engl. var. *violaceum* (Sw.) Engl., *Anthurium violaceum* (Sw.) Schott, *Dracontium scandens* Aubl., *Pothos violaceus* Sw.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anthurium sellowianum Kunth

Sin.: *Anthurium crassipes* Engl., *Anthurium longilaminatum* Engl., *Anthurium viride* C. Koch & Bouché

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium sinuatum Benth. ex Schott

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Anthurium urvilleanum Schott

Sin.: *Anthurium beyrichianum* Kunth, *Anthurium harrisii* (Graham) Endl. var. *beyrichianum* (Kunth) Engl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Arum L.

Arum italicum Miller

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA). URY(CAS, MON).

ARACEAE

Alocasia (Schott) G. Don

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

Hierba. Introducida.

Países: PRY(ITA).

Anthurium Schott

Anthurium acutum N.E. Br.

Hierba. Nativa. 300-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium comtum Schott

Hierba epífita. Nativa. 1200 m.

Países: BRA(PAR).

Anthurium coriaceum G. Don

Sin.: *Anthurium glaucescens* Kunth, *Anthurium lacerdae* Reitz, *Anthurium rubriflorum* Engl., *Anthurium subcaulescens* (Vell.) Stelfeld, *Pothos*

Asterostigma Fisch. & C.A. Mey.

Asterostigma lividum (Lodd.) Engl.

Sin.: *Caladium lividum* Lodd.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Asterostigma reticulatum E. G. Gonç.

Hierba. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Asterostigma tweedianum Schott

Sin.: *Staurostigma tweedianum* (Schott)

C. Koch

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Caladium Vent.

Caladium bicolor (Aiton) Vent.

Sin.: *Arum bicolor* Aiton

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(GUA).

Colocasia Schott, nom. cons.

Colocasia esculenta (L.) Schott

Sin.: *Arum colocasia* L., *Arum esculentum* L., *Caladium esculentum* (L.) Vent.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).
PRY(AMA, CEN). URY(ART, CLA).

Dieffenbachia Schott

Dieffenbachia aglaonematifolia Engl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(COA, GUA).

Dracontium L.

Dracontium margaretae Bogner

Hierba. Nativa. 200-600 m.

Países: PRY(APY).

Gorgonidium Schott

Gorgonidium bulbostylum Bogner & E.

G. Gonç.

Hierba. Nativa. 1700-2300 m.

Países: ARG(CAT).

Gorgonidium vermicidum (Speg.)

Bogner & Nicolson

Sin.: *Asterostigma fabrisii* Crisci,

Asterostigma lorentzianum Engl.,

Asterostigma vermicidum (Speg.)

Hauman & Vanderv., *Staurostigma*

vermicidum Speg.

Hierba. Nativa. 600-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, MIS,
SAL, TUC).

Heteropsis Kunth

Heteropsis oblongifolia Kunth

Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR).

Heteropsis rigidifolia Engl.

Liana. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heteropsis salicifolia Kunth

Liana hemiepífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Landoltia Les & D.J. Crawford

Landoltia punctata (G. Mey.) Les & D.J.
Crawford

Sin.: *Lemna punctata* G. Mey., *Spirodela punctata* (G. Mey.) C.H. Thomps.

Hierba acuática. Introducida. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA). CHL(MAG).

Lemna L., nom. cons.

Lemna aequinoctialis Welw.

Sin.: *Lemna angolensis* Hegelm., *Lemna paucicostata* Hegelm., *Lemna perpusilla* Torr. var. *trinervis* (Austin ex A. Gray) Small, *Lemna trinervis* Austin ex A. Gray

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, CHU, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU,
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, CAU, ITA, ÑEE,
PHA, SPE).

Lemna disperma Hegelm.

Hierba acuática. Introducida.

Países: ARG(SFE).

Lemna gibba L.

Sin.: *Lemna parodiana* Giardelli

Hierba acuática. Cosmopolita. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,
MEN, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE,
SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL,
LBO, BIO, LLA, RME). PRY(APY,
PHA). URY(CAS, MON, TYT).

Lemna minuta Kunth

Sin.: *Lemna minima* Kunth, nom. nud.,
Lemna minima Phil. ex Hegelm., hom.
illeg., *Lemna minuscula* Herter, nom.
superfl., *Lemna valdiviana* Phil. var.
abbreviata Hegelm., *Lemna valdiviana*
Phil. var. *minima* Hegelm.

Hierba acuática. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APY, CEN, COA, PAI). URY(CAS, FLA, MON, ROC, SJO, TYT).

Lemna valdiviana Phil.

Sin.: *Lemna cyclostoma* (Elliot ex Chevall.) C.H. Thomps., *Lemna minor* L. var. *cyclostoma* Elliot ex Chevall., *Lemna valdiviana* Phil. var. *pellucida* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *platyclados* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *robusta* Hegelm.
Hierba acuática. Nativa. 0-2700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, SAL, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, VAL, MAU, ARA, LLA, RME). PRY(CEN). URY(CAS, MON, ROC, SJO, TYT).

Mangonia Schott

Mangonia tweedieana Schott

Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART).

Mangonia uruguayana (Hicken) Bogner

Sin.: *Felipponia uruguayana* Hicken, *Felipponiella uruguayana* (Hicken) Herter
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CLA).

Monstera Adans.

Monstera adansonii Schott subsp. *adansonii*

Hierba hemiepipífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Monstera adansonii Schott subsp. *klotzschiana* (Schott) Mayo & I.M. Andrade

Sin.: *Monstera adansonii* Schott var. *klotzschiana* (Schott) Madison, *Monstera klotzschiana* Schott, *Monstera modesta* Schott, *Monstera pertusa* (L.) de Vriese var. *klotzschiana* (Schott) Engl., *Monstera pertusa* (L.) de Vriese var. *modesta* (Schott) Engl.

Hierba hemiepipífita. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Monstera praetermissa E.G. Gonç. & Temponi
Hierba hemiepipífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron Schott, nom. cons.

Philodendron appendiculatum Nadruz & Mayo
Hierba hemiepipífita. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Philodendron camposportoanum G.M. Barroso
Hierba hemiepipífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Philodendron cordatum Kunth ex Schott
Sin.: *Arum cordatum* Vell.
Hierba hemiepipífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron crassinervium Lindl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron curvilobum Schott
Hierba hemiepipífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Philodendron eximium Schott
Hierba hemiepipífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Philodendron hastatum K. Koch & Sellow
Hierba hemiepipífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Philodendron imbe Schott ex Kunth
Sin.: *Calostigma imbe* Schott
Liana hemiepipífita. Nativa.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Philodendron loefgrenii Engl.
Hierba hemiepipífita. Nativa. 300-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron martianum Engl.
Sin.: *Philodendron cannifolium* Mart. ex Kunth
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron meridionale Buturi & Sakur.
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron missionum (Hauman) Hauman
Sin.: *Philodendron ochrostemon* Schott var. *uleanum* Engl., *Philodendron sonderianum* Schott var. *missionum* Hauman
Hierba hemiepipífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Philodendron obliquifolium Engl.
Liana hemiepipífita. Nativa. 300
Países: BRA(PAR).

Philodendron propinquum Schott

Hierba hemiepipífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron renauxii Reitz

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Philodendron rheophyticum Buturi & Temponi

Hierba epífita. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(PAR).

Philodendron roseopetiolatum Nadrusz & Mayo

Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pistia L.

Pistia stratiotes L.

Sin.: *Pistia occidentalis* Blume, *Pistia stratiotes* L. var. *linguiformis* (Blume) Engl., *Pistia stratiotes* L. var. *obcordata* (Schleid.) Engl.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, MON).

Spathanthemum Schott

Spathanthemum orbignyanum Schott

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Spathicarpa Hook.

Spathicarpa hastifolia Hook.

Sin.: *Aropsis palustris* Rojas Acosta, *Spathicarpa bridgesii* Schott, nom. nud., *Spathicarpa tweedieana* Schott
Hierba. Nativa. 200-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(ART).

Spathicarpa lanceolata Engl.

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, COA, GUA).

Spirodela Schleid.

Spirodela intermedia W. Koch

Sin.: *Lemna biperforata* W. Koch, *Lemna polyrhiza* L. var. *maxima* Griseb., *Spirodela biperforata* W. Koch
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, NEU, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY, CEN, CHO, COA, ÑEE, PHA). URY(CAS, MON, ROC, SJO).

Synandropadix Engl.

Synandropadix vermitoxicus (Griseb.) Engl.

Sin.: *Asterostigma vermitoxicum* Griseb., *Lilloa puki* Speg., *Staurostigma vermitoxicum* (Griseb.) Engl.
Hierba. Nativa. 400-1700 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, CEN, PHA).

Syngonium Schott

Syngonium angustatum Schott

Hierba hemiepipífita. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Syngonium podophyllum Schott

Hierba hemiepipífita. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Taccarum Brongn. ex Schott

Taccarum peregrinum (Schott) Endl.

Sin.: *Endera conophalloidea* Regel, *Lysistigma peregrinum* Schott, *Taccarum cylindricum* Arcang., *Taccarum dubium* Bertoni, *Taccarum josephinae* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var. *elatum* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var. *latilobum* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var. *multilobum* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var. *primum* Bertoni
Hierba. Nativa.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Taccarum weddellianum Brongn.

Sin.: *Taccarum hasslerianum* Chodat
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAN, CON).

Thaumatophyllum Schott

Thaumatophyllum bipinnatifidum (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo

Sin.: *Philodendron bipinnatifidum* Schott ex Endl., *Philodendron pygmaeum* Chodat & Vischer, *Philodendron selloum* K. Koch, *Sphinctrostigma bipinnatifidum* Schott, nom. illeg.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

Thaumatophyllum corcovadense
(Kunth) Sakur., Calazans & Mayo

Sin.: *Philodendron corcovadense* Kunth,
Philodendron melanorrhizum Reitz

Hierba hemiepífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Thaumatophyllum petraeum (Chodat & Vischer) Sakur., Calazans & Mayo

Sin.: *Philodendron petraeum* Chodat & Vischer, *Philodendron petraeum* Chodat & Vischer var. *triangulare* Chodat & Vischer, *Philodendron petraeum* Chodat & Vischer var. *valenzuelae* Chodat & Vischer

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(COA).

Thaumatophyllum tweedeanum (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo

Sin.: *Philodendron dubium* Chodat,
Philodendron tweedeanum Schott

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(COL, MON, RNO).

Thaumatophyllum undulatum (Engl.) Sakur., Calazans & Mayo

Sin.: *Philodendron eichleri* Engl., *Philodendron petraeum* Chodat & Vischer var. *tobatiense* Chodat & Vischer, *Philodendron undulatum* Engl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Typhonium Schott

Typhonium roxburghii Schott

Hierba. Introducida.

Países: BRA(SCA).

Urospatha Schott

Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott

Sin.: *Pothos sagittifolius* Rudge

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Wolffia Horkel ex Schleid., nom. cons.

Wolffia brasiliensis Wedd.

Sin.: *Wolffia papulifera* C.H. Thomps.,
Wolffia punctata Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(APY, APA). URY(MON).

Wolffia columbiana H. Karst.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LRI, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY). URY(CAS, MON, TYT).

Wolffiella (Hegelm.) Hegelm.

Wolffiella lingulata (Hegelm.) Hegelm.

Sin.: *Wolffia lingulata* Hegelm.

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA). URY(MON).

Wolffiella oblonga (Phil.) Hegelm.

Sin.: *Lemna oblonga* Phil., *Wolffiella lingulata* Hegelm. var. *minor* Hegelm., *Wolffiella oblonga* (Phil.) Hegelm.

Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, RME). PRY(APY, CEN, COA). URY(CAS, FLA, MON, ROC, SJO, TYT).

Xanthosoma Schott

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott

Sin.: *Arum sagittifolium* L., *Xanthosoma violaceum* Schott

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Xanthosoma striatipes (Kunth & Bouché) Madison

Sin.: *Acontias striatipes* (Kunth & Bouché) Schott, *Caladium angustifolium* Engl., *Caladium heterotypicum* S. Moore, *Caladium striatipes* (Kunth & Bouché) Schott, *Cyrtospadix striatipes* (Kunth & Bouché) C. Koch, *Philodendron striatipes* Kunth & Bouché

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Xanthosoma syngoniifolium Rusby

Hierba. Nativa. 500

Países: ARG(SAL).

Xanthosoma taioba E.G. Gonçalves

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Zantedeschia Spreng., nom. cons.

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.

Sin.: *Calla aethiopica* L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LLA, RME, JFE). URY(MON).

ARALIACEAE

Aralia L.

Aralia soratensis Marchal

Sin.: *Pentapanax angelicifolius* Griseb.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC).

Aralia warmingiana (Marchal) J. Wen

Sin.: *Coemansia warmingiana* Marchal, *Coudenbergia warmingiana* (Marchal) Marchal, *Pentapanax warmingianus* (Marchal) Harms

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, SPE).

Dendropanax Decne. & Planch.

Dendropanax australis Fiaschi & Jung-

Mendaçolli

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.

Sin.: *Dendropanax affinis* (Marchal) Gamero & Zuloaga, *Gilibertia affinis* Marchal, *Gilibertia cuneata* (DC.) Marchal, *Hedera cuneata* DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Dendropanax monogynus (Vell.) Seem.

Sin.: *Aralia monogyna* Vell., *Gilibertia monogyna* (Vell.) Marchal

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Didymopanax Decne. & Planch.

Didymopanax angustissimus Marchal

Sin.: *Schefflera angustissima* (Marchal) Frodin

Árbol. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Didymopanax calvus (Cham.) Decne. & Planch.

Sin.: *Didymopanax pachycarpus* Marchal, *Panax calvus* Cham., *Schefflera calva* (Cham.) Frodin & Fiaschi

Arbusto. Nativa. 500-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch.

Sin.: *Panax morototoni* Aubl., *Schefflera morototoni* (Aubl.) Maguire, Steyer. & Frodin

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN).

Didymopanax vinosus (Cham. & Schltdl.) Marchal

Sin.: *Panax vinosus* Cham. & Schltdl., *Schefflera vinosa* (Cham. & Schltdl.) Frodin & Fiaschi

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Hedera L.

Hedera helix L.

Hierba, subarbusto o enredadera. Introducida.

Países: ARG(BAI, COR, SAL). BRA(PAR, RGS). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Hydrocotyle L.

Hydrocotyle alpestris Gardner

Sin.: *Hydrocotyle itatiaensis* Brade

Hierba. Nativa. 1500-2200 m.

Países: BRA(SCA).

Hydrocotyle alpina Vell.

Sin.: *Hydrocotyle quinqueloba* Ruiz & Pav. var. *quadrata* Urb., *Hydrocotyle quinqueloba* Ruiz & Pav. var. *stella* (Pohl ex DC.) Urb., *Hydrocotyle stella* Pohl ex DC.

Hierba. Nativa. 100-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hydrocotyle bonariensis Lam.

Sin.: *Hydrocotyle multiflora* Ruiz & Pav., *Hydrocotyle umbellata* L. var. *bonariensis* (Lam.) Spreng.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, BIO). PRY(CAN, ITA, ÑEE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

Hydrocotyle bowlesioides Mathias & Constance

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CEN, GUA, PAI).

Hydrocotyle callicephala Cham.

Sin.: *Hydrocotyle callicephala* Cham. & Schltl. var. *hirtella* Urb., *Hydrocotyle callicephala* Cham. & Schltl. var. *villosa* Urb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA).

Hydrocotyle chamaemorus Cham. & Schltl.

Sin.: *Hydrocotyle araucana* Phil., *Hydrocotyle araucana* Phil. var. *patagonica* Speg., *Hydrocotyle bonplandii* A. Rich. var. *chilensis* DC., nom. superfl., *Hydrocotyle carrerae* Phil., *Hydrocotyle chamaemorus* Cham. & Schltl. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Hydrocotyle rahmeri* Phil., *Hydrocotyle skottsbergii* Gand., *Hydrocotyle valdiviana* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Hydrocotyle cryptocarpa Speg.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). CHL(COQ, LBO, BIO, ARA). URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Hydrocotyle exigua (Urb.) Malme

Sin.: *Hydrocotyle hirsuta* Sw. var. *exigua* Urb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, MIE). URY(MAL, SAO, TYT).

Hydrocotyle filipes Mathias

Sin.: *Hydrocotyle bonplandii* A. Rich. var. *filipes* (Griseb.) Pérez-Mor., *Hydrocotyle poeppigii* DC. var. *filipes* Griseb.

Hierba. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Hydrocotyle fluminensis Vell.

Sin.: *Hydrocotyle macrophylla* Pohl ex DC.

Hierba. Nativa. 100-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hydrocotyle indecora DC.

Sin.: *Hydrocotyle marchantioides* Clos

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Hydrocotyle langsdorffii DC.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltl.

Sin.: *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltl. var. *minuta* (Pohl ex DC.) Urb., *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltl. var. *obtusiloba* Urb., *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltl. var. *truncatiloba* Urb., nom. superfl., *Hydrocotyle minuta* Pohl ex DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, ÑEE). URY(ART, COL, MON, SAO, TAC).

Hydrocotyle modesta Cham. & Schltl.

Sin.: *Hydrocotyle modesta* Cham. & Schltl. var. *repens* Clos

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MON, PAY, SAO).

Hydrocotyle poeppigii DC.

Sin.: *Hydrocotyle lechleri* Phil., *Hydrocotyle uliginosa* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Hydrocotyle pusilla A. Rich.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, MIE). URY(LAV, MON, RIV, TAC).

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

Sin.: *Hydrocotyle batrachioides* DC., *Hydrocotyle natans* Cirillo, *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. var. *brasiliensis* Urb., *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. var. *inciso-crenata* Urb., *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. var. *lobata* Urb.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). PRY(CAA, ÑEE, PHA). URY(COL, MON, SOR).

Hydrocotyle umbellata L.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: CHL(TAR, VAL, BIO). PRY(APY, CAA, CEN).

Hydrocotyle verticillata Thunb.

Sin.: *Hydrocotyle verticillata* Thunb. var. *pluriradiata* Urb., *Hydrocotyle volckmanni* Phil.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(COA). URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC).

Oreopanax Decne. & Planch.

Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch.

Sin.: *Aralia capitata* Jacq.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Oreopanax fulvus Marchal

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oreopanax kuntzei Harms

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Raukua Seem.

Raukua laetevirens (Gay) Frodin

Sin.: *Aralia laetevirens* Gay, *Aralia paniculata* Phil., *Cheirodendron laetevirens* (Gay) Seem., *Pseudopanax laetevirens* (Gay) Baill., *Pseudopanax laetevirens* (Gay) Franch., *Pseudopanax racemiflorum* (Miq.) Ball, *Sciodaphyllum racemiflorum* Miq.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Raukua valdiviensis (Gay) Frodin

Sin.: *Aralia valdiviensis* Gay, *Pseudopanax valdiviensis* (Gay) Seem. ex Harms

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Tetrapanax (K. Koch) K. Koch

Tetrapanax papyrifer (Hook.) K. Koch

Sin.: *Aralia papyrifera* Hook.

Arbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

ARECACEAE

Acrocomia Mart.

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

Sin.: *Acrocomia chunta* Covas & Ragonese, *Acrocomia totai* Mart., *Cocos aculeata* Jacq.

Palmera. Nativa. 100-200 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Acrocomia emensis (Toledo) Lorenzi

Sin.: *Acanthococos emensis* Toledo

Palmera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Acrocomia hassleri (Barb. Rodr.) W.J. Hahn

Sin.: *Acanthococos hassleri* Barb. Rodr.

Palmera. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Allagoptera Nees

Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze

Palmera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze

Sin.: *Diplothemium campestre* Mart., *Diplothemium campestre* Mart. var. *genuinum* Drude, nom. inval., *Diplothemium campestre* Mart. var. *glaziovii* Dammer

Palmera acaule. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA, SPE).

Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze

Sin.: *Allagoptera anisitsii* (Barb. Rodr.) H.

E. Moore, *Allagoptera campestris*

(Mart.) Kuntze var. *orbignyi* (Drude)

Kuntze, *Allagoptera hassleriana* (Barb.

Rodr.) H. E. Moore, *Diplothemium*

anisitsii Barb. Rodr., *Diplothemium*

campestre Mart. var. *orbygnyi* Drude,

Diplothemium hasslerianum Barb.

Rodr., *Diplothemium jangadense* S.

Moore, *Diplothemium leucocalyx*

Drude

Palmera acaule. Nativa. 100-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, PAI).

Astrocaryum G. Mey., nom. cons.

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret

Sin.: *Astrocaryum ayri* Mart., *Toxophoenix aculeatissima* Schott

Palmera. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Attalea Kunth

Attalea dubia (Mart.) Burret

Sin.: *Attalea indaya* Drude, *Orbignya dubia* Mart.

Palmera. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Attalea exigua Drude

Sin.: *Attalea geraensis* Barb. Rodr.,
Attalea guaranitica Barb. Rodr.
Palmera. Nativa. 300
Países: PRY(AMA, COA).

Attalea phalerata Mart. ex Spreng.

Sin.: *Attalea anisitsiana* (Barb. Rodr.)
Zona, *Attalea parviflora* Barb. Rodr.,
Scheelea anisitsiana Barb. Rodr.,
Scheelea parviflora (Barb. Rodr.)
Barb. Rodr., *Scheelea quadrisperma*
Barb. Rodr., *Scheelea quadrisulcata*
Barb. Rodr.
Palmera. Nativa. 100-300 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Bactris Jacq. ex Scop.

Bactris gasipaes Kunth

Sin.: *Bactris insignis* (Mart.) Baill.,
Guilielma insignis Mart.
Palmera. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(SAL). PRY(CAN).

Bactris glaucescens Drude

Sin.: *Bactris anisitsii* Barb. Rodr.
Palmera. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON, SPE).

Bactris hatschbachii Noblick ex A.J.

Hend.
Palmera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Bactris setosa Mart.

Sin.: *Bactris lindmanniana* Drude ex
Lindm.
Palmera. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bactris vulgaris Barb. Rodr.

Palmera. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).

Butia (Becc.) Becc.

Butia campicola (Barb. Rodr.) Noblick

Sin.: *Cocos campicola* Barb. Rodr.,
Syagrus campicola (Barb. Rodr.)
Becc.
Palmera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN, COA, SPE).

Butia capitata (Mart.) Becc.

Sin.: *Butia bonnettii* Becc., *Butia capitata*
(Mart.) Becc. var. *elegantissima*
(Chabaud) Becc., *Butia capitata*
(Mart.) Becc. var. *erythrospatha*
(Chabaud) Becc., *Butia capitata*
(Mart.) Becc. var. *lilaceiflora*
(Chabaud) Becc., *Butia capitata*
(Mart.) Becc. var. *nehrlingiana* (Abbott
ex Nehrl.) L.H. Bailey, *Butia capitata*
(Mart.) Becc. var. *strictior* L.H. Bailey,
Butia capitata (Mart.) Becc. var.
subglobosa Becc., *Butia capitata*
(Mart.) Becc. var. *virescens* Becc.,
Butia leiospatha (Barb. Rodr.) Becc.,
Butia nehrlingiana (Abbott ex Nehrl.)
Abbott ex Nehrl., *Cocos capitata* Mart.,
Cocos elegantissima Chabaud, *Cocos*
erythrospatha Chabaud, *Cocos*
leiospatha Barb. Rodr., *Cocos*
lilaceiflora Chabaud, *Cocos*
nehrlingiana Abbott ex Nehrl., *Syagrus*
capitata (Mart.) Glassman
Palmera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(MON, ROC).

Butia catarinensis Noblick & Lorenzi

Árbol. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.

Sin.: *Butia eriospatha* (Mart. ex Drude)
Becc. subsp. *punctata* Bomhard,
Cocos eriospatha Mart. ex Drude,
Syagrus eriospatha (Mart. ex Drude)
Glassman
Palmera. Endémica. 700-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Butia exilata Deble & Marchiori

Palmera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Butia exospadix Noblick

Palmera. Nativa. 200-600 m.
Países: PRY(APA, AMA, CON).

Butia lallemantii Deble & Marchiori

Palmera acaule. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Butia leptospatha (Burret) Noblick

Sin.: *Syagrus leptospatha* Burret
Palmera. Nativa. 300-500 m.
Países: PRY(AMA).

Butia marmorii Noblick

Palmera. Endémica. 200-400 m.
Países: PRY(APA).

Butia microspadix Burret

Sin.: *Syagrus hatschbachii* Glassman
Palmera. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Butia noblickii Deble, Marchiori, F.S.

Alves & A.S. Oliveira
Palmera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick

Sin.: *Butia capitata* (Mart.) Becc. var.
odorata (Barb. Rodr.) Becc., *Butia*
capitata (Mart.) Becc. var. *pulposa*
(Barb. Rodr.) Becc., *Butia pulposa*

(Barb. Rodr.) Nehrl., *Cocos odorata* Barb. Rodr., *Cocos pulposa* Barb. Rodr.
Palmera. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(TYT).

Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
Sin.: *Butia amadelpa* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia arenicola* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia dyerana* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia pungens* Becc., *Butia wildemaniana* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso, *Butia yatay* (Mart.) Becc. var. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Becc., *Cocos amadelpa* Barb. Rodr., *Cocos arenicola* Barb. Rodr., *Cocos dyerana* Barb. Rodr., *Cocos paraguayensis* Barb. Rodr., *Cocos wildemaniana* Barb. Rodr., *Syagrus amadelpa* (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren, *Syagrus arenicola* (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren, *Syagrus dyerana* (Barb. Rodr.) Becc., *Syagrus paraguayensis* (Barb. Rodr.) Glassman, *Syagrus wildemaniana* (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren
Palmera. Nativa. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, SPE). URY(ART, RIV).

Butia poni Burret
Sin.: *Cocos poni* Hauman, nom. inval.
Palmera. Endémica.
Países: ARG(MIS).

Butia pubispatha Noblick & Lorenzi
Palmera. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Butia witeckii K. Soares & S. Longhi
Palmera. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Butia yatay (Mart.) Becc.
Sin.: *Butia missionera* Deble & Marchiori, *Butia quaraimana* Deble & Marchiori, *Cocos yatay* Mart., *Syagrus yatay* (Mart.) Glassman
Palmera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(PAY, RNO).

Copernicia Mart. ex Endl.

Copernicia alba Morong
Sin.: *Copernicia australis* Becc., *Copernicia australis* Becc. var. *alba* (Morong) Bertoni ex Hauman, *Copernicia australis* Becc. var. *nigra* (Morong) Bertoni ex Hauman, *Copernicia cerifera* (Arruda) Mart., *Copernicia nigra* Morong ex Becc., nom. nud., *Copernicia ramulosa* Burret, *Copernicia rubra* Morong, *Corypha cerifera* Arruda, *Coryphomia tectorum* Rojas Acosta
Palmera. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Euterpe Mart., nom. cons.

Euterpe edulis Mart.
Sin.: *Euterpe edulis* Mart. var. *clausa* Mattos, *Euterpe egusquiza* Bertoni, nom. nud.
Palmera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Geonoma Willd.

Geonoma elegans Mart.
Palmera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Geonoma gamiova Barb. Rodr.
Palmera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Geonoma pohliana Mart. subsp. *pohliana*
Sin.: *Geonoma meridionalis* Lorenzi
Palmera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Geonoma pohliana Mart. subsp. *weddelliana* (H. Wendl. ex Drude) Henderson
Sin.: *Geonoma schottiana* Mart. var. *palustris* Warm. ex Drude, *Geonoma warmingii* Hawkes
Palmera. Nativa. 200-1700 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAN).

Geonoma schottiana Mart.
Sin.: *Geonoma hoeheii* Burret, *Geonoma schottiana* Mart. var. *angustifolia* Drude, *Geonoma schottiana* Mart. var. *latifolia* Drude
Palmera. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Juania Drude

Juania australis (Mart.) Drude ex Hook. f.
Sin.: *Ceroxylon australe* Mart., *Morenia chonta* Phil., *Nunnezharia chonta* (Phil.) Kuntze
Palmera. Endémica. 200-800 m.
Países: CHL(JFE).

Jubaea Kunth

Jubaea chilensis (Molina) Baill.

Sin.: *Cocos chilensis* (Molina) Kunth, *Jubaea spectabilis* Kunth, *Micrococos chilensis* (Molina) Phil., *Molinaea micrococos* Bertero, *Palma chilensis* Molina
 Palmera. Endémica. 300
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Phoenix L.**Phoenix canariensis** Wildpret, nom. cons.

Palmera. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COR, LPA, SDE). BRA(SCA).

Syagrus Mart.**Syagrus campylospatha** (Barb. Rodr.) Becc.

Sin.: *Cocos acaulis* Drude subsp. *glauca* Drude ex Lindm., *Cocos apaensis* Barb. Rodr., *Cocos campylospatha* Barb. Rodr., *Cocos hassleriana* Barb. Rodr., *Syagrus apaensis* (Barb. Rodr.) Becc., *Syagrus hassleriana* (Barb. Rodr.) Becc.
 Palmera. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(CEN, CON, COA, PAI).

Syagrus cerqueirana Noblick & Lorenzi

Palmera. Nativa.
 Países: PRY(AMA).

Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.

Sin.: *Cocos flexuosa* Mart.
 Palmera. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Syagrus hoehnei Burret

Sin.: *Lytocaryum hoehnei* (Burret) Toledo

Palmera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Syagrus lilliputiana (Barb. Rodr.) Becc.

Sin.: *Cocos lilliputiana* Barb. Rodr.
 Palmera. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(CAN, SPE).

Syagrus loefgrenii Glassman

Sin.: *Syagrus rachidii* Glassman
 Palmera. Nativa. 300-900 m.
 Países: PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON).

Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Sin.: *Cocos oleracea* Mart., *Cocos picrophylla* Barb. Rodr. ex Becc., *Syagrus gomesii* Glassman
 Palmera. Nativa. 400-800 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

Sin.: *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc., *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc. var. *australe* (Mart.) Becc., *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc. var. *genuinum* Becc., nom. inval., *Cocos acrocomioides* Drude, *Cocos arechavaletana* Barb. Rodr., *Cocos australis* Mart., *Cocos datil* Drude & Griseb., *Cocos geriba* Barb. Rodr., *Cocos martiana* Drude & Glaz. ex Drude, *Cocos plumosa* Hook., *Cocos romanzoffiana* Cham., *Cocos sapida* Barb. Rodr.
 Palmera. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE, SJU, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(MAL, MON, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Trachycarpus H. Wendl.**Trachycarpus fortunei** (Hook.) H. Wendl.

Sin.: *Chamaerops fortunei* Hook.
 Palmera. Introducida.
 Países: ARG(BAI, TUC).

Trithrinax Mart.**Trithrinax brasiliensis** Mart. var. **acanthocoma** (Drude) Mattos

Sin.: *Trithrinax acanthocoma* Drude
 Palmera. Endémica. 400-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Trithrinax brasiliensis Mart. var. **brasiliensis**

Sin.: *Thrinax brasiliensis* Mart.
 Palmera. Endémica. 400-1100 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb.

Sin.: *Chamaethrinax hookeriana* H. Wendl. & Pfister, *Copernicia campestris* Burmeist.
 Palmera. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(PAY, RNO, SJO, SOR).

Trithrinax schizophylla Drude var. **biflabellata** (Barb. Rodr.) An. Cano & F.W. Stauffer

Sin.: *Trithrinax biflabellata* Barb. Rodr.
 Palmera. Endémica. 100-200 m.
 Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APA, PHA).

Trithrinax schizophylla Drude var. **schizophylla**

Sin.: *Diodosperma burity* H. Wendl.
 Palmera. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY, CON, PHA).

ARISTOLOCHIACEAE

Hierba. Endémica. 900-1300 m.
Países: CHL(ATA, COQ, LBO, MAU, RME).

Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Aristolochia Tourn. ex L.**Aristolochia angustifolia** Cham.

Sin.: *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *australis* Ahumada, *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *brevifolia* Cham., *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *guaranitica* Ahumada, *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *longifolia* Cham., *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *viperina* Chodat & Hassl., *Aristolochia brevifolia* (Cham.) Hauman, *Aristolochia longifolia* (Cham.) Hauman, *Aristolochia viperina* (Chodat) Chodat & Hassl., *Howardia longifolia* (Cham.) Klotzsch
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE). URY(RNO, SJO, SOR).

Aristolochia arcuata Mast.

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Aristolochia argentina Griseb.

Sin.: *Aristolochia glaberrima* Hassl., *Aristolochia parviflora* Griseb., *Aristolochia schreiteri* Ahumada
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(AMA).

Aristolochia barbata Jacq. subsp. **benedicti** Malme

Hierba. Nativa. 200-700 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Aristolochia bridgesii (Klotzsch) Duch.

Sin.: *Howardia bridgesii* Klotzsch

Aristolochia burelae Herzog

Sin.: *Aristolochia peltibractea* Hoehne
Enredadera. Nativa. 300-1200 m.
Países: ARG(SAL). PRY(APY).

Aristolochia castellanosi Ahumada

Sin.: *Aristolochia burkartii* Ahumada
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Aristolochia ceresensis Kuntze

Sin.: *Aristolochia albertiana* Ahumada, *Aristolochia ceresensis* Kuntze var. *joergensenii* (Hauman) Hoehne, *Aristolochia joergensenii* Hauman, *Aristolochia schulzii* Ahumada
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, MIS, SFE, SDE). PRY(BOQ, PHA).

Aristolochia chamissonis (Klotzsch) Duch.

Sin.: *Howardia chamissonis* Klotzsch
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Aristolochia chilensis Bridges ex Lindl.

Sin.: *Aristolochia setigera* Klotzsch
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Aristolochia curviflora Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS).

Aristolochia elegans Mast.

Sin.: *Aristolochia elegans* Mast. var. *hassleriana* (Chodat) Hassl., *Aristolochia hassleriana* Chodat
Enredadera. Nativa. 0-900 m.

Aristolochia esperanzae Kuntze

Sin.: *Aristolochia boliviensis* Kuntze, *Aristolochia esperanzae* Kuntze var. *longilabra* Ahumada, *Aristolochia esperanzae* Kuntze var. *major* Hassl., *Aristolochia malmeana* Hoehne
Enredadera. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CON, PAI, PHA).

Aristolochia fimbriata Cham.

Sin.: *Aristolochia ciliata* Hook. f., *Aristolochia ciliosa* Benth., *Howardia fimbriata* (Cham.) Klotzsch
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, PAY, SAO, SOR, TAC).

Aristolochia gibertii Hook.

Sin.: *Aristolochia cobra* Chodat, *Aristolochia gibertii* Hook. var. *cobra* (Chodat) Chodat, *Aristolochia ipemi* D. Parodi, *Aristolochia warmingii* Mast. var. *angustilabia* Hauman
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Aristolochia gigantea Mart. & Zucc.

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Aristolochia holostylis F. González

Sin.: *Aristolochia reniformis* (Duch.) F. González, hom. illeg., *Duchartrella*

reniformis (Duch.) Kuntze, *Holostylis reniformis* Duch.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

***Aristolochia labiata* Willd.**

Sin.: *Aristolochia brasiliensis* Mart. & Zucc., *Aristolochia brasiliensis* Mart. & Zucc. var. *macrophylla* Duch.

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Aristolochia lindneri* A. Berger**

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

***Aristolochia lingua* Malme**

Sin.: *Aristolochia ceresensis* Kuntze var. *acuminata* Hoehne, *Aristolochia ceresensis* Kuntze var. *lingua* (Malme) Hoehne, *Aristolochia lingua* Malme var. *acuminata* (Hoehne) Ahumada, comb. inval.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

***Aristolochia melanoglossa* Speg.**

Sin.: *Aristolochia oranensis* Ahumada

Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

***Aristolochia melastoma* Silva Manso ex Duch.**

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

***Aristolochia odoratissima* L.**

Sin.: *Aristolochia aurantiaca* Duch., *Aristolochia glaziovii* Mast., *Aristolochia hassleriana* Chodat var. *guaranitica* Chodat, *Aristolochia martiniana* Standl., *Aristolochia moschata* Wedd. ex Duch., *Aristolochia odoratissima* L. f.

paraguariensis Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *genuina* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *glaziovii* (Mast.) Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *glaziovii* (Mast.) Hassl. f. *brasiliensis* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *grandiflora* Duch., *Aristolochia odoratissima* L. var. *guaranitica* (Chodat) Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *hastata* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *pandurata* (Jacq.) Hoehne, *Aristolochia pandurata* Jacq., *Aristolochia pandurata* Jacq. var. *warscewiczii* Duch., *Aristolochia rimbachii* O.C. Schmidt, *Howardia pandurata* (Jacq.) Klotzsch, *Howardia warscewiczii* Klotzsch ex Duch, nom. inval.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, SPE).

***Aristolochia paulistana* Hoehne**

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Aristolochia pearcei* Phil.**

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

***Aristolochia prostrata* Duch.**

Sin.: *Aristolochia cardenasii* Standl., *Aristolochia trollii* O.C. Schmidt

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(SAL).

***Aristolochia pyrifolia* Lombardi & D. Frank**

Sin.: *Holostylis reniformis* Duch. f. *minor* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: PRY(AMA).

***Aristolochia ridicula* N.E. Br.**

Liana. Nativa. 200-800 m.

Países: PRY(AMA).

***Aristolochia robertii* Ahumada**

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

***Aristolochia rojasiana* (Chodat & Hassl.) Hosseus**

Sin.: *Euglypha rojasiana* Chodat & Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, CON, COA, PHA).

***Aristolochia sessilifolia* (Klotzsch) Duch.**

Sin.: *Aristolochia brevifolia* (Cham.) Hauman var. *subcordata* Hauman, *Aristolochia emarginata* (Klotzsch) Duch., *Aristolochia sessilifolia* (Klotzsch) Duch. var. *uruguayensis* Hauman, *Howardia emarginata* Klotzsch, *Howardia sessilifolia* Klotzsch

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU). URY(ART, TAC).

***Aristolochia stomachoidis* Hoehne**

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

***Aristolochia stuckertii* Speg.**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). URY(ART, RNO, SAO, SOR).

***Aristolochia triangularis* Cham.**

Sin.: *Aristolochia antihysterica* Mart. ex Duch., *Aristolochia paraguariensis* D. Parodi, *Aristolochia salpinx* Mast., *Aristolochia sellowiana* (Klotzsch) Duch., *Aristolochia triangularis* Cham. f. *minor* Chodat, *Aristolochia triangularis* Cham. var. *salpinx* (Mast.)

Hauman, *Howardia sellowiana*
Klotzsch, *Howardia triangularis*
(Cham.) Klotzsch
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR,
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON,
COA, PAI, SPE). URY(PAY, SOR).

Aristolochia trilobata L.

Sin.: *Aristolochia appendiculata* Vell.,
Aristolochia caudata Booth ex Lindl.,
Aristolochia caudata D. Parodi, hom.
illeg., *Aristolochia macroura* Gomes,
Aristolochia macroura Gomes var.
subtrifida Duch., *Aristolochia trifida*
Lam., *Aristolochia trilobata* Lindl., hom.
illeg., *Howardia macroura* (Gomes)
Klotzsch, *Howardia trifida* (Lam.)
Klotzsch, *Howardia trilobata* (L.)
Klotzsch
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA,
CAN, PHA). URY(MON, ROC).

Aristolochia warmingii Mast.

Hierba. Nativa. 200-800 m.
Países: PRY(AMA).

Aristolochia wendeliana Hoehne

Hierba voluble. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Lactoris Phil.

Lactoris fernandeziana Phil.

Arbusto. Endémica. 500
Países: CHL(JFE).

ASPARAGACEAE

Agave L.

Agave americana L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COR, LPA).

Anthericum L.

Anthericum argentinense (Hauman)

Guagl.
Sin.: *Anthericum ciliatum* (Kunth) Spreng.
var. *argentinense* Hauman
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Anthericum hickenianum Poelln.

Sin.: *Anthericum parviflorum* Hicken, hom.
illeg.
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Anthericum volcanense Ravenna

Hierba. Endémica. 2500-2800 m.
Países: ARG(JUJ).

Asparagus L.

Asparagus aethiopicus L.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

Asparagus asparagoides (L.) Druce

Sin.: *Medeola asparagoides* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA). URY(CAS,
MAL).

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop

Sin.: *Asparagopsis densiflora* Kunth,
Asparagus sprengeri Regel
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Asparagus officinalis L. var. **altilis** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI,
LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SJU,
SLU, TUC). URY(CAS).

Asparagus scoparius Lowe

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(LPA).

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop

Sin.: *Asparagopsis setacea* Kunth,
Asparagus plumosus Baker
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, LPA,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Beschorneria Kunth

Beschorneria yuccoides K. Koch

Hierba. Introducida. 800-900 m.
Países: ARG(COR).

Clara Kunth

Clara gracilis R.C. Lopes & Andreato

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Clara ophiopogonoides Kunth

Sin.: *Herreria ophiopogonoides* (Kunth)
Niederl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(MIE). URY(CAS,
FLA, RIV, TAC).

Clara stricta (L.B. Sm.) R.C. Lopes & Andreato

Sin.: *Herreria stricta* L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Cordyline Comm. ex R. Br., nom. cons.

Cordyline sellowiana Kunth
Hierba. Nativa. 200-300 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Cordyline terminalis (L.) Kunth
Arbusto. Introducida.
Países: CHL(IPA).

Echeandia Ortega

Echeandia ciliata (Kunth) Cruden
Sin.: *Anthericum humboldtii* Hemsl.,
Anthericum peruvianum Willd. ex
Kunth, nom. nud., *Anthericum sprengelii* Rusby, *Phalangium ciliatum* Kunth
Hierba. Nativa. 2200-2600 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Echeandia eccremorrhiza (Ruiz & Pav.) Govaerts
Sin.: *Anthericum eccremorrhizum* Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(SAL).

Hagenbachia Nees & Mart.

Hagenbachia brasiliensis Nees & Mart.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Hagenbachia hassleriana (Baker) Cruden
Sin.: *Chlorophytum hasslerianum* Baker
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(CAN).

Hagenbachia matogrossensis (Poelln.) Ravenna

Sin.: *Anthericum brasiliense* Baker,
Anthericum matogrossense Poelln.,
Hagenbachia angusta Ravenna
Hierba. Nativa. 400-600 m.
Países: PRY(AMA).

Herreria Ruiz & Pav.

Herreria bonplandii Lecomte
Sin.: *Dioscorea tuberosa* Rojas Acosta, nom. illeg., *Herreria linearifolia* Dammer, nom. nud., *Herreria montevidensis* Klotzsch ex Griseb. var. *bonplandii* (Lecomte) L.B. Sm., *Herreria tuberosa* Rojas Acosta
Hierba o enredadera. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, ÑEE).

Herreria montevidensis Klotzsch ex Griseb.
Hierba o enredadera. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, SPE). URY(COL, MON, RNO).

Herreria stellata Ruiz & Pav.
Sin.: *Herreria verticillata* Molina
Hierba o enredadera. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(MAU, BIO, LLA).

Ophiopogon Ker Gawl.

Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker Gawl.
Sin.: *Convallaria japonica* L. f.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(COR).

Oziroë Raf.

Oziroë acaulis (Baker) Speta
Sin.: *Allium sessile* R.E. Fr., *Fortunatia acaulis* (Baker) Guagl. & S.C. Arroyo, *Fortunatia sessilis* (R.E. Fr.) Ravenna, *Nothoscordum sessile* (R.E. Fr.) Beauverd, *Oziroë acaulis* (Baker) Ravenna, comb. superfl., *Oziroë sessilis* (R.E. Fr.) Ravenna, *Scilla acaulis* Baker
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP).

Oziroë argentinensis (Lillo & Hauman) Speta
Sin.: *Fortunatia argentinensis* (Lillo & Hauman) Ravenna, *Oziroë argentinensis* (Lillo & Hauman) Ravenna, comb. superfl., *Oziroë correntina* Ravenna, *Scilla argentinensis* Lillo & Hauman
Hierba. Nativa. 0-3200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, SAL, TUC). PRY(CON).

Oziroë arida (Poepp.) Speta
Sin.: *Fortunatia arida* (Poepp.) Ravenna, *Ornithogalum aridum* Poepp., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don var. *chloroleucum* (Lindl.) Baker, *Ornithogalum chilense* Phil., *Ornithogalum chloroleucum* Lindl., *Oziroë arida* (Poepp.) Ravenna, comb. superfl., *Oziroë chloroleuca* (Poepp.) Speta, *Scilla chloroleuca* (Lindl.) Kunth
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Oziroë biflora (Ruiz & Pav.) Speta
Sin.: *Camassia biflora* (Ruiz & Pav.) Cocucci, *Fortunatia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don, *Ornithogalum geminiflorum* Herb. ex

Lindl., *Oziroë biflora* (Ruiz & Pav.)
Ravenna, comb. superfl., *Scilla biflora*
Ruiz & Pav., *Scilla geminiflora* (Herb.
ex Lindl.) Kunth, *Scilla triflora* Phil.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ,
VAL, LBO, RME).

Oziroë pomensis Ravenna

Sin.: *Oziroë totoensis* Ravenna

Hierba. Nativa. 1800-3600 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(TAR).

Trichopetalum Lindl.

Trichopetalum chosmalensis Guagl. &
Belgrano
Hierba. Endémica. 1000
Países: ARG(NEU).

Trichopetalum plumosum (Ruiz & Pav.)
J.F. Macbr.
Sin.: *Anthericum plumosum* Ruiz & Pav.,
Bottionea thysanoides Colla,
Endocoma parviflora Raf., *Endocoma*
peruviana Raf., *Trichopetalum gracile*
Lindl., *Trichopetalum stellatum* Lindl.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Trihesperus Herb.

Trihesperus glaucus (Ruiz & Pav.) Herb.
Sin.: *Anthericum glaucum* Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUU).

Yucca L.

Yucca aloifolia L.

Arbolito. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COR, ERI, LPA, TUC).

Yucca gloriosa L.

Arbolito. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(ERI).

ASPHODELACEAE

Aloe L.

Aloe arborescens Mill.

Arbusto. Introducida.

Países: ARG(COR).

Aloe maculata All.

Arbusto. Introducida.

Países: ARG(BAI, COR, LPA).

Asphodelus L.

Asphodelus fistulosus L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COR, LPA). CHL(AYP,
ATA).

Kniphofia Moench

Kniphofia uvaria (L.) Oken

Sin.: *Aloe uvaria* L.

Hierba. Introducida. 100-1000 m.

Países: ARG(COR).

Pasithea D. Don

Pasithea caerulea (Ruiz & Pav.) D. Don

Sin.: *Anthericum caeruleum* Ruiz & Pav.,
Cyanella illcu Molina, *Pasithea*
caerulea (Ruiz & Pav.) D. Don var.
grandiflora I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

ASTELIACEAE

Astelia Banks & Sol. ex R. Br., nom.
cons.

Astelia pumila (G. Forst.) Gaudich.

Sin.: *Astelia pumila* (G. Forst.) R. Br.,
comb. illeg., *Melanthium pumilum* G.
Forst.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(TDF). CHL(LSR, LLA,
AIS, MAG).

ASTERACEAE

Abrotanella Cass.

Abrotanella diemii Cabrera

Hierba. Endémica. 1400-1700 m.

Países: ARG(NEU).

Abrotanella emarginata (Gaudich.)
Cass.

Sin.: *Oligosporus emarginatus* Gaudich.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS,
MAG).

Abrotanella linearifolia A. Gray

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(LLA, AIS, MAG, JFE).

Abrotanella purpurea Swenson

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(LLA, AIS, MAG).

Abrotanella submarginata A. Gray

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(MAG).

Abrotanella trichoachaenia Cabrera

Hierba. Endémica. 800-1600 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(AIS, MAG).

Abrotanella trilobata Swenson

Hierba. Endémica. 400-800 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Acanthospermum Schrank, nom. cons.**Acanthospermum australe** (Loefl.) KuntzeSin.: *Acanthospermum brasiliense* Schrank, *Acanthospermum hirsutum* DC., nom. superfl., *Acanthospermum xanthioides* (Kunth) DC., *Centrospermum xanthioides* Kunth, *Melampodium australe* Loefl., *Orcya adhaerens* Vell.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Acanthospermum consobrinum S.F. Blake

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(CEN).

Acanthospermum hispidum DC.Sin.: *Acanthospermum humile* DC. var. *hispidum* (DC.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,

MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Notas: Citada para Uruguay (Ariza Espinar, 2000b) sin indicar localidad o material de referencia.

Acanthostyles R.M. King & H. Rob.**Acanthostyles buniifolius** (Hook. & Arn.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Acanthostyles saucechicoensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *bakeri* Kuntze, *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *buniifolium*, *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *hieronymi* Kuntze, *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *saucechicoense* (Hieron.) Ariza, *Eupatorium crithmifolium* Griseb., *Eupatorium pinnatifidum* DC., nom. illeg., *Eupatorium pinnatifidum* DC. var. *virgata* (D. Don ex Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium pinnatifidum* H. Buek, *Eupatorium saucechicoense* Hieron., *Eupatorium virgatum* D. Don ex Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Achillea L.**Achillea millefolium** L.Sin.: *Achillea lanulosa* Nutt., *Achillea sudetica* Opiz

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, LPA, LRI, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME). URY(CAS, FLA, MON, SAO).

Achillea ptarmica L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(LLA).

Achyrocline (Less.) DC.**Achyrocline alata** (Kunth) DC.Sin.: *Achyrocline alata* (Kunth) DC. var. *vautheiriana* (DC.) Baker, *Achyrocline argentina* O. Hoffm., *Achyrocline flavescens* Griseb., *Achyrocline glandulosa* Blake, *Achyrocline pterocaula* DC., *Achyrocline rufescens* DC., *Achyrocline vautheiriana* DC., *Gnaphalium alatum* Kunth, *Gnaphalium incanum* Kunth, *Gnaphalium rufescens* Kunth

Subarbusto. Nativa. 1500-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA). URY(ART, CAS, CLA, MON, ROC, SJO, TAC, TYT).

Achyrocline anabelae Deble

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

Achyrocline crassiuscula (Malme) Deble & MarchioriSin.: *Achyrocline saturejoides* (Lam.) DC. var. *crassiuscula* Malme

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Achyrocline flaccida (Weinm.) DC.

Sin.: *Achyrocline citrina* Griseb.,
Achyrocline mathiolaeifolia DC.,
Achyrocline satureioides (Lam.) DC.
var. *albicans* Griseb., *Gnaphalium*
flaccidum Weinm.
Hierba o subarbusto. Nativa. 800-3400
m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAU, CAA, COA, GUA,
PAI). URY(ART, CAS, MAL, RNO,
RIV, ROC, SAO).

Achyrocline gardneri (Baker) Deble &
Marchiori

Sin.: *Stenocline gardneri* Baker,
Stenophalium gardneri (Baker) D.J.N.
Hind
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Achyrocline gertiana Deble & Marchiori

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, COA).

Achyrocline hyperchlora Blake

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC).

Achyrocline luisiana Deble

Subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(RGS).

Achyrocline marchiorii Deble

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).

Achyrocline ramosissima Britton ex
Rusby

Sin.: *Achyrocline brittoniana* Deble &
Marchiori, nom. superfl., *Gnaphalium*
ramosissimum Sch. Bip., hom. illeg.
Subarbusto. Nativa. 2200-4000 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).
CHL(AYP).

Achyrocline rupestris Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2900-4700 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
SAL, SJU, TUC). CHL(AYP).

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

Sin.: *Achyrocline candicans* (Kunth) DC.,
Gnaphalium candicans Kunth,
Gnaphalium satureioides Lam.
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL,
SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, COA,
GUA, PAI). URY(CAS, COL, CLA,
FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV,
ROC, SJO, TAC, TYT).

Achyrocline tomentosa Rusby

Sin.: *Achyrocline polycephala* Rusby
Subarbusto. Nativa. 700-3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ,
LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, TUC).
BRA(RGS). CHL(AYP, TAR).
PRY(AMA, PAI).

Achyrocline vargasiana DC.

Sin.: *Achyrocline macella* Deble &
Marchiori
Subarbusto. Nativa. 1000
Países: BRA(PAR).

Achyrocline venosa Rusby

Subarbusto. Nativa. 1600-2800 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, COA,
GUA, MIE, PAI, PHA).

Acilepidopsis H. Rob.

Acilepidopsis echitifolia (Mart. ex DC.)
H. Rob.

Sin.: *Vernonia echitifolia* Mart. ex DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,
CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA,
MIE, PAI, SPE).

Acmella Rich. ex Pers.

Acmella alpestris (Griseb.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes alpestris* Griseb.
Hierba. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,
JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR,
RGS). PRY(PAI, PHA).

Acmella bellidioides (Sm.) R.K. Jansen

Sin.: *Ceratocephalus arnicoides* (DC.)
Kuntze, *Ceratocephalus decumbens*
(Sm.) Kuntze var. *doronicoides* (DC.)
Kuntze, *Rudbeckia bellidioides* Sm.,
Spilanthes arnicoides DC., *Spilanthes*
arnicoides DC. var. *intermedia* Chodat,
Spilanthes arnicoides DC. var. *setosa*
Chodat, *Spilanthes bellidioides* (Sm.)
Cabrera, *Spilanthes blepharicarpa*
DC., *Spilanthes doronicoides* DC.,
Spilanthes grandis DC., *Spilanthes*
grisea (Chodat) A.H. Moore var.
intermedia (Chodat) A.H. Moore,
Spilanthes grisea (Chodat) A.H. Moore
var. *micra* A.H. Moore, *Spilanthes*
grisea (Chodat) A.H. Moore var.
setosa (Chodat) A.H. Moore,
Spilanthes longifolia DC., *Spilanthes*
sphaerocephala DC.
Hierba. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU,
CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE,
PHA, SPE). URY(MON, TAC).

Acmella brachyglossa Cass.

Sin.: *Ceratocephalus caespitosus* (DC.) Kuntze, *Spilanthes arrayana* Gardner, *Spilanthes caespitosa* DC., *Spilanthes eggersii* Hieron., *Spilanthes limonica* A.H. Moore, *Spilanthes ocymifolia* (Lam.) A.H. Moore f. *radiifera* A.H. Moore
 Hierba. Nativa. 100-3000 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA).

Acmella ciliata (Kunth) Cass.

Sin.: *Acmella fimbriata* (Kunth) Cass., *Ceratocephalus ciliatus* (Kunth) Kuntze, *Ceratocephalus fimbriatus* (Kunth) Kuntze, *Ceratocephalus poeppigii* (DC.) Kuntze, *Spilanthes ciliata* Kunth, *Spilanthes fimbriata* Kunth, *Spilanthes melampodioides* Gardner, *Spilanthes poeppigii* DC., *Spilanthes popayanensis* Hieron.
 Hierba. Nativa. 0-3000 m.
 Países: ARG(CHA, JUJ). BRA(PAR, SCA).

Acmella decumbens (Sm.) R.K. Jansen var. **affinis** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes affinis* Hook. & Arn., *Spilanthes americana* (L. f.) Hieron. f. *ciliatifolia* A.H. Moore, *Spilanthes eurycarena* A.H. Moore, *Spilanthes micralloeophylla* A.H. Moore
 Hierba. Endémica. 400-3000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SDE, SLU, TUC).

Acmella decumbens (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**

Sin.: *Ceratocephalus decumbens* (Sm.) Kuntze, *Ceratocephalus decumbens* (Sm.) Kuntze var. *macropodus* (DC.) Kuntze, *Rudbeckia decumbens* Sm., *Spilanthes americana* (L. f.) Hieron. var. *stolonifera* (DC.) A.H. Moore, *Spilanthes arnicoides* DC. var.

macropoda (DC.) Baker, *Spilanthes decumbens* (Sm.) A.H. Moore, *Spilanthes decumbens* (Sm.) A.H. Moore var. *macropoda* (DC.) A.H. Moore, *Spilanthes helenioides* Hook. & Arn., *Spilanthes macropoda* DC., *Spilanthes stenophylla* Hook. & Arn., *Spilanthes stolonifera* DC.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, ÑEE, PAI). URY(CAS, MON, ROC).

Acmella glaberrima (Hassl.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes glaberrima* Hassl.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, SDE, SFE). CHL(MAU). PRY(AMA, CAA, CEN, CON, ITA, MIE, ÑEE, PHA, SPE).

Acmella grisea (Chodat) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes arnicoides* DC. f. *grisea* Chodat, *Spilanthes arnicoides* DC. var. *grisea* (Chodat) Chodat, *Spilanthes grisea* (Chodat) A.H. Moore
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Acmella leptophylla (DC.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes arnicoides* DC. f. *minor* Chodat, *Spilanthes arnicoides* DC. f. *nervosa* Chodat, *Spilanthes arnicoides* DC. var. *leptophylla* (DC.) Baker, *Spilanthes decumbens* (Sm.) A.H. Moore var. *leptophylla* (DC.) A.H. Moore, *Spilanthes grisea* (Chodat) A.H. Moore var. *chodatana* A.H. Moore, *Spilanthes leptophylla* DC.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAA, GUA, PHA).

Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes oleracea* L.
 Hierba. Introducida.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Acmella psilocarpa R.K. Jansen

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(ERI). BRA(RGS).

Acmella pusilla (Hook. & Arn.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes americana* (L. f.) Hieron. f. *longiinternodiata* A.H. Moore, *Spilanthes pusilla* Hook. & Arn., *Spilanthes stolonifera* DC. var. *pusilla* (Hook. & Arn.) Baker
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(RNO).

Acmella serratifolia R.K. Jansen

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(COL, RIV, TYT).

Acrisione B.Nord.**Acrisione cymosa** (J. Remy) B. Nord.

Sin.: *Senecio cymosus* J. Remy
 Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1100 m.
 Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Acrisione denticulata (Hook. & Arn.) B. Nord. var. **denticulata**

Sin.: *Cacalia denticulata* Hook. & Arn., *Danaa yegua* Colla, *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC., hom. illeg., *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC. var. *araeus* Phil., *Senecio*

denticulatus (Hook. & Arn.) DC. var. *depilis* Phil., *Senecio ovalifolius* Turcz., *Senecio rancaguensis* J. Remy, *Senecio yegua* (Colla) Cabrera var. *depilis* (Phil.) Cabrera, *Senecio yegua* (Colla) Cabrera var. *yegua*

Arbusto. Endémica. 700-900 m.

Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Acrisione denticulata (Hook. & Arn.) B. Nord. var. **pilota** (Phil.) B. Nord.

Sin.: *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC. var. *pilotus* Phil., *Senecio yegua* (Colla) Cabrera var. *pilotus* (Phil.) Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Adenocaulon Hook.

Adenocaulon chilense Less.

Sin.: *Adenocaulon lechleri* Sch. Bip., *Boerhavia nudicaulis* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Adenostemma J.R. Forst. & G. Forst.

Adenostemma brasilianum (Pers.) Cass.

Sin.: *Adenostemma brasilianum* (Pers.) Cass. var. *triangulare* (DC.) Malme, *Adenostemma triangulare* DC., *Adenostemma viscosum* J.R. Forst. var. *brasilianum* (Pers.) Benth., *Adenostemma viscosum* J.R. Forst. var. *triangulare* (DC.) Benth., *Verbesina brasiliana* Pers.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, GUA, PAI). URY(CLA, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Adenostemma involucreatum R.M. King & H. Rob.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Adenostemma verbesina (L.) Kuntze

Sin.: *Adenostemma swartzii* Cass., *Cotula verbesina* L., *Lavenia decumbens* Sw.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, GUA).

Ageratina Spach

Ageratina azangaroensis (Sch. Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium azangaroense* Sch. Bip. ex Wedd., *Eupatorium prasiifolium* Griseb. var. *glanduliferum* R.E. Fr., *Fleischmannia prasiifolia* (Griseb.) R.M. King & H. Rob. var. *glandulifera* (R.E. Fr.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 3500-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Ageratina glechonophylla (Less.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Ageratina remyana* (Phil.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium chilense* Bertero, *Eupatorium glechonophyllum* Less., *Eupatorium remyanum* Phil.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Ageratina lorentzii (Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium lorentzii* Hieron.

Hierba. Nativa. 2000-3400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Ageratina tenuis (R.E. Fr.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium tenue* R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 1500-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Ageratum L.

Ageratum conyzoides L.

Sin.: *Ageratum conyzoides* L. var. *hirtum* (Lam.) DC., *Ageratum hirsutum* Poir., *Ageratum hirtum* Lam., *Ageratum latifolium* Cav., *Carelia conyzoides* (L.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA). URY(ART).

Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Isocarpha fastigiata* Gardner

Hierba a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Agoseris Raf.

Agoseris chilensis (Less.) Greene

Sin.: *Macrorhynchus chilensis* Less., *Troximon chilense* (Less.) A. Gray

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Agoseris coronopifolia (d'Urv.) K.L. Chambers ex D.M. Moore

Sin.: *Agoseris australis* (Phil.) Macloskie, *Agoseris poeppigii* (DC.) Greene,

Agoseris pumila (Gaudich.) Macloskie,
Macrorhynchus australis Phil.,
Macrorhynchus elatus Phil.,
Macrorhynchus poeppigii DC.,
Macrorhynchus pumilus (Gaudich.)
 DC., *Taraxacum coronopifolium* d'Urv.,
Taraxacum pumilum Gaudich.,
Troximon coronopifolius (d'Urv.)
 Cabrera, *Troximon poeppigii* (DC.) De
 Wild., *Troximon pumilum* (Gaudich.)
 De Wild.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
 SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, BIO,
 ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Aldama La Llave

Aldama adenotricha (S.F. Blake)
 E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera adenotricha* S.F. Blake

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Aldama amphichlora (S.F. Blake)
 E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera amphichlora* S.F. Blake

Hierba. Endémica. 200-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Aldama anchusifolia (DC.) E.E.Schill. &
 Panero var. **anchusifolia**

Sin.: *Leighia anchusifolia* DC., *Leighia*
baldwiniana Nutt., *Leighia dissitifolia*
 DC., *Leighia lomatoneura* DC.,
Rhyssolepis anchusifolia (DC.) H. Rob.
 & A.J. Moore, *Viguiera anchusifolia*
 (DC.) Baker var. *anchusifolia*

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

Aldama anchusifolia (DC.) E.E.Schill. &
 Panero var. **immarginata** (S.F. Blake)
 Magenta & Pirani

Sin.: *Leighia immarginata* DC., *Leighia*
stenophylla Hook. & Arn., *Viguiera*
anchusifolia (DC.) Baker var.
immarginata (DC.) Baker, *Viguiera*
immarginata (DC.) Herter, *Viguiera*
stenophylla (Hook. & Arn.) Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON,
 PAY, SJO, TAC).

Aldama aspilioides (Baker) E.E.Schill. &
 Panero

Sin.: *Rhyssolepis aspilioides* (Baker) H.
 Rob. & A.J. Moore, *Viguiera*
aspilioides Baker, *Wedelia aspilioides*
 (Baker) B.L. Turner

Hierba. Endémica. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Aldama atacamensis (Phil.) E.E.Schill. &
 Panero

Sin.: *Rhyssolepis atacamensis* (Phil.) H.
 Rob. & A.J. Moore, *Viguiera*
atacamensis Phil., *Viguiera linearis*
 Reiche, hom. illeg.

Subarbusto. Endémica. 2800-2900 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Aldama bakeriana (S.F. Blake)
 E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Aldama subdentata* (S.F. Blake)
 E.E.Schill. & Panero, *Viguiera*
bakeriana S.F. Blake, *Viguiera*
subdentata S.F. Blake

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Aldama breviflosculosa (S.F. Blake)
 E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera breviflosculosa* S.F. Blake

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(CLA, FLA, LAV, MAL,
 RIV, TAC, TYT).

Aldama densifolia (Baker) E.E.Schill. &
 Panero

Sin.: *Viguiera densifolia* Baker

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU).

Aldama fabrisii (A.A. Sáenz) E.E.Schill.
 & Panero

Sin.: *Rhyssolepis fabrisii* (A.A. Sáenz) H.
 Rob. & A.J. Moore, *Viguiera fabrisii*
 A.A. Sáenz

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Aldama filifolia (Sch. Bip. ex Baker)
 E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera filifolia* Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: PRY(AMA).

Aldama gilliesii (Hook. & Arn.) E.E.Schill.
 & Panero

Sin.: *Flourensia hispida* Phil., *Helianthus*
heteropappus Gillies ex Hook. & Arn.,
 nom. nud., *Leighia gilliesii* Hook. &
 Arn., *Rhyssolepis gilliesii* (Hook. & Arn.)
 H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera gilliesii*
 (Hook. & Arn.) Hieron.

Subarbusto. Endémica. 1600-3300 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Aldama helianthoides (Rich.) E.E. Schill.
 & Panero

Sin.: *Flourensia atacamensis* (Phil.)
 Reiche, *Helianthus atacamensis* Phil.,
Helianthus procumbens Pers.,
Rhyssolepis helianthoides (Rich.) H.
 Rob. & A.J. Moore, *Sanvitalia*
helianthoides Rich., *Viguiera pazensis*
 Rusby, *Viguiera pflanzii* Perkins,
Viguiera procumbens (Pers.) S.F.
 Blake, *Viguiera punensis* S.F. Blake
 Hierba. Nativa. 1300-3500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP,
 TAR).

Aldama knobiana (Mondin & Magenta)
E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera knobiana* C.A. Mondin & Magenta

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.

Países: BRA(RGS).

Aldama linearifolia (Chodat) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Aldama rojasii* (S.F. Blake) E.E.Schill. & Panero, *Rhysolepis linearifolia* (Chodat) H. Rob. & A.J. Moore, *Rhysolepis rojasii* (S.F. Blake) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera linearifolia* Chodat, *Viguiera rojasii* S.F. Blake

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, PAI, SPE).

Aldama macrorhiza (Baker) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Rhysolepis macrorhiza* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera hassleriana* Chodat, *Viguiera macrorhiza* Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN).

Aldama megapotamica (Malme)
Magenta & Pirani

Sin.: *Viguiera megapotamica* Malme

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Aldama meridionalis (Magenta)
E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera meridionalis* Magenta

Hierba o subarbusto. Endémica. 600-700 m.

Países: BRA(RGS).

Aldama misionensis (A.A. Sáenz) Freire

Sin.: *Viguiera misionensis* A.A. Sáenz

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Aldama mollis (Griseb.) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Helianthopsis mollis* (Griseb.) Sala & Echarte, *Helianthus argentinus* A.A. Sáenz, *Rhysolepis mollis* (Griseb.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera mollis* Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Aldama nudicaulis (Baker) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Rhysolepis nudicaulis* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera nudicaulis* Baker

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, TAC, TYT).

Aldama paranensis (Malme) Magenta & Pirani

Sin.: *Aspilia paranensis* Malme, *Viguiera paranensis* (Malme) J.U. Santos, *Wedelia paranensis* (Malme) B.L. Turner

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Aldama pilicaulis (S.F. Blake) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera pilicaulis* S.F. Blake, *Viguiera robusta* Gardner var. *confusa* Hassl., *Viguiera robusta* Gardner var. *scaberrima* Hassl.

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: PRY(AMA).

Aldama pilosa (Baker) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Aldama salicifolia* (Hassl.) E.E.Schill. & Panero, *Rhysolepis pilosa* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore, *Rhysolepis salicifolia* (Hassl.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera malmei* S.F. Blake, *Viguiera pilosa* Baker, *Viguiera*

salicifolia Hassl., *Viguiera villaricensis* S.F. Blake

Hierba. Nativa. 300-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Aldama revoluta (Meyen) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Flourensia corymbosa* DC., *Flourensia corymbosa* DC. var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Flourensia corymbosa* DC. var. *lanceolata* (Meyen) Reiche, *Flourensia gayana* (Phil.) Reiche, *Helianthus araucanus* Phil., *Helianthus gayanus* Phil., *Helianthus lanceolatus* Meyen, *Helianthus revolutus* Meyen, *Viguiera corymbosa* (DC.) Blake, *Viguiera gayana* (Phil.) Cabrera ex Espinosa, nom. illeg., *Viguiera poeppigii* A. Gray, nom. illeg., *Viguiera revoluta* (Meyen) S.F. Blake

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, RME).

Aldama robusta (Gardner) E.E. Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera robusta* Gardner

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

Aldama santacatarinensis (H. Rob. & A.J. Moore) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Rhysolepis santacatarinensis* H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera santacatarinensis* (H. Rob. & A.J. Moore) A.A. Sáenz, *Viguiera santacatarinensis* (H. Rob. & A.J. Moore) Magenta & Pirani

Arbusto. Endémica. 400-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Aldama squalida (S. Moore) E.E. Schill. & Panero
Sin.: *Viguiera squalida* S. Moore
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Aldama trichophylla (Dusén) Magenta
Sin.: *Viguiera trichophylla* Dusén
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aldama tuberosa (Griseb.) E.E.Schill. & Panero var. **guaranitica** (Chodat) Magenta
Sin.: *Aldama guaranitica* (Chodat) E.E.Schill. & Panero, *Rhysolepis guaranitica* (Chodat) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera guaranitica* Chodat, *Viguiera tuberosa* Griseb. f. *angustifolia* Hassl., *Viguiera tuberosa* Griseb. f. *major* Hassl., *Viguiera tuberosa* Griseb. f. *scaberula* Hassl., *Viguiera tuberosa* Griseb. var. *guaranitica* (Chodat) Hassl.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA, SPE).

Aldama tuberosa (Griseb.) E.E.Schill. & Panero var. **tuberosa**
Sin.: *Rhysolepis tuberosa* (Griseb.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera tuberosa* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CON, ITA, PHA). URY(ART, PAY, RNO, RIV).

Aldama tucumanensis (Hook. & Arn.) E.E.Schill. & Panero
Sin.: *Leighia tucumanensis* Hook. & Arn., *Rhysolepis tucumanensis* (Hook. & Arn.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera discoidea* (Griseb.) S.F. Blake,

Viguiera oligodonta S.F. Blake, *Viguiera stenophylla* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* Griseb., *Viguiera tucumanensis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* (Griseb.) Cabrera, *Viguiera tucumanensis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *oligodonta* (Blake) Cabrera, *Viguiera tucumanensis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *tucumanensis*
Hierba. Nativa. 500-3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Amblyopappus Hook. & Arn.

Amblyopappus pusillus Hook. & Arn. var. **pauciflorus** (Phil.) Reiche
Sin.: *Amblyopappus pauciflorus* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Amblyopappus pusillus Hook. & Arn. var. **pusillus**
Sin.: *Aromia tenuifolia* Nutt., *Infantea chilensis* J. Remy
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, JFE).

Ambrosia L.

Ambrosia arborescens Mill.
Sin.: *Franseria artemisioides* Willd., *Franseria conwayi* Rusby
Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.
Países: CHL(AYP, COQ).

Ambrosia artemisiifolia L.
Sin.: *Ambrosia artemisiifolia* L. var. *elatior* (L.) Descourt., *Ambrosia chilensis* Hook. & Arn., *Ambrosia elatior* L., *Ambrosia peruviana* Cabrera, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO). PRY(APA, AMA, CAA, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, FLA, MON, PAY, RNO, RIV).

Ambrosia artemisioides Meyen & Walp.
Sin.: *Franseria fruticosa* Phil., *Franseria meyeniana* Sch. Bip.
Arbusto. Nativa. 1700-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Ambrosia chamissonis (Less.) Greene
Sin.: *Franseria bipinnatifida* Nutt. var. *insularis* Reiche, *Franseria chamissonis* Less.
Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Ambrosia cumanensis Kunth
Sin.: *Ambrosia paniculata* Michx. var. *peruviana* O.E. Schulz, *Ambrosia peruviana* Willd., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Ambrosia polystachya DC.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ambrosia scabra Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, DFE, SFE). BRA(RGS, SCA).
Notas: Citada para Uruguay (Cabrera 1974a) sin indicar localidad o ejemplares de referencia

Ambrosia tarapacana Phil.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(TAR).

Ambrosia tenuifolia Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(CEN, PHA). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO).

Ameghinoa Speg.

Ameghinoa patagonica Speg.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Anaphalis DC.

Anaphalis chilensis Reiche

Sin.: *Helichrysum chilense* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 500-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Antennaria Gaertn.

Antennaria chilensis J. Remy var. **chilensis**

Sin.: *Gnaphalium affine* d'Urv. var. *parvulum* Speg.

Hierba. Endémica. 1600-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Antennaria chilensis J. Remy var. **magellanica** (Sch. Bip.) Reiche

Sin.: *Antennaria magellanica* Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Antennaria sleumeri Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-2100 m.

Países: ARG(SAL).

Anthemis L.

Anthemis arvensis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(LBO, BIO, ARA, LLA, RME). URY(MON).

Anthemis cotula L.

Sin.: *Chamaemelum cotula* (L.) All., *Maruta cotula* (L.) DC.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). PRY(CEN, ITA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Aphyllocladus Wedd.

Aphyllocladus denticulatus (J. Remy)

Cabrera var. **calvus** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Jobaphes virgatus* Phil. var. *calvus* Phil.

Arbusto. Endémica. 2000-2900 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Aphyllocladus denticulatus (J. Remy)

Cabrera var. **denticulatus**

Sin.: *Cyclolepis denticulata* J. Remy, *Jobaphes virgatus* Phil., *Plazia virgata* (Phil.) O. Hoffm.

Arbusto. Endémica. 700-2700 m.

Países: CHL(ATA).

Aphyllocladus ephedroides Cabrera

Arbusto. Endémica. 1200-1600 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Aphyllocladus sanmartinianus Molino

Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Aphyllocladus spartioides Wedd.

Sin.: *Hyalis spartioides* (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Griseb., *Plazia spartioides* (Wedd.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 2400-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Apopyros G.L. Nesom

Apopyros corymbosus (Hook. & Arn.) G.L. Nesom

Sin.: *Aster setosus* Baker, *Aster tuberosus* Less. ex Baker, *Conyza blanchetii* Sch. Bip. ex Baker, *Conyza setosa* (Baker) Malme, *Diplopappus corymbosus* Hook. & Arn., *Erigeron blanchetii* Sch. Bip. ex Baker

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, COA).

Archidasiphyllum (Cabrera) P.L.

Ferreira, Saavedra & Groppo

Archidasiphyllum diacanthoides

(Less.) P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo

Sin.: *Chuquiraga leucoxydon* Poepp., *Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera, *Flotovia diacanthoides* Less., *Flotovia stiftioides* Speg., *Piptocarpha diacanthoides* Hook. & Arn.

Árbol. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Archidasphyllum excelsum (D. Don)
P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo

Sin.: *Chuquiraga excelsa* D. Don,
Dasyphyllum excelsum (D. Don)
Cabrera, *Flotovia excelsa* (D. Don)
DC., *Piptocarpha excelsa* (D. Don)
Hook. & Arn.

Árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Arctium L.

Arctium minus (Hill) Bernh.

Sin.: *Arctium degeni* H. Lindb., *Arctium*
pubens Bab., *Lappa glabra* Lam.,
Lappa minor Hill

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, SJU,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA,
RME). URY(CAS, FLA, MON, SOR).

Arctotheca Vaill.

Arctotheca calendula (L.) Levyns

Sin.: *Arctotis calendula* L., *Arctotis*
calendula L. var. *superba* (L.) L.,
Arctotis calendula L. var. *tristis* (L.) L.,
Arctotis superba L., *Arctotis tristis* L.,
Cryptostemma calendula (L.) Druce

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(LBO, MAU,
BIO, ARA).

Arctotis L.

Arctotis stoechadifolia P.J. Bergius

Sin.: *Arctotis decumbens* Thunb., *Arctotis*
grandis Thunb.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI).
BRA(RGS). URY(COL).

Argyranthemum Webb ex Sch. Bip.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.
Bip.

Sin.: *Chrysanthemum frutescens* L.,
Pyrethrum frutescens (L.) Willd.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(COQ, RME).

Aristeguietia R.M. King & H. Rob.

Aristeguietia salvia (Colla) R.M. King &
H. Rob.

Sin.: *Eupatorium salvium* Colla

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Arnica L.

Arnica angustifolia Vahl

Sin.: *Arnica alpina* (L.) Olin & Ladau, hom.
illeg., *Arnica alpina* (L.) Olin & Ladau
subsp. *angustifolia* (Vahl) Macloskie,
Arnica alpina (L.) Olin & Ladau subsp.
genuina Maguire, nom. inval., *Arnica*
alpina (L.) Olin & Ladau var.
angustifolia (Vahl) Fernald, *Arnica*
angustifolia Vahl subsp. *alpina* (L.)
L.K. Ferguson, *Arnica attenuata*
Greene, *Arnica intermedia* Turcz.,
Arnica lowii Holm, *Arnica montana* L.
var. *alpina* L., *Arnica montana* L. var.
angustifolia (Vahl) Hook., *Arnica*

plantaginea Pursh, *Arnica somborgeri*
Fernald, *Arnica terrae-novae* Fernald
Hierba. Introducida. 1500-1700 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LLA).

Artemisia L.

Artemisia abrotanum L.

Arbusto o subarbusto. Introducida. 500-
1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SFE, TDF).

Artemisia absinthium L.

Subarbusto. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, DFE,
MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU,
SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,
MAG, JFE).

Artemisia annua L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI,
LPA, NEU, SAL, SFE, SJU, TUC).

Artemisia copa Phil. var. **copa**

Arbusto o arbolito. Endémica. 3000-
4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, VAL).

Artemisia copa Phil. var. **trifida** Acevedo

Arbusto. Endémica. 2400

Países: CHL(ANT).

Artemisia douglasiana Besser

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(COR, LRI, MEN, SJU,
SLU).

Artemisia echegarayi Hieron.

Subarbusto. Endémica. 2000-3100 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Artemisia magellanica Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

Artemisia mendozana DC. var. **mendozana**

Sin.: *Seriphidium mendozanum* (DC.)

Bremer & Humphries

Subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Artemisia mendozana DC. var. **paramilloensis** F.A. Roig & Ambrosetti

Subarbusto. Endémica. 2400-3100 m.

Países: ARG(MEN).

Artemisia verlotiorum Lamotte

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU). URY(CLA, FLA, MON, RNO).

Aspilia Thouars

Aspilia attenuata (Gardner) Baker

Sin.: *Viguiera attenuata* Gardner, *Wedelia attenuata* (Gardner) B.L. Turner

Subarbusto. Nativa. 700-900 m.

Países: BRA(PAR).

Aspilia aurantiaca Griseb. var. **aurantiaca**

Sin.: *Wedelia aurantiaca* (Griseb.) B.L. Turner

Subarbusto. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Aspilia aurantiaca Griseb. var. **vulcanica** Cabrera

Subarbusto. Nativa. 200-2200 m.

Países: ARG(JUU).

Aspilia camporum Chodat

Sin.: *Wedelia camporum* (Chodat) B.L. Turner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON, PAI).

Aspilia clausseniana Baker

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).

Aspilia floribunda (Gardner) Baker

Sin.: *Aspilia gracilis* (Gardner) Baker, *Aspilia pseudoviguiera* H. Rob., *Viguiera floribunda* Gardner, *Viguiera gracilis* Gardner, *Viguiera ramosissima* Gardner

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Aspilia foliacea (Spreng.) Baker

Sin.: *Aspilia burchellii* Sch. Bip. ex Baker, *Aspilia elegans* (Gardner) Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks., *Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker var. *angustifolia* (Gardner) Baker, *Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker var. *hirsuta* (Gardner) Baker, *Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker var. *oblonga* Baker, *Aspilia glabra* (Gardner) Benth. ex Baker, *Aspilia hirsuta* (Gardner) Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks., *Aspilia pusilla* Baker, *Viguiera elegans* Gardner, *Viguiera foliacea* Spreng., *Viguiera glabra* Gardner, *Viguiera hirsuta* Gardner, *Viguiera pusilla* Less. ex Baker, *Wedelia burchellii* (Baker) B.L. Turner, *Wedelia glabra* (Gardner) B.L. Turner, hom. illeg., *Wedelia hirsuta* (Gardner) B.L. Turner

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAU).

Aspilia hassleriana Chodat

Sin.: *Aspilia hassleriana* Chodat var. *scaberrima* Chodat, *Wedelia hassleriana* (Chodat) B.L. Turner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

Aspilia latissima Malme

Sin.: *Aspilia cuyabensis* Malme

Subarbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

Aspilia leucanthema Chodat

Sin.: *Wedelia leucanthema* (Chodat) B.L. Turner

Subarbusto. Endémica. 300-600 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Aspilia linearis S.F. Blake

Sin.: *Aspilia linearifolia* Baker, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 100-300 m.

Países: ARG(COS, MIS).

Aspilia montevidensis (Spreng.) Kuntze

Sin.: *Aspilia arillata* (DC.) Griseb., *Aspilia buphthalmiflora* (DC.) Griseb., *Aspilia calendulacea* (DC.) Griseb., *Aspilia montevidensis* (Spreng.) Kuntze var. *setosa* (Griseb.) Cabrera, *Aspilia setosa* Griseb., *Leighia arillata* DC., *Leighia buphthalmiflora* DC., *Leighia calendulacea* DC., *Verbesina montevidensis* Spreng., *Wedelia montevidensis* (Spreng.) B.L. Turner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).

Aspilia pascalioides Griseb.

Sin.: *Wedelia pascalioides* (Griseb.) B.L. Turner

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, RNO, RIV, SAO, SJO, TYT).

Aspilia phyllostachya Baker

Sin.: *Wedelia phyllostachya* (Baker) B.L. Turner

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: PRY(CON).

Aspilia reflexa Baker

Sin.: *Aspilia setosa* Griseb. var. *reflexa* (Baker) Chodat, *Viguiera reflexa* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud., *Wedelia reflexa* (Baker) B.L. Turner, *Wedelia sessilifolia* Mart. ex Baker, nom. nud. Hierba. Nativa. 0-800 m. Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN).

Aspilia riedelii Baker

Sin.: *Wedelia riedelii* (Baker) B.L. Turner Hierba. Nativa. 200-500 m. Países: PRY(CAU).

Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f. ex Baker

Sin.: *Gymnopsis helianthoides* DC., *Leighia silphioides* Hook. & Arn., *Wedelia silphioides* (Hook. & Arn.) B.L. Turner Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, COA, ÑEE, PHA). URY(MON, RNO, SJO).

Asteropsis Less.

Asteropsis megapotamica (Spreng.) Marchesi

Sin.: *Aster megapotamicus* Spreng., *Asteropsis macrocephala* Less., *Neja*

macrocephala DC., *Podocoma macrocephala* (Less.) Herter, *Podopappus tomentosus* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

Austrobrickellia R.M. King & H. Rob.

Austrobrickellia arnottii (Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium arnottii* Baker, *Eupatorium tenuiflorum* (Griseb.) Hieron., *Mikania tenuiflora* Griseb., *Willoughbya tenuiflora* (Griseb.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ).

Austrobrickellia patens (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. var. **patens**

Sin.: *Eupatorium patagonicum* Klatt, *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *gracilior* Lorentz, *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *patens*, *Eupatorium patens* Phil., hom. illeg., *Eupatorium vattuonei* Hicken, *Eupatorium xerolepis* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.

Arbusto. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, PHA).

Austrobrickellia patens (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. var. **rhodolaena** (Griseb.) Ariza & S.E. Freire

Sin.: *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *rhodolaenum* Griseb.

Arbusto. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

Austrobrickellia patens (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. var. **tomentosa** (Hieron.) Ariza & S.E. Freire

Sin.: *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *tomentosum* Hieron.

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Austrocritonia R.M. King & H. Rob.

Austrocritonia velutina (Gardner) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium velutinum* Gardner Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Austroeupatorium R.M. King & H. Rob.

Austroeupatorium apense (Chodat) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium apense* Chodat Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(AMA, SPE).

Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Austroeupatorium entrerriense* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium entrerriense* Hieron., *Eupatorium inulifolium* Kunth, *Eupatorium inulifolium* Kunth f. *suaveolens* (Kunth) Hieron., *Eupatorium molle* Kunth, nom. illeg., *Eupatorium pallescens* DC., *Eupatorium pallescens* DC. var.

- bonariense* DC., *Eupatorium pallescens* DC. var. *hirsuta* DC., *Eupatorium pallidum* Hook. & Arn., *Eupatorium paranense* Hook. & Arn., *Eupatorium suaveolens* Kunth
Arbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, SOR, TAC).
- Austroeupatorium laetevirens** (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium laetevirens* Hook. & Arn., *Eupatorium steviifolium* DC. var. *laetevirens* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium steviifolium* DC. var. *salicinum* Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URU (CLA, RIV).
- Austroeupatorium neglectum** (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium neglectum* B.L. Rob.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Austroeupatorium picturatum** (Malme) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium picturatum* Malme
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Austroeupatorium rosmarinaceum** (Cabrera & Vittet) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium rosmarinaceum* Cabrera & Vittet, *Eupatorium steviifolium* DC. var. *rosmarinifolium* Baker
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Austroeupatorium silphiifolium** (Mart.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium silphiifolium* Mart.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Austroeupatorium steviifolium** (DC.) Mailhos & Bonif.
Sin.: *Eupatorium steviifolium* DC., *Eupatorium steviifolium* DC. var. *angustius* DC., *Eupatorium tweedeanum* Hook. & Arn. var. *angustius* (DC.) Malme
Subarbusto. Endémica.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, PAI). URU (RIV, TAC).
- Austroflourensia** J.C. Ospina & S.E. Freire
- Austroflourensia fiebrigii** (S.F. Blake) J.C. Ospina & S.E. Freire
Sin.: *Flourensia blakeana* M.O. Dillon, *Flourensia fiebrigii* S.F. Blake, *Flourensia hirta* S.F. Blake
Arbusto. Nativa. 1200-4000 m.
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Austroflourensia hirtissima** (S.F. Blake) J.C. Ospina & S.E. Freire
Sin.: *Flourensia hirtissima* S.F. Blake
Subarbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: ARG(LPA, NEU, RNE).
- Austroflourensia niederleinii** (S.F. Blake) J.C. Ospina & S.E. Freire
Sin.: *Flourensia niederleinii* S.F. Blake
- Arbusto. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(LRI).
- Austroflourensia suffrutescens** (R.E. Fr.) J.C. Ospina & S.E. Freire
Sin.: *Encelia suffrutescens* R.E. Fr., *Flourensia polyclada* S.F. Blake, *Flourensia suffrutescens* (R.E. Fr.) S.F. Blake
Subarbusto. Endémica. 2500-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
- Austroflourensia thurifera** (Molina) J.C. Ospina & S.E. Freire
Sin.: *Diomedea thurifera* (Molina) Bertero ex Colla, *Flourensia besseriana* Meyen & Walp., *Flourensia campestris* Griseb., *Flourensia grindelioides* S. Moore, *Flourensia leptopoda* S.F. Blake, *Flourensia oolepis* S.F. Blake, *Flourensia riparia* Griseb., *Flourensia thurifera* (Molina) DC., *Flourensia thurifera* (Molina) DC. var. *lanceolata* J. Remy, *Helianthus besseriana* Benth. & Hook. f., nom. inval., *Helianthus campestris* (Griseb.) Kuntze, *Helianthus glutinosus* Hook. & Arn., *Helianthus riparius* (Griseb.) Kuntze, *Helianthus thurifera* Molina
Arbusto. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).
- Austroflourensia tortuosa** (Griseb.) J.C. Ospina & S.E. Freire
Sin.: *Flourensia macroligulata* Seeligm., *Flourensia tortuosa* Griseb.
Arbusto. Endémica. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Austroliabum** H. Rob. & Brettell
- Austroliabum candidum** (Griseb.) H. Rob. & Brettell

Sin.: *Liabum auriculatum* Griseb., *Liabum candidum* Griseb., *Liabum candidum* Griseb. var. *subcirrhosum* (S.F. Blake) Cabrera, *Liabum subcirrhosum* Blake, *Microliabum candidum* (Griseb.) H. Rob.

Hierba o subarbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU, TUC).

Austroliabum eremophilum (Cabrera) H. Rob. & Brettell

Sin.: *Liabum eremophilum* Cabrera, *Microliabum eremophilum* (Cabrera) H. Rob.

Hierba o subarbusto. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Austroliabum glanduliferum (Cabrera) D.G. Gut., N. Garcia, Susanna & M.A. Grossi

Sin.: *Liabum candidum* Griseb. var. *glanduliferum* Cabrera, *Microliabum glanduliferum* (Cabrera) H. Rob.

Subarbusto. Endémica. 800-1400 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Ayapana R.M. King & H. Rob.

Ayapana amygdalina (Lam.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium amygdalinum* Lam. var. *amygdalinum*, *Eupatorium amygdalinum* Lam. var. *oxychlaenum* (DC.) Baker, *Eupatorium hasslerianum* Chodat, *Eupatorium oxychlaenum* DC., *Eupatorium oxychlaenum* DC. f. *hasslerianum* (Chodat) Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Ayapanopsis R.M. King & H. Rob.

Ayapanopsis esperanzae (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium esperanzae* Hassl., *Eupatorium esperanzae* Hassl. var. *schininii* (Cabrera) Cabrera, *Eupatorium schininii* Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, COA, PAI).

Ayapanopsis tucumanensis (Lillo & B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium tucumanense* Lillo & B.L. Rob.

Arbusto. Endémica. 1000

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Aylacophora Cabrera

Aylacophora deserticola Cabrera

Sin.: *Nardophyllum deserticola* (Cabrera) G.L. Nesom

Arbusto. Endémica. 500-700 m.

Países: ARG(NEU).

Baccharis L., nom. cons.

Baccharis acaulis (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera

Sin.: *Baccharis acaulis* (Wedd. ex R.E. Fr.) Malag., nom. illeg., *Heterothalamus acaulis* Wedd. ex R.E. Fr., *Pseudobaccharis acaulis* (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera, *Psila caespitosa* Phil.

Hierba. Nativa. 3300-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Baccharis albida Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE).

Baccharis albilanosa A.S. Oliveira & Deble

Sin.: *Lanugothamnus albilanosus* (A.S. Oliveira & Deble) Deble

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Baccharis aliena (Spreng.) Joch.Müll.

Sin.: *Heterothalamus alienus* (Spreng.) Kuntze, *Heterothalamus brunoides* Less., nom. superfl., *Marshallia aliena* Spreng.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(COR, LRI, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

Baccharis alnifolia Meyen & Walp.

Arbusto. Nativa. 3000-3800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Baccharis alpina Kunth

Sin.: *Baccharis alpina* Kunth f. *macrocephala* Hieron., *Baccharis alpina* Kunth var. *nivalis* Wedd., *Baccharis alpina* Kunth var. *nummuloides* Heering, *Baccharis alpina* Kunth var. *serpyllifolia* Wedd., *Baccharis caespitosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *alpina* (Kunth) Cuatrec., *Baccharis caespitosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *nummuloides* (Heering) Cuatrec., *Baccharis humifusa* Kunth

Subarbusto. Nativa. 4000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP).

Baccharis amambayensis Zardini & Soria

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Baccharis angusticeps Dusén ex Malme

Subarbusto. Endémica. 1100-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis anomala DC.

Sin.: *Pingraea anomala* (DC.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(ART, DUR, RNO, RIV, TAC, TYT).

Baccharis aphylla (Vell.) DC.

Sin.: *Baccharis nuda* (Vell.) DC.,
Chrysocoma aphylla Vell.,
Chrysocoma nuda Vell.
Subarbusto. Nativa. 800
Países: BRA(PAR).

Baccharis apicifolia A.A. Schneid. & Boldrini

Arbusto. Endémica. 700-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis aracetubensis Malag. &

Hatschbach ex G.M. Barroso
Subarbusto. Endémica. 700-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis arenaria Baker

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, ROC).

Baccharis argentina Heering

Sin.: *Baccharis flabellata* Hook. & Arn. var.
argentina (Heering) Ariza
Arbusto. Endémica. 0-2100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC).

Baccharis artemisioides Hook. & Arn.

Sin.: *Lanugothamnus artemisioides* (Hook. & Arn.) Deble
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, RNE, SLU, SFE, TUC).

Baccharis articulata (Lam.) Pers.

Sin.: *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. var.
gaudichaudiana (DC.) Baker,
Baccharis gaudichaudiana DC.,
Conyza articulata Lam., *Molina articulata* (Lam.) Less., *Pingraea articulata* (Lam.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TYT).

Baccharis axillaris DC.

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera

Sin.: *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera, *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Malag., comb. superfl., *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cuatrec., comb. superfl., *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Malag., comb. superfl., *Heterothalamus boliviensis* Wedd., *Heterothalamus boliviensis* Wedd. var. *latifolia* R.E. Fr., *Pseudobaccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera, *Pseudobaccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera, *Psila boliviensis* (Wedd.) Cabrera, *Psila boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera
Arbusto. Nativa. 1500-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Baccharis brachylaenoides DC. var. **polycephala** (Malag.) G.M. Barroso

Sin.: *Baccharis brachylaenoides* DC. var. *rufidula* (Sch. Bip.) A.S. Oliveira & Deble, comb. illeg., *Baccharis polycephala* Sch. Bip., nom. nud., *Pseudobaccharis polycephala* I.L. Teodoro
Arbusto. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis breviseta DC.

Sin.: *Baccharidastrium argutum* (Less.) Cabrera, *Conyza arguta* Less.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, RNO, ROC, SJO, TAC).

Baccharis cabreræ Ariza

Arbusto. Endémica. 2600
Países: ARG(SAL).

Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Molina caespitosa* Ruiz & Pav.
Subarbusto. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, LBO).

Baccharis calliprinos Griseb.

Sin.: *Baccharis adscendens* Pers., *Baccharis mirabilis* Heering, *Baccharis petiolata* DC., *Baccharis petiolata* DC. var. *rotundifolia* Phil., *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *calliprinos* (Griseb.) Joch.Müll., *Pingraea scandens* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 1400-3500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Baccharis calvescens DC.

Sin.: *Baccharis oleifolia* Gardner

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis camporum DC.

Sin.: *Baccharis camporum* DC. f. *parvifolia* Heering, *Baccharis camporum* DC. f. *typica* Heering, nom. inval., *Baccharis cephalotes* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, SPE).

Baccharis capitalensis Heering

Arbusto. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Baccharis caprariifolia DC.

Sin.: *Baccharis bairdii* Hook. & Arn., *Baccharis caprariifolia* DC. subsp. *recurvata* (Gardner) Malag., comb. inval., *Baccharis grisea* Baker, *Baccharis recurvata* Gardner
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, SPE). URY(RIV, TYT).

Baccharis chionolaenoides D.B. Falkenb. & Deble

Sin.: *Lanugothamnus chionolaenoides* (D.B. Falkenb. & Deble) Deble
Subarbusto. Endémica. 1800
Países: BRA(SCA).

Baccharis clavata (Joch.Müll.) G. Heiden

Sin.: *Baccharis juncea* (Lehm.) Desf. subsp. *clavata* Joch.Müll.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Baccharis cognata DC.

Sin.: *Baccharis hoehneana* Malag., *Baccharis pauciflosculosa* DC. var. *puncticulata* DC.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

Baccharis concava (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *intermedia* Heering, *Molina concava* Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: CHL(BIO).

Baccharis concinna G.M. Barroso

Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Baccharis conyzoides (Less.) DC.

Sin.: *Molina conyzoides* Less., *Pingraea conyzoides* (Less.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis cordobensis Heering

Sin.: *Baccharis rotundifolia* Spreng. var. *stuckertii* Heering, *Baccharis sessiliflora* Vahl var. *stuckertii* (Heering) Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, SFE).

Baccharis coridifolia DC.

Sin.: *Baccharis coridifolia* DC. var. β , *Eupatorium montevidense* Spreng., *Lanugothamnus montevidensis* (Spreng.) Deble
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE). URY(ART, CAS, COL, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, TAC, TYT).

Baccharis coronata Giuliano

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis crispa Spreng.

Sin.: *Baccharis cylindrica* (Less.) DC., *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. subsp. *crispa* (Spreng.) Joch.Müll., *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. subsp. *lorentzii* Joch.Müll., *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *crispa* (Spreng.) Baker, *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *cylindrica* (Less.) Baker, *Baccharis lorentzii* (Joch.Müll.) Deble, *Baccharis perplexa* Malag. & J.E. Vidal, *Molina crispa* (Spreng.) Less., *Molina cylindrica* Less., *Pingraea crispa* (Spreng.) F.H. Hellwig
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI). URY(LAV, MAL, MON, RIV).

Baccharis cultrata Baker

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(LAV, MAL, MON, RIV, TAC).

Baccharis curitybensis Heering ex Malme

Sin.: *Lanugothamnus curitybensis* (Heering ex Malme) Deble
Arbusto. Nativa. 900-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis cymosa Phil.

Sin.: *Pingraea cymosa* (Phil.) F.H. Hellwig
Arbusto. Endémica. 1000-1300 m.
Países: CHL(LSR, LLA).

Baccharis darwinii Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis angulata* Griseb., *Baccharis angulata* Griseb. var. *andina* Hieron., *Baccharis angulata* Griseb. var. *gracilis* Heering, *Baccharis grossedentata* Heering, *Baccharis ulicina* Hook. & Arn. var. *subintegrifolia* Kuntze, *Neomolina darwinii* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig, nom. illeg.
Subarbusto. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(LLA, AIS). URY(RNO).

Baccharis deblei A.S. Oliveira & Marchiori

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis deltoidea Baker

Sin.: *Baccharis tridentata* Vahl var. *deltoidea* (Baker) Heering
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Baccharis dentata (Vell.) G.M. Barroso

Sin.: *Baccharis fuchsiifolia* Gardner, *Baccharis macrodonta* DC., *Baccharis orgyalis* DC., *Baccharis orgyalis* DC. f. *fuchsiifolia* (Gardner) Heering, *Baccharis orgyalis* DC. var. *fuchsiifolia* (Gardner) Malag., *Chrysocoma dentata* Vell., *Chrysocoma maritima* Vell.
Arbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, GUA).

Baccharis divaricata Hauman

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE).

Baccharis dracunculifolia DC. subsp. *dracunculifolia*

Sin.: *Baccharis bracteata* Hook. & Arn., *Baccharis doniana* Hook. & Arn., *Baccharis dracunculifolia* DC. f. *spectabilis* Heering, *Baccharis dracunculifolia* DC. f. *subviscosa* Kuntze, *Baccharis leptospermoides* DC., *Baccharis microthamna* Sch. Bip. ex Baker, *Baccharis paucidentata* Sch. Bip. ex Baker, hom. illeg., *Baccharis pulverulenta* Klatt, *Baccharis selloi* Baker

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC, TYT).

Baccharis dracunculifolia DC. subsp. *tandilensis* (Speg.) Giuliano

Sin.: *Baccharis tandilensis* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Baccharis dunensis A.A. Schneid. & G. Heiden

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).

Baccharis effusa Griseb.

Arbusto. Nativa. 900-2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Baccharis elaeoides J. Remy

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(BIO, LSR, LLA).

Baccharis elliptica Gardner

Subarbusto. Nativa. 900
Países: BRA(PAR).

Baccharis erigeroides DC.

Sin.: *Baccharis erigeroides* DC. var. *dusenii* Heering, *Baccharis puberula* DC., *Lanugothamnus erigeroides* (DC.) Deble
Subarbusto. Nativa. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis erioclada DC.

Arbusto. Nativa. 200-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Baccharis famatinensis Ariza

Arbusto. Endémica. 2100
Países: ARG(LRI).

Baccharis fimbriata (Joch.Müll.) G. Heiden

Sin.: *Baccharis tola* Phil. subsp. *fimbriata* Joch.Müll.
Arbusto. Nativa. 2700-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Baccharis flabellata Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 200-2500 m.
Países: ARG(COR, LPA, LRI, SDE, SJU, SLU). URY(ART, PAY, SAO).

Baccharis flexuosiramosa A.A. Schneid. & Boldrini

Arbusto. Endémica. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis floccosa Deble & A.S. Oliveira

Arbusto. Endémica. 1200-1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis frenguelli Cabrera

Sin.: *Baccharis hassleriana* Malag.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE). PRY(CEN, COA, PAI).

Baccharis funkiae Bonifacino, G. Heiden, Valtierra & Marchesi

Arbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: URY(TYT).

Baccharis genistelloides (Lam.) Pers.

Sin.: *Baccharis myriocephala* DC.,
Baccharis venosa (Ruiz & Pav.) Pers.,
Conyza genistelloides Lam., *Molina*
venosa Ruiz & Pav.

Subarbusto. Nativa. 3300-4800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(AYP, TAR). PRY(CAA).

Baccharis genistifolia DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,
SFE). URY(CAS, FLO, MAL, MON,
ROC, SJO).

Baccharis gibertii Baker

Sin.: *Lanugothamnus gibertii* (Baker)
Deble

Arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(CAS,
CLA, MAL, MON, ROC, SJO).

Baccharis gilliesii A. Gray

Sin.: *Baccharis involucrata* (Phil.) O.
Hoffm., *Baccharis jema* Stuck. ex
Heering, *Baccharis nana* D. Don ex
Baker, *Icma involucrata* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN,
RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,
TUC).

Baccharis glaziovii Baker

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis glutinosa Pers.

Sin.: *Baccharis angustifolia* (Cass.) Desf.,
nom. illeg., *Baccharis farinosa* Pers.
ex Spreng, nom. superfl., *Baccharis*
glutinosa Pers. var. *angustissima*
(DC.) Giuliano, *Baccharis litoralis* Phil.,

Baccharis longipes Kunze ex DC. var.
angustissima Phil., *Baccharis*
medullosa DC., *Baccharis medullosa*
DC. var. *latifolia* Hieron. ex Heering,
Baccharis pingraea DC. f. *latifolia* DC.,
Baccharis pingraea DC. var.
angustissima DC., *Baccharis pingraea*
DC. var. *latifolia* DC., nom. superfl.,
Baccharis pingraea DC. var. *pingraea*,
Baccharis serrulata (Lam.) Pers. var.
pingraea (DC.) Baker, *Baccharis*
subpingraea Heering, *Baccharis*
subpingraea Heering f. *crassifolia*
Heering, *Baccharis subpingraea*
Heering f. *pseudulicina* Heering,
Baccharis viscosa (Ruiz & Pav.)
Kuntze, comb. illeg., *Conyza*
montevicensis Spreng., *Molina*
viscosa Ruiz & Pav., *Pingraea*
angustifolia Cass., *Pingraea viscosa*
(Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ,
LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL,
SJU, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA,
RME). PRY(APY, AMA, CAU, CAN,
CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI).
URY(CAS, CLA, COL, MAL, MON,
PAY, RNO, SJO, SOR).

Baccharis gnaphalioides Spreng.

Sin.: *Baccharis psammophila* Malme,
Baccharis radicans DC.,
Lanugothamnus gnaphalioides
(Spreng.) Deble

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA).
URY(CAS, MAL, MON, ROC, TAC).

Baccharis gracilis DC.

Sin.: *Neomolina gracilis* (DC.) F.H. Hellwig
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAA,
GUA).

Baccharis grandimucronata Malag.

Sin.: *Baccharis nebulae* Malag. &
Hatschbach ex A.S. Oliveira
Arbusto. Nativa. 1000-1900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis grisebachii Hieron.

Sin.: *Baccharis abietina* Kuntze, *Baccharis*
rosmarinifolia Hook. & Arn. var.
andicola Hauman

Arbusto. Nativa. 2000-3800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
SAL, SJU, TUC).

Baccharis heeringiana Malag.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CLA, ROC).

Baccharis helichrysoides DC.

Sin.: *Baccharis lanuginosa* Gardner,
Baccharis leucolepis Sch. Bip., nom.
nud., *Baccharis polyantha* Spreng.,
hom. illeg., *Lanugothamnus*
helichrysoides (DC.) Deble

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,
GUA).

Baccharis hirta DC.

Sin.: *Baccharis prenanthoides* Baker
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(MAL, MON, RIV).

Baccharis humilis Sch. Bip. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Baccharis hyemalis Deble

Sin.: A.S. Oliveira & Marchiori,
Heterothalamus rupestris Deble

- Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Baccharis hypericifolia** Baker
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Baccharis illinitoides** Malag.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(AMA, CAU).
- Baccharis incisa** Hook. & Arn.
Sin.: *Baccharis axillaris* DC. var. *acutiloba* DC., *Baccharis incisa* Hook. & Arn. var. *dentata* (DC.) Baker
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).
- Baccharis inexpectata** Deble & A.S. Oliveira
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Baccharis intermedia** DC.
Sin.: *Baccharis gayana* Phil., *Baccharis volckmannii* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Baccharis intermixta** Gardner
Arbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Baccharis isabelae** Soria & Zardini
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, COA, PAI).
- Baccharis itapirocensis** A.S. Oliveira & Deble
Subarbusto. Endémica. 1400-1800 m.
Países: BRA(PAR).
- Baccharis jocheniana** G. Heiden & Macias
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
- Países: BRA(RGS). URY(LAV).
- Baccharis juncea** (Lehm.) Desf. subsp. *juncea*
Sin.: *Arrhenachne juncea* Cass., *Baccharis subulata* D. Don ex Hook. & Arn., *Stephananthus junceus* Lehm.
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, LSR, LLA, AIS, RME). URY(MON).
- Baccharis junciformis** DC.
Sin.: *Baccharis brachystachys* (Baker) Malag. & J.E. Vidal, *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *brachystachys* Baker, *Baccharis trimeroides* Malme, *Baccharis usterii* Heering, *Molina juncea* Less.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, RIV).
- Baccharis kurtziana** Ariza
Arbusto. Endémica. 1700-2100 m.
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).
- Baccharis lateralis** Baker
Sin.: *Baccharis montana* Sch. Bip., nom. nud., *Baccharis schultzii* Baker
Arbusto. Nativa. 900-2200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Baccharis latifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Sin.: *Baccharis floribunda* Kunth, *Baccharis polyantha* Kunth, *Baccharis polyantha* Kunth f. *genuina* Hieron., nom. inval., *Baccharis polyantha* Kunth var. *macrophylla* Hieron., *Baccharis riparia* Kunth, *Molina latifolia* Ruiz & Pav., *Pingraea latifolia* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Pluchea glabra* Griseb.
- Arbusto o arbolito. Nativa. 800-2400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Baccharis leucocephala** Dusén
Sin.: *Lanugothamnus leucocephalus* (Dusén) Deble
Arbusto. Endémica. 800-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Baccharis leucopappa** DC.
Sin.: *Baccharis helichrysoides* DC. var. *leucopappa* (DC.) Baker, *Lanugothamnus leucopappus* (DC.) Deble
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Baccharis lilloi** Heering
Arbusto. Nativa. 2000-3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Baccharis linearifolia** (Lam.) Pers. subsp. *linearifolia*
Sin.: *Baccharis baldwinii* Hook. & Arn., *Baccharis brevifolia* DC., *Baccharis curvifolia* Gardner, *Baccharis denticulata* D. Don ex DC., *Baccharis fluminensis* Glaz., *Baccharis guianensis* M.R. Schomb., nom. nud., *Baccharis leptcephala* DC., *Baccharis leptophylla* DC., *Baccharis maritima* Baker, *Baccharis myrsinoides* Hook. & Arn., *Baccharis paucidentata* DC., *Baccharis pseudotenuifolia* Malag., *Baccharis pseudotenuifolia* Malag. var. *leptophylla* (DC.) Giuliano, *Baccharis pseudotridentata* Heering, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *leptophylla* (DC.) Baker, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *leptophylla* (DC.) Baker, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *rufescens*, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *subrufescens* (Heering) Ariza, *Baccharis rufescens* Spreng.

var. *tenuifolia* (DC.) Baker, nom. inval., *Baccharis rufescens* Spreng. var. *varians* (Gardner) Baker, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *ventanicola* Cabrera, *Baccharis santiagensis* Heering ex Reiche, *Baccharis subrufescens* Heering, *Baccharis subspathulata* Gardner, *Baccharis tenuifolia* DC., hom. illeg., *Baccharis tenuifolia* DC. var. *leptophylla* (DC.) Malme, nom. inval., *Baccharis varians* Gardner, *Baccharis ventanicola* (Cabrera) Soria & Zardini
 Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

Baccharis linearifolia (Lam.) Pers. subsp. **polycephala** (Wedd.) Joch.Müll.

Sin.: *Baccharis polycephala* Wedd.

Nativa.

Países: ARG(MIS, SAL).

Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**

Sin.: *Baccharis holmbergii* Hicken, *Baccharis lingulata* Kunze ex Less., *Baccharis linifolia* Meyen, *Baccharis montteana* Phil., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn., *Molina linearis* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Baccharis longiattenuata A.S. Oliveira

Arbolito o arbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis lycioides J. Remy

Sin.: *Baccharis negerii* Heering ex Reiche,

Baccharis valdiviana Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Baccharis lymanii G.M. Barroso ex G. Heiden

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis macraei Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var.

lucida Heering

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Baccharis magellanica (Lam.) Pers.

Sin.: *Baccharis tricuneata* (L. f.) Pers. var.

magellanica (Lam.) Cuatrec., *Conyza magellanica* Lam.

Arbusto. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Baccharis malmei Joch.Müll.

Arbusto. Nativa. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis megapotamica Spreng. var. **megapotamica**

Sin.: *Baccharis pyramidalis* Gardner

Arbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, GUA). URY(RIV, ROC, TAC, TYT).

Baccharis megapotamica Spreng. var.

weirii (Baker) G.M. Barroso

Sin.: *Baccharis weirii* Baker

Arbusto. Nativa. 700-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis melanopotamica Speg.

Sin.: *Baccharis dusenii* O. Hoffm.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, RNE, SLU).

Baccharis mesoneura DC.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis microcephala (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis microptera* Baker, *Molina microcephala* Less.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Baccharis microdonta DC.

Sin.: *Baccharis meridionalis* Heering & Dusén, *Baccharis refracta* Burch. ex Baker, *Baccharis sebastianopolitana* Baker

Arbusto. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(CAT, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SAO).

Baccharis milleflora (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *milleflora* (Less.) Baker, *Molina milleflora* Less.

Subarbusto. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis minor (F.H. Hellwig) G. Heiden

Sin.: *Baccharis zoellneri* F.H. Hellwig subsp. *minor* F.H. Hellwig

Arbusto. Endémica. 800-1400 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

- Baccharis minutiflora** Mart. ex Baker
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Baccharis montana** DC.
Sin.: *Baccharis elaeagnoides* Steud. ex Baker, *Baccharis semiserrata* DC. var. *elaeagnoides* (Steud. ex Baker) G.M. Barroso, nom. inval.
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, ITA, PAI).
- Baccharis multiflorescens** Heering
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(SAL).
- Baccharis multifolia** A.S. Oliveira, Deble & Marchiori
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Baccharis mylodontis** F.H. Hellwig
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(MAG).
- Baccharis myricifolia** DC.
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Baccharis napaea** G. Heiden
Subarbusto. Endémica. 700-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Baccharis neaei** DC.
Sin.: *Baccharis bezanilleana* J. Remy, *Baccharis bezanilleana* J. Remy var. *solisii* (Phil.) Reiche, *Baccharis rhethinodes* Meyen & Walp., *Baccharis solieri* J. Remy, *Baccharis solieri* J. Remy var. *williamsii* (F. Phil.) Heering, *Baccharis solisii* Phil., *Baccharis talcareguensis* Heering, *Baccharis williamsii* F. Phil.
Arbusto. Endémica. 0-3200 m.
- Baccharis nebularis** G. Heiden
Arbusto. Endémica. 1400-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Baccharis neurupensis** Deble & A.S. Oliveira
Sin.: *Baccharis rupestris* Heering, nom. inval.
Arbusto. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Baccharis neutruncata** G. Heiden
Sin.: *Baccharis rhomboidalis* J. Remy subsp. *truncata* F.H. Hellwig, *Baccharis rhomboidalis* J. Remy var. *truncata* Heering, *Baccharis truncata* Phil., nom. illeg.
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(NEU, RNE).
- Baccharis niederleinii** Heering var. *niederleinii*
Arbusto. Endémica. 1200-1300 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
- Baccharis nitida** (Ruiz & Pav.) Pers.
Sin.: *Baccharis nitida* (Ruiz & Pav.) Pers. f. *angustifolia* Cuatrec., *Baccharis oronocensis* DC., *Baccharis oronocensis* DC. var. *perua* Cuatrec., *Baccharis popayanensis* Hieron., *Baccharis prinoides* Kunth, *Molina nitida* Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativa. 900-1500 m.
Países: ARG(SAL).
- Baccharis nivalis** (Wedd.) Sch. Bip. ex Phil.
Sin.: *Heterothalamus nivalis* Wedd., *Lucilia dioica* Phil., *Palenia delfinii* Phil.
Hierba. Endémica. 500-3500 m.
- Baccharis notoserigila** Griseb.
Sin.: *Baccharis curtifolia* S. Moore, *Baccharis genistifolia* DC. var. β
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU, CEN, COA, ÑEE, PHA). URY(CAS, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TAC).
- Baccharis nummularia** Heering ex Malme
Sin.: *Baccharis barrosoana* Mattos
Arbolito. Endémica. 900-2200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Baccharis oblongifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Sin.: *Baccharis brachylaenoides* DC. var. *brachylaenoides*, *Baccharis meridensis* Steyerf., *Baccharis oblanceolata* Rusby, *Baccharis venulosa* DC., *Molina oblongifolia* Ruiz & Pav., *Psila brachylaenoides* (DC.) Aristeg.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Baccharis obovata** Hook. & Arn.
Sin.: *Baccharis foliosa* Hook. & Arn., *Baccharis obovata* Hook. & Arn. subsp. *umbelliformis* (DC.) F.H. Hellwig, *Baccharis umbelliformis* DC., *Baccharis umbelliformis* DC. f. *frigida* Heering, nom. superfl., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *typica* Heering, nom. inval., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *vulgaris* Heering, *Baccharis umbelliformis* DC. var. β
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR,
LLA, AIS, RME).

Baccharis ochracea Spreng.

Sin.: *Baccharis velutina* DC.,
Lanugothamnus ochraceus (Spreng.)
Deble
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-
1200 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY(CLA, LAV, MAL, MON,
RIV, ROC, TAC, TYT).

Baccharis opuntioides Mart. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 1200-2500 m.
Países: BRA(SCA).

Baccharis oreophila Malme

Arbusto. Nativa. 1300
Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis organensis Baker

Arbolito. Nativa. 800-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis oxyodonta DC.

Sin.: *Baccharis triplinervia* DC., *Pingraea*
oxyodonta (DC.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA,
CEN, GUA, PAI). URY(CAS, COL,
FLA, MAL, MON).

Baccharis palustris Heering

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis pampeana A.S. Oliveira,
Deble & Marchiori
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Baccharis paniculata DC.

Sin.: *Baccharis floribunda* Phil., hom.
illeg., *Baccharis leptcephala* Phil.,
hom. illeg., *Baccharis philippii* Heering,
Nardophyllum paniculatum Phil.,
Neomolina paniculata (DC.) F.H.
Hellwig, nom. illeg.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, RME).

Baccharis paranensis Heering & Dusén

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis patagonica Hook. & Arn.

subsp. **palenae** (Phil.) F.H. Hellwig
Sin.: *Baccharis palenae* Phil., *Baccharis*
patagonica Hook. & Arn. var. *palenae*
(Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Baccharis patagonica Hook. & Arn.

subsp. **patagonica**
Sin.: *Baccharis cuneifolia* (Lam.) DC.,
hom. illeg., *Chrysocoma cuneifolia*
Jacq., *Conyza cuneifolia* Lam.
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA,
LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Baccharis patens Baker

Sin.: *Baccharis bakeri* Heering, *Baccharis*
squarrosa Baker, *Lanugothamnus*
patens (Baker) Deble
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, LAV,
MAL, MON, ROC, SJO).

Baccharis paucicostata Joch.Müll. &

Giuliano
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1900-
3200 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Baccharis pauciflosculosa DC.

Sin.: *Baccharis subincisa* Heering &
Dusén
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis pedersenii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). PRY(COA, GUA, ITA).

Baccharis penningtonii Heering

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI,
SFE). BRA(RGS). URY(CAS, COL,
MON, SJO).

Baccharis pentaptera (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis stenocephala* Baker,
Molina pentaptera Less.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Baccharis pentodonta Malme

Sin.: *Baccharis gracillima* Heering ex
Dusén, *Baccharis pluridentata* Heering
Arbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, GUA).

Baccharis pentziifolia Sch. Bip. ex Baker

Sin.: *Baccharis praemorsa* Heering, nom.
nud., *Baccharis sphenophylla* Dusén
ex Malme, *Baccharis subumbelliformis*
Heering ex Malme
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis perulata Kuntze

Sin.: *Baccharis densiflora* Wedd. subsp.
perulata (Kuntze) Joch.Müll.
Arbusto. Nativa. 1200-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC).

- Baccharis petraea** Heering
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).
PRY(CEN, COA, PAI). URY(FLO, FLA).
- Baccharis petrophila** R.E. Fr.
Subarbusto. Endémica. 3400-3700 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Baccharis phyllicifolia** DC.
Sin.: *Baccharis anabelae* (Deble) G. Heiden, *Lanugothamnus anabelae* Deble, *Lanugothamnus phyllicifolius* (DC.) Deble
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Baccharis phyteuma** Heering
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE).
- Baccharis phyteumoides** (Less.) DC.
Sin.: *Molina phyteumoides* Less.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(ITA, ÑEE). URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).
- Baccharis pilcensis** F.H. Hellwig
Arbusto. Endémica. 1600-2200 m.
Países: CHL(MAU, BIO).
- Baccharis pluricapitulata** (Deble) G. Heiden
Sin.: *Lanugothamnus pluricapitulatus* Deble
Arbusto. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(RGS).
- Baccharis poeppigiana** DC. subsp. **austropedicellata** F.H. Hellwig
Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.
- Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).
- Baccharis poeppigiana** DC. subsp. **ocellata** (Phil.) F.H. Hellwig
Sin.: *Baccharis ocellata* Phil., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *ocellata* (Phil.) Heering ex Reiche
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO).
- Baccharis poeppigiana** DC. subsp. **poeppigiana**
Sin.: *Baccharis obovata* Hook. & Arn. var. *poeppigiana* (DC.) Cabrera, *Baccharis pedicellata* DC., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *poeppigiana* (DC.) Heering ex Reiche
Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Baccharis polifolia** Griseb.
Arbusto. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
- Baccharis polygama** Ariza
Arbusto. Endémica. 2200-3400 m.
Países: ARG(TUC).
- Baccharis potrerillana** (Ariza) G. Heiden
Sin.: *Baccharis niederleinii* Heering var. *potrerillana* Ariza
Arbusto. Endémica. 2200-2500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
- Baccharis pseudomyriocephala** Malag.
Sin.: *Baccharis myriocephala* Baker, hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR).
- Baccharis pseudovillosa** Malag. & J.E. Vidal
Sin.: *Baccharis villosa* Heering, hom. illeg.
- Subarbusto. Endémica. 500-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Baccharis psiadioides** (Less.) Joch.Müll.
Sin.: *Baccharis czermakii* Hochr., *Heterothalamus psiadioides* Less.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA, RIV, TAC, TYT).
- Baccharis pulchella** Sch. Bip. ex Griseb.
Sin.: *Baccharis arguta* Gillies ex Hook. & Arn., nom. illeg., *Baccharis plucheiformis* Kuntze, *Baccharis pulchella* Sch. Bip. ex Griseb. var. *grisea* Heering, *Baccharis subsculpta* Hochr., *Neomolina pulchella* (Sch. Bip. ex Griseb.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 100-3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
- Baccharis punctulata** DC.
Sin.: *Baccharis amygdalina* Griseb., *Baccharis melastomifolia* Hook. & Arn., *Baccharis oxyodonta* DC. var. *punctulata* (DC.) Baker, *Pingraea punctulata* (DC.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TAC, TYT).
- Baccharis pycnantha** Phil.
Sin.: *Pingraea pycnantha* (Phil.) F.H. Hellwig
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA).
- Baccharis pycnocephala** (F.H. Hellwig) G. Heiden

Sin.: *Baccharis callistemoides* Walp., *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *pycnocephala* F.H. Hellwig, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *callistemoides* (Walp.) Heering ex Reiche, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subandina* (Phil.) Heering, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subsinuata* DC., *Baccharis subandina* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Baccharis quitensis Kunth

Sin.: *Baccharis flexuosa* Baker, *Baccharis mattogrossensis* Heering ex Malme, *Baccharis pendula* Heering, *Pingraea flexuosa* (Baker) F.H. Hellwig

Arbusto. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(SCA).

Baccharis racemosa DC.

Sin.: *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn., *Baccharis fastigiata* Phil. ex Reiche, hom. illeg., *Baccharis ovata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Baccharis racemosa* DC. var. *angolensis* Kuntze, *Baccharis racemosa* DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Heering ex Reiche, comb. superfl., *Baccharis racemosa* DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Baccharis racemosa* DC. var. *typica* Heering, nom. inval., *Baccharis rigida* Hook. & Arn., *Baccharis sessilifolia* (Less.) DC., *Molina racemosa* Ruiz & Pav., hom. illeg., *Molina sessilifolia* Less., *Neomolina racemosa* (Ruiz & Pav.) Hellwig

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Baccharis ramboi G. Heiden & Macias
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis rectialata Valtierra,
Bonifacino, G. Heiden & Marchesi
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: URY(CLA, CLA, TYT).

Baccharis retamoides Phil.

Sin.: *Pseudobaccharis retamoides* (Phil.) Cabrera, *Psila retamoides* (Phil.) Cabrera
Subarbusto. Endémica. 900-3100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Baccharis reticularia DC.

Sin.: *Baccharis arctostaphyloides* Baker, *Baccharis bahiensis* Baker, *Baccharis clausenii* Baker, *Baccharis micropoda* Baker, *Baccharis vauthieri* DC.
Arbolito. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis reticularioides Deble & A.S.
Oliveira
Arbusto. Nativa. 700-1400 m.
Países: BRA(PAR).

Baccharis retusa DC.

Sin.: *Baccharis halimimorpha* DC., *Baccharis ramosissima* Gardner, *Baccharis salzmännii* DC.
Arbolito. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA).
Notas: Heiden et al. (2010b: S49) citan a la especie como presente en Uruguay sin indicar localidad o material de referencia.

Baccharis rhexioides Kunth

Sin.: *Baccharis trichoclada* DC., *Baccharis trinervis* Pers. var. *rhexioides* (Kunth) Baker, *Baccharis venusta* Kunth,

Pingraea rhexioides (Kunth) F.H. Hellwig, *Pseudobaccharis rhexioides* (Kunth) V.M. Badillo
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Baccharis rhomboidalis J. Remy subsp. **rhomboidalis**

Sin.: *Baccharis involucreta* Phil., *Baccharis nemorosa* Phil., *Baccharis rhomboidalis* J. Remy var. *nemorosa* (Phil.) Heering ex Reiche
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Baccharis riograndensis Malag. & J.E. Vidal
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Baccharis rodriguezii Ariza
Arbusto. Endémica. 3100
Países: ARG(SAL, TUC).

Baccharis sagittalis (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis chubutensis* Speg., *Molina sagittalis* Less., *Pingraea sagittalis* (Less.) F.H. Hellwig
Subarbusto. Nativa. 0-2400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME). URY(FLA, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).
Notas: Citada para Paraguay por Heiden et al. (2009: 976) sin indicar localidad ni material de referencia.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Baccharis alamanii* DC., *Baccharis araucana* Phil., *Baccharis chilquilla* DC., nom. superfl., *Baccharis coerulescens* DC., *Baccharis confertifolia* Colla var. *confertifolia*,

- Baccharis cuervii* Phil., *Baccharis feviliei* DC., *Baccharis glutinosa* Pers. var. *incisa* Heering, *Baccharis huydobriana* J. Rémy, *Baccharis iresinoides* Kunth, *Baccharis kraussei* Heering ex Reiche, *Baccharis lanceolata* Kunth, *Baccharis linifolia* DC., hom. illeg., *Baccharis linifolia* Phil., hom. illeg., *Baccharis longifolia* DC., *Baccharis longipes* Kunze ex DC., *Baccharis marginalis* DC., *Baccharis marginalis* DC. var. *araucana* (Phil.) Heering, *Baccharis marginalis* DC. var. *linifolia* (Phil.) Heering, *Baccharis marginalis* DC. var. *longipes* (Kunze ex DC.) Heering, *Baccharis pallida* Heering ex Reiche, *Baccharis parviflora* (Ruiz & Pav.) Pers., *Baccharis purpurascens* Heering, *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *longifolia* (DC.) Cuatrec., *Baccharis sphaerocephala* Hook. & Arn. var. *krausei* (Heering) Malag., comb. illeg., *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *nigricans* Kuntze, *Molina parviflora* Ruiz & Pav., *Molina salicifolia* Ruiz & Pav., *Molina striata* Ruiz & Pav., *Pingraea marginalis* (DC.) F.H. Hellwig, *Pingraea salicifolia* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). PRY(APY, BOQ, CEN, PHA). URY(COL).
- Baccharis samensis** Joch.Müll.
Arbusto. Nativa. 3400-3800 m.
Países: ARG(SAL).
- Baccharis santelicens** Phil.
Sin.: *Baccharis santelicens* Phil. subsp. *chrysophylla* F.H. Hellwig, *Baccharis tola* Phil. subsp. *santelicens* (Phil.) Joch.Müll., *Baccharis tola* Phil. var. *chrysophylla* (F.H. Hellwig) Joch.Müll.
Arbusto. Endémica. 1900-4800 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).
- Baccharis scabrifolia** G. Heiden
Sin.: *Baccharis multipaniculata* A.S. Oliveira & Deble, *Lanugothamnus scabrifolius* (G. Heiden) Deble
Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Baccharis scopulorum** A.A. Schneid. & G. Heiden
Subarbusto. Endémica. 1300-1500 m.
Países: BRA(SCA).
- Baccharis sculpta** Griseb.
Sin.: *Baccharis pentlandii* DC. subsp. *sculpta* (Griseb.) Joch.Müll., *Pluchea montana* Griseb.
Arbusto. Nativa. 1800-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Baccharis semiserrata** DC.
Arbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, ITA, PAI).
- Baccharis sessiliflora** Vahl
Sin.: *Baccharis camporum* DC. var. *glaucescens* Chodat & Hassl., *Baccharis glaucescens* (Chodat & Hassl.) Soria & Zardini, *Baccharis pentziifolia* Sch. Bip. ex Baker var. *minor* G.M. Barroso, *Baccharis rotundifolia* Spreng.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
- PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, CON, PHA). URY(MAL, MON, PAY, RIV).
- Baccharis singularis** (Vell.) G.M. Barroso
Sin.: *Baccharis daphnoides* Hook. & Arn., *Baccharis senicula* Mart., *Chrysocoma purpurea* Vell., *Chrysocoma singularis* Vell.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Baccharis spartioides** (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy
Sin.: *Baccharis sarophora* Phil., *Heterothalamus spartioides* Hook. & Arn. ex DC., *Pseudobaccharis spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera, *Psila spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA, COQ).
- Baccharis sphaerocephala** Hook. & Arn.
Sin.: *Baccharis radin* Phil., *Pingraea sphaerocephala* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).
- Baccharis sphagnophila** A.A. Schneid. & G. Heiden
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Baccharis spicata** (Lam.) Baill.
Sin.: *Baccharis attenuata* Don ex Hook. & Arn., *Baccharis platensis* Spreng., *Eupatorium spicatum* Lam.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Baccharis stenophylla Ariza

Sin.: *Baccharis subpingraea* Heering f. *nana* Heering
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, SLU, SFE). URY(COL, FLO, FLA, MON, RNO).

Baccharis subdentata DC.

Sin.: *Baccharis subcapitata* Gardner
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA).

Baccharis suberectifolia A.S. Oliveira & Deble

Sin.: *Lanugothamnus suberectifolius* (A.S. Oliveira & Deble) Deble
Subarbusto. Endémica. 900-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Baccharis subtropicalis G. Heiden

Sin.: *Baccharis sagittalis* (Less.) DC. var. *montevidensis* Baker
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, ROC).

Baccharis taltalensis I.M. Johnst.

Sin.: *Neomolina taltalensis* (I.M. Johnst.) F.H. Hellwig, nom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 300-900 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Baccharis tarchonanthes DC.

Sin.: *Baccharis ibitiensis* Toledo, *Lanugothamnus tarchonanthes* (DC.) Deble
Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis tenella Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis tenella* Hook. & Arn. var. β , *Heterothalamus tenellus* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Pseudobaccharis tenella* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Psila tenella* (Hook. & Arn.) Cabrera
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU).

Baccharis tenuiptera Deble

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Baccharis thymifolia Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(MEN).

Baccharis tola Phil. var. *incarum* (Wedd.) Joch.Müll.

Sin.: *Baccharis incarum* (Wedd.) Perkins, *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. var. *subviscosa* Kuntze, *Baccharis microphylla* Kunth var. *incarum* Wedd.
Arbusto. Endémica. 1900-4800 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Baccharis tola Phil. subsp. *tola*

Sin.: *Baccharis incarum* (Wedd.) Perkins var. *lejia* (Phil.) Cabrera, *Baccharis lejia* Phil., *Baccharis tafiensis* Heering, *Baccharis tola* Phil. var. *lejia* (Phil.) Reiche, *Baccharis tola* Phil. var. *viscosissima* (Kuntze) Joch.Müll.
Arbusto. Nativa. 2200-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA).

Baccharis triangularis Hauman

Sin.: *Baccharis trimera* (Less.) DC. var. *viscosissima* Speg.
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, RNE, SLU).

Baccharis tridentata Vahl

Sin.: *Baccharis affinis* DC., *Baccharis dentosa* Mart. ex Baker, nom. nud., *Baccharis illinita* DC., *Baccharis saltensis* Baker, *Baccharis subopposita* DC., *Baccharis subopposita* DC. var. *affinis* (DC.) Baker, *Baccharis tridentata* Vahl var. *subopposita* (DC.) Cabrera, *Baccharis tweediei* Hook. & Arn.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, MIE). URY(CAS, LAV, MAL, MON, RIV, SAO, TAC).

Baccharis trilobata A.S. Oliveira & Marchiori

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis trimera (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *trimera* (Less.) Baker, *Molina trimera* Less.
Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Baccharis trinervis Pers. var. *debilis* (Rusby) Joch.Müll.

Sin.: *Baccharis debilis* Rusby
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). PRY(APY, CON).

Baccharis trinervis Pers. var. **trinervis**

Sin.: *Baccharis cinerea* DC., *Baccharis laxa* Gardner, *Baccharis rhexioides* Kunth var. *parvifolia* Hieron., *Conyza trinervia* Mill., *Conyza trinervis* Lam., hom. illeg., *Heterothalamus trinervis* (Pers.) Hook. & Arn., *Pseudobaccharis trinervis* (Pers.) Malag., comb. superfl., *Pseudobaccharis trinervis* (Pers.) V.M. Badillo, *Psila trinervis* (Pers.) Cabrera
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Baccharis trineura Soria & Zardini

Sin.: *Baccharis triplinervia* (Spreng.) Baker, hom. illeg., *Polypappus triplinervis* (Spreng.) Less., *Vernonia triplinervia* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Baccharis tucumanensis Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis myrtilloides* Griseb., *Baccharis myrtilloides* Griseb. f. *angustifolia* Heering, *Baccharis tucumanensis* Hook. & Arn. var. *angustifolia* (Heering) Cabrera, *Baccharis tucumanensis* Hook. & Arn. var. *myrtilloides* (Griseb.) Cabrera, *Baccharis tucumanensis* Hook. & Arn. var. β

Arbusto. Nativa. 500-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Baccharis uleana Malag.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis ulicina Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis pinnatifida* Klatt, *Baccharis strobiliana* Ces., *Baccharis ulicina*

Hook. & Arn. var. *humilis* Hook. & Arn., nom. nud., *Baccharis ulicina* Hook. & Arn. var. *multifida* (Griseb.) Kuntze, *Baccharis ulicina* Hook. & Arn. var. β , *Neomolina ulicina* (Hook. & Arn.) Hellwig, *Vittadinia multifida* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SLU, TUC).

Baccharis umbellata G. Heiden & O.S.

Ribas

Subarbusto. Endémica. 1300-1800 m.

Países: BRA(PAR).

Baccharis uncinella DC.

Sin.: *Baccharis discolor* Baker

Arbusto. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis urvilleana Brongn.

Sin.: *Baccharis muelleri* Baker

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis vernalis F.H. Hellwig

Sin.: *Baccharis concava* (Ruiz & Pav.)

Pers. var. *floribunda* Heering

Arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO).

Baccharis vernicosa Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Baccharis vincifolia Baker

Arbolito. Endémica. 0-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Baccharis viscosissima (Kuntze) G. Heiden

Sin.: *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. var. *viscosissima* Kuntze, *Baccharis*

tola Phil. subsp. *altiplanicola* F.H. Hellwig

Arbusto. Nativa. 3100-4500 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Baccharis vismioides DC.

Arbusto. Nativa. 700

Países: BRA(PAR).

Baccharis vulneraria Baker

Sin.: *Baccharidastrum triplinervium* (Less.)

Cabrera, *Baccharis pseudoserrulata* Malag., *Baccharis serrulata* DC., hom. illeg., *Conyza triplinervia* Less.

Subarbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Baccharis wagenitzii (F.H. Hellwig) Joch.Müll.

Sin.: *Heterothalamulopsis wagenitzii* (F.H. Hellwig) Deble, A.S. Oliveira & Marchiori, *Heterothalamus wagenitzii* F.H. Hellwig

Subarbusto. Endémica. 1000-1900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis zoellneri F.H. Hellwig subsp. **zoellneri**

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Bahia Lag.

Bahia ambrosioides Lag.

Sin.: *Achyropappus maritimus* Poepp. ex DC., nom. nud., *Eriophyllum ambrosioides* (Lag.) Kuntze, *Stylesia ambrosioides* (Lag.) Nutt., *Stylesia puberula* Nutt.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE).

Baltimora L.

Baltimora geminata (Brandegee) Stuessy

Sin.: *Baltimora ovata* Rusby,
Melampodium bonairense Bold.,
Melampodium geminatum Brandegee
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(APY).

Barnadesia Mutis ex L.

Barnadesia odorata Griseb.
Arbusto. Nativa. 400-1800 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Barrosoa R.M. King & H. Rob.

Barrosoa betoniciformis (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Conoclinium betoniciforme* DC.,
Eupatorium betoniciforme (DC.) Baker
var. *ascendens* Baker, *Eupatorium betoniciforme* (DC.) Baker var. *betoniciforme*,
Eupatorium betoniciforme (DC.) Baker var. *hastatum* Baker, nom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, FOR, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MAL, ROC, TYT).

Barrosoa cabreræ (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium cabreræ* B.L. Rob.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE).

Barrosoa candolleana (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium candolleianum* Hook. & Arn., *Eupatorium candolleianum* Hook. & Arn. var. *lancifolium* Baker, *Eupatorium candolleianum* Hook. & Arn. var. *paranaensis* Baker, *Eupatorium palustre* (DC.) Baker var. *guaraniticum* Chodat, hom. illeg., *Eupatorium palustre* (DC.) Baker var. *verbenaceum* Chodat

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE).

Notas: Citada para Uruguay (Cabrera & Klein, 11989) sin indicar localidad o material de referencia.

Barrosoa ramboi (Cabrera) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ramboi* Cabrera
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Bejaranoa R.M. King & H. Rob.

Bejaranoa balansae (Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium balansae* Hieron., *Eupatorium balansae* Hieron. f. *foliosum* Chodat, *Eupatorium balansae* Hieron. var. *menthoides* Chodat, *Eupatorium balansae* Hieron. var. *reticulatum* (Chodat) Chodat, *Eupatorium bracteanum* Gardner var. *reticulatum* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, CON, COA, GUA, NAS, PAI, PHA, SPE).

Bellis L.

Bellis perennis L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME).

Belloa J. Remy

Belloa chilensis (Hook. & Arn.) J. Remy

Sin.: *Lucilia chilensis* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 900-2000 m.

Países: CHL(TAR, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Belloa eriophora (J. Rémy) M.O. Dillon

Sin.: *Lucilia eriophora* J. Remy

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, ARA, RME).

Belloa nivea (Phil.) M.O. Dillon

Sin.: *Chevreulia nivea* Phil., *Gnaphalium andicola* Kuntze, hom. illeg., *Gnaphalium frigidum* Poepp., nom. inval., *Lucilia araucana* Phil., *Lucilia chilensis* Hook. & Arn., *Lucilia chilensis* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Lucilia frigida* Reiche, nom. inval., *Lucilia nivea* (Phil.) Cabrera

Hierba. Endémica. 900-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(TAR, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Berroa Beauverd

Berroa gnaphalioides (Less.) Beauverd

Sin.: *Gnaphalium gnaphalioides* (Less.) Kuntze, *Lucilia argentea* Hook. & Arn., *Lucilia gnaphalioides* Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, SFE, SDE), BRA(RGS), URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Bidens L.

Bidens andicola Kunth var. **andicola**

Sin.: *Bidens andicola* Kunth var. *diversifolia* (Griseb.) Sherff, *Bidens andicola* Kunth var. *normalis* Kuntze, *Bidens cosmantha* Griseb. var. *diversifolia* Griseb., *Bidens fruticulosa* Meyen ex Walp.

Hierba. Nativa. 1500-3900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Bidens andicola Kunth var. **heterophylla** Kuntze

Sin.: *Bidens andicola* Kunth f. *buchtienii* (Sherff) Sherff, *Bidens andicola* Kunth var. *cosmantha* (Griseb.) Sherff, *Bidens buchtienii* Sherff, *Bidens cosmantha* Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

Bidens aurea (Aiton) Sherff

Sin.: *Bidens arguta* Kunth, *Bidens arguta* Kunth var. *luxurians* (Willd.) DC., *Bidens decolorata* Kunth, *Bidens ferulifolia* (Jacq.) DC., *Bidens heterophylla* Ortega, *Bidens luxurians* Willd., *Bidens tetragona* (Cerv.) DC., *Coreopsis aurea* Aiton, *Coreopsis ferulifolia* Jacq., *Coreopsis lucida* Cav., *Coreopsis tetragona* Cerv., *Coreopsis trichosperma* Michx. var. *aurea* (Aiton) Nutt., *Diodonta aurea* (Aiton) Nutt., *Kerneria ferulifolia* (Jacq.) Cass.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI), CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LSR, LLA, RME, IPA).

Bidens bipinnata L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bidens chodatii Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON, PAI, SPE).

Bidens exigua Sherff

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Bidens gardneri Baker

Hierba. Nativa. 100-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS), PRY(CAU, CAA, CAN, CON, COA, SPE).

Bidens hassleriana (Chodat) A.A. Sáenz

Sin.: *Bidens riedelii* Baker f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Bidens riedelii* Baker var. *hassleriana* Chodat, *Bidens riedelii* Baker var. *hirsuta* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS), PRY(AMA, CAN).

Bidens laevis (L.) Britton, Stern & Poggenb.

Sin.: *Bidens chrysanthemoides* Michx., nom. inval., *Bidens helianthoides* Kunth, *Helianthus laevis* L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC), BRA(PAR, RGS, SCA), CHL(ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME), PRY(CEN, COA, PAI), URY.

Bidens mandonii (Sherff) Cabrera

Sin.: *Bidens andicola* Kunth var. *mandonii* Sherff

Hierba. Nativa. 1500-3900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Bidens pilosa L. var. **apiifolia** (DC.) Sherff

Sin.: *Bidens chilensis* var. *apiifolia* DC.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Bidens pilosa L. var. **pilosa**

Sin.: *Acocotli quauhuahuacensis* F. Hern. ex Altam. & Ramírez, *Bidens abadiae* DC., *Bidens abadiae* DC. var. *pilosoides* Sherff, *Bidens abortiva* Schumacher & Thonn., *Bidens africana* Klatt, *Bidens alausensis* Kunth, *Bidens alba* (L.) DC., *Bidens alba* (L.) DC. var. *radiata* (Sch. Bip.) R.E. Ballard, *Bidens alba* (L.) DC. var. *radiata* (Sch. Bip.) R.E. Ballard ex Melchert, *Bidens aurantiaca* Colenso, *Bidens barrancae* M.E. Jones, *Bidens bimucronata* Turcz., *Bidens bipinnata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Bidens bonplandii* Sch. Bip., *Bidens brachycarpa* DC., *Bidens californica* DC., *Bidens caracasana* DC., *Bidens caucalidea* DC., *Bidens chilensis* DC., *Bidens chilensis* DC. var. *apiifolia* DC., *Bidens ciliata* Hoffmanns. ex Fisch. & C.A. Mey., *Bidens daucifolia* DC., *Bidens deamii* Sherff, *Bidens decumbens* Greenm., *Bidens exaristata* DC., *Bidens hirsuta* Nutt., hom. illeg., *Bidens hispida* Kunth, *Bidens inermis* S. Watson, *Bidens leucantha* L. f. *discoidea* (Sch. Bip.) Krauss, *Bidens leucantha* Willd. var. *pilosa* (L.) Griseb., *Bidens leucanthema* (L.) E.H.L. Krause, *Bidens leucanthema* (L.) Willd., *Bidens leucanthema* (L.) Willd. ex Walp., *Bidens leucanthema* (L.) Willd. var.

humilis Walp., *Bidens leucanthema* (L.) Willd. var. *sundaica* (Blume) Hassk., *Bidens montaubanii* Phil., *Bidens odorata* Cav., *Bidens odorata* Cav. var. *calicicola* (Greenm.) R.E. Ballard, *Bidens odorata* Cav. var. *chilpancingensis* R.E. Ballard, *Bidens odorata* Cav. var. *oaxacensis* R.E. Ballard, *Bidens odorata* Cav. var. *rosea* (Sch. Bip.) Melchert, *Bidens orendainae* M.E. Jones, *Bidens oxyodonta* DC., *Bidens pilosa* L. f. *alausensis* (Kunth) Sherff, *Bidens pilosa* L. f. *bipinnata* Kuntze, *Bidens pilosa* L. f. *calicicola* (Greenm.) Sherff, *Bidens pilosa* L. f. *decomposita* Kuntze, *Bidens pilosa* L. f. *decumbens* (Greenm.) Sherff, *Bidens pilosa* L. f. *discoidea* Sch. Bip., nom. illeg., *Bidens pilosa* L. f. *indivisa* Kayama, *Bidens pilosa* L. f. *minor* (Blume) Sherff, *Bidens pilosa* L. f. *odorata* (Cav.) Sherff, *Bidens pilosa* L. f. *pilosior* Kuntze, *Bidens pilosa* L. f. *pinnata* Kuntze, *Bidens pilosa* L. f. *radiata* Sch. Bip., *Bidens pilosa* L. f. *radiata* Sherff, *Bidens pilosa* L. f. *rubiflora* S.S. Ying, *Bidens pilosa* L. f. *scandicina* (Kunth) Sherff, *Bidens pilosa* L. f. *subbiterata* Kuntze, *Bidens pilosa* L. f. *subsimplicifolia* Kuntze, *Bidens pilosa* L. f. *ternata* Kuntze, *Bidens pilosa* L. f. *umbrosa* Sherff, *Bidens pilosa* L. var. *alausensis* (Kunth) Sherff, *Bidens pilosa* L. var. *alba* (L.) O.E. Schulz, *Bidens pilosa* L. var. *bimucronata* (Turcz.) O.E. Schulz, *Bidens pilosa* L. var. *brachycarpa* (DC.) O.E. Schulz, *Bidens pilosa* L. var. *brevifoliata* Hieron., *Bidens pilosa* L. var. *calicicola* (Greenm.) Sherff, *Bidens pilosa* L. var. *discoidea* J.A. Schmidt, nom. illeg., *Bidens pilosa* L. var. *dubia* (Cass.) O.E. Schulz, *Bidens pilosa* L. var. *humilis* (Walp.) Reiche, *Bidens pilosa* L. var. *kraussii* Sch. Bip., *Bidens pilosa*

L. var. *leucanthema* (L.) Harv. & Sond., *Bidens pilosa* L. var. *minor* (Blume) Sherff, *Bidens pilosa* L. var. *radiata* (Sch. Bip.) J.A. Schmidt, *Bidens ramosissima* Sherff, *Bidens reflexa* Link, *Bidens rosea* Sch. Bip., *Bidens rosea* Sch. Bip. var. *calicicola* Greenm., *Bidens scandicina* Kunth, *Bidens sundaica* Blume, *Bidens sundaica* Blume var. *minor* Blume, *Bidens valparadisiaca* Colla, *Coreopsis alba* L., *Coreopsis ferulifolia* (Jacq.) Sweet var. *odoratissima* Pers., *Coreopsis leucanthema* L., *Coreopsis odoratissima* Cav. ex Pers., *Cosmos pilosus* Kunth, *Cosmos tenellus* Kunth, *Kerneria dubia* Cass., *Kerneria leucanthema* (L.) Cass., *Kerneria pilosa* (L.) Lowe, *Kerneria pilosa* (L.) Lowe var. *discoidea* (Sch. Bip.) Lowe, *Kerneria pilosa* (L.) Lowe var. *radiata* (Sch. Bip.) Lowe, *Kerneria tetragona* Moench

Hierba. Nativa. 0-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE, IPA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MON, SAO).

***Bidens pseudocosmos* Sherff**

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL, TUC). CHL(ANT, COQ).

***Bidens reptans* (L.) G. Don**

Sin.: *Coreopsis reptans* L.

Subarbusto. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUU, MIS).

***Bidens riedelii* Baker**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

***Bidens squarrosa* Kunth**

Sin.: *Bidens antiguensis* J.M. Coult., *Bidens antiguensis* J.M. Coult. var. *procumbens* (Donn. Sm.) Roseman, *Bidens antiguensis* J.M. Coult. var. *salvadorensis* Roseman, *Bidens coreopsidis* DC. var. *procumbens* Donn. Sm., *Bidens longipetiolata* Rusby, *Bidens multiserrata* Sch. Bip., nom. nud., *Bidens pallida* Rusby, *Bidens patula* Gardner, *Bidens rubifolia* Kunth var. *silvatica* Baker, *Bidens segetum* Mart. ex Colla, *Bidens segetum* Mart. ex Colla var. *patula* (Gardner) Sherff, *Bidens segetum* Mart. ex Colla var. *silvatica* (Baker) Sherff, *Bidens speciosa* Gardner, *Bidens speciosa* Gardner var. *patula* (Gardner) O.E. Schulz, *Bidens speciosa* Gardner var. *silvatica* (Baker) O.E. Schulz, *Bidens squarrosa* Kunth var. *atrostriata* Roseman, *Bidens squarrosa* Kunth var. *hondurensis* Roseman, *Bidens squarrosa* Kunth var. *speciosa* Roseman, *Bidens squarrosa* Kunth var. *tereticaulis* (DC.) Roseman, *Bidens sylvaticus* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud., *Bidens tereticaulis* DC., *Bidens tereticaulis* DC. var. *antiguensis* (J.M. Coult.) O.E. Schulz, *Bidens tereticaulis* DC. var. *indivisa* B.L. Rob., *Bidens tereticaulis* DC. var. *sordida* Greenm., *Coreopsis brasiliensis* Colla, *Coreopsis scandens* Sessé & Moç., *Coreopsis trifoliata* Bertol.

Liana. Nativa. 300-3200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Bidens subalternans* DC. var. *simulans* Sherff**

Hierba. Nativa. 1500-3400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR).

Bidens subalternans DC. var. **subalternans**

Sin.: *Bidens platensis* Manganaro, *Bidens quadrangularis* DC.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

Bidens subalternans DC. var. **unipinnata** Sherff

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SLU). PRY(COA).

Bidens tenera O.E. Schulz

Sin.: *Bidens ekmanii* O.E. Schulz ex Urb., *Bidens ekmanii* O.E. Schulz ex Urb. var. *paucidentata* O.E. Schulz ex Urb., *Bidens tenera* O.E. Schulz var. *paucidentata* (O.E. Schulz ex Urb.) Sherff, *Bidens tenera* O.E. Schulz var. *tetracera* Sherff, *Bidens tenera* O.E. Schulz var. *typica* Sherff
Hierba. Nativa. 400-2100 m.
Países: ARG(JUU). PRY(AMA).

Bidens triplinervia Kunth var. **macrantha** (Wedd.) Sherff

Sin.: *Bidens andicola* Kunth f. *dissecta* Sherff, *Bidens andicola* Kunth f. *tarijensis* (Sherff) Sherff, *Bidens andicola* Kunth var. *decomposita* Kuntze, *Bidens andicola* Kunth var. *tarijensis* Sherff, *Bidens artemisiifolia* Poepp. & Endl., *Bidens attenuata* Sherff, *Bidens canescens* Bertol.,

Bidens consolidifolia Turcz., *Bidens crithmifolia* Kunth, *Bidens decomposita* Wall. ex DC. var. *hirsutior* C.B. Clarke, *Bidens delphinifolia* Kunth, *Bidens geraniifolia* Brandege, *Bidens glaberrima* DC., *Bidens grandiflora* Balb. var. *breviloba* Kuntze, *Bidens grandiflora* Balb. var. *humilis* (Kunth) Kuntze, *Bidens humilis* Kunth, *Bidens humilis* Kunth var. *macrantha* Wedd., *Bidens humilis* Kunth var. *major* Sch. Bip., *Bidens humilis* Kunth var. *tenuifolia* Sch. Bip. ex Griseb., *Bidens macrantha* Griseb., *Bidens pilosa* L. f. *hirsutior* (C.B. Clarke) Kuntze, *Bidens pusilla* Sherff, *Bidens triplinervia* Kunth f. *macrantha* (Wedd.) Sherff, *Bidens triplinervia* Kunth f. *octoradiata* Sherff
Hierba. Nativa. 1000-4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Bidens triplinervia Kunth var. **triplinervia**

Sin.: *Bidens affinis* Klotzsch & Otto, *Bidens pedunculata* Phil.
Hierba. Nativa. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUU, MEN). CHL(AYP, TAR).

Bishovia R.M. King & H. Rob.

Bishovia mikaniifolia (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Chacoa mikaniifolia* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium mikaniifolium* B.L. Rob.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA).

Blennosperma Less.

Blennosperma chilense Less.

Sin.: *Apalus anthemifolius* (Bertero ex Colla) DC., *Soliva radiata* Poepp. ex Less., *Unxia anthemidifolia* F. Phil.
Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Brachyclados D. Don

Brachyclados caespitosus (Phil.) Speg.

Sin.: *Brachyclados obtusifolius* Kuntze, *Brachyclados pygmaeus* Kuntze, *Lavidia caespitosa* Phil.
Arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Brachyclados lycioides D. Don

Sin.: *Baucis lavandulifolia* Phil., *Brachyclados involutus* Kuntze, *Brachyclados lycioides* D. Don var. *microcephalus* Hieron., *Brachyclados macrocephalus* Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(COQ, VAL).

Brachyclados megalanthus Speg.

Sin.: *Brachyclados lycioides* D. Don var. *macrocephala* Hieron.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, RNE).

Brachylaena R. Br.

Brachylaena discolor DC.

Arbusto. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Brickellia Elliott, nom. cons.

Brickellia diffusa (Vahl) A. Gray

Sin.: *Bulbostylis diffusa* (Vahl) DC.,
Coleosanthus diffusus (Vahl) Kuntze,
Eupatorium capillare Desv. ex Ham.,
Eupatorium diffusum Vahl, *Eupatorium*
leptopodium Gardner, *Eupatorium*
trichosantherum A. Rich.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Burkartia Crisci**Burkartia lanigera** (Hook. & Arn.) Crisci

Sin.: *Perezia lanigera* Hook. & Arn.,
Perezia sessiliflora Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Cabreraea Bonifacino**Cabreraea andina** (Cabrera) Bonifacino

Sin.: *Chiliophyllum andinum* Cabrera

Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(LRI, SJU).

Calea L.**Calea acaulis** Baker

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR). PRY.

Calea asclepiifolia Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

Calea bakeriana Chodat

Sin.: *Calea bakeriana* Chodat var. *dentata*
 Chodat, *Calea bakeriana* Chodat var.
volubilis Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CEN).

Calea cabreræ Pruski

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Calea chodatii Hassl.

Sin.: *Calea nitida* Chodat, hom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Calea clematidea Baker

Sin.: *Calea rojasiana* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

PRY(AMA, CAA, CEN, CON, COA,

GUA, MIE, PAI). URY(ART, RIV,

TAC).

Calea × crassa V.R. Bueno & G. Heiden

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Calea crenata Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CON).

Calea cuneifolia DC.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN).

Calea cymosa Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,

MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAU, CAA, CON, ITA, MIE).

Calea formosa Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Calea gentianoides DC.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Calea hassleriana Chodat

Sin.: *Calea platylepis* Sch. Bip. ex Baker
 var. *mollis* Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU,
 CAA, CAN, SPE).

Calea hymenolepis Baker

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Calea ilienii Malme

Subarbusto. Endémica. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Calea kristinae Pruski

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Notas: Citada para Uruguay (Pruski,
 2005c) sin indiar localidad o ejemplar
 de referencia

Calea marginata S.F. Blake

Sin.: *Calea longifolia* (DC.) Baker, *Meyeria*
longifolia DC.

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Calea mediterranea (Vell.) Pruski

Sin.: *Bupthalmum mediterraneum* Vell.,

Calea platylepis Sch. Bip. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

PRY(CAN, ITA).

Calea monocephala Dusén

Subarbusto. Endémica. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Calea myrtifolia (DC.) Baker

Sin.: *Meyeria myrtifolia* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Calea × parviantha V.R. Bueno & G.

Heiden

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Calea parvifolia (DC.) Baker

Sin.: *Meyeria parvifolia* DC.

Subarbusto. Nativa. 1100-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Calea phyllolepis Baker

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Calea pilosa Baker

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, PAI).

Calea pinnatifida (R. Br.) Less.

Sin.: *Actinea commutata* Spreng., *Calea glabra* DC., *Calea pinnatifida* (R. Br.) Less. var. *glabra* (DC.) Baker, *Caleacte pinnatifida* R. Br., *Mocinna brasiliensis* Spreng.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, PAI).

Calea rupicola Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON, COA, PAI).

Calea subintegerrima (Malme) V.R.

Bueno & G. Heiden

Sin.: *Calea hispida* f. *subintegerrima* Malme, *Meyeria subintegerrima* (Malme) Pruski

Arbusto. Endémica.

Países: BRA (PAR, SCA).

Calea triantha (Vell.) Pruski

Sin.: *Aster trianthus* Vell., *Calea hispida* (DC.) Baker, *Meyeria hispida* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Calea uniflora Less. var. **discoidea** Baker

Sin.: *Calea pedunculosa* DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI).

Calea uniflora Less. var. **uniflora**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Calea verticillata (Klatt) Pruski

Sin.: *Calea catalaonensis* Krasch., *Calea clauseniana* Baker var. *balansana* Baker, *Calea multijuga* Krasch., *Tridax verticillata* Klatt

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

Calendula L.

Calendula arvensis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, RNE). CHL(COQ, VAL, BIO, RME). URY(MON).

Calendula officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, LPA, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, BIO, RME, JFE).

Calendula tripterocarpa Rupr.

Hierba. Introducida. 800-1200 m.

Países: CHL(COQ).

Calopappus Meyen

Calopappus acerosus Meyen

Sin.: *Calopappus acanthifolius* J. Remy, *Nassauvia acanthifolia* (J. Remy) G.F.

Grandjot, *Nassauvia acerosa* (Meyen) Wedd., *Nassauvia remyana* Wedd.

Hierba. Endémica. 2300-3200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Calyplocarpus Less.

Calyplocarpus biaristatus (DC.) H. Rob.

Sin.: *Blainvillea biaristata* DC., *Calyplocarpus megapotamica* (DC.) Sch. Bip., *Oligogyne megapotamica* DC., *Oligogyne synedrelloides* Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, ITA, PAI). URY(ART, COL, FLO, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

Calyplocarpus vialis Less.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(IPA).

Campovassouria R.M. King & H. Rob.

Campovassouria barbosae H. Rob.

Arbusto. Endémica. 800-1600 m.

Países: BRA(PAR).

Campovassouria cruciata (Vell.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Campovassouria bupleurifolia* (DC.) R.M. King & H. Rob., *Chrysocoma cruciata* Vell., *Eupatorium asclepiadeum* DC., *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *asclepiadeum* (DC.) Baker, *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *bupleurifolium*, *Eupatorium bupleurifolium* DC. var.

ensifolium (Griseb.) Hieron., *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *linifolium* (DC.) Baker, *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *microcephalum* Hieron., *Eupatorium cruciatum* (Vell.) Ariza, *Eupatorium ensifolium* Griseb., *Eupatorium graminifolium* Chodat, *Eupatorium linifolium* DC.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, LAV, RNO, RIV, SJO, TAC).

Campuloclinium DC.

Campuloclinium burchellii (Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium burchellii* Baker, *Eupatorium chlorocephalum* Dusén, nom. nud., *Eupatorium glaziovii* Baker var. *molle* Hassl., *Eupatorium griseopubescens* Dusén ex Malme, *Eupatorium riedelii* Baker f. *guaraniticum* Chodat & Hassl., *Eupatorium riedelii* Baker var. *microcephalum* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON).

Campuloclinium chlorolepis (Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium chlorolepis* Baker

Hierba. Nativa. 600-800 m.

Países: BRA(PAR).

Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC.

Sin.: *Campuloclinium hickenii* (Cabrera & Vittet) R.M. King & H. Rob., *Campuloclinium macrocephalum* (Less.) DC. var. *strigosum* DC.,

Campuloclinium strigosum (DC.) Sch. Bip. ex Baker, *Chromolaena pratensis* Gardner, *Eupatorium betoniciforme* (DC.) Baker f. *alternifolium* Hicken, *Eupatorium denudatum* Chodat, *Eupatorium donianum* Hook. & Arn., *Eupatorium hickenii* Cabrera & Vittet, *Eupatorium macrocephalum* Less., *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *angustifolium* Baker, *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *stigmatosum* (Chodat) Hassl., *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *strigosum* (DC.) Baker, *Eupatorium stigmatosum* Chodat f. *roseoinvolucratum* Chodat & Hassl., *Eupatorium stigmatosum* Chodat, hom. illeg., *Eupatorium stigmatosum* Chodat var. *subcalvatum* Chodat, *Eupatorium stigmatosum* Chodat var. *violaceum* Chodat

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

Campuloclinium megacephalum (Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium megacephalum* Baker

Hierba. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

Campuloclinium purpurascens (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium glaziovii* Baker, *Eupatorium purpurascens* Sch. Bip. ex Baker

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA).

Campuloclinium riedelii (Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium riedelii* Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Campuloclinium scabrum (Klatt) J. Calvo & Roque

Sin.: *Campuloclinium tubaraoense* R.M. King & H. Rob., nom. illeg.,

Eupatorium tubaraoense Hieron., nom. illeg.,

Trichogonia scabra Klatt

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Carduus L.

Carduus acanthoides L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, SAL, SFE). PRY(ÑEE). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SJO).

Carduus nutans L.

Hierba. Introducida. 600-1000 m.

Países: CHL(VAL, ARA, RME).

Carduus pycnocephalus L.

Sin.: *Carduus tenuiflorus* Curtis var. *pycnocephalus* (L.) DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(CAS, FLA, LAV, MON, PAY, SJO, SOR).

Carduus tenuiflorus Curtis

Sin.: *Carduus pycnocephalus* L. var. *tenuiflorus* (Curtis) Ball, *Carduus*

pycnocephalus L. var. *tenuiflorus* (Curtis) Fiori & Bég., comb. superfl.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, JFE). URY(CAS, FLA, MON).

Carduus thoermeri Weinm.

Sin.: *Carduus leiophyllus* Petrovic, *Carduus nutans* L. subsp. *leiophyllus* (Petrovic) Stoj. & Stef.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, ARA, AIS, MAG, RME). URY(PAY, RNO, SOR).

Carthamus L.

Carthamus lanatus L.

Sin.: *Kentrophyllum lanatum* (L.) DC. ex Duby
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LPA, RNE, SFE, SDE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TYT).

Carthamus tinctorius L.

Sin.: *Carduus tinctorius* (L.) Falk
Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, JUJ, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(COQ, BIO, RME).

Centaurea L., nom. cons.

Centaurea americana Nutt.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS).

Centaurea benedicta (L.) L.

Sin.: *Cnicus benedictus* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, COR, COS, LPA, MEN, NEU). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, RME). URY(ART, CLA).

Centaurea cachinalensis Phil.

Arbusto. Endémica. 0-2800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Centaurea calcitrapa L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SFE). BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, SJO, SOR).

Centaurea chilensis Hook. & Arn. var. **breviloba** DC.

Sin.: *Plectocephalus chilensis* (Bertero ex Hook. & Arn.) G. Don ex Loudon var. *brevilobus* (DC.) Penneck. & Chaura
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL).

Centaurea chilensis Hook. & Arn. var. **chilensis**

Subarbusto. Endémica. 1500-3500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Centaurea cyanus L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, RNE). BRA(PAR). CHL(AIS, RME).

Centaurea debeauxii Gren. & Gordon

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: URY(MON).

Centaurea diffusa Lam.

Sin.: *Acosta diffusa* (Lam.) Soják, *Centaurea parviflora* Sm.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA).

Centaurea floccosa Hook. & Arn.

Subarbusto. Endémica. 0-2900 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Centaurea iberica Trevir. ex Spreng.

Sin.: *Calcitrapa iberica* (Trevir. ex Spreng.) Schur, *Leucantha iberica* (Trevir. ex Spreng.) Á. Löve & D. Löve
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, NEU, RNE).

Centaurea jacea L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE). BRA(PAR). CHL(ARA).

Centaurea melitensis L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, FLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Centaurea nigra L.

Hierba. Introducida. 900-1000 m.
Países: CHL(ARA).

Centaurea nigrescens Willd.

Sin.: *Centaurea dubia* Suter subsp. *vochinensis* (Bernh. ex Rchb.) Hayek ex Hegi, *Centaurea vochinensis* Bernh. ex Rchb.
Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Centaurea solstitialis L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, RME). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MON, PAY).

Centaurodendron Johow

Centaurodendron dracaenoides Johow

Sin.: *Plectocephalus dracaenoides* (Johow) F.H. Hellwig

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Centaurodendron palmiforme Skottsbo.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Centaurodendron schilleri Penneck., N.

García & Susanna

Arbusto. Endémica. 300-400 m.

Países: CHL(JFE).

Centipeda Lour.

Centipeda elatinoides (Less.) Benth. &

Hook. f. ex O. Hoffm.

Sin.: *Myriogyne elatinoides* Less.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Centratherum Cass.

Centratherum punctatum Cass.

Sin.: *Ampherephes aristata* Kunth, *Ampherephes intermedia* Link,

Ampherephes mutica Kunth,

Ampherephes pilosa Cass.,

Ampherephes pulchella Cass.,

Amphibecis violacea (Schrank)

Schrank, *Baccharoides brachylepis*

(Sch. Bip. ex Baker) Kuntze,

Baccharoides holtonii (Baker) Kuntze,

Baccharoides muticum (Kunth)

Kuntze, *Baccharoides punctatum*

(Cass.) Kuntze, *Baccharoides*

violaceum (Schrank) Kuntze,

Centratherum brachylepis Sch. Bip. ex

Baker, *Centratherum brevispinum*

Cass., *Centratherum camporum*

(Hassl.) Malme, *Centratherum*

camporum (Hassl.) Malme var.

albicans (Hassl.) Malme,

Centratherum camporum (Hassl.)

Malme var. *longipes* (Hassl.) Malme,

Centratherum confertum K. Kirkman,

nom. illeg., *Centratherum holtonii*

Baker, *Centratherum intermedium*

(Link) Less., *Centratherum*

longispinum Cass., *Centratherum*

muticum (Kunth) Less., *Centratherum*

pulchellum (Cass.) Steud.,

Centratherum punctatum Cass. f.

brachyphyllum Hassl., *Centratherum*

punctatum Cass. f. *foliosum* (Chodat)

Hassl., *Centratherum punctatum* Cass.

subsp. *camporum* Hassl.,

Centratherum punctatum Cass. var.

albicans Hassl., *Centratherum*

punctatum Cass. var. *foliosum* Chodat,

Centratherum punctatum Cass. var.

longipes Hassl., *Centratherum*

punctatum Cass. var. *parviflorum*

Baker, *Centratherum punctatum* Cass.

var. *viscosissimum* Hassl.,

Centratherum violaceum (Schrank)

Gleason, *Crantzia ovata* Vell., *Spixia*

violacea Schrank

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,

AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,

COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Chacoa R.M. King & H. Rob.

Chacoa pseudoprasiifolia (Hassl.) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium fiebrigii* Hassl.,

Eupatorium fiebrigii Hassl. var.

acuminata Hassl., *Eupatorium fiebrigii*

Hassl. var. *heterophylla* Hassl., nom.

illeg., *Eupatorium pseudoprasiifolium*

Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,

SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY,

AMA, CEN, CHO, CON, COA, GUA,

PAI, PHA, SPE).

Chaetanthera Ruiz & Pav.

Chaetanthera albiflora (Phil.) A.M.R.

Davies

Sin.: *Chaetanthera albiflora* Phil., nom.

inval., *Chaetanthera linearis* Poepp. ex

Less. var. *albiflora* Phil., *Chaetanthera*

linearis Poepp. ex Less. var.

taltalensis I.M. Johnst., *Chaetanthera*

linifolia Bertero ex Less. var. *albiflora*

Phil., *Chaetanthera microphylla*

(Cass.) Hook. & Arn. var. *albiflora*

(Phil.) Cabrera

Hierba. Endémica. 1600-1800 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Chaetanthera australis Cabrera

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU, RNE).

Chaetanthera callaquiensis A.E. Martic.

& Teillier

Hierba. Endémica. 1600-1700 m.

Países: CHL(BIO).

Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. **chilensis**

Sin.: *Chaetanthera argentea* Phil., hom. illeg., *Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *argentea* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *involucrata* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera collina* Phil., *Chaetanthera eryngioides* D. Don, *Chaetanthera grandiflora* Steud., *Chaetanthera involucrata* Phil., *Chaetanthera nana* Phil., *Chaetanthera sericea* Lag. ex DC., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *argentea* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *nana* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera sublignosa* Kuntze, *Chaetanthera tenuifolia* D. Don var. *eryngioides* (D. Don) Hook. & Arn., *Perdicium chilense* Willd.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).

Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. **tenuifolia** (D. Don) Cabrera

Sin.: *Chaetanthera argentea* D. Don, *Chaetanthera tenuifolia* D. Don
Hierba. Endémica.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO).

Chaetanthera ciliata Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Chaetanthera depauperata (Hook. & Arn.) A.M.R. Davies

Sin.: *Chaetanthera leptcephala* Cabrera, *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less. var. *depauperata* (Hook. & Arn.) DC., *Chaetanthera microphylla* (Cass.) Hook. & Arn. var. *depauperata* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 700-2900 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Chaetanthera elegans Phil. var. **elegans**

Sin.: *Chaetanthera brachylepis* Phil., *Chaetanthera elata* Phil., *Chaetanthera humilis* Phil., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera valdiviana* Phil., *Chaetanthera volckmannii* Phil.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

Chaetanthera elegans Phil. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Chaetanthera andina* Phil., *Chaetanthera andina* Phil. var. *pratensis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera araucana* Phil., *Chaetanthera comata* Phil., *Chaetanthera elegans* Phil. var. *andina* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera foliosa* Phil., *Chaetanthera montana* Phil., *Chaetanthera pratensis* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Chaetanthera elegans Phil. var. **pulchra** Cabrera

Hierba. Endémica.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Chaetanthera euphrasioides (DC.) F. Meigen

Sin.: *Chaetanthera debilis* Meyen & Walp., *Chaetanthera euphrasioides* Reiche, hom. illeg., *Chaetanthera euphrasioides* Reiche var. *spinulosa* (Phil.) Reiche, *Elachia euphrasioides* DC., *Elachia spinulosa* Phil., *Tylloma euphrasioides* (DC.) Wedd.
Hierba. Endémica. 1300-3400 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Chaetanthera flabellata D. Don

Sin.: *Chaetanthera flabellata* D. Don var. *prostrata* (D. Don) Hook. & Arn., *Chaetanthera multicaulis* DC. var. *prostrata* DC., *Chaetanthera prostrata* D. Don, *Elachia euphrasioides* Deless., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1600-2600 m.
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Chaetanthera flabellifolia Cabrera

Sin.: *Pachylaena elegans* Phil.
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: CHL(COQ).

Chaetanthera frayjorgensis A.M.R. Davies

Sin.: *Tylloma brachylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *microphyllum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chaetanthera glabrata (DC.) F. Meigen

Sin.: *Tylloma glabratum* DC., *Tylloma glabratum* DC. var. *rotundifolium* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *stolpii* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *strictum* (Phil.) Reiche, *Tylloma rotundifolium* Phil., *Tylloma stolpii* Phil., *Tylloma strictum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Chaetanthera glandulosa J. Remy var. **glandulosa**

Sin.: *Tillilia pungens* Phil. ex Reiche, nom. nud.
Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.

- Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Chaetanthera glandulosa** J. Remy var. **gracilis** A.M.R. Davies
Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: CHL(VAL).
- Chaetanthera incana** Poepp. ex Less.
Sin.: *Chaetanthera chilensis* Hook. & Arn., hom. illeg., *Chaetanthera incana* Poepp. ex Less. var. *spathulata* DC., *Chaetanthera obtusata* Phil., *Chaetanthera scariosa* D. Don, *Chaetanthera spathulata* Poepp. ex Less.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Chaetanthera kalinae** A.M.R. Davies
Hierba. Endémica. 2500-3300 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Chaetanthera lanata** (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Chaetanthera philippii* B.L. Rob., *Chondrochilus grandiflorus* Phil., *Chondrochilus involucratus* Phil., *Chondrochilus lanatus* Phil., *Tylloma involucratus* (Phil.) Reiche, *Tylloma lanatum* Phil.
Hierba. Endémica. 2600-3900 m.
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).
- Chaetanthera limbata** (D. Don) Less.
Sin.: *Chaetanthera schroederi* G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Tylloma ciliatum* Phil., *Tylloma eurylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma limbatus* D. Don
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).
- Chaetanthera linearis** Poepp. ex Less.
Sin.: *Chaetanthera kunthiana* Less., *Chaetanthera linearifolia* Poepp. ex Steud., nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Chaetanthera microphylla** (Cass.) Hook. & Arn.
Sin.: *Chaetanthera delicatula* Phil., *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less., *Chaetanthera pentapetala* Phil., *Chaetanthera salsoloides* (D. Don) Kuntze, *Cherina microphylla* Cass., *Euthrixia affinis* D. Don, *Euthrixia salsoloides* D. Don, *Onoseris linifolia* Bertero, nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).
- Chaetanthera moenchioides** Less.
Sin.: *Chaetanthera moenchioides* Less. var. *pauciflora* F. Meigen, *Chaetanthera moenchioides* Less. var. *sulphurea* F. Meigen, *Chaetanthera tenuifolia* Deless., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-2300 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
- Chaetanthera multicaulis** DC.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).
- Chaetanthera perpusilla** (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire
Sin.: *Chaetanthera aymarae* Martic. & Quezada, *Luciliopsis perpusilla* Wedd.
Hierba. Nativa. 2200-3300 m.
Países: CHL(AYP, TAR).
- Chaetanthera peruviana** A. Gray
Hierba. Nativa. 3700-3800 m.
- Países: CHL(AYP).
- Chaetanthera pubescens** A.M.R. Davies
Hierba. Endémica. 600-3500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Chaetanthera ramosissima** D. Don
Sin.: *Chaetanthera berteriana* Colla, hom. illeg., *Chaetanthera tenella* Less. var. *tenella*, *Minythodes umbellata* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Chaetanthera renifolia** (J. Remy) Cabrera
Sin.: *Chaetanthera crenata* (Phil.) F. Meigen, comb. illeg., *Chondrochilus crenatus* Phil., *Elachia renifolia* J. Remy, *Tylloma renifolium* (J. Remy) Wedd.
Hierba. Endémica. 2500-3800 m.
Países: CHL(RME).
- Chaetanthera serrata** Ruiz & Pav.
Sin.: *Chaetanthera spinulosa* Cass., *Proselia serrata* (Ruiz & Pav.) D. Don
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).
- Chaetanthera spathulifolia** Cabrera
Sin.: *Carmelita spathulata* Phil., *Chaetanthera spathulata* (Phil.) Hauman, comb. illeg.
Hierba. Endémica. 2700-4100 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, VAL).
- Chaetanthera splendens** (J. Remy) B.L. Rob.
Sin.: *Elachia splendens* J. Remy, *Tylloma splendens* (J. Remy) Wedd.
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(SJU). CHL(COQ, RME).

Chaetanthera taltalensis (Cabrera)
A.M.R. Davies
Sin.: *Chaetanthera tenella* Less. var.
taltalensis Cabrera
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Chaetanthera villosa D. Don
Sin.: *Carmelita formosa* Gay ex DC.
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Chaptalia Vent., nom. cons.

Chaptalia arechavaletae Hieron.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI,
MIS). BRA(RGS). URY(CAS, CLA,
COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY,
RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).

Chaptalia cordifolia (Baker) Cabrera
Sin.: *Trichocline cordifolia* Baker
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chaptalia exscapa (Pers.) Baker var.
chilensis (DC.) Burkart
Sin.: *Gerbera chilensis* (DC.) Sch. Bip.,
Loxodon chilensis DC., *Thyrsanthema*
chilensis (DC.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, RME).

Chaptalia exscapa (Pers.) Baker var.
exscapa
Sin.: *Gerbera brevipes* (Cass.) Sch. Bip.,
comb. illeg., *Leria exscapa* DC.,
Loxodon brevipes Cass., nom.
superfl., *Thyrsanthema exscapa*
(Pers.) Kuntze, *Tussilago exscapa*
Pers.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI,
SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CAS, FLO, FLA, MAL, MON,
RNO, ROC, SOR).

Chaptalia ignota Burkart
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). URY(ART, CLA, PAY,
RNO, SAO).

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart
Sin.: *Chaptalia integrifolia* (Cass.) Baker,
hom. illeg., *Chaptalia microdonta*
Greene, *Leria integrifolia* Cass., *Leria*
lutescens Sch. Bip., nom. nud., *Leria*
nutans (L.) DC. var. *integrifolia* (Cass.)
Less., *Thyrsanthema integrifolia*
(Cass.) Kuntze, *Tussilago integerrima*
Vell.
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL,
SJO, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,
APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, MIE, PAI).
URY(CLA, COL, LAV, MAL, MON,
PAY, RNO, RIV, TAC).

Chaptalia modesta Burkart
Hierba. Nativa. 2000-3900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJO,
TUC).

Chaptalia nutans (L.) Pol.
Sin.: *Chaptalia diversifolia* Greene,
Chaptalia ebracteata (Kuntze) K.
Schum., *Chaptalia erosa* Greene,
Chaptalia majuscula Greene,
Chaptalia nutans (L.) Hemsl., comb.
superfl., *Chaptalia nutans* (L.) Pol. var.
texana (Greene) Burkart, *Chaptalia*
subcordata Greene, *Chaptalia texana*
Greene, *Gerbera nutans* (L.) Sch. Bip.,
Leria lyrata Cass., hom. illeg., *Leria*

nutans (L.) DC., *Thyrsanthema*
ebracteata Kuntze, *Thyrsanthema*
nutans (L.) Kuntze, *Tussilago lyrata*
Pers., hom. illeg., *Tussilago nutans* L.,
Tussilago vaccina Vell.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,
SDE, SFE, SJO, SLU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA,
GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART,
RIV, SAO, TAC).

Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker
Sin.: *Chaptalia graminifolia* (Dusén ex
Malme) Cabrera, *Chaptalia mandonii*
Burkart, *Chaptalia piloselloides* (Vahl)
Baker subsp. *bracteata* (Cass.)
Burkart, *Chaptalia piloselloides* (Vahl)
Baker var. *graminifolia* Dusén ex
Malme, *Chaptalia runcinata* Kunth,
Chaptalia runcinata Kunth var.
graminifolia (Dusén ex Malme)
Burkart, *Gerbera bracteata* (Cass.)
Sch. Bip., comb. superfl., *Leria*
mandonii Sch. Bip., nom. nud.,
Lieberkuhna bracteata Cass., nom.
superfl., *Loxodon longipes* Cass.,
nom. illeg., *Oxydon bicolor* Less., nom.
illeg., *Perdicion piloselloides* Vahl,
Thyrsanthema piloselloides (Vahl)
Kuntze, *Tussilago sinuata* Pers.
subsp. *piloselloides* (Vahl) Pers.
Hierba. Nativa. 1800-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS,
SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(COA, GUA, ITA, PAI,
SPE). URY(CAS, FLO, FLA, MAL,
MON, PAY, RNO, ROC, SJO, TAC).

Chaptalia similis R.E. Fr.
Hierba. Nativa. 0-4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
MEN, SAL, SJO, SLU, TUC).

Chaptalia sinuata (Less.) Baker

Sin.: *Leria nutans* (L.) DC. var. *sinuata* Less., *Leria sinuata* (Less.) DC., *Thysanthera sinuata* (Less.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI). URY(COL, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO).

Chersodoma Phil., emend. Cabrera**Chersodoma arequipensis** (Cuatrec.)

Cuatrec.

Sin.: *Chersodoma longipedicellata* Ricardi & Martic., *Senecio arequipensis* Cuatrec.

Subarbusto. Nativa. 3200-3700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Chersodoma argentina Cabrera

Arbusto. Endémica. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Chersodoma candida Phil.

Sin.: *Senecio chersodomus* Reiche, *Senecio oxyodon* Phil.

Arbusto. Nativa. 3600-4200 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Chersodoma glabriuscula (Cabrera)

M.O. Dillon & Sagást.

Sin.: *Chersodoma diclina* (Wedd.) Cabrera var. *glabriuscula* (Cabrera) Cabrera, *Senecio diclinus* Wedd. var. *glabriusculus* Cabrera

Arbusto. Endémica. 3200-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.)

Cabrera

Sin.: *Senecio jodopappus* Sch. Bip., *Senecio jodopappus* Sch. Bip. ex Wedd., nom. superfl.

Arbusto. Nativa. 3000-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Chevreulia Cass.**Chevreulia acuminata** Less.

Sin.: *Chevreulia elegans* Rusby, *Chevreulia filiformis* Hook. & Arn., *Chevreulia longipes* Wedd.

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CAS, CLA, MON, PAY, RNO, TAC).

Chevreulia diemii Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU, ARA, LLA).

Chevreulia lycopodioides (d'Urv.) DC.

Sin.: *Gnaphalium lycopodioides* d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LLA).

Chevreulia pusilla DC.

Sin.: *Chevreulia lanceolata* J. Remy

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LSR, LLA).

Chevreulia revoluta A.A. Schneid. & R.

Trevis.

Hierba. Endémica. 800-900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Chevreulia sarmentosa (Pers.) S.F.

Blake

Sin.: *Chaptalia sarmentosa* (Pers.) S.F.

Blake, *Chevreulia stolonifera* Cass., nom. illeg., *Chevreulia thouarsii* J. Remy, nom. illeg., *Gnaphalium calycinum* Poir., *Leria caespitosa* (Thouars) Spreng., *Tussilago sarmentosa* Pers., *Xeranthemum caespitosum* Thouars

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA). PRY(GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC).

Chiliophyllum Phil., nom. cons.**Chiliophyllum densifolium** Phil.

Sin.: *Phyllochilium densifolium* (Phil.) Cabrera

Arbusto. Endémica. 2000-2600 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Chiliotrichiopsis Cabrera**Chiliotrichiopsis keidelii** Cabrera

Arbusto. Nativa. 2200-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Chiliotrichiopsis ledifolia (Griseb.)

Cabrera

Sin.: *Gutierrezia ledifolia* Griseb.

Arbusto. Endémica. 2300-3300 m.

Países: ARG(CAT, LRI).

Chiliotrichum Cass.**Chiliotrichum diffusum** (G. Forst.)

Kuntze

Sin.: *Amellus diffusus* G. Forst., *Aster magellanicus* Spreng., hom. illeg., *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg., *Chiliotrichum amelloideum* Cass. var. *diffusum* (G. Forst.) Nees, *Chiliotrichum amelloideum* Cass. var. *lanceolatum* Nees, *Chiliotrichum amelloideum* Cass. var. *rosmarinifolium* (Less.) Nees, *Chiliotrichum angustifolium* Phil., *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze f. *angustifolium* Speg., *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze f. *medium* Speg., *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze f. *typicum* Speg., nom. illeg., *Chiliotrichum feliciae* Hombr. & Jacquinot ex Decne., *Chiliotrichum longifolium* Phil., *Chiliotrichum rosmarinifolium* Less., *Chiliotrichum tenue* Phil., *Chiliotrichum virgatum* Phil., *Tropidolepis diffusa* (G. Forst.) Tausch
Arbusto. Endémica. 0-2700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Chiliotrichum fuegianum (O. Hoffm.) Bonifacio
Sin.: *Chiliophyllum fuegianum* O. Hoffm.
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Chionolaena DC.

Chionolaena capitata (Baker) S.E. Freire
Sin.: *Achyrocline capitata* Baker
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chondrilla L.

Chondrilla juncea L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). CHL(BIO).

Chresta Vell. ex DC.

Chresta plantaginifolia (Less.) Gardner
Sin.: *Eremanthus plantaginifolius* (Less.) Baker, *Vernonia plantaginifolia* Less.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Chresta sphaerocephala DC.

Sin.: *Eremanthus sphaerocephalus* (DC.) Malme
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Chromolaena DC.

Chromolaena adenolepis (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium adenolepis* Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chromolaena amambayensis (Cabrera) M.A. Grossi, V.G. Salgado & D.G. Gut.
Sin.: *Eupatorium amambayense* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Chromolaena arnottiana (Griseb.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium arnottianum* Griseb.
Subarbusto. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Chromolaena ascendens (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ascendens* Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Chromolaena asperrima (Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium asperrimum* Baker, *Eupatorium asperrimum* Baker f. *pauciflorum* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Chromolaena barbacensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium barbacense* Hieron.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CHO).

Chromolaena caaguazuensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium caaguazuense* Hieron., *Eupatorium caaguazuense* Hieron. var. *crassifolium* Chodat, *Eupatorium caaguazuense* Hieron. var. *hirsutum* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Chromolaena callilepis (Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium callilepis* Baker
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Chromolaena christiana (Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium christianum* Baker, *Eupatorium laevigatum* B.L. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, BOQ,

CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Chromolaena congesta (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(LAV, MAL, RIV, TAC).

Chromolaena connivens (Rusby) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium cochabambense* Hieron., *Eupatorium connivens* Rusby
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(JUU, SAL).

Chromolaena cryptantha (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium cryptanthum* Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chromolaena cylindrocephala (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium cylindrocephalum* Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chromolaena diversifolia A.L. Christ
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chromolaena elliptica (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Chromolaena umbelliformis* (Dusén) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium ellipticum* Hook. & Arn., *Eupatorium umbelliforme* Dusén
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, PAI). URY(LAV, RIV).

Chromolaena ferruginea R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium charpinii* Cabrera, nom. illeg., *Eupatorium ferrugineum* Gardner, *Eupatorium ferrugineum* Gardner var. *paraguariense* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CHO, CON).

Chromolaena gentianoides (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Brickellia gentianoides* B.L. Rob., *Chromolaena oinopolepis* (Malme) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium oinopolepis* (Malme) Cabrera, *Eupatorium rhinanthaceum* DC. var. *oinopolepis* Malme
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Chromolaena hirsuta (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium bartsiiifolium* DC., *Eupatorium bartsiiifolium* DC. var. *trichophorum* (DC.) Baker, *Eupatorium congestum* Hook. & Arn. var. *hirsutum* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Eupatorium congestum* Hook. & Arn. var. *truncatum* Hassl., *Eupatorium hexanthum* DC., *Eupatorium hirsutum* Hook. & Arn., *Eupatorium hirsutum* Hook. & Arn. var. *triseriale* (Griseb.) Hieron., *Eupatorium hirsutum* Hook. & Arn. var. *triseriale* Hassl., *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn., *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. var. *hexanthum* (DC.) Malme, *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. var. *hirsutum* (Hook. & Arn.) Griseb., *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. var. *trichophorum* (DC.) Malme, *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. var. *triseriale* Griseb., *Eupatorium tozziifolium* DC. var. *subpetiolatum* Chodat, *Eupatorium trichophorum* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, COL, FLO, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Chromolaena hookeriana (Griseb.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Chromolaena jujuensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium ciliatum* Hook. & Arn., hom. illeg., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *ciliatum* (Hook. & Arn.) Hieron., *Eupatorium hookerianum* Griseb., *Eupatorium hookerianum* Griseb. var. *jujuense* (Hieron.) Cabrera, *Eupatorium jujuense* Hieron.
Arbusto. Nativa. 400-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Chromolaena ivifolia (L.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Chromolaena luquensis* (Chodat) R.M. King & H. Rob., *Chromolaena polyantha* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium affine* Hook. & Arn., *Eupatorium callilepis* Baker var. *oligocephalum* Griseb., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *affine* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium ivifolium* L., *Eupatorium ivifolium* L. var. *foliosum* Chodat, *Eupatorium ivifolium* L. var. *genuinum* Hassl., *Eupatorium ivifolium* L. var. *hirsutum* Hassl., *Eupatorium ivifolium* L. var. *perturbatum* B.L. Rob., *Eupatorium ivifolium* L. var. *pilcomayense* Hassl., *Eupatorium luquense* Chodat, *Eupatorium paucicapitulatum* Hieron.
Subarbusto. Nativa. 0-2100 m.

- Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
- Chromolaena kleinii** (Cabrera) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium kleinii* Cabrera
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chromolaena laevigata** (Lam.) R.M. King & H. Rob. var. **arenaria** (Baker) S.E. Freire & Ariza
Sin.: *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *arenarium* Baker
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). URY(CLA, COL, ROC).
- Chromolaena laevigata** (Lam.) R.M. King & H. Rob. var. **laevigata**
Sin.: *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *laevigatum*, *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *longepetiolatum* Hassl., *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *psiadiifolium* (DC.) Hassl., *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *squamulosum* Hieron., *Eupatorium psiadiifolium* DC.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, COL, PAY, RIV, SJO, SOR, TAC).
- Chromolaena laevigata** (Lam.) R.M. King & H. Rob. var. **submembranacea** (Hieron.) S.E. Freire & Ariza
Sin.: *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *submembranaceum* Hieron.
- Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL).
- Chromolaena latisquamulosa** (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium latisquamulosum* (Hieron.) Malme, *Eupatorium rhinanthaceum* DC. var. *latisquamulosum* Hieron.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chromolaena margaritensis** (Hassl.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium conyzoides* Vahl subsp. *margaritense* Hassl., *Eupatorium margaritense* (Hassl.) Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).
- Chromolaena maximiliani** (Schrud. ex DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium maximiliani* Schrad. ex DC.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chromolaena nervosa** (Chodat) A.L. Christ
Sin.: *Eupatorium caaguazuense* Hieron. var. *nervosum* Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, COA, MIE, SPE).
- Chromolaena odorata** (L.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium conyzoides* Mill., *Eupatorium conyzoides* Vahl, hom. illeg., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *paucidentatum* Baker, *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *pauciflorum* Baker, *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *scaberulum* Hassl., *Eupatorium odoratum* L. var. *odoratum*, *Eupatorium odoratum* L. var. *pauciflorum* Hieron.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).
- Chromolaena orbignyana** (Klatt) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Chromolaena densiflora* (Morong) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium densiflorum* Morong, *Eupatorium orbignyanum* Klatt, *Eupatorium oxylepis* DC. var. *densiflorum* (Morong) Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
- Chromolaena oxylepis** (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium ferrugineum* Gardner f. *parvifolium* Hack., *Eupatorium oxylepis* DC.
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).
- Chromolaena palmaris** (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium palmare* Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chromolaena paraguariensis** (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Chromolaena angusticeps* (Malme) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium angusticeps* Malme, *Eupatorium oxylepis* DC. subsp. *paraguariense* (Hieron.) Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(PAI).

Chromolaena pedunculosa (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Chromolaena foliata* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *foliatum* Sch. Bip. ex Baker, *Eupatorium foliatum* (Sch. Bip. ex Baker) Hieron., *Eupatorium foliatum* (Sch. Bip. ex Baker) Hieron. var. *incanum* Hieron., *Eupatorium paraguariense* Hieron., *Eupatorium pedunculosum* Hook. & Arn.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

Chromolaena punctulata (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium punctulatum* DC.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Chromolaena pungens (Gardner) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium pungens* Gardner
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chromolaena rhinanthacea (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium rhinanthaceum* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chromolaena rojasii (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium rojasii* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Chromolaena squalida (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium dichotomum* Sch. Bip. ex Miq., *Eupatorium ramosissimum* Gardner, *Eupatorium squalidum* DC. var. *squalidum*, *Eupatorium squalidum* DC. var. *subvelutinum* (DC.) Baker, *Eupatorium subvelutinum* DC., *Osmia ramosissima* (Gardner) Sch. Bip.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Chromolaena squarrosoramosa (Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Chromolaena oyadensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium oyadense* Hieron., *Eupatorium oyadense* Hieron. var. *paraguayense* Hieron., *Eupatorium squarrosoramosum* Hieron., *Eupatorium squarrulosum* Griseb., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, GUA, PAI, PHA, SPE).

Chromolaena squarrulosa (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ascendens* Sch. Bip. ex Baker var. *parcisetosum* B.L. Rob., *Eupatorium bracteatum* Hook. & Arn., *Eupatorium congestum* Hook. & Arn., *Eupatorium liatrideum* DC., *Eupatorium liatrideum* DC. var. *subcanum* DC., *Eupatorium squarrulosum* Hook. & Arn., *Eupatorium tozziifolium* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC).

Chromolaena stachyophylla (Spreng.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium clausenii* Gardner, *Eupatorium pulchrum* Gardner, *Eupatorium scaberrimum* Walp., *Eupatorium stachyophyllum* Spreng., *Eupatorium subalternifolium* DC.
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Chromolaena tecta (Gardner) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium tectum* Gardner
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chromolaena toldensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium toldense* Hieron.
Hierba. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Chromolaena tunariensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium conyzoides* Mill. var. *tunariense* Hieron., *Eupatorium tunariense* (Hieron.) B.L. Rob.
Subarbusto. Nativa. 1500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Chromolaena ulei (Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ulei* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Chromolaena verbenacea (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium rhodolepis* Chodat, *Eupatorium verbenaceum* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Chromolaena xylorrhiza (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium xylorrhizum* Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Chrysanthellum Rich.

Chrysanthellum indicum DC. subsp. **afroamericanum** B.L. Turner
Sin.: *Adenospermum tuberculatum* Hook. & Arn., *Chrysanthellum argentinum* Ariza & Cerana, *Chrysanthellum boliviense* Sch. Bip., nom. nud., *Chrysanthellum tuberculatum* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Chrysanthellum weberbaueri* I.C. Chung, *Hinterhubera kotschyi* Sch. Bip. ex Hochst., nom. nud., *Plagiocheilus erectus* Rusby
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR).
Notas: Citada para Uruguay (Ariza Espinar, 2000b) sin indicar localidad o material de referencia.

Chrysanthemoides Fabr.

Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl.
Sin.: *Osteospermum moniliferum* L.
Arbusto. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Chrysanthemum L.

Chrysanthemum coronarium L.
Sin.: *Glebionis coronaria* (L.) Cass. ex Spach, *Matricaria coronaria* (L.) Desr., *Xanthophthalmum coronarium* (L.) P.D. Sell
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, JFE). URY(CAS, MON).

Chrysanthemum segetum L.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(LLA).

Chrysolaena H. Rob.

Chrysolaena candelabrum (Chodat) Dematteis
Sin.: *Vernonia candelabrum* Chodat
Hierba. Endémica.
Países: PRY(CAU).

Chrysolaena cognata (Less.) Dematteis
Sin.: *Cacalia cognata* (Less.) Kuntze, *Vernonia cinerascens* Sch. Bip., nom. nud., *Vernonia cognata* Less., *Vernonia senecionea* Mart. ex DC., *Vernonia senecionea* Mart. ex DC. f. *calvata* Chodat, *Vernonia senecionea* Mart. ex DC. var. *adenocarpa* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(COL, RIV, TAC).

Chrysolaena cordifolia Dematteis
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS).

Chrysolaena cristobaliana Dematteis
Subarbusto. Nativa.
Países: PRY(AMA, CAN, SPE).

Chrysolaena desertorum (Mart. ex DC.) Dematteis
Sin.: *Cacalia desertorum* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Lessingianthus desertorum* (Mart. ex DC.) H. Rob., *Vernonia desertorum* Mart. ex DC., *Vernonia desertorum* Mart. ex DC. var. *longipes* Baker
Hierba. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(PAR).

Chrysolaena dusenii (Malme) Dematteis
Sin.: *Vernonia dusenii* Malme
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Chrysolaena flexuosa (Sims) H. Rob.
Sin.: *Cacalia flexuosa* (Sims) Kuntze, *Vernonia flexuosa* Sims, *Vernonia flexuosa* Sims var. *ensifolia* Hieron., *Vernonia flexuosa* Sims var. *glabra* Arechav., nom. nud., *Vernonia flexuosa* Sims var. *macrocephala* Hieron., *Vernonia flexuosa* Sims var. *microcephala* Hieron., *Vernonia montevidensis* Nees ex Otto & A. Dietr.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).

Chrysolaena guaranitica Dematteis
Sin.: *Vernonia desertorum* Mart. ex DC. var. *macrocephala* Chodat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CAN, CON).

Chrysolaena lithospermifolia (Hieron.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia desertorum* Mart. ex DC.
var. *polycephala* Chodat, *Vernonia lithospermifolia* Hieron.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Chrysolaena nicolackii H. Rob.

Subarbusto. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Chrysolaena obovata (Less.) Dematteis

Sin.: *Cacalia obovata* (Less.) Kuntze,
Chrysocoma herbacea Vell.,
Chrysolaena herbacea (Vell.) H. Rob.,
Vernonia chrysophylla Gardner,
Vernonia densevillosa Mart. ex DC.,
Vernonia herbacea (Vell.) Rusby,
Vernonia obovata Less., *Vernonia paucifolia* Rusby

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chrysolaena oligophylla (Vell.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia oligophylla* (Vell.) Kunth,
Chrysocoma oligophylla Vell.,
Vernonia hypochlora Malme

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chrysolaena platensis (Spreng.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia platensis* (Spreng.) Kuntze,
Conyza platensis Spreng., *Vernonia platensis* (Spreng.) Less., *Vernonia virens* Sch. Bip. ex Baker f. *robustior* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
URY(MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Chrysolaena propinqua (Hieron.) H.

Rob. var. **canescens** (Chodat)

Dematteis

Sin.: *Vernonia lepidifera* Chodat var. *canescens* Chodat,
Vernonia propinqua Hieron. var. *canescens* (Chodat) Dematteis

Hierba. Nativa. 100-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).
PRY(AMA, COA, PAI).

Chrysolaena propinqua (Hieron.) H.

Rob. var. **propinqua**

Sin.: *Vernonia lepidifera* Chodat, *Vernonia propinqua* Hieron.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAN, GUA, ITA, MIE, PHA, SPE).

Chrysolaena sceptrum (Chodat)

Dematteis

Sin.: *Vernonia cognata* Less. var. *sceptrum* (Chodat) Cabrera,
Vernonia sceptrum Chodat

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Chrysolaena simplex (Less.) Dematteis

Sin.: *Cacalia simplex* (Less.) Kuntze,
Lessingianthus simplex (Less.) H. Rob.,
Vernonia erigerontis Mart. ex DC., nom. nud.,
Vernonia simplex Less., *Vernonia simplex* Less. var. *angustifolia* Less.,
Vernonia simplex Less. var. *latifolia* Less.,
Vernonia simplex Less. var. *regnellii* Baker

Subarbusto. Nativa. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chrysolaena verbascifolia (Less.) H.

Rob.

Sin.: *Cacalia verbascifolia* (Less.) Kuntze,
Vernonia verbascifolia Less., *Vernonia verbascifolia* Less. var. *laxa* Arechav.,
nom. nud., *Vernonia verbascifolia*

Less. var. *robustior* Arechav., nom. nud.

Subarbusto. Endémica. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, COA, GUA, PAI).

Chuquiraga Juss.

Chuquiraga acanthophylla Wedd.

Sin.: *Chuquiraga punensis* Gaspar

Arbusto. Nativa. 3500-4000 m.

Países: ARG(JUJ).

Chuquiraga atacamensis Kuntze

Sin.: *Chuquiraga glabra* Phil., nom. illeg.

Arbusto. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Chuquiraga aurea Skottsb.

Sin.: *Chuquiraga erinacea* D. Don f. *pulvinata* Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Chuquiraga avellanadae Lorentz

Sin.: *Chuquiraga argentea* (Speg.) Speg. var. *dusenii* (O. Hoffm.) Speg.,
Chuquiraga avellanadae Lorentz var. *dusenii* (O. Hoffm.) Hosseus,
Chuquiraga dusenii O. Hoffm.,
Chuquiraga kingii Ball

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Chuquiraga calchaquina Cabrera

Arbusto. Endémica. 2300-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Chuquiraga echegarayi Hieron.

Arbusto. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(SJU).

Chuquiraga erinacea D. Don subsp. **erinacea**

Sin.: *Chuquiraga erinacea* D. Don var. *mollior* Lorentz, *Chuquiraga erinacea* D. Don var. *unguis-cati* (Ces.) Hauman, *Chuquiraga juniperina* Decne., *Chuquiraga juniperina* Phil., nom. illeg., *Chuquiraga unguis-cati* Ces.

Arbusto. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

Chuquiraga erinacea D. Don subsp. **hystrix** (Don) C. Ezcurra

Sin.: *Chuquiraga hystrix* D. Don

Arbusto. Endémica. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

Chuquiraga kuschelii Acevedo

Arbusto. Endémica. 2900-3900 m.

Países: CHL(AYP).

Chuquiraga longiflora (Griseb.) Hieron.

Sin.: *Chuquiraga chrysantha* Fielding & Gardner var. *longiflora* Griseb., *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *macrocephala* Wedd.

Arbusto. Nativa. 2500-3900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Chuquiraga morenonis (Kuntze) C. Ezcurra

Sin.: *Chuquiraga argentea* (Speg.) Speg., nom. illeg., *Chuquiraga spinosa* Less. var. *morenonis* Kuntze, *Doniophyton argenteum* Speg.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Chuquiraga oppositifolia D. Don

Sin.: *Barnadesia flavescens* Meyen, *Chuquiraga alpina* Poepp. ex Less.,

Chuquiraga chrysantha Fielding & Gardner, *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *angustifolia* Ces., *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *macrantha* J. Remy

Arbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Chuquiraga parviflora (Griseb.) Hieron.

Sin.: *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *microcephala* Wedd., *Chuquiraga spinosa* Less. var. *parviflora* Griseb.

Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Chuquiraga rosulata Gaspar

Arbusto. Endémica. 400-1800 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

Chuquiraga ruscifolia D. Don

Arbusto. Endémica. 1800-3500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Chuquiraga spinosa Less. subsp. **australis** C. Ezcurra

Arbusto. Nativa. 3500-4500 m.

Países: ARG(JUJ). CHL(ANT, ATA).

Chuquiraga spinosa Less. subsp. **rotundifolia** (Wedd.) C. Ezcurra

Sin.: *Chuquiraga rotundifolia* Wedd.

Hierba. Nativa. 3500-4500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Chuquiraga straminea Sandwith

Arbusto. Endémica. 600-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Chuquiraga ulicina (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. **acicularis** (D. Don) C. Ezcurra

Sin.: *Chuquiraga acicularis* D. Don, *Chuquiraga revoluta* Fielding & Gardner

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Chuquiraga ulicina (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. **ulicina**

Sin.: *Barnadesia ulicina* Hook. & Arn., *Chuquiraga incana* D. Don, *Chuquiraga incana* Phil., nom. illeg., *Chuquiraga ulicina* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. var. *incana* (Phil.) I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-1700 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cichorium L.

Cichorium endivia L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cichorium intybus L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(ART, CAS, MON, RNO).

Cirsium Mill.

Cirsium arvense (L.) Scop.

Sin.: *Serratula arvensis* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Sin.: *Carduus lanceolatus* L., *Carduus vulgaris* Savi, *Cirsium lanceolatum* (L.) Scop., *Cirsium vulgare* (Savi) Airy Shaw, comb. superfl.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). PRY(CAA, ÑEE). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Cladanthus Cass.**Cladanthus mixtus** (L.) Chevall.

Sin.: *Anthemis mixta* L., *Chamaemelum mixtum* (L.) All., *Ormenis mixta* (L.) Dumort.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, BIO). URY(CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TYT).

Clibadium F. Allam., nom. cons.**Clibadium armanii** (Balb.) Sch. Bip. ex O.E. Schulz

Sin.: *Clibadium rotundifolium* DC., *Eupatorium armanii* Balb.

Arbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, SPE).

Clibadium peruvianum Poepp. ex DC.

Sin.: *Clibadium heterotrichum* S.F. Blake, *Clibadium psilogynum* S.F. Blake, *Clibadium remotiflorum* O.E. Schulz, *Clibadium Vargasianum* H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Cnicothamnus Griseb.**Cnicothamnus azafran** (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Cnicothamnus lorentzii* Griseb. var. *azafran* Cabrera

Arbusto o arbolito. Nativa. 1300-2200 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY).

Cnicothamnus lorentzii Griseb.

Sin.: *Lefrovia rhaponticoides* Franch.

Arbusto o arbolito. Nativa. 500-1400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Coleostephus Cass.**Coleostephus myconis** (L.) Cass.

Sin.: *Chrysanthemum myconis* L., *Coleostephus myconis* (L.) Rchb. f., *Kremeria myconis* (L.) Maire, *Leucanthemum myconis* (L.) Giraud, *Matricaria myconis* (L.) Desr., *Myconella myconis* (L.) Sprague, *Myconia myconis* (L.) Briq. & Cavill., *Pyrethrum myconis* (L.) Moench

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, ARA, AIS). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, SJO).

Conyza Less., nom. cons.**Conyza andina** J. Remy

Sin.: *Conyza arvensis* Phil., *Conyza dumetorum* Phil., *Conyza hirtella* (DC.) Martic., nom. illeg., *Erigeron hirtellus* DC.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Conyza arabidifolia J. Remy

Sin.: *Conyza asperula* Phil., *Conyza coxi* Phil., *Conyza paulsenii* Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Conyza blakei (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Erigeron blakei* Cabrera, *Erigeron bonariensis* L. f. *filifolia* Chodat, *Erigeron montevidensis* Baker, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MIS, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC).

Conyza boelckei Cabrera

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU).

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. **angustifolia** (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Conyza linearis* DC., *Erigeron bonariensis* L. var. *angustifolius* Cabrera

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(CEN). URY(MON).

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. **bonariensis**

Sin.: *Conyza hispida* Kunth, *Conyza plebeja* Phil., *Erigeron bonariensis* L., *Erigeron bonariensis* L. f. *grisea* Chodat, *Marsea bonariensis* (L.) V.M. Badillo

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, IDE, JFE, IPA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Conyza burkartii Zardini

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

Conyza bustillosiana J. Remy

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL, RME).

Conyza catharinensis Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Conyza copiapina Phil.

Hierba. Endémica. 200-1500 m.

Países: CHL(ATA).

Conyza cordata Kuntze

Sin.: *Conyza chilensis* Spreng. var. *auriculata* Griseb., *Erigeron cordatus* (Kunth) Cabrera

Hierba. Endémica. 1000-2700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Conyza coronopifolia Kunth

Sin.: *Conyza obtusa* Kunth

Hierba. Nativa. 3000-3500 m.

Países: ARG(JUJ).

Conyza depilis Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(BIO).

Conyza deserticola Phil.

Sin.: *Conyza punensis* Cabrera, *Erigeron cinarescens* Sch. Bip. ex Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Conyza foliosa Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ARA).

Conyza gayana Phil.

Sin.: *Conyza araucana* Phil., *Conyza canescens* Phil., *Conyza consanguinea* Phil., *Conyza monticola* Phil., *Conyza vulgaris* Phil., hom. illeg., *Erigeron consanguineus* (Phil.) Cabrera, *Erigeron stenophyllus* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Conyza glabrata Phil.

Hierba. Endémica. 1000

Países: CHL(RME).

Conyza glandulitecta Cabrera

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, GUA).

Conyza laevigata (Rich.) Pruski

Sin.: *Conyza apurensis* Kunth, *Conyza subspathulata* Cronquist, *Erigeron apurensis* (Kunth) Griseb., *Erigeron laevigatus* Rich., *Erigeron spathulatus* Vahl, *Marsea spathulata* (Vahl) V.M. Badillo

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SLU).

Conyza larrainiana J. Remy

Sin.: *Conyza conglomerata* Phil., *Conyza pratensis* Phil., *Erigeron larrainianus* (J. Remy) Cabrera

Hierba o subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LLA, AIS, MAG).

Conyza lateralis Phil.

Hierba. Endémica. 500-600 m.

Países: CHL(COQ, RME).

Conyza lechleri (Sch. Bip.) Cabrera

Sin.: *Erigeron lechleri* Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 500-2100 m.

Países: ARG(CHU, COR, LPA, LRI, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

Conyza lorentzii Griseb.

Sin.: *Erigeron lorentzii* (Griseb.) Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(RNO).

Conyza macrophylla Spreng.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, PAY, ROC, TAC).

Conyza magnimontana Cabrera

Hierba. Endémica. 0-3200 m.

Países: ARG(RNE, SJU).

Conyza monorchis (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Erigeron monorchis* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TAC).

Conyza neolaxiflora A.M. Teles & Stehmann

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Conyza oligantha Cabrera

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, SCR).

Conyza pampeana (Parodi) Cabrera

Sin.: *Erigeron pampeanus* Parodi

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, COL, FLO, FLA, LAV, PAY, SJO, SOR, TAC).

Conyza pencana Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO).

Conyza primulifolia (Lam.) Cuatrec. & Lourteig

Sin.: *Conyza chilensis* Spreng., *Conyza chilensis* Spreng. var. *carnea* Chodat & Hassl., *Conyza chilensis* Spreng. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Conyza chilensis* Spreng. var. *integrifolia* Phil., *Conyza myosotifolia* Kunth, *Conyza notobellidiastrum* Griseb. var. *oblongifolia* Griseb., *Conyza scabiosifolia* J. Remy, *Conyza yungasensis* Rusby, *Erigeron chilensis* (Spreng.) D. Don ex G. Don, *Inula primulifolia* Lam., *Marsea chilensis* (Spreng.) Kuntze, *Marsea chilensis* (Spreng.) V.M. Badillo, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA). PRY(APY, CAU, CAN, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY,

RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Conyza reitziana Cabrera

Hierba. Endémica. 1400-1700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Conyza retirensis Cabrera

Hierba. Endémica. 1600

Países: BRA(SCA).

Conyza saltensis Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SAL, SJU).

Conyza serrana Cabrera

Sin.: *Erigeron platensis* Speg.

Hierba. Endémica. 500-1600 m.

Países: ARG(BAI, COS, JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS). URY(SJO).

Conyza spiciformis (Griseb.) Zardini

Sin.: *Erigeron spiciformis* Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Conyza spiculosa (Hook. & Arn.) Zardini

Sin.: *Conyza colinensis* Phil., *Conyza patens* Phil., *Erigeron colinensis* Phil., *Erigeron spiculosus* Hook. & Arn., *Erigeron spinulosum* Hook. & Arn. var. *umbrosa* Phil.

Hierba. Nativa.

Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Conyza stenophylla Phil.

Sin.: *Conyza armeriifolia* Phil., *Conyza linifolia* Phil., hom. illeg., *Erigeron flagellifolius* Cabrera

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Conyza suffruticosa Phil.

Hierba. Nativa.

Países: CHL(RME).

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho

Sin.: *Conyza bilbaoana* J. Remy, *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *leiotheca* (S.F. Blake) Cuatrec., *Conyza elata* Kunth & Bouché, *Conyza floribunda* Kunth, *Conyza floribunda* Kunth var. *laciniata* Cabrera, *Conyza myriocephala* J. Remy, *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker var. *floribunda* (Kunth) J.B. Marshall, *Erigeron bilbaoanus* (J. Remy) Cabrera, *Erigeron bonariensis* L. f. *glabratus* Speg., *Erigeron bonariensis* L. var. *floribundus* (Kunth) Cuatrec., *Erigeron bonariensis* L. var. *leiothecus* S.F. Blake, *Erigeron floribundus* (Kunth) Sch. Bip., *Marsea bonariensis* (L.) V.M. Badillo var. *leiotheca* (S.F. Blake) V.M. Badillo

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, FLA, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**

Sin.: *Conyza albida* Willd. ex Spreng., *Conyza altissima* Naudin ex Debeaux, *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist f. *subleiotheca* Cuatrec., *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *microcephala* (Cabrera) Cabrera, *Conyza erigeroides* DC., *Conyza floribunda* Kunth var. *subleiotheca* (Cuatrec.) J.B. Marshall, *Erigeron albidus* (Spreng.) Herter, comb. superfl., *Erigeron albidus* (Willd. ex

Spreng.) A. Gray, *Erigeron bonariensis* L. var. *microcephalus* Cabrera, *Erigeron sumatrensis* Retz.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA). URY(MON, SOR).

Conyza tenera Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL).

Conyza thamarum Phil.

Sin.: *Erigeron thamarum* (Phil.) Cabrera

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Conyza tunariensis (Kuntze) Zardini

Sin.: *Erigeron tunariensis* Kuntze

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Conyza valdiviana Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LLA).

Coreopsis L.

Coreopsis fasciculata Wedd.

Hierba. Nativa. 2800-4200 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet

Hierba. Introducida.

Países: ARG(LPA).

Coreopsis lanceolata L.

Sin.: *Coreopsoides lanceolata* (L.) Moench

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, LPA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(SAO).

Coreopsis suaveolens Sherff

Subarbusto. Endémica. 3400-3800 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Coreopsis tinctoria Nutt.

Sin.: *Calliopsis tinctoria* (Nutt.) DC.,

Diplosastera tinctoria (Nutt.) Tausch

Hierba. Introducida. 200-500 m.

Países: ARG(COR, LPA, MIS, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cosmos Cav.

Cosmos bipinnatus Cav.

Sin.: *Cosmos bipinnatus* Cav. var. *exaristatus* DC.

Hierba. Introducida. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, SAL). BRA(RGS).

Cosmos peucedanifolius Wedd. var. **peucedanifolius**

Sin.: *Bidens peucedanifolia* (Wedd.) Kuntze, *Cosmos marginatus* Klatt

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cosmos peucedanifolius Wedd. var. **tiraquensis** (Kuntze) Sherff

Sin.: *Bidens peucedanifolia* (Wedd.) Kuntze var. *tiraquensis* Kuntze, *Cosmos subpubescens* Wedd.

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Cosmos sulphureus Cav.

Sin.: *Bidens artemisiifolia* Poepp. & Endl. var. *sulphurea* (Cav.) Kuntze, *Bidens sulphurea* (Cav.) Sch.Bip., *Coreopsis artemisiifolia* Jacq., *Coreopsis artemisiifolia* Sessé & Moç., *Cosmea*

sulphurea Willd., nom. inval., *Cosmos aurantiacus* Klatt, *Cosmos gracilis* Sherff, *Cosmos sulphureus* Cav. var. *exaristatus* Sherff, *Cosmos sulphureus* Cav. var. *hirsuticaulis* Sherff

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Cotula L.

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.

Sin.: *Anacyclus australis* Sieber ex Spreng., *Cotula membranacea* D.G. Lloyd, *Lancisia australis* (Sieber ex Spreng.) Rydb., *Leptinella tenella* (A. Cunn.) D. G. Lloyd & C. J. Webb, *Soliva tenella* A. Cunn., *Strongylosperma australe* (Sieber ex Spreng.) Less.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, IDE, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, COL, MON, SJO, SOR, TAC).

Cotula coronopifolia L.

Sin.: *Cotula montevidensis* Spreng., *Lancisia coronopifolia* (L.) Rydb.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, IDE, JFE). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).

Cotula mexicana (DC.) Cabrera

Sin.: *Cotula cabreræ* Caro, *Cotula minuta* (L. f.) Schinz, nom. illeg., *Cotula pedicellata* (Ruiz & Pav.) Cabrera,

nom. illeg., *Cotula pygmaea* (Kunth) Benth. & Hook. ex Hemsl, nom. illeg., *Gymnostyles minuta* (L. f.) Spreng., *Gymnostyles peruviana* Spreng., nom. illeg., *Hippia minuta* L. f., *Lancisia minuta* (L. f.) Rydb., *Soliva mexicana* DC., *Soliva minuta* (L. f.) Sweet, *Soliva pedicellata* Ruiz & Pav., *Soliva pedunculata* Ruiz & Pav. ex Steudel, nom. inval., *Soliva pygmaea* Kunth

Hierba. Nativa. 3500-4400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

Crepis L.

Crepis capillaris (L.) Wallr.

Sin.: *Crepis virens* L., nom. illeg., *Lapsana capillaris* L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS).

Crepis foetida L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA).

Crepis pulchra L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR). CHL(LBO, MAU, BIO).

Crepis setosa Hallier f.

Sin.: *Barkhausia setosa* (Haller f.) DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, RNE, SFE). BRA(RGS). CHL(ARA). URY(COL, SOR).

Crepis vesicaria L. subsp. **taraxacifolia** (Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller

Sin.: *Barkhausia haenseleri* Boiss. ex DC., *Crepis taraxacifolia* Thuill., *Crepis taraxacifolia* Thuill. subsp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) Nyman, *Crepis vesicaria* L. subsp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) P.D. Sell

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(BIO, ARA).

Criscia Katinas

Criscia stricta (Spreng.) Katinas

Sin.: *Onoseris stricta* Spreng., *Perezia pampeana* Speg., *Trixis stricta* (Spreng.) Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Critonia P. Browne

Critonia arachnoidea (Legname) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium arachnoideum* Legname

Árbol. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ).

Critonia megaphylla (Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium megaphyllum* Baker

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Critonia morifolia (Mill.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium morifolium* Mill.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Critoniopsis Sch. Bip.

Critoniopsis quinqueflora (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia quinqueflora* Less.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cuatrecasasiella H. Rob.

Cuatrecasasiella argentina (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Luciliopsis argentina* Cabrera

Hierba. Nativa. 2500-4300 m.

Países: ARG(JUJ, LRI). CHL(AYP, TAR, ANT).

Culcitium Bonpl.

Culcitium humile DC.

Sin.: *Culcitium glaciale* Meyen & Walp., *Senecio anacephalus* Griseb., *Senecio candollei* Wedd., *Senecio glacialis* (Meyen & Walp.) Cuatrec., *Senecio mandonianus* Wedd.

Hierba. Nativa. 3500-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Culcitium nivale Kunth

Sin.: *Culcitium haenkei* Wedd., hom. illeg., *Senecio haenkeanus* Cuatrec.

Hierba. Nativa. 4500-5000 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Culcitium oligocephalum Cabrera

Sin.: *Culcitium albifolium* Zoellner, *Senecio keshua* Cabrera, *Senecio zoellneri* Martic. & Quezada

Hierba. Endémica. 3200-5000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR).

Cyclolepis Gillies ex D. Don

Cyclolepis genistoides Gillies ex D. Don
Sin.: *Gochnatia genistoides* (D. Don) Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 900-1900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Cynara L.

Cynara cardunculus L.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE, IPA). URY(CAS, MON, PAY, RNO, SOR).

Cyrtocymura H. Rob.

Cyrtocymura cincta (Griseb.) H. Rob.
Sin.: *Cacalia cincta* (Griseb.) Kuntze, *Vernonia cincta* Griseb., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *cincta* (Griseb.) Cabrera
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob.
Sin.: *Cacalia scorpioides* (Lam.) Kuntze, *Chrysocoma repanda* Vell., *Conyza scorpioides* Lam., *Lepidaploa*

scorpioides (Lam.) Cass., *Vernonia arborescens* (L.) Sw. var. *corrientensis* Hieron., *Vernonia centriflora* Link & Otto, *Vernonia flavescens* Less., *Vernonia lanuginosa* Gardner, *Vernonia longeracemosa* Mart. ex DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *longeracemosa* DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *longifolia* DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *subrepanda* (Pers.) DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *subtomentosa* DC., *Vernonia subrepanda* Pers., *Vernonia tournefortioides* Kunth
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL).

Dahlia Cav.

Dahlia pinnata Cav.
Sin.: *Dahlia pinnata* Cav. var. *nana* B.D. Jacks., *Dahlia pinnata* Cav. var. *variabilis* Voss., *Dahlia sambucifolia* Salisb., *Dahlia superflua* W.T. Aiton, *Dahlia variabilis* Desf., nom. superfl., *Georgina superflua* DC., nom. superfl., *Georgina variabilis* Willd.
Hierba. Introducida. 1000-1500 m.
Países: ARG(COR, SAL).

Dasyanthina H. Rob.

Dasyanthina palustris (Gardner) H. Rob.
Sin.: *Vernonia palustris* Gardner
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APA, AMA, CEN).

Dasycondylus R.M. King & H. Rob.

Dasycondylus debeauxii (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium debeauxii* B.L. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dasycondylus dusenii R.M. King & H. Rob.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Dasycondylus resinosus (Spreng.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Mikania resinosa* Spreng.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dasyphyllum Kunth

Dasyphyllum armatum (J. Kost.) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga armata* J. Kost., *Flotovia armata* (J. Kost.) Tovar
Arbusto. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera var. **brasiliense**
Sin.: *Carthamus fluminensis* Vell., *Chuquiraga brasiliensis* (Spreng.) Kuntze, *Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker, *Chuquiraga racemosa* Baker, *Flotovia brasiliensis* (Spreng.) Cabrera ex Tovar, *Flotovia glabra* Spreng., *Ioannea brasiliensis* Spreng., *Johannia brasiliensis* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.)
Cabrera var. **divaricatum** (Griseb.)
Cabrera
Sin.: *Barnadesia divaricata* Griseb.,
Chuquiraga brasiliensis (Spreng.)
Kuntze var. *divaricata* (Griseb.)
Kuntze, *Flotovia divaricata* (Griseb.)
Hieron.
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Dasyphyllum donianum (Gardner)
Cabrera
Sin.: *Chuquiraga doniana* (Gardner)
Baker, *Chuquiraga latifolia* (Gardner)
Baker, *Dasyphyllum latifolium*
(Gardner) Cabrera, *Flotovia doniana*
Gardner, *Flotovia latifolia* Gardner
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Dasyphyllum flagellare (Casar.) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga regnelli* Baker, *Flotovia*
flagellans Casar., *Flotovia regnellii*
Sch. Bip., nom. nud.
Arbusto. Nativa. 700-2100 m.
Países: BRA(PAR).

Dasyphyllum floribundum (Gardner)
Cabrera
Sin.: *Chuquiraga floribunda* (Gardner)
Baker, *Flotovia floribunda* Gardner
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA).

Dasyphyllum inerme (Rusby) Cabrera
Sin.: *Barnadesia inermis* Rusby
Arbusto. Nativa. 700-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Dasyphyllum lanceolatum (Less.)
Cabrera
Sin.: *Chuquiraga synacantha* Baker,
Dasyphyllum synacanthum (Baker)
Cabrera, *Flotovia lanceolata* Less.,

Flotovia synacantha Sch. Bip., nom.
nud.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Dasyphyllum maria-lianae Zardini &
Soria
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(GUA, SPE).

Dasyphyllum spinescens (Less.)
Cabrera
Sin.: *Chuquiraga spinescens* (Less.)
Baker, *Flotovia spinescens* Less.
Árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CLA).

Dasyphyllum sprengelianum (Gardner)
Cabrera
Sin.: *Chuquiraga chapadensis* S. Moore,
Chuquiraga mattogrossensis Malme,
Chuquiraga sprengeliana (Gardner)
Baker, *Chuquiraga sprengeliana*
(Gardner) Baker f. *mattogrossensis*
(Malme) Hassl., *Chuquiraga*
sprengeliana (Gardner) Baker f.
paraguariensis Hassl., *Chuquiraga*
sprengeliana (Gardner) Baker f.
subinermis Hassl., *Chuquiraga*
sprengeliana (Gardner) Baker var.
chapadensis (S. Moore) Hassl.,
Flotovia sprengeliana Gardner
Arbusto. Nativa. 300-1500 m.
Países: PRY(AMA).

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.)
Cabrera var. **multiflorum** (Baker)
Cabrera
Sin.: *Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker
var. *multiflora* Baker
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.)
Cabrera var. **tomentosum**
Sin.: *Chuquiraga paniculata* D. Don,
Chuquiraga tomentosa (Spreng.)
Baker, *Flotovia paniculata* (D. Don)
DC., *Flotovia tomentosa* Spreng.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Dasyphyllum vagans (Gardner) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga vagans* (Gardner) Baker,
Flotovia vagans Gardner
Arbusto. Nativa. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Dasyphyllum varians (Gardner) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker
var. *hassleriana* (Chodat) Chodat,
Chuquiraga glabra (Spreng.) Baker
var. *rectispina* Chodat, *Chuquiraga*
glabra (Spreng.) Baker var. *variens*
(Gardner) Baker, *Chuquiraga*
hassleriana Chodat, *Chuquiraga*
variens (Gardner) Rusby, *Dasyphyllum*
brasiliense (Spreng.) Cabrera var.
variens Cabrera, *Flotovia variens*
Gardner
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CAU, CEN,
CON, COA, PAI, SPE).

Delairea Lem.

Delairea aparadensis Funez & Hassemer
Hierba. Endémica. 1700-1800 m.
Países: BRA(SCA).

Delairea odorata Lem.

Sin.: *Senecio mikanioides* Otto ex Walp.,
Senecio scandens DC., hom. illeg.
Hierba. Introducida. 200-600 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA).
CHL(VAL, BIO, LSR, LLA, JFE).
URY(CAS, MON).

Delilia Spreng.

Delilia biflora (L.) Kuntze

Sin.: *Delilia berteroi* Spreng., *Elvira biflora* (L.) DC., *Elvira martyni* Cass., nom. superfl., *Meratia sprengelii* Cass., nom. superfl., *Milleria biflora* L.
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Dendrophorbium (Cuatrec.) C. Jeffrey

Dendrophorbium bomanii (R.E. Fr.) C. Jeffrey
Sin.: *Senecio bomanii* R.E. Fr.
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Dendrophorbium brachycodon (Baker) C. Jeffrey
Sin.: *Senecio brachycodon* Baker
Subarbusto. Endémica. 900
Países: BRA(PAR).

Dendrophorbium bradei (Cabrera) C. Jeffrey
Sin.: *Senecio bradei* Cabrera
Arbusto a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dendrophorbium catharinense (Dusén ex Cabrera) C. Jeffrey
Sin.: *Senecio catharinensis* Dusén ex Cabrera
Hierba. Endémica. 700
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Dendrophorbium fruticosus (Vell.) C. Jeffrey
Sin.: *Senecio fruticosus* Vell.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dendrophorbium limosum C. Jeffrey
Sin.: *Senecio limosus* Dusén ex Malme, hom. illeg.
Enredadera. Endémica. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dendrophorbium paranense (Malme) Matezenb. & Baptista
Sin.: *Senecio paranensis* Malme
Hierba. Endémica. 1200-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dendrophorbium peregrinum (Griseb.) C. Jeffrey
Sin.: *Senecio peregrinus* Griseb.
Arbusto. Nativa. 400-800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Dendrophorbium pluricephalum (Cabrera) C. Jeffrey
Sin.: *Dendrophorbium missionum* (Cabrera) C. Jeffrey, *Senecio missionum* Cabrera, *Senecio myriocephalus* Baker, hom. illeg., *Senecio pluricephalus* Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, PAI).

Dendrophorbium subnemorale (Dusén) A. Teles
Sin.: *Senecio melloi* Cabrera, nom. superfl., *Senecio subnemoralis* Dusén
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dimerostemma Cass.

Dimerostemma annuum (Hassl.) H. Rob.
Sin.: *Oyedaea annua* Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Dimerostemma apense (Chodat) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum apense* (Chodat) A.A. Sáenz, *Angelphytum apense* (Chodat) Pruski, comb. superfl., *Aspilia apensis* Chodat, *Wedelia apensis* (Chodat) B.L. Turner, *Zexmenia apensis* (Chodat) Hassl.

Hierba. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). PRY(AMA, COA).

Dimerostemma arnottii (Baker) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum arnottii* (Baker) H. Rob., *Angelphytum oppositifolium* (A.A. Sáenz) H. Rob., *Angelphytum paraguariense* (Chodat) H. Rob., *Dimerostemma oppositifolia* (A.A. Sáenz) M.D. Moraes, *Verbesina arnottii* Baker, *Verbesina arnottii* Baker f. *gracilis* Chodat, *Verbesina arnottii* Baker f. *scabriuscula* Chodat, *Verbesina arnottii* Baker var. *angustifolia* Chodat, *Verbesina arnottii* Baker var. *oblongifolia* Chodat, *Verbesina arnottii* Baker var. *tomentosa* Chodat, *Verbesina paraguariensis* Chodat, *Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl., *Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f. *angustifolia* Hassl., *Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f. *calvescens* Hassl., *Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f. *graminifolia* Hassl., *Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f. *intermedia* Hassl., *Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f. *macrocephala* Hassl., *Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f. *sericea* Hassl., *Zexmenia oppositifolia* A.A. Sáenz, *Zexmenia paraguariensis* (Chodat) S.F. Blake
Subarbusto. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, RNO, RIV).

Dimerostemma aspilioides (Griseb.)
M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum aspilioides* (Griseb.) H. Rob., *Verbesina aspilioides* Griseb., *Zexmenia aspilioides* (Griseb.) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON).

Dimerostemma grisebachii (Baker) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum grisebachii* (Baker) H. Rob., *Verbesina grisebachii* Baker, *Zexmenia grisebachii* (Baker) Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, PAI, PHA).

Dimerostemma hieronymi (Hassl.) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum hieronymi* (Hassl.) H. Rob., *Zexmenia hieronymi* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Dimerostemma indutum (Chodat) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum indutum* (Chodat) H. Rob., *Aspilina induta* Chodat, *Zexmenia induta* (Chodat) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: PRY(CAU, CEN, COA, GUA).

Dimerostemma myrtifolium (Chodat) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum myrtifolium* (Chodat) H. Rob., *Verbesina myrtifolia* Chodat, *Zexmenia myrtifolia* (Chodat) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Dimerostemma pseudosilphioides (Hassl.) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum pseudosilphioides* (Hassl.) H. Rob., *Zexmenia pseudosilphioides* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Dimerostemma reitzii (H. Rob.) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum hatschbachii* H. Rob., *Angelphytum reitzii* H. Rob., *Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f. *angustissima* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA).

Dimerostemma tenuifolium (Hassl.) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum tenuifolium* (Hassl.) H. Rob., *Zexmenia tenuifolia* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(RGS). PRY(PHA).

Dinoseris Griseb.**Dinoseris salicifolia** Griseb.

Sin.: *Dinoseris salicifolia* Griseb. var. *araneosa* Kuntze, *Dinoseris salicifolia* Griseb. var. *normalis* Kuntze, nom. superfl., *Hyaloseris boliviensis* J. Kost., *Hyaloseris salicifolia* (Griseb.) Hieron.
Arbusto. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, TUC).

Diplostephium Kunth**Diplostephium cinereum** Cuatrec.

Arbusto. Nativa. 3600-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Diplostephium meyenii Wedd.

Sin.: *Aster trachyticus* Phil.
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Diplostephium paposanum S.T. Ibáñez & Muñoz-Schick

Arbusto. Endémica. 500-600 m.
Países: CHL(ANT).

Diplostephium tacorense Hieron.

Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: CHL(ATA).

Disynaphia Hook. & Arn. ex DC.**Disynaphia calyculata** (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Disynaphia montevidensis* DC., *Eupatorium calycinum* Sch. Bip. ex Baker, nom. illeg., *Eupatorium calyculatum* Hook. & Arn., *Stevia calycina* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).

Disynaphia ericoides (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ericoides* DC.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS). URY(RIV).

Disynaphia filifolia (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium filifolium* Hassl., *Eupatorium filifolium* Hassl. var. *longifolium* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CON, SPE).

Disynaphia ligulifolia (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium gnidioides* DC.,
Eupatorium ligulifolium Hook. & Arn.
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Disynaphia littoralis (Cabrera) R.M. King
& H. Rob.

Sin.: *Eupatorium littorale* Cabrera
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Disynaphia multicrenulata (Sch. Bip. ex
Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Disynaphia achillaea* (Chodat) R.M.
King & H. Rob., *Eupatorium achillaea*
Chodat, *Eupatorium multicrenulatum*
Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE,
PAI, SPE). URY(TAC).

Disynaphia radula (Chodat) R.M. King &
H. Rob.

Sin.: *Eupatorium radula* Chodat,
Eupatorium radula Chodat var.
obtusifolium Chodat, *Eupatorium*
radula Chodat var. *serratum* Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CAU, SPE).

Disynaphia senecioneoidea (Baker)
R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium senecionideum* Baker
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Disynaphia spatulata (Hook. & Arn.)
R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Disynaphia albissima* (Hassl.) R.M.
King & H. Rob., *Eupatorium*
albissimum Hassl., *Eupatorium*
halimifolium DC., *Eupatorium*
spatulatum Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU).

Disynaphia tacuarembensis (Hieron. &
Arechav.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium tacuarembense* Hieron.
& Arechav.
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: URY(TAC).

Disynaphia variolata (B.L. Rob.) R.M.
King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium variolatum* B.L. Rob.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Dittrichia Greuter

Dittrichia graveolens (L.) Greuter

Sin.: *Erigeron graveolens* L.
Hierba. Introducida. 600-700 m.
Países: CHL(RME).

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

Sin.: *Erigeron viscosus* L.
Arbusto. Introducida. 0-400 m.
Países: CHL(VAL).

Dolichlasium Lag.

Dolichlasium lagascae D. Don

Sin.: *Dolichlasium glanduliferum* Lag. ex
Hook. & Arn., nom. superfl., *Trixis*
glandulifera Benth. & Hook. f. ex
Hieron.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(LPA, LRI, MEN, NEU,
SJU, SCR).

Doniophyton Wedd.

Doniophyton anomalum (D. Don) Kurtz

Sin.: *Chuquiraga anomala* D. Don,
Chuquiraga patagonica Phil.,
Doniophyton andicolum Wedd.,
Doniophyton flavescens Suess.,
Doniophyton patagonicum (Phil.)
Hieron.
Subarbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA,
MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU).
CHL(ARA, RME).

Doniophyton weddellii Katinas &
Stuessy

Subarbusto. Endémica. 1900-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
NEU, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA,
COQ, RME).

Duseniella K. Schum.

Duseniella patagonica (O. Hoffm.) K.
Schum.

Sin.: *Dusenienia patagonica* O. Hoffm.,
Duseniella bicolor Suess.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU,
RNE, SCR).

Dyssodia Cav.

Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc.

Sin.: *Boebera chrysanthemoides* Willd.,
nom. superfl., *Boebera ciliata* Rydb.,
Boebera glandulosa Pers., nom. illeg.,
Boebera papposa (Vent.) Rydb.,
Boebera roseata Rydb., *Dyssodia*
chrysanthemifolia Steud., nom.
superfl., *Dyssodia chrysanthemoides*
(Willd.) Lag., *Dyssodia ciliata* (Rydb.)
Standl., *Dyssodia fastigiata* DC.,
Dyssodia roseata (Rydb.) Gentry,

nom. superfl., *Tagetes papposa* Vent.,
Tagetes pumila Willd., nom. illeg.
 Hierba. Introducida. 1000-3000 m.
 Países: ARG(JUU).

Eclipta L., nom. cons.

Eclipta elliptica DC.

Sin.: *Wollastonia prostrata* DC.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI).
 BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS,
 CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO,
 ROC, SJO, SOR).

Eclipta megapotamica (Spreng.) Sch.

Bip. ex S.F. Blake
 Sin.: *Eclipta lanceolata* DC., *Verbesina*
megapotamica Spreng.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI).
 BRA(RGS).

Eclipta prostrata (L.) L.

Sin.: *Eclipta alba* (L.) Hassk., *Eclipta*
erecta L., nom. illeg., *Galinsoga*
oblongifolia (Hook.) DC., *Polygyne*
inconspicua Phil., *Spilanthes*
wedelioides Hook. & Arn., *Verbesina*
alba L., *Verbesina conyzoides* Trew,
Verbesina prostrata L., *Wiborgia*
oblongifolia Hook.
 Hierba. Nativa. 0-2000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS,
 SAL, SJU, SFE, SDE, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL,
 MAU, RME). PRY(APA, APY, AMA,
 BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA,
 MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART,
 COL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC,
 SAO, SJO, SOR).

Egletes Cass.

Egletes viscosa (L.) Less.

Sin.: *Cotula viscosa* L.
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL).
 BRA(PAR). PRY(APY, BOQ, ÑEE,
 PHA).

Elephantopus L.

Elephantopus micropappus Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR).

Elephantopus mollis Kunth

Sin.: *Elephantopus cernuus* Vell.,
Elephantopus cervinus Vell.,
Elephantopus hypomalacus S.F.
 Blake, *Elephantopus pilosus* Philipson
 Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI,
 FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
 AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,
 COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
 URY(ART, RIV, TAC).

Elephantopus palustris Gardner

Sin.: *Elephantopus vaginatus* Gardner
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,
 SPE).

Eleutheranthera Poit.

Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.

Bip.
 Sin.: *Melampodium ruderale* Sw.
 Hierba. Introducida.
 Países: BRA(PAR).

Emilia Cass.

Emilia fosbergii Nicolson

Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN,
 CEN, COA, GUA).

Emilia sonchifolia (L.) DC.

Sin.: *Cacalia sonchifolia* L.
 Hierba. Introducida.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Encelia Adans.

Encelia canescens Lam. var. **canescens**

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1500
 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
 COQ).

Encelia canescens Lam. var. **oblongifolia** (DC.) S.F. Blake

Sin.: *Encelia oblongifolia* DC.
 Subarbusto. Endémica. 0-2700 m.
 Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Encelia canescens Lam. var. **parvifolia** (Kunth) Ball

Sin.: *Encelia canescens* Lam. var.
lanuginosa I.M. Johnst., *Encelia*
canescens Lam. var. *tomentosa*
 (Walp.) Ball, *Encelia parvifolia* Kunth,
Encelia tomentosa Walp.
 Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.
 Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Enydra Lour.

Enydra anagallis Gardner

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
 ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,

CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA).
URY(CAS, CLA, COL, ROC, SJO).

Enydra sessilis (Sw.) DC.

Sin.: *Eclipta sessilis* Sw.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA).
URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).

Erechtites Raf.

Erechtites albiflorus (Sch. Bip.)

Hassemer & Funez

Sin.: *Cacalia prenanthoides* Kunth,
Erechtites petiolatus Benth., *Erechtites prenanthoides* (Kunth) Greenm. & Hieron., hom. illeg., *Erechtites valerianifolius* (Link ex Spreng.) Less. ex DC. f. *prenanthoides* (Kunth) Cuatrec. ex Belcher, *Senecio albiflorus* Sch. Bip., *Senecio lactuoides* Klatt, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 800-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Erechtites goyazensis (Gardner)

Cabrera

Sin.: *Erechtites missionum* Malme var. *lanceolatus* Chodat & Hassl., *Senecio goyazensis* Gardner

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC.

var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.

Sin.: *Erechtites agrestis* (Sw.) Standl. & Steyerl., *Erechtites cacalioides* (Fisch. ex Spreng.) Less., *Erechtites carduifolius* (Cass.) DC., *Erechtites carduifolius* (Cass.) DC. var. *latifolius* Klatt, nom. nud., *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. f. *pubescens* Kuntze, nom. illeg., *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex

DC. var. *carduifolius* (Cass.) Griseb., *Erechtites hieraciifolius* Walp., nom. illeg., *Erechtites sulcatus* Gardner, *Gynura aspera* Ridl., *Gynura malasica* (Ridl.) Ridl., *Gynura zeylanica* Trin. var. *malasica* Ridl., *Neoceis carduifolia* Cass., *Senecio cacalioides* Fisch. ex Spreng., *Senecio carduifolius* (Cass.) Desf., *Senecio fischeri* Sch. Bip., nom. nud., *Sonchus agrestis* Sw., *Sonchus brasiliensis* Meyen & Walp., *Sonchus occidentalis* Spreng.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC.

var. **hieraciifolius**

Sin.: *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. f. *minor* Waisb., *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *glabrescens* Kuntze, *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *intermedius* Fernald, *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *praealtus* (Raf.) Fernald, *Erechtites praealtus* Raf., *Neoceis hieraciifolia* (L.) Cass., *Neoceis rigidula* Cass., *Senecio hieraciifolius* L., *Senecio hieraciifolius* L. var. *giganteus* Raf., *Senecio seminudus* Bory, *Senecio sonchoides* Vuk., *Senecio vukotinovi* Schloss.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, AMA).

Erechtites ignobilis Baker

Sin.: *Senecio ignobilis* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.

Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Erechtites leptanthus (Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio leptanthus* Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Erechtites missionum Malme

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).
PRY(CAU).

Erechtites valerianifolius (Link ex

Spreng.) Less. ex DC. f. **organensis** (Gardner) Belcher

Sin.: *Erechtites organensis* Gardner, *Erechtites valerianifolius* (Link ex Spreng.) Less. ex DC. var. *organensis* (Gardner) Baker

Hierba. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Erechtites valerianifolius (Link ex

Spreng.) Less. ex DC. f. **reductus** Belcher

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR).

Erechtites valerianifolius (Link ex

Spreng.) Less. ex DC. f. **valerianifolius**

Sin.: *Crassocephalum valerianifolium* (Link ex Spreng.) Less., *Erechtites ambiguus* DC., *Erechtites gardnerianus* Cabrera, *Gynura rosea* Ridl., *Senecio valerianifolius* Desf., hom. illeg., *Senecio valerianifolius* Gardner, hom. illeg., *Senecio valerianifolius* J.P. Wolff, nom. inval., *Senecio valerianifolius* Link ex Spreng., *Sonchus erythropappus* Meyen & Walp. ex Walp.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(RIV, ROC, TAC, TYT).

Eriachaenium Sch. Bip.

Eriachaenium magellanicum Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Erigeron L., nom. cons.

Erigeron andicola DC.

Sin.: *Aster andicola* Hauman, *Aster bellidiastrum* Nees ex Walp., hom. illeg., *Erigeron andicola* DC. f. *humilior* Vierh., *Erigeron andinus* Phil., *Erigeron araucanus* Phil., *Erigeron biflorus* Phil., *Erigeron cabreræ* Solbrig, *Erigeron ciliaris* Phil.

Hierba. Nativa. 500-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Erigeron campanensis Valdeb., Lowrey & Stuessy

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(VAL).

Erigeron canadensis L.

Sin.: *Conyza canadensis* (L.) Cronquist

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Erigeron cinereus Hook. & Arn.

Sin.: *Erigeron andicola* DC. f. *pleiocephalus* Vierh., *Erigeron dusenii* Vierh., *Erigeron dusenii* Vierh. f. *purpurascens* Vierh., *Erigeron dusenii*

Vierh. f. *viridis* Vierh., *Erigeron poeppigii* DC.

Hierba. Endémica. 500-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Erigeron corrales-molinensis Danton

Hierba. Endémica. 300-400 m.

Países: CHL(JFE).

Erigeron fasciculatus Colla

Sin.: *Aster breviflorus* Phil., *Aster litoralis* Phil., *Erigeron berterianus* DC., *Erigeron subandinus* Phil., *Haplopappus hispidulus* DC.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Erigeron fernandezius (Colla) Harling

Sin.: *Erigeron fernandezianus* (Colla) Solbrig, nom. illeg., *Erigeron fruticosus* DC., *Terranea fernandezia* Colla

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Erigeron gilliesii (Hook. & Arn.) Cabrera

Sin.: *Aster albertii* Phil., *Aster gayanus* DC., *Aster gilliesii* Hook. & Arn., *Astradelphus chilensis* J. Remy, *Erigeron pratensis* Phil., *Erigeron remyanus* Wedd., *Gusmania chilensis* J. Remy

Hierba. Endémica. 800-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Erigeron illapelinus Phil.

Hierba. Endémica. 2400-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ).

Erigeron imbricatus Vierh.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Erigeron incertus (d'Urv.) Skotts. b.

Sin.: *Erigeron sullivanii* Hook. f., *Hieracium incertum* d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(TDF).

Erigeron ingae Skotts. b.

Sin.: *Erigeron ingae* Skotts. b. var. *innocentium* Skotts. b., *Erigeron turricola* Skotts. b.

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(JFE).

Erigeron karvinskianus DC.

Sin.: *Erigeron karvinskianus* DC. var. *mucronatus* (DC.) Hieron., nom. inval., *Erigeron mucronatus* DC., *Erigeron trilobus* Sond.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(COR). CHL(VAL, BIO, LLA, RME).

Erigeron lanceolatus Wedd.

Sin.: *Erigeron lanceolatus* Wedd. var. *subacaulis* Wedd.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Erigeron leirolepis Solbrig

Hierba. Endémica. 3000

Países: ARG(MEN).

Erigeron leptopetalus Phil.

Sin.: *Erigeron brevicaulis* Phil., *Erigeron erianthus* Speg., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *skottsbergii* Vierh., *Erigeron nubigenus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(ATA, COQ, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG, RME).

Erigeron luteoviridis Skotts. b.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Erigeron luxurians (Skottsb.) Solbrig
Sin.: *Erigeron litoralis* (Phil.) Skottsb. var. *luxurians* Skottsb.
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Erigeron myosotis Pers.
Sin.: *Erigeron fernandezii* Phil., *Erigeron gyanus* J. Remy var. *leptophyllus* Speg., *Erigeron glabratus* Reiche, hom. illeg., *Erigeron ibari* Phil., *Erigeron lacarensis* Phil., *Erigeron myosotis* Pers. f. *pluriceps* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. f. *spithameus* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *fuegiae* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *magellanicus* (Sch. Bip.) Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *polymorphoides* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *pseudomagellanicus* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. var. *elongatum* Sch. Bip., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. f. *densehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. f. *sparsehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. f. *tragopogonoides* Skottsb. ex Vierh., *Erigeron platylepis* Vierh., *Erigeron polyphyllus* Phil., *Erigeron sullivanii* Hook. f. var. *magellanicus* Sch. Bip.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Erigeron othonnifolius Hook. & Arn.
Sin.: *Aster prostratus* Phil., *Erigeron vidalii* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

Erigeron patagonicus Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(BIO, AIS, MAG).

Erigeron pulcher Phil.
Hierba. Endémica. 2700-3200 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(VAL, RME).

Erigeron rosulatus Wedd.
Sin.: *Erigeron brittonianus* Rusby, *Erigeron pulvinatus* Wedd.
Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR).

Erigeron rupicola Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Erigeron schnackii Solbrig
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Erigeron stuessyi Valdeb.
Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: CHL(JFE).

Eupatorium L.

Eupatorium areniscophilum Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, COA).

Eupatorium gnaphalioides Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(GUA).

Eupatorium lineatum Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eupatorium maracayuense Chodat
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

Eupatorium rosengurtii Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Euryops (Cass.) Cass., nom. cons.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B. Nord.
Sin.: *Gamolepis chrysanthemoides* DC.
Subarbusto. Introducida. 200
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

Exostigma G. Sancho

Exostigma notobellidiastrum (Griseb.) G. Sancho
Sin.: *Baccharidastrum notobellidiastrum* (Griseb.) Herter, *Conyza notobellidiastrum* Griseb., *Erigeron notobellidiastrum* (Griseb.) Blake, *Erigeron pauciflorus* Less., nom. nud., *Marsea notobellidiastrum* (Griseb.) Kuntze, *Podocoma notobellidiastrum* (Griseb.) G.L. Nesom
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

Exostigma rivulare (Gardner) G. Sancho
Sin.: *Baccharidastrum rivulare* (Gardner) Herter, *Conyza rivularis* Gardner, *Erigeron gardneri* Cabrera, *Podocoma rivularis* (Gardner) G.L. Nesom
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, GUA). URY(MON, RNO).

Facelis Cass.**Facelis lasiocarpa** (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Facelis capillaris* Rusby, *Facelis schultzi* Beauverd, *Filago lasiocarpa* Griseb., *Lucilia erecta* Benoist
 Hierba. Nativa. 1800-3700 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Facelis plumosa (Wedd.) Sch. Bip.

Sin.: *Facelis weddelliana* Beauverd, nom. superfl., *Lucilia plumosa* Wedd.
 Hierba. Nativa. 2800-4500 m.
 Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR).

Facelis retusa (Lam.) Sch. Bip.

Sin.: *Facelis apiculata* Cass., nom. illeg., *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *congesta* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *gigantea* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *laxa* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *nana* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *planifolia* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *andicola* (Nees) Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *candelabrum* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *patula* Beauverd, *Gnaphalium retusum* Lam., *Helichrysum retusum* (Lam.) Spreng., *Leptalea apiculata* (Cass.) D. Don ex Hook. & Arn., *Pteropogon andicola* Ness, *Pteropogon chilensis* Fisch. & Meyer, nom. nud.
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SLU, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL,

LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC).

Famatinanthus Ariza & S.E. Freire**Famatinanthus decussatus** (Hieron.)

Ariza & S.E. Freire
 Sin.: *Aphyllocladus decussatus* Hieron.
 Arbusto. Endémica. 1800-2500 m.
 Países: ARG(LRI).

Flaveria Juss.**Flaveria bidentis** (L.) Kuntze

Sin.: *Ethulia bidentis* L., *Eupatorium chilense* Molina, *Flaveria bidentis* (L.) B.L. Rob., comb. superfl., *Flaveria bonariensis* DC., *Flaveria capitata* Juss. ex Sm., *Flaveria chilensis* (Molina) J.F. Gmel., *Flaveria contrayerba* (Cav.) Pers., *Milleria chiloensis* Juss., nom. nud., *Milleria contrayerba* Cav., *Vermifuga corymbosa* Ruiz & Pav., nom. illeg.
 Hierba. Nativa. 0-3000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME). PRY(APY, CON, PHA). URY(MON).

Flaveria haumanii Dimitri & Orfila

Sin.: *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze var. *angustifolia* Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU, SDE). CHL(TAR, ANT, ATA).

Fleischmannia Sch. Bip.**Fleischmannia dissolvens** (Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium dissolvens* Baker
 Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, ERI, SDE). BRA(PAR). PRY(GUA, PHA).

Fleischmannia hassleri H. Rob.

Subarbusto. Endémica.
 Países: PRY(CAU, CEN, COA).

Fleischmannia laxicephala (Cabrera)

R.M. King & H. Rob.
 Sin.: *Eupatorium laxicephalum* Cabrera
 Hierba. Endémica. 500-1000 m.
 Países: BRA(SCA).

Fleischmannia microstemon (Cass.)

R.M. King & H. Rob.
 Sin.: *Eupatorium microstemon* Cass.
 Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Fleischmannia prasiifolia (Griseb.) R.M.

King & H. Rob.
 Sin.: *Eupatorium argentinum* Ariza, *Eupatorium prasiifolium* Griseb., nom. illeg.
 Subarbusto. Nativa. 200-2000 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Fleischmannia remotifolia (DC.) R.M.

King & H. Rob.
 Sin.: *Eupatorium remotifolium* DC.
 Hierba. Nativa.
 Países: BRA(SCA).

Fleischmannia schickendantzii (Hieron.)

R.M. King & H. Rob.
 Sin.: *Eupatorium schickendantzii* Hieron.
 Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Gaillardia Foug.

Gaillardia aristata Pursh

Sin.: *Gaillardia aristata* Pursh var. *foliacea* Lunell, *Gaillardia bracteosa* Standl., *Gaillardia hallii* Rydb., *Gaillardia perennis* Loisel., *Gaillardia richardsonii* Hort, *Gaillardia roezlii* Regel, *Gaillardia rustica* Cass., *Polatherus scaber* Raf., *Virgilia grandiflora* Nutt.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR).

Gaillardia cabreræ Covas

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(LPA).

Gaillardia megapotamica (Spreng.)

Baker var. **megapotamica**

Sin.: *Actinea heterophylla* Juss. var. *latifolia* Kuntze, *Cercostylos brasiliensis* (Less.) Less., *Gaillardia doniana* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* Griseb., *Guentheria megapotamica* Spreng., *Polypteris brasiliensis* Less.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SFE, SLU). BRA(RGS). URY(RNO, SOR).

Gaillardia megapotamica (Spreng.)

Baker var. **radiata** (Griseb.) Baker

Sin.: *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker f. *bicolor* Kuntze, *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker f. *biflora* Kuntze, *Gaillardia scabiosoides* (Arn. ex DC.) Benth. & Hook. f. var. *radiata* Griseb.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(MON).

Gaillardia megapotamica (Spreng.)

Baker var. **scabiosoides** (Arn. ex DC.) Baker

Sin.: *Cercostylos scabiosoides* Arn. ex DC., *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker f. *flava* Kuntze, *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker f. *fuscrobura* Kuntze, *Gaillardia scabiosoides* (Arn. ex DC.) Benth. & Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(RNO).

Gaillardia tontalensis Hieron.

Hierba. Endémica. 2400-3700 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Galinsoga Ruiz & Pav.

Galinsoga parviflora Cav.

Sin.: *Adventina parviflora* Raf., *Galinsoga quinqueradiata* Ruiz & Pav., nom. superfl., *Wiborgia acmella* Roth, *Wiborgia parviflora* (Cav.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(CEN, GUA).

Notas: Citada para Uruguay (Ariza Espinar, 2000b) sin mencionar localidad o ejemplar de referencia

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

Sin.: *Adventina ciliata* Raf., *Galinsoga aristulata* Bricknell, *Galinsoga caracasana* (DC.) Sch. Bip., *Galinsoga ciliata* (Raf.) S.F. Blake, *Galinsoga*

parviflora Cav. var. *hispida* DC., *Galinsoga urticifolia* (Kunth) Benth., *Stemmatella urticifolia* (Kunth) O. Hoffm. ex Hieron., *Vargasia caracasana* DC., *Wiborgia urticifolia* Kunth

Hierba. Nativa. 900-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Galinsoga unxioides Griseb.

Sin.: *Galinsoga calva* Rusby, *Galinsoga calva* Sch. Bip., nom. nud., *Galinsoga mandonii* Sch. Bip., nom. nud.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SFE, TUC). CHL(AYP).

Gamochaeta Wedd.

Gamochaeta affinis Cabrera

Sin.: *Gamochaeta malvinensis* (H. Koyama) T.R. Dudley, comb. illeg., *Gnaphalium affine* d'Urv., hom. illeg., *Gnaphalium malvinense* H. Koyama

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Gamochaeta aliena (Hook. & Arn.) Cabrera

Sin.: *Gnaphalium alienum* Hook. & Arn., *Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *alienum* (Hook. & Arn.) Reiche

Hierba. Endémica. 200-2600 m.

Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Gamochaeta alpina (Poepp.) S.E. Freire & Anderb.

Sin.: *Gamochaetopsis alpina* (Poepp. & Endl.) Anderb. & S.E. Freire, *Laennecia alpina* Poepp., *Lucilia alpina* (Poepp.) Cabrera

Hierba. Endémica. 700-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME).

Gamochaeta ambatensis Ariza

Hierba. Endémica. 2600-2700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ).

Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.

Sin.: *Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd.

var. *alpina* Wedd., *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguelen,

Gamochaeta guatemalensis (Gand.)

Cabrera, *Gamochaeta impatiens* G.L.

Nesom, *Gamochaeta irazuensis* G.L.

Nesom, *Gamochaeta spicata* Cabrera,

Gnaphalium americanum Mill.,

Gnaphalium coarctatum Willd.,

Gnaphalium consanguineum

Gaudich., *Gnaphalium guatemalense*

Gand., *Gnaphalium purpureum* L. var.

americanum (Mill.) Klatt, *Gnaphalium*

purpureum L. var. *macrophyllum*

Greenm., *Gnaphalium purpureum* L.

var. *spicatum* Baker, nom. illeg.,

Gnaphalium purpureum L. var.

spicatum Klatt, *Gnaphalium spicatum*

Lam., nom. illeg., *Gnaphalium*

spicatum Lam. var. *alpinum* (Wedd.)

Hieron., *Gnaphalium spicatum* Mill.

var. *chonticum* Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,

COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI,

MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU,

SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP,

COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,

LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA).

PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA,

GUA, ITA, ÑEE, SPE). URY(CAS,

CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL,

MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR,

TYT).

Gamochaeta andina (Phil.) Cabrera

Sin.: *Gnaphalium andinum* Phil.,

Gnaphalium petraeum Phil.

Hierba. Endémica. 2100-2300 m.

Países: CHL(MAU, BIO, RME).

Gamochaeta antarctica (Hook. f.)

Cabrera

Sin.: *Gnaphalium antarcticum* Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Gamochaeta argentina Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,

COS, LPA, LRI, MEN, SLU, SFE).

BRA(RGS). URY(LAV, MAL, MON,

SJO).

Gamochaeta axillaris (J. Remy) Cabrera

Sin.: *Gnaphalium axillare* J. Remy,

Gnaphalium stachydifolium Lam. var.

axillare (J. Remy) Reiche

Hierba. Endémica. 1700-2000 m.

Países: CHL(LSR, RME).

Gamochaeta calviceps (Fernald)

Cabrera

Sin.: *Gnaphalium calviceps* Fernald

Hierba. Nativa. 0-2900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,

MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,

TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APY, CEN, COA, NAS, PAI).

URY(MON).

Gamochaeta camaquaensis Deble

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Gamochaeta capitata Wedd.

Sin.: *Gamochaeta weddelliana* (Rusby)

Anderb., nom. superfl., *Gnaphalium*

capitatum (Wedd.) Griseb., hom. illeg.,

Gnaphalium weddellianum Rusby,

Stuckertiella capitata (Wedd.)

Beauverd

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Gamochaeta chamissonis (DC.)

Cabrera

Sin.: *Gamochaeta fernandeziana* (Phil.)

Anderb., *Gamochaeta julietii* (Phil.)

Anderb., *Gamochaeta neuquensis*

Cabrera, *Gamochaeta polybotrya*

(Phil.) Cabrera, *Gamochaeta serranoi*

(Phil.) Cabrera, *Gamochaeta*

suffruticosa (Phil.) Anderb.,

Gnaphalium chamissonis DC.,

Gnaphalium fernandezianum Phil.,

Gnaphalium julietii Phil., *Gnaphalium*

polybotryum Phil., *Gnaphalium*

purpureum L. var. *chamissonis* (DC.)

Klatt, *Gnaphalium purpureum* L. var.

julietii (Phil.) Reiche, *Gnaphalium*

serranoi Phil., *Gnaphalium*

suffruticosum Phil.

Hierba. Endémica. 700-3900 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,

SCR, TDF). CHL(AYP, COQ, VAL,

LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS,

MAG, RME, JFE).

Gamochaeta depilata (Phil.) Cabrera

Sin.: *Gnaphalium depilatum* Phil.,

Gnaphalium obscurum Phil.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL,

MAU, BIO, ARA, LSR, AIS).

Gamochaeta deserticola Cabrera

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP,

TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU,

BIO, ARA, RME).

Gamochaeta diffusa Deble & Marchiori

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Gamochaeta erecta Deble

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Gamochaeta erythraetis (Wedd.)

Cabrera

Sin.: *Belloa erythraetis* (Wedd.) Cabrera,
Gnaphalium erythraetis (Wedd.)
Griseb., *Merope erythraetis* Wedd.

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera

Sin.: *Gnaphalium falcatum* Lam.,
Gnaphalium heteroides Klatt,
Gnaphalium purpureum L. var.
falcatum (Lam.) Torr. & Gray,
Gnaphalium stachydifolium Lam. var.
falcatum (Lam.) Klatt

Hierba. Nativa. 900-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
ERI, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU,
SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(MAU,
BIO, ARA). PRY(CAN, PAI).
URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO,
SOR).

Gamochaeta filaginea (DC.) Cabrera

Sin.: *Gamochaeta berteriana* (DC.)
Cabrera, *Gnaphalium bellidifolium*
Phil., *Gnaphalium berterianum* DC.,
Gnaphalium filagineum DC.,
Gnaphalium stachydifolium Lam. var.
berterianum (DC.) Klatt

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI,
MEN, MIS, RNE, SJU, SLU, SFE,
SDE). BRA(PAR, RGS). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,
RME, JFE). URY(FLO, FLA, MON,
RNO, SJO, SOR).

Gamochaeta girardiana Deble & A.S.

Oliveira

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Gamochaeta hiemalis Cabrera

Sin.: *Gamochaeta brasiliensis* Deble, nom.
superfl., *Gamochaeta hiemale* (Rizzini)
Cabrera, comb. illeg., *Gnaphalium*
hiemale Rizzini, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 1000

Países: BRA(PAR, SCA).

Gamochaeta humilis Wedd.

Hierba. Nativa. 3500-4600 m.

Países: CHL(AYP, ANT).

Gamochaeta longipedicellata Cabrera

Hierba. Nativa. 3500-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ). CHL(TAR).

Gamochaeta nigrevestis Deble &

Marchiori

Hierba. Nativa. 1000-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Gamochaeta nivalis Cabrera

Sin.: *Gamochaeta spiciformis* (Sch. Bip.)
Cabrera var. *subaffinis* Cabrera,
Gnaphalium affine d'Urv. var. *pusillum*
Speg., *Gnaphalium nivale* Phil., hom.
illeg.

Hierba. Endémica. 800-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO,
ARA, LLA, AIS, MAG).

Gamochaeta oligantha (Phil.) L.E. Navas

Sin.: *Gamochaeta monticola* (Phil. ex
Reiche) Cabrera, *Gnaphalium*
monticola Phil. ex Reiche, *Gnaphalium*
oliganthum Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(NEU, SCR). CHL(ANT,
COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI,
MAG, RME).

Gamochaeta pensylvanica (Willd.)

Cabrera

Sin.: *Gamochaeta platensis* (Cabrera)

Cabrera, *Gnaphalium pensylvanicum*
Willd., *Gnaphalium peregrinum*
Fernald, *Gnaphalium platense*
Cabrera, *Gnaphalium purpureum* L.
subsp. *pensylvanicum* (Willd.) O.Bolòs
& Vigo, *Gnaphalium purpureum* L. var.
spatulatum Baker, *Gnaphalium*
spatulatum Lam., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-3400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS,
SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
APY, BOQ, CEN, GUA, PAI, PHA).
URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO,
LAV, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).

Gamochaeta peregrina (Beauverd) S.E.

Freire & Anderb.

Sin.: *Stuckertiella peregrina* Beauverd,
Stuckertiella peregrina Beauverd var.
albida Beauverd, *Stuckertiella*
peregrina Beauverd var. *fusca*
Beauverd

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ,
LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SLU,
TUC).

Gamochaeta pickeringii (A. Gray) M.O.

Dillon & Quip

Sin.: *Belloa pickeringii* (A. Gray) Sagást. &
M.O. Dillon, *Lucilia pickeringii* A. Gray,
Lucilia pickeringii A. Gray var. *minor* A.
Gray, *Luciliocline pickeringii* (A. Gray)
M.O. Dillon & Sagást., *Mniodes*
pickeringii (A. Gray) S.E. Freire,
Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Hierba. Nativa. 3500-4900 m.

Países: ARG(SAL).

Gamochaeta procumbens (Phil.)

Cabrera

Sin.: *Gnaphalium procumbens* Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR).
CHL(LBO, MAU, BIO, LSR, RME).

Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera
Sin.: *Gamochaeta rosacea* (I.M. Johnst.)
Anderb., *Gnaphalium colombianum*
Hieron., *Gnaphalium purpureum* L.,
Gnaphalium rosaceum I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(IPA). PRY(CAU, PHA).
URY(MON).

Gamochaeta ramosa S.E. Freire, Bayón
& Baeza
Sin.: *Gnaphalium ramosum* Phil., hom.
illeg.
Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Gamochaeta rizzini Cabrera
Hierba. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Gamochaeta serpyllifolia Wedd.
Sin.: *Gamochaeta munnozii* Cabrera,
nom. superfl., *Gnaphalium*
serpyllifolium J. Remy, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 700-3200 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO,
MAU, BIO, ARA, LSR, AIS, RME).

Gamochaeta simplicicaulis (Willd. ex
Spreng.) Cabrera
Sin.: *Gamochaeta spicata* Cabrera,
Gnaphalium purpureum L. var.
simplicicaule (Willd. ex Spreng.) Klatt,
Gnaphalium simplicicaule Willd. ex
Spreng.
Hierba. Nativa. 0-3700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
DFE, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL,
MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG,
RME, JFE). PRY(APA, AMA, ÑEE).

URY(CAS, CLA, LAV, MON, RNO,
ROC, SJO, TAC, TYT).

Gamochaeta sphacelata (Kunth)
Cabrera
Sin.: *Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd.
var. *linearifolia* Wedd., *Gnaphalium*
pedunculatum I.M. Johnst.,
Gnaphalium purpureum L. var.
sphacelatum (Kunth) Speg.,
Gnaphalium sphacelatum Kunth,
Gnaphalium sphacelatum Kunth var.
legitimum DC., nom. inval.,
Gnaphalium stachydifolium Lam. var.
sphacelatum (Kunth) Reiche
Hierba. Nativa. 2000-3600 m.
Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY.

Gamochaeta spiciformis (Sch. Bip.)
Cabrera
Sin.: *Gamochaeta chilensis* Deble, nom.
illeg., *Gamochaeta foliosa* Anderb.,
Gamochaeta peteroana (Phil.)
Anderb., *Gnaphalium affine* d'Urv. var.
medium Speg., *Gnaphalium foliosum*
Phil., hom. illeg., *Gnaphalium*
mucronatum Phil., nom. illeg.,
Gnaphalium peteroanum Phil.,
Gnaphalium purpureum L. var.
mucronatum (Phil.) Skottsb.,
Gnaphalium spiciforme Sch. Bip.
Hierba. Endémica. 200-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG,
RME).

Gamochaeta stachydifolia (Lam.)
Cabrera
Sin.: *Gnaphalium agreste* Phil.,
Gnaphalium purpureum L. var.
stachydifolium (Lam.) Baker,
Gnaphalium stachydifolium Lam.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,
LRI, MEN, RNE, SCR, TDF).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL,
BIO, LSR, RME, JFE). URY(CAS,
LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

Gamochaeta subfalcata (Cabrera)
Cabrera
Sin.: *Gnaphalium subfalcatum* Cabrera
Hierba. Nativa. 0-4100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, SAL, SJU,
SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS,
SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO,
RME). PRY(CEN, COA, SPE).
URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO,
SOR).

Gamochaeta valparadisea (Phil.)
Anderb.
Sin.: *Gnaphalium valparadiseum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO,
RME).

Gamochaeta villarroelii (Phil.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium villarroelii* Phil.
Hierba. Endémica. 700-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).

Gamochaeta virescens (Wedd.) M.O.
Dillon & Quip
Sin.: *Belloa virescens* (Wedd.) Cabrera,
Gnaphalium viridescens Cabrera,
Merope virescens Wedd.
Hierba. Nativa. 3600-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Gazania Gaertn.

Gazania rigens (L.) Gaertn.
Sin.: *Gorteria rigens* (L.) L., *Othonna*
rigens L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA). BRA(PAR, RGS, SCA).

Gnaphalium L.

Gnaphalium polycaulon Pers.
Sin.: *Gnaphalium multicaule* Willd.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(PHA).

Gochnatia Kunth

Gochnatia cardenasii S.F. Blake
Arbusto. Nativa. 3400
Países: ARG(JUJ).

Gochnatia curviflora (Griseb.) O. Hoffm.
Sin.: *Moquinia curviflora* Griseb.
Arbusto. Nativa. 1400-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Gochnatia palosanto Cabrera
Arbusto. Nativa. 600-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
PRY(APY).

Graphistylis B. Nord.

Graphistylis argyrotricha (Dusén) B. Nord.
Sin.: *Senecio argyrotrichus* Dusén
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Graphistylis dichroa (Bong.) D.J.N. Hind
Sin.: *Cacalia dichroa* Bong.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Graphistylis oreophila (Dusén) B. Nord.
Sin.: *Senecio oreophilus* Dusén

Hierba. Nativa. 1700
Países: BRA(SCA).

Graphistylis organensis (Casar.) B. Nord.
Sin.: *Senecio organensis* Casar.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Graphistylis serrana (Zardini) B. Nord.
Sin.: *Graphistylis serranus* (Zardini) D. J. N. Hind, *Senecio serranus* Zardini
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Grazielia R.M. King & H. Rob.

Grazielia brevipetiolata (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium brevipetiolatum* Sch. Bip. ex Baker, *Eupatorium hieronymi* S.E. Freire, nom. superfl., *Eupatorium vernoniopsis* Sch. Bip. ex Baker var. *brevipetiolata* Sch. Bip., nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(FLA, LAV, MAL, ROC, SJO).

Grazielia dimorpholepis (Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium dimorpholepis* Baker
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Grazielia gaudichaudiana (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium gaudichaudianum* DC. f. *lobatum* Dusén ex Malme, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *bipinnatum* Dusén ex Malme, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *gaudichaudianum*, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *macrodon* Dusén ex Malme, *Eupatorium*

gaudichaudianum DC. var. *oppositifolium* Dusén ex Malme
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Grazielia intermedia (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium intermedium* DC.
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(RIV, TAC).

Grazielia multifida (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Dimorpholepis multifida* (DC.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium multifidum* DC.
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Grazielia nummularia (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium nummularium* Hook. & Arn.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Grazielia schultzei R.M. King & H. Rob.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Grazielia serrata (Spreng.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Dimorpholepis serrata* (Spreng.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium alpestre* Gardner, *Eupatorium comptoniifolium* DC., *Eupatorium confertum* Gardner, *Eupatorium intermedium* DC. var. *angustifolium* Hieron., *Eupatorium serratum* Spreng., *Eupatorium serratum* Spreng. var. *alpestre* (Gardner) Baker, *Eupatorium serratum* Spreng. var. *confertum* (Gardner) Baker
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA). URY(CAS, CLA, MAL, RIV, TAC, TYT).

Grindelia Willd.

Grindelia aegialitis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAI).

Grindelia andina (Phil.) Phil.

Sin.: *Chrysophthalmum andinum* Phil.,
Helianthus australis Phil.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Grindelia anethifolia (Phil.) A. Bartoli & Tortosa var. **anethifolia**

Sin.: *Aster anethifolius* (Phil.) Kuntze,
Aster pectinatus (Phil.) Kuntze,
Diplopappus pinnatifidus Hook. & Arn.,
hom. illeg., *Haplopappus anethifolius*
Phil., *Haplopappus araucanus* Phil.,
Haplopappus moyanoi Speg.,
Haplopappus pectinatus Phil.,
Haplopappus pectinatus Phil. var.
anethifolius (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA).

Grindelia anethifolia (Phil.) A. Bartoli & Tortosa var. **eligulata** A. Bartoli & Tortosa
Subarbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(NEU).

Grindelia atlantica Deble & A.S. Oliveira
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).

Grindelia boliviana Rusby

Arbusto o subarbusto. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Grindelia brachystephana Griseb.

Sin.: *Grindelia bergii* (Hieron.) Cabrera,
Grindelia brachystephana Griseb. var.
bergii Hieron., *Grindelia tehuelches*
(Speg.) Cabrera, *Haplopappus patagonicus*
Speg., nom. illeg., *Haplopappus tehuelches*
Speg.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU, SCR, SFE, SDE).

Grindelia buphthalmoides DC.

Sin.: *Grindelia argentina* Deble & A.S.
Oliveira, *Grindelia rupestris* A. Bartoli,
Tortosa & Marchesi
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).
URY(TYT).

Grindelia cabreræ Ariza var. **alatocarpa** Ariza

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR).

Grindelia cabreræ Ariza var. **cabreræ**

Sin.: *Grindelia pulchella* Dunal var.
serratifolia Kuntze, *Grindelia pulchella*
Dunal var. *sublinearis* Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE, TUC).

Grindelia chacoensis A. Bartoli & Tortosa

Sin.: *Grindelia puberula* Hook. & Arn. var.
microcephala Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, SFE).

Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera

Sin.: *Grindelia foliosa* D. Don ex Hook. & Arn.,
Grindelia resinosa Hook. & Arn.,
Grindelia speciosa Hook. & Arn.,

Grindelia speciosa Hook. & Arn. var.
integrifolia Speg., *Grindelia speciosa*
Lindl. & Paxton, *Grindelia volkensii*
Kuntze, *Grindelia volkensii* Kuntze var.
angustifolia Kuntze, *Grindelia volkensii*
Kuntze var. *latifolia* Kuntze,
Haplopappus hoorebekia DC., nom.
illeg., *Hoorebekia chiloensis* Cornel.
Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Grindelia coronensis A. Bartoli & Tortosa

Arbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE).

Grindelia covasii A. Bartoli & Tortosa

Sin.: *Grindelia chiloensis* (Cornel.)
Cabrera var. *pampeana* Covas
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(LPA).

Grindelia gaucha Deble & A.S. Oliveira
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Grindelia globularifolia Griseb.

Subarbusto. Endémica. 2000-2200 m.
Países: ARG(COR).

Grindelia glutinosa (Cav.) Mart.

Sin.: *Aster glutinosus* Cav., *Grindelia glutinosa* (Cav.) Dunal, nom. illeg.,
Grindelia montana Phil., *Grindelia peruviana* Sch. Bip.
Subarbusto. Nativa. 500-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Grindelia linearifolia A. Bartoli, Tortosa & Marchesi

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(PAY, SOR).

Grindelia mendocina A. Bartoli & Tortosa
var. **mendocina**
Arbusto. Endémica. 2400-2900 m.
Países: ARG(MEN).

Grindelia mendocina A. Bartoli & Tortosa
var. **radiata** A. Bartoli & Tortosa
Arbusto. Endémica. 2700-2900 m.
Países: ARG(MEN).

Grindelia orientalis A. Bartoli, Tortosa &
G.H. Rua
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(MAL, ROC).

Grindelia patagonica A. Bartoli & Tortosa
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE).

Grindelia peregrinensis Deble &
Sabatino
Arbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: ARG(BAI).

Grindelia prostrata A. Bartoli & Tortosa
Subarbusto. Endémica. 1000-3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SLU).

Grindelia prunelloides (Poepp. ex Less.)
A. Bartoli & Tortosa var. **discoidea**
Tortosa & A. Bartoli
Sin.: *Aster chryseus* Kuntze, *Haplopappus*
chryseus (Kuntze) Cabrera,
Haplopappus chrysocephalus Reiche,
Pyrrocoma aurea Phil.
Subarbusto. Endémica. 2300-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU).

Grindelia prunelloides (Poepp. ex Less.)
A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**
Sin.: *Aster prunelloides* (Poepp. ex Less.)
Kuntze, *Diplopappus prunelloides*
Poepp. ex Less., *Haplopappus*
ameghinoides Speg., *Haplopappus illinii*
Speg., *Haplopappus mustersii* Speg.,
Haplopappus prunelloides (Poepp. ex

Less.) DC., *Haplopappus prunelloides*
(Poepp. ex Less.) DC. var. *lanatus*
Cabrera, *Haplopappus prunelloides*
(Poepp. ex Less.) DC. var. *mustersii*
(Speg.) Cabrera, *Haplopappus*
prunelloides (Poepp. ex Less.) DC.
var. *sphaerocephalus* Reiche
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-
1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Grindelia puberula Hook. & Arn.
Sin.: *Grindelia puberula* Hook. & Arn. f.
angustifolia Malme
Arbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ,
SAL, SDE, TUC). BRA(RGS).
PRY(APY, ÑEE).

Grindelia pulchella Dunal var. **discoidea**
(Hook. & Arn.) A. Bartoli & Tortosa
Sin.: *Grindelia anomala* DC., *Grindelia*
discoidea Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE,
ERI, LRI, MEN, SDE, SLU, TUC).
BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MON,
PAY, RNO).

Grindelia pulchella Dunal var. **pulchella**
Sin.: *Grindelia diffusa* Gillies ex Hook. &
Arn., *Grindelia pulchella* Dunal var.
normalis Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LRI, MEN,
RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU,
TUC). BRA(RGS). URY(LAV, RNO,
SAO, TAC).

Grindelia pygmaea Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1000
Países: ARG(RNE).

Grindelia ragonesei Cabrera
Sin.: *Grindelia scorzonrifolia* Hook. &
Arn. var. *spathulata* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(CHA, COS, SFE).

Grindelia scorzonrifolia Hook. & Arn.
Sin.: *Grindelia pectinata* Baker, *Grindelia*
scorzonrifolia Hook. & Arn. var.
pectinata (Baker) Hassl., *Grindelia*
scorzonrifolia Hook. & Arn. var.
subintegra Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, LPA, MIS, SFE).
BRA(RGS). PRY(PHA). URY(DUR,
TAC).

Grindelia tarapacana Phil.
Sin.: *Grindelia obovata* Rusby
Arbusto. Nativa. 2900-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Grindelia ventanensis A. Bartoli &
Tortosa
Subarbusto. Endémica. 500-600 m.
Países: ARG(BAI).

Gutierrezia Lag.

Gutierrezia ameghinoides Speg.
Sin.: *Gutierrezia paniculata* (DC.) Phil. var.
patagonica Speg.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(RNE, SCR).

Gutierrezia baccharoides Sch. Bip.
Sin.: *Gutierrezia baccharoides* Sch. Bip.
var. *hoffmannii* (Kuntze) Hauman,
Gutierrezia hoffmannii Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Gutierrezia chubutensis Ratto & A. Bartoli
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(CHU).

Gutierrezia espinosae Acevedo
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Gutierrezia gayana (J. Remy) Reiche
Sin.: *Brachyris gayana* (J. Remy) J. Remy, *Odontocarpa gayana* J. Remy
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Gutierrezia gilliesii Griseb.
Sin.: *Gutierrezia mandonii* (Sch. Bip.) Solbrig subsp. *gilliesii* (Griseb.) Solbrig, *Gutierrezia spathulata* (Phil.) Kurtz var. *gilliesii* (Griseb.) Kuntze
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).

Gutierrezia isernii (Phil.) Phil. var. *isernii*
Sin.: *Brachyris isernii* Phil., *Gutierrezia mandonii* (Sch. Bip.) Solbrig subsp. *isernii* (Phil.) Solbrig
Arbusto. Endémica. 900-2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).

Gutierrezia isernii (Phil.) Phil. var. *nivea* Ratto & A. Bartoli
Endémica. 900-2700 m.
Países: ARG(COR, MEN, SLU).

Gutierrezia leucantha Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Gutierrezia mandonii (Sch. Bip.) Solbrig var. *anomala* Ratto & A. Bartoli
Endémica. 2700-3100 m.

Países: ARG(SAL).

Gutierrezia mandonii (Sch. Bip.) Solbrig var. *mandonii*
Sin.: *Brachyris mandonii* Sch. Bip., *Gutierrezia gilliesii* Griseb. var. *scabriuscula* Griseb.
Arbusto. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Gutierrezia mendocina Ratto & A. Bartoli
Subarbusto. Endémica. 2000-2100 m.
Países: ARG(MEN).

Gutierrezia neaeana (DC.) Sch. Bip. ex S.F. Blake
Sin.: *Brachyris neaeana* DC.
Arbusto. Endémica. 2500-4000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Gutierrezia repens Griseb.
Sin.: *Gutierrezia ruizlealii* Solbrig
Arbusto. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gutierrezia resinosa (Hook. & Arn.) S.F. Blake
Sin.: *Brachyris floribunda* Phil., *Brachyris paniculata* DC., *Galinsoga resinosa* Hook. & Arn., *Gutierrezia compacta* Phil., *Gutierrezia laricifolia* D. Don, *Odontocarpa poeppigii* DC.
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Gutierrezia solbrigii Cabrera
Sin.: *Gutierrezia brachyris* Macloskie var. *patagonica* (Speg.) Macloskie
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).

Gutierrezia spathulata (Phil.) Kurtz
Sin.: *Brachyris spathulata* Phil., *Gutierrezia pulviniformis* Cabrera,

Gutierrezia spathulata (Phil.) Kurtz var. *ochroleuca* Kurtz
Arbusto. Endémica. 1300-2400 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Gutierrezia taltalensis Phil.
Sin.: *Gutierrezia copiapina* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Gutierrezia tortosae Ratto & A. Bartoli
Subarbusto. Endémica. 2000-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Guynesomia Bonifacino & Sancho

Guynesomia scoparia (Phil.) Bonifacino & Sancho
Sin.: *Hinterhubera scoparia* (Phil.) Cabrera, *Nardophyllum scoparium* Phil.
Arbusto. Endémica. 1400-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Gymnanthemum Cass.

Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch. Bip. ex Walp.
Sin.: *Vernonia amygdalina* Delile
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gymnocoronis DC.

Gymnocoronis spilanthis (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. var. *spilanthis*
Sin.: *Alomia spilanthis* D. Don ex Hook. & Arn., *Gymnocoronis attenuata* DC., *Gymnocoronis spilanthis* (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. var. *attenuata* (DC.) Baker, *Piqueria attenuata* (DC.) Gardner

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. var. **subcordata** (DC.) Baker
Sin.: *Gymnocoronis subcordata* DC., *Piqueria subcordata* (DC.) Gardner
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(COL, SOR).

Gynura Cass., nom. cons.

Gynura aurantiaca (Blume) DC.
Sin.: *Cacalia aurantiaca* Blume
Hierba. Introducida. 300-2400 m.
Países: ARG(SAL).

Gypothamnium Phil.

Gypothamnium pinifolium Phil.
Sin.: *Plazia pinnifolia* (Phil.) Hoffm. ex Reiche
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Gyptidium R.M. King & H. Rob.

Gyptidium militare (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium militare* B.L. Rob.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR).

Gyptidium trichobasis (Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn. var. *curitybanum* Dusén ex Malme, *Eupatorium trichobasis* Baker
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gyptis (Cass.) Cass.

Gyptis artemisifolia (Griseb.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium artemisiifolium* Griseb.
Subarbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI).

Gyptis commersonii Cass.
Sin.: *Eupatorium bacleanum* DC., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron. var. *dentata* Speg., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron. var. *pinnata* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).

Gyptis crassipes (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker, nom. illeg., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *oppositifolium* Baker, *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. var. *burchellii* Baker, *Eupatorium crassipes* Hieron., *Eupatorium hunzingeri* Hieron., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *crassipes* (Hieron.) B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *lasiolepis* (B.L. Rob.) B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *longicuneatum* B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn.

var. *oppositifolium* (Baker) B.L. Rob., *Eupatorium lasiolepis* B.L. Rob., *Gyptis alternifolia* R.M. King & H. Rob.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

Gyptis lanigera (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker f. *asperum* Hassl., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker f. *paraguariensis* Chodat, *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *aureoviride* (Chodat) Hassl., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *deltoideum* Chodat, *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *hispidulum* Hassl., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *vernoniopsis* (Baker) Hassl., *Eupatorium aureoviride* Chodat, *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *aureoviride* (Chodat) B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *deltoideum* (Chodat) B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *lanigerum*, *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *typicum* B.L. Rob., *Eupatorium oblongifolium* (Spreng.) Baker var. *hirsutum* Chodat, *Eupatorium veroniopsis* Sch. Bip. ex Baker
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, COL, MON, PAY, RIV, TAC).

Gyptis tanacetifolia (Gillies ex Hook. & Arn.) D.J.N. Hind & Flann

Sin.: *Eupatorium ceratophyllum* Hook. & Arn., *Eupatorium erodiifolium* DC., *Eupatorium erodiifolium* DC. var. *obtusilobum* Hieron., *Eupatorium tanacetifolium* Gillies ex Hook. & Arn., *Gyptis pinnatifida* Cass. ex R.M. King & H. Rob., nom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TYT).

Haplopappus Cass.

Haplopappus angustifolius (DC.) Reiche

Sin.: *Aster atenes* Kuntze, *Aster stewardensis* Kuntze, *Haplopappus durus* Reiche, *Pyrrocoma angustifolia* DC., *Pyrrocoma rigida* Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(ATA, COQ).

Haplopappus anthylloides Meyen & Walp.

Sin.: *Aster anthylloides* (Meyen & Walp.) Kuntze, *Aster radicans* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus arbutoides* J. Remy var. *glandulosus* Hicken, *Haplopappus bellidifolius* Phil. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche, *Haplopappus brachylepis* Phil., *Haplopappus radicans* J. Remy
Arbusto. Endémica. 1900-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus baylahuen J. Remy

Sin.: *Aster baylahuen* (J. Remy) Kuntze, *Aster lastarrianus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus domeykoi* Phil., *Haplopappus fluehmannii* Phil.,

Haplopappus lastarrianus J. Remy, *Haplopappus medicinalis* Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

Haplopappus bezanilleanus (J. Remy) Reiche

Sin.: *Aster bezanilleanus* Kuntze,

Pyrrocoma bezanilleana J. Remy

Subarbusto. Endémica. 300-2800 m.

Países: CHL(COQ).

Haplopappus boelckei Tortosa & A. Bartoli

Hierba. Endémica. 2500-2700 m.

Países: ARG(MEN).

Haplopappus cerberoanus (J. Remy) Reiche subsp. **cerberoanus**

Sin.: *Aster cerberoanus* (J. Remy) Kuntze, *Aster denticulatus* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus denticulatus* (Phil.) Reiche, *Pyrrocoma cerberoana* J. Remy, *Pyrrocoma denticulata* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Haplopappus cerberoanus (J. Remy) Reiche subsp. **elquianus** Klingeb.

Arbusto. Endémica. 800-2000 m.

Países: CHL(COQ).

Haplopappus chrysanthemifolius (Less.) DC.

Sin.: *Andromachia alternifolia* Kunze ex Steud., *Aster berteroi* (DC.) Kuntze, *Diplopappus chrysanthemifolius* Less., *Diplopappus coquimbensis* Hook. & Arn., *Diplopappus inuloides* Hook. & Arn., *Grindelia glutinosa* Bertero, *Haplopappus berteroi* DC., *Haplopappus berteroi* DC. var. *lanceolatus* DC., *Haplopappus formosus* Phil., *Haplopappus hirtellus* Phil. var. *hirsutus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus leucanthemifolius* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Haplopappus colliguayensis M.A.

Villalobos, V. Morales & Nic. García

Arbusto. Endémica. 600-1700 m.

Países: CHL(VAL).

Haplopappus coquimbensis (Hook. & Arn.) L. Klingenberg

Sin.: *Aster hirtellus* (Phil.) Kuntze, *Haplodiscus elatus* Phil., *Haplopappus acanthodon* Phil., *Haplopappus elatus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus hirsutus* Phil., *Haplopappus hirtellus* Phil., *Haplopappus hirtellus* Phil. var. *limarensis* Reiche, *Haplopappus limarensis* Phil., *Haplopappus vidalii* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO).

Haplopappus decurrens J. Remy

Sin.: *Aster remyanus* Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Haplopappus deserticola Phil.

Sin.: *Haplopappus involucratum* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Haplopappus diplopappus J. Remy subsp. **diplopappus**

Sin.: *Aster diplopappus* (J. Remy) Kuntze

Subarbusto. Endémica. 800-3600 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

Haplopappus diplopappus J. Remy subsp. **villosus** (Phil.) L. Klingenberg

Sin.: *Aster venosus* Kuntze, *Aster villiger* Kuntze, *Diplopappus spinulosus* Hook. & Arn., *Haplopappus diplopappus* J. Remy var. *struthionum* (Speg.) Cabrera, *Haplopappus pallidus* Phil.,

- Haplopappus petersianus* Phil.,
Haplopappus reticulatus Phil.,
Haplopappus struthionum Speg.,
Haplopappus villosus Phil., *Pyrrocoma reticulata* Phil.
 Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, SCR).
 CHL(VAL, LBO, MAU, RME).
- Haplopappus donianus** Sch. Bip. ex Reiche
 Sin.: *Diplopappus donianus* Hook. & Arn.,
Haplodiscus tenuifolius Phil.
 Arbusto. Endémica. 0-600 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).
- Haplopappus foliosus** DC.
 Sin.: *Aster foliosus* (DC.) Kuntze, hom. illeg.,
Aster polyphyllus (Phil.) Kuntze, hom. illeg.,
Diplopappus foliosus Hook. & Arn.,
Haplopappus polyphyllus Phil.
 Arbusto. Endémica. 0-200 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Haplopappus glutinosus** Cass.
 Sin.: *Aster glutinosus* (Less.) Kuntze,
Aster oligodontus Kuntze, *Aster senecioifolius* Kuntze, nom. illeg.,
Diplopappus coronopifolius Less., nom. illeg.,
Diplopappus glutinosus Less., *Haplopappus arbutoides* J. Remy,
Haplopappus arbutoides J. Remy var. *glabratus* (Phil.) Reiche,
Haplopappus australis Phil., *Haplopappus bustillosianus* J. Remy,
Haplopappus coronopifolius (Less.) DC., nom. superfl.,
Haplopappus coronopifolius (Less.) DC. var. *laxus* Phil.,
Haplopappus glabratus Phil., *Haplopappus glutinosus* (Less.) DC.,
 hom. illeg., *Haplopappus glutinosus* Cass. f. *patagonicus* (Phil.) Cabrera,
Haplopappus glutinosus Cass. f. *spathulatus* Cabrera,
Haplopappus obovatus Phil., *Haplopappus patagonicus* Phil.,
Haplopappus paucidentatus Phil.
 Arbusto. Endémica. 500-2500 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
 CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).
- Haplopappus graveolens** (Phil.) Reiche
 Sin.: *Haplodiscus graveolens* Phil.
 Arbusto. Endémica.
 Países: CHL(RME).
- Haplopappus grindelioides** (Less.) DC.
 Sin.: *Aster marginalis* (Phil.) Kuntze, *Aster reversus* Kuntze,
Diplopappus grindelioides Less., *Haplopappus corniculatus* Phil.,
Haplopappus heterocomus Phil., *Haplopappus heterophysus* Phil.,
Haplopappus marginalis Phil., *Haplopappus marginalis* Phil. var. *heterophysus* (Phil.) Reiche,
Haplopappus reflexus Phil., *Haplopappus tiliensis* Phil.
 Subarbusto. Endémica. 600-2500 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
 CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).
- Haplopappus humilis** (Phil.) Reiche
 Sin.: *Haplodiscus humilis* Phil.
 Arbusto. Endémica. 100-1100 m.
 Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).
- Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **integerrimus**
 Sin.: *Diplopappus integerrimus* Hook. & Arn.,
Grindelia acerosa Bertero, nom. nud.,
Haplopappus acerosus Bertero ex Phil.,
Haplopappus pulchellus DC. var. *elongatus* J. Remy,
Steriphe acerosa (Bertero ex Phil.) Phil.
 Arbusto. Endémica. 500-2000 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).
- Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **punctatus** (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark
 Sin.: *Aster adelbertii* Kuntze, *Conyza punctata* Willd.,
Diplopappus chamissonis Less., *Diplopappus punctatus* Less. ex DC.,
Haplopappus chamissonis (Less.) DC.,
Haplopappus punctatus (Willd.) H.M. Hall
 Arbusto. Endémica.
 Países: CHL(MAU, BIO).
- Haplopappus ischnos** (Phil.) Reiche
 Sin.: *Haplodiscus ischnos* Phil.,
Haplodiscus landbeckii Phil.
 Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
 Países: CHL(COQ).
- Haplopappus kingii** (Phil.) Reiche
 Sin.: *Haplodiscus kingii* Phil.
 Arbusto. Endémica.
 Países: CHL(ATA).
- Haplopappus latifolius** (Phil.) Reiche
 Sin.: *Haplodiscus latifolius* Phil.,
Haplodiscus vernicosus Phil. var. *geissei* Phil.
 Arbusto. Endémica. 2500
 Países: CHL(COQ).
- Haplopappus linifolius** (Phil.) Reiche
 Sin.: *Aster linoides* Kuntze, *Pyrrocoma linifolia* Phil.
 Arbusto. Endémica. 1800-2200 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).
- Haplopappus macraeanus** (J. Remy) A. Gray
 Sin.: *Aster macraeanus* (J. Remy) Kuntze,
Pyrrocoma macraeana J. Remy
 Subarbusto. Endémica.
 Países: CHL(COQ, VAL).
- Haplopappus macrocephalus** (Poepp. ex Less.) DC.

Sin.: *Aster macrocephalus* (Poepp. ex Less.) Kuntze, *Diplopappus macrocephalus* Poepp. ex Less., *Haplopappus caespitosus* Nutt.
Subarbusto. Endémica. 100-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Haplopappus maulinus Klingeb.
Arbusto. Endémica. 400-2300 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Haplopappus mendocinus Tortosa & A. Bartoli
Arbusto. Endémica. 1100-1600 m.
Países: ARG(LPA, MEN).

Haplopappus meyenii Walp.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Haplopappus mieresii P. Medina & Nic. García
Subarbusto. Endémica. 1200-1300 m.
Países: CHL(COQ).

Haplopappus mucronatus (Hook. & Arn.) B.D. Jacks.
Sin.: *Aster ilicifolius* (J. Remy) Kuntze, *Baccharis hookeriana* DC., *Baccharis mucronata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Diplopappus mucronatus* Hook. & Arn., *Haplopappus fonckii* Phil., *Haplopappus hookerianus* (DC.) DC., *Haplopappus ilicifolius* J. Remy
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Haplopappus multifolius Phil. ex Reiche
Sin.: *Aster multifolius* Kuntze, *Pyrrocoma foliosa* Phil.
Arbusto. Endémica. 700-3200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Haplopappus nahuelbutae Klingeb.
Subarbusto. Endémica. 100-200 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Haplopappus neoscaposus Zuloaga & C.A. Zanotti

Sin.: *Haplopappus scaposus* J. Remy, hom. illeg.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL, LBO).

Haplopappus ochagavianus Phil.
Arbusto. Endémica. 100-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Haplopappus parvifolius (DC.) Gay
Sin.: *Aster parvifolius* (DC.) Kuntze, *Pyrrocoma parvifolia* DC.
Subarbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Haplopappus pedunculatus J. Remy
Sin.: *Aster pedunculatus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus corymbosus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus rosmarinifolius* Reiche, *Steriphe corymbosa* Phil.
Arbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Haplopappus philippii (Kuntze) H.M. Hall
Sin.: *Aster philippii* Kuntze, *Haplopappus paniculatus* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Haplopappus phyllophorus Reiche
Sin.: *Haplodiscus densifolius* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Haplopappus pinea (Phil.) Reiche
Sin.: *Aster pineus* (Phil.) Kuntze, *Pyrrocoma pinea* Phil.
Arbusto. Endémica. 2000-2400 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Haplopappus pinnatifidus Nutt.

Sin.: *Aster andinus* Kuntze, hom. illeg., *Aster setiger* (Phil.) Kuntze, hom. illeg., *Diplopappus setiger* Hook. & Arn., *Haplopappus setigerus* (Phil.) Meigen, *Pyrrocoma nuttalli* J. Remy, nom. superfl., *Pyrrocoma setigera* Phil.
Arbusto. Endémica. 500-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus platylepis Phil.
Sin.: *Haplopappus ilicifolius* J. Remy var. *platylepis* (Phil.) Reiche, *Haplopappus litoralis* Phil.
Subarbusto. Endémica. 200-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Haplopappus poeppigianus (Hook. & Arn.) A. Gray
Sin.: *Aster griseus* Kuntze, *Chroilema subcanescens* Bernh., *Grindelia canescens* Bertero, nom. nud., *Haplodiscus exserens* Phil., *Haplodiscus polycladus* Phil., *Haplopappus argenteus* Steud., nom. nud., *Haplopappus canescens* Reiche, hom. illeg., *Haplopappus canescens* Reiche var. *exserens* Reiche, *Pyrrocoma canescens* Phil.
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus pristiphyllus (J. Remy) H.M. Hall
Sin.: *Aster pristiphyllus* (J. Remy) Kuntze, *Pyrrocoma pristiphylla* J. Remy
Arbusto. Endémica.
Países: CHL.

Haplopappus pulchellus DC.
Sin.: *Aster valparaisanus* Kuntze, *Grindelia pulchella* Bertero, nom. nud.
Arbusto. Endémica. 300-1600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus racemiger Klingeb.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Haplopappus reicheanus H.M. Hall

Sin.: *Haplopappus vernicosus* Phil. ex
Reiche, hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 700-2200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Haplopappus remyanus Wedd.

Sin.: *Haplodiscus vernicosus* Phil.,
Haplopappus prinophyllus Phil.,
Pyrrocoma ilicifolia J. Remy
Arbusto. Endémica. 300-2400 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Haplopappus rengifoanus J. Remy

Sin.: *Aster rengifoanus* (J. Remy) Kuntze,
Haplodiscus pachyphyllus Phil.
Arbusto. Endémica. 100-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, LBO).

Haplopappus rigidus Phil.

Sin.: *Aster atacamensis* Kuntze,
Haplopappus doellianus Phil.,
Haplopappus villanuevae Phil.
Arbusto. Nativa. 3400-4000 m.
Países: ARG(CAT, SAL). CHL(ANT, ATA, COQ).

Haplopappus rosulatus H.M. Hall

Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Haplopappus rotundifolius H.M. Hall

Sin.: *Diplopappus ilicifolius* Hook. & Arn.
Arbusto. Nativa. 1000-3000 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Haplopappus saxatilis (J. Remy) Reiche

Sin.: *Aster saxatilis* (J. Remy) Kuntze,
Haplodiscus sphacelatus Phil.,
Haplopappus angustifolius (DC.)
Reiche subsp. *saxatilis* (J. Rémy)

Klingeb., *Haplopappus sphacelatus*
(Phil.) Reiche, *Pyrrocoma saxatilis* J.
Remy

Arbusto. Endémica. 400-1700 m.
Países: CHL(COQ, MAU, RME).

Haplopappus schumannii (Kuntze) G.K.

Br. & W.D. Clark
Sin.: *Aster schumannii* Kuntze,
Haplopappus armerioides Phil., hom.
illeg., *Haplopappus poeppigianus*
(Hook. & Arn.) A. Gray var. *radiatus* A.
Gray, *Haplopappus sericeus* Phil.,
Steriphe navarri Phil., *Urocarpidium*
peruvianum (L.) Krapov.
Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Haplopappus scrobiculatus (Nees) DC.

Sin.: *Aster cuneifolius* (Nutt.) Kuntze,
Aster densifolius (J. Remy) Kuntze,
Aster scrobiculatus (Nees) Kuntze,
Diplopappus bellidifolius Hook. & Arn.,
Diplopappus cuneatus Hook. & Arn.,
Diplopappus scrobiculatus Nees,
Haplopappus cuneifolius Nutt.,
Haplopappus densifolius J. Remy,
Perezia spathulata Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 2600-3700 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Haplopappus serrulatus Reiche

Sin.: *Haplopappus spinulosus* Phil.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(RME).

Haplopappus setulosus Klingeb.

Arbusto. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Haplopappus stelliger J. Remy

Sin.: *Aster stelliger* (J. Remy) Kuntze
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Haplopappus stolpii Phil.

Arbusto. Endémica.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Haplopappus taeda Reiche

Sin.: *Haplodiscus peteroanus* Phil.
Arbusto. Endémica. 300-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus teillieri A. Cádiz-Véliz, V.

Morales & Nic. García
Arbusto. Endémica. 1500-2600 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Haplopappus uncinatus Phil.

Sin.: *Aster uncinatus* (Phil.) Kuntze,
Diplopappus canescens Hook. & Arn.,
hom. illeg., *Haplopappus candollei*
Phil., *Haplopappus uncinatus* Phil. var.
candollei (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus undulatus Klingeb.

Arbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Haplopappus velutinus J. Remy

Sin.: *Aster illinitus* (Phil.) Kuntze,
Haplodiscus fallax Phil., *Haplodiscus*
longiscapus Phil., *Haplodiscus*
longiscapus Phil., *Haplodiscus*
zañartui Phil., *Haplopappus*
baccharidifolius Phil., *Haplopappus*
fallax (Phil.) Reiche, *Haplopappus*
glutinosus Cass. var. *illinitus* (Phil.)
Reiche, *Haplopappus illinitus* Phil.,
Haplopappus longipes (Phil.) Reiche,
Haplopappus stenophyllus Phil., hom.
illeg., *Haplopappus subandinus* Phil.,
Haplopappus velutinus J. Remy
subsp. *illinitus* (Phil.) L. Klingenberg,
Haplopappus virgatus Phil.,
Haplopappus zañartui (Phil.) Reiche,
Pyrrocoma longipes Phil.

Arbusto. Endémica. 1300-2100 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Haplopappus vicuniensis Klingeb.

Arbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Haplosticha Phil.

Haplosticha arnicoides (Hook. & Arn.)

Pruski

Sin.: *Aster plantagineus* Poepp. ex DC.,
Senecio arnicoides Hook. & Arn.,
Senecio plantagineus Bertero ex Colla
Hierba. Endémica. 800
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Haplosticha zosterifolia (Hook. & Arn.)

Pruski

Sin.: *Haplosticha stolonifera* Phil., *Senecio cotuloides* Reiche, *Senecio graminifolius* Sch. Bip. ex Phil., *Senecio leiophyllus* Turcz., *Senecio potamogetonifolius* Sch. Bip. ex F. Phil., *Senecio uliginosus* Phil., *Senecio zosterifolius* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 600-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA).

Haroldia Bonifacino

Haroldia mendocina (Cabrera)

Bonifacino

Sin.: *Chiliotrichiopsis mendocina* Cabrera
Arbusto. Endémica. 2200-2600 m.
Países: ARG(MEN).

Hatschbachiella R.M. King & H.

Rob.

Hatschbachiella polyclada (Dusén ex Malme) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium polycladum* Dusén
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Hatschbachiella tweedieana (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Austroeupatorium tweedieanum* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.,
Eupatorium erigeroides DC.,
Eupatorium steviifolium DC. var. *erigeroides* (DC.) Baker, *Eupatorium steviifolium* DC. var. *viscosum* Chodat, *Eupatorium tweedieanum* Hook. & Arn. var. *tweedieanum*
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Hebeclinium DC.

Hebeclinium macrophyllum (L.) DC.

Sin.: *Ageratum guianense* Aubl.,
Eupatorium dryadeum DC.,
Eupatorium macrophyllum L.,
Eupatorium molle Sw., nom. illeg.,
Eupatorium populifolium Mart., nom. illeg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Hedypnois Mill.

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt

Sin.: *Hedypnois cretica* (L.) Dum. Cours.,
Hedypnois cretica (L.) Willd., comb. superfl., *Hedypnois polymorpha* DC.,
Hyoseris cretica L., *Hyoseris rhagadioloides* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, SAO, SJO, SOR).

Helenium L.

Helenium argentinum Ariza

Sin.: *Actinea heterophylla* Juss. f. *concolor* Kuntze, nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss. var. *linearifolia* Kuntze, *Helenium donianum* (Hook. & Arn.) Seckt var. *linearifolium* (Kuntze) Bierner
Hierba. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(COR, SDE, SLU).

Helenium aromaticum (Hook.) L.H.

Bailey

Sin.: *Cephalophora aromatica* (Hook.) Schrad., *Cephalophora collina* Phil., *Cephalophora lanceolata* Phil., *Cephalophora tenera* Cass., *Graemia aromatica* Hook., *Helenium collinum* (Phil.) F. Meigen
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Helenium atacamense Cabrera

Sin.: *Cephalophora litoralis* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Helenium donianum (Hook. & Arn.)

Seckt

Sin.: *Actinea doniana* (Hook. & Arn.) Kuntze, comb. superfl., *Cephalophora doniana* Hook. & Arn., *Gaillardia*

doniana (Hook. & Arn.) Griseb.,
Helenium donianum (Hook. & Arn.)
Cabrera, comb. superfl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Helenium glaucum (Cav.) Stuntz

Sin.: *Cephalophora berteriana* Phil.,
Cephalophora borchersii Phil.,
Cephalophora foliosa Phil.,
Cephalophora glauca Cav.,
Cephalophora gracilis Phil.,
Cephalophora plantaginea DC.,
Cephalophora plantaginea DC. var.
spathulata (F. Phil.) Reiche,
Cephalophora punctata Klatt,
Cephalophora rigida Phil.,
Cephalophora spathulata F. Phil.,
Cephalophora stolpii Phil., *Ethulia*
repanda Nees ex DC., nom. nud.,
Gaillardia glauca (Cav.) Baill.,
Heleniastrium glaucum (Cav.) Kuntze,
Helenium borchersii (Phil.) Cabrera,
Helenium foliosum (Phil.) Cabrera,
Helenium gracile (Phil.) Cabrera,
Helenium plantagineum (DC.) J.F.
Macbr., *Hymenopappus glaucus*
(Cav.) Spreng.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Helenium insulare (Phil.) Cabrera

Sin.: *Actinea insularis* (Phil.) Kuntze,
Cephalophora insularis Phil.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(BIO).

Helenium ovallense Bierner

Hierba. Endémica. 200-400 m.

Países: CHL(COQ).

Helenium uniflorum (Spreng.) P.L.R.
Moraes

Sin.: *Actinea alternifolia* Spreng., nom.
superfl., *Actinea heterophylla* Juss.,
Actinea heterophylla Juss. f. *bicolor*
Kuntze, nom. superfl., *Actinea*
heterophylla Juss. var. *dentata*
Kuntze, *Actinea radiata* (Less.)
Kuntze, comb. superfl., *Actinella*
heterophylla (Juss.) Pers., comb.
superfl., *Cephalophora heterophylla*
(Juss.) Less., *Cephalophora radiata*
Less., *Galinsoga uniflora* Spreng.,
Helenium alternifolium (Spreng.)
Cabrera, *Helenium heterophyllum*
(Juss.) Malme, hom. illeg., *Helenium*
mattfeldianum Herter, nom. superfl.,
Helenium radiatum (Less.) Bierner,
comb. superfl., *Helenium radiatum*
(Less.) Seckt

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TYT).

Helenium urmenetae (Phil.) Cabrera var.
leguiffei (Phil.) Bierner

Sin.: *Cephalophora leguiffei* Phil.,
Cephalophora peraltae Phil., *Helenium*
leguiffei (Phil.) J.F. Macbr.

Hierba. Endémica. 300-1300 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Helenium urmenetae (Phil.) Cabrera var.
urmenetae

Sin.: *Cephalophora setigera* Phil.,
Cephalophora urmenetae Phil.,
Helenium longiaristatum Cuatrec.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

Helenium vallenariense (Phil.) Bierner

Sin.: *Cephalophora vallenariense* Phil.

Hierba. Endémica. 400-1200 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Helianthus L.

Helianthus × laetiflorus Pers.

Sin.: *Helianthus laetiflorus* Pers. var.
tricuspis (Elliott) Torr. & A. Gray,
Helianthus scaberrimus Elliott,
Helianthus tricuspis Elliott

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Helianthus annuus L.

Sin.: *Helianthus aridus* Rydb., *Helianthus*
erythrocarpus Barth, *Helianthus*
indicus L., *Helianthus lenticularis*
Douglas ex Lindl., *Helianthus*
macrocarpus DC., *Helianthus*
multiflorus Hook., hom. illeg.,
Helianthus ovatus Lehm., *Helianthus*
platycephalus Cass., nom. inval.,
Helianthus tubaeformis Nutt.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, LPA, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Helianthus petiolaris Nutt.

Sin.: *Helianthus integrifolius* Nutt.,
Helianthus integrifolius Nutt. var.
gracilis Nutt., *Helianthus patens*
Lehm., *Helianthus petiolaris* Nutt. var.
patens (Lehm.) Rydb. ex Porter &
Britton, *Helianthus praecox* Engelm. &
A. Gray

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SLU).

Helianthus tuberosus L.

Sin.: *Helianthus esculentus* Warsz.,
Helianthus serotinus Tausch

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(CAS, MON).

Helichrysum Mill.**Helichrysum foetidum** (L.) MoenchSin.: *Gnaphalium foetidum* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(RGS).

Heliopsis Pers.**Heliopsis buphthalmoides** (Jacq.) DunalSin.: *Acmella mutisii* (Kunth) Cass., nom.superfl., *Acmella occidentalis* Rich.,nom. superfl., *Acmella oppositifolia*(Lam.) R.K. Jansen, *Anthemis**americana* L. f., hom. illeg., *Anthemis**occidentalis* Willd., nom. superfl.,*Anthemis oppositifolia* Lam.,*Ceratocephalus americanus* Kuntze,nom. superfl., *Spilanthes americana*Hieron., nom. superfl., *Spilanthes**mutisii* Kunth, nom. superfl.,*Spilanthes oppositifolia* (Lam.) D'Arcy

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

PRY(APY).

Helminthotheca Vaill.**Helminthotheca echioides** (L.) HolubSin.: *Helminthia echioides* (L.) Gaertn.,*Picris echioides* L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI,

LPA, MEN, RNE, SAL, SLU).

CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL,

LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,

RME, IPA). URY(MON).

Helogyne Nutt.**Helogyne apaloidea** Nutt.Sin.: *Brachyandra tenuifolia* (Phil.) Reiche,*Leto tenuifolia* Phil.

Arbusto. Nativa. 700-3200 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Helogyne macrogyne (Phil.) B.L. Rob.Sin.: *Brachyandra macrogyne* Phil.

Arbusto. Endémica. 2000-3800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Helogyne tacaquirensis Hieron.Sin.: *Eupatorium dejectum* B.L. Rob.,*Eupatorium tacaquirensis* (Hieron.)

B.L. Rob.

Arbusto. Nativa. 3000-3600 m.

Países: ARG(JUJ).

Heterocondylus R.M. King & H. Rob.**Heterocondylus alatus** (Vell.) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium vauthierianum* DC. var.*campestre* Dusén ex Malme,*Eupatorium vauthierianum* DC. var.*trichotomum* Baker, *Heterocondylus**vauthierianus* (DC.) R.M. King & H.

Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heterocondylus amphidictyus (DC.) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium amphidictyum* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Heterocondylus decipiens R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium decipiens* Baker, hom. illeg.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heterocondylus didymus (Klatt) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Ayapanopsis didyma* (Klatt) R.M.King & H. Rob., *Eupatorium didymum*Klatt, *Eupatorium didymum* Klatt var.*glandulitectum* B.L. Rob.

Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Heterocondylus grandis (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium grande* Sch. Bip. ex Baker

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,

CAA, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE,

PAI).

Heterocondylus lysimachioides (Chodat) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium estrellense* Hassl.,*Eupatorium lysimachioides* Chodat,*Eupatorium lysimachioides* Chodatvar. *estrellense* (Hassl.) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA, AMA, CAU).

Heterocondylus pumilus (Gardner) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Bulbostylis pumila* Gardner,*Eupatorium agrigaudium* Cabrera,*Heterocondylus reitzii* R.M. King & H.

Rob.

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Heterocondylus vitalbae (DC.) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Bulbostylis ramosissima* Gardner,*Eupatorium vauthierianum* DC. var.*ramosissimum* (Gardner) Baker,*Eupatorium vitalbae* DC., *Eupatorium**vitalbae* DC. var. *serratifolium* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, CAU, CAN, GUA, SPE).

Heterosperma Cav.

Heterosperma diversifolium Kunth

Sin.: *Heterosperma depressum* Griseb.,
Heterosperma pinnatum Kunth var.
depressum (Griseb.) Kuntze,
Heterosperma pinnatum Kunth var.
diversifolium (Kunth) Kuntze
Hierba. Nativa. 1000-3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU,
SLU, TUC).

Heterosperma nanum (Nutt.) Sherff

Sin.: *Bidens involucreta* Phil.,
Heterosperma involucreta (Phil.)
Reiche, *Heterosperma pinnatum*
Kunth var. *involucreta* (Phil.) Kuntze,
Microdonta nana Nutt.
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Heterosperma ovatifolium Cav.

Sin.: *Bidens rhombifolia* Sch. Bip., nom.
nud., *Heterosperma pinnatum* Kunth
var. *maritimum* (Kunth) Kuntze,
Heterosperma pinnatum Kunth var.
ovatifolium (Cav.) Kuntze,
Heterosperma rhombifolium (Sch.
Bip.) Griseb., comb. illeg.,
Heterospermum maritimum Kunth,
Heterospermum ovatum Willd.
Hierba. Nativa. 500-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA,
LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
CHL(AYP, TAR).

Heterosperma tenuisectum (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Heterosperma diversifolium* Kunth
var. *tenuisectum* Griseb.,

Heterosperma pinnatum Kunth var.
bitermatum Kuntze
Hierba. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
SAL, SJU, SLU, TUC).

Heterotheca Cass.

Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britton & Rusby

Sin.: *Heterotheca latifolia* Buckley, *Inula*
subaxillaris Lam.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, LPA, MEN, SLU).

Hieracium L.

Hieracium achalense Sleumer

Sin.: *Hieracium champaquiense* Sleumer
Hierba. Endémica. 1000-2200 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Hieracium adenocephalum (Sch. Bip.) Arv.-Touv.

Sin.: *Hieracium chilense* Less. var.
adenocephalum (Sch. Bip.) Griseb.,
Hieracium mandonii Britton, hom.
illeg., *Pilosella adenocephala* Sch. Bip.
Hierba. Nativa. 2100-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC).

Hieracium antarcticum d'Urv.

Sin.: *Hieracium andinum* Phil., *Hieracium*
antarcticum d'Urv. var. *fuegiensis*
Speg., *Hieracium antarcticum* d'Urv.
var. *myosotidifolium* (Sch. Bip.)
Sleumer, *Hieracium gracile* Hook.
subsp. *andinum* (Phil.) Zahn,
Hieracium gracile Hook. subsp.
antarcticum (d'Urv.) Zahn, *Hieracium*
gracile Hook. subsp. *myosotidifolium*
(Sch. Bip.) Zahn, *Hieracium*

magellanicum Sch. Bip., *Hieracium*
myosotidifolium Sch. Bip., *Hieracium*
philippii Albov, *Pilosella magellanica*
(Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip.,
Pilosella myosotidifolia (Sch. Bip.)
F.W. Schultz & Sch. Bip.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).
CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Hieracium argentinense Zahn

Sin.: *Hieracium argentinense* Zahn var.
sublorentzianum Sleumer, *Hieracium*
subargentense Zahn var.
rufocomatulum Sleumer, *Hieracium*
subargentense Zahn var.
subargentense
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC).

Hieracium astroadenium Sleumer

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SLU, TUC).

Hieracium aurantiacum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, MAG).

Hieracium burkartii Sleumer

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Hieracium catamarcense Sleumer

Hierba. Endémica. 2000-3100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN).

Hieracium chacoense (Zahn) Sleumer

Sin.: *Hieracium paraguayense* Arv.-Touv.
var. *chacoense* Zahn
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Hieracium chilense Less.

Sin.: *Hieracium gayanum* Arv.-Touv.,
Hieracium orthotrichum R.E. Fr.,

- Pilosella chilensis* (Less.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Pilosella orthotricha* (R.E. Fr.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).
- Hieracium cienegae** Zahn
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
- Hieracium commersonii** Monnier
Sin.: *Hieracium commersonii* Monnier var. *lorentzii* Malme, *Hieracium ignatianum* Baker, *Hieracium polygonatum* Zahn, *Hieracium semiglabratum* Comm. ex Fr., nom. superfl., *Hieracium semiglabratum* J. Vahl ex Froel., nom. inval., *Hieracium uruguayense* Arv.-Touv., *Pilosella semiglabrata* F.W. Schultz & Sch. Bip.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).
- Hieracium cordobense** Sleumer
Sin.: *Hieracium cordobense* Sleumer var. *mollisetum* Sleumer
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
- Hieracium criniceps** Sleumer
Sin.: *Hieracium petrophytes* Sleumer
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(COR, MEN, SLU).
- Hieracium dasychaetocomum** Zahn
Hierba. Nativa. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Hieracium eriadenum** Sleumer
Sin.: *Hieracium eriadenum* Sleumer var. *subadenocephalum* Sleumer
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Hieracium flagellare** Willd.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).
- Hieracium fulvipes** Wedd.
Sin.: *Hieracium fiebrigianum* Zahn, *Hieracium fulvipes* Wedd. var. *nigerrimum* Sleumer, *Hieracium lagopus* Soest, hom. illeg., *Pilosella fulvipes* (Wedd.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Hieracium gigantium** Sleumer
Sin.: *Hieracium gigantium* Sleumer var. *canofloccosum* Sleumer, *Hieracium gigantium* Sleumer var. *setulosum* Sleumer
Hierba. Endémica. 2000-2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, SLU).
- Hieracium gilliesianum** Sleumer
Sin.: *Hieracium sordidum* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU, SLU).
- Hieracium glaucifolium** Poepp. ex Froel.
Sin.: *Hieracium chilense* Skottsb., hom. illeg., *Hieracium chubutense* Speg., *Pilosella glaucifolia* (Poepp. ex Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).
- Hieracium jaretanum** (Zahn) Sleumer
Sin.: *Hieracium streptochaetum* Zahn subsp. *jaretanum* Zahn
- Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(LRI).
- Hieracium kieslingii** Cabrera
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ).
- Hieracium lorentzianum** Zahn
Sin.: *Hieracium lorentzianum* Zahn var. *pilosissimum* Sleumer
Hierba. Endémica. 2500-3700 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
- Hieracium luteomontanum** Cabrera
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ).
- Hieracium mandonii** (Sch. Bip.) Arv.-Touv.
Sin.: *Hieracium chilense* Ball, *Hieracium eriosphaerophorum* Zahn, *Hieracium eriosphaerophorum* Zahn var. *castillense* Zahn, *Hieracium mandonii* (Sch. Bip.) Arv.-Touv. var. *pseudargentinese* (Sleumer) Cabrera, *Hieracium pseudargentinese* Sleumer, *Hieracium sanctae-victoriae* Sleumer, *Pilosella mandonii* Sch. Bip.
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Hieracium mendocinum** Sleumer
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
- Hieracium microcephalum** Sch. Bip.
Sin.: *Hieracium bangii* Rusby, *Hieracium bangii* Rusby subsp. *austrobolivense* Zahn, *Hieracium bangii* Rusby var. *siambonicum* Zahn, *Hieracium microcephalum* Sch. Bip. var. *subglandulosum* Sleumer
Hierba. Nativa. 1000-2700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Hieracium mosenii Malme

Sin.: *Hieracium warmingii* Baker var. *lechleri* Zahn

Hierba. Nativa. 100-300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Hieracium murorum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Hieracium neofurcatum Sleumer

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Hieracium niederleinii (Zahn) Sleumer

Sin.: *Hieracium bangii* Rusby subsp. *niederleinii* Zahn, *Hieracium frigidum* Wedd. var. *elatius* Griseb., *Hieracium lorentzianum* Zahn var. *subtucumanicum* Zahn, *Hieracium niederleinii* (Zahn) Sleumer var. *subcatamarcense* Sleumer

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hieracium padcayense Sleumer

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Hieracium palezieuxii Zahn

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LPA, SFE). BRA(RGS). URY(COL).

Hieracium paraguayense Arv.-Touv.

Sin.: *Hieracium ignatianum* Baker var. *paraguayense* Zahn, *Hieracium paraguayense* Baker, nom. superfl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Hieracium patagonicum Hook. f.

Sin.: *Hieracium austroamericanum* Dahlst., *Hieracium chilense* Less. var. *navarinum* Zahn, *Hieracium poeppigianum* Zahn, *Pilosella patagonica* (Hook. f.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG).

Hieracium pilosella L. subsp.

euronotum Nägeli & Peter

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(MAG).

Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAG).

Hieracium reitzianum Cabrera ex

Urtubey

Hierba. Endémica. 1300-1500 m.

Países: BRA(SCA).

Hieracium schreiteri Sleumer

Hierba. Nativa. 3000-5000 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Hieracium sordidum Griseb.

Sin.: *Hieracium sordidum* Griseb. var. *subglandulosum* Sleumer

Hierba. Endémica. 2400-3300 m.

Países: ARG(CAT, LRI, TUC).

Hieracium stachyoideum Arv.-Touv.

Sin.: *Hieracium boliviense* (Wedd.) Sch. Bip. var. *stachyoideum* (Arv.-Touv.) Zahn, *Mandonia pilosella* Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 3300-3600 m.

Países: ARG(SAL).

Hieracium × stoloniflorum Waldst. & Kit.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(RNE).

Hieracium streptochaetum Zahn

Sin.: *Hieracium adenocephalum* (Sch. Bip.) Arv.-Touv. var. *subsetulosum* Zahn, *Hieracium sordidum* Griseb. var. *subfrigidum* Griseb., *Hieracium streptochaetum* Zahn f. *floccosius* Sleumer, *Hieracium streptochaetum* Zahn var. *epilosum* Sleumer

Hierba. Endémica. 2600-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Hieracium tandilense Sleumer

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Hieracium tucumanicum (Zahn) Sleumer

var. **esetosum** Sleumer

Hierba. Endémica. 2600-0 m.

Países: ARG(TUC).

Hieracium tucumanicum (Zahn) Sleumer

var. **tucumanicum**

Sin.: *Hieracium boliviense* (Wedd.) Sch. Bip. subsp. *tucumanicum* Zahn, *Hieracium boliviense* (Wedd.) Sch. Bip. var. *setosopilosum* Kuntze

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hieracium urvillei Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hieracium vervoorstii Sleumer

Hierba. Endémica. 2200-2500 m.

Países: ARG(CAT).

Holocheilus Cass.

Holocheilus brasiliensis (L.) Cabrera

Sin.: *Cacalia scabra* Vahl, *Cleanthes brasiliensis* (L.) D. Don, *Cleanthes ochroleuca* (Cass.) Parodi, *Cleanthes othonoides* (Less.) Griseb.,

- Holocheilus ochroleucus* Cass., *Leucheria echiodides* D. Don, *Perdicium brasiliense* L., *Perezia ochroleuca* (Cass.) Less., *Platycheilus ochroleucus* (Cass.) Cass., *Trixis brasiliensis* (L.) DC., *Trixis brasiliensis* (L.) DC. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Trixis brasiliensis* (L.) DC. var. *sellowii* (Less. ex DC.) Hassl., nom. illeg., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn., *Trixis othonoides* Less., *Trixis sellowii* Less. ex DC., nom. nud.
- Hierba. Nativa. 0-1400 m.
- Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
- Holocheilus fabrisii** Cabrera
- Hierba. Endémica. 2000-2700 m.
- Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
- Sin.: *Cleanthes hieracioides* D. Don, *Cleanthes hieracioides* D. Don var. *thrinoides* (Griseb.) Guagl., *Leucheria conyzoides* D. Don, *Leucheria thrinoides* Griseb., *Trixis hieracioides* (D. Don) DC., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *incisa* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *pusilla* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *robusta* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *subintegra* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. var. *hieracioides* (D. Don) Kuntze, *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. var. *thrinoides* (Griseb.) Kuntze, *Trixis ochroleuca* Baker, hom. illeg., *Trixis sonchoides* Chodat, *Trixis thrinoides* (Griseb.) Hassl.
- Hierba. Nativa. 0-1200 m.
- Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, ITA, ÑEE, PHA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).
- Holocheilus illustris** (Vell.) Cabrera
- Sin.: *Castra illustris* Vell., *Trixis denticulata* Dusén ex Malme, *Trixis hieronymi* Arechav.
- Hierba. Nativa. 0-1700 m.
- Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(PAY, RNO, RIV).
- Holocheilus monocephalus** C.A. Mondin
- Hierba. Endémica. 1000-1200 m.
- Países: BRA(RGS, SCA).
- Holocheilus pinnatifidus** (Less.) Cabrera
- Sin.: *Trixis pinnatifida* Less.
- Hierba. Nativa. 0-1200 m.
- Países: BRA(PAR).
- Holocheilus schulzii** (Cabrera) Cabrera
- Sin.: *Trixis schulzii* Cabrera
- Hierba. Endémica. 0-500 m.
- Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, SPE).
- Huarpea** Cabrera
- Huarpea andina** Cabrera
- Subarbusto. Endémica. 3000-4500 m.
- Países: ARG(SJU).
- Hyalis** D. Don ex Hook. & Arn.
- Hyalis argentea** D. Don ex Hook. & Arn. var. *argentea*
- Sin.: *Plazia argentea* Kunze, nom. nud., *Vernonia argentea* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.
- Subarbusto. Endémica. 1600-2700 m.
- Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU).
- Hyalis argentea** D. Don ex Hook. & Arn. var. *latisquama* Cabrera
- Subarbusto. Endémica. 100-1500 m.
- Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).
- Hyalis argentea** D. Don ex Hook. & Arn. var. *macrosperma* F.A. Roig
- Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
- Países: ARG(MEN).
- Hyalis lancifolia** Baker
- Sin.: *Hyalis lorentzii* Hieron., *Plazia acaciifolia* J. Kost.
- Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
- Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(PHA).
- Hyaloseris** Griseb.
- Hyaloseris andrade-limae** Cristóbal & Cabrera
- Arbusto. Endémica. 0-500 m.
- Países: ARG(SDE).
- Hyaloseris camataquiensis** Hieron. ex J. Kost.
- Arbusto. Nativa. 3400-3600 m.
- Países: ARG(JUU).
- Hyaloseris cinerea** (Griseb.) Griseb. var. *cinerea*
- Sin.: *Gochnatia cinerea* Griseb.
- Arbusto. Endémica. 800-1200 m.
- Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).
- Hyaloseris cinerea** (Griseb.) Griseb. var. *tomentella* Griseb.

Sin.: *Hyaloseris tomentella* (Griseb.) Hieron.
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: ARG(COR, LRI, SJU, SLU).

Hyaloseris rubicunda Griseb.
Arbusto. Endémica. 1100-2900 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

Hymenostephium Benth.

Hymenostephium debile (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Viguiera cabreræ* H. Rob., *Viguiera debilis* (Cabrera) Ariza, *Wulffia debilis* Cabrera
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hymenoxys Cass.

Hymenoxys anthemoides (Juss.) Cass. ex DC.
Sin.: *Actinea anthemoides* (Juss.) Kuntze, *Actinea haenkeana* (DC.) Kuntze, *Actinella anthemoides* (Juss.) Malme, *Actinella anthemoides* (Cass.) Herter, comb. illeg., *Actinella anthemoides* (Juss.) A. Gray, *Hymenopappus anthemoides* Juss., *Hymenoxys haenkeana* DC., *Hymenoxys parodii* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(ÑEE, PHA). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, SAO).

Hymenoxys cabreræ K.L. Parker
Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, RNE, SFE).

Hymenoxys megapotamica (Spreng.) P.L.R. Moraes
Sin.: *Actinea tweediei* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Actinella tweediei* (Hook. & Arn.) Malme, *Galinsoga megapotamica* Spreng., *Hymenoxys tweediei* Hook. & Arn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(FLO, RNO, SJO).

Hymenoxys robusta (Rusby) K.L. Parker
Sin.: *Cephalophora robusta* Rusby
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Hypochaeris L.

Hypochaeris acaulis (J. Remy) Britton
Sin.: *Achyrophorus acaulis* J. Remy
Hierba. Endémica. 1400-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Hypochaeris alba Cabrera
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: ARG(COS). PRY(CAU, ITA).

Hypochaeris albiflora (Kuntze) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.
Sin.: *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *albiflora* Kuntze, *Hypochaeris microcephala* (Sch. Bip.) Cabrera var. *albiflora* (Kuntze) Cabrera
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CON, GUA, MIE, SPE). URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON).

Hypochaeris apargioides Hook. & Arn.
Sin.: *Achyrophorus apargioides* (Hook. & Arn.) DC., *Achyrophorus lechleri* Sch. Bip., nom. inval., *Achyrophorus lessingii* Sch. Bip., *Achyrophorus philippii* Sch. Bip. ex Sched., *Achyrophorus tenerifolius* J. Remy, *Achyrophorus thrincioides* J. Remy, *Hypochaeris berteroi* Colla, *Hypochaeris cupressorum* F. Phil., *Hypochaeris hispidula* Phil., *Hypochaeris laciniosa* Phil., *Hypochaeris lessingii* (Sch. Bip.) Reiche, *Hypochaeris tenerifolia* (J. Remy) Dusén, *Hypochaeris thrincioides* (J. Remy) Reiche, *Oreophila apargioides* D. Don, *Oreophila picroides* D. Don, *Porcellites apargioides* Less.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Hypochaeris arenaria Gaudich.
Sin.: *Achyrophorus andinus* DC., *Achyrophorus arenarius* (Gaudich.) DC., *Achyrophorus humilis* Phil., *Achyrophorus magellanicus* Sch. Bip., *Achyrophorus webbii* Sch. Bip., nom. nud., *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb., *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *laciniata* Phil., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *andina* (DC.) Cabrera, *Hypochaeris humilis* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris pygmaea* Phil., *Hypochaeris ushuaiae* Skottsb., *Leontodon arenarius* (Gaudich.) Albov, *Seriola andina* DC., nom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-2400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Hypochaeris argentina Cabrera

Hierba. Nativa. 1700-4200 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Hypochaeris caespitosa Cabrera

Hierba. Endémica. 1400-2800 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Hypochaeris catharinensis Cabrera

Hierba. Endémica. 100-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypochaeris chillensis (Kunth) Britton

Sin.: *Achyrophorus brasiliensis* (Less.) Sch. Bip., *Achyrophorus chillensis* (Kunth) Sch. Bip., *Achyrophorus sagittatus* Phil., *Apargia chillensis* Kunth, *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb., *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *chacoensis* Hassl., *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *sulfurea* Kuntze, *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *tweediei* (Hook. & Arn.) Baker, *Hypochaeris chillensis* (Kunth) Hieron., *Hypochaeris tweediei* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Leontodon chillense* (Kunth) DC., *Porcellites brasiliensis* Less., *Porcellites brasiliensis* Less. var. *hirta* Less., *Porcellites brasiliensis* Less. var. *integrifolia* Less., nom. nud., *Porcellites brasiliensis* Less. var. *pinnatifida* Less., nom. nud., *Seriola brasiliensis* (Less.) Less., *Seriola tweediei* Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, COL,

FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

Hypochaeris chondrilloides (A. Gray) Cabrera

Sin.: *Achyrophorus chondrilloides* A. Gray, *Achyrophorus deserticola* Phil., *Achyrophorus glaucus* Phil., *Hypochaeris glabrata* Phil., *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche f. *halophila* Hauman, *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche var. *viridis* Hauman, *Hypochaeris halophila* (Hauman) Cabrera, *Oreophila chondrilloides* D. Don ex A. Gray, nom. inval., *Oreophila chondrilloides* Hook. & Arn., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TDF). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Hypochaeris clarionoides (J. Remy) Reiche

Sin.: *Achyrophorus clarionoides* J. Remy, *Achyrophorus microphyllus* J. Remy, *Hypochaeris clarionoides* (J. Remy) Reiche var. *microphylla* (J. Remy) Cabrera, *Hypochaeris microphylla* (J. Remy) Reiche, *Hypochaeris nana* Phil., *Hypochaeris tenuifolia* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *clarionoides* (J. Remy) Bortiri, *Hypochaeris thernarum* Phil.

Hierba. Endémica. 2500-3400 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, MAU, MAG, RME).

Hypochaeris echegarayi Hieron.

Sin.: *Achyrophorus setosus* Wedd., *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *leucantha* Cabrera, *Hypochaeris*

ornata J. Kost., *Hypochaeris setosa* (Wedd.) Rusby, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 3100-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

Hypochaeris elata (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Griseb.Sin.: *Achyrophorus elatus* Wedd.

Hierba. Nativa. 1200-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Hypochaeris eremophila CabreraSin.: *Distoecha taraxacoides* Phil.

Hierba. Nativa. 2800-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Hypochaeris eriolaena (Sch. Bip.) ReicheSin.: *Achyrophorus eriolaenus* Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: CHL(TAR).

Hypochaeris gayana (DC.) Cabrera

Sin.: *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *gayanus* DC., *Hypochaeris melanolepis* Phil., *Hypochaeris philippii* Kuntze var. *glabrescens* Kuntze, *Hypochaeris tenerifolia* (J. Remy) Dusén var. *glabrescens* (Kuntze) Cabrera

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Hypochaeris glabra L.Sin.: *Hypochaeris pumila* Phil.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TYT).

Hypochaeris grisebachii Cabrera

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI).
URY(CAS, CLA, FLA, MAL).**Hypochaeris hookeri** Phil.Sin.: *Hypochaeris montana* (Phil.) Reiche
var. *hookeri* (Phil.) Bortiri, *Hypochaeris stenophylla* Dusén

Hierba. Endémica. 200-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Hypochaeris incana (Hook. & Arn.)Macloskie var. *incana*Sin.: *Achyrophorus coronopifolius* Sch. Bip., *Achyrophorus coronopifolius* Sch. Bip. var. *integrifolius* Sch. Bip. ex Walp., *Achyrophorus incanus* (Hook. & Arn.) Sch. Bip., *Achyrophorus leucanthus* Speg., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *coronopifolia* (Sch. Bip.) Speg., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *integrifolia* (Sch. Bip.) Speg., *Hypochaeris coronopifolia* (Sch. Bip.) Franch., *Hypochaeris ibari* Phil., *Hypochaeris incana* (Hook. & Arn.) Macloskie var. *integrifolia* (Sch. Bip. ex Wedd.) Cabrera, *Hypochaeris incana* (Hook. & Arn.) Macloskie var. *leucantha* (Speg.) Cabrera, *Hypochaeris lanata* Dusén, *Hypochaeris leucantha* (Speg.) Speg., *Leontodon coronopifolium* (Sch. Bip.) Comm. ex Albov, *Seriola incana* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

Hypochaeris laciniata (Hicken) Urtubey, Stuessy & Tremetsb.Sin.: *Achyrophorus montanus* Phil., *Hypochaeris montana* (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Hypochaeris stenophylla* Dusén var. *laciniata* Hicken

Hierba. Endémica. 1800-4000 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU, SCR). CHL(RME).

Hypochaeris lutea (Vell.) BrittonSin.: *Achyrophorus bipontinae* Sch. Bip., *Achyrophorus brasiliensis* Gardner, nom. illeg., *Achyrophorus gardneri* Sch. Bip., *Achyrophorus sellowii* Sch. Bip., *Achyrophorus trichocephalus* Sch. Bip., *Hypochaeris gardneri* (Sch. Bip.) Baker, *Hypochaeris lutea* (Vell.) Britton var. *trichocephala* (Sch. Bip.) Cabrera, *Hypochaeris rosengurtii* Cabrera, *Prenanthes lutea* Vell.

Hierba. Nativa. 200-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA). URY(CLA, FLA, SJO).**Hypochaeris megapota mica** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).
BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR).**Hypochaeris meyeniana** (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb.Sin.: *Achyrophorus meyenianus* (Walp.) Walp., *Achyrophorus meyenianus* (Walp.) Walp. var. *ciliatus* Wedd., *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *brachylepis* Cabrera, *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *ciliata* (Wedd.) Perkins, *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *eriolaenoides* Cabrera, *Oreophila meyeniana* Walp.

Hierba. Nativa. 1700-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR).

Hypochaeris microcephala (Sch. Bip.) CabreraSin.: *Achyrophorus microcephalus* Sch. Bip., *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *microcephala* (Sch. Bip.) Baker, *Seriola brasiliensis* (Less.) Less. var. *parviflora* Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE). BRA(SCA).
URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, TYT).

Notas: Citada para Paraguay por Urtubey et al. (2019) sin citar material de herbario

Hypochaeris nahuelvutae Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: CHL(ARA).

Hypochaeris neopinnatifida C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.Sin.: *Hypochaeris pinnatifida* (Speg.) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb., nom. illeg., *Hypochaeris rosengurtii* Cabrera var. *pinnatifida* (Speg.) Cabrera, *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *acutibracteata* Speg., *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *pinnatifida* Speg.

Hierba. Endémica. 200-700 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA).
URY(MON).**Hypochaeris palustris** (Phil.) De Wild.Sin.: *Achyrophorus palustris* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).**Hypochaeris pampasica** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU).

Hypochaeris parodii Cabrera

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hypochaeris patagonica Cabrera

Sin.: *Hypochaeris chubutensis* Bortiri

Hierba. Endémica. 300-800 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Hypochaeris petiolaris (Hook. & Arn.)

Griseb.

Sin.: *Achyrophorus petiolaris* (Hook. & Arn.) DC., *Seriola petiolaris* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SFE, SLU, TUC).
URY(CAS, COL, MON, SJO).

Hypochaeris radicata L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, COL, FLO, MAL, MON, ROC, SJO).

Hypochaeris scorzonerae (DC.) F.

Muell. var. **scorzonerae**

Sin.: *Achyrophorus chrysanthus* DC., *Achyrophorus foliosus* Phil., *Achyrophorus grandidentatus* Phil., *Achyrophorus scorzonerae* DC., *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *glabratus* DC., *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *ramosus* DC., *Hypochaeris crysanthus* Poepp. ex DC., *Hypochaeris deserticola* Phil., *Hypochaeris foliosa* (Phil.) Reiche,

Hypochaeris grandidentata (Phil.)

Reiche, *Hypochaeris scorzonerae* (DC.) F. Muell. var. *glabrata* (DC.)

Reiche, *Hypochaeris scorzonerae* (DC.) F. Muell. var. *ramosa* (DC.)

Reiche, *Oreophila taraxacoides* D. Don, *Seriola taraxacoides* (D. Don) Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Hypochaeris spathulata (J. Remy)

Reiche

Sin.: *Achyrophorus brevicaulis* Phil., *Achyrophorus spathulatus* J. Remy, *Achyrophorus spathulatus* J. Remy var. *chiloensis* J. Remy, *Hypochaeris grandiflora* F. Phil., hom. illeg., *Hypochaeris philippii* Kuntze, *Hypochaeris spathulata* (J. Remy) Reiche var. *chiloensis* (J. Remy) Reiche, *Hypochaeris toltensis* Reiche, nom. superfl.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Hypochaeris taraxacoides (Walp.) Ball

Sin.: *Achyrophorus stenocephalus* A. Gray ex Wedd., nom. inval., *Achyrophorus taraxacoides* Walp., *Achyrophorus taraxacoides* Walp. var. *stenocephalus* A. Gray ex Wedd., *Hypochaeris stenocephala* (A. Gray ex Wedd.) Kuntze, comb. illeg., *Hypochaeris stenocephala* (A. Gray ex Wedd.) Kuntze var. *integrifolia* Kuntze, *Hypochaeris stenocephala* (A. Gray ex Wedd.) Kuntze var. *taraxacoides* (Meyen & Walp.) Kuntze, *Hypochaeris stenophylla* Dusén var. *integrifolia* Kuntze, *Oreophila taraxacifolia* Meyen & Walp., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 2600-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb.

Sin.: *Achyrophorus angustissimus* Phil., *Achyrophorus araucanus* Phil., *Achyrophorus graminifolius* Phil., nom. nud., *Achyrophorus odoratus* (Poepp. & Endl.) Walp., *Achyrophorus psychrophilus* Wedd., *Achyrophorus spinuliger* Phil., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *linearifolius* DC., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *neoeanus* DC., *Achyrophorus volckmannii* Phil., *Hypochaeris eurylepis* Phil., *Hypochaeris graminifolia* Phil., *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. f., *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. f. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris psychrophila* (Wedd.) Reiche, *Hypochaeris spinuligera* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris tenuifolia* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *eurylepis* (Phil.) Cabrera, *Hypochaeris tenuifolia* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *linearifolia* (DC.) Bortiri, *Hypochaeris volckmannii* (Phil.) Phil., *Oreophila odorata* Poepp. & Endl., *Oreophila tenuifolia* D. Don ex Hook. & Arn., nom. inval., *Seriola tenuifolia* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 1300-3200 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Hypochaeris tropicalis Cabrera

Sin.: *Hypochaeris tropicalis* Cabrera var. *australis* Cabrera

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(MIE, PAI).

URY(ART, CLA, FLA, PAY, SAO, SJO).

Hypochaeris variegata (Lam.) Baker
Sin.: *Achyrophorus variegatus* (Lam.) Sch. Bip., *Apargia variegata* (Lam.) Willd., *Hieracium variegatum* Lam., *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *glaucescens* Speg., *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *nana* Speg., *Leontodon variegatum* Willd. ex Poir.
Hierba. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS). BRA(RGS). URY(COL, LAV, MAL, MON).

Hysterionica Willd.

Hysterionica aberrans (Cabrera)
Cabrera var. **aberrans**
Sin.: *Hysterionica bakeri* Hicken var. *aberrans* Cabrera
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(TUC).

Hysterionica aberrans (Cabrera)
Cabrera var. **hunzikeri** Ariza
Hierba. Endémica. 2200-2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Hysterionica bakeri Hicken
Sin.: *Hysterionica caurina* Johnst.
Hierba. Endémica. 100-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Hysterionica cabreriae Ariza
Subarbusto. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Hysterionica chamomilloides Deble
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV).

Hysterionica dianthifolia (Griseb.)
Cabrera var. **dianthifolia**
Sin.: *Erigeron dianthifolius* Griseb., *Neja dianthifolia* (Griseb.) G.L. Nesom
Subarbusto. Endémica. 2000-2900 m.
Países: ARG(COR).

Hysterionica dianthifolia (Griseb.)
Cabrera var. **pulvinata** (Cabrera)
Ariza
Sin.: *Hysterionica pulvinata* Cabrera, *Neja pulvinata* (Cabrera) G.L. Nesom
Subarbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(COR).

Hysterionica glaucifolia (Kuntze) Solbrig
Sin.: *Erigeron glaucifolius* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(MEN).

Hysterionica jasionoides Willd.
Sin.: *Chrysopsis andicola* Phil., *Diplopappus hispidus* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Erigeron mendocinus* Greene, *Heterochaeta hispida* DC., *Hysterionica intermedia* Hieron., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC).

Notas: Citada para Uruguay por Cabrera, 1946, 1963a; Sancho & Ariza Espinar, 2003 sin indicar material de referencia.

Hysterionica matzenbacherii A.A. Schneid.
Hierba. Endémica. 900-1400 m.
Países: BRA(SCA).

Hysterionica nebularis Deble, A.S. Oliveira & Marchiori
Subarbusto. Endémica. 900
Países: BRA(RGS).

Hysterionica pinnatiloba Matzenb. & Sobral
Subarbusto. Endémica. 900
Países: BRA(RGS, SCA).

Hysterionica pinnatisecta Matzenb. & Sobral
Subarbusto. Endémica. 1000-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Hysterionica pulchella Cabrera
Sin.: *Erigeron lanceolatus* Wedd. var. *lorentzianus* Griseb., *Hysterionica bakeri* Hicken f. *decumbens* Hicken
Hierba. Endémica. 2500-4400 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Hysterionica resinosa (Spreng.) P.L.R. Moraes
Sin.: *Diplopappus villosus* Hook. & Arn., nom. illeg., *Erigeron dubius* Spreng., *Erigeron resinosus* Spreng., *Hysterionica nidorelloides* (DC.) Baker, *Hysterionica villosa* Cabrera, *Neja nidorelloides* DC.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(CEN, ITA). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC).

lanthopappus Roque & D.J.N. Hind

lanthopappus corymbosus (Less.) Roque & D.J.N. Hind
Sin.: *Actinoseris corymbosa* (Less.) Cabrera, *Gochnatia corymbosa* Less., *Onoseris corymbosa* (Less.) Benth. & Hook. f.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(ART).

Ichthyothere Mart.

Ichthyothere integrifolia (DC.) BakerSin.: *Ichthyothere agrestis* Baker

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

Ichthyothere mollis Baker

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Idiothamnus R.M. King & H. Rob.**Idiothamnus lilloi** (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium lilloi* B.L. Rob.

Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC).
PRY(APY).**Idiothamnus pseudorgyalis** R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Inulopsis (DC.) O. Hoffm.**Inulopsis scaposa** (DC.) O. Hoffm.Sin.: *Aster longipes* Gardner,
Haplopappus scaposus DC.,
Leucopsis scaposa (DC.) Baker

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA,
CAU, CAA, ITA).**Inulopsis stenophylla** Dusén

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

locenes B.Nord.**locenes virens** (Phil.) PruskiSin.: *locenes acanthifolius* B. Nord.,
locenes acanthifolius B. Nord. subsp.
virens (Phil.) B. Nord., *Senecio*
acanthifolius Hombr. & Jacquinot ex
Hook., hom. illeg. subsp. *virens* (Phil.)
Cabrera & Zardini, *Senecio*
acanthifolius Hombr. & Jacquinot ex
Hook., hom. illeg., *Senecio auriculatus*
Albov, hom. illeg., *Senecio*
ombrophyllus Skottsb., *Senecio virens*
Phil.

Hierba. Endémica. 200-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).**Isostigma** Less.**Isostigma acaule** (Baker) ChodatSin.: *Bidens acaulis* Baker, *Isostigma*
vailianum Britton

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, PHA).

Isostigma cordobense CabreraSin.: *Isostigma crithmifolium* Less. var.
nanum Sherff

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(COR).

Isostigma dissitifolium BakerSin.: *Isostigma peucedanifolium* (Spreng.)
Less. var. *dissitifolium* (Baker) Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500
m.
Países: ARG(MIS). PRY(COA, PAI).**Isostigma herzogii** Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(APY).

Isostigma hoffmannii Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, SJU). PRY(APY).

Isostigma molfinianum SherffSin.: *Bodenbenderia riojana* Kurtz, nom.
nud.Hierba o subarbusto. Endémica. 1400-
4600 m.

Países: ARG(CAT, LRI).

Isostigma peucedanifolium (Spreng.)Less. var. **crithmifolium** (Less.) G.
PeterSin.: *Isostigma crithmifolium* Less.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(ITA, MIE).
URY(ART, PAY, RIV, SAO, TAC).**Isostigma peucedanifolium** (Spreng.)Less. var. **peucedanifolium**Sin.: *Isostigma peucedanifolium* (Spreng.)
Less. var. *genuinum* Hassl., nom.
inval., *Tragoceros peucedanifolium*
Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS). PRY(ITA, MIE,
ÑEE). URY(ART, SAO).**Isostigma peucedanifolium** (Spreng.)Less. var. **speciosum** (Less.) G. PeterSin.: *Isostigma peucedanifolium* (Spreng.)
Less. f. *discoidea* Hassl., *Isostigma*
peucedanifolium (Spreng.) Less. f.
radiata Hassl., *Isostigma speciosum*
Less.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CAN, COA).**Isostigma simplicifolium** Less. var.**riedelii** (Baker) G. PeterSin.: *Isostigma riedelii* (Baker) Chodat,
Isostigma speciosum Less. var. *riedelii*
Baker

Hierba. Endémica. 200-300 m.

Países: BRA(RGS). PRY(AMA, CAU,
CAN, CON, SPE).

Jaegeria Kunth

Jaegeria hirta (Lag.) Less.

Sin.: *Acmella hirta* Lag., *Eclipta bellidioides* (Spreng.) Sch. Bip. ex S.F. Blake, *Jaegeria bellidioides* Spreng., *Jaegeria discoidea* Klatt, *Jaegeria hirta* (Lag.) Less. var. *glabra* Baker, *Jaegeria mnioides* Kunth, *Jaegeria parviflora* DC., *Jaegeria repens* DC., *Spilanthes ecliptoides* Gardner, *Spilanthes karvinskiana* DC., *Spilanthes mariannae* DC., *Spilanthes sessilifolia* Hemsl.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA). URY(CLA, COL, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Jaumea Pers.

Jaumea linearifolia (Juss.) DC.

Sin.: *Jaumea linearis* Pers., nom. illeg., *Kleinia linearifolia* Juss.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(CAS, MAL, MON, ROC).

Jungia L. f.

Jungia floribunda Less.

Sin.: *Jungia affinis* Gardner, *Jungia floribunda* Less. var. *affinis* (Gardner) Baker, *Jungia pubescens* (Lag.) Kuntze var. *floribunda* (Less.) Kuntze, *Jungia pubescens* (Lag.) Kuntze var. *tomentosa* (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze, *Jungia pyramidalis* D. Don, *Jungia tomentosa* Sch. Bip. ex Baker
Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, ROC, TAC).

Jungia pauciflora Rusby

Sin.: *Jungia herzogiana* P. Beauv. ex J. Kost., *Jungia mandonii* Sch. Bip., nom. illeg., *Jungia orbicularis* Rusby, *Jungia pubescens* (Lag.) Kuntze var. *boliviensis* Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Jungia polita Griseb.

Sin.: *Jungia divaricata* Rusby, *Jungia polita* Griseb. var. *divaricata* (Rusby) Kuntze, *Jungia polita* Griseb. var. *glabra* Kuntze, *Jungia polita* Griseb. var. *tomentosa* Kuntze

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-2700 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR).

Jungia sellowii Less.

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Jungia sordida J. Kost.

Sin.: *Jungia pubescens* (Lag.) Kuntze var. *grandistipulata* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 900-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Katinasia Bonifacino

Katinasia cabreræ (Bonifacino) Bonifacino

Sin.: *Nardophyllum cabreræ* Bonifacino
Arbusto. Endémica. 700-1600 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Kaunia R.M. King & H. Rob.

Kaunia lasiophthalma (Griseb.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium hiemale* Lillo, *Eupatorium lasiophthalmum* Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-1800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Kaunia rufescens (P.W. Lund ex DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium rufescens* P.W. Lund ex DC., *Eupatorium rufescens* P.W. Lund ex DC. var. *glabratum* Hieron. ex B.L. Rob., *Eupatorium rufescens* P.W. Lund ex DC. var. *glabratum* Hieron. ex Kuntze, nom. nud., *Eupatorium subtripplinerve* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, GUA).

Kaunia saltensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium eucosmum* B.L. Rob., *Eupatorium saltense* Hieron.

Arbusto. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Kieslingia Faúndez, Saldivia & A.E.Martic.

Kieslingia chilensis Faúndez, Saldivia & A.E. Martic.

Arbusto. Endémica. 1600-2500 m.

Países: CHL(ATA).

Koanophyllon Arruda

Koanophyllon consanguineum (DC.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium consanguineum* DC.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Koanophyllon lobatifolium (Cabrera)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium lobatifolium* Cabrera

Hierba. Endémica. 500

Países: BRA(SCA).

Koanophyllon solidaginoides (Kunth)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium filicaule* Sch. Bip. ex A.Gray, *Eupatorium solidaginoides*Kunth, *Eupatorium stipuliferum* Rusby,*Koanophyllon stipuliferum* (Rusby)R.M. King & H. Rob., *Ophryosporus**solidaginoides* (Kunth) Hieron.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COS, JUJ, SAL,

SDE). PRY(APY, CHO).

Koanophyllon tinctorium ArrudaSin.: *Eupatorium laeve* DC., *Eupatorium**laeve* DC. var. *latifolia* Sch. Bip. exHieron., *Eupatorium laeve* DC. var.*macrophyllum* Chodat, *Eupatorium**laeve* DC. var. *pubens* B.L. Rob.,*Eupatorium simillimum* B.L. Rob.,*Koanophyllon simillimum* (B.L. Rob.)

R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,

SCA). PRY(CAU, CEN, CON, COA,

GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Lactuca L.**Lactuca canadensis** L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Lactuca saligna L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, DFE, LPA,

MEN, NEU, SLU). BRA(PAR).

URY(FLA, MON, PAY).

Lactuca sativa L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR). BRA(PAR,

RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, RME).

Lactuca serriola L.Sin.: *Lactuca scariola* L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,

COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI,

MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU,

SLU, SFE). BRA(RGS, SCA).

CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO,

MAU, BIO, ARA, RME). PRY(PAI).

URY(ART, COL, MON, PAY, RNO,

RIV, SAO, SOR, TAC).

Lactuca virosa L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). CHL(LBO, MAU,

BIO, ARA, RME).

Laennecia Cass.**Laennecia altoandina** (Cabrera) G.L.

Nesom

Sin.: *Conyza altoandina* Cabrera

Hierba. Nativa. 3900-4200 m.

Países: ARG(JUJ).

Laennecia artemisioides (Meyen & Walp.) G.L. NesomSin.: *Conyza andicola* Phil., *Conyza**artemisioides* Meyen & Walp., *Conyza**senecioides* (Wedd.) Cabrera,*Erigeron artemisioides* (Meyen &Walp.) Sch. Bip., *Erigeron senecioides*Wedd., *Marsea artemisiifolia* (Meyen &

Walp.) Kuntze, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 3500-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP,

TAR, ANT, RME).

Laennecia sophiifolia (Kunth) G.L.

Nesom

Sin.: *Conyza coulteri* A. Gray var.*tenuisecta* A. Gray, *Conyza pulchella*Kunth, *Conyza serpentaria* Griseb.,*Conyza sophiifolia* Kunth,*Eschenbachia tenuisecta* (A. Gray)Wootton & Standl., *Marsea sophiifolia*(Kunth) Kuntze, *Marsea sophiifolia*

(Kunth) V.M. Badillo, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 300-2200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ,

LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU,

TUC).

Lagascea Cav., nom. cons.**Lagascea mollis** Cav.Sin.: *Lagascea campestris* Gardner,*Lagascea kunthiana* Gardner,*Lagascea parvifolia* Klatt, *Nocca mollis*

(Cav.) Jacq.

Hierba. Nativa. 100-1300 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR,

JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY,

CEN).

Lagenophora Cass.**Lagenophora hariatii** Franch.Sin.: *Lagenifera hariatii* (Franch.) T.R.Dudley, comb. superfl., *Lagenophora**hirsuta* Poepp. ex Less. var. *gracilis*

Albov

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,

TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR,

LLA, AIS, MAG, JFE).

Lagenophora hirsuta Poepp. ex Less.
Sin.: *Lagenophora commersonii* Cass.
var. *hirsuta* (Poepp. ex Less.) Hook. f.
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS,
MAG, RME).

Lagenophora nudicaulis (Comm. ex
Lam.) Dusén
Sin.: *Aster nudicaulis* Comm. ex Lam.,
Bellis magellanica DC., *Calendula
magellanica* Willd., *Calendula pusilla*
Thouars, *Lagenifera nudicaulis*
(Comm. ex Lam.) T.R. Dudley, comb.
superfl., *Lagenophora commersonii*
Cass., *Lagenophora purpurascens*
Phil.
Hierba. Endémica. 0-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS,
MAG).

Lapsana L.

Lapsana communis L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, NEU).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LSR, LLA, AIS, RME, JFE).

Lasthenia Cass.

Lasthenia kunthii (Less.) Hook. & Arn.
Sin.: *Hymenatherum kunthii* Less.,
Lasthenia bridgesii (Poepp. & Endl.)
Steud., *Lasthenia chilensis* Steud.,
nom. superfl., *Lasthenia obtusifolia*
Cass., *Lasthenia obtusifolia* Cass. var.
bridgesii (Poepp. & Endl.) DC.,
Rancagua bridgesii Poepp. & Endl.,
Rancagua feuillei (Bertero) Poepp. &
Endl., *Tagetes feuillei* Bertero

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG,
RME).

Leontodon L. f., nom. cons.

Leontodon autumnalis L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(SCR). CHL(VAL, MAG).

Leontodon hirtus L.
Sin.: *Thrinicia hirta* Roth
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: CHL(VAL, BIO, LSR, LLA).

Leontodon saxatilis Lam.
Sin.: *Hyoseris taraxacoides* Vill., nom.
superfl., *Leontodon taraxacoides* (Vill.)
Willd. ex Mérat., hom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, COR). CHL(VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,
JFE).

Lepidaploa (Cass.) Cass.

Lepidaploa amambaia H. Rob.
Sin.: *Vernonia amambaia* (H. Rob.)
Dematteis
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CEN, CON).

Lepidaploa argyrotrichia (Sch. Bip. ex
Baker) H. Rob.
Sin.: *Vernonia argyrotrichia* Sch. Bip. ex
Baker
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lepidaploa balansae (Hieron.) H. Rob.
Sin.: *Lessingianthus dorsiventralis*
(Chodat) H. Rob., *Vernonia balansae*

Hieron., *Vernonia dorsiventralis*
Chodat
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,
CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA,
PAI, SPE).

Lepidaploa chamissonis (Less.) H. Rob.
Sin.: *Cacalia chamissonis* (Less.) Kuntze,
Vernonia chamissonis Less., *Vernonia
parodii* Cabrera
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR).
BRA(PAR, SCA). PRY(CHO, PAI,
PHA).

Lepidaploa decumbens (Gardner) H.
Rob.
Sin.: *Vernonia decumbens* Gardner
Hierba. Nativa. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lepidaploa eriolepis (Gardner) H. Rob.
Sin.: *Cacalia eriolepis* (Gardner) Kuntze,
Vernonia eriolepis Gardner
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lepidaploa novarae (Cabrera) A.J. Vega
& Dematteis
Sin.: *Vernonia novarae* Cabrera
Arbusto. Endémica. 600-1800 m.
Países: ARG(SAL).

Lepidaploa pseudomuricata H. Rob.
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Lepidaploa psilostachya (DC.) H. Rob.
Sin.: *Vernonia oxylepis* Sch. Bip. ex
Baker, *Vernonia psilostachya* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, COA).

Lepidaploa remotiflora (Rich.) H. Rob.
 Sin.: *Vernonia hirtiflora* Sch. Bip. ex Baker, *Vernonia leonensis* Cabrera, *Vernonia lithospermoides* Baker, *Vernonia remotiflora* Rich., *Vernonia remotiflora* Rich. var. *tricholepis* (DC.) Baker, *Vernonia sessiliflora* Willd. ex Less., *Vernonia tricholepis* DC.
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Lepidaploa salzmännii (DC.) H. Rob.
 Sin.: *Vernonia argyropappa* H. Buek, *Vernonia herbertii* Cuatrec., *Vernonia miersiana* Gardner, *Vernonia poeppigiana* DC., *Vernonia salzmännii* DC., *Vernonia velutina* Hieron.
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Lepidaploa setososquamosa (Hieron.) M.B. Angulo & Dematteis
 Sin.: *Vernonia remotiflora* Rich. var. *aristifera* Cabrera, *Vernonia setososquamosa* Hieron.
 Hierba. Nativa. 500-1400 m.
 Países: ARG(SAL). PRY(APA, AMA, CAN, CON).

Lepidaploa tarijensis (Griseb.) H. Rob.
 Sin.: *Cacalia tarijensis* (Griseb.) Kuntze, *Vernonia sericea* Rich. var. *tarijensis* Griseb., *Vernonia tarijensis* (Griseb.) Hieron.
 Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
 Países: ARG(SAL).

Lepidophyllum Cass.

Lepidophyllum cupressiforme (Lam.) Cass.

Sin.: *Athanasia cupressiformis* Comm. ex Cass., nom. nud., *Baccharis cupressiformis* (Lam.) Pers., *Brachyridium cupressiforme* (Lam.) Meisn., *Conyza cupressiformis* Lam., *Grindelia cupressiformis* (Lam.) Sch. Bip. ex Reiche, *Gutierrezia cupressiformis* (Lam.) Sch. Bip.
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Leptinella Cass.

Leptinella scariosa Cass.
 Sin.: *Cotula acaenoides* (Hook. & Arn.) Alb., *Cotula hombronii* Franch., *Cotula scariosa* (Cass.) Franch., *Leptinella acaenoides* Hook. & Arn.
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, LSR, LLA, AIS, MAG).

Leptocarpha DC.

Leptocarpha rivularis DC.
 Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
 Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Leptostelma D. Don

Leptostelma catharinense (Cabrera) A. Teles & Sobral
 Sin.: *Erigeron catharinensis* Cabrera
 Hierba. Endémica. 1200-2000 m.
 Países: BRA(SCA).

Leptostelma maxima D. Don
 Sin.: *Aster maximus* (D. Don) Less., *Erigeron alpestris* Gardner, *Erigeron maximus* (D. Don) DC., *Erigeron maximus* (D. Don) DC. var. *minor*

Baker, *Erigeron maximus* (D. Don) DC. var. *palustris* (Gardner) Baker, *Erigeron palustris* Gardner, *Erigeron scaberrimus* Gardner, *Erigeron schuchtii* Sch. Bip., nom. nud., *Erigeron sulcatus* DC.
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA, PAI).

Leptostelma meyeri (Cabrera) A. Teles
 Sin.: *Erigeron meyeri* Cabrera
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, ERI).

Leptostelma tucumanense (Cabrera) A. Teles
 Sin.: *Erigeron tucumanensis* Cabrera
 Hierba. Endémica. 2400-2600 m.
 Países: ARG(CAT, TUC).

Leptostelma tweediei (Hook. & Arn.) D. J. N. Hind & G.L. Nesom
 Sin.: *Erigeron seneciiformis* S.F. Blake, *Erigeron tweediei* Hook. & Arn., *Haplopappus tweediei* (Hook. & Arn.) Malme, *Leucopsis tweediei* (Hook. & Arn.) Baker
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).

Lessingianthus H. Rob.

Lessingianthus arachniolepis (Ekman ex Dusén) H. Rob.
 Sin.: *Vernonia arachniolepis* Ekman ex Dusén
 Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Lessingianthus argenteus (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia argentea* (Less.) Kuntze, *Vernonia argentea* Less.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN).

Lessingianthus asteriflorus (Mart. ex DC.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia asteriflora* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Cacalia kuntzei* (Hieron.) Kuntze, *Vernonia asteriflora* Mart. ex DC., *Vernonia kuntzei* Hieron.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, GUA).

Lessingianthus bardanoides (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia bardanoides* (Less.) Kuntze, *Vernonia bardanoides* Less., *Vernonia reticulata* Gardner, hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

Lessingianthus bellulus (Dematteis) M.B. Angulo

Sin.: *Vernonia bellula* Dematteis
Subarbusto. Nativa. 600
Países: PRY(CAN).

Lessingianthus brevifolius (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia brevifolia* (Less.) Kuntze, *Cacalia brevifolia* (Less.) Kuntze var. *ericifolia* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Vernonia brevifolia* Less., *Vernonia brevifolia* Less. var. *ericifolia* (Hook. & Arn.) Baker, *Vernonia brevifolia* Less. var. *squarrosifoliata* Hieron., *Vernonia ericifolia* Hook. & Arn., *Vernonia filifolia* Mart. ex Baker, *Vernonia linosyriifolia* Chodat, *Vernonia linosyriifolia* Chodat f. *major* Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, SAO, TAC).

Lessingianthus cataractarum (Hieron.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia cataractarum* Hieron.
Arbusto. Endémica. 300-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lessingianthus centaurosideus (Hieron.) M.B. Angulo & Dematteis

Sin.: *Vernonia centaurosidea* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Lessingianthus concepcionis M.B.

Angulo & Dematteis
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: PRY(CON).

Lessingianthus constrictus (Matzenb. & Mafioleti) Dematteis

Sin.: *Vernonia constricta* Matzenb. & Mafioleti
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).

Lessingianthus correntinus (Cabrera & Cristóbal) Dematteis

Sin.: *Vernonia correntina* Cabrera & Cristóbal
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Lessingianthus durus (Mart. ex DC.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia dura* Mart. ex DC.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Lessingianthus elegans (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Vernonia elegans* Gardner
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Lessingianthus exiguus (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonia exigua* Cabrera
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lessingianthus glabratus (Less.) H. Rob. var. **angustifolius** (Cabrera) Dematteis

Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var. *angustifolia* Cabrera
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).

Lessingianthus glabratus (Less.) H. Rob. var. **glabratus**

Sin.: *Cacalia glabrata* (Less.) Kuntze, hom. illeg., *Cacalia lappoides* (Baker) Kuntze, *Cacalia radula* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Vernonia ensifolia* Mart. ex DC., *Vernonia glabrata* Less. f. *oxyphylla* Chodat, *Vernonia glabrata* Less. var. *cuneifolia* Chodat, *Vernonia glabrata* Less. var. *glabrata*, *Vernonia glabrata* Less. var. *serrata* Chodat, *Vernonia lappoides* Baker, *Vernonia oxyodonta* Malme, *Vernonia radula* Mart. ex DC., *Vernonia radula* Mart. ex DC. var. *latifolia* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(RIV, SAO, TAC).

Lessingianthus grandiflorus (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia grandiflora* Less.
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, SPE).

- Lessingianthus hasslerianus** (Chodat) M.B. Angulo
Sin.: *Vernonia hassleriana* Chodat
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: PRY(AMA, CAN, ITA).
- Lessingianthus hypochaeris** (DC.) H. Rob.
Sin.: *Cacalia hypochaeris* (DC.) Kuntze, *Vernonia hypochaeris* DC.
Hierba. Nativa. 300-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN).
- Lessingianthus lanatus** (Chodat) Dematteis
Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var. *lanata* Chodat, *Vernonia lanata* (Chodat) Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, COA, GUA, PAI).
- Lessingianthus laniferus** (Cristóbal & Dematteis) M.B. Angulo
Sin.: *Vernonia lanifera* Cristóbal & Dematteis
Subarbusto. Nativa. 100-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Lessingianthus lorentzii** (Hieron.) H. Rob.
Sin.: *Vernonia lorentzii* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
- Lessingianthus macrocephalus** (Less.) H. Rob.
Sin.: *Vernonia macrocephala* Less.
Subarbusto. Endémica. 100-400 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, MON, RIV, TAC).
- Lessingianthus macrophyllus** (Less.) H. Rob.
- Sin.: *Cacalia macrophylla* (Less.) Kuntze, hom. illeg., *Vernonia macrophylla* Less.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Lessingianthus magnificus** Deble, Dematteis & Marchiori
Sin.: *Dematteis* & Marchiori) Dematteis, *Lessingianthus alegretensis* Deble & R. Matielo, *Vernonia magnifica* (Deble) Arbusto. Endémica. 100-400 m.
Países: BRA(RGS).
- Lessingianthus mollissimus** (D. Don ex Hook. & Arn.) H. Rob. var. **microcephalus** (Hieron.) Dematteis
Sin.: *Vernonia mollissima* D. Don ex Hook. & Arn. var. *microcephala* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR, COS, MIS).
- Lessingianthus mollissimus** (D. Don ex Hook. & Arn.) H. Rob. var. **mollissimus**
Sin.: *Cacalia mollissima* (D. Don ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Vernonia mollissima* D. Don ex Hook. & Arn. var. *mollissima*
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAN).
- Lessingianthus niederleinii** (Hieron.) H. Rob.
Sin.: *Vernonia hystricosa* Cabrera & Dematteis, *Vernonia microdonta* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud., *Vernonia niederleinii* Hieron., *Vernonia valenzuelae* Chodat
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA, SPE).
- Lessingianthus paraguariensis** Dematteis
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(AMA).
- Lessingianthus parvifolius** (Chodat) H. Rob.
Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var. *parvifolia* Chodat, *Vernonia parvifolia* (Chodat) Cabrera
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, COA, PAI).
- Lessingianthus plantaginodes** (Kuntze) H. Rob.
Sin.: *Cacalia plantaginoides* Kuntze, *Vernonia pseudosquarrosa* Hieron., *Vernonia rubricaulis* Bonpl. var. *squarrosa* Less., *Vernonia squarrosa* (Less.) Less, nom. illeg., *Vernonia squarrosa* (Less.) Less. var. *plantaginea* Less., *Vernonia squarrolosa* Mattf. ex Malme
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).
- Lessingianthus platyphyllus** (Chodat) H. Rob.
Sin.: *Vernonia platyphylla* Chodat
Subarbusto. Endémica. 400-800 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAN).
- Lessingianthus polyphyllus** (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.
Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var. *bracteata* Chodat, *Vernonia glabrata* Less. var. *linearifolia* Chodat, *Vernonia polyphylla* Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, MIE).
- Lessingianthus profusus** (Dematteis & Cabrera) M.B. Angulo

- Sin.: *Vernonia profusa* Dematteis & Cabrera
Subarbusto. Nativa. 600-800 m.
Países: PRY(AMA, CAN, COA).
- Lessingianthus pseudoincanus** (Hieron.) Dematteis & M.B. Angulo
Sin.: *Cacalia rubricaulis* (Bonpl.) Kuntze var. *pseudoincana* (Hieron.) Kuntze, *Vernonia acutifolia* Hook. var. *ambigua* DC., *Vernonia pseudoincana* (Hieron.) Cabrera, *Vernonia rubricaulis* Bonpl. var. *denudata* Baker, *Vernonia rubricaulis* Bonpl. var. *latifolia* Less., *Vernonia rubricaulis* Bonpl. var. *pseudoincana* Hieron., *Vernonia salicifolia* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MEN, SAL, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS). PRY(CEN, ÑEE). URY(ROC).
- Lessingianthus psilophyllus** (DC.) H. Rob.
Sin.: *Cacalia graminifolia* (Gardner) Kuntze, *Cacalia psilophylla* (DC.) Kuntze, *Vernonia graminifolia* Gardner, *Vernonia psilophylla* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Lessingianthus pubescens** M.B. Angulo & Dematteis
Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var. *puberula* Chodat
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, MIE, SPE).
- Lessingianthus pumillus** (Vell.) H. Rob.
Sin.: *Vernonia sessilifolia* Less.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
- Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, CON).
- Lessingianthus pusillus** (Dematteis) M.B. Angulo
Sin.: *Vernonia pusilla* Dematteis
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE, SDE). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, COA, MIE, PAI, PHA).
- Lessingianthus ramellae** (Cabrera) H. Rob.
Sin.: *Vernonia ramellae* Cabrera, *Vernonia sessilifolia* Less. var. *auriculata* Chodat
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(PAI).
- Lessingianthus reitzianus** (Cabrera) H. Rob.
Sin.: *Vernonia reitziana* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1200-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Lessingianthus rubricaulis** (Bonpl.) H. Rob.
Sin.: *Cacalia intermedia* (DC.) Kuntze, *Cacalia rubricaulis* (Bonpl.) Kuntze, *Lessingianthus intermedius* (DC.) Dematteis, *Vernonia chromolepis* Gardner, *Vernonia intermedia* DC., *Vernonia intermedia* DC. var. *ramosior* DC., *Vernonia linearis* D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud., *Vernonia rubricaulis* Bonpl., *Vernonia rubricaulis* Bonpl. f. *bonplandia* Less., *Vernonia rubricaulis* Bonpl. var. *australis* Hieron., *Vernonia squarrosa* (D. Don) Less. var. *angustifolia* Less.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI,
- PHA, SPE). URY(MAL, MON, PAY, RIV).
- Lessingianthus saltensis** (Hieron.) H. Rob.
Sin.: *Vernonia saltensis* Hieron.
Subarbusto. Nativa. 300-1300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).
- Lessingianthus sanctipauli** (Hieron.) Dematteis
Sin.: *Vernonia sanctipauli* Hieron.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Lessingianthus sellowii** (Less.) H. Rob.
Sin.: *Cacalia sellowii* (Less.) Kuntze, *Vernonia sellowii* Less.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, MIE). URY(ART, MON, PAY, RIV, TAC).
- Lessingianthus spicatus** (Cabrera) Dematteis
Sin.: *Vernonia spicata* Cabrera
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS).
- Lessingianthus teyucuaensis** (Cabrera) Dematteis
Sin.: *Vernonia teyucuaensis* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(MIS).
- Lessingianthus ulei** (Hieron.) H. Rob.
Sin.: *Vernonia ulei* Hieron.
Subarbusto. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Lessingianthus varroniifolius** (DC.) H. Rob.
Sin.: *Vernonia varroniifolia* DC.

Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: PRY(AMA).

Lessingianthus westermanii (Ekman & Dusén ex Malme) H. Rob.
Sin.: *Vernonia westermanii* Ekman & Dusén ex Malme
Subarbusto. Endémica. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Leucanthemum Mill.

Leucanthemum vulgare Lam.
Sin.: *Chrysanthemum leucanthemum* L., *Leucanthemum leucanthemum* (L.) Rydb., nom. inval., *Tanacetum leucanthemum* (L.) Sch. Bip.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME). URY(CAS, COL, MON, SJO, SOR).

Leucheria Lag.

Leucheria achillaeifolia Hook. & Arn.
Sin.: *Chabreaa fragrans* Phil., *Chabreaa multifida* DC., *Lasiorrhiza achillaeifolia* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Lasiorrhiza anthemidifolia* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza fragrans* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza ibari* (Phil.) Macloskie, *Lasiorrhiza multifida* (DC.) Kuntze, *Leucheria anthemidifolia* Phil., *Leucheria ibari* Phil., *Leucheria ibari* Phil. var. *glabrata* Speg., *Leucheria ibari* Phil. var. *glandulosa* Speg., *Leucheria ibari* Phil. var. *sessiliflora* Speg., *Leucheria multifida* (DC.) S. Moore
Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

Leucheria amoena Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU).

Leucheria apiifolia Phil.
Hierba. Endémica. 2500-2400 m.
Países: CHL(MAU).

Leucheria bridgesii Hook. & Arn.
Sin.: *Chabreaa pulchella* Phil., *Lasiorrhiza pulchella* (Phil.) Kuntze, comb. illeg., *Leucheria microcephala* Reiche
Hierba. Endémica. 1000-4000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Leucheria candidissima D. Don
Sin.: *Chabreaa candidissima* (D. Don) DC., *Lasiorrhiza candidissima* (D. Don) Macloskie, *Leucheria candidissima* D. Don f. *subintegra* Skottsb., *Leucheria laciniata* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 2000-3200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, RME).

Leucheria cantillanensis Lavandero
Hierba. Endémica. 1900-2000 m.
Países: CHL(RME).

Leucheria coerulescens J. Remy
Sin.: *Leucheria aurita* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Leucheria diemii Cabrera var. **diemii**
Hierba. Endémica. 1500-2100 m.
Países: ARG(NEU, SCR).

Leucheria diemii Cabrera var. **purpurea**
Ratto, Bello & A. Bartoli
Sin.: *Leucheria arancioi* Jara-Arancio, Ratto & A. Bartoli
Hierba. Endémica. 1200-1300 m.
Países: ARG(SCR).

Leucheria eriocephala Speg.
Sin.: *Leucheria papillosa* Cabrera
Hierba. Endémica. 1000-1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Leucheria floribunda DC.
Sin.: *Eizaguirrea candollei* J. Remy, nom. superfl., *Eizaguirrea cirsioides* Phil., *Eizaguirrea sonchifolia* Turcz., *Lasiorrhiza floribunda* (DC.) Kuntze, *Leucheria racemosa* Phil., *Leucheria sonchifolia* (Turcz.) Reiche
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Leucheria fusca (Meyen) Hershk.
Sin.: *Diaphoranthus fuscus* Meyen, *Polyachyrus fuscus* (Meyen) Walp., *Polyachyrus fuscus* (Meyen) Walp. var. *roseus* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus nesites* I.M. Johnst., *Polyachyrus roseus* Phil.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Leucheria gayana (J. Remy) Reiche
Sin.: *Chabreaa gayana* J. Remy, *Leucheria nudicaulis* Phil., *Leucheria popetana* Phil.
Hierba. Endémica. 1800-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Leucheria gilliesii Hook. & Arn.

Sin.: *Leucheria garciana* J. Remy,
Leucheria hieracioides D. Don, hom.
illeg., *Leucheria nivea* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO,
MAU, ARA, RME).

Leucheria glacialis (Poepp. ex Less.)
Reiche

Sin.: *Chabreaa glacialis* (Poepp. ex Less.)
DC., *Chabreaa thermarum* Phil.,
Lasiorrhiza glacialis Poepp. ex Less.,
Lasiorrhiza stricta (Phil.) Macloskie,
Leucheria araucana Phil., *Leucheria*
discolor Phil., *Leucheria glacialis*
(Poepp. ex Less.) Reiche var.
longifolia (Phil.) Cabrera, *Leucheria*
longifolia Phil., *Leucheria magna* Phil.,
Leucheria paniculata Poepp. ex Less.,
Leucheria pauciflora Phil., *Leucheria*
stricta Phil., *Leucheria thermarum*
(Phil.) Phil., *Leucheria thermarum*
(Phil.) Reiche, nom. illeg., *Leucheria*
thermarum (Phil.) Reiche var.
araucana (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS,
MAG, RME).

Leucheria graui Katinas, M.C. Tellería &
Crisci

Hierba. Endémica. 2200-2300 m.
Países: CHL(MAU).

Leucheria hieracioides Cass.

Sin.: *Chabreaa prenanthoides* Bertero,
nom. inval., *Lasiorrhiza acanthoides*
(D. Don) Kuntze, *Lasiorrhiza*
hieracioides (Cass.) Kuntze, *Leucheria*
acanthoides D. Don, *Leucheria*
divaricata D. Don
Hierba. Endémica. 0-2200 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Leucheria lithospermifolia (Less.)
Reiche subsp. **integrifolia** (Phil.) Grau
& Zinnecker

Sin.: *Chabreaa integrifolia* Phil., *Leucheria*
integrifolia (Phil.) Crisci, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Leucheria lithospermifolia (Poepp. ex
Less.) Reiche subsp. **lithospermifolia**

Sin.: *Chabreaa lithospermifolia* (Poepp. ex
Less.) DC., *Lasiorrhiza lithospermifolia*
Poepp. ex Less., *Leuchaeria volcanica*
Hook. & Arn.
Hierba. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU,
BIO, ARA).

Leucheria meladensis Katinas, Crisci &
A.E. Martic.

Hierba. Endémica. 1000-1100 m.
Países: CHL(MAU).

Leucheria nutans (J. Remy) Reiche

Sin.: *Chabreaa nutans* J. Remy, *Chabreaa*
poepigii Phil., *Clybatis volckmannii*
Phil., *Lasiorrhiza nutans* (J. Remy)
Kuntze
Hierba. Endémica. 1300-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA).

Leucheria petersiana Lavandero

Hierba. Endémica. 2500-2600 m.
Países: CHL(MAU).

Leucheria polyclados (J. Remy) Reiche

Sin.: *Chabreaa polyclados* J. Remy
Hierba. Endémica. 2500-4100 m.
Países: CHL(ATA).

Leucheria purpurea (Vahl) Hook. & Arn.

Sin.: *Chabreaa purpurea* (Vahl) DC.,
Lasiorrhiza purpurea (Vahl) Less.,
Leucheria millefolium Dusén &
Skottsb., *Leucheria millefolium* Dusén

& Skottsb. f. *major* Dusén & Skottsb.,
Leucheria millefolium Dusén &
Skottsb. f. *minor* Dusén & Skottsb.,
Leucheria purpurea (Vahl) S. Moore
ex Rendle, *Perdicium purpureum* Vahl
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, AIS,
MAG).

Leucheria rosea Poepp. ex Less.

Sin.: *Lasiorrhiza rosea* Less. var. *albiflora*
Kuntze, *Lasiorrhiza rosea* Less. var.
andryaloides (DC.) Kuntze, comb.
illeg., *Leucheria andryaloides* DC.,
nom. superfl., *Leucheria lepida* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO,
MAU, RME).

Leucheria runcinata D. Don

Sin.: *Chabreaa barrasiana* J. Remy,
Chabreaa canescens Phil., *Chabreaa*
concinna Phil., *Chabreaa coquimbana*
Phil., *Chabreaa landbeckii* Phil.,
Chabreaa oligocephala Phil.,
Chabreaa runcinata (D. Don) Hook.,
Chabreaa tenerifolia Phil., *Lasiorrhiza*
glomerulata Kuntze, *Leucheria*
barrasiana (J. Remy) F. Meigen,
comb. superfl., *Leucheria barrasiana*
(J. Remy) Reiche, comb. superfl.,
Leucheria barrasiana (J. Remy)
Reiche var. *tenerifolia* (Phil.) Reiche,
Leucheria canescens (Phil.) Reiche,
Leucheria concinna (Phil.) Reiche,
Leucheria congesta D. Don, *Leucheria*
coquimbana (Phil.) Reiche, *Leucheria*
glomerulata (Kuntze) K. Schum.,
Leucheria landbeckii (Phil.) Reiche,
Leucheria meyeniana Walp.,
Leucheria paucicapitata Reiche,
Leucheria sonchoides Phil., *Leucheria*
tenerifolia (Phil.) Phil.
Hierba. Endémica. 1700-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Leucheria salina (J. Remy) Hieron.

Sin.: *Chabraea salina* J. Remy, *Chabraea salinasi* Phil. var. *bipinnatifida* Phil., *Lasiorrhiza salina* (J. Remy) Kuntze, *Leucheria pteropogon* (Griseb.) Cabrera, *Leucheria salina* (J. Remy) Dusén, comb. superfl., *Leucheria salina* (J. Remy) Hieron. subsp. *zoellneri* Crisci, *Leucheria salina* (J. Remy) Reiche, hom. illeg., *Senecio pteropogon* Griseb.

Hierba. Endémica. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Leucheria scrobiculata D. Don

Sin.: *Chabraea glabra* DC., *Chabraea scrobiculata* (D. Don) DC., *Chabraea scrobiculata* (D. Don) DC. var. *pentacephala* Phil., *Lasiorrhiza glabra* (DC.) Kuntze, *Lasiorrhiza scrobiculata* (D. Don) Kuntze, *Leucheria scrobiculata* D. Don var. *glabra* (DC.) Hauman, *Mimela pedicularifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 3000-4200 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(VAL, LBO, RME).

Leucheria suaveolens (d'Urv.) Speg.

Sin.: *Chabraea integrifolia* Phil., hom. illeg., *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC., *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC. var. *integrifolia* Sch. Bip., nom. nud., *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC. var. *pinnatifida* Sch. Bip., nom. nud., *Lasiorrhiza ceterachifolia* Cass., *Lasiorrhiza fueguiana* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza gossypina* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Lasiorrhiza gracilis* (Albov) Macloskie, *Lasiorrhiza hahnii* (Franch.) Macloskie, *Lasiorrhiza hoffmannii* (Dusén) Macloskie, *Lasiorrhiza lanata*

(Albov) Macloskie, *Lasiorrhiza lanigera* (O. Hoffm. ex Dusén) Macloskie, *Lasiorrhiza leontopodioides* Kuntze, *Lasiorrhiza patagonica* (Speg.) Macloskie, *Lasiorrhiza suaveolens* (d'Urv.) Macloskie, *Lasiorrhiza viscosa* Cass., *Leucheria fuegina* Phil., *Leucheria gossypina* Hook. & Arn., *Leucheria gossypina* Hook. & Arn. var. *integrifolia* Reiche, *Leucheria gossypina* Hook. & Arn. var. *pinnatifida* Reiche, *Leucheria gracilis* Albov, *Leucheria hahnii* Franch., *Leucheria hahnii* Franch. var. *lanata* (Albov) Cabrera, *Leucheria hoffmannii* Dusén, *Leucheria integrifolia* (Phil.) Reiche ex B.L. Rob., *Leucheria lanata* Albov, *Leucheria lanata* Albov f. *virescens* Albov, *Leucheria lanigera* O. Hoffm. ex Dusén, *Leucheria leontopodioides* (Kuntze) K. Schum., *Leucheria patagonica* Speg., *Leucheria suaveolens* (d'Urv.) B.L. Rob., comb. superfl., *Leucheria suaveolens* (d'Urv.) Druce, comb. superfl., *Leucheria suaveolens* (d'Urv.) Skottsb., *Perdicium suaveolens* d'Urv., *Picris macloviana* d'Urv. ex DC., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Leucheria tomentosa (Less.) Crisci

Sin.: *Chabraea berteroniana* Steud., *Chabraea cinerea* (D. Don) DC., *Chabraea elongata* Bertero, *Chabraea glabriuscula* Phil., *Chabraea glandulosa* (D. Don) DC., *Chabraea modesta* Phil., *Chabraea tenuior* Bertero ex Colla, nom. inval., *Chabraea tomentosa* (Less.) DC., *Lasiorrhiza cinerea* (D. Don) Less., *Lasiorrhiza glandulosa* (D. Don) DC., *Lasiorrhiza pulchella* (D. Don) Steud., *Lasiorrhiza senecioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Lasiorrhiza tomentosa* Less.,

Leucheria cerberoana J. Remy, *Leucheria cinerea* D. Don, *Leucheria cumingii* Hook. & Arn., *Leucheria debilis* Phil., *Leucheria eriochlaena* J. Remy, *Leucheria glabrata* Phil., *Leucheria glabriuscula* (Phil.) Reiche, *Leucheria glandulosa* D. Don, *Leucheria menana* J. Remy, *Leucheria modesta* (Phil.) Reiche, *Leucheria multiflora* Phil., *Leucheria oligocephala* J. Remy, *Leucheria peduncularis* J. Remy, *Leucheria pulchella* D. Don, *Leucheria senecioides* Hook. & Arn., *Leucheria senecioides* Hook. & Arn. var. *purpurescens* DC., nom. superfl., *Leucheria tenuis* Less., *Trixis senecioides* Hook.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Leucheria viscida (Bertero ex Colla) Crisci

Sin.: *Chabraea rosea* DC., *Chabraea viscida* Bertero ex Colla, *Chabraea viscosa* Bertero ex DC., nom. nud., *Lasiorrhiza philippiana* Kuntze, *Lasiorrhiza rosea* Less., *Leucheria chillanensis* Reiche, *Leucheria glandulosa* Phil., nom. illeg., *Leucheria leucomalla* Phil., *Leucheria neaei* DC., *Leucheria rosea* (Less.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Leunisia Phil.

Leunisia laeta Phil.

Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Liabum Adans.

Liabum acuminatum Rusby
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1100 m.
Países: ARG(SAL).

Logfia Cass.

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
Sin.: *Filago gallica* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Lomanthus B. Nord. & Pelser

Lomanthus bangii (Rusby) B. Nord. & Pelser
Sin.: *Senecio bangii* Rusby
Subarbusto. Nativa. 3000-3700 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Lomanthus coscayanus (Ricardi & Martic.) Pruski
Sin.: *Senecio coscayanus* Ricardi & Martic.
Arbusto. Endémica. 3200-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Lophopappus Rusby

Lophopappus cuneatus R.E. Fr.
Arbusto. Nativa. 2800-4000 m.
Países: ARG(JUU). CHL(TAR).

Lophopappus foliosus Rusby
Sin.: *Proustia foliosa* (Rusby) Ferreyra
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR).

Lophopappus tarapacanus (Phil.) Cabrera
Sin.: *Gochnatia tarapacana* Phil.

Arbusto. Nativa. 2200-4700 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Lorentzianthus R.M. King & H. Rob.

Lorentzianthus viscidus (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium viscidum* Hook. & Arn., *Eupatorium viscidum* Hook. & Arn. var. *protractum* Griseb.
Arbusto. Nativa. 1600-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Lucilia Cass.

Lucilia acutifolia (Poir.) Cass.
Sin.: *Gnaphalium commersonii* Spreng., nom. superfl., *Gnaphalium jamesonii* (Baker) Kuntze, *Gnaphalium virescens* (Less.) Kuntze, *Helichrysum montevidense* Spreng., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. f. *microphylla* (Cass.) Less., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. f. *nivea* Less., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. f. *virescens* Less., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. var. *virescens* (Less.) DC., *Lucilia jamesonii* Baker, *Lucilia lundii* Baker, *Lucilia microphylla* Cass., *Pachyrhynchus xeranthemoides* DC., *Serratula acutifolia* Poir.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, PAI). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

Lucilia ferruginea Baker
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Lucilia kunthiana (DC.) Zardini

Sin.: *Belloa kunthiana* (DC.) Anderb. & S.E. Freire, *Conyza kunthiana* DC., *Conyza pusilla* Kunth, hom. illeg., *Gnaphalium kunthianum* (DC.) Kuntze, *Lucilia affinis* Wedd., *Lucilia pusilla* Hieron., *Lucilia venezuelensis* Steyererm., *Lucilia violacea* Wedd., *Merope kunthiana* (DC.) Wedd., *Mniodes kunthiana* (DC.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey
Hierba. Nativa. 3200-5000 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP).

Lucilia linearifolia Baker

Hierba. Nativa. 100-2200 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lucilia lycopodioides (Less.) S.E. Freire
Sin.: *Hymenopholis imbricata* Gardner, *Lucilia flagelliformis* Wedd., *Lucilia glomerata* Baker, *Oligandra lucilioides* Less., *Oligandra lycopodioides* Less.
Hierba. Nativa. 900-2100 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lucilia nitens Less.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC).

Lucilia recurva Wedd.

Hierba. Nativa. 2500-2800 m.
Países: ARG(SAL).

Lucilia tomentosa Wedd.

Sin.: *Lucilia squarrosa* Baker
Hierba. Nativa. 1000-2000 m.
Países: BRA(PAR).

Lulia Zardini

Lulia nervosa (Less.) Zardini
Sin.: *Trichocline nervosa* Less.
Hierba. Nativa. 800-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lycapsus Phil.

Lycapsus tenuifolius Phil.
Sin.: *Alomia tenuifolia* (Phil.) Benth. & Hook. f. ex Reiche
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(IDE).

Macrachaenium Hook. f.

Macrachaenium gracile Hook. f. var. **gracile**
Sin.: *Macrachaenium foliosum* Albov
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Macrachaenium gracile Hook. f. var. **radiatum** Cabrera
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(AIS).

Macropodina R.M. King & H. Rob.

Macropodina blumenavii (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium blumenavii* Hieron., *Eupatorium blumenavii* Hieron. f. *major* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA).

Macropodina reitzii R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium kingii* Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1000
Países: BRA(SCA).

Madia Molina

Madia chilensis (Nutt.) Reiche
Sin.: *Madariopsis chilensis* Nutt.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Madia sativa Molina

Sin.: *Madia viscosa* Cav.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Malacothrix DC.

Malacothrix clevelandii A. Gray
Sin.: *Crepis geisseana* Phil., *Malacothrix senecioides* Reiche
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Malacothrix coulteri Harv. & A. Gray
Sin.: *Malacolepis coulteri* (Harv. & A. Gray) A. Heller, *Malacothrix coulteri* Harv. & A. Gray var. *cognata* Jeps., *Zollikoferia elquiensis* Phil.
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ).

Malmeanthus R.M. King & H. Rob.

Malmeanthus catharinensis R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium subintegerrimum* Malme var. *aliciae* Cabrera

Árbol. Endémica. 1000
Países: BRA(SCA).

Malmeanthus subintegerrimus (Malme) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium subintegerrimum* Malme var. *subintegerrimum*
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, ITA). URY(ART, RIV, TAC).

Marticorenia Crisci

Marticorenia foliosa (Phil.) Crisci
Sin.: *Lasiorrhiza foliosa* (Phil.) Kuntze, *Leucheria foliosa* Phil.
Arbusto. Endémica. 2700-3300 m.
Países: CHL(ATA, VAL, MAU, RME).

Matricaria L., nom. cons.

Matricaria chamomilla L.
Sin.: *Chamomilla recutita* (L.) Rausch., *Chamomilla vulgaris* Gray, *Chrysanthemum chamomilla* (L.) Bernh., *Matricaria chamomilla* L. var. *recutita* (L.) Grierson, nom. illeg., hom., *Matricaria recutita* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). PRY(CAA). URY(CAS, CLA, MON, SJO).

Matricaria discoidea DC.

Sin.: *Artemisia matricarioides* Less., *Chamomilla suaveolens* (Pursh) Rydb., *Santolina suaveolens* Pursh
Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(PAR, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Melampodium L.

Melampodium divaricatum (Rich.) DC.

Sin.: *Dysodium divaricatum* Rich.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Melanthera Rohr

Melanthera latifolia (Gardner) Cabrera

Sin.: *Echinocephalum angustifolium* Gardner, *Echinocephalum lanceolatum* Gardner, *Echinocephalum latifolium* Gardner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, GUA, ÑEE, PHA). URY(ART, PAY, RNO, SAO).

Mesanthophora H. Rob.

Mesanthophora brunneri H. Rob.

Sin.: *Vernonia brunneri* (H. Rob.) Cabrera

Hierba. Nativa. 100-200 m.

Países: PRY(CON).

Mesanthophora rojasii (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonia rojasii* Cabrera

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CEN).

Microgyne Less.

Microgyne marchesiana Bonifacino & Sancho

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(RGS). URY(TAC).

Microgyne trifurcata Less.

Sin.: *Erigeron tridactylus* DC., *Microgynella trifurcata* (Less.) Grau, *Vittadinia trifurcata* (Less.) Griseb.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, SDE, SFE, SLU). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).

Microliabum Cabrera

Microliabum humile (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Angelianthus humilis* (Cabrera) H. Rob. & Brettell, *Liabellum humile* Cabrera

Hierba. Endémica. 3300-3400 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Microliabum mulgediifolium (Muschl.)

H. Rob.

Sin.: *Austroliabum mulgediifolium* (Muschl.) H. Rob. & Brettell, *Liabum mulgediifolium* Muschl.

Hierba. Nativa. 1200-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Microliabum polymnioides (R.E. Fr.) H. Rob.

Sin.: *Austroliabum polymnioides* (R.E. Fr.) H. Rob. & Brettell, *Liabum polymnioides* R.E. Fr.

Hierba o subarbusto. Nativa. 600-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Micropsis DC.

Micropsis australis Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, LPA, RNE).

Micropsis dasycarpa (Griseb.) Beauverd

Sin.: *Filago dasycarpa* Griseb.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, FLA).

Micropsis nana DC.

Sin.: *Lasiophyton pusillum* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 300-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).

Micropsis ostenii Beauverd

Sin.: *Micropsis bonaerensis* Manganaro

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, FLA, PAY, SAO, SJO, SOR, TAC).

Micropsis spathulata (Pers.) Cabrera

Sin.: *Evax spathulata* Pers., *Gnaphalium bracteatum* Willd., nom. illeg., *Gnaphalium involucratus* Lam., hom. illeg., *Micropsis herteri* Beauverd, *Micropsis involucratus* Cabrera, *Micropsis nana* Speg., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).

Microseris D. Don

Microseris pygmaea D. Don

Sin.: *Bellardia pusilla* Colla, *Fichtea poeppigii* Sch. Bip., *Hyoseris tenella* Poepp. ex Sch.Bip., *Krigia chilensis* Bertero, *Krigia chilensis* Nees ex DC.,

Krigia pinnatifida Bertero ex DC.,
Krigia pusilla Hort ex DC., *Lepidonema chilense* Fisch. & C.A. Mey.,
Microseris brevipes Phil.
 Hierba. Nativa. 0-900 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Mikania Willd.

Mikania anethifolia (DC.) Matzenb.

Sin.: *Eupatorium anethifolium* DC.,
Mikania carvifolia Hieron. ex Arechav.,
Mikania verticillata Sch. Bip.
 Enredadera. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS). URY(PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Mikania anisodora Hassl.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA).

Mikania argyreiae DC.

Enredadera. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(CAU, PAI).

Mikania barrosoana G.M. Barroso

Enredadera. Nativa.
 Países: BRA(SCA).

Mikania biformis DC.

Sin.: *Cacalia obsoleta* Vell., *Mikania diversifolia* DC., *Mikania obsoleta* (Vell.) G.M. Barroso
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania buchtienii B.L. Rob.

Liana. Nativa. 1000-3500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Mikania buddlejifolia DC.

Sin.: *Mikania discolor* Baker
 Liana. Nativa. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania burchellii Baker

Sin.: *Mikania salicifolia* Hassl.,
Willoughbya burchellii (Baker) Kuntze
 Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1100 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, GUA).

Mikania calcarulata B.L. Rob.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA).

Mikania campanulata Gardner

Sin.: *Mikania subluxa* Malme, *Willoughbya campanulata* (Gardner) Kuntze
 Enredadera. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania capricorni B.L. Rob.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania chlorolepis Baker

Sin.: *Willoughbya chlorolepis* (Baker) Kuntze
 Enredadera. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

Mikania clematidifolia Dusén

Enredadera. Nativa. 0-1200 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania cordifolia (L. f.) Willd.

Sin.: *Cacalia cordifolia* L. f., *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. var. *tomentosa* Hieron., *Mikania gonoclada* DC., *Willoughbya cordifolia* (L. f.) Kuntze
 Enredadera. Nativa. 0-2000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CLA, COL, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

Mikania cynanchifolia Hook. & Arn. ex B.L. Rob.

Sin.: *Mikania cynanchifolia* Hook. & Arn. ex B.L. Rob. f. *intermedia* (Malme) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. f. *intermedia* (Malme) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. subsp. *cynanchifolia* (Hook. & Arn. ex Baker) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *cynanchifolia* Hook. & Arn. ex Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *intermedia* Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *mollis* Chodat
 Enredadera. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Mikania daspitii W.C. Holmes & McDaniel

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). PRY(GUA).

Mikania decumbens Malme

Sin.: *Mikania kleiniana* Cabrera
 Enredadera. Nativa. 0-1200 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania dusenii B.L. Rob.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).

Mikania euryanthela (Malme) W.C. Holmes

Sin.: *Mikania laxa* DC. subsp. *euryanthela* Malme
 Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CEN,
COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Mikania fulva (Hook. & Arn.) Baker

Sin.: *Eupatorium fulvum* Hook. & Arn.,
Mikania hassleriana Chodat, *Mikania*
hassleriana Chodat f. *cuneifolia*
Chodat, *Mikania montevidensis*
Spreng. ex Baker, nom. nud., *Mikania*
senecioides Sch. Bip. ex Baker, nom.
nud., *Mikania ternifolia* DC., *Mikania*
ternifolia DC. var. *senecioides* Baker,
Willoughbya ternifolia (DC.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 500-1400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,
CON, COA, PAI). URY(ART, LAV,
MAL, MON, ROC).

Mikania glomerata Spreng.

Sin.: *Cacalia trilobata* Vell., *Mikania*
glomerata Spreng. var. *montana*
Hassl., *Mikania hatschbachii* G.M.
Barroso, *Mikania hederifolia* DC.,
Mikania scansoria DC., *Willoughbya*
glomerata (Spreng.) Kuntze
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CON, COA, ITA,
PAI).

Mikania guaco Bonpl.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Mikania guaranitica Hassl.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE).
PRY(COA, PAI).

Mikania haenkeana DC.

Sin.: *Mikania monzonensis* Hieron.,
Mikania pellucidivenia Hieron.,
Willoughbya haenkeana (DC.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 500-800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Mikania hastato-cordata Malme

Enredadera. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania hemisphaerica Sch. Bip. ex
Baker

Sin.: *Willoughbya hemisphaerica* (Sch.
Bip. ex Baker) Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAU).

Mikania hirsutissima DC. var.
hirsutissima

Sin.: *Eupatorium hirtum* Less., nom. nud.,
Mikania hirsutissima DC. var. *martiana*
(Gardner) Baker, *Mikania martiana*
Gardner, *Mikania sepiaria* Gardner,
Willoughbya hirsutissima (DC.) Kuntze
Liana. Nativa. 200-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAU, GUA,
PAI).

Mikania hirsutissima DC. var. **ursina**
Baker

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mikania hoehnei B.L. Rob.

Enredadera. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania hoffmanniana Dusén ex Malme

Sin.: *Mikania hoffmanniana* Dusén ex
Malme var. *microphylla* Malme,
Mikania hoffmanniana Malme var.
polycephala (Dusén) Malme
Liana. Nativa. 600-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania involucrata Hook. & Arn.

Sin.: *Mikania bracteosa* DC.
Liana. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(LAV, MAL, ROC, TYT).

Mikania jujuyensis Cabrera

Enredadera. Endémica. 1700-2000 m.
Países: ARG(JUJ).

Mikania laevigata Sch. Bip. ex Baker

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania lanuginosa DC.

Sin.: *Mikania affinis* Gardner
Liana. Nativa. 500-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania lasiandrae DC.

Sin.: *Mikania strigosa* Gardner
Liana. Nativa. 400-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania ligustrifolia DC.

Enredadera. Nativa. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania lindbergii Baker var. **collina**
Baker

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania lindbergii Baker var. **lindbergii**

Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania lindleyana DC.

Sin.: *Mikania acrensis* B.L. Rob.,
Willoughbya lindleyana (DC.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, SPE).

Mikania lundiana DC.

Sin.: *Mikania catharinensis* Hieron.,
Willoughbya lundiana (DC.) Kuntze
Liana. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania mendocina Phil.

Enredadera. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Mikania micrantha Kunth

Sin.: *Mikania orinocensis* Kunth, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *subcymosa* (Gardner) Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *umbellifera* (Gardner) Baker, *Mikania subcrenata* Hook. & Arn., *Mikania subcymosa* Gardner, *Mikania umbellifera* Gardner, *Willoughbya micrantha* (Kunth) Rusby

Enredadera. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, FLA, MON, RNO, SAO, SJO, SOR).

Mikania microcephala DC.

Liana. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Mikania microlepis Baker

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania microptera DC.

Enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania minima (Baker) B.L. Rob.

Sin.: *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *minima* Baker

Enredadera. Endémica.

Países: ARG(TUC).

Mikania nana W.C. Holmes

Subarbusto. Endémica. 900

Países: BRA(PAR).

Mikania nummularia DC.

Sin.: *Mikania flavescens* Gardner

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Mikania oblongifolia DC.

Sin.: *Kanimia oblongifolia* (DC.) Baker, *Willoughbya oblongifolia* (DC.) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 200-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania officinalis Mart.

Hierba. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania oreophila M.R. Ritter & Miotto

Enredadera. Nativa. 700-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania orleansensis Hieron.

Liana. Endémica. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania paniculata DC.

Enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Mikania paranensis Dusén

Enredadera. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania parodii Cabrera

Enredadera. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ROC, SAO, SOR, TYT).

Mikania periplocifolia Hook. & Arn.

Sin.: *Mikania araucana* Phil., *Mikania auricularis* Griseb., *Mikania niederleinii* Hieron., *Mikania scandens* (L.) Willd. subsp. *paraguayensis* Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *periplocifolia*

(Hook. & Arn.) Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *sagittifolia* Hassl., *Willoughbya scandens* (L.) Kuntze var. *periplocifolia* (Hook. & Arn.) Kuntze

Enredadera. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CHO, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, PAY, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Mikania pilcomayensis (Hassl.) B.L. Rob.

Sin.: *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *pilcomayensis* Hassl.

Liana. Endémica.

Países: PRY(PHA).

Mikania pinnatiloba DC.

Sin.: *Willoughbya pinnatiloba* (DC.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).

Notas: Citada para Uruguay (Barroso, 1959; Ritter & Miotto, 2005) sin indicar localidad o material de referencia.

Mikania pseudohoffmanniana G.M.

Barroso var. *microphylla* G.M.

Barroso

Enredadera. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Mikania pseudohoffmanniana G.M.

Barroso var. *pseudohoffmanniana*

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania pseudorimachii W.C. Holmes & McDaniel

Liana. Endémica. 500-600 m.

- Países: PRY(CEN, GUA, PAI, PHA).
- Mikania psilostachya** DC.
Sin.: *Mikania consanguinea* Gardner, *Mikania lima* Schtdl. ex Mart., *Mikania polystachya* DC., *Mikania psilostachya* DC. var. *racemulosa* (Benth.) Baker, *Mikania psilostachya* DC. var. *scabra* (DC.) Baker
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Mikania rufescens** Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Mikania pachylepis* Sch. Bip. ex Baker, *Mikania riedeliana* Casar. ex B.L. Rob.
Liana. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Mikania saltensis** Hieron.
Sin.: *Willoughbya saltensis* (Hieron.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC).
- Mikania salviifolia** Gardner
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, PAI).
- Mikania sericea** Hook. & Arn.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Mikania sessilifolia** DC.
Subarbusto. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Mikania setigera** Sch. Bip.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Mikania siambonensis** Hieron.
Enredadera. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(TUC).
- Mikania smaragdina** Dusén ex Malme
Sin.: *Mikania latisquama* Cabrera, *Mikania nebularum* Dusén, *Mikania smaragdina* Dusén ex Malme var. *nebularum* Dusén ex Malme
Enredadera. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Mikania smilacina** DC.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Mikania sulcata** (Hook. & Arn.) B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium sulcatum* Hook. & Arn., *Mikania penstemonoides* DC.
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). PRY(CON, COA, PAI). URY(ART, FLA, PAY, SAO, SOR).
- Mikania summinima** W.C. Holmes
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).
- Mikania ternata** (Vell.) B.L. Rob.
Sin.: *Cacalia septemnata* Vell., *Cacalia ternata* Vell., *Mikania apiifolia* DC., *Mikania apiifolia* DC. var. *gracillima* Dusén ex Malme, *Mikania dentata* Spreng., *Willoughbya ternata* (Vell.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, GUA).
- Mikania thapsoides** DC.
Sin.: *Eupatorium scandens* Link, nom. illeg., *Eupatorium thapsoides* (DC.) Niederl., *Kanimia thapsoides* (DC.) Jackson & Hook. f., *Mikania lagoensis* Baker, *Willoughbya thapsoides* (DC.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, MIE).
- Notas: Citada para Uruguay (Holmes & McDaniel, 1996) sin indicar localidad o material de referencia.
- Mikania thyrsoides** Baker
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Mikania trachypleura** B.L. Rob.
Sin.: *Mikania ypacarayensis* W.C. Holmes & McDaniel, nom. superfl.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, COA, GUA). URY(ART, PAY, SAO, SOR).
- Mikania triangularis** Baker
Enredadera. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Mikania trinervis** Hook. & Arn.
Sin.: *Mikania estrellensis* Baker, *Mikania laevis* DC.
Liana. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Mikania triphylla** Spreng. ex Baker
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Mikania ulei** Hieron.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Mikania urticifolia** Hook. & Arn.
Sin.: *Mikania humilis* Kuntze ex Hieron., *Mikania joergensenii* B.L. Rob., *Mikania phyllopoda* Griseb., *Willoughbya phyllopoda* (Griseb.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(COA).

Mikania variifolia Hieron.Sin.: *Mikania sapucayensis* Hassl.

Enredadera o liana. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, PAI). URY(PAY).

Mikania viminea DC.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Mikania virgata B.L. Rob.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Mikania vitifolia DC.Sin.: *Willoughbya vitifolia* (DC.) Kuntze

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mniodes (A. Gray) A. Gray ex Benth. & Hook. f.**Mniodes burkartii** (Cabrera) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & UrtubeySin.: *Belloa burkartii* (Cabrera) Cabrera, *Gnaphalium burkartii* Cabrera, *Lucilia burkartii* (Cabrera) S.E. Freire, *Lucilicline burkartii* (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Nativa. 3100-3700 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Mniodes catamarcensis (Cabrera) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & UrtubeySin.: *Belloa catamarcensis* Cabrera, *Lucilia catamarcensis* (Cabrera) S.E. Freire, *Lucilicline catamarcensis* (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Endémica. 3000

Países: ARG(CAT).

Mniodes coarctata Cuatrec.

Hierba. Nativa. 4500-5000 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Mniodes lopezmirandae (Cabrera) S.E.

Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Sin.: *Belloa lopezmirandae* Cabrera, *Gnaphalium americanum* Mill. var. *discolor* Griseb., *Lucilia lopezmirandae* (Cabrera) S.E. Freire, *Lucilicline lopezmirandae* (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Nativa. 2200-4200 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Mniodes piptolepis (Wedd.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & UrtubeySin.: *Belloa piptolepis* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium evacoides* Klatt, *Gnaphalium piptolepis* (Wedd.) Griseb., *Lucilia piptolepis* Wedd., *Lucilicline piptolepis* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást., *Merope piptolepis* Wedd.

Hierba. Nativa. 3200-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR).

Mniodes santanica (Cabrera) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & UrtubeySin.: *Belloa santanica* (Cabrera) Cabrera, *Gnaphalium santanicum* Cabrera, *Lucilia santanica* (Cabrera) S.E. Freire, *Lucilicline santanica* (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Endémica. 3100-3400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Mniodes schultzei (Wedd.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & UrtubeySin.: *Belloa cerrateae* (Ferreyra) Sagást. & M.O. Dillon, *Belloa schultzei* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium schultzei* (Wedd.) Cabrera, *Lucilia schultzei* (Wedd.) A. Gray, *Lucilicline schultzei* (Wedd.)M.O. Dillon & Sagást., *Merope caespititia* Wedd., *Merope schultzei* Wedd., *Mniodes cerratei* Ferreyra

Hierba. Nativa. 3900-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Mniodes subspicata (Cabrera) S.E.

Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Sin.: *Belloa punae* (Cabrera) Cabrera, *Belloa subspicata* Wedd., *Gnaphalium punae* Cabrera, *Lucilia subspicata* (Wedd.) Hieron., *Lucilicline subspicata* (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Nativa. 3000-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP).

Montanoa Cerv.**Montanoa bipinnatifida** (Kunth) K. KochSin.: *Montanoa elegans* K. Koch, *Montanoa heracleifolia* Brongn. ex Groenl., nom. nud., *Montanoa pyramidata* Sch. Bip. ex C. Koch, *Polymnia grandis* Kunth, nom. nud., *Uhdea bipinnatifida* Kunth

Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Moquiniastrium (Cabrera) G. Sancho**Moquiniastrium argentinum** (Cabrera) G. SanchoSin.: *Gochnatia argentina* (Cabrera) Cabrera, *Moquinia argentina* Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, SDE, TUC). PRY(PHA).

Moquiniastrium argyreum (Dusén ex Malme) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia argyrea* (Dusén ex Malme) Cabrera, *Moquinia argyrea* Dusén ex Malme

Arbusto. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Moquiniastrium barrosoae (Cabrera) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia barrosoae* Cabrera, *Gochnatia paraguariensis* Cabrera, *Moquinia velutina* Bong. var. *cordata* Chodat

Arbusto. Nativa. 500

Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CHO, CON).

Moquiniastrium cinereum (Hook. & Arn.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia cinerea* (Hook.) Cabrera, comb. illeg., *Gochnatia orbiculata* (Malme) Cabrera, *Moquinia cinerea* (Hook.) DC., *Moquinia orbiculata* Malme, *Moquinia orbiculata* Malme f. *ovata* Malme, *Spadonia cinerea* Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Moquiniastrium cordatum (Less.) G. Sancho var. **cordatum**

Sin.: *Gochnatia cordata* Less.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).

Moquiniastrium cordatum (Less.) G. Sancho var. **mollissimum** (Hassl.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia cordata* Less. var. *mollissima* Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(CAU).

Moquiniastrium haumanianum (Cabrera) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia haumaniana* Cabrera

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: PRY(AMA, SPE).

Moquiniastrium mollissimum (Malme) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia mollissima* (Malme) Cabrera, *Moquinia mollissima* Malme

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Moquiniastrium paniculatum (Less.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia lanuginosa* (Baker) Cabrera, *Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera, *Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera var. *lanuginosa* (Less.) Cabrera, *Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera var. *polycephala* (Gardner) Cabrera, *Moquinia congesta* Gardner, *Moquinia desertorum* Gardner, *Moquinia lanuginosa* Baker, *Moquinia paniculata* (Less.) DC., *Moquinia polycephala* Gardner, *Moquinia tomentosa* Bong., *Spadonia paniculata* Less.

Arbusto. Nativa. 1300

Países: BRA(PAR).

Moquiniastrium polymorphum (Less.) G. Sancho subsp. **ceanothifolium** (Less.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia malmei* Cabrera, *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera subsp. *ceanothifolia* (Less.) Cabrera, *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *ceanothifolia* (Less.) DC., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *eleagnifolia* (Less.) DC., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *obtusifolia* (Less.) DC., *Spadonia polymorpha* Less. var. *ceanothifolia* Less., *Spadonia polymorpha* Less. var. *elaeagnifolia* Less., *Spadonia polymorpha* Less. var. *obtusifolia* Less.

Árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA, MIE, SPE). URY(ART, CLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, TAC, TYT).

Moquiniastrium polymorphum (Less.) G. Sancho subsp. **floccosum** (Cabrera) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera subsp. *floccosa* Cabrera

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Moquiniastrium polymorphum (Less.) G. Sancho subsp. **polymorphum**

Sin.: *Baccharis lessingiana* DC., *Baccharis tomentosa* Thunb., *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera subsp. *polymorpha*, *Moquinia polymorpha* (Less.) DC., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *populifolia* (Less.) DC., *Spadonia polymorpha* Less., *Spadonia polymorpha* Less. var. *populifolia* Less.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Moquiniastrium pulchrum (Cabrera) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia pulchra* Cabrera

Arbusto. Nativa. 500-1100 m.

Países: PRY(AMA).

Moquiniastrium ramboi (Cabrera) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia ramboi* Cabrera

Subarbusto. Nativa. 500-600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Moquiniastrium sordidum (Less.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia sordida* (Less.) Cabrera, *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *sordida* (Less.) DC., *Spadonia polymorpha* Less. var. *sordida* Less.
Arbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Moquiniastrium velutinum (Bong.) G. Sancho
Sin.: *Gochnatia velutina* (Bong.) Cabrera, *Moquinia velutina* Bong.
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Moscharia Ruiz & Pav.

Moscharia pinnatifida Ruiz & Pav.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Moscharia solbrigii Crisci
Hierba. Endémica. 300-500 m.
Países: CHL(COQ).

Munnozia Ruiz & Pav.

Munnozia hastifolia (Poepp.) H. Rob. & Brettell
Sin.: *Heterotheca deltoidea* Klatt, *Liabum hastifolium* Poepp., *Liabum laticiferum* V.M. Badillo
Subarbusto. Nativa. 800-1600 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Mutisia L. f.

Mutisia acerosa Less.
Sin.: *Mutisia parviflora* J. Remy, *Mutisia ulicina* D. Don
Arbusto. Endémica. 1200-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Mutisia acuminata Ruiz & Pav. var. **hirsuta** (Meyen) Cabrera
Sin.: *Mutisia hirsuta* Meyen, *Mutisia viciifolia* Cav. var. *hirsuta* (Meyen) Wedd.
Arbusto. Nativa. 2500-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Mutisia acuminata Ruiz & Pav. var. **paucijuga** (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Mutisia viciifolia* Cav. var. *paucijuga* Griseb.
Arbusto. Nativa. 1700-3400 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Mutisia araucana Phil.
Subarbusto. Endémica. 800-1400 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Mutisia brachyantha Phil.
Subarbusto. Endémica. 1200
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Mutisia burkartii Cabrera
Arbusto. Endémica. 1800
Países: ARG(NEU).

Mutisia campanulata Less.
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA).

Mutisia cana Poepp. & Endl.
Sin.: *Mutisia glauca* Phil., *Mutisia polyphylla* Phil., *Mutisia reticulata* Phil., *Mutisia volckmannii* Phil.
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Mutisia castellanosi Cabrera var. **castellanosi**

Sin.: *Mutisia retrorsa* Cav. var. *castellanosi* (Cabrera) Cabrera
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SLU).

Mutisia castellanosi Cabrera var. **comechingoniana** Ariza
Enredadera. Endémica.
Países: ARG(COR).

Mutisia castellanosi Cabrera var. **hieronymi** (Kuntze) Ariza
Sin.: *Mutisia retrorsa* Cav. var. *hieronymi* Kuntze
Enredadera. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Mutisia coccinea A. St.-Hil. var. **coccinea**
Sin.: *Mutisia hypoleuca* Mart. & Zucc. ex Baker, *Mutisia speciosa* Aiton ex Hook. var. *alborufescens* A. St.-Hil.
Enredadera. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mutisia coccinea A. St.-Hil. var. **dealbata** (Less.) Cabrera
Sin.: *Mutisia dealbata* (Less.) DC., *Mutisia dealbata* (Less.) DC. var. *guaranitica* Chodat, *Mutisia hayenbeckii* Arechav., *Mutisia speciosa* Aiton ex Hook. var. *dealbata* Less., *Mutisia speciosa* Aiton ex Hook. var. *elliptica* Chodat
Enredadera. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, PAI). URY(CLA, FLO, MON, RNO, ROC).

Mutisia decurrens Cav. var. **decurrens**
Sin.: *Aplophyllum decurrens* (Cav.) Cass., *Mutisia decurrens* Cav. var. *andina* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

- Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).
- Mutisia decurrens** Cav. var. **patagonica** (Phil.) S.F. Blake
Sin.: *Mutisia patagonica* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO).
- Mutisia friesiana** Cabrera
Subarbusto. Nativa. 3500-4600 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Mutisia hamata** Reiche
Sin.: *Mutisia microphylla* Phil., hom. illeg.,
Mutisia philippi R.E. Fr.
Subarbusto. Nativa. 2500-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Mutisia homoeantha** Wedd.
Arbusto. Nativa. 3400-3500 m.
Países: ARG(SAL).
- Mutisia ilicifolia** Cav. var. **decandolleana** (Phil. ex Reiche) Cabrera
Sin.: *Mutisia decandolleana* Phil.
Arbusto. Endémica. 200-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Mutisia ilicifolia** Cav. var. **ilicifolia**
Sin.: *Aplophyllum ilicifolium* (Cav.) Cass.,
Mutisia breviflora Phil., *Mutisia consobrina* Phil., *Mutisia eriocephala* Phil., *Mutisia grossedentata* Phil.,
Mutisia ilicifolia Cav., *Mutisia ilicifolia* Cav. var. *cavanillesii* DC., *Mutisia involucrata* Phil. var. *consobrina* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).
- Mutisia involucrata** Phil.
Subarbusto. Endémica. 300-1700 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).
- Mutisia kurtzii** R.E. Fr. var. **anomala** (Lillo) Cabrera
Sin.: *Mutisia anomala* Lillo
Arbusto. Endémica. 2700-3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Mutisia kurtzii** R.E. Fr. var. **kurtzii**
Arbusto. Endémica. 2000-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
- Mutisia kurtzii** R.E. Fr. var. **pinnata** Cabrera
Arbusto. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(JUU).
- Mutisia lanigera** Wedd.
Subarbusto. Nativa. 3500-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Mutisia latifolia** D. Don f. **latifolia**
Arbusto. Endémica. 0-2400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).
- Mutisia latifolia** D. Don f. **bracteata** (J. Remy) Cabrera
Sin.: *Mutisia bracteata* J. Remy
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL).
- Mutisia ledifolia** Decne. ex Wedd.
Sin.: *Mutisia ledifolia* Decne. ex Wedd. f. *dentata* Cabrera, *Mutisia ledifolia* Decne. ex Wedd. f. *glabrata* Cuatrec.,
Mutisia ledifolia Decne. ex Wedd. f. *longiflora* J. Kost.
Arbusto. Nativa. 3000-4200 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).
- Mutisia linearifolia** Cav.
Sin.: *Aplophyllum linearifolium* (Cav.) Cass.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO).
- Mutisia linifolia** Hook.
Arbusto. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
- Mutisia macrophylla** Phil.
Subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(BIO).
- Mutisia oligodon** Poepp. & Endl.
Sin.: *Mutisia gayana* J. Remy, *Mutisia meyeniana* J. Remy ex Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA).
- Mutisia orbignyana** Wedd.
Sin.: *Mutisia cneorifolia* Decne. ex Wedd.,
nom. nud., *Mutisia neriifolia* Decne. ex Wedd., nom. nud.
Arbusto. Nativa. 3200-4000 m.
Países: ARG(JUU).
- Mutisia retrorsa** Cav.
Sin.: *Guariruma retrorsum* (Cav.) Cass.,
Mutisia retrorsa Cav. f. *tomentosa* Hauman, *Mutisia retrorsa* Cav. var. *latifolia* Kuntze, *Mutisia retrorsa* Cav. var. *normalis* Kuntze, *Mutisia runcinata* Willd., nom. superfl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
- Mutisia rosea** Poepp. ex Less.
Sin.: *Mutisia alba* Phil., *Mutisia berteroa* Poepp. & Endl., *Mutisia berteroi* DC.,
Mutisia landbeckii Phil., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *rosea* (Less.) Ruiz & Pav.

Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Mutisia saltensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Mutisia sinuata Cav.

Sin.: *Guariruma sinuatum* (Cav.) Cass., *Mutisia dentata* Phil., *Mutisia popetana* Phil., *Mutisia sanguinea* Meyen, *Mutisia sinuata* Cav. var. *brachycephala* Phil., *Mutisia sinuata* Cav. var. *taraxacifolia* (Less.) Kuntze, *Mutisia taraxacifolia* Less., *Mutisia taraxacifolia* Less. f. *cirrhifera* Hauman, *Mutisia taraxacifolia* Less. var. *integerrima* Phil.
Arbusto. Endémica. 1700-3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Mutisia speciosa Aiton ex Hook.

Sin.: *Mutisia arachnoidea* Mart. ex D. Don, *Mutisia caryophyllata* Vell.
Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA).

Mutisia spectabilis Phil.

Subarbusto. Endémica. 1300-2800 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Mutisia spinosa Ruiz & Pav. var. **pulchella** (Speg.) Cabrera

Sin.: *Mutisia bridgesii* Endl. ex Poepp. & Endl., *Mutisia heterochroa* Gand., *Mutisia lechleri* Sch. Bip., nom. nud., *Mutisia pulchella* Speg., *Mutisia retusa* J. Remy, *Mutisia retusa* J. Remy var. *pulchella* (Speg.) Skottsb.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Mutisia spinosa Ruiz & Pav. var. **spinosa**

Sin.: *Mutisia auriculata* Poepp. ex Less., *Mutisia chubutensis* Speg., *Mutisia hastata* Bertero ex DC., nom. nud., *Mutisia ilicifolia* Cav. f. *alata* Hauman, *Mutisia ilicifolia* Cav. f. *paucidentata* Hauman, *Mutisia ilicifolia* Cav. var. *truncata* (D. Don) DC., *Mutisia moyanoi* Speg., *Mutisia retusa* J. Remy var. *glaberrima* Phil., *Mutisia retusa* J. Remy var. *moyanoi* (Speg.) Skottsb., *Mutisia truncata* D. Don
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Mutisia splendens Renjifo

Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(VAL, RME).

Mutisia subspinosa Cav.

Sin.: *Guariruma subspinum* (Cav.) Cass.
Subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ATA, BIO).

Mutisia subulata Ruiz & Pav. f. **rosmarinifolia** (Poepp. & Endl.) Cabrera

Sin.: *Mutisia elegans* Phil., *Mutisia gracilis* Meyen, *Mutisia hookeri* Meyen, *Mutisia hookeri* Meyen var. *rosmarinifolia* Poepp. & Endl., *Mutisia linearifolia* Cav. var. *hookeri* (Meyen) Reiche, *Mutisia linearifolia* Hook., hom. illeg., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Meyen) Walp., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *major* Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 1700-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Mutisia subulata Ruiz & Pav. f. **subulata**

Sin.: *Guariruma inflexum* (Cav.) Cass., *Mutisia hookeri* Meyen var. *scandens* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav., *Mutisia inflexa* Cav. var. *imberbis* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav. var. *melanopoga* Poepp. & Endl., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *cavanillesii* Hook. & Arn., *Mutisia versicolor* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Mutisia tridens Poepp. ex Less.

Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Nardophyllum Hook. & Arn.

Nardophyllum bryoides (Lam.) Cabrera

Sin.: *Anactinia hookeri* J. Remy, nom. illeg., *Aster nardophyllum* Kuntze, *Baccharis bryoides* (Lam.) Pers., *Chiliotrichum darwinii* Hook. f., *Chiliotrichum humile* Hook. f., *Chiliotrichum kingii* Hook. f., *Conyza bryoides* Lam., *Dolichogyne parvifolia* Phil. ex Kuntze, *Microchaete humilis* (Hook. f.) Sch. Bip., *Nardophyllum darwinii* (Hook. f.) A. Gray, *Nardophyllum humile* (Hook. f.) A. Gray, *Nardophyllum kingii* (Hook. f.) A. Gray, *Nardophyllum nardophyllum* (Kuntze) Macloskie, nom. illeg., *Nardophyllum obtusifolium* Hook. & Arn., *Nardophyllum parvifolium* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Nardophyllum chiliotrichoides (J. Remy) A. Gray

Sin.: *Dolichogyne chiliotrichoides* J. Remy, *Nardophyllum bracteolatum* Hauman
Arbusto. Endémica. 0-3800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Nardophyllum genistoides (Phil.) A. Gray

Sin.: *Dolichogyne genistoides* Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(VAL, RME).

Nardophyllum lanatum (Meyen) Cabrera

Sin.: *Barnadesia lanata* Meyen, *Dolichogyne candollei* J. Remy, nom. superfl., *Dolichogyne gnaphalioides* DC., *Dolichogyne staehelinoides* DC., *Gochnatia revoluta* D. Don ex Hook. & Arn., *Nardophyllum candollei* (J. Remy) F. Meigen, comb. superfl., *Nardophyllum revolutum* (D. Don ex Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Nardophyllum staehelinoides* (DC.) Macloskie

Arbusto. Endémica. 1200-3200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Nardophyllum patagonicum (Cabrera) G.L. Nesom

Sin.: *Paleaepappus patagonicus* Cabrera
Arbusto. Endémica. 300-700 m.

Países: ARG(CHU).

Nassauvia Comm. ex Juss.

Nassauvia aculeata (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**

Sin.: *Nassauvia aculeata* (Less.) Poepp. & Endl. var. *spinosa* (D. Don) Cabrera, *Nassauvia diazii* (Phil.) Reiche, *Nassauvia latifolia* (Phil.) F. Meigen, *Nassauvia spinosa* (D. Don) Reiche,

comb. illeg., *Panargyrus diazii* Phil., *Panargyrus latifolium* Phil., *Panargyrus pectinatum* Phil., *Panargyrus spinosum* D. Don, *Pentanthus aculeatus* Less.

Hierba o arbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

Nassauvia aculeata (Less.) Poepp. & Endl. var. **azorelloides** (Speg.) Cabrera

Sin.: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén, *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *azorelloides* Speg., *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *subspinosa* (Phil.) Macloskie, *Nassauvia subspinosa* (Phil.) Albov, *Panargyrus abbreviatus* Hook. & Arn., *Panargyrus subspinosa* Phil.

Hierba o arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Nassauvia aculeata (Less.) Poepp. & Endl. var. **robusta** (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *robusta* Cabrera

Hierba o arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Nassauvia ameghinoi Speg.

Sin.: *Nassauvia morenonis* Kuntze

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Nassauvia argentea Phil.

Sin.: *Nassauvia revoluta* D. Don var. *argentea* (Phil.) Hosseus

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Nassauvia argyrophylla Speg. ex Cabrera

Hierba o subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Nassauvia axillaris (Lag. ex Lindl.) D. Don

Sin.: *Acanthophyllum axillare* (Lag. ex Lindl.) Hook. & Arn., *Strongyloma axillare* (Lag. ex Lindl.) DC., *Triptilion axillare* Lag. ex Lindl.

Arbusto. Nativa. 1000-4600 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(COQ, VAL, RME).

Nassauvia chubutensis Speg.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU).

Nassauvia coronipappa Arroyo & Martic.

Hierba. Endémica. 800-1100 m.

Países: CHL(MAG).

Nassauvia cumingii Hook. & Arn.

Sin.: *Nassauvia glabrata* Phil., *Nassauvia macracantha* DC., *Nassauvia macracantha* DC. var. *glabrata* (Phil.) Reiche, *Nassauvia macracantha* DC. var. *spicata* (J. Remy) Hauman, *Nassauvia spicata* J. Remy, *Nassauvia spinosa* Phil., *Nassauvia suaveolens* D. Don, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 2700-4000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Nassauvia darwinii (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén

Sin.: *Nassauvia candollei* Macloskie, *Nassauvia darwinii* (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén var. *laxa* (Phil.) Skottsb., *Nassauvia lagascae* (DC.) Reiche, hom. illeg., *Nassauvia laxa*

(Phil.) Speg., *Panargyrus darwinii* Hook. & Arn., *Panargyrus lagascae* DC., *Panargyrus laxum* Phil.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Nassauvia dentata Griseb.

Sin.: *Nassauvia cespitosa* Wedd., *Nassauvia patula* Phil.
Hierba. Endémica. 1200-2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Nassauvia digitata Wedd.

Sin.: *Nassauvia lycopodioides* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO).

Nassauvia dusenii O. Hoffm.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Nassauvia falklandica R. Upson & D.J.N.

Hind
Hierba. Endémica. 400-500 m.
Países: ARG(TDF).

Nassauvia fuegiana (Speg.) Cabrera

Sin.: *Nassauvia scleranthoides* O. Hoffm. ex Dusén, *Strongylomopsis fuegiana* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF).

Nassauvia gaudichaudii (Cass.) Cass.

Sin.: *Mastigophorus gaudichaudii* Cass.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Nassauvia glomerata (Gillies ex D. Don) Wedd.

Sin.: *Panargyrus densifolius* Phil., *Panargyrus glomeratus* Gillies ex D. Don
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Nassauvia glomerulosa (Lag. ex Lindl.) D. Don

Sin.: *Acanthophyllum rosulatum* Hook. & Arn., *Nassauvia axillaris* (Lag. ex Lindl.) D. Don var. *contracta* Speg., *Nassauvia bryoides* O. Hoffm., *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don f. *paradoxa* Skottsb., *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don f. *struthionum* (Phil.) Skottsb., *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don var. *columnaris* Hauman, *Nassauvia modesta* O. Hoffm., *Nassauvia rosulata* (Hook. & Arn.) Balls, *Nassauvia struthionum* (Phil.) Speg., *Nassauvia struthionum* (Phil.) Speg. var. *robusta* Speg., *Strongyloma glomerulosum* (Lag. ex Lindl.) DC., *Strongyloma struthionum* Phil., *Triptilion glomerulosum* Lag. ex Lindl.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG, RME).

Nassauvia hillii Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(NEU).

Nassauvia juniperina Skottsb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen

f. *solitaria* J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 2400-2500 m.
Países: ARG(NEU).

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. **globosa** Skottsb.

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. **lagascae**

Sin.: *Caloptilium lagascae* (D. Don) Hook. & Arn., *Nassauvia lagascae* (D. Don) F. Meigen f. *glabrescens* Hauman, *Nassauvia lanata* Reiche, *Portalesia procumbens* Meyen, *Sphaerocephalus lagascae* D. Don
Hierba. Endémica. 3000-4300 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, LSR, MAG, RME).

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. **lanata** (Phil.) Skottsb.

Sin.: *Caloptilium lagascae* (D. Don) Hook. & Arn. var. *lanata* Phil., *Nassauvia humilis* Phil., *Nassauvia lanata* Reiche var. *lanigera* (Phil.) Reiche, *Nassauvia lanigera* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Nassauvia latissima Skottsb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Nassauvia looseri Cabrera

Sin.: *Nassauvia heterophylla* (Phil.) Reiche, hom. illeg., *Panargyrus acerosum* Phil., *Panargyrus heterophyllum* Phil.
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: CHL(RME).

Nassauvia maeviae Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR). CHL(AIS, MAG).

Nassauvia magellanica J.F. Gmel.

Sin.: *Nassauvia heterophylla* Albov,
Nassauvia magellanica J.F. Gmel. var.
purpurascens (S. Moore) Cabrera,
Nassauvia purpurascens S. Moore,
Nassauvia suaveolens Willd.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Nassauvia pentacaenoides Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Nassauvia pinnigera D. Don

Sin.: *Nassauvia multiflora* Meyen
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,
LBO, MAU, RME).

Nassauvia planifolia Wedd.

Hierba. Endémica. 1600-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Nassauvia pulcherrima Cabrera

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LSR,
LLA).

Nassauvia pygmaea (Cass.) Hook. f. var.
intermedia (Phil.) Cabrera

Sin.: *Nassauvia intermedia* Phil.,
Nassauvia pumila Poepp. & Endl.,
Nassauvia pumila Poepp. & Endl. var.
intermedia (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LLA).

Nassauvia pygmaea (Cass.) Hook. f. var.
pygmaea

Sin.: *Nassauvia nordenskjoeldii* O. Hoffm.
ex Dusén, *Nassauvia pumila* Poepp. &
Endl. var. *nordenskjoeldii* (O. Hoffm. ex
Dusén) Reiche, *Triachne pygmaea*
Cass.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL,
BIO, ARA, AIS, MAG).

Nassauvia pyramidalis Meyen

Sin.: *Nassauvia macracantha* DC. var.
pungens (Phil.) Hauman, *Nassauvia*
pungens Phil.
Hierba. Endémica. 2000-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO,
MAU, BIO, RME).

Nassauvia ramosissima DC.

Hierba. Endémica. 600-2000 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, LLA).

Nassauvia revoluta D. Don

Sin.: *Nassauvia brevifolia* Phil., *Nassauvia*
nivalis Poepp. ex Less., *Nassauvia*
nivalis Poepp. ex Less. var. *brevifolia*
(Phil.) Reiche, *Nassauvia nivalis*
Poepp. ex Less. var. *sericea* Phil.,
Nassauvia revoluta D. Don var. *nivalis*
(Poepp. ex Less.) Hosseus, *Nassauvia*
sericea Phil.
Hierba o subarbusto. Endémica. 1000-
4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Nassauvia ruizii Cabrera

Hierba. Endémica. 3000-3700 m.
Países: ARG(MEN).

Nassauvia sceptrum Dusén

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Nassauvia serpens d'Urv.

Sin.: *Nassauvia durvillei* Cass.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Nassauvia sprengelioides DC.

Sin.: *Nassauvia araucana* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO,
ARA).

Nassauvia sublobata Cabrera

Hierba. Endémica. 1900-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Nassauvia ulicina (Hook. f.) Macloskie

Sin.: *Nassauvia patagonica* Speg.,
Nassauvia patagonica Speg. var.
elator Speg., *Trianthus ulicinus* Hook.
f.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Nassauvia uniflora (D. Don) Hauman

Sin.: *Nassauvia oligocephala* (DC.)
Wedd., *Panargyrus oligocephalum*
DC., *Panargyrus uniflorus* D. Don
Hierba. Endémica. 2800-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,
VAL, RME).

Neja D. Don

Neja filiformis (Spreng.) Nees

Sin.: *Diplopappus stenophyllus* Hook. &
Arn., *Erigeron filiformis* Spreng.,
Erigeron montevidensis Spreng.,
Hysterionica filiformis (Spreng.)
Cabrera, *Hysterionica gracilis* (D. Don
ex Sweet) Benth. & Hook. f.,
Hysterionica linearifolia (DC.) Baker,
Hysterionica montevidensis (Spreng.)
Baker, *Hysterionica setuligera* Gand.,
Neja ciliaris DC., *Neja gracilis* D. Don
ex Sweet, *Neja linearifolia* DC., *Neja*
subvillosa DC., *Neja tenuifolia* DC.,
Polyactidium sprengelii DC.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR, ERI, SFE).
BRA(PAR, RGS). URY(CLA, COL,
LAV, RIV, ROC).

Neja pinifolia (Poir.) G.L. Nesom

Sin.: *Diplopappus pinifolius* Hook. & Arn.,
Erigeron pinifolius Poir., *Hysterionica*
pinifolia (Poir.) Baker
 Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS).
 URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL,
 MON, ROC).

Neocabreria R.M. King & H. Rob.**Neocabreria catharinensis** (Cabrera)

R.M. King & H. Rob.
 Sin.: *Eupatorium catharinense* Cabrera,
Symphyopappus catharinensis
 (Cabrera) R.M. King & H. Rob.
 Arbusto. Endémica. 1500
 Países: BRA(SCA).

Neocabreria concinna R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium concinnum* DC.
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS).

Neocabreria malachophylla (Klatt) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium malachophyllum* Klatt,
Eupatorium niederleinii Hieron.,
Eupatorium niederleinii Hieron. var.
latifolia Hieron.
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(APA, ITA).

Neocabreria pennivenia (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Symphyopappus pennivenius* B.L.
 Rob.
 Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Neocabreria serrulata (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium acuminatum* Hook. &
 Arn., *Eupatorium serrulatum* DC.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(APA, AMA).

Nordenstamia Lundin**Nordenstamia fabrisii** (Cabrera) B. Nord.

Sin.: *Aequatorium fabrisii* (Cabrera) C.
 Jeffrey, *Gynoxys fabrisii* Cabrera
 Arbusto. Nativa. 1600-2500 m.
 Países: ARG(JUU, SAL).

Nothoschkuhria B.G. Baldwin**Nothoschkuhria degenerica** (Kuntze) B.G. Baldwin

Sin.: *Rothia degenerica* Kuntze, *Schkuhria*
degenerica (Kuntze) R.E. Fr.,
Schkuhria oolepis Sch. Bip., nom.
 nud., *Schkuhria pusilla* Wedd. var.
major Sch. Bip., nom. nud.
 Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
 Países: ARG(JUU).

Noticastrum DC.**Noticastrum acuminatum** (DC.) Cuatrec.

Sin.: *Aster calendulaceus* (Griseb.)
 Kuntze, *Haplopappus acuminatus* DC.,
Haplopappus calendulaceus Griseb.,
Leucopsis acuminata (DC.) Malme,
Leucopsis calendulacea (Griseb.)
 Baker, *Noticastrum calendulaceum*
 (Griseb.) Malme
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
 FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS).
 PRY(APY, PHA). URY(CAS, COL,
 MON, PAY, RNO, SJO, TAC).

Noticastrum adscendens DC.

Sin.: *Aster adscendens* (DC.) Reiche,
Aster pradensis Phil., *Diplopappus*
sericeus Less. var. *glandulosa* Hook.
 & Arn., *Noticastrum glandulosum* Phil.,
Noticastrum pradense (Phil.) Phil.,
Noticastrum sanfurgii Phil.
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
 RME).

Noticastrum antucense Phil.

Sin.: *Aster antucensis* (Phil.) Kuntze, *Aster*
erectus (J. Remy) Kuntze var.
antucensis (Phil.) Reiche
 Hierba. Endémica. 100-300 m.
 Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Noticastrum argenteum Cabrera

Sin.: *Aster marginatus* Kunth var.
argenteus Wedd.
 Hierba. Nativa. 1500-4500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
 SAL, SJU, TUC).

Noticastrum argentinense (Cabrera) Cuatrec.

Sin.: *Aster argentinensis* Cabrera
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI).

Noticastrum calvatum (Baker) Cuatrec.

Sin.: *Aster calvatus* (Baker) Herter,
Leucopsis calvata Baker
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS,
 SCA). URY(TAC).

Noticastrum chebataroffii (Herter) Zardini

Sin.: *Aster chebataroffii* Herter
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).
 URY(MON).

Noticastrum decumbens (Baker)
Cuatrec.
Sin.: *Aster decumbens* Baker
Hierba. Endémica. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Noticastrum diffusum (Pers.) Cabrera
Sin.: *Aster montevidensis* (Spreng.) Griseb., *Diplopappus diffusus* (Pers.) Hook. & Arn., *Erigeron diffusus* Pers., *Haplopappus diffusus* (Pers.) DC., *Leucopsis diffusa* (Pers.) Baker, *Noticastrum montevidense* (Spreng.) Cuatrec., *Onoseris montevidensis* Spreng.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, MEN, SAL, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SJO, SOR).

Noticastrum erectum J. Remy
Sin.: *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze, hom. illeg., *Aster erectus* (J. Remy) Reiche, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Noticastrum eriophorum J. Remy
Sin.: *Aster eriophorus* (J. Remy) Kuntze, *Aster eriophorus* (J. Remy) Reiche, hom. illeg., *Aster leucopappus* (Phil.) Reiche, *Leucopsis harveyi* Baker, *Leucopsis sericea* (Less.) Baker var. *eriophora* (J. Remy) Baker, *Noticastrum leucopappus* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Noticastrum gnaphalioides (Baker)
Cuatrec.
Sin.: *Aster gnaphalioides* (Baker) Hassl., *Leucopsis gnaphalioides* Baker
Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, GUA). URY(LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SOR).

Noticastrum hatschbachii Zardini
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Noticastrum jujuyense Cabrera
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).

Noticastrum macrocephalum (Baker)
Cuatrec.
Sin.: *Aster macrocephalus* (Baker) Hassl., hom. illeg., *Aster macrocephalus* (Baker) Hassl. var. *pseudognaphalioides* Hassl., *Leucopsis macrocephala* Baker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CAU, ITA, MIE, PHA).

Noticastrum malmei Zardini
Sin.: *Aster psammophilus* (Malme) Herter, hom. illeg., *Aster psammophilus* (Malme) Malag., hom. illeg., *Leucopsis psammophila* Malme, *Leucopsis psammophila* Malme var. *calvescens* Malme
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ROC).

Noticastrum marginatum (Kunth)
Cuatrec.
Sin.: *Aster acaulis* Wedd., *Aster marginatus* Kunth, *Aster perezii* Cuatrec., *Noticastrum marginatum* (Kunth) Cuatrec. f. *acaulis* (Wedd.) Cuatrec.
Hierba. Nativa. 0-4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Noticastrum psammophilum (Klatt)
Cuatrec.
Sin.: *Aster psammophilus* Klatt
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Noticastrum sericeum (Less.) Less. ex Phil.
Sin.: *Aster albus* (Phil.) Kuntze, hom. illeg., *Aster albus* (Phil.) Reiche, hom. illeg., *Aster haplopappus* (J. Remy) Kuntze, comb. illeg., *Aster haplopappus* (J. Remy) Reiche, *Aster marginatus* Kunth var. *tomentosus* Wedd., *Aster nitens* Kuntze, *Aster notosericeus* Griseb., *Aster sericeus* (Less.) Nees, *Diplopappus sericeus* Less., *Haplopappus sericeus* (Less.) DC., *Leucopsis sericea* (Less.) Baker, *Noticastrum album* Phil., *Noticastrum haplopappus* J. Remy, nom. superfl., *Noticastrum philippii* Sch. Bip., nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, SLU). BRA(PAR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(SAO).

Novenia S.E. Freire

Novenia acaulis (Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.) S.E. Freire & F.H. Hellwig
Sin.: *Dolichogyne acaulis* Benth. & Hook. f., *Gnaphalium tunariense* Kuntze, *Lepidophyllum acaule* Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks., *Lucilia tunariensis* (Kuntze) K. Schum., *Mniodes tunariensis* (Kuntze) Hieron. ex Weberb., *Novenia tunariensis* (Kuntze) S.E. Freire
Subarbusto. Nativa. 3100-5000 m.
Países: ARG(SAL).

Ocyroe Phil.**Ocyroe armata** (Wedd.) Bonifacino

Sin.: *Dolichogyne armata* Wedd.,
Nardophyllum armatum (Wedd.)
 Reiche, *Ocyroe spinosa* Phil.
 Arbusto. Nativa. 2800-4600 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
 TUC). CHL(ANT).

Onopordum L.**Onopordum acanthium** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,
 DFE, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE,
 SLU, SCR). BRA(RGS). CHL(ARA,
 RME). URY(MON).

Onopordum nervosum Boiss.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
 Países: ARG(COR).

Onoseris Willd.**Onoseris alata** Rusby

Hierba. Nativa. 700-1400 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Onoseris hastata Wedd.

Hierba. Nativa. 2100-2200 m.
 Países: ARG(JUU, SAL).

Ophryosporus Meyen**Ophryosporus anomalus** R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Piqueria cumingii* B.L. Rob.
 Arbusto. Nativa. 0-200 m.
 Países: CHL(TAR, ANT).

Ophryosporus axilliflorus (Griseb.) Hieron.

Sin.: *Eupatorium axilliflorum* Griseb.
 Arbusto. Nativa. 1000-2000 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
 SAL, SLU, TUC).

Ophryosporus burkartii Cabrera

Arbusto. Endémica. 3000-3200 m.
 Países: ARG(JUU).

Ophryosporus charua (Griseb.) Hieron.

Sin.: *Mikania charua* Griseb., *Willoughbya charua* (Griseb.) Kuntze
 Arbusto. Nativa. 500-3500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
 SAL, SJU, SLU, TUC).

Ophryosporus heptanthus Sch. Bip. ex Wedd.

Sin.: *Eupatorium heptanthus* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.,
Eupatorium origanoides Meyen & Walp., hom. illeg., *Ophryosporus origanoides* Hieron., *Ophryosporus origanoides* Hieron. var. *microcephala* Hieron.
 Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.
 Países: CHL(AYP, TAR).

Ophryosporus johnstonii B.L. Rob.

Arbusto. Endémica. 1200-1300 m.
 Países: CHL(ANT).

Ophryosporus laxiflorus Baker

Subarbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Ophryosporus lorentzii Hieron.

Sin.: *Eupatorium laeve* Griseb.
 Arbusto. Endémica. 1500-3200 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Ophryosporus macrodon Griseb.

Sin.: *Eupatorium kuntzei* Hieron.
 Arbusto. Nativa. 2000-3900 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Ophryosporus paradoxus (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.

Sin.: *Eupatorium paradoxum* Hook. & Arn., *Nothites baccharidea* DC., *Stevia baccharoides* (DC.) F. Meigen
 Arbusto. Endémica. 0-1800 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Ophryosporus pinifolius (Phil.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Piqueria pinifolia* (Phil.) Hieron. ex B.L. Rob., *Stevia pinifolia* Phil.
 Arbusto. Nativa. 2700-3500 m.
 Países: CHL(AYP, TAR).

Ophryosporus piquerioides (DC.) Benth. ex Baker

Sin.: *Eupatorium clavulatum* Griseb., *Eupatorium piquerioides* DC., *Mikania mandonii* Sch. Bip., *Ophryosporus clavulatus* (Griseb.) Griseb., *Ophryosporus mandonii* (Sch. Bip.) Hook. f. & A.B. Jacks, comb. illeg., *Ophryosporus saltensis* Hieron.
 Arbusto. Nativa. 1000-3000 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Ophryosporus regnellii Baker

Sin.: *Eupatorium regnellii* Sch. Bip.
 Arbusto. Nativa. 500-1200 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Ophryosporus triangularis Meyen

Sin.: *Eupatorium decipiens* Hook. & Arn., *Eupatorium foliolosum* DC., *Eupatorium volckmanni* Phil., *Kuhnia multiramea* Turcz., *Ophryosporus foliolosus* (DC.) Reiche, *Piqueria floribunda* DC.
 Arbusto. Endémica. 0-3400 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Oriastrum Poepp.

Oriastrum acerosum (J. Remy) Phil. var. **acerosum**

Sin.: *Chaetanthera acerosa* (J. Remy) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *acerosa*, *Chaetanthera pallida* (Phil.) Hauman, *Egania acerosa* J. Remy, *Egania pallida* Phil., *Egania racemosa* Pritz., *Oriastrum incanum* Phil., *Oriastrum pallidum* (Phil.) Phil., *Oriastrum parviflorum* Phil., *Oriastrum pusillum* Poepp. & Endl. var. *uncinatum* (Phil.) Reiche, *Oriastrum uncinatum* Phil.

Hierba. Endémica. 2800-4000 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Oriastrum acerosum (J. Remy) Phil. var. **dasycarpum** Cabrera

Hierba. Endémica. 3600-4000 m.
Países: ARG(SJU). CHL(COQ).

Oriastrum achenohirsutum (Tombesi) A.M.R. Davies

Sin.: *Chaetanthera acheno-hirsuta* (Tombesi) Arroyo, A.M.R. Davies & Till-Bottraud, *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *achenohirsuta* Tombesi
Hierba. Endémica. 3900-4100 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ATA).

Oriastrum apiculatum (J. Remy) A.M.R. Davies

Sin.: *Chaetanthera apiculata* (J. Remy) F. Meigen, *Chaetanthera lanigera* Phil., *Egania apiculata* J. Remy, *Oriastrum albicaule* Phil. var. *albicaule*, *Oriastrum albicaule* Phil. var. *nivale* (Phil.) Reiche, *Oriastrum nivale* Phil.
Hierba. Endémica. 3000-3300 m.
Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Oriastrum chilense (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Aldunatea chilensis* J. Remy, *Chaetanthera pusilla* (D. Don) Hook. & Arn., *Oriastrum pusillum* Reiche, hom. illeg., *Tylloma pusillum* D. Don
Hierba. Endémica. 2100-3800 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, RME).

Oriastrum dioicum (J. Remy) Phil.

Sin.: *Chaetanthera dioica* (J. Remy) B.L. Rob., *Egania dioica* J. Remy
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, COQ, RME).

Oriastrum gnaphalioides (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Aldunatea gnaphalioides* J. Remy, *Chaetanthera gnaphalioides* (J. Remy) I.M. Johnst., *Chondrochilus parvifolius* Phil., *Oriastrum albiflorum* (Phil.) Reiche, *Oriastrum leucocephalum* Phil., *Tylloma albiflorum* Phil.
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Oriastrum lycopodioides (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Aldunatea lycopodioides* J. Remy, *Chaetanthera lycopodioides* (J. Remy) Cabrera ex Pérez-Mor., *Oriastrum gayi* Phil., *Oriastrum glabriusculum* Phil., *Oriastrum lycopodioides* (J. Remy) Wedd. var. *glabriusculum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 3000-3900 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO).

Oriastrum minutum (Phil.) Nicola, S.E. Freire & Ariza

Sin.: *Chaetanthera minuta* (Phil.) Cabrera, *Oriastrum gossypinum* Phil., *Tylloma gnaphalioides* Phil., *Tylloma minutum* Phil.

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Oriastrum pentacaenoides Phil.

Sin.: *Chaetanthera pentacaenoides* (Phil.) Hauman
Hierba. Endémica. 2900-4100 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Oriastrum polymallum Phil.

Sin.: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *polymalla* (Phil.) Hicken, *Oriastrum pulvinatum* Phil. var. *polymallum* (Phil.) Hicken, *Oriastrum tontalensis* A.M.R. Davies
Hierba. Endémica. 3000-4600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(TAR, COQ).

Oriastrum pulvinatum Phil.

Sin.: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *pulvinata*
Hierba. Endémica. 2800-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Oriastrum pusillum Poepp. & Endl.

Sin.: *Chaetanthera planiseta* Cabrera
Hierba. Endémica. 2300-3400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Oriastrum revolutum (Phil.) A.M.R. Davies

Sin.: *Chaetanthera revoluta* (Phil.) Cabrera, *Egania appressa* Phil., *Egania revoluta* Phil., *Oriastrum dioicum* (J. Remy) Phil. var. *revolutum* (Phil.) Reiche
Hierba. Nativa. 3500-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Oriastrum sphaeroidale Reiche

Sin.: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.)
 Hauman var. *acuminati-bracteata*
 Hauman, *Chaetanthera sphaeroidalis*
 (Reiche) Hicken
 Hierba. Endémica. 3200-5000 m.
 Países: ARG(LRI, SAL, SJU).
 CHL(ANT, ATA, COQ).

Oriastrum stuebelii (Hieron.) A.M.R.

Davies var. **abbreviatum** (Cabrera)
 Nicola, S.E. Freire & Ariza
 Sin.: *Chaetanthera stuebelii* Hieron. var.
abbreviata Cabrera, *Oriastrum*
abbreviatum (Cabrera) A.M.R. Davies
 Hierba. Endémica. 3400-4500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Oriastrum stuebelii (Hieron.) A.M.R.

Davies var. **argentinum** (Cabrera)
 Nicola, S.E. Freire & Ariza
 Sin.: *Chaetanthera stuebelii* (Hieron.)
 A.M.R. Davies var. *argentina* Cabrera,
Oriastrum famatinae A.M.R. Davies,
Oriastrum stuebelii (Hieron.) A.M.R.
 Davies var. *cryptum* A.M.R. Davies
 Hierba. Endémica. 3100-4600 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
 TUC).

Oriastrum tarapacensis A.M.R. Davies

Hierba. Endémica. 4100-4600 m.
 Países: CHL(AYP, TAR).

Oriastrum werdermannii A.M.R. Davies

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: CHL(COQ).

Orthopappus Gleason**Orthopappus angustifolius** (Sw.)

Gleason
 Sin.: *Elephantopus angustifolius* Sw.,
Elephantopus nudiflorus Willd.,
Elephantosis angustifolia (Sw.) DC.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
 JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA,
 CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA,
 PAI, PHA, SPE). URY(TAC).

Oxyphyllum Phil.**Oxyphyllum ulicinum** Phil.

Arbusto. Endémica.
 Países: CHL(ANT, ATA).

Pachylaena Hook. & Arn.**Pachylaena atriplicifolia** D. Don ex

Hook. & Arn.
 Sin.: *Chionopectera gayophyta* DC.,
Pachylaena gayophyta (DC.) Hieron.,
Pachylaena rosea I.M. Johnston.
 Hierba. Nativa. 1400-4000 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU,
 SAL, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL,
 LBO, MAU, RME).

Pacourina Aubl.**Pacourina edulis** Aubl.

Sin.: *Pacourina edulis* Aubl. var.
spinosissima Britton, *Pacourinopsis*
dentata Cass., nom. illeg.,
Pacourinopsis integrifolia Cass.,
Vernonia cirsiiflora Mart. ex Baker
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, FOR, SFE).
 PRY(APY, CEN, CON, COA, ITA,
 ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Panphalea Lag.**Panphalea araucariophila** Cabrera

Hierba. Endémica. 1300-1500 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Panphalea bupleurifolia Less.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI).
 BRA(RGS). URY(CAS, CLA, CLA,
 FLA, LAV, MAL, MON, PAY, SAO,
 SJO, SOR, TAC).

Panphalea cardaminifolia Less.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: BRA(RGS, SCA). URY(ART,
 MON).

Panphalea commersonii Cass.

Hierba. Endémica. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS). URY(CAS,
 CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RIV,
 SAO, SJO).

Panphalea heterophylla Less.

Sin.: *Panphalea tweediei* Gardner &
 Fielding
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
 BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA,
 COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL,
 MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO,
 SJO, SOR, TAC, TYT).

Panphalea maxima Less.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: BRA(RGS, SCA). URY(CAS,
 CLA, FLA, LAV, MON, PAY, TYT).

Panphalea missionum Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
 PRY(COA, ITA).

Panphalea ramboi Cabrera

Sin.: *Panphalea ramboi* Cabrera var.
scaposa Merxm.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Panphalea smithii Cabrera

Hierba. Endémica. 1000-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Panphalea tenuissima Trujillo,

Bonifacio & E. Pasini

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Paranephelium Poepp.

Paranephelium asperifolium (Muschl.) H.

Rob. & Brettell

Sin.: *Liabum asperifolium* Muschl.

Hierba. Nativa. 3000-3700 m.

Países: ARG(SAL).

Parastrephia Nutt. emend. Cabrera

Parastrephia lepidophylla (Wedd.)
Cabrera

Sin.: *Dolichogyne lepidophylla* Wedd.,
Lepidophyllum meyenii A. Gray,
Lepidophyllum tola Cabrera

Arbusto. Nativa. 3400-4800 m.

Países: ARG(JUU, SJU). CHL(AYP,
TAR, ANT).

Parastrephia lucida (Meyen) Cabrera

Sin.: *Baccharis lucida* Meyen, *Baccharis*
phyliciformis Meyen, *Diplostegium*
tovari Cuatrec., *Dolichogyne glabra*
Phil., *Dolichogyne rigida* Wedd.,
Dolichogyne rupestris Wedd.,
Lepidophyllum abietinum (Phil.)
Reiche, *Lepidophyllum lucidum*
(Meyen) Cabrera, *Lepidophyllum*
phyliciforme (Meyen) Hieron. ex R.E.
Fr., *Lepidophyllum phyliciforme*
(Meyen) Hieron. ex R.E. Fr. var.
resinosum (Walp.) Blake,

Lepidophyllum rigidum (Wedd.) Benth.
& Hook., *Parastrephia ericoides* Nutt.,
Parastrephia phyliciformis (Meyen)
Cabrera, *Polyclados abietinus* Phil.,
Vernonia phyliciformis (Meyen) Walp.,
Vernonia phyliciformis (Meyen) Walp.
var. *resinosa* Walp., *Vernonia*
phyliciformis Walp.

Arbusto. Nativa. 2900-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Parastrephia quadrangularis (Meyen)
Cabrera

Sin.: *Baccharis quadrangularis* Meyen,
Lepidophyllum cupressinum (Phil.)
Kuntze, *Lepidophyllum quadrangulare*
(Meyen) Benth. & Hook., *Polyclados*
cupressinus Phil.

Arbusto. Nativa. 3000-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Parastrephia teretiuscula (Kuntze)
Cabrera

Sin.: *Lepidophyllum teretiusculum* Kuntze

Arbusto. Nativa. 3200-3900 m.

Países: CHL(AYP, ANT).

Parthenium L.

Parthenium cineraceum Rollins

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Parthenium hysterophorus L.

Sin.: *Argyrochaeta bipinnatifida* Cav.,
Echetrosis pentasperma Phil.,
Parthenium glomeratum Rollins,
Parthenium lobatum Buckley,
Parthenium pinnatifidum Stokes, nom.
superfl.

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,

NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,
TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA,
PHA). URY(MON, RNO, SAO).

Pascalía Ortega

Pascalía glauca Ortega

Sin.: *Aspilia ecliptifolia* (DC.) Baker,
Helianthus copiapinus Phil., *Leighia*
ecliptifolia DC., *Lorentzia pascaloides*
Griseb., *Wedelia chrysostephana*
Griseb., *Wedelia copiapina* (Phil.)
Reiche, *Wedelia ecliptifolia* (DC.) B.L.
Turner, *Wedelia glauca* (Ortega) O.
Hoffm. ex Hicken, *Wedelia glauca*
(Ortega) S.F. Blake, comb. superfl.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,
MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU,
SFE, SDE). CHL(ATA). PRY(PHA).
URY(COL, MON, RNO, SJO).

Pascalía subvaginata (N.E. Br.) Strother

Sin.: *Wedelia crassiuscula* S.F. Blake,
Wedelia subvaginata N.E. Br., *Wedelia*
subvaginata N.E. Br. var. *major* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
SFE). PRY(CEN, COA, ÑEE, PHA).

Pectis L.

Pectis guaranitica Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CON).

Pectis odorata Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU,
SDE). PRY(APY, CON, PHA).

Pectis sessiliflora (Less.) Sch. Bip.

Sin.: *Cryptopetalum ciliare* Cass.,
Lorentea cryptopetala DC., nom. illeg.,
Lorentea sessiliflora Less.
 Hierba. Nativa. 1000-3500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
 SAL, SDE, TUC).

Pectis substriata Rusby

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA, CON).

Pentacalia Cass.**Pentacalia desiderabilis** (Vell.) Cuatrec.

Sin.: *Senecio desiderabilis* Vell., *Senecio ellipticus* DC.
 Arbusto o liana. Nativa. 300-1500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pentacalia epiphytica (Kuntze) Cuatrec.

Sin.: *Senecio epiphyticus* Kuntze, *Senecio steinbachianus* Cuatrec.
 Arbusto. Nativa. 1700
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Pentaphorus D. Don**Pentaphorus fascicularis** D. Don

Sin.: *Gochnatia fascicularis* (D. Don) D.
 Don ex Hook. & Arn., *Gochnatia foliolosa* (D. Don) D. Don ex Hook. &
 Arn. var. *fascicularis* (D. Don) Cabrera,
Gochnatia multiflora F. Phil.
 Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
 ARA, RME).

Pentaphorus foliolosus D. Don

Sin.: *Gochnatia australis* Phil., *Gochnatia berteriana* Phil., *Gochnatia cuspidata*
 Phil., *Gochnatia foliolosa* (D. Don) D.
 Don ex Hook. & Arn. var. *foliolosa*,

Gochnatia integerrima Phil., *Gochnatia laxiflora* Phil., *Gochnatia litoralis* Phil.,
Gochnatia pyrifolia (D. Don) D. Don ex
 Hook. & Arn., *Gochnatia racemosa*
 Phil., *Gochnatia rigida* D. Don ex
 Hook. & Arn., *Pentaphorus pyrifolius*
 D. Don

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
 MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Pentaphorus glutinosus D. Don

Sin.: *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook.
 & Arn., *Gochnatia glutinosa* (D. Don)
 Hook. & Arn. var. *media* Kuntze,
Gochnatia glutinosa (D. Don) Hook. &
 Arn. var. *puberula* Kuntze, *Gochnatia glutinosa*
 (D. Don) Hook. & Arn. var.
viscosissima Kuntze, *Gochnatia viscosissima*
 (Kuntze) S.F. Blake
 Arbusto. Endémica. 500-4000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI,
 MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, TUC).

Perezia Lag.**Perezia atacamensis** (Phil.) Reiche

Sin.: *Clarionea atacamensis* Phil., *Perezia hunzikeri* Cabrera, *Perezia keshua*
 Cabrera
 Hierba. Nativa. 3500-5000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
 SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Perezia bellidifolia (Phil.) Reiche

Sin.: *Homoianthus bellidifolius* Phil.
 Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Perezia burkartii Cabrera

Hierba. Endémica. 3400-3500 m.
 Países: ARG(JUJ).

Perezia calophylla (Phil.) Reiche

Sin.: *Homoianthus calophyllus* Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Perezia capito (Phil.) Reiche

Sin.: *Homoianthus capito* Phil.
 Hierba. Endémica. 1500-2600 m.
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU,
 BIO).

Perezia carthamoides (D. Don) Hook. & Arn.

Sin.: *Clarionea carthamoides* D. Don,
Clarionea carthamoides D. Don var.
crispa (Meyen) Phil., *Clarionea multicapitata*
 J. Remy, *Clarionea spectabilis* Phil., *Perezia diversifolia*
 Meyen, *Perezia diversifolia* Meyen var.
crispa Meyen, *Perezia multicapitata* (J.
 Remy) Wedd.
 Hierba. Endémica. 1800-3800 m.
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,
 VAL, LBO, MAU, RME).

Perezia catharinensis Cabrera

Hierba. Endémica. 600-800 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Perezia ciliosa (Phil.) Reiche

Sin.: *Clarionea ciliosa* Phil.
 Hierba. Nativa. 2500-4600 m.
 Países: ARG(JUJ, TUC). CHL(AYP,
 TAR, ANT).

Perezia delicata Vuilleum.

Hierba. Endémica. 900-2200 m.
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Perezia dentata (Cabrera) Katinas

Sin.: *Perezia ciliosa* (Phil.) Reiche var.
dentata Cabrera
 Hierba. Nativa. 3900-5000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Perezia eryngioides (Cabrera) Crisci & Martic.

Sin.: *Trixis eryngioides* Cabrera

- Hierba. Endémica. 700-1700 m.
Países: BRA(SCA).
- Perezia fonkii** (Phil.) Reiche
Sin.: *Clarionea affinis* Phil., *Clarionea fonkii* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(ARA, LLA).
- Perezia kingii** Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, LPA).
URY(CAS, FLA, MON, SOR).
- Perezia lactuoides** (Vahl) Less.
Sin.: *Aster magellanicus* Lam.,
Chaetanthera magellanica (Lam.)
Spreng., *Clarionea glaberrima* Cass.,
nom. illeg., *Clarionea lactuoides*
(Vahl) D. Don, *Homoianthus*
magellanicus (Lam.) DC.,
Homoianthus magellanicus (Lam.) DC.
var. *lactuoides* (Vahl) Hook. f.,
Homoianthus palustris Phil., *Perdicium*
lactuoides Vahl, *Perdicium*
laevigatum Banks & Sol. ex Hook. f.,
nom. nud., *Perezia lactuoides* (Vahl)
Less. subsp. *palustris* (Phil.) Vuilleum.,
Perezia palustris (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).
- Perezia linearis** Less.
Sin.: *Homoianthus linearis* (Less.) DC.,
Homoianthus pectinellus Gand.,
Homoianthus rigidus Phil.
Hierba. Endémica. 600-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS,
MAG).
- Perezia lyrata** (J. Remy) Wedd.
Sin.: *Clarionea pinnata* Phil., *Homoianthus*
gayanus J. Remy, *Homoianthus*
lyratus J. Remy, *Perezia pinnata*
(Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU,
BIO, ARA, LLA).
- Perezia magellanica** (L. f.) Less.
Sin.: *Clarionea elegans* Phil., *Clarionea*
magellanica (L. f.) Lag. ex DC.,
Perdicium magellanicum L. f.,
Perdicium sinuatum Banks & Sol. ex
Hook. f., nom. nud., *Perezia elegans*
(Phil.) Albov, *Perezia lagascae* Cass.,
nom. illeg., *Perezia magellanica* Lag.,
nom. illeg.
Hierba. Endémica. 200-1400 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA,
AIS, MAG).
- Perezia megalantha** Speg.
Sin.: *Perezia oleracea* Kuntze
Hierba. Endémica. 500-1300 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).
- Perezia multiflora** (Bonpl.) Less. subsp.
multiflora
Sin.: *Chaetanthera multiflora* Humb. &
Bonpl., *Clarionea polycephala* Cass.,
nom. illeg., *Clarionia acanthoides* D.
Don ex Hook. & Arn., nom. nud.,
Homanthis multiflorus (Bonpl.) Kunth,
Homoianthus multiflorus (Bonpl.) DC.,
hom. illeg., *Perezia acanthoides* Hook.
& Arn., *Perezia bidentata* Meyen,
Perezia glomerata Rusby, *Perezia*
multiflora (Bonpl.) Less. var.
achalensis Kuntze, *Scolymanthus*
cnicoides Willd. ex Less., nom. nud.
Hierba. Nativa. 1100-4900 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN,
SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(AYP, TAR).
- Perezia multiflora** (Bonpl.) Less. subsp.
sonchifolia (Baker) Vuilleum.
- Sin.: *Perezia aletes* J.F. Macbr., *Perezia*
sonchifolia Baker, *Perezia sonchifolia*
Baker var. *tandilensis* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, LPA, RNE).
BRA(RGS, SCA). URY(CAS, DUR,
LAV, MAL, MON, RNO, TAC).
- Perezia nutans** Less.
Sin.: *Calorezia nutans* (Less.) Panero,
Perdicium nutans Poepp. ex DC.,
nom. nud., *Perezia gayana* DC.,
Perezia perfoliata J. Remy
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, RME).
- Perezia pedicularidifolia** Less.
Sin.: *Clarionea comosa* Phil., *Clarionea*
humilis Phil., *Clarionea laciniata* Phil.,
Clarionea parvifolia Phil., *Clarionea*
variabilis Phil., *Clarionea volckmanii*
Phil., *Homoianthus variabilis* Phil.,
Perdicium pedicularifolium Poepp. ex
Less., nom. nud., *Perezia laciniata*
(Phil.) Reiche, *Perezia laciniata* (Phil.)
Reiche var. *comosa* (Phil.) Reiche,
Perezia pedicularidifolia Less. var.
humilis (Phil.) Reiche, *Perezia*
pedicularidifolia Less. var. *parvifolia*
(Phil.) Reiche, *Perezia variabilis* (Phil.)
Reiche
Hierba. Endémica. 1000-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).
- Perezia pilifera** (D. Don) Hook. & Arn.
Sin.: *Clarionea lechleri* Sch. Bip.,
Clarionea pilifera D. Don,
Homoianthus humilis Phil., *Perezia*
lechleri (Sch. Bip.) De Wild., *Perezia*
linearis Less. var. *humilis* (Phil.)
Reiche, *Perezia pilifera* (D. Don) Hook.
& Arn. var. *nirihuaensis* Hosseus
Hierba. Endémica. 1500-4300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Perezia pinnatifida (Humb. & Bonpl.) Wedd.

Sin.: *Chaetanthera pinnatifida* Humb. & Bonpl., *Perezia cirsiifolia* Wedd., *Perezia coerulescens* Wedd., *Perezia coerulescens* Wedd. var. *amplibracteata* Tovar, *Perezia integrifolia* Wedd., *Perezia nitidifolia* J. Kost., *Perezia nivalis* Wedd., *Perezia pygmaea* Wedd., *Perezia violacea* Wedd.

Hierba. Nativa. 3300-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Perezia poeppigii Less.

Sin.: *Clarionea caulescens* Phil., *Clarionea nana* Phil., *Clarionea virens* (D. Don) Phil. var. *humilis* Phil., *Clarionea virens* D. Don, *Homoianthus brevicaulis* Phil., *Homoianthus pristiphyllus* J. Remy, *Homoianthus remyanus* Phil., *Perezia pristiphylla* (J. Remy) Wedd., *Perezia virens* (D. Don) Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 1200-2900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Perezia prenanthoides Less.

Sin.: *Calorezia prenanthoides* (Less.) Panero, *Perezia brachylepis* Phil.

Hierba. Endémica. 1200-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA).

Perezia pungens (Bonpl.) Less.

Sin.: *Chaetanthera pungens* Bonpl., *Clarionea ciliaris* (D. Don) DC., *Clarionea pungens* (Bonpl.) D. Don, *Homanthis pungens* (Humb. & Bonpl.)

Kunth, *Homoianthus nivalis* Phil., *Homoianthus pungens* (Bonpl.) Spreng., *Homoianthus scaber* Benth., *Leucheria fasciata* Klatt, *Perezia abbiattii* Cabrera, *Perezia aracensis* J. Kost., *Perezia carduncelloides* Griseb., *Perezia ciliaris* D. Don, *Perezia conaicaensis* Tovar, *Perezia coriacea* Tovar, *Perezia elongata* Kuntze, *Perezia foliosa* Rusby, *Perezia fosbergii* Tovar, *Perezia glandulosa* Meyen, *Perezia laurifolia* Kuntze, *Perezia mandonii* Rusby, *Perezia obtusisquama* J. Kost., *Perezia pungens* (Bonpl.) Less. var. *cernua* Rusby, *Perezia purpurata* Wedd., *Perezia scalpellifolia* J. Kost., *Perezia scalpellifolia* J. Kost. var. *parviflora* J. Kost., *Perezia stuebelii* Hieron., *Perezia sublyrata* Domke, *Perezia sublyrata* Domke var. *glabrescens* Tovar, *Perezia weberbaueri* Hieron. ex Domke

Hierba. Nativa. 2000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Perezia recurvata (Vahl) Less. subsp. **beckii** (Hook. & Arn.) Cabrera

Sin.: *Homoianthus pectinatus* Phil., *Perezia beckii* Hook. & Arn., *Perezia flavescens* Dusén, *Perezia pectinata* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU).

Perezia recurvata (Vahl) Less. subsp. **recurvata**

Sin.: *Chaetanthera recurvata* (Vahl) Spreng., *Clarionea recurvata* (Vahl) D. Don, *Clarionea recurvata* (Vahl) D. Don, *Clarionea reflexa* (Meyen) Phil., *Homoianthus donianus* (Less.) J. Remy, *Homoianthus echinulatus*

Cass., *Homoianthus inermis* Meyen & Walp., nom. superfl., *Homoianthus patagonicus* Gand., *Perdicion recurvatum* Vahl, *Perezia doniana* Less., *Perezia patagonica* Speg., *Perezia patagonica* Speg. var. *intermedia* Speg., *Perezia recurvata* (Vahl) Less. subsp. *patagonica* (Speg.) Cabrera, *Perezia recurvata* (Vahl) Less. var. *sessilis* Dusén, *Perezia reflexa* Meyen

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Perezia recurvata (Vahl) Less. subsp. **triceps** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Homoianthus triceps* Phil., *Perezia triceps* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA).

Perezia spathulata (Lag. ex D. Don) Hook. & Arn.

Sin.: *Clarionea spathulata* Lag. ex D. Don, *Homoianthus germaini* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Homoianthus viscosus* (Poepp. ex Less.) DC., *Perdicion viscosum* Poepp. ex Less., nom. nud., *Perezia viscosa* Poepp. ex Less.

Hierba. Endémica. 100-1200 m.

Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LLA).

Perezia squarrosa (Vahl) Less. subsp. **cubataensis** (Less.) Vuilleum.

Sin.: *Homoianthus cubataensis* (Less.) DC., *Homoianthus laevis* (Less.) DC., *Perezia cubataensis* Less., *Perezia laevis* Less.

Hierba. Nativa. 700-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Perezia squarrosa (Vahl) Less. subsp. **squarrosa**

Sin.: *Homoianthus ambiguus* Cass., nom. superfl., *Homoianthus squarrosus* (Vahl) DC., *Perdicium squarrosus* Vahl

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA, PAI). URY(CAS, MAL).

Perezia volcanensis Cabrera

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUU).

Perityle Benth.

Perityle emoryi Torr.

Sin.: *Closia anthemoides* Phil., *Closia brachypetala* Phil., *Closia chilensis* Regel & Körn., *Closia cotula* J. Remy, *Closia cotula* J. Remy var. *elata* (Phil.) Reiche, *Closia digitata* Phil., *Closia discoidea* Phil., *Closia elata* Phil., *Closia elata* Phil. var. *nana* Phil., *Closia foliosa* Phil., *Closia pusilla* Phil., *Closia villosa* Phil., *Closia viridis* Phil., *Laphamia emoryi* (Torr.) Benth. & Hook. f., nom. inval., *Laphamia nuda* (Torr.) Benth. & Hook. f., nom. inval., *Perityle discoidea* (Phil.) I.M. Johnst., *Perityle emoryi* Torr. var. *elata* (Phil.) I.M. Johnst., *Perityle emoryi* Torr. var. *nuda* (Torr.) A. Gray, *Perityle grayi* Rose, *Perityle nuda* Torr., *Perityle rothrockii* Rose

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Picradeniopsis Rydb. ex Britton

Picradeniopsis multiflora (Hook. & Arn.) B.G. Baldwin

Sin.: *Achyropappus neomexicanus* (A. Gray) A. Gray ex Rydb., *Achyropappus schkuhrioides* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Amblyopappus neomexicanus* (A. Gray) A. Gray, *Bahia gilliesii* A. Gray, *Bahia neomexicana* (A. Gray) A. Gray, *Cephalobembix neomexicana* (A. Gray) Rydb., *Rothia intermedia* Kuntze, *Rothia pusilla* (Wedd.) Kuntze, *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn., *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn. var. *aristata* (R.E. Fr.) Cabrera, *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn. var. *pusilla* (Wedd.) Cabrera, *Schkuhria neomexicana* A.Gray, *Schkuhria pusilla* Wedd., *Schkuhria pusilla* Wedd. var. *aristata* R.E. Fr., *Schkuhria pusilla* Wedd. var. *longipedicellata* Hauman

Hierba. Nativa. 500-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT). URY(TAC).

Picrosia D. Don

Picrosia cabreriana A.G. Schulz

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Picrosia longifolia D. Don

Sin.: *Picrosia australis* Decne., *Picrosia longifolia* D. Don var. *angustissima* Kuntze, *Prenanthes subdentata* Hook., *Psilopogon albiflorus* Phil., *Tragopogon fritillarioides* Less.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, GUA, ÑEE, PHA, SPE). URY(MON).

Piptocarpha R. Br.

Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme

Árbol. Nativa. 300-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptocarpha axillaris (Less.) Baker

Sin.: *Piptocarpha tomentosa* Baker, *Vernonia axillaris* Less.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptocarpha densifolia Dusén ex G.L. Smith

Arbusto o árbol. Nativa. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptocarpha leprosa (Less.) Baker

Sin.: *Vernonia leprosa* Less.

Arbusto. Nativa. 800-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Piptocarpha lucida (Spreng.) Benn. ex Baker

Sin.: *Conyza lucida* Speg., *Piptocarpha isotrichia* (DC.) Cabrera & Vittet, *Vernonia isotricha* DC.

Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker subsp. **crassifolia** (Baker) G. Lom. Sm.

Sin.: *Piptocarpha macropoda* (DC.) Baker var. *crassifolia* Baker

Árbol. Nativa. 200-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptocarpha notata (Less.) Baker
Sin.: *Carphobolus notatus* (Less.) Sch. Bip., *Vernonia notata* Less.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Piptocarpha oblonga (Gardner) Baker
subsp. **lepidota** (Sch. Bip.) G.L. Smith
Sin.: *Piptocarpha reitziana* Cabrera
Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptocarpha oblonga (Gardner) Baker
subsp. **oblonga**
Sin.: *Carphobolus oblongus* (Gardner) Sch. Bip., *Vernonia oblonga* Gardner
Liana. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piptocarpha organensis Cabrera
Arbusto o árbol. Nativa. 300-900 m.
Países: BRA(SCA).

Piptocarpha quadrangularis (Vell.) Baker
Sin.: *Chrysocoma quadrangularis* Vell.
Liana. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piptocarpha ramboi G.L. Smith
Liana. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Piptocarpha regnellii (Sch. Bip.) Cabrera
Sin.: *Carphobolus regnellii* Sch. Bip.
Arbolito. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker
Sin.: *Vernonia rotundifolia* Less.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Piptocarpha sellowii (Sch. Bip.) Baker
Sin.: *Carphobolus sellowii* Sch. Bip., *Piptocarpha sellowii* (Sch. Bip.) Baker
var. *balansiana* Hieron.
Liana. Nativa. 100-600 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, GUA, PAI).

Plagiocheilus Arn. ex DC.

Plagiocheilus tanacetoides Hook. & Arn. ex DC.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(PHA).

Plazia Ruiz & Pav.

Plazia cheiranthifolia (J. Remy) Wedd.
Sin.: *Aglaodendron cheiranthifolium* J. Remy
Arbusto. Nativa. 2600-2800 m.
Países: CHL(COQ).

Plazia daphnoides Wedd.
Sin.: *Harthamnus boliviensis* H. Rob., *Plazia daphnoides* Wedd. var. *glabrescens* Wedd., *Plazia daphnoides* Wedd. var. *villosa* Wedd.
Arbusto. Nativa. 2600-4400 m.
Países: ARG(JUU, MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR).

Plectocephalus D. Don

Plectocephalus atacamensis (Reiche) Penneck. & Chaura
Sin.: *Centaurea atacamensis* (Reiche) I.M. Johnst., *Centaurea atacamensis* (Reiche) Ravenna, comb. superfl.,

Centaurea floccosa Hook. & Arn. var. *atacamensis* Reiche
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ANT, ATA, VAL).

Plectocephalus bridgesii (S. Moore) Penneck. & Chaura
Sin.: *Centaurea bridgesii* S. Moore, *Centaurea chilensis* Hook. & Arn. var. *stenolepis* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Plectocephalus bulbosus (Hook. & Arn.) Penneck. & Chaura
Sin.: *Centaurea bulbosa* Hook. & Arn., *Centaurea dianthoides* J. Remy
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA).

Plectocephalus formosus (Ravenna) Penneck. & Gl. Rojas
Sin.: *Centaurea formosa* Ravenna
Subarbusto. Endémica. 100-400 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Plectocephalus gyanus (J. Remy) Penneck. & Chaura
Sin.: *Centaurea gayana* J. Remy, *Centaurea huascoensis* Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Plectocephalus illapelinus (Phil.) Penneck. & Gl. Rojas
Sin.: *Centaurea illapelina* Phil.
Subarbusto. Endémica. 600-1200 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Plectocephalus monocephalus (J. Remy) Penneck. & Chaura
Sin.: *Centaurea monocephala* J. Remy
Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Plectocephalus tweediei (Hook. & Arn.)

N. Garcia & Susanna

Sin.: *Centaurea tweediei* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(GUA). URY(ART, CLA, FLA, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Pleocarpus D. Don

Pleocarpus revolutus D. Don

Sin.: *Jungia dentata* (Phil.) B.L. Rob., *Jungia revoluta* (D. Don) Reiche, *Jungia revoluta* (D. Don) Reiche var. *dentata* (Phil.) Reiche, *Pleocarpus dentatus* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Pluchea Cass.

Pluchea chingoyo (Kunth) DC.

Sin.: *Conyza chingoyo* Kunth

Arbusto. Nativa. 1000-2500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Pluchea laxiflora Hook. & Arn. ex Baker

Sin.: *Pluchea macrophylla* Sch. Bip. ex Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pluchea microcephala R.K. Godfrey

Hierba. Nativa. 200-400 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Pluchea oblongifolia DC.

Sin.: *Pluchea organensis* Gardner

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera

Sin.: *Conyza sagittalis* Lam., *Epaltes brasiliensis* DC., *Gnaphalium suaveolens* Vell., *Pluchea quitoc* DC., *Pluchea suaveolens* (Vell.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(COL, MON, SOR).

Podanthus Lag.

Podanthus mitiqui Lindl.

Sin.: *Euxenia mitiqui* (Lindl.) DC.

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Podanthus ovatifolius Lag.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

Podocoma Cass.

Podocoma bellidifolia Baker

Sin.: *Leucopsis podocomoides* Baker

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Podocoma blanchetiana Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CON, COA, SPE).

Podocoma hieraciifolia (Poir.) Cass.

Sin.: *Erigeron hieraciifolius* Poir., *Erigeron primulifolius* Juss. ex Cass.,

Podocoma blanchetiana Baker var. *intermedia* Hassl., *Podocoma erigerifolia* Steud., *Podocoma foliosa* Dusén ex Malme, *Podocoma primulifolia* Cass., *Podopappus pubescens* Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CON, MIE). URY(FLA, MON, ROC).

Podocoma hirsuta (Hook. & Arn.) Baker

Sin.: *Podocoma hirsuta* (Hook. & Arn.) Baker var. *macrophylla* Arechav., *Podocoma regnellii* Baker, *Podopappus hirsutus* Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(CAS, FLA, SJO).

Podocoma spagazzinii Cabrera

Sin.: *Podocoma asperrima* Dusén ex Malme

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHA, SAL). BRA(RGS, SCA). URY(RIV).

Polyachyrus Lag.

Polyachyrus annuus I.M. Johnst.

Sin.: *Polyachyrus mollendoensis* I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Polyachyrus carduoides Phil.

Sin.: *Polyachyrus foliosus* Phil., *Polyachyrus glabratus* Phil., *Polyachyrus latifolius* Phil.,

Polyachyrus rigidus I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémica. 800-3000 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Polyachyrus cinereus Ricardi & Weldt
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Polyachyrus gayi J. Remy
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Polyachyrus poeppigii Kuntze ex Less.
subsp. **multifidus** (D. Don) Ricardi & Weldt
Sin.: *Polyachyrus multifidus* D. Don,
Polyachyrus oblongiflorus J. Kost.,
Polyachyrus sanromanii Phil.,
Polyachyrus selinoides Reiche
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Polyachyrus poeppigii Kuntze ex Less.
subsp. **poeppigii**
Sin.: *Polyachyrus auritus* D. Don,
Polyachyrus calderensis Phil.,
Polyachyrus decurrens Lag. ex DC.,
Polyachyrus litoralis Phil., *Polyachyrus*
macrotytis Phil., *Polyachyrus poeppigii*
Kuntze ex Less. var. *litoralis* (Phil.)
Reiche, *Polyachyrus tenuifolius* Phil.,
Polyachyrus virgatus I.M. Johnst.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, RME).

Polyachyrus sphaerocephalus D. Don
Sin.: *Polyachyrus bridgesii* Endl. ex
Steud., *Polyachyrus echinopsoides*
DC., *Polyachyrus glandulosus* Nutt.,
Polyachyrus niveus Lag. ex DC.,
Polyachyrus tarapacanus Phil.,
Polyachyrus uniflorus Sch. Bip.,
Polyachyrus villosus Wedd.
Subarbusto. Nativa. 3300-4000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Porophyllum Guett.

Porophyllum angustissimum Gardner
Sin.: *Kleinia filifolia* Hook. & Arn., nom.
illeg., *Porophyllum arenosum* Sch. Bip.
ex Baker, nom. nud., *Porophyllum*
riedelii Baker
Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500
m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(RGS).

Porophyllum cabreræ D.J.N. Hind
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Porophyllum curticeps Malme
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).

Porophyllum hasslerianum Chodat
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Porophyllum iruyense Anzuinelli & A.
Bartoli
Hierba. Endémica. 2300-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Porophyllum lanceolatum DC.
Sin.: *Kleinia exserta* Hook. & Arn.,
Porophyllum exsertum (Hook. & Arn.)
Baker, *Porophyllum lanceolatum* DC. f.
depauperatum Chodat & Hassl.,
Porophyllum lanceolatum DC. f.
foetens Chodat & Hassl., *Porophyllum*
lanceolatum DC. var. *angustius*
Chodat & Hassl., *Porophyllum*
lanceolatum DC. var. *corymbosus*
Chodat, *Porophyllum lanceolatum* DC.
var. *genuinum* Hassl., nom. inval.,
Porophyllum lanceolatum DC. var.
glaucum Hassl., *Porophyllum*
lanceolatum DC. var. *induratum*
Chodat & Hassl., *Porophyllum*
lanceolatum DC. var. *lineare* (DC.)
Hassl., *Porophyllum lineare* DC.,

Porophyllum lineare DC. var.
corymbosum Chodat, *Porophyllum*
martii Baker, *Porophyllum*
prenanthoides DC.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE,
TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(COA,
GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Porophyllum linifolium (Ard.) DC.

Sin.: *Cacalia linaria* Cav. var. *pumila* Poir.,
Cacalia linifolia Ard., *Cacalia*
suffruticosa L., nom. illeg., *Kleinia*
filifolia Spreng., *Kleinia pumila* Hook. &
Arn., *Kleinia suffruticosa* (L.) Willd.,
comb. illeg., *Porophyllum linifolium*
(Spreng.) DC., *Porophyllum*
suffruticosum (L.) Cass, comb. illeg.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). URY(CAS, COL, LAV,
MAL, MON, PAY, SOR, TAC).

Porophyllum macrolepidium Malme

Sin.: *Porophyllum ruderales* (Jacq.) Cass.
var. *angustifolium* Hassl., *Porophyllum*
ruderales (Jacq.) Cass. var.
macrolepidium (Malme) Chodat &
Hassl.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
SFE). PRY(APY, CEN, CON, PHA).
URY(PAY, SAO, TAC).

Porophyllum obscurum (Spreng.) DC.

Sin.: *Kleinia linifolia* Gillies & D. Don ex
Hook. & Arn., *Kleinia obscura* Spreng.,
Porophyllum eremophilum Cabrera,
Porophyllum haenkei DC.,
Porophyllum oblanceolatum Rusby
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN,
MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, CON, MIE). URY(SJO, TAC).

Porophyllum oppositifolium (Poir.) DC.

Sin.: *Porophyllum oppositifolium* Kuntze, hom. illeg., *Porophyllum platyphyllum* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Porophyllum riparium Anzuinelli,

Schiavinato & A. Bartoli

Hierba. Endémica. 400-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.

Sin.: *Cacalia glandulosa* Salisb., nom. superfl., *Cacalia porophyllum* L., *Cacalia ruderalis* (Jacq.) Sw., *Kleinia porophyllum* (L.) Willd., *Kleinia ruderalis* Jacq., *Porophyllum ellipticum* Cass., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *genuinum* Urb., nom. inval., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *intermedium* DC., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *runderale* (Jacq.) Urb., *Porophyllum latifolium* Benth., *Porophyllum porophyllum* (L.) Kuntze, comb. illeg., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. f. *suffruticosum* Chodat & Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *ellipticum* (Cass.) A. Gray ex B.L. Rob., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *glandulosum* Chodat & Hassl., *Tagetes integrifolia* Muschl.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, SAO, TAC).

Porophyllum spathulatum C.R. Carneiro & A.A. Schneid.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

Praxelis Cass.

Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium catarium* Veldkamp, *Eupatorium clematideum* Griseb., hom. illeg., *Eupatorium urticifolium* L. f. var. *clematideum* Hieron. ex Kuntze, *Eupatorium urticifolium* L. f. var. *nanum* Hieron. ex Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE). URY(ART, SAO).

Praxelis diffusa (Rich.) Pruski

Sin.: *Eupatorium pauciflorum* Kunth, *Praxelis pauciflora* (Kunth) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

Praxelis grandiflora (DC.) Sch. Bip.

Sin.: *Eupatorium kleinoides* Kunth var. *latifolium* Chodat, *Eupatorium variegatum* Malme, *Ooclinium grandiflorum* DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, SPE).

Praxelis kleinoides (Kunth) Sch. Bip.

Sin.: *Campuloclinium kleinoides* (Kunth) DC., *Eupatorium kleinoides* Kunth, *Eupatorium kleinoides* Kunth var. *microcephalum* Chodat, *Eupatorium*

kleinoides Kunth var. *subglabratum* Hieron., *Eupatorium sanctopaulense* B.L. Rob. var. *subglabratum* (Hieron.) Malme, *Eupatorium subglabratum* (Hieron.) Cabrera & Vittet, *Ooclinium paucidentatum* DC., *Ooclinium pedunculare* DC., *Praxelis paucidentata* (DC.) Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, ÑEE).

Praxelis missiona (Malme) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium kleinoides* Kunth var. *hecantha* Baker, *Eupatorium missionum* Malme

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA, MIE).

Praxelis ostenii (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ostenii* B.L. Rob.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

Praxelis sanctopaulensis (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Chromolaena sanctopaulensis* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium sanctopaulense* B.L. Rob. Subarbusto. Nativa. 800-1000 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Proustia Lag.

Proustia cuneifolia D. Don subsp. **cinerea** (Phil.) Luebert

Sin.: *Proustia cinerea* Phil., *Proustia cuneifolia* D. Don f. *cinerea* (Phil.) Fabris

Arbusto. Endémica. 300-1200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Proustia cuneifolia D. Don subsp. **cuneifolia**

Sin.: *Proustia pungens* Poepp. ex Less., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *cuneifolia* (D. Don) Wedd., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *heterophylla* Kuntze, *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *integrifolia* Hook. & Arn., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *spinulosa* Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Proustia cuneifolia D. Don subsp. **mendocina** (Phil.) Katinas

Sin.: *Proustia cuneifolia* D. Don f. *mendocina* (Phil.) Fabris, *Proustia cuneifolia* D. Don var. *mendocina* (Phil.) Ariza, *Proustia mendocina* Phil.

Arbusto. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).

Proustia cuneifolia D. Don subsp. **mollis** (Kuntze) G. Sancho

Sin.: *Proustia angustifolia* Wedd., *Proustia angustifolia* Wedd. var. *mollis* Kuntze, *Proustia cuneifolia* D. Don f. *angustifolia* (Wedd.) Fabris, *Proustia cuneifolia* D. Don var. *mollis* (Kuntze) Cabrera

Arbusto. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE).

Proustia cuneifolia D. Don subsp. **tipia** (Phil.) Luebert

Sin.: *Proustia cuneifolia* D. Don f. *tipia* (Phil.) Fabris, *Proustia tipia* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Proustia pyrifolia DC.

Sin.: *Proustia glandulosa* DC., *Proustia oblongifolia* D. Don, *Proustia pyrifolia* DC. f. *glandulosa* (DC.) Fabris, *Proustia pyrifolia* DC. var. *canescens* DC.

Arbusto. Endémica. 200-1200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Pseudelephantopus Rohr

Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronquist

Sin.: *Chaetospira funckii* (Turcz.) S.F. Blake, *Chaetospira spiralis* (Less.) Aspl. & S.F. Blake, *Distreptus spiralis* Less., *Pseudelephantopus funckii* (Turcz.) Cabrera, comb. superfl., *Pseudelephantopus funckii* (Turcz.) Philipson, *Spirochaeta funckii* Turcz.

Hierba. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA).

Pseudognaphalium Kirp.

Pseudognaphalium aldunateoides (J. Rémy) C. Monti, Bayón & S.E. Freire

Sin.: *Gnaphalium aldunateoides* J. Remy, *Gnaphalium diminutivum* Phil., *Gnaphalium insulare* Phil., *Gnaphalium perpusillum* Phil., *Gnaphalium phaeolepis* Phil., *Gnaphalium rivulare* Phil. ex Klatt, *Pseudognaphalium perpusillum* (Phil.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire

Hierba. Endémica. 500-3700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

Pseudognaphalium cabreræ (S.E. Freire) S.E. Freire, Bayón, Baeza, Giuliano & C. Monti

Sin.: *Gnaphalium cabreræ* S.E. Freire, *Gnaphalium cabreræ* S.E. Freire, nom. inval., *Gnaphalium fastigiatum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium philippii* Cabrera, hom. illeg., *Pseudognaphalium cabreræ* (S.E. Freire) Deble, nom. inval., *Pseudognaphalium fastigiatum* Bayón, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). CHL(TAR, MAU, ARA, RME).

Pseudognaphalium cheiranthifolium (Lam.) Hilliard & B.L. Burt

Sin.: *Gnaphalium acutifolium* Phil., *Gnaphalium araucanum* Phil., *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam., *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. var. *multiflorum* J. Kost., *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. var. *paniculatum* (Bertero ex Colla) Skotts., *Gnaphalium citrinum* Hook. & Arn., *Gnaphalium paniculatum* Bertero ex Colla, *Gnaphalium valdivianum* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, SOR, TYT).

Pseudognaphalium cymatoides (Kunze ex DC.) Anderb.

Sin.: *Gnaphalium canum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium cheiranthifolium* Bertero ex DC., hom. illeg., *Gnaphalium cymatoides* Kunze ex DC., *Gnaphalium cymatoides* Kunze ex DC. var. *glabrum* Walp., *Gnaphalium*

- moelleri* Phil., *Gnaphalium ulophyllum* Hook. & Arn., *Pseudognaphalium moelleri* (Phil.) Anderb.
Hierba. Nativa. 0-4300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
- Pseudognaphalium dysodes*** (Spreng.) S. E. Freire, Bayón & C. Monti
Sin.: *Gnaphalium dysodes* Spreng., *Gnaphalium graveolens* Kunth, hom. illeg., *Gnaphalium nanum* Kunth, hom. illeg., *Pseudognaphalium graveolens* Anderb.
Hierba. Nativa. 3400-4300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, TUC).
- Pseudognaphalium gaudichaudianum*** (DC.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. var. *gaudichaudianum* (DC.) Baker, *Gnaphalium gaudichaudianum* DC., *Gnaphalium gaudichaudianum* DC. var. *subrufescens* DC., *Gnaphalium mendocinum* Phil., *Pseudognaphalium austrobrasilicum* Deble & Marchiori, *Pseudognaphalium mendocinum* (Phil.) Deble & Marchiori
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, TAC, TYT).
- Pseudognaphalium gayanum*** (J. Remy) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium gayanum* J. Remy, *Gnaphalium heterophyllum* Phil., *Gnaphalium heterotrichum* Phil., *Gnaphalium leucocephalum* Phil., nom. illeg., *Gnaphalium pseudohelichrysum* Reiche, *Gnaphalium robustum* Phil., *Hypelichrysum heterotrichum* (Phil.) Kirp., *Pseudognaphalium heterotrichum* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium robustum* (Phil.) Anderb.
Hierba. Endémica. 0-4500 m.
Países: ARG(SLU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG, RME).
- Pseudognaphalium glanduliferum*** C. Monti, Bayón & S.E. Freire
Sin.: *Gnaphalium glanduliferum* Griseb.
Subarbusto. Endémica. 2200-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL).
- Pseudognaphalium jujuyense*** (Cabrera) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium jujuyense* Cabrera
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Pseudognaphalium lacteum*** (Meyen & Walp.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium argyrolepis* Phil., *Gnaphalium badium* Wedd., *Gnaphalium frigidum* Wedd., *Gnaphalium lacteum* Meyen & Walp., *Pseudognaphalium badium* (Wedd.) Anderb., *Pseudognaphalium frigidum* (Wedd.) Anderb.
Hierba. Nativa. 2500-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Pseudognaphalium landbeckii*** (Phil.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium landbeckii* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).
- Pseudognaphalium leucocephalum*** (Cabrera) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium leucocephalum* Cabrera
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(MON, SJO).
- Pseudognaphalium luteoalbum*** (L.) Hilliard & B.L. Burt
Sin.: *Gnaphalium helichrysoides* Wedd., *Gnaphalium luteoalbum* L.
Hierba. Introducida. 0-3000 m.
Países: ARG(TDF). BRA(RGS). CHL(RME).
- Pseudognaphalium munozae*** Bayón C. Monti & S.E. Freire
Hierba. Endémica. 3500-4200 m.
Países: CHL(AYP, TAR).
- Pseudognaphalium psilophyllum*** (Meyen & Walp.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium glandulosum* Klatt, *Gnaphalium psilophyllum* Meyen & Walp., *Pseudognaphalium glandulosum* (Klatt) Anderb.
Hierba. Endémica. 800-4600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, LLA).
- Pseudognaphalium remyanum*** (Phil.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium remyanum* Phil.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(RME).
- Pseudognaphalium tarapacanam*** (Phil.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium tarapacanam* Phil.
Hierba. Nativa. 2600-4200 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, MAU, BIO, RME).

Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb.

Sin.: *Gnaphalium andicola* Phil., *Gnaphalium coquimbense* Phil., *Gnaphalium illapelinum* Phil. var. *illapelinum*, *Gnaphalium illapelinum* Phil. var. *lanatum* Phil., *Gnaphalium longifolium* Phil., *Gnaphalium melanosphaeroides* Wedd., *Gnaphalium montevidense* Spreng., *Gnaphalium pratense* Phil., *Gnaphalium subnudum* Phil., *Gnaphalium versatile* Rusby, *Gnaphalium viravira* Molina, *Pseudognaphalium andicola* (Phil.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire, *Pseudognaphalium coquimbense* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium illapelinum* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium melanosphaeroides* (Wedd.) Anderb., *Pseudognaphalium montevidense* (Spreng.) Anderb., *Pseudognaphalium pratense* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium versatile* (Rusby) Anderb.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Pseudognaphalium yalaense (Cabrera) Anderb.

Sin.: *Gnaphalium yalaense* Cabrera
Hierba. Endémica. 1600-3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Pseudogynoxys (Greenm.) Cabrera

Pseudogynoxys benthamii Cabrera

Sin.: *Pseudogynoxys cabreræ* H. Rob. & Cuatrec., *Senecio benthamii* Baker, hom. illeg.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera

Sin.: *Senecio chenopodioides* Kunth
Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pseudogynoxys cordifolia (Cass. ex Gaudich.) Cass.

Sin.: *Gynoxys cordifolia* Cass.
Enredadera. Introducida. 200-300 m.
Países: CHL(AYP).

Psilocarphus Nutt.

Psilocarphus brevissimus Nutt.

Sin.: *Psilocarphus globifer* Nutt.
Hierba. Nativa. 300-3000 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Psilocarphus tenellus Nutt. var. **globifer** (Bertero ex DC.) Morefield

Sin.: *Bezanilla chilensis* J. Remy, nom. superfl., *Micropus globifer* Bertero ex DC., *Psilocarphus berteroi* I.M. Johnst., *Psilocarphus chilensis* (J. Remy) A. Gray, *Psilocarphus globifer* (Bertero ex DC.) Speg., hom. illeg., *Psilocarphus globifer* (Bertero ex DC.) Speg. var. *minimus* Cabrera, *Psilocarphus tenellus* Nutt. var. *tenuis* (Eastw.) Cronquist, *Psilocarphus tenuis* Eastw.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Pterocaulon Elliott

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.

Sin.: *Baccharis erioptera* Benth., *Chlaenobolus alopecuroides* (Lam.) Cass., *Conyza alopecuroides* Lam., *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC. var. *glabrescens* Chodat, *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC. var. *polystachyum* DC., *Pterocaulon interruptum* DC., *Pterocaulon interruptum* DC. var. *monostachyum* DC., *Pterocaulon interruptum* DC. var. *polystachyum* DC., *Pterocaulon latifolium* Kuntze, *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *alopecuroides* (Lam.) Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subcorymbosum* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(MON, ROC).

Pterocaulon angustifolium DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(PAY).

Pterocaulon balansae Chodat

Sin.: *Pterocaulon paniculatum* Arechav., *Pterocaulon polystachyum* DC. var. *tomentosum* Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subpaniculatum* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI). URY(CAS, MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Pterocaulon cabrerae M. Monge,
Anderb. & Semir
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,
CEN).

Pterocaulon cordobense Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, FOR, LPA, SFE, SLU).
BRA(RGS). PRY(COA, GUA, PHA).
URY(CAS, COL, MAL, MON, SOR).

Pterocaulon lanatum Kuntze
Sin.: *Pterocaulon hassleri* Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, COA, PAI, SPE).

Pterocaulon lorentzii Malme
Sin.: *Pterocaulon malmeanum* Chodat,
Pterocaulon virgatum (L.) DC. f.
angustifolium Arechav., *Pterocaulon*
virgatum (L.) DC. f. *spicata* Arechav.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA,
GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA).
URY(CAS, COL, MAL, MON, RNO,
ROC, SJO, TAC).

Pterocaulon polypterum (DC.) Cabrera
Sin.: *Baccharis polyptera* DC.,
Pterocaulon bakeri Malme, *Vernonia*
pterocaulon Baker
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS,
SCA). URY(CLA).

Pterocaulon polystachyum DC.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN,

COA, GUA, PAI, SPE). URY(MON,
PAY, RIV).

Pterocaulon purpurascens Malme
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE,
TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ,
CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

Pterocaulon rugosum Malme
Sin.: *Chlaenobolus rugosus* Cass.,
Conyza rugosa Vahl, hom. illeg.,
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.
var. *mollis* Chodat, *Pterocaulon*
spicatum DC. var. *brachystachyum*
DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CEN, ÑEE, PHA, SPE).

Pterocaulon virgatum (L.) DC.
Sin.: *Chlaenobolus virgatus* (L.) Cass.,
Conyza virgata (L.) L., *Gnaphalium*
virgatum L., *Pterocaulon pilcomayense*
Malme, *Pterocaulon pompilianum*
Standl. & Williams, *Pterocaulon*
subspicatum Malme ex Chodat,
Pterocaulon subvirgatum Malme,
Pterocaulon virgatum (L.) DC. f.
subvirgatum (Malme) Arechav.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE,
TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APA,
APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI,
PHA). URY(ART, MON, PAY, RNO,
ROC).

Quechualia H. Rob.

Quechualia fulta (Griseb.) H. Rob.
Sin.: *Cacalia fulta* (Griseb.) Kuntze,
Quechualia trixioides (Rusby) H. Rob.,
Vernonia fulta Griseb., *Vernonia*
senecionifolia Britton, *Vernonia*
trixioides Rusby
Arbusto. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SFE, TUC).

Radlkoferotoma Kuntze

Radlkoferotoma berroi (Hutch.) R.M.
King & H. Rob.
Sin.: *Carelia berroi* Hutch.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

Radlkoferotoma cistifolium (Less.)
Kuntze
Sin.: *Carelia cistifolia* Less.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CLA, TYT).

Radlkoferotoma ramboi (Cabrera) R.M.
King & H. Rob.
Sin.: *Carelia ramboi* Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).

Ratibida Raf.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton &
Standl. f. **columnifera**
Sin.: *Rudbeckia columnifera* Nutt.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(SFE).

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton &
Standl. f. **pulcherrima** (DC.) W.M.
Sharp
Sin.: *Obeliscaria columnaris* (Pursh) DC.
var. *pulcherrima* (DC.) D. Don,

Obeliscaria pulcherrima DC., *Ratibida columnifera* (Nutt.) Wooton & Standl. var. *pulcherrima* (DC.) Woot. & Standl. Hierba. Introducida. 0-100 m. Países: ARG(SLU).

Raulinoreitzia R.M. King & H. Rob.

Raulinoreitzia crenulata (Spreng.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Ageratina dendroides* (Spreng.) R.M. King & H. Rob., *Baccharis crenulata* Spreng., *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Hieron. var. *tucumanense* Hieron., *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Spreng. ex Hieron., comb. illeg., *Eupatorium dendroides* Spreng., *Eupatorium laevigatum* Griseb., hom. illeg., *Eupatorium neurophyllum* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud., *Eupatorium pentanthum* Sch. Bip., nom. nud., *Eupatorium piauhense* Gardner, *Eupatorium polystachyum* DC. var. *polystachyum*, *Eupatorium polystachyum* DC. var. *subcordatum* Cabrera & Vittet, *Mikania arborea* Kunth, nom. illeg.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PHA, SPE). URY(PAY).

Raulinoreitzia leptophlebia (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium leptophlebium* (B.L. Rob.) Steyer., *Symphyopappus leptophlebius* B.L. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Raulinoreitzia tremula (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Hieron., hom. illeg. var. *xylophyloides* (DC.) Hicken, *Eupatorium dendroides* Spreng. var. *xylophyloides* (DC.) Baker, *Eupatorium tremulum* Hook. & Arn., *Eupatorium xylophyloides* DC.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, RNO, SJO).

Rhaponticum Ludw., nom. & typ. cons.

Rhaponticum repens (L.) Hidalgo

Sin.: *Acroptilon picris* (Pall. ex Willd.) C.A. Mey., *Acroptilon repens* (L.) DC., *Centaurea picris* Pall. ex Willd., *Centaurea repens* L., *Serratula picris* (Pall. ex Willd.) M. Bieb.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, RNE, SCR).

Richterago Kuntze

Richterago radiata (Vell.) Roque

Sin.: *Actinoseris radiata* (Vell.) Cabrera, *Ingenhusia radiata* Vell., *Onoseris brevifolia* D. Don, *Seris denticulata* DC., *Trichocline radiata* (Vell.) S.F. Blake

Hierba. Nativa. 800-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Salmea DC.

Salmea scandens (L.) DC.

Sin.: *Bidens scandens* L., *Calea amellus* (L.) L., *Fornicaria scandens* (L.) Raf., *Salmea eupatoria* DC. var. *intermedia* DC., *Salmea grandiceps* Cass.,

Salmea nitida (La Llave) Sch. Bip. ex Klatt, *Salmea oppositiceps* Cass., *Salmea parviceps* Cass., *Salmea pubescens* (S.F. Blake) Standl. & Steyer., *Salmea salicifolia* Brongn. ex Neumann, *Salmea scandens* (L.) DC. subsp. *paraguariensis* Hassl., *Salmea scandens* (L.) DC. var. *amellus* (L.) Kuntze, *Salmea scandens* (L.) DC. var. *genuina* S.F. Blake, nom. inval., *Salmea scandens* (L.) DC. var. *obtusata* S.F. Blake, *Salmea scandens* (L.) DC. var. *pubescens* S.F. Blake, *Salmea sessilifolia* Griseb., *Salmea tomentosa* D. L. Nash, *Salmeopsis clausenii* Benth., *Santolina amellus* L., *Spilanthes nitida* La Llave, *Verbesina scandens* Klatt

Arbusto. Nativa. 1500-1600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). PRY(GUA, PAI, SPE).

Sanvitalia Lam.

Sanvitalia versicolor Griseb.

Hierba. Nativa. 300-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Schistocarpa Less.

Schistocarpa eupatorioides (Fenzl) Kuntze

Sin.: *Neilreichia eupatorioides* Fenzl, *Schistocarpa hoffmannii* Kuntze, *Schistocarpa oppositifolia* (Kuntze)

Rydb., *Zyconia oppositifolia* Kuntze

Hierba. Nativa. 800-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Schkuhria Roth, nom. cons.

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.

Sin.: *Amblyopappus mendocinus* Phil., *Pectis pinnata* Lam., *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *pallida* Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *purpurascens* Kuntze, *Schkuhria abrotanoides* Roth, *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *isopappa* (Benth.) Hieron., *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *pomasquiensis* Hieron., *Schkuhria advena* Thell., *Schkuhria bonariensis* Hook. & Arn., *Schkuhria coquimbana* Phil., *Schkuhria isopappa* Benth., *Schkuhria octoaristata* DC., *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *abrotanoides* (Roth) Cabrera, *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *octoaristata* (DC.) Cabrera
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, COQ). PRY(AMA, CEN). URY(COL).

Schlechtendalia Less., nom. cons.

Schlechtendalia luzulifolia Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS). URY(CLA, LAV, MAL, MON, ROC).

Scolymus L.

Scolymus hispanicus L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, SFE). CHL(VAL).

Scorzonera L.

Scorzonera laciniata L.

Sin.: *Podospermum laciniatum* (L.) DC.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, SCR).

Senecio L.

Senecio × lulioi M.G. López & Xifreda

Sin.: *Senecio grisebachii* Baker var. *anomalus* Cabrera
Hierba. Endémica.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR, RGS).

Senecio achalensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1500-1700 m.
Países: ARG(COR).

Senecio adamantinus Bong.

Sin.: *Senecio camporum* Gardner, *Senecio sessilis* Vell.
Hierba. Nativa. 1300
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senecio adenophyllus Meyen & Walp.

Sin.: *Senecio adenophyllus* Meyen & Walp. var. *oblongifolius* Wedd., nom. nud.
Arbusto. Nativa. 4200-4900 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio adenotrichius DC.

Sin.: *Adenotrichia amplexicaulis* Lindl.
Hierba. Endémica. 300-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Senecio adrianicus Cabrera

Arbusto. Endémica. 2500-3300 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Senecio alicornis Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio chrysanthemoides* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Senecio algens Wedd.

Hierba. Nativa. 3700-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio alloeophyllus O. Hoffm. var. **alloeophyllus**

Subarbusto. Endémica. 1300-1800 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Senecio alloeophyllus O. Hoffm. var. **glaberrimus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF).

Senecio almeidae Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Senecio altoandinus Cabrera

Subarbusto. Endémica. 4500-4900 m.
Países: ARG(JUU).

Senecio ambatensis Cabrera

Arbusto. Endémica. 2900-3500 m.
Países: ARG(CAT).

Senecio ameghinoi Speg.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU).

Senecio anconquijae Cabrera f. **anconquijae** Cabrera

Hierba. Endémica. 3800-4500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Senecio anconquijae Cabrera f. **discoideus** Cabrera

Hierba. Endémica. 3300-3400 m.

- Países: ARG(TUC).
- Senecio angulatus** L. f.
Enredadera. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, DFE, SDE).
CHL(TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Senecio angustissimus** Phil.
Sin.: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC.
var. *angustissimus* (Phil.) Speg.,
Senecio nahuelbutanus Phil.
Subarbusto. Endémica. 1700
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA).
- Senecio anthemidiphyllus** J. Remy
Sin.: *Senecio brachylepis* Phil., *Senecio campanae* Phil., *Senecio hakeifolius* Bertero ex DC. var. *viscidus* Hook. & Arn., *Senecio psammoecus* Cabrera, *Senecio psammophilus* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 2700
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME).
- Senecio antofagastanus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1000
Países: CHL(ANT).
- Senecio apensis** Cabrera
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CON).
- Senecio aquaticus** Hill subsp. **aquaticus**
Hierba. Introducida.
Países: CHL(BIO, LLA).
- Senecio aquaticus** Hill subsp. **barbareifolius** (Wimm. & Grab.) Walters
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LSR, LLA).
- Senecio aquilaris** Cabrera
Subarbusto. Nativa. 4900-5000 m.
Países: ARG(JUU).
- Senecio arechavaletae** Baker
Hierba. Endémica. 900
Países: ARG(BAI). URY(MON, ROC).
- Senecio argillosus** Baker
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MON).
- Senecio argophylloides** Griseb. var. **argophylloides**
Arbusto. Endémica. 2800-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Senecio argophylloides** Griseb. var. **rupestris** Cabrera
Arbusto. Endémica. 3200-4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
- Senecio argyreus** Phil.
Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).
- Senecio aristianus** J. Remy
Sin.: *Senecio guayacanensis* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).
- Senecio arleguianus** J. Remy
Arbusto. Endémica. 1200
Países: CHL(COQ).
- Senecio arnottii** Hook. f.
Sin.: *Senecio limbardiioides* Hook. & Arn., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(NEU, SCR, TDF).
CHL(LLA, MAG).
- Senecio aspericaulis** J. Remy
Sin.: *Senecio hypsophilus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2400-2800 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, RME).
- Senecio asplenifolius** Griseb.
Sin.: *Senecio roripifolius* Cabrera
Hierba. Endémica. 3200-4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, TUC).
- Senecio atacamensis** Phil.
Arbusto. Endémica. 3100
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT).
- Senecio australandinus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1500-1700 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
- Senecio baccharidifolius** Poepp. ex DC.
Subarbusto. Endémica. 1500-1600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).
- Senecio bahioides** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *glaber* Hook. & Arn., *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *lanosus* Hook. & Arn., *Senecio irregularis* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).
- Senecio balsamicus** Phil.
Subarbusto. Endémica. 2700
Países: CHL(ATA).
- Senecio barbarae** Cabrera
Hierba. Endémica. 4300-5000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(ANT).
- Senecio barrosianus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(MAU).

- Senecio beaufilsii** Kuntze
Sin.: *Senecio beaufilsii* Kuntze var. *toninii* Kuntze
Subarbusto. Endémica. 1500-1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).
CHL(MAG).
- Senecio belenensis** Griseb.
Hierba. Endémica. 3200
Países: ARG(CAT).
- Senecio benaventianus** J. Remy
Subarbusto. Endémica. 200-2000 m.
Países: CHL(COQ).
- Senecio bergii** Hieron.
Sin.: *Senecio quequensis* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE).
- Senecio berteroi** (DC.) Pelser
Sin.: *Balbisia berteroi* DC., *Robinsonia berteroi* (DC.) R.W. Sanders, *Stuessy* & Martic.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Senecio bipontinii** Wedd.
Subarbusto. Endémica.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(BIO).
- Senecio boelckei** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1600-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
- Senecio bonariensis** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn. var. β Hook. & Arn., *Senecio rhodaster* Baker, *Senecio sagittarioides* Speg., *Senecio sagittifolius* Baker, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MEN, MIS, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
- URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MON, SJO, SOR).
- Senecio brachylobus** Phil.
Subarbusto. Endémica. 500
Países: CHL(ATA, COQ).
- Senecio bracteolatus** Hook. & Arn. var. **bracteolatus**
Sin.: *Senecio coxi* Phil., *Senecio diabolicus* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(BIO, ARA).
- Senecio bracteolatus** Hook. & Arn. var. **luteus** Tortosa & A. Bartoli
Arbusto. Endémica. 2000
Países: ARG(NEU).
- Senecio bracteolatus** Hook. & Arn. var. **valderramae** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio inutilis* Speg., *Senecio valderramae* Phil.
Arbusto. Endémica. 1000-1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, MAG).
- Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less. var. **brasiliensis**
Sin.: *Cineraria brasiliensis* Spreng.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, ITA, MIE). URY(MAL, MON).
- Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less. var. **incanus** Baker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA). URY(MAL, MON).
- Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less. var. **tripartitus** (DC.) Baker
- Sin.: *Senecio amabilis* Vell., *Senecio megapotamicus* H. Buek, *Senecio tripartitus* DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, ITA, MIE). URY(CAS, COL, MAL, MON, SJO, SOR).
- Senecio bravensis** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).
- Senecio breviscapus** DC.
Sin.: *Senecio acaulis* Phil., *Senecio chamaecephalus* Wedd., *Senecio werneroides* Wedd., *Werneria cortusifolia* Griseb., nom. superfl., *Werneria werneroides* (Wedd.) Kuntze
Hierba. Nativa. 2500-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).
- Senecio bridgesii** Hook. & Arn.
Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Senecio brunonianus** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio serenensis* J. Remy
Subarbusto. Endémica. 100
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).
- Senecio buglossus** Phil.
Sin.: *Senecio limonius* Phil., *Senecio valdivianus* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).
- Senecio burkartii** Cabrera
Sin.: *Senecio hygrophilus* Cuatrec., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 3800-4000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Senecio bustillosianus J. Remy var. **bustillosianus**

Sin.: *Senecio schulzeanus* F. Meigen
Subarbusto. Endémica. 2600-2700 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Senecio cachinalensis Phil. var. **cachinalensis**

Sin.: *Senecio breanus* Phil., *Senecio larranagae* Phil.
Arbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Senecio cachinalensis Phil. var. **copiapinus** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio copiapinus* Phil.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Senecio cajonensis Cabrera

Hierba. Endémica. 4600-4700 m.
Países: ARG(CAT).

Senecio calchaquensis Cabrera

Sin.: *Lomanthus calchaquinus* (Cabrera)
B. Nord.
Subarbusto. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(TUC).

Senecio calcicola Meyen & Walp.

Sin.: *Senecio botijae* C. Ehrh.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Senecio calingastensis Tombesi

Subarbusto. Endémica. 2500-3600 m.
Países: ARG(SJU).

Senecio calocephalus Poepp.

Sin.: *Senecio columbaria* J. Remy
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Senecio canchahuinganquensis Cabrera

Arbusto. Endémica. 1000-1200 m.

Países: ARG(NEU).

Senecio candidans DC.

Sin.: *Brachypappus candicans* (J. Vahl)
Sch. Bip., *Cacalia candicans* Vahl,
Culcitium gayanum J. Remy, *Senecio*
culciremy Cuatrec.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(BIO, LLA,
AIS, MAG).

Senecio caparoensis Cabrera

Hierba. Nativa. 1400-1600 m.

Países: BRA(SCA).

Senecio carbonensis C. Ezcurra,

Ferreya & Clayton
Subarbusto. Endémica. 1500-1800 m.
Países: ARG(RNE).

Senecio catamarcensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2000
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Senecio ceratophylloides Griseb.

Sin.: *Senecio ceratophyllus* D. Don ex
Hook. & Arn., hom. illeg., *Senecio*
ceratophyllus D. Don ex Hook. & Arn.,
hom. illeg. var. *macrodon* (Baker)
Malme, *Senecio ceratophyllus* D. Don
ex Hook. & Arn., hom. illeg. var. *major*
D. Don ex Hook. & Arn., *Senecio*
chilensis Less. var. *ceratophyllus* (D.
Don ex Hook. & Arn.) Baker, *Senecio*
chilensis Less. var. *macrodon* Baker,
Senecio cuspidatus DC. var.
ceratophylloides (Griseb.) Kuntze,
Senecio cuspidatus DC. var.
ceratophyllus (D. Don ex Hook. & Arn.)
Baker, *Senecio cuspidatus* DC. var.
macrodon (Baker) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE,
SLU). BRA(RGS, SCA). URY(CAS,
MAL, MON).

Senecio cerberoanus J. Remy var. **cerberoanus**

Sin.: *Senecio berteroanus* DC. var.
obtusius DC., *Senecio phaedrui* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Senecio cerberoanus J. Remy var. **lanatus** Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ).

Senecio chamomillifolius Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ATA).

Senecio chanaralensis Phil.

Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Senecio chilensis Less. f. **discoideus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU).

Senecio chilensis Less. var. **argophyllus** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio argophyllus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2000
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO,
ARA).

Senecio chilensis Less. var. **chilensis**

Sin.: *Senecio argenteus* Kuntze ex DC.,
Senecio linearifolius Colla, *Senecio*
phagnaloides DC.
Subarbusto. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR,
LLA, RME).

Senecio chillanensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 700-1800 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Senecio chionophilus Phil.

Sin.: *Senecio hollemayeri* Cabrera,
Senecio vulcanicus Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 1500-2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Senecio chipauquilensis H.O. Troiani & Steibel

Subarbusto. Endémica. 900
Países: ARG(RNE).

Senecio chrysanthemum Dusén var. **chrysanthemum**

Subarbusto. Endémica. 300-1500 m.
Países: ARG(SCR).

Senecio chrysanthemum Dusén var. **discoideus** Ratto, Sbarra & Tortosa

Subarbusto. Endémica. 1100-1200 m.
Países: ARG(SCR).

Senecio chrysocomoides Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio capillarifolius* Speg.,
Senecio chubutensis Speg.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).

Senecio chrysolepis Phil.

Sin.: *Senecio juncalensis* Phil.
Subarbusto. Nativa. 3400-4200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU).
CHL(TAR, ANT, ATA).

Senecio cisplatinus Cabrera

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). URY(RIV).

Senecio clarioneifolius J. Rémy

Subarbusto. Nativa. 2300-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Senecio clivicola Wedd. var. **clivicola**

Sin.: *Senecio fiebrigianus* Cabrera,
Senecio pampae Lingelsh. var.
penicillatus Lingelsh.
Arbusto. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Senecio clivicola Wedd. var. **pampae** (Lingelsh.) Cabrera

Sin.: *Senecio pampae* Lingelsh.
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Senecio coluhuapiensis Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU).

Senecio comberi Cabrera

Subarbusto. Endémica. 900
Países: ARG(NEU).

Senecio conyzifolius Baker

Hierba. Endémica. 500-1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Senecio coquimbensis Phil.

Sin.: *Senecio berterianus* DC., hom. illeg.,
Senecio peripotamus C. Jeffrey,
Senecio rivularis J. Remy, hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 100-700 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Senecio corcovadensis Cabrera

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU).

Senecio coronopodiophyllus J. Rémy

Sin.: *Metazanthus cacalioides* Meyen
Subarbusto. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, LBO, RME).

Senecio corrugatus (Phil.) Pelsner

Sin.: *Robinsonia corrugata* Phil.,
Robinsonia gayana Decne.,
Robinsonia longifolia Phil.

Arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Senecio covasii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1800-2800 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, RME).

Senecio covuncensis Cabrera

Arbusto. Endémica. 1000
Países: ARG(NEU).

Senecio crassiflorus (Poir.) DC. var. **crassiflorus**

Sin.: *Cineraria crassiflora* Poir., *Cineraria vestita* Spreng., *Senecio andryaloides* DC., *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. var. *andryaloides* (DC.) Arechav., *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. var. *tricuspidis* Baker, *Senecio culcitium* J. Rémy
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC, SJO).

Senecio crassiflorus (Poir.) DC. var. **maritimus** (Malme) Cabrera

Sin.: *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. f. *maritimus* Malme
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MON, ROC).

Senecio crassiflorus (Poir.) DC. var. **subceratophyllus** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, MAL, MON).

Senecio cremeiflorus Mattf.

Hierba. Endémica. 2000-2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Senecio cremnicola Cabrera

Hierba. Endémica. 4000-4200 m.

- Países: ARG(LRI).
- Senecio cremnophilus** I.M. Johnst.
Subarbusto. Endémica. 3200-3400 m.
Países: ARG(SJU).
- Senecio crepidifolius** DC.
Subarbusto. Nativa. 2500-3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU).
- Senecio crithmoides** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio carnifolius* Cabrera, *Senecio diazii* Phil., *Senecio iberidifolius* Phil., *Senecio julietii* Phil., *Senecio remyanus* Phil., *Senecio sarcophyllus* Phil., hom. illeg., *Senecio schultzei* Wedd., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 1300-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).
- Senecio crusei** Pelser
Sin.: *Robinsonia gracilis* Decne.
Arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Senecio cryptocephalus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1500-1700 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
- Senecio ctenophyllus** Phil.
Sin.: *Senecio vittatus* Reiche
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Senecio cumingii** Hook. & Arn. var. **bracteosus** (J. Remy) Cabrera
Sin.: *Senecio bracteosus* J. Remy
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL).
- Senecio cumingii** Hook. & Arn. var. **cumingii**
Sin.: *Senecio paralias* Phil.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Senecio cuneatus** Hook. f.
Sin.: *Senecio arenicola* Reiche, *Senecio duseii* Hoffm.
Hierba. Endémica. 600
Países: ARG(SCR). CHL(AIS, MAG).
- Senecio cylindrocephalus** Cabrera
Arbusto. Endémica. 2200-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).
- Senecio darwinii** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. var. *laxus* Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).
- Senecio davilae** Phil.
Subarbusto. Endémica. 1900-3000 m.
Países: CHL(VAL, RME).
- Senecio deferens** Griseb.
Sin.: *Senecio stenopteris* Griseb.
Hierba. Endémica. 400-3000 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA).
- Senecio delicatulus** Cabrera & Zardini
Subarbusto. Endémica. 4300-4500 m.
Países: ARG(CAT).
- Senecio depressus** Hook. & Arn.
Sin.: *Calcutium depressum* D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud., *Senecio confertissimus* Cabrera, *Senecio poeppigii* Hook. & Arn. var. *condensatus* Reiche
Subarbusto. Endémica. 3100-3300 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU).
- Senecio desideratus** DC.
Sin.: *Senecio hauthalii* Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
- Países: ARG(SCR).
- Senecio diaguila** Cabrera
Arbusto. Endémica. 2000-3200 m.
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).
- Senecio dichotomus** Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-2900 m.
Países: CHL(ANT).
- Senecio diemii** Cabrera
Hierba. Endémica. 1800-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA).
- Senecio digitatus** Phil.
Sin.: *Werneria pygmaephylla* S.F. Blake
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR, ANT).
- Senecio divaricoides** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1600-1800 m.
Países: ARG(NEU).
- Senecio donianus** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio arachnoideus* Phil., hom. illeg., *Senecio arachnoideus* Phil. var. *viridis* Hauman, *Senecio lanuginosus* D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud.
Subarbusto. Endémica. 2700-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).
- Senecio dryophyllus** Meyen & Walp.
Sin.: *Senecio amphibolus* Wedd., *Senecio amphibolus* Wedd. var. *socialis* (Wedd.) Cabrera, *Senecio socialis* Wedd., *Senecio subvulgaris* Kuntze, *Senecio tarapacanus* Phil.
Subarbusto. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Senecio eightsii** Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.

- Países: ARG(TDF).
- Senecio elquiensis** Cabrera
Hierba o subarbusto. Endémica. 800
Países: CHL(COQ).
- Senecio ephemerus** J. Calvo & Saldivia
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: CHL(COQ).
- Senecio eriocladus** Wedd.
Sin.: *Senecio behnii* Ricardi & Martic.
Subarbusto. Nativa. 3200-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR).
- Senecio eriophyton** J. Remy
Arbusto. Endémica. 3500-4800 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
CHL(ANT, ATA, COQ).
- Senecio erraticus** Bertol.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(LLA).
- Senecio eruciformis** J. Remy var.
brachycephalus (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio rutaceus* Phil. var.
brachycephalus Phil.
Subarbusto. Endémica. 1200-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ,
VAL, MAU, RME).
- Senecio eruciformis** J. Remy var.
eruciformis
Sin.: *Senecio rutaceus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2200-2600 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,
MAU, BIO, RME).
- Senecio espinosae** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 2500
Países: CHL(MAU).
- Senecio evacoides** Sch. Bip.
Subarbusto. Nativa. 3500-4800 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP).
- Senecio evenius** (Phil.) Pelser
Sin.: *Robinsonia evenia* Phil.
Arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Senecio expansus** Wedd.
Hierba. Nativa. 3900-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Senecio fabrisii** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1500-2400 m.
Países: ARG(CAT, SAL).
- Senecio falklandicus** Hook. f.
Sin.: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. f.
falklandicus (Hook. f.) Skottsb.,
Senecio littoralis Gaudich., nom. illeg.,
Senecio littoralis Gaudich. var. *lanata*
Gaudich.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).
- Senecio famatinensis** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(LRI).
- Senecio farinifer** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio apricus* Phil., *Senecio*
belophyllus J. Remy, *Senecio*
linariifolius Poepp. ex DC. var.
longifolia Phil.
Subarbusto. Endémica. 700-3400 m.
Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL,
LBO, MAU, ARA, RME).
- Senecio ferruglii** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(CHU).
- Senecio festucoides** J. Calvo & Moreira
Hierba. Endémica. 4300-4600 m.
Países: CHL(TAR, ANT).
- Senecio filaginoides** DC. var.
filaginoides
- Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn.,
Senecio albicaulis Hook. & Arn. var.
gilliesii Hook. & Arn., *Senecio*
albolanatus Phil., hom. illeg., *Senecio*
caricifolius Hook. & Arn., *Senecio*
doeringii Hieron., *Senecio leuciscus*
Phil., *Senecio leyboldtii* Phil., *Senecio*
meyenii Phil., *Senecio quensellii*
Skottsb., *Senecio sericeus* Kuntze
Arbusto. Endémica. 400-2700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ,
LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU,
SLU, SCR, TDF, TUC). CHL(BIO,
MAG).
- Senecio filaginoides** DC. var. **lobulatus**
(Hook. & Arn.) Cabrera
Sin.: *Senecio albiflorus* Phil., hom. illeg.,
Senecio calceiflorus Cabrera, *Senecio*
psammophilus Griseb., *Senecio*
sericeus Kuntze var. *candolleanus*
Kuntze
Nativa. 1600-4300 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA,
LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU,
SCR, TUC).
- Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var.
fistulosus
Sin.: *Senecio amplus* J. Rémy, *Senecio*
cordillerae Phil., *Senecio dombeyanus*
DC., *Senecio hualtata* Bertero ex DC.,
Senecio hualtata Bertero ex DC. var.
variabilis (Phil.) Reiche, *Senecio*
quillotensis Phil., *Senecio variabilis*
Phil.
Hierba. Nativa. 1600-2400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LSR, LLA, AIS, RME).
- Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var.
ochroleucus (Hook. & Arn.) Cabrera
Sin.: *Senecio fistulosus* Poepp. ex DC.,
nom. superfl., *Senecio ochroleucus*

- Hook. & Arn., *Senecio xanthocephalus* Dusén
Hierba. Endémica. 1200-3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
CHL(COQ, VAL, BIO, LLA).
- Senecio flagellifolius** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1700-2700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Senecio fragantissimus** Tortosa & A. Bartoli
Arbusto. Endémica. 800
Países: ARG(SLU).
- Senecio friesii** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU).
- Senecio ganganensis** Cabrera
Arbusto. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SJU).
- Senecio garaventai** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1600-1900 m.
Países: CHL(COQ, VAL).
- Senecio gayanus** DC.
Sin.: *Senecio sotoanus* Phil., *Senecio sotoanus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1500-2300 m.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).
- Senecio gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Sin.: *Cacalia candicans* Poepp. ex DC., *Culcitium dentatum* Don ex Hook. & Arn., *Culcitium gilliesii* (Hook. & Arn.) Speg., *Culcitium poeppigii* DC., *Senecio gilliesii* Hook. & Arn. var. *dasycarpus* Cabrera, *Senecio passus-crucis* Kuntze, *Senecio poeppigii* (DC.) Wedd., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 700-3200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(LBO, MAU, BIO).
- Senecio glabratus** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio auriculatus* Poepp. ex DC., *Senecio berterianus* Colla, *Senecio macrotus* Kunze ex Walp., *Senecio valparadisiacus* Colla
Subarbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAG).
- Senecio glandulifer** Dematteis & Cristóbal
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR).
- Senecio glanduloso-hirtellus** Reiche
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Senecio glandulosus** Don ex Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 2200-2800 m.
Países: ARG(CAT, MEN).
- Senecio gnidioides** Phil. var. **gnidioides**
Sin.: *Senecio gilvus* Phil., *Senecio gnidioides* Phil. var. *gilvus* (Phil.) Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR).
CHL(LBO, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).
- Senecio goldsackii** Phil.
Sin.: *Senecio gilliesianus* Hieron. var. *arachnoidea* Hieron., *Senecio stipellatus* O. Hoffm.
Subarbusto. Endémica. 200-1300 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).
- Senecio grandis** Gardner
Hierba. Nativa. 1600
Países: BRA(PAR).
- Senecio grandjotii** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 3200-3800 m.
Países: ARG(MEN). CHL(RME).
- Senecio grindeliifolius** DC.
Subarbusto. Endémica. 2700-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(RME).
- Senecio grossidens** Dusén ex Malme
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(PAI, PHA).
- Senecio guatulamensis** M. Muñoz, Moreira & Trenquale
Subarbusto. Endémica. 700-800 m.
Países: CHL(COQ).
- Senecio guncckelii** Cabrera
Arbusto. Endémica. 1500
Países: CHL(LBO, MAU, RME).
- Senecio haenkei** DC.
Sin.: *Senecio chionotus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2800-3500 m.
Países: ARG(SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).
- Senecio hakeifolius** Bertero ex DC. var. **hakeifolius**
Sin.: *Senecio hakeifolius* Bertero ex DC. var. *ochroleucus* (Phil.) Reiche, *Senecio leptophyllus* Hook., hom. illeg., *Senecio ochroleucus* Phil., hom. illeg., *Senecio platycodon* Baker
Subarbusto. Endémica. 100-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).
- Senecio hakeifolius** Bertero ex DC. var. **vidalii** (Phil.) Reiche
Sin.: *Senecio vidalii* Phil.
Subarbusto. Endémica. 200
Países: CHL(ATA, COQ).
- Senecio haloragis** J. Remy var. **glandulosus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(MAU).

Senecio haloragis J. Remy var. **haloragis**

Sin.: *Senecio germainii* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Senecio hatcherianus O. Hoffm. ex Macloskie

Arbusto. Endémica. 1800-2100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Senecio helgae Cabrera

Hierba. Nativa. 4000-4600 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(ANT).

Senecio heterolobus (Wedd.) Kelloff & J. Calvo

Sin.: *Rockhausenia pinnatifida* (J. Rémy) D.J.N. Hind, *Werneria heteroloba* Wedd., *Werneria heteroloba* Wedd. f. *microcephala* Rockh., *Werneria heteroloba* Wedd. var. *obtusiloba* (S.F. Blake) Rockh., *Werneria obtusiloba* S.F. Blake, *Werneria pinnatifida* J. Remy

Hierba. Nativa. 3500-3900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Senecio heteroschizus Baker

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(PAY).

Senecio heterotrichus DC.

Sin.: *Senecio maldonadensis* Baker

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, RIV).

Senecio hickenii Hauman

Sin.: *Senecio clavatus* Hauman

Subarbusto. Endémica. 3500-4000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL).

Senecio hieracium J. Rémy

Sin.: *Senecio araucanus* Phil., *Senecio pearcei* Phil.

Hierba. Endémica. 1200-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Senecio hieronymi Griseb.

Sin.: *Senecio charaguensis* Cuatrec., *Senecio tafiensis* Cabrera

Subarbusto. Nativa. 200-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). PRY(APA, CAN, CEN, PAI).

Senecio hilairianus Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

Senecio hirsutulius Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Senecio hirtus Cabrera

Sin.: *Senecio crispus* Phil., hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 3500-4000 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Senecio hjertingii Cabrera

Arbusto. Endémica. 1600-2300 m.

Países: ARG(MEN).

Senecio hoehnei Cabrera

Subarbusto. Nativa. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Senecio hualtaranensis Petenatti, Ariza & Del Vitto

Subarbusto. Endémica. 700

Países: ARG(LRI, SLU).

Senecio huitrinicus Cabrera

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU).

Senecio humifusus (Hook. f.) Cabrera

Sin.: *Melalema humifusa* Hook. f., *Senecio darwinii* Hook. & Arn. var. *erradiatus* A. Gray

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Senecio humillimus Sch. Bip. ex Wedd.

Sin.: *Senecio humillimus* Sch. Bip. ex Wedd. var. *fruticulosus* Wedd., *Senecio pulviniformis* Hieron.

Hierba. Nativa. 3500-4800 m.

Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR).

Senecio icoglossoides Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(CAS, MON, SJO, SOR).

Senecio icoglossus DC. var. **icoglossus**

Hierba. Nativa. 700-2400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(SAO).

Senecio icoglossus DC. var. **splendens**

Cabrera

Hierba. Endémica. 500

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(COA, PAI).

Senecio illapelinus Phil.

Subarbusto. Endémica. 3100-3600 m.

Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL).

Senecio illinitus Phil.

Sin.: *Senecio cervicornis* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Senecio infimus Cabrera

Hierba. Endémica. 3100-3800 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Senecio invalidus C. Jeffrey

Sin.: *Senecio debilis* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 1100-1500 m.
Países: CHL(LBO).

Senecio irgangii Matzenb. & Mondin

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Senecio isernii Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Senecio jacobiformis J. Remy

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-2600 m.
Países: CHL(ANT, COQ).

Senecio jaffuelii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(RME).

Senecio jarae Phil.

Hierba. Nativa. 2400-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio jilesii Cabrera

Arbusto. Endémica. 2000
Países: CHL(COQ).

Senecio jobii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2100-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SCR).

Senecio johnstonianus Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2000-2700 m.
Países: CHL(ATA).

Senecio jorquerae Phil.

Subarbusto. Endémica. 3000-3500 m.
Países: CHL(ATA).

Senecio jujuyensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3700-4200 m.
Países: ARG(JUJ).

Senecio julianus Speg.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(RNE, SCR).

Senecio jungei Phil.

Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Senecio jürgensii Mattf.

Hierba. Nativa. 800-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senecio kakeifolius Bertero ex DC.

Sin.: *Senecio borchersii* Phil., *Senecio bustillosianus* J. Remy var. *borchersii* (Phil.) Cabrera, *Senecio tenuicaulis* Phil., nom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 1800-2200 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Senecio kingii Hook. f. var. *kingii*

Sin.: *Senecio gymnocaulos* Phil., *Senecio kingii* Hook. f. var. *paradoxus* (Albov ex Kurtz) Cabrera, *Senecio kurtzii* Albov, hom. illeg., *Senecio paradoxus* Albov ex Kurtz, *Senecio poculiferus* S. Moore
Hierba. Endémica. 100-3800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Senecio krapovickasii Cabrera

Hierba. Endémica. 4300-4700 m.
Países: ARG(LRI).

Senecio kunturinus Cabrera

Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Senecio laetevirens Phil.

Subarbusto. Endémica. 2000-3200 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, RME).

Senecio laevicaulis DC.

Sin.: *Senecio holophyllus* J. Remy
Subarbusto. Endémica. 2500-2700 m.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Senecio landbeckii Phil.

Subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Senecio langei Malme

Subarbusto. Nativa. 800
Países: BRA(PAR, SCA).

Senecio lanifer Mart. ex C. Jeffrey

Sin.: *Senecio vernonioides* Sch. Bip. ex Baker, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 300-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, PAI).

Senecio lanosissimus Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1800-4000 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Senecio laseguei Hombr. & Jacquinot

Sin.: *Senecio danyauii* Hombr. & Jacquinot var. *intermedius* Sch. Bip., *Senecio magellanensis* Macloskie, *Senecio magellanicus* Phil., hom. illeg., *Senecio philippii* De Wild.
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Senecio lastarrianus J. Remy

Sin.: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *angustifolius* DC., *Senecio nitidus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 900-2000 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Senecio leptocaulos Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-1600 m.

- Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).
- Senecio leptolobus** DC.
Sin.: *Senecio pinnatus* Poir. var. *leptolobus* (DC.) Baker, *Senecio uruguayensis* Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA, TAC, TYT).
- Senecio leptoschizus** Bong.
Sin.: *Senecio leptoschizus* Bong. var. *leptocladus* Baker
Hierba. Nativa. 1300
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Senecio leucomallus** A. Gray var. **leucomallus**
Sin.: *Senecio hyadesii* Franch., *Senecio leucomallus* A. Gray var. *incisus* A. Gray
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).
- Senecio leucopeplus** Cabrera
Sin.: *Senecio candolleanus* Hook. & Arn., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI).
- Senecio leucophyton** Phil.
Subarbusto. Endémica. 1500-1800 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU).
- Senecio leucostachys** Baker var. **leucostachys**
Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *pinnatifidus* Hook. & Arn., *Senecio sericeus* (Kuntze) Kuntze var. *pinnatifidus* (Hook. & Arn.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 700-1900 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).
- Senecio leucostachys** Baker var. **schreiteri** (Cabrera) Tortosa & A. Bartoli
Sin.: *Senecio schreiteri* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1700-2100 m.
Países: ARG(CAT, SAL, SJU, TUC).
- Senecio leucus** Phil.
Arbusto. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(SAL). CHL(ANT, ATA, COQ).
- Senecio lilloi** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(LRI).
- Senecio linarensensis** Soldano
Sin.: *Senecio subdentatus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 900-2000 m.
Países: CHL(MAU).
- Senecio linariifolius** Poepp. ex DC. var. **aclonetus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio aclonetus* Phil., *Senecio encelia* J. Remy, *Senecio microcephalus* Phil. var. *aclonetus* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-2200 m.
Países: CHL(MAU, BIO).
- Senecio linariifolius** Poepp. ex DC. var. **heliophytoides** (Phil.) Reiche
Sin.: *Senecio heliophytoides* Phil., *Senecio lacarensis* Phil., *Senecio simpsonii* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1200-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).
- Senecio linariifolius** Poepp. ex DC. var. **linariifolius**
Sin.: *Senecio promaucanus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1000-2900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS).
- Senecio linariifolius** Poepp. ex DC. var. **subtomentosus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(RNE).
- Senecio linearilobus** Bong.
Subarbusto. Nativa. 900
Países: BRA(PAR).
- Senecio lithostaurus** Cabrera
Sin.: *Senecio remyanus* Phil. f. *eradiatus* Kuntze
Subarbusto. Endémica. 2100-3600 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(RME).
- Senecio looseri** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).
- Senecio lorentziella** Hicken
Sin.: *Senecio depressus* Hauman, hom. illeg., *Senecio lorentzii* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 2900-3500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).
- Senecio lorentzii** Griseb.
Sin.: *Senecio lorentzii* Griseb. var. *latifolius* Cabrera, *Senecio lorentzii* Griseb. var. *radiatus* Cabrera
Hierba. Nativa. 2200-3400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Senecio maculatus** Cabrera
Hierba. Endémica. 4000-4300 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
- Senecio madagascariensis** Poir.
Sin.: *Senecio incognitus* Cabrera
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

- CHL(COQ). URY(CAS, MON, RNO, ROC, SAO).
- Senecio madariagae** Phil.
Arbusto. Endémica. 3400-3500 m.
Países: ARG(SAL). CHL(TAR, ANT).
- Senecio maeviae** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
- Senecio magellanicus** Hook. & Arn.
Sin.: *Culcitium dasyphyllum* Gand., *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot, *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot f. *angustifolia* Skotts., *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot f. *latifolia* Skotts., *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot f. *typica* Skotts., nom. inval., *Culcitium sessile* Speg., *Culcitium tenellum* Dusén, *Senecio culcitenellus* Cuatrec., *Senecio dasyphyllum* (Gand.) Cuatrec., *Senecio neosessilis* Cuatrec., *Senecio santacruzensis* Cabrera, nom. superfl., *Senecio tunicatus* Kuntze, *Senecio vaginifolius* Sch. Bip.
Hierba. Endémica. 200-1600 m.
Países: ARG(SJU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).
- Senecio manguensis** Cabrera & Zardini
Subarbusto. Endémica. 1700-1900 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
- Senecio mapuche** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1800-2200 m.
Países: CHL(VAL, RME).
- Senecio martinensis** Dusén
Hierba. Endémica. 600-1200 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).
- Senecio masafuerae** (Skotts.) Pelser
Sin.: *Robinsonia masafuerae* Skotts.
Arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Senecio masatierrae** Pelser
Sin.: *Robinsonia macrocephala* Decne.
Arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Senecio mattfeldianus** Cabrera
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON).
- Senecio maulinus** Reiche
Sin.: *Senecio leucomallus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 200-2800 m.
Países: CHL(MAU).
- Senecio megaoreinus** Zardini
Subarbusto. Endémica. 500
Países: ARG(RNE).
- Senecio melanopotamicus** Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE).
- Senecio mesembrynus** Cabrera
Sin.: *Senecio bakeri* Reiche, hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(AIS, MAG).
- Senecio microphyllus** Phil.
Sin.: *Senecio alfalfalis* Phil., *Senecio bowenkampii* Phil., *Senecio gypsophilus* Phil., *Senecio hakeifolius* Bertero ex DC. var. *adenophyllus* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 1500-2300 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Senecio micropifolius** DC.
Sin.: *Senecio pelolepis* Johnst.
- Subarbusto. Endémica. 1900-4300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Senecio microtis** Phil.
Arbusto. Endémica. 0-3200 m.
Países: CHL(ATA).
- Senecio minutifolius** Phil.
Arbusto. Endémica. 1600-3200 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).
- Senecio miser** Hook. f.
Sin.: *Senecio ericoides* Reiche, *Senecio fueginus* Phil., *Senecio miser* Hook. f. major Albov, *Senecio prichardii* S. Moore, *Senecio verruculosus* Kuntze, *Senecio verruculosus* Kuntze var. *dentatus* Kuntze, *Senecio verruculosus* Kuntze var. *subulatus* Kuntze
Subarbusto. Endémica. 100-1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).
- Senecio montevidensis** (Spreng.) Baker
Sin.: *Cineraria montevidensis* Spreng., *Senecio chilensis* Baker, hom. illeg., *Senecio cuspidatus* DC., *Senecio cuspidatus* DC. var. *montevidensis* (Spreng.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(CAS, MON).
- Senecio monttianus** J. Remy
Subarbusto. Endémica. 2400-3000 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, RME).
- Senecio munnozii** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(COQ).
- Senecio murinus** Phil.
Subarbusto. Endémica. 400-1400 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Senecio murorum J. Remy

Arbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Senecio myriophyllus Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Senecio neaei DC. var. **incisus** DC.

Sin.: *Senecio sericeus* Kuntze var. *incisus* (DC.) Kuntze
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR).
CHL(MAG).

Senecio neaei DC. var. **neaei**

Sin.: *Senecio sericeus* Kuntze var. *neaei* (DC.) Kuntze
Arbusto o subarbusto. Endémica. 300-1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
CHL(BIO, ARA, AIS).

Senecio nemiae A. Bartoli, Tortosa &

S.E. Freire
Arbusto. Endémica. 500
Países: ARG(RNE).

Senecio niederleinii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(LRI).

Senecio nigrescens Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio chamaedryfolius* Less.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Senecio nublensis Soldano

Sin.: *Senecio carnosus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Senecio nutans Sch. Bip.

Sin.: *Senecio graveolens* Wedd., *Senecio graveolens* Wedd. var. *psiloachaenius* Cabrera, *Senecio psychrophilus* Wedd.
Arbusto. Nativa. 3500-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio obesus Klatt

Subarbusto. Endémica. 600-1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Senecio obtectus Kuntze

Subarbusto. Endémica. 2200-2600 m.
Países: ARG(MEN).
CHL(LBO, RME).

Senecio octolepis Griseb. var. **octolepis**

Arbusto. Nativa. 2000-3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Senecio octolepis Griseb. var. **saltensis**

(Hicken) Cabrera
Sin.: *Senecio mendocinus* Phil. f. *saltensis* Hicken
Arbusto. Endémica. 2800-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

Senecio odonellii Cabrera

Hierba. Endémica. 3000-3200 m.
Países: ARG(MEN).

Senecio oleosus Vell.

Sin.: *Senecio hastatus* Bong.
Hierba. Nativa. 800-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senecio oligoleucus Baker

Subarbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: URY(MON).

Senecio oligophyllus Baker

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
PRY(AMA).

Senecio oreinus Cabrera

Sin.: *Senecio andicola* Phil., hom. illeg., *Senecio monticola* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 1700-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
CHL(ATA, COQ).

Senecio oreophyton J. Rémy

Sin.: *Senecio medicinalis* Phil., *Senecio uspallatensis* Hook. & Arn. var. *retroflexus* Hook. & Arn., *Senecio uspallatensis* Hook. & Arn. var. *tenuior* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 3100-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).
CHL(ANT, ATA, COQ).

Senecio ostenii Mattf. var. **balaenicus**

Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MAL).

Senecio ostenii Mattf. var. **ostenii**

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(BAI).
URY(MAL).

Senecio otaeguianus Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(VAL).

Senecio otites Kunze ex DC.

Sin.: *Senecio alsophilus* Phil., *Senecio chiloensis* Phil., *Senecio otophorus* Phil., nom. illeg.
Hierba. Endémica. 600-1100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Senecio otopterus Griseb.

Hierba. Nativa. 1700-3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Senecio oxyphyllus DC.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).
BRA(RGS).
URY(CLA, RIV).

Senecio pachyphyllos J. Remy

Sin.: *Senecio domeykoanus* Phil., *Senecio sedifolius* Phil.

Subarbusto. Endémica. 1200-3200 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Senecio pampeanus Cabrera

Sin.: *Senecio pampeanus* Cabrera f. *serratus* Cabrera

Hierba. Nativa. 200-2400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SLU, SFE, TUC).

Senecio pappii Ricardi & Martic.

Subarbusto. Endémica. 3200-3600 m.

Países: CHL(ANT).

Senecio paraguariensis Mattf.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(SCA). PRY(CEN, COA, PAI).

Senecio parodii Cabrera

Hierba. Endémica. 300-1200 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA).

Senecio patagonicus Hook. & Arn. var. **alyssoides** (Sch. Bip.) Cabrera

Sin.: *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinot ex Decne., *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinot var. *alyssoides* Sch. Bip., *Senecio exilis* Hombr. & Jacquinot, *Senecio floccidus* Hombr. & Jacquinot

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(AIS, MAG).

Senecio patagonicus Hook. & Arn. var. **andersonii** (Hook. f.) Cabrera

Sin.: *Senecio andersonii* Hook. f., *Senecio forsteri* Phil.

Subarbusto. Endémica. 100-900 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(AIS, MAG).

Senecio patagonicus Hook. & Arn. var. **lobatifolius** (Hombr. & Jacquinot) Cabrera

Sin.: *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinot var. *lobatifolia* Hombr. & Jacquinot, *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinot var. *pinnatifidus* Macloskie, *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinot var. *trifurcatus* Sch. Bip., *Senecio xanthoxylon* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Senecio patagonicus Hook. & Arn. var. **patagonicus**

Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *lobulatus* Hook. & Arn., *Senecio choiquelahuensis* Speg., *Senecio hookeri* Hombr. & Jacquinot, nom. illeg., *Senecio lechleri* Phil., *Senecio palenae* Phil.

Subarbusto. Endémica. 200-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Senecio paucidentatus DC. var. **limbardoides** (Hook. & Arn.) Cabrera

Sin.: *Senecio olivaceus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(VAL).

Senecio paucidentatus DC. var. **paucidentatus**

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Senecio paulensis Bong.

Hierba. Nativa. 800-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senecio pelquensis Dusén

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(SCR).

Senecio pemehuenensis Soldano

Sin.: *Senecio scoparius* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémica. 1400

Países: CHL(BIO, ARA).

Senecio pentaphyllus Phil.

Sin.: *Senecio laciniosus* Phil., *Senecio navarri* Phil., *Senecio pentaphyllus* Phil. var. *navarri* (Phil.) Reiche, *Senecio schoenleinii* F. Meigen

Subarbusto. Endémica. 2300-2500 m.

Países: CHL(LBO, RME).

Senecio perezii Cabrera f. **perezii**

Sin.: *Senecio perezii* Cabrera f. *integerrima* Cabrera

Arbusto. Endémica. 600-1200 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Senecio peteroanus Phil.

Subarbusto. Endémica. 1600-2100 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(MAU, ARA).

Senecio petrophyus Pelser

Sin.: *Robinsonia saxatilis* Danton

Arbolito. Endémica. 300

Países: CHL(JFE).

Senecio philippicus Regel & Körn.

Sin.: *Senecio paposanus* Phil.

Arbusto. Endémica. 200-900 m.

Países: CHL(ANT).

Senecio philippii Sch. Bip. ex Wedd.

Sin.: *Senecio ammophilus* Phil., *Senecio hirthii* Phil.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, TDF).
CHL(LLA, AIS, MAG).

Senecio phyllicifolius Poepp. ex DC.

Subarbusto. Endémica. 200-2000 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Senecio pichineuquensis Tortosa & A. Bartoli var. **albus** Tortosa & A. Bartoli
Arbusto. Endémica. 1000
Países: ARG(NEU).

Senecio pichineuquensis Tortosa & A. Bartoli var. **pichineuquensis**
Arbusto. Endémica. 1300-1600 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Senecio pilquensis H. Buek
Sin.: *Senecio heterophyllus* DC., hom. illeg., *Senecio phyllomorphus* Steud., *Senecio porophylloides* J. Remy
Subarbusto. Endémica. 900-1700 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LLA).

Senecio pinachensis Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1400
Países: ARG(NEU).

Senecio pinnatus Poir. var. **pinnatus**
Sin.: *Cineraria megapotamica* Spreng., *Senecio feuillei* Phil., nom. superfl., *Senecio gilliesianus* Hieron., *Senecio gilliesianus* Hieron. var. *glaberrima* Hieron., *Senecio gilliesii* Phil., hom. illeg., *Senecio pinnatus* Poir. var. *pectinatus* Baker, *Senecio pinnatus* Poir. var. *tenuisectus* Griseb.
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PHA). URY(CAS, COL, MON, RNO, TAC).

Senecio pinnatus Poir. var. **simplicifolius** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SLU, SFE).

Senecio pissisii Phil.
Subarbusto. Endémica. 3000-4100 m.
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL).

Senecio planiflorus Kunze ex Cabrera
Sin.: *Senecio littoralis* Poepp. ex DC., nom. inval., *Senecio sinuatilobus* DC. var. *littoralis* DC.
Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Senecio platensis Arechav.
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MON, ROC, SJO).

Senecio poeppigii Hook. & Arn. var. **discoideus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1800-2000 m.
Países: ARG(NEU).

Senecio poeppigii Hook. & Arn. var. **poeppigii**
Sin.: *Senecio dealbatus* Phil., *Senecio micropifolius* DC. var. β . *monocephalus* DC., *Senecio williamsii* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1300-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, MAG).

Senecio pogonias Cabrera
Sin.: *Senecio aquaniger* Cabrera & Zardini, *Senecio barbatus* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 2800-3800 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Senecio polygaloides Phil.
Sin.: *Senecio francisci* Phil., *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *discodeus* Kuntze, *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *tenuifolius* DC.
Subarbusto. Endémica. 2000-3100 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Senecio polyphyllus Kunze ex DC.
Sin.: *Senecio tristis* Phil. var. *comberi* Greenm.
Subarbusto. Endémica. 1700-2600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Senecio portalesianus J. Remy var. **lanuginosus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio antucensis* Phil. var. *lanuginosa* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1400-2500 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Senecio portalesianus J. Remy var. **portalesianus**
Sin.: *Senecio antucensis* Phil., *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *nanus* Hook. & Arn., *Senecio polyphyllus* Kunze ex DC. var. *antucensis* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémica. 1500-2800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Senecio portulacoides J. Remy
Sin.: *Senecio macer* Phil.
Arbusto. Endémica. 1200-2800 m.
Países: CHL(COQ).

Senecio potosianus Klatt
Sin.: *Senecio attenuatus* Sch. Bip. ex Rusby var. *microphyllus* Britton, *Senecio clavifolius* Rusby
Arbusto. Nativa. 3000-4400 m.
Países: ARG(JUJ).

Senecio prenanthifolius Phil.
Sin.: *Senecio helianthoides* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, ARA, LLA).

Senecio promatensis Matzenb.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

Senecio proteus J. Remy var. **geissei** (Phil.) CabreraSin.: *Senecio geissei* Phil.

Arbusto. Endémica. 1200-1800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Senecio proteus J. Remy var. **proteus**Sin.: *Senecio bracteolatus* Phil., *Senecio foliolosus* Reiche, *Senecio pinnatifidus* Phil., *Senecio stenophyllus* Phil.

Arbusto. Endémica. 800-3000 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Senecio pseudalmeidae Cabrera

Arbusto. Endémica. 300

Países: CHL(ANT).

Senecio pseudaspericaulis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2000-2200 m.

Países: ARG(NEU, TDF).

Senecio pseuderucoides Cabrera

Arbusto. Endémica. 1900

Países: CHL(RME).

Senecio pseudodepressus L. Salomón & S.E. Freire

Subarbusto. Endémica. 3600-3700 m.

Países: ARG(SJU).

Senecio pseudotites Griseb.Sin.: *Senecio pseudotites* Griseb. var. *glabra* Hicken

Hierba. Endémica. 2500-3600 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Senecio pterophorus DC.Sin.: *Senecio balansae* Baker, *Senecio grisebachii* Baker, *Senecio grisebachii* Baker var. *balansae* (Baker) Cabrera, *Senecio grisebachii* Baker var. *leptotus* Cabrera, *Senecio grisebachii*Baker var. *pseudovernonioides* Cabrera, *Senecio grisebachii* Baker var. *subincanus* Cabrera, *Senecio icoglossus* DC. var. *araneosus* Griseb., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(PAY, RNO, SAO, SJO).

Senecio pubescens Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1500-1600 m.

Países: CHL(COQ).

Senecio pucheii Phil.

Subarbusto. Nativa. 4000-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio pulcher Hook. & Arn. f. **albiflorus** Matzenb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Senecio pulcher Hook. & Arn. f. **pulcher** Sin.: *Senecio icoglossus* DC. var. *araneosus* DC.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC).

Senecio pulcarioides Baker var. **auriculatus** Baker

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

Senecio pulcarioides Baker var. **pulcarioides**

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Senecio pumilus Tortosa & A. BartoliSin.: *Senecio breviamulus* Tortosa & A. Bartoli

Arbusto. Endémica. 1900-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Senecio punae Cabrera

Arbusto. Endémica. 3000-4600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Senecio pycnanthus Phil.Sin.: *Senecio pycnanthus* Phil. var. *brevifolia* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(MAU).

Senecio pygmoxyllus (S.F. Blake) J. Calvo, A. Granda & V.A. FunkSin.: *Senecio laucanus* Ricardi & Martic., *Werneria pygmoxylla* S.F. Blake

Hierba. Endémica. 4200-4400 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Senecio ragonesei Cabrera

Hierba. Endémica. 1800-3300 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Senecio rahmeri Phil. var. **rahmeri**

Subarbusto. Endémica. 4100-4300 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL). CHL(ANT, ATA).

Senecio rahmeri Phil. var. **sericeus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 4300-4400 m.

Países: ARG(LRI).

Senecio ramboanus Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Senecio rauchii Matzenb.

Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(RGS).

Senecio reedii Phil.

Arbusto. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(MEN).

Senecio reicheanus Cabrera

Sin.: *Senecio phylloleptus* Cuatrec.
Subarbusto. Endémica. 2700-4200 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio reitzianus Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Senecio renjifoanus Phil.

Subarbusto. Endémica. 1700-3600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
CHL(RME).

Senecio repollensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1200-2200 m.
Países: ARG(NEU, SCR).

Senecio retanensis Cabrera

Sin.: *Senecio sectilis* Griseb. var. *radiatus* Griseb.
Subarbusto. Endémica. 2200-2800 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Senecio ricardii Martic. & Quezada

Arbusto. Endémica. 3100-3400 m.
Países: CHL(ATA).

Senecio riograndensis Matzenb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Senecio riojanus Cabrera var. **radiatus**

Cabrera
Subarbusto. Endémica. 300-1100 m.
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

Senecio riojanus Cabrera var. **riojanus**

Subarbusto. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, RNE, SJU).

Senecio rodolfoi X. Wu

Sin.: *Senecio luridus* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 2400
Países: CHL(ATA).

Senecio rudbeckiifolius Meyen & Walp.

Sin.: *Senecio flagellisectus* Griseb.
Arbusto. Nativa. 700-2300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Senecio rufescens DC.

Sin.: *Senecio adenophylloides* Sch. Bip.,
Senecio austrorufescens Cuatrec.
Arbusto. Nativa. 3500-3700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Senecio ruiz-lealii Cabrera

Hierba. Endémica. 2600-2700 m.
Países: ARG(MEN).

Senecio saltensis Hook. & Arn.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, SAL, SDE, SFE). URY(RNO).

Senecio sanagastae Cabrera

Subarbusto. Endémica. 600-2600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Senecio sandwithii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 600-1200 m.
Países: ARG(NEU).

Senecio santelicens Phil.

Sin.: *Senecio crispus* Phil. var. *santelicens* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 3500-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA).

Senecio santiagoensis Kuntze

Sin.: *Senecio leucanthemifolius* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 2300-2500 m.
Países: CHL(RME).

Senecio saxicola Wedd.

Subarbusto. Nativa. 200-300 m.
Países: CHL(AYP, ATA).

Senecio schoenemannii Phil.

Subarbusto. Endémica. 1300-1500 m.
Países: CHL(MAU).

Senecio schyzotus (Cabrera) Iamónico

Sin.: *Senecio grisebachii* Baker var. *schyzotus* Cabrera
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Senecio scopulorum Poepp.

Hierba o subarbusto. Endémica. 900-1500 m.
Países: CHL(BIO).

Senecio scorzonifolius Meyen & Walp.

Sin.: *Senecio armeriifolius* Phil.
Hierba. Nativa. 4400-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio sectilis Griseb.

Arbusto. Endémica. 1200-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Senecio segethii Phil.

Sin.: *Senecio peraltae* Phil.
Hierba. Endémica. 4100-4200 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

Senecio selloi (Spreng.) DC.

Sin.: *Cineraria selloi* Spreng., *Senecio doriciflorus* Hook. & Arn., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).
URY(CAS, COL, MON, ROC, SAO, SJO, SOR).

Senecio sericeonitens Speg.

Sin.: *Senecio argentatus* S. Moore, *Senecio morenonis* Kuntze, *Senecio patagonicus* Phil., hom. illeg.
 Arbusto. Endémica. 700-2000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

Senecio serratifolius (Meyen & Walp.) Cuatrec.

Sin.: *Culcitium serratifolium* Meyen & Walp., *Senecio cernuiflorus* Cabrera, *Senecio cernuus* Phil., hom. illeg.
 Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio sinuatilobus DC.

Sin.: *Senecio mollis* Poepp. ex DC.
 Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Senecio skottsbergii Cabrera var. **anomalus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
 Países: CHL(AIS).

Senecio skottsbergii Cabrera var. **skottsbergii**

Subarbusto. Endémica. 600-1800 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, SCR). CHL(AIS, MAG).

Senecio smithii DC.

Sin.: *Brachypappus smithii* (DC.) Sch. Bip., *Cineraria gigantea* Sm., *Senecio kurtzii* Phil., *Senecio punctarenicus* Krause, *Senecio verbascifolius* Hombr. & Jacquinot ex Decne
 Hierba. Endémica. 0-2100 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Senecio socompae Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3500-4000 m.

Países: ARG(SAL). CHL(ANT).

Senecio sorianoii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 500-600 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU).

Senecio spinosus DC.

Arbusto. Nativa. 3900-4600 m.
 Países: CHL(AYP).

Senecio steparius Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1400
 Países: ARG(NEU).

Senecio stigophlebius Baker

Sin.: *Senecio hemmendorffii* Malme, *Senecio stigophlebius* Cabrera, hom. illeg.
 Hierba. Nativa. 800-900 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Senecio subarnicoides Cabrera

Hierba. Endémica. 900-1800 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Senecio subauritus Phil.

Subarbusto. Endémica. 900-1500 m.
 Países: CHL(BIO, ARA).

Senecio subdiscoideus Sch. Bip. ex Wedd.

Sin.: *Metazanthus grandiflorus* Meyen, *Senecio breviculus* Phil., *Senecio caespitosus* Phil., *Senecio kingii* Hook. f. f. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Hosseus, *Senecio purpuratus* Phil., *Senecio purpuratus* Phil. var. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Reiche
 Subarbusto. Endémica. 1600-3800 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Senecio subpanduratus O. Hoffm.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHU, TDF).

Senecio subpubescens Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1000-2300 m.
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, MAG).

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. **erectus** Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio mendocinus* Phil., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *macranthus* Hook. & Arn.
 Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. **salsus** (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Senecio disparifolius* Cabrera, *Senecio diversifolius* Phil., hom. illeg., *Senecio innovans* Klatt, *Senecio salsus* Griseb., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *diversifolius* (Phil.) Cabrera
 Arbusto. Nativa. 2500-4000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. **subulatus**

Sin.: *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *a prostratus* D. Don, *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *elatior* Hook. & Arn.
 Arbusto. Nativa. 1000-1300 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).

Senecio subumbellatus Phil. var. **microcephalus** (Phil.) Tortosa & A. Bartoli

Sin.: *Senecio microcephalus* Phil. var. *angustifolius* Cabrera, *Senecio microcephalus* Phil. var. *microcephalus*

- Arbusto. Endémica. 300-800 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).
- Senecio subumbellatus** Phil. var. **subumbellatus**
Sin.: *Senecio antirrhinifolius* Phil., *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *subdiscoideus* DC., *Senecio multibracteatus* Phil., hom. illeg., *Senecio multicaulis* Poepp., hom. illeg., *Senecio mustersii* Speg. var. *dentatus* Cabrera, *Senecio mustersii* Speg. var. *mustersii*, *Senecio thermarum* Phil., nom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 1500-3600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
- Senecio sundtii** Phil.
Subarbusto. Nativa. 3600-4700 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU). CHL(ANT).
- Senecio sylvaticus** L.
Hierba. Introducida. 600-1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, AIS).
- Senecio tacorensis** Cabrera
Sin.: *Senecio olivaceobracteatus* Ricardi & Martic.
Subarbusto. Nativa. 3500-4700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Senecio tacuarembensis** Arechav.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(TAC).
- Senecio talquinus** Phil.
Subarbusto. Endémica. 2100
Países: CHL(MAU).
- Senecio tandilensis** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI).
- Senecio tehuelches** (Speg.) Cabrera
Sin.: *Senecio miser* Hook. f. var. *tehuelches* Speg.
Subarbusto. Endémica. 400-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).
- Senecio thurifer** (Decne.) Pelser
Sin.: *Robinsonia thurifera* Decne.
Arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Senecio tilcarensis** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 2800-3100 m.
Países: ARG(JUU).
- Senecio tinctolobus** I.M. Johnst.
Subarbusto. Endémica. 3000-4300 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Senecio tocomarensis** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 4300-4400 m.
Países: ARG(SAL, SJU).
- Senecio toconaoensis** J. Calvo & Moreira
Hierba. Endémica. 4800-5000 m.
Países: CHL(ANT).
- Senecio tocornalii** Phil.
Sin.: *Senecio ahrendsii* Phil., *Senecio delfinii* Phil., *Senecio fernandezii* Phil., *Senecio glaber* Less., hom. illeg., *Senecio glaber* Less. var. *pratensis* (Phil.) Cabrera, *Senecio molinae* Phil., *Senecio möelleri* Phil., *Senecio phyllocomus* Phil., *Senecio pratensis* Phil., hom. illeg., *Senecio pratensis* Phil. var. *delfinii* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémica. 1100-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).
- Senecio toroanus** Cabrera
Sin.: *Senecio saucensis* Cabrera
- Subarbusto. Endémica. 2000-2700 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
- Senecio trafulensis** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 800-1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
- Senecio tricephalus** Kuntze
Sin.: *Senecio tupungatoii* Hauman
Subarbusto. Endémica. 2500-3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SCR).
- Senecio trichocaulon** Baker
Sin.: *Senecio trichocodon* Baker var. *trichocaulon* (Baker) Cabrera
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).
- Senecio trichocodon** Baker
Sin.: *Senecio grüneri* Cabrera
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). PRY(APA, CAU).
- Senecio tricuspидatus** Hook. & Arn. var. **dentatus** (Sch. Bip.) Cabrera
Sin.: *Senecio ibari* Phil., *Senecio longipes* Hook. f., *Senecio longipes* Hook. f. var. *dentatus* Sch. Bip., *Senecio longipes* Hook. f. var. *integrifolius* Sch. Bip.
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).
- Senecio tricuspидatus** Hook. & Arn. var. **dumosus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio dumosus* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(SCR, TDF).
- Senecio tricuspидatus** Hook. & Arn. var. **tricuspидatus**
Sin.: *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm., *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm. var. *simplicior* O. Hoffm., *Senecio paeninsularis* S. Moore

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(AIS, MAG).

Senecio trifidus Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio demissus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2700-4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
CHL(RME).

Senecio trifurcatus (G. Forst.) Less.

Sin.: *Cineraria trifurcata* (G. Forst.) Spreng., *Senecio pentadactylus* Phil., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pentadactylus* (Phil.) Speg., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pisensis* Sch. Bip. ex Wedd., *Tussilago trifurcata* G. Forst.
Hierba. Endémica. 800-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Senecio trifurcifolius Hieron.

Subarbusto. Nativa. 4200-5100 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Senecio triodon Phil. var. **neuquensis** (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Senecio neuquensis* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1400-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ARA).

Senecio triodon Phil. var. **triodon**

Sin.: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *subradiatus* DC.
Subarbusto. Endémica. 1200-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Senecio tripinnatifidus Reiche

Subarbusto. Endémica. 1100-1300 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Senecio tristis Phil.

Sin.: *Senecio consanguineus* Phil., hom. illeg., *Senecio setulosus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 1200-2100 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Senecio troncosii Phil.

Sin.: *Senecio crepidioides* Phil., hom. illeg., *Senecio thinophilus* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Senecio tucumanensis Cabrera

Hierba. Endémica. 3700-3800 m.
Países: ARG(TUC).

Senecio tweediei Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio argentinensis* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE).
BRA(RGS). URY(CAS, MON, SJO).

Senecio uspallatensis Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio inca* Phil.
Arbusto. Endémica. 2200-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Senecio vaginatus Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio littoralis* Gaudich. var. *glabrata* Gaudich.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(TDF).

Senecio varvarcensis Cabrera var.

pinnatus Tortosa & A. Bartoli
Subarbusto. Endémica. 1300-1600 m.
Países: ARG(NEU).

Senecio varvarcensis Cabrera var.

varvarcensis
Subarbusto. Endémica. 2000
Países: ARG(NEU).

Senecio ventanensis Cabrera

Sin.: *Senecio pinnatus* Poir. var. *glandulosus* Ball, *Senecio pinnatus* Poir. var. *glandulosus* Macloskie, hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 800
Países: ARG(BAI).

Senecio vervoorstii Cabrera

Arbusto. Endémica. 2200
Países: ARG(CAT).

Senecio vira-vira Hieron.

Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *glabriusculus* Griseb., *Senecio argentinus* Baker, *Senecio pinnatus* Poir. var. *achalensis* Griseb., *Senecio sericeus* Kuntze var. *glabriusculus* (Griseb.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, LPA, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(ART, LAV, MAL, MON, SJO).

Senecio viridis Phil. var. **radiatus** R.E. Fr.

Arbusto. Endémica. 2500-3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT).

Senecio viridis Phil. var. **viridis**

Arbusto. Nativa. 3000-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU).
CHL(TAR, ANT).

Senecio viscosissimus Colla

Sin.: *Cineraria humilis* Poepp. ex DC.
Subarbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ANT, COQ, VAL).

Senecio volckmannii Phil. var.

pinohachense Tortosa & A. Bartoli
Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU).

Senecio volckmannii Phil. var. **volckmannii**

Sin.: *Senecio ascotanensis* Phil., *Senecio donae-annae* Phil., *Senecio rosmarinus* Phil., *Senecio rosmarinus* Phil. var. *ascotanensis* (Phil.) Cabrera, *Senecio spegazzinii* Cabrera, *Senecio volckmannii* Phil. var. *lejocarpus* Cabrera
Subarbusto. Nativa. 3300-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Senecio vulgaris L.

Hierba. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(ATA, VAL, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE). URY(MON).

Senecio websteri Hook. f.

Sin.: *Senecio websteri* Hook. f. var. *subdiscoideus* A. Gray
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Senecio werdermannii Greenm.

Sin.: *Senecio modestus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Senecio westermanii Dusén

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senecio xerophilus Phil. var. **deserticola** (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Senecio deserticola* Cabrera, *Senecio eremophilus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 4500
Países: CHL(ANT).

Senecio xerophilus Phil. var. **xerophilus**

Subarbusto. Endémica. 3700-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT).

Senecio yalae Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-3800 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Senecio zapahuirensis Martic. & Quezada

Arbusto. Endémica. 2100-3200 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Senecio zapalae Cabrera

Hierba. Endémica. 600-1200 m.
Países: ARG(NEU, SCR).

Sigesbeckia L.

Sigesbeckia jorullensis Kunth

Sin.: *Sigesbeckia cordifolia* Kunth, *Sigesbeckia mandonii* Sch. Bip., nom. nud., *Sigesbeckia serrata* DC.
Hierba. Nativa. 1300-2900 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Sigesbeckia orientalis L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Silybum Adans., nom. cons.

Silybum marianum (L.) Gaertn.

Sin.: *Carduus marianus* L.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(MAL).

Simsia Pers.

Simsia dombeyana DC.

Sin.: *Encelia hirsuta* Kuntze, *Encelia hirsuta* Kuntze f. *radiata* Kuntze, *Simsia hirsuta* (Kuntze) S.F. Blake
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY).

Smallanthus Mack.

Smallanthus araucariophilus C.A.

Mondin
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).

Smallanthus connatus (Spreng.) H. Rob.

Sin.: *Gymnolomia connatum* Spreng., *Polymnia andrei* Arechav., *Polymnia connata* (Spreng.) S.F. Blake, *Polymnia silphioides* DC., *Polymnia silphioides* DC. var. *perennis* Speg. ex Bettfr.
Hierba. Nativa. 200-1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APA, CAN, MIE, PAI). URY(COL, MAL, RNO, ROC, TAC, TYT).

Smallanthus macroscyphus (Baker) A.

Grau ex A.A. Sáenz
Sin.: *Polymnia macroscypha* Baker
Hierba. Nativa. 1200-2200 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA).

Smallanthus riograndensis C.A. Mondin

Hierba. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Smallanthus siegesbeckia (DC.) H. Rob.

Sin.: *Polymnia siegesbeckia* DC.

Hierba. Nativa. 600-1600 m.
Países: BRA(PAR). PRY(GUA).

Solidago L.

Solidago argentinensis López Laph. & Semple
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(VAL).

Solidago chilensis Meyen

Sin.: *Aster sagei* Phil., *Solidago coquimbana* Phil., *Solidago floribunda* Phil., *Solidago laxiflora* Phil., *Solidago linearifolia* DC., *Solidago linearifolia* DC. var. *brachypoda* Speg., *Solidago microglossa* DC. var. *linearifolia* (DC.) Baker, *Solidago parviflora* Phil., *Solidago recta* Phil., *Solidago valdiviana* Phil.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON, PAY, SOR).

Solidago microglossa DC.

Sin.: *Solidago chilensis* Meyen var. *megapotamica* (DC.) Cabrera, *Solidago microglossa* DC. var. *megapotamica* DC.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Solidago patagonica Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(AIS).

Solidago virgaurea L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(RNE).

Soliva Ruiz & Pav.

Soliva anthemifolia (Juss.) Sweet

Sin.: *Gymnostyles anthemifolia* Juss.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA, ITA). URY(ART, MON).

Soliva macrocephala Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLA, MON, SOR).

Soliva sessilis Ruiz & Pav.

Sin.: *Gymnostyles alata* Spreng., *Gymnostyles barclayana* (DC.) Steud., *Gymnostyles chilensis* Speg., hom. illeg., *Gymnostyles pterosperma* Juss., *Soliva alata* (Spreng.) DC., *Soliva barclayana* DC., *Soliva daucifolia* Nutt., *Soliva microloma* Phil., *Soliva neglecta* Cabrera, *Soliva pterosperma* (Juss.) Less., *Soliva sessilis* Ruiz & Pav. var. *barclayana* (DC.) Baker, *Soliva valdiviana* Phil.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APA, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, SPE). URY(COL, FLO, MON).

Soliva stolonifera (Brot.) Sweet

Sin.: *Gymnostyles lusitanica* Spreng., *Gymnostyles nasturtiifolia* Juss., *Gymnostyles stolonifera* (Brot.) Tutin, *Hippia stolonifera* Brot., *Soliva acaulis* Hook. & Arn., *Soliva anthemifolia* (Juss.) Sweet var. *acaulis* (Hook. & Arn.) Baker, *Soliva lusitanica* (Spreng.) Less., *Soliva nasturtiifolia* (Juss.) DC., *Soliva urbica* Phil.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI). CHL(MAU, RME). URY(FLA, MON).

Soliva triniifolia Griseb.

Hierba. Endémica.
Países: ARG(COR).

Sommerfeltia Less., nom. cons.

Sommerfeltia cabreræ Chebat.

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: URY(RIV, TAC).

Sommerfeltia spinulosa (Spreng.) Less.

Sin.: *Conyza spinulosa* Spreng.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC).

Sonchus L.

Sonchus arvensis L.

Hierba. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(MEN). CHL(MAG).

Sonchus asper (L.) Hill

Sin.: *Sonchus oleraceus* L. var. *asper* L.
Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU,

- SLU, SCR, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, IDE, JFE, IPA). PRY(GUA). URY(CLA, FLO, ROC, SOR).
- Sonchus berterianus** (Decne.) S.-C. Kim & Mejías
Sin.: *Dendroseris berteriana* (Decne.) Hook. & Arn., *Dendroseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *insignis* (Bertero) Johow, *Phoenicoseris berteriana* (Decne.) Skottsb., *Rea berteriana* Decne., *Rea pinnata* Bertero ex Decne. var. *insignis* Bertero
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Sonchus brassicifolius** S.-C. Kim & Mejías
Sin.: *Dendroseris litoralis* Skottsb.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Sonchus lobatiflorus** S.-C. Kim & Mejías
Sin.: *Dendroseris gigantea* Johow
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Sonchus marginatus** (Bertero ex Decne.) S.-C. Kim & Mejías
Sin.: *Dendroseris macrophylla* D. Don var. *marginata* (Bertero ex Decne.) Johow, *Dendroseris marginata* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn., *Rea marginata* Bertero ex Decne.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Sonchus micranthus** (Bertero ex Decne.) S.-C. Kim & Mejías
Sin.: *Dendroseris micrantha* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn., *Rea longifolia* Phil. ex Reiche, *Rea micrantha* Bertero ex Decne.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Sonchus neriifolius** (Hook. & Arn.) S.-C. Kim & Mejías
Sin.: *Dendroseris neriifolia* (Decne.) Hook. & Arn., *Rea neriifolia* Decne.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Sonchus oleraceus** L.
Sin.: *Sonchus gracilis* Phil., *Sonchus rivularis* Phil.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, MAG, RME, IDE, JFE). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CAN, CEN, GUA, ÑEE, SPE). URY(CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
- Sonchus phoeniciformis** S.-C. Kim & Mejías
Sin.: *Dendroseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn., *Phoenicoseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Skottsb., *Rea pinnata* Bertero ex Decne.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Sonchus pruinaus** (Johow) S.-C. Kim & Mejías
Sin.: *Dendroseris micrantha* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *pruinata* Johow, *Dendroseris pruinata* (Johow) Skottsb., *Rea pruinata* (Johow) Skottsb.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Sonchus regius** (Skottsb.) S.-C. Kim & Mejías
Sin.: *Dendroseris regia* Skottsb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Sonchus sinuatus** S.-C. Kim & Mejías
Sin.: *Dendroseris macrantha* (Bertero ex Decne.) Skottsb., *Rea macrantha* Bertero ex Decne.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Sonchus splendens** S.-C. Kim & Mejías
Sin.: *Dendroseris macrophylla* D. Don
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Sonchus tenerrimus** L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE).
- Sphagneticola** O. Hoffm.
- Sphagneticola brachycarpa** (Baker) Pruski
Sin.: *Aspilia callosa* Chodat, *Aspilia silphoides* (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f. ex Baker f. *parvifolia* Hassl. ex Chodat, nom. illeg., *Stemmodontia brachycarpa* (Baker) Morong, *Thelechitonia brachycarpa* (Baker) H. Rob. & Cuatrec., *Thelechitonia muricata* Cuatrec., *Wedelia brachycarpa* Baker, *Wedelia callosa* (Chodat) B.L. Turner, *Wedelia pilosa* Baker, *Wedelia pilosa* Baker var. *brachycarpa* (Baker) Hassl.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski

Sin.: *Complaya trilobata* (L.) Strother,
Silphium trilobatum L., *Thelechitonía*
trilobata (L.) H. Rob. & Cuatrec.,
Wedelia trilobata (L.) Hitchc.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Spilanthes Jacq.**Spilanthes leiocarpa** DC.

Sin.: *Ceratocephalus leiocarpus* (DC.)
 Kuntze, *Spilanthes urens* Jacq. var.
hispidula DC.
 Hierba. Nativa. 200-300 m.
 Países: CHL(AYP, TAR).

Spilanthes nervosa Chodat

Sin.: *Spilanthes barinensis* Aristeg.,
Spilanthes urens Jacq. f. *ciliatifolia*
 Hassl., *Spilanthes urens* Jacq. f. *lanea*
 A.H. Moore, *Spilanthes urens* Jacq.
 var. *nervosa* (Chodat) Hassl.
 Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Spilanthes paraguayensis R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes urens* Jacq. var. *typica*
 Hassl.
 Hierba. Endémica. 0-300 m.
 Países: PRY(APY, PHA).

Spilanthes urens Jacq.

Hierba hemiepipífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Spinoliva G. Sancho, Luebert & Katinas

Spinoliva ilicifolia (Hook. & Arn.) G.
 Sancho subsp. **baccharoides** (D. Don
 ex Hook. & Arn.) G. Sancho

Sin.: *Proustia baccharoides* D. Don ex
 Hook. & Arn., *Proustia ilicifolia* Hook. &
 Arn. f. *baccharoides* (D. Don ex Hook.
 & Arn.) Fabris
 Arbusto. Endémica.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
 RME).

Spinoliva ilicifolia (Hook. & Arn.) G. Sancho subsp. **ilicifolia**

Sin.: *Proustia ilicifolia* Hook. & Arn.,
Proustia olivillo Phil., *Proustia pungens*
 Poepp. ex Less. var. *ilicifolia* (Hook. &
 Arn.) DC., *Proustia reticulata* Phil.,
 hom. illeg.
 Arbusto. Endémica. 900-2000 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Stachycephalum Sch. Bip. ex Benth.

Stachycephalum argentinum Griseb.
 Hierba. Nativa. 1500-2500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Stenachaenium Benth.**Stenachaenium adenanthum** Krasch.

Sin.: *Dichropappus adenanthus* Sch. Bip.
 ex Krasch.
 Hierba. Nativa. 300-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stenachaenium campestre Baker

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, ERI, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).
 URY(CLA, COL, MON, SJO, SOR).

Stenachaenium megapotamicum
 (Spreng.) Baker f. **minor** Chodat
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(COA).

Stenachaenium megapotamicum (Spreng.) Baker var. **megapotamicum**

Sin.: *Conyza megapotamica* Spreng.,
Pluchea macrocephala DC.,
Stenachaenium macrocephalum (DC.)
 Griseb., *Stenachaenium*
macrocephalum Benth. ex Benth. &
 Hook. f., nom. inval.
 Hierba. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(AMA, GUA). URY(CAS,
 CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV,
 ROC, SJO, TAC).

Stenachaenium megapotamicum (Spreng.) Baker var. **pedunculata** Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(SPE).

Stenachaenium riedelii Baker

Hierba. Nativa. 0-700 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,
 SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA,
 GUA, MIE, PAI). URY(RIV, TAC).

Stenocephalum Sch. Bip.**Stenocephalum apiculatum** (Mart. ex DC.) Sch. Bip.

Sin.: *Vernonia apiculata* Mart. ex DC.
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Stenocephalum hexanthum Sch. Bip.

Sin.: *Cacalia hexantha* (Sch. Bip.) Kuntze,
Vernonia hexantha (Sch. Bip.) Baker
 var. *balansae* Chodat, *Vernonia*
hexantha (Sch. Bip.) Baker var.
eleagnoides Chodat, *Vernonia*
hexantha (Sch. Bip.) Baker var.
hexantha, *Vernonia hexantha* (Sch.
 Bip.) Baker var. *paraguariensis*
 Chodat, *Vernonia megapotamica*

Spreng. subsp. *eriocephala* Malme,
Vernonia megapotamica Spreng. var.
hexantha (Sch. Bip.) Cabrera
Subarbusto. Nativa. 200-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).
BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA,
CAU, CAA, COA, MIE, PAI, SPE).

Stenocephalum hystrix (Chodat) H. Rob.
Sin.: *Vernonia hystrix* Chodat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAA, CAN, COA,
MIE, PAI).

Stenocephalum megapotamicum
(Spreng.) Sch. Bip.
Sin.: *Stenocephalum melanotrichium*
(DC.) Sch. Bip., *Stenocephalum*
penicillatum Sch. Bip., *Vernonia*
megapotamica Spreng., *Vernonia*
megapotamica Spreng. var. *argentina*
Hieron., *Vernonia megapotamica*
Spreng. var. *melanotrichia* DC.,
Vernonia megapotamica Spreng. var.
penicillata (Sch. Bip.) Baker
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI).
URY(ART, CLA, LAV, MON, PAY,
RNO, RIV, SAO, TAC).

Stenocephalum niveum (Chodat)
Dematteis
Sin.: *Vernonia abbatobiana* Chodat,
Vernonia hexantha (Sch. Bip.) Baker
var. *nivea* (Chodat) Chodat, *Vernonia*
nivea Chodat
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-
1000 m.
Países: ARG(COS). PRY(COA, MIE,
PAI).

Stenocephalum tragiifolium (DC.) Sch.
Bip.
Sin.: *Vernonia tragiifolia* DC.

Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Stevia Cav.

Stevia alpina Griseb. var. **alpina**

Sin.: *Stevia centinelae* Cabrera, *Stevia*
crassicephala Cabrera, *Stevia*
grisebachiana Hieron., *Stevia*
schickendantzii Hieron.
Subarbusto. Nativa. 1700-2700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC).

Stevia alpina Griseb. var. **glutinosa** Ariza
& Cerana
Subarbusto. Endémica. 1700-3100 m.
Países: ARG(CAT).

Stevia alternifolia Hieron.

Sin.: *Stevia parvifolia* Hassl.
Hierba. Nativa. 100-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA).

Stevia amambayensis B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, COA, PAI).

Stevia ammotropha B.L. Rob.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CEN, MIE).

Stevia amplexicaulis Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Stevia apensis B.L. Rob.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, CAU, CON, PAI).

Stevia aristata D. Don ex Hook. & Arn.

Sin.: *Stevia aristata* D. Don ex Hook. &
Arn. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval.
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
MIS, SFE). PRY(APA, CAU, CEN,
CON, COA, GUA, PAI, SPE).
URY(PAY, SJO).

Stevia balansae Hieron.

Sin.: *Stevia hassleriana* Chodat
Subarbusto. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,
CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI,
SPE).

Stevia breviaristata Hook. & Arn.

Sin.: *Stevia boliviensis* Sch. Bip. ex
Rusby, *Stevia discolor* B.L. Rob.,
Stevia lorentzii Griseb., *Stevia*
pubigera Hieron., *Stevia pubigera*
Hieron. var. *subglabrata* Hieron.,
Stevia schultzii Hieron.
Hierba. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
SAL, SJU, TUC). PRY(APY).

Stevia burkartii B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(TAC).

Stevia camachensis Hieron.

Hierba. Nativa. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Stevia carapariensis Cabrera & Vittet

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Stevia catharinensis Cabrera

Hierba. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CON).

Stevia chamaedrys Griseb. var. **chamaedrys**

Sin.: *Stevia nevadensis* Hieron.
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC).

- Stevia chamaedrys** Griseb. var. **glandulifera** Ariza & Cerana
Hierba. Endémica. 2900-3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI).
CON, COA, PAI, PHA). URY(COL, RNO, TAC).
Países: BRA(RGS). URY(ART, DUR, RIV, ROC, TAC, TYT).
- Stevia cinerascens** Sch. Bip. ex Baker
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RNO, RIV, SOR).
- Stevia clausenii** Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Stevia collina** Gardner
Sin.: *Stevia commixta* B.L. Rob.
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).
- Stevia congesta** Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CAS, MAL).
- Stevia crenulata** Baker
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Stevia cruziana** Malme
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Stevia cuneata** Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, PHA).
- Stevia entleriensis** Hieron.
Sin.: *Dissothrix hassleriana* Chodat, *Stevia entleriensis* Hieron. var. *minor* Hieron., *Stevia hirsuta* Griseb., hom. illeg., *Stevia oxylaena* DC. var. *villosa* Hieron., hom. illeg., *Stevia oxylaena* Griseb., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(APY, AMA, CEN,
- Stevia estrellensis** B.L. Rob.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, SPE).
- Stevia fiebrigii** Hieron. var. **fiebrigii**
Hierba. Nativa. 2300-2600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Stevia fiebrigii** Hieron. var. **jujuiensis** Cabrera
Hierba. Endémica. 1300-1700 m.
Países: ARG(JUJ).
- Stevia fiebrigii** Hieron. var. **vattuonei** (Hicken) Cabrera
Sin.: *Stevia fiebrigii* Hieron. var. *gracillima* B.L. Rob., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. *vattuonei* Hicken
Hierba. Endémica. 1200-1500 m.
Países: ARG(CAT, SAL).
- Stevia gardneriana** Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Stevia gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Sin.: *Stevia arnottiana* Baker, nom. superfl., *Stevia lanceolata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Stevia tenuifolia* Phil.
Hierba. Endémica. 900-3100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU).
- Stevia gilliesii** Hook. & Arn. var. **glandulosa** Ariza & Cerana
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
- Stevia gratioloides** Hook. & Arn.
Sin.: *Stevia veronicae* DC. var. *gratioloides* (Hook. & Arn.) Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
- Stevia heptachaeta** DC.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Stevia involucrata** Sch. Bip. ex Baker
Hierba. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Stevia jujuyensis** Cabrera
Hierba. Endémica. 1000-1600 m.
Países: ARG(JUJ).
- Stevia leptophylla** Baker
Sin.: *Stevia guaranitica* Chodat
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA, PAI).
- Stevia lilloi** B.L. Rob.
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Stevia lundiana** DC.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Stevia maimarensis** (Hieron.) Cabrera
Sin.: *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. *maimarensis* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 2400-3300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
- Stevia mandonii** Sch. Bip. var. **mandonii**
Sin.: *Stevia mandonii* Sch. Bip. ex B.L. Rob., hom. illeg., *Stevia mandonii* Sch. Bip., nom. nud.
Hierba. Nativa. 3400-4500 m.
Países: ARG(JUJ).
- Stevia mandonii** Sch. Bip. var. **tarijensis** (Hieron.) Rodríguez-Craverro, Grossi, V.G. Salgado & D.G. Gut.

Sin.: *Stevia tarijensis* Hieron.
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUU).

Stevia menthifolia Sch. Bip.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Stevia mercedensis Hieron. var.
glanditecta B.L. Rob.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SLU).

Stevia mercedensis Hieron. var.
mercedensis
Sin.: *Stevia mercedensis* Hieron. var.
typica B.L. Rob., nom. inval.
Hierba. Nativa. 400-2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC).

Stevia mercedensis Hieron. var.
pereyrae B.L. Rob.
Sin.: *Stevia pereyrae* (B.L. Rob.) Cabrera
Hierba. Endémica. 3200-3700 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Stevia minor Griseb.
Hierba. Nativa. 1200-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

Stevia multiaristata Spreng.
Sin.: *Pectis violacea* Griseb., *Stevia hirsuta* Hook. & Arn., *Stevia laxa* Hook. & Arn., *Stevia laxa* Hook. & Arn. var. *curtula* Malme, *Stevia megapotamica* DC., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. *laxa* (Hook. & Arn.) Baker, *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. *multiaristata* (Spreng.) Baker, *Stevia violacea* (Griseb.) Hieron. ex Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(COL, FLA, LAV, MON, PAY, RIV, SJO, TYT).

Stevia myriadenia Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa. 1000-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stevia okadae Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-3400 m.
Países: ARG(SAL).

Stevia ophryodonta B.L. Rob.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(TYT).

Stevia ophryophylla B.L. Rob.
Hierba. Nativa. 700-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stevia philippiana Hieron.
Sin.: *Porophyllum tarapacanthum* Zoellner, *Stevia hyssopifolia* Phil., hom. illeg., *Stevia hyssopifolia* Phil. var. *panulensis* B.L. Rob. ex I.M. Johnst., *Stevia menthifolia* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Stevia pohliana Baker
Hierba. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Stevia potrerensis Hieron.
Hierba. Nativa. 800-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Stevia procumbens Hieron.
Hierba. Endémica. 900-5000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni
Sin.: *Eupatorium rebaudianum* Bertoni, *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Hemsl., comb. superfl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAA, CEN, CON, COA, ITA).

Stevia regnellii Sch. Bip.
Hierba. Nativa. 1000-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Stevia rojasii Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Stevia sabulonis B.L. Rob.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(MIE). URY(MAL).

Stevia sanguinea Hieron.
Sin.: *Stevia camporum* Griseb., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1500-2600 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. **patagonica** (Hieron.) Hieron.
Sin.: *Stevia multiaristata* Spreng. var. *patagonica* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 300-2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, NEU, RNE).

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. **satureiifolia**
Sin.: *Carelia satureiifolia* (Lam.) Juss. ex Cav., *Eupatorium satureiifolium* Lam., *Mikania satureiifolia* (Lam.) Willd., *Nothites satureiifolia* (Lam.) DC., *Stevia liniifolia* DC., *Stevia multiaristata* Griseb., hom. illeg., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch f. *angustifolia* Baker
Subarbusto. Nativa. 200-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. **ventanensis** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI).

Stevia schreiteri B.L. Rob.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL).

Stevia selloi (Spreng.) Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Kleinia selloi* Spreng., *Stevia selloi* (Spreng.) B.L. Rob. var. *ypacarayensis* B.L. Rob.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(MAL).

Stevia spathulata Cabrera
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(CAU).

Stevia tenuis Hook. & Arn.
Sin.: *Stevia veronicae* DC. var. *tenuis* (Hook. & Arn.) Baker
Hierba. Endémica. 900-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stevia vaga Griseb. var. **effusa** (Hieron.) Ariza & Cerana
Sin.: *Stevia effusa* Hieron., *Stevia effusa* Hieron. var. *saltensis* Hieron., *Stevia effusa* Hieron. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval., *Stevia vaga* Griseb. var. *saltensis* (Hieron.) Ariza & Cerana
Subarbusto. Endémica. 300-3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Stevia vaga Griseb. var. **vaga**
Sin.: *Stevia aachalensis* Hieron., *Stevia diversipapposa* Hieron., *Stevia diversipapposa* Hieron. f. *breviaristata* Hieron., *Stevia diversipapposa* Hieron. f. *exaristata* Hieron., *Stevia diversipapposa* Hieron. f. *longiaristata* Hieron., *Stevia procumbens* Hieron. var. *tucumanensis* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 700-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

Stevia veronicae DC.
Hierba. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stevia villaricensis (B.L. Rob.) Cabrera & Vittet
Sin.: *Stevia aristata* D. Don ex Hook. & Arn. var. *villaricensis* B.L. Rob.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(GUA).

Stevia yaconensis Hieron. var. **aristifera** B.L. Rob.
Hierba. Nativa. 2200-2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Stevia yaconensis Hieron. var. **saltensis** (Hieron.) B.L. Rob.
Sin.: *Stevia saltensis* Hieron.
Hierba. Nativa. 1200-2100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU).

Stevia yaconensis Hieron. var. **subeglandulosa** Hieron.
Hierba. Endémica. 1000-2200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Stevia yaconensis Hieron. var. **yaconensis**
Sin.: *Stevia yacoensis* Hieron. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval.
Hierba. Nativa. 1400-2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Stevia yalae Cabrera
Hierba. Nativa. 2300-2600 m.
Países: ARG(JUJ).

Steyermarkina R.M. King & H. Rob.

Steyermarkina dispalata (Gardner) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium dispalatum* Gardner
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Steyermarkina dusenii (Malme) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium dusenii* Malme
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Steyermarkina pyrifolia (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium pyrifolium* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Stiffitia J.C. Mikan

Stiffitia chrysantha J.C. Mikan
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Stomatanthos R.M. King & H. Rob.

Stomatanthos oblongifolius (Spreng.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Conyza oblongifolia* Spreng., *Eupatorium elongatum* Hook. & Arn., *Eupatorium oblongifolium* (Spreng.) Baker, *Eupatorium oblongifolium* (Spreng.) Baker f. *odoratissima* Hassl., *Eupatorium oblongifolium* (Spreng.) Baker var. *elongatum* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium oblongifolium*

(Spreng.) Baker var. *oxyodontum* B.L. Rob., *Eupatorium oblongifolium* (Spreng.) Baker var. *tucumanense* Baker
Subarbusto. Nativa. 100-300 m.
Países: ARG(ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, MIE). URY(MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC).

Stomatanthus subcapitatus (Malme) H. Rob.
Sin.: *Eupatorium subcapitatum* Malme
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Strophopappus DC.

Strophopappus regnellii (Baker) R. Esteves
Sin.: *Stilpnopappus regnellii* Baker
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Struchium P. Browne

Struchium sparganophorum (L.) Kuntze
Sin.: *Ethulia sparganophora* L., *Sparganophorus vaillantii* Crantz
Subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Symphypappus Turcz.

Symphypappus casaretti B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium casaretti* (B.L. Rob.) Steyerl.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphypappus compressus (Gardner) B.L. Rob.

Sin.: *Eupatorium compressum* Gardner
Árbol. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphypappus cuneatus (DC.) Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Eupatorium cuneatum* DC.
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphypappus itatiayensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium itatiayense* Hieron., *Symphypappus polystachyus* Baker var. *microcephalus* Baker
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphypappus lymansmithii B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium lymansmithii* (B.L. Rob.) Steyerl.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphypappus reitzii (Cabrera) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium benjamin-lincolnii* Steyerl. var. *vernicosum* (Baker) Steyerl., *Eupatorium reitzii* Cabrera, *Symphypappus reticulatus* Baker var. *vernicosus* Baker
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Symphotrichum Nees

Symphotrichum glabrifolium (DC.) G.L. Nesom
Sin.: *Aster glabrifolius* (DC.) Reiche, *Aster vahlhii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *australis* (Phil.) Reiche, *Erigeron australis* Phil., *Erigeron glabrifolius* DC., *Erigeron scorzonifolius* J. Remy

Hierba. Endémica. 1500-2400 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Symphotrichum laeve (L.) Á. Löve & D. Löve
Sin.: *Aster laevis* L.
Subarbusto. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphotrichum patagonicum (Cabrera) G.L. Nesom
Sin.: *Aster patagonicus* Cabrera
Hierba. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(MAG).

Symphotrichum peteroanum (Phil.) G.L. Nesom
Sin.: *Aster peteroanus* Phil., *Aster vahlhii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *latifolius* Cabrera
Hierba. Endémica. 1000-2200 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

Symphotrichum regnellii (Baker) G.L. Nesom
Sin.: *Aster regnellii* Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphotrichum subulatum (Michx.) G.L. Nesom
Sin.: *Aster asteroides* (Bertero ex Colla) Rusby, comb. illeg., *Aster cabreræ* Ariza, *Aster divaricatus* Baker, hom. illeg., *Aster divaricatus* Baker, hom. illeg. var. *graminifolius* (Spreng.) Baker, *Aster exilis* Elliott var. *australis* A. Gray, *Aster linifolius* Griseb., hom. illeg., *Aster moelleri* (Phil.) Reiche, *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron., *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron.

var. *graminifolius* (Spreng.) Hieron., *Aster subtropicus* Morong, *Baccharis asterooides* Bertero ex Colla, *Conyza berteriana* Phil., *Conyza graminifolia* Spreng., *Conyza squamata* Spreng., *Conyzanthus graminifolius* (Spreng.) Tamamsch., *Conyzanthus squamatus* (Spreng.) Tamamsch., *Erigeron depilis* Phil., *Erigeron semiamplexicaulis* Meyen, *Symphotrichum graminifolium* (Spreng.) G.L. Nesom, *Symphotrichum squamatum* (Spreng.) G.L. Nesom, *Symphotrichum subulatum* (Michx.) G.L. Nesom var. *squamatum* (Spreng.) S.D. Sundb., *Tripolium conspicuum* J. Remy, *Tripolium moelleri* Phil., *Tripolium oliganthum* Phil., *Tripolium subulatum* Nees & C. Mart. var. *brasilianum* DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(FLA, MON, TYT).

Symphotrichum vahllei (Gaudich.) G.L. Nesom

Sin.: *Aster vahllei* (Gaudich.) Hook. & Arn., *Aster vahllei* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *robusta* De Wild., *Aster vahllei* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *tenuifolius* (Phil.) Cabrera, *Aster zosterifolius* Reiche, *Astradelphus calbucanus* Phil., *Erigeron graminifolius* Phil., *Erigeron pugae* Phil., *Erigeron tripolioides* Phil., *Erigeron vahllei* Gaudich., *Erigeron vahllei* Gaudich. var. *robusta* Albov, *Symphotrichum vahllei* (Gaudich.) G.L. Nesom var. *tenuifolium* (Phil.) G.L.

Nesom, *Tripolium humile* Phil., *Tripolium tenuifolium* Phil.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Synedrella Gaertn.

Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.

Sin.: *Ucacou nodiflorum* (L.) Hitchc., *Verbesina nodiflora* L.

Hierba. Nativa. 300-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Synedrellopsis Hieron. & Kuntze

Synedrellopsis grisebachii Hieron. & Kuntze ex Kuntze

Sin.: *Synedrella nodiflora* Griseb. ex Kuntze, nom. nud.

Hierba. Nativa. 300-1800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA).

Tagetes L.

Tagetes argentina Cabrera

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(COR, MEN, SJU, SLU).

Tagetes biflora Cabrera

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU, SLU). CHL(ATA).

Tagetes campanulata Griseb.

Subarbusto. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Tagetes erecta L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COR)

Tagetes filifolia Lag.

Sin.: *Diglossus variabilis* Cass., *Tagetes anisata* Lillo, *Tagetes dichotoma* Turcz., *Tagetes foeniculacea* Poepp. ex DC., hom. illeg., *Tagetes multifida* DC., *Tagetes pseudomicrantha* Lillo, *Tagetes pusilla* Kunth, *Tagetes scabra* Brandege, *Tagetes silenoides* Meyen & Walp.

Hierba. Nativa. 1000-4400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Tagetes iltisiana H. Rob.

Hierba. Nativa. 2200-3000 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Tagetes imbricata Schiavinato & A. Bartoli

Hierba. Nativa. 2800-3500 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Tagetes laxa Cabrera

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Tagetes minuta L.

Sin.: *Tagetes bonariensis* Pers., *Tagetes glandulifera* Schrank, *Tagetes glandulosa* Link, *Tagetes porophyllum* Vell.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

PRY(APY, AMA, COA, PHA).
URY(COL, LAV, MON, TAC).

Tagetes mirandae Schiavinato & A. Bartoli
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1800-2000 m.
Países: ARG(LRI).

Tagetes multiflora Kunth
Sin.: *Tagetes andina* M. Ferraro, *Tagetes erythrocephala* Rusby, *Tagetes multiflora* Kunth var. *rupestris* Wedd.
Hierba. Nativa. 1000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Tagetes ostenii Hicken
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(RNO, SAO).

Tagetes pauciloba DC.
Sin.: *Tagetes mendocina* Phil., *Tagetes perezii* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

Tagetes praetermissa (Strother) H. Rob.
Sin.: *Vilobia praetermissa* Strother
Arbusto. Nativa. 3300-3600 m.
Países: ARG(JUU).

Tagetes riojana M. Ferraro
Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Tagetes rupestris Cabrera
Hierba. Endémica. 2100-2600 m.
Países: ARG(TUC).

Tagetes terniflora Kunth
Sin.: *Tagetes cabreræ* M. Ferraro, *Tagetes gigantea* Carrière, *Tagetes graveolens* L'Hér. ex DC.
Hierba. Nativa. 700-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Tanacetum L.

Tanacetum balsamita L.
Sin.: *Balsamita major* Desf., *Chrysanthemum balsamita* (L.) Baill., hom. illeg., *Chrysanthemum balsamita* L., *Chrysanthemum balsamitoides* Nábelek, *Leucanthemum balsamita* (L.) Over, *Matricaria balsamita* (L.) Desr., *Pyrethrum balsamita* (L.) Willd., *Pyrethrum balsamita* (L.) Willd. var. *tanacetoides* Boiss., *Pyrethrum balsamitoides* (Nábelek) Tzvelev, *Pyrethrum majus* (Desf.) Tzvelev, *Pyrethrum tanacetum* DC., nom. illeg., *Tanacetum balsamita* L. subsp. *balsamitoides* (Sch. Bip.) Grierson, *Tanacetum balsamitoides* Sch. Bip.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, LPA, MEN).

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
Sin.: *Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh., *Leucanthemum parthenium* (L.) Gren. & Godr., *Matricaria parthenium* L., *Pyrethrum parthenium* (L.) Sm.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME). URY(MON).

Tanacetum vulgare L.
Sin.: *Chrysanthemum vulgare* (L.) Bernh., nom. illeg., *Pyrethrum vulgare* (L.) Boiss.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON).

Taraxacum F.H. Wigg., nom. cons.

Taraxacum angustisquameum Dahlst. ex H. Lindb.
Hierba. Endémica. 800
Países: CHL(RME).

Taraxacum copidophyllum Dahlst.
Hierba. Endémica. 500
Países: CHL(RME).

Taraxacum dupidentifrons Dahlst.
Hierba. Introducida. 500-600 m.
Países: ARG(TDF).

Taraxacum fernandezianum Dahlst. ex Skottsbo.
Sin.: *Taraxacum cuzcense* A.J. Richards, *Taraxacum subspathulatum* A.J. Richards
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(ERI, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(RME, JFE).

Taraxacum gilliesii Hook. & Arn.
Sin.: *Taraxacum andinum* Dahlst., *Taraxacum dens-leonis* Desf. var. *laevigatum* (Willd.) Hook., *Taraxacum ibari* Phil., *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. var. *magellanicum* (Comm. ex Sch. Bip.) Reiche, *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip., *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip. var. *lobatum*

- Dahlst., *Taraxacum rhusiocarpum* Dahlst.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(AIS, MAG, RME).
- Taraxacum laevigatum** (Willd.) DC.
Sin.: *Leontodon erythrospermum* (Andrz.) Eichw., *Leontodon laevigatus* Willd., *Taraxacum erythrospermum* Andrz., *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. var. *erythrospermum* (Andrz.) J. Weiss, *Taraxacum officinale* F.H. Wigg. var. *erythrospermum* (Andrz.) Bab., *Taraxacum officinale* F.H. Wigg. var. *laevigatum* (Willd.) Bouvier
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).
- Taraxacum marklundii** Palmgr.
Hierba. Introducida. 500
Países: CHL(RME).
- Taraxacum officinale** F.H. Wigg.
Sin.: *Leontodon taraxacum* L., *Leontodon vulgaris* Lam., nom. illeg., *Taraxacum dens-leonis* Desf., *Taraxacum vulgare* (Lam.) Schrank., nom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, IPA). PRY(APA, CAA, GUA). URY(MON, ROC).
- Taraxacum patagonicum** Uhlemann
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(MAG).
- Taraxacum plumbeum** Dahlst.
Hierba. Introducida. 500
- Países: ARG(SCR). CHL(RME).
- Taraxacum stictophyllum** Dahlst.
Hierba. Introducida. 200-500 m.
Países: ARG(SCR).
- Taraxacum vastisectum** Markl. ex Puol.
Hierba. Introducida. 500
Países: CHL(RME).
- Tessaria** Ruiz & Pav.
- Tessaria absinthioides** (Hook. & Arn.) DC.
Sin.: *Baccharis absinthioides* Hook. & Arn., *Pluchea absinthioides* (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec.
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(COA). URY(MAL, MON, ROC).
- Tessaria ambigua** DC.
Sin.: *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. var. *ambigua* (DC.) R.E. Fr., *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. var. *ambigua* (DC.) S.E. Freire, *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. var. *obtusifolia* Hassl., *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. var. *polyandra* Cabrera
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, PHA).
- Tessaria dodonaeifolia** (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **dodonaeifolia**
Sin.: *Conyza straminea* Chodat, *Eupatorium dodonaeifolium* Hook. & Arn., *Pluchea dodonaeifolia* (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec., *Tessaria straminea* (Chodat) Hassl., *Tessaria viscosa* Lillo
Arbusto. Nativa. 600-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(CEN, PHA). URY(COL).
- Tessaria dodonaeifolia** (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **plucheoides** (Hassl.) S.E. Freire
Sin.: *Tessaria plucheoides* Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: PRY(CEN, ÑEE, PHA).
- Tessaria fastigiata** (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Pluchea fastigiata* Griseb.
Subarbusto. Nativa. 700-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC). PRY(APY).
- Tessaria integrifolia** Ruiz & Pav.
Sin.: *Gynheteria incana* Spreng., *Tessaria ambigua* DC. var. *uniflora* Cuatrec., *Tessaria dentata* Ruiz & Pav., *Tessaria legitima* DC.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, ÑEE, PHA). URY(COL).
- Thamnoseric** F. Phil.
- Thamnoseric lacerata** (Phil.) F. Phil. f. **lacerata**
Sin.: *Rea lacerata* Phil., *Sonchus laceratus* (Phil.) S.-C. Kim & Mejías
Hierba. Endémica.
Países: CHL(IDE).
- Thamnoseric lacerata** (Phil.) F. Phil. f. **obtusifolia** Skottsb.
Hierba. Endémica.

- Países: CHL(IDE).
- Thelesperma** Less.
- Thelesperma megapotamicum** (Spreng.) Kuntze
Sin.: *Bidens gracilis* Torr., *Bidens leyboldii* Phil., *Bidens megapotamica* Spreng., *Bidens paradoxa* Don ex Hook. & Arn., *Cosmidium gracile* (Torr.) Nutt., *Isostigma megapotamicum* (Spreng.) Sherff, *Thelesperma gracile* (Torr.) A. Gray, *Thelesperma megapotamicum* (Spreng.) Herter, comb. superfl., *Thelesperma scabiosoides* Less.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SFE, SDE). URY(PAY).
- Thymophylla** Lag.
- Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small
Sin.: *Dyssodia belenidium* (DC.) Macloskie, comb. superfl., *Dyssodia belenidium* (DC.) O. Hoffm., *Dyssodia berlandieri* (DC.) S.F. Blake, *Dyssodia cupulata* A. Nelson, *Dyssodia gracilis* (Rydb.) Cory, *Dyssodia pentachaeta* (DC.) B.L. Rob. var. *belenidium* (DC.) Strother, *Dyssodia thurberi* (A. Gray) B.L. Rob, comb. superfl., *Hymenatherum belenidium* DC., *Hymenatherum berlandieri* DC., *Hymenatherum candolleanum* Hook. & Arn., nom. illeg., *Hymenatherum pentachaetum* DC., *Hymenatherum thurberi* A. Gray, *Tagetes belenidium* (DC.) Kuntze, *Thymophylla belenidium* (DC.) Cabrera, *Thymophylla gracilis* Rydb., *Thymophylla pentachaeta* (DC.) Small var. *belenidium* (DC.) Strother, *Thymophylla thurberi* (A. Gray) Wooton & Standl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE).
- Tilesia** G. Mey.
- Tilesia baccata** (L.) Pruski
Sin.: *Chatiakella platyglossa* Cass., *Chatiakella stenoglossa* Cass., *Coreopsis baccata* L., *Pascalina baccata* (L.) Spreng., *Wulffia baccata* (L.) Kuntze, *Wulffia platyglossa* (Cass.) DC., *Wulffia stenoglossa* DC.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN).
- Tithonia** Desf. ex Juss.
- Tithonia diversifolia** (Hemsl.) A. Gray
Sin.: *Mirasolia diversifolia* Hemsl.
Arbusto a subarbusto. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Tithonia rotundifolia** (Mill.) S.F. Blake
Sin.: *Tagetes rotundifolia* Mill., *Tithonia uniflora* J.F. Gmel.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, SCA).
- Tithonia tubiformis** (Jacq.) Cass.
Sin.: *Helianthus tubiformis* Jacq.
Hierba. Introducida. 200-2000 m.
Países: ARG(CHA, COR, JUJ, SAL, SDE).
- Tolpis** Adans.
- Tolpis barbata** (L.) Gaertn.
Sin.: *Crepis barbata* L., *Tolpis umbellata* Bertol.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).
- Tragopogon** L.
- Tragopogon dubius** Scop.
Sin.: *Tragopogon major* Jacq.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR).
- Tragopogon porrifolius** L.
Hierba. Introducida. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, AIS, RME).
- Tragopogon pratensis** L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, TDF).
- Trichocline** Cass.
- Trichocline aurea** (D. Don) Reiche
Sin.: *Bichenia aurea* D. Don, *Chaetanthera berteriana* Less., *Trichocline pedicularifolia* Walp.
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Trichocline auriculata** (Wedd.) Hieron. var. **auriculata**
Sin.: *Bichenia auriculata* Wedd.
Hierba. Nativa. 3300-4600 m.
Países: ARG(JUU, LRI, SAL).
- Trichocline auriculata** (Wedd.) Hieron. var. **breviscapa** Zardini
Hierba. Endémica. 3300-4600 m.

- Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
- Trichocline boecheri** Cabrera
Hierba. Endémica. 1500-3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
- Trichocline catharinensis** Cabrera
Sin.: *Trichocline catharinensis* Cabrera
var. *discolor* Cabrera
Hierba. Endémica. 700-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(ROC).
- Trichocline caulescens** Phil.
Sin.: *Chaetanthera crispa* Phil., *Onoseris lanata* Phil., *Trichocline nivea* Phil.,
Trichocline stuebelii Hieron.
Hierba. Nativa. 1800-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Trichocline cineraria** (D. Don) Hook. & Arn.
Sin.: *Bichenia cineraria* D. Don, *Bichenia crenata* J. Rémy, *Chaetanthera crenata* J. Rémy, *Gerbera cineraria* (D. Don) Kuntze, *Leucheria contrayerba* Kurtz, *Trichocline contrayerba* (Kurtz) Hauman, *Trichocline crenata* (J. Remy) Reiche, hom. illeg., *Trichocline tontalensis* Hieron.
Hierba. Endémica. 1700-3400 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU).
CHL(COQ, VAL).
- Trichocline cisplatina** E. Pasini & M.R. Ritter
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(RGS). URY(ROC).
- Trichocline dealbata** (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f. ex Griseb.
Sin.: *Chaetanthera dealbata* Hook. & Arn., *Chaetanthera parviflora* Phil., *Gerbera pulvinata* Kuntze, *Trichocline cineraria* (D. Don) Hook. & Arn. var. *pulvinata* (Kuntze) Hauman
- Hierba. Endémica. 2000-3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, RME).
- Trichocline deserticola** Zardini
Sin.: *Onoseris spathulata* Phil., *Trichocline spathulata* (Phil.) Zardini, comb. illeg.
Hierba. Endémica. 3500-4000 m.
Países: CHL(TAR, ANT).
- Trichocline exscapa** Griseb.
Hierba. Endémica. 2200-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Trichocline heterophylla** (Spreng.) Less.
Sin.: *Chaptalia heterophylla* (Spreng.) D. Don, *Onoseris heterophylla* Spreng.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). URY(CAS, FLA, MAL, MON).
- Trichocline humilis** Less.
Sin.: *Trichocline heterophylla* (Spreng.) Less. var. *humilis* (Less.) Baker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). PRY(PAI). URY(ART, CAS, MAL, ROC, SAO, SOR, TAC).
- Trichocline incana** (Lam.) Cass.
Sin.: *Arnica incana* (Lam.) Pers., *Doronicum incanum* Lam., *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI, SAL). BRA(RGS).
URY(ART, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SJO).
- Trichocline linearifolia** Malme
Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Trichocline macrocephala** Less.
Sin.: *Trichocline foliosa* Hook. & Arn.
Hierba. Nativa. 600-1300 m.
- Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Trichocline macrorhiza** Cabrera
Hierba. Endémica. 2400-3700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Trichocline maxima** Less.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).
- Trichocline minuana** E. Pasini
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, SAO, TAC).
- Trichocline plicata** D. Don ex Hook. & Arn.
Sin.: *Brachyclados stuckertii* Speg., *Gerbera plicata* (D. Don ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Trichocline argentea* Griseb.
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
- Trichocline reptans** (Wedd.) Hieron.
Sin.: *Bichenia reptans* Wedd., *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze f. *aurantiaca* Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze f. *pallida* Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze var. *intermedia* Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze var. *reptans* (Wedd.) Kuntze, *Trichocline reptans* (Wedd.) B.L. Rob., comb. superfl.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY).
- Trichocline sinuata** (D. Don) Cabrera
Sin.: *Bichenia sinuata* D. Don
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU, SFE).

Trichocline speciosa Less.

Sin.: *Trichocline collina* Baker, *Trichocline paraguayensis* Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, COA, GUA, SPE).

Trichogonia (DC.) Gardner

Trichogonia chodatii (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium chodatii* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU).

Trichogonia hassleri Mattf.

Sin.: *Trichogonia menthifolia* Gardner f. *attenuata* Hassl., *Trichogonia menthifolia* Gardner f. *cordata* Hassl., *Trichogonia menthifolia* Gardner var. *martii* Hassl., *Trichogonia menthifolia* Gardner var. *tomentosula* Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CAU, CON, COA, GUA).

Trichogonia phlebodes (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium phlebodes* B.L. Rob.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Trichogonia rhodotricha Malme

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS).

Trichogonia salviifolia Gardner

Sin.: *Trichogonia fiebrigii* Mattf., *Trichogonia salviifolia* Gardner f. *linearifolia* Hassl., *Trichogonia salviifolia* Gardner f. *microphylla* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CHO, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Trichogoniopsis R.M. King & H. Rob.

Trichogoniopsis adenantha (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium adenanthum* DC.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Tridax L.

Tridax paraguayensis Kuntze

Sin.: *Calea paraguayensis* (Kuntze) Deble
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Tridax procumbens L.

Sin.: *Amellus pedunculatus* Ortega ex Willd., nom. inval., *Balbisia canescens* Pers., *Balbisia divaricata* Cass., *Balbisia elongata* Willd., *Balbisia pedunculata* Ortega ex Hoffmans., nom. illeg., *Tridax procumbens* L. var. *canescens* (Pers.) DC., *Tridax procumbens* L. var. *ovatifolia* B.L. Rob. & Greenm.
Hierba. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(COR, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, ÑEE, SPE).

Tripleurospermum Sch. Bip.

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.

Sin.: *Chamaemelum inodorum* (L.) Vis., *Chamomilla inodora* (L.) K. Koch, *Chrysanthemum inodorum* (L.) L., *Matricaria inodora* L., *Matricaria perforata* Mérat, *Pyrethrum inodorum* (L.) Moench, *Tripleurospermum maritimum* (L.) W.D.J. Koch subsp. *inodorum* (L.) Appleq.,

Tripleurospermum perforatum (Mérat) Laínz, *Tripleurospermum perforatum* (Mérat) Wagenitz, comb. superfl.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, ERI, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(MAG). URY(CAS, MON).

Triptilion Ruiz & Pav.

Triptilion achilleae DC.

Sin.: *Triptilion achillea* DC. var. *glabriceps* Speg., *Triptilion chilense* Bertero ex DC., nom. nud., *Triptilion dusenii* O. Hoffm., *Triptilion euphrasioides* DC., *Triptilion tenuifolium* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, BIO, ARA, LLA, RME).

Triptilion benaventei J. Remy

Hierba. Endémica. 1000-1300 m.
Países: CHL(ARA).

Triptilion berteroi Phil.

Hierba. Endémica. 1200-1600 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Triptilion capillatum (D. Don) Hook. & Arn.

Sin.: *Nassauvia capillata* D. Don, *Triptilion andinum* Phil., *Triptilion capillatum* (D. Don) Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Reiche, *Triptilion capillatum* (D. Don) Hook. & Arn. var. *laxum* (Phil.) Reiche, *Triptilion laxum* Phil.
Hierba. Endémica. 300-2200 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Triptilion cordifolium Lag. ex Lindl.

Sin.: *Triptilion maritimum* Poepp. ex DC., nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

***Triptilion gibbosum* J. Remy**

Sin.: *Triptilion compactum* Phil., *Triptilion pusillum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

***Triptilion spinosum* Ruiz & Pav.**

Sin.: *Triptilion bulbosum* J. Remy, *Triptilion diffusum* D. Don, *Triptilion digitatum* Phil., *Triptilion humile* Phil., *Triptilion integrifolium* Phil., *Triptilion laciniatum* Willd., *Triptilion millefolium* Phil., *Triptilion pectinatum* Phil., *Triptilion pectinatum* Phil. var. *millefolium* (Phil.) Reiche, *Triptilion ramulosum* Phil., *Triptilion remyanum* Phil., *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *eriochlaenum* DC., *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *integrifolium* (Phil.) Reiche, *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *remyanum* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Trixis* P. Browne**Trixis cacalioides* (Kunth) D. Don**

Sin.: *Perdicium cacalioides* Kunth, *Trixis frutescens* P. Browne var. *denticulata* Less., *Trixis hexantha* S. Moore, *Trixis neaeana* DC., *Trixis papillosa* Gillies ex D. Don, *Trixis paradoxa* Cass., *Trixis subparadoxa* B. Herrera

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA). PRY(APY).

***Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. subsp. *discolor* (D. Don) Katinas**

Sin.: *Trixis antimenorrhoea* (Schrunk) Kuntze f. *discolor* (D. Don) Kuntze,

Trixis antimenorrhoea (Schrunk) Kuntze f. *sublanata* Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrunk) Kuntze subsp. *discolor* (D. Don) Katinas, *Trixis antimenorrhoea* (Schrunk) Kuntze var. *discolor* (D. Don) Cabrera, *Trixis antimenorrhoea* (Schrunk) Kuntze var. *heterophylla* Kuntze, *Trixis discolor* D. Don, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. f. *petiolata* Chodat, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *glandulifera* Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, LRI, SJU, SLU, SFE, SDE). PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI).

Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. subsp. *divaricata

Sin.: *Castra regia* Vell., *Perdicium divaricatum* Kunth, *Perdicium flexuosum* Kunth, *Prionanthes antimenorrhoea* Schrank, *Trixis antimenorrhoea* (Schrunk) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrunk) Kuntze var. *auriculata* (Hook.) Cabrera, *Trixis antimenorrhoea* (Schrunk) Kuntze var. *cladoptera* (Baker) Cabrera, *Trixis antimenorrhoea* (Schrunk) Kuntze var. *divaricata* (Spreng.) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrunk) Kuntze var. *flexuosa* (Kunth) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrunk) Kuntze var. *petiolata* Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrunk) Mart. ex Baker, nom. inval., *Trixis auriculata* Hook., *Trixis calcarea* Gardner, *Trixis diffusa* Rusby, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. f. *subpetiolata* Chodat, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *auriculata* (Hook.) DC., *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *cladoptera* Baker, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *discolor* (D. Don) Griseb., *Trixis divaricata* (Kunth)

Spreng. var. *exauriculata* DC., *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *odoratissima* (Gardner) Baker, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *sprengeliana* (Gardner) Baker, *Trixis flexuosa* (Kunth) Spreng., *Trixis odoratissima* Gardner, *Trixis salicifolia* D. Don, *Trixis scandens* Poepp. ex Herrera, nom. nud., *Trixis sprengeliana* Gardner

Arbusto. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA). URY(RNO).

***Trixis glaziovii* Baker**

Sin.: *Trixis glaziovii* Baker var. *aurantiaca* Dusén

Hierba. Nativa. 600-3000 m.

Países: BRA(PAR).

***Trixis grisebachii* Kuntze**

Sin.: *Trixis frutescens* P. Browne var. *cacalioides* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

***Trixis hassleri* Chodat**

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: PRY(AMA, PAI).

***Trixis lessingii* DC.**

Sin.: *Trixis brasiliensis* Less., hom. illeg. var. *aquatica* Less., *Trixis brasiliensis* Less., nom. illeg., *Trixis grandis* S.F. Blake, *Trixis lessingii* DC. var. *aquatica* (Less.) DC., *Trixis lessingii* DC. var. *glabrata* Chodat, *Trixis lessingii* DC. var. *major* Chodat, *Trixis lundii* DC., *Trixis picroides* Gardner

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAU, CAN, COA, PAI).
URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

***Trixis nobilis* (Vell.) Katinas**

Sin.: *Castra nobilis* Vell., *Trixis glaberrima* Less., *Trixis glabrata* Baker, nom. illeg., *Trixis megapotamica* Hook. & Arn., *Trixis rosea* Baker, nom. nud., *Trixis stricta* Mart., nom. nud., *Trixis suaveolens* Baker, nom. nud., *Trixis verbasciformis* Less., *Trixis verbasciformis* Less. var. *glaberrima* (Less.) Malme, *Trixis verbasciformis* Less. var. *intermedia* Malme
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

***Trixis ophiorhiza* Gardner subsp. *glandulifera* (Hassl.) Katinas**

Sin.: *Trixis ophiorhiza* Gardner var. *glandulifera* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(AMA).

Trixis ophiorhiza* Gardner subsp. *ophiorhiza

Sin.: *Trixis cerroleonensis* Soria & Zardini, *Trixis chionopappa* Baker, nom. illeg., *Trixis hoffmanniana* Taub.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

***Trixis pallida* Less.**

Sin.: *Trixis lorentzii* Arechav., *Trixis pallida* Less. var. *australis* Griseb., *Trixis pallida* Less. var. *subsericea* Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA,

PAI, PHA, SPE). URY(ART, RNO, RIV, SAO, SOR).

***Trixis praestans* (Vell.) Cabrera**

Sin.: *Cacalia praestans* Baker, nom. illeg., *Castra praestans* Vell., *Trixis flexuosa* Less., *Trixis missionum* Cabrera, *Trixis mollissima* D. Don
Arbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, COA). URY(COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TYT).

***Trixis proustioides* Hieron.**

Sin.: *Trixis matisiana* Díaz & Vélez, *Trixis monteseoensis* Sagást. & M.O. Dillon, *Trixis ragonesei* Cabrera
Arbusto. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

***Trixis spicata* Gardner**

Sin.: *Trixis ravenii* Zardini & Soria
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: PRY(AMA).

***Trixis thyrsoides* Dusén ex Malme**

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Urmenetea* Phil.**

***Urmenetea atacamensis* Phil.**

Sin.: *Onoseris atacamensis* (Phil.) Hoffm.
Hierba. Endémica. 2400-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(ANT, ATA).

***Urolepis* (DC.) R.M. King & H. Rob.**

***Urolepis hecatantha* (DC.) R.M. King & H. Rob.**

Sin.: *Eupatorium hecatanthum* (DC.) Baker, *Eupatorium populifolium* Hook. & Arn., hom. illeg., *Hebeclinium hecatanthum* DC., *Hebeclinium urolepis* DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

***Urospermum* Scop.**

***Urospermum picroides* (L.) F.W. Schmidt**

Sin.: *Tragopogon picroides* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, SFE). CHL(COQ, VAL, RME). URY(MON).

***Verbesina* L., nom. cons.**

***Verbesina aurita* Phil.**

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC). CHL(ANT, ATA).

***Verbesina caleifolia* Cabrera**

Subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(AMA).

***Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray**

Sin.: *Verbesina australis* Baker, *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray subsp. *exauriculata* (B.L. Rob. & Greenm.) J.R. Coleman, *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray var. *exauriculata* B.L. Rob. ex

Greenm, *Verbesina encelioides* (Cav.) Echegaray, comb. superfl., *Verbesina exauriculata* (B.L. Rob. & Greenm.) Cockerell, *Verbesina microptera* (DC.) Herter, nom. illeg., *Verbesina scabra* Phil., hom. illeg., *Ximenesia encelioides* Cav., *Ximenesia encelioides* Cav. var. *exauriculata* (B.L. Rob. & Greenm.) F.C. Gates, *Ximenesia microptera* DC.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ANT, ATA). PRY(APY). URY(PAY, RNO, SJO, SOR).

Verbesina glabrata Hook. & Arn.
Arbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbesina guaranitica Chodat
Sin.: *Zexmenia guaranitica* (Chodat) S.F. Blake
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CAN, CON).

Verbesina liloi S.F. Blake
Sin.: *Chaenocephalus alatus* Lillo, *Verbesina saltensis* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1200-2900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Verbesina macrophylla (Cass.) S.F. Blake var. **macrophylla**
Sin.: *Ditrichum macrophyllum* Cass.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Verbesina macrophylla (Cass.) S.F. Blake var. **nelidae** (Cabrera) Olsen
Sin.: *Verbesina nelidae* Cabrera
Subarbusto. Nativa. 800-2400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Verbesina rugosa Chodat
Arbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(CAN).

Verbesina saubinetia Klatt
Hierba. Endémica. 500-700 m.
Países: CHL(COQ).

Verbesina sordescens DC. var. **glabrata** Chodat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Verbesina sordescens DC. var. **sordescens**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, MIE, PAI, PHA).

Verbesina subcordata DC.
Sin.: *Verbesina auriculata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Verbesina heterosperma* Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

Verbesina subdiscoidea Toledo
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(AMA).

Verbesina suncho (Griseb.) S.F. Blake
Sin.: *Chaenocephalus heterophyllus* Griseb., *Chaenocephalus macrophyllum* Griseb., *Chaenocephalus suncho* Griseb., *Verbesina allophylla* S.F. Blake, *Verbesina octantha* S.F. Blake
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Vernonanthura H. Rob.

Vernonanthura beyrichii (Less.) H. Rob.
Sin.: *Vernonia beyrichii* Less., *Vernonia denticulata* DC.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Vernonanthura brasiliana (L.) H. Rob.
Sin.: *Baccharis brasiliana* L., *Vernonia assans* Mart. ex DC., *Vernonia brasiliana* (L.) Druce, *Vernonia odoratissima* Kunth, *Vernonia salviifolia* Chodat, hom. illeg., *Vernonia scabra* Pers.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, SPE).

Vernonanthura canaminina (Gleason) H. Rob.
Sin.: *Vernonanthura amplexicaulis* H. Rob., *Vernonia amplexicaulis* R.E. Fr., *Vernonia canaminina* Gleason, *Vernonia prenanthoides* Gleason
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(AMA).

Vernonanthura catharinensis (Cabrera) H. Rob.
Sin.: *Vernonia catharinensis* Cabrera
Arbusto. Nativa. 300-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vernonanthura chamaedrys (Less.) H. Rob.
Sin.: *Cacalia chamaedrys* (Less.) Kuntze, *Vernonia chamaedrys* Less., *Vernonia illex* Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Vernonanthura chaquensis (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonia chaquensis* Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR).
PRY(APA, CAU, CAA, GUA).

Vernonanthura cichoriiflora (Chodat) H. Rob.

Sin.: *Vernonia cichoriiflora* Chodat

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN, SPE).

Vernonanthura crassa (Vell.) H. Rob.

Sin.: *Chrysocoma crassa* Vell., *Vernonia crassa* (Vell.) Ekman ex Malme

Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Vernonanthura cuneifolia (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Vernonia cuneifolia* Gardner,
Vernonia itapensis Chodat

Arbusto. Nativa. 300-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Vernonanthura cupularis (Chodat) H. Rob.

Sin.: *Vernonia cupularis* Chodat var. *cupularis*, *Vernonia cupularis* Chodat var. *oligocephala* Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAN, CON, COA, PAI).

Vernonanthura densiflora (Gardner) A.J. Vega & Dematteis

Sin.: *Vernonia densiflora* Gardner

Árbol. Nativa. 300-1100 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, ITA).

Vernonanthura diffusa (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia diffusa* Less.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob.

Sin.: *Eupatorium discolor* Spreng.,
Vernonia discolor (Spreng.) Less.

Árbol. Nativa. 100-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vernonanthura divaricata (Spreng.) H. Rob.

Sin.: *Conyza divaricata* Spreng.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vernonanthura ferruginea (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia ferruginea* (Less.) Kuntze,
Vernonia crenata Gardner, *Vernonia ferruginea* Less., *Vernonia polycephala* DC.

Arbusto. Nativa. 600-800 m.

Países: BRA(RGS). PRY(AMA).

Vernonanthura hilairiana (Gardner) A.J. Vega & Dematteis

Sin.: *Vernonia hilairiana* Gardner

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Vernonanthura laxa (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Vernonia laxa* Gardner

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Vernonanthura lindbergii (Baker) H. Rob.

Sin.: *Vernonia lindbergii*, *Vernonia subpaludosa* Malme

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Vernonanthura lipeoensis (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonanthura nebularum* (Cabrera) H. Rob., *Vernonia lipeoensis* Cabrera,
Vernonia nebularum Cabrera

Arbusto o arbolito. Endémica. 1400-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Vernonanthura loretensis (Hieron.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia loretensis* Hieron.

Subarbusto. Endémica. 100-300 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Vernonanthura lucida (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia lucida* (Less.) Kuntze,
Vernonia lucida Less., *Vernonia nitidula* Less. var. *lucida* (Less.) Arechav.

Subarbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, ITA, PHA, SPE).

Notas: Citada para Uruguay (Matzenbacher & Mafioleti, 1994) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Vernonanthura montevidensis (Spreng.) H. Rob.

Sin.: *Baccharis montevidensis* Spreng.,
Cacalia montevidensis (Spreng.) Kuntze, *Piptocarpha nitidula* (Less.) Griseb., *Vernonia arechavaletae* André, *Vernonia florida* Gardner, *Vernonia gochnatioides* Hook. & Arn. ex DC., *Vernonia nitidula* Less., *Vernonia nitidula* Less. var. *acutifolia* Griseb., *Vernonia nitidula* Less. var. *florida* (Gardner) Baker, *Vernonia nitidula* Less. var. *intermedia* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE,

SPE). URY(ART, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC).

Vernonanthura mucronulata (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia collina* Gardner, *Vernonia mucronulata* Less.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Vernonanthura nana A.J. Vega & Dematteis

Subarbusto. Endémica. 800-1800 m.

Países: BRA(PAR).

Vernonanthura nudiflora (Less.) H. Rob.
f. *albiflora* (Matzenb.) Deble

Sin.: *Vernonia nudiflora* Less. f. *albiflora* Matzenb.

Subarbusto. Endémica. 300-400 m.

Países: BRA(RGS).

Vernonanthura nudiflora (Less.) H. Rob.
f. *nudiflora*

Sin.: *Cacalia nudiflora* (Less.) Kuntze, *Vernonia angustifolia* D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud., *Vernonia nudiflora* Less. f. *nudiflora*

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, COL, FLA, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Vernonanthura oligactoides (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia oligactoides* (Less.) Kuntze, *Vernonia conyzoides* Chodat, *Vernonia oligactoides* Less., *Vernonia sorocabae* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, SPE).

Vernonanthura oligolepis (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.

Sin.: *Cacalia oligolepis* (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze, *Vernonia imbricata* Chodat, *Vernonia oligolepis* Sch. Bip. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Vernonanthura perangusta (Malme) A.J. Vega & Dematteis

Sin.: *Vernonia perangusta* Malme

Subarbusto. Endémica. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Vernonanthura petiolaris (DC.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia diffusa* Less. var. *macrocephala* Hieron., *Vernonia petiolaris* DC., *Vernonia petiolaris* DC. var. *pauciflora* DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Vernonanthura pinguis (Griseb.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia pinguis* Griseb.

Arbusto o arbolito. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(AMA).

Vernonanthura polyanthes (Spreng.) A.J. Vega & Dematteis

Sin.: *Cacalia polyanthes* (Spreng.) Kuntze, *Chrysocoma arborea* Vell., *Eupatorium polyanthes* Spreng., *Vernonia polyanthes* (Spreng.) Less.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Vernonanthura pseudolinearifolia (Hieron.) A.J. Vega & Dematteis

Sin.: *Vernonia pseudolinearifolia* Hieron.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(CLA, PAY, RIV, TAC, TYT).

Vernonanthura puberula (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia estrellensis* Gardner, *Vernonia puberula* Less. var. *puberula*, *Vernonia puberula* Less. var. *serrulata* Hieron., *Vernonia serrulata* Sch. Bip.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Vernonanthura rigiophylla Kuntze

Sin.: *Cacalia rigiophylla* (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze, *Vernonia elsieae* Stutts, *Vernonia rigiophylla* Sch. Bip. ex Baker, hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Vernonanthura schulziana (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonia schulziana* Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA). BRA(RGS).

Vernonanthura squamulosa (Hook. & Arn.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia praecox* Kuntze, *Cacalia squamulosa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Vernonia praecox* (Kuntze) K. Schum., *Vernonia squamulosa* Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). PRY(COA).

Vernonanthura subverticillata (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.

Sin.: *Vernonia subverticillata* Sch. Bip. ex Baker

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Vernonanthura tweedieana (Baker) H. Rob.

Sin.: *Vernonia tweedieana* Baker

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,

APY, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Vernonanthura viscidula (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia viscidula* Less.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Vernonanthura westiniana (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia hebeclada* DC., *Vernonia westiniana* Less.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vernonia Schreb., nom. cons.

Vernonia echioides Less.

Sin.: *Eupatorium arechavaletae* Baker, *Vernonia lingua* Chodat, *Vernonia oreophila* Speg., hom. illeg., *Vernonia spegazzini* Hicken, *Vernonia verbenacea* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CEN, CON, GUA, ITA, PHA, SPE). URY(DUR, FLO, MON, SJO, TAC).

Vernonia incana Less.

Sin.: *Cacalia incana* (Less.) Kuntze, *Vernonia inmundis* Griseb.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CEN, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, RNO).

Vickia Roque & G. Sancho

Vickia rotundifolia (Less.) Roque & G. Sancho

Sin.: *Gochnatia rotundifolia* Less.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Viguiera Kunth

Viguiera simulans S.F. Blake

Subarbusto. Endémica. 200-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Villanova Lag., nom. cons.

Villanova oppositifolia Lag.

Sin.: *Unxia anemonifolia* Kunth, *Vasquezia anemonifolia* (Kunth) S.F. Blake, *Vasquezia bitemata* Phil., *Vasquezia oppositifolia* (Lag.) S.F. Blake, *Villanova anemonifolia* (Kunth) Less.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: CHL(ANT).

Villanova robusta Phil.

Hierba. Endémica. 3200-3800 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Vittetia R.M. King & H. Rob.

Vittetia orbiculata (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium orbiculatum* DC.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Volutaria Cass.

Volutaria tubuliflora (Murb.) Sennen

Hierba. Introducida.

Países: CHL(ATA, COQ).

Wedelia Jacq., nom. cons.

Wedelia brachylepis Griseb.

Sin.: *Zexmenia brachylepis* (Griseb.) Cabrera

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CON).

Wedelia buphtalmiflora Lorentz

Sin.: *Zexmenia buphtalmiflora* (Lorentz) Ariza

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Wedelia holwayi S.F. Blake

Subarbusto. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Wedelia kerrii N.E. Br.

Sin.: *Wedelia kerrii* N.E. Br. var. *decumbens* Hassl., *Wedelia longepetiolata* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, ITA).

Wedelia monantha (Vell.) Remor, Bringel & J.F.B. Pastore

Sin.: *Aster monanthus* Vell., *Wedelia subvelutina* DC., *Wedelia subvelutina* DC. var. *linearifolia* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAN).

Wedelia saltensis Cabrera

Arbusto o subarbusto. Nativa. 600-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Wedelia trichostephia DC.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Werneria Kunth

Werneria apiculata Sch. Bip.

Sin.: *Rockhausenia apiculata* (Sch. Bip.) D.J.N. Hind, *Werneria pygmaea* Gillies ex Hook. & Arn. var. *apiculata* (Sch. Bip.) Wedd.
Hierba. Nativa. 2900-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Werneria aretioides Wedd.

Sin.: *Rockhausenia aretioides* (Wedd.) D.J.N. Hind, *Werneria minima* Walp. var. *pygmaea* Walp.
Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Werneria cochlearis Griseb.

Sin.: *Rockhausenia cochlearis* (Griseb.) D.J.N. Hind, *Werneria brachypappa* Phil., hom. illeg., *Werneria denticulata* S.F. Blake
Hierba. Endémica. 3900-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(ANT).

Werneria digitata Wedd.

Sin.: *Xenophyllum digitatum* (Wedd.) V.A. Funk
Subarbusto. Nativa. 3700-5000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Werneria glaberrima Phil.

Sin.: *Rockhausenia glaberrima* (Phil.) D.J.N. Hind
Hierba. Endémica. 3500-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Werneria incisa Phil.

Sin.: *Xenophyllum incisum* (Phil.) V.A. Funk

Subarbusto. Nativa. 4300-4400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
CHL(ANT).

Werneria juniperina Hieron.

Sin.: *Werneria lycopodioides* S.F. Blake, *Xenophyllum juniperinum* (Hieron.) J. Calvo, *Xenophyllum lycopodioides* (S.F. Blake) V.A. Funk
Subarbusto. Nativa. 4100-5000 m.
Países: CHL(AYP).

Werneria lorochaqui (J. Calvo & V.A. Funk) D.J.N. Hind

Sin.: *Xenophyllum lorochaqui* J. Calvo & V.A. Funk
Hierba. Endémica. 3500-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Werneria nubigera Kunth

Sin.: *Rockhausenia nubigena* (Kunth) D.J.N. Hind
Hierba. Nativa. 4000-4200 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Werneria orbignyana Wedd.

Sin.: *Rockhausenia orbignyana* (Wedd.) D.J.N. Hind, *Werneria pygmaea* Gillies & Hook. var. *rhodopappa* Phil.
Hierba. Nativa. 3500-5000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Werneria poposa Phil.

Sin.: *Werneria decumbens* Hieron., *Werneria incisa* Phil. var. *pubescens* Rockh., *Werneria lorentziana* Hieron., *Xenophyllum incisum* (Phil.) V.A. Funk var. *pubescens* (Rockh.) Cabrera & S.E. Freire, *Xenophyllum poposum* (Phil.) V.A. Funk
Subarbusto. Nativa. 3500-5300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Werneria praetermissa J. Calvo

Hierba. Nativa. 3500-4600 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Werneria pseudodigitata Rockh.

Sin.: *Xenophyllum pseudodigitatum* (Rockh.) V.A. Funk
Subarbusto. Endémica. 4000-5000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Werneria pumila Kunth

Sin.: *Rockhausenia pumila* (Kunth) D.J.N. Hind, *Werneria calyculata* Turcz., *Werneria densa* Benth.
Hierba. Nativa. 3600-4500 m.
Países: ARG(SAL).

Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. var. **pygmaea**

Sin.: *Rockhausenia pygmaea* (Gillies ex Hook. & Arn.) D.J.N. Hind, *Werneria brachypappa* Sch. Bip., *Werneria minima* Walp., *Werneria pygmaea* Gillies ex Hook. & Arn. var. *praemorsa* Wedd., *Werneria rhizoma* J. Remy
Hierba. Nativa. 2200-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, AIS, RME).

Werneria rosenii R.E. Fr.

Sin.: *Xenophyllum rosenii* (R.E. Fr.) V.A. Funk
Subarbusto. Nativa. 4800-5000 m.
Países: ARG(JUU).

Werneria solivifolia Sch. Bip.

Sin.: *Rockhausenia solivifolia* (Sch. Bip.) D.J.N. Hind
Hierba. Nativa. 4000-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Werneria spathulata Wedd.

Sin.: *Rockhausenia spathulata* (Wedd.) D.J.N. Hind
Hierba. Nativa. 4000-4600 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Werneria villosa A. Gray

Sin.: *Rockhausenia villosa* (A. Gray)
D.J.N. Hind, *Werneria caulescens*
(Wedd.) Griseb., *Werneria nubigena*
Kunth var. *caulescens* Wedd.
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Werneria weddellii Phil.

Sin.: *Xenophyllum weddellii* (Phil.) V.A.
Funk
Subarbusto. Nativa. 4000-5000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Xanthium L.

Xanthium ambrosioides Hook. & Arn.

Sin.: *Xanthium spinosum* L. var.
ambrosioides (Hook & Arn.) Löve &
Dans.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI,
LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).

Xanthium argenteum Widder

Hierba. Endémica. 400-1500 m.
Países: CHL(MAU, RME).

Xanthium spinosum L. f. *inerme* (Bel) O.
Bolòs & Vigo

Sin.: *Xanthium spinosum* L. var. *inerme*
Bel, *Xanthium spinosum* L. var.
pseudinerme Widder ex Parodi
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(DFE).

Xanthium spinosum L. var. *spinosum*

Sin.: *Acanthoxanthium spinosum* (L.) E.
Fourn.
Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,

MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE,
SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ,
VAL, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).
PRY(APY, CAU, CEN, COA, ÑEE,
PAI, PHA). URY(CAS, FLA, MAL,
MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Xanthium strumarium L.

Sin.: *Xanthium australe* Millsp. & Sherff,
Xanthium cavanillesii Schouw,
Xanthium cavanillesii Schouw var.
cordobense Widder ex Parodi,
Xanthium echinatum Murray var.
cavanillesii (Schouw) O. Bolòs & Vigo,
Xanthium saccharatum Wallr.,
Xanthium strumarium L. subsp.
cavanillesii (Schouw) D. Löve & Dans.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS,
NEU, RNE, SAL, SJU, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA,
COQ, MAU, BIO, RME). PRY(CEN,
GUA, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA,
MON, PAY, RNO, SJO).

Xenophyllum V.A. Funk

Xenophyllum esquilachense (Cuatrec.)
V.A.Funk

Sin.: *Senecio pfisteri* Ricardi & Martic.,
Werneria esquilachensis Cuatrec.
Hierba. Nativa. 4000-4900 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Xerochrysum Tzvelev

Xerochrysum bracteatum (Vent.)
Tzvelev

Sin.: *Xeranthemum bracteatum* Vent.
Subarbusto. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Youngia Cass.

Youngia japonica (L.) DC.

Sin.: *Prenanthes japonica* L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(COR, ERI, MIS, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Yunquea Skottsb.

Yunquea tenzii Skottsb.

Arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Zinnia L., nom. cons.

Zinnia peruviana (L.) L.

Sin.: *Chrysogonum peruvianum* L.,
Crassina leptopoda (DC.) Kuntze,
Crassina peruviana (L.) Kuntze,
Crassina tenuiflora (Jacq.) Kuntze,
Crassina verticillata (Andrews) Kuntze,
Lepia multiflora (L.) Hill, *Lepia*
pauciflora (L.) Hill, comb. superfl.,
Zinnia hybrida Roem. & Usteri, *Zinnia*
intermedia Engelm., *Zinnia leptopoda*
DC., *Zinnia mendocina* Phil., *Zinnia*
multiflora L., *Zinnia pauciflora* L., nom.
superfl., *Zinnia pauciflora* L. var. *flava*
(Kuntze) Seckt, *Zinnia revoluta* Cav.,
Zinnia tenuiflora Jacq., *Zinnia*
verticillata Andrews
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI,
FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL,
SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS).
PRY(APY, CEN).

ATHEROSPERMATACEAE

Laureliopsis Schodde

Laureliopsis philippiana (Looser)
Schodde
Sin.: *Laurelia philippiana* Looser, *Laurelia serrata* Phil., hom. illeg.
Árbol. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

BALANOPHORACEAE

Helosis Rich.

Helosis brasiliensis Schott & Endl.
Hierba parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng.
Sin.: *Cynomorium cayennense* Sw.
Hierba parásita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Langsdorffia Mart.

Langsdorffia heterotepala L.J.T.
Cardoso, R.J.V. Alves & J.M.A. Braga
Hierba parásita. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Langsdorffia hypogaea Mart.
Hierba parásita. Nativa. 700-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).

Lophophytum Schott & Endl.

Lophophytum mirabile Schott & Endl.
subsp. **bolivianum** (Wedd.) B.Hansen
Sin.: *Lophophytum bolivianum* Wedd.
Hierba parásita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(AMA, PAI, SPE).

Lophophytum mirabile Schott & Endl.
subsp. **mirabile**
Hierba parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lophophytum pyramidale (Leandro)
L.J.T. Cardoso & J.M.A. Braga
Sin.: *Archimedeia pyramidalis* Leandro,
Lophophytum leandri Eichler, nom. illeg.
Hierba parásita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

Ombrophytum Poepp. ex Endl.

Ombrophytum chilensis Kuijt & P.G.
Delprete
Hierba parásita. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Ombrophytum subterraneum (Aspl.) B.
Hansen
Sin.: *Juelia lilloana* Sleumer, *Juelia meyeri* Sleumer, *Juelia subterranea* Aspl.
Hierba parásita. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Scybalium Schott & Endl.

Scybalium fungiforme Schott & Endl.
Hierba parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

BALSAMINACEAE

Impatiens L.

Impatiens balsamina L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Impatiens glandulifera Royle
Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA).

Impatiens walleriana Hook. f.
Sin.: *Impatiens sultani* Hook. f.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

BASELLACEAE

Anredera Juss.

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis
Sin.: *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis
subsp. *gracilis* (Miers) Xifreda & Argimón, *Boussingaultia cordifolia* Ten., *Boussingaultia gracilis* Miers, *Boussingaultia gracilis* Miers f. *pseudobaselloides* Hauman, *Boussingaultia gracilis* Miers var. *pseudobaselloides* (Hauman) L.H. Bailey
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, IPA). PRY(APY, CEN, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(COL, MON).

Anredera diffusa (Moq.) Sperling
Sin.: *Tandonia diffusa* Moq.
Hierba. Nativa. 2900-3000 m.
Países: CHL(AYP).

Anredera krapovickasii (Villa) Sperling
Sin.: *Boussingaultia krapovickasii* Villa
Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Anredera tucumanensis (Lillo & Hauman) Sperling
Sin.: *Boussingaultia tucumanensis* Lillo & Hauman, *Boussingaultia tucumanensis* Lillo & Hauman var. *brasiliensis* Hauman
Enredadera. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Ullucus Caldas

Ullucus tuberosus Caldas subsp. **aborigineus** (Brücher) Sperling
Sin.: *Ullucus aborigineus* Brücher, *Ullucus tuberosus* Caldas f. *rubriflorus* Kuntze
Enredadera. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUU).

BEGONIACEAE

Begonia L.

Begonia angularis Raddi
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Begonia angulata Vell.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia balansae C. DC.
Sin.: *Begonia balansae* C. DC. var. *glabrior* C. DC.
Hierba. Nativa. 100-900 m.
Países: ARG(MIS). PRY(CAN, COA, PAI).

Begonia barkleyana L.B. Sm.
Sin.: *Begonia dusenii* Brade, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia biguassuensis Brade
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia boliviensis A. DC.
Sin.: *Begonia argentinensis* Speg., *Begonia boliviensis* A. DC. var. *latipetala* Irmsch., *Begonia boliviensis* A. DC. var. *volcanensis* L.B. Sm. & B.G. Schub.
Hierba. Nativa. 700-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Begonia calvescens (Brade ex L.B. Sm. & R.C. Sm.) E.L. Jacques & Mamede
Sin.: *Begonia schenckii* Irmsch. var. *calvescens* Brade ex L.B. Sm. & R.C. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Begonia campos-portoana Brade
Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia capanemae Brade
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia catharinensis Brade
Hierba. Endémica. 400-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Begonia ciliatifolia Funez & J.C. Jaramillo
Hierba. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia cinnabarina Hook.
Sin.: *Begonia micranthera* Griseb. var. *fimbriata* L.B. Sm. & B.G. Schub.

Hierba. Nativa. 1300-2500 m.
Países: ARG(SAL).

Begonia coccinea Hook.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Begonia convolvulacea (Klotzsch) A. DC.
Sin.: *Begonia geniculata* Vell., hom. illeg., *Wageneria convolvulacea* Klotzsch
Hierba. Nativa. 300-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia cucullata Willd.
Sin.: *Begonia agrial* Rojas Acosta, *Begonia cucullata* Willd. var. *arenosicola* (C. DC.) L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia cucullata* Willd. var. *hookeri* (A. DC.) L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia cucullata* Willd. var. *spatulata* (Lodd.) Golding, *Begonia hookeri* Sweet, *Begonia paludicola* C. DC., *Begonia sellowii* Klotzsch, *Begonia semperflorens* Hook., nom. illeg., *Begonia semperflorens* Link & Otto, *Begonia semperflorens* Link & Otto var. *hookeri* A. DC., *Begonia semperflorens* Link & Otto var. *sellowii* A. DC., *Begonia spatulata* Lodd., *Begonia subcucullata* C. DC., *Begonia subcucullata* C. DC. var. *arenosicola* C. DC.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, COA, ITA, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Begonia descoleana L.B. Sm. & B.G. Schub.
Hierba. Endémica. 200-1000 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Begonia echinosepala Regel

Sin.: *Begonia echinosepala* Regel var. *elongatifolia* Irmsch., *Begonia insularis* Brade, *Begonia itajaiensis* Brade
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia fiebrigii C. DC.

Hierba. Endémica. 100-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(APA).

Begonia fischeri Schrank

Sin.: *Begonia brasiliensis* Klotzsch, *Begonia fischeri* Schrank var. *brasiliensis* (Klotzsch) Irmsch., *Begonia fischeri* Schrank var. *elata* (Klotzsch) Irmsch., *Begonia fischeri* Schrank var. *malvacea* (Klotzsch) Irmsch., *Begonia fischeri* Schrank var. *tovarensis* (Klotzsch) Irmsch., *Begonia hassleri* C. DC., *Begonia intercedens* Irmsch., *Begonia malvacea* Klotzsch, *Begonia setosa* Klotzsch, *Begonia towarensis* Klotzsch
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Begonia fruticosa A. DC.

Hierba. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Begonia fuscocaulis Brade

Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Begonia garuvae L.B. Sm. & R.C. Sm.

Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia hammoniae Irmsch.

Sin.: *Begonia reitzii* Brade
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia hilariana A. DC.

Sin.: *Begonia raulinii* Brade
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia hirtella Link

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Begonia hispida Schott

Sin.: *Begonia hammoniae* Irmsch., *Begonia reitzii* Brade
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia huegelii Bosse

Sin.: *Begonia huegelii* A. DC., hom. illeg., *Wageneria huegelii* (Bosse) Klotzsch
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Begonia incisoserrata (Klotzsch) A. DC.

Sin.: *Scheidweilera incisoserrata* Klotzsch
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Begonia inermis Irmsch.

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Begonia isopterocarpa Irmsch.

Sin.: *Begonia bauensis* Brade
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Begonia itatinensis Irmsch. ex Brade

Hierba o subarbusto. Nativa. 700-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Begonia itupavensis Brade

Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Begonia konder-reisiana L.B. Sm. & R.C. Sm.

Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia lineolata Brade

Hierba. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia lucidissima Golding & Kareg.

Sin.: *Begonia lucida* D. Parodi, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CEN).

Begonia marinae Tebbitt

Hierba. Nativa. 2200-3600 m.
Países: ARG(SAL).

Begonia medeirosii Funez & J.C. Jaramillo

Hierba. Endémica. 500-700 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia micranthera Griseb.

Sin.: *Begonia hieronymi* Lindau, *Begonia hieronymi* Lindau var. *rhacophylla* Irmsch., *Begonia micranthera* Griseb. var. *foliosa* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia micranthera* Griseb. var. *hieronymi* (Lindau) L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia micranthera* Griseb. var. *nana* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia micranthera* Griseb. var. *rhacophylla* (Irmsch.) L.B. Sm. & Wassh., *Begonia micranthera* Griseb. var. *typica* L.B. Sm. & B.G. Schub., nom. inval., *Begonia micranthera* Griseb. var. *venturii* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia rubricaulis* Hook. var. *volcanensis* L.B. Sm. & B.G. Schub.
Hierba. Nativa. 700-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Begonia obovatistipula C. DC.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Begonia paleata Schott ex A. DC.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia paranaensis Brade

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia parvistipulata Irmsch.

Hierba. Endémica. 200-1800 m.

Países: BRA(SCA).

Begonia per-dusenii Brade

Sin.: *Begonia chapecoensis* Brade,
Begonia schubertiana Irmsch.

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Begonia pilgeriana Irmsch.

Hierba. Endémica. 400-800 m.

Países: BRA(SCA).

Begonia pluvialis L.B. Sm. ex S.F. Sm. & Wassh.

Subarbusto. Endémica. 200-800 m.

Países: BRA(PAR).

Begonia polyandra Irmsch.

Sin.: *Begonia blumenaviensis* Irmsch.,
Begonia blumenaviensis Irmsch.
subsp. *brachyphylla* Irmsch.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia pulchella Raddi

Sin.: *Begonia similis* Brade

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Begonia radicans Vell.

Sin.: *Begonia fritz-muelleri* Brade, *Begonia limmingheiana* É. Morren, *Begonia procumbens* Vell.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Begonia rubricaulis Hook.

Sin.: *Huszia rubricaulis* (Hook.) Klotzsch

Hierba. Nativa. 1500-3600 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Begonia rufosericea J.M. Toledo & Barboza

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(SCA).

Begonia rupium Irmsch.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Begonia scharffii Hook. f.

Sin.: *Begonia schenckii* Irmsch.

Hierba. Endémica. 300-700 m.

Países: BRA(SCA).

Begonia serranegrae L.B. Sm. ex S.F. Sm. & Wassh.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

Begonia sleumeri L.B. Sm. & B.G. Schub.

Hierba. Endémica. 3000-3400 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Begonia solitudinis Brade

Hierba. Endémica. 1000-1700 m.

Países: BRA(SCA).

Begonia squamipes Irmsch.

Hierba. Endémica. 800-1400 m.

Países: BRA(SCA).

Begonia stenolepis L.B. Sm. & R.C. Sm.

Hierba. Endémica. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia subvillosa Klotzsch

Sin.: *Begonia heineri* Brade, *Begonia leptotricha* C. DC., *Begonia schmidtiana* Regel, *Begonia serafinensis* Brade, *Begonia serafinensis* Brade var. *cerqueirae* Brade, *Begonia subvillosa* Klotzsch var. *leptotricha* (C. DC.) L.B. Sm. & Wassh.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN). URY(RIV).

Begonia tafiensis Lillo

Hierba. Endémica. 2700-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Begonia trevisoensis J.C. Jaramillo

Subarbusto. Endémica. 500-600 m.

Países: BRA(SCA).

Begonia valdensium A. DC.

Sin.: *Begonia rutilans* A. DC.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Begonia veitchii Hook. f.

Sin.: *Begonia coriacea* A. DC., hom. illeg.,
Begonia tominana Golding

Hierba. Nativa. 1400-4100 m.

Países: ARG(SAL).

Begonia vicina Irmsch.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Begonia wollnyi Herzog

Sin.: *Begonia parodiana* L.B. Sm. & B.G. Schub.

Hierba. Nativa. 700-1300 m.

Países: ARG(SAL).

BERBERIDACEAE

Berberis L.**Berberis actinacantha** Mart.

Sin.: *Berberis actinacantha* Mart. var. *crispa* (Gay) Reiche, *Berberis brachyacantha* Phil. ex Reiche, *Berberis congestiflora* Gay var. *hakeoides* Hook. f., *Berberis coquimbensis* Muñoz, *Berberis crispa* Gay, *Berberis florida* Phil., *Berberis hakeoides* (Hook. f.) C.K. Schneid., *Berberis variiflora* C.K. Schneid.
 Arbusto. Endémica. 100-1900 m.
 Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Berberis andeana Job

Árbol. Endémica. 1900-2100 m.
 Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Berberis argentinensis Hosseus

Sin.: *Berberis pseudospinulosa* Job, *Berberis trollii* Diels
 Arbusto. Nativa. 1000-3500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Berberis x bidentata Lechl.

Sin.: *Berberis lologensis* Sandwith
 Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Berberis burruyacuensis O.R. Dantur,

S. Radice, E. Giordani & Papini
 Arbusto. Endémica. 1400-1500 m.
 Países: ARG(TUC).

Berberis buxifolia Lam.

Sin.: *Berberis antucoana* C.K. Schneid., *Berberis barilochensis* Job, *Berberis buxifolia* Lam. var. *antucoana* (C.K. Schneid.) Orsi, *Berberis buxifolia* Lam. var. *nuda* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *spinosissima* Reiche, *Berberis spinosissima* (Reiche) Ahrendt

Arbusto. Endémica. 600-700 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).

Berberis cabreræ Job

Arbusto. Endémica. 1500-1700 m.
 Países: ARG(NEU, RNE).

Berberis calilehua Ayarde & Bulacio

Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Berberis campos-portoi Brade

Sin.: *Berberis kleinii* Mattos
 Arbusto. Nativa. 1000-2000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Berberis chilensis Gillies ex Hook. &

Arn. var. *brachybotria* (Gay) Landrum
 Sin.: *Berberis brachybotria* Gay, *Berberis brachybotria* Gay var. *brevispina* Reiche
 Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn. var. *chilensis*

Sin.: *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *diffusa* (Gay) Reiche, *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *ferox* (Gay) Reiche, *Berberis diffusa* Gay, *Berberis ferox* Gay, *Berberis fragrans* Phil. ex Reiche, *Berberis gayi* K. Koch
 Arbusto. Endémica. 300-1600 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Berberis chillanensis (C.K. Schneid.)

Sprague ex Bean
 Sin.: *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean var. *hirsutipes* Sprague, *Berberis coletoides* Lechl. var. *gracilis* (C.K. Schneid.) Ahrendt, *Berberis montana* Gay var. *chillanensis* C.K. Schneid., *Berberis*

montana Gay var. *gracilis* C.K. Schneid.

Arbusto. Endémica. 1100-1300 m.
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL.

Berberis comberi Sprague & Sandwith

Arbusto. Endémica. 900-1500 m.
 Países: ARG(MEN, NEU).

Berberis commutata Eichler

Sin.: *Berberis divaricata* Rusby
 Arbusto. Nativa. 1300-3000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Berberis congestiflora Gay

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(ARA, LLA).

Berberis copahuensis Job

Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.
 Países: ARG(NEU).

Berberis corymbosa Hook. & Arn.

Sin.: *Berberis corymbosa* Hook. & Arn. var. *paniculata* (Phil.) Reiche, *Berberis paniculata* Phil.
 Arbusto. Endémica. 300-600 m.
 Países: CHL(JFE).

Berberis darwinii Hook.

Sin.: *Berberis costulata* Gand., *Berberis knightii* (Lindl.) K. Koch, *Mahonia knightii* Lindl.
 Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Berberis empetrifolia Lam.

Sin.: *Berberis empetrifolia* Lam. var. *magellanica* C.K. Schneid., *Berberis mutabilis* Phil., *Berberis wawrana* C.K. Schneid.
 Subarbusto. Endémica. 0-3500 m.
 Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF).

- CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).
- Berberis fiebrigii** C.K. Schneid.
Subarbusto. Nativa. 2600-2800 m.
Países: ARG(JUJ).
- Berberis glomerata** Hook. & Arn.
Sin.: *Berberis glomerata* Hook. & Arn. var. *zahlbruckneriana* (C.K. Schneid.) Ahrendt, *Berberis zahlbruckneriana* C.K. Schneid.
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(COQ).
- Berberis grevilleana** Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Berberis actinacantha* Mart. var. *grevilleana* (Gillies ex Hook. & Arn.) C.K. Schneid.
Arbusto. Endémica. 1800-2800 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
- Berberis heterophylla** Juss. ex Poir.
Sin.: *Berberis cuneata* DC., *Berberis heterophylla* Juss. ex Poir. var. *pluriflora* Reiche, *Berberis morenonis* Kuntze
Arbusto. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
- Berberis hieronymi** C.K. Schneid.
Sin.: *Berberis ruscifolia* Lam. var. *subintegrifolia* Kurtz
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(COR).
- Berberis horrida** Gay
Sin.: *Berberis actinacantha* Mart. var. *horrida* (Gay) Reiche, *Berberis actinacantha* Mart. var. *mollis* Reiche, *Berberis pilosifolia* Ahrendt
Arbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).
- Berberis ilicifolia** L. f.
Sin.: *Berberis lagenaria* Poir., *Berberis subantarctica* Gand.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).
- Berberis jobii** Orsi
Arbusto. Endémica. 1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Berberis jujuyensis** Job
Arbusto. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(JUJ).
- Berberis laurina** Thunb.
Sin.: *Berberis coriacea* A. St.-Hil., *Berberis glaucescens* A. St.-Hil., *Berberis spinulosa* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(DUR, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).
- Berberis lilloana** Job
Arbusto. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Berberis litoralis** Phil.
Arbusto o arbolito. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(ANT).
- Berberis masafuerana** Skottsbo.
Arbusto o arbolito. Endémica. 200-1100 m.
Países: CHL(JFE).
- Berberis michay** Job
Arbusto. Endémica. 150-700 m.
Países: ARG(RNE, SCR).
- Berberis microphylla** G. Forst.
Sin.: *Berberis buxifolia* Lam. var. *antarctica* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *gracilior* Albov, *Berberis dulcis* Sweet, *Berberis inermis* Pers., *Berberis marginata* Gay
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).
- Berberis mikuna** Job
Árbol. Endémica. 2500 m.
Países: ARG(TUC).
- Berberis montana** Gay
Sin.: *Berberis buxifolia* Lam. var. *montana* (Gay) Reiche, *Berberis coletoides* Lechl., *Berberis montana* Gay var. *coletoides* (Lechl.) C.K. Schneid., *Berberis polypetala* Phil.
Arbusto. Endémica. 500-2700 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
- Berberis montevidensis** C.K. Schneid.
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: URY(MON).
- Berberis negeriana** Tischler
Arbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(BIO).
- Berberis parodii** Job
Sin.: *Berberis buxifolia* Lam. var. *papillosa* C.K. Schneid.
Arbusto o árbol. Endémica. 600-700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
- Berberis rotundifolia** Poepp. & Endl.
Sin.: *Berberis philippii* Ahrendt, *Berberis polymorpha* Phil., *Berberis umbellata* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 200-2300 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).
- Berberis ruscifolia** Lam.
Sin.: *Berberis ruscifolia* Lam. var. *coriacea* Job

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, LRI, NEU, SDE, SFE, SLU). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Berberis sellowiana C.K. Schneid.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). URY(MON).

Berberis serratodentata Lechl.

Sin.: *Berberis pearcei* Phil.
Arbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

Berberis trigona Kunze ex Poepp. & Endl.

Sin.: *Berberis grisebachii* Lechl., *Berberis linearifolia* Phil., *Berberis linearifolia* Phil. var. *longifolia* (Reiche) Ahrendt, *Berberis trigona* Kunze ex Poepp. & Endl. var. *longifolia* Reiche
Arbusto. Endémica. 500-1800 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, MAG).

Berberis valdiviana Phil.

Sin.: *Berberis valdiviana* Phil. var. *gracilifolia* Ahrendt
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

BERBERIDOPSISACEAE

Berberidopsis Hook. f.

Berberidopsis corallina Hook. f.
Arbusto. Endémica. 100-600 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Berberidopsis granitica Menegoz, A.E.

Villarroel & Lavandero
Arbusto. Endémica. 1500-1700 m.
Países: CHL(BIO).

BETULACEAE

Alnus Mill.

Alnus acuminata Kunth

Sin.: *Alnus acuminata* Kunth var. *spachii* Regel, *Alnus ferruginea* Kunth var. *aliso* Griseb., *Alnus jorullensis* Kunth var. *acuminata* (Kunth) Kuntze, *Alnus jorullensis* Kunth var. *spachii* (Regel) Winckler, *Alnus mirbellii* Spach, *Alnus spachii* (Regel) Callier
Árbol. Nativa. 1500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Sin.: *Betula alnus* L. var. *glutinosa* L.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(COR, NEU). CHL(COQ, BIO, LLA, RME).

Alnus incana (L.) Moench

Sin.: *Betula alnus* L. var. *incana* L.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Alnus rubra Bong.

Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU).

Betula L.

Betula pendula Roth
Árbol. Introducida.
Países: ARG(CHU, COR, RNE).

BIGNONIACEAE

Adenocalymma Mart. ex Meisn.

Adenocalymma acutissimum (Cham.)

Miers

Sin.: *Adenocalymma comosum* DC., *Adenocalymma comosum* DC. var. *acutissimum* Bureau, *Adenocalymma comosum* DC. var. *lanceolatum* Bureau & K. Schum., *Adenocalymma comosum* DC. var. *nitidum* (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum., *Adenocalymma nitidum* Mart. ex DC., *Adenocalymma prehensile* Miers, *Adenocalymma separium* Mart. ex DC., *Bignonia acutissima* Cham., *Bignonia comosa* Cham., nom. superfl.
Liana. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Adenocalymma bracteatum (Cham.) DC.

Sin.: *Adenocalymma macrostachyum* Miers, *Bignonia bracteata* Cham.
Liana. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Adenocalymma dusenii Kraenzl.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Adenocalymma hatschbachii A.H.

Gentry
Liana. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Adenocalymma marginatum (Cham.) DC.

Sin.: *Adenocalymma apterospermum* (Sandwith) Udulutsch, *Adenocalymma marginatum* (Cham.) DC. var. *apterospermum* Sandwith, *Bignonia marginata* Cham., R. G. & Assis

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, NAS, PAI, SPE).
URY(SAO).

Adenocalymma paulistarum Bureau ex
K. Schum.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APY, APA).

Adenocalymma peregrinum (Miers) L.G.
Lohmann

Sin.: *Adenocalymma peregrinum* (Miers)
L.G. Lohmann, nom. nud., *Memora*
cuspidata Hassl., *Memora cuspidata*
Hassl. f. *cirrifer* Hassl., *Memora*
cuspidata Hassl. f. *parvifoliolata*
Hassl., *Memora peregrina* (Miers)
Sandwith, *Pleonotoma peregrina* Miers
Liana. Nativa. 400-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Adenocalymma scansile Miers

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA,
ITA).

Amphilophium Kunth

Amphilophium bracteatum (Cham.) L.G.
Lohmann

Sin.: *Amphilophium bracteatum*,
Haplophium bracteatum Cham.,
Haplophium lundii DC.

Liana. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR).

Amphilophium carolinae (Lindl.) L. G.
Lohmann

Sin.: *Amphilophium cynanchoides* (DC.)
L.G. Lohmann, *Anemopaegma*
clematideum Griseb., *Bignonia baclei*

DC., *Bignonia carolinae* Lindl.,
Pithecoctenium carolinae (Lindl.) G.
Nicholson, *Pithecoctenium*
clematideum (Griseb.) Griseb.,
Pithecoctenium cynanchoides DC.,
Pithecoctenium cynanchoides DC. var.
pellucidum Hassl.

Liana. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL,
SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
PRY(APY, BOQ, CHO, ÑEE, NAS,
PHA). URY(PAY, RNO).

Amphilophium crucigerum (L.) L.G.
Lohmann

Sin.: *Anisostichus crucigera* (L.) Small,
Bignonia botryoides Cham., *Bignonia*
crucigera L., *Bignonia echinata* Jacq.,
Bignonia phaseoloides Cham.,
Bignonia squalus Vell., *Bignonia*
tiliifolia Kunth, *Bignonia vitalba* Cham.,
Bignonia vitalba Cham. var.
aequinoctialis Cham., *Bignonia vitalba*
Cham. var. *extratropica* Cham.,
Neves-armondia cordifolia K. Schum.,
Petastoma phaseoloides (Cham.)
Miers, *Pithecoctenium aubletii* Splitg.,
Pithecoctenium botryoides (Cham.)
DC., *Pithecoctenium catharinae* DC.,
Pithecoctenium cordifolium Mart.,
Pithecoctenium crucigerum (L.) A.H.
Gentry, *Pithecoctenium echinatum*
(Jacq.) Baill., *Pithecoctenium*
echinatum (Jacq.) Baill. f. *grandiflora*
Hassl., *Pithecoctenium echinatum*
(Jacq.) Baill. var. *intermedium* Hassl.,
Pithecoctenium echinatum (Jacq.)
Baill. var. *tomentosum* Hassl.,
Pithecoctenium echinatum (Jacq.)
Baill. var. *typicum* Sprague, nom.
inval., *Pithecoctenium glaucum* Rusby,
Pithecoctenium hatschbachii A.H.
Gentry, *Pithecoctenium hexagonum*
DC., *Pithecoctenium hexagonum* DC.
var. *brasilianum* DC., *Pithecoctenium*

lundii DC., *Pithecoctenium muricatum*
Moç. ex DC., *Pithecoctenium*
phaseoloides (Cham.) Schenck,
Pithecoctenium squalus (Vell.) DC.,
Pithecoctenium tribrachiatum Loes.,
Pithecoctenium vitalba (Cham.) DC.,
Pithecoctenium vitalba (Cham.) DC. f.
glabratum Hassl., *Pithecoctenium*
vitalba (Cham.) DC. f. *intermedium*
Hassl., *Pithecoctenium vitalba* (Cham.)
DC. var. *extratropica* (Cham.) DC.,
Pithecoctenium vitalba (Cham.) DC.
var. *rostrata* Hassl.

Liana. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN,
CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI,
SPE).

Notas: Citada para Uruguay por
Lohmann & Taylor (2014), sin citar
localidad o ejemplar de referencia

Amphilophium dolichoides (Cham.)
L.G. Lohmann

Sin.: *Amphilophium dolichoides* (Cham.)
L.G. Lohmann, nom. nud., *Bignonia*
dolichoides Cham., *Pithecoctenium*
dolichoides (Cham.) Bureau & K.
Schum.

Liana. Nativa. 300-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Amphilophium dusenianum (Kraenzl.)
L.G. Lohmann

Sin.: *Amphilophium glaziovii* Bureau ex K.
Schum., *Amphilophium neoglaziovii*
L.G. Lohmann, nom. nud.,
Bothriopodium glaziovii (Bureau & K.
Schum.) Rizzini var. *begonifolium*
Rizzini, *Bothriopodium glaziovii*
(Bureau ex K. Schum.) Rizzini,
Bothriopodium glaziovii (Bureau ex K.
Schum.) Rizzini var. *glabrum* Rizzini &
J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii*
(Bureau ex K. Schum.) Rizzini var.

robustus Rizzini, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *stenocarpum* Rizzini, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *symmetricum* J.C. Gomes, *Distictis glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Bureau & K. Schum., *Haplophium dusenianum* Kraenzl., *Haplophium glaziovii* (Bureau & K. Schum.) A.H. Gentry, *Pithecoctenium glaziovii* Bureau & K. Schum., *Urbaniella duseniana* (Kraenzl.) Dusén ex Melch., *Urbanolophium dusenianum* (Kraenzl.) Melch., *Urbanolophium glaziovii* (Bureau & K. Schum.) Melch.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Amphilophium elongatum* (Vahl) L.G. Lohmann**

Sin.: *Bignonia elongata* Vahl, *Distictella elongata* (Vahl) Urb., *Distictis elongata* (Vahl) Bureau & K. Schum., *Doxantha elongata* (Vahl) Miers, *Pithecoctenium elongatum* (Vahl) Klotzsch, *Pithecoctenium obovatum* Mart. ex DC.

Liana. Nativa. 100-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Amphilophium falcatum* (Vell.) L.G. Lohmann**

Sin.: *Amphilophium falcatum* (Vell.) L. G. Lohmann, nom. nud., *Bignonia falcata* Vell., *Pithecoctenium falcatum* (Vell.) A. Pool

Liana. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

***Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth**

Sin.: *Amphilophium glanduliferum* Mart. ex DC., *Amphilophium macrophyllum* Kunth, *Amphilophium molle* Cham. & Schltdl., *Amphilophium mollicomum* Pittier, *Amphilophium mutisii* Kunth,

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth var. *imatacense* A.H. Gentry, *Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth var. *molle* (Cham. & Schltdl.) Standl., *Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth var. *mollicomum* (Pittier) A.H. Gentry, *Amphilophium paraguayense* Hassl. ex A.G. Schulz, *Amphilophium purpureum* Brandege, *Amphilophium vauthieri* DC., *Arrabidaea paniculata* (L.) Seem., *Bignonia paniculata* L., *Endoloma purpurea* Raf.

Liana. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

***Amphilophium pannosum* (DC.) Bureau & K. Schum.**

Sin.: *Amphilophium jelskii* Zahlbr., *Amphilophium oxylaphium* Donn. Sm., *Bignonia pannosa* DC., *Bignonia pubescens* Pav. ex DC., hom. illeg.

Liana. Nativa. 600-1600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

***Amphilophium sandwithii* Fabris, H. A.**

Liana. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

***Anemopaegma* Mart. ex Meisn.**

***Anemopaegma arvense* (Vell.) Stelfeld ex Souza**

Sin.: *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *angustifolium* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *glabrum* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *hirsutum* Hassl., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *latifolium* DC., *Anemopaegma*

mirandum (Cham.) Mart. ex DC. var. *petiolatum* Bureau, *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *puberum* (DC.) Bureau, *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *pubescens* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *sessilifolium* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *verticellatum* Bureau, *Anemopaegma sessilifolium* Mart. ex DC., *Anemopaegma subundulatum* Bureau & K. Schum., *Bignonia arvensis* Vell., *Bignonia miranda* Cham., *Jacaranda arvensis* (Vell.) Steud.

Hierba. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

***Anemopaegma chamberlaynii* (Sims) Bureau & K. Schum.**

Sin.: *Anemopaegma chamberlaynii* (Sims) Bureau & K. Schum. var. *brachybotrys* DC., *Anemopaegma chamberlaynii* (Sims) Bureau & K. Schum. var. *tenerior* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma citrifolium* (DC.) Baill., *Anemopaegma longipes* K. Schum., *Anemopaegma racemosum* Mart. ex DC., *Anemopaegma racemosum* Mart. ex DC. var. *brachybotrys* DC., *Anemopaegma scandens* (Vell.) Mello ex K. Schum., *Bignonia aequinoctialis* L. var. *chamberlaynii* (Sims) Ker Gawl., *Bignonia chamberlaynii* Sims, *Bignonia chamberlaynii* Sims var. *tenerior* Cham., *Bignonia scandens* Vell., *Jacaranda arrabidaea* Steud., *Macfadyena citrifolia* (DC.) Miers, *Tabebuia citrifolia* DC.

Liana. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON, PHA, SPE).

Anemopaegma flavum Morong

Sin.: *Anemopaegma sylvestre* S. Moore,
Anemopaegma symmetricum Rusby
Liana. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE).
PRY(CEN, COA, GUA, ÑEE).

Anemopaegma glaucum Mart. ex DC.

Sin.: *Anemopaegma glaucum* Mart. ex
DC. var. *lanceifolium* Bureau & K.
Schum., *Anemopaegma glaucum*
Mart. ex DC. var. *pubescens* Bureau &
K. Schum., *Anemopaegma glaucum*
Mart. ex DC. var. *triplinervium* Bureau
& K. Schum., *Anemopaegma*
lanceifolium DC., *Anemopaegma*
lanceifolium DC. var. *puberum* DC.,
Anemopaegma triplinervium Mart. ex
DC.
Arbusto. Nativa. 600 m.
Países: PRY(AMA).

Anemopaegma longipetiolatum

Sprague
Sin.: *Anemopaegma fiebrigianum* Kraenzl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, SPE).

Anemopaegma nebulosum Firetti-

Leggieri & L.G. Lohmann
Liana. Endémica. 1200-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Anemopaegma prostratum DC.

Liana. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CON).

Argyria D. Don

Argyria adscendens DC. var.
adscendens

Sin.: *Argyria huidobriana* Clos, *Argyria*
lutea Phil., *Argyria viridis* Phil. var.
lutea (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 900-3200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Argyria adscendens DC. var. **viridis**

(Phil.) Gleisner & Ricardi
Sin.: *Argyria viridis* Phil.
Hierba. Endémica. 1800-2500 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Argyria bifrons Phil.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: CHL(ATA).

Argyria bustillosii Phil.

Sin.: *Argyria australis* Phil., *Argyria*
potentillifolia DC. var. *australis* (Phil.)
Macloskie, comb. superfl., *Argyria*
potentillifolia DC. var. *australis* (Phil.)
Speg.
Subarbusto. Endémica. 800-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO,
BIO).

Argyria checoensis (Meyen) I.M. Johnst.

Sin.: *Argyria incana* Phil., *Argyria sitiens*
I.M. Johnst., *Oxalis checoensis* Meyen
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Argyria conaiensis Ravenna

Subarbusto. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(ATA).

Argyria farnesiana Gleisner & Ricardi

Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: CHL(COQ).

Argyria geranioides DC.

Hierba. Endémica. 900-1400 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Argyria glutinosa Phil.

Hierba. Endémica. 1400-2900 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Argyria potentillifolia DC.

Hierba. Endémica. 200-3500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Argyria radiata (L.) D. Don

Sin.: *Argyria canescens* D. Don, *Argyria*
chrysantha Phil., *Argyria digitalina*
Phil., *Argyria eremophila* Phil., *Argyria*
feuillei DC., *Argyria glabriuscula* Phil.,
Argyria puberula DC., *Argyria tenuifolia*
C. Presl, *Argyria villosa* Phil., *Argyria*
viridis Phil. var. *digitalina* (Phil.)
Reiche, *Bignonia radiata* L., *Oxymitus*
argyrioides C. Presl
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Argyria robusta Sandwith

Hierba. Endémica. 100-1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU).

Argyria tomentosa Phil.

Sin.: *Argyria tenella* Phil., *Argyria*
tomentosa Phil. var. *tenella* (Phil.)
Reiche
Hierba. Endémica. 2400-2900 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Argyria uspallatensis DC.

Sin.: *Argyria trifoliata* DC., *Tecoma*
uspallatensis Mart. ex DC.
Hierba. Endémica. 1700-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
SAL, SJU). CHL(ANT, VAL).

Bignonia L.

Bignonia binata Thunb.

Sin.: *Adenocalymma ocositense* Donn.
Sm., *Arrabidaea schumanniana*
Huber, *Bignonia eximia* Morong,
Bignonia purpurea Lodd. ex Hook. f.,
Bignonia umbellata DC., *Bignonia*
umbellulata DC., *Clytostoma binatum*
(Thunb.) Sandwith, *Clytostoma*

elegans Standl., *Clytostoma isthmicum* Pittier, *Petastoma multiglandulosum* Kraenzl.

Liana. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Bignonia callistegioides Cham.

Sin.: *Bignonia lindleyi* DC., *Bignonia picta* Lindl., nom. illeg., *Bignonia speciosa* Graham, *Clytostoma calystegioides* (Cham.) Bureau ex Griseb., *Clytostoma uniflorum* K. Schum., *Cuspidaria callistegioides* (Cham.) DC., *Pithecoctenium callistegioides* (Cham.) Niederl.

Liana. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(APY, CEN). URY(CAS, CLA, FLA, MON, RNO, SAO, SOR).

Bignonia decora (S. Moore) L.G. Lohmann

Sin.: *Anemopaegma decorum* S. Moore, *Arrabidaea decora* (S. Moore) Hassl., *Arrabidaea decora* (S. Moore) Hassl. var. *macrophylla* Hassl., *Bignonia decora* (S. Moore) L.G. Lohmann, nom. nud., *Clytostoma decorum* (S. Moore) Bureau & K. Schum., *Cydista decora* (S. Moore) A.H. Gentry

Liana. Nativa. 100-400 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, GUA, SPE).

Bignonia sciuripabulum (Hovel.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea sciuripabulum* K. Schum., nom. nud., *Clytostoma itatiaense* J.C. Gomes, *Clytostoma sciuripabulum* Bureau & K. Schum., *Clytostoma sciuripabulum* Hovel., *Clytostoma sciuripabulum* Hovel. var. *longiflorum*

Sprague, *Pithecoctenium sciuripabulum* (K. Schum.) Corr. Mélo Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CAN, GUA, ITA, SPE).

Campsidium Seem.

Campsidium valdivianum (Phil.) W. Bull
Sin.: *Campsidium chilense* Reissek & Seem., *Campsidium valdivianum* (Phil.) Skottsb., comb. superfl., *Tecoma valdiviana* Phil.

Arbusto o liana. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

Campsis Lour.

Campsis radicans (L.) Bureau

Sin.: *Campsis radicans* (L.) Seem.

Liana. Introducida. 400-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SAL). BRA(PAR, RGS).

Cuspidaria DC., nom. cons.

Cuspidaria convoluta (Vell.) A.H. Gentry

Sin.: *Bignonia convoluta* Vell., *Bignonia pterocarpa* Cham., *Cuspidaria populeaster* Mart. ex DC., *Cuspidaria pterocarpa* (Cham.) DC., *Cuspidaria pterocarpa* (Cham.) DC. var. *pubescens* Corr. Mélo, *Cuspidaria trifoliata* DC., *Lochmocydia populeaster* Mart. ex DC., *Nouletia pterocarpa* (Cham.) Pichon, *Saldanhaea convoluta* Corr. Mélo Liana. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,

AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Cuspidaria lateriflora (Mart.) DC.

Sin.: *Saldanhaea confertiflora* Bureau, *Saldanhaea lateriflora* (Mart.) Bureau, *Saldanhaea lateriflora* (Mart.) Bureau var. *elliptica* Bureau, *Saldanhaea lateriflora* (Mart.) Bureau var. *ovata* Bureau, *Tecoma lateriflora* Mart.

Liana. Nativa. 500-600 m.

Países: PRY(AMA).

Cuspidaria pulchella (Cham.) K. Schum.

Sin.: *Arrabidaea pulchella* (Cham.) Bureau, *Arrabidaea tobatensis* Chodat, *Bignonia pulchella* Cham., *Cuspidaria pauciflora* DC., *Fridericia pulchella* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Lundia pauciflora* Mart. ex DC., *Mansoa schwackei* Bureau & K. Schum., *Paracarpaea pulchella* (Cham.) Pichon

Liana. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAN).

Cuspidaria pulchra (Cham.) L.G. Lohmann

Sin.: *Anemopaegma whitei* Rusby, *Arrabidaea whitei* (Rusby) Sandwith, *Fridericia whitei* (Rusby) L.G. Lohmann, *Fridericia whitei* (Rusby) L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma whitei* (Rusby) Sandwith

Enredadera. Nativa. 200-300 m.

Países: PRY(APY).

Cybistax Mart. ex Meisn.

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.

Sin.: *Bignonia antisyphilitica* Mart., *Cybistax antisyphilitica* (Mart.) Mart. var. *trochocalyx* Bureau & K. Schum. Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(JUU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI).

Dolichandra Cham.

Dolichandra chodatii (Hassl.) L.G. Lohmann

Sin.: *Dolichandra chodatii* (Hassl.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Parabignonia chodatii* (Hassl.) A.H. Gentry, *Paradolichandra chodatii* Hassl., *Paradolichandra chodatii* Hassl. var. *brachycalyx* Hassl.

Arbusto o liana. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, CON, PHA, SPE).

Dolichandra cynanchoides Cham.

Sin.: *Bignonia coccinea* Vell., hom. illeg., *Dolichandra cynanchoides* Cham. var. *latifolia* Hassl., *Macfadyena coccinea* Miers, *Macfadyena cynanchoides* (Cham.) Morong, *Spathodea dolichandra* Steud.

Liana. Nativa. 500-800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL, MON, RNO, RIV, SAO).

Dolichandra dentata (K. Schum.) L.G. Lohmann

Sin.: *Dolichandra dentata* (K. Schum.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Macfadyena dentata* K. Schum., *Macfadyena tweediana* Griseb. ex Lorentz, nom. inval.

Enredadera o liana. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, FLA, MON, SAO).

Dolichandra hispida (DC.) L.H. Fonseca & L.G. Lohmann

Sin.: *Macfadyena hispida* (DC.) Seem., *Macfadyena mollis* (Sond.) Seem., *Macfadyena pubescens* S. Moore, *Spathodea hispida* DC., *Spathodea mollis* Sond.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, ITA).

Dolichandra quadrivalvis (Jacq.) L.G. Lohmann

Sin.: *Bignonia fraxinifolia* (Kunth) Spreng., *Bignonia populifolia* DC., *Bignonia quadrivalvis* Jacq., *Melloa fraxinifolia* (Kunth) K. Schum. ex Schnee, *Melloa populifolia* (DC.) Britton, *Melloa populifolia* (DC.) Bureau, *Melloa quadrivalvis* (Jacq.) A.H. Gentry, *Phryganocydia pisoniana* Mart. ex DC., nom. nud., *Spathodea fraxinifolia* Kunth, *Spathodea pisoniana* DC., *Tabebuia pisoniana* (DC.) Miers, *Tecoma pisoniana* (DC.) DC. ex Bureau & K. Schum.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

Notas: Citada para Uruguay por Lohmann & Taylor (2014), sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Dolichandra uncata (Andrews) L.G. Lohmann

Sin.: *Bignonia pachyptera* DC., nom. nud., *Bignonia uncata* Andrews, *Bignonia uncata* Sims, nom. inval., *Bignonia uncinata* G. Mey., *Dolichandra fenzliana* Miq., *Doxantha uncata*

(Andrews) Miers, *Macfadyena fenzliana* (Miq.) Miq., *Macfadyena guatemalensis* S.F. Blake, *Macfadyena hassleri* Sprague, *Macfadyena uncata* (Andrews) Sprague & Sandwith, *Macfadyena uncinata* (G. Mey.) A. DC., *Macfadyena undulata* K. Schum., *Pachyptera puberula* DC., *Spathodea uncata* (Andrews) Spreng., *Spathodea uncinata* (G. Mey.) Spreng.

Enredadera o liana. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS).

Dolichandra unguiculata (Vell.) L.G. Lohmann

Sin.: *Bignonia unguiculata* Vell., *Dolichandra maximiliani* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Dolichandra unguiculata* (Vell.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Doxantha unguiculata* (Vell.) Miers, *Parabignonia maximiliani* (Mart. ex DC.) Bureau ex K. Schum., *Parabignonia unguiculata* (Vell.) A.H. Gentry, *Tecoma maximiliani* Mart. ex DC.

Enredadera o liana. Nativa. 100 m.

Países: BRA(PAR).

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann

Sin.: *Batocydia exoleta* (Vell.) Mart. ex DC., *Batocydia unguis-cati* (L.) Mart. ex Britton, nom. illeg., *Bignonia acutistiopula* Schltld., *Bignonia californica* Brandegee, *Bignonia catharinensis* Schenk, *Bignonia dasyonyx* S.F. Blake, *Bignonia exoleta* Vell., *Bignonia gracilis* Lodd., *Bignonia inflata* Griseb., *Bignonia lanuginosa* Hemsl., *Bignonia pseudounguis* Desf., *Bignonia triantha* DC., *Bignonia*

tweediana Lindl., *Bignonia unguis* L., *Bignonia unguis-cati* L., *Bignonia unguis-cati* L. var. *exoleta* (Vell.) Sprague, *Bignonia unguis-cati* L. var. *gracilis* (Lodd.) DC., *Bignonia unguis-cati* L. var. *guatemalensis* K. Schum. & Loes., *Bignonia unguis-cati* L. var. *radicans* DC., *Bignonia unguis-cati* L. var. *serrata* Bureau & K. Schum., *Bignonia vespertilia* Barb. Rodr., *Dolichandra kohautiana* C. Presl, *Doxantha acutistipula* (Schltdl.) Miers, *Doxantha adunca* Miers, *Doxantha dasyonyx* (S.F. Blake) S.F. Blake, *Doxantha exoleta* (Vell.) Miers, *Doxantha mexicana* Miers, nom. nud., *Doxantha praesignis* Miers, nom. nud., *Doxantha radicans* (DC.) Miers, *Doxantha serrulata* Miers, nom. nud., *Doxantha tenuicula* Miers, nom. nud., *Doxantha tweediana* (Lindl.) Miers, *Doxantha unguis* (L.) Miers, *Doxantha unguis-cati* (L.) Miers var. *exoleta* (Vell.) Fabris, *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H. Gentry, *Microbignonia auristellae* Kraenzl.

Enredadera o liana. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE). URY(ART, COL, FLA, MON, RNO, RIV, SJO).

Eccremocarpus Ruiz & Pav.

Eccremocarpus scaber Ruiz & Pav.

Sin.: *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) Sweet, *Eccremocarpus scaber* Ruiz & Pav. var. *sepium* Bertero ex A.DC., *Eccremocarpus sepium* Bertero
Arbusto. Nativa. 200-2400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, ARA, LLA, RME).

Fridericia Mart.

Fridericia candicans (Rich.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea calodictyos* Sprague, *Arrabidaea candicans* (Rich.) DC., *Arrabidaea candicans* (Rich.) DC. var. *latifolia* DC., *Arrabidaea orbignyana* DC., *Arrabidaea pachycalyx* Sprague, *Arrabidaea pruinosa* Klotzsch ex Bureau & K. Schum., *Arrabidaea quinquenervia* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea rhodothyrsus* Kraenzl., *Arrabidaea schomburgkii* Klotzsch ex Bureau & K. Schum., *Arrabidaea subincana* DC., *Arrabidaea zuliaensis* Pittier, *Bignonia candicans* Rich., *Bignonia colorata* Poir., *Fridericia candicans* (Rich.) L.G. Lohmann, nom. nud.

Liana. Nativa. 100-200 m.

Países: PRY(APY).

Fridericia caudigera (S. Moore) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea caudigera* (S. Moore) A.H. Gentry, *Arrabidaea coleocalyx* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea coleocalyx* Bureau & K. Schum. var. *induta* Sprague, *Arrabidaea coleocalyx* Bureau & K. Schum. var. *micrantha* Sprague, *Bignonia caudigera* S. Moore, *Fridericia caudigera* (S. Moore) L.G. Lohmann, nom. nud.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann
Sin.: *Adenocalymma portoricense* Bello, *Arrabidaea chica* (Bonpl.) Verl., *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. f. *cuprea* (Cham.) Sandwith, *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *acutifolia* (DC.) Bureau, *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *angustifolia* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *cuprea* (Cham.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *thyrsoidae* (DC.) Bureau, *Arrabidaea cuprea* (Cham.) Bornm., hom. illeg., *Arrabidaea cuprea* Pittier, *Arrabidaea larensis* Pittier, *Arrabidaea rosea* DC., *Bignonia chica* Bonpl., *Bignonia cuprea* Cham., *Bignonia cuprea* Cham. var. *grandiflora* Cham., *Bignonia cuprea* Cham. var. *parviflora* Cham., *Bignonia rubescens* S. Moore, *Bignonia rufescens* DC., *Bignonia thyrsoidae* DC., *Fridericia chica* (Bonpl.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Lundia chica* (Bonpl.) Seem., *Temnocydia carajura* Mart. ex DC., *Vasconcellia acutifolia* Mart. ex DC.

Liana. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, MIE, SPE).

Notas: Citada para Uruguay por Lohmann & Taylor (2014), sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Fridericia conjugata (Vell.) L.G. Lohmann

Sin.: *Adenocalymma paniculatum* Benth. ex Miers, *Arrabidaea amazonica* K. Schum., *Arrabidaea chironeura* Bureau ex Glaz., nom. nud., *Arrabidaea conjugata* (Vell.) Mart., *Arrabidaea virescens* DC., *Arrabidaea virescens* DC. var. *farinosa* Salzm. ex

- DC., *Bignonia ciliata* Wawra, *Bignonia conjugata* Vell., *Bignonia farinosa* Salzm. ex DC., *Fridericia conjugata* (Vell.) L.G. Lohmann, nom. nud.
Liana. Nativa. 300-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Fridericia craterophora** (DC.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea craterophora* (DC.) Bureau, *Arrabidaea craterophora* (DC.) Bureau var. *acutifolia* Bureau, *Bignonia craterophora* DC.
Liana. Nativa. 300-400 m.
Países: PRY(AMA).
- Fridericia fagoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea anguillulicarpa* Hassl., *Arrabidaea fagoides* (Cham.) Bureau, *Bignonia fagoides* Cham., *Bignonia grewoides* S. Moore
Liana. Nativa. 300-400 m.
Países: PRY(AMA).
- Fridericia florida** (DC.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea cardenasii* Rusby, *Arrabidaea divaricata* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea florida* DC., *Arrabidaea panamensis* Sprague, *Bignonia nitida* Britton ex Bureau & K. Schum., nom. nud., *Fridericia florida* (DC.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Vasconcellia florida* Bureau ex DC.
Liana. Nativa. 100-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).
- Fridericia leucopogon** (Cham.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea leucopogon* (Cham.) Sandwith, *Bignonia leucopogon* Cham., *Pantherpa leucopogon* (Cham.) Miers, *Petastoma leucopogon* (Cham.) Bureau ex Warm., *Petastoma leucopogon* (Cham.) Bureau ex Warm.
var. *glabra* K. Schum., *Petastoma puniceum* (Mart.) Miers
Liana. Nativa. 100-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Fridericia mutabilis** (Bureau & K. Schum.) Frazão & L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea muehlbergiana* Hassl., *Arrabidaea mutabilis* Bureau & K. Schum., *Fridericia mutabilis* (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Tanaecium mutabile* (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).
- Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *acuminata* (Bureau) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *attenuata* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *cuneata* (DC.) Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *firma* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *induta* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *platyphylla* (Cham.) Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *rigida* Bureau, *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum., nom. illeg., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *acuminata* (Bureau) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *cuneata* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *elliptica* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *firma* (Bureau) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *firmula* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *heterophylla* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *induta* (Bureau) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *lasiorrhachis* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *puberula* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *stricta* (DC.) Bureau & K. Schum., *Bignonia brachypoda* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *acutifolia* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *cuneata* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *elliptica* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *firma* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *heterophylla* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *platyphylla* (Cham.) DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *pubescens* Sond., *Bignonia platyphylla* Cham., *Bignonia regnelliana* Sond., *Fridericia platyphylla* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud.
Liana. Nativa. 300-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, PAI, SPE).
- Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea blanchetii* DC., *Arrabidaea blanchetii* DC. var. *desertorum* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea carabobensis* Pittier, *Arrabidaea cordifolia* Klotzsch, *Arrabidaea desertorum* DC.,

Arrabidaea lundellii Standl., *Arrabidaea pleei* DC., *Arrabidaea pubescens* (L.) A.H. Gentry, *Arrabidaea sieberi* A. DC., *Bignonia blanchetii* DC., *Bignonia pubescens* L., *Bignonia sieberi* DC., *Bignonia tomentella* S. Moore, *Fridericia pubescens* (L.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma pubescens* (L.) Miers, *Vasconcellia desertorum* Mart. ex DC.
Liana. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CON, SPE).

Fridericia samydoides (Cham.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea samydoides* (Cham.) Sandwith, *Bignonia samydoides* Cham., *Bignonia variabilis* Mart., *Bignonia varians* DC., *Fridericia samydoides* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma crenatum* Miers, *Petastoma glabrum* Miers, *Petastoma laurifolium* Kraenzl., *Petastoma samydoides* (Cham.) Miers
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, SPE).

Fridericia speciosa Mart.

Sin.: *Fridericia guilielma* Mart., *Tabebuia sanguinea* DC.
Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY.

Fridericia triplinervia (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea ateramnantha* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea triplinervia* (Mart. ex DC.) Baill. ex Bureau, *Arrabidaea triplinervia* (Mart. ex DC.) Baill. ex Bureau var. *brachycalix* Hassl., *Bignonia triplinervia* Mart. ex DC., *Fridericia triplinervia* (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma triplinerve* (Mart. ex DC.)

Miers, *Saritaea triplinervia* (Mart. ex DC.) Dugand
Liana. Nativa. 100-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Fridericia truncata (Sprague) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea truncata* (Sprague) Sandwith, *Fridericia truncata* (Sprague) L.G. Lohmann, nom. nud., *Mansoa truncata* Sprague, *Mansoa truncata* Sprague var. *parviflora* (Hassl.) Sandwith, *Petastoma truncatum* (Sprague) Hassl., *Petastoma truncatum* (Sprague) Hassl. var. *grandiflorum* Hassl., *Petastoma truncatum* (Sprague) Hassl. var. *parviflorum* Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, CON, PHA).

Handroanthus Mattos

Handroanthus abayoy Villarroel & G. A. Parada
Árbol. Nativa. 100-300 m.
Países: PRY(APY).

Handroanthus albus (Cham.) Mattos
Sin.: *Tabebuia alba* (Cham.) Sandwith, *Tecoma alba* Cham.
Árbol. Nativa. 200-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA).

Handroanthus catarinensis (A.H. Gentry) S. Grose
Sin.: *Tabebuia catarinensis* A.H. Gentry
Arbusto. Endémica. 700-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos
Sin.: *Gelsemium chrysotrichum* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Handroanthus chrysotrichus* (Mart. ex DC.) Mattos var. *obtusatus* (DC.) Mattos, *Tabebuia chrysotricha* (Mart. ex DC.) Standl., *Tecoma chrysotricha* Mart. ex DC., *Tecoma chrysotricha* Mart. ex DC. var. *obtusata* (DC.) Bureau & K. Schum., *Tecoma grandis* Kraenzl., *Tecoma obtusata* DC., *Tecoma ochracea* Cham. var. *denudata* Cham.
Arbolito o árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos

Sin.: *Bignonia heptaphylla* Vell., *Handroanthus avellanadae* (Lorentz ex Griseb.) Mattos var. *paullensis* (Toledo) Mattos, *Handroanthus eximius* (Miq.) Mattos, *Tabebuia avellanadae* Lorentz ex Griseb. var. *paulensis* Toledo, *Tabebuia eximia* (Miq.) Sandwith, *Tabebuia heptaphylla* (Vell.) Toledo, *Tabebuia ipe* (Mart. ex K. Schum.) Standl., *Tecoma curialis* Saldanha, *Tecoma eximia* Miq., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *glabra* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *grandiflora* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *parviflora* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. var. *desinens* Sprague, *Tecoma ipe* Mart., nom. nud.
Árbol. Nativa. 100-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ROC, SAO).

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos

Sin.: *Gelsemium avellanedae* (Lorentz ex Griseb.) Kuntze, *Handroanthus avellanedae* (Lorentz ex Griseb.) Mattos, *Handroanthus impetiginosus* (Mart. ex DC.) Mattos var. *lepidotus* (Bureau) Mattos, *Tabebuia avellanedae* Lorentz ex Griseb., *Tabebuia dugandii* Standl., *Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl., *Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl. var. *lepidota* (Bureau) Toledo, *Tabebuia ipe* (Mart. ex K. Schum.) Standl. var. *integra* (Sprague) Sandwith, *Tabebuia nicaraguensis* S.F. Blake, *Tabebuia palmeri* Rose, *Tabebuia schunkevigoi* D.R. Simpson, *Tecoma adenophylla* Bureau & K. Schum., *Tecoma avellanedae* (Lorentz ex Griseb.) Speg., *Tecoma avellanedae* (Lorentz ex Griseb.) Speg. var. *alba* Lillo, *Tecoma impetiginosa* Mart. ex DC., *Tecoma impetiginosa* Mart. ex DC. var. *lepidota* Bureau, *Tecoma impetiginosa* Mart., nom. nud., *Tecoma integra* (Sprague) Hassl., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *lepidota* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *leucotricha* Hassl., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. var. *integra* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. var. *integrifolia* Hassl.
Árbol. Nativa. 200-1400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Handroanthus lapacho (K. Schum.) S. Grose
Sin.: *Tabebuia lapacho* (K. Schum.) Sandwith, *Tecoma lapacho* K. Schum.
Árbol. Nativa. 700-1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos var. **aguaraguensis** M.A. Zapater & Califano
Endémica. 500-600 m.
Países: ARG(SAL).

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos subsp. **ochraceus**
Sin.: *Tabebuia heteropoda* (DC.) Sandwith, *Tabebuia ochracea* (Cham.) Standl., *Tabebuia ochracea* (Cham.) Standl. subsp. *heteropoda* (DC.) A.H. Gentry, *Tecoma hassleri* Sprague, *Tecoma heteropoda* DC., *Tecoma ochracea* Cham.
Árbol. Nativa. 100-1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Handroanthus pulcherrimus (Sandwith) S. Grose
Sin.: *Tabebuia pulcherrima* Sandwith, *Tecoma petropolitana* Glaz., nom. nud.
Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, ITA, MIE, ÑEE).

Handroanthus serratifolius (Vahl) S. Grose
Sin.: *Bignonia araliacea* Cham., *Bignonia conspicua* Rich. ex DC., nom. nud., *Bignonia flavescens* Vell., *Bignonia patrisiana* DC., nom. nud., *Bignonia serratifolia* Vahl, *Gelsemium araliaceum* (Cham.) Kuntze, *Handroanthus araliaceus* (Cham.) Mattos, *Handroanthus atractocarpus* (Bureau & K. Schum.) Mattos, *Handroanthus flavescens* (Vell.) Mattos, *Tabebuia araliacea* (Cham.) Morong & Britton, *Tabebuia serratifolia* (Vahl) G. Nicholson, *Tecoma araliacea* (Cham.) DC., *Tecoma atractocarpa*

Bureau & K. Schum., *Tecoma conspicua* DC., *Tecoma flavescens* (Vell.) Mart. ex A. DC., *Tecoma nigricans* Klotzsch, nom. nud., *Tecoma patrisiana* DC., *Tecoma serratifolia* (Vahl) G. Don, *Tecoma speciosa* DC. ex Mart.
Árbol. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(PAR).

Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos
Sin.: *Tabebuia umbellata* (Sond.) Sandwith, *Tabebuia umbellata* (Sond.) Sandwith var. *lanceolata* (Bureau & K. Schum.) Toledo, *Tecoma umbellata* Sond., *Tecoma umbellata* Sond. var. *lanceolata* Bureau & K. Schum.
Árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Handroanthus vellosi (Toledo) Mattos
Sin.: *Bignonia longiflora* Vell., *Handroanthus longiflorus* Mattos, nom. superfl., *Tabebuia vellosi* Toledo, *Tecoma alba* Cham. var. *subdenudata* Bureau, *Tecoma longiflora* Bureau ex K. Schum.
Arbusto o árbol. Nativa. 900 .
Países: BRA(PAR).

Jacaranda Juss.

Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers.
Sin.: *Bignonia brasiliana* Lam.
Árbol. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Jacaranda caroba (Vell.) DC.
Sin.: *Bignonia caroba* Vell., *Jacaranda caroba* (Vell.) DC. var. *oxyphylla* (Cham.) Bureau
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Jacaranda cuspidifolia Mart.

Sin.: *Jacaranda chapadensis* Barb. Rodr.,
Jacaranda cuspidifolia Mart. ex DC.
 var. *calycina* Bureau
 Árbol. Nativa. 100-1300 m.
 Países: ARG(SAL, TUC). BRA(PAR).
 PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Jacaranda decurrens Cham.

Sin.: *Jacaranda decurrens* Cham. subsp.
symmetrifoliolata Farias & Proença,
Jacaranda decurrens Cham. var.
glabrata Hassl., *Jacaranda pteroides*
 Silva Manso, *Jacaranda robertii* S.
 Moore
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Jacaranda micrantha Cham.

Sin.: *Jacaranda intermedia* Sond.
 Árbol. Nativa. 100-900 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, ITA, PAI).

Jacaranda mimosifolia D. Don

Sin.: *Jacaranda chelonias* Griseb.,
Jacaranda ovalifolia R. Br.
 Árbol. Nativa. 0-1700 m.
 Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, COA). URY(MON).
 Notas: Cultivado en Argentina (Buenos Aires, Distrito Federal) y Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Jacaranda mutabilis Hassl.

Sin.: *Jacaranda mutabilis* Hassl. f. *integra*
 Hassl., *Jacaranda mutabilis* Hassl. f.
subcoetanea Hassl., *Jacaranda mutabilis*
 Hassl. var. *angustiflora* Hassl., *Jacaranda mutabilis*
 Hassl. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Jacaranda mutabilis*
 Hassl. var. *parvifolia* Hassl.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Jacaranda oxyphylla Cham.

Arbusto. Nativa.
 Países: BRY(PAR).

Jacaranda puberula Cham.

Sin.: *Bignonia obovata* Vell., *Jacaranda digitaliflora* Lem., *Jacaranda digitaliflora* Lem. var. *albiflora* Lem., *Jacaranda endotricha* DC., *Jacaranda gloxiniiflora* Lem., *Jacaranda hebeophora* DC., *Jacaranda paulista* Silva Manso, *Jacaranda puberula* Cham. var. *macrophylla* Cham., *Jacaranda puberula* Cham. var. *microphylla* Cham., *Jacaranda purpurea* Vattimo, *Jacaranda semiserrata* Cham., *Jacaranda subrhombica* DC.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, GUA).

Lundia DC.**Lundia corymbifera** (Vahl) Sandwith

Sin.: *Arrabidaea corymbifera* (Vahl) Bureau ex K. Schum., *Bignonia corymbifera* Vahl, *Bignonia umbrosa* Kunth, *Cuspidaria corymbifera* (Vahl) Baill. ex K. Schum., *Lundia phaseolifolia* Rusby, *Lundia truncata* Rusby, *Lundia umbrosa* (Kunth) Bureau, *Lundia umbrosa* (Kunth) Bureau var. *coccinea* Bureau, *Lundia valenzuelae* Dugand, *Petastoma corymbiferum* (Vahl) Miers
 Liana. Nativa. 0-100 m.
 Países: BRA(PAR, RGS).

Lundia nitidula DC.

Sin.: *Lundia virginalis* DC. var. *nitidula* (DC.) A.H. Gentry
 Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lundia obliqua Sond.

Sin.: *Lundia rubicunda* Mierx
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR).

Lundia virginalis DC.

Sin.: *Alsocordia virginalis* Mart. ex DC., nom. nud., *Bignonia hebantha* Mart. ex DC., nom. nud., *Bignonia virginalis* Mart. ex DC., *Lundia nitidula* DC. var. *virginalis* (DC.) Bureau & K. Schum.
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Mansoa DC.**Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.

Sin.: *Adenocalymma glomeratum* Sprague, *Adenocalymma splendens* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea grandiflora* Hassl., *Bignonia difficilis* Cham., *Chodanthus praepensus* (Miers) Sandwith, *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl., *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *glomeratus* Hassl., *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *grandiflora* Hassl., *Clytostoma punctatum* Bureau ex Glaz., *Cydista difficilis* (Cham.) Miers, *Cydista praepensa* Miers, *Mansoa acuminatissima* Bureau & K. Schum., *Mansoa laevis* DC.
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Perianthomega Bureau ex Baill.**Perianthomega vellozoi** Bureau

Sin.: *Bignonia perianthomega* Vell.,
Memora perianthomega (Vell.) Miers,
Stizophyllum trternatum J.C. Gomes
 Liana. Nativa. 0-200 m.
 Países: PRY(APY, CEN, CON).

Podranea Sprague**Podranea ricasoliana** (Tanfani) Sprague

Sin.: *Tecoma ricasoliana* Tanfani
 Arbusto o liana. Introducida. 700-800 m.
 Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pyrostegia C. Presl**Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers

Sin.: *Bignonia ignea* Vell., *Bignonia tecomiflora* Rusby, *Bignonia tubulosa* Klotzsch, *Bignonia venusta* Ker Gawl., *Jacaranda echinata* Spreng., *Pyrostegia amabilis* Miers, nom. nud., *Pyrostegia dichotoma* Miers ex K. Schum., *Pyrostegia ignea* (Vell.) C. Presl, *Pyrostegia pallida* Miers, nom. nud., *Pyrostegia reticulata* Miers, nom. nud., *Pyrostegia tecomiflora* (Rusby) K. Schum. ex Urb., *Pyrostegia tubulosa* (Klotzsch) Bureau & K. Schum., *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers var. *villosa* Hassl. ex Sprague, *Tecoma venusta* (Ker Gawl.) Lem., *Tynanthus igneus* Barb. Rodr.
 Liana. Nativa. 0-1300 m.
 Países: ARG(COS, JUJ, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Sparattosperma Mart. ex Meisn.**Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.

Sin.: *Bignonia leucantha* Vell., *Bignonia leucoxylon* DC., nom. nud., *Sparattosperma lithontripticum* Mart. ex A. DC., *Sparattosperma lithontripticum* Mart. ex A.DC. var. *subtomentosum* Bureau, *Sparattosperma stenocarpum* Bureau & K. Schum., *Sparattosperma vernicosum* (Cham.) Bureau & K. Schum., *Sparattosperma vernicosum* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *subtomentosa* Bureau, *Spathodea vernicosa* Cham., *Tecoma salzmännii* DC., *Tecoma subvernica* DC.
 Árbol. Nativa. 100-400 m.
 Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Stizophyllum Miers**Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers

Sin.: *Bignonia arrabidae* Steud., *Bignonia calycina* DC., *Bignonia dentata* DC., *Bignonia glandulosa* Mart. ex DC., nom. illeg., *Bignonia glandulosa* Mart., nom. illeg., *Bignonia longisiliqua* Vell., *Bignonia occidentalis* Salzm. ex DC., *Bignonia perforata* Cham., *Bignonia physaloides* Cham., *Bignonia punctata* DC., *Bignonia velutina* DC., *Petastoma physaloides* (Cham.) Miers, *Petastoma urceolare* Kraenzl., *Stizophyllum dentatum* (DC.) Miers, *Stizophyllum denticulatum* Miers, *Stizophyllum glandulosum* (Mart. ex DC.) Miers, *Stizophyllum longisiliquum* Bureau ex Baill., *Stizophyllum occidentale* (Salzm. ex DC.) Miers, *Stizophyllum perforatum* (Cham.) Miers var. *dentatum* (Miers) Bureau, *Stizophyllum perforatum* (Cham.)

Miers var. *physaloides* (Cham.) Bureau, *Stizophyllum velutinum* (DC.) Miers
 Liana. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR).

Tabebuia Gomes ex DC.**Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore

Sin.: *Bignonia aurea* Silva Manso, *Bignonia squamellulosa* DC., nom. nud., *Gelseminum caraiba* (Mart.) Kuntze, *Handroanthus caraiba* (Mart.) Mattos, *Handroanthus leucophlaeos* (Mart. ex DC.) Mattos, *Tabebuia argentea* (Bureau & K. Schum.) Britton, *Tabebuia caraiba* (Mart.) Bureau, *Tabebuia suberosa* Rusby, *Tecoma argentea* Bureau & K. Schum., *Tecoma aurea* (Silva Manso) DC., *Tecoma caraiba* Mart., *Tecoma caraiba* Mart. var. *grandiflora* Hassl., *Tecoma caraiba* Mart. var. *squamellulosa* (DC.) Bureau & K. Schum., *Tecoma leucophlaeos* Mart. ex DC., *Tecoma squamellulosa* DC., *Tecoma trichocalycina* DC.
 Árbol. Nativa. 0-400 m.
 Países: ARG(COS, FOR, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CHO, CON, COA, ÑEE, PHA).

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC.

Sin.: *Bignonia cassinoides* Lam., *Bignonia obtusifolia* Lam., *Bignonia tabebuia* Vell., *Bignonia uliginosa* Gomes, *Catalpa cassinoides* (Lam.) Spreng., *Spathodea magnolioides* Cham., *Tabebuia magnolioides* (Cham.) Miers, *Tabebuia uliginosa* (Gomes) DC., *Tecoma uliginosa* Mart. ex DC.
 Arbolito o árbol. Nativa. 0-100 m.
 Países: BRA(PAR).

Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb.

Sin.: *Bignonia morongii* Britton, *Gelsemium nodosum* (Griseb.) Kuntze, *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. var. *parviflora* Griseb., *Tecoma nodosa* Griseb.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, AMA, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith

Sin.: *Bignonia roseo-alba* Ridl., *Handroanthus odontodiscus* (Bureau & K. Schum.) Mattos, *Handroanthus piutinga* (Pilg.) Mattos, *Handroanthus roseo-albus* (Ridl.) Mattos, *Sparattosperma neurocalyx* Bureau & K. Schum., *Tabebuia odontodiscus* (Bureau & K. Schum.) Toledo, *Tabebuia papyrophloios* (Bureau & K. Schum.) Melch., *Tabebuia piutinga* (Pilg.) Sandwith, *Tecoma mattogrossensis* Kraenzl., *Tecoma odontodiscus* Bureau & K. Schum. var. *paraguariensis* Hassl., *Tecoma papyrophloios* Bureau & K. Schum., *Tecoma schumannii* Kraenzl.

Árbol. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Tanaecium Sw.**Tanaecium cyrtanthum** (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum.

Sin.: *Tanaecium brasiliense* Miers, *Tecoma cyrtantha* Mart. ex DC.

Arbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY, AMA, CON, SPE).

Tanaecium dichotomum (Jacq.) Kaehler & L.G. Lohmann

Sin.: *Adenocalymma friesianum* Kraenzl., *Arrabidaea acuminata* (J.R. Johnst.) Urb., *Arrabidaea barquisimetensis* Pittier, *Arrabidaea corallina* (Jacq.) Sandwith, *Arrabidaea guaricensis* Pittier, *Arrabidaea lenticellosa* Pittier, *Arrabidaea obliqua* (Kunth) Bureau, *Arrabidaea obliqua* (Kunth) Bureau var. *hirsuta* (DC.) Dugand, *Arrabidaea obovata* DC., *Arrabidaea ovalifolia* Pittier, *Arrabidaea praecox* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *glabrescens* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *mollis* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *puberula* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *subglabra* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *elliptica* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *genuina* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *induta* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *oxyphylla* Sprague & Sandwith, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *praecox* (Hassl.) Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *typica* Sprague, *Arrabidaea rotundata* (DC.) Bureau ex K. Schum., *Arrabidaea sickiana* J.C. Gomes, *Arrabidaea spraguei* Pittier, *Bignonia acuminata* J.R. Johnst., *Bignonia balbisiana* DC., *Bignonia balbisiana* DC. var. *glabra* DC., *Bignonia balbisiana* DC. var. *hirsuta* DC., *Bignonia boliviana* Rusby, *Bignonia columbiana* Morong, *Bignonia corallina* Jacq., *Bignonia dichotoma* Jacq., *Bignonia glabrata* Kunth, *Bignonia hibiscifolia* Cham., *Bignonia obliqua* Kunth, *Bignonia rotundata* DC., *Bignonia villosa* Bertero ex Spreng., *Cremastus*

balbisianus (DC.) Miers, *Cuspidaria hibiscifolia* (Cham.) Bureau, *Fridericia dichotoma* (Jacq.) L.G. Lohmann, *Fridericia dichotoma* (Jacq.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Panterpa dichotoma* (Jacq.) Miers, *Petastoma obliquum* (Kunth) Miers, *Piriadacus hibiscifolius* (Cham.) Pichon, *Tabebuia chapadensis* S. Moore

Liana. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE).

Tanaecium pyramidatum (Rich.) L.G. Lohmann

Sin.: *Adenocalymma densiflora* Rusby, *Arrabidaea dichasia* Donn. Sm., *Bignonia brachiata* Sessé & Moç., *Bignonia ehretioides* Cham., *Bignonia laurifolia* Vahl, *Bignonia lenta* Mart. ex DC., *Bignonia martiusiana* DC., *Bignonia pyramidata* Rich., *Bignonia rupestris* Gardner, *Bignonia sinclairii* Benth., *Bignonia striata* DC., *Memora lenta* (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum., *Pachygenium perrottetii* DC., *Pachyptera dasyantha* DC., *Pachyptera umbelliformis* DC., *Paragonia pyramidata* (Rich.) Bureau, *Paragonia pyramidata* (Rich.) Bureau var. *elliptica* Bureau, *Paragonia pyramidata* (Rich.) Bureau var. *tomentosa* Bureau & K. Schum., *Petastoma leiophyllum* Kraenzl., *Petastoma macrocalyx* Kraenzl., *Pithecoctenium reticulare* DC., *Tabebuia pyramidata* (Rich.) DC., *Zeyheria surinamensis* Miq.

Liana. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA). URY.

Tanaecium selloi (Spreng.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea dichotoma* Bureau, *Arrabidaea selloi* (Spreng.) Sandwith, *Bignonia coriacea* Sellow ex Steud., *Bignonia dichotoma* Vell., hom. illeg., *Bignonia selloi* Spreng., *Lundia hebantha* DC.

Liana. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(ART).

Tanaecium tetramerum (A.H. Gentry) Zuntini & L.G. Lohmann

Sin.: *Sphingiphila tetramera* A.H. Gentry
Arbolito. Nativa. 100-200 m.
Países: PRY(APY).

Tecoma Juss.

Tecoma capensis (Thunb.) Lindl.

Sin.: *Bignonia capensis* Thunb., *Ducoudraea capensis* Bureau, *Tecoma petersii* Klotzsch, *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach, *Tecomaria krebsii* Klotzsch, *Tecomaria petersii* Klotzsch

Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(COS).

Tecoma fulva (Cav.) D. Don subsp. **fulva**

Sin.: *Bignonia fulva* Cav., *Bignonia meyeniana* Schauer, *Stenolobium fulvum* (Cav.) Sprague, *Tecomaria fulva* (Cav.) Seem.

Arbusto. Nativa. 200-2300 m.

Países: CHL(TAR).

Tecoma fulva (Cav.) D. Don subsp. **garrocha** (Hieron.) J.R.I. Wood

Sin.: *Gelseminum garrocha* (Hieron.) Kuntze, *Gelseminum garrocha* (Hieron.) Kuntze var. *bicolor* Kuntze, *Stenolobium cochabambense* Herzog, *Stenolobium garrocha* (Hieron.) R.E. Fr., *Stenolobium guarracha* Hieron. ex Bureau & K. Schum., nom. nud., *Tecoma cochabambensis* Herzog, *Tecoma garrocha* Hieron.

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-2900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth var. **stans**

Sin.: *Bignonia frutescens* Mill., *Bignonia incisa* DC., nom. nud., *Bignonia sorbifolia* Salisb., *Bignonia stans* L., *Bignonia tecoma* Wehmer, *Bignonia tecomoides* DC., *Gelseminum stans* (L.) Kuntze, *Stenolobium incisum* Rose & Standl., *Stenolobium quinquejugum* Loes., *Stenolobium stans* (L.) Seem., *Stenolobium stans* (L.) Seem. var. *apiifolium* (DC.) Seem., *Stenolobium stans* (L.) Seem. var. *multijugum* R.E. Fr., *Stenolobium stans* (L.) Seem. var. *pinnatum* Seem., *Stenolobium tronadora* Loes., *Tecoma incisa* (Rose & Standl.) I.M. Johnst., *Tecoma sorbifolia* Kunth, *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *angustata* Rehder, *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *apiifolia* DC., *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *mollis* (Kunth) Siddiqi, *Tecoma tronadora* (Loes.) I.M. Johnst., *Tecoma velutina* Lindl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CEN).

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth var. **velutina** DC.

Sin.: *Gelseminum molle* (Kunth) Kuntze, *Stenolobium molle* (Kunth) Seem., *Tecoma fabrisii* T. Mey., *Tecoma mollis* Kunth

Arbusto o arbolito. Nativa. 1200-2100 m.

Países: ARG(SAL).

Tecoma tenuiflora (DC.) Fabris

Sin.: *Bignonia tenuiflora* DC., *Gelseminum amoenum* Kuntze, *Gelseminum amoenum* Kuntze var. *pubescens* Kuntze, *Gelseminum amoenum* Kuntze var. *tomentosum* Kuntze, *Stenolobium amoenum* (Kuntze) K. Schum.

Arbusto. Nativa. 1400-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Tourrettia Foug., nom. cons.

Tourrettia lappacea (L'Hér.) Willd.

Sin.: *Dombeya lappacea* L'Hér., *Tourrettia volubilis* J.F. Gmel., nom. illeg.

Enredadera. Nativa. 1000-2800 m.

Países: ARG(SAL).

Tynanthus Miers

Tynanthus cognatus (Cham.) Miers

Sin.: *Bignonia cognata* Cham., *Bignonia elegans* Cham., hom. illeg., *Schizopsis chimonanthe* Bureau ex Baill., *Schizopsis regnelliana* Bureau ex Baill., *Tynanthus elegans* Miers

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tynanthus micranthus Corr. Mélo ex K. Schum.

Liana. Nativa. 100-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, CAN).

Xylophragma Sprague

Xylophragma myrianthum (Cham. ex Steud.) Sprague

Sin.: *Bignonia myriantha* Cham. ex Steud., *Bignonia pratensis* Poepp. ex Bureau & K. Schum., *Rojasiophyton tuberculatum* Hassl., *Saldanhaea myriantha* (Cham. ex Steud.) Bureau, *Saldanhaea myriantha* (Cham. ex Steud.) Bureau var. *pubescens* Bureau, *Saldanhaea pratensis* Bureau & K. Schum., *Tecoma myriantha* DC., nom. nud., *Tecoma pratensis* Bureau & K. Schum., *Xylophragma myrianthum* (Cham. ex Steud.) Sprague var. *magnifolium* J.C. Gomes, *Xylophragma pratense* (Bureau & K. Schum.) Sprague
Liana. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Zeyheria Mart.

Zeyheria montana Mart.

Sin.: *Bignonia digitalis* Vell., *Jacaranda quinquefolia* Steud. ex DC., *Zeyheria digitalis* (Vell.) Hoehne & Kuhlman, *Zeyheria velloziana* Miers
Arbusto o subarbusto. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl.

Sin.: *Bignonia tuberculosa* Vell., *Jacaranda tuberculosa* Steud., *Zeyheria kuntzei* K. Schum.
Árbol. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

BIXACEAE

Bixa L.

Bixa orellana L.

Sin.: *Bixa americana* Poir., nom. illeg., *Bixa tinctoria* Salisb., nom. superfl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, PAI, PHA).

Cochlospermum Kunth

Cochlospermum regium (Schränk) Pilg.

Sin.: *Maximiliana regia* Schrank, *Maximiliana regia* Schrank var. *glaberrima* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).

Cochlospermum tetraporum Hallier f.

Sin.: *Cochlospermum argentinense* (Speg.) Hauman, *Cochlospermum zahlbruckneri* Osterm., *Maximiliana argentinensis* Speg., *Maximiliana tetrapora* (Hallier f.) S.F. Blake
Árbol. Nativa. 300-1300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

BORAGINACEAE

Amsinckia Lehm.

Amsinckia calycina (Moris) Chater

Sin.: *Amsinckia angustifolia* Lehm., *Amsinckia angustifolia* Lehm. var. *microcarpa* Speg., *Amsinckia angustifolia* Lehm. var.

pseudolycopsioides Clos, *Amsinckia basistaminea* Ces., *Amsinckia hispida* I.M. Johnst., *Amsinckia hispida* I.M. Johnst. var. *microcarpa* (Speg.) Brand, *Amsinckia pseudolycopsioides* (Clos) Speg., *Benthamia basistaminea* (Ces.) Druce, *Cryptantha spegazzinii* I.M. Johnst., *Lithospermum calycinum* Moris, *Lithospermum chilense* Colla, *Lithospermum hispidum* Ruiz & Pav., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Amsinckia tessellata A. Gray

Sin.: *Benthamia tessellata* (A. Gray) Druce
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(RME).

Anchusa L.

Anchusa officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Antiphytum DC. ex Meisn.

Antiphytum berroi (Arechav.) N. Mend. & Flores Oliv.

Sin.: *Myosotis berroi* Arechav.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

Antiphytum charruasorum N. Mend. & Marina Díaz

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(PAY, RNO).

Antiphytum cruciatum (Cham.) DC.

Sin.: *Anchusa cruciata* Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(CLA, MAL, RIV, TYT).

Asperugo L.

Asperugo procumbens L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Borago L.

Borago officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA). URY(CAS, FLA, MON).

Buglossoides Moench

Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst.

Sin.: *Lithospermum arvense* L., *Lithospermum officinale* Molfino, hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). CHL(AIS). URY(CAS, ROC).

Cordia L.

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken

Sin.: *Cerdana alliodora* Ruiz & Pav., *Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Oken f. *albotomentosa* Chodat, *Gerascanthus*

alliodorus (Ruiz & Pav.) M. Kuhlm. & Mattos, *Lithocardium alliodorum* (Ruiz & Pav.) Kuntze

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CON, GUA).

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Sin.: *Cordia patagonula* Aiton, *Patagonica americana* (L.) Kuntze, *Patagonula alba* Rojas Acosta, nom. nud., *Patagonula americana* L., *Patagonula americana* L. var. *glabra* Cham., *Patagonula americana* L. var. *hirsuta* Fresen., *Patagonula australis* Salisb., nom. superfl., *Patagonula fuscata* Rojas Acosta, nom. nud., *Patagonula glabra* (Cham.) Miers, *Patagonula tweediana* Miers

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, MON).

Cordia decandra Hook. & Arn.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cordia ecalyculata Vell.

Sin.: *Cordia leptocaula* Fresen., *Cordia salicifolia* Cham., *Gerascanthus salicifolius* (Cham.) Borhidi, *Lithocardium leptocaulon* (Fresen.) Kuntze, *Lithocardium salicifolium* (Cham.) Kuntze

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV).

Cordia glabrata (Mart.) A. DC.

Sin.: *Cordia glabrata* (Mart.) A. DC. var. *amambayensis* Chodat, *Cordia glabrata* (Mart.) A. DC. var. *longipeda* (Mez) Chodat, *Cordia glabrata* (Mart.) A. DC. var. *orbicularis* Chodat & Vischer, *Cordia longipeda* Mez, *Cordia longituba* Chodat & Vischer

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, PAI).

Cordia glazioviana (Taub.) Gottschling & J.S. Mill.

Sin.: *Auxemma glazioviana* Taub.

Árbol. Nativa. 200-600 m.

Países: PRY(APY).

Cordia magnoliifolia Cham.

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cordia rufescens A. DC.

Arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Cordia saccellia Gottschling & J.S. Mill.

Sin.: *Saccellium lanceolatum* Humb. & Bonpl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Cordia sellowiana Cham.

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Cordia silvestris Fresen.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cordia superba Cham.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cordia taguahyensis Vell.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

- Países: BRA(PAR).
- Cordia tarodae** M. Stapf
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Cordia trichotoma** (Vell.) Arráb. ex Steud.
Sin.: *Cordia chamissoniana* Steud. var. *aemilii* Chodat, *Cordia frondosa* Schott ex Spreng., *Cordia gerascanthus* Jacq., *Cordia hassleriana* Chodat, *Cordia hypoleuca* DC., *Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. ex Steud. f. *puberula* (Kuntze) I.M. Johnst., *Cordiada trichotoma* Vell., *Gerascanthus trichotoma* (Vell.) Kuhl. & Mattos, *Lithocardium gerascanthus* (L.) Kuntze var. *puberulum* Kuntze
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(COL, MON).
- Cordia weddellii** I.M. Johnst.
Sin.: *Cordia bordasii* Schinini
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, BOQ, NAS).
- Cortesia** Cav.
- Cortesia cuneifolia** Cav.
Sin.: *Cortesia microphylla* Miers, *Ehretia cortesia* Gottschling
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(COR, LRI, MEN, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
- Cryptantha** Lehm. ex G. Don
- Cryptantha alfalfalis** (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium alfalfalis* Phil., *Eritrichium rigidum* Phil.
Hierba. Endémica. 700-1100 m.
Países: CHL(LBO, RME).
- Cryptantha alyssoides** (A. DC.) Reiche
Sin.: *Cryptantha talquina* (Phil.) Brand, *Eritrichium alyssoides* A. DC., *Eritrichium gilliesii* Phil., *Eritrichium talquinum* Phil.
Hierba. Endémica. 1500-2700 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).
- Cryptantha aprica** (Phil.) Reiche
Sin.: *Cryptantha candelabrum* Brand, *Eritrichium apricum* Phil., *Eritrichium bridgesii* Phil., *Eritrichium closii* Phil., *Eritrichium denudatum* Phil., *Eritrichium lignosum* Phil., *Eritrichium renjifoanum* Phil.
Hierba. Endémica. 400-2400 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).
- Cryptantha argentea** I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).
- Cryptantha aspera** (Phil.) Grau
Sin.: *Eritrichium asperum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Cryptantha calycina** (Phil.) Reiche
Sin.: *Eritrichium calycinum* Phil.
Hierba. Endémica. 3100-3800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).
- Cryptantha calycotricha** I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Cryptantha capituliflora** (Clos) Reiche
Sin.: *Cynoglossospermum capituliflorum* (Clos) Kuntze, *Eritrichium capituliflorum* Clos, *Eritrichium cephalanthum* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).
- Cryptantha chaetocalyx** (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Cryptantha divaricata* (Phil.) Reiche, *Eritrichium chaetocalyx* Phil., *Eritrichium divaricatum* Phil., *Eritrichium pustulosum* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA).
- Cryptantha chispae** Grau
Sin.: *Eritrichium affine* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ).
- Cryptantha cynoglossoides** (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium cynoglossoides* Phil., *Eritrichium uspalatense* Phil.
Hierba. Endémica. 700-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ).
- Cryptantha dichita** (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium dichita* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).
- Cryptantha diffusa** (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Cryptantha borchersii* (Phil.) Hauman, *Cryptantha debilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha famatinae* Brand, *Eritrichium borchersii* Phil., *Eritrichium debile* Phil., *Eritrichium diffusum* Phil., *Eritrichium micranthum* Phil., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 2000-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Cryptantha dimorpha (Phil.) Greene

Sin.: *Eritrichium dimorphum* Phil.

Hierba. Endémica. 600-2000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Cryptantha dolichophylla (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium dolichophyllum* Phil.

Hierba. Endémica. 100-1200 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Cryptantha filaginea (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium filagineum* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cryptantha filiformis (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium filiforme* Phil., *Eritrichium mite* Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(TAR, ANT, COQ).

Cryptantha gayi I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Cryptantha globulifera (Clos) Reiche

Sin.: *Cryptantha floribunda* Reiche, *Cryptantha oligantha* (Phil.) Reiche, *Cryptantha parvula* (Phil.) Brand, *Eritrichium carrizalense* Phil., *Eritrichium floribundum* Phil., hom. illeg., *Eritrichium glareosum* Phil., *Eritrichium globuliferum* Clos, *Eritrichium oliganthum* Phil., *Eritrichium parvulum* Phil., *Eritrichium sphaerophorum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME).

Cryptantha glomerata Lehm. ex G. Don subsp. **glomerata**

Sin.: *Cryptantha candolleana* Brand, *Cryptantha clandestina* (Trevir.) I.M. Johnst., *Cryptantha philippiana* Brand,

Eritrichium diplasianthum Phil., *Eritrichium foliosum* Phil., *Eritrichium longisetum* Phil., *Eritrichium strictum* Phil., *Lithospermum clandestinum* Trevir.

Hierba. Endémica. 0-2800 m.

Países: CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Cryptantha glomerata Lehm. ex G. Don subsp. **quadrinuculata** Grau

Sin.: *Cryptantha vidalii* (Phil.) Reiche, *Eritrichium vidalii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Cryptantha glomerulifera (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium glomeruliferum* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, RME).

Cryptantha gnaphalioides (A. DC.) Reiche

Sin.: *Eritrichium fruticosum* Phil., *Eritrichium gnaphalioides* A. DC.

Hierba. Endémica. 0-2900 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cryptantha haplostachya (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium haplostachyum* Phil.

Hierba. Endémica. 200 m.

Países: CHL(ATA).

Cryptantha hispida (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium hispidum* Phil.

Hierba. Endémica. 2700-3800 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Cryptantha involucrata (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium involucratum* Phil.

Hierba. Endémica. 1300-3500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Cryptantha latefissa R.L. Pérez-Mor.

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(SJU).

Cryptantha limensis (A. DC.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium limense* A. DC.

Hierba. Nativa. 3700-3900 m.

Países: CHL(ANT).

Cryptantha linearis (DC.) Greene

Sin.: *Cryptantha fallax* (Phil.) Reiche, *Cryptantha gracilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha minutiflora* (Phil.) Brand, *Eritrichium fallax* Phil., *Eritrichium gracile* Phil., *Eritrichium lineare* DC., *Eritrichium minutiflorum* Phil., *Myosotis linearis* Colla, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Cryptantha longifolia Reiche

Sin.: *Eritrichium longifolium* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Cryptantha macrocalyx (Phil.) Reiche

Sin.: *Cryptantha kingii* (Phil.) Reiche, *Cryptantha virens* (Phil.) Reiche, *Eritrichium kingii* Phil., *Eritrichium macrocalyx* Phil., *Eritrichium virens* Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Cryptantha marioricardiana Teillier

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(ATA).

Cryptantha maritima Greene var. **pilosa** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(MEN, SJU).

Cryptantha marticorenae Grau
Hierba. Endémica. 300-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Cryptantha mendocina I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(LPA, MEN, SLU).

Cryptantha papillosa R.L. Pérez-Mor.
Hierba. Endémica. 2200-2300 m.
Países: ARG(NEU).

Cryptantha patagonica (Speg.) I.M. Johnst.

Sin.: *Amsinckia patagonica* Speg.,
Cynoglossospermum humile (A. DC.)
Kuntze
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU,
RNE, SJU, SCR).

Cryptantha phaceloides (Clos) Reiche
Sin.: *Eritrichium phaceloides* Clos
Hierba. Endémica. 3200-3400 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Cryptantha romanii I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Cryptantha spathulata Reiche
Sin.: *Eritrichium spathulatum* Phil., hom.
illeg.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO).

Cryptantha subamplexicaulis (Phil.)
Reiche
Sin.: *Eritrichium subamplexicaule* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Cryptantha taltalensis I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cryptantha volckmannii (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Cryptantha chrysantha* (Phil.)
Reiche, *Eritrichium chrysanthum* Phil.,
Eritrichium volckmannii Phil.
Hierba. Endémica. 600-2900 m.
Países: CHL(COQ).

Cryptantha werdermanniana I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 2200-2400 m.
Países: CHL(ANT).

Cynoglossum L.

Cynoglossum amabile Stapf & J.R. Drumm.
Hierba. Introducida. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
TUC).

Cynoglossum creticum Mill.
Sin.: *Cynoglossum molle* Phil.,
Cynoglossum pictum Sol.
Hierba. Introducida. 500-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,
RNE, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,
RME, JFE).

Cynoglossum zeylanicum (Vahl ex
Hornem.) Thunb. ex Lehm.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(MAU, ARA, LLA).

Echium L.

Echium creticum L.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS)-

Echium plantagineum L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,
ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, SAL, SLU,
SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).
URY(ART, MON).

Echium vulgare L. var. vulgare

Sin.: *Echium vulgare* L. var. *wierzbickii*
(Haberle ex Rchb.) Coste, *Echium*
wierzbickii Haberle ex Rchb.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Euploca Nutt.

Euploca aurata (Phil.) M.W. Frohl.
Sin.: *Heliotropium auratum* Phil.
Hierba. Endémica. 800-3800 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL,
SJU, TUC).

Euploca campestris (Griseb.) Diane &
Hilger

Sin.: *Heliotropium andinum* Rusby,
Heliotropium campestre Griseb.
Hierba. Nativa. 400-2800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU,
SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ).

Euploca catamarcensis (I.M. Johnst.)
M.W. Frohl.

Sin.: *Heliotropium catamarcense* I.M.
Johnst.
Hierba. Endémica. 500-800 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Euploca cerroleonensis (R. Degen)) R.
Degen

Sin.: *Heliotropium cerroleonense* R.
Degen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CHO).

Euploca chrysantha (Phil.) Diane & Hilger

Sin.: *Heliotropium chrysanthum* Phil.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU).

Euploca distantiflora (I.M. Johnst.) J.I. M. Melo & R. Degen

Sin.: *Heliotropium distantiflorum* I.M. Johnst.
Hierba. Endémica.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, PAI).

Euploca dunaensis (R. Degen) R. Degen

Sin.: *Heliotropium dunaense* R. Degen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

Euploca filiformis (Lehm.) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium filiforme* Lehm., *Heliotropium tenue* Willd.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). PRY(AMA, CAN, PAI). URY(ART).

Euploca krapovickasii J.I. M. Melo & Semir

Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS). URY(SAO, TAC).

Euploca margaritensis (I.M. Johnst.) J.I. M. Melo & R. Degen

Sin.: *Heliotropium margaritense* Hassl. ex I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Euploca mendocina (Phil.) Diane & Hilger

Sin.: *Heliotropium mendocinum* Phil.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Euploca ocellata (Cham.) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium ocellatum* Cham., *Schleidenia ocellata* (Cham.) Fresen.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(SPE). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

Euploca pallescens (I.M. Johnst.) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium pallescens* I.M. Johnst.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger

Sin.: *Heliotropium inundatum* Sw., *Heliotropium inundatum* Sw. f. *ellipticum* Chodat & Hassl., *Heliotropium inundatum* Sw. f. *pusillum* Hassl., *Heliotropium inundatum* Sw. var. *chacoense* R.E. Fr., *Heliotropium procumbens* Mill., *Heliotropium riparium* Mart. ex Colla
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, SAO, SJO, TYT).

Euploca salicoides (Cham.) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Euploca hassleriana* (Chodat) J.I. M. Melo & Semir, *Euploca maxima* (Chodat & Hassl.) M.W. Frohl. & M.W. Chase, *Heliotropium clausenii* A.DC., *Heliotropium clausenii* A.DC. f. *robustior* Chodat, *Heliotropium hasslerianum* Chodat, *Heliotropium hispidum* Kunth var. *maximum* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Heliotropium*

maximum Chodat & Hassl., *Heliotropium salicoides* Cham., *Schleidenia salicoides* (Cham.) Fresen.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAN, COA, PAI, PHA, SPE).

Greeneocharis Gürke & Harms

Greeneocharis circumscissa (Hook. & Arn.) Rydb.

Sin.: *Cryptantha circumscissa* (Hook. & Arn.) I.M. Johnst., *Lithospermum circumscissum* Hook. & Arn.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(MEN, NEU).

Hackelia Opiz

Hackelia revoluta (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Sin.: *Cynoglossum fiebrigii* Krause, *Cynoglossum ovatifolium* Griseb., *Cynoglossum revolutum* Ruiz & Pav., *Lappula revoluta* (Ruiz & Pav.) Brand, *Lappula revoluta* (Ruiz & Pav.) Brand f. *fiebrigii* (Krause) Brand, *Lappula revoluta* (Ruiz & Pav.) Brand f. *ovatifolia* (Griseb.) Brand
Hierba. Nativa. 1500-3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Heliotropium L.

Heliotropium abbreviatum Rusby

Hierba. Nativa. 2600-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Heliotropium amplexicaule Vahl

Sin.: *Cochranea anchusifolia* (Poir.)
 Gürke, *Cochranea anchusifolia* (Poir.)
 Gürke var. *latifolia* (DC.) Hicken,
Cochranea anchusifolia (Poir.) Gürke
 var. *latifolia* (DC.) Hicken, *Heliophytum*
amplexicaule (Vahl) Britton & P.
 Wilson, *Heliophytum anchusifolium*
 (Poir.) DC. var. *angustifolium* DC.,
Heliophytum lithospermifolium DC.,
Heliotropium anchusifolium Poir.,
Heliotropium anchusifolium Poir. var.
angustifolium (DC.) Kuntze f.
grandiflorum Kuntze, *Heliotropium*
anchusifolium Poir. var. *angustifolium*
 (DC.) Kuntze f. *medium* Kuntze,
Heliotropium anchusifolium Poir. var.
latifolium (DC.) Kuntze f. *parviflorum*
 Kuntze, *Heliotropium anchusifolium*
 Poir. var. *lithospermifolium* (DC.)
 Griseb., *Heliotropium lithospermifolium*
 (DC.) Speg., *Tournefortia sessilifolia*
 Poir.
 Hierba o subarbusto. Nativa. 100-1800
 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,
 MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU,
 SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
 CHL(RME). URY(CAS, COL, CLA,
 LAV, MON, RNO, SJO, TAC).

Heliotropium angiospermum Murray

Sin.: *Heliotropium parviflorum* L.,
Heliotropium simplex Meyen
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA).
 Notas: Cita dudosa para la Flora de
 Chile (Luebert, 2020; Gayana, Bot.
 77[2]: 115-138)

Heliotropium chenopodiaceum (A. DC.)

Clos var. **chenopodiaceum**
 Sin.: *Cochranea chenopodiacea* (A. DC.)
 Miers, *Heliophytum chenopodiaceum*
 A. DC.

Arbusto. Endémica. 200-1700 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Heliotropium chenopodiaceum (A. DC.)

Clos var. **ericoideum** (Miers) Reiche
 Sin.: *Cochranea ericoidea* Miers,
Eritrichium glabratum Phil.,
Heliotropium pearcei Phil.
 Arbusto. Endémica. 0-2300 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Heliotropium corymbosum Ruiz & Pav.

var. **grisellum** (I.M. Johnst.) Luebert
 Sin.: *Heliotropium arborescens* L. var.
grisellum I.M. Johnst.
 Arbusto. Nativa. 200-3300 m.
 Países: CHL(AYP).

Heliotropium curassavicum L. var. **curassavicum**

Sin.: *Heliotropium chilense* Bertero, nom.
 nud., *Heliotropium curassavicum* L.
 var. *argentum* I.M. Johnst.,
Heliotropium curassavicum L. var.
genuinum I.M. Johnst., nom. inval.,
Heliotropium curassavicum L. var.
parviflorum Ball
 Hierba. Nativa. 0-2000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
 COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ,
 LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL,
 SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
 BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT,
 ATA, COQ, VAL, LBO, RME).
 PRY(APY, BOQ, CEN, PHA).
 URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).

Heliotropium curassavicum L. var. **fruticulosum** I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémica. 400-2500 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL,
 SJU).

Heliotropium elongatum (Lehm.) Hoffm.
ex Roem. & Schult.

Sin.: *Tiaridium elongatum* Lehm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
 JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN,
 COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).
 URY(ART, CLA, PAY, SAO).

Heliotropium eremogenum I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.
 Países: CHL(TAR, ANT).

Heliotropium filifolium (Miers) I.M. Johnst.

Sin.: *Cochranea filifolia* Miers, *Cochranea*
kingii Phil., *Heliotropium*
chenopodiaceum (A. DC.) Clos var.
filifolium (Miers) Reiche, *Heliotropium*
kingii (Phil.) Reiche
 Arbusto. Endémica. 0-400 m.
 Países: CHL(ATA).

Heliotropium floridum (A. DC.) Clos

Sin.: *Cochranea florida* (A. DC.) Miers,
Heliophytum floridum A.DC.,
Heliotropium floridum (A. DC.) Clos
 var. *latifolium* Phil.
 Arbusto. Endémica. 0-600 m.
 Países: CHL(ANT, ATA).

Heliotropium funkiae Feuillet

Sin.: *Tournefortia bicolor* Sw.
 Arbusto. Nativa. 0-900 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(CAN).

Heliotropium geissei F. Phil. ex Phil.

Hierba. Endémica. 1000-1200 m.
 Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,
 RME).

Heliotropium glutinosum Phil.

Sin.: *Cochranea glutinosa* (Phil.) Phil.
 Arbusto. Endémica. 1100-1500 m.
 Países: CHL(ATA).

Heliotropium inconspicuum Reiche

Sin.: *Cochranea parviflora* Phil.

Arbusto. Endémica. 1000-1200 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Heliotropium indicum L.

Sin.: *Heliophytum indicum* (L.) DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, MIE, ÑEE, PHA). URY(ART, CLA).

Heliotropium jaffuelii I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT).

Heliotropium johnstonii Ragonese

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, SJU, SDE).

Heliotropium krauseanum Fedde

Arbusto. Nativa. 700 m.

Países: CHL(TAR).

Heliotropium kurtzii Gangui

Hierba. Endémica.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

Heliotropium leiocarpum Morong

Sin.: *Heliotropium leiocarpum* Morong f. *albiflorum* Chodat & Hassl., *Heliotropium leiocarpum* Morong f. *minor* Chodat, nom. nud.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Heliotropium lilloi (I.M. Johnst.) Luebert

Sin.: *Heliotropium lilloi* (I.M. Johnst.) J.I. M. Melo, comb. superfl., *Tournefortia lilloi* I.M. Johnst.

Arbusto. Nativa. 500-1800 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Heliotropium liniifolium Phil.

Sin.: *Heliotropium linearifolium* F. Phil., *Heliotropium longiflorum* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Heliotropium longistylum Phil.

Sin.: *Cochranea longistyla* (Phil.) Phil., *Heliotropium vernicosum* Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Heliotropium megalanthum I.M. Johnst.

Sin.: *Cochranea corymbosa* Miers, *Cochranea crassifolia* Phil., *Heliotropium corymbosum* (Miers) Reiche, *Heliotropium crassifolium* Phil., hom. illeg.

Hierba o arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Heliotropium microstachyum Ruiz & Pav.

Sin.: *Coldenia phaenocarpa* Phil., *Heliophytum brachystachyum* DC., *Heliotropium brachystachyum* (DC.) Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-4100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR).

Heliotropium myosotifolium (A. DC.) Reiche

Sin.: *Cochranea hebecula* Miers, *Cochranea hispidula* Miers, *Cochranea myosotifolia* (A. DC.) Miers, *Cochranea sentis* Phil., *Heliophytum stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *myosotifolium* A.DC., *Heliotropium canum* Phil., *Heliotropium hispidulum* (Miers) Reiche, *Heliotropium hispidulum* Phil., *Heliotropium stenophyllum* Hook. & Arn. var. *myosotifolium* (A. DC.) Clos

Arbusto. Endémica. 0-2400 m.

Países: CHL(TAR, ATA).

Heliotropium nicotianifolium Poir.

Sin.: *Heliophytum sidifolium* (Cham.) DC., *Heliotropium sidifolium* Cham., *Tournefortia heliotropioides* Hook.

Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(COA, PAI). URY(COL, FLA, PAY, RNO, SJO, SOR).

Heliotropium paronychioides A. DC.

Hierba. Endémica. 100-4000 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Heliotropium patagonicum (Speg.) I.M. Johnst.

Sin.: *Valentina patagonica* Speg., *Valentiniella patagonica* (Speg.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Heliotropium philippianum I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Heliotropium phylicoides Cham.

Sin.: *Heliophytum phylicoides* (Cham.) DC., *Heliotropium phylicoides* Cham. f. *luciliaefolium* Arechav.

Subarbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, COL, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC).

Heliotropium pinnatisectum R.L. Pérez-Mor.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU).

Heliotropium pycnophyllum Phil.

Sin.: *Cochranea pycnophylla* (Phil.) Phil.
ex Reiche, *Heliotropium breanum*
Phil., *Heliotropium brevifolium* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Heliotropium ruiz-lealii I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(SJU).

Heliotropium schreiteri I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,
LRI, SAL, SJU, SDE). PRY(APY,
PHA).

Heliotropium sclerocarpum Phil.

Sin.: *Cochranea sclerocarpa* (Phil.) Phil.,
Heliotropium chenopodiaceum (A.
DC.) Clos var. *sclerocarpum* (Phil.)
Reiche
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ATA).

Heliotropium sinuatum (Miers) I.M. Johnst.

Sin.: *Cochranea sinuata* Miers,
Heliotropium izagae Phil., *Heliotropium*
rosmarinifolium Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
COQ).

Heliotropium stenophyllum Hook. & Arn.

Sin.: *Cochranea conferta* Miers, nom.
nud., *Cochranea congesta* Miers,
Cochranea stenophylla (Hook. & Arn.)
Miers, *Heliotropium stenophyllum*
(Hook. & Arn.) A. DC., *Heliotropium*
huascoense I.M. Johnst., *Heliotropium*
rosmarinifolium Bertero ex DC.,
Heliotropium stenophyllum (Hook. &
Arn.) A. DC. var. *rosmarinifolium* Clos,
Meladendron chilense Molina

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Heliotropium taltalense (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Cochranea rugosa* Phil., *Cochranea*
taltalensis Phil., *Heliotropium rugosum*
Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Heliotropium transalpinum Vell.

Sin.: *Heliotropium monostachyum* Cham.,
Heliotropium monostachyum Cham.
var. *tiaridioides* (Cham.) Chodat,
Heliotropium tiaridioides Cham.,
Heliotropium tiaridioides Cham. var.
genuina I.M. Johnst., nom. inval.,
Heliotropium tiaridioides Cham. var.
schizocarpum I.M. Johnst.,
Heliotropium transalpinum Vell. var.
arcanum Di Fulvio & Ariza,
Heliotropium transalpinum Vell. var.
tiaridioides (Cham.) I.M. Johnst.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE,
PAI). URY(ART, SAO).

Heliotropium veronicifolium Griseb.

Sin.: *Heliotropium repens* Griseb.,
Heliotropium repens Griseb. var.
medium Kuntze, *Heliotropium repens*
Griseb. var. *stenophyllum* Kuntze,
Heliotropium salsum Griseb.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,
JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC).
PRY(APY, CON).

Ixorhea Fenzl**Ixorhea tschudiana** Fenzl

Sin.: *Oxyosmyles viscosissima* Speg.
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(SAL, TUC).

Johnstonella Brand**Johnstonella albida** (Kunth) M.E. Mabry & M.G. Simpson

Sin.: *Cryptantha albida* (Kunth) I.M.
Johnst., *Cryptantha argentinica* Brand,
Cryptantha falcata (Hieron.) I.M.
Johnst., *Eritrichium falcatum* Hieron.,
Myosotis albida Kunth
Hierba. Nativa. 300-4200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
SAL).

Johnstonella diplotricha (Phil.) Hasenstab & M.G. Simpson

Sin.: *Cryptantha axillaris* (Phil.) Reiche,
Cryptantha capituliflora (Clos) Reiche
var. *compacta* Brand, *Cryptantha*
diplotricha (Phil.) Reiche, *Cryptantha*
diplotricha (Phil.) Reiche var. *humilis*
(Phil.) Reiche, *Cryptantha hossei*
Brand, *Cryptantha modesta* Brand,
Eritrichium axillare Phil., *Eritrichium*
diplotrichum Phil., *Eritrichium*
diplotrichum Phil. var. *humilis* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI,
MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR).

Johnstonella parviflora (Phil.) Hasenstab & M.G. Simpson

Sin.: *Cryptantha microphylla* (Phil.)
Reiche, *Cryptantha parviflora* (Phil.)
Reiche, *Eritrichium microphyllum* Phil.,
Eritrichium parviflorum Phil.
Hierba. Nativa. 0-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Johnstonella punensis M.G. Simpson & Muñoz-Schick

Hierba. Endémica. 2800-3500 m.
Países: CHL(ANT).

Lappula Moench

Lappula redowskii (Hornem.) Greene

Sin.: *Echinosperrum desertorum* (Greene) K. Schum., *Echinosperrum patagonicum* Speg., *Echinosperrum redowskii* (Hornem.) Lehm., *Echinosperrum redowskii* (Hornem.) Lehm. var. *occidentale* S. Watson, *Echinosperrum texanum* Scheele, *Lappula desertorum* Greene, *Lappula inconspicua* Brand, *Lappula patagonica* (Speg.) Macloskie & Dusén, *Lappula redowskii* (Hornem.) Greene var. *desertorum* (Greene) I.M. Johnst., *Lappula redowskii* (Hornem.) Greene var. *occidentalis* (S. Watson) Rydb., *Lappula redowskii* (Hornem.) Greene var. *texana* (Scheele) Brand, *Lappula texana* (Scheele) Britton, *Myosotis redowskii* Hornem.
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR). CHL(MAG).

Lithospermum L.

Lithospermum officinale L.

Hierba. Introducida. 800-800 m.
Países: ARG(NEU).

Lycopsis L.

Lycopsis arvensis L.

Sin.: *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb.
Hierba. Introducida. 500-1500 m.
Países: ARG(COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).

Moritzia DC. ex Meisn.

Moritzia ciliata (Cham.) DC. ex Meisn.

Sin.: *Anchusa ciliata* Cham.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(RGS).

Moritzia dusenii I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myosotis L.

Myosotis albiflora Banks & Sol. ex Hook. f.

Sin.: *Allocarya albiflora* (Banks & Sol. ex Hook. f.) Greene, *Eritrichium albiflorum* (Banks & Sol. ex Hook. f.) Griseb., *Exarrhena albiflora* (Banks & Sol. ex Hook. f.) O.D. Nikif.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Myosotis antarctica Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(MAG).

Myosotis arvensis (L.) Hill

Sin.: *Myosotis scorpioides* L. var. *arvensis* L.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, TDF, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME, JFE).

Myosotis azorica H.C. Watson ex Hook.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(LLA).

Myosotis discolor Pers. subsp.

canariensis (Pit.) Grau
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(AIS, MAG).

Myosotis discolor Pers. subsp. **discolor**

Sin.: *Myosotis arvensis* (L.) Hill var. *versicolor* Pers., *Myosotis versicolor* (Pers.) Sm.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(TAR, MAU, ARA, LSR, MAG).

Myosotis latifolia Poir.

Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, LSR, LLA, AIS, JFE). URY(MON).

Myosotis laxa Lehm.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE). BRA(PAR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE).

Myosotis ramosissima Rochel

Hierba. Introducida.
Países: CHL(MAG).

Myosotis scorpioides L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.

Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(JFE).

Myosotis verna Nutt.

Sin.: *Eritrichium pampeanum* Speg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE, SCR, TDF).

Myriopus Small

Myriopus breviflorus (DC.) LuebertSin.: *Tournefortia breviflora* DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CEN, PAI). URY(CLA, ROC).**Myriopus gardneri** (A. DC.) J.I.M. MeloSin.: *Tournefortia gardneri* A. DC.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myriopus membranaceus (A. DC.) J.I.M.

Melo

Sin.: *Tournefortia membranacea*
(Gardner) DC.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myriopus paniculatus Cham. var.
austrinus (I.M. Johnst.) LuebertSin.: *Tournefortia paniculata* Cham. var.
austrina I.M. Johnst.

Arbusto. Nativa.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
SDE, TUC).**Myriopus paniculatus** (Cham.) Feuillet
var. **paniculatus**Sin.: *Tournefortia brachiata* A. DC.,
Tournefortia elegans Cham.,
Tournefortia paniculata Cham., hom.
illeg.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS). PRY(APY, AMA, CAA, CAN,
CEN, CON, COA, GUA, ITA, SPE).
URY(SAO).**Myriopus rubicundus** (Salzm. ex DC.)
LuebertSin.: *Tournefortia rubicunda* Salzm. ex
DC.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
APY, BOQ, CAA, CAN, CEN, CON,
COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).**Myriopus salicifolius** (Gardner) J.I.M.
MeloSin.: *Messerschmidia salicifolia*
Gardner, *Tournefortia salicifolia*
(Gardner) DC.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Myriopus salzmännii (DC.) Diane &
HilgerSin.: *Tournefortia salzmännii* DC.,
Tournefortia salzmännii DC. var.
blanchetiana Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
SAL). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN,
COA, ÑEE, PAI, PHA).**Myriopus villosus** (Salzm. ex DC.) J.I. M.
MeloSin.: *Tournefortia villosa* Salzm. ex DC.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Nesocaryum I.M. Johnst.**Nesocaryum stylosum** (Phil.) I.M.
Johnst.Sin.: *Heliotropium stylosum* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(IDE).

Omphalodes Mill.**Omphalodes linifolia** (L.) MoenchSin.: *Cynoglossum linifolium* L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(ARA).

Pectocarya DC. ex Meisn.**Pectocarya anomala** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 2300-2600 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Pectocarya boliviana (I.M. Johnst.) I.M.
Johnst.Sin.: *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M.
Johnst. var. *boliviana* I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Pectocarya dimorpha (I.M. Johnst.) I.M.
Johnst.Sin.: *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M.
Johnst. var. *dimorpha* I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.) DC.Sin.: *Cynoglossum lineare* Ruiz & Pav.,
Pectocarya chilensis DC., *Pectocarya*
gracilis (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.,
Pectocarya lateriflora (Lam.) DC.,
Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.) DC.
var. *ferocula* I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,
NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT,
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, AIS,
RME).**Pectocarya pusilla** (A. DC.) A. GraySin.: *Gruvelia pusilla* A. DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(VAL, LBO).

Plagiobothrys Fisch. & C.A. Mey.**Plagiobothrys armeriifolius** (Phil.) I.M.
Johnst.Sin.: *Eritrichium armeriifolius* Phil.

Hierba. Endémica.

- Países: CHL(LBO).
- Plagiobothrys calandrinoides** (Phil.) I.M. Johnst.
 Sin.: *Allocarya alternifolia* Brand, *Eritrichium albiflorus* Griseb., *Eritrichium calandrinoides* Phil., *Eritrichium nubigenum* Phil. ex F. Meigen, *Plagiobothrys albiflorus* (Griseb.) R.L. Pérez-Mor. ex D.M. Moore, *Plagiobothrys lechleri* I.M. Johnst.
 Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(VAL, MAG, RME).
- Plagiobothrys collinus** (Phil.) I.M. Johnst.
 Sin.: *Cryptantha collina* (Phil.) Reiche, *Cryptantha inconspicua* (Phil.) Reiche, *Eritrichium collinum* Phil., *Eritrichium inconspicuum* Phil.
 Hierba. Endémica. 100-500 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL).
- Plagiobothrys congestus** (Wedd.) I.M. Johnst.
 Sin.: *Eritrichium humile* (Ruiz & Pav.) DC. var. *congestum* Wedd.
 Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, SJU, TUC).
- Plagiobothrys corymbosus** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
 Sin.: *Allocarya capillata* (Clos) Brand, *Allocarya corymbosa* (Ruiz & Pav.) Brand, *Allocarya sessiliflora* (DC.) Greene, *Allocarya sessiliflora* (DC.) Greene var. *nubigena* Phil. ex Reiche, *Allocarya tenuifolia* (A. Gray) Green, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex A. Gray) Greene var. *pulchella* (Phil.) Reiche, *Cryptantha corymbosa* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Eritrichium humile* (Ruiz & Pav.) DC. var. *capitatum* Clos,
- Eritrichium sessiliflorum* DC., *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex A. Gray, *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex A. Gray var. *pulchellum* Phil., *Myosotis corymbosa* Ruiz & Pav., *Plagiobothrys tenuifolius* (Schlecht. ex A. Gray) I.M. Johnst.
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).
- Plagiobothrys foliosus** I.M. Johnst.
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(BIO, ARA).
- Plagiobothrys germainii** (Phil.) I.M. Johnst.
 Sin.: *Allocarya germainii* (Phil.) Reiche, *Eritrichium germainii* Phil.
 Hierba. Endémica. 200-300 m.
 Países: CHL(BIO, ARA).
- Plagiobothrys gracilis** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
 Sin.: *Echinosperrum gracile* (Ruiz & Pav.) Lehm., *Myosotis gracilis* Ruiz & Pav., *Rochelia gracilis* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(COQ, MAU, BIO, MAG, RME).
- Plagiobothrys muricatus** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
 Sin.: *Allocarya muricata* (Ruiz & Pav.) Reiche, *Eritrichium fulvum* (Hook. & Arn.) A. DC., *Eritrichium fulvum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *pinguis* Phil., *Eritrichium laxiflorum* Phil., *Eritrichium muricatum* (Ruiz & Pav.) A. DC., *Lithospermum muricatum* Ruiz & Pav., *Myosotis fulva* Hook. & Arn., *Plagiobothrys fulvus* (Hook. & Arn.) I.M. Johnst., *Plagiobothrys rufescens* Fisch. & C.A. Mey., *Plagiobothrys*
- rufescens* Fisch. & C.A. Mey. var. *laxiflorus* (Phil.) Reiche
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
- Plagiobothrys myosotoides** (Lehm.) Brand
 Sin.: *Eritrichium pugae* Phil., *Eritrichium tinctorium* A. DC., *Lithospermum myosotoides* Lehm., *Plagiobothrys tinctorius* A. Gray
 Hierba. Nativa. 0-3500 m.
 Países: CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Plagiobothrys oppositifolius** (Phil.) I.M. Johnst.
 Sin.: *Eritrichium cinereum* Phil., *Eritrichium limonium* Phil., *Eritrichium oppositifolium* Phil.
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(ARA).
- Plagiobothrys pedicellaris** (Phil.) I.M. Johnst.
 Sin.: *Allocarya capitata* (Clos) Brand var. *longipes* (Phil.) Brand, *Allocarya pedicellaris* (Phil.) Reiche, *Allocarya tenuifolia* A. Gray var. *longipes* (Phil.) Reiche, *Eritrichium pedicellare* Phil., *Eritrichium tenuifolium* A. Gray var. *longipes* Phil.
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(BIO, ARA).
- Plagiobothrys polycaulis** (Phil.) I.M. Johnst.
 Sin.: *Eritrichium bracteatum* Phil., *Eritrichium delicatulum* Phil., *Eritrichium flavicans* Phil., *Eritrichium graminifolium* Phil., *Eritrichium polycaulis* Phil., *Eritrichium vernum* Phil.
 Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Plagiobothrys pratensis (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium pratense* Phil.
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Plagiobothrys procumbens (Colla) A. Gray

Sin.: *Allocarya procumbens* (Colla) Greene, *Eritrichium illapelinum* Phil., *Eritrichium tenuicaule* Phil., *Myosotis procumbens* Colla
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Plagiobothrys pulchellus (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium pulchellum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Plagiobothrys uliginosus (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya uliginosa* (Phil.) Greene, *Eritrichium uliginosum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Plagiobothrys verrucosus (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium verrucosum* Phil., *Plagiobothrys myosotoides* (Lehm.) Brand var. *patagonicus* (I.M. Johnst.) Brand, *Plagiobothrys patagonicus* I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, LLA, AIS, RME).

Selkirkia Hemsl.

Selkirkia berteroi (Colla) Hemsl.

Sin.: *Cynoglossum berteroi* Colla
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(JFE).

Selkirkia limensis (Willd.) Holstein & Weigend

Sin.: *Cynoglossum alatum* Molina, nom. superfl., *Cynoglossum decurrens* Ruiz & Pav., *Cynoglossum limense* Willd.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Selkirkia pauciflora (Ruiz & Pav.) Holstein & Weigend

Sin.: *Cynoglossum azocarti*, *Cynoglossum paniculatum* Hook. & Arn., *Cynoglossum paniculatum* Hook. & Arn. f. *philippianum* Brand, *Cynoglossum paniculatum* Hook. & Arn. var. *azocartii* (Phil.) Reiche, *Cynoglossum pauciflorum* Ruiz & Pav.
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Symphytum L.

Symphytum officinale L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA).

Thaumatocaryon Baill.

Thaumatocaryon dasyanthum (Cham.) I.M. Johnst.

Sin.: *Anchusa dasyantha* Cham.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Thaumatocaryon sellowianum (Cham.) I.M. Johnst.

Sin.: *Thaumatocaryon dasyanthum* var. *sellowianum* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Thaumatocaryon tetraquetrum (Cham.) I.M. Johnst.

Sin.: *Anchusa tetraquetra* Cham., *Antiphytum tetraquetrum* (Cham.) A.DC., *Moritzia tetraquetra* (Cham.) Brand
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Tiquilia Pers.

Tiquilia atacamensis (Phil.) A.T. Richardson

Sin.: *Coldenia atacamensis* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Tiquilia grandiflora (Phil.) A.T. Richardson

Sin.: *Coldenia grandiflora* Phil.
Subarbusto. Nativa. 1400 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Tiquilia litoralis (Phil.) A.T. Richardson

Sin.: *Coldenia litoralis* Phil.
Subarbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Tiquilia nuttallii (Hook.) A.T. Richardson

Sin.: *Coldenia decumbens* Hauman, *Coldenia nuttallii* Hook., *Tiquiliopsis nuttallii* (Hook.) A. Heller
Hierba. Nativa. 700-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

Tiquilia paronychioides (Phil.) A.T. Richardson

Sin.: *Coldenia paronychioides* Phil.
Subarbusto. Nativa. 0-3300 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Tiquilia tacnensis A.T. Richardson
Subarbusto. Nativa. 1900-2000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Varronia P. Browne

Varronia curassavica Jacq.
Sin.: *Cordia chacoensis* Chodat, *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. & Schult., *Cordia salicina* DC., *Cordia verbenacea* DC.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, MIE). URY(MAL, ROC).

Varronia dichotoma Ruiz & Pav.
Sin.: *Cordia bifurcata* Roem. & Schult., *Cordia corymbosa* (L.) G. Don f. *detonsa* I.M. Johnst., nom. inval.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(COL, RNO, SJO, TAC).

Varronia guaranitica (Chodat & Hassl.) J.S. Mill.
Sin.: *Cordia guaranitica* Chodat & Hassl., *Cordia guaranitica* Chodat & Hassl. var. *foliosa* Chodat & Hassl., *Cordia guaranitica* Chodat & Hassl. var. *pedunculosa* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, SAL). PRY(CAA, COA, PAI).

Varronia guazumifolia Desv.
Sin.: *Cordia axillaris* I.M. Johnst., *Cordia guazumifolia* (Desv.) Roem. & Schult., *Cordia patens* Kunth f. *monocephala* Cham., *Varronia axillaris* (I.M. Johnst.) Borhidi
Arbusto. Nativa. 200-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Varronia paucidentata (Fresen.) Friesen
Sin.: *Cordia paucidentata* Fresen., *Cordia paucidentata* Fresen. var. *subulata* Chodat & Hassl., *Cordia paucidentata* Fresen. var. *valenzuelensis* Chodat, *Cordia uruguayana* Arechav., *Varronia paucidentata* (Fresen.) Friesen var. *subulata* (Chodat & Hassl.) Friesen, *Varronia paucidentata* (Fresen.) Friesen var. *valenzuelensis* (Chodat) Friesen
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, MIE). URY(ART, RIV, SAO).

Varronia polycephala Lam.
Sin.: *Cordia discolor* Cham., *Cordia hermanniifolia* Cham., *Cordia monosperma* (Jacq.) Roem. & Schult., *Cordia polycephala* (Lam.) I.M. Johnst., *Cordia ulmifolia* Juss. ex Dum. Cours.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, PAI). URY(COL, RNO, SAO, SJO, TAC).

Varronia sessilifolia (Cham.) Borhidi
Sin.: *Cordia caaguazuensis* Chodat, *Cordia sessilifolia* Cham., *Cordia sessilifolia* Cham. var. *tomentosa* (Chodat & Hassl.) I.M. Johnst., *Cordia villicaulis* Fresen., *Cordia villicaulis* Fresen. var. *tomentosa* Chodat & Hassl., *Varronia villicaulis* (Fresen.) Borhidi

Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAU, COA).

Varronia urticifolia (Cham.) J.S. Mill.
Sin.: *Cordia urticifolia* Cham.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

BRASSICACEAE

Aimara Salaria & Al-Shehbaz

Aimara rollinsii (Al-Shehbaz & Martic.) Salaria & Al-Shehbaz
Sin.: *Menonvillea rollinsii* Al-Shehbaz & Martic.
Subarbusto. Endémica. 2600-3400 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Alliaria Matthioli & Heist. ex Fabr.

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
Sin.: *Alliaria officinalis* Andr. ex M. Bieb., hom. illeg., *Arabis petiolata* M. Bieb., *Erysimum alliaria* L., *Sisymbrium alliaria* (L.) Scop.
Hierba. Introducida. 400-800 m.
Países: ARG(NEU, RNE).

Alshehbazia Salaria & Zuloaga

Alshehbazia friesii (O.E. Schulz) Salaria, Zuloaga & Al-Shehbaz
Sin.: *Eudema friesii* O.E. Schulz, *Petroravenia friesii* (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Hierba. Nativa. 4200-5000 m.
Países: ARG(SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Alshehbazia hauthalii (Gilg & Muschl.)
Salariato & Zuloaga

Sin.: *Brayopsis hauthalii* (Gilg & Muschl.)
Skotts., *Brayopsis skottsbergii* Gilg
ex Skotts., *Eudema hauthalii* Gilg &
Muschl., *Onuris hauthalii* (Gilg &
Muschl.) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 300-4000 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Alshehbazia werdermannii (O.E. Schulz)
Salariato, Zuloaga & Al-Shehbaz

Sin.: *Eudema werdermannii* O.E. Schulz,
Petroravenia werdermannii (O.E.
Schulz) Al-Shehbaz

Hierba. Nativa. 3800-4700 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL, SJU).
CHL(ATA).

Alyssum L.

Alyssum alyssoides (L.) L.

Sin.: *Clypeola alyssoides* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,
NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, MAG).

Arabidopsis (DC.) Heynh. , nom.
cons.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Sin.: *Arabis thaliana* L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(SCR). CHL(BIO, ARA,
LLA, AIS). URY(MON).

Aschersoniodoxa Gilg & Muschl.

Aschersoniodoxa cachensis (Speg.) Al-
Shehbaz

Sin.: *Braya cachensis* Speg.

Hierba. Nativa. 4000-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Atacama O. Toro, Mort & Al-Shehbaz

Atacama nivea (Phil.) O. Toro, Mort & Al-
Shehbaz

Sin.: *Mathewsia nivea* (Phil.) O.E. Schulz,
Sisymbrium niveum Phil.

Hierba o subarbusto. Endémica. 2500-
3500 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Barbarea W.T. Aiton , nom. cons.

Barbarea verna (Mill.) Asch.

Sin.: *Barbarea praecox* (Sm.) W.T. Aiton,
Erysimum vernum Mill.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(RNE, SCR). BRA(PAR,
SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR,
LLA, RME).

Barbarea vulgaris W.T. Aiton

Sin.: *Erysimum barbarea* L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Brassica L.

Brassica juncea (L.) Czern.

Sin.: *Sinapis juncea* L.

Hierba. Introducida. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA,
MIS, SAL, SJU). BRA(PAR).
PRY(APY).

Brassica napus L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(ERI, JUJ). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, LBO,
BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE).

Brassica oleracea L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(LLA, MAG, JFE, IPA).

Brassica rapa L.

Sin.: *Brassica campestris* L.

Hierba. Introducida. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI,
MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR,
SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP,
ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME,
JFE). PRY(APY). URY(MON).

Brassica tournefortii Gouan

Hierba. Introducida.

Países: CHL(VAL).

Brayopsis Gilg & Muschl.

Brayopsis calycina (Desv.) Gilg &
Muschl.

Sin.: *Braya calycina* (Desv.) Wedd.,
Brayopsis alpaminae Gilg & Muschl.
var. *argentea* (Gilg & Muschl.) O.E.
Schulz, *Brayopsis argentea* Gilg &
Muschl., *Brayopsis calycina* (Desv.)
Gilg & Muschl. var. *filiformis* O.E.
Schulz, *Brayopsis weberbaueri* Gilg &
Muschl., *Draba calycina* Desv.,
Englerocharis alpaminae (Gilg &
Muschl.) Baehni & J.F. Macbr. var.
argentea (Gilg & Muschl.) Baehni &
J.F. Macbr., *Englerocharis calycina*
(Desv.) Baehni & J.F. Macbr.,
Englerocharis calycina (Desv.) Baehni
& J.F. Macbr. var. *filiformis* (O.E.
Schulz) Baehni & J.F. Macbr.,
Englerocharis weberbaueri (Gilg &
Muschl.) Baehni & J.F. Macbr.,
Hesperis calycina (Desv.) Kuntze,
Sisymbrium calycinum (Desv.) Wedd.

Hierba. Nativa. 3500-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Brayopsis monimocalyx O.E. Schulz
Sin.: *Braya monimocalyx* Gilg & Muschl.
ex Hosseus, nom. nud.
Hierba. Nativa. 4100-4800 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Cakile Mill.

Cakile maritima Scop.
Sin.: *Bunias cakile* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA).
URY(MAL, ROC).

Camelina Crantz

Camelina alyssum (Mill.) Thell.
Sin.: *Camelina parodii* Ibarra & La Porte,
Camelina sativa (L.) Crantz var.
dentata (Willd.) Ibarra & La Porte,
Myagrum alyssum Mill., *Myagrum*
dentatum Willd.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, SFE). CHL(RME).

Camelina microcarpa Andr. ex DC.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,
NEU, RNE). CHL(RME).

Camelina sativa (L.) Crantz
Sin.: *Myagrum sativum* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SFE).
URY(SOR).

Capsella Medik. , nom. cons.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Sin.: *Thlaspi bursa-pastoris* L.
Hierba. Introducida. 0-3800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,
MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR,
SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP,
TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME,
IPA). URY(CAS).

Cardamine L.

Cardamine africana L.
Sin.: *Cardamine innovans* O.E. Schulz,
Cardamine ovata Benth. var.
corymbosa Britton
Hierba. Introducida. 500-3400 m.
Países: ARG(MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LLA, AIS,
IPA).

Cardamine bonariensis Pers.
Sin.: *Cardamine alsophila* Phil.,
Cardamine alsophila Phil. var.
bracteata (Phil.) Reiche, *Cardamine*
alsophila Phil. var. *caespitosa* (Phil.)
Reiche, *Cardamine alsophila* Phil. var.
pusilla (Phil.) Reiche, *Cardamine*
alsophila Phil. var. *tridens* (Phil.)
Reiche, *Cardamine andicola* Phil.,
Cardamine axillaris Wedd., *Cardamine*
axillaris Wedd. var. *tucumanensis*
Griseb., *Cardamine bonariensis* Pers.
var. *flaccida* (Cham. & Schltdl.) J.F.
Macbr., *Cardamine bonariensis* Pers.
var. *minima* (Steud.) J.F. Macbr.,
Cardamine bonariensis Pers. var.
tucumanensis (Griseb.) O.E. Schulz,
Cardamine bracteata Phil., *Cardamine*
caespitosa Phil., *Cardamine*
cymbalaria Chodat & Wilczek,
Cardamine demissa Triana & Planch.,
Cardamine flaccida Cham. & Schltdl.,

Cardamine flaccida Cham. & Schltdl.
subsp. *alsophila* (Phil.) O.E. Schulz,
Cardamine flaccida Cham. & Schltdl.
subsp. *bonariensis* (Pers.) O.E.
Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. &
Schltdl. subsp. *minima* (Steud.) O.E.
Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. &
Schltdl. var. *pilosa* O.E. Schulz,
Cardamine flaccida Cham. & Schltdl.
var. *tucumanensis* (Griseb.) O.E.
Schulz, *Cardamine minima* Steud.,
Cardamine nasturtioides Bertero ex
Barnéoud, *Cardamine nemophila* Phil.,
Cardamine pusilla Phil., *Cardamine*
radicans (Walp.) Kuntze, *Cardamine*
ramosissima Steud., *Cardamine*
tridens Phil., *Nasturtium radicans*
Walp., *Nasturtium turfosum* Kunze ex
Walp.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
COS, DFE, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS,
NEU, SAL, SJU, SCR, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP,
TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME,
JFE). PRY(APA). URY(CAS, FLA,
SOR).

Cardamine chenopodiifolia Pers.
Sin.: *Arabis commersonii* DC., *Arabis*
spathulata (Poir.) DC., *Cardamine*
argentina Speg., *Cardamine*
fernandeziana (Phil.) Johow,
Heterocarpus fernandezianus Phil.,
Sisymbrium bellidifolium Poir.,
Sisymbrium spathulatum Poir.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(JFE). PRY(GUA).
URY(CAS, MON, SJO, SOR).

Cardamine chilensis DC.
Sin.: *Cardamine callitrichoides* Speg.,
Cardamine chilensis DC. var.

angustifolia O.E. Schulz, *Cardamine chilensis* DC. var. *nana* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Cardamine chilensis* DC. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Cardamine micropetala* Phil., *Cardamine nana* Barnéoud, *Cardamine ramosissima* Steud. var. *micropetala* (Phil.) Reiche, *Cardamine solisii* Phil., *Cardamine valdiviana* Phil., *Cardamine valdiviana* Phil. var. *callitrichoides* (Speg.) O.E. Schulz, *Cardamine vulgaris* Phil. var. *micropetala* (Phil.) O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SAL). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Cardamine cordata Barnéoud

Sin.: *Cardamine andina* Phil., *Cardamine calbucana* Phil., *Cardamine cordata* Barnéoud var. *decumbens* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Cardamine decumbens* Barnéoud, *Cardamine monticosa* Phil., *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg. subsp. *andina* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine peteroana* Phil., *Cardamine rostrata* Griseb. var. *alpina* Chodat & Wilcz.
Hierba. Endémica. 700-2900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Cardamine flexuosa With.

Sin.: *Cardamine hirsuta* L. subsp. *flexuosa* (With.) Forbes & Hemsl., *Cardamine hirsuta* L. var. *flexuosa* (With.) Hook. f. & T. Anderson
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MEN, SAL).

Cardamine geraniifolia (Poir.) DC.

Sin.: *Dentaria geraniifolia* (Poir.) Reiche, *Sisymbrium geraniifolium* Poir.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Cardamine glacialis (G. Forst.) DC.

Sin.: *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb., *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb. var. *andicola* Albov, *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb. var. *pauciflora* Speg., *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb. var. *umbrosa* Albov, *Cardamine ciliata* Phil., *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. subsp. *litoralis* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *elatior* A. Gray, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pubescens* Phil. ex O.E. Schulz, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pumila* A. Gray, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *soehrensii* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine gongyloides* Phil., *Cardamine hirsuta* L. var. *antiscorbutica* (Banks & Sol. ex Griseb.) Reiche, *Cardamine hirsuta* L. var. *magellanica* (Phil.) Macloskie, *Cardamine hirsuta* L. var. *soehrensii* (Phil.) Reiche, *Cardamine litoralis* Phil., *Cardamine magellanica* Phil., *Cardamine palenae* Phil., *Cardamine pratensis* L. var. *minor* Barnéoud, *Cardamine soehrensii* Phil., *Cardamine strictula* Steud., *Sisymbrium glaciale* G. Forst., *Sisymbrium grandiflorum* Molina
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(ATA, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Cardamine hirsuta L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, JUJ, LPA, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU,

BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE). URY(MON).

Cardamine kruesselii Johow ex Reiche

Hierba. Endémica.
Países: CHL(JFE).

Cardamine marginata Phil.

Sin.: *Cardamine vulgaris* Phil. var. *marginata* (Phil.) O.E. Schulz
Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA).

Cardamine rostrata Griseb.

Sin.: *Cardamine lechleriana* Steud., *Cardamine reniformis* Phil., *Cardamine rostrata* Griseb. var. *dichondroides* Speg., *Cardamine rostrata* Griseb. var. *reniformis* (Phil.) O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(CHU). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Cardamine tenuirostris Hook. & Arn.

Sin.: *Cardamine affinis* Hook. & Arn., *Cardamine flavescens* Phil., *Cardamine pentaphylla* Phil., hom. illeg., *Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn. subsp. *affinis* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz, *Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn. subsp. *reicheana* O.E. Schulz, *Nasturtium stenophyllum* F. Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Cardamine tuberosa DC.

Sin.: *Cardamine cognata* Steud., *Cardamine granulata* Phil., *Cardamine thyrsoides* O.E. Schulz, *Cardamine tuberosa* DC. subsp. *cognata* (Steud.) O.E. Schulz, *Cardamine tuberosa* DC. var. *granulata* (Phil.) Reiche,

Cardamine tuberosa DC. var. *velutina* Speg.

Hierba. Endémica. 0-2700 m.

Países: ARG(CHU). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, AIS, RME).

Cardamine variabilis Phil.

Sin.: *Cardamine integrifolia* Phil., hom. illeg., *Cardamine integrifolia* Phil., hom. illeg. var. *dichondroides* Speg., *Cardamine integrifolia* Phil. var. *diversifolia* O.E. Schulz, *Cardamine ovata* Phil., hom. illeg., *Cardamine thermarum* Martic., *Cardamine triphylla* Phil., *Cardamine variabilis* Phil. var. *pinnatisecta* O.E. Schulz, *Sisymbrium simpsonii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Cardamine volckmannii Phil.

Sin.: *Cardamine hirsuta* L. var. *nivalis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hook. f., *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Cardamine petiolulata* Phil. ex O.E. Schulz, *Cardamine stricta* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3800 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Cardamine vulgaris Phil.

Sin.: *Cardamine garaventae* O.E. Schulz, *Cardamine grandjotii* O.E. Schulz, *Cardamine hirsuta* L. var. *vulgaris* (Phil.) Reiche, *Cardamine intermedia* Steud., *Cardamine macrostachya* Phil., *Cardamine vulgaris* Phil. var. *oligozyga* O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Chilocardamum O.E. Schulz

Chilocardamum castellanosii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium castellanosii* O.E. Schulz
Hierba. Endémica.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Chilocardamum longistylum (Romanczuk) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium longistylum* Romanczuk
Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU).

Chilocardamum onuridifolium (Ravenna) Al-Shehbaz

Sin.: *Dimitria onuridifolia* Ravenna, *Sisymbrium onuridifolium* (Ravenna) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Chilocardamum patagonicum (Speg.) O.E. Schulz

Sin.: *Sisymbrium flexicaule* Dusén, *Sisymbrium patagonicum* Speg., *Thelypodium flexicaule* (Dusén) Gilg & Muschl.

Hierba o arbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Chorispora R. Br. ex DC, nom. cons.

Chorispora tenella (Pall.) DC.

Sin.: *Raphanus tenellus* Pall.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(RME).

Cremolobus DC.

Cremolobus chilensis (Lag. ex DC.) DC.

Sin.: *Biscutella chilensis* Lag. ex DC., *Cremolobus aphanopterus* A. Gray, *Cremolobus benoistii* J.F. Macbr., *Cremolobus humilis* Muschl., *Cremolobus parviflorus* Wedd., *Cremolobus paysonii* O.E. Schulz, *Cremolobus pinnatifidus* Hook., *Cremolobus pinnatifidus* Hook. var. *integrifolius* A. Gray, *Cremolobus sinuatus* Hook., *Cremolobus stenophyllus* Muschl., *Cremolobus weberbaueri* Muschl., *Loxoptera stenophylla* (Muschl.) O.E. Schulz, *Urbanodoxa tarapacana* Ricardi & Martic.

Hierba. Nativa. 3300-4400 m.

Países: ARG(JUU, TUC). CHL(AYP, TAR).

Delpinophytum Speg.

Delpinophytum patagonicum (Speg.) Speg.

Sin.: *Coronopus patagonicus* (Speg.) Muschl., *Delpinoella patagonica* Speg.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Descurainia Webb & Berthel., nom. cons.

Descurainia antarctica (E. Fourn.) O.E. Schulz

Sin.: *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *bonarellii* O.E. Schulz, *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *patagonica* (Speg.) O.E. Schulz, *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *purpureola* (Speg.) O.E. Schulz, *Descurainia argentea* O.E. Schulz,

Descurainia canescens (Nutt.) Prantl var. *patagonica* Speg., *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *purpureola* Speg., *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *leiocarpa* O.E. Schulz, *Descurainia glandulifera* (Speg.) Gilg & Muschl., *Descurainia nana* Romanczuk, *Hesperis antarctica* (E. Fourn.) Kuntze, *Sisymbrium antarcticum* E. Fourn., *Sisymbrium glanduliferum* Speg., *Sisymbrium sophia* L. var. *canescens* Hook. f., *Sophia glandulifera* (Speg.) Macloskie, *Sophia pinnata* (Walter) Howell var. *patagonica* (Speg.) Macloskie, *Sophia pinnata* (Walter) Howell var. *purpureola* (Speg.) Macloskie
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

Descurainia canoensis Al-Shehbaz

Hierba. Nativa. 3500-3700 m.

Países: CHL(AYP).

Descurainia depressa (Phil.) Prantl ex Reiche

Sin.: *Descurainia brachycarpa* (Phil.) Prantl ex Reiche, *Descurainia depressa* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *pflanzii* (Muschl.) O.E. Schulz, *Descurainia latisiliqua* O.E. Schulz, *Descurainia pflanzii* Muschl., *Descurainia titicacensis* (Walp.) Lillo var. *dasycarpa* O.E. Schulz, *Sisymbrium brachycarpum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium depressum* Phil.

Hierba. Nativa. 3500-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Descurainia erodiifolia (Phil.) Prantl ex Reiche

Sin.: *Descurainia appendiculata* (Griseb.) O.E. Schulz, *Descurainia appendiculata* (Griseb.) O.E. Schulz var. *angustisecta* O.E. Schulz, *Descurainia argentina* O.E. Schulz, *Descurainia argentina* O.E. Schulz var. *brachysiliqua* (Chodat & Wilczek) O.E. Schulz, *Descurainia brevifructa* Boelcke ex Mart.-Laborde, *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *appendiculata* (Griseb.) Hosseus, *Descurainia heterotricha* Speg., *Sisymbrium canescens* Nutt. f. *brachysiliqua* Chodat & Wilczek, *Sisymbrium canescens* Nutt. var. *appendiculatum* Griseb., *Sisymbrium erodiifolium* Phil., *Sophia heterotricha* (Speg.) Macloskie
Hierba. Nativa. 200-3200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME). URY(SAO).

Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr.

Sin.: *Descurainia leptoclada* Muschl., *Descurainia leptoclada* Muschl. var. *dasycarpa* O.E. Schulz, *Descurainia leptoclada* Muschl. var. *glandulosa* O.E. Schulz, *Descurainia myriophylla* (Willd. ex DC.) R.E. Fr. var. *glandulosa* O.E. Schulz, *Descurainia perkinsiana* Muschl., *Descurainia pulcherrima* Muschl., *Descurainia titicacensis* (Walp.) Lillo, *Descurainia titicacensis* (Walp.) Lillo var. *glandulosa* O.E. Schulz, *Hesperis myriophylla* (Willd. ex DC.) Kuntze, *Nasturtium myriophyllum* (Willd. ex DC.) Spreng., *Sisymbrium adpressum* Turcz., *Sisymbrium myriophyllum* Willd. ex DC., *Sisymbrium titicacense* Walp.

Hierba. Nativa. 1900-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Descurainia nuttallii (Colla) O.E. Schulz

Sin.: *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl, *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *elegantula* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *glabrescens* (Speg.) O.E. Schulz, *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *tenuissima* (Phil.) Reiche, *Descurainia diversifolia* O.E. Schulz, *Descurainia glabrescens* (Speg.) Speg., *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl var. *macrophylla* (Barnéoud) Prantl ex Reiche, *Descurainia tenuissima* (Phil.) Speg., *Hesperis cumingiana* (Fisch. & E. Mey.) Kuntze, *Sisymbrium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey., *Sisymbrium cumingii* C. Presl, *Sisymbrium elegantulum* Phil., *Sisymbrium glabrescens* Speg., *Sisymbrium macrophyllum* Barnéoud, *Sisymbrium nuttallii* Colla, *Sisymbrium tenuissimum* Phil., *Sophia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Macloskie, *Sophia glabrescens* (Speg.) Macloskie, *Sophia tenuissima* (Phil.) Macloskie

Hierba. Endémica. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, LLA, MAG, RME).

Descurainia pimpinellifolia (Barnéoud) O.E. Schulz

Sin.: *Descurainia altoandina* Romanczuk, *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *pimpinellifolium* (Barnéoud) Reiche, *Descurainia diversifolia* O.E. Schulz var. *cunninghamii* O.E. Schulz, *Descurainia glaucescens* (Phil.) Prantl ex Reiche, *Descurainia pimpinellifolia*

(Barnéoud) O.E. Schulz var. *glaucescens* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche f. *umbellifera* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium glaucescens* Phil., hom. illeg., *Sisymbrium pimpinellifolium* Barnéoud, *Sisymbrium umbelliferum* Phil., *Sophia glaucescens* (Phil.) Macloskie
Hierba. Endémica. 1500-4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Sin.: *Hesperis sophia* (L.) Kuntze, *Sisymbrium sophia* L.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG, RME).

Descurainia stricta (Phil.) Prantl ex Reiche
Sin.: *Descurainia adpressa* Boelcke, *Descurainia minutiflora* Prantl ex Reiche, *Descurainia minutiflora* Prantl ex Reiche var. *florida* (Phil.) Reiche, *Descurainia rubescens* (Phil.) Reiche, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *florida* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *minutiflora* (Prantl ex Reiche) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *rubescens* (Phil.) O.E. Schulz, *Hesperis florida* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium floridum* Phil., *Sisymbrium minutiflorum* Phil., hom. illeg., *Sisymbrium rubescens* Phil., *Sisymbrium strictum* Phil.
Hierba. Nativa. 3200-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Dictyophragmus O.E. Schulz

Dictyophragmus punensis (Romanczuk) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium punense* Romanczuk
Hierba. Endémica. 3100-3800 m.
Países: ARG(JUU).

Diplotaxis DC.

Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Sin.: *Sinapis erucoides* L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(MEN, SJU).

Diplotaxis muralis (L.) DC.
Sin.: *Brassica muralis* (L.) Huds., *Sinapis muralis* (L.) W.T. Aiton, *Sisymbrium murale* L.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(ATA, COQ, RME).

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Sin.: *Sisymbrium tenuifolium* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE). URY(MON).

Draba L., nom. cons.

Draba burkartiana O.E. Schulz
Sin.: *Draba burkartiana* O.E. Schulz var. *parodiana* O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Draba funiculosa Hook. f.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Draba gilliesii Hook. & Arn.

Sin.: *Draba araucana* Phil., *Draba azorellicola* O.E. Schulz, *Draba chubutensis* Speg., *Draba colchaguensis* Phil., *Draba davilae* Phil., *Draba gilliesii* Hook. & Arn. f. *araucana* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *argentina* O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *davilae* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *glabrata* (Gilg ex Speg.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *rosulata* (Phil.) Reiche, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *rosulata* (Phil.) Reiche f. *bagualensis* O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *stolonifera* (Barnéoud) Reiche, *Draba magellanica* Lam. var. *glabrata* Gilg ex Speg., *Draba rosulata* Phil., *Draba stolonifera* Barnéoud
Hierba. Endémica. 400-4000 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Draba lapaziana Al-Shehbaz
Hierba. Nativa. 4300-4800 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Draba loayzana Al-Shehbaz
Hierba. Nativa. 4400-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Draba macleanii Hook. f.
Sin.: *Draba atacamensis* Gilg ex Gilg & Muschl.
Hierba. Nativa. 3900-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Draba magellanica Lam.
Sin.: *Draba atuelica* Chodat & Wilczek, *Draba chodatii* O.E. Schulz, *Draba falklandica* Hook. f., *Draba incana* L.

var. *magellanica* (Lam.) Hook. f., *Draba incana* L. var. *sylvatica* (Albov) Macloskie, *Draba magellanica* Lam. var. *citrina* O.E. Schulz, *Draba magellanica* Lam. var. *falklandica* (Hook. f.) O.E. Schulz, *Draba magellanica* Lam. var. *saffordii* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba magellanica* Lam. var. *sylvatica* Albov, *Draba rosularis* Chodat & Wilczek, hom. illeg., *Draba saffordii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-3400 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Draba pusilla F. Phil.

Sin.: *Draba magellanica* Lam. var. *subglabrata* Speg., *Draba schoenleinii* F. Meigen, *Draba subglabrata* (Speg.) O.E. Schulz, *Draba subglabrata* (Speg.) O.E. Schulz var. *leiocarpa* O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 500-3400 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME).

Draba thlaspiiformis (Phil.) Al-Shehbaz

Sin.: *Draba philippii* O.E. Schulz, *Eudema thlaspiiforme* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Draba tucumanensis O.E. Schulz

Sin.: *Draba atuelica* Chodat & Wilczek var. *hirsutior* O.E. Schulz, *Draba chodatii* O.E. Schulz var. *subtorta* O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 2700-4400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

Draba verna L.

Sin.: *Erophila verna* (L.) DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, COS, ERI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, AIS, MAG, RME).

Eruca Mill.

Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. **sativa** (Mill.) Thell.

Sin.: *Eruca sativa* Mill.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(VAL).

Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. **vesicaria**

Sin.: *Brassica vesicaria* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL).

Erysimum L.

Erysimum cheiranthoides L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Erysimum repandum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Exhalimolobos Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Exhalimolobos burkartii (Romanczuk & Boelcke) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sin.: *Polypsecadium burkartii* Romanczuk & Boelcke

Hierba. Endémica. 800-1200 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Exhalimolobos pazensis (Rusby) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sin.: *Halimolobos adpressus* O.E. Schulz, *Sisymbrium pazensis* Rusby

Hierba. Nativa. 1600-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SCR, TUC).

Exhalimolobos weddellii (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sin.: *Draba greggioides* Griseb., *Greggia montana* Griseb., *Halimolobos boelckeii* Mart.-Laborde, *Halimolobos hispidula* (DC.) O.E. Schulz var. *weddellii* (E. Fourn.) Rollins, *Halimolobos montanus* (Griseb.) O.E. Schulz, *Halimolobos montanus* (Griseb.) O.E. Schulz var. *andina* O.E. Schulz, *Halimolobos weddellii* (E. Fourn.) O.E. Schulz, *Hesperis weddellii* (E. Fourn.) Kuntze, *Sisymbrium hispidulum* (DC.) Triana & Planch. var. *weddellii* (E. Fourn.) Baehni & J.F. Macbr., *Sisymbrium weddellii* E. Fourn.

Hierba. Nativa. 300-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(ART, COL, RNO, SAO, TAC).

Hesperis L.

Hesperis matronalis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(NEU, RNE, TDF). CHL(MAG).

Hirschfeldia Moench

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.

Sin.: *Sinapis incana* L.

Hierba. Introducida. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME, JFE, IPA). URY(PAY, SJO).

Hollermayera O.E. Schulz

Hollermayera valdiviana (Phil.) Ravenna
Sin.: *Armoracia valdiviana* Phil., *Hollermayera sylvatica* O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: CHL(ARA, LLA).

Hornungia Rchb.

Hornungia procumbens (L.) Hayek
Sin.: *Bursa procumbens* (L.) Kuntze, *Capsella procumbens* (L.) Fr., *Draba tenuis* Barnéoud, *Hutchinsia procumbens* (L.) Desv., *Hutchinsia reticulata* Griseb., *Hutchinsia tenuis* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Hymenolobus procumbens* (L.) Nutt. ex Schinz & Thell., *Lepidium procumbens* L., *Microcardamum tenue* (Barnéoud) O.E. Schulz
Hierba. Introducida. 0-4000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, MAG).

Iberis L.

Iberis amara L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE, SFE).

Isatis L.

Isatis tinctoria L.
Hierba. Introducida. 100-500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Ivania O.E. Schulz

Ivania cremnophila (I.M. Johnst.) O.E. Schulz
Sin.: *Cardamine cremnophila* I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 2700-3300 m.
Países: CHL(ATA).

Ivania juncalensis Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 2400-2600 m.
Países: CHL(VAL).

Lepidium L.

Lepidium angustissimum Phil.
Sin.: *Lepidium tayloriae* Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 1900-2400 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Lepidium appelianum Al-Shehbaz
Sin.: *Cardaria pubescens* (C.A. Mey.) Jarm., *Hymenophysa pubescens* C.A. Mey.
Hierba. Introducida. 300-1600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Lepidium argentinum Thell.
Sin.: *Lepidium argentinum* Thell. var. *stenocarpum* (Thell.) Thell., *Lepidium argentinum* Thell. var. *virginicifolium* Thell., *Lepidium bonariense* L. var. *stenocarpum* Thell.
Hierba. Endémica. 1800-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

Lepidium auriculatum Regel & Körn.
Sin.: *Lepidium aletes* J.F. Macbr., *Lepidium araucanum* Phil., *Lepidium*

bipinnatifidum Desv. var. *araucanum* (Phil.) Reiche, *Lepidium calycinum* Godr., *Lepidium pubescens* Desv. var. *fallax* Thell., *Lepidium subvaginatum* Steud. ex Thell.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG). PRY(APA, CEN, COA, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TYT).

Lepidium bipinnatifidum Desv.
Sin.: *Nasturtium dubium* (Kunth) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, LLA). URY(MON).

Lepidium boelckeanum Prina
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, MEN, SLU, SFE, SDE).

Lepidium boelckei Al-Shehbaz
Sin.: *Lepidium marginatum* Griseb., hom. illeg., *Lepidium meyerii* Walp. subsp. *marginatum* (Griseb.) Thell.
Hierba. Endémica. 3000-3400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Lepidium bonariense L.
Sin.: *Lepidium bonariense* L. var. *hirsutulum* Thell., *Lepidium bonariense* L. var. *microcarpum* Thell., *Lepidium bonariense* L. var. *pseudovirginicum* Thell., *Lepidium mendocinum* Phil., *Thlaspi multifidum* Poir.
Hierba. Nativa. 0-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL,

- SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME, JFE, IPA). PRY(AMA, CEN, COA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, ROC, SAO, SJO, TYT).
- Lepidium burkartii** Boelcke
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(ERI).
- Lepidium campestre** (L.) W.T. Aiton
Sin.: *Thlaspi campestre* L.
Hierba. Introducida.
Notas: Citada como Introducida para Chile (Al-Shehbaz, 2010b: 148) sin indicar localidad ni material de referencia.
- Lepidium chalepense** L.
Sin.: *Cardaria chalepensis* (L.) Hand.-Mazz., *Cardaria draba* (L.) Desv. subsp. *chalepensis* (L.) O.E. Schulz
Hierba. Introducida.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU, TDF).
- Lepidium chichicara** Desv.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).
- Lepidium coronopus** (L.) Al-Shehbaz
Sin.: *Cochlearia coronopus* L., *Coronopus squamatus* (Forssk.) Asch., *Lepidium squamatum* Forssk.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(LLA).
- Lepidium cumingianum** Fisch. & C.A. Mey.
Sin.: *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *bertoronianum* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *orbiculatum* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. var. *canescens* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. var. *subsagittatum* Thell.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(TAR, VAL, LBO, BIO, RME).
- Lepidium densiflorum** Schrad.
Sin.: *Lepidium neglectum* Thell.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(LPA, MEN, SLU).
- Lepidium depressum** Thell.
Hierba. Nativa. 3800-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Lepidium didymum** L.
Sin.: *Coronopus didymus* (L.) Sm., *Coronopus didymus* L. var. *macrocarpus* Muschl., *Coronopus didymus* L. var. *procumbens* Muschl., *Coronopus leptocarpus* Boelcke, *Coronopus leptocarpus* Boelcke var. *microcarpus* Boelcke, *Lepicochlea americana* Rojas Acosta, *Senebiera didyma* (L.) Pers., *Senebiera pinnatifida* DC.
Hierba. Nativa. 0-2900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME, IPA). PRY(CEN, COA). URY(MON).
- Lepidium draba** L.
Sin.: *Cardaria draba* (L.) Desv., *Cochlearia draba* (L.) L.
Hierba. Introducida. 0-2600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SLU, TDF).
- CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, AIS, MAG, RME). URY(MON).
- Lepidium filisegmentum** C.L. Hitchc.
Sin.: *Lepidium reticulatum* Howell var. *austro-americanum* Thell.
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(CHU, LPA, RNE, SCR). CHL(MAG).
- Lepidium gracile** (Chodat & Hassl.) Boelcke
Sin.: *Lepidium bonariense* L. var. *gracile* Chodat & Hassl., *Lepidium calycinum* Stephan ex Willd. var. *gracile* (Chodat & Hassl.) Thell.
Hierba. Nativa. 100-2200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, SLU, SFE, SDE). PRY(CON, PHA).
- Lepidium heterophyllum** Benth.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(ARA).
- Lepidium hickenii** Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAI).
- Lepidium horstii** Johow ex Skottsbo.
Hierba. Endémica. 300 m.
Países: CHL(IDE).
- Lepidium johnstonii** C.L. Hitchc.
Hierba. Endémica. 700-1500 m.
Países: CHL(ANT).
- Lepidium jujuyanum** Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 3700-4500 m.
Países: ARG(JUJ).
- Lepidium latifolium** L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(COR). CHL(ANT, COQ, MAU).

Lepidium meyenii Walp.

Sin.: *Lepidium affine* Wedd., hom. illeg., *Lepidium gelidum* Wedd., *Lepidium meyenii* Walp. subsp. *affine* (Wedd.) Thell., *Lepidium meyenii* Walp. subsp. *gelidum* (Wedd.) Thell., *Lepidium meyenii* Walp. var. *gelidum* (Wedd.) Hosseus, *Lepidium peruvianum* G. Chacón, *Lepidium weddellii* J.F. Macbr., hom. illeg., *Lepidium weddellii* O.E. Schulz
Hierba. Nativa. 3000-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(TAR).

Lepidium myrianthum Phil.

Sin.: *Lepidium ruderales* L. var. *myrianthum* (Phil.) Reiche, *Lepidium spicatum* Desv. f. *microcarpum* Hicken
Hierba. Endémica. 200-3400 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(ANT).

Lepidium nitidum Nutt.

Sin.: *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *curicoanum* (Phil.) Reiche, *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *tenuifolium* (Phil.) Reiche, *Lepidium chilense* Kunze, *Lepidium curicoanum* Phil., *Lepidium tenuifolium* Phil., *Lepidium tenuissimum* Steud.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

Lepidium parodii Thell.

Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, RNE, SFE).

Lepidium pedersenii Al-Shehbaz

Sin.: *Lepidium aletes* J.F. Macbr. var. *integrifolium* (Thell.) Boelcke, *Lepidium calycinum* Stephan ex Willd. var. *integrifolium* Thell.
Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, MIS, SFE, TUC). PRY(APA, APY).

Lepidium perfoliatum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Lepidium philippianum (Kuntze) Thell.

Sin.: *Lepidium philippianum* (Kuntze) Thell. var. *brachystylum* Thell., *Lepidium suffruticosum* Phil., hom. illeg., *Nasturtium philippianum* Kuntze, *Onuris reichei* Gilg & Muschl.
Hierba. Endémica. 2400-3000 m.
Países: CHL(RME).

Lepidium pinnatifidum Ledeb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(RNE).

Lepidium pseudodidymum Thell. ex Druce

Sin.: *Coronopus australis* (Hook. f.) Speg., *Coronopus didymus* (L.) Sm. subsp. *australis* (Hook. f.) Muschl., *Coronopus pinnatifidus* (DC.) Gaertn. var. *australis* (Hook. f.) Reiche, *Lepidium inclusum* O.E. Schulz, *Senebiera australis* Hook. f., *Senebiera pinnatifida* DC. var. *australis* (Hook. f.) De Wild.
Hierba. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Lepidium pubescens Desv.

Sin.: *Lepidium raimondii* O.E. Schulz
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

Lepidium rahmeri Phil.

Hierba. Nativa. 2600-4200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Lepidium reichei Phil. ex Reiche

Sin.: *Lepidium barneoudianum* Sukorý, nom. superfl., *Lepidium bonariense* L. var. *gayi* Thell., *Lepidium brevicaula* Barnéoud, *Lepidium morrisonii* C.L. Hitchc., *Nasturtium brevicaula* (Barnéoud) Kuntze
Hierba. Endémica. 1800-3600 m.
Países: ARG(COR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Lepidium rhytidocarpum (Hook.) Al-Shehbaz

Sin.: *Coronopus rhytidocarpus* (Hook.) Macloskie, *Senebiera rhytidocarpa* Hook.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, SFE). URY(PAY, SAO, TAC).

Lepidium ruderales L.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lepidium santacruzense Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(SCR).

Lepidium sativum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA).

Lepidium serratum (Poir.) Al-Shehbaz

Sin.: *Coronopus serratus* (Poir.) Desv., *Senebiera serrata* Poir.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(SOR).

Lepidium spathulatum Phil.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Lepidium spicatum Desv.

Sin.: *Lepidium racemosum* Griseb., *Lepidium spicatum* Desv. var. *calyx-*

persistente Boelcke, *Lepidium spicatum* Desv. var. *racemosum* (Griseb.) Boelcke

Hierba. Endémica. 0-3300 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE). CHL(ATA, BIO, ARA, LLA, MAG, RME). URY(CAS, COL, LAV).

Lepidium strictum (S. Watson) Rattan ex B.L. Rob.

Sin.: *Lepidium oxycarpum* Torr. & A. Gray var. *strictum* S. Watson

Hierba. Nativa. 0-3800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Lepidium stuckertianum (Thell.) Boelcke

Sin.: *Lepidium bonariense* L. var. *stuckertianum* Thell.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Lepidium subulatum L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Lepidium tandilense Boelcke

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, RNE). URY(MON).

Lepidium virginicum L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, IDE). PRY(CAU, CEN, GUA).

Lithodraba Boelcke

Lithodraba mendocinensis (Hauman) Boelcke

Sin.: *Xerodraba mendocinensis* Hauman

Arbusto. Endémica. 1700-3000 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Lobularia Desv., nom. cons.

Lobularia maritima (L.) Desv.

Sin.: *Alyssum maritimum* (L.) Lam., *Clypeola maritima* L.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU). BRA(PAR, RGS). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(MON).

Lunaria L.

Lunaria annua L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE).

Malcolmia R. Br., nom. cons.

Malcolmia maritima (L.) W. T. Aiton

Sin.: *Cheiranthus maritimus* L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: ARG(SCR).

Mancoa Wedd., nom. cons.

Mancoa foliosa (Wedd.) O.E. Schulz

Sin.: *Hutchinsia foliosa* Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(JUU, TUC).

Mancoa hispida Wedd.

Sin.: *Mancoa minima* Rollins, *Radicula scabra* Rusby

Hierba. Nativa. 3400-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Mancoa venturii Al-Shehbaz

Hierba. Nativa. 2300-4500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Mathewsia Hook. & Arn.

Mathewsia auriculata Phil.

Subarbusto. Endémica. 100-2700 m.

Países: CHL(TAR, ATA, COQ).

Mathewsia foliosa Hook. & Arn.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Mathewsia incana Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Mathewsia linearifolia Turcz.

Sin.: *Mathewsia collina* I.M. Johnst., *Mathewsia laciniata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Matthiola R. Br.

Matthiola incana (L.) W.T. Aiton

Sin.: *Cheiranthus incanus* L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(RNE). BRA(PAR). CHL(ANT, JFE).

Menonvillea DC.

Menonvillea chilensis (Turcz.) B.D. Jacks.

Sin.: *Cymatoptera chilensis* Turcz., *Menonvillea aptera* Phil., *Menonvillea*

chilensis (Turcz.) B.D. Jacks. var. *aptera* (Phil.) Rollins, *Menonvillea media* Turcz., *Menonvillea orbiculata* Phil. f. *glabra* Gilg & Muschl., *Menonvillea orbiculata* Phil. var. *parviflora* (Phil.) Reiche, *Menonvillea parviflora* Phil., *Menonvillea parviflora* Phil. var. *aptera* (Phil.) I.M. Johnst., *Menonvillea parvula* Phil., *Menonvillea pinnatifida* Barnéoud var. *parvula* (Phil.) Gilg & Muschl.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Menonvillea cicatricosa (Phil.) Rollins

Sin.: *Hexaptera cicatricosa* Phil.

Subarbusto. Endémica. 1800-2800 m.

Países: ARG(MEN). CHL(LBO, MAU).

Menonvillea comberi Sandwith

Sin.: *Menonvillea hirsuta* Rollins, *Menonvillea scapigera* (Phil.) Rollins

subsp. *hirsuta* (Rollins) Prina

Hierba. Endémica. 1000-1700 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA).

Menonvillea constitutionis (F. Phil.)

Rollins

Sin.: *Hexaptera constitutionis* F. Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Menonvillea cuneata (Gillies & Hook.)

Rollins

Sin.: *Decaptera trifida* Turcz., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *violacea* (Phil.) Reiche, *Hexaptera jussiaei* Barnéoud, *Hexaptera jussiaei* Barnéoud var. *tridens* (Phil.) Reiche, *Hexaptera kurtzii* Hosseus, *Hexaptera tridens* Phil., *Hexaptera violacea* Phil.

Hierba. Endémica. 1700-4600 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Menonvillea famatinensis (Boelcke)

Rollins

Sin.: *Hexaptera famatinensis* Boelcke, *Hexaptera famatinensis* Boelcke var. *sphaerocarpa* Boelcke, *Hexaptera pinnatifida* Gillies & Hook. var. *nana* Hieron., nom. nud., *Menonvillea famatinensis* (Boelcke) Rollins var. *sphaerocarpa* (Boelcke) Rollins

Hierba. Endémica. 3700-4500 m.

Países: ARG(LRI, SJU).

Menonvillea filifolia Fisch. & C.A. Mey.

Sin.: *Menonvillea angustifolia* C. Presl, *Menonvillea linearis* DC. var. *filifolia*

(Fisch. & C.A. Mey.) Rollins

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Menonvillea flexuosa Phil.

Sin.: *Menonvillea crassa* Rollins, *Menonvillea falcata* Reiche, *Menonvillea flexuosa* Phil. f. *tomentosa* Gilg & Muschl.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Menonvillea frigida (Phil.) Rollins

Sin.: *Hexaptera frigida* Phil.

Hierba. Endémica. 3900-4700 m.

Países: CHL(ANT).

Menonvillea linearis DC.

Sin.: *Dispeltophorus crassifolius* Lehm. ex Gilg & Muschler, *Menonvillea linearis* DC. var. *trifida* (Phil.) Reiche, *Menonvillea linearis* DC. var. *virgata* (Phil.) Reiche, *Menonvillea robustula* Steud., *Menonvillea trifida* Phil., *Menonvillea virgata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Menonvillea litoralis (Barnéoud) Rollins

Sin.: *Hexaptera litoralis* Barnéoud, *Menonvillea arachnoidea* O.E. Schulz, *Menonvillea gayi* Phil.

Hierba. Endémica. 200-1100 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Menonvillea macrocarpa (I.M. Johnst.)

Rollins

Sin.: *Hexaptera macrocarpa* I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3600-3800 m.

Países: CHL(ATA).

Menonvillea marticorenae (Al-Shehbaz)

Salariato & Al-Shehbaz

Sin.: *Menonvillea filifolia* Fisch. & C.A.

Mey. subsp. *marticorenae* Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Menonvillea minima Rollins

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Menonvillea nordenskjöldii (Dusén)

Rollins

Sin.: *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. f. *brevifolia* Skottsbo., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *nordenskjöldii* (Dusén) Gilg & Muschl., *Hexaptera nordenskjöldii* Dusén

Hierba. Endémica. 500-2100 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Menonvillea orbiculata Phil.

Sin.: *Menonvillea alata* Rollins, *Menonvillea orbiculata* Phil. var. *perplexa* Rollins

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Menonvillea patagonica Speg.

Sin.: *Menonvillea alyssoides* Rollins

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Menonvillea pinnatifida Barnéoud

Hierba. Endémica. 800-3000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

Menonvillea purpurea (Hastings) RollinsSin.: *Hexaptera linearis* Barnéoud,
Hexaptera purpurea Hastings

Hierba. Endémica. 0-2800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Menonvillea rigida Rollins

Hierba. Endémica. 1500-1900 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

Menonvillea scapigera (Phil.) Rollinssubsp. **longipes** (Rollins) PrinaSin.: *Hexaptera pinnatifida* Gillies & Hook.,
Menonvillea hookeri Rollins,
Menonvillea longipes Rollins,
Menonvillea perstylosa Rollins

Hierba. Endémica. 1100-3300 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).**Menonvillea scapigera** (Phil.) Rollinssubsp. **scapigera**Sin.: *Hexaptera scapigera* Phil.

Hierba. Endémica. 2200-4300 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SCR, SJU).

Menonvillea spathulata (Gillies & Hook.)

Rollins

Sin.: *Hexaptera cuneata* (Gillies & Hook.)
Rollins var. *edentata* Kuntze,
Hexaptera pusilla Phil., *Hexaptera*
spathulata Gillies & Hook., *Hexaptera*
spathulata Gillies & Hook. subsp.
pusilla (Phil.) Gilg & Muschl.,
Hexaptera spathulata Gillies & Hook.
var. *pusilla* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 2200-4100 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, RME).**Menonvillea virens** (Phil.) RollinsSin.: *Hexaptera virens* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(TAR, ANT, ATA).**Menonvillea zuloagaensis** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 3400-3500 m.

Países: ARG(SJU).

Mostacillastrum O.E. Schulz**Mostacillastrum ameghinoi** (Speg.) O.E.

Schulz

Sin.: *Sisymbrium ameghinoi* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Mostacillastrum andinum (Phil.) Al-

Shehbaz

Sin.: *Hesperis andina* (Phil.) Kuntze,
Hesperis corymbosa (Phil.) Kuntze,
Sisymbrium amplexicaule Phil. var.
corymbosum (Phil.) Reiche,
Sisymbrium andinum Phil.,
Sisymbrium andinum Phil. f.
dolihocarpum Hauman, *Sisymbrium*
andinum Phil. var. *hossei* O.E. Schulz,
Sisymbrium andinum Phil. var.
latifolium Phil., *Sisymbrium andinum*
Phil. var. *morenoanum* (Chodat &
Wilczek) O.E. Schulz, *Sisymbrium*
consanguineum Phil. ex Reiche,
Sisymbrium corymbosum Phil.,
Sisymbrium corymbosum Phil. var.
consanguineum (Phil. ex Reiche) O.E.
Schulz, *Sisymbrium morenoanum*
Chodat & Wilczek, *Sisymbrium*
morenoanum Chodat & Wilczek var.
robustum, *Sisymbrium sagittatum*
Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.)
Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. &
Arn. var. *latifolium* (Phil.) Speg.
Hierba. Endémica. 1800-3300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU).

CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Mostacillastrum carolinense (Scappini,

C.A. Bianco & Prina) Al-Shehbaz

Sin.: C.A. Bianco & Prina, *Sisymbrium*
carolinense Scappini

Subarbusto. Endémica. 1500-1700 m.

Países: ARG(SLU).

Mostacillastrum commune (Speg.) Al-

Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium andinum* Phil. var.
exauriculatum (Speg.) O.E. Schulz,
Sisymbrium andinum Phil. var.
pubescens Gilg & Muschl., hom. illeg.,
Sisymbrium commune (Speg.)
Romanczuk, *Sisymbrium sagittatum*
Hook. & Arn. var. *commune* Speg.,
Sisymbrium sagittatum Hook. & Arn.
var. *exauriculatum* Speg., *Sisymbrium*
sagittatum Hook. & Arn. var. *glaucom*
Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. &
Arn. var. *normalis* Speg., *Sisymbrium*
sagittatum Hook. & Arn. var.
pubescens (Phil.) Speg., *Sisymbrium*
sagittatum Hook. & Arn. var.
purpurascens Speg.

Hierba. Endémica. 100-3300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).**Mostacillastrum dianthoides** (Phil.) Al-

Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium arequipanum* Al-
Shehbaz, *Sisymbrium dianthoides*
Phil.

Hierba. Nativa. 3200-4400 m.

Países: ARG(JUJ). CHL(TAR, ANT).

Mostacillastrum ferreyrae (Förther &
Weigend) Al-ShehbazSin.: *Sisymbrium ferreyrae* Förther &
Weigend

Hierba. Nativa. 300-1000 m.

Países: CHL(TAR).

Mostacillastrum gracile (Wedd.) Al-Shehbaz

Sin.: *Heterothrix gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Pennellia gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Phlebiophragmus macrorrhizus* (Muschl.) O.E. Schulz, *Sisymbrium gracile* Wedd., *Thelypodium macrorrhizum* Muschl.
Hierba. Nativa. 1800-3900 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

Mostacillastrum hunzikeri Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 700-2200 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Mostacillastrum leptocarpum (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis leptocarpa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Nasturtium hastatum* Phil., *Sisymbrium andinum* Phil. var. *hastatum* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *juncalense* O.E. Schulz, *Sisymbrium gayanum* Barnéoud, *Sisymbrium hastatum* Phil., *Sisymbrium leptocarpum* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 1800-3200 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Mostacillastrum orbignyanum (E. Fourn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis orbignyana* (E. Fourn.) Kuntze, *Mostacillastrum elongatum* O.E. Schulz, *Mostacillastrum elongatum* O.E. Schulz var. *latisiliquum* O.E. Schulz, *Sisymbrium elongatum* (O.E. Schulz) Romanczuk, hom. illeg., *Sisymbrium orbignyanum* E. Fourn.
Hierba. Nativa. 700-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Mostacillastrum pectinifolium (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium pectinifolium* Al-Shehbaz
Hierba. Nativa. 2300-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Mostacillastrum saltaense Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2100-2400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Mostacillastrum stenophyllum (Gillies ex Hook. & Arn.) O.E. Schulz

Sin.: *Hesperis stenophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium stenophyllum* Gillies ex Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 300-1200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SLU, SDE, TUC).

Mostacillastrum subscandens (Speg.) Al-Shehbaz

Sin.: *Descurainia subscandens* (Speg.) Gilg & Muschl., *Erucastrum obtusangulum* Hieron., hom. illeg., *Sisymbrium subscandens* Speg., *Sophia subscandens* (Speg.) Macloskie
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE).

Mostacillastrum ventanense (Boelcke) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium perenne* Speg., hom. illeg., *Sisymbrium ventanense* Boelcke
Hierba. Endémica. 300-800 m.
Países: ARG(BAI).

Mostacillastrum volckmannii (Phil.) D.A. German & Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis sagittata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Mostacillastrum sagittatum* (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz, *Sisymbrium ciliatum* Phil., *Sisymbrium fruticosum* Reiche, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *ciliatum*

(Phil.) Speg., *Sisymbrium volckmannii* Phil., *Sophia sagittata* (Hook. & Arn.) Macloskie
Hierba. Endémica. 100-3700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME).

Mutarda Bernh.

Mutarda nigra (L.) Bernh.

Sin.: *Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch, *Rhaphospermum nigrum* (L.) Al-Shehbaz, *Sinapis nigra* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, RNE, SAL, SJU, SFE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME, JFE).

Nasturtium W.T. Aiton, nom. cons.

Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb.

Sin.: *Nasturtium officinale* W.T. Aiton var. *microphyllum* (Boenn. ex Rchb.) Beck ex Thell., *Rorippa microphylla* (Boenn. ex Rchb.) Hyl. ex A. Löve & D. Löve, *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek subsp. *microphyllum* (Boenn. ex Rchb.) O. Bólos & Vigo
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(ERI). CHL(VAL, LBO).

Nasturtium officinale W.T. Aiton

Sin.: *Nasturtium fontanum* (Lam.) Asch., *Nasturtium siifolium* Phil., hom. illeg., *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek, *Sisymbrium nasturtium-aquaticum* L.
Hierba. Introducida. 0-4100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE,

TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME, JFE). PRY(CEN). URY(MON, ROC).

Neslia Desv., nom. cons.

Neslia paniculata (L.) Desv.

Sin.: *Myagrum paniculatum* L., *Vogelia paniculata* (L.) Hornem.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SFE).

Neuontobotrys O.E. Schulz

Neuontobotrys berningeri O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-3200 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Neuontobotrys choiquensis

(Romanczuk) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium choiquense* Romanczuk
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Neuontobotrys elloanensis Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 3500 m.
Países: CHL(ANT).

Neuontobotrys frutescens (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis frutescens* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium catamarcense* Romanczuk, *Sisymbrium frutescens* Gillies ex Hook. & Arn., *Sisymbrium tomentosum* Romanczuk var. *pauciovulatum* Romanczuk, *Sisymbrium tomentosum* Romanczuk var. *tomentosum*
Hierba o arbusto. Endémica. 800-2700 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Neuontobotrys grayanus (Baehni & J.F. Macbr.) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium amplexicaule* A. Gray, hom. illeg., *Sisymbrium grayanum* Baehni & J.F. Macbr.
Hierba o subarbusto. Nativa. 2600-3300 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Neuontobotrys intricatissimus (Phil.) Al-Shehbaz

Sin.: *Draba intricatissima* Phil., *Eremodraba intricatissima* (Phil.) O.E. Schulz, *Hesperis intricatissima* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium intricatissimum* O.E. Schulz
Hierba. Nativa. 1400-2900 m.
Países: CHL(TAR).

Neuontobotrys lanatus (Walp.) Al-Shehbaz

Sin.: *Arabis lanata* Walp., *Hesperis foliosa* Kuntze, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *pubescens* Phil., *Sisymbrium donnarosae* Martic., *Sisymbrium foliosum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium lanatum* (Walp.) O.E. Schulz, *Sisymbrium lanatum* (Walp.) O.E. Schulz var. *fragile* (Wedd.) O.E. Schulz, *Sisymbrium pubescens* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz, *Sisymbrium pubescens* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz var. *glabrescens* O.E. Schulz
Hierba o subarbusto. Nativa. 2400-4100 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

Neuontobotrys linearifolius (Kuntze) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis linearifolia* Kuntze, *Neuontobotrys linifolius* O.E. Schulz, *Sisymbrium linifolium* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 100-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

Neuontobotrys mendocina (Romanczuk) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium mendocinum* Romanczuk
Hierba. Endémica. 2200-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(RME).

Neuontobotrys polyphyllus (Phil.) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium polyphyllum* Phil.
Hierba. Endémica. 3500-4500 m.
Países: ARG(CAT). CHL(ANT).

Neuontobotrys robustus (Chodat & Wilczek) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium robustum* Chodat & Wilczek
Subarbusto. Endémica. 2000-2600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

Neuontobotrys tarapacanus (Phil.) Al-Shehbaz

Sin.: *Arabis tarapacana* Phil., *Cardamine deserticola* Phil., *Neuontobotrys deserticola* (Phil.) Al-Shehbaz, *Sisymbrium amplexicaule* Phil., hom. illeg., *Sisymbrium intricatissimum* (Phil.) Reiche var. *berningeri* O.E. Schulz, *Sisymbrium intricatissimum* (Phil.) Reiche var. *brachycarpum* O.E. Schulz, *Sisymbrium philippianum* I.M. Johnst., *Sisymbrium tarapacatum* Phil.
Hierba o subarbusto. Nativa. 1700-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Noccaea Moench

Noccaea magellanica (Comm. ex Poir.) Holub

Sin.: *Draba depilis* Phil., *Thlaspi alpestre* L. var. *gracile* (Phil.) Gilg & Muschl., *Thlaspi andicola* Hook. & Arn., *Thlaspi*

commutatatum Reiche, hom. illeg., *Thlaspi exile* Phil., *Thlaspi glaucophyllum* Barnéoud, *Thlaspi gracile* Phil., *Thlaspi magellanicum* Comm. ex Poir., *Thlaspi magellanicum* Comm. ex Poir. var. *andicola* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 0-4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Onuris Phil.

Onuris alismatifolia Gilg ex Skottsbo.
Hierba. Endémica. 500-1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Onuris graminifolia Phil.

Sin.: *Draba oligosperma* Speg., hom. illeg., *Draba spegazziniana* Dusén, *Onuris graminifolia* Phil. var. *austroamericana* Boelcke, *Onuris oligosperma* (Speg.) Gilg & Muschl.
Hierba. Endémica. 1100-2300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Onuris hatcheriana (Gilg ex Macloskie) Gilg & Muschl.

Sin.: *Draba hatcheriana* Gilg ex Macloskie
Hierba. Endémica. 900-1800 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Onuris papillosa O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 100-1200 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Onuris spegazziniana Gilg & Muschl.

Sin.: *Draba graminifolia* Speg.
Hierba. Endémica. 600-1800 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Parodiodoxa O.E. Schulz

Parodiodoxa chionophila (Speg.) O.E. Schulz

Sin.: *Thlaspi chionophilum* Speg.
Hierba. Endémica. 3500-5100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Pennellia Nieuwl.

Pennellia boliviensis (Muschl.) Al-Shehbaz

Sin.: *Streptanthus boliviensis* Muschl.
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Pennellia brachycarpa Beilstein & Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 3600-3700 m.
Países: ARG(JUU).

Pennellia yalaensis Salarato & Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 1800-1900 m.
Países: ARG(JUU).

Petroravenia Al-Shehbaz

Petroravenia esepitata Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 4500-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Phlebolobium O.E. Schulz

Phlebolobium maclovianum (d'Urv.) O.E. Schulz

Sin.: *Arabis falklandica* Benth. & Hook. f., *Arabis macloviana* (d'Urv.) Hook. f., *Brassica macloviana* d'Urv., *Erysimum maclovianum* (d'Urv.) Gay ex Spreng.
Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Physaria (Nutt. ex Torr. & A. Gray) A. Gray

Physaria crassistigma O'Kane & Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2100-2900 m.
Países: ARG(MEN).

Physaria lateralis O'Kane & Al-Shehbaz

Sin.: *Lesquerella mendocina* (Phil.) A. Gray var. *microcarpa* O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 1100-2400 m.
Países: ARG(COR, LRI, MEN, NEU, SJU, SLU).

Physaria mendocina (Phil.) O'Kane & Al-Shehbaz

Sin.: *Alyssum mendocinum* (Phil.) Kuntze, *Lesquerella mendocina* (Phil.) Kurtz, *Lesquerella montevidensis* (Eichler) S. Watson, *Vesicaria mendocina* Phil., *Vesicaria montevidensis* Eichler
Hierba. Endémica. 200-1600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU). URY(PAY).

Physaria okanensis Al-Shehbaz & Prina

Hierba. Endémica. 3900-4100 m.
Países: ARG(CAT).

Physaria pygmaea O'Kane & Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2500-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).

Physaria urbaniana (Muschl.) O'Kane & Al-Shehbaz

Sin.: *Alyssum boliviense* Muschl., *Alyssum urbanianum* Muschl.
Hierba. Nativa. 2000-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

Polypsecadium O.E. Schulz

Polypsecadium arnottianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis arnottiana* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium arnottianum* Gillies ex Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 700-1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).

Polypsecadium brasiliense (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium brasiliense* O.E. Schulz
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Polypsecadium gilliesii (Romanczuk) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium gilliesii* Romanczuk
Hierba. Endémica. 700-4300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Polypsecadium grandiflorum

Romanczuk & Boelcke

Hierba. Endémica. 1000-3300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Polypsecadium harmsianum (Muschl.) O.E. Schulz

Sin.: *Polypsecadium harmsianum* (Muschl.) O.E. Schulz var. *dentatum* (Muschl.) O.E. Schulz, *Sisymbrium ragoneseanum* O.E. Schulz, *Thelypodium harmsianum* Muschl., *Thelypodium harmsianum* Muschl. var. *dentatum* Muschl.
Hierba. Nativa. 1000-3200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Polypsecadium litorale (Phil.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis litoralis* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium litorale* Phil., *Sisymbrium litorale* Phil. var. *virgatum* O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, BIO).

Polypsecadium magellanicum (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz

Sin.: *Arabis magellanica* (Juss. ex Pers.) Dusén, *Brassica antarctica* Molina, *Brassica magellanica* Juss. ex Pers., *Cardamine patagonica* Speg., *Hesperis magellanica* (Juss. ex Pers.) Kuntze, *Schizopetalon fuegianum* Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg. var. *glabrum* Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg. var. *hispidum* Speg., *Sisymbrium maclovianum* Speg., *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook. f., *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook. f. f. *glabrum* (Speg.) O.E. Schulz, *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook. f. f. *hispidum* (Speg.) O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Polypsecadium tucumanense (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium arnottianum* Gillies ex Hook. & Arn. var. *dolichocarpum* O.E. Schulz, *Sisymbrium arnottianum* Gillies ex Hook. & Arn. var. *tucumanense* O.E. Schulz, *Sisymbrium tucumanense* (O.E. Schulz) Romanczuk, *Sisymbrium tucumanense* (O.E. Schulz) Romanczuk var. *rigidocarpum* Romanczuk
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Polypsecadium zoellneri Al-Shehbaz
Hierba. Endémica.

Países: CHL(ATA).

Raphanus L.

Raphanus raphanistrum L.

Hierba. Introducida. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(COA, ITA). URY(MAL).

Raphanus sativus L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME, JFE). PRY(MIE). URY(MON, RNO, SAO, SOR).

Rapistrum Crantz, nom. cons.

Rapistrum rugosum (L.) All.

Sin.: *Myagrum rugosum* L.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, IPA). PRY(CEN). URY(MAL, MON).

Rorippa Scop.

Rorippa austroamericana Mart.-Laborde
Hierba. Nativa. 2000-4300 m.

- Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, LLA, RME).
- Rorippa bonariensis** (Poir.) Macloskie var. **bonariensis**
Sin.: *Cardamine indica* Burm. f. var. *bonariensis* (Poir.) Kuntze, *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC., *Nasturtium indicum* (L.) DC. subsp. *bonariense* (Poir.) Kuntze & Muschl., *Nasturtium macrorrhizum* Steud., *Nasturtium pamparum* Speg., *Nasturtium tweediei* O.E. Schulz, *Rorippa pamparum* (Speg.) Cabrera, *Sisymbrium bonariense* Poir.
Hierba. Nativa. 0-2400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(RME). URY(COL, FLA, MON).
- Rorippa bonariensis** (Poir.) Macloskie var. **chacoensis** Mart.-Laborde
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). PRY(COA).
- Rorippa burkartii** (Mart.-Laborde) Al-Shehbaz
Sin.: *Rorippa bonariensis* (Poir.) Macloskie var. *burkartii* Mart.-Laborde
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
- Rorippa clandestina** (Spreng.) J.F. Macbr.
Sin.: *Cardamine clandestina* (Spreng.) Kuntze, *Nasturtium clandestinum* Spreng., *Nasturtium clandestinum* Spreng. var. *brevistylum* O.E. Schulz, *Nasturtium clandestinum* Spreng. var. *sodiroidi* O.E. Schulz, *Nasturtium pumilum* Cambess., *Rorippa clandestina* (Spreng.) J.F. Macbr. var. *sodiroidi* (O.E. Schulz) J.F. Macbr.
- Hierba. Nativa. 300-2200 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ). BRA(RGS, SCA). PRY(APA).
- Rorippa coxii** (F. Phil. ex Phil.) L.E. Navas
Sin.: *Nasturtium coxii* F. Phil. ex Phil., *Nasturtium patens* Phil., *Rorippa ventanensis* Boelcke, *Sisymbrium lacinosum* Phil., *Turritis chilensis* Phil.
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(BAI, COR). CHL(VAL, ARA, RME).
- Rorippa dubia** (Pers.) H. Hara
Sin.: *Nasturtium sinapis* (Burm. f.) O.E. Schulz, *Rorippa sinapis* (Burm. f.) J.F. Macbr., comb. superfl., *Rorippa sinapis* (Burm. f.) Ohwi & Hara, *Sisymbrium dubium* Pers.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MIS, TUC). BRA(PAR).
- Rorippa hilariana** (Walp.) Cabrera
Sin.: *Cardamine hilariana* Walp., *Cardamine nasturtioides* Cambess., hom. illeg., *Nasturtium hilarianum* (Walp.) Hauman, *Nasturtium nasturtioides* Herter, *Nasturtium platense* Speg.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, RNE, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(CAS, MON, PAY, ROC).
- Rorippa mandonii** (E. Fourn.) Mart.-Laborde
Sin.: *Diplotaxis vernalis* Phil., *Hesperis mandonii* (E. Fourn.) Kuntze, *Nasturtium eggertii* O.E. Schulz, *Rorippa eggertii* (O.E. Schulz) J.F. Macbr., *Sisymbrium mandonii* E. Fourn.
- Hierba. Nativa. 100-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU).
- Rorippa nana** (Schltdl.) J.F. Macbr.
Sin.: *Kardanoglyphos nana* Schltdl., *Mathewsia boliviana* Gilg & Muschl., *Mathewsia diffusa* Rusby, *Nasturtium nanum* (Schltdl.) Wedd., *Radicula nana* (Schltdl.) Rusby, hom. illeg., *Radicula nana* (Wedd.) Druce
Hierba. Nativa. 2400-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
- Rorippa palustris** (L.) Besser
Sin.: *Nasturtium palustre* (L.) DC., *Sisymbrium amphibium* L. var. *palustre* L., *Sisymbrium palustre* (L.) Pollich
Hierba. Introducida. 100-1600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE). BRA(PAR). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).
- Rorippa philippiana** Macloskie
Sin.: *Descurainia chubutica* O.E. Schulz, *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC. var. *micranthum* (Phil.) Reiche, *Nasturtium micranthum* Phil., hom. illeg., *Nasturtium philippianum* Speg., nom. illeg., *Rorippa chubutica* (O.E. Schulz) Mart.-Laborde
Hierba. Endémica. 0-2900 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).
- Rorippa sylvestris** (L.) Besser
Sin.: *Cardamine sylvestris* (L.) Kuntze, *Nasturtium sylvestre* (L.) W.T. Aiton, *Sisymbrium sylvestre* L.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(CHU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Sarcodraba Gilg & Muschl.**Sarcodraba andina** O.E. Schulz

Sin.: *Ateixa andina* (O.E. Schulz) Ravenna
 Hierba. Endémica. 3000-4500 m.
 Países: ARG(LRI, SJU).

Sarcodraba dusenii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sin.: *Grammosperma dusenii* O.E. Schulz
 Hierba. Endémica. 500-1000 m.
 Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Sarcodraba karraikensis (Speg.) Gilg & Muschl.

Sin.: *Draba karraikensis* Speg., *Draba karraikensis* Speg. var. *major* Speg., *Draba karraikensis* Speg. var. *minor* Speg., *Sarcodraba karraikensis* (Speg.) Gilg & Muschl. var. *major* (Speg.) O.E. Schulz, *Sarcodraba karraikensis* (Speg.) Gilg & Muschl. var. *minor* (Speg.) O.E. Schulz
 Hierba. Endémica. 400-800 m.
 Países: ARG(SCR).

Sarcodraba subterranea (Speg. ex O.E. Schulz) O.E. Schulz

Sin.: *Draba karraikensis* Speg. var. *subterranea* Speg. ex O.E. Schulz
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(SCR).

Schizopetalon Sims**Schizopetalon arcuatum** Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 200-400 m.
 Países: CHL(ATA).

Schizopetalon bipinnatifidum Phil.

Hierba. Endémica. 300-2400 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Schizopetalon biseriatum Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Schizopetalon brachycarpum Al-Shehbaz

Shehbaz
 Hierba. Endémica. 2100-2300 m.
 Países: CHL(RME).

Schizopetalon corymbosum Al-Shehbaz

Hierba. Endémica.
 Países: CHL(COQ, VAL).

Schizopetalon dentatum (Barnéoud) Gilg & Muschl.

Sin.: *Diploaxis chilensis* Barnéoud, *Perreymondia dentata* Barnéoud, *Perreymondia multifida* Barnéoud, *Perreymondia viridis* Phil., *Schizopetalon viride* (Phil.) Reiche
 Hierba. Endémica. 600-2300 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Schizopetalon maritimum Barnéoud

Sin.: *Schizopetalon gayanum* Barnéoud
 Hierba. Endémica. 0-200 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Schizopetalon rupestre (Barnéoud) Reiche

Sin.: *Perreymondia brongniartii* Barnéoud, *Perreymondia rupestris* Barnéoud, *Schizopetalon brongniartii* (Barnéoud) Reiche, *Schizopetalon dentatum* (Barnéoud) Gilg & Muschl. var. *san-romanii* (Phil.) Gilg & Muschl., *Schizopetalon san-romanii* Phil., *Schizopetalon walkeri* Sims var. *brongniartii* (Barnéoud) Gilg & Muschl.
 Hierba. Endémica. 1900-3700 m.
 Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL).

Schizopetalon tenuifolium Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(ATA).

Schizopetalon walkeri Sims

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL).

Sibara Greene**Sibara anethifolia** (Phil.) Al-Shehbaz

Sin.: *Heterothrix anethifolia* (Phil.) O.E. Schulz, *Nasturtium anethifolium* Phil., *Sisymbrium carnosulum* Phil., *Werdermannia anethifolia* (Phil.) I.M. Johnst.
 Hierba. Endémica. 0-800 m.
 Países: CHL(ANT, ATA).

Sibara dilloniorum Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 0-800 m.
 Países: CHL(ANT).

Sibara macrostachya (Phil.) Al-Shehbaz

Sin.: *Nasturtium macrostachyum* Phil., *Sisymbrium larranagae* Phil., *Sisymbrium macrostachyum* Phil., *Sisymbrium pectinatum* Reiche, *Werdermannia macrostachya* (Phil.) O.E. Schulz
 Hierba. Endémica. 0-100 m.
 Países: CHL(ANT).

Sibara mendocina (Boelcke & S.C. Arroyo) Al-Shehbaz

Sin.: *Werdermannia mendocina* Boelcke & S.C. Arroyo
 Subarbusto. Endémica. 2500-3000 m.
 Países: ARG(MEN).

Sibara pinnata (Barnéoud) Al-Shehbaz

Sin.: *Nasturtium deserticola* Phil., *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud, *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud var. *pubescens* Barnéoud, *Werdermannia pinnata* (Barnéoud) O.E. Schulz
 Hierba. Endémica. 2800 m.
 Países: CHL(ANT, ATA).

Sibara tehuelches (Speg.) Al-Shehbaz
Sin.: *Pterygiosperma tehuelches* (Speg.)
O.E. Schulz, *Sisymbrium pinnatum*
Speg., hom. illeg., *Sisymbrium*
tehuelches Speg., *Streptanthus*
tehuelches (Speg.) Gilg & Muschl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Sinapis L.

Sinapis alba L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, TDF).

Sinapis arvensis L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA,
MEN, MIS, RNE, SFE, TDF).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ).
PRY(APY).
Notas: Citada para Montevideo,
Uruguay (Lombardo, 1982) sin indicar
ejemplar de referencia

Sisymbrium L.

Sisymbrium altissimum L.
Hierba. Introducida. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI,
MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO).

Sisymbrium austriacum Jacq.
Sin.: *Sisymbrium berterianum* Phil.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(COQ,
VAL, LBO, ARA, LLA, RME).

Sisymbrium erysimoides Desf.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(DFE).

Sisymbrium irio L.
Hierba. Introducida. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ,
LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU,
SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC).
CHL(AYP, ANT, ATA, VAL, LBO,
MAU, MAG, RME). URY(MON).

Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Sin.: *Erysimum officinale* L.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE,
SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME,
JFE). URY(CAS, FLA, MON, SOR).

Sisymbrium orientale L.
Hierba. Introducida. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI,
JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL,
SJU, SLU, SCR). CHL(ANT, COQ,
VAL, LBO, BIO, ARA, LSR, LLA,
MAG, RME). URY(MON).

Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(SCR).

Stenodraba O.E. Schulz

Stenodraba chillanensis (Phil.) O.E.
Schulz
Sin.: *Draba chillanensis* Phil.,
Weberbaueria chillanensis (Phil.) Al-
Shehbaz
Hierba. Endémica. 2000-2900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA,
LLA, AIS, MAG, RME).

Stenodraba colchaguensis (Barnéoud)
O.E. Schulz

Sin.: *Arabis colchaguensis* (Barnéoud)
Turcz., *Arabis drabiformis* Schltdl.,
hom. illeg., *Braya pusilla* A. Gray,
Cardamine colchaguensis Barnéoud,
Draba andina Phil., *Draba patagonica*
Phil., *Erysimum pusillum* Gillies ex
Hook. & Arn., hom. illeg., *Hesperis*
colchaguensis (Barnéoud) Kuntze,
Hesperis pusilla (A. Gray) Kuntze,
Sisymbrium colchaguensis (Barnéoud)
Wedd. ex E. Fourn., *Sisymbrium*
pusillum (A. Gray) Wedd. ex E. Fourn.,
hom. illeg., *Stenodraba andina* (Phil.)
O.E. Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.)
O.E. Schulz var. *hirticaulis* O.E.
Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E.
Schulz var. *patagonica* (Phil.) O.E.
Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E.
Schulz var. *stylosa* O.E. Schulz,
Stenodraba patagonica (Phil.)
Ravenna, *Stenodraba pusilla* (A. Gray)
Boelcke, *Stenodraba pusilla* (A. Gray)
Boelcke var. *patagonica* (Phil.)
Boelcke, *Weberbaueria colchaguensis*
(Barnéoud) Al-Shehbaz, *Weberbaueria*
pusilla (A. Gray) O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 1700-3400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, MAU, LLA, AIS,
MAG, RME).

Stenodraba imbricatifolia (Barnéoud)
O.E. Schulz
Sin.: *Braya imbricatifolia* (Barnéoud) A.
Gray, *Draba imbricatifolia* Barnéoud,
Hesperis imbricatifolia (Barnéoud)
Kuntze, *Sisymbrium imbricatifolium*
(Barnéoud) Wedd., *Stenodraba*
imbricatifolia (Barnéoud) O.E. Schulz
var. *glabrata* O.E. Schulz,
Weberbaueria imbricatifolia (Barnéoud)
Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 2800-4200 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Stenodraba lagunae (O.E. Schulz)
Salariato & Al-Shehbaz

Sin.: *Stenodraba suffruticosa* (Barnéoud)
O.E. Schulz var. *lagunae* O.E. Schulz,
Weberbaueria lagunae (O.E. Schulz)
Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 3800-4000 m.

Países: CHL(ATA).

Stenodraba lechleri (E. Fourn.) Ravenna

Sin.: *Hesperis lechleri* (E. Fourn.) Kuntze,
Hesperis petraea Kuntze, *Heterothrix*
petraea (Kuntze) O.E. Schulz,
Pennellia lechleri (E. Fourn.) Al-
Shehbaz & C.D. Bailey, *Pennellia*
petraea (Kuntze) O.E. Schulz,
Sisymbrium caespitosum Phil.,
Sisymbrium fastigiatum Phil.,
Sisymbrium lechleri E. Fourn.,
Sisymbrium petraeum Phil., nom.
illeg., *Sisymbrium stenophyllum*
Schltdl., hom. illeg., *Stenodraba*
fastigiata (Phil.) Ravenna, *Stenodraba*
glareosa Ravenna, *Weberbaueria*
lechleri (E. Fourn.) Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 300-2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(LBO, BIO, ARA, RME).

Stenodraba parvifolia (Phil.) O.E. Schulz

Sin.: *Pennellia parvifolia* (Phil.) Al-
Shehbaz & C.D. Bailey, *Sisymbrium*
hispidum Phil., hom. illeg., *Sisymbrium*
parvifolium Phil., *Sisymbrium vestitum*
(Ravenna) Al-Shehbaz, *Stenodraba*
vestita Ravenna, *Weberbaueria*
parvifolia (Phil.) Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 1500-2300 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(LBO,
MAU, BIO, RME).

Stenodraba stenophylla (Leyb.) O.E.
Schulz

Sin.: *Draba cauquenensis* Phil., *Draba*
leyboldii Phil., *Draba stenophylla*
Leyb., *Stenodraba stenophylla* (Leyb.)
O.E. Schulz var. *leyboldii* (Phil.) O.E.
Schulz, *Weberbaueria stenophylla*
(Leyb.) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: CHL(MAU, RME).

Stenodraba suffruticosa (Barnéoud)
O.E. Schulz

Sin.: *Draba imbricatifolia* Barnéoud var.
suffruticosa (Barnéoud) Reiche, *Draba*
suffruticosa Barnéoud, *Hesperis*
suffruticosa (Barnéoud) Kuntze,
Sisymbrium suffruticosum (Barnéoud)
E. Fourn., *Weberbaueria suffruticosa*
(Barnéoud) Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 3300-4100 m.
Países: CHL(COQ).

Strigosella Boiss.

Strigosella africana (L.) Botsch.

Sin.: *Hesperis africana* L., *Malcolmia*
africana (L.) W.T. Aiton
Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Teesdalia R. Br.

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.

Sin.: *Iberis nudicaulis* L.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(MAG).

Thlaspi L.

Thlaspi arvense L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR,
TDF). CHL(ANT, MAG).

Tomostima Raf.

Tomostima australis (Hook. f.) Al
Shehbaz, M. Koch & Jordon-Thaden

Sin.: *Draba ameghinoi* Speg., *Draba*
argentina Speg., *Draba argentina*
Speg. var. *grandiflora* Speg., *Draba*
argentina Speg. var. *latifolia* Speg.,
Draba australis Hook. f., *Draba*
australis Hook. f. f. *uruguayana*
(Arechav. ex Kurtz) O.E. Schulz,
Draba australis Hook. f. var.
ameghinoi (Speg.) Kurtz, *Draba*
australis Hook. f. var. *uruguayana*
Arechav. ex Kurtz

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA,
MEN, NEU, RNE, SCR, TDF).
CHL(COQ, MAG). URY(PAY).

Trichotolinum O.E. Schulz

Trichotolinum deserticola (Speg.) O.E.
Schulz

Sin.: *Descurainia deserticola* (Speg.) Gilg
& Muschl., comb. illeg., *Descurainia*
deserticola (Speg.) Speg., *Sisymbrium*
deserticola Speg., *Sophia deserticola*
(Speg.) Macloskie
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Tropidocarpum Hook.

Tropidocarpum lanatum (Barnéoud) Al-
Shehbaz & R.A. Price

Sin.: *Agallis lanata* (Barnéoud) Gilg &
Muschl. ex O.E. Schulz, *Agallis*
montana Phil., *Lepidium lanatum*
Barnéoud
Hierba. Endémica. 200-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Weberbaueria Gilg & Muschl.

Weberbaueria densifolia Al-Shehbaz
Hierba. Nativa. 4200-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).

Weberbaueria herzogii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Sin.: *Sarcodraba herzogii* O.E. Schulz
Hierba. Nativa. 3100-4700 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Weberbaueria orophila (Wedd.) Salariato & Al-Shehbaz
Sin.: *Hesperis orophila* (Wedd.) Kuntze, *Sisymbrium oliganthum* Wedd., *Sisymbrium orophilum* Wedd., *Sisymbrium septaceum* Wedd.
Hierba. Nativa. 3800-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC). CHL(AYP).

Weberbaueria peruviana (DC.) Al-Shehbaz
Sin.: *Arabis bracteata* Wedd., *Hesperis peruviana* (DC.) Kuntze, *Sisymbrium anomalum* Wedd., *Sisymbrium peruvianum* DC.
Hierba. Nativa. 2800-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Xerodraba Skottsb.

Xerodraba colobanthoides Skottsb.
Sin.: *Eudema colobanthoides* (Skottsb.) O.E. Schulz, *Skottsbergianthus colobanthoides* (Skottsb.) Boelcke, *Skottsbergianthus soriano* (Boelcke) Boelcke, *Skottsbergiella colobanthoides* (Skottsb.) Boelcke, *Skottsbergiella soriano* Boelcke
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU).

Xerodraba glebaria (Speg.) Skottsb.
Sin.: *Braya glebaria* Speg., *Eudema glebaria* (Speg.) Gilg & Muschl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Xerodraba lycopodioides (Speg.) Skottsb.
Sin.: *Braya lycopodioides* Speg., *Braya lycopodioides* Speg. var. *contracta* Speg., *Braya pectinata* Speg., hom. illeg., *Eudema lycopodioides* (Speg.) Gilg & Muschl., *Eudema pectinatum* Gilg & Muschl., *Xerodraba lycopodioides* (Speg.) Skottsb. var. *contracta* (Speg.) O.E. Schulz, *Xerodraba pectinata* Skottsb.
Subarbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Xerodraba monantha (Gilg ex Kuntze) Skottsb.
Sin.: *Braya monantha* (Gilg ex Kuntze) Speg., *Draba monantha* Gilg ex Kuntze, *Eudema monanthum* (Gilg ex Kuntze) Gilg & Muschl.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(SCR).

Xerodraba patagonica (Speg.) Skottsb.
Sin.: *Braya patagonica* Speg., *Braya pycnophylloides* Speg., *Draba monantha* Gilg ex Kuntze var. *microphylla* Gilg, nom. nud., *Eudema microphyllum* Gilg & Muschl., *Eudema patagonica* (Speg.) Gilg & Muschl., *Eudema pycnophylloides* (Speg.) Gilg & Muschl., *Xerodraba microphylla* (Gilg & Muschl.) Skottsb., *Xerodraba patagonica* (Speg.) Skottsb. subsp. *pycnophylloides* (Speg.) Salariato & Al-Shehbaz, *Xerodraba pycnophylloides* (Speg.) Skottsb., *Xerodraba pycnophylloides* (Speg.) Skottsb. var. *microphylla* (Gilg & Muschl.) O.E. Schulz

Subarbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Yunkia Salariato & Al-Shehbaz

Yunkia subscandens (Kuntze) Salariato & Al-Shehbaz
Sin.: *Cremolobus subscandens* Kuntze
Hierba. Nativa. 200-2700 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Zuloagocardamum Salariato & Al-Shehbaz

Zuloagocardamum jujuyensis Salariato & Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 3600-3700 m.
Países: ARG(JUU).

BROMELIACEAE

Acanthostachys Link, Klotzsch & Otto

Acanthostachys strobilacea (Schult. f.) Link, Klotzsch & Otto
Sin.: *Acanthostachys exilis* Bertoni, *Hohenbergia strobilacea* Schult. f.
Hierba epífita. Nativa. 700-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

Aechmea Ruiz & Pav., nom. cons.

Aechmea apocalyptica Reitz
Sin.: *Orgiesia apocalyptica* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea blumenavii Reitz var. **alba** Reitz

Sin.: *Ortgiesia blumenavii* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *alba* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Endémica. 300-800 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea blumenavii Reitz var. **blumenavii**

Sin.: *Ortgiesia blumenavii* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker

Sin.: *Aechmea pulchra* (Beer) Mez, *Aechmea tinctoria* (Mart.) Mez, *Macrochordion bromeliifolium* (Rudge) Beer, *Tillandsia bromeliifolia* Rudge

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE).

Aechmea calyculata (E. Morren) Baker var. **calyculata**

Sin.: *Aechmea gamosepala* A. Cast., nom. illeg., *Aechmea selloana* Baker, *Aechmea thyrsigera* Speg., *Chevaliera thyrsigera* (Speg.) Mez, *Hohenbergia calyculata* (E. Morren) Baker, *Hoplophytum calyculatum* E. Morren, *Macrochordion luteum* Regel & Linden, *Macrochordion nudiusculum* K. Koch, *Ortgiesia calyculata* (E. Morren) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 100-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea calyculata (E. Morren) Baker var. **variegata** Strehl

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 500-600 m.

Países: BRA(RGS).

Aechmea candida E. Morren ex Baker

Sin.: *Ortgiesia candida* (E. Morren ex Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Aechmea caudata Lindm.

Sin.: *Aechmea caudata* Lindm. var. *variegata* M.B. Foster, *Aechmea henningsiana* Wittm., *Aechmea platzmannii* Wittm., *Ortgiesia caudata* (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba terrestre, epífita o rupícola. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea coelestis (K. Koch) E. Morren

Sin.: *Hohenbergia coelestis* (K. Koch) Baker, *Hoplophytum coeleste* K. Koch, *Ortgiesia coelestis* (K. Koch) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Nativa. 600-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aechmea comata (Beer) Baker

Sin.: *Aechmea comata* (Beer) Baker var. *makoyana* (Mez) L.B. Sm., nom. illeg., *Aechmea lindenii* (E. Morren) Baker, *Aechmea lindenii* (E. Morren) Baker var. *makoyana* Mez, *Hoplophytum comatum* Beer, *Hoplophytum lindenii* (E. Morren), *Macrochordion lindenii* (E. Morren) Wittm., *Ortgiesia lindenii* (E. Morren) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava comata* (Beer) Gaudich. ex Wittm.

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Aechmea cylindrata Lindm.

Sin.: *Aechmea cylindrata* Lindm. var. *micrantha* Lindm., *Aechmea*

hyacinthus F. Muell., *Ortgiesia cylindrata* (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea dealbata E. Morren ex Baker

Sin.: *Aechmea esseri* E. Gross & Rauh, *Platyaechmea dealbata* (E. Morren ex Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.

Países: PRY(AMA).

Aechmea distichantha Lem.

Sin.: *Aechmea distichantha* Lem. f. *albiflora* L.B. Sm., *Aechmea distichantha* Lem. var. *glaziovii* (Baker) L.B. Sm., *Aechmea distichantha* Lem. var. *schlumbergeri* E. Morren ex Mez, *Aechmea excavata* Baker, *Aechmea glaziovii* Baker, *Aechmea grandiceps* (Griseb.) Mez, *Aechmea hookeri* Lem., *Aechmea platyphylla* Hassl., *Aechmea polystachia* Mez, *Aechmea polystachia* Mez var. *excavata* (Baker) Mez, *Aechmea polystachia* Mez var. *longifolia* A. Cast., *Aechmea polystachia* Mez var. *myriophylla* Hassl., *Chevaliera grandiceps* Griseb., *Hohenbergia distichantha* (Lem.) Baker, *Platyaechmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg., *Platyaechmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress f. *albiflora* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg., *Platyaechmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *glaziovii* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg., *Platyaechmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *schlumbergeri* (E. Morren ex Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 700-2200 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Aechmea gamosepala Wittm. var. **gamosepala**

Sin.: *Aechmea gamosepala* Wittm. var. *angustifolia* Wittm., *Ortgiesia gamosepala* (Wittm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea gamosepala Wittm. var. **nivea** Reitz

Sin.: *Ortgiesia gamosepala* (Wittm.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *nivea* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea gracilis Lindm.

Sin.: *Ortgiesia gracilis* (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aechmea joannis Strehl

Sin.: *Aechmea joannis* Strehl var. *alvipetala* Strehl
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Aechmea kertesziae Reitz

Sin.: *Aechmea kertesziae* Reitz var. *viridi-aurata* Reitz, *Aechmea leppardii* Philcox, *Ortgiesia kertesziae* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Ortgiesia kertesziae* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *viridi-aurata* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Aechmea kleinii Reitz

Sin.: *Pothuava kleinii* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Endémica. 1000-1300 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

Sin.: *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. f. *tabuleirensis* (Reitz) Reitz, *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *cuspidata* Baker, *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *flavomarginata* E. Pereira, *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *tabuleirensis* Reitz, *Pothuava nudicaulis* (L.) Regel var. *cuspidata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava nudicaulis* (L.) Regel var. *flavomarginata* (E. Pereira) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava spicata* Gaudich., nom. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea organensis Wawra

Sin.: *Aechmea caudata* Lindm. var. *eipperii* Reitz, *Ortgiesia organensis* (Wawra) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea ornata Baker

Sin.: *Aechmea hystrix* E. Morren, *Aechmea ornata* Baker var. *hoehneana* L.B. Sm., *Aechmea ornata* Baker var. *nationalis* Reitz, *Chevaliera ornata* Gaudich., nom. illeg., *Echinostachys hystrix* (E. Morren) Wittm., *Pothuava ornata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava ornata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *hoehneana* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava ornata* (Baker) L.B.

Sm. & W.J. Kress var. *nationalis* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aechmea pectinata Baker

Sin.: *Aechmea crocophylla* (E. Morren) Baker, *Chevaliera crocophylla* E. Morren, *Pothuava pectinata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aechmea pimenti-velosoi Reitz

Sin.: *Aechmea pimenti-velosoi* Reitz var. *glabra* Reitz, *Ortgiesia pimenti-velosoi* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Ortgiesia pimenti-velosoi* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *glabra* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm. var. **albobracteata** Strehl

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(RGS).

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm. var. **benrathii** (Mez) Reitz

Sin.: *Aechmea benrathii* Mez, *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *benrathii* (Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm. var. **ortgiesii** (Baker) Reitz

Sin.: *Aechmea ortgiesii* Baker, *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *ortgiesii* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress

W.J. Kress, *Ortgiesia tillandsioides* Regel
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm.
var. **recurvata**
Sin.: *Aechmea ampullacea* Mez, *Aechmea ampullacea* Mez var. *longifolia* Hassl., *Aechmea guaratubensis* E. Pereira, *Macrochordion recurvatum* Klotzsch, *Ortgiesia guaratubensis* (E. Pereira) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA). URY(CLA, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

Aechmea rubroaristata Leme & Fraga
Hierba. Endémica. 1100-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea triangularis L.B. Sm.
Hierba. Nativa. 600-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Aechmea winkleri Reitz
Sin.: *Ortgiesia winkleri* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Ananas Mill.

Ananas ananassoides (Baker) L.B. Sm.
Sin.: *Acanthostachys ananassoides* Baker, *Ananas guaraniticus* Bertoni
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, SPE).

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. f.
Sin.: *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f.
var. *rudis* Bertoni, *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f. var. *striatus* M.B. Foster, *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f. var. *tricolor* (Bertoni) L.B. Sm., *Ananas comosus* (L.) Merr. var. *tricolor* (Bertoni) Camargo, *Ananassa bracteata* Lindl.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, PAI).

Ananas fritzmuelleri Camargo
Sin.: *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f.
var. *albus* L.B. Sm.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Billbergia Thunb.

Billbergia alfonsi-joannis Reitz
Hierba epífita. Nativa. 700-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. var. **amoena**
Sin.: *Billbergia amoena* (Lodd.) Lindl. var. *rubra* M.B. Foster, *Tillandsia amoena* Lodd.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. var. **viridis** L.B. Sm.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Billbergia distachia (Vell.) Mez var. **concolor** Reitz
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Billbergia distachia (Vell.) Mez var. **distachia**
Sin.: *Tillandsia distachia* Vell.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Billbergia distachia (Vell.) Mez var. **maculata** Reitz
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Billbergia distachia (Vell.) Mez var. **straussiana** (Wittm.) L.B. Sm.
Sin.: *Billbergia bakeri* E. Morren var. *straussiana* Wittm.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Billbergia magnifica Mez
Sin.: *Billbergia magnifica* Mez var. *acutisepala* Hassl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel
Sin.: *Billbergia bonplandiana* Gaudich. ex Mez, *Billbergia linearifolia* Baker, *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel f. *rupestris* Hassl., *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel var. *schimperiana* (Wittm. ex Baker) Mez, *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel var. *striata* Reitz, *Billbergia schimperiana* Wittm. ex Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI). URY(ART, CLA, MON, RIV, TAC).

Billbergia porteana Brongn. ex Beer
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Notas: Citado para Paraguay (Gaiotto et al. 2010: 96) sin indicar material de referencia.

Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.

Sin.: *Bromelia pyramidalis* Sims
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Billbergia zebrina (Herb.) Lindl.

Sin.: *Billbergia canterae* André, *Bromelia zebrina* Herb.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART).

Bromelia Plum. ex L.

Bromelia antiacantha Bertol.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, RIV, ROC).

Bromelia balansae Mez

Sin.: *Bromelia argentina* Baker
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Bromelia hieronymi Mez

Hierba. Nativa. 400-700 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Bromelia serra Griseb.

Sin.: *Rhodostachys argentina* Baker
Hierba. Nativa. 100-1200 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, CEN, PAI, PHA).

Bromelia urbaniana (Mez) L.B. Sm.

Sin.: *Deinacanthon urbanianum* (Mez) Mez, *Rhodostachys urbaniana* Mez
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CHO, PHA).

Canistropsis (Mez) Leme

Canistropsis billbergioides (Schult. f.)

Leme
Sin.: *Hohenbergia billbergioides* Schult. f., *Nidularium billbergioides* (Schult. f.) L.B. Sm., *Nidularium billbergioides* (Schult. f.) L.B. Sm. var. *citrinum* (Burch. ex Baker) Reitz, *Nidularium citrinum* Mez, *Tillandsia citrina* Burch. ex Baker
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Catopsis Griseb.

Catopsis berteroniana (Schult. f.) Mez

Sin.: *Catopsis mosenii* Mez, *Tillandsia berteroniana* Schult. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez

Sin.: *Catopsis modesta* F.J. Müll., *Catopsis sessiliflora* (Ruiz & Pav.) Mez var. *dioica* L.B. Sm., *Tillandsia sessiliflora* Ruiz & Pav.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Deuterocohnia Mez

Deuterocohnia abstrusa (A. Cast.) N.

Schütz ex D. Butcher
Sin.: *Abromeitiella abstrusa* A. Cast., *Dyckia abstrusa* (A. Cast.) Forzza
Hierba. Nativa. 1500-3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Deuterocohnia brevifolia (Griseb.) M.A.

Spencer & L.B. Sm.
Sin.: *Abromeitiella brevifolia* (Griseb.) A. Cast., *Abromeitiella brevifolia* (Griseb.) A. Cast. subsp. *chlorantha* (Speg.) Schulze-Motel, *Abromeitiella chlorantha* (Speg.) Mez, *Abromeitiella lorentziana* (Mez) A. Cast., *Deuterocohnia lorentziana* (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm., *Dyckia andina* Forzza, *Dyckia grisebachii* Baker, *Hepetis lorentziana* (Mez) Mez, *Lindmania brevifolia* (Griseb.) Hauman, *Lindmania chlorantha* (Speg.) Hauman, *Meziothamnus brevifolius* (Griseb.) Harms, *Navia brevifolia* Griseb., *Pitcairnia brevifolia* (Griseb.) R.E. Fr., *Pitcairnia chlorantha* (Speg.) A. Cast., *Pitcairnia lorentziana* (Speg.) A. Cast., *Pitcairnia lorentziana* Mez, *Tillandsia chlorantha* Speg.
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Deuterocohnia chrysantha (Phil.) Mez

Sin.: *Dyckia chrysantha* (Phil.) Forzza, *Pitcairnia chrysantha* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Deuterocohnia digitata L.B. Sm.

Sin.: *Dyckia digitata* (L.B. Sm.) Forzza
Hierba. Nativa. 2900 m.
Países: ARG(SAL).

Deuterocohnia haumanii A. Cast.

Sin.: *Dyckia haumanii* (A. Cast.) Forzza
Hierba. Endémica. 1000-1900 m.

- Países: ARG(CAT, SAL, SJU, TUC).
- Deuterocohnia meziana** Kuntze ex Mez
subsp. **vallegrandensis** S.E. Gómez,
Slanis & A. Grau
Sin.: *Dyckia meziana* (Kuntze ex Mez)
Forzza subsp. *vallegrandensis* (S.E.
Gómez, Slanis & A. Grau) Forzza
Hierba. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(JUU).
- Deuterocohnia meziana** Kuntze ex Mez
subsp. **vogtii** N.Schütz
Sin.: *Dyckia meziana* (Kuntze ex Mez)
Forzza subsp. *vogtii* (N. Schütz)
Forzza
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: PRY(APY, PHA).
- Deuterocohnia recurvipetala** E. Gross
Sin.: *Dyckia recurvipetala* (E. Gross)
Forzza
Hierba. Endémica. 500-600 m.
Países: ARG(COR, SDE).
- Deuterocohnia schreiteri** A. Cast.
Sin.: *Dyckia schreiteri* (A. Cast.) Forzza
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,
SAL, SJU, SLU, TUC).
- Deuterocohnia strobilifera** Mez
Sin.: *Deuterocohnia strobilifera* Mez var.
inermis L.B. Sm., *Dyckia strobilifera*
(Mez) Forzza
Hierba. Nativa. 2500-3400 m.
Países: ARG(SAL).
- Dyckia** Schult. f.
- Dyckia affinis** Baker
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(CON, PAI).
- Dyckia agudensis** Irgang & Sobral
Hierba. Endémica. 400 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia alba** S. Winkl.
Hierba terrestre. Endémica. 400 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia apiunensis** P.J. Braun & C.
Gastaldi
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).
- Dyckia brevifolia** Baker
Sin.: *Dyckia gemellaria* E. Morren ex Mez,
Dyckia sulphurea K. Koch
Hierba. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(SCA).
- Dyckia choristaminea** Mez
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).
- Dyckia commixta** Hassl.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: PRY(COA).
- Dyckia delicata** Larocca & Sobral
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia distachya** Hassl.
Sin.: *Dyckia distachya* Hassl. f. *induta*
Hassl., *Dyckia interrupta* Mez
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).
PRY(APA).
- Dyckia dusenii** L.B. Sm.
Sin.: *Dyckia ibicuiensis* Strehl
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dyckia x elisabethae** S. Winkl.
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia encholirioides** (Gaudich.) Mez
Sin.: *Dyckia catharinensis* K. Koch, *Dyckia*
catharinensis K. Koch var. *dentata*
Wittm., *Dyckia encholirioides*
(Gaudich.) Mez var. *rubra* (Wittm.)
Reitz, *Dyckia rubra* Wittm., *Encholirion*
catharinense (K. Koch) Benth. & Hook.
f. ex Mez, nom. nud., *Encholirion*
garreli Beer, nom. illeg., *Garrelia*
encholirioides Gaudich.
Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-
100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dyckia exserta** L.B. Sm.
Hierba rupícola. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).
- Dyckia ferox** Mez
Sin.: *Deuterocohnia divaricata* Mez,
Deuterocohnia meziana Kuntze ex
Mez subsp. *meziana*, *Deuterocohnia*
paraguariensis Hassl., *Dyckia ferox*
Mez f. *australis* Hassl., *Dyckia ferox*
Mez f. *hamosa* (Mez) A. Cast., *Dyckia*
ferox Mez f. *vulgaris* Hassl., *Dyckia*
ferox Mez subsp. *hamosa* (Mez)
Hassl., *Dyckia hamosa* Mez, *Dyckia*
meziana (Kuntze ex Mez) Forzza,
nom. illeg.
Hierba. Nativa. 1200-300 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR).
PRY(APY, AMA, BOQ, CON, COA,
PAI).
- Dyckia floribunda** Griseb.
Sin.: *Dyckia chaguar* A. Cast., *Dyckia*
gilliesii Baker
Hierba terrestre o rupícola. Endémica.
800-1200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
SAL, SJU, SLU). PRY(PAI).
- Dyckia fosteriana** L.B. Sm. var.
fosteriana

- Hierba rupícola. Endémica. 1000-1200 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia fosteriana** L.B. Sm. var. **robustior** L.B. Sm.
Hierba rupícola. Endémica. 1900 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia frigida** Hook. f.
Sin.: *Dyckia regalis* Linden & E. Morren ex Baker, nom. nud.
Hierba. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia gracilis** Mez
Hierba. Nativa. 200-500 m.
Países: ARG(CHA).
- Dyckia hatschbachii** L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 500 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia hebdingii** L.B. Sm.
Sin.: *Dyckia domfelicianensis* Strehl
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia ibiramensis** Reitz
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(SCA).
- Dyckia insignis** Hassl.
Sin.: *Dyckia grandiflora* Mez, *Dyckia insignis* Hassl. var. *flaviflora* Hassl., *Dyckia insignis* Hassl. var. *macrantha* Hassl., *Dyckia insignis* Hassl. var. *obtusiflora* Hassl.
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(CON).
- Dyckia irmgardiae** L.B. Sm.
Hierba terrestre. Endémica. 200-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia x julianae** Strehl
Hierba terrestre. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia leptostachya** Baker
Sin.: *Dyckia apensis* Mez, *Dyckia boliviensis* Mez, *Dyckia conspicua* Mez, *Dyckia hassleri* Mez, *Dyckia longifolia* Mez, *Dyckia rojasii* Mez
Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA).
- Dyckia longipetala** Baker
Sin.: *Deuterocohnia longipetala* (Baker) Mez, *Deuterocohnia longipetala* (Baker) Mez f. *uberrima* A. Cast., *Dyckia decomposita* Baker, *Puya flava* Willd. ex Baker, nom. nud., *Puya weberii* Schlumb. ex Lillo
Hierba. Nativa. 400-2100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).
- Dyckia magnifica** H. Büneker & Mariath
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Dyckia maritima** Baker
Sin.: *Prionophyllum maritimum* (Baker) Mez
Hierba rupícola. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Dyckia microcalyx** Baker var. **microcalyx**
Sin.: *Dyckia microcalyx* Baker var. *inermis* Hassl., *Dyckia microcalyx* Baker var. *micrantha* Hassl., *Dyckia minutiflora* Mez
Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-300 m.
- Países: BRA(PAR). PRY(APA, GUA, PAI).
- Dyckia microcalyx** Baker var. **ostenii** L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
- Dyckia minarum** Mez
Hierba rupícola. Nativa. 900-1300 m.
Países: BRA(SCA).
- Dyckia mitis** A. Cast.
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS).
- Dyckia monticola** L.B. Sm. & Reitz
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: BRA(SCA).
- Dyckia niederleinii** Mez
Sin.: *Dyckia missionum* Mez, *Dyckia missionum* Mez var. *breviflora* Hassl.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS).
- Dyckia nigrospinulata** Strehl
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia pampeana** H. Büneker
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(TAC).
- Dyckia pontesii** H. Büneker, L. Witeck & K. Soares
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia pseudodelicata** H. Büneker & Mariath
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Dyckia x racinae L.B. Sm.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Dyckia ragonesei A. Cast.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE).

Dyckia reitzii L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dyckia remotiflora Otto & A. Dietr. var. **montevidensis** (K. Koch) L.B. Sm.Sin.: *Dyckia montevidensis* K. Koch, *Dyckia rariflora* Schult. f. var. *montevidensis* (K. Koch) Baker ex Hauman & Vanderveken

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, LAV, RNO, RIV).

Dyckia remotiflora Otto & A. Dietr. var. **remotiflora**Sin.: *Dyckia jonesiana* Strehli, *Dyckia rariflora* Schult. f. var. *cunninghamii* Baker, *Dyckia rariflora* Schult. f. var. *remotiflora* (Otto & A. Dietr.) Baker, comb. illeg., *Dyckia vaginosa* Mez

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC).

Dyckia remotiflora Otto & A. Dietr. var. **tandilensis** (Speg.) CabreraSin.: *Dyckia montevidensis* K. Koch var. *tandilensis* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Dyckia retardata S. Winkl.

Hierba terrestre. Endémica. 300-1200 m.

Países: BRA(RGS).

Dyckia retroflexa S. Winkl.

Hierba terrestre. Endémica. 300-1200 m.

Países: BRA(RGS).

Dyckia rigida Strehli

Hierba terrestre. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Dyckia selloa (K. Koch) BakerSin.: *Dyckia grandifolia* Baker, *Dyckia macracantha* Baker, *Dyckia myriostachya* Baker, *Prionophyllum selloum* K. Koch

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY.

Dyckia strehliana H. Büneker & R.

Pontes

Hierba. Endémica. 200-300 m.

Países: BRA(RGS).

Dyckia subinermis Mez

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(MIS).

Dyckia tobatiensis Hassl.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: PRY(COA).

Dyckia tomentella Mez

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(AMA, PHA).

Dyckia tomentosa MezSin.: *Dyckia polyclada* L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Dyckia tuberosa (Vell.) BeerSin.: *Dyckia cabrae* L.B. Sm. & Reitz, *Dyckia coccinea* Mez, *Dyckia coccinea* Mez var. *deltoidea* L.B. Sm., *Dyckia crocea* L.B. Sm., *Dyckia deltoidea*(L.B. Sm.) L.B. Sm., *Dyckia lutziana* L.B. Sm., *Dyckia pseudococcinea* L.B. Sm., *Dyckia remotiflora* Otto & A. Dietr. var. *angustior* L.B. Sm., *Dyckia tuberosa* (Vell.) Beer var. *deltoidea* (L.B. Sm.) L.B. Sm., *Tillandsia tuberosa* Vell.

Hierba. Nativa. 800-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dyckia tweediei Mez

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SAL, SDE).

Dyckia velascana Mez

Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 700-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Dyckia velloziifolia Mez

Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(CAU).

Dyckia vestita Hassl.

Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(APY, CON, PAI).

Dyckia vicentensis StrehliSin.: *Dyckia waechteri* Strehli

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Dyckia wilsonii P.J. Braun & C. Gastaldi

Hierba. Endémica. 300-500 m.

Países: BRA(SCA).

Dyckia virgata Mez

Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(PAI, PHA).

Dyckia walteriana Leme

Hierba. Endémica. 700-700 m.

Países: BRA(PAR).

Edmundoa Leme

Edmundoa lindenii (Regel) Leme

Sin.: *Aechmea eburnea* (E. Morren) Baker, *Aechmea viridis* (E. Morren) Baker, *Canistrum eburneum* E. Morren, nom. illeg., *Canistrum lindenii* (Regel) Mez, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *elatum* Reitz, nom. nud., *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *exiguum* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *humile* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *magnum* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *parvum* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *procerum* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez var. *pehnkii* Reitz, *Edmundoa lindenii* (Regel) Leme var. *rosea* (E. Morren) Leme, *Nidularium lindenii* Regel
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Fascicularia Mez

Fascicularia bicolor (Ruiz & Pav.) Mez subsp. bicolor

Sin.: *Billbergia bicolor* (Ruiz & Pav.) Schult. f., *Bromelia bicolor* Ruiz & Pav., *Bromelia joinvillei* E. Morren, *Fascicularia micrantha* (Phil.) Mez, *Fascicularia parviflora* Mez, *Rhodostachys bicolor* (Ruiz & Pav.) Benth. ex Hook. f. ex Baker, *Rhodostachys micrantha* Phil.
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 600 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Fascicularia bicolor (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **canaliculata** E.C. Nelson & Zizka

Sin.: *Bromelia albobracteata* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Fascicularia kirchhoffiana* (Wittm.) Mez, *Rhodostachys albobracteata* Baker, *Rhodostachys pitcairniifolia* (B. Verl.) Benth. & Hook., hom. illeg. var. *kirchhoffiana* Wittm.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Fosterella L.B. Sm.

Fosterella albicans (Griseb.) L.B. Sm.
Sin.: *Cottendorfia albicans* Griseb., *Lindmania albicans* (Griseb.) Mez
Hierba rupícola. Nativa. 900-2100 m.
Países: ARG(SAL).

Fosterella penduliflora (C.H. Wright) L.B. Sm.
Sin.: *Catopsis penduliflora* C.H. Wright, *Lindmania penduliflora* (C.H. Wright) Stapf
Hierba rupícola. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Fosterella rojasii (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Sin.: *Lindmania rojasii* L.B. Sm.
Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(AMA).

Greigia Regel

Greigia berteroi Skottsb.
Sin.: *Hesperogreigia berteroi* (Skottsb.) Skottsb.
Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: CHL(JFE).

Greigia landbeckii (Lechl. ex Phil.) Phil. ex F. Phil.
Sin.: *Bromelia landbeckii* Lechl. ex Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(BIO, LSR, LLA).

Greigia pearcei Mez

Hierba. Endémica. 100-400 m.
Países: CHL(BIO, LSR, LLA).

Greigia sphacelata (Ruiz & Pav.) Regel

Sin.: *Billbergia sphacelata* (Ruiz & Pav.) Schult. f., *Bromelia clandestina* Carrière, nom. nud., *Bromelia crassa* Steud., nom. nud., *Bromelia discolor* Lindl., *Bromelia sphacelata* Ruiz & Pav.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Hohenbergia Schult. f.

Hohenbergia augusta (Vell.) E. Morren
Sin.: *Aechmea augusta* (Vell.) Baker, *Hoplophytum augustum* (Vell.) Beer, *Tillandsia augusta* Vell.
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Neoregelia L.B. Sm.

Neoregelia chlorosticta (Baker) L.B. Sm.
Sin.: *Aregelia chlorosticta* (Baker) Mez, *Billbergia chlorosticta* Baker, nom. nud., *Karatas chlorosticta* Baker, *Neoregelia marmorata* L.B. Sm., *Neoregelia sarmentosa* (Regel) L.B. Sm. var. *chlorosticta* (Baker) L.B. Sm., *Nidularium chlorosticta* E. Morren ex Baker, nom. nud., *Regelia chlorosticta* (Baker) Lindm.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Neoregelia doeringiana L.B. Sm.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 300-800 m.

Países: BRA(PAR).

Neoregelia laevis (Mez) L.B. Sm.

Sin.: *Aregelia laevis* Mez, *Karatas candida* Mez, nom. illeg., *Neoregelia laevis* (Mez) L.B. Sm. f. *maculata* H. Luther
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Neoregelia maculata L.B. Sm.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Nidularium Lem.**Nidularium albiflorum** (L.B. Sm.) Leme

Sin.: *Nidularium rubrum* Beer ex L.B. Sm.
var. *albiflorum* L.B. Sm.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Nidularium amazonicum (Baker) Linden & E. Morren ex Lindm.

Sin.: *Canistrum amazonicum* (Baker) Mez, *Karatas amazonica* Baker, *Wittrockia amazonica* (Baker) L.B. Sm., *Wittrockia smithii* Reitz

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 200-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nidularium angustibracteatum Leme

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Nidularium campo-alegreense Leme

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Nidularium catarinense Leme

Hierba epífita. Endémica. 300-900 m.

Países: BRA(SCA).

Nidularium innocentii Lem. var. **innocentii**

Sin.: *Karatas innocentii* (Lem.) Antoine, *Nidularium exostigmum* Tardivo, *Nidularium innocentii* Lem. var. *paxianum* (Mez) L.B. Sm., *Nidularium paxianum* Mez

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nidularium innocentii Lem. var. **lineatum** (Mez) L.B. Sm.

Sin.: *Nidularium lineatum* Mez

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(SCA).

Nidularium innocentii Lem. var. **striatum** (Bull.) Wittm.

Sin.: *Nidularium innocentii* Lem. var. *bauense* Reitz, *Nidularium striatum* Bull.

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 200 m.

Países: BRA(SCA).

Nidularium jonesianum Leme

Hierba epífita. Nativa. 200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Nidularium procerum Lindm.

Sin.: *Aechmea purpurea* Baker, *Canistrum purpureum* E. Morren, nom. nud., *Nidularium affine* Mez, *Nidularium gracile* Tardivo, *Nidularium insularis* E. Pereira & Leme, *Nidularium kermesianum* F.J. Müll. ex Mez, *Nidularium porphyreum* Mez, *Nidularium procerum* Lindm. var. *kermesianum* (F.J. Müll. ex Mez) Reitz, *Nidularium terminale* Ule

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nidularium scheremetiewii Regel

Sin.: *Karatas scheremetiewii* (Regel) Antoine, *Nidularium corcovadense* Ule
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(SCA).

Ochagavia Phil.**Ochagavia andina** (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner

Sin.: *Rhodostachys andina* Phil.

Hierba. Endémica. 700-2500 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Ochagavia carnea (Beer) L.B. Sm. & Looser

Sin.: *Bromelia carnea* Beer, *Bromelia lindleyana* Lem., nom. illeg., *Ochagavia chamissonis* (Mez) L.B. Sm. & Looser, *Ochagavia grandiflora* (Phil.) Mez, *Pourretia argentea* Wittm., nom. nud., *Rhodostachys carnea* (Beer) Mez, *Rhodostachys chamissonis* Mez, *Rhodostachys grandiflora* Phil., *Ruckia ellemeti* Regel

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

Ochagavia elegans Phil.

Sin.: *Rhodostachys elegans* (Phil.) Mez

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(JFE).

Ochagavia litoralis (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner

Sin.: *Bromelia pitcairniifolia* (B. Verl.) K. Koch, *Fascicularia litoralis* (Phil.) Mez, *Fascicularia pitcairniifolia* (B. Verl.) Mez, *Hechtia carnea* Wittm., nom. nud., *Hechtia pitcairniifolia* B. Verl., *Ochagavia lindleyana* Mez,

- Placseptalia rebecae* Espinosa,
Rhodostachys litoralis Phil.,
Rhodostachys pitcairniifolia (B. Verl.)
Benth. & Hook., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).
- Pitcairnia** L'Hér., nom. cons.
- Pitcairnia chiriguana** A. Cast.
Hierba. Endémica. 600 m.
Países: ARG(SAL).
- Pitcairnia flammea** Lindl. var. **flammea**
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pitcairnia flammea** Lindl. var. **floccosa**
L.B. Sm.
Sin.: *Pitcairnia muscosa* Mart. ex Schult. f.
Hierba. Nativa. 700-1900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Pitcairnia flammea** Lindl. var. **glabrior**
L.B. Sm.
Hierba. Nativa. 600-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Pitcairnia oranensis** L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 800 m.
Países: ARG(SAL).
- Pitcairnia paraguayensis** L.B. Sm.
Hierba terrestre o epífita. Endémica.
400-500 m.
Países: PRY(AMA).
- Pitcairnia saltensis** L.B. Sm.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(SAL).
- Pseudananas** Hassl. ex Harms
- Pseudananas sagenarius** (Arruda)
Camargo
Sin.: *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f.
var. *sagenarius* (Arruda) Bertoni,
Ananas macrodontes E. Morren,
Ananas sativus Schult. f. var.
macrodontes (E. Morren) Bertoni,
Ananas sativus Schult. f. var.
sagenarius (Arruda) Bertoni, *Bromelia*
sagenaria Arruda, *Pseudananas*
macrodontes (E. Morren) Harms
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, SCA).
PRY(APY, CAU, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, ÑEE, PAI).
- Puya** Molina
- Puya alpestris** (Poepp.) Gay subsp.
alpestris
Sin.: *Pourretia alpestris* Poepp., *Puya*
pumila Ravenna, *Puya whytei* Hook. f.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU, SJU). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Puya alpestris** (Poepp.) Gay subsp.
zoellneri Zizka, J.V. Schneid. &
Novoa
Sin.: *Pitcairnia alpestris* L.H. Bailey, nom.
nud.
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
RME).
- Puya assurgens** L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 1700-2000 m.
Países: ARG(JUU).
- Puya berteroniana** Mez
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Puya boliviensis** Baker
Sin.: *Puya copiapina* Phil., *Puya whytei*
Hook. f.
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).
- Puya bravoii** E. Aráoz & A. Grau
Hierba. Endémica. 3100 m.
Países: ARG(SAL).
- Puya castellanosi** L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 2300-3000 m.
Países: ARG(SAL).
- Puya chilensis** Molina
Sin.: *Pitcairnia chilensis* Lodd. ex Loudon,
nom. nud., *Pitcairnia coarctata* (Ruiz &
Pav.) Pers., *Pourretia coarctata* Ruiz &
Pav., *Puya chilensis* Molina var.
gigantea (Phil.) Baker, *Puya coarctata*
(Ruiz & Pav.) Fisch., *Puya gigantea*
Phil., *Puya quillotana* W. Weber, *Puya*
suberosa Molina
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO,
RME).
- Puya coerulea** Lindl. var. **coerulea**
Sin.: *Pourretia coerulea* Miers, nom. nud.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Puya coerulea** Lindl. var. **intermedia**
(L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser
Sin.: *Puya paniculata* Phil., *Puya violacea*
(Brongn.) Mez var. *intermedia* L.B.
Sm. & Looser
Hierba. Endémica. 400-700 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).
- Puya coerulea** Lindl. var. **monteroana**
(L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser
Sin.: *Puya violacea* (Brongn.) Mez var.
monteroana L.B. Sm. & Looser
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: CHL(LBO).

Puya coerulea Lindl. var. **violacea** (Brongn.) L.B. Sm. & Looser

Sin.: *Pitcairnia coerulea* (Lindl.) Benth. ex Baker, *Pitcairnia philippii* Baker, *Pitcairnia violacea* Brongn., *Pourretia rubricaulis* Miers, *Pourretia violacea* Linden, *Puya glabrata* Phil. ex Baker, nom. nud., *Puya rubricaulis* (Steud.) Miers, *Puya violacea* (Brongn.) Mez
Hierba. Endémica. 400-1200 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

Puya dyckiioides (Baker) Mez
Sin.: *Pitcairnia dyckiioides* Baker
Hierba. Nativa. 1300-3400 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Puya gilmartiniae G.S. Varad. & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: CHL(COQ).

Puya harmsii (A. Cast.) A. Cast.
Sin.: *Puya spathacea* (Griseb.) Mez var. *harmsii* A. Cast.
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, TUC).

Puya hofstenii Mez
Sin.: *Puya hauthalii* Mez
Hierba. Nativa. 3500-3800 m.
Países: ARG(JUU).

Puya lilloi A. Cast.
Hierba. Endémica. 1200-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Puya micrantha Mez
Hierba. Nativa. 1500-1700 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Puya mirabilis (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Pitcairnia mirabilis* Mez, *Pitcairnia mirabilis* Mez var. *tucumana* A. Cast.
Hierba. Nativa. 900-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Puya novarae G.S. Varad. ex S.E. Gómez & A. Grau
Hierba. Endémica. 2600-4100 m.
Países: ARG(SAL).

Puya smithii A. Cast.
Hierba. Endémica. 1500-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Puya spathacea (Griseb.) Mez
Sin.: *Pitcairnia spathacea* Griseb., *Puya formosa* Speg.
Hierba. Nativa. 1400-2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

Puya venusta Phil.
Sin.: *Pitcairnia sphaerocephala* Baker, *Pitcairnia venusta* Baker, *Puya coquimbensis* Mez, *Puya gaudichaudii* Mez, *Puya venusta* Phil. ex Baker, nom. nud.
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Puya vervoortii S.E. Gómez & A. Grau
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(SJU).
Notas: Observada también en la provincia de La Rioja (serranías cercanas a Guandacol) cfr. Gómez & Grau (Bol. Soc. Argent. Bot. 44: 192. 2009).

Puya volcanensis Castillón
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Puya weberiana E. Morren ex Mez
Sin.: *Puya flora* Speg.
Hierba. Endémica. 3600-4000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Puya yakespala A. Cast.
Hierba. Endémica. 3400-4000 m.
Países: ARG(SAL).

Quesnelia Gaudich.

Quesnelia arvensis (Vell.) Mez
Sin.: *Ananas arvensis* (Vell.) Steud., *Bromelia arvensis* Vell., *Quesnelia arvensis* (Vell.) Mez var. *sororocabae* (Lindm.) Mez, *Quesnelia rufa* Gaudich. var. *sororocabae* Lindm.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Quesnelia humilis Mez
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Quesnelia imbricata L.B. Sm.
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 300-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Quesnelia testudo Lindm.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Racinaea M.A. Spencer & L.B. Sm.

Racinaea aeris-incola (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Sin.: *Catopsis maculata* E. Morren ex Baker, *Tillandsia aeris-incola* (Mez) Mez, *Vriesea aeris-incola* Mez
Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Racinaea spiculosa (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. var. **spiculosa**
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Racinaea spiculosa (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. var. **ustulata** (Reitz) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia spiculosa* Griseb. var. *ustulata* (Reitz) L.B. Sm., *Tillandsia*

triticea Burch. ex Baker, *Tillandsia triticea* Burch. ex Baker var. *ustulata* Reitz, *Tillandsia viridis* Baker, *Vriesea viridis* E. Morren ex Baker, nom. nud. Hierba epífita. Nativa. 300-2500 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Tillandsia L.

Tillandsia aeranthos (Loisel.) L.B. Sm.
Sin.: *Amalia aeris-incola* Schult. f., nom. nud., *Anoplophytum aeranthos* (Loisel.) Beer, *Anoplophytum dianthoideum* Beer, *Pourretia aeranthos* Loisel., *Tillandsia aeranthos* (Loisel.) L.B. Sm. var. *aemula* Strehl, *Tillandsia aeranthos* (Loisel.) L.B. Sm. var. *rosea* Strehl, *Tillandsia aeranthos* Desf. ex Steud., nom. nud., *Tillandsia bicolor* Brongn., *Tillandsia dianthoidea* G. Rossi, nom. superfl., *Tillandsia microxiphion* Baker, *Tillandsia unca* Griseb.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Tillandsia afonsoana Strehl
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia aizoides Mez
Hierba epífita. Nativa. 200-1300 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Tillandsia albertiana Verv.
Hierba epífita. Endémica. 800-2300 m.
Países: ARG(LRI, SAL).

Tillandsia andicola Gillies ex Baker
Hierba epífita. Endémica.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SLU).

Tillandsia angulosa Mez
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Tillandsia arequitae (André) André ex Mez
Sin.: *Tillandsia xiphioides* Ker Gawl. var. *arequitae* André
Hierba epífita. Endémica.
Países: URY(LAV, MAL).

Tillandsia argentina C.H. Wright
Hierba epífita. Nativa. 400-1300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Tillandsia arhiza Mez
Sin.: *Tillandsia arhiza* Mez var. *rupestris* (Mez) Hassl., *Tillandsia rupestris* Mez, *Tillandsia rupestris* Mez var. *pendens* Chodat & Vischer
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(PAI).

Tillandsia australis Mez
Sin.: *Tillandsia maxima* Lillo & Hauman, hom. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 700-3900 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Tillandsia bandensis Baker subsp. **bandensis**
Sin.: *Tillandsia bandensis* Baker var. *intermedia* Hassl., *Tillandsia recurvata* (L.) L. var. *majuscula* Mez
Hierba epífita. Nativa. 300-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(ÑEE, PHA). URY(ART, COL, RNO, SAO, SJO).

Tillandsia bandensis Baker subsp. **grandipetala** Rossado
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: URY(CLA, TYT).

Tillandsia bella Strehl
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia bergeri Mez
Sin.: *Tillandsia dianthoidea* G. Rossi var. *grisea* Guillaumin
Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

Tillandsia brealitoensis L. Hrom.
Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia buchlohii Rauh
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY.

Tillandsia caliginosa W. Till
Sin.: *Tillandsia crocata* (E. Morren) N.E. Br. f. *major* Rauh, nom. nud., *Tillandsia crocata* (E. Morren) N.E. Br. var. *tristis* Rauh, *Tillandsia myosura* Griseb., hom. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 1900-3000 m.
Países: ARG(CAT, ERI, JUJ, SAL, TUC).

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav.
Sin.: *Diaphoranthema capillaris* (Ruiz & Pav.) Beer, *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *hieronymi* (Mez) L.B. Sm., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *incana* (Mez) L.B. Sm., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *typica* L.B. Sm., nom. inval., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. var. *incana* Mez, *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. var. *lanuginosa* Mez, *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez f. *percordobensis* (Mez) A. Cast., *Tillandsia dependens*

- Hieron. ex Mez f. *perusneoides* (Mez) A. Cast., *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *dependens*, *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *percordobensis* Mez, *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *perusneoides* Mez, *Tillandsia hieronymi* Mez, *Tillandsia incana* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia lanuginosa* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia permutata* A. Cast., *Tillandsia propinqua* Gay var. *saxicola* Hieron.
Hierba epífita. Nativa. 300-3600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL). URY(COL, MON).
- Tillandsia castellanii** L.B. Sm.
Hierba epífita. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU).
- Tillandsia chasmophyta** H. Büneker, R. Pontes & K. Soares
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Tillandsia colorata** L. Hrom.
Hierba epífita. Endémica. 1600-1700 m.
Países: ARG(SAL).
- Tillandsia x cornissaensis** Gouda
Hierba epífita. Endémica. 1300-1400 m.
Países: ARG(SAL).
- Tillandsia crocata** (E. Morren) N.E. Br.
Sin.: *Phytarrhiza crocata* E. Morren, *Tillandsia mandonii* E. Morren ex Mez
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS).
- Tillandsia diaguitensis** A. Cast.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
- Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY).
- Tillandsia didisticha** (E. Morren) Baker
Sin.: *Anoplophytum didistichum* E. Morren, *Tillandsia crassifolia* Baker, *Tillandsia disticha* Willd. ex Roem. & Schult., hom. illeg., *Tillandsia drepanophylla* Baker, *Tillandsia oranensis* Baker, *Tillandsia vernicosa* Baker
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
- Tillandsia dorotheae** Rauh
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: ARG(SAL).
- Tillandsia dura** Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).
- Tillandsia duratii** Vis. var. **duratii**
Sin.: *Tillandsia circinalis* Griseb.
Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, PAY, SAO).
- Tillandsia duratii** Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia confusa* Hassl., *Tillandsia confusa* Hassl. var. *minor* Hassl., *Tillandsia confusa* Hassl. var. *saxatilis* Hassl., *Tillandsia decomposita* Baker, *Tillandsia duratii* Vis. var. *confusa* (Hassl.) L.B. Sm., *Tillandsia tomentosa* N.E. Br., *Tillandsia weddellii* Baker
Hierba epífita. Nativa. 200-3000 m.
- Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CEN, CHO, COA, ÑEE, PHA).
- Tillandsia erecta** Gillies ex Baker
Sin.: *Tillandsia rigida* Gillies ex Baker, nom. nud.
Hierba epífita. Nativa. 1300-2700 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
- Tillandsia esseriana** Rauh & L.B. Sm.
Hierba epífita. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(AMA).
- Tillandsia friesii** Mez
Hierba epífita. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Tillandsia funebris** A. Cast.
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: ARG(CAT, FOR, SAL, TUC). PRY(APY, PHA).
- Tillandsia gardneri** Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Tillandsia geissei** Phil.
Hierba epífita. Endémica. 200-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Tillandsia geminiflora** Brongn.
Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(CLA, LAV, ROC, TYT).
- Tillandsia genseri** Rauh
Hierba epífita. Endémica. 1500-1800 m.
Países: ARG(JUJ).
- Tillandsia gilliesii** Baker subsp. **gilliesii**
Sin.: *Tillandsia myosura* Griseb. ex Baker var. *saxicola* A. Cast., nom. nud.
Hierba epífita. Nativa. 1800-2800 m.

- Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
- Tillandsia gilliesii** Baker subsp. **polysticha** W. Till & L. Hrom.
Hierba epífita. Endémica. 1700-2500 m.
Países: ARG(JUU, TUC).
- Tillandsia guelzii** Rauh
Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU).
- Tillandsia hirta** W. Till & L. Hrom.
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL).
- Tillandsia itaubensis** Strehl
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).
- Tillandsia ixioides** Griseb. subsp. **ixioides**
Sin.: *Anoplophytum luteum* E. Morren ex Baker, nom. nud., *Tillandsia canescens* Baker, nom. nud., *Tillandsia ixioides* Griseb. var. *occidentalis* A. Cast., *Tillandsia lutea* Baker, *Tillandsia meridionalis* Baker, *Tillandsia stricta* Sol. ex Ker Gawl. var. *paraguariensis* Hassl.
Hierba epífita. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, PAI). URY(ART, MAL, RNO, SAO, SJO).
- Tillandsia ixioides** Griseb. subsp. **viridiflora** (Rauh) Gouda
Sin.: *Tillandsia jucunda* Castellanos var. *viridiflora* Rauh
Hierba epífita. Nativa. 600-1000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
- Tillandsia jonesii** Strehl
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).
- Tillandsia jucunda** A. Cast.
Hierba epífita. Nativa. 600-900 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Tillandsia landbeckii** Phil.
Hierba epífita. Nativa. 300-1500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).
- Tillandsia leonamiana** E. Pereira
Sin.: *Tillandsia meridionalis* Baker var. *subsecundifolia* W. Weber & Ehlers
Hierba epífita. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR).
- Tillandsia leucopetala** H. Büneker, R. Pontes & L. Witeck
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).
- Tillandsia linearis** Vell.
Sin.: *Anoplophytum lineare* (Vell.) Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Tillandsia loliacea** Mart. ex Schult. f.
Sin.: *Tillandsia undulata* Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).
- Tillandsia lorentziana** Griseb.
Sin.: *Tillandsia lorentziana* Griseb. f. *simplex* Kuntze, *Tillandsia lorentzii* André
Hierba epífita. Nativa. 100-3300 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CON, PAI).
- Tillandsia mallemontii** Glaz. ex Mez
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
- Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Tillandsia × marchesii** Rossado
Hierba epífita. Endémica.
Países: ARG(COS). URY(ART).
- Tillandsia marconae** W. Till & Vitek
Hierba epífita. Nativa. 600-800 m.
Países: CHL(AYP, TAR).
- Tillandsia markusii** L. Hrom.
Hierba epífita. Endémica. 2600-2700 m.
Países: ARG(SAL).
- Tillandsia mereliana** Schinini
Hierba epífita. Endémica. 100-300 m.
Países: PRY(APY, CEN, PHA).
- Tillandsia minutiflora** Donadio
Sin.: *Tillandsia coarctata* Gillies ex Baker var. *pedicellata* Mez
Hierba epífita. Nativa. 800-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CHO).
- Tillandsia mollis** H. Hrom. & W. Till var. **reptans** Ayarde & Bulacio
Hierba epífita. Endémica. 2600-2700 m.
Países: ARG(JUU).
- Tillandsia muhrii** W. Weber
Sin.: *Tillandsia albei* Ehlers, *Tillandsia quasamayensis* Palací & Gilmartin
Hierba epífita. Nativa. 2600-3400 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Tillandsia myosura** Griseb. ex Baker
Sin.: *Tillandsia nappii* Lorentz & Niederl.
Hierba epífita. Nativa. 700-2600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). URY(COL, LAV, MAL, RNO, SAO, SJO, SOR).

Tillandsia pedicellata (Mez) A. Cast.

Sin.: *Tillandsia coarctata* Gillies ex Baker
var. *pedicellata* Mez
Hierba epífita. Nativa.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI,
MEN, RNE, SAL, SJU).

Tillandsia peiranoi A. Cast. var. **alba**

Rutschm. ex Rauh
Hierba epífita. Endémica. 800-900 m.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia peiranoi A. Cast. var. **peiranoi**

Hierba epífita. Endémica.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia pfeufferi Rauh

Hierba epífita. Endémica. 1000-1800 m.
Países: ARG(JUU).

Tillandsia pohliana Mez

Hierba epífita. Nativa. 700-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAA,
CAN, CEN, GUA, ITA, SPE).

Tillandsia polystachia (L.) L.

Sin.: *Renealmia polystachia* L.
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR).

Tillandsia polzii Ehlers

Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia porongoensis L. Hrom. & P. Schneid.

Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(LRI).

Tillandsia ramellae W. Till & S. Till

Hierba epífita. Endémica. 600-700 m.
Países: PRY(APY).

Tillandsia rectangula Baker

Sin.: *Tillandsia propinqua* Gay var.
rectangula (Baker) Griseb.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL,
SDE, SLU, TUC).

Tillandsia recurvata (L.) L.

Sin.: *Diaphoranthema recurvata* (L.) Beer,
Renealmia recurvata L., *Tillandsia*
monostachys Gillies ex Baker, nom.
nud., *Tillandsia recurvata* (L.) L. f.
argentea André, *Tillandsia recurvata*
(L.) L. f. *brevifolia* André, *Tillandsia*
recurvata (L.) L. f. *caespitosa* André,
Tillandsia recurvata (L.) L. f. *contorta*
André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f.
elongata André, *Tillandsia recurvata*
(L.) L. f. *genuina* André, nom. inval.,
Tillandsia recurvata (L.) L. f. *major*
André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f.
minor André, *Tillandsia recurvata* (L.)
L. f. *minuta* (Mez) A. Cast., *Tillandsia*
recurvata (L.) L. var. *ciliata* E. Morren
ex Mez, *Tillandsia recurvata* (L.) L.
var. *minuta* Mez

Hierba epífita. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON,
GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).
URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA,
FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY,
RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR,
TAC, TYT).

Tillandsia recurvifolia Hook.

Sin.: *Tillandsia pulchella* Mez, hom. illeg.,
Tillandsia stricta Mez, hom. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ,
CEN, CHO, COA, GUA, ÑEE, PAI,
PHA). URY(ART, SAO).

Tillandsia reichenbachii Baker

Sin.: *Tillandsia euosma* Speg., *Tillandsia*
herzogii Wittm., *Tillandsia*
tucumanensis Mez
Hierba epífita. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,
JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY,
PHA).

Tillandsia retorta Griseb. ex Baker

Sin.: *Tillandsia caespitosa* Gillies ex
Baker, nom. nud., *Tillandsia nappii*
Lorentz & Niederl. var. *darwinii* Lorentz
& Niederl.
Hierba epífita. Endémica. 600-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN,
SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Tillandsia rohdenardinii Strehli

Hierba epífita. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia rosarioae L. Hrom.

Hierba epífita. Endémica. 1900-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia schreiteri Lillo & A. Cast.

Hierba epífita. Nativa. 1300-2400 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Tillandsia seideliana E. Pereira

Hierba epífita. Endémica. 200-800 m.
Países: BRA(SCA).

Tillandsia sphaerocephala Baker var. **sphaerocephala**

Hierba epífita. Nativa. 900-3500 m.
Países: ARG(JUU, TUC).

Tillandsia sphaerocephala Baker var. **tarijensis** Ehlers & L. Hrom.

Hierba epífita. Nativa. 2400-2600 m.
Países: ARG(JUU).

Tillandsia streptocarpa Baker

Sin.: *Tillandsia streptocarpa* Baker var. *filifolia* Hassl., *Tillandsia streptocarpa* Baker var. *pungens* Chodat & Vischer
Hierba epífita. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Tillandsia stricta Sol. ex Ker Gawl. var. **disticha** L.B. Sm.

Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tillandsia stricta Sol. ex Ker Gawl. var. **stricta**

Sin.: *Tillandsia montana* Reitz
Hierba epífita. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA, PAI). URY(CLA, RNO, TYT).

Tillandsia tenebra L. Hrom. & W. Till

Hierba epífita. Endémica. 300-1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, LPA, LRI, MEN, SJU).

Tillandsia tenuifolia L. var. **glaucifolia**

Gouda
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Tillandsia tenuifolia L. var. **tenuifolia**

Sin.: *Tillandsia astragaloides* Mez, *Tillandsia autumnalis* F. Muell., *Tillandsia pseudomontana* W. Weber & Ehlers, *Tillandsia pulchella* Hook., *Tillandsia pulchella* Hook. var. *rosea* Mez, *Tillandsia pulchella* Hook. var. *surinamensis* Mez.
Hierba epífita. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CAN, GUA, MIE, ÑEE, PAI).

Tillandsia tenuifolia L. var. **vaginata** (Wawra) L.B. Sm.

Sin.: *Tillandsia pulchella* Hook. var. *vaginata* (Wawra) A. Cast., *Tillandsia pulchra* Hook. var. *vaginata* Wawra
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, CON, GUA).

Tillandsia toropiensis Rauh

Hierba epífita. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia tragophoba M.O. Dillon

Hierba epífita. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(ANT).

Tillandsia tricholepis Baker

Sin.: *Tillandsia polytrichoides* E. Morren, *Tillandsia tricholepis* Baker var. *argentea* Hassl.
Hierba epífita. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, SAO, TAC).

Tillandsia uruguayensis Rossado

Hierba epífita. Endémica. 100-300 m.
Países: URY(ART, RIV, TAC).

Tillandsia usneoides (L.) L.

Sin.: *Renalmia usneoides* L., *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *cretacea* Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *crispa* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *ferruginea* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *filiformis* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *genuina* André, nom. inval., *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *longissima* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *major* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *cretacea* (Mez) Mez, *Tillandsia*

usneoides (L.) L. var. *ferruginea* (André) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *longissima* (André) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *robusta* (Mez) Mez

Hierba epífita. Nativa. 0-3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(CAU, CAA, CON, GUA, ITA, ÑEE, PHA). URY(ART, CLA, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Tillandsia violaceiflora L. Hrom.

Hierba epífita. Endémica. 1500-1600 m.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia virescens Ruiz & Pav.

Sin.: *Diaphoranthema virescens* (Ruiz & Pav.) Beer, *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *cordobensis* (Hieron.) L.B. Sm., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *virescens* (Ruiz & Pav.) L.B. Sm., *Tillandsia cordobensis* Hieron., *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *sanzinii* Hicken, *Tillandsia hieronymi* Mez var. *lichenoides* (Hieron.) A. Cast., *Tillandsia lichenoides* Hieron., *Tillandsia propinqua* Gay, *Tillandsia pusilla* Gillies ex Baker, *Tillandsia stolpii* Phil., *Tillandsia virescens* Ruiz & Pav. var. *sanzinii* (Hicken) A. Cast., *Tillandsia williamsii* Rusby

Hierba epífita. Nativa. 400-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO). URY(CAS, MON).

Tillandsia winkleri Strehli

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia witeckii H. Büneker, R. Pontes & K. Soares

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var. **tafiensis** L.B. Sm.

Hierba epífita. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var. **xiphioides**

Sin.: *Anoplophytum xyphyoides* Beer, nom. nud., *Phytarrhiza xiphioides* (Ker Gawl.) E. Morren, nom. nud., *Tillandsia macrocnemis* Griseb., *Tillandsia odorata* Gillies ex Baker, nom. illeg., *Tillandsia sericea* E. Morren, nom. nud., *Tillandsia suaveolens* Lem., *Tillandsia unca* Hicken, hom. illeg., *Tillandsia xiphioides* Ker Gawl. var. *minor* L. Hrom.

Hierba epífita. Nativa. 700-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(CLA, MAL, SJO).

Notas: Citada para Paraguay (Smith, 1977) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Tillandsia zecheri W. Till f. **brealitoensis** Palací & G.K. Br.

Hierba epífita. Endémica. 500-1800 m.

Países: ARG(SAL).

Tillandsia zecheri W. Till var. **cafayatensis** Palací & G.K. Br.

Sin.: *Tillandsia muhrrii* Rauh, hom. illeg.

Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Tillandsia zecheri W. Till var. **zecheri**

Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.

Países: ARG(SAL).

Vriesea Lindl., nom. cons.

Vriesea altodaserrae L.B. Sm.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea atra Mez

Sin.: *Vriesea gamba* F.J. Müll.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea biguassuensis Reitz

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Vriesea brusquensis Reitz

Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea carinata Wawra

Sin.: *Tillandsia carinata* (Wawra) Baker, *Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl. var. *carinata* (Wawra) E. Morren

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea corcovadensis (Britten) Mez

Sin.: *Tillandsia corcovadensis* Britten, *Tillandsia ventricosa* Wawra, hom. illeg., *Vriesea rubida* E. Morren ex Baker, nom. nud., *Vriesea rubida* E. Morren ex Mez, *Vriesea ventricosa* (Wawra) Mez, comb. illeg.

Hierba epífita. Nativa. 200-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea declinata Leme

Hierba epífita. Endémica. 400 m.

Países: BRA(SCA).

Vriesea drepanocarpa (Baker) Mez

Sin.: *Tillandsia drepanocarpa* Baker, *Tillandsia pabstiana* E. Pereira, *Vriesea dusenii* L.B. Sm.

Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea ensiformis (Vell.) Beer

Sin.: *Tillandsia ensiformis* Vell., *Tillandsia selloana* Baker, *Vriesea ensiformis* (Vell.) Beer var. *striata* A. Seidel

Hierba epífita. Nativa. 1500-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea erythrodactylon (E. Morren) E. Morren ex Mez

Sin.: *Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl. var. *erythrodactylon* E. Morren

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea flammea L.B. Sm.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea flava A.F. Costa, H. Luther & Wand.

Sin.: *Vriesea morreniana* E. Morren

Hierba epífita. Nativa. 700-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea friburgensis Mez var. **friburgensis**

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, GUA).

Vriesea friburgensis Mez var. **paludosa** (L.B. Sm.) L.B. Sm.

Sin.: *Vriesea paludosa* L.B. Sm.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea friburgensis Mez var. **tucumanensis** (Mez) L.B. Sm.

Sin.: *Vriesea argentinensis* Speg., *Vriesea glutinosa* Lindl. var. *viridis* Hassl., *Vriesea tucumanensis* Mez

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 700-900 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, PAI, SPE).

***Vriesea gigantea* Gaudich.**

Sin.: *Tillandsia gigantea* (Gaudich.) Griseb., *Tillandsia reticulata* Baker, *Tillandsia tessellata* Linden, *Vriesea mosenii* Mez, *Vriesea reticulata* (Baker) Mez, *Vriesea tessellata* (Linden) E. Morren

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Vriesea guttata* Linden & André**

Sin.: *Tillandsia guttata* (Linden & André) Baker, *Vriesea guttata* Linden & André var. *eguttata* Reitz, *Vriesea guttata* Linden & André var. *striata* Reitz
Hierba epífita. Nativa. 300-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

***Vriesea hieroglyphica* (Carrière) E. Morren**

Sin.: *Massangea hieroglyphica* Carrière, *Tillandsia hieroglyphica* (Carrière) Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

***Vriesea hoehneana* L.B. Sm.**

Hierba epífita. Nativa. 900-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Vriesea incurvata* Gaudich.**

Sin.: *Tillandsia incurvata* (Gaudich.) Baker, comb. illeg., *Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl. var. *truffautiana* André, *Vriesea rostrum-aquillae* Mez

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Vriesea inflata* (Wawra) Wawra**

Sin.: *Tillandsia heterostachys* Baker, *Tillandsia inflata* (Wawra) Baker, *Vriesea carinata* Wawra var. *inflata* Wawra, *Vriesea heterostachys* (Baker) L.B. Sm., *Vriesea incurvata* Gaudich. var. *inflata* (Wawra) Mez

Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Vriesea jonghei* (K. Koch) E. Morren**

Sin.: *Tillandsia jonghei* K. Koch
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

***Vriesea longicaulis* (Baker) Mez**

Sin.: *Tillandsia longicaulis* Baker, *Vriesea longicaulis* (Baker) Mez var. *secunda* Mez

Hierba epífita. Nativa. 700-1900 m.

Países: BRA(SCA).

***Vriesea lubbersii* (Baker) E. Morren ex Mez**

Sin.: *Tillandsia lubbersii* Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

***Vriesea maxoniana* (L.B. Sm.) L.B. Sm.**

Sin.: *Tillandsia maxoniana* L.B. Sm., *Vriesea icterica* A. Cast.
Hierba epífita. Nativa. 900-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

***Vriesea muelleri* Mez**

Hierba epífita. Nativa. 300-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

***Vriesea paratiensis* E. Pereira**

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

***Vriesea pauperrima* E. Pereira**

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

***Vriesea philippocoburgii* Wawra**

Sin.: *Tillandsia philippocoburgii* (Wawra) Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Vriesea pinottii* Reitz**

Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

***Vriesea platynema* Gaudich. var. *flava* Reitz**

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Vriesea platynema* Gaudich. var. *platynema

Sin.: *Tillandsia platynema* (Gaudich.) Griseb.
Hierba epífita. Nativa. 300-1400 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

***Vriesea platynema* Gaudich. var. *striata* (Wittm.) Wittm. ex Mez**

Sin.: *Vriesea corallina* Regel var. *striata* Wittm.
Hierba epífita. Endémica. 400-800 m.
Países: BRA(SCA).

***Vriesea platynema* Gaudich. var. *variegata* (Guillon) Reitz**

Sin.: *Encholirion roseum* Antoine var. *variegatum* Guillon
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

***Vriesea platzmannii* E. Morren**

Sin.: *Tillandsia platzmannii* (E. Morren) Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea procera (Mart. ex Schult. f.)
Wittm. var. **debilis** Mez
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Vriesea procera (Mart. ex Schult. f.)
Wittm. var. **procera**
Sin.: *Tillandsia erectiflora* Baker, *Tillandsia procera* Mart. ex Schult. f., *Vriesea procera* (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. *gracilis* (Gaudich.) Mez
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG. PRY(ITA).
Notas: Citada para Argentina (Smith, 1977) sin indicar localidad precisa

Vriesea psittacina (Hook.) Lindl. var. **decolor** Wawra
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CAU).

Vriesea rastrensis Leme
Hierba epífita. Endémica. 500-1400 m.
Países: BRA(SCA).

Vriesea reitzii Leme & A.F. Costa
Hierba epífita. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea rodigasiana E. Morren
Sin.: *Tillandsia rodigasiana* (E. Morren) Baker, *Tillandsia tweedieana* Baker, *Vriesea tweedieana* (Baker) F. Muell., *Vriesea vitellina* F. Muell.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea rubens Gomes da Silva & A.F. Costa
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(SCA).

Vriesea rubroviridis F.P. Uribbe & A.F. Costa
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea scalaris E. Morren
Sin.: *Tillandsia scalaris* (E. Morren) Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea tijucana E. Pereira
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea triangularis Reitz
Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Vriesea unilateralis (Baker) Mez
Sin.: *Tillandsia unilateralis* Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea vagans (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Sin.: *Vriesea philippocoburgii* Wawra var. *vagans* L.B. Sm.
Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea vulpinoidea L.B. Sm.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Wittmackia Mez

Wittmackia bicolor (L.B. Sm.) Aguirre-Santoro
Sin.: *Aechmea bicolor* L.B. Sm., *Ortgiesia bicolor* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Endémica. 400-500 m.
Países: BRA(SCA).

Wittrockia Lindm.

Wittrockia cyathiformis (Vell.) Leme
Sin.: *Canistrum cyathiforme* (Vell.) Mez, *Canistrum regnellii* Mez, *Canistrum schwackeanum* Mez, *Hohenbergia cyathiformis* (Vell.) Beer, *Mosenia sicarius* Lindm., *Tillandsia cyathiformis* Vell.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Wittrockia superba Lindm.
Sin.: *Canistrum cruentum* F. Muell., *Canistrum superbum* (Lindm.) Mez, *Nidularium superbum* (Lindm.) Ule
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

BURMANNIACEAE

Apteria Nutt.

Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small
Sin.: *Apteria gentianoides* Jonker, *Apteria lilacina* (Miers) Miers, *Lobelia aphylla* Nutt.
Saprófito. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA).

Burmannia L.

Burmannia alba Mart.
Sin.: *Burmannia sellowiana* Seub. var. *albiflora* Seub., *Burmannia sellowiana* Seub. var. *violacea* Seub., *Tripterella alba* (Mart.) Schult. & Schult. f.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA).

Burmattia australis Malme

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CAU, COA, PAI).

Burmattia bicolor Mart.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Burmattia capitata (Walter ex J.F. Gmel.) Mart.

Sin.: *Anonymos capitatus* Walter, nom. nud., *Tripterella capitata* (Walter ex J.F. Gmel.) Michx., *Vogelia capitata* Walter ex J.F. Gmel.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Burmattia flava Mart.

Sin.: *Burmattia flava* Mart. var. *macroptera* Jonker, *Tripterella flava* (Mart.) Schult. & Schult. f.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CON, PAI).

Dictyostega Miers

Dictyostega orobanchoides (Hook.)

Miers subsp. **orobanchoides**

Sin.: *Apteria orobanchoides* Hook., *Dictyostega schomburgkii* Miers
Saprófita. Nativa. 900-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dictyostega orobanchoides (Hook.)

Miers subsp. **parviflora** (Benth.)
Snelders & Maas

Sin.: *Dictyostega orobanchoides* (Hook.)
Miers var. *parviflora* (Benth.) Jonker,
Dictyostega schomburgkii Miers var.
parviflora Benth.
Saprófita. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(SCA).

Gymnosiphon Blume

Gymnosiphon divaricatus (Benth.)

Benth. & Hook.

Sin.: *Ptychomeria divaricata* Benth.

Saprófita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Gymnosiphon refractus (Miers) Benth. & Hook. f.

Sin.: *Cymbocarpa refracta* Miers

Hierba saprófita. Nativa. 100-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gymnosiphon tenellus (Benth.) Urb.

Hierba. Nativa. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Miersiella Urb.

Miersiella umbellata (Miers) Urb.

Sin.: *Dictyostega umbellata* Miers

Saprófita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Thismia Griff.

Thismia caudata Maas & H. Maas

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Thismia cordata D.F. Silva & J.M.A.

Braga

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Thismia panamensis (Standl.) Jonker

Sin.: *Ophiomeris panamensis* Standl.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Thismia prateensis Mancinelli, C.T. Blum

& E.C. Smidt

Hierba. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(PAR).

BURSERACEAE

Commiphora Jacq.

Commiphora leptophloeos (Mart.) J. Gillet

Sin.: *Bursera leptophloeos* Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Protium Burm. f.

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand

Sin.: *Icica heptaphylla* Aubl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).

Protium kleinii Cuatrec.

Sin.: *Protium dusenii* Sw.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CABOMBACEAE

Cabomba Aubl.

Cabomba aquatica Aubl.

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cabomba caroliniana A. Gray

Sin.: *Cabomba australis* Speg., *Cabomba caroliniana* A. Gray var. *flavida*

Ørgaard, *Nectris caroliniana* (A. Gray) Steud.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, RNE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, ÑEE, PHA, SPE). URY(SOR).

Cabomba furcata Schult. & Schult. f.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CACTACEAE

Acanthocalycium Backeb.

Acanthocalycium ferrarii Rausch

Sin.: *Acanthocalycium thionanthum* (Speg.) Backeb. var. *variiflorum* (Rausch) Donald, *Acanthocalycium variiflorum* Backeb., nom. inval., *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *ferrarii* (Rausch) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *variiflora* (Backeb.) Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(TUC).

Acanthocalycium glaucum F. Ritter

Sin.: *Acanthocalycium aurantiacum* Rausch, *Acanthocalycium thionanthum* (Speg.) Backeb. subsp. *glaucum* (F. Ritter) Lodé, *Acanthocalycium thionanthum* (Speg.) Backeb. var. *aurantiacum* (Rausch) Donald, *Acanthocalycium thionanthum* (Speg.) Backeb. var. *glaucum* (F. Ritter) Donald, *Echinopsis aurantiaca* (Rausch) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis glaucina* Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis thionantha* (Speg.) Werderm. subsp. *glaucum* (F. Ritter) M.

Lowry, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *aurantiaca* (Rausch) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *glaucum* (F. Ritter) Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI).

Acanthocalycium klimpelianum (Weid. & Werderm.) Backeb.

Sin.: *Acanthocalycium klimpelianum* (Weid. & Werderm.) Backeb. var. *macranthum* (Rausch) J.G. Lamb., *Acanthocalycium peitscherianum* Backeb., *Acanthocalycium spiniflorum* (K. Schum.) Backeb. f. *peitscherianum* (Backeb.) Donald, *Acanthocalycium spiniflorum* (K. Schum.) Backeb. var. *klimpelianum* (Weid. & Werderm.) Donald, *Echinopsis klimpeliana* Weid. & Werderm., *Echinopsis peitscheriana* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, comb. illeg., *Lobivia klimpeliana* (Weid. & Werderm.) A. Berger, *Lobivia spiniflora* (K. Schum.) Rausch var. *klimpeliana* (Weid. & Werderm.) Rausch, *Lobivia spiniflora* (K. Schum.) Rausch var. *macrantha* Rausch, *Lobivia spiniflora* (K. Schum.) Rausch var. *peitscheriana* (Backeb.) Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, SDE).

Acanthocalycium spiniflorum (K. Schum.) Backeb.

Sin.: *Acanthocalycium spiniflorum* (K. Schum.) Backeb. f. *violaceum* Donald, nom. inval., *Acanthocalycium violaceum* (Werderm.) Backeb., *Echinocactus spiniflorus* K. Schum., *Echinopsis spiniflora* (K. Schum.) A. Berger, *Echinopsis violacea* Werderm., *Lobivia spiniflora* (K. Schum.) Rausch, *Lobivia spiniflora* (K.

Schum.) Rausch var. *violacea* (Werderm.) Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Acanthocalycium thionanthum (Speg.) Backeb.

Sin.: *Acanthocalycium brevispinum* F. Ritter, *Acanthocalycium catamarcense* F. Ritter, *Acanthocalycium chionanthum* (Speg.) Backeb., *Acanthocalycium griseum* Backeb., nom. inval., *Acanthocalycium thionanthum* (Speg.) Backeb. var. *brevispinum* (F. Ritter) Donald, *Echinocactus chionanthus* Speg., *Echinocactus thionanthus* Speg., *Echinopsis brevispina* (F. Ritter) H. Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis chionantha* (Speg.) Werderm., *Echinopsis thionantha* (Speg.) Werderm., *Lobivia chionantha* (Speg.) Britton & Rose, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *brevispina* (F. Ritter) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *catamarcensis* (F. Ritter) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *chionantha* (Speg.) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *erythrantha* Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *munita* Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Airampo Fric

Airampo ayrampo (Haenke) Doweld

Sin.: *Cactus ayrampo* Azara, nom. nud., *Cactus ayrampo* Haenke, *Opuntia cedegreniana* Backeb., *Opuntia*

- ianthinantha* (F. Ritter) Iliff, *Opuntia multiareolata* Backeb., *Opuntia obliqua* Backeb., *Opuntia soehrensii* Britton & Rose, *Opuntia tilcarensis* Backeb. var. *rubellispina* Backeb., *Platyopuntia ianthinantha* F. Ritter, nom. illeg., *Platyopuntia soehrensii* (Britton & Rose) F. Ritter, comb. illeg., *Tunilla ianthinantha* (F. Ritter) D.R. Hunt & Iliff, *Tunilla soehrensii* (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff
Subarbusto suculento. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(TAR, ANT).
- Austrocactus** Britton & Rose
- Austrocactus aonikenkensis** E. Sarnes & N. Sarnes
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).
- Austrocactus bertinii** (J.F. Cels) Britton & Rose
Sin.: *Austrocactus dusenii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Austrocactus gracilis* Backeb., *Cereus bertinii* J.F. Cels, *Cereus dusenii* F.A.C. Weber, *Cereus patagonicus* F.A.C. Weber, *Malacocarpus bertinii* (J.F. Cels ex Hérincq) Hosseus, *Malacocarpus patagonicus* (F.A.C. Weber) Britton & Rose, *Notocactus bertinii* (J.F. Cels ex Hérincq) Marshall
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
- Austrocactus colloncurensis** I. Schaub & Keim
Subarbusto. Endémica.
Países: ARG(NEU).
- Austrocactus coxii** (K. Schum.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus coxii* K. Schum., *Echinocactus intertextus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
- Austrocactus ferrarii** R. Kiesling, E. Sarnes & N. Sarnes
Subarbusto. Endémica. 2800-2900 m.
Países: ARG(MEN).
- Austrocactus hibernus** F. Ritter subsp. **hibernus**
Subarbusto. Endémica.
Países: ARG(MEN).
- Austrocactus hibernus** F. Ritter subsp. **robustior** E. Sarnes & N. Sarnes
Subarbusto. Endémica.
Países: ARG(NEU).
- Austrocactus longicarpus** E. Sarnes & N. Sarnes
Sin.: *Austrocactus coxii* (K. Schum.) Backeb. subsp. *longicarpus* (E. Sarnes & N. Sarnes) Guiggi
Subarbusto. Endémica. 1000-1400 m.
Países: ARG(NEU).
- Austrocactus nobilis** E. Sarnes & N. Sarnes
Sin.: *Austrocactus bertinii* (J.F. Cels) Britton & Rose subsp. *nobilis* (E. Sarnes & N. Sarnes) Guiggi
Subarbusto. Endémica.
Países: ARG(RNE).
- Austrocactus patagonicus** (F.A.C. Weber) Hosseus
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(ARA, AIS).
- Austrocactus pauxillus** E. Sarnes & N. Sarnes
- Subarbusto. Endémica.
Países: ARG(MEN).
- Austrocactus philippii** (Regel & E. Schmidt) Buxb.
Sin.: *Cereus philippii* Regel & Schmidt, *Echinocactus philippii* (Regel & E. Schmidt) K. Schum., *Echinopsis philippii* (Regel & E. Schmidt) G. Nicholson, *Erdisia philippii* (Regel & E. Schmidt) Britton & Rose
Subarbusto suculento. Endémica. 1900-2500 m.
Países: ARG(MEN). CHL(MAU).
- Austrocactus praecox** E. Sarnes & N. Sarnes
Subarbusto. Endémica.
Países: ARG(MEN).
- Austrocactus spiniflorus** (Phil.) F. Ritter
Sin.: *Cereus hypogaeus* F.A.C. Weber ex Regel, *Corryocactus spiniflorus* (Phil.) Hutchison, *Echinocereus clavata* K. Schum., *Echinocereus hypogaeus* (F.A.C. Weber ex Regel) Rümpler, *Erdisia spiniflora* (Phil.) Britton & Rose, *Eulychnia clavata* Phil., *Opuntia bicolor* Phil., *Opuntia clavata* Phil., hom. illeg., *Opuntia spiniflora* Phil.
Hierba suculenta. Endémica. 1800-2200 m.
Países: CHL(LBO, RME).
- Austrocactus subandinus** E. Sarnes & N. Sarnes
Subarbusto. Endémica. 2000-2100 m.
Países: ARG(MEN).
- Austrocylindropuntia** Backeb.
- Austrocylindropuntia miquelii** (Monv.) Backeb.
Sin.: *Cylindropuntia miquelii* (Monv.) Backeb., *Miqueliopuntia miquelii*

(Monv.) F. Ritter, *Opuntia geissei* Phil.,
Opuntia miquelii Monv.

Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Austrocylindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb. var. **humahuacana** (Backeb.) R. Kiesling

Sin.: *Austrocylindropuntia humahuacana* (Backeb.) Backeb. & F.M. Knuth, *Cylindropuntia humahuacana* Backeb., *Opuntia shaferi* Britton & Rose var. *humahuacana* (Backeb.) G.D. Rowley, *Trichopuntia shaferi* (Britton & Rose) Guiggi subsp. *humahuacana* (Backeb.) Guiggi

Subarbusto. Nativa. 3000-3500 m.

Países: ARG(JUU).

Austrocylindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb. var. **shaferi**

Sin.: *Austrocylindropuntia vestita* (Salm-Dyck) Backeb. var. *shaferi* (Britton & Rose) F. Ritter, *Austrocylindropuntia weingartiana* (Backeb.) Backeb., *Cylindropuntia weingartiana* (Backeb.) Backeb., *Opuntia shaferi* Britton & Rose, *Opuntia weingartiana* Backeb., *Trichopuntia shaferi* (Britton & Rose) Guiggi

Subarbusto. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(JUU).

Austrocylindropuntia verschaffeltii (J.F. Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.

Sin.: *Austrocylindropuntia hypsophila* (Speg.) Backeb., *Austrocylindropuntia verschaffeltii* (J.F. Cels ex F.A.C. Weber) Backeb. var. *hypsophila* (Speg.) Backeb., *Austrocylindropuntia verschaffeltii* (J.F. Cels ex F.A.C. Weber) Backeb. var. *longispina* Backeb., *Banfiopuntia verschaffeltii* (J.F. Cels ex F.A.C. Weber) Guiggi, *Cylindropuntia hypsophila* (Speg.) Backeb., *Cylindropuntia verschaffeltii*

(J.F. Cels ex F.A.C. Weber) Backeb., *Opuntia digitalis* F.A.C. Weber, *Opuntia hypsophila* Speg., *Opuntia verschaffeltii* J.F. Cels ex F.A.C. Weber, *Opuntia verschaffeltii* J.F. Cels ex F.A.C. Weber var. *digitalis* F.A.C. Weber, *Tephrocactus verschaffeltii* (J.F. Cels ex F.A.C. Weber) D.R. Hunt & Ritz

Subarbusto. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Austrocylindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb.

Sin.: *Cylindropuntia vestita* (Salm-Dyck) Backeb., *Opuntia vestita* Salm-Dyck, *Trichopuntia vestita* (Salm-Dyck) Guiggi

Subarbusto. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Blossfeldia Werderm.

Blossfeldia liliputana Werderm.

Sin.: *Blossfeldia campaniflora* Backeb., *Blossfeldia fecheri* Backeb., nom. inval., *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *atroviridis* (F. Ritter) Krainz, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *campaniflora* (Backeb.) Krainz, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *formosa* F. Ritter, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *pedicellata* (F. Ritter) Krainz, comb. illeg., *Blossfeldia pedicellata* F. Ritter, *Parodia liliputana* (Werderm.) N.P. Taylor

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU).

Brasiliopuntia A. Berger

Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger

Sin.: *Cactus brasiliensis* Willd., *Opuntia argentina* Griseb., *Opuntia brasiliensis* (Willd.) Haw., *Opuntia hieronymi* Griseb.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Brasiliopuntia schulzii (A. Cast. & Lelong) Backeb.

Sin.: *Opuntia arborea* Rojas Acosta, hom. illeg., *Opuntia schulzii* A. Cast. & Lelong

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Browningia Britton & Rose

Browningia caineana (Cárdenas) D.R. Hunt

Sin.: *Castellanosia caineana* Cárdenas

Árbol suculento. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON).

Browningia candelaris (Meyen) Britton & Rose

Sin.: *Cactus candelaris* (Meyen) Meyen, *Cereus candelaris* Meyen

Árbol suculento. Nativa. 2000-3000 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Cereus Mill.

Cereus aethiops Haw.

Sin.: *Cereus aethiops* Haw. var. *landbeckii* (Phil.) Backeb., *Cereus aethiops* Haw. var. *melanacanthus* (K. Schum.) Backeb., *Cereus azureus* J. Parm. ex Pfeiff., *Cereus chalibaeus* Salm-Dyck,

Cereus coerulescens Salm-Dyck,
Cereus coerulescens Salm-Dyck var.
landbeckii (Phil.) K. Schum., *Cereus*
coerulescens Salm-Dyck var.
melanacanthus K. Schum., *Cereus*
landbeckii Phil., *Piptanthocereus*
aethiops (Haw.) F. Ritter, nom. illeg.
 Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA,
 LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU,
 TUC).
 Notas: Citada para Uruguay (Hunt,
 1999) sin mencionar localidad o
 material de referencia.

Cereus argentinensis Britton & Rose
 Sin.: *Cereus platygonus* Speg., hom. illeg.
 Árbol. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, ERI).

Cereus forbesii Hort. Berol. ex C.F.
 Först.
 Sin.: *Piptanthocereus forbesii* (Otto ex
 C.F. Först.) Riccob., nom. illeg.
 Árbol. Nativa. 500-2000 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,
 JUJ, LRI, SAL, SFE).

Cereus haenkeanus F.A.C. Weber ex K.
 Schum.
 Árbol suculento. Nativa. 500-2000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Cereus hildmannianus K. Schum.
 Árbol suculento. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cereus lanosus (F. Ritter) P.J. Braun
 Sin.: *Piptanthocereus lanosus* F. Ritter
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(APY, CAA, CEN, CON,
 COA, GUA, PAI, PHA).

Cereus paraguayensis K. Schum.
 Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(CAU, CON, COA).

Cereus stenogonus K. Schum.
 Sin.: *Cereus dayami* Speg., *Cereus*
roseiflorus Speg., *Piptanthocereus*
dayami (Speg.) F. Ritter, nom. illeg.
 Árbol suculento. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
 SAL). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN,
 CON, ÑEE, PAI, SPE). URY(RNO).

Cereus uruguayanus R. Kiesling
 Sin.: *Cereus alacriportanus* Pfeiff., *Cereus*
hildmannianus K. Schum. subsp.
uruguayanus (R. Kiesling) N.P. Taylor,
Piptanthocereus uruguayanus F.
 Ritter, nom. illeg.
 Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).
 URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, RIV,
 ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Cleistocactus Lem.

Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.
 subsp. **baumannii**
 Sin.: *Cereus anguinus* Gürke, *Cereus*
baumannii Lem., *Cereus tweediei*
 Hook., *Cleistocactus baumannii* (Lem.)
 Lem. var. *colubrinus* Riccob.,
Cleistocactus croceiflorus F. Ritter,
Cleistocactus paraguayensis F. Ritter,
Echinopsis baumannii (Lem.) Anceschi
 & Magli
 Hierba suculenta. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
 ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE,
 TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, CON,
 COA, GUA, PAI, PHA).
 Notas: Citada para Uruguay sin indicar
 localidad ni material de referencia.
 (Lowry, 2016)

Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.
 subsp. **horstii** (P.J. Braun) N.P. Taylor
 Sin.: *Cleistocactus horstii* P.J. Braun
 Hierba suculenta. Nativa.

Países: PRY(CAN).

Cleistocactus ferrarii R. Kiesling
 Subarbusto suculento. Nativa. 1000-
 1500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Cleistocactus hyalacanthus (K. Schum.)
 Gosselin
 Sin.: *Cereus hyalacanthus* K. Schum.,
Cleistocactus jujuyensis (Backeb.)
 Backeb., *Cleistocactus jujuyensis*
 Backeb. var. *fulvus* F. Ritter,
Cleistocactus straussii Backeb. var.
jujuyensis Backeb.
 Subarbusto suculento. Nativa. 1500-
 2500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Cleistocactus smaragdiflorus (F.A.C.
 Weber) Britton & Rose
 Sin.: *Cereus smaragdiflorus* (F.A.C.
 Weber) F.A.C. Weber, *Cleistocactus*
colubrinus Lem. var. *smaragdiflorus*
 F.A.C. Weber
 Subarbusto suculento. Nativa. 1000-
 1500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Copiapoa Britton & Rose

Copiapoa ahremephiana N.P. Taylor &
 G.J. Charles
 Arbusto suculento. Endémica. 0-100 m.
 Países: CHL(ANT).

Copiapoa algarrobensis Katt.
 Sin.: *Copiapoa algarrobensis* Katt., nom.
 illeg.
 Subarbusto. Endémica.
 Países: CHL(TAR).

Copiapoa australis (Hoxey) H.E. Walter
 & Larridon

Sin.: *Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison
subsp. *australis* Hoxey
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa boliviiana (Pfeiff.) F. Ritter

Sin.: *Copiapoa atacamensis* Middled.,
Copiapoa calderana F. Ritter subsp.
atacamensis (Middled.) D.R. Hunt,
Echinocactus bolivianus Pfeiff.
Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000
m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa calderana F. Ritter

Sin.: *Copiapoa atacamensis* Middled. var.
calderana (F. Ritter) A.E. Hoffm.,
Copiapoa calderana F. Ritter var.
spinosior F. Ritter, *Copiapoa lembckeii*
Backeb., nom. inval.
Subarbusto suculento. Endémica. 0-
200 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa cinerascens (Salm-Dyck)
Britton & Rose

Sin.: *Copiapoa applanata* Backeb., nom.
inval., *Copiapoa cinerascens* (Salm-
Dyck) Britton & Rose var. *intermedia*
F. Ritter, *Echinocactus ambiguus*
Hildm. ex K. Schum., *Echinocactus*
cinerascens Salm-Dyck, *Echinocactus*
copiapensis Pfeiff.
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose
var. **cinerea**

Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton &
Rose var. *tenebrosa* (F. Ritter) A.E.
Hoffm., *Copiapoa tenebrosa* F. Ritter,
Echinocactus cinereus Phil.
Arbusto suculento. Endémica. 0-1000
m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose
var. **columna-alba** (F. Ritter) Backeb.

Sin.: *Copiapoa columna-alba* F. Ritter,
Copiapoa columna-alba F. Ritter var.
nuda F. Ritter, *Copiapoa*
melanohystrix F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 0-
1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose
var. **gigantea** (Backeb.) N.P. Taylor

Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton &
Rose var. *haseltoniana* (Backeb.) N.P.
Taylor, *Copiapoa gigantea* Backeb.,
Copiapoa gigantea Backeb. var.
haseltoniana (Backeb.) F. Ritter,
Copiapoa haseltoniana Backeb.
Arbusto suculento. Endémica. 700-
1000 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa coquimbana (Rümppler) Britton
& Rose var. **coquimbana**

Sin.: *Copiapoa alticostata* F. Ritter,
Copiapoa coquimbana (Rümppler)
Britton & Rose var. *alticostata* (F.
Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa*
coquimbana (Rümppler) Britton & Rose
var. *armata* F. Ritter, *Copiapoa*
coquimbana (Rümppler) Britton & Rose
var. *pendulina* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,
Copiapoa coquimbana (Rümppler)
Britton & Rose var.
pseudocoquimbana (F. Ritter) A.E.
Hoffm., *Copiapoa coquimbana*
(Rümppler) Britton & Rose var.
vallenarensis (F. Ritter) A.E. Hoffm.,
Copiapoa coquimbana (Rümppler)
Britton & Rose var. *wagenknechtii* F.
Ritter, *Copiapoa pendulina* F. Ritter,
Copiapoa pseudocoquimbana F.
Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana*
F. Ritter var. *chaniarensis* F. Ritter,
Copiapoa pseudocoquimbana F. Ritter
var. *domeykoensis* F. Ritter, *Copiapoa*

pseudocoquimbana F. Ritter var.
vulgata F. Ritter, *Copiapoa serenana*
Voldan, *Copiapoa vallenarensis* F.
Ritter, *Echinocactus coquimbanus*
Rümppler
Arbusto suculento. Endémica. 0-1000
m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Copiapoa coquimbana (Rümppler) Britton
& Rose var. **fiedleriana** (K. Schum.)
A.E. Hoffm.

Sin.: *Copiapoa fiedleriana* (K. Schum.)
Backeb., *Copiapoa pepiniana* (K.
Schum.) Backeb. var. *fiedleriana*
Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica. 0-
200 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa corralensis I. Schaub & R.
Keim

Subarbusto suculento. Endémica. 400-
800 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa dealbata F. Ritter

Sin.: *Copiapoa carrizalensis* F. Ritter,
Copiapoa carrizalensis F. Ritter var.
gigantea F. Ritter, *Copiapoa cinerea*
(Phil.) Britton & Rose var. *dealbata* (F.
Ritter) Backeb., *Copiapoa dealbata* F.
Ritter f. *gigantea* (F. Ritter) A.E.
Hoffm., *Copiapoa dealbata* F. Ritter
var. *carrizalensis* (F. Ritter) A.E.
Hoffm.
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa decorticans N.P. Taylor & G.J.
Charles

Subarbusto suculento. Endémica. 0-
200 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa echinata F. Ritter

Sin.: *Copiapoa echinata* F. Ritter f. *pulla* F. Ritter, *Copiapoa echinata* F. Ritter var. *borealis* F. Ritter, *Copiapoa megarhiza* Britton & Rose var. *echinata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa totoralensis* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa echinoides (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Sin.: *Copiapoa cuprea* F. Ritter, *Copiapoa dura* F. Ritter, *Copiapoa echinoides* (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *cuprea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinocactus echinoides* Lem. ex Salm-Dyck
Subarbusto suculento. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa eremophila F. Ritter

Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose f. *albispina* F. Ritter, *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *eremophila* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Arbusto suculento. Endémica. 400-1000 m.
Países: CHL(TAR).

Copiapoa fusca I. Schaub & R. Keim

Subarbusto suculento. Endémica. 300-700 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa grandiflora F. Ritter

Sin.: *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *grandiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Subarbusto suculento. Endémica.
Países: CHL(ANT, ATA).

Copiapoa hoffmanniana Pumarino & Blando

Subarbusto suculento. Endémica.

Países: CHL(ATA).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **esmeraldana** (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Sin.: *Copiapoa esmeraldana* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **humilis**

Sin.: *Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *paposoensis* (F. Ritter) A. Hoffm., nom. inval., *Copiapoa paposoensis* F. Ritter, nom. inval., *Echinocactus humilis* Phil.
Hierba suculenta. Endémica. 200-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **longispina** (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Sin.: *Copiapoa longispina* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **taltalensis** (Werderm.) A.E. Hoffm.

Sin.: *Copiapoa chaniaralensis* F. Ritter, *Copiapoa taltalensis* (Werderm.) Looser, *Echinocactus taltalensis* Werderm.
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **tocopillana** (F. Ritter) G. Charles

Sin.: *Copiapoa tocopillana* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **variispinata** (F. Ritter) G. Charles

Sin.: *Copiapoa variispinata* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison subsp. **matancillensis** I. Schaub & R. Keim

Subarbusto suculento. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa hypogaea F. Ritter var. **hypogaea**

Sin.: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *barquitenensis* F. Ritter, *Copiapoa mollicula* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 400-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Copiapoa hypogaea F. Ritter var. **montana** (F. Ritter) G. Charles

Sin.: *Copiapoa montana* F. Ritter, *Copiapoa olivana* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa krainziana F. Ritter

Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *krainziana* (F. Ritter) Slaba, *Copiapoa krainziana* F. Ritter var. *scopulina* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 300-900 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa laui Diers

Sin.: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *laui* (Diers) A. Hoffm.
Hierba suculenta. Endémica. 100-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Copiapoa longistaminea F. Ritter

Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *longistaminea* (F. Ritter) Slaba
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa marginata (Salm-Dyck) Britton & Rose var. **bridgesii** (Pfeiff.) A.E. Hoffm.

Sin.: *Copiapoa bridgesii* (Pfeiff.) Backeb., *Echinocactus bridgesii* Pfeiff.

Subarbusto suculento. Endémica. 200-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Copiapoa marginata (Salm-Dyck) Britton & Rose var. **marginata**

Sin.: *Copiapoa streptocaulon* (Hook.) Oosten, *Echinocactus columnaris* Pfeiff., *Echinocactus marginatus* Salm-Dyck, *Echinocactus streptocaulon* Hook.

Subarbusto suculento. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ATA).

Copiapoa megarhiza Britton & Rose

Sin.: *Copiapoa megarhiza* Britton & Rose var. *microrhiza* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica. 200-800 m.

Países: CHL(ATA).

Copiapoa rarissima F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica.

Países: CHL(ANT).

Copiapoa rupestris F. Ritter

Sin.: *Copiapoa desertorum* F. Ritter, *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *hornilloensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *rubriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *rupestris* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa hornilloensis* F. Ritter, *Copiapoa rubriflora* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT).

Copiapoa saxifraga Blando & Pumarino

Subarbusto suculento. Endémica.

Países: CHL(ATA).

Copiapoa serpentisulcata F. Ritter

Sin.: *Copiapoa serpentisulcata* F. Ritter var. *castanea* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(ATA).

Copiapoa solaris (F. Ritter) F. Ritter

Sin.: *Copiapoa conglomerata* (Phil.) Lembcke, *Copiapoa ferox* Lembcke & Backeb., nom. inval., *Echinocactus conglomeratus* Phil., *Pilocopiapoa solaris* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT).

Corryocactus Britton & Rose

Corryocactus brevistylus (K. Schum. ex Vaupel) Britton & Rose

Sin.: *Cereus brevistylus* K. Schum. ex Vaupel, *Corryocactus krausii* Backeb.

Árbol suculento. Nativa. 2000-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Cumulopuntia F. Ritter

Cumulopuntia boliviana (Salm-Dyck) F. Ritter

Sin.: *Austrocylindropuntia boliviana* (Salm-Dyck) G.D. Rowley, *Cumulopuntia famatinensis* F. Ritter, *Cumulopuntia pampana* F. Ritter, *Maihueniopsis boliviana* (Salm-Dyck) R. Kiesling, *Opuntia boliviana* Salm-Dyck, *Tephrocactus bolivianus* (Salm-Dyck) Backeb., *Tephrocactus flexispinus* Backeb., nom. inval., *Tephrocactus melanacanthus* Backeb., nom. inval.

Subarbusto suculento. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU).

Cumulopuntia dactylifera (Vaupel) E.F. Anderson

Sin.: *Cumulopuntia pentlandii* (Salm-Dyck) F. Ritter var. *dactylifera* (Vaupel) F. Ritter, *Opuntia dactylifera* Vaupel

Hierba suculenta. Nativa.

Países: CHL(ANT).

Cumulopuntia pentlandii (Salm-Dyck) F. Ritter

Sin.: *Cumulopuntia rossiana* (Heinr. & Backeb.) F. Ritter, *Maihueniopsis pentlandii* (Salm-Dyck) R. Kiesling, *Opuntia pentlandii* Salm-Dyck, *Tephrocactus pentlandii* (Salm-Dyck) Backeb., *Tephrocactus pentlandii* (Salm-Dyck) Backeb. var. *rossianus* Heinr. & Backeb.

Subarbusto suculento. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(CHA, JUJ).

Cumulopuntia recurvata Gilmer & H.P. Thomas

Sin.: *Maihueniopsis recurvata* (Gilmer & H.P. Thomas) R. Kiesling, *Tephrocactus curvispinus* Backeb., nom. inval.

Subarbusto suculento. Endémica. 800-2400 m.

Países: ARG(SJU).

Cumulopuntia sphaerica (C.F. Först.) E.F. Anderson

Sin.: *Cumulopuntia berteroi* (Colla) F. Ritter, *Cumulopuntia tubercularis* F. Ritter, *Opuntia leucophaea* Phil., *Opuntia sphaerica* C.F. Först., *Tephrocactus dimorphus* (C.F. Först.) Backeb.

Hierba suculenta. Nativa. 0-3500 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Cylindropuntia (Engelm.) F.M. Knuth

Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. Knuth

Sin.: *Cereus imbricatus* Haw.

Arbusto suculento. Introducida. 800-900 m.

Países: ARG(COR).

Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M. Knuth

Sin.: *Cactus tunicatus* Lehm., *Cylindropuntia tunicata* (Lehm.) Knuth var. *chilensis* F. Ritter, *Opuntia puelchana* A. Cast., *Opuntia tunicata* (Lehm.) Pfeiff., *Opuntia tunicata* (Lehm.) Pfeiff. var. *chilensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Arbusto suculento. Introducida. 500-3500 m.

Países: ARG(LPA, MEN). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Denmoza Britton & Rose

Denmoza rhodacantha (Salm-Dyck) Britton & Rose

Sin.: *Cereus erythrocephalus* (K. Schum.) A. Berger, *Cleistocactus rhodacanthus* (Salm-Dyck) Lem., *Denmoza erythrocephala* (K. Schum.) A. Berger, *Echinocactus rhodacanthus* Salm-Dyck, *Echinopsis rhodacantha* (Salm-Dyck) C.F. Först., *Pilocereus erythrocephalus* K. Schum., *Pilocereus rhodacanthus* (Salm-Dyck) Speg.

Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Discocactus Pfeiff.

Discocactus hartmannii (K. Schum.) Britton & Rose

Sin.: *Echinocactus hartmannii* K. Schum.

Hierba suculenta. Nativa. 500-800 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Echinopsis Zucc.

Echinopsis albispinosa K. Schum.

Sin.: *Echinopsis silvestrii* Speg.

Hierba suculenta. Nativa. 1200-1800 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Echinopsis ancistrophora Speg.

Sin.: *Echinopsis ancistrophora* Speg. var. *kratochviliana* (Backeb.) Rausch, *Echinopsis ancistrophora* Speg. var. *polyancistra* (Backeb.) Rausch, *Echinopsis hamatacantha* Backeb., *Echinopsis hamatispina* Werderm., *Echinopsis kratochviliana* Backeb., *Echinopsis leucorhodantha* Backeb., *Echinopsis lobivioides* Backeb., *Echinopsis pelecyrhachis* Backeb., *Echinopsis polyancistra* Backeb., *Lobivia ancistrophora* (Speg.) Schlumpb., *Lobivia graulichii* Fric, *Mesechinopsis hamatacantha* (Backeb.) Y. Ito, nom. inval., *Mesechinopsis leucorhodantha* (Backeb.) Y. Ito, nom. inval., *Mesechinopsis lobivioides* (Backeb.) Y. Ito, *Mesechinopsis pelecyrhachis* (Backeb.) Y. Ito, *Mesechinopsis polyancistra* (Backeb.) Y. Ito, *Neolobivia kratochviliana* (Backeb.) Y. Ito, *Pseudolobivia ancistrophora* (Speg.) Backeb., *Pseudolobivia hamatacantha* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia kratochviliana* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia leucorhodantha* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia lobivioides* Backeb., *Pseudolobivia pelecyrhachis* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia pelecyrhachis*

(Backeb.) Backeb. var. *lobivioides* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia polyancistra* (Backeb.) Backeb.

Hierba suculenta. Nativa. 1000-1400 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Echinopsis aurea Britton & Rose var. **albiflora** (Rausch) J. Ullmann

Sin.: *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich

var. *albiflora* (Rausch) J.G. Lamb.,

Lobivia aurea (Britton & Rose)

Backeb. var. *albiflora* Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(COR).

Echinopsis aurea Britton & Rose subsp. **aurea**

Sin.: *Echinopsis aurea* Britton & Rose subsp. *shaferi* (Britton & Rose) M. Lowry, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *leucomalla* (Wessner) Rausch, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *quinesensis* Rausch, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *sierragrandensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis cylindracea* (Backeb.) Friedrich, *Echinopsis fallax* (Oehme) J.G. Lamb., nom. inval., *Echinopsis quinesensis* (Rausch) Friedrich & Glaetzle, *Hymenorebutia aurea* (Britton & Rose) F. Ritter, *Hymenorebutia aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var. *cylindrica* (Backeb.) F. Ritter, *Hymenorebutia quinesensis* (Rausch) F. Ritter, *Lobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb., *Lobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. subsp. *shaferi* (Britton & Rose) Lodé, *Lobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. var. *sierragrandensis* Rausch, *Lobivia cylindracea* Backeb., *Lobivia cylindrica* Backeb., *Lobivia leucomalla* Wessner, *Lobivia shaferi* Britton & Rose subsp. *leucomalla* (Wessner) E. Herzog,

Pseudolobivia aurea (Britton & Rose) Backeb., *Pseudolobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. var. *elegans* (Backeb.) Backeb., *Salpingolobivia aurea* (Britton & Rose) Y. Ito, *Salpingolobivia aurea* (Britton & Rose) Y. Ito var. *grandiflora* (Backeb.) Y. Ito, nom. inval.

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(COR, LRI, SDE, SLU).

Echinopsis aurea Britton & Rose subsp. **dobenana** (Backeb.) Lodé

Sin.: *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *dobeana* (Dölz) J. Ullmann, *Echinopsis dobeana* (Dölz) J.G. Lamb., *Lobivia dobeana* Dölz

Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT).

Echinopsis aurea Britton & Rose subsp. **fallax** (Oehme) Lodé

Sin.: *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *callochrysea* (F. Ritter) J. Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *catamarcensis* (F. Ritter) J. Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *depressicostata* (F. Ritter) J. Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *fallax* (Oehme) J. Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *lariojensis* (F. Ritter) J. Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *tortuosa* (Rausch) J. Ullmann, *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich, *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var. *callochrysea* (F. Ritter) Lamb., *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var. *catamarcensis* (F. Ritter) Lamb., *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var. *depressicostata* (F. Ritter) Lamb., *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var. *schaferi* (Britton & Rose) J.G. Lamb., *Echinopsis fallax* (Oehme)

Friedrich var. *tortuosa* (Rausch) J.G. Lamb., *Hymenorebutia aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var. *callochrysea* F. Ritter, *Hymenorebutia aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var. *catamarcensis* F. Ritter, *Hymenorebutia aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var. *depressicostata* F. Ritter, *Hymenorebutia aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var. *lariojensis* F. Ritter, *Lobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. subsp. *fallax* (Oehme) Lodé, *Lobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. var. *tortuosa* Rausch, *Lobivia fallax* Oehme, *Lobivia shaferi* Britton & Rose, *Lobivia shaferi* Britton & Rose subsp. *fallax* (Oehme) E. Herzog, *Pseudolobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. var. *fallax* (Oehme) Backeb.

Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, SAL).

Echinopsis leucantha (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Sin.: *Acanthocalycium leucanthum* (Salm-Dyck) Schlumpb., *Cereus leucanthus* Pfeiff., *Echinocactus leucanthus* Gillies ex Salm-Dyck, *Echinopsis baldiana* Speg., *Echinopsis campylacantha* Pfeiff. & Otto, *Echinopsis campylacantha* Pfeiff. & Otto var. *leucantha* Labour., *Echinopsis campylacantha* Pfeiff. & Otto var. *stylodes* Monv., *Echinopsis cordobensis* Speg., *Echinopsis intricatissima* Speg., *Echinopsis melanopotamica* Speg., *Echinopsis molesta* Speg., *Echinopsis robinsoniana* Werderm., *Echinopsis salpigophora* (Lem.) Salm-Dyck, *Echinopsis salpingantha* Y. Ito, *Echinopsis schaeferi* Britton & Rose, *Echinopsis simplex* Nied., *Echinopsis spegazziniana* Britton & Rose, *Echinopsis xiphacantha* Y. Ito, *Echinycanthus leucanthus* Lem.

Subarbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Echinopsis longispina (Britton & Rose) Werderm.

Sin.: *Echinopsis ferox* (Britton & Rose) Backeb., *Echinopsis lecoriensis* Cárdenas, *Echinopsis nigra* Backeb., *Furiolobivia ferox* (Britton & Rose) Y. Ito, *Furiolobivia longispina* (Britton & Rose) Y. Ito, *Furiolobivia nigra* (Backeb.) Y. Ito, *Lobivia ferox* Britton & Rose, *Lobivia hastisfera* Werderm., *Lobivia horrida* F. Ritter, *Lobivia longispina* Britton & Rose, *Lobivia pictiflora* F. Ritter, *Lobivia variispina* F. Ritter, *Pseudolobivia ferox* (Britton & Rose) Backeb., *Pseudolobivia longispina* (Britton & Rose) Backeb., *Pseudolobivia longispina* (Britton & Rose) Backeb. var. *nigra* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia nigra* (Backeb.) Backeb.

Subarbusto suculento. Nativa. 2000-3800 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(TAR).

Echinopsis mamillosa Gürke

Sin.: *Echinopsis kermesina* (Krainz) Krainz, *Echinopsis mamillosa* Gürke var. *flexilis* Rausch, *Echinopsis mamillosa* Gürke var. *kermesina* (Krainz) Friedrich, *Echinopsis ritteri* Boed., *Neolobivia ritteri* (Wessner) Y. Ito, *Pseudolobivia kermesina* Krainz

Hierba suculenta. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(SAL).

Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff. & Otto

Sin.: *Cereus geminatus* Otto, *Cereus multiplex* Pfeiff., *Cereus turbinatus* Pfeiff., *Echinocactus eyriesii* Turpin,

Echinocactus oxygonus Link,
Echinopsis eyriesii (Turpin) Zucc. ex
Pfeiff. & Otto, *Echinopsis multiplex*
(Pfeiff.) Pfeiff. & Otto, *Echinopsis*
oxygona (Link) Zucc. f. *multiplex*
(Pfeiff.) J. Ullmann, *Echinopsis*
paraguayensis F. Ritter, *Echinopsis*
turbinata (Pfeiff.) Pfeiff. & Otto
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). PRY(GUA). URY(CLA,
TAC).

Echinopsis rhodotricha K. Schum.

Sin.: *Acanthocalycium rhodotrichum* (K.
Schum.) Schlumpb., *Echinopsis*
adolphofriedrichii G. Moser,
Echinopsis chacoana Schütz,
Echinopsis minuana Speg., *Echinopsis*
rhodotricha K. Schum. subsp.
chacoana (Schütz) P.J. Braun &
Esteves, *Echinopsis rhodotricha* K.
Schum. var. *brevispina* F. Ritter,
Echinopsis rhodotricha K. Schum. var.
roseiflora K. Schum.

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
SFE, SDE). PRY(APY, CON, COA).
URY(PAY, RNO, SJO).

Echinopsis tubiflora (Pfeiff.) Zucc.

Sin.: *Cereus tubiflorus* Pfeiff.
Hierba subleñosa. Endémica. 500-1000
m.
Países: ARG(BAI, ERI, SAL, TUC).

Epiphyllum Haw.

Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.

Sin.: *Cactus oxypetalus* DC.
Hierba epífita. Introducida.
Países: BRA(SCA)

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.

Sin.: *Cactus phyllanthus* L., *Epiphyllum*
phyllanthus (L.) Haw. var.
paraguayense (F.A.C. Weber)
Backeb., *Phyllocactus phyllanthus* (L.)
Link, *Phyllocactus phyllanthus* (L.) Link
var. *paraguayense* F.A.C. Weber
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN,
CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI,
SPE).

Eriosyce Phil.

Eriosyce aurata (Pfeiff.) Backeb. var.
aurata

Sin.: *Echinocactus auratus* Pfeiff.,
Echinocactus ceratistes Otto ex Pfeiff.,
Echinocactus sandillon Gay, *Eriosyce*
algarrobensis F. Ritter, *Eriosyce*
ceratistes Britton & Rose, *Eriosyce*
sandillon (Gay) Phil., *Eriosyce*
sandillon (Gay) Phil. var. *algarrobensis*
(F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce*
sandillon (Gay) Phil. var. *mollesensis*
(Backeb.) A.E. Hoffm., *Eriosyce*
sandillon (Gay) Phil. var. *vallenarensis*
(Backeb.) A.E. Hoffm.
Arbusto suculento. Endémica. 1500-
2500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Eriosyce aurata (Pfeiff.) Backeb. var.
spinibarbis (F. Ritter) Katt.

Sin.: *Eriosyce spinibarbis* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémica. 2000-
2500 m.
Países: CHL(ATA).

Eriosyce ihotzkyanae F. Ritter

Arbusto suculento. Endémica. 0-1500
m.
Países: CHL(COQ).

Eriosyce lapampaensis F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica. 200-
2500 m.
Países: CHL(ATA).

Eriosyce megacarpa F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica. 0-
100 m.
Países: CHL(ATA).

Eriosyce rodentiophila F. Ritter

Sin.: *Eriosyce rodentiophila* F. Ritter var.
lanata F. Ritter
Arbusto suculento. Endémica. 100-600
m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Eriosyce tuberculosa S. Campbell

Arbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: CHL(ATA).

Eulychnia Phil.

Eulychnia acida Phil.

Sin.: *Eulychnia acida* Phil. var. *elata* F.
Ritter, *Eulychnia acida* Phil. var.
procumbens F. Ritter
Árbol suculento. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Eulychnia aricensis F. Ritter

Árbol suculento. Endémica. 400-700 m.
Países: CHL(TAR).

Eulychnia breviflora Phil.

Sin.: *Cereus panoplaeatus* Monv., nom.
utique rej., *Eulychnia barquitenis* F.
Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var.
taltalensis F. Ritter, *Eulychnia*
breviflora Phil. var. *tenuis* F. Ritter,
Eulychnia saint-pieana F. Ritter var.
barquitenis (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Árbol suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Eulychnia castanea Phil.

Sin.: *Cereus castaneus* (Phil.) K. Schum.,
Philippicereus castaneus (Phil.)
 Backeb.
 Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
 Países: CHL(COQ, VAL).

Eulychnia coquimbana (Molina) S. Albesiano

Sin.: *Cactus coquimbanus* Molina, nom.
 utique rej., *Cereus coquimbanus*
 (Molina) K. Schum., *Echinopsis*
coquimbana (Molina) Friedrich & G.D.
 Rowley, *Trichocereus coquimbanus*
 (Molina) Britton & Rose
 Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Eulychnia iquiquensis (K. Schum.) Britton & Rose

Sin.: *Cereus iquiquensis* K. Schum.,
Eulychnia breviflora Phil. subsp.
iquiquensis (K. Schum.) D.R. Hunt,
Eulychnia iquiquensis (K. Schum.)
 Britton & Rose var. *pullilana* F. Ritter
 Árbol suculento. Endémica. 0-1000 m.
 Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Eulychnia saint-pieana F. Ritter

Árbol suculento. Endémica. 0-700 m.
 Países: CHL(ANT, ATA).

Eulychnia vallenarensis P.C. Guerrero & H.E. Walter

Arbusto. Endémica. 600-1300 m.
 Países: CHL(ATA).

Frailea Britton & Rose**Frailea buenekeri** W.R. Abraham

Sin.: *Frailea buenekeri* W.R. Abraham
 subsp. *densispina* Hofacker & K.
 Herm, *Frailea densispina* (Hofacker &
 K. Herm) N. Gerloff
 Hierba suculenta. Endémica. 200 m.

Países: BRA(RGS).

Frailea castanea Backeb.

Sin.: *Frailea asterioides* Werderm.
 Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(ERI, MIS). BRA(RGS).
 URY(ART, RIV, SAO).

Frailea cataphracta (Dams) Britton & Rose

Sin.: *Echinocactus cataphractus* Dams,
Frailea cataphracta (Dams) Britton &
 Rose subsp. *tuyensis* (Buining & G.
 Moser) Braun & Esteves, *Frailea*
tuyensis Buining & G. Moser
 Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS). BRA(RGS).
 PRY(COA).

Frailea curvispina Buining & Brederoo

Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.
 Países: BRA(RGS).

Frailea erythracantha R. Pontes,

Oliveira-Deble & Deble
 Subarbusto suculento. Endémica. 200-
 300 m.
 Países: BRA(RGS).

Frailea gracillima (Lem.) Britton & Rose subsp. **gracillima**

Sin.: *Echinocactus gracillimus* Lem.,
Frailea alacriportana Backeb. & Voll,
Frailea albifusca F. Ritter, *Frailea*
gracillima (Lem.) Britton & Rose
 subsp. *alacriportana* (Backeb. & Voll)
 N. Gerloff, *Frailea gracillima* (Lem.)
 Britton & Rose subsp. *albifusca* (F.
 Ritter) Braun & E. Pereira, *Frailea*
lepida Buining & Brederoo, *Frailea*
pseudogracillima F. Ritter
 Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(ERI). BRA(RGS).
 URY(ART, CLA, RIV).

Frailea gracillima (Lem.) Britton & Rose subsp. **horstii** (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves

Sin.: *Frailea horstii* F. Ritter
 Hierba suculenta. Endémica.
 Países: BRA(RGS).

Frailea mamifera Buining & Brederoo subsp. **angelesiae** R. Kiesling & Metzing

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(ERI).

Frailea mamifera Buining & Brederoo subsp. **mamifera**

Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.
 Países: BRA(RGS).

Frailea phaeodisca (Speg.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus pygmaeus* Speg. var.
phaeodiscus Speg., *Frailea perbella*
 Prestle, *Frailea pygmaea* (Speg.)
 Britton & Rose var. *phaeodisca*
 (Speg.) Y. Ito
 Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS). URY(CLA, DUR,
 LAV, RIV, TAC).

Frailea pumila (Lem.) Britton & Rose

Sin.: *Echinocactus pumilus* Lem., *Frailea*
albiareolata Buining & Brederoo,
Frailea carminifilamentosa Backeb.,
Frailea chrysacantha Hrabe, nom.
 inval.
 Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(ERI, MIS). BRA(RGS).
 PRY(APY). URY(ART, RIV, SAO,
 TAC).

Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose subsp. **albicolumnaris** (F. Ritter) Hofacker

Sin.: *Frailea albicolumnaris* F. Ritter
 Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS).

Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose
subsp. **fulviseta** (Buining & G. Moser)
Braun & Esteves

Sin.: *Frailea fulviseta* Buining & Brederoo
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose
subsp. **pygmaea**

Sin.: *Echinocactus dadakii* Fric,
Echinocactus pulcherrimus Arechav.,
Echinocactus pygmaeus Speg.,
Frailea asperispina F. Ritter, *Frailea*
aureispina F. Ritter, *Frailea*
cataphracta (Dams) Britton & Rose
var. *tuyensis* Buining & G. Moser,
Frailea dadakii (Fric) A. Berger, *Frailea*
pulcherrima (Arechav.) Speg.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).
URY(LAV, MAL, MON, RIV, SAO,
TYT).

Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose
subsp. **tuyensis** (Buining & G. Moser)
Metzing

Sin.: *Frailea cataphracta* (Dams) Britton &
Rose var. *tuyensis* Buining & G. Moser
Hierba suculenta. Endémica.

Frailea schilinzkyana (F. Haage ex K.
Schum.) Britton & Rose

Sin.: *Cactus schilinzkyanus* (F. Haage ex
K. Schum.) Kuntze, *Echinocactus*
grahlianus F. Haage ex K. Schum.,
Echinocactus schilinzkyanus F. Haage
ex K. Schum., *Frailea conceptionensis*
Buining & G. Moser, *Frailea friedrichii*
Buining & G. Moser, *Frailea grahliana*
(F. Haage ex K. Schum.) Britton &
Rose, *Frailea ignacionensis* Buining &
G. Moser, *Frailea perumbilicata* F.
Ritter
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).
BRA(RGS). PRY(CON, PAI).
URY(ART, RNO).

Gymnocalycium Pfeiff. ex ex Mittler

Gymnocalycium alboareolatum Rausch

Sin.: *Gymnocalycium alboareolatum*
Rausch var. *ramosum* Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 1000-
1500 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium alenae Kulhánek

Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium amerhauseri H. Till

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000
m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium andreae (Boed.)
Backeb.

Sin.: *Echinocactus andreae* Boed.,
Gymnocalycium andreae (Boed.)
Backeb. f. *svecianum* Pazout ex H.
Till, *Gymnocalycium andreae* (Boed.)
Backeb. var. *grandiflorum* Krainz &
Andreae
Hierba suculenta. Endémica. 1500-
2500 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Gymnocalycium angelae Meregalli

Sin.: *Gymnocalycium denudatum* (Link &
Otto) Pfeiff. ex Mittler subsp. *angelae*
(Meregalli) Prestlé
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Gymnocalycium anisitsii (K. Schum.)
Britton & Rose

Sin.: *Echinocactus anisitsii* K. Schum.,
Echinocactus damsii K. Schum.,

Echinocactus joossensianus Boed.,
Gymnocalycium anisitsii (K. Schum.)
Britton & Rose subsp. *multiproliferum*
(P.J. Braun) P.J. Braun & Esteves,
Gymnocalycium damsii (K. Schum.)
Britton & Rose, *Gymnocalycium*
damsii (K. Schum.) Britton & Rose var.
centrispinum Backeb., nom. inval.,
Gymnocalycium damsii (K. Schum.)
Britton & Rose var. *multiproliferum* P.J.
Braun, *Gymnocalycium damsii* (K.
Schum.) Britton & Rose var.
rotundulum Backeb., nom. inval.,
Gymnocalycium damsii (K. Schum.)
Britton & Rose var. *torulosum* Backeb.,
nom. inval., *Gymnocalycium damsii* (K.
Schum.) Britton & Rose var.
tucavocense Backeb., nom. inval.,
Gymnocalycium joossensianum
(Boed.) Britton & Rose
Hierba suculenta. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(CON).

Gymnocalycium baldianum (Speg.)
Speg.

Sin.: *Echinocactus baldianus* Speg.,
Echinocactus sanguiniflorus
Werderm., *Gymnocalycium baldianum*
(Speg.) Speg. f. *venturianum* (Fric ex
Backeb.) J.G. Lamb., *Gymnocalycium*
baldianum (Speg.) Speg. var.
albiflorum C.A.L. Bercht,
Gymnocalycium sanguiniflorum
(Werderm.) Werderm.,
Gymnocalycium venturianum Fric ex
Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 1000-
2000 m.
Países: ARG(CAT).

Gymnocalycium bayrianum H. Till

Sin.: *Gymnocalycium spegazzinii* Britton &
Rose subsp. *bayrianum* (H. Till) Halda
Hierba suculenta. Endémica. 1000-
1500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Gymnocalycium bruchii (Speg.)
 Hosseus var. **brigitiae** Piltz
 Hierba suculenta. Endémica. 1500-2000 m.
 Países: ARG(COR).

Gymnocalycium bruchii (Speg.)
 Hosseus var. **bruchii**
 Sin.: *Echinocactus lafaldensis* A. Berger,
Frailea bruchii Speg., *Gymnocalycium andreae* (Boed.) Backeb. subsp. *carolinense* Neuhuber,
Gymnocalycium bruchii (Speg.)
 Hosseus var. *enorme* (Oehme)
 Backeb., *Gymnocalycium bruchii* (Speg.)
 Hosseus var. *hossei* Backeb.,
Gymnocalycium lafaldense Vaupel
 Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m.
 Países: ARG(COR, SLU).

Gymnocalycium bruchii (Speg.)
 Hosseus var. **niveum** Rausch
 Sin.: *Gymnocalycium albispinum* Backeb.
 Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
 Países: ARG(COR).

Gymnocalycium buenekeri (Buining)
 Swales
 Sin.: *Gymnocalycium horstii* Buining var. *buenekeri* Buining
 Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS).

Gymnocalycium cabreraense Schädlich,
 Bercht. & Melojer
 Hierba suculenta. Endémica. 400-500 m.
 Países: PRY(APY).

Gymnocalycium calochlorum (Boed.) Y. Ito
 Sin.: *Echinocactus calochlorus* Boed.,
Echinocactus prolifer Backeb.,
Gymnocalycium calochlorum

(Wessner) Y. Ito var. *proliferum* (Backeb.) Backeb., *Gymnocalycium papschii* H. Till
 Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
 Países: ARG(COR).

Gymnocalycium campestre Repka
 Hierba suculenta. Endémica.
 Países: ARG(COR).

Gymnocalycium capillense (Schick)
 Hosseus
 Sin.: *Echinocactus capillaensis* Schick,
Echinocactus sigelianum Schick,
Echinocactus sutterianus Schick,
Gymnocalycium deezianus Dölz,
Gymnocalycium sigelianum (Schick)
 Hosseus, *Gymnocalycium sutterianum* (Schick)
 Hosseus, *Gymnocalycium sutterianum* (Schick)
 Hosseus subsp. *arachnispinum* Repka,
Gymnocalycium sutterianum (Schick)
 Hosseus subsp. *dolezalii* (Halda & Milt) Repka
 Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
 Países: ARG(COR).

Gymnocalycium castellanosi Backeb.
 var. **bozsingianum** (Schütz) Piltz
 Sin.: *Gymnocalycium bozsingianum* Schütz
 Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
 Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium castellanosi Backeb.
 var. **castellanosi**
 Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
 Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium castellanosi Backeb.
 subsp. **acorrugatum** (J.G. Lamb.) R. Kiesling & Metzger

Sin.: *Gymnocalycium acorrugatum* J.G. Lamb.
 Hierba suculenta. Endémica.
 Países: ARG(SJU).

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler
 Sin.: *Echinocactus denudatus* Link & Otto
 Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV).

Gymnocalycium erinaceum J.G. Lamb.
 Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
 Países: ARG(COR).

Gymnocalycium eurypleurum F. Ritter
 Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.
 Países: PRY(APY).

Gymnocalycium fischeri Halda, Kupcák, Lukasič & Sladk.
 Hierba suculenta. Endémica.
 Países: ARG(SLU).

Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler
 Sin.: *Cactus gibbosus* Haw., *Cereus gibbosus* (Haw.) Pfeiff., *Echinocactus brachypetalus* (Speg.) Werderm.,
Echinocactus gibbosus (Haw.) DC.,
Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *cerebriformis* Speg., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *chubutensis* Speg., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *ferox* Rümpler,
Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *leonensis* Hildm. ex K. Schum., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *leucacanthus* Rümpler,
Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *leucodictyus* Salm-Dyck, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *polygonus* K. Schum.,
Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *schlumbergeri* Rümpler,

- Echinocactus leucodictyus* Salm-Dyck,
Gymnocalycium borthii Koop ex H. Till,
Gymnocalycium brachypetalum Speg.,
Gymnocalycium chubutense (Speg.)
 Speg., *Gymnocalycium gibbosum*
 (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var.
brachypetalum (Speg.) Papsch,
Gymnocalycium gibbosum (Haw.)
 Pfeiff. ex Mittler var. *chubutense*
 (Speg.) Papsch, *Gymnocalycium*
strigilium Jeggle ex H. Till
 Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,
 RNE, SCR, SLU).
- Gymnocalycium horstii** Buining
 Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS).
- Gymnocalycium hybopleurum** (K.
 Schum.) Backeb.
 Sin.: *Echinocactus multiflorus* Hook. var.
hybopleurus K. Schum.,
Gymnocalycium ambatoense Piltz,
Gymnocalycium catamarcense H. Till
 & W. Till subsp. *acinacispinum* H. Till
 & W. Till, *Gymnocalycium*
catamarcense H. Till & W. Till subsp.
schmidianum H. Till & W. Till,
Gymnocalycium hybopleurum (K.
 Schum.) Backeb. var. *breviflorum*
 Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium*
hybopleurum (K. Schum.) Backeb. var.
centrispinum Backeb., nom. inval.,
Gymnocalycium hybopleurum (K.
 Schum.) Backeb. var. *ferocior*
 Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium*
hybopleurum (K. Schum.) Backeb. var.
ferox Backeb., nom. inval.,
Gymnocalycium nigriareolatum
 Backeb.
 Hierba suculenta. Endémica. 1000-
 2000 m.
 Países: ARG(CAT, LRI).
- Gymnocalycium hyptiacanthum** (Lem.)
 Britton & Rose
 Sin.: *Echinocactus hyptiacanthus* Lem.,
Echinocactus netrelianum Labour.,
Gymnocalycium netrelianum (Labour.)
 Britton & Rose
 Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(ERI). URY(CAS, COL,
 FLA, LAV, MAL, RNO, ROC, SAO,
 SJO).
- Gymnocalycium kieslingii** O. Ferrari f.
alboareolatum O. Ferrari
 Hierba suculenta. Endémica. 500-1500
 m.
 Países: ARG(LRI).
- Gymnocalycium kieslingii** O. Ferrari f.
castaneum O. Ferrari
 Hierba suculenta. Endémica. 1000-
 1500 m.
 Países: ARG(LRI).
- Gymnocalycium kieslingii** O. Ferrari f.
kieslingii
 Hierba suculenta. Endémica. 500-1500
 m.
 Países: ARG(LRI).
- Gymnocalycium kroenleinii** R. Kiesling,
 Rausch & O. Ferrari
 Hierba suculenta. Endémica. 1200-
 1400 m.
 Países: ARG(LRI).
- Gymnocalycium kuehhasii** Neuhuber &
 R. Sperling subsp. *corneuspinum* R.
 Sperling & Strub
 Hierba suculenta. Endémica. 300-400
 m.
 Países: ARG(SDE).
- Gymnocalycium kuehhasii** Neuhuber &
 R. Sperling subsp. *incurvatispinum*
 R. Sperling & Strub
- Hierba suculenta. Endémica. 500-600
 m.
 Países: ARG(COR).
- Gymnocalycium kuehhasii** Neuhuber &
 R. Sperling subsp. *kuehhasii*
 Hierba suculenta. Endémica. 500-600
 m.
 Países: ARG(COR).
- Gymnocalycium leptanthum** (Speg.)
 Speg.
 Sin.: *Echinocactus platensis* Speg. var.
leptanthus Speg.
 Hierba suculenta. Endémica. 500-1000
 m.
 Países: ARG(SDE).
- Gymnocalycium marianae** Perea, O.
 Ferrari, Las Peñas & R. Kiesling
 Hierba suculenta. Endémica. 1700-
 1800 m.
 Países: ARG(CAT).
- Gymnocalycium marsoneri** Fric ex Y. Ito
 Sin.: *Gymnocalycium knebelii* Fric, nom.
 nud.
 Hierba suculenta. Endémica. 500-1500
 m.
 Países: ARG(SAL, TUC).
- Gymnocalycium mazanense** (Backeb.)
 Backeb.
 Sin.: *Echinocactus mazanensis* Backeb.,
Gymnocalycium guachinense Schütz,
Gymnocalycium mazanense (Backeb.)
 Backeb. var. *breviflorum* Backeb.,
Gymnocalycium mazanense (Backeb.)
 Backeb. var. *ferox* Backeb., nom.
 inval., *Gymnocalycium nidulans* Fric
 ex Backeb., *Gymnocalycium*
weissianum Backeb., *Gymnocalycium*
weissianum Backeb. var. *atorroseum*
 Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium*
weissianum Backeb. var. *cinerascens*
 Backeb., nom. inval.

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium megatae Y. Ito

Sin.: *Gymnocalycium eytianum* Cárdenas,
Gymnocalycium fricianum Plesnik,
nom. inval., *Gymnocalycium tudae* Y.
Ito
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Gymnocalycium mesopotamicum R.
Kiesling

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Gymnocalycium mihanovichii (Fric &
Gürke) Britton & Rose

Sin.: *Echinocactus mihanovichii* Fric &
Gürke
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY,
PHA).

Gymnocalycium monvillei (Lem.) Britton
& Rose subsp. **achirasense** (H. Till &
Schatzl) H. Till

Sin.: *Gymnocalycium achirasense* H. Till &
Schatzl, *Gymnocalycium horridispinum*
G. Frank ex H. Till var. *achirasense*
(H. Till & Schatzl) Lodé
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000
m.
Países: ARG(COR, SLU).

Gymnocalycium monvillei (Lem.) Britton
& Rose subsp. **horridispinum** (G.
Frank ex H. Till) H. Till

Sin.: *Gymnocalycium horridispinum* G.
Frank ex H. Till
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000
m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium monvillei (Lem.) Britton
& Rose subsp. **monvillei**

Sin.: *Echinocactus brachyanthus* Gürke,
Echinocactus monvillei Lem.,
Echinocactus multiflorus Hook.,
Echinocactus multiflorus Hook. var.
albispinus K. Schum., *Echinocactus*
multiflorus Hook. var. *parisiense* K.
Schum., *Gymnocalycium*
brachyanthum (Gürke) Britton & Rose,
Gymnocalycium monvillei (Lem.)
Britton & Rose subsp. *brachyanthum*
(Gürke) H. Till, *Gymnocalycium*
monvillei (Lem.) Britton & Rose var.
grandiflorum (Backeb.) H. Till,
Gymnocalycium multiflorum (Hook.)
Britton & Rose, *Gymnocalycium*
multiflorum (Hook.) Britton & Rose var.
parisiense P. Fourn., *Gymnocalycium*
schuetzianum H. Till & Schatzl
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000
m.
Países: ARG(COR, SLU).

Gymnocalycium mostii (Gürke) Britton &
Rose

Sin.: *Echinocactus kurtzianus* Gürke,
Echinocactus mostii Gürke,
Gymnocalycium bicolor Schütz,
Gymnocalycium immemoratium A.
Cast. & Lelong, *Gymnocalycium*
kurtzianum (Gürke) Britton & Rose,
Gymnocalycium mostii (Gürke) Britton
& Rose var. *kurtzianum* (Gürke)
Backeb., *Gymnocalycium*
tobuschianum Schick, *Gymnocalycium*
valnicekianum Jajó, *Gymnocalycium*
valnicekianum Jajó var. *polycentralis*
Schütz
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000
m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium mucidum Oehme

Sin.: *Gymnocalycium ferrarii* Rausch,
Gymnocalycium glaucum F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 500-1500
m.

Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium neuhuberi H. Till & W.
Till

Hierba suculenta. Endémica.
Países: ARG(SLU).

Gymnocalycium ochoterenae Backeb.
subsp. **ochoterenae**

Sin.: *Gymnocalycium bodenbenderianum*
A. Berger subsp. *intertextum* (Backeb.
ex H. Till) H. Till, *Gymnocalycium*
intertextum Backeb. ex H. Till,
Gymnocalycium kozelskianum
Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium*
moserianum Schütz, nom. inval.,
Gymnocalycium ochoterenae Backeb.
subsp. *herbsthoferianum* H. Till &
Neuhuber, *Gymnocalycium*
ochoterenae Backeb. var. *cinereum*
Backeb., *Gymnocalycium ochoterenae*
Backeb. var. *polygonum* Backeb.,
nom. inval., *Gymnocalycium*
ochoterenae Backeb. var. *scoparium*
H. Till & Neuhuber, *Gymnocalycium*
ochoterenae Backeb. var. *tenuispinum*
Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium*
ochoterenae Backeb. var. *variispinum*
Backeb., nom. inval.

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000
m.

Países: ARG(COR, SLU).

Gymnocalycium ochoterenae Backeb.
subsp. **vatterii** (Buining) Papsch

Sin.: *Gymnocalycium ochoterenae*
Backeb. var. *altautenense* Papsch,
Gymnocalycium vatterii Buining
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000
m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium oenanthemum Backeb.
Sin.: *Gymnocalycium carminanthum* Borth
& Koop, *Gymnocalycium tillianum*
Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000
m.

Países: ARG(CAT).

Gymnocalycium paediophilum F. Ritter
ex Schütz

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Gymnocalycium paraguayense (K.
Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus
f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing &
R. Kiesling

Sin.: *Echinocactus denudatus* Link & Otto
var. *andersohnianus* F. Haage,
Echinocactus denudatus Link & Otto
var. *heuschkelianus* F. Haage,
Echinocactus denudatus Link & Otto
var. *meiklejohnianus* F. Haage,
Gymnocalycium denudatum (Link &
Otto) Pfeiff. ex Mittler var.
andersohnianum (F. Haage) Y. Ito,
nom. inval., *Gymnocalycium*
denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex
Mittler var. *heuschkelianum* (F. Haage)
Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium*
denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex
Mittler var. *meiklejohnianum* (F.
Haage) Y. Ito, nom. inval.,
Gymnocalycium fleischerianum
Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium*
fleischerianum Backeb. var.
andersohnianum (F. Haage) Schütz,
nom. inval., *Gymnocalycium*
fleischerianum Backeb. var. *anoplum*
Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium*
fleischerianum Backeb. var.
heuschkelianum (F. Haage) Schütz,
nom. inval., *Gymnocalycium*
fleischerianum Backeb. var.
meiklejohnianum (F. Haage) Schütz,
nom. inval.

Hierba suculenta. Endémica. 100-300
m.

Países: PRY(COA, PAI).

Gymnocalycium paraguayense (K.
Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus
f. **paraguayense**

Sin.: *Echinocactus denudatus* Link & Otto
var. *anisitsii* Fric, *Echinocactus*
denudatus Link & Otto var.
bruennowianus F. Haage,
Echinocactus denudatus Link & Otto
var. *deletianus* F. Haage,
Echinocactus denudatus Link & Otto
var. *golzianus* Mundt, *Echinocactus*
denudatus Link & Otto var.
paraguayensis F. Haage, nom. inval.,
Echinocactus denudatus Link & Otto
var. *roseiflorus* K. Schum.,
Echinocactus denudatus Link & Otto
var. *scheidelianus* F. Haage,
Echinocactus denudatus Link & Otto
var. *wagnerianus* F. Haage,
Echinocactus denudatus Link & Otto
var. *wieditzianus* F. Haage,
Echinocactus paraguayensis K.
Schum. ex Chodat & Hassl.,
Gymnocalycium denudatum (Link &
Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *deletianum*
(F. Haage) Y. Ito, nom. inval.,
Gymnocalycium denudatum (Link &
Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *golzianum*
(Mundt) Y. Ito, nom. inval.,
Gymnocalycium denudatum (Link &
Otto) Pfeiff. ex Mittler var.
paraguayense (F. Haage) Y. Ito, nom.
inval., *Gymnocalycium denudatum*
(Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var.
paraguayense F. Haage, nom. inval.,
Gymnocalycium denudatum (Link &
Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *roseiflorum*
(K. Schum.) Y. Ito, nom. inval.,
Gymnocalycium denudatum (Link &
Otto) Pfeiff. ex Mittler var.
scheidelianum (F. Haage) Y. Ito, nom.
inval., *Gymnocalycium denudatum*

(Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var.
wieditzianum (F. Haage) Y. Ito, nom.
inval., *Gymnocalycium paraguayense*
(K. Schum. ex Chodat & Hassl.)
Hosseus var. *roseiflorum* (K. Schum.)
Schütz, *Gymnocalycium*
paraguayense (K. Schum. ex Chodat
& Hassl.) Hosseus var. *scheidelianum*
(F. Haage) Schütz, *Gymnocalycium*
paraguayense (K. Schum. ex Chodat
& Hassl.) Hosseus var. *wagnerianum*
(F. Haage) Schütz, *Gymnocalycium*
paraguayense (K. Schum. ex Chodat
& Hassl.) Hosseus var. *wieditzianum*
(F. Haage) Schütz

Hierba suculenta. Endémica. 100-300
m.

Países: PRY(COA, PAI).

Gymnocalycium parvulum (Speg.)
Speg.

Sin.: *Echinocactus platensis* Speg. var.
parvulus Speg., *Gymnocalycium*
berchtii Neuhuber

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000
m.

Países: ARG(SLU).

Gymnocalycium pflanzii (Vaupel)
Werderm. subsp. **argentinense** H. Till
& W. Till

Sin.: *Gymnocalycium marquezii* Cárdenas
var. *argentinense* Backeb., nom. inval.

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY, PHA).

Gymnocalycium ponomarevae Gapon &
Neuhuber

Hierba suculenta. Endémica. 1100-
1200 m.

Países: ARG(CAT).

Gymnocalycium pugionacanthum
Backeb. ex H. Till

Sin.: *Gymnocalycium catamarcense* H. Till
& W. Till f. *belense* H. Till & W. Till,

- Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *ensispinum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *montanum* H. Till & W. Till Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m. Países: ARG(CAT, LRI).
- Gymnocalycium quehlianum** (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus
Sin.: *Echinocactus platensis* Speg. var. *quehlianus* (F. Haage ex Quehl) Speg., *Echinocactus quehlianus* F. Haage ex Quehl, *Gymnocalycium asterium* A. Cast. var. *minimum* Pazout, nom. inval., *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *flavispinum* Backeb., *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *rolfianum* Schick, *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *zantnerianum* Schick, *Gymnocalycium stellatum* Speg. var. *flavispinum* Bozsing ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium stellatum* Speg. var. *kleinianum* Rausch ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium stellatum* Speg. var. *zantnerianum* (Schick) H. Till & W. Till Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m. Países: ARG(COR).
- Gymnocalycium ragonesei** A. Cast. Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CAT).
- Gymnocalycium raineri** H. Till Hierba suculenta. Endémica. Países: ARG(CAT).
- Gymnocalycium reductum** (Link) Pfeiff. ex Mittler var. **platense** (Speg.) R. Kiesling
Sin.: *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *platensis* Speg., *Echinocactus platensis* Speg., *Gymnocalycium platense* (Speg.) Britton & Rose Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(BAI).
- Gymnocalycium reductum** (Link) Pfeiff. ex Mittler var. **reductum**
Sin.: *Cactus reductus* Link, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *nobilis* Lem., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *ventanicola* Speg., *Gymnocalycium platense* (Speg.) Britton & Rose var. *ventanicola* (Speg.) R. Kiesling, *Gymnocalycium schatzlianum* Strigl & W. Till Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(BAI).
- Gymnocalycium ritterianum** Rausch Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m. Países: ARG(LRI).
- Gymnocalycium robustum** R. Kiesling, O. Ferrari & Metzger Hierba suculenta. Endémica. Países: ARG(COR).
- Gymnocalycium saglionis** (J.F. Cels) Britton & Rose var. **jujuyense** Backeb.
Sin.: *Brachycalycium tilcarensis* (Backeb.) Backeb., nom. illeg., *Gymnocalycium saglionis* (J.F. Cels) Britton & Rose subsp. *tilcarensis* (Backeb.) H. Till & W. Till, comb. illeg., *Gymnocalycium saglionis* (J.F. Cels) Britton & Rose var. *tilcarensis* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium tilcarensis* Backeb. Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m. Países: ARG(JUJ).
- Gymnocalycium saglionis** (J.F. Cels) Britton & Rose var. **saglionis**
Sin.: *Echinocactus saglionis* J.F. Cels Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).
- Gymnocalycium sanluisense** Neuhuber Hierba suculenta. Endémica. 1500-1600 m. Países: ARG(SLU).
- Gymnocalycium schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **delaetii** (K. Schum.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus delaetii* K. Schum., *Gymnocalycium delaetii* (K. Schum.) Hosseus, *Gymnocalycium schickendantzii* (F.A.C. Weber) Britton & Rose subsp. *delaetii* (K. Schum.) G.J. Charles Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m. Países: ARG(SAL).
- Gymnocalycium schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **schickendantzii**
Sin.: *Echinocactus schickendantzii* F.A.C. Weber, *Gymnocalycium antherostele* F. Ritter, *Gymnocalycium michoga* Fric ex Y. Ito, *Gymnocalycium pungens* Fleischer Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
- Gymnocalycium schroederianum** Osten subsp. **bayense** R. Kiesling Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI).
- Gymnocalycium schroederianum** Osten subsp. **boessii** R. Kiesling, Marchesi & O. Ferrari
Sin.: *Gymnocalycium erolesii* Neuhuber & C.A.L. Bercht Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.

- Países: ARG(SFE).
- Gymnocalycium schroederianum** Osten
subsp. **paucicostatum** R. Kiesling
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).
- Gymnocalycium schroederianum** Osten
subsp. **schröderianum**
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). URY(RNO).
- Gymnocalycium spegazzinii** Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus loricatus* Speg., nom. illeg., *Gymnocalycium spegazzinii* Britton & Rose var. *major* Backeb., *Gymnocalycium spegazzinii* Britton & Rose var. *punillense* H. Till & W. Till
Hierba suculenta. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
- Gymnocalycium stellatum** Speg.
Sin.: *Echinocactus bodenbenderianus* A. Berger, *Echinocactus stellatus* Speg., hom. illeg., *Gymnocalycium asterium* A. Cast., nom. illeg., *Gymnocalycium asterium* A. Cast. var. *paucispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium bodenbenderianum* A. Berger, *Gymnocalycium obductum* Piltz, *Gymnocalycium occultum* Fric ex Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium piltziorum* Schütz, *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *stellatum* (Speg.) Dölz, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till subsp. *kozelskianum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till subsp. *paucispinum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till subsp. *piltziorum* H. Till & W. Till,
- Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *guasayanense* Strigl, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *guthianum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *mirandaense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *pipanacoense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *platygonum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *sanjuanense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium stellatum* Speg. subsp. *occultum* Fric ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium triacanthum* Backeb., nom. inval.
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU).
- Gymnocalycium stenopleurum** F. Ritter
Sin.: *Gymnocalycium friedrichii* (Werderm.) Pazout, nom. inval., *Gymnocalycium mihanovichii* (Fric & Gürke) Britton & Rose var. *friedrichii* Werderm.
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).
- Gymnocalycium stuckertii** (Speg.) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus stuckertii* Speg.
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SLU).
- Gymnocalycium tanningaense** Piltz subsp. **fuschilloi** Neuhuber
Hierba suculenta. Endémica. 600-700 m.
Países: ARG(COR).
- Gymnocalycium tanningaense** Piltz subsp. **tanningaense**
Sin.: *Gymnocalycium gaponii* Neuhuber
- Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR).
- Gymnocalycium uebelmannianum** Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(LRI).
- Gymnocalycium uruguayense** (Arechav.) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus guerkeanus* Heese, *Echinocactus uruguayensis* Arechav., *Gymnocalycium artigas* Herter, *Gymnocalycium guerkeanus* (Heese) Britton & Rose
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
- Gymnocalycium volskyi** Gapon, Ponomareva, Protopopov, Schelkun. & Zaitseva subsp. **angulatum** (Prestlé) Gapon, Chikin, Ponomareva, Protopopov & Schelkun.
Sin.: *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler subsp. *angulatum* Prestlé
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).
- Gymnocalycium volskyi** Gapon, Ponomareva, Protopopov, Schelkun. & Zaitseva subsp. **volskyi**
Hierba suculenta. Endémica. 200-300 m.
Países: URY(CLA).
- Haageocereus** Backeb.

Haageocereus australis Backeb.

Sin.: *Haageocereus australis* Backeb. f. *subtilispinus* F. Ritter, *Haageocereus multicolorispinus* Buining

Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(TAR).

Haageocereus fascicularis (Meyen) F. Ritter

Sin.: *Cereus fascicularis* Meyen, *Trichocereus fascicularis* (Meyen) Britton & Rose, *Weberbauerocereus fascicularis* (Meyen) Backeb.

Arbusto suculento. Endémica. 2000-3000 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Harrisia Britton**Harrisia bonplandii** (Pfeiff.) Britton & Rose

Sin.: *Cereus balansae* K. Schum., *Cereus bonplandii* Pfeiff., *Cereus guelichii* Speg., *Echinopsis balansae* (K. Schum.) Anceschi & Magli, *Eriocereus bonplandii* (Pfeiff.) Riccob., *Eriocereus guelichii* (Speg.) A. Berger, *Harrisia balansae* (K. Schum.) N.P. Taylor & Zappi, *Harrisia guelichii* (Speg.) Britton & Rose, *Harrisia pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. *bonplandii* (Pfeiff.) Braun & E. Pereira

Hierba suculenta. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, CON, COA, GUA, NAS, PAI, PHA, SPE).

Harrisia martinii (Labour.) Britton

Sin.: *Cereus martinii* Labour., *Cereus martinii* Labour. var. *perviridis* Weing., *Eriocereus martinii* (Labour.) Riccob. Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PHA).

Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **pomanensis**

Sin.: *Cereus pomanensis* F.A.C. Weber ex K. Schum., *Echinopsis pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Anceschi & Magli, *Eriocereus polyacanthus* F. Ritter, *Eriocereus pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) A. Berger, *Eriocereus tarijensis* F. Ritter, *Harrisia pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. *tarijensis* (F. Ritter) Braun & E. Pereira Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **regelii** (Weing.) R. Kiesling

Sin.: *Cereus regelii* Weing., *Eriocereus regelii* (Weing.) Backeb., *Harrisia regelii* (Weing.) Borg Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(ERI, SFE). URY(ART, RNO).

Harrisia tortuosa (Forbes ex Otto & D. Dietr.) Britton & Rose

Sin.: *Cereus arendtii* Hildmann & Mathsson ex K. Schum., *Cereus tortuosus* Forbes ex Otto & D. Dietr., *Eriocereus tortuosus* (Forbes ex Otto & D. Dietr.) Riccob.

Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, COA). URY(ART, MON, RNO).

Hattiora Britton & Rose**Hattiora salicornioides** (Haw.) Britton & Rose

Sin.: *Rhipsalis salicornioides* Haw.

Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Islaya Backeb.**Islaya caligophila** (R. Pinto) Faúndez & R. Kiesling

Sin.: *Eriosyce caligophila* R. Pinto

Hierba suculenta. Endémica. 600-700 m.

Países: CHL(TAR).

Islaya iquiquensis (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Sin.: *Eriosyce iquiquensis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce recondita* (F. Ritter) Katt. subsp. *iquiquensis* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia iquiquensis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *saxifraga* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria iquiquensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *residua* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria residua* (F. Ritter & Buining) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus aricensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus floribundus* (Backeb.) F. Ritter, nom. inval., *Pyrrhocactus iquiquensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus residuus* F. Ritter & Buining, *Pyrrhocactus saxifragus* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 600-1000 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Islaya islayensis (C.F. Först.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus islayensis* C.F. Först.,
Eriosyce islayensis (C.F. Först.) Katt.,
Islaya krainziana F. Ritter, *Neoporteria*
krainziana (F. Ritter) Donald & G.D.
Rowley
Hierba suculenta. Nativa.
Países: CHL(TAR).

Islaya laui (Luthy) Faúndez & R. Kiesling

Sin.: *Eriosyce laui* Luthy, *Rimacactus laui*
(Luthy) Mottram
Hierba suculenta. Endémica. 500-700
m.
Países: CHL(ANT).

Lepismium Pfeiff.

Lepismium lineare (K. Schum.) Barthlott

Sin.: *Rhipsalis linearis* K. Schum.
Hierba epífita. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAU).

Lepismium warmingianum (K. Schum.)

Barthlott
Sin.: *Nothorhipsalis warmingiana* (K.
Schum.) Doweld, *Rhipsalis*
warmingiana K. Schum.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leucostele Backeb.

Leucostele faundezii (Albesiano)

Schlumpb.
Sin.: *Trichocereus faundezii* S. Albesiano
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: CHL(COQ).

Leucostele litoralis (Johow) P.C.

Guerrero & H.E. Walter

Sin.: *Cereus litoralis* Johow, *Echinopsis*
chiloensis (Colla) Friedrich & G.D.
Rowley subsp. *litoralis* (Johow) Lowry,
Echinopsis litoralis (Johow) Friedrich &
G.D. Rowley, *Trichocereus chiloensis*
(Colla) Britton & Rose subsp. *litoralis*
(Johow) Faúndez, *Trichocereus*
litoralis (Johow) Looser
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO).

Leucostele nigripilis (Phil.) P.C.

Guerrero & H.E. Walter
Sin.: *Cereus nigripilis* Phil., *Echinopsis*
nigripilis (Phil.) Friedrich & G.D.
Rowley, *Trichocereus coquimbano*
(Molina) Britton & Rose var. *nigripilis*
(Phil.) Borg, *Trichocereus nigripilis*
(Phil.) Baker
Arbusto suculento. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Leucostele pectinifera (Albesiano)

Schlumpb.
Sin.: *Trichocereus pectiniferus* S.
Albesiano
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ).

Leucostele skottsbergii (Backeb. ex

Skottsb.) P.C. Guerrero & H.E. Walter
Sin.: *Echinopsis skottsbergii* (Backeb. ex
Skottsb.) Friedrich & G.D. Rowley,
Trichocereus skottsbergii Backeb. ex
Skottsb.
Arbusto suculento. Endémica. 100-200
m.
Países: CHL(COQ).

Leucostele undulosa (Albesiano)

Schlumpb.
Sin.: *Trichocereus undulosus* S. Albesiano
Arbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(COQ).

Lobivia Britton & Rose

Lobivia bonnieae Halda, Hogan &
Janeba

Sin.: *Echinopsis bonnieae* (Halda, Hogan
& Janeba) Halda & Malina, Hogan &
Janeba) Schlumpb., *Reicheocactus*
bonnieae (Halda
Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT).

Lobivia bruchii Britton & Rose

Sin.: *Echinopsis bruchii* (Britton & Rose)
A. Cast. & Lelong, *Echinopsis formosa*
(Pfeiff.) Jacobi ex Salm-Dyck subsp.
bruchii (Britton & Rose) M. Lowry,
Echinopsis grandis (Britton & Rose)
Friedrich & G.D. Rowley, *Eriosyce*
bruchii (Britton & Rose) Backeb.,
Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds var.
bruchii (Britton & Rose) Rausch,
Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds var.
grandis (Britton & Rose) Rausch,
Lobivia grandis Britton & Rose,
Pseudobivia grandis (Britton & Rose)
Krainz, *Soehrensia bruchii* (Britton &
Rose) Backeb., *Soehrensia grandis*
(Britton & Rose) Backeb.,
Trichocereus bruchii (Britton & Rose)
F. Ritter, *Trichocereus bruchii* (Britton
& Rose) F. Ritter var. *brevispinus* F.
Ritter, *Trichocereus formosus* (Pfeiff.)
F. Ritter subsp. *bruchii* (Britton &
Rose) Guiggi, *Trichocereus grandis*
(Britton & Rose) F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica.
2000-3500 m.
Países: ARG(TUC).

Lobivia chrysantha (Werderm.) Backeb.
var. **chrysantha**

Sin.: *Echinopsis chrysantha* Werderm.,
Echinopsis hossei Werderm.,
Hymenorebutia chrysantha
(Werderm.) F. Ritter, *Lobivia*
chrysantha (Werderm.) Backeb. var.

hossei (Werderm.) Backeb., *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. var. *janseniana* (Backeb.) Backeb., *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. var. *leucacantha* (Backeb.) Backeb., *Lobivia dragai* Fric, *Lobivia hanseniana* Backeb., *Lobivia hossei* (Werderm.) Backeb., *Lobivia janseniana* Backeb., *Lobivia klusacekii* Fric, *Lobivia polaskiana* Backeb., *Lobivia schultii* Fric, *Lobivia staffenii* Fric
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Lobivia chrysantha (Werderm.) Backeb.
var. **hypocyrtia** Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Lobivia chrysochete (Werderm.)
Wessner var. **chrysochete**
Sin.: *Echinopsis chrysochete* Werderm.,
Lobivia chrysochete (Werderm.)
Wessner var. *markusii* (Rausch)
Rausch, *Lobivia chrysochete*
(Werderm.) Wessner var. *subtilis*
Rausch, *Lobivia hystrix* F. Ritter,
Lobivia markusii Rausch
Hierba suculenta. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Lobivia chrysochete (Werderm.)
Wessner var. **minutiflora** Rausch
Sin.: *Lobivia minutiflora* (Rausch)
Schlumpb. & M. Lowry
Hierba suculenta. Endémica. 3500-4000 m.
Países: ARG(SAL).

Lobivia crassicaulis Backeb. ex R.
Kiesling
Sin.: *Echinopsis crassicaulis* (Backeb. ex
R. Kiesling) Friedrich & Glaetzle,

Helianthocereus crassicaulis Backeb.,
nom. inval., *Soehrensia crassicaulis*
(R. Kiesling) Schlumpb.
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT).

Lobivia densispina (Werderm.)
Werderm. ex Backeb. & F.M. Knuth
Sin.: *Echinopsis densispina* Werderm.,
Echinopsis densispina Werderm. var.
pectinifera (Wessner) J.G. Lamb.,
Echinopsis rebutioides (Backeb.)
Friedrich, *Hymenorebutia albolanata*
Buining, *Hymenorebutia chlorogona*
(Wessner) F. Ritter, *Hymenorebutia densispina*
(Werderm.) Buining,
Hymenorebutia pectinifera (Wessner)
Donald, *Hymenorebutia rebutioides*
Fric & Kreuz., *Lobivia albolanata*
(Buining) Krainz, *Lobivia chlorogona*
Wessner, *Lobivia densispina*
(Werderm.) Buining, *Lobivia densispina*
(Werderm.) Buining var.
blossfeldii Wessner, *Lobivia densispina*
(Werderm.) Buining var.
sanguinea Wessner, *Lobivia haematantha*
(Speg.) Britton & Rose
subsp. *densispina* (Werderm.) G.D.
Rowley, *Lobivia haematantha* (Speg.)
Britton & Rose var. *densispina*
(Werderm.) Rausch, *Lobivia haematantha*
(Speg.) Britton & Rose
var. *rebutioides* (Backeb.) Rausch,
Lobivia napina Pazout, *Lobivia rebutioides*
Backeb., *Lobivia rebutioides* Backeb.
var. *citriniflora* Backeb., *Lobivia rebutioides*
Backeb. var. *kraussiana* Backeb., *Lobivia scoparia*
Werderm., *Lobivia sublimiflora* Backeb.,
Lobivia wessneriana Fritzen, *Salpingolobivia densispina*
(Werderm.) Y. Ito
Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUU).

Lobivia famatimensis (Speg.) Britton &
Rose var. **famatimensis**
Sin.: *Echinocactus famatimensis* Speg.,
Echinopsis famatimensis (Speg.)
Werderm., *Lobivia famatimensis*
(Speg.) Britton & Rose var. *jachalensis*
Rausch, *Rebutia famatimensis* (Speg.)
Speg.
Hierba suculenta. Endémica. 2300-3300 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Lobivia famatimensis (Speg.) Britton &
Rose var. **sanjuanensis** Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(SJU).

Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds var.
formosa
Sin.: *Acanthocalycium formosum* (Pfeiff.)
Backeb., *Acanthocalycium oreopepon*
(Speg.) Backeb., *Echinocactus formosus*
Pfeiff., *Echinopsis formosa* (Pfeiff.)
Jacobi ex Salm-Dyck,
Echinopsis ingens (Backeb.) Friedrich
& G.D. Rowley, *Echinopsis oreopepon*
(Speg.) Werderm., *Echinopsis uebelmanniana*
(Lembcke & Backeb.)
A.E. Hoffm., nom. inval., *Lobivia formosa*
(Pfeiff.) Dodds var.
uebelmanniana (Lembcke & Backeb.)
Rausch, *Lobivia oreopepon* Speg.,
Soehrensia formosa (Pfeiff.) Backeb.,
Soehrensia formosa (Pfeiff.) Backeb.
var. *maxima* Backeb., *Soehrensia formosa*
(Pfeiff.) Backeb. var.
polycephala Backeb., *Soehrensia ingens*
Backeb., *Soehrensia oreopepon* (Speg.)
Backeb., *Soehrensia uebelmanniana* Lembcke
& Backeb., nom. inval., *Trichocereus formosus*
(Pfeiff.) F. Ritter,
Trichocereus ingens (Backeb.) F.

- Ritter, *Trichocereus uebelmannianus* (Lembcke & Backeb.) F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU). CHL(ANT).
- Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **rosarioana** (Rausch) Rausch
Sin.: *Lobivia rosarioana* Rausch
Subarbusto suculento. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(LRI).
- Lobivia gonjianii** (R. Kiesling) R. Kiesling
Sin.: *Lobivia einsteinii* (Fric ex Kreuz. & Buining) Rausch var. *gonjianii* (R. Kiesling) Donald, *Rebutia einsteinii* Fric ex Kreuz. & Buining var. *gonjianii* (R. Kiesling) Donald, *Rebutia gonjianii* R. Kiesling
Hierba suculenta. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUU).
- Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **amblayensis** (Rausch) Rausch ex G.D. Rowley
Sin.: *Echinopsis amblayensis* (Rausch) Friedrich, *Lobivia amblayensis* Rausch, *Lobivia amblayensis* Rausch var. *albispina* Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(SAL).
- Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **fechseri** (Rausch) Rausch ex G.D. Rowley
Sin.: *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *hualfinensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis hualfinensis* (Rausch) Friedrich & Glaetzle, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *hualfinensis* (Rausch) Rausch, *Lobivia hualfinensis* Rausch, *Lobivia hualfinensis* Rausch var. *fechseri* Rausch
Hierba suculenta. Endémica.
Países: ARG(SAL).
- Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**
Sin.: *Echinocactus haematanthus* Speg., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt, *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *elongata* (Backeb.) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *jasimanensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Lobivia elongata* Backeb., *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *elongata* (Backeb.) Rausch, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *jasimanensis* Rausch, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *viridis* Rausch
Hierba suculenta. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
- Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch
Sin.: *Echinopsis cachensis* Speg., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *chorrillosensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *kuehnrichii* (Fric) J.G. Lamb., *Echinopsis kuehnrichii* (Fric) Friedrich & Glaetzle, *Hymenorebutia drijveriana* (Backeb.) F. Ritter, *Hymenorebutia kuehnrichii* (Fric) F. Ritter, *Lobivia cachensis* (Speg.) Britton & Rose, *Lobivia chorrillosensis* Rausch, *Lobivia drijveriana* Backeb., *Lobivia drijveriana* Backeb. var. *astranthema* Backeb., *Lobivia drijveriana* Backeb. var. *aurantiaca* Backeb., *Lobivia drijveriana* Backeb. var. *nobilis* Backeb., *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose subsp. *kuehnrichii* (Fric) G.D. Rowley, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *chorrillosensis* (Rausch)
- Rausch, *Lobivia kuehnrichii* Fric, *Lobivia nigripina* Backeb., *Lobivia nigripina* Backeb. var. *rubriflora* Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(SAL).
- Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**
Sin.: *Lobivia buiningiana* F. Ritter, *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. subsp. *jajoiana* (Backeb.) G.D. Rowley, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *aurata* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *caspalensis* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *elegans* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *fleischeriana* Backeb., *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *nidularis* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *nigrostoma* (Kreuz. & Buining) Backeb., *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *pungens* Rausch, *Lobivia nigrostoma* Kreuz. & Buining, *Lobivia vatteri* Krainz, *Lobivia vatteri* Krainz var. *robusta* Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUU).
- Lobivia jajoiana** Backeb. var. **paucicostata** (Rausch) Rausch
Sin.: *Lobivia glauca* Rausch, *Lobivia glauca* Rausch var. *paucicostata* Rausch, *Lobivia miniatinigra* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUU).
- Lobivia kieslingii** Rausch
Sin.: *Echinopsis formosa* (Pfeiff.) Jacobi ex Salm-Dyck subsp. *kieslingii* (Rausch) M. Lowry, *Echinopsis kieslingii* (Rausch) Anceschi & Magli, *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *kieslingii* (Rausch) Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(TUC).

Lobivia korethroides (Werderm.)
Werderm.

Sin.: *Echinopsis formosa* (Pfeiff.) Jacobi ex Salm-Dyck subsp. *korethroides* (Backeb.) M. Lowry, *Echinopsis korethroides* Werderm., *Eriosyce korethroides* (Werderm.) Backeb., *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *nivalis* (Fric) Rausch, *Soehrensia korethroides* (Werderm.) Backeb., *Trichocereus korethroides* (Werderm.) F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica. 3000-4000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Lobivia marsoneri (Werderm.) Backeb.
var. **iridescens** (Backeb.) Rausch

Sin.: *Lobivia iridescens* Backeb., *Lobivia muhrii* Backeb., *Lobivia muhrii* Backeb. var. *flaviflora* Backeb., *Lobivia uitewaaleana* Buining

Hierba suculenta. Endémica. 3000-4500 m.

Países: ARG(JUU).

Lobivia marsoneri (Werderm.) Backeb.
var. **marsoneri**

Sin.: *Echinopsis marsoneri* Werderm., *Echinopsis rubescens* Backeb., *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. subsp. *marsoneri* (Werderm.) G.D. Rowley, *Lobivia haageana* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *albihepatica* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *bicolor* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *chrysantha* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *croceantha* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *durispina* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *grandiflora-*

stellata Backeb., *Lobivia rubescens* (Backeb.) Backeb., *Lobivia rubescens* (Backeb.) Backeb. var. *tenuispina* Backeb., *Rebutia krainziana* Kesselr., *Rebutia krainziana* Kesselr. var. *brevisetata* (Backeb.) Donald, *Rebutia marsoneri* Werderm., *Rebutia minuscula* K. Schum. var. *marsoneri* (Werderm.) E. Scholz, *Rebutia permutata* Backeb., *Rebutia wessneriana* Bewer. var. *berylloides* (Buining & Donald) Buining & Donald

Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUU).

Lobivia nigricans Wessner

Sin.: *Digitorebutia nigricans* (Wessner) Buining, *Lobivia nigricans* Wessner var. *albispina* Rausch, *Lobivia nigricans* Wessner var. *carmeniana* (Rausch) Rausch, *Lobivia nigricans* Wessner var. *petersenii* (Fric) Rausch, *Mediolobivia nigricans* (Wessner) Krainz, *Rebutia nigricans* (Wessner) D.R. Hunt

Hierba suculenta. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(SAL).

Lobivia pugionacantha (Rose & Boed.)
Backeb.

Sin.: *Echinopsis pugionacantha* Rose & Boed., *Lobivia pugionacantha* (Rose & Boed.) Backeb. var. *corrugata* Rausch, *Lobivia pugionacantha* (Rose & Boed.) Backeb. var. *flaviflora* Backeb.

Hierba suculenta. Nativa. 3500-4000 m.

Países: ARG(JUU).

Lobivia pygmaea (R.E. Fr.) Backeb.

Sin.: *Acantholobivia haagei* (Fric & Schelle) Y. Ito, *Digitorebutia haagei* (Fric & Scheele) Fric ex Buining, *Digitorebutia nazarenoensis* Rausch, *Echinopsis pygmaea* R.E. Fr., *Lobivia*

digitiformis Backeb., *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *elegantula* Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *mudanensis* (Rausch) Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *nazarenoensis* Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *pelziana* Rausch, *Lobivia neohaageana* Backeb., *Lobivia neohaageana* Backeb. var. *flavovirens* Backeb., *Lobivia pygmaea* (R.E. Fr.) Backeb. var. *tafnaensis* Rausch, *Mediolobivia haagei* (Fric & Schelle) Backeb., *Mediolobivia haagei* (Fric & Schelle) Backeb. var. *flavovirens* (Backeb.) Backeb., *Mediolobivia pectinata* (Backeb.) Backeb. ex Krainz var. *atrovirens* (Backeb.) Backeb., *Mediolobivia pectinata* (Backeb.) Backeb. ex Krainz var. *digitiformis* (Backeb.) Backeb., *Mediolobivia pygmaea* (Fric) Backeb., *Mediolobivia pygmaea* (R.E. Fr.) Backeb. var. *flavovirens* (Backeb.) Backeb., *Rebutia haagei* Fric & Schelle, *Rebutia nazarenoensis* (Rausch) B. Fearn & Percy, *Rebutia pygmaea* (R.E. Fr.) Britton & Rose

Hierba suculenta. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUU).

Lobivia saltensis (Speg.) Britton & Rose

Sin.: *Chamaecereus saltensis* (Speg.) Schlumpb., *Echinopsis nealeana* (Backeb.) Friedrich, *Echinopsis pseudocachensis* (Backeb.) Friedrich, *Echinopsis saltensis* Speg., *Echinopsis saltensis* Speg. var. *nealeana* (Backeb.) J.G. Lamb., *Echinopsis saltensis* Speg. var. *pseudocachensis* (Backeb.) J.G. Lamb., *Lobivia emmae* Backeb., *Lobivia emmae* Backeb. var. *brevispina* Backeb., *Lobivia nealeana*

Backeb., *Lobivia pseudocachensis*
 Backeb., *Lobivia pseudocachensis*
 Backeb. var. *cinnabarina* Backeb.,
Lobivia pseudocachensis Backeb. var.
sanguinea Backeb., *Lobivia saltensis*
 (Speg.) Britton & Rose var.
multicostata (Backeb.) Rausch,
Lobivia saltensis (Speg.) Britton &
 Rose var. *nealeana* (Backeb.) Rausch,
Lobivia saltensis (Speg.) Britton &
 Rose var. *pseudocachensis* (Backeb.)
 Rausch, *Lobivia saltensis* (Speg.)
 Britton & Rose var. *zapallarensis*
 Rausch
 Hierba suculenta. Endémica. 2000-
 3000 m.
 Países: ARG(SAL).

Lobivia sanguiniflora Backeb.

Sin.: *Echinopsis breviflora* (Backeb.) M.
 Lowry, *Echinopsis sanguiniflora*
 (Backeb.) D.R. Hunt, *Lobivia breviflora*
 Backeb., *Lobivia duursmaiana*
 Backeb., *Lobivia polycephala* Backeb.,
Lobivia sanguiniflora Backeb. var.
breviflora (Backeb.) Rausch, *Lobivia*
sanguiniflora Backeb. var.
duursmaiana (Backeb.) Rausch,
Lobivia sanguiniflora Backeb. var.
pseudolateritia Backeb.
 Hierba suculenta. Endémica. 2500-
 3000 m.
 Países: ARG(JUU, SAL).

Lobivia schreiteri A. Cast. var.
riolarensis Rausch
 Hierba suculenta. Endémica. 3000-
 3500 m.
 Países: ARG(CAT).

Lobivia schreiteri A. Cast. var. **schreiteri**
 Sin.: *Chamaecereus schreiteri* (A. Cast.)
 Schlumpb., *Chamaecereus stilowianus*
 (Backeb.) Schlumpb., *Echinopsis*
saltensis Speg. subsp. *schreiteri* (A.
 Cast.) M. Lowry, *Echinopsis schreiteri*

(A. Cast.) Werderm. ex Backeb.,
Echinopsis stilowiana (Backeb.) J.G.
 Lamb., *Lobivia saltensis* (Speg.)
 Britton & Rose var. *schreiteri* (A. Cast.)
 Rausch, *Lobivia schreiteri* A. Cast. var.
stilowiana (Backeb.) Rausch, *Lobivia*
stilowiana Backeb.
 Hierba suculenta. Endémica. 2500-
 3500 m.
 Países: ARG(TUC).

Lobivia silvestrii (Speg.) G.D. Rowley

Sin.: *Cereus silvestrii* Speg.,
Chamaecereus silvestrii (Speg.)
 Britton & Rose, *Echinopsis*
chamaecereus Friedrich & Glaetzle
 Hierba suculenta. Endémica. 2500-
 3500 m.
 Países: ARG(LRI, SAL, TUC).

Lobivia walteri R. Kiesling

Sin.: *Echinopsis walteri* (R. Kiesling)
 Friedrich & Glaetzle, *Lobivia huascha*
 (F.A.C. Weber) W.T. Marshall var.
walteri (R. Kiesling) Rausch,
Soehrensia walteri (R. Kiesling)
 Schlumpb., *Trichocereus walteri* (R.
 Kiesling) J.G. Lamb.
 Subarbusto suculento. Endémica.
 2000-2500 m.
 Países: ARG(SAL).

Maihuenia (F.A.C. Weber) K. Schum.

Maihuenia patagonica (Phil.) Britton &
 Rose

Sin.: *Maihuenia albolanata* F. Ritter,
Maihuenia andicola Comber,
Maihuenia brachydelphys K. Schum.,
Maihuenia cumulata F. Ritter,
Maihuenia latispina F. Ritter,
Maihuenia tehuelches Speg.,
Maihuenia valentinii Speg., *Opuntia*
patagonica Phil.

Subarbusto suculento. Endémica. 0-
 500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
 SCR). CHL(LLA, AIS, MAG).

Maihuenia poeppigii (Otto ex Pfeiff.) K.
 Schum.

Sin.: *Maihuenia philippii* (F.A.C. Weber) K.
 Schum., *Opuntia maihuen* Gay,
Opuntia poeppigii Otto & Pfeiff.,
Pereskia philippii F.A.C. Weber,
Pereskia poeppigii (Otto & Pfeiff.)
 Salm-Dyck
 Subarbusto suculento. Endémica. 500-
 1000 m.
 Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO,
 ARA).

Maihueniopsis Speg.

Maihueniopsis archiconoidea F. Ritter

Sin.: *Opuntia archiconoidea* (F. Ritter)
 D.R. Hunt
 Subarbusto suculento. Endémica.
 1200-1800 m.
 Países: CHL(ATA).

Maihueniopsis atacamensis (Phil.) F.
 Ritter

Sin.: *Opuntia atacamensis* Phil.,
Tephrocactus atacamensis (Phil.) F.
 Ritter
 Subarbusto suculento. Endémica. 4100
 m.
 Países: CHL(ANT).

Maihueniopsis boliviana (Salm-Dyck) R.
 Kiesling subsp. **echinacea** (F. Ritter)
 Faúndez & R. Kiesling

Sin.: *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck)
 F. Ritter subsp. *echinacea* (F. Ritter)
 D.R. Hunt, *Cumulopuntia echinacea*
 (F. Ritter) F. Ritter, *Opuntia echinacea*
 (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Tephrocactus*
echinaceus F. Ritter

- Hierba suculenta. Nativa. 2600-4000 m.
Países: CHL(TAR).
- Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **ignescens** (Vaupe) Faúndez & R. Kiesling
Sin.: *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *ignescens* (Vaupe) D.R. Hunt, *Cumulopuntia hystrix* F. Ritter, *Cumulopuntia ignescens* (Vaupe) F. Ritter, *Cumulopuntia ticnarensis* F. Ritter, *Cumulopuntia tortispina* F. Ritter, *Opuntia ignescens* Vaupe, *Tephrocactus ignescens* (Vaupe) Backeb.
Hierba suculenta. Nativa. 3300-4500 m.
Países: CHL(TAR, ANT).
- Maihueniopsis camacho** (Espinosa) F. Ritter
Sin.: *Opuntia camacho* Espinosa, *Tephrocactus camacho* (Espinosa) Backeb., *Tephrocactus chilensis* Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica. 3900 m.
Países: CHL(ANT).
- Maihueniopsis colore** (F. Ritter) F. Ritter
Sin.: *Opuntia colore* (F. Ritter) D.R. Hunt, *Tephrocactus coloreus* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 1300-3500 m.
Países: CHL(ATA).
- Maihueniopsis crassispina** F. Ritter
Sin.: *Opuntia crassispina* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémica. 200 m.
Países: CHL(ATA).
- Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **darwinii**
Sin.: *Opuntia darwinii* Hensl., *Tephrocactus darwinii* (Hensl.) Backeb. ex Fric
Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR). CHL(AIS).
- Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling
Sin.: *Maihueniopsis albomarginata* F. Ritter, *Maihueniopsis hickenii* (Britton & Rose) D.R. Hunt, *Maihueniopsis neuquensis* (Borg) F. Ritter, *Maihueniopsis platyacantha* (Pfeiff.) D.R. Hunt, *Opuntia hickenii* Britton & Rose, *Opuntia neuquensis* Borg, *Opuntia platyacantha* Pfeiff., *Tephrocactus hickenii* (Britton & Rose) Speg., *Tephrocactus neuquensis* (Borg) Backeb., *Tephrocactus platyacanthus* (Pfeiff.) Lem., *Tephrocactus platyacanthus* (Pfeiff.) Lem. var. *neoplatyacanthus* Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).
- Maihueniopsis domeykoensis** F. Ritter
Sin.: *Opuntia domeykoensis* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA).
- Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling
Sin.: *Maihueniopsis conoidea* (F. Ritter) F. Ritter, *Maihueniopsis hypogaea* (Werderm.) F. Ritter, *Maihueniopsis leoncito* (Werderm.) F. Ritter, *Maihueniopsis leptoclada* F. Ritter, *Maihueniopsis molfinoi* Speg., *Maihueniopsis tarapacana* (Phil.) F. Ritter, *Opuntia conoidea* (F. Ritter ex Backeb.) G.D. Rowley, *Opuntia glomerata* Haw., *Opuntia hypogaea* Werderm., *Opuntia leoncito* Werderm., *Opuntia molfinoi* (Speg.) Werderm., *Opuntia ovallei* Gay, *Opuntia tarapacana* Phil., *Tephrocactus conoideus* F. Ritter, *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *andicola* (Pfeiff.) Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *atratispinus* Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *fulvispinus* (Lem.) Backeb., *Tephrocactus leoncito* (Werderm.) Backeb., *Tephrocactus reicheanus* (Espinosa) Backeb., *Tephrocactus tarapacanus* (Phil.) Backeb.
Subarbusto suculento. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).
- Maihueniopsis grandiflora** F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 1700 m.
Países: CHL(COQ).
- Maihueniopsis minuta** (Backeb.) R. Kiesling
Sin.: *Maihueniopsis mandragora* (Backeb.) F. Ritter, comb. illeg., *Opuntia mandragora* (Backeb.) G.D. Rowley, comb. illeg., *Opuntia minuta* (Backeb.) A. Cast., *Tephrocactus mandragora* Backeb., *Tephrocactus minutus* Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Maihueniopsis nigrispina** (K. Schum.) R. Kiesling

Sin.: *Opuntia nigrispina* K. Schum.,
Opuntia purpurea R.E. Fr.,
Platyopuntia nigrispina (K. Schum.) F.
Ritter, comb. illeg., *Tephrocactus*
nigrispinus (K. Schum.) Backeb.
Subarbusto suculento. Nativa. 2500-
3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(TAR).

Maihueiopsis ovata (Pfeiff.) F. Ritter

Sin.: *Maihueiopsis ovata* (Pfeiff.) F. Ritter
f. *calva* F. Ritter, *Opuntia ovata* Pfeiff.,
Opuntia russellii Britton & Rose,
Tephrocactus ovatus (Pfeiff.) Backeb.,
Tephrocactus russellii (Britton & Rose)
Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica.
1000-2000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(VAL,
RME).

Maihueiopsis rahmeri (Phil.) F. Ritter

Sin.: *Opuntia rahmerii* Phil.
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(TAR).

Maihueiopsis wagenknechtii F. Ritter

Sin.: *Opuntia wagenknechtii* (F. Ritter)
D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémica. 2000
m.
Países: CHL(COQ).

Monvillea Britton & Rose

Monvillea cavendishii (Monv.) Britton &
Rose

Sin.: *Cereus cavendishii* Monv., *Cereus*
paxtonianus Monv., *Cereus*
rhodoleucanthus K. Schum., *Cereus*
saxicola Morong, *Praecereus saxicola*
(Morong) N.P. Taylor
Subarbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUU, MIS, SAL, SFE). PRY(APY, AMA,

CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI,
PHA, SPE).

Monvillea euchlora (F.A.C. Weber ex K.
Schum.) Backeb.

Sin.: *Cereus euchlorus* F.A.C. Weber ex
K. Schum., *Cereus lauterbachii* K.
Schum., *Monvillea alticostata* F. Ritter,
Praecereus euchlorus (F.A.C. Weber
ex K. Schum.) N.P. Taylor
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CEN, COA, ITA, PAI).

Monvillea krapovickiana R. Kiesling

Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(FOR).

Monvillea phatnosperma (K. Schum.)
Britton & Rose var. **arenasi** L.J.
Oakley & R. Kiesling

Sin.: *Cereus kroenleinii* (R. Kiesling) P.J.
Braun & Esteves, *Monvillea kroenleini*
R. Kiesling, nom. inval.
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, NAS, PHA).

Monvillea phatnosperma (K. Schum.)
Britton & Rose var. **phatnosperma**

Sin.: *Cereus kroenleinii* N.P. Taylor,
Cereus phatnospermus K. Schum.,
Cereus phatnospermus K. Schum.
subsp. *kroenleinii* (N.P. Taylor) P.J.
Braun & Esteves, *Monvillea*
phatnosperma (K. Schum.) Britton &
Rose subsp. *kroenleinii* (N.P. Taylor)
Lodé
Arbusto suculento. Nativa. 100-400 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, CON,
PHA).

Monvillea spegazzinii (F.A.C. Weber)
Britton & Rose

Sin.: *Cereus anisitsii* K. Schum., *Cereus*
marmoratus Zeiss., nom. nud., *Cereus*
spegazzinii F.A.C. Weber, *Cereus*

spegazzinii F.A.C. Weber var. *hassleri*
Weing.

Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SFE).
PRY(APY, CON, PHA).

Neoporteria Britton & Rose

Neoporteria castanea F. Ritter

Sin.: *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt.
var. *castanea* (F. Ritter) Katt.
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(LBO, MAU).

Neoporteria clavata (Söhrens ex K.
Schum.) Werderm.

Sin.: *Echinocactus clavatus* Söhrens ex K.
Schum., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.)
Katt. subsp. *clavata* (Söhrens ex K.
Schum.) Katt., *Eriosyce subgibbosa*
(Haw.) Katt. var. *nigrihorrida* (Backeb.)
Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.)
Katt. var. *vallenarensis* (F. Ritter) Katt.,
Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. var.
wagenknechtii (F. Ritter) Katt.,
Neoporteria clavata (Söhrens ex K.
Schum.) Werderm. var. *parviflora* F.
Ritter, *Neoporteria clavata* (Söhrens
ex K. Schum.) Werderm. var. *procera*
F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F.
Ritter, *Neoporteria microsperma* F.
Ritter var. *graciana* F. Ritter,
Neoporteria microsperma F. Ritter var.
serenana F. Ritter, *Neoporteria*
wagenknechtii F. Ritter, *Neoporteria*
wagenknechtii F. Ritter var.
microsperma (F. Ritter) A.E. Hoffm.,
Neoporteria wagenknechtii F. Ritter
var. *napina* F. Ritter, *Neoporteria*
wagenknechtii F. Ritter var.
vallenarensis (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ).

Neoporteria nidus (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Sin.: *Echinocactus nidus* Söhrens ex K. Schum., *Echinocactus senilis* Phil., nom. illeg., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *coimasensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *elquiensis* Katt., *Neoporteria coimasensis* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter var. *robusta* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria gerocephala* Y. Ito, *Neoporteria multicolor* F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose var. *coimasensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria nidus* (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose var. *gerocephala* (Y. Ito) F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose var. *matancillana* F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose var. *multicolor* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria robusta* F. Ritter, *Neoporteria senilis* Backeb., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *robusta* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(COQ).

Neoporteria sociabilis F. Ritter

Sin.: *Eriosyce sociabilis* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria sociabilis* F. Ritter var. *napina* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Neoporteria subgibbosa (Haw.) Britton & Rose

Sin.: *Cactus berteroi* Colla, *Cereus dichroacanthus* Mart. ex Pfeiff., *Echinocactus acutissimus* Otto & Dietr., *Echinocactus castaneoides* J.F.

Cels ex Salm-Dyck, *Echinocactus subgibbosus* Haw., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *litoralis* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria castanea* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Neoporteria litoralis* F. Ritter var. *intermedia* F. Ritter, *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *intermedia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *litoralis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *orientalis* F. Ritter

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Neoporteria villosa (Monv.) A. Berger

Sin.: *Cactus villosus* Monv., *Echinocactus villosus* (Monv.) Labour., *Eriosyce villosa* (Monv.) Katt., *Neoporteria atrispinosa* Backeb., *Neoporteria laniceps* F. Ritter, *Neoporteria villosa* (Monv.) A. Berger var. *laniceps* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Hierba suculenta. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Neowerdermannia Fric

Neowerdermannia chilensis Backeb.

Sin.: *Weingartia chilensis* (Backeb.) Backeb.

Hierba suculenta. Nativa. 3000-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Neowerdermannia vorwerkii Fric

Sin.: *Weingartia vorwerkii* (Fric) Backeb.

Hierba suculenta. Nativa. 3500-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck

Sin.: *Cactus cochenillifer* L.

Arbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON, PHA).

Opuntia Mill.

Opuntia anacantha Speg. var. **anacantha**

Sin.: *Opuntia anacantha* Speg. var. *kiskaloro* (Speg.) R. Kiesling, *Opuntia bispinosa* Backeb., nom. inval., *Opuntia canina* Speg., *Opuntia kiskaloro* Speg., *Platyopuntia kiskaloro* (Speg.) F. Ritter, comb. illeg.

Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE). PRY(PHA).

Opuntia anacantha Speg. var. **retrorsa** (Speg.) R. Kiesling

Sin.: *Opuntia fuscolineata* Starmühler & Muncher, *Opuntia retrorsa* Speg., *Platyopuntia retrorsa* (Speg.) F. Ritter, comb. illeg.

Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, ÑEE, PAI, PHA). URY(PAY, RNO).

Opuntia anacantha Speg. var. **utkilio** (Speg.) R. Kiesling

Sin.: *Opuntia utkilio* Speg.

Subarbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, SAL). PRY(APY).

Opuntia arechavaletae Speg.

Sin.: *Opuntia monacantha* Haw. subsp. *arechavaletae* (Speg.) Guiggi, *Opuntia*

viridirubra (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, ROC).

Opuntia aurantiaca Lindl.

Sin.: *Opuntia maldonadensis* Arechav., *Opuntia montevideensis* Speg.
Subarbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). URY(MON).

Opuntia bonaerensis Speg.

Subarbusto. Endémica. 200 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS).
Notas: Según Hunt (2014) posiblemente se encuentre en Uruguay

Opuntia canterae Arechav.

Subarbusto. Endémica.
Países: URY(CAS, MON, RNO, SJO).

Opuntia colubrina A. Cast.

Sin.: *Austrocylindropuntia colubrina* (A. Cast.) Backeb.
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY).

Opuntia discolor Britton & Rose

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SDE). PRY(APY).

Opuntia elata Salm-Dyck var. **cardiosperma** (K. Schum.) R. Kiesling

Sin.: *Opuntia cardiosperma* K. Schum., *Opuntia chakensis* Speg., *Opuntia limitata* (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves, *Opuntia mieckleyi* K. Schum., *Platyopuntia limitata* F. Ritter, nom. illeg.
Endémica.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE, SDE). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

Opuntia elata Salm-Dyck var. **elata**

Sin.: *Opuntia delaetiana* (F.A.C. Weber) Vaupel, *Opuntia elata* Salm-Dyck var. *deletaetiana* F.A.C. Weber ex Rol.-Goss., *Opuntia pituitosa* (F. Ritter) J. Iliff, *Opuntia pyrrhantha* (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves, *Platyopuntia pituitosa* F. Ritter, nom. illeg., *Platyopuntia pyrrhantha* F. Ritter, nom. illeg.

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MEN, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, MAL, PAY, SAO).

Opuntia elata Salm-Dyck var. **obovata** E. Walther

Sin.: *Opuntia rioplatense* F. Font
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS). URY(MAL, MON, PAY, SJO).

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. f. **amyklaea** (Ten.) Schelle

Sin.: *Opuntia amyklaea* Ten., *Opuntia cordobensis* Speg., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. var. *amyklaea* (Ten.) A. Berger, *Opuntia megacantha* Salm-Dyck, *Opuntia streptacantha* Lem., *Platyopuntia cordobensis* (Speg.) F. Ritter, comb. illeg.
Subarbusto suculento. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SDE).

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. f. **ficus-indica**

Sin.: *Cactus ficus-indica* L., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. var. *decumana* (Willd.) Speg., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. var. *gymnocarpa* F.A.C. Weber, *Opuntia fusicaulis* Griff., *Opuntia paraguayensis* K. Schum., *Opuntia tuna-blanca* Speg.

Arbusto suculento. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

Opuntia fragilis (Nutt.) Haw.

Sin.: *Cactus fragilis* Nutt., *Opuntia ventanensis* A. Long
Subarbusto suculento. Introducida.
Países: ARG(BAI, COR).

Opuntia megapota mica Arechav. var. **chadihuensis** L.J. Oakley & Villamil

Arbusto suculento. Endémica.
Países: ARG(BAI).

Opuntia megapota mica Arechav. var. **megapota mica**

Sin.: *Opuntia atrovirens* Speg., *Opuntia brunneogemma* (F. Ritter) C. Schlindwein, *Opuntia monacantha* Haw. subsp. *brunneogemma* (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves, *Opuntia prasina* Speg., *Platyopuntia brunneogemma* F. Ritter, nom. illeg.
Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, ERI, RNE, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Opuntia megapota mica Arechav. var. **salagria** (A. Cast.) L.J. Oakley

Sin.: *Opuntia salagria* A. Cast.
Arbusto suculento. Endémica.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, SLU, SFE, SDE).

Opuntia monacantha Haw.

Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada para Uruguay (Osten, 1941) sin mencionar localidad o ejemplar de referencia

Opuntia penicilligera Speg.

Subarbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN, NEU, RNE).

Opuntia quimilo K. Schum.

Sin.: *Opuntia distans* Britton & Rose, *Platyopuntia quimilo* (K. Schum.) F. Ritter, comb. illeg.

Arbusto suculento. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, CON).

Opuntia robusta J.C. Wendl.

Arbusto. Introducida. 300-2100 m.

Países: ARG(SAL).

Opuntia salmiana J. Parm. ex Pfeiff.

Sin.: *Austrocylindropuntia albiflora* (K. Schum.) Backeb., *Austrocylindropuntia salmiana* (J. Parm. ex Pfeiff.) Backeb., *Austrocylindropuntia salmiana* (J. Parm. ex Pfeiff.) Backeb. var. *albiflora* (K. Schum.) Backeb., *Austrocylindropuntia salmiana* (J. Parm. ex Pfeiff.) Backeb. var. *spgazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Austrocylindropuntia spegazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Cylindropuntia spegazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Opuntia albiflora* K. Schum., *Opuntia mucheri* Starmühler, *Opuntia spegazzinii* F.A.C. Weber, *Opuntia wagneri* F.A.C. Weber ex

Rol.-Goss., *Platyopuntia salmiana* (J. Parm. ex Pfeiff.) F. Ritter, comb. illeg., *Salmiopuntia salmiana* (J. Parm. ex Pfeiff.) Fric ex Guiggi, *Salmonopuntia salmiana* (J. Parm. ex Pfeiff.) P.V. Heath

Subarbusto suculento. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU). PRY(APY).

Opuntia spinulifera Salm-Dyck

Arbusto suculento. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(ERI).

Opuntia stenarthra K. Schum.

Sin.: *Opuntia assumptionis* K. Schum., *Opuntia cognata* F. Ritter ex P.J. Braun & Esteves, *Opuntia subsphaerocarpa* Speg., *Platyopuntia cognata* F. Ritter, nom. illeg.

Arbusto suculento. Endémica.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. **pampeana** (Speg.) Backeb.

Sin.: *Opuntia brunnescens* Britton & Rose, *Opuntia maculacantha* C.F. Först., *Opuntia pampeana* Speg.

Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, SDE, SFE). URY(RNO).

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. **sulphurea**

Sin.: *Opuntia hildemannii* Fric, *Opuntia sulphurea* Gillies ex Salm-Dyck var. *hildemannii* (Fric) Backeb., *Platyopuntia sulphurea* (Gillies ex Salm-Dyck) F. Ritter

Subarbusto suculento. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, TUC).

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. **vulpina** (F.A.C. Weber) L.J. Oakley

Sin.: *Opuntia sulphurea* Gillies ex Salm-Dyck subsp. *vulpina* (F.A.C. Weber) Guiggi, *Opuntia vulpina* F.A.C. Weber

Subarbusto suculento. Endémica. 1800-1900 m.

Países: ARG(CAT).

Oreocereus (A. Berger) Riccob.

Oreocereus celsianus (Hort. Paris. ex Jacques & Hérincq) A. Berger ex Riccob.

Sin.: *Borzacactus celsianus* (Hort. Paris. ex Jacques & Hérincq) Kimnach, *Cereus celsianus* (Hort. Paris. ex Jacques & Hérincq) A. Berg., *Echinopsis celsiana* (Salm-Dyck) Anceschi & Magli, *Oreocereus bruennowii* Backeb., *Oreocereus maximus* Backeb., *Oreocereus neocelsianus* Backeb., *Pilocereus celsianus* Hort. Paris. ex Jacques & Hérincq

Arbusto suculento. Nativa. 3500-4000 m.

Países: ARG(JUJ).

Oreocereus hempelianus (Gürke) D.R. Hunt

Sin.: *Arequipa australis* F. Ritter, *Arequipa soehrensii* Kreuz. ex Backeb., nom. inval., *Arequipa weingartiana* Backeb., *Echinopsis hempelianus* Gürke, *Oreocereus australis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Arbusto suculento. Nativa. 2400-3700 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Oreocereus leucotrichus (Phil.)
Wagenkn. ex F. Ritter

Sin.: *Arequipa leucotricha* (Phil.) Britton & Rose, *Arequipa variicolor* (Backeb.) Backeb., *Borzicactus hendriksenianus* (Backeb.) Kimnach, *Borzicactus leucotrichus* (Phil.) Kimnach, *Echinocactus leucotrichus* Phil., *Oreocereus hendriksenianus* Backeb., *Oreocereus variicolor* Backeb.
Arbusto suculento. Nativa. 2400-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Oreocereus trollii (Kupper) Backeb.

Sin.: *Borzicactus celsianus* (Lem.) Riccob. var. *trollii* (Kupper) G.D. Rowley, *Borzicactus trollii* (Kupper) Kimnach, *Cereus trollii* Kupper, *Echinopsis trollii* (Kupper) Anceschi & Magli
Subarbusto suculento. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(JUJ).

Parodia Speg.

Parodia alacriportana Backeb. & Voll

Sin.: *Brasiliparodia alacriportana* (Backeb. & Voll) F. Ritter, *Brasiliparodia brevihamata* (W. Haage ex Backeb.) F. Ritter, *Brasiliparodia buenekerii* (Buining) F. Ritter, *Brasiliparodia catarinensis* F. Ritter, *Notocactus alacriportanus* (Backeb. & Voll) Buxb., *Notocactus brevihamatus* (W. Haage ex Backeb.) Buxb., *Notocactus buenekerii* (Buining) Krainz, *Parodia alacriportana* Backeb. & Voll subsp. *brevihamata* (W. Haage ex Backeb.) Hofacker & P.J. Braun, *Parodia alacriportana* Backeb. & Voll subsp. *buenekerii* (Buining) Hofacker & P.J. Braun, *Parodia alacriportana* Backeb. & Voll subsp. *catarinensis* (F. Ritter) Hofacker & P.J. Braun, *Parodia*

brevihamata W. Haage ex Backeb., *Parodia buenekerii* Buining, *Parodia catarinensis* (F. Ritter) F.H. Brandt
Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).

Parodia allosiphon (Marchesi) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus allosiphon* Marchesi
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV).

Parodia aureicentra Backeb.

Sin.: *Parodia aureicentra* Backeb. var. *muhrii* (F.H. Brandt) J.G. Lamb., *Parodia aureicentra* Backeb. var. *rauschii* (Backeb. ex D.R. Hunt) J.G. Lamb, *Parodia aureicentra* Backeb. var. *variicolor* (F. Ritter) J.G. Lamb., *Parodia muhrii* F.H. Brandt, *Parodia rauschii* Backeb. ex D.R. Hunt, *Parodia uhligiana* Backeb., *Parodia variicolor* F. Ritter, *Parodia variicolor* F. Ritter var. *robustispina* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Parodia buiningii (Buxb.) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus buiningii* Buxb., *Ritterocactus buiningii* (Buxb.) Doweld
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV, SAO).

Parodia carambeiensis (Buining & Brederoo) Hofacker

Sin.: *Notocactus carambeiensis* Buining & Brederoo, *Notocactus villa-velhensis* (Backeb. & Voll) Slaba
Hierba suculenta. Endémica. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Parodia chrysacanthion (K. Schum.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus chrysacanthion* K. Schum.

Hierba suculenta. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ).

Parodia claviceps (F. Ritter) F.H. Brandt

Sin.: *Eriocactus claviceps* F. Ritter, *Eriocactus schumannianus* (Nicolai) Backeb., nom. illeg. subsp. *claviceps* (F. Ritter) Doweld, *Erioccephala claviceps* (F. Ritter) Lodé subsp. *itaubensis* Gapon, Ponomareva & Protopopov, *Notocactus claviceps* (F. Ritter) Krainz

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Parodia concinna (Monv.) N.P. Taylor

Sin.: *Echinocactus apricus* Arechav., *Echinocactus concinnus* Monv., *Frailea caespitosa* (Speg.) Britton & Rose, *Notocactus apricus* (Arechav.) A. Berger, *Notocactus caespitosus* (Speg.) Backeb., *Notocactus concinnioides* Prauser, *Notocactus eremiticus* F. Ritter, *Notocactus gibberulus* Prestle, *Notocactus joadii* (Hook. f.) Herter, *Notocactus olimarensis* Prestle, *Notocactus rubrigemmatum* W.R. Abraham, *Parodia caespitosa* (Speg.) N.P. Taylor
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, TYT).

Parodia crassigibba (F. Ritter) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus arachnitis* F. Ritter, *Notocactus crassigibbus* F. Ritter, *Notocactus meonacanthus* Prestle, *Notocactus uebelmannianus* Buining, *Notocactus uebelmannianus* Buining var. *pleiocephalus* N. Gerloff & G. König, *Parodia meonacantha* (Prestlé)

- Hofacker, *Parodia wernerii* Hofacker, *Parodia wernerii* Hofacker subsp. *pleiocephala* (N. Gerloff & G. König) Hofacker
Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Parodia curvispina** (F. Ritter) D.R. Hunt
Sin.: *Notocactus arnostianus* Lisal & Kolarik, *Notocactus curvispinus* F. Ritter, *Parodia arnostiana* (Lisal & Kolarik) Hofacker
Subarbusto suculento. Nativa.
Países: BRA(RGS).
- Parodia fusca** (F. Ritter) Hofacker & P.J. Braun
Sin.: *Notocactus fuscus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Parodia gaucha** M. Machado & Larocca
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).
- Parodia graessneri** (K. Schum.) F.H. Brandt
Sin.: *Acanthocephala graessneri* (K. Schum.) Backeb., *Brasilicactus elachisanthus* (F.A.C. Weber) Backeb., *Brasilicactus graessneri* (K. Schum.) Backeb., *Dactylanthocactus graessneri* (K. Schum.) Y. Ito, *Echinocactus graessneri* K. Schum., *Malacocarpus graessneri* (K. Schum.) Britton & Rose, *Notocactus graessneri* (K. Schum.) A. Berger, *Parodia elachisantha* (F.A.C. Weber) F.H. Brandt, *Parodia haselbergii* (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt subsp. *graessneri* (K. Schum.) Hofacker & P.J. Braun
Hierba suculenta. Introducida. 0-1800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Parodia haselbergii** (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt
Sin.: *Brasilicactus haselbergii* (F. Haage) Backeb., *Echinocactus haselbergii* F. Haage ex Rümpler, *Malacocarpus haselbergii* (F. Haage) Britton & Rose, *Notocactus haselbergii* (F. Haage ex Rümpler) A. Berger, *Sericocactus haselbergii* (F. Haage ex Rümpler) Y. Ito
Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Parodia herteri** (Werderm.) N.P. Taylor
Sin.: *Echinocactus herteri* Werderm., *Notocactus herteri* (Werderm.) Buining & Kreuz., *Notocactus pseudoherteri* Buining, *Ritterocactus herteri* (Werderm.) Doweld
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).
- Parodia hofackeriana** A.S. Oliveira & R. Pontes
Sin.: *Notocactus hofackerianus* (A.S. Oliveira & R. Pontes) Deble
Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).
- Parodia horstii** (F. Ritter) N.P. Taylor
Sin.: *Notocactus horstii* F. Ritter, *Notocactus horstii* F. Ritter f. *muglianus* K. Herm & Pontes, *Notocactus horstii* F. Ritter f. *muglianus* K. Herm, nom. inval., *Notocactus purpureus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Parodia ibicuiensis** (Prestlé) Anceschi & Magli
Sin.: *Notocactus ibicuiensis* Prestlé
Subarbusto suculento. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Parodia langsdorfii** (Lem.) D.R. Hunt
Sin.: *Cactus langsdorfii* Lem.
Subarbusto suculento. Nativa.
Países: BRA(RGS).
- Parodia leninghausii** (K. Schum.) F.H. Brandt
Sin.: *Echinocactus leninghausii* K. Schum., *Notocactus leninghausii* (K. Schum.) Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Parodia linkii** (Lehm.) R. Kiesling
Sin.: *Cactus linkii* Lehm., *Echinocactus linkii* (Lehm.) Pfeiff., *Notocactus linkii* (Lehm.) Herter, *Notocactus linkii* (Lehm.) Herter f. *multiflorus* (Fric ex Buining) F. Ritter, *Notocactus megapotamicus* Osten ex Herter, *Notocactus ottonis* (Lehm.) A. Berger var. *megapotamicus* (Osten ex Herter) Buining
Hierba suculenta. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, PAI). URY(ART, CLA, RIV, SAO, TAC).
- Parodia maassii** (Heese) A. Berger
Sin.: *Bolivicactus maassii* (Heese) Doweld, *Echinocactus escayachensis* Vaupel, *Echinocactus maassii* Heese, *Parodia maassii* (Heese) A. Berger var. *carminatiflora* F. Ritter, *Parodia maassii* (Heese) A. Berger var. *shaferi* F. Ritter
Hierba suculenta. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ).
- Parodia magnifica** (F. Ritter) F.H. Brandt
Sin.: *Eriocactus magnificus* F. Ritter, *Erioccephala magnifica* (F. Ritter) Guiggi, *Notocactus magnificus* (F. Ritter) N.P. Taylor
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia mammulosa (Lem.) N.P. Taylor
Sin.: *Echinocactus floricomus* Arechav.,
Echinocactus mammulosus Lem.,
Notocactus floricomus (Arechav.)
Backeb., *Notocactus mammulosus*
(Lem.) A. Berger, *Notocactus mueller-*
moelleri Backeb. & F.M. Knuth,
Notocactus paulus Schlosser &
Brederoo, *Notocactus roseoluteus*
Vliet, *Ritterocactus mammulosus*
(Lem.) Doweld

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).
URY(ART, CLA, DUR, LAV, MAL,
MON, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).

Parodia microsperma (F.A.C. Weber)
Speg. subsp. **gaponiorum** Schelkun.
Hierba suculenta. Endémica. 2000-
2100 m.
Países: ARG(SAL).

Parodia microsperma (F.A.C. Weber)
Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R.
Kiesling & O. Ferrari
Sin.: *Parodia dextrohamata* Backeb., nom.
inval., *Parodia dichroacantha* F.H.
Brandt & Weskamp, nom. inval.,
Parodia fuscato-viridis Backeb.,
Parodia gutekunstiana Backeb.,
Parodia heteracantha F. Ritter &
Weskamp, *Parodia horrida* F.H.
Brandt, *Parodia hummeliana* A.B. Lau
& Weskamp, *Parodia kilianana*
Backeb., *Parodia kilianana* Backeb.
var. *rigida* F.H. Brandt, *Parodia*
lohaniana A.B. Lau & Weskamp,
Parodia piltziorum Weskamp, *Parodia*
pluricentralis F.H. Brandt, *Parodia*
rigida Backeb., *Parodia tolongbona*
Weskamp
Hierba suculenta. Endémica. 1500-
3000 m.
Países: ARG(SAL).

Parodia microsperma (F.A.C. Weber)
Speg. subsp. **microsperma**
Sin.: *Boliviacactus saint-pieanus* (Backeb.)
Doweld, *Echinocactus microspermus*
F.A.C. Weber, *Echinocactus*
microspermus F.A.C. Weber var.
erythranthus Speg., *Echinocactus*
microspermus F.A.C. Weber var.
thionanthus Speg., *Parodia*
aconquijaensis Weskamp, *Parodia*
albofuscata F.H. Brandt, *Parodia*
argerichiana Weskamp, *Parodia*
atroviridis Backeb., nom. illeg.,
Parodia aureispina Backeb., *Parodia*
aureispina Backeb. var. *australis* F.H.
Brandt, *Parodia aureispina* Backeb.
var. *elegans* Backeb., *Parodia*
aureispina Backeb. var.
erythrostaminea F.H. Brandt, *Parodia*
aureispina Backeb. var. *vulgaris* F.H.
Brandt, *Parodia belenensis* Weskamp,
Parodia betaniana F. Ritter, *Parodia*
campestris F.H. Brandt, *Parodia*
capillitaensis F.H. Brandt, *Parodia*
carapariana F.H. Brandt, *Parodia*
carminata Backeb., *Parodia*
catamarcensis Backeb., *Parodia*
catamarcensis Backeb. var. *riojensis*
(F. Ritter & Weskamp) J.G. Lamb.,
Parodia catamarcensis Backeb. var.
rubriflora Backeb., *Parodia*
cebilarensis Weskamp, *Parodia*
chlorocarpa F. Ritter, *Parodia*
dextrohamata Backeb. var.
stenopetala Backeb., *Parodia elegans*
Fechser ex Backeb., nom. inval.,
Parodia erythrantha (Speg.) Backeb.,
Parodia erythrantha (Speg.) Backeb.
var. *thionantha* (Speg.) Backeb.,
Parodia fechseri Backeb., *Parodia*
formosa F. Ritter, *Parodia*
glischrocarpa F. Ritter, *Parodia*
herzogii Rausch, *Parodia lembckeii*
Weskamp, *Parodia malyana* Rausch,
Parodia malyana Rausch var.
rubriflora F.H. Brandt, *Parodia*

mercedesiana Weskamp, *Parodia*
mesembrina F.H. Brandt, *Parodia*
mesembrina F.H. Brandt var.
juanensis Weskamp, *Parodia*
microsperma (F.A.C. Weber) Speg.
var. *aurantiaca* F.H. Brandt, *Parodia*
microsperma (F.A.C. Weber) Speg.
var. *cafayatensis* Backeb., *Parodia*
microsperma (F.A.C. Weber) Speg.
var. *erythrantha* (Speg.) Weskamp,
Parodia microsperma (F.A.C. Weber)
Speg. var. *opulenta* F.H. Brandt,
Parodia microsperma (F.A.C. Weber)
Speg. var. *rigidissima* F.H. Brandt,
Parodia microsperma (F.A.C. Weber)
Speg. var. *weberiana* (F.H. Brandt)
J.G. Lamb., *Parodia microthele*
Backeb., *Parodia minima* Rausch,
nom. illeg., *Parodia minuscula*
Rausch, *Parodia mutabilis* Backeb.,
Parodia mutabilis Backeb. var.
carneospina Backeb., *Parodia*
mutabilis Backeb. var. *sanguiniflora*
(Backeb.) F.H. Brandt, *Parodia nana*
Weskamp, *Parodia pachysa* F.H.
Brandt, *Parodia papagayana* F.H.
Brandt, *Parodia parvula* F.H. Brandt,
Parodia pluricentralis F.H. Brandt var.
erythroflora F.H. Brandt, *Parodia*
pluricentralis F.H. Brandt var.
xanthoflora F.H. Brandt, *Parodia*
pusilla F.H. Brandt, *Parodia riojensis*
F. Ritter & Weskamp, *Parodia*
rubelliamata Backeb., nom. inval.,
Parodia rubelliamata Backeb. var.
aureiflora Backeb., *Parodia rubriflora*
Backeb., nom. inval., *Parodia*
rubristaminea F. Ritter, *Parodia saint-*
pieana Backeb., *Parodia sanagasta*
Weing., *Parodia sanagasta* Weing.
var. *saltensis* F.H. Brandt, *Parodia*
sanagasta Weing. var. *viridior*
Backeb., *Parodia sanguiniflora*
Backeb., *Parodia sanguiniflora*
Backeb. var. *comata* F. Ritter, *Parodia*
scopaoides Backeb., *Parodia setifera*

- Backeb., *Parodia setifera* Backeb. var. *longihamata* Werderm., *Parodia setifera* Backeb. var. *nigricentra* Backeb., *Parodia spanisa* F.H. Brandt, *Parodia spegazziniana* F.H. Brandt, *Parodia spegazziniana* F.H. Brandt var. *aurea* F.H. Brandt, *Parodia superba* F.H. Brandt, *Parodia tafiensis* Backeb., *Parodia talaensis* F.H. Brandt, *Parodia thionantha* F.H. Brandt, *Parodia tuberculosi-costata* Backeb., *Parodia tuberculosi-costata* Backeb. var. *amblayana* F.H. Brandt, *Parodia tucumanensis* Weskamp, *Parodia uebelmanniana* F. Ritter, *Parodia wagneriana* Weskamp, *Parodia weberiana* F.H. Brandt, *Parodia weskampiana* Krasucka & Spanoswski, *Parodia winbergii* Weskamp
Hierba suculenta. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).
- Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor
Sin.: *Notocactus eugeniae* Vliet, *Notocactus gutierrezii* W.R. Abraham, *Notocactus mueller-melchersii* Backeb., *Notocactus roseiflorus* Schloss. & Brederoo, *Notocactus rutilans* Däniker & Krainz, *Notocactus veenianus* Vliet, *Notocactus winkleri* Vliet, *Parodia mammulosa* (Lem.) N.P. Taylor subsp. *eugeniae* (Vliet) Hofacker, *Parodia mueller-melchersii* (Backeb.) N.P. Taylor subsp. *gutierrezii* (W.R. Abraham) Hofacker, *Parodia mueller-melchersii* (Backeb.) N.P. Taylor subsp. *winkleri* (Vliet) Hofacker, *Parodia rutilans* (Däniker & Krainz) N.P. Taylor, *Parodia rutilans* (Däniker & Krainz) N.P. Taylor subsp. *veeniana* (Vliet) Hofacker
Hierba suculenta. Endémica. 0-400 m.
- Países: BRA(RGS). URY(MON, RIV, TAC).
- Parodia muricata** (Otto) Hofacker
Sin.: *Echinocactus muricatus* Otto
Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Parodia neohorstii** (S. Theun.) N.P. Taylor
Sin.: *Notocactus neohorstii* S. Theun.
Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Parodia nigrispina** (K. Schum.) F.H. Brandt
Sin.: *Echinocactus nigrispinus* K. Schum., *Eriocactus nigrispinus* (K. Schum.) F. Ritter, nom. inval., *Erioccephala nigrispina* (K. Schum.) Lodé, *Erioccephala schumanniana* (Nicolai) Backeb. ex Guiggi subsp. *nigrispina* (K. Schum.) Guiggi, *Malacocarpus nigrispinus* (K. Schum.) Britton & Rose, *Notocactus nigrispinus* (K. Schum.) Buining, nom. inval., *Notocactus schumannianus* (Nicolai) Fric f. *nigrispinus* (K. Schum.) Neduchal
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.
Países: PRY(COA, GUA).
- Parodia nivosa** Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(SAL).
- Parodia nothorauschi** D.R. Hunt
Sin.: *Notocactus rauschii* Vliet, *Notocactus spinibarbis* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(RIV).
- Parodia ottonis** (Lehm.) N.P. Taylor
Sin.: *Cactus ottonis* Lehm., *Echinocactus arechavaletae* Speg., *Echinocactus ottonis* (Lehm.) Link & Otto, *Malacocarpus ottonis* (Lehm.) Britton & Rose, *Notocactus arechavaletae* (Speg.) Herter, *Notocactus ottonis* (Lehm.) A. Berger
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS), BRA(PAR, RGS, SCA), PRY(PAI), URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
- Parodia oxycostata** (Buining & Brederoo) Hofacker subsp. **gracilis** (F. Ritter) Hofacker
Sin.: *Notocactus glaucinus* F. Ritter var. *gracilis* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Parodia oxycostata** (Buining & Brederoo) Hofacker subsp. **oxycostata**
Sin.: *Notocactus oxycostatus* Buining & Brederoo
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).
- Parodia penicillata** Fechsner & Steeg
Sin.: *Parodia penicillata* Fechsner & Steeg var. *fulviceps* Backeb., *Parodia penicillata* Fechsner & Steeg var. *nivosa* Fechsner
Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(SAL).
- Parodia rechensis** (Buining) F.H. Brandt
Sin.: *Brasiliparodia rechensis* (Buining) F. Ritter, *Notocactus rechensis* Buining
Hierba suculenta. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).
- Parodia rudibuenekeri** (W.R. Abraham) Hofacker & P.J. Braun

Sin.: *Notocactus glomeratus* N. Gerloff,
Notocactus rudibuenekeri W.R.
Abraham
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia schumanniana (Nicolai) F.H.
Brandt

Sin.: *Echinocactus buchheimianus* Quehl,
Echinocactus grossei K. Schum.,
Echinocactus schumannianus Nicolai,
Eriocactus grossei (K. Schum.)
Backeb. var. *aureispinus* F. Ritter,
Eriocactus schumannianus (Nicolai)
Backeb., nom. illeg., *Eriocactus*
warasii F. Ritter, *Erioccephala grossei*
(K. Schum.) Y. Ito, *Erioccephala*
schumanniana (Nicolai) Backeb. ex
Guiggi, *Erioccephala warasii* (F. Ritter)
Guiggi, *Malacocarpus grossei* (K.
Schum.) Britton & Rose, *Malacocarpus*
schumannianus (Nicolai) Britton &
Rose, *Notocactus grossei* (K. Schum.)
A. Berger, *Notocactus grossei* (K.
Schum.) A. Berger f. *aureispinus* (F.
Ritter) J. Theun. ex Havlicek,
Notocactus grossei (K. Schum.) A.
Berger var. *aureispinus* (F. Ritter) J.
Theun., *Notocactus schumannianus*
(Nicolai) Fric, *Notocactus warasii* (F.
Ritter) Hewitt & Donald, *Parodia*
grossei (K. Schum.) F.H. Brandt,
Parodia grossei (K. Schum.) F.H.
Brandt var. *aureispina* (F. Ritter) F.H.
Brandt, *Parodia warasii* (F. Ritter) F.H.
Brandt
Hierba suculenta. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).
PRY(GUA, PAI).

Parodia scopa (Spreng.) N.P. Taylor
subsp. **neobuenekeri** (F. Ritter)
Hofacker & P.J. Braun
Sin.: *Notocactus neobuenekeri* F. Ritter ,
Parodia neobuenekeri (F. Ritter)
Anceschi & Magli

Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Parodia scopa (Spreng.) N.P. Taylor
subsp. **scopa**

Sin.: *Cactus scopa* Spreng., *Echinocactus*
scopa (Spreng.) Link & Otto,
Notocactus scopa (Spreng.) Backeb.,
Notocactus soldtianus Vliet
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV,
MAL, ROC, TYT).

Parodia scopa (Spreng.) N.P. Taylor
subsp. **succinea** (F. Ritter) Hofacker &
P.J. Braun

Sin.: *Notocactus succineus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Parodia stockingeri (Prestlé) Hofacker &
P.J. Braun

Sin.: *Notocactus stockingeri* Prestle
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia stuemeri (Werderm.) Backeb.

Sin.: *Boliviacactus stuemeri* (Werderm.)
Doweld, *Boliviacactus tilcarensis*
(Werderm. & Backeb.) Doweld,
Echinocactus stuemeri Werderm.,
Parodia crucinigricentra Subík,
Parodia friciana F.H. Brandt, *Parodia*
gigantea Krainz, *Parodia jujuyana* Fric
ex R. Subík, *Parodia pseudostuemeri*
Backeb., *Parodia rubricentra* Backeb.,
Parodia schuetziana Jajó, *Parodia*
scoparia F. Ritter, *Parodia setosa*
Backeb., *Parodia stuemeri* (Werderm.)
Backeb. var. *robustior* Backeb.,
Parodia stuemeri (Werderm.) Backeb.
var. *tilcarensis* (Werderm. & Backeb.)
Borg, *Parodia tilcarensis* (Werderm. &
Backeb.) Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 2000-
3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Parodia submammulosa (Lem.) R.
Kiesling subsp. **minor** R. Kiesling
Hierba suculenta. Endémica. 2000-
2500 m.
Países: ARG(CAT).

Parodia submammulosa (Lem.) R.
Kiesling subsp. **submammulosa**

Sin.: *Echinocactus mammulosus* Lem.
var. *pampeana* Speg., *Echinocactus*
mammulosus Lem. var.
submammulosus (Lem.) Speg.,
Echinocactus pampeanus Speg.,
Echinocactus submammulosus Lem.,
Notocactus mammulosus (Lem.) A.
Berger var. *pampeanus* (Speg.) A.
Cast., *Notocactus pampeanus* (Speg.)
Backeb., *Notocactus submammulosus*
(Lem.) Backeb., *Notocactus*
submammulosus (Lem.) Backeb. var.
pampeanus (Speg.) Backeb.,
Ritterocactus mammulosus (Lem.)
Doweld subsp. *submammulosus*
(Lem.) Doweld
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN,
RNE, SLU).

Parodia tabularis (Ruempler) D.R. Hunt
Sin.: *Echinocactus tabularis* Ruempler,
Notocactus bommeljei Vliet,
Notocactus brederooianus Prestle,
Notocactus tabularis (Ruempler) D.R.
Hunt, *Parodia tabularis* (Ruempler)
D.R. Hunt subsp. *bommeljei* (Vliet)
Hofacker
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MAL).

Parodia tenuicylindrica (F. Ritter) D.R.
Hunt
Sin.: *Notocactus minimus* Fric & Kreuz. ex
Buining, *Notocactus tenuicylindricus* F.
Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia turecekiana R. Kiesling

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(RNO).

Parodia wedermanniana (Herter) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus ferrugineus* Schlosser,
Notocactus vanvlietii Rausch,
Notocactus wedermannianus Herter
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(DUR, RIV, TAC).

Pereskia Mill.

Pereskia aculeata Mill.

Sin.: *Cactus pereskia* L., *Pereskia pereskia* (L.) H. Karst., comb. illeg.
Arbusto suculento. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, PAI).

Pereskia grandifolia Haw.

Arbusto suculento. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Pereskia nemorosa Rojas Acosta

Sin.: *Pereskia amapola* F.A.C. Weber,
Pereskia amapola F.A.C. Weber var.
argentina (F.A.C. Weber) Weing.,
Pereskia argentina F.A.C. Weber
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, COA, PAI, SPE). URY(ART).

Pereskia sacharosa Griseb.

Sin.: *Rhodocactus sacharosa* (Griseb.) Backeb.

Arbusto suculento. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY).

Pfeiffera Salm-Dyck

Pfeiffera ianthothele (Monv.) F.A.C. Weber

Sin.: *Cereus ianthothele* Monv.,
Lepismium ianthothele (Monv.) Barthlott,
Pfeiffera cereiformis Salm-Dyck,
Rhipsalis cereiformis (Salm-Dyck) C.F. Först.,
Rhipsalis ianthothele (Monv.) F.H. Brandt
Hierba epífita. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Pilosocereus Byles & G.D. Rowley

Pilosocereus machrisii (Y. Dawson) Backeb.

Sin.: *Cephalocereus machrisii* Y. Dawson,
Pilocereus juaruensis Buining & Brederoo,
Pilocereus machrisii (Y. Dawson) Backeb.,
Pilosocereus juaruensis (Buining & Brederoo) P.J. Braun,
Pseudopilocereus machrisii (Y. Dawson) Buxb.
Arbusto suculento. Nativa. 0-700 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Pterocactus K. Schum.

Pterocactus araucanus A. Cast.

Sin.: *Opuntia araucana* (A. Cast.) M. Kiessling
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Pterocactus australis (F.A.C. Weber) Backeb.

Sin.: *Opuntia australis* F.A.C. Weber
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(AIS).

Pterocactus fischeri Britton & Rose

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Pterocactus gonjianii R. Kiesling

Sin.: *Opuntia gonjianii* (R. Kiesling) M. Kiessling, nom. inval.
Hierba suculenta. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(SJU).

Pterocactus hickenii Britton & Rose

Sin.: *Opuntia hickenii* (Britton & Rose) M. Kiessling, nom. illeg.,
Opuntia skottsbergii Britton & Rose,
Pterocactus skottsbergii (Britton & Rose) Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).

Pterocactus meglolii R. Kiesling

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SJU).

Pterocactus neuquensis R. Kiesling, E. Sarnes & N. Sarnes

Hierba suculenta. Endémica. 1000-1200 m.
Países: ARG(NEU).

Pterocactus reticulatus R. Kiesling

Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Pterocactus tuberosus (Pfeiff.) Britton & Rose f. **lelongii** (Ruiz Leal ex R. Kiesling) R. Kiesling

Sin.: *Pterocactus kuntzei* K. Schum. f. *lelongii* Ruiz Leal ex R. Kiesling
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Pterocactus tuberosus (Pfeiff.) Britton & Rose f. **tuberosus**

Sin.: *Opuntia kuntzei* (K. Schum.) M. Kiessling, *Opuntia tuberosa* Pfeiff., *Pterocactus decipiens* Gürke, *Pterocactus kuntzei* K. Schum.
Hierba suculenta. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

Pterocactus valentinii Speg.

Sin.: *Opuntia valentinii* (Speg.) M. Kiessling, *Pterocactus pumilus* Britton & Rose
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU).

Puna R. Kiesling

Puna bonnieae D.J. Ferguson & R. Kiesling

Sin.: *Maihueniopsis bonnieae* (D.K. Ferguson & R. Kiesling) E.F. Anderson, *Opuntia bonnieae* (D.J. Ferguson & R. Kiesling) Halda & Janeba, *Tephrocactus bonnieae* (D.J. Ferguson & R. Kiesling) Stuppy
Hierba suculenta. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(CAT).

Puna clavarioides (Pfeiff.) R. Kiesling

Sin.: *Austrocylindropuntia clavarioides* (Pfeiff.) Backeb., *Austrocylindropuntia clavarioides* (Pfeiff.) Backeb. var. *ruiz-lealii* (A. Cast.) Backeb., *Cylindropuntia clavarioides* (Pfeiff.) F.M. Knuth, *Maihueniopsis clavarioides* (Pfeiff.) E.F. Anderson,

Opuntia clavarioides Pfeiff., *Opuntia ruiz-lealii* A. Cast., *Tephrocactus clavarioides* (Pfeiff.) G.D. Rowley
Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Puna subterranea (R.E. Fr.) R. Kiesling

Sin.: *Cumulopuntia subterranea* (R.E. Fr.) F. Ritter, *Maihueniopsis subterranea* (R.E. Fr.) E.F. Anderson, *Opuntia subterranea* R.E. Fr., *Tephrocactus subterraneus* (R.E. Fr.) Backeb., *Tephrocactus variiflorus* Backeb.
Hierba suculenta. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUU).

Pyrrhocactus A. Berger

Pyrrhocactus aspillagae (Söhrens) F. Ritter

Sin.: *Echinocactus aspillagae* Söhrens, *Eriosyce aspillagae* (Söhrens) Katt., *Eriosyce aspillagae* (Söhrens) Katt. subsp. *maechlerorum* H.E. Walter, *Neoporteria aspillagae* (Söhrens) Backeb., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *aspillagae* (Söhrens) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Pyrrhocactus bulbocalyx (Werderm.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus bulbocalyx* Werderm., *Eriosyce bulbocalyx* (Werderm.) Katt., *Neoporteria bulbocalyx* (Werderm.) Donald & G.D. Rowley
Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

Pyrrhocactus catamarcensis (F.A.C. Weber) Backeb.

Sin.: *Echinocactus catamarcensis* Speg., *Echinocactus catamarcensis* Speg. var. *obscurus* Speg., *Echinocactus catamarcensis* Speg. var. *pallidus* Speg., *Echinopsis catamarcensis* F.A.C. Weber, *Malacocarpus catamarcensis* (Speg.) Britton & Rose, *Pyrrhocactus melanacanthus* Backeb., nom. inval.
Hierba suculenta. Endémica. 800-1000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Pyrrhocactus chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. **albidiflorus** F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(COQ).

Pyrrhocactus chilensis (Hildm. ex K. Schum.) F. Ritter var. **chilensis**

Sin.: *Echinocactus chilensis* Hildm. ex K. Schum., *Eriosyce chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Katt., *Neochilenia chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Backeb., *Neoporteria chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Britton & Rose, *Pyrrhocactus krausii* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Pyrrhocactus confinis F. Ritter

Sin.: *Eriosyce confinis* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia confinis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria confinis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria kunzei* (C.F. Först.) Backeb. var. *confinis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA).

Pyrrhocactus crispus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus crispus* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria crispa* (F. Ritter)

Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *crispa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., nom. illeg.

Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(ATA).

Pyrrhocactus curvispinus (Bertero ex Colla) A. Berger

Sin.: *Cactus curvispinus* Bertero ex Colla, *Echinocactus froelichianus* K. Schum., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *choapensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *limariensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce limariensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *gracilis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *lissocarpa* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus aconcaguensis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus choapensis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus curvispinus* (Bertero ex Colla) Backeb., *Neoporteria choapensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *coliguayensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *limariensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria litoralis* F. Ritter, *Pyrrhocactus aconcaguensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *descendens* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *mollensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus*

choapensis F. Ritter, *Pyrrhocactus coliguayensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus grandiflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *orientalis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus limariensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter, *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter var. *gracilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus pamaensis* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 200-2000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Pyrrhocactus echinus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *echinus* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *echinus* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *glaucescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus glaucescens* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 400-800 m.

Países: CHL(ANT).

Pyrrhocactus engleri (F. Ritter) F. Ritter

Sin.: *Eriosyce engleri* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus engleri* F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *engleri* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria engleri* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley

Hierba suculenta. Endémica. 1900 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Pyrrhocactus floccosus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *floccosa* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria eriocephala* (Backeb.)

Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter)

Donald & G.D. Rowley var. *floccosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus floccosus* F. Ritter var. *minor* (F. Ritter) F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 200-600 m.

Países: CHL(ANT).

Pyrrhocactus garaventai (F. Ritter) F. Ritter

Sin.: *Eriosyce garaventai* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus garaventai* F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *garaventai* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria garaventai* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria subaiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley

Hierba suculenta. Endémica. 1000-3000 m.

Países: CHL(VAL).

Pyrrhocactus jussiei (Monv. ex Salm-Dyck) F. Ritter

Sin.: *Chilenia jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Backeb., *Chilenia occulta* (Phil.) Backeb., *Echinocactus jussieui* Monv. ex Salm-Dyck, *Echinocactus occultus* Phil., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *intermedia* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. var. *setosiflora* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria chorosensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria deherdtiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Neoporteria dimorpha* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose, *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chaniarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria*

jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chorosensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *dimorpha* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *setosiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *trapichensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *wagenknechtii* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria occulta* (Phil.) Britton & Rose, *Neoporteria ritteri* Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria setosiflora* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus chaniarensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus heinrichianus* (Backeb.) F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *spinosior* F. Ritter, *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter var. *intermedius* F. Ritter, *Pyrrhocactus trapichensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus wagenknechtii* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

***Pyrrhocactus kattermannii* R. Kiesling**

Sin.: *Acanthocalycium andreaeanum* (Backeb.) Donald, nom. inval., *Eriosyce andreaeana* Katt., *Neochilenia andreaeana* Backeb., nom. inval., *Neoporteria andreaeana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, comb. illeg., *Pyrrhocactus andreaeanus* (Backeb.) F. Ritter, comb. illeg.
Subarbusto suculento. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

***Pyrrhocactus kunzei* (C.F. Först.) Borg**
Sin.: *Echinocactus kunzei* C.F. Forst., *Eriosyce crisa* (F. Ritter) Katt. subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crisa* (F. Ritter) Katt. var. *carrizalensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crisa* (F. Ritter) Katt. var. *huascensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crisa* (F. Ritter) Katt. var. *ttotalensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *carrizalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *huascensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *ttotalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *transitensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce kunzei* (C.F. Först.) Katt. var. *transitensis* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus atroviridis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus carrizalensis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus eriosyzoides* F. Ritter, *Neochilenia huascensis* (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia ttotalensis* (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia transitensis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *ttotalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria eriosyzoides* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria huascensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *huascensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria kunzei* (C.F. Först.) Backeb., *Neoporteria ttotalensis* (F. Ritter) Donald & G.D.

Rowley, *Neoporteria ttotalensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *carrizalensis* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A. Hoffm., comb. illeg., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *atroviridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *domeykoensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *transitensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus atroviridis* F. Ritter, *Pyrrhocactus carrizalensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus eriosyzoides* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus eriosyzoides* (F. Ritter) F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus huascensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus ttotalensis* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

***Pyrrhocactus marksianus* F. Ritter**

Sin.: *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley f. *lissocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *marksiana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria marksiana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus marksianus* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus truncatipetalus* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 200-500 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

***Pyrrhocactus pachacoensis* Rausch**

Sin.: *Eriosyce strausiana* (K. Schum.) Katt. var. *pachacoensis* (Rausch) Katt.
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Pyrrhocactus paucicostatus (F. Ritter)

F. Ritter

Sin.: *Delaetia woutersiana* Backeb., nom. inval., *Eriosyce paucicostata* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *paucicostata* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus paucicostatus* F. Ritter, *Neochilenia paucicostata* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria haenkeana* (C.F. Först.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria neohankeana* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *neohankeana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria woutersiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *densispinus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *elongatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *flaviflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus paucicostatus* (F. Ritter) F. Ritter var. *viridis* (F. Ritter) F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT).

Pyrrhocactus philippianus Faúndez

Sin.: *Eriosyce occulta* Katt., *Pyrrhocactus occultus* F. Ritter, nom. inval.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT).

Pyrrhocactus pilispinus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *pilispina* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pilispina* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria pilispina* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA).

Pyrrhocactus pygmaeus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *pygmaea* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria calderana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley f. *gracilis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley f. *pygmaea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pulchella* (F. Ritter) A.E. Hoffm., nom. illeg., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *scoparia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., nom. illeg., *Neoporteria scoparia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus gracilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus pulchellus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Pyrrhocactus reconditus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce recondita* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia recondita* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *vexata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus vexatus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 400-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Pyrrhocactus sanjuanensis (Speg.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus sanjuanensis* Speg., *Eriosyce vertongenii* (J.G. Lamb.) D.R. Hunt, *Eriosyce villicumensis* (Rausch) Katt., *Neoporteria sanjuanensis* (Speg.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria umadeave* (Werderm.) Donald & G.D. Rowley var.

marayesensis (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria villicumensis* (Rausch) Donald, *Pyrrhocactus marayesensis* (Backeb.) J.G. Lamb., *Pyrrhocactus megliolii* Rausch, *Pyrrhocactus strausianus* (K. Schum.) A. Berger var. *sanjuanensis* (Speg.) J.G. Lamb., *Pyrrhocactus umadeave* Werderm. var. *marayesensis* Backeb., *Pyrrhocactus vertongenii* J.G. Lamb., *Pyrrhocactus villicumensis* Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SJU).

Pyrrhocactus simulans F. Ritter

Sin.: *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *simulans* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce simulans* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia simulans* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria simulans* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
Hierba suculenta. Endémica. 100-400 m.
Países: CHL(COQ).

Pyrrhocactus strausianus (K. Schum.) A. Berger

Sin.: *Echinocactus strausianus* K. Schum., *Eriosyce strausiana* (K. Schum.) Katt., *Malacocarpus strausianus* (K. Schum.) Britton & Rose, *Neoporteria strausiana* (K. Schum.) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus platyacanthus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Pyrrhocactus taltalensis (Hutchison) F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt., *Neochilenia taltalensis* (Hutchison) Backeb., *Neoporteria rupicola* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria taltalensis* Hutchison,

Pyrrhocactus rupicola F. Ritter,
Pyrrhocactus tenuis F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 500-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Pyrrhocactus tuberisulcatus (Jacobi) A. Berger

Sin.: *Cactus horridus* Bertero ex Colla, nom. illeg., *Echinocactus horridus* J. Rémy ex Gay, *Echinocactus tuberisulcatus* Jacobi, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *armata* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *mutabilis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *robusta* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *tuberisulcata* (Jacobi) Katt., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *armata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *odoriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria tuberisulcata* (Jacobi) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus armatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *mutabilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* Backeb., *Pyrrhocactus odoriflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus robustus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Pyrrhocactus umadeave (Werderm.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus umadeave* Werderm., *Eriosyce umadeave* (Werderm.) Katt., *Friesia umadeave* Fric ex Kreuz., nom. inval., *Neoporteria umadeave* (Werderm.) Donald & G.D. Rowley
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Quiabentia Britton & Rose

Quiabentia verticillata (Vaupel) Vaupel ex A. Berger

Sin.: *Pereskia pflanzii* Vaupel, *Pereskia verticillata* Vaupel, *Quiabentia chacoensis* Backeb., *Quiabentia chacoensis* Backeb. var. *jujuyensis* Backeb., *Quiabentia pflanzii* (Vaupel) Vaupel ex A. Berger
Arbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL).
PRY(APY, PHA).

Rebutia K. Schum.

Rebutia diminuta (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Sin.: *Aylosteria diminuta* (F.A.C. Weber) Backeb., *Aylosteria diminuta* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *pseudominuscula* (Speg.) Backeb., *Aylosteria pseudodiminuta* (Backeb.) Backeb., *Aylosteria pseudodiminuta* (Backeb.) Backeb. var. *albiseta* Backeb., *Aylosteria pseudodiminuta* (Backeb.) Backeb. var. *grandiflora* Backeb., *Aylosteria pseudodiminuta* (Backeb.) Backeb. var. *schneideriana* Backeb., *Aylosteria pseudodiminuta* (Backeb.) Backeb. var. *schumanniana* (Backeb.) Backeb., *Aylosteria pseudominuscula* (Speg.) Speg., *Echinopsis diminuta* F.A.C. Weber, *Echinopsis pseudominuscula* Speg., *Rebutia diminuta* (F.A.C. Weber) A. Berger var. *pseudominuscula* (Speg.) Donald, *Rebutia pseudodiminuta* Backeb., *Rebutia pseudodiminuta* Backeb. var. *schumanniana* Backeb., *Rebutia*

pseudominuscula (Speg.) Britton & Rose

Hierba suculenta. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Rebutia einsteinii Fric ex Kreuz. & Buining subsp. **aureiflora** (Backeb.) Hjertson

Sin.: *Cylindrorebutia einsteinii* (Fric ex Kreuz. & Buining) Brederoo, *Digitorebutia euanthema* (Backeb.) Buining, *Lobivia aurantida* Wessner, *Lobivia columnaris* Wessner, *Lobivia conoidea* Wessner, *Lobivia einsteinii* (Fric ex Kreuz. & Buining) Rausch, *Lobivia einsteinii* (Fric ex Kreuz. & Buining) Rausch var. *atrospinoso* Rausch, *Lobivia einsteinii* (Fric ex Kreuz. & Buining) Rausch var. *aureiflora* (Backeb.) Rausch, *Lobivia einsteinii* (Fric ex Kreuz. & Buining) Rausch var. *elegans* (Backeb.) Rausch, *Lobivia euanthema* Backeb., *Lobivia euanthema* Backeb. var. *tilcarensis* Rausch, *Lobivia schmiedcheniana* U. Köhler, *Mediolobivia aurantida* (Wessner) Krainz, *Mediolobivia aurantida* (Wessner) Krainz var. *flaviflora* Backeb., *Mediolobivia aureiflora* Backeb., *Mediolobivia boedekeriana* Backeb., *Mediolobivia conoidea* (Wessner) Krainz, *Mediolobivia conoidea* (Wessner) Krainz var. *columnaris* (Wessner) Backeb., *Mediolobivia duursmaiana* Backeb., *Mediolobivia elegans* Backeb., *Mediolobivia euanthema* (Backeb.) Krainz, *Mediolobivia euanthema* (Backeb.) Krainz var. *oculata* (Werderm.) Krainz, *Mediolobivia rubelliflora* Backeb., *Mediolobivia rubriflora* Backeb., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz, *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *einsteinii* (Fric)

Backeb., comb. illeg., *Medioblobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *karrerii* Backeb., *Medioblobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *steineckei* Backeb., *Rebulobivia einsteinii* (Fric ex Kreuz. & Buining) Kreuz., *Rebutia aureiflora* Backeb., *Rebutia blossfeldii* Werderm., *Rebutia einsteinii* Fric ex Kreuz. & Buining, *Rebutia einsteinii* Fric ex Kreuz. & Buining var. *atrospinosa* (Rausch) Sida, *Rebutia einsteinii* Fric ex Kreuz. & Buining var. *rubroviridis* (Backeb.) Buining & Donald, *Rebutia oculata* Werderm., *Rebutia pilifera* Fric, *Rebutia sarothroides* Werderm., *Rebutia schmiedcheniana* (U. Köhler) W.T. Marshall
Hierba suculenta. Nativa. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Rebutia fiebrigii (Gürke) Britton & Rose

Sin.: *Aylostera fiebrigii* (Gürke) Backeb., *Aylostera jujuyana* (Rausch) Mosti & Papini, *Aylostera spegazziniana* (Backeb.) Backeb., *Aylostera spegazziniana* (Backeb.) Backeb. var. *atroviridis* Backeb., *Aylostera spinosissima* (Backeb.) Backeb., *Echinocactus fiebrigii* Gürke, *Lobivia steinmannii* (Salm-Dyck) Backeb. var. *christinae* (Rausch) Rausch, *Rebutia buiningiana* Rausch, *Rebutia christinae* Rausch, *Rebutia fabrisii* Rausch, *Rebutia fabrisii* Rausch var. *aureiflora* Rausch, *Rebutia fabrisii* Rausch var. *nana* Rausch, *Rebutia fiebrigii* (Gürke) Britton & Rose var. *densisetata* (Cullman) Oeser, *Rebutia hoffmannii* Diers & Rausch, *Rebutia jujuyana* Rausch, *Rebutia kieslingii* Rausch, *Rebutia spegazziniana* Backeb., *Rebutia spinosissima* Backeb., *Rebutia walteri* Diers
Hierba suculenta. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Rebutia margarethae Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Rebutia minuscula K. Schum. subsp. **minuscula**

Sin.: *Rebutia australis* Mottram & Gapon, *Rebutia chrysacantha* Backeb., *Rebutia chrysacantha* Backeb. var. *elegans* (Backeb.) Backeb., *Rebutia chrysacantha* Backeb. var. *kesselringiana* (Bewer.) Donald, *Rebutia dasyphrissa* Werderm., *Rebutia graciliflora* Backeb., *Rebutia grandiflora* Backeb., *Rebutia hyalacantha* (Backeb.) Backeb., *Rebutia knuthiana* Backeb., *Rebutia minuscula* K. Schum. subsp. *grandiflora* (Backeb.) Donald, *Rebutia minuscula* K. Schum. subsp. *violaciflora* (Backeb.) Donald, *Rebutia minuscula* K. Schum. var. *grandiflora* (Backeb.) Krainz, *Rebutia senilis* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *aurescens* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *brevisetata* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *chrysacantha* (Backeb.) Donald, *Rebutia senilis* Backeb. var. *hyalacantha* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *iseliniana* Krainz, *Rebutia senilis* Backeb. var. *kesselringiana* Bewer., *Rebutia senilis* Backeb. var. *lilacinorosea* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *schieliana* Bewer., *Rebutia senilis* Backeb. var. *sieperdaiana* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *stuemeri* Backeb., *Rebutia violaciflora* Backeb., *Rebutia violaciflora* Backeb. var. *knuthiana* (Backeb.) Donald, *Rebutia xanthocarpa* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *citricarpa* Fric ex Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *coerulescens* Backeb.,

Rebutia xanthocarpa Backeb. var. *dasyphrissa* (Werderm.) Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *elegans* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *luteirosea* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *salmonea* Fric ex Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *violaciflora* (Backeb.) Backeb.

Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Rebutia minuscula K. Schum. subsp. **wessneriana** (Bewer.) Muruaga

Sin.: *Rebutia calliantha* Bewer., *Rebutia krainziana* Kesseler. var. *wessneriana* (Bewer.) Krainz & Haarm., *Rebutia wessneriana* Bewer., *Rebutia wessneriana* Bewer. var. *calliantha* (Bewer.) Donald

Hierba suculenta. Endémica. 2000-2100 m.

Países: ARG(JUU).

Rebutia tarijensis Rausch

Hierba suculenta. Nativa. 3000-3100 m.
Países: ARG(SAL).

Rhipsalis Gaertn.

Rhipsalis aculeata F.A.C. Weber

Sin.: *Lepismium aculeatum* (F.A.C. Weber) Barthlott, *Lepismium lumbricoides* (Lem.) Barthlott f. *aculeatum* Barthlott & N.P. Taylor, *Ophiorhipsalis lumbricoides* (Lem.) Doweld subsp. *aculeata* (F.A.C. Weber) Doweld

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC).
PRY(PHA). URY(ART).

Rhipsalis baccifera (Sol.) Stearn subsp. **baccifera**

Sin.: *Cassya baccifera* Sol., *Rhipsalis cassutha* Gaertn.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn subsp. **shaferi** (Britton & Rose) Barthlott & N.P. Taylor

Sin.: *Rhipsalis shaferi* Britton & Rose

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Rhipsalis burchellii Britton & Rose

Sin.: *Rhipsalis cribrata* (Lem.) Pfersd. ex N.E. Br.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rhipsalis campos-portoana Loefgr.

Hierba epífita. Nativa. 0-2300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis cereuscula Haw.

Sin.: *Rhipsalis penduliflora* N.E. Br., *Rhipsalis saglionis* (Lem.) Otto

Hierba epífita. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, TAC).

Rhipsalis clavata F.A.C. Weber

Sin.: *Hariota clavata* (F.A.C. Weber) Moran var. *delicatula* (Loefgr.) A. Cast., *Hatiora clavata* (F.A.C. Weber) Moran, *Rhipsalis clavata* F.A.C. Weber var. *delicatula* Loefgr.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Rhipsalis crispata (Haw.) Pfeiff.

Sin.: *Epiphyllum crispatum* Haw., *Hariota crispata* (Haw.) Kuntze

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Rhipsalis cruciformis (Vell.) Ser.

Sin.: *Cactus cruciformis* Vell., *Cereus squamulosus* Salm-Dyck ex DC., *Lepismium cavemosum* Lindb., *Lepismium cruciforme* (Vell.) Miq., *Rhipsalis cavernosa* (Lindb.) K. Schum., *Rhipsalis cruciformis* (Vell.) A. Cast., *Rhipsalis squamulosa* (Salm-Dyck) K. Schum., isónimo

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CLA, ROC, TYT).

Rhipsalis dissimilis (G. Lindb.) K. Schum. f. **dissimilis**

Sin.: *Lepismium dissimile* G. Lindb.

Hierba epífita. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rhipsalis dissimilis (G. Lindb.) K. Schum. f. **epiphyllanthoides** (Backeb.) Barthlott & N.P. Taylor

Sin.: *Lepismium epiphyllanthoides* Backeb.

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Rhipsalis elliptica G. Lindb. ex K. Schum.

Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis floccosa Pfeiff. subsp. **hohenauensis** (F. Ritter) Barthlott & N.P. Taylor

Sin.: *Rhipsalis hohenauensis* F. Ritter

Hierba epífita. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, PHA, SPE). URY(RIV).

Rhipsalis floccosa Pfeiff. subsp. **pulvinigera** (G. Lindb.) Barthlott & N.P. Taylor

Sin.: *Lepismium gibberulum* (F.A.C. Weber) Backeb., *Rhipsalis gibberula* F.A.C. Weber, *Rhipsalis pulvinigera* G. Lindb.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis floccosa Pfeiff. subsp. **tucumanensis** (F.A.C. Weber) Barthlott & N.P. Taylor

Sin.: *Lepismium tucumanensis* (F.A.C. Weber) Backeb., *Rhipsalis tucumanensis* F.A.C. Weber

Hierba epífita. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Rhipsalis grandiflora Haw.

Sin.: *Cactus funalis* Spreng.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rhipsalis houletiana Lem.

Sin.: *Acanthorhipsalis houletiana* (Lem.) Volgin, *Lepismium houletianum* (Lem.) Barthlott, *Nothorhipsalis houletiana* (Lem.) Doweld

Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis juengeri Barthlott & N.P. Taylor

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rhipsalis lindbergiana K. Schum.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Rhipsalis lorentziana Griseb.

Sin.: *Lepismium lorentzianum* (Griseb.) Barthlott, *Nothorhipsalis lorentziana* (Griseb.) Doweld
 Hierba epífita. Nativa. 500-2000 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Rhipsalis lumbricoides (Lem.) Lem.

Sin.: *Cereus lumbricoides* Lem., *Lepismium lumbricoides* (Lem.) Barthlott, *Ophiorhipsalis lumbricoides* (Lem.) Doweld, *Rhipsalis leucorhaphis* K. Schum., *Rhipsalis sarmentacea* Otto & D. Dietr.
 Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Rhipsalis monacantha Griseb.

Sin.: *Acanthorhipsalis monacantha* (Griseb.) Britton & Rose, *Lepismium monacanthum* (Griseb.) Barthlott, *Pfeiffera monacantha* (Griseb.) P.V. Heath
 Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Rhipsalis neves-armondii K. Schum.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Rhipsalis pachyptera Pfeiff.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck

Sin.: *Lepismium paradoxum* Salm-Dyck ex Pfeiff.
 Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis pilocarpa Loefgr.

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
 Países: BRA(PAR).

Rhipsalis puniceo-discus G. Lindb.

Sin.: *Lepismium puniceo-discus* (G. Lindb.) Backeb.
 Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis russellii Britton & Rose

Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Rhipsalis teres (Vell.) Steud.

Sin.: *Cactus teres* Vell., *Hariota prismatica* Lem., *Rhipsalis albolanata* F. Ritter, *Rhipsalis capilliformis* F.A.C. Weber, *Rhipsalis heteroclada* Britton & Rose, *Rhipsalis prismatica* (Lem.) Ruempler, *Rhipsalis teres* (Vell.) Steud. f. *capilliformis* (F.A.C. Weber) Barthlott & N.P. Taylor, *Rhipsalis teres* (Vell.) Steud. f. *heteroclada* (Britton & Rose) Barthlott & N.P. Taylor, *Rhipsalis teres* (Vell.) Steud. f. *prismatica* (Lem.) Barthlott & N.P. Taylor

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis trigona Pfeiff.

Sin.: *Lepismium trigonum* (Pfeiff.) Backeb.
 Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Salmonopuntia P.V. Heath**Salmonopuntia schickendantzii** (F.A.C. Weber) Font & M. Köhler

Sin.: *Austrocylindropuntia schickendantzii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Brasilopuntia schickendantzii* (F.A.C. Weber) R. Puente & Majure, *Cylindropuntia schickendantzii* (F.A.C. Weber)

Backeb., *Mortolopuntia schickendantzii* (F.A.C. Weber) Guiggi, *Opuntia schickendantzii* F.A.C. Weber
 Subarbusto suculento. Nativa. 1000-2000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Schlumbergera Lem.**Schlumbergera gaertneri** (Regel) Britton & Rose

Sin.: *Epiphyllum russeianum* Hook. var. *gaertneri* Regel, *Hatiora gaertneri* (Regel) Barthlott, *Rhipsalidopsis gaertneri* (Regel) Moran
 Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Schlumbergera rosea (Lagerh.) Calvente & Zappi

Sin.: *Hatiora rosea* (Lagerh.) Barthlott, *Rhipsalidopsis rosea* (Lagerh.) Britton & Rose, *Rhipsalis rosea* Lagerh.
 Hierba epífita. Nativa. 1000-2000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Selenicereus (A. Berger) Britton & Rose**Selenicereus anthonyanus** (Alexander) D.R. Hunt

Sin.: *Cryptocereus anthonyanus* Alexander
 Arbusto suculento. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Selenicereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Sin.: *Cereus hassleri* K. Schum., *Cereus lindbergianus* F.A.C. Weber, *Cereus lindmanii* F.A.C. Weber, *Cereus setaceus* Salm-Dyck ex DC.,

Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) R. Bauer, *Mediocactus hassleri* (K. Schum.) Backeb., *Mediocactus lindmanii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Mediocactus setaceus* (Salm-Dyck ex DC.) Borg, *Selenicereus macdonaldiae* (Hook.) Britton & Rose, *Selenicereus rizzinii* Scheinvar
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, PAI, PHA).

Selenicereus undatus (Haw.) D.R. Hunt
Sin.: *Cereus undatus* Haw., *Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose
Arbusto suculento. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Setiechinopsis (Backeb.) de Haas

Setiechinopsis mirabilis (Speg.) de Haas
Sin.: *Acanthopetalus mirabilis* (Speg.) Y. Ito, *Arthrocereus mirabilis* (Speg.) Marshall, *Echinopsis mirabilis* Speg., *Setiechinopsis mirabilis* (Speg.) de Haas var. *gracilior* Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR, LRI, MEN, SDE, SJU).

Stetsonia Britton & Rose

Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose
Sin.: *Cereus coryne* Salm-Dyck
Árbol suculento. Nativa. 200-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE). PRY(APY, CON, PHA).

Tephrocactus Lem.

Tephrocactus alexanderi (Britton & Rose) Backeb.

Sin.: *Opuntia alexanderi* Britton & Rose, *Opuntia alexanderi* Britton & Rose var. *bruchii* (Speg.) G.D. Rowley, *Opuntia bruchii* Speg., *Tephrocactus alexanderi* (Britton & Rose) Backeb. var. *bruchii* (Speg.) Backeb., *Tephrocactus alexanderi* (Britton & Rose) Backeb. var. *subsphaericus* (Backeb.) Backeb., nom. inval., *Tephrocactus bruchii* (Speg.) Speg., *Tephrocactus subsphaericus* Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).

Tephrocactus aoracanthus (Lem.) Lem.

Sin.: *Cereus ovatus* Pfeiff., nom. illeg., *Opuntia aoracantha* Lem., *Opuntia hossei* (Krainz & Gräser) G.D. Rowley, *Opuntia paediophila* A. Cast., *Tephrocactus aoracanthus* (Lem.) Lem. var. *paediophilus* (A. Cast.) J.G. Lamb., *Tephrocactus hossei* Krainz & Gräser, *Tephrocactus paediophilus* (A. Cast.) F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb. var. **articulatus**

Sin.: *Cereus articulatus* Pfeiff., *Opuntia articulata* (Pfeiff.) D.R. Hunt, *Opuntia diademata* Lem. var. *inermis* Speg., *Opuntia glomerata* Haw. var. *inermis* (Speg.) A. Cast., *Opuntia papyracantha* Phil., *Opuntia strobiliformis* A. Berger, *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. var. *calvus* (Lem.) Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. var.

diadematus (Lem.) Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. var. *inermis* (Speg.) Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. var. *papyracanthus* (Phil.) Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. f. *papyracanthus* (Phil.) Guiggi & Verloove, *Tephrocactus calvus* Lem.

Subarbusto suculento. Endémica.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Sin.: *Cereus syringacanthus* Pfeiff., *Opuntia diademata* Lem., *Opuntia diademata* Lem. var. *oligacantha* Speg., *Opuntia diademata* Lem. var. *polyacantha* Speg., *Opuntia glomerata* Haw. f. *oligacantha* (Speg.) A. Cast., *Opuntia turpinii* Lem., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. var. *polyacanthus* (Speg.) Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. var. *syringacanthus* (Pfeiff.) Backeb., *Tephrocactus diadematus* (Lem.) Lem., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *oligacanthus* Speg.

Subarbusto suculento. Endémica.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU).

Tephrocactus aulacothele (F.A.C. Weber ex Rol.-Goss.) R. Kiesling & L.J. Oakley subsp. **aulacothele**

Sin.: *Opuntia aulacothele* F.A.C. Weber, *Opuntia weberi* Speg., *Opuntia weberi* Speg. var. *dispar* A. Cast. & Lelong, *Opuntia weberi* Speg. var. *setiger* (Backeb.) Backeb., *Tephrocactus setiger* Backeb., *Tephrocactus setiger* Backeb. f. *dispar* (A. Cast. & Lelong) G. Popov, *Tephrocactus weberi*

(Speg.) Backeb. var. *weberi*,
Ursopuntia textoris P.V. Heath var.
dispar (A. Cast. & Lelong) P.V. Heath,
 nom. inval., *Ursopuntia textoris* P.V.
 Heath var. *setiger* (Backeb. & F.M.
 Knuth) P.V. Heath, nom. inval.
 Subarbusto suculento. Endémica. 500-
 1500 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU,
 TUC).

Tephrocactus aulacothele (F.A.C.
 Weber ex Rol.-Goss.) R. Kiesling &
 L.J. Oakley subsp. **deminutus**
 (Rausch) R. Kiesling & L.J. Oakley
 Sin.: *Opuntia weberi* Speg. var. *deminuta*
 (Rausch) M. Kiesling, *Tephrocactus*
abditus D.J. Ferguson & Janeba,
Tephrocactus setiger Backeb. subsp.
deminutus (Rausch) G. Popov,
Tephrocactus weberi (Speg.) Backeb.
 var. *deminutus* Rausch
 Subarbusto suculento. Endémica.
 2800-2900 m.
 Países: ARG(SAL).

Tephrocactus geometricus (A. Cast.)
 Backeb.
 Sin.: *Opuntia geometrica* A. Cast.,
Tephrocactus alexanderi (Britton &
 Rose) Backeb. subsp. *geometricus* (A.
 Cast.) Guiggi
 Subarbusto suculento. Endémica. 500-
 1500 m.
 Países: ARG(CAT).

Tephrocactus halophilus (Speg.)
 Backeb.
 Sin.: *Opuntia halophila* Speg.,
Tephrocactus ovatus (Pfeiff.) Backeb.
 subsp. *halophilus* (Speg.) G. Popov &
 Gapon
 Subarbusto suculento. Endémica.
 1000-1500 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).

Tephrocactus molinensis (Speg.)
 Backeb.
 Sin.: *Maihueniopsis molinensis* (Speg.) F.
 Ritter, *Opuntia guerkei* Schelle,
Opuntia molinensis Speg., *Opuntia*
schumannii Speg., hom. illeg.
 Subarbusto suculento. Endémica. 500-
 1500 m.
 Países: ARG(SAL).

Thelocephala Y. Ito

Thelocephala esmeraldana (F. Ritter) F.
 Ritter
 Sin.: *Chileorebutia esmeraldana* F. Ritter,
Eriosyce esmeraldana (F. Ritter) Katt.,
Neoporteria esmeraldana (F. Ritter)
 Donald & G.D. Rowley
 Hierba suculenta. Endémica. 100-200
 m.
 Países: CHL(ANT).

Thelocephala glabrescens (F. Ritter) F.
 Ritter
 Sin.: *Chileorebutia glabrescens* F. Ritter,
Eriosyce odieri (Lem. ex Salm-Dyck)
 Katt. subsp. *glabrescens* (F. Ritter)
 Katt.
 Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.
 Países: CHL(ATA).

Thelocephala krausii (F. Ritter) F. Ritter
 Sin.: *Chileorebutia krausii* F. Ritter,
Eriosyce krausii (F. Ritter) Katt.,
Eriosyce malleolata (F. Ritter) P.C.
 Guerrero & H. Walter, *Thelocephala*
longirapa F. Ritter, *Thelocephala*
malleolata (F. Ritter) F. Ritter,
Thelocephala malleolata (F. Ritter) F.
 Ritter var. *solitaria* (F. Ritter) F. Ritter
 Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.
 Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Thelocephala napina (Phil.) Y. Ito
 Sin.: *Chileorebutia aerocarpa* F. Ritter,
Chileorebutia duripulpa F. Ritter,
Chileorebutia napina (Phil.) F. Ritter,
Echinocactus napinus Phil., *Eriosyce*
aerocarpa (F. Ritter) Katt., *Eriosyce*
napina (Phil.) Katt. subsp. *aerocarpa* (F.
 Ritter) Ferryman, *Eriosyce napina*
 (Phil.) Katt. subsp. *challensis* R. Keim
 & I. Schaub, *Eriosyce napina* (Phil.)
 Katt. subsp. *lembckei* Katt., *Eriosyce*
napina (Phil.) Katt. var. *duripulpa* (F.
 Ritter) Katt., *Eriosyce odieri* (Lem. ex
 Salm-Dyck) Katt. subsp. *fulva* (F.
 Ritter) Katt., *Neochilenia aerocarpa* (F.
 Ritter) Backeb., *Neochilenia duripulpa*
 (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia*
lembckei Backeb., *Neochilenia napina*
 (Phil.) Backeb., *Neoporteria napina*
 (Phil.) Backeb., *Neoporteria napina*
 (Phil.) Backeb. f. *nuda* (F. Ritter) A.E.
 Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.)
 Backeb. var. *aerocarpa* (F. Ritter) A.E.
 Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.)
 Backeb. var. *duripulpa* (F. Ritter) A.E.
 Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.)
 Backeb. var. *lembckei* (Backeb.) A.E.
 Hoffm., *Thelocephala aerocarpa* (F.
 Ritter) F. Ritter, *Thelocephala*
duripulpa (F. Ritter) F. Ritter,
Thelocephala fulva F. Ritter,
Thelocephala lembckei (Backeb.) F.
 Ritter, *Thelocephala nuda* F. Ritter
 Hierba suculenta. Endémica. 100-600
 m.
 Países: CHL(ATA).

Thelocephala odieri (Lem. ex Salm-
 Dyck) F. Ritter
 Sin.: *Chileorebutia odieri* (Lem. ex Salm-
 Dyck) F. Ritter, *Echinocactus odieri*
 Lem. ex Salm-Dyck, *Eriosyce odieri*
 (Lem. ex Salm-Dyck) Katt., *Eriosyce*
odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. var.
monte-amargensis Katt., *Neoporteria*

monte-amargensis (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Neoporteria odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb. Hierba suculenta. Endémica. 0-400 m. Países: CHL(ATA).

***Thelocephala tenebrica* F. Ritter**

Sin.: *Eriosyce tenebrica* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *fankhauseri* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephala fankhauseri* F. Ritter Hierba suculenta. Endémica. 100-600 m. Países: CHL(ATA, COQ).

***Thelocephala weisseri* (A. Hoffm. & H. Walter) Faúndez & Saldivia**

Sin.: *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. var. *weisseri* A.E. Hoffm. & H. Walter Hierba suculenta. Endémica. Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

***Trichocereus* (A. Berger) Riccob.**

***Trichocereus andalgalensis* (F.A.C. Weber) Hosseus**

Sin.: *Cereus andalgalensis* F.A.C. Weber, *Cereus huascha* F.A.C. Weber var. *rubriflorus* F.A.C. Weber, *Echinopsis huascha* (F.A.C. Weber) G.D. Rowley var. *rubriflora* (F.A.C. Weber) Friedrich & G.D. Rowley, *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *rubriflorus* (F.A.C. Weber) Backeb., *Lobivia andalgalensis* (F.A.C. Weber) Britton & Rose, *Lobivia huascha* (F.A.C. Weber) Marshall var. *andalgalensis* (F.A.C. Weber) Rausch, *Salpingolobivia andalgalensis* (F.A.C. Weber) Y. Ito, *Trichocereus huascha* (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. *rubriflorus* (F.A.C. Weber) Backeb. Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT).

***Trichocereus angelesiae* R. Kiesling**

Sin.: *Echinopsis angelesiae* (R. Kiesling) G.D. Rowley, *Soehrensia angelesiae* (R. Kiesling) Schlumpb. Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m. Países: ARG(SAL).

***Trichocereus arboricola* Kimnach**

Sin.: *Echinopsis arboricola* (Kinnach) Mottram, *Soehrensia arboricola* (Kinnach) Schlumpb. Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m. Países: ARG(SAL).

***Trichocereus atacamensis* (Phil.) W.T. Marshall & T.M. Bock**

Sin.: *Cereus atacamensis* Phil., *Cereus eriocarpus* Phil., *Cereus pasacana* (F.A.C. Weber) F.A.C. Weber, *Echinopsis atacamensis* (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis atacamensis* (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *pasacana* (F.A.C. Weber) G. Navarro, *Echinopsis pasacana* (F.A.C. Weber) Friedrich & G.D. Rowley, *Helianthocereus atacamensis* (Phil.) Backeb., *Helianthocereus pasacanus* (F.A.C. Weber) Backeb., *Pilocereus pasacanus* F.A.C. Weber, *Trichocereus atacamensis* (Phil.) W.T. Marshall & T.M. Bock subsp. *pasacana* (F.A.C. Weber) Guiggi, *Trichocereus pasacana* (F.A.C. Weber) Britton & Rose Arbusto suculento. Nativa. 2000-3800 m. Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT).

***Trichocereus bolligerianus* (Mächler & H.E. Walter) S. Albesiano**

Sin.: *Echinopsis bolligeriana* Mächler & H.E. Walter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *conjungens* F. Ritter Arbusto. Endémica. 0-100 m. Países: CHL(VAL, LBO).

***Trichocereus cabreræ* R. Kiesling**

Sin.: *Echinopsis cabreræ* (R. Kiesling) G.D. Rowley Arbusto suculento. Endémica. 500-1000 m. Países: ARG(CAT, LRI).

***Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose**

Sin.: *Cereus candicans* Gillies ex Salm-Dyck, *Cereus candicans* Gillies ex Salm-Dyck var. *courantii* K. Schum., *Cereus gladius* Lem., *Cereus lamprochlorus* Lem. var. *salinicola* Speg., *Echinocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Rümpler, *Echinopsis candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt, *Echinopsis candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt var. *gladiata* (Lem.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt var. *tenuispina* (Pfeiff.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis courantii* (K. Schum.) Friedrich & G.D. Rowley, *Soehrensia candicans* (Salm-Dyck) Schlumpb., *Trichocereus courantii* (K. Schum.) Backeb. Arbusto suculento. Endémica. 0-2000 m. Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

***Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose subsp. *australis* (F. Ritter) S. Albesiano**

Sin.: *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter Arbusto. Endémica. 400-500 m.

- Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).
- Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **chiloensis**
 Sin.: *Cactus chiloensis* Colla, *Cereus chiloensis* (Colla) DC., *Cereus quisco* J. Remy ex Gay, *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *borealis* F. Ritter
 Arbusto suculento. Endémica. 0-1700 m.
 Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).
- Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **eburneus** (Phil. ex K. Schum.) S. Albesiano
 Sin.: *Cereus chiloensis* (Colla) DC. var. *eburneus* Phil. ex K. Schum.
 Arbusto. Endémica. 900 m.
 Países: CHL(COQ).
- Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **panhoplites** (K. Schum.) S. Albesiano
 Sin.: *Cereus chiloensis* (Colla) DC. var. *panhoplites* K. Schum.
 Arbusto. Endémica. 1100-1300 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).
- Trichocereus deserticola** (Werderm.) Looser
 Sin.: *Cereus deserticola* Werderm., *Cereus spinibarbis* Pfeiff., *Echinopsis deserticola* (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis deserticola* (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley var. *fulvilana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinopsis spinibarbis* (Pfeiff.) A.E. Hoffm., *Eulychnia spinibarbis* (Pfeiff.) Britton & Rose, *Trichocereus fulvilanus* F. Ritter, *Trichocereus serenanus* F. Ritter, *Trichocereus spinibarbis* (Pfeiff.) F. Ritter
- Arbusto suculento. Endémica. 400-800 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Trichocereus fabrisii** R. Kiesling
 Sin.: *Echinopsis fabrisii* (R. Kiesling) G.D. Rowley, *Soehrensia fabrisii* (R. Kiesling) Schlumpb., *Trichocereus volcanensis* F. Ritter
 Subarbusto suculento. Endémica. 2000-3500 m.
 Países: ARG(JUJ).
- Trichocereus glaucus** F. Ritter f. **pendens** F. Ritter
 Sin.: *Echinopsis glauca* (F. Ritter) H. Friedrich & G.D. Rowley f. *pendens* (F. Ritter) H. Friedrich & G.D. Rowley
 Arbusto suculento. Endémica. 400-600 m.
 Países: CHL(TAR).
- Trichocereus hahnianus** (Backeb.) Guiggi
 Sin.: *Echinopsis hahniana* (Backeb.) R.S. Wallace, *Harrisia hahniana* (Backeb.) Kimnach & Hutchison ex Kimnach, *Mediocactus hahnianus* Backeb., *Soehrensia hahniana* (Backeb.) Schlumpb.
 Hierba suculenta. Endémica. 200 m.
 Países: PRY(CON).
- Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**
 Sin.: *Cereus huascha* F.A.C. Weber, *Cereus huascha* F.A.C. Weber var. *flaviflora* F.A.C. Weber, *Echinopsis huascha* (F.A.C. Weber) G.D. Rowley, *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb., *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *auricolor* (Backeb.) Backeb., *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *macranthus* Backeb., *Helianthocereus*
- hyalacanthus* (Speg.) Backeb., *Lobivia huascha* (F.A.C. Weber) Marshall, *Lobivia hyalacantha* Speg., *Salpingolobivia huascha* (F.A.C. Weber) Y. Ito, *Soehrensia huascha* (F.A.C. Weber) Schlumpb., *Trichocereus auricolor* Backeb.
 Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
- Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **pecheretianus** Backeb. ex R. Kiesling
 Sin.: *Helianthocereus pecheretianus* Backeb., nom. inval., *Helianthocereus pecheretianus* Backeb. var. *viridior* Backeb.
 Subarbusto suculento. Endémica. 1500-2000 m.
 Países: ARG(CAT, LRI).
- Trichocereus lamprochlorus** (Lem.) Britton & Rose
 Sin.: *Cereus lamprochlorus* Lem., *Cereus nitens* Salm-Dyck, *Echinocereus lamprochlorus* (Lem.) Engelm. ex J.N. Haage, *Echinopsis lamprochlora* (Lem.) F.A.C. Weber ex Friedrich & Glaetzle, *Echinopsis purpureopilosa* (Weing.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus neolamprochlorus* Backeb., *Trichocereus purpureopilosus* Weing.
 Subarbusto suculento. Endémica. 500-1500 m.
 Países: ARG(COR, LRI).
- Trichocereus pseudocandicans** Backeb. ex R. Kiesling
 Sin.: *Echinopsis pseudocandicans* (Backeb. ex R. Kiesling) Friedrich & Glaetzle, *Helianthocereus pseudocandicans* Backeb., nom. inval., *Helianthocereus pseudocandicans* Backeb. var.

- flaviflorus* (Backeb.) Backeb., comb. illeg., *Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose f. *rubriflorus* F. Ritter, *Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *roseiflorus* Backeb., nom. inval. Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m. Países: ARG(LRI).
- Trichocereus rowleyi** (Friedrich) R. Kiesling
Sin.: *Chamaecereus grandiflorus* (Britton & Rose) Fric, *Echinopsis rowleyi* Friedrich, *Helianthocereus grandiflorus* (Britton & Rose) Backeb., *Lobivia grandiflora* Britton & Rose, *Lobivia grandiflora* Britton & Rose var. *lobioides* (F. Ritter) Rausch, *Lobivia grandiflora* Britton & Rose var. *longispina* Rausch, *Lobivia purpureominiata* F. Ritter Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m. Países: ARG(CAT).
- Trichocereus schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose
Sin.: *Echinopsis friedrichii* G.D. Rowley, *Echinopsis schickendantzii* F.A.C. Weber, *Salpingolobivia shaferi* (Britton & Rose) Y. Ito, *Soehrensia schickendantzii* (F.A.C. Weber) Schlumpb., *Trichocereus shaferi* Britton & Rose Subarbusto suculento. Endémica. 1500-2000 m. Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Trichocereus smrzianus** (Backeb.) Backeb.
Sin.: *Echinopsis smrziana* Backeb., *Soehrensia smrziana* (Backeb.) Backeb.
- Subarbusto suculento. Endémica. 1500-2500 m. Países: ARG(SAL).
- Trichocereus strigosus** (Salm-Dyck) Britton & Rose
Sin.: *Cereus strigosus* Salm-Dyck, *Echinopsis strigosa* (Salm-Dyck) Friedrich & G.D. Rowley, *Soehrensia strigosa* (Salm-Dyck) Schlumpb., *Trichocereus strigosus* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *flaviflorus* F. Ritter Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m. Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).
- Trichocereus tarijensis** (Vaupel) Werderm.
Sin.: *Cereus tarijensis* Vaupel, *Echinopsis poco* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis tarijensis* (Vaupel) Friedrich & G.D. Rowley, *Helianthocereus poco* (Backeb.) Backeb., *Helianthocereus poco* (Backeb.) Backeb. var. *albiflorus* Cárdenas, *Helianthocereus poco* (Backeb.) Backeb. var. *sanguiniflorus* Backeb., *Helianthocereus tarijensis* (Vaupel) Backeb., *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds subsp. *tarijensis* (Vaupel) Rausch, *Soehrensia tarijensis* (Vaupel) Schlumpb., *Trichocereus poco* Backeb. Arbusto suculento. Nativa. 3000-4500 m. Países: ARG(JUU).
- Trichocereus terscheckii** (J. Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose
Sin.: *Cereus terscheckii* J. Parm. ex Pfeiff., *Echinopsis terscheckii* (J. Parm. ex Pfeiff.) Friedrich & G.D. Rowley, *Pilocereus terscheckii* (Parm. ex Pfeiff.) Rümpler ex Pfeiff., *Trichocereus terscheckii* (J. Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose var. *montanus* Backeb. Árbol suculento. Nativa. 500-1500 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
- Trichocereus thelegonoides** (Speg.) Britton & Rose
Sin.: *Cereus thelegonoides* Speg., *Echinopsis rubinghiana* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis thelegonoides* (Speg.) Friedrich & G.D. Rowley, *Soehrensia thelegonoides* (Speg.) Schlumpb., *Trichocereus rubinghianus* Backeb. Arbusto suculento. Nativa. 500-2000 m. Países: ARG(JUU, SAL).
- Trichocereus thelegonus** (F.A.C. Weber) Britton & Rose
Sin.: *Cereus thelegonus* F.A.C. Weber, *Echinopsis thelegona* (F.A.C. Weber) Friedrich & G.D. Rowley, *Soehrensia thelegona* (F.A.C. Weber) Schlumpb. Arbusto suculento. Endémica. 500-1000 m. Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Trichocereus uyupampensis** Backeb.
Arbusto suculento. Nativa. 400-600 m. Países: CHL(AYP).
- Trichocereus vatteri** R. Kiesling
Sin.: *Echinopsis vatteri* (R. Kiesling) G.D. Rowley, *Trichocereus callianthus* F. Ritter Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m. Países: ARG(LRI).
- Tunilla** D.R. Hunt & Iliff
- Tunilla chilensis** (F. Ritter) D.R. Hunt & Iliff

Sin.: *Opuntia alcerrecensis* (F. Ritter) Iliff,
comb. illeg., *Platyopuntia chilensis* F.
Ritter, nom. illeg.

Hierba suculenta. Nativa. 3500 m.

Países: CHL(TAR).

Tunilla corrugata (Salm-Dyck) D.R. Hunt
& Iliff

Sin.: *Opuntia corrugata* Salm-Dyck,
Opuntia longispina Haw. var.
brevispina Backeb., *Opuntia*
longispina Haw. var. *corrugata* (Salm-
Dyck) Backeb., *Opuntia longispina*
Haw. var. *flavidispina* Backeb.,
Opuntia longispina Haw. var.
intermedia Backeb., *Platyopuntia*
corrugata (Salm-Dyck) F. Ritter, comb.
illeg.

Subarbusto suculento. Endémica.
1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL,
SJU).

Tunilla tilcarensis (Backeb.) D.R. Hunt &
J. Iliff

Sin.: *Opuntia tilcarensis* Backeb.,
Platyopuntia soehrensii (Britton &
Rose) F. Ritter, comb. illeg. var.
tilcarensis (Backeb.) F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 2000-
2700 m.

Países: ARG(JUU).

Weingartia Werderm.

Weingartia neumanniana (Backeb.)
Werderm.

Sin.: *Echinocactus neumannianus*
Backeb., nom. nud., *Gymnocalycium*
neumannianum (Backeb.) Hutch.,
Rebutia neumanniana (Backeb.) D.R.
Hunt, *Spegazzinia neumanniana*
Backeb.

Hierba suculenta. Endémica. 3000-
3500 m.

Países: ARG(JUU).

Wigginsia D.M. Porter

Wigginsia calvescens (N. Gerloff & A.D.
Nilson) Font

Sin.: *Notocactus calvescens* N. Gerloff &
A.D. Nilson

Hierba suculenta. Endémica.

Países: ARG(COS).

Wigginsia corynodes (Otto ex Pfeiff.)
D.M. Porter

Sin.: *Echinocactus corynodes* Otto ex
Pfeiff., *Malacocarpus arechavaletae*
(K. Schum. ex Speg.) Berg, *Wigginsia*
arechavaletae (K. Schum. ex Speg.)
D.M. Porter

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(ROC).

Wigginsia erinacea (Haw.) D.M. Porter

Sin.: *Cactus erinaceus* Haw., *Parodia*
erinacea (Haw.) N.P. Taylor

Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Wigginsia gladiata Gapon &
Ponomareva

Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.

Países: URY(SAO).

Wigginsia pauciareolata (Arechav.) R.
Kiesling

Sin.: *Echinocactus pauciareolatus*
Arechav., *Malacocarpus*
pauciareolatus (Arechav.) A. Berger

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI). URY(SOR).

Wigginsia schaeferiana W.R. Abraham
& J. Theun.

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Wigginsia sessiliflora (Hook.) D.M.
Porter

Sin.: *Echinocactus sessiliflorus* Hook.,
Echinocactus tetracanthus Lem.,
Malacocarpus sessiliflorus (Hook.)
Backeb., *Malacocarpus stegmannii*
Backeb., nom. inval., *Malacocarpus*
tetracanthus (Lem.) Rud. Mey.,
Wigginsia stegmannii (Backeb.) D.M.
Porter, comb. illeg.

Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE).
URY(RNO).

Wigginsia tephacantha (Link & Otto)
D.M. Porter

Sin.: *Echinocactus tephacanthus* Link &
Otto, *Malacocarpus tephacanthus*
(Link & Otto) K. Schum.

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(COL).

Yavia R. Kiesling & Piltz

Yavia cryptocarpa R. Kiesling & Piltz

Sin.: *Blossfeldia cryptocarpa* (R. Kiesling
& Piltz) Halda

Hierba suculenta. Nativa. 3600-3800 m.

Países: ARG(JUU).

CALCEOLARIACEAE

Calceolaria L.

Calceolaria aiseniana Ehrh.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(AIS).

Calceolaria alba Ruiz & Pav.

Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Calceolaria andina Benth.

Sin.: *Calceolaria secunda* Witssek

Subarbusto. Endémica. 800-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria angustifolia (Lindl.) Sweet

Sin.: *Calceolaria berteroi* Colla, *Calceolaria integrifolia* L. var. *angustifolia* Lindl., *Calceolaria salicariifolia* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-2600 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria arachnoidea Graham subsp. **arachnoidea**

Hierba. Endémica. 1900-2600 m.

Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Calceolaria arachnoidea Graham subsp. **nubigena** (Poepp.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria arachnoidea* Graham var. *lanata* Meyen ex Walp. & Schauer, *Calceolaria arachnoidea* Graham var. *viridis* Benth., *Calceolaria nubigena* Poepp.

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria ascendens Lindl. subsp. **ascendens**

Sin.: *Calceolaria uspalatensis* Kraenzl.

Subarbusto. Endémica. 0-1900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Calceolaria ascendens Lindl. subsp. **exigua** (Witssek) Nic.García

Sin.: *Calceolaria exigua* Witssek, *Calceolaria miserrima* Kraenzl., *Calceolaria parvifolia* Phil., nom. illeg.

Subarbusto. Endémica. 1600-2100 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Calceolaria ascendens Lindl. subsp. **glandulifera** (Witssek) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria bipartita* Phil., *Calceolaria glandulifera* Witssek

Arbusto. Endémica. 800-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria ascendens Lindl. subsp. **pristiphylla** (Phil.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *pristiphylla* (Phil.) Kraenzl., *Calceolaria pristiphylla* Phil.

Subarbusto. Endémica. 500-1800 m.

Países: CHL(COQ, MAU, BIO, RME).

Calceolaria asperula Phil.

Hierba. Endémica. 900-2000 m.

Países: CHL(LBO, RME).

Calceolaria auriculata Phil.

Subarbusto. Endémica. 200 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

Calceolaria biflora Lam.

Sin.: *Calceolaria biflora* Lam. f. *falklandica* (S. Moore) W. Bowden, *Calceolaria falklandica* (S. Moore) Kraenzl., *Calceolaria plantaginea* Sm., nom. superfl., *Fagelia falklandica* S. Moore

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Calceolaria brunellifolia Phil.

Sin.: *Calceolaria bellidifolia* Benth., hom. illeg., *Calceolaria bellidifolia* Benth. var. *angustifolia* Speg.

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Calceolaria caleuana M. Muñoz & Moreira

Sin.: *Calceolaria espinosae* M. Muñoz & Moreira, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 2100-2300 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Calceolaria campanae Phil.

Sin.: *Calceolaria gnaphaliifolia* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(VAL).

Calceolaria cana Cav.

Hierba. Endémica. 600-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Calceolaria chelidonioides Kunth

Sin.: *Calceolaria cantensis* López Guillén, *Calceolaria conocarpa* Pennell subsp. *irregularis* López Guillén, *Calceolaria glutinosa* Heer & Regel, *Calceolaria gracilis* Kunth var. *stenoptera* Diels, *Calceolaria grandepinnata* Edwin, *Calceolaria lilloi* Descole & Borsini, *Calceolaria obscura* Pennell, *Fagelia chelidonioides* (Kunth) Kuntze, *Fagelia diversifolia* Pennell, *Fagelia pinnatisecta* Pennell

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL). CHL(VAL).

Notas: cita dudosa para Brasil (cfr. Ichaso & Barroso 1970: 58-60)

Calceolaria collina Phil. subsp. **collina**

Sin.: *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *coquimbensis* Benth., *Calceolaria coquimbensis* (Benth.) Kraenzl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Calceolaria collina Phil. subsp. **conferta** (Witssek) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria conferta* Witssek, *Calceolaria fulva* Witssek f. *viscosa* Witssek

Arbusto. Endémica. 400-1600 m.

- Países: CHL(COQ).
- Calceolaria collina** Phil. subsp. **subincisa** (Benth.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria abscondita* Witassek, *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *subincisa* Benth., *Calceolaria quadriradiata* Phil.
Arbusto. Endémica. 200-800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **corymbosa**
Sin.: *Calceolaria cordata* Phil., *Calceolaria herbertiana* Lindl., *Calceolaria herbertiana* Lindl. var. *parviflora* Lindl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
- Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **floccosa** (Witassek) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria floccosa* Witassek
Hierba. Endémica. 2200-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU).
- Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **mimuloides** (Clos) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria mimuloides* Clos, *Calceolaria oligantha* Phil.
Hierba. Endémica. 2200-3500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **montana** (Cav.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria mollissima* Walp., *Calceolaria montana* Cav., *Calceolaria villosa* Phil.
Hierba. Endémica. 2200-3100 m.
Países: CHL(LBO, MAU).
- Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **santiagina** C. Ehrh.
Hierba. Endémica. 700-2300 m.
- Países: CHL(VAL, LBO, RME).
- Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **tetraphylla** (Phil.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria tetraphylla* Phil.
Hierba. Endémica. 700-1600 m.
Países: CHL(BIO, ARA).
- Calceolaria crenatiflora** Cav.
Sin.: *Calceolaria cunninghamii* Vatke, *Calceolaria hollermayeri* Kraenzl., *Calceolaria pendula* Sweet
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, ARA, LSR, LLA, AIS).
- Calceolaria densifolia** Phil. subsp. **densifolia**
Arbusto. Endémica. 1200-1300 m.
Países: CHL(COQ, VAL).
- Calceolaria densifolia** Phil. subsp. **laxa** C. Ehrh.
Subarbusto. Endémica. 1300-1700 m.
Países: CHL(VAL, RME).
- Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp. **araucana** (Phil.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria araucana* Phil.
Hierba. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LLA).
- Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp. **cunningiana** (Witassek) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria cunningiana* Witassek, *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *cunningiana* (Witassek) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(LBO, MAU).
- Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp. **dentata**
Sin.: *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *chiloensis* (Lindl.) Kraenzl., *Calceolaria chiloensis* Lindl., *Calceolaria compacta* Phil., *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *chiloensis* (Lindl.) Benth., *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *compacta* (Phil.) Reiche, *Calceolaria laetevirens* Kraenzl.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).
- Calceolaria elatior** Griseb.
Sin.: *Calceolaria camptoclada* Kraenzl., *Calceolaria leiophylla* Kraenzl.
Hierba. Nativa. 400-2800 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Calceolaria filicaulis** Clos subsp. **filicaulis**
Sin.: *Calceolaria flabellifolia* Kraenzl., *Calceolaria palenae* Phil.
Hierba. Nativa. 1400-2700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).
- Calceolaria filicaulis** Clos subsp. **luxurians** (Witassek) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria cana* Cav. var. *pannosa* (Phil.) Reiche, *Calceolaria luxurians* Witassek, *Calceolaria pannosa* Phil.
Hierba. Endémica. 2200-3100 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Calceolaria flavida** Lavandero & L. Santilli
Hierba. Endémica. 1400-2200 m.
Países: CHL(RME).
- Calceolaria flavovirens** C. Ehrh.
Arbusto. Endémica. 2200-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).
- Calceolaria fothergillii** Aiton
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF).

Calceolaria georgiana F. Phil.
Arbusto. Endémica. 400-700 m.
Países: CHL(COQ).

Calceolaria germainii Witasek
Hierba. Endémica. 600-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SLU). CHL(MAU).

Calceolaria glacialis Wedd.
Hierba. Nativa. 3500-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU, TUC).

Calceolaria glandulosa Poepp. ex Benth.
subsp. **alicahuensis** (M. Muñoz) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria alicahuensis* M. Muñoz,
Calceolaria dumetorum Phil.,
Calceolaria glutinosa Meigen, nom. illeg.
Hierba. Endémica. 700-2100 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Calceolaria glandulosa Poepp. ex Benth.
subsp. **glandulosa**
Sin.: *Calceolaria atrovirens* Witasek,
Calceolaria kingii Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria hypericina Poepp. ex Benth.
Arbusto. Endémica. 1800-2600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Calceolaria inamoena Kraenzl.
Sin.: *Calceolaria aberrans* Kraenzl.,
Calceolaria pulchella Phil., hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 3500-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Calceolaria integrifolia L.
Sin.: *Calceolaria rugosa* Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG).

Calceolaria jujuyensis Botta
Hierba o subarbusto. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Calceolaria lagunae-blancae Kraenzl.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).

Calceolaria lanigera Phil.
Hierba. Endémica. 900-1500 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Calceolaria latifolia Benth.
Sin.: *Calceolaria latifolia* Benth. var.
longepetiolata (Phil.) Reiche,
Calceolaria longepetiolata Phil.,
Calceolaria stachydifolia Phil.
Hierba. Endémica. 500-1100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

Calceolaria lepida Phil.
Subarbusto. Endémica. 1800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Calceolaria lepidota Kraenzl.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT).

Calceolaria meyeniana Phil. subsp.
cheiranthoides (Witasek) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria cheiranthoides* Reiche ex
Witasek
Arbusto. Endémica. 500 m.
Países: CHL(MAU).

Calceolaria meyeniana Phil. subsp.
glabrata (Phil.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria glabrata* Phil.
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Calceolaria meyeniana Phil. subsp.
meyeniana

Sin.: *Calceolaria andicola* Witasek, hom. illeg.,
Calceolaria crocea Phil.,
Calceolaria glabrata Phil. var.
meyeniana (Phil.) Reiche, *Calceolaria landbeckii* Phil.
Arbusto. Endémica. 600-2300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

Calceolaria meyeniana Phil. subsp.
nahuelbutae (Phil.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria nahuelbutae* Phil.,
Calceolaria vernicosa Phil.
Arbusto. Endémica. 800-1300 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Calceolaria morisii Walp.
Sin.: *Calceolaria polyphylla* Kraenzl.,
Calceolaria salviifolia Colla, nom. illeg.,
Calceolaria wettsteiniana Witasek
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Calceolaria nitida Colla
Sin.: *Calceolaria pseudoglandulosa* Clos
Subarbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Calceolaria pallida Phil.
Arbusto. Endémica. 1600-2200 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Calceolaria paposana Phil.
Subarbusto. Endémica. 200-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Calceolaria paralia Cav.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Calceolaria parviflora Benth.
Hierba. Endémica. 200-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SLU, TUC). URY(LAV, MAL).

Calceolaria parvifolia Wedd.

Sin.: *Calceolaria elliptica* Wedd., *Calceolaria lechioides* Rusby, *Fagelia bangii* Rusby

Hierba o subarbusto. Nativa. 3300-3500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Calceolaria pennellii Descole & Borsini

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

Calceolaria petiolaris Cav.

Sin.: *Calceolaria connata* Hook. ex Graham, *Calceolaria cuspidata* Phil., *Calceolaria effusa* Phil., *Calceolaria petiolaris* Cav. var. *cuspidata* (Phil.)

Reiche, *Calceolaria petiolaris* Cav. var. *latifolia* Clos, *Calceolaria petiolaris* Cav. var. *oblongifolia* Clos

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria philippii Eyz.

Hierba. Endémica. 1300 m.

Países: CHL(LBO, RME).

Calceolaria picta Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ).

Calceolaria pinifolia Cav.

Hierba. Endémica. 2600-4300 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL).

Calceolaria pinnata L.

Sin.: *Calceolaria bipinnatifida* Phil.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: CHL(ANT).

Calceolaria plectranthifolia Walp.

Sin.: *Calceolaria fiebrigiana* Kraenzl., *Calceolaria foliosa* Griseb., nom. illeg., *Calceolaria hieronymi* Kraenzl., *Calceolaria paucifolia* Edwin & Wooden, *Fagelia plectranthifolia* (Walp.) Kuntze

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

Calceolaria poikilanthos Sandwith

Hierba. Endémica. 1300-2000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(ARA).

Calceolaria polifolia Hook.

Sin.: *Calceolaria spatellifolia* Kraenzl.

Arbusto. Endémica. 0-2300 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Calceolaria polyclada Kraenzl.

Sin.: *Calceolaria catamarcae* Kraenzl., *Calceolaria grisebachii* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 700-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Calceolaria polyrhiza Cav.

Sin.: *Calceolaria acutifolia* Witasek, *Calceolaria bergii* Hieron., *Calceolaria borsinii* Rossow, *Calceolaria chubutensis* Skottsb., *Calceolaria cymbiflora* Sandwith, *Calceolaria lanceolata* Cav., *Calceolaria lanceolata* Cav. f. *acutifolia* (Witasek) W. Bowden, *Calceolaria lanceolata* Cav. f. *polyrhiza* (Cav.) W. Bowden, *Calceolaria lanceolata* Cav. var. *acutifolia* (Witasek) Reiche, *Calceolaria lanceolata* Cav. var. *glabrata* Speg., *Calceolaria lanceolata* Cav. var. *pusilla* (Witasek) Reiche, *Calceolaria mendocina* Phil., *Calceolaria patagonica* Kraenzl., *Calceolaria prichardii* (Rendle)

Kraenzl., *Calceolaria pusilla* Witasek, *Fagelia prichardii* Rendle

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

Calceolaria pratensis Phil.

Sin.: *Calceolaria nudicaulis* Benth.

Hierba. Endémica. 500-1800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Calceolaria purpurea Graham

Hierba. Endémica. 900-2300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria recta Witasek

Sin.: *Calceolaria cavanillesii* Phil.

Hierba. Endémica. 500-2100 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Calceolaria rinconada Ehrh.

Subarbusto. Endémica. 200-600 m.

Países: CHL(ANT).

Calceolaria rivularis Kraenzl.

Hierba palustre. Nativa. 1800-3000 m.

Países: ARG(SAL).

Calceolaria rubiginosa C. Ehrh.

Subarbusto. Endémica. 400-700 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Calceolaria ruiz-lealii Descole & Borsini

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Calceolaria santolinoides Kraenzl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 3400-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Calceolaria schickendantziana Kraenzl.

Sin.: *Calceolaria fabrisii* Botta & Cabrera

Hierba. Nativa. 2000-3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Calceolaria segethii Phil.

Subarbusto. Endémica. 1800-2200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Calceolaria spathulata Witssek

Hierba. Endémica. 1900-2000 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Calceolaria stellariifolia Phil.

Sin.: *Calceolaria rupicola* F. Meigen
Subarbusto. Endémica. 2700-4300 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, RME).

Calceolaria talcana Grau & C. Ehrh.

Arbusto. Endémica. 500-1300 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Calceolaria tenella Poepp. & Endl.

Sin.: *Calceolaria skottsbergii* Gand.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Calceolaria teucroides Griseb.

Sin.: *Calceolaria lossenii* Kraenzl.,
Calceolaria ruiz-pavonii Descole &
Borsini, *Calceolaria teucroides* Griseb.
var. *pumila* Griseb.
Hierba o subarbusto. Nativa. 1000-3600
m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
SAL, TUC).

Calceolaria thyrsoflora Graham

Sin.: *Calceolaria bridgesii* Kunze,
Calceolaria thyrsoflora Graham var.
alliacea Phil.
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria tripartita Ruiz & Pav.

Sin.: *Calceolaria scabiosaefolia* Roem. &
Schult.

Hierba. Nativa. 0-3900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(COQ, VAL).

Calceolaria tucumana Descole

Hierba. Nativa. 2800-3900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Calceolaria umbellata Wedd.

Sin.: *Calceolaria lorentzii* Griseb.
Hierba. Nativa. 1500-3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC).

Calceolaria undulata Benth.

Sin.: *Calceolaria brevistyla* Clos,
Calceolaria foliosa Phil.
Arbusto. Endémica. 1300-2200 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO).

Calceolaria uniflora Lam.

Sin.: *Calceolaria darwinii* Benth.,
Calceolaria minima Witssek,
Calceolaria nana Sm., *Calceolaria*
uniflora Lam. var. *darwinii* (Benth.)
Witssek ex Reiche, *Calceolaria*
uniflora Lam. var. *minima* (Witssek)
Reiche, *Calceolaria uniflora* Lam. var.
silvestris Skotts., *Fagelia darwinii*
(Benth.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(AIS, MAG, RME).

Calceolaria valdiviana Phil. subsp.
crassifolia (Phil.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria crassifolia* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Calceolaria valdiviana Phil. subsp.
valdiviana

Sin.: *Calceolaria llaimae* Kraenzl.,
Calceolaria tenera Phil., *Calceolaria*
tenerifolia Phil., *Calceolaria*
werdermannii Kraenzl.

Hierba. Endémica. 600-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Calceolaria verbascifolia Bertero ex Phil.

Sin.: *Calceolaria borchersii* Phil.,
Calceolaria oreas Phil.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-
1300 m.
Países: CHL(VAL, LBO).

Calceolaria viscosissima (Hook.) Lindl.

Sin.: *Calceolaria gmelinii* Phil., *Calceolaria*
integrifolia L. var. *viscosissima* Hook.,
Calceolaria pubescens Phil.,
Calceolaria robusta A. Dietr.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

Calceolaria volckmannii Phil.

Sin.: *Calceolaria benthamii* Phil.,
Calceolaria bigemina Phil., *Calceolaria*
poeppigiana Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR). CHL(MAU, BIO).

Calceolaria williamsii Phil.

Hierba. Endémica. 2400-2700 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Jovellana Ruiz & Pav.

Jovellana guentheri Kraenzl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(LLA).

Jovellana punctata Ruiz & Pav.

Sin.: *Calceolaria punctulata* Phil.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-
2000 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA,
LSR).

Jovellana violacea (Cav.) G. Don
Sin.: *Calceolaria violacea* Cav.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR).

CALOPHYLLACEAE

Calophyllum L.

Calophyllum brasiliense Cambess.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, ITA).

Kielmeyera Mart.

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.
Arbusto o árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc. var. **stenophylla** Saddi
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc. var. **variabilis**
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc. subsp. **paranaensis** (Saddi) Bittrich
Sin.: *Kielmeyera paranaensis* Saddi
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

CALYCERACEAE

Acicarpha Juss.

Acicarpha bonariensis (Pers.) Herter
Sin.: *Acicarpha spathulata* R. Br., *Bupthalmum bonariense* Pers., *Cryptocarpa spathulata* (R. Br.) Cass.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acicarpha bupleuroides Less.
Sin.: *Boopis bupleuroides* (Less.) C.A. Muell.
Hierba. Nativa. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acicarpha juergensii (Pilg.) S. Denham & Pozner
Sin.: *Boopis jürgensii* Pilg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Acicarpha obtusisepala Marchesi
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(ROC).

Acicarpha procumbens Less.
Sin.: *Acicarpha procumbens* Less. var. *viridiflora* C.A. Muell.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CLA, SAO, SJO, SOR, TAC).

Acicarpha tribuloides Juss.
Sin.: *Acicarpha laxa* R.E. Fr., *Acicarpha pinnatifida* Miers, *Acicarpha runcinata* Miers, *Acicarpha tribuloides* Juss. var. *dentata* Kuntze, *Acicarpha tribuloides* Juss. var. *pinnatifida* (Miers) Kuntze, *Cryptocarpa tribuloides* (Juss.) Cass.
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, MIE,

ÑEE, PAI). URY(FLO, MON, SAO, SJO).

Anachoretes S.S. Denham & Pozner

Anachoretes castilloni (Hicken) S.S. Denham & Pozner
Sin.: *Boopis castillonii* (Hicken) Pontiroli, *Calycera castillonii* Hicken
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT).

Asynthemum S.S. Denham & Pozner

Asynthemum gracile (Phil.) S.S. Denham & Pozner
Sin.: *Boopis bicolor* Phil., *Boopis gracilis* Phil., *Boopis gracilis* Phil. var. *decumbens* Chodat, *Boopis gracilis* Phil. var. *lazulina* Speg., *Boopis gracilis* Phil. var. *pozoiformis* (Phil.) Hicken, *Boopis pozoaeformis* Phil., *Calycera boopidea* Hicken
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(MAU, BIO, RME).

Boopis Juss.

Boopis eryngioides (J. Rémy) Pozner & Zijlstra
Sin.: *Anomocarpus eryngioides* (J. Remy) Miers, *Calycera eryngioides* J. Remy, *Leucocera eryngioides* (J. Rémy) S.S. Denham & Pozner
Hierba. Endémica. 1800-2500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Boopis horrida (Hicken) Pozner & Zijlstra
Sin.: *Calycera horrida* Hicken, *Leucocera horrida* (Hicken) S.S. Denham & Pozner
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(NEU).

Boopis leucanthema Poepp. ex Less.
Sin.: *Acicarpa lanata* Lag. ex Pers., *Anomocarpus leucanthemus* (Poepp. ex Less.) Miers, *Anomocarpus tenuifolius* Miers, *Anomocarpus tenuis* Miers, *Boopis integrifolia* Phil., *Calycera integrifolia* (Phil.) Reiche, *Calycera leucanthema* (Poepp. ex Less.) Kuntze, *Leucocera annua* Turcz., *Leucocera leucanthema* (Poepp. ex Less.) S.S. Denham & Pozner
Hierba. Endémica. 300-700 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

Boopis pterocalyx Zav.-Gallo, S.S. Denham & Pozner
Sin.: *Leucocera pterocalyx* (Zav.-Gallo, S.S. Denham & Pozner) S.S. Denham & Pozner
Hierba. Endémica. 2300-2400 m.
Países: ARG(MEN).

Boopis pusilla Phil.
Sin.: *Leucocera pusilla* (Phil.) S.S. Denham & Pozner
Hierba. Endémica. 1600 m.
Países: CHL(RME).

Boopis sessiliflora (Phil.) Pozner & Zijlstra
Sin.: *Anomocarpus axillaris* Miers, *Anomocarpus subsessiliflorus* Miers, nom. superfl., *Calycera sessiliflora* Phil., *Calycera sessiliflora* Phil. var. *axillaris* (Miers) Reiche, *Leucocera sessiliflora* (Phil.) S.S. Denham & Pozner

Hierba. Endémica. 700-1900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Boopis sympaganthera (Ruiz & Pav.) Pozner & Zijlstra
Sin.: *Boopis balsamitifolia* Juss., nom. superfl., *Calycera balsamitifolia* (Juss.) Rich., nom. superfl., *Calycera sympaganthera* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Leucocera sympaganthera* (Ruiz & Pav.) S.S. Denham & Pozner, *Scabiosa sympaganthera* Ruiz & Pav.
Hierba. Endémica. 1300 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Calycera Cav.

Calycera calcitrapa Griseb.
Hierba. Endémica. 400-1900 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Calycera crassifolia (Miers) Hicken var. **crassifolia**
Sin.: *Acicarpa crassifolia* Miers, *Boopis crassifolia* (Miers) A. Gray, *Boopis crassifolia* (Miers) A. Gray var. *spinuligera* Speg., *Calycera crassifolia* (Miers) Hicken var. *spinuligera* (Speg.) Hicken
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).

Calycera crassifolia (Miers) Hicken var. **spinulosa** (Gillies ex Miers) Zav.-Gallo, S.S. Denham & Pozner
Sin.: *Calycera foliosa* Phil. ex Reiche, *Calycera neuquenensis* Suess., *Calycera spinulosa* Gillies ex Miers, *Calycera spinulosa* Gillies ex Miers var. *serratifolia* Miers
Hierba. Endémica. 100-2600 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Calycera herbacea Cav. var. **herbacea**
Sin.: *Calycera cavanillesii* Rich., nom. superfl., *Calycera herbacea* Cav. var. *viridiflora* (Phil.) Pontiroli, *Calycera nudicaulis* Phil. ex Miers, *Calycera squarrosa* Miers, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers f. *squarrosa* (Miers) Hicken, *Gymnocaulis viridiflorus* Phil.
Hierba. Endémica. 2200-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU, TUC). CHL(COQ, VAL, MAU, ARA, RME).

Calycera herbacea Cav. var. **sinuata** (Miers) Pontiroli
Sin.: *Calycera crenata* R.E. Fr., *Calycera intermedia* Phil., *Calycera involucrata* Phil., *Calycera pulvinata* J. Remy f. *cauligera* Hicken, *Calycera pulvinata* J. Remy f. *crenata* (R.E. Fr.) Hicken, *Calycera sinuata* Miers, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers f. *sinuata* (Miers) Hicken
Hierba. Endémica. 2500-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT).

Calycera monocephala (Phil.) S.S. Denham & Pozner
Sin.: *Boopis monocephala* Phil., *Moschopsis monocephala* (Phil.) Reiche
Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Calycera necronensis (Zav.-Gallo, S.S. Denham & Pozner) S.S. Denham & Pozner
Sin.: *Boopis necronensis* Zav.-Gallo, S.S. Denham & Pozner
Hierba. Endémica. 3700-4300 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Calycera pulvinata J. Remy

Sin.: *Anomocarpus pulvinatus* (J. Remy) Miers

Hierba. Nativa. 3500-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

Gamocarpha DC., emend. S.S.
Denham & Pozner

Gamocarpha alpina (Poepp. ex Less.)
H.V. Hansen subsp. **alpina**

Sin.: *Boopis alpina* Poepp. ex Less., *Boopis angustifolia* Phil., *Gamocarpha ligulata* Miers, *Gamocarpha poeppigii* DC., nom. superfl., *Gamocarpha polycephala* Phil.

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Gamocarpha alpina (Poepp. ex Less.)
H.V. Hansen subsp. **gilliesii** (Miers)
S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Boopis breviscapa* Phil., *Boopis gilliesii* (Miers) Hauman, *Gamocarpha breviscapa* Phil., *Gamocarpha gilliesii* Miers, *Gamocarpha gilliesii* Miers var. *gerthii* Hicken, Hierba. Endémica. 200-2500 m.
Países: ARG(MEN). CHL(TAR, VAL, LBO).

Gamocarpha australis (Decne.) S.S.
Denham & Pozner

Sin.: *Acarpha australis* (Decne.) Griseb., *Boopis australis* Decne., *Boopis australis* Decne. var. *hickenii* Pontiroli, *Boopis australis* Decne. var. *leptophylla* (Speg.) Hicken, *Boopis australis* Decne. var. *squarrosa* (Miers) Reiche, *Boopis leptophylla* Speg., *Boopis squarrosa* Miers
Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Gamocarpha caespitosa (Phil.) S.S.
Denham & Pozner

Sin.: *Boopis caespitosa* Phil., *Nastanthus caespitosus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus sanjuaninus* (Hieron.) Hieron.
Hierba. Endémica. 2500-4300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, MAU).

Gamocarpha chubutensis (Speg.) S.S.
Denham & Pozner

Sin.: *Boopis chubutensis* Speg.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU).

Gamocarpha compacta (Phil.) S.S.
Denham & Pozner

Sin.: *Boopis compacta* Phil., *Boopis diazi* Phil., *Gamocarpha pumila* Miers, nom. superfl., *Nastanthus compactus* (Phil.) Miers, *Nastanthus diazi* (Phil.) Phil. ex Reiche
Hierba. Endémica. 3000-3700 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, MAU, RME).

Gamocarpha falklandica (D.M. Moore)
S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Nastanthus falklandicus* D.M. Moore
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(TDF).
Notas: Especie microendémica de las Islas Malvinas

Gamocarpha graminea (Phil.) S.S.
Denham & Pozner

Sin.: *Boopis graminea* Phil. var. *bracteata* Reiche, *Boopis graminea* Phil. var. *graminea*
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA).

Gamocarpha macrocephala S.S.
Denham & Pozner

Sin.: *Acarpha laciniata* Stapf, *Nastanthus patagonicus* Speg.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Gamocarpha multicaulis (Phil.) S.S.
Denham & Pozner

Sin.: *Boopis multicaulis* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, ARA).

Gamocarpha raffaellii (Speg.) S.S.
Denham & Pozner

Sin.: *Boopis raffaellii* Speg.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE).

Gamocarpha scapigera (J. Rémy) S.S.
Denham & Pozner

Sin.: *Boopis andicola* Gand., *Boopis araucana* Phil., *Boopis bellidifolia* Phil., *Boopis dubia* Phil., *Boopis laciniata* (Miers) Ball, *Boopis miersii* Phil., *Boopis reichei* Phil., *Boopis scapigera* J. Remy, *Boopis spathulata* Phil., *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *laciniatus* (Miers) Reiche, *Nastanthus araucanus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus bellidifolius* (Phil.) Reiche, *Nastanthus bellidifolius* (Phil.) Reiche var. *chubutensis* (Speg.) Hicken, *Nastanthus chubutensis* Speg., *Nastanthus laciniatus* Miers, *Nastanthus scapiger* (J. Remy) Miers, *Nastanthus scapiger* Miers, *Nastanthus spathulatus* (Phil.) Miers var. *bellidifolius* (Phil.) Pontiroli, *Nastanthus spathulatus* (Phil.) Miers var. *spathulatus*
Hierba. Endémica. 500-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, MAG, RME).

Gamocarpha selliana Reiche

Sin.: *Gamocarpha patagonica* Speg.,
Gamocarpha selliana Reiche var.
multicaulis Dusén
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Gamocarpha ventosa (Meyen) S.S.
Denham & Pozner

Sin.: *Boopis agglomerata* (Miers)
Hauman, *Boopis agglomerata* (Miers)
Hauman var. *pinnatifida* (Miers)
Hauman, *Boopis agglomerata* (Miers)
Hauman var. *sanjuanina* (Hieron.)
Hauman, *Boopis breviflora* Phil.,
Boopis gayana Phil., *Boopis oocaulis*
Kuntze, *Boopis sanjuanina* Hieron.,
Boopis scapigera J. Remy var.
ventosa (Meyen) Wedd., *Boopis*
ventosa (Meyen) Kuntze, *Calycera*
andina Miers, nom. nud., *Calycera*
ventosa Meyen, *Nastanthus*
agglomeratus Miers var.
agglomeratus, *Nastanthus*
agglomeratus Miers var. *breviflorus*
(Phil.) Reiche, *Nastanthus*
agglomeratus Miers var. *gayanus*
(Phil.) Reiche, *Nastanthus*
agglomeratus Miers var. *gilliesii*
(Miers) Reiche, *Nastanthus*
agglomeratus Miers var. *pinnatifidus*
(Miers) Reiche, *Nastanthus andina*
(Miers) H.V. Hansen, nom. inval.,
Nastanthus caespitosus (Phil.) Reiche
var. *ventosus* (Meyen) Pontiroli,
Nastanthus gayanus (Phil.) Miers,
Nastanthus gilliesii Miers, *Nastanthus*
pinnatifidus Miers, *Nastanthus*
ventosus (Meyen) Miers
Hierba. Endémica. 2500-4300 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).
CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

Moschopsis Phil.

Moschopsis ameghinii (Speg.) Dusén
ex Macloskie

Sin.: *Boopis ameghinii* Speg.,
Gamocarpha ameghinii (Speg.)
Speg., *Moschopsis ameghinii* (Speg.)
Hicken, comb. superfl.
Hierba. Endémica. 200-500 m.
Países: ARG(SCR). CHL(AIS).

Moschopsis angustifolia (Phil.) S.S.
Denham & Pozner

Sin.: *Gamocarpha angustifolia* Phil.,
Gamocarpha poeppigii DC. var.
angustifolia (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO).

Moschopsis caleofuensis (Speg.) Dusén

Sin.: *Gamocarpha caleofuensis* Speg.
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Moschopsis dentata (Phil.) Pozner &
S.S. Denham

Sin.: *Gamocarpha dentata* Phil.,
Gamocarpha dentata Phil. var.
glaucescens Speg. ex Hicken,
Gamocarpha subandina Speg. var.
glaucescens Speg.
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).

Moschopsis filifolia (Speg.) Pozner &
S.S. Denham

Sin.: *Boopis filifolia* Speg., *Boopis*
prichardii S. Moore
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Moschopsis leyboldii Phil.

Hierba. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
CHL(VAL, RME).

Moschopsis patagonica (Speg.) Pozner
& S.S. Denham

Sin.: *Boopis patagonica* Speg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(NEU, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Moschopsis rosulata (N.E. Br.) Dusén
ex Hicken

Sin.: *Acicarpha rosulata* N.E. Br.,
Gamocarpha rosulata (N.E. Br.)
Skotts., *Gamocarpha rosulata* (N.E.
Br.) Skotts. var. *columnaris* Skotts.,
Moschopsis spathulata Dusén
Hierba. Endémica. 700-2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Moschopsis subandina (Speg.) Dusén

Sin.: *Gamocarpha subandina* Speg.
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(ARA,
LSR, LLA).

Moschopsis trilobata Dusén

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Xiphodesma Pozner & Zijlstra

Xiphodesma anthemoides (Juss.)
Pozner & Zijlstra

Sin.: *Boopis anthemoides* Juss., *Boopis*
anthemoides Juss. f. *patagonica*
(Hieron.) Hicken, *Boopis anthemoides*
Juss. var. *andina* Hieron., *Boopis*
anthemoides Juss. var. *rigidula* (Miers)
Griseb., *Boopis anthemoides* Juss.
var. *subintegrifolia* Hicken, *Boopis*
anthemoides Juss. var. *subscandens*
Speg., *Boopis rigidula* Miers, *Boopis*
rigidula Miers var. *patagonica* Hieron.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU,
RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE,
SDE, TUC). URY(PAY).

CAMPANULACEAE**Campanula** L.**Campanula rapunculoides** L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(JFE).

Campanula rotundifolia L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Cyphocarpus Miers**Cyphocarpus innocuus** Sandwith

Hierba. Endémica. 1000 m.

Países: CHL(COQ).

Cyphocarpus psammophilus Ricardi

Hierba. Endémica. 800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Cyphocarpus rigescens MiersSin.: *Cyphocarpus rigescens* Miers f.
glabratus Phil. ex E. Wimm.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Diastatea Scheidw.**Diastatea micrantha** (Kunth) McVaughSin.: *Lobelia micrantha* Kunth

Hierba. Nativa. 1100-2000 m.

Países: ARG(JUJ).

Downingia Torr.**Downingia pusilla** (G. Don) Torr.Sin.: *Bolelia humilis* Greene, *Bolelia pusilla* (G. Don) Greene, *Clintonia**pusilla* G. Don, *Downingia humilis* (Greene) Rattan, *Lobelia pusilla* Poepp. ex A. DC.

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).**Hippobroma** G. Don**Hippobroma longiflora** (L.) G. DonSin.: *Isotoma longiflora* (L.) C. Presl, *Laurentia longiflora* (L.) Endl., *Lobelia longiflora* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Legenere McVaugh**Legenere valdiviana** (Phil.) E. Wimm.Sin.: *Dortmanna valdiviana* (Phil.) Kuntze, *Howellia limosa* Greene, *Howellia valdiviana* (Phil.) E. Wimm., *Legenere limosa* (Greene) McVaugh, *Lobelia valdiviana* (Phil.) Vatke, *Mezleria valdiviana* Phil.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(CHU). CHL(LLA).

Lobelia L.**Lobelia anceps** L. f.Sin.: *Dortmanna anceps* (L. f.) Kuntze, *Lobelia alata* Labill., *Lobelia rupicola* Bertero ex Colla, *Rapuntium alatum* (Labill.) C. Presl, *Rapuntium anceps* (L. f.) C. Presl

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, JFE).**Lobelia aquatica** Cham.Sin.: *Dortmanna aquatica* (Cham.) Kuntze, *Lobelia bracteolata* Vatke, hom. illeg., *Lobelia domingensis* A. DC., *Rapuntium aquaticum* (Cham.) C. Presl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).
PRY(CON).**Lobelia bridgesii** Hook. & Arn.Sin.: *Dortmanna blanda* (D. Don) Kuntze, *Dortmanna bridgesii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Dortmanna lucaeana* (C. Presl) Kuntze, *Lobelia blanda* (D. Don) Heynh., *Lobelia lucaeana* (C. Presl) A. DC., *Rapuntium blandum* (D. Don) C. Presl, *Rapuntium bridgesii* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Rapuntium lucaeana* C. Presl, *Tupa blanda* D. Don, *Tupa bridgesii* (Hook. & Arn.) A. DC.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ARA, LLA).

Lobelia camporum PohlSin.: *Dortmanna camporum* (Pohl) Kuntze, *Lobelia camporum* Pohl f. *angustifolia* E. Wimm., *Lobelia camporum* Pohl var. *lundiana* A. DC., *Lobelia paranaensis* R. Braga, *Lobelia paulista* E. Wimm., *Rapuntium camporum* (Pohl) C. Presl

Subarbusto. Nativa. 700-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lobelia exaltata PohlSin.: *Dortmanna exaltata* (Pohl) Kuntze, *Haynaldia exaltata* (Pohl) Kanitz, *Haynaldia exaltata* (Pohl) Kanitz var. *ramosa* Kanitz, *Lobelia stellfeldii* R. Braga, *Rapuntium exaltatum* (Pohl) C. Presl

Hierba. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lobelia excelsa Bonpl.

Sin.: *Dortmanna arguta* (Lindl.) Kuntze, *Dortmanna excelsa* (Bonpl.) Kuntze, *Lobelia arguta* Lindl., *Lobelia neriifolia* Moris, *Lobelia salicifolia* Sweet, *Rapuntium excelsum* (Bonpl.) C. Presl, *Tupa arguta* (Lindl.) G. Don, *Tupa glaucescens* Phil., *Tupa kingi* Phil., *Tupa salicifolia* (Sweet) G. Don
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Lobelia fastigiata Kunth

Sin.: *Dortmanna fastigiata* (Kunth) Kuntze, *Dortmanna gardneriana* (Kanitz) Kuntze, *Lobelia gardneriana* Kanitz, *Rapuntium fastigiatum* (Kunth) C. Presl
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CEN).

Lobelia fervens Thunb.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Lobelia hassleri Zahlbr.

Subarbusto. Nativa. 200-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA).

Lobelia hederacea Cham.

Sin.: *Lobelia hederacea* Cham. var. *elliptica* Hook. & Arn., *Lobelia odorata* Graham, *Pratia elliptica* Hook. f., *Pratia hederacea* (Cham.) G. Don, *Pratia hederacea* (Cham.) G. Don var. *elliptica* A. DC., *Pratia odorata* Graham, *Pratia serpyllacea* C. Presl
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, RNE, SAL, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA). URY(LAV).

Lobelia langeana Dusén

Hierba. Endémica. 600-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lobelia nana Kunth

Sin.: *Dortmanna cymbalaria* (Griseb.) Kuntze, *Dortmanna nana* (Kunth) Kuntze, *Lobelia cymbalaria* Griseb., *Lobelia nana* Kunth var. *flagelliformis* Wedd., *Rapuntium nanum* (Kunth) C. Presl
Hierba. Nativa. 1900-2400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Lobelia nummularioides Cham.

Sin.: *Dortmanna nummularioides* (Cham.) Kuntze, *Lobelia nummularioides* Cham. var. *prostrata* (Zahlbr.) E. Wimm, *Lobelia prostrata* Zahlbr., *Rapuntium nummularioides* (Cham.) C. Presl
Hierba. Nativa. 700-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA, GUA).

Lobelia oligophylla (Wedd.) Lammers

Sin.: *Hypsela atacamensis* (Phil.) Benth. & Hook. f., *Hypsela atacamensis* (Phil.) F. Phil., hom. illeg., *Hypsela longiflora* (Hook. f.) Benth. & Hook. f., *Hypsela longiflora* (Hook. f.) F. Phil., *Hypsela oligophylla* (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Zahlbr., *Hypsela reniformis* (Kunth) C. Presl, *Hypsela subsessilis* (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Zahlbr., *Lobelia pratiana* Gaudich. ex Lammers, *Lysipomia reniformis* Kunth, *Pratia atacamensis* Phil., *Pratia longiflora* Hook. f., *Pratia oligophylla* Wedd., *Pratia pencana* Phil., *Pratia repens* Gaudich., *Pratia subsessilis* Wedd., *Viola algida* Humb. & Bonpl. ex Willd., nom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Lobelia polyphylla Hook. & Arn.

Sin.: *Dortmanna besseriana* (C. Presl) Kuntze, *Dortmanna bracteosa* (C. Presl) Kuntze, *Dortmanna hyssopifolia* (C. Presl) Kuntze, *Dortmanna polyphylla* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Dortmanna purpurea* (G. Don) Kuntze, *Dortmanna subdentata* (C. Presl) Kuntze, *Lobelia axilliflora* (Phil.) Reiche, *Lobelia hyssopifolia* (C. Presl) Gay, *Lobelia ovata* Reiche, *Lobelia poeppigiana* Kunze ex A. DC., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *bracteosa* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *hyssopifolia* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *linearifolia* (Phil.) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *subdentata* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *angustifolia* (Hook. & Arn. ex A. DC.) Heynh., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *besseriana* (C. Presl) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *bracteosa* (C. Presl) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *coquimbana* (Vatke) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* (A. DC.) Heynh., *Rapuntium besserianum* C. Presl, *Rapuntium bracteosum* C. Presl, *Rapuntium hyssopifolium* C. Presl, *Rapuntium poeppigianum* (Kunze ex A. DC.) C. Presl, *Rapuntium polyphyllum* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Rapuntium purpureum* (G. Don) C. Presl, *Rapuntium subdentatum* C. Presl, *Tupa atropurpurea* Vis., *Tupa axilliflora* Phil., *Tupa besseriana* (C. Presl) A. DC., *Tupa bracteosa* (C. Presl) A. DC.,

Tupa coquimbana Phil., *Tupa gayana* Phil., *Tupa hyssopifolia* (C. Presl) A. DC., *Tupa linearifolia* Phil., *Tupa ovata* Phil., *Tupa poeppigiana* Phil., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *angustifolia* (Hook. & Arn.) A. DC., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *besseriana* (C. Presl) Vatke, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *bracteosa* (C. Presl) Vatke, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *coquimbana* Vatke, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *latifolia* A. DC., *Tupa purpurea* G. Don, *Tupa serrata* Phil., *Tupa subdentata* (C. Presl) A. DC.

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Lobelia reniformis Cham.

Sin.: *Pratia reniformis* (Cham.) Kanitz, *Rapuntium reniforme* (Cham.) C. Presl
Hierba. Endémica. 1000-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS; SCA). PRY.

Notas: Citada para Paraguay por Keller (2007a) sin indicar material de referencia. ni localidad.

Lobelia tupa L.

Sin.: *Dortmanna berteroi* (A. DC.) Kuntze, *Dortmanna bicalcarata* Kuntze, *Dortmanna mucronata* (Cav.) Kuntze, *Dortmanna philippiana* Kuntze, *Dortmanna tupa* (L.) Kuntze, *Lobelia bicalcarata* (Kuntze) Zahlbr. ex K. Schum., *Lobelia mucronata* Cav., *Lobelia mucronata* Cav. f. *hookeri* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav. f. *ovalifolia* E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav. var. *berteroi* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia serrata* Meyen, *Lobelia tupa* L. var. *berteroi* (A. DC.) Reiche, *Lobelia tupa* L. var.

bicalcarata (Kuntze) E. Wimm., *Lobelia tupa* L. var. *montana* (Phil.) Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *mucronata* (Cav.) Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *pavonii* E. Wimm., *Rapuntium mucronatum* (Cav.) C. Presl, *Rapuntium tupa* (L.) C. Presl, *Tupa berteroi* A. DC., *Tupa cavanillesiana* G. Don, nom. illeg., *Tupa feuillei* G. Don, *Tupa feuillei* G. Don var. *berteroi* (A. DC.) Vatke, *Tupa feuillei* G. Don var. *macrophylla* Vatke, *Tupa feuillei* G. Don var. *mucronata* (Cav.) Vatke, *Tupa montana* Phil., *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC., *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC. var. *hookeri* A. DC.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, JFE).

Lobelia xalapensis Kunth

Sin.: *Dortmanna cliffortiana* (L.) Kuntze var. *xalapensis* (Kunth) Kuntze, *Dortmanna mollis* (Graham) Kuntze, *Dortmanna monticola* (Kunth) Kuntze, *Dortmanna ocimoides* (Kunze) Kuntze, *Lobelia cliffortiana* L. var. *xalapensis* (Kunth) A. Gray, *Lobelia mollis* Graham, *Lobelia monticola* Kunth, *Lobelia ocimoides* Kunze, *Lobelia palmaris* Willd. ex Roem. & Schult., *Rapuntium monticola* (Kunth) C. Presl, *Rapuntium xalapense* (Kunth) C. Presl
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Siphocampylus Pohl

Siphocampylus argentinus (Griseb.) Hieron. ex E. Wimm

Sin.: *Centropogon argentinus* Griseb., *Siphocampylus argentinus* (Griseb.)

Hieron. ex E. Wimm var. *cuspidatus* (E. Wimm.) E. Wimm., *Siphocampylus cuspidatus* E. Wimm.

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Siphocampylus baccae Funez & Hassemer

Hierba. Endémica. 500-900 m.

Países: BRA(SCA).

Siphocampylus betulifolius (Cham.) G. Don

Sin.: *Lobelia betulifolia* Cham.

Subarbusto. Nativa. 500-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Siphocampylus convolvulaceus (Cham.) G. Don

Sin.: *Lobelia convolvulacea* Cham.

Arbusto o liana. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Siphocampylus densidentatus E. Wimm.

Endémica.

Países: BRA(SCA).

Siphocampylus duploserratus Pohl

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Siphocampylus fiebrigii E. Wimm.

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Siphocampylus fimbriatus Regel

Subarbusto. Nativa. 700-1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Siphocampylus fluminensis (Vell.) E. Wimm.

Sin.: *Lobelia fluminensis* Vell., *Siphocampylus fluminensis* (Vell.) E. Wimm. var. *oppositifolium* E. Wimm.

Hierba a arbusto. Nativa.

- Países: BRA(PAR).
- Siphocampylus foliosus** Griseb.
Sin.: *Siphocampylus foliosus* Griseb. var. *diversifolius* (Hicken) Pontiroli, *Siphocampylus foliosus* Griseb. var. *glabratus* E. Wimm., *Siphocampylus foliosus* Griseb. var. *lessenii* E. Wimm., *Siphocampylus foliosus* Griseb. var. *minor* Zahlbr. ex Kuntze, *Siphocampylus foliosus* Griseb. var. *subcanus* Zahlbr. ex E. Wimm., *Siphocampylus tupaiformis* Zahlbr. var. *diversifolius* Hicken
Subarbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Siphocampylus fulgens** Lebas
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Siphocampylus lycioides** (Cham.) G. Don
Sin.: *Lobelia lycioides* Cham.
Hierba a subarbusto. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR).
- Siphocampylus macropodus** (Thunb.) G. Don
Sin.: *Lobelia macropoda* Thunb.
Arbusto a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Siphocampylus nebularis** G.P. Coelho
Hierba. Endémica. 1400-1800 m.
Países: BRA(PAR).
- Siphocampylus nemoralis** Griseb.
Sin.: *Siphocampylus argentinus* (Griseb.) Hieron. ex E. Wimm. var. *hirticorollinus* E. Wimm., *Siphocampylus lorentzii* E. Wimm., *Siphocampylus nemoralis* Griseb. f. *hieronymi* E. Wimm.,
Siphocampylus nemoralis Griseb. var. *grisebachii* E. Wimm.
Subarbusto. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
- Siphocampylus orbignianus** A. DC.
Subarbusto. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Siphocampylus sevegnaniae** Funez & Hassemer
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).
- Siphocampylus sulfureus** E. Wimm.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Siphocampylus umbellatus** (Kunth) G. Don
Sin.: *Lobelia umbellata* Kunth
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Siphocampylus verticillatus** (Cham.) G. Don
Sin.: *Lobelia verticillata* Cham., *Siphocampylus verticillatus* (Cham.) G. Don var. *grandiflorens* E. Wimm.
Subarbusto. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(RIV).
- Siphocampylus yerbalensis** E. Wimm.
Sin.: *Siphocampylus hypopogon* E. Wimm.
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(MIS).
- Triodanis** Raf.
Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. var. *biflora* (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley
Sin.: *Campanula biflora* Ruiz & Pav., *Campanula ludoviciana* Torr. ex A. Gray, nom. nud., *Campanula montevidensis* Spreng., *Dysmicodon californicum* Nutt., *Dysmicodon ovatum* Nutt., *Legousia biflora* (Ruiz & Pav.) Britton, *Pentagonia biflora* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Specularia californica* (Nutt.) Vatke, *Specularia ovata* (Nutt.) Vatke, *Specularia perfoliata* (L.) A. DC. f. *ramosa* Arechav., *Specularia perfoliata* (L.) A. DC. f. *rigida* Arechav., *Triodanis biflora* (Ruiz & Pav.) Greene, *Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. subsp. *biflora* (Ruiz & Pav.) Lammers
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, VAL, BIO, LLA, RME). PRY(APA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).
- Wahlenbergia** Schrad. ex Roth, nom. cons.
Wahlenbergia berteroi Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(JFE).
- Wahlenbergia brasiliensis** Cham.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Wahlenbergia calycina** Schltld. ex Griseb.
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Wahlenbergia fernandeziana** A. DC.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(JFE).

Wahlenbergia grahamiae Hemsl.
Subarbusto. Endémica. 400-600 m.
Países: CHL(JFE).

Wahlenbergia linarioides (Lam.) A. DC.
Sin.: *Campanula arida* Kunth, *Campanula chilensis* Molina, nom. superfl., *Campanula filiformis* Ruiz & Pav., *Campanula linarioides* Lam., *Wahlenbergia arida* (Kunth) Griseb., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *arida* (Kunth) A. DC., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *micrantha* Phil.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, ÑEE, PAI). URY(MON).

Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.

Sin.: *Campanula marginata* Thunb.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

Wahlenbergia masafuerae (Phil.) Skottsb.
Sin.: *Euphorbia masafuerae* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(JFE).

Wahlenbergia peruviana A. Gray
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Wahlenbergia tuberosa Hook. f.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(JFE).

CANELLACEAE

Cinnamodendron Endl.

Cinnamodendron catarinense J. Salazar & F. Barros
Árbol. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(SCA).

Cinnamodendron dinisii Schwacke
Sin.: *Capsicodendron dinisii* (Schwacke) Occhioni, *Capsicodendron pimenteira* Hoehne
Árbol. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CANNABACEAE

Celtis L.

Celtis australis L.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(COR, LPA, SFE).

Celtis brasiliensis (Gardner) Planch.
Sin.: *Celtis boliviensis* Planch., *Celtis flexuosa* (Wedd.) Miq., *Mertensia brasiliensis* Gardner, *Momisia flexuosa* Wedd.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Celtis chichape (Wedd.) Miq.
Sin.: *Celtis flexuosa* (Wedd.) Miq. var. *glabrifolia* Griseb., *Celtis pubescens* Spreng. var. *chichape* (Wedd.) Baehni, *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *obtusata* Chodat & Hassl., *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *chichape* (Wedd.) Planch., *Momisia chichape* Wedd.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,

BOQ, CEN, CHO, CON, COA, PAI, PHA). URY(MAL).

Celtis clauseniana (Wedd.) Miq.
Sin.: *Celtis brasiliensis* (Gardner) Planch. f. *clauseniana* (Wedd.) Planch., *Momisia clauseniana* Wedd.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, SPE). URY(TAC).

Celtis diffusa Planch.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: PRY(CAU).

Celtis lancifolia (Wedd.) Miq.
Sin.: *Momisia lancifolia* Wedd.
Arbusto Nativa.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, PAI). URY(MAL, TAC).

Celtis pallida Torr. var. **discolor** Hunz. & Dottori
Sin.: *Celtis ehrenbergiana* (Klotzsch) Liebm. var. *discolor* (Hunz. & Dottori) L.J. Oakley & D.E. Prado, *Celtis pallida* Torr. subsp. *sericea* (Romanczuk) Romanczuk, *Celtis sericea* Romanczuk, *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *subpilosa* Kuntze, *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *subtomentosa* Kuntze, *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *velutina* Herzog
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, CON).

Celtis pallida Torr. var. **pallida**
Sin.: *Celtis spinosa* Spreng. var. *pallida* (Torr.) M.C. Johnst., *Celtis tala* Gillies

ex Planch. var. *pallida* (Torr.) Planch.,
Momisia pallida (Torr.) Planch.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CON, PAI, PHA). URY(PAY).

Celtis serratissima Zamengo, R.B. Torres, Gaglioti & Romaniuc
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON, COA, GUA, PAI).

Celtis spinosa Spreng.
Sin.: *Celtis bonplandiana* Planch., *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *gaudichaudiana* Planch.
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PHA). URY(CLA, COL, LAV).

Celtis spinosissima (Wedd.) Miq.
Sin.: *Momisia spinosissima* Wedd.
Árbol o arbusto. Nativa.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA).

Celtis tala Gillies ex Planch.
Sin.: *Celtis sellowiana* Miq., *Celtis spinosa* Spreng. var. *weddelliana* (Planch.) Baehni, *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *gilliesiana* Planch., *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *sellowiana* (Miq.) Kuntze, *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *weddelliana* Planch., *Celtis weddelliana* (Planch.) Romanczuk, *Momisia integrifolia* Wedd., *Momisia tala* Planch.
Arbusto o árbol. Nativa.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Celtis tarijensis (Wedd.) Zamengo, Chamorro & L.J. Oakley
Sin.: *Momisia tarijensis* Wedd.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: ARG(JUU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA). URY(ART).

Humulus L.

Humulus lupulus L.
Enredadera. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE). BRA(PAR, RGS).

Humulus scandens (Lour.) Merr.
Sin.: *Antidesma scandens* Lour., *Humulopsis scandens* (Lour.) Grudz., *Humulus japonicus* Siebold & Zucc.
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN).

Trema L.

Trema micranthum (L.) Blume
Sin.: *Celtis micrantha* (L.) Sw., *Rhamnus micrantha* L., *Sponia micrantha* (L.) Decne.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Canna L.

Canna ascendens Ciciarelli
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

Canna glauca L.

Sin.: *Canna glauca* L. var. *angusta* J.W. Richardson, *Canna glauca* L. var. *rubro-lutea* Hook., *Canna hassleriana* Kraenzl., *Canna pedicellata* C. Presl, *Canna stolonifera* A. Dietr.
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON).

Canna indica L.

Sin.: *Canna achiras* Gillies ex D. Don, *Canna amabilis* T. Koyama & Nb. Tanaka, *Canna brasiliensis* Spreng., *Canna coccinea* Mill., *Canna compacta* Roscoe, *Canna edulis* Ker Gawl., *Canna esculenta* Lodd., nom. nud., *Canna indica* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Canna lanuginosa* Roscoe, *Canna limbata* Roscoe ex Ker. Gawl., *Canna plurituberosa* T. Koyama & Nb. Tanaka, *Canna rubricaulis* Link, *Canna speciosa* Roscoe ex Sims, *Canna variegatifolia* Ciciarelli, *Canna warszewiczii* A. Dietr.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RNO, ROC, TAC).

Canna lineata Ciciarelli
Hierba. Endémica.
Países: ARG(BAI).

CANNACEAE

Canna paniculata Ruiz & Pav.

Sin.: *Canna amambayensis* Kraenzl., *Canna confusa* J.W. Richardson & L.B. Sm., *Canna denudata* Roscoe, *Canna jacquinii* Bouché, *Canna kunzei* (Bouché) Kraenzl., *Canna linkii* Bouché, *Canna ottonis* (Bouché) Kraenzl., *Distemon kunzei* Bouché, *Distemon ottonis* Bouché
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Canna pedunculata Sims

Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Canna tandilensis Ciciarelli

Hierba. Endémica.
 Países: ARG(BAI).

CAPPARACEAE**Anisocapparis** Cornejo & Iltis**Anisocapparis speciosa** (Griseb.)

Cornejo & Iltis

Sin.: *Capparis malmeana* Gilg, *Capparis pruinosa* Griseb., *Capparis speciosa* Griseb., *Capparis speciosa* Griseb. f. *malmeana* (Gilg) Hassl., *Capparis speciosa* Griseb. var. *lanceolata* Kuntze, *Capparis speciosa* Griseb. var. *normalis* Kuntze, *Capparis speciosa* Griseb. var. *ovata* Kuntze, *Capparis speciosa* Griseb. var. *pruinosa* (Griseb.) Hassl., *Capparis speciosa* Griseb. var. *vera* Hassl., nom. superfl., *Morisonia speciosa* (Griseb.) Christenh. & Byng
 Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE). PRY(APY, PHA).

Atamisquea Miers ex Hook. & Arn.**Atamisquea emarginata** Miers ex Hook. & Arn.

Sin.: *Capparis atamisquea* Kuntze, *Morisonia atamisquea* (Kuntze) Christenh. & Byng
 Arbusto. Nativa. 0-3000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(PHA).

Capparicordis Iltis & Cornejo**Capparicordis tweedieana** (Eichler) Iltis & Cornejo

Sin.: *Capparis tweedieana* Eichler, *Colicodendron tweedieanum* (Eichler) Hutch., *Morisonia tweedieana* (Eichler) Christenh. & Byng
 Arbusto. Nativa. 0-900 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, ÑEE, PHA).

Capparidastrum (DC.) Hutch.**Capparidastrum coimbranum** (Cornejo & Iltis) Cornejo & Iltis

Sin.: *Capparis coimbrana* Cornejo & Iltis, *Morisonia coimbrana* (Cornejo & Iltis) Christenh. & Byng
 Árbol. Nativa.
 Países: ARG(SAL).

Notas: Esta especie ha sido citada para el noroeste de la Argentina (Arboretum Calilegua: 52. 2016), sin citar material de referencia.

Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis

Sin.: *Capparis frondosa* Jacq.

Árbol o arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Capparidastrum humile (Hassl.) Cornejo & Iltis

Sin.: *Capparis brasiliana* DC. var. *puberula* Hieron., nom. nud., *Capparis humilis* Hassl., *Morisonia humilis* (Hassl.) Christenh. & Byng
 Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, ITA).

Crateva L.**Crateva tapia** L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Cynophalla (DC.) J. Presl**Cynophalla declinata** (Vell.) Iltis & Cornejo

Sin.: *Capparis declinata* Vell.
 Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl

Sin.: *Capparis cynophallophora* L. var. *cynophallophora*, *Capparis cynophallophora* L. var. *pubescens* Hassl., *Capparis flexuosa* (L.) L., *Capparis flexuosa* (L.) L. var. *pubescens* (Hassl.) H.H. Iltis, *Morisonia flexuosa* L.
 Árbol. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Cynophalla polyantha (Triana & Planch.) Cornejo & Iltis

Sin.: *Capparis flexuosa* (L.) L. subsp. *polyantha* (Triana & Planch.) Iltis, *Capparis polyantha* Triana & Planch., *Morisonia polyantha* (Triana & Planch.) Christenh. & Byng
Árbol. Nativa. 1000-1800 m.
Países: ARG(SAL).

Cynophalla retusa (Griseb.) Cornejo & Iltis

Sin.: *Capparis cynophallophora* L. var. *cuneata* Malme, *Capparis cynophallophora* L. var. *retusa* (Griseb.) Kuntze, *Capparis retusa* Griseb., *Capparis retusa* Griseb. var. *velutina* Hauman, *Morisonia retusa* (Griseb.) Christenh. & Byng
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, ÑEE, NAS, PAI, PHA).

Physostemon Mart. & Zucc.

Physostemon lanceolatum Mart. & Zucc.

Sin.: *Cleome lanceolata* (Mart. & Zucc.) H.H. Iltis var. *lanceolata*, *Cleome lanceolata* (Mart. & Zucc.) H.H. Iltis var. *paraguarensis* H.H. Iltis
Hierba. Nativa. 100-600 m.
Países: PRY(AMA, PHA).

Sarcotoxikum Cornejo & Iltis

Sarcotoxikum salicifolium (Griseb.) Cornejo & Iltis

Sin.: *Capparis salicifolia* Griseb., *Colicodendron salicifolium* (Griseb.) Hutch., *Morisonia salicifolia* (Griseb.) Christenh. & Byng
Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE). PRY(APY, BOQ, CHO, NAS, PHA).

CAPRIFOLIACEAE

Centranthus Lam. & DC.

Centranthus ruber (L.) DC.

Sin.: *Valeriana rubra* L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, COR, JUJ, MEN). CHL(JFE).

Dipsacus L.

Dipsacus fullonum L.

Sin.: *Dipsacus fullonum* Huds., hom. illeg., *Dipsacus fullonum* L. var. *sylvestris* (Huds.) Schmalh., *Dipsacus sylvestris* Huds., *Dipsacus sylvestris* Lam., hom. illeg., *Dipsacus sylvestris* Mill., hom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, RNE, SAL, SJU, SFE). URY(CAS, MON, ROC, SJO, SOR).

Dipsacus sativus (L.) Honck.

Sin.: *Dipsacus fullonum* L. var. *sativus* (L.) Thell., *Dipsacus fullonum* L. var. *sativus* L., *Dipsacus sativus* (L.) Gersault, nom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, JFE).

Knautia L.

Knautia arvensis (L.) Coult.

Sin.: *Scabiosa arvensis* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(NEU).

Knautia integrifolia (L.) Bertol.

Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: CHL(ARA).

Lonicera L.

Lonicera japonica Thunb.

Sin.: *Caprifolium brachypodum* (DC.) Gordon, *Caprifolium japonicum* (Thunb.) Dum. Cours., *Lonicera brachypoda* DC., *Lonicera brachypoda* DC. var. *repens* Siebold, *Lonicera fauriei* H. Lév. & Vaniot, *Lonicera japonica* Thunb. var. *repens* (Siebold) Rehder
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, NEU, RNE, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SJO, SOR, TAC).

Scabiosa L., nom. cons.

Scabiosa atropurpurea L.

Sin.: *Scabiosa maritima* L.
Hierba o subarbusto. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, JFE). URY(LAV, MON, PAY).

Stangea Graebn.

Stangea paulae Graebn.

Hierba. Nativa. 4700-5200 m.

Países: CHL(TAR).

Stangea rhizantha (A. Gray) Killip

Hierba. Nativa. 4500-4600 m.

Países: CHL(AYP).

Symphoricarpos Duhamel

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake

Sin.: *Lonicera alba* (L.) Druce, hom. illeg.,

Vaccinium album L., *Xylosteon album*

(L.) Moldenke

Arbusto. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE).

Valeriana L.

Valeriana aequiloba Clos

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ).

Valeriana atacamensis Borsini

Sin.: *Valeriana pubescens* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Valeriana boelckei Rossow

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, ARA).

Valeriana bornmuelleri Pilg.

Hierba. Endémica. 500

Países: BRA(RGS).

Valeriana borsinii Rossow

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(NEU).

Valeriana bracteosa Phil.

Sin.: *Valeriana rupestris* Phil.

Hierba. Endémica. 1000-1600 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

Valeriana bridgesii Hook. & Arn.

Sin.: *Phyllactis regularis* (Clos) Speg.,

Valeriana phellocarpa Phil., *Valeriana*

regularis Clos, *Valeriana simplex* Clos

Hierba. Endémica. 200-900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Valeriana calvescens Briq.

Sin.: *Valeriana interrupta* Ruiz & Pav. var.

calcitrapifolia Griseb.

Hierba. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Valeriana castellanosi Borsini

Hierba. Endémica. 4200-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

CHL(ANT).

Valeriana catharinensis Graebn.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Valeriana chamaedryfolia Cham. & Schltdl.

Sin.: *Valerianopsis chamaedryfolia* (Cham. & Schltdl.) C.A.Mull.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS).

Valeriana chilensis Borsini

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU).

Valeriana clarionifolia Phil.

Sin.: *Phyllactis clarionifolia* (Phil.) Speg.,

Valeriana sarcophylla Stuck. & Briq.,

Valeriana spegazzinii Skotts.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, AIS).

Valeriana clematitis Kunth

Sin.: *Valeriana ghiesbreghtii* Briq.,

Valeriana hispida Turcz., *Valeriana*

laurifolia Kunth, *Valeriana laxissima*

Standl. & L.O. Williams, *Valeriana*

pavonii Poepp. & Endl., *Valeriana*

pavonii Poepp. & Endl. var.

yungasensis Briq., *Valeriana subincisa*

Benth., *Valeriana trichiata* Killip

Hierba o enredadera. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Valeriana condamoana Graebn.

Sin.: *Valeriana romanana* Graebn.

Hierba. Nativa. 3500-4500 m.

Países: ARG(JUJ).

Valeriana corymbulosa (Wedd.) Cabrera

Sin.: *Phyllactis corymbulosa* Wedd.,

Valeriana triatomodes Borsini

Hierba. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Valeriana corynodes Borsini

Hierba. Endémica. 2200-3900 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ATA).

Valeriana crispa Ruiz & Pav.

Sin.: *Astrephia lobata* Hook. & Arn.,

Valeriana excelsa Reiche, *Valeriana*

floribunda Phil., *Valeriana lobata*

(Hook. & Arn.) Höck, *Valeriana*

oreocharis Phil.

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Valeriana descolei Borsini

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Valeriana dinorrhiza (Griseb.) Höck

Sin.: *Phyllactis dinorrhiza* Griseb.

Hierba. Endémica. 2000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Valeriana effusa Griseb.

Sin.: *Valeriana approximata* Briq.,

Valeriana effusa Griseb. var. *fibrigii*

- Briq., *Valeriana effusa* Griseb. var. *genuina* Briq., nom. inval., *Valeriana effusa* Griseb. var. *trifoliata* Griseb.
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Valeriana eichleriana** (C.A. Muell.) Graebn.
Sin.: *Valerianopsis eichleriana* C.A.Mull.
Hierba. Endémica. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Valeriana eupatoria** Sobral
Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-900 m.
Países: BRA(RGS).
- Valeriana ferax** (Griseb.) Höck
Sin.: *Phyllactis ferax* Griseb.
Hierba. Endémica. 2100-2300 m.
Países: ARG(COR, SLU).
- Valeriana fonkii** Phil.
Sin.: *Valeriana crenata* Phil., *Valeriana spathulata* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).
- Valeriana fragilis** Clos
Sin.: *Betckea heterophylla* Phil., *Valeriana heterophylla* (Phil.) Reiche, hom. illeg., *Valeriana integrifolia* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Valeriana gaimanensis** Nagahama
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(CHU).
- Valeriana glauca** DC.
Sin.: *Valeriana elegans* Clos, *Valeriana glauca* DC. var. *elegans* (Clos) Reiche, *Valeriana stricta* Clos
Subarbusto. Endémica. 1000-3300 m.
- Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Valeriana glechomifolia** F.G. Meyer
Hierba. Endémica. 800-1800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Valeriana gracilipes** Clos
Sin.: *Valeriana lutescens* Phil.
Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Valeriana grandifolia** Phil.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, RME).
- Valeriana hebecarpa** DC.
Sin.: *Valeriana columbaria* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).
- Valeriana hornschruchiana** Walp.
Sin.: *Valeriana bustillosii* Phil., *Valeriana rotundiloba* Clos
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).
- Valeriana hunzikeri** Borsini
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(LRI).
- Valeriana hyalinorrhiza** Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).
- Valeriana iganciana** Rabuske & Külkamp
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1100-1300 m.
Países: BRA(SCA).
- Valeriana interrupta** Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
- Países: CHL(TAR).
- Valeriana kurtziana** Borsini
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).
- Valeriana lapathifolia** Vahl
Sin.: *Valeriana andonaegui* Phil., *Valeriana cordata* Griseb., *Valeriana cordata* Griseb. var. *dentata* Phil., *Valeriana cordata* Phil., hom. illeg., *Valeriana lindaviana* Graebn., *Valeriana parnassiifolia* Sandwith
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).
- Valeriana lasiocarpa** Griseb.
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
- Valeriana laxiflora** DC.
Sin.: *Valeriana astrephioides* Höck, *Valeriana foliosa* Phil., *Valeriana laxa* Phil., *Valeriana laxiflora* DC. var. *cardaminifolia* Poepp. & Endl., *Valeriana lyrata* Phil., *Valeriana pearcei* Phil., *Valeriana rupicola* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Valeriana sparsiflora* Clos
Hierba. Endémica. 100-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).
- Valeriana lepidota** Clos
Sin.: *Valeriana colchaguensis* Phil., *Valeriana maipoana* Ravenna
Hierba. Endémica. 1000-2300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).
- Valeriana leucocarpa** DC.
Sin.: *Valeriana chubutensis* Speg.
Hierba. Endémica. 900-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, MAG).

Valeriana macrorhiza DC.

Sin.: *Betckea gilliesii* Hook. & Arn.,
Phyllactis gilliesii (Hook. & Arn.)
 Wedd., *Phyllactis macrorhiza* (DC.)
 Wedd., *Phyllactis macrorhiza* (DC.)
 Wedd. var. *pumila* Speg., *Valeriana*
gilliesii (Hook. & Arn.) Stuck. & Briq.,
Valeriana macrorhiza DC. var. *pumila*
 (Speg.) Speg.
 Hierba. Endémica. 1500-2700 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
 SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA,
 LLA).

Valeriana magellanica Lam.

Sin.: *Valeriana carnososa* Sm.
 Hierba. Endémica. 0-2700 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
 SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO,
 ARA, LLA, AIS, MAG).

Valeriana moyanoi Speg.

Sin.: *Valeriana fonkii* Phil. var. *spiciformis*
 Dusén, *Valeriana radicalis* Clos var.
patagonica Hicken
 Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
 CHL(AIS).

Valeriana munozii Borsini

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
 Países: ARG(MEN).

Valeriana nahuelbutae Penneck.

Hierba. CeraEndémica. 1200-1300 m.
 Países: CHL(ARA).

Valeriana nivalis Wedd.

Sin.: *Valeriana altoandina* Cabrera
 Hierba. Nativa. 3600-4800 m.
 Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP,
 TAR, ANT, ATA).

Valeriana obtusifolia DC.

Sin.: *Valeriana aegialitis* Phil., *Valeriana*
araucana Phil., *Valeriana crassicaulis*

Phil., *Valeriana obovata* Clos, hom.
 illeg.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LSR).

Valeriana papilla Bertero ex DC.

Sin.: *Valeriana berterii* Colla, *Valeriana*
papilla Bertero ex DC. var. *andicola*
 Clos

Hierba. Endémica. 200-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Valeriana peltata Clos

Sin.: *Valeriana crispa* Hook. & Arn., hom.
 illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Valeriana petersenii Weberling & Reese-
Krug

Hierba. Nativa. 3000-5000 m.

Países: CHL(AYP).

Notas: Es probable su presencia en el
 norte de Argentina

Valeriana philippiana Briq.

Sin.: *Valeriana pulchella* Phil.
 Hierba. Endémica. 1000-2400 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
 CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

Valeriana polemoniifolia Phil.

Sin.: *Valeriana caudata* Phil., *Valeriana*
germainii Briq., *Valeriana pilosa* Phil.,
 hom. illeg., *Valeriana pugae* Phil.
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
 CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LSR,
 LLA, RME).

Valeriana polybotrya (Griseb.) Höck

Sin.: *Phyllactis polybotrya* Griseb.
 Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
 SLU, TUC).

Valeriana polystachya Sm.

Sin.: *Valeriana glomerulosa* Briq.,
Valerianopsis polystachya (Sm.) C.A.
 Mull.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, DFE, RNE, SFE,
 TUC). BRA(RGS). URY(CAS, CLA,
 COL, DUR, FLA, MON, RIV, SJO).

Valeriana potopensis Briq.

Sin.: *Valeriana humahuacensis* Borsini
 Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
 Países: ARG(JUU).

Valeriana praecipitis A.E. Villarroel &
Menegoz

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
 Países: CHL(BIO).

Valeriana pycnantha A. Gray

Hierba. Nativa. 4000-4900 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
 TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Valeriana pyricarpa Borsini

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Valeriana radicalis Clos

Sin.: *Valeriana andina* F. Meigen, hom.
 illeg.
 Hierba. Endémica. 2000-3400 m.
 Países: CHL(RME).

Valeriana reitziana Borsini

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Valeriana ruizlealii Borsini

Hierba. Endémica. 1500-4100 m.
 Países: ARG(LRI, MEN, SAL, SJU).

Valeriana salicariifolia Vahl

Sin.: *Phyllactis salicariifolia* (Vahl) Speg.,
Valeriana gilgiana Graebn., *Valeriana*
muelleri Graebn., *Valerianopsis*

- angustifolia* C.A.Mull., *Valerianopsis foliosa* C.A.Mull., *Valerianopsis salicariifolia* (Vahl) C.A. Mull.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CLA, RNO, RIV, SJO).
- Valeriana samolifolia** (DC.) Bertero ex Colla
Sin.: *Betckea samolifolia* DC., *Plectritis samolifolia* (DC.) Höck, *Plectritis samolifolia* (DC.) Höck var. *pusilla* Speg., *Valerianella samolifolia* (DC.) A. Gray
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Valeriana scandens** Loebl. ex L. var. **candolleana** (Gardner) C.A. Muell.
Sin.: *Valeriana candolleana* Gardner
Hierba o enredadera. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA, RGS). PRY(APA).
- Valeriana scandens** Loebl. ex L. var. **scandens**
Sin.: *Valeriana bonariensis* Speg.
Hierba o enredadera. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CON). URY(COL).
- Valeriana sedifolia** d'Urv.
Sin.: *Aretiastrum sedifolium* (d'Urv.) Graebn., *Phyllactis magellanica* (Decne.) Speg., *Phyllactis magellanica* (Decne.) Speg. var. *azorelloides* Speg., *Phyllactis sedifolia* (d'Urv.) Wedd., *Valeriana magellanica* Decne. var. *azorelloides* (Speg.) Macloskie, *Valeriana magellanica* Hombr. & Jacquinot ex Decne
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).
- Valeriana senecioides** Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Valeriana serratifolia** J.M. Acosta, L. Salomón & C.A. Zanotti
Hierba. Endémica. 4500-4600 m.
Países: ARG(SAL).
- Valeriana sobraliana** Rabuske & Iganci
Subarbusto. Endémica. 1100-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Valeriana sphaerocarpa** Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).
- Valeriana stuckertii** Briq.
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(COR, SLU).
- Valeriana tafiensis** Borsini
Sin.: *Valeriana urticifolia* Kunth var. *coarctata* Griseb.
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Valeriana tajuensis** Sobral
Arbusto. Endémica. 500-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Valeriana tucumana** Borsini
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Valeriana tunuyanense** E. Méndez
Hierba. Endémica. 3600-3700 m.
Países: ARG(MEN).
- Valeriana ulei** Graebn.
Sin.: *Phuodendron ulei* (Graebn.) A.W. Hill
Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Valeriana urbanii** Phil.
Sin.: *Valeriana grisebachiana* Borsini
- Hierba. Endémica. 3500-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Valeriana vaga** Clos
Sin.: *Valeriana muriculata* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).
- Valeriana valdiviana** Phil.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).
- Valeriana velutina** Clos
Hierba. Endémica. 1500-2200 m.
Países: CHL(COQ, VAL).
- Valeriana verticillata** Clos
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).
- Valeriana virescens** Clos
Sin.: *Valeriana montteana* Phil., *Valeriana virescens* Clos var. *montteana* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).
- Valeriana wandae** (Graebn. & Tessend.) Christenh. & Byng
Sin.: *Stangea calchaquina* (Borsini) Borsini, *Stangea wandae* Graebn. & Tessend., *Valeriana calchaquina* Borsini
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).
- Valerianella** Mill.
- Valerianella eriocarpa** Desv.
Sin.: *Valeriana eriocarpa* (Desv.) Christenh. & Byng
Hierba. Introducida. 200-500 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LSR).

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Sin.: *Valeriana locusta* L. var. *locusta*,
Valeriana locusta L. var. *olitoria* L.,
Valerianella olitoria (L.) Pollich

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Valerianella rimosa Bastard

Hierba. Introducida. 300

Países: CHL(ARA).

Valerianella vesicaria (L.) Moench

Sin.: *Valeriana locusta* L. var. *vesicaria* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

CARDIOPTERIDACEAE**Citronella** D. Don**Citronella apogon** (Griseb.) R.A. Howard

Sin.: *Emmotum apogon* Griseb.

Árbol. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, SCA).

Citronella engleriana (Loes.) R.A. Howard

Sin.: *Villaresia engleriana* Loes.

Arbusto. Nativa. 1300-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Citronella gongonha (Mart.) R.A. Howard

Sin.: *Cassine gongonha* Mart., *Ilex gongonha* (Mart.) D. Don, *Myginda gongonha* (Mart.) DC., *Villaresia cuspidata* Miers, *Villaresia gongonha* (Mart.) Miers

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ROC, TAC, TYT).

Citronella mucronata (Ruiz & Pav.) D. Don

Sin.: *Patagua chilensis* Poepp. ex Neger, *Villaresia gongonha* (Mart.) Miers var. *pungens* (Miers) Engl., *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav., *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav. var. *laeta* Miers, *Villaresia pungens* Miers

Árbol. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(PAR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Citronella paniculata (Mart.) R.A. Howard

Sin.: *Citronella paraguariensis* (Hassl.) R.A. Howard, *Citronella toledo* Hashim., *Leonia paniculata* Mart., *Leretic paniculata* (Mart.) Miq., *Villaresia paniculata* (Mart.) Miers, *Villaresia paniculata* (Mart.) Miers var. *intermedia* Hassl., *Villaresia paraguariensis* Hassl., *Villaresia ramiflora* Miers, *Villaresia virescens* Miers

Árbol. Nativa. 200-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

CARICACEAE**Carica** L.**Carica papaya** L.

Sin.: *Carica jimenezii* (Bertoni) Bertoni, *Carica papaya* L. var. *jimenezii* Bertoni

Arbolito. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, PAI).

Jacaratia A. DC.**Jacaratia corumbensis** Kuntze

Sin.: *Jacaratia hassleriana* Chodat, *Jacaratia heptaphylla* DC. f. *inermis* Kuntze

Arbusto. Nativa. 300-800 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.

Sin.: *Carica dodecaphylla* Vell., *Carica spinosa* Aubl., *Jacaratia dodecaphylla* (Vell.) A.DC., *Jacaratia dodecaphylla* (Vell.) A.DC. f. *longiflora* Hassl., *Jacaratia dodecaphylla* (Vell.) A.DC. var. *lucida* Hassl., *Papaya spinosa* (Aubl.) DC.

Árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Vasconcellea A. St.-Hil.**Vasconcellea chilensis** Planch. ex A. DC.

Sin.: *Carica chilensis* (Planch. ex A. DC.) Solms, *Papaya chilensis* (Planch. ex A. DC.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Vasconcellea glandulosa A. DC.

Sin.: *Carica glandulosa* (A. DC.) Solms, *Carica gossypifolia* Griseb., *Carica triplisecta* Herzog, *Papaya glandulosa* (A. DC.) Kuntze, *Papaya gossypifolia* (Griseb.) Kuntze

Árbol. Nativa. 400-1700 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil.

Sin.: *Carica lanceolata* (A. DC.) Hieron.,
Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.,
Papaya lanceolata (A. DC.) Kuntze,
Papaya quercifolia (A. St.-Hil.) Kuntze,
Vasconcellea lanceolata A. DC.

Árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,
JUU, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAN, CEN, CON, GUA, PAI, PHA,
SPE). URY(CLA, RIV).

CARYOCARACEAE

Caryocar L.

Caryocar brasiliense Cambess. subsp.
brasiliense

Arbolito o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,
CON, SPE).

Caryocar brasiliense Cambess. subsp.
intermedium (Wittm.) Prance & M.F.
Silva

Sin.: *Caryocar brasiliense* Cambess. f.
dentata Chodat & Hassl., *Caryocar*
intermedium Wittm.

Arbusto o arbolito. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA,
CAN).

CARYOPHYLLACEAE

Agrostemma L.

Agrostemma githago L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA,
RNE, SJU, TDF). BRA(RGS).
CHL(BIO, ARA). URY(CAS, MON).

Arenaria L.

Arenaria achalensis Griseb.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).

Arenaria catamarcensis Pax

Hierba. Nativa. 800-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
SJU).

Arenaria digyna Willd. ex D.K.F. Schtdl.

Hierba. Nativa. 500-4200 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LLA, AIS, MAG, RME).

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var.
diffusa Rohrb.

Sin.: *Arenaria diffusa* Elliot

Hierba. Introducida.

Países: ARG(SLU).

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var.
ensifolia Rohrb.

Hierba. Nativa. 1000-1700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var.
lanuginosa

Sin.: *Arenaria alsinoides* Willd. ex D.K.F.
Schtdl., *Arenaria diffusa* Elliot var.
tucumanensis Griseb., *Arenaria*
jussiaei Cambess. ex St.-Hil., *Arenaria*
lanuginosa (Michx.) Rohrb. var.
genuina Rohrb., nom. inval., *Arenaria*
lanuginosa (Michx.) Rohrb. var.
tucumanensis (Griseb.) Pax, *Arenaria*
megalantha (Rohrb.) F. N. Williams

var. *tucumanensis* (Griseb.) F. N.
Williams, *Spergulastrum lanuginosum*
Michx.

Hierba. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var.
megalantha Rohrb.

Sin.: *Arenaria megalantha* (Rohrb.) F. N.
Williams

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, SJU, TUC).

Arenaria pycnophylloides Pax

Sin.: *Arenaria pycnophylloides* Pax var.
compacta Pax, *Minuartia altoandina*
Nicola & Pozner, *Sabulina altoandina*
(Nicola & Pozner) Dillenb. & Kadereit
Hierba. Nativa. 3600-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC).

Arenaria rivularis Phil.

Hierba. Nativa. 3200-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR,
ANT, ATA, COQ, LLA, AIS).

Arenaria serpens Kunth

Sin.: *Arenaria andicola* Gillies, *Arenaria*
andicola Gillies var. *caespitosa*
Hauman, *Arenaria andicola* Gillies var.
major Hook. & Arn., *Arenaria*
caespitosa Phil., nom. illeg., *Arenaria*
cordillerana Iamónico, *Arenaria*
fastigiata Phil., *Arenaria microphylla*
Phil., *Arenaria multicaulis* Phil., nom.
illeg., *Arenaria oligosperma* Naudin,
Arenaria palustris Naudin var.
patagonica (Phil.) Reiche, *Arenaria*
patagonica Phil., *Arenaria philippii*
Iamónico, *Arenaria pleurantha* Phil.,
Arenaria serpens Kunth var. *andicola*
(Gillies) Rohrb., *Arenaria serpens*

Kunth var. *caespitosa* Hauman & Irigoyen, *Arenaria serpens* Kunth var. *microphylla* (Phil.) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *palustris* (Naudin) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *patagonica* (Phil.) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *robusta* Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *serpylloides* (Naudin) Speg., *Arenaria serpylloides* Naudin, *Arenaria serpylloides* Naudin var. *andicola* (Gillies) Reiche

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

***Arenaria serpyllifolia* L.**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, MAG, RME). URY(PAY, TAC).

***Augustea* lamónico**

***Augustea anomala* (Hassl.) lamónico**

Sin.: *Polycarpon anomalum* Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: PRY(PHA).

***Augustea coquimbensis* (Gereau & Martic.) lamónico**

Sin.: *Polycarpon coquimbense* Gereau & Martic.

Arbusto. Endémica. 1200-1700 m.

Países: CHL(COQ).

***Augustea moreirana* (M. Muñoz) lamónico & Montesinos**

Sin.: *Polycarpon moreiranum* M. Muñoz

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(COQ).

***Augustea suffruticosa* (Griseb.) lamónico**

Sin.: *Polycarpon australe* Britton, *Polycarpon suffruticosum* Griseb., *Polycarpon suffruticosum* Griseb. var. *virens* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, ÑEE, PHA).

***Cardionema* DC.**

***Cardionema burkartii* Subils**

Hierba. Nativa. 1500-4600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

***Cardionema kurtzii* Subils**

Hierba. Endémica. 1500-2600 m.

Países: ARG(COR, MEN). CHL(COQ).

***Cardionema ramosissimum* (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.**

Sin.: *Acanthonychia polycnemoides* (Schltdl.) Rohrb., *Acanthonychia ramosissima* (Weinm.) Rohrb., *Acanthonychia ramosissima* (Weinm.) Rohrb. var. *andina* (Phil.) Reiche, *Cardionema andinum* (Phil.) A. Nelson & J.F. Macbr., *Loeflingia ramosissima* Weinm., *Paronychia confertiflora* D. Parodi, *Paronychia pauciflora* Larrañaga, *Paronychia polycnemoides* Schltdl., *Paronychia ramosissima* (Weinm.) DC., *Pentacaena andina* Phil., *Pentacaena polycnemoides* (Schltdl.) Walp., comb. illeg., *Pentacaena polycnemoides* Bartl., *Pentacaena ramosissima* (Weinm.) Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 500-3600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME). PRY(CEN, PAI). URY(MON).

***Cardionema rosetta* (Cambess.) A. Nelson & J.F. Macbr.**

Sin.: *Acanthonychia ramosissima* (Weinm.) Rohrb. var. *rosetta* (Cambess.) Rohrb., *Paronychia rosetta* Cambess., *Pentacaena rosetta* (Cambess.) Walp.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI). URY(CLA).

***Cerastium* L.**

***Cerastium argentinum* (Pax) F. N. Williams**

Sin.: *Cerastium nutans* Raf. var. *argentinum* Pax

Hierba. Endémica.

Países: ARG(COR).

***Cerastium arvense* L.**

Sin.: *Cerastium arvense* L. f. *glandulosum* (Wedd.) Rohrb., *Cerastium arvense* L. subsp. *fuegianum* (Hook. f.) Ugbor., *Cerastium arvense* L. var. *fuegianum* Hook. f., *Cerastium arvense* L. var. *montanum* (Naudin) Reiche, *Cerastium arvense* L. var. *nervosum* (Naudin) Reiche, *Cerastium arvense* L. var. *parviflora* Dusén, *Cerastium arvense* L. var. *rigidum* Naudin, *Cerastium arvense* L. var. *verticellare* Naudin, *Cerastium arvense* L. var. *vestitum* Naudin, *Cerastium arvensiforme* Wedd. var. *glandulosum* Wedd., *Cerastium cardiopetalum*

- Naudin, *Cerastium colsmannii* Lehm. ex Spreng., *Cerastium diazii* Phil., *Cerastium fuegianum* Albov, *Cerastium hieronymi* Pax, *Cerastium magellanicum* Phil., *Cerastium montanum* Naudin, *Cerastium nervosum* Naudin, *Cerastium pauciflorum* Phil., hom. illeg., *Cerastium vidalii* Phil.
Hierba. Introducida. 0-3800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).
- Cerastium commersonianum** Ser. ex DC. var. **commersonianum**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).
- Cerastium dicotrichum** Fenzl ex Rohrb.
Hierba. Nativa. 0-2300 m.
Países: BRA(RGS, PAR, SCA). URY(LAV).
- Cerastium fontanum** Baumg. subsp. **vulgare** (Hartmann) Greuter & Burdet
Sin.: *Cerastium andinum* Phil., hom. illeg., *Cerastium caespitosum* Gilib., nom. illeg., *Cerastium fontanum* Baumg. f. **vulgare** (Hartm.) M.B. Wyse Jacks., *Cerastium fontanum* Baumg. subsp. **triviale** (Link) Jalas, *Cerastium holosteoides* Fr. subsp. **triviale** (Link) Möschl, *Cerastium holosteoides* Fr. subsp. **vulgare** (Hartm.) Buttler, *Cerastium holosteoides* Fr. var. **vulgare** (Hartm.) Hyl., *Cerastium triviale* Link, *Cerastium vulgare* Hartmann
Hierba. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO,
- ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).
- Cerastium glomeratum** Thuill.
Sin.: *Alsine glomerata* (Thuill.) E.H.L. Krause, nom. illeg., *Cerastium obovatum* Larrañaga, *Cerastium vulgatum* L.
Hierba. Introducida. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, MON).
- Cerastium humifusum** Cambess.
Sin.: *Cerastium glabrum* Larrañaga
Hierba. Nativa. 0-3800 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, MEN, SJU, SFE). BRA(RGS). URY(CLA).
- Cerastium junceum** Möschl
Sin.: *Cerastium commersonianum* Ser. ex DC. var. *darwinianum* F. N. Williams
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, RNE, SLU, SCR, SFE, TUC).
Notas: Citada para Paraguay y Uruguay (Pedersen, 1984b, 1987b) sin indicar localidad o material de referencia.
- Cerastium mollissimum** Poir.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, SLU). BRA(RGS). URY(RIV).
- Cerastium montioides** Naudin
Hierba. Endémica. 3000-3800 m.
Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Cerastium parvum** (Pedersen) M.T. Sharples & E. Tripp
Sin.: *Stellaria parva* Pedersen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE). PRY(CEN, COA, GUA).
- Cerastium racemosum** Bartl.
Hierba. Nativa. 3600-4400 m.
Países: CHL(AYP).
- Cerastium rivulare** Cambess.
Sin.: *Cerastium catharinense* L.B. Sm. & Downs
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAN, GUA, ITA, MIE).
- Cerastium rivulariastrum** Möschl & Pedersen
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). PRY(CAN, CEN, GUA, MIE, PAI). URY(MON, SJO).
- Cerastium selloi** Schltdl. ex Rohrb.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS).
- Cerastium semidecandrum** L.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Cerastium soratense** Rohrb.
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU).
- Cerastium subspicatum** Wedd.
Sin.: *Cerastium subspicatum* Wedd. var. *apetalum* Wedd., *Cerastium tucumanense* Pax
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Cerastium verecundum Ravenna
Hierba. Endémica. 1700-2000 m.
Países: CHL(RME).

Colobanthus Bartl.

Colobanthus lycopodioides Griseb.

Sin.: *Colobanthus lechleri* Phil.,
Colobanthus polycnemoides Hieron.,
Drudea lycopodioides Griseb., nom.
superfl.
Subarbusto. Endémica. 0-2300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, SJU, TDF). CHL(MAG, RME).

Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.

Sin.: *Colobanthus alatus* Pax,
Colobanthus aretioides Gillies ex
Hook., *Colobanthus billardiarei* Fenzl,
Colobanthus cherlerioides Hook. f.,
Colobanthus crassifolius (d'Urv.) Hook.
f., *Colobanthus crassifolius* (d'Urv.)
Hook. f. var. *aretioides* (Gillies ex
Hook.) Macloskie, *Colobanthus*
crassifolius (d'Urv.) Hook. f. var.
brevifolius Engl., *Colobanthus*
maclovianus Gand., *Colobanthus*
meigenii Phil., *Colobanthus quitensis*
(Kunth) Bartl. var. *alatus* (Pax)
Hosseus, *Colobanthus quitensis*
(Kunth) Bartl. var. *brevifolius* (Engl.)
Mart. Crov., *Colobanthus saginoides*
Bartl., *Sagina crassifolia* d'Urv., *Sagina*
haenkeana Naudin, *Sagina quitensis*
Kunth
Hierba. Nativa. 0-3800 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI,
MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TDF).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,
VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG,
RME).

Colobanthus subulatus (d'Urv.) Hook. f.

Sin.: *Colobanthus benthamianus* Fenzl,
Colobanthus subulatus (d'Urv.) Hook.

f. var. *darwinii* Hook. f., *Sagina*
subulata d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(AIS,
MAG, RME).

Corrigiola L.

Corrigiola crassifolia Chaudhri

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, RME).

Corrigiola propinqua Gay

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

Corrigiola squamosa Hook. & Arn. var. **latifolia** (Gay) Skottsb.

Sin.: *Corrigiola latifolia* Gay
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Corrigiola squamosa Hook. & Arn. var. **poeppigii** Chaudhri

Sin.: *Corrigiola collina* Poepp., nom. nud.,
Corrigiola glomeruliflora Steud.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Corrigiola squamosa Hook. & Arn. var. **squamosa**

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Dianthus L.

Dianthus armeria L.

Hierba. Introducida.
Países: ARG(CHU). CHL(ARA).

Dianthus deltoides L.

Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Drymaria Willd. ex Schult.

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult.

Sin.: *Alsine media* Vell., nom. illeg., *Alsine*
rotundifolia (Poir.) Macloskie,
Cerastium cordatum (L.) Crantz,
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem.
& Schult. var. *pacifica* Mizush.,
Drymaria rotundifolia (Poir.) Har.,
Holosteum cordatum L., *Stellaria*
rotundifolia Poir.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ,
LRI, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(ANT). PRY(CEN,
COA, GUA, PAI). URY(ROC).

Drymaria engleriana (Muschl.) Baehni & J.F. Macbr. var. **devia** (Baehni & J.F. Macbr.) J.A. Duke

Sin.: *Drymaria devia* Baehni & J.F. Macbr.
Hierba. Nativa. 3500
Países: CHL(AYP, TAR).

Drymaria glandulosa C. Presl

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
SAL, SDE, TUC).

Drymaria ovata Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Drymaria paposana Phil.

Hierba. Nativa.
Países: CHL(ANT).

Drymaria villosa Cham. & Schltldl.

Sin.: *Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Roem. & Schult. var. *villosa* (Cham. & Schltldl.) Rohrb.

Hierba. Nativa. 1500

Países: ARG(JUU, SAL).

Gypsophila L.

Gypsophila vaccaria (L.) Small

Sin.: *Lychnis vaccaria* (L.) Scop., *Saponaria hispanica* Mill., *Saponaria segetalis* Neck., nom. illeg., *Saponaria vaccaria* L., *Silene vaccaria* (L.) E.H.L. Krause, *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert, *Vaccaria pyramidata* Medik., *Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke ex Asch.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, NEU, RNE, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(PAY).

Herniaria L.

Herniaria austroamericana Chaudhri & Rutish.

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.

Países: ARG(JUU).

Herniaria cinerea DC.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(COQ, VAL).

Herniaria hirsuta L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, JUJ, LPA, SFE).

Holosteum L.

Holosteum umbellatum L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, NEU, RNE).

Microphyes Phil.

Microphyes litoralis Phil.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Microphyes minimus (Miers ex Colla) Briq.

Sin.: *Calandrinia minima* (Miers ex Colla) Bertero ex Steud., *Microphyes lanuginosus* Phil., nom. inval., *Talinum minimum* Miers ex Colla, *Wangerinia minima* (Miers ex Colla) E. Franz

Hierba. Endémica. 0-4600 m.

Países: ARG(JUU). CHL(COQ, VAL, BIO, RME).

Microphyes robustus Ricardi var. **pallidus** Ricardi

Hierba. Endémica. 500-900 m.

Países: CHL(ATA).

Microphyes robustus Ricardi var. **robustus**

Hierba. Endémica. 800-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Minuartia Loefl. ex L.

Minuartia groenlandica (Retz.) Ostenf.

Sin.: *Arenaria groenlandica* (Retz.) Spreng., *Stellaria groenlandica* Retz.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(RGS).

Paronychia Mill.

Paronychia brasiliana DC. var. **brasiliana**

Sin.: *Paronychia bonariensis* DC., nom. superfl., *Paronychia punctoria* Larrañaga

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(MON).

Paronychia brasiliana DC. subsp. **pubescens** (Chaudhri) Iamónico & Montesinos

Sin.: *Paronychia brasiliana* DC. var. *pubescens* Chaudhri

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI).

Paronychia cabreræ Chaudhri

Hierba. Nativa. 2800-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SJU, TUC).

Paronychia camphorosmoides Cambess.

Hierba. Nativa. 700-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paronychia chilensis DC. f. **subglabra** Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(SPE).

Paronychia chilensis DC. var. **mutica** (Phil.) Reiche

Sin.: *Paronychia mutica* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, VAL, BIO).

Paronychia chilensis DC. subsp. **chilensis**

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, RNE, SCR, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE).

Paronychia chilensis DC. subsp. **subandina** (Phil.) Chaudhri

Sin.: *Paronychia chilensis* DC. var. *subandina* (Phil.) Reiche, *Paronychia subandina* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Paronychia communis Cambess. var. **chicligastensis** Chaudhri

Hierba. Endémica.

Países: ARG(TUC).

Paronychia communis Cambess. var. **communis**

Sin.: *Paronychia communis* Cambess. var. *pungentifolia* Chaudhri, *Paronychia paranensis* Chaudhri

Hierba. Nativa. 600-3200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, PAI). URY(ART, RNO, RIV, SJO, TAC).

Paronychia coquimbensis Gay var. **appressa** (Phil.) Chaudhri

Sin.: *Paronychia appressa* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Paronychia coquimbensis Gay var. **coquimbensis**

Sin.: *Paronychia chilensis* DC. var. *coquimbensis* (Gay) Reiche

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, VAL).

Paronychia hieronymi Pax var. **hieronymi**

Sin.: *Paronychia chilensis* DC. var. *hieronymi* (Pax) Hosseus

Hierba. Nativa. 2500-4800 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Paronychia johnstonii Chaudhri var. **johnstonii**

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ANT).

Paronychia johnstonii Chaudhri var. **scabrida** Chaudhri

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ANT).

Paronychia jujuensis (Chaudhri) lamónico & Montesinos

Sin.: *Paronychia hieronymi* Pax var. *jujuensis* Chaudhri

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUU).

Paronychia microphylla Phil.

Subarbusto. Nativa. 2200-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Paronychia muschleri Chaudhri

Sin.: *Paronychia rigida* Muschl., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(SAL).

Paronychia revoluta C.E. Carneiro & A. Furlan

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. var. **cordobensis** (Chaudhri) lamónico

Sin.: *Paronychia setigera* (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. subsp. *cordobensis* Chaudhri

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, LRI, MEN, MIS, SLU, SFE, SDE).

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. var. **longiseta** Chaudhri

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(ART).

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. var. **subglabra** (Chaudhri) lamónico

Sin.: *Paronychia setigera* (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. subvar. *subglabra* Chaudhri

Hierba. Endémica.

Países: ARG(COR, MEN).

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. subsp. **argillicola** Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI).

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. subsp. **setigera**

Sin.: *Herniaria setigera* Gillies ex Hook. & Arn., *Paronychia australis* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Paronychia chilensis* DC. var. *andina* Reiche, *Paronychia subandina* Gand., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 200-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE). BRA(RGS). CHL(VAL, MAU, BIO, RME). URY(MAL).

Petrorhagia (Ser.) Link**Petrorhagia dubia** (Raf.) G. López & Romo

Sin.: *Dianthus dubius* Raf., *Petrorhagia velutina* (Guss.) P.W. Ball & Heywood

Hierba. Introducida. 0-1600 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG).

Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball & Heywood

Sin.: *Dianthus nanteuillii* Burnat

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE).

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood

Sin.: *Dianthus prolifer* L.

Hierba. Introducida. 200-600 m.

Países: ARG(BAI). CHL(LBO, BIO, ARA).

Philippiella Speg.

Philippiella patagonica Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU, SCR). CHL(MAG).

Polycarpaea Lam., nom. cons.

Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.

Sin.: *Achyranthes corymbosa* L.,
Polycarpaea brasiliensis Cambess.,
Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. var.
brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA).

Polycarpaea hassleriana Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Polycarpon Loefl. ex L.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. **tetraphyllum**

Sin.: *Mollugo tetraphylla* L.

Hierba. Introducida. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE, IPA). URY(ROC).

Polycarpon tetraphyllum L. subsp. **apurense** (Kunth) Iamónico & C.A. Zanotti

Sin.: *Polycarpon apurense* Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). PRY(CEN).

Pycnophyllum J. Remy

Pycnophyllum bryoides (Phil.) Rohrb.

Sin.: *Stichophyllum bryoides* Phil.

Hierba. Nativa. 4100-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Pycnophyllum convexum Griseb.

Sin.: *Pycnophyllum argentinum* Pax,
Pycnophyllum mucronulatum Mattf.

Hierba. Endémica. 4000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Pycnophyllum macropetalum Mattf.

Hierba. Nativa. 4000-4800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Pycnophyllum molle J. Remy

Hierba. Nativa. 3500-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Pycnophyllum spathulatum Mattf.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Pycnophyllum tetrastichum J. Remy

Sin.: *Pycnophyllum glomeratum* Mattf.

Hierba. Nativa. 3300-4600 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Reicheella Pax

Reicheella andicola (Phil.) Pax

Sin.: *Bryopsis andicola* Reiche, *Lyallia andicola* Phil.

Hierba. Endémica. 4100-4900 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Sabulina Rchb.

Sabulina acutiflora (Fenzl ex Endl.) Dillenb. & Kadereit

Sin.: *Alsine acutiflora* Fenzl ex Endl.,
Alsine minuta (Naudin) Rohrb.,
Arenaria minuta Naudin, *Minuartia acutiflora* (Fenzl ex Endl.) Mattf.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Sagina L.

Sagina apetala Ard.

Sin.: *Arenaria apetala* Larrañaga, hom. illeg., *Sagina apetala* Ard. var. *pachyrrhiza* (Phil.) Reiche, *Sagina apetala* Ard. var. *urbica* (Phil.) Reiche, *Sagina apetala* Ard. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Sagina ciliata* Fr., *Sagina pachyrrhiza* Phil., *Sagina urbica* Phil., *Sagina valdiviana* Phil.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). PRY(SPE). URY(MON).

Sagina chilensis Naudin ex Gay

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). CHL(LBO, RME, JFE). URY(MAL).

Sagina humifusa (Cambess.) Fenzl & Rohrb.

Sin.: *Spergula humifusa* Cambess.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SLU, SFE). BRA(RGS). URY.

Sagina procumbens L.

Sin.: *Sagina apetala* Ard. var. *melanopotamica* Speg., *Sagina apetala* Ard. var. *paludosa* Speg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Saponaria L.

Saponaria officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME). URY(CAS, FLA, RNO).

Scleranthus L.

Scleranthus annuus L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA). URY(COL).

Scleranthus polycarpus L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, CHU).

Silene L., nom. cons.

Silene andicola Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Lychnis andicola* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rusby, *Lychnis chilensis* Naudin, *Lychnis terminalis* Naudin, *Melandrium andicola* (Gillies ex Hook. & Arn.)

Rohrb., *Melandrium andicola* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb. var. *nubigena* (Phil.) Reiche, *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb., *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *argentinense* Hosseus, *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *cucubaloides* (Fenzl ex Rohrb.) Hosseus, *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *plutonicum* (Naudin) Hosseus, *Melandrium cucubaloides* Fenzl ex Rohrb., *Melandrium koslowskii* Dusén, *Melandrium plutonicum* (Naudin) Reiche, *Melandrium terminale* (Naudin) Reiche, *Silene chilensis* (Naudin) Bocquet, *Silene nubigena* Phil., *Silene plutonica* Naudin, *Wahlbergella andicola* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rouy

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME).

Silene antarctica (Kuntze) Pedersen

Sin.: *Lychnis antarctica* Kuntze, *Melandrium alpestre* Dusén

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Silene antirrhina L. var. **antirrhina**

Sin.: *Silene antirrhina* L. var. *pteroneura* Ball, *Silene pteroneura* (Ball) F. N. Williams

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(MON).

Silene antirrhina L. var. **divaricata** B.L. Rob.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: PRY(CEN).

Silene argentina (Pax) Bocquet

Sin.: *Lychnis argentina* Speg., *Melandrium argentinum* Pax

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(BAI, COR, SLU).

Silene argentinensis Hauman

Hierba. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, TUC).

Silene armeria L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA).

Notas: Cita dudosa para la Flora Argentina

Silene bersieri Bocquet

Hierba. Endémica. 3200-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Silene chubutensis (Speg.) Bocquet

Sin.: *Lychnis chubutensis* Speg., *Melandrium chubutense* (Speg.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).

Silene coronaria (L.) Clairv.

Sin.: *Agrostemma coronaria* L., *Lychnis coronaria* (L.) Desr.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI). BRA(SCA). CHL(BIO, ARA).

Silene densifolia (Dusén) Bocquet

Sin.: *Melandrium densifolium* Dusén, *Silene cuspidata* Pedersen f. *cuspidata*, *Silene cuspidata* Pedersen f. *inuncta* Pedersen

Hierba. Endémica. 800-2000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(ARA).

Silene dioica (L.) Clairv.

Sin.: *Lychnis dioica* L., *Lychnis sylvestris* Schkuhr, *Melandrium sylvestre* (Schkuhr) Röhl.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, TDF).

Silene echegarayi (Hieron.) Bocquet

Sin.: *Melandrium echegarayi* Hieron.

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Silene filifolia (Dusén) Bocquet

Sin.: *Melandrium filifolium* Dusén, *Melandrium magellanicum* (Desr.)

Fenzl ex Rohrb. var. *robustum* Hosseus

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Silene gallica L.

Sin.: *Silene anglica* L., *Silene spatulata* Larrañaga

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LRI, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). URY(LAV, ROC, SJO).

Silene haumanii Bocquet var. **densa** Bocquet

Hierba. Endémica. 3500-4000 m.

Países: ARG(JUU).

Silene haumanii Bocquet var. **haumanii**

Sin.: *Melandrium friesii* Hauman

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Silene magellanica (Desr.) Bocquet

Sin.: *Lychnis graminea* Molina, nom. nud., *Lychnis magellanica* Desr., *Melandrium magellanicum* (Desr.) Fenzl ex Rohrb.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Silene mandonii (Rohrb.) Bocquet

Sin.: *Melandrium mandonii* Rohrb., *Melandrium rimbachii* Mattf.

Hierba. Nativa. 3400-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Silene margaritae Bocquet

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CAT).

Silene melanopotamica Pedersen

Sin.: *Silene inflata* (Salisb.) Sm. var. *patagonica* Speg., *Silene maritima* With. var. *patagonica* (Speg.)

Hauman, *Silene melanopotamica* Pedersen subsp. *agrostophylla* Pedersen, *Silene melanopotamica* Pedersen subsp. *nivosimontana* Pedersen

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Silene patagonica (Speg.) Bocquet

Sin.: *Lychnis patagonica* Speg., *Lychnis patagonica* Speg. f. *glabriuscula* H. Ross, *Melandrium patagonicum* (Speg.) Speg.

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Silene pendula L.

Sin.: *Silene cisplatensis* Cambess.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: URY(MON).

Notas: Citada para Brasil por Añón (1967) sin mencionar ejemplar de referencia. Cita dudosa para la Flora Argentina

Silene pratensis (Rafn) Godr. & Gren.

Sin.: *Lychnis alba* Mill., *Lychnis pratensis* Rafn, *Melandrium album* (Mill.)

Garcke, *Saponaria dioica* Cham. & Schltld., hom. illeg., *Silene alba* (Mill.)

E.H.L. Krause

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SFE).

Silene vulgaris (Moench) Garcke

Sin.: *Behen vulgaris* Moench, *Cucubalus behen* L., *Silene cucubalus* Wibel, nom. illeg., *Silene inflata* (Salisb.) Sm.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, NEU, RNE). CHL(ARA, RME).

Spergula L.

Spergula arvensis L.

Sin.: *Arenaria arvensis* (L.) Wallr., *Spergula arvensis* L. var. *sativa* Rohrb., *Spergula arvensis* L. var. *vulgaris* (Boenn.) Rohrb., *Spergula sativa* Boenn., *Spergula vulgaris* Boenn., *Spergularia arvensis* (L.)

Cambess., *Stellaria arvensis* (L.) Scop.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME). PRY(APY). URY(MON).

Spergula calva Pedersen

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

Spergula grandis Pers.

Sin.: *Arenaria grandis* (Pers.) Kunth, *Buda grandis* (Pers.) Kuntze, *Lepigonum grande* (Pers.) Kindb., *Spergularia grandis* (Pers.) Cambess., *Spergularia*

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, JUJ, LPA, MEN, SCR, SFE, TDF). CHL(COQ, VAL, BIO, LLA, AIS, MAG, RME).

Spergularia masafuerana Skottsbo.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(JFE).

Spergularia media (L.) C. Presl

Sin.: *Arenaria marginata* DC., nom. illeg., *Arenaria media* L., *Lepigonum medium* Wahlb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, IDE, JFE).

Notas: Cita dudosa para la Argentina y Uruguay

Spergularia pissisii (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Arenaria pissisii* Phil., *Spergula pissisii* (Phil.) Volponi, *Tissa pissisii* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ, VAL).

Spergularia platensis (Cambess.) Fenzl

Sin.: *Alsine platensis* (Cambess.) House, *Balardia platensis* Cambess., *Buda platensis* (Cambess.) Kuntze, *Spergula platensis* (Cambess.) Shinnars var. *balansae* (R. Roszbach) Pedersen, *Spergula platensis* (Cambess.) Shinnars var. *platensis*, *Spergularia angolensis* Phil., *Spergularia platensis* (Cambess.) Fenzl var. *balansae* R. Roszbach, *Spergularia platensis* (Cambess.) Fenzl var. *septentrionalis* (Hassl.) Hauman & Irigoyen, *Tissa angolensis* (Phil.) Reiche, *Tissa platensis* (Cambess.) Hassl. var. *septentrionalis* (Hassl.) Hassl., *Tissa platensis* (Cambess.) Reiche, *Tissa platensis* (Cambess.) Reiche subsp.

septentrionalis Hassl. f. *decumbens* Hassl.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, RNE, SAL, SCR, SFE, TUC). CHL(BIO, ARA, RME). PRY(PHA). URY(ART, MON).

Notas: Introducida en Chile

Spergularia pycnantha R. Roszbach

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Spergularia ramosa Cambess.

Sin.: *Spergula ramosa* (Cambess.) D. Dietr. subsp. *ramosa*, *Spergula ramosa* (Cambess.) D. Dietr. subsp. *rossbachiae* Pedersen, *Spergularia ramosa* Cambess. var. *diffusa* Roszbach

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, BOQ, PHA). URY(MON, SJO, TAC).

Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl

Sin.: *Arenaria rubra* L., *Spergula rubra* (L.) D. Dietr., *Spergularia campestris* (L.) Asch.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).

Spergularia rupestris Cambess.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(LAV, MAL, SAO, TYT).

Spergularia stenocarpa (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Arenaria stenocarpa* Phil., *Spergularia borchersii* Phil., *Spergularia larranagae* Phil., *Tissa borchersii* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Spergularia villosa (Pers.) Cambess.

Sin.: *Arenaria alba-villosa* Larrañaga, *Arenaria berteriana* Phil., *Lepigonum arenarium* Kindb., *Lepigonum glandulosum* Liebm., *Lepigonum liebmannianum* Lange, *Lepigonum villosum* (Pers.) Fisch. & C.A. Mey., *Spergula villosa* Pers., *Spergularia aprica* Phil., *Spergularia liebmanniana* (Lange) Rohrb., *Spergularia remotiflora* Steud., *Spergularia villosa* (Pers.) Cambess. var. *berteroana* (Phil.) Rohrb., *Tissa aprica* (Phil.) Reiche, *Tissa media* Reiche var. *berteroana* (Phil.) Reiche, *Tissa villosa* (Pers.) Britton

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, RME). URY(MON).

Stellaria L.

Stellaria alsine Grimm

Sin.: *Stellaria uliginosa* Murray

Hierba. Introducida.

Países: ARG(NEU). CHL(AIS, MAG).

Stellaria aphanantha Griseb.

Hierba. Endémica. 3400-4300 m.

Países: ARG(CAT).

Stellaria arvalis Fenzl ex F. Phil.

Sin.: *Stellaria cuspidata* Willd. ex D.K.F. Schltdl. var. *alsineformis* Gay

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(TAR, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Stellaria chilensis Pedersen

Sin.: *Stellaria celsa* Ravenna, *Stellaria circinata* Ravenna, *Stellaria concinna* Ravenna, *Stellaria serpens* Ravenna
Hierba. Nativa. 0-3400 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE).

Stellaria cryptopetala Griseb.

Sin.: *Alsine cherleriae* (Fisch. ex Ser.) Fenzl var. *andina* Kuntze
Hierba. Endémica. 2500-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Stellaria cuspidata Willd. ex D.K.F. Schltld.

Sin.: *Stellaria antoniana* Volponi
Hierba. Nativa. 600-2600 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL, TUC).

Stellaria debilis d'Urv.

Sin.: *Alsine axillaris* (Phil.) Macloskie, *Alsine chubutensis* (Speg.) Macloskie, *Alsine debile* (d'Urv.) Macloskie, *Stellaria axillaris* Phil., *Stellaria chubutensis* Speg., *Stellaria debilis* d'Urv. var. *condensata* (A. Gray ex Macloskie) Hauman & Irigoyen, *Stellaria stenopetala* Phil., *Stellaria stenopetala* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *chubutensis* (Speg.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *magellanica* Phil., *Stellaria xanthospora* Chodat & Wilczek
Hierba. Nativa. 3200-4400 m.
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ, BIO, MAG).

Stellaria media (L.) Vill.

Sin.: *Alsine media* L., *Stellaria glabra* Raunk., *Stellaria hiemalis* (Bég.) Raunk., *Stellaria media* (L.) Vill. f.

malachioides Macloskie, *Stellaria media* (L.) Vill. var. *gymnocalyx* Trautv., *Stellaria media* (L.) Vill. var. *normalis* Speg., nom. inval.
Hierba. Introducida. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(ITA). URY(ROC).

Stellaria pallida (Dumort.) Crepin

Sin.: *Alsine pallida* Dumort., *Stellaria abortiva* Gay
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, DFE, ERI, RNE). CHL(MAG, RME).

Stellaria parviflora Banks & Sol. ex

Hook. f. subsp. *ignis* Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Stellaria patagonica Montesinos & Borsch

Sin.: *Pycnophyllopsis muscosa* Skottsb.
Hierba. Endémica. 900-1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Stellaria pedersenii Volponi

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Stellaria villasenorii Montesinos & Borsch

Sin.: *Pycnophyllopsis lanata* (Phil.) M.E. Timaná, *Pycnophyllum lanatum* Phil.
Hierba. Endémica. 2600-2800 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Stellaria weddellii Pedersen

Hierba. Nativa. 3100-4500 m.
Países: ARG(JUJ). CHL(TAR).

CELASTRACEAE**Anthodon** Ruiz & Pav.**Anthodon decussatus** Ruiz & Pav.

Sin.: *Hippocratea decussata* (Ruiz & Pav.) Peyr., *Salacia decussata* (Ruiz & Pav.) G. Don
Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Celastrus L.**Celastrus liebmannii** Standl.

Sin.: *Maytenus racemosa* Reissek
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cheiloclinium Miers**Cheiloclinium serratum** (Cambess.) A.C. Sm.

Sin.: *Salacia serrata* Cambess., *Tontelea serrata* (Cambess.) Endl. ex Walp.
Liana. Nativa. 100-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Elachyptera A.C. Sm.**Elachyptera festiva** (Miers) A.C. Sm.

Sin.: *Hippocratea festiva* Miers
Liana. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Elachyptera micrantha (Cambess.) A.C. Sm.

Sin.: *Clercia micrantha* (Cambess.) Miers, *Hippocratea micrantha* Cambess.
Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA).

Hippocratea L.

Hippocratea volubilis L.

Sin.: *Hemiangium excelsum* (Kunth) A.C.
Sm., *Hippocratea excelsa* Kunth,
Hippocratea infusca Miers
Liana. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA,
CAN, CON, COA, MIE, PHA).

Lepuropetalon Elliott

Lepuropetalon spathulatum Muhl. ex
Elliott
Sin.: *Cryptopetalum pusillum* Hook. &
Arn., *Lepuropetalon pusillum* (Hook. &
Arn.) Gay, *Pyxidantha spathulata*
Muhl., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA,
RME). URY(MAL, MON).

Maytenus Molina

Maytenus boaria Molina

Sin.: *Boaria molinae* DC., nom. illeg.,
Celastrus boaria (Molina) Baill.,
Celastrus maytenus Willd., nom. illeg.,
Celastrus uncinatus Ruiz & Pav.,
Maytenus angustifolia J. Mattos & N.
Mattos, nom. illeg., *Maytenus boaria*
Molina var. *latifolia* Reissek, *Maytenus*
chilensis DC., nom. illeg., *Maytenus*
chilensis DC. var. *angustifolia* DC.,
nom. illeg., *Maytenus crenulata* C.
Presl, *Maytenus uncinata* (Ruiz &

Pav.) G. Don, *Senecia maytenus*
Lam., nom. illeg.

Árbol. Nativa. 0-3800 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, MIS,
NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG,
RME).

Maytenus chubutensis (Speg.) Lourteig, O'Donnell & Sleumer

Sin.: *Pernettya chubutensis* Speg.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-
1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Maytenus disticha (Hook. f.) Urb.

Sin.: *Crossopetalum distichum* (Hook. f.)
Kuntze, *Myginda disticha* Hook. f.,
Rhacoma disticha (Hook. f.) Loes.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 200-
1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR,
LLA, AIS, MAG).

Maytenus magellanica (Lam.) Hook. f.

Sin.: *Cassine magellanica* Lam., *Celastrus*
magellanicus (Lam.) DC., *Maytenus*
andina Phil.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR,
LLA, AIS, MAG).

Maytenus verticillata (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Celastrus verticillatus* Ruiz & Pav.,
Maytenus cuezzoi Legname
Arbolito o árbol. Nativa. 1500-1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Monteverdia A. Rich.

Monteverdia aquifolium (Mart.) Biral

Sin.: *Maytenus aquifolium* Mart.
Árbol o arbusto. Nativa. 100-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Monteverdia cassineformis (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus cassineformis* Reissek
Árbol o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(TYT).

Monteverdia dasyclados (Mart.) Biral

Sin.: *Maytenus dasyclada* Mart.
Árbol o arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CLA, ROC, TAC, TYT).

Monteverdia evonymoides (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus evonymoides* Reissek,
Maytenus evonymoides Reissek var.
minarum Briq., *Maytenus*
evonymoides Reissek var. *pyncnodonta*
Briq., *Maytenus pseudocasearia*
Reissek
Árbol o arbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA).

Monteverdia floribunda (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus floribunda* Reissek
Árbol o arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Monteverdia glaucescens (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus glaucescens* Reissek
Árbol o arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Monteverdia gonoclada (Mart.) Biral

Sin.: *Maytenus gonoclada* Mart.,
Maytenus robusta Reissek,
Monteverdia robusta (Reissek) Biral
Árbol o arbusto. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Monteverdia ilicifolia (Mart. ex Reissek)

Biral

Sin.: *Celastrus spinifolius* Larrañaga, *Maytenus hassleri* Briq., *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek, nom. cons., *Maytenus officinalis* Mabb., *Maytenus pilcomayensis* Briq.

Árbol o arbusto. Nativa. 100-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, CLA, FLA, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Monteverdia littoralis (R.M. Carvalho-Okano) Biral

Sin.: *Maytenus littoralis* R.M. Carvalho-Okano

Árbol o arbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Monteverdia patens (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus patens* Reissek

Árbol o arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Monteverdia schumanniana (Loes.) Biral

Sin.: *Maytenus rostrata* Handro, *Maytenus schumanniana* Loes.

Árbol o arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Monteverdia spinosa (Griseb.) Biral

Sin.: *Celastrus moya* Kuntze, *Gymnosporia boliviiana* Loes., *Gymnosporia establei* Herter, *Gymnosporia spinosa* (Griseb.) Loes. ex Hicken, nom. illeg., *Maytenus scutioides* (Griseb.) Lourteig & O'Donell, *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O'Donell, *Moya boliviiana*

(Loes.) Loes., *Moya scutioides* Griseb., *Moya spinosa* Griseb.

Árbol o arbusto. Nativa. 100-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA).

Monteverdia urbaniana (Loes.) Biral

Sin.: *Maytenus urbaniana* Loes.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Peritassa Miers

Peritassa campestris (Cambess.) A.C. Sm.

Sin.: *Calypso campestris* Cambess., *Salacia campestris* (Cambess.) Walp.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, MIE, SPE).

Peritassa hatschbachii Lombardi

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plenckia Reissek

Plenckia integerrima Lundell

Sin.: *Viposia integerrima* (Lundell) Lundell

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Plenckia microcarpa Lundell

Sin.: *Austroplenckia microcarpa* (Lundell) Lundell

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(PAI).

Plenckia populnea Reissek

Sin.: *Austroplenckia populnea* (Reissek) Lundell

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(COA, PAI, SPE).

Pristimera Miers

Pristimera celastroides (Kunth) A.C. Sm.

Sin.: *Clercia tweediana* Miers, *Hippocratea andina* (Miers) J.F. Macbr., *Hippocratea celastroides* Kunth, *Hippocratea grisebachii* Loes., *Hippocratea grisebachii* Loes. var. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Hippocratea tenuiflora* Mart. ex Peyr. f. *angustifolia* Hassl., *Hippocratea tenuiflora* Mart. ex Peyr. var. *grisebachii* (Loes.) Hassl., *Hippocratea verrucosa* Griseb., nom. illeg., *Pristimera andina* Miers

Liana. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(PAY, RNO, SAO).

Salacia L., nom. cons.

Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) G. Don

Sin.: *Anthodon crassifolius* Mart. ex Schult.

Arbusto. Nativa. 100-1300 m.

Países: PRY(CAU, CAN, SPE).

Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G. Don

Sin.: *Anthodon ellipticus* Mart. ex Schult.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, CON, MIE).

Schaefferia Jacq.

Schaefferia argentinensis Speg.

Sin.: *Schaefferia diemonis* Herter,
Schaefferia uruguayensis Speg.

Arbusto o árbol. Nativa. 300-2100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON, GUA, PHA, SPE). URY(ART, RIV, SAO).

Semialarium N. Hallé

Semialarium paniculatum (Mart. ex Schult.) N. Hallé

Sin.: *Anthodon paniculatus* Mart. ex Schult., *Hippocratea paniculata* (Mart. ex Schult.) Hassl., hom. illeg.

Liana. Nativa. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, COA, PHA, SPE).

Tontelea Miers, nom. cons.

Tontelea micrantha (Mart.) A.C. Sm.

Sin.: *Anthodon micranthus* Mart., *Salacia micrantha* (Mart.) G. Don, *Tontelea brachypoda* Miers

Arbusto. Nativa. 100-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Tontelea miersii (Peyr.) A.C. Sm.

Sin.: *Salacia miersii* Peyr.

Liana. Nativa. 100-900 m.

Países: BRA(PAR).

Tricerna Liebm.

Tricerna viscifolium (Griseb.) Lundell

Sin.: *Maytenus viscifolia* Griseb.

Árbol. Nativa. 400-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SDE, TUC).

Tricerna vitis-idaea (Griseb.) Lundell

Sin.: *Maytenus lorentzii* Briq., *Maytenus paraguariensis* Briq., *Maytenus paraguariensis* Briq. var. *genuina* Briq., nom. inval., *Maytenus paraguariensis* Briq. var. *grandifolia* Briq., *Maytenus vitis-idaea* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA). URY(RNO, SJO).

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum L.

Ceratophyllum demersum L.

Sin.: *Ceratophyllum apiculatum* Cham., *Ceratophyllum aquaticum* H.C. Watson, *Ceratophyllum chilense* Leyb., *Ceratophyllum demersum* L. var. *apiculatum* (Cham.) Asch., *Ceratophyllum demersum* L. var. *inermis* Gay ex Radcl.-Sm., *Ceratophyllum demersum* L. var. *inflatum* R.E. Fr., *Ceratophyllum demersum* L. var. *oxyacanthum* (Cham.) K. Schum., *Ceratophyllum demersum* L. var. *oxycarpum* Kuntze, *Ceratophyllum indicum* Willd. ex Cham., *Ceratophyllum oxyacanthum* Cham., *Ceratophyllum tricuspidatum* Dumort., *Ceratophyllum tuberculatum* Cham., *Ceratophyllum unicornis* Dumort., *Ceratophyllum verticillatum* Roxb., *Ceratophyllum vulgare* Schleid., nom. illeg., *Ceratophyllum*

vulgare Schleid., nom. illeg. var. *oxyacanthum* (Cham.) Schleid.

Hierba acuática. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, LRI, RNE, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, BIO, RME). PRY(APY). URY(CLA, COL, ROC, SJO).

Ceratophyllum muricatum Cham. subsp. **australe** (Griseb.) Les

Sin.: *Ceratophyllum australe* Griseb., *Ceratophyllum cristatum* Spruce ex K. Schum., *Ceratophyllum demersum* L. var. *cristatum* K. Schum., *Ceratophyllum echinatum* A. Gray, *Ceratophyllum floridanum* Fassett, *Ceratophyllum llerenae* Fassett, *Ceratophyllum submersum* L. var. *echinatum* (A. Gray) Wilmot-Dear

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(TUC).

CHENOPODIACEAE

Allenrolfea Kuntze

Allenrolfea patagonica (Moq.) Kuntze

Sin.: *Halopeplis patagonica* (Moq.) Ung.-Sternb., *Halostachys patagonica* Moq., *Spirostachys patagonica* (Moq.) Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU).

Allenrolfea vaginata (Griseb.) Kuntze

Sin.: *Spirostachys vaginata* Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Atriplex L., nom. cons.**Atriplex ameghinoi** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Atriplex argentina Speg.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Atriplex atacamensis Phil.

Arbusto. Nativa. 200-3000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Atriplex boecheri Aellen

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(MEN).

Atriplex braunii A. Soriano

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Atriplex chapinii I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(IDE).

Atriplex chilensis Colla

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG).

Atriplex chizae Rosas

Arbusto. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Atriplex clivicola I.M. Johnst.Sin.: *Atriplex clivicola* I.M. Johnst. var. *lopholepis* I.M. Johnst., *Obione clivicola* (I.M. Johnst.) Ulbr.

Arbusto. Endémica. 200-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Atriplex coquimbana Phil.

Arbusto. Endémica. 300-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Atriplex cordobensis Gand. & Stuck.subsp. **cordobensis**Sin.: *Atriplex hjertingii* Aellen

Subarbusto. Nativa. 200-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Atriplex cordobensis Gand. & Stuck.subsp. **grandibracteata** Múlgura

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Atriplex costellata Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Atriplex crenatifolia Chodat & WilczekSin.: *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *macrophylla* Speg.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, LPA, MEN, NEU, SJU, SLU).

Atriplex eximia A. Soriano

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

Atriplex frigida Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Atriplex glaucescens Phil.Sin.: *Atriplex polyphylla* Phil.

Arbusto. Endémica. 1300-3700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Atriplex hortensis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU). CHL(COQ, RME).

Atriplex hystrix Phil.Sin.: *Atriplex mucronata* Phil., hom. illeg.,*Obione hystrix* (Phil.) Ulbr., *Obione mucronata* Ulbr.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. var.**foliolosa** (Phil.) RosasSin.: *Atriplex foliolosum* Phil., *Atriplex sanambrosiana* Sparre

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(IDE).

Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. var.**imbricata**Sin.: *Atriplex axillaris* Phil., nom. illeg., *Atriplex microphylla* Phil., nom. illeg., *Atriplex salaris* Phil., *Obione axillaris* Ulbr., *Obione imbricata* Moq.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 3500-3800 m.

Países: ARG(CAT, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, RME).

Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr.Sin.: *Atriplex ceratophylla* Kuntze, *Atriplex lampa* (Moq.) D. Dietr. f. *latifolia* Hauman, nom. nud., *Obione lampa* Moq.

Subarbusto. Endémica. 800-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC).

Atriplex leuca Phil.Sin.: *Atriplex densifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Atriplex lithophila A. Soriano ex Múlgura

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU, SLU).

Atriplex madariagae Phil.

Arbusto. Nativa. 200-2700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Atriplex mendozaensis Speg.

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(MEN).

Atriplex micrantha C.A. Mey.

Sin.: *Atriplex hastata* L. var. *heterosperma* (Bunge) Regel ex Iljin, *Atriplex heterosperma* Bunge, *Atriplex hortensis* L. subsp. *heterosperma* (Bunge) Meijden

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SJU).

Atriplex montevidensis Spreng.

Sin.: *Atriplex grisebachii* Kurtz ex Gand., *Atriplex montevidensis* Spreng. f. *conferta* Hicken, *Obione montevidensis* (Spreng.) Moq.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE). PRY(CEN, PHA). URY(MON, RNO).

Atriplex myriophylla Phil.

Sin.: *Atriplex andina* R.E. Fr., *Atriplex cristata* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *depauperata* Kuntze, *Atriplex cristata* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *pulvinata* Kuntze, *Atriplex herzogii* Standl., *Atriplex lilloi* Hauman, *Atriplex pusilla* Phil., nom. illeg., *Atriplex serpyllifolium* Herzog, *Obione myriophylla* (Phil.) Ulbr., *Obione pusilla* Wedd., nom. nud.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR).

Atriplex nitrophiloides A. Soriano ex Múlgura

Hierba. Nativa. 2000-3700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Atriplex nummularia Lindl.

Arbusto. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(ANT, COQ).

Atriplex oreophila Phil.

Sin.: *Atriplex chenopodioides* Aellen, hom. illeg., *Atriplex humilis* Phil., hom. illeg.,

Atriplex hypsophila I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3500-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU). CHL(TAR, ATA, COQ).

Atriplex pamparum Griseb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Atriplex patagonica (Moq.) D. Dietr.

Sin.: *Obione patagonica* Moq.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SCR).

Atriplex patula L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, SCR, SFE). CHL(BIO, ARA, LLA, MAG, RME). URY(CAS).

Atriplex peruviana Moq.

Sin.: *Chenopodium cinereum* Moq.

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: CHL(AYP).

Atriplex philippii R.E. Fr.

Sin.: *Atriplex prostratum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: CHL(RME).

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

Sin.: *Atriplex hastata* L., *Atriplex hastata* L. var. *salinum* Green & Godr., *Atriplex*

patula L. subsp. *hastata* (L.) H.M. Hall & Clem., *Atriplex patula* L. var. *hastata* (L.) A. Gray, *Atriplex platensis* Speg., *Atriplex triangularis* Willd.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, SJU, SCR, SFE). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(CAS, MON).

Atriplex quixadensis Del Vitto, Múlgura & Petenatti

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SLU).

Atriplex repanda Phil.

Sin.: *Atriplex angustifolia* Phil., hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, RME).

Atriplex retusa Gay

Sin.: *Atriplex deserticola* Phil., *Atriplex podocarpa* Phil., *Atriplex transandina* I.M. Johnst., *Obione podocarpa* (Phil.) Ulbr., *Obione retusa* (Gay) Ulbr., *Obione transandina* (I.M. Johnst.) Ulbr.

Subarbusto. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

Atriplex rosea L.

Sin.: *Atriplex arenicola* Hauman, *Atriplex arenicola* Hauman var. *albescens* Hauman, *Atriplex spatiosa* A. Nelson

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SDE). CHL(COQ).

Atriplex sagittifolia Speg.

Sin.: *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *heterophylla* Speg., *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *microphylla* Speg., *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *typica* Speg., nom. inval.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR).

Atriplex semibaccata R. Br.

Sin.: *Atriplex semibaccata* R. Br. var. *melanocarpa* Aellen, *Atriplex stuckertii* Gand.

Hierba. Introducida. 500-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Atriplex sorianoii Múlgura

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).

Atriplex spegazzinii A. Soriano ex Múlgura

Sin.: *Atriplex flavescens* Speg., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).

Atriplex suberecta I. Verd.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SFE, SDE). CHL(ATA, COQ).

Atriplex taltalensis I.M. Johnst.

Subarbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Atriplex tatarica L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SCR). CHL(RME).

Atriplex undulata (Moq.) D. Dietr.

Sin.: *Obione undulata* Moq.
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SLU, SFE).

Atriplex vallenarensis Rosas

Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Atriplex vulgatissima Speg.

Sin.: *Atriplex macrostyla* Speg., *Atriplex reichei* Volkens ex Dusén
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Bassia All.

Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze

Sin.: *Echinopsilon hyssopifolium* (Pall.) Moq., *Salsola hyssopifolia* Pall.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, VAL, RME).

Bassia scoparia (L.) A.J. Scott

Sin.: *Atriplex scoparia* (L.) Crantz, *Chenopodium scoparia* L., *Kochia parodii* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *contracta* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *densa* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *elongata* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *glabrescens* Aellen, *Kochia scoparia* (L.) Schrad., *Kochia scoparia* (L.) Schrad. f. *densa* (Aellen) A. Soriano, *Kochia scoparia* (L.) Schrad. f. *remotiflora* Beck, *Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *densiflora* Moq., *Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *pubescens* Fenzl, *Salsola scoparia* (L.) M. Bieb.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE).

Beta L.

Beta vulgaris L. subsp. **maritima** (L.) Arcang.

Sin.: *Beta maritima* L., *Beta vulgaris* L. var. *maritima* (L.) Moq., *Beta vulgaris* L. var. *perennis* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, RNE, SFE). CHL(TAR, ATA, VAL, RME, JFE). URY(CAS, MON).

Beta vulgaris L. subsp. **vulgaris**

Sin.: *Beta vulgaris* L. subsp. *cicla* (L.) Schübl. & G. Martens, *Beta vulgaris* L. var. *cicla* L.
Hierba. Introducida. 0-2700 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SAL, SFE, TUC). CHL(TAR, JFE).

Blitum L.

Blitum antarcticum Hook. f.

Sin.: *Chenopodium antarcticum* (Hook. f.) Benth. & Hook. f., *Chenopodium antarcticum* (Hook. f.) Speg., comb. superfl., *Oxybasis antarctica* (Hook. f.) Mosyakin
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Blitum nuttallianum Schult.

Sin.: *Chenopodium trifidum* Trev., *Monolepis chenopodioides* Moq., *Monolepis nuttalliana* (Schult.) Green, *Monolepis patagonica* Ulbr., *Monolepis trifida* (Trev.) Schrad.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).

Chenopodiastrum S. Fuentes, Uotila & Borsch

Chenopodiastrium murale (L.) S.

Fuentes, Uotila & Borsch

Sin.: *Chenopodium murale* L.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, IDE, JFE). URY(MAL, MON, PAY, RNO, SJO).

Chenopodium L.

Chenopodium album L. subsp. **album**

Sin.: *Botrys alba* (L.) Nieuwl., *Chenopodium acutifolium* Phil., hom. illeg., *Chenopodium album* L. var. *polymorphum* Aellen, *Chenopodium laxiflorum* Phil. Hierba. Introducida. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(SPE). URY(COL, MON, PAY, RNO, SJO).

Chenopodium album L. subsp. **borbasii** (Murr) Soó

Sin.: *Chenopodium borbasii* Murr, *Chenopodium zobelii* A. Ludw. & Aellen

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SDE, TUC).

Chenopodium carnosulum Moq.

Sin.: *Chenopodium carnosulum* Moq. var. *patagonicum* (Phil.) Wahl,

Chenopodium fuegianum Speg.,

Chenopodium patagonicum Phil.

Hierba. Introducida. 0-4200 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, SAL, SCR, TDF, TUC). CHL(VAL, LLA, AIS, MAG).

Chenopodium cordobense Aellen

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, NEU, SDE, SJU).

Chenopodium cruseoanum Skottsb.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Chenopodium ficifolium Sm.

Hierba. Introducida. 0-2700 m.

Países: CHL(VAL, LLA, MAG).

Chenopodium giganteum D. Don

Sin.: *Chenopodium album* L. subsp. *amaranthicolor* H.J. Coste & A. Reyn., *Chenopodium amaranticolor* (H.J. Coste & A. Reyn.) H.J. Coste & A. Reyn.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, DFE, MEN). CHL(VAL, RME).

Chenopodium hircinum Schrad. subsp. **catamarcense** Aellen

Hierba. Nativa. 500-3500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, TUC).

Chenopodium hircinum Schrad. subsp. **hircinum**

Sin.: *Chenopodium bonariense* Ten., *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *microphyllum* Thell. ex Parodi, *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *angustifolium* Aellen, *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *deminutum* Aellen, *Chenopodium hircinum* f. *multidentatum* Aellen, *Chenopodium hircinum* Schrad. var. *andinum* Aellen,

Chenopodium hircinum Schrad. var.

typicum A. Ludw. & Aellen, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, LSR, LLA, RME). PRY(COA). URY(MON).

Chenopodium nesodendron Skottsb.

Arbusto. Endémica. 300-500 m.

Países: CHL(JFE).

Chenopodium obscurum Aellen

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR).

Chenopodium pallidicaule Aellen

Sin.: *Chenopodium pallidicaule* Aellen f. *purpureum* Aellen

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Chenopodium papulosum Moq.

Sin.: *Chenopodium papulosum* Moq. var. *hastatum* Kurtz, *Chenopodium rafaelse* Chodat & Wilczek

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, LPA, MEN, SJU, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL, BIO, LLA).

Chenopodium petiolare Kunth

Sin.: *Chenopodium bolivianum* Murr, *Chenopodium hastatum* Phil., *Chenopodium paniculatum* Hook., *Chenopodium petiolare* Kunth f. *hastatum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium petiolare* Kunth f. *incanum* Aellen, *Chenopodium petiolare* Kunth f. *scutatum* Aellen

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Chenopodium philippianum Aellen

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Chenopodium pilcomayense Aellen

Hierba. Nativa. 0-5000 m.

Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE). PRY(APY, PHA).

Chenopodium pratericola Rydb.

Sin.: *Chenopodium dessicatum* A. Nelson var. *leptophylloides* (Murr) Wahl, *Chenopodium leptophyllum* (Nutt. ex Moq.) S.Watson var. *leptophylloides* (Murr) Thell. & Aellen, *Chenopodium petiolare* Kunth var. *leptophylloides* Murr, *Chenopodium pratericola* Rydb. subsp. *eupratericola* Allem, nom. inval., *Chenopodium pratericola* Rydb. var. *leptophylloides* (Murr) Aellen

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SFE, SDE).

Chenopodium purpurascens B. Juss. ex

Jacq.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Chenopodium quinoa Willd. var. **melanospermum** Hunz.Sin.: *Chenopodium quinoa* Willd. subsp. *milleanum* Aellen

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Chenopodium quinoa Willd. var. **quinoa**

Sin.: *Chenopodium canihua* O.F. Cook, *Chenopodium nuttalliae* Saff., *Chenopodium quinoa* Willd. f. *purpureum* Aellen

Hierba. Nativa. 0-3800 m.

Países: CHL(TAR, ANT, BIO, LLA).

Chenopodium ruiz-lealii Aellen

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(MEN).

Chenopodium sanctae-clarae Johow

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(JFE).

Chenopodium sancti-ambrosii Skottsb.

Arbusto. Endémica. 300-500 m.

Países: CHL(IDE).

Chenopodium scabriculaule Speg.

Sin.: *Chenopodium scabriculaule* Speg. f. *megalospermum* Speg., *Chenopodium scabriculaule* Speg. f. *pusilla* Speg., *Chenopodium scabriculaule* Speg. f. *robusta* Speg.

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).

Chenopodium trifurcatum Phil.

Hierba. Endémica. 300-2900 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Chenopodium vulvaria L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, TDF). CHL(TAR, ANT, VAL, LBO, MAU, RME).

Dysphania R. Br.**Dysphania ambrosioides** (L.) Mosyakin & Clemants

Sin.: *Ambrina ambrosioides* (L.) Spach, *Ambrina anthelmintica* (L.) Spach, *Ambrina incisa* Moq., *Ambrina incisa* Phil., hom. illeg., *Ambrina parvula* Phil., *Chenopodium ambrosioides* L., *Chenopodium ambrosioides* L. f. *dentatum* (Fenzl) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *integrifolium* (Fenzl) Aellen,

Chenopodium ambrosioides L. f. *pinnatifidum* (Willk.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *rotundatum* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *euambrosioides* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *typicum* Speg., nom. inval., *Chenopodium ambrosioides* L. f. *genuinum* Aellen, nom. inval., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *dentata* Fenzl, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *genuinum* Willk., nom. inval., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *integrifolium* Fenzl, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *pinnatifidum* Willk., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *suffruticosum* (Willd.) Graebn., *Chenopodium suffruticosum* Willd., *Chenopodium suffruticosum* Willd. subsp. *remotum* Vorosh., *Teloxys ambrosioides* (L.) W.A. Weber

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, IDE, JFE). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA). URY(FLA, MON).

Dysphania atriplicifolia (Spreng.) G. Kadereit, Sukhor. & Uotila

Sin.: *Cyclolepis platyphylla* (Michx.) Moq., *Cycloloma atriplicifolium* (Spreng.) Coult., *Cycloloma platyphylla* (Michx.) Moq., *Kochia atriplicifolia* (Spreng.) Roth, *Salsola atriplicifolia* Spreng., *Salsola platyphylla* Michx.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR). CHL(BIO).

Dysphania bonariensis (Hook. f.)
Mosyakin & Clemants ex Sukhor.

Sin.: *Chenopodium bonariense* (Hook. f.)
Hauman & Irigoyen, comb. illeg.,
Chenopodium haumanii Ulbr.,
Roubieva bonariensis Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). URY(PAY,
SAO).

Dysphania burkartii (Aellen) Mosyakin &
Clemants

Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L.
subsp. *burkartii* Aellen, *Chenopodium*
burkartii (Aellen) Vorosch.,
Chenopodium dunosum L. Simón,
Dysphania dunosa (L. Simón)
Mosyakin & Clemants

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
LPA, SFE). PRY(ITA). URY(ART,
RIV).

Dysphania carinata (R. Br.) Mosyakin &
Clemants

Sin.: *Ambrina carinata* (R. Br.) Moq.,
Blitum carinatum (R. Br.) Moq.,
Chenopodium carinatum R. Br.,
Salsola carinata (R. Br.) Spreng.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, LRI,
MIS, SAL, SDE, TUC).

Dysphania chilensis (Schr.) Mosyakin
& Clemants

Sin.: *Ambrina andicola* Phil., *Ambrina*
chilensis (Schr.) Spach, *Ambrina*
denudata Phil., *Chenopodium*
ambrosioides L. f. *angustifolium* (Moq.)
Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L.
f. *normale* Aellen, *Chenopodium*
ambrosioides L. subsp. *chilense*
(Schr.) Aellen, *Chenopodium*
ambrosioides L. subsp. *chilense*
(Schr.) Aellen var. *andicola* (Phil.)
Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L.

subsp. *chilense* (Schr.) Aellen var.
denudatum (Phil.) Aellen,

Chenopodium ambrosioides L. subsp.
chilense (Schr.) Aellen var.
euchilense Aellen, *Chenopodium*
ambrosioides L. var. *chilense*
(Schr.) Speg., *Chenopodium*
anthelminticum L. var. *chilense*
(Schr.) Griseb., *Chenopodium*
chilense Schr., *Chenopodium*
chilense Schr. var. *angustifolium*
Moq., *Chenopodium chilense* Schr.
var. *denudata* (Phil.) Reiche,
Chenopodium soanum Aellen,
Chenopodium vagans Standl.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ,
LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU,
SLU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, LLA, RME).

Dysphania mandonii (S. Watson)
Mosyakin & Clemants

Sin.: *Chenopodium foetidum* Schr. f.
pumilum Kurtz ex R.E. Fr.,
Chenopodium graveolens Willd. f.
pumilum (Kurtz ex R.E. Fr.) Aellen,
Chenopodium graveolens Willd. var.
bangii (Murr) Aellen, *Chenopodium*
incisum Poir. var. *bangii* Murr,
Chenopodium mandonii (S. Watson)
Aellen, *Chenopodium rigidum*
Lingelsh., *Teloxys mandonii* S. Watson

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(VAL).

Dysphania microcarpa (Phil.) Mosyakin
& Clemants

Sin.: *Chenopodium microcarpum* (Phil.) A.
Troncoso, *Chenopodium multifidum* L.
var. *microcarpum* (Phil.) Reiche,
Chenopodium zoellneri Aellen,
Roubieva microcarpa Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL, RME).

Dysphania multifida (L.) Mosyakin &
Clemants

Sin.: *Ambrina pinnatisecta* Spach, *Atriplex*
multifida (L.) Crantz, *Chenopodium*
citriodorum Steud., *Chenopodium*
multifidum L., *Chenopodium*
multifidum L. f. *intermedium* Aellen,
Chenopodium multifidum L. f.
latisectum Bontea & Aellen,
Chenopodium multifidum L. f.
spatulatum Aellen, *Chenopodium*
multifidum L. f. *typicum* Aellen, nom.
inval., *Chenopodium payco* Molina,
Herniaria payco Molina, *Orthosporum*
multifidum (L.) Kostel., *Roubieva*
multifida (L.) Moq., *Teloxys multifida*
(L.) W.A. Weber

Hierba. Introducida. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,
ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL,
SJU, SFE). CHL(AYP, TAR, ANT,
ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LSR, LLA, RME, JFE).
URY(PAY, ROC).

Dysphania ob lanceolata (Speg.)
Mosyakin & Clemants

Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L. var.
ob lanceolata Speg., *Chenopodium*
ob lanceolatum (Speg.) Giusti

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU).

Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin &
Clemants

Sin.: *Ambrina pumilio* (R. Br.) Moq., *Blitum*
pumilio (R. Br.) Steud., *Chenopodium*
pumilio R. Br., *Teloxys pumilio* (R. Br.)
W.A. Weber

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MIS,
SDE, TUC). BRA(SCA). PRY(APA).

Dysphania retusa (Juss. ex Moq.)
Mosyakin & Clemants

Sin.: *Ambrina obovata* Moq., *Ambrina retusa* Juss. ex Moq., *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *obovatum* (Moq.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *retusum* (Juss. ex Moq.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *obovata* (Moq.) Speg., *Chenopodium obovatum* (Moq.) Moq., *Chenopodium retusum* (Juss. ex Moq.) Moq.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA), BRA(RGS), URY(COL, ROC).

Dysphania venturii (Aellen) Mosyakin & Clemants

Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *venturii* Aellen, *Chenopodium venturii* (Aellen) Cabrera, comb. superfl.
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Heterostachys Ung.-Sternb.

Heterostachys olivascens (Speg.) Molino

Sin.: *Heterostachys olivascens* Speg., nom. inval., *Spirostachys olivascens* Speg.
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, RNE).

Heterostachys ritteriana (Moq.) Ung.-Sternb.

Sin.: *Halocnemum ritterianum* Moq., *Halopeplis gilliesii* Griseb., *Halostachys ritteriana* (Moq.) Moq., *Spirostachys ritteriana* (Moq.) Ung.-Sternb.
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE), PRY(APY, PHA).

Holmbergia Hicken

Holmbergia tweedii (Moq.) Speg.

Sin.: *Chenopodium exocarpum* Griseb., *Chenopodium stuckertii* Gand., *Chenopodium tweedii* Moq., *Holmbergia exocarpa* (Griseb.) Hicken
 Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC), PRY(APY, APA, PHA), URY(RNO, SOR).

Maireana Moq.

Maireana brevifolia (R. Br.) Paul G. Wilson

Sin.: *Enchylaena tamariscina* (Lindl.) Druce, *Kochia brevifolia* R. Br., *Kochia tamariscina* (Lindl.) J.M. Black, *Kochia thymifolia* Lindl., *Salsola brachyphylla* Spreng., *Suaeda feliciana* A. Hoffm. & Teillier, *Suaeda tamariscina* Lindl.
 Arbusto. Introducida. 0-500 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, IDE).

Oxybasis Kar. & Kir.

Oxybasis ambigua (R. Br.) de Lange & Mosyakin

Sin.: *Chenopodium ambiguum* R. Br., *Chenopodium glaucum* L. subsp. *ambiguum* (R. Br.) Murr & Thell., *Chenopodium glaucum* L. var. *divaricatum* Hook. f.
 Hierba. Nativa.
 Países: CHL(VAL, AIS).

Oxybasis frigida (Phil.) Uotila

Sin.: *Chenopodium frigidum* Phil., *Chenopodium hypsophilum* Hauman
 Hierba. Endémica. 2500-4200 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU), CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Sin.: *Chenopodium glaucum* L.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(SDE), CHL(VAL, LLA, AIS, MAG, IPA).

Oxybasis halophila (Phil.) Uotila

Sin.: *Chenopodium halophilum* Phil., *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *halophilum* (Phil.) Aellen
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(LLA).

Oxybasis macrosperma (Hook. f.) S. Fuentes, Uotila & Borsch subsp. **macrosperma**

Sin.: *Blitum rubrum* (L.) C.A.Mey. var. *macrosperma* (Hook. f.) Speg., *Chenopodium farinosum* (S. Watson) Standl., *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *halophilum* (Phil.) Aellen f. *subviride* Thell., *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *macrospermum*, *Chenopodium macrospermum* Hook. f. var. *farinosum* (S. Watson) J.T. Howell, *Chenopodium macrospermum* Hook. f. var. *halophilum* (Phil.) Standl., *Chenopodium murale* L. var. *farinosum* S.Watson
 Hierba. Nativa. 0-100 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, JUJ, MEN, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF), CHL(ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, RME), PRY(PHA), URY(CAS, MON, SJO).

Oxybasis macrosperma (Hook. f.) S. Fuentes, Uotila & Borsch subsp. **salsa** (Phil.) Uotila

Sin.: *Blitum salsum* Phil., *Chenopodium macrospermum* Hook. f. *subsp. salsum* (Phil.) A. Troncoso
Hierba. Nativa.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, MEN, RNE, SJU, SCR, SFE). CHL(ANT, LBO, MAU, RME). PRY(PHA). URY(CAS, MON, SJO).

Oxybasis parodii (Aellen) Mosyakin & de Lange

Sin.: *Blitum rubrum* (L.) C.A.Mey. var. *hypoleucum* Speg., *Chenopodium glaucum* L. *subsp. parodii* (Aellen) Aellen, *Chenopodium parodii* Aellen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF).

Oxybasis urbica (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Sin.: *Chenopodium urbicum* L.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(JFE).

Salicornia L.

Salicornia ambigua Michx.

Sin.: *Arthrocnemum ambiguum* (Michx.) Moq., *Salicornia gaudichaudiana* Moq., *Sarcocornia ambigua* (Michx.) M.A. Alonso & M.B. Crespo
Arbusto. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, FOR, LPA, MEN, SFE, SDE). BRA(SCA). PRY(PHA). URY(CAS, MON, ROC).

Salicornia andina Phil.

Sin.: *Sarcocornia andina* (Phil.) Freitag, M.A. Alonso & M.B. Crespo, *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *andina* (Phil.) Gunckel, *Salicornia peruviana* Kunth var. *andina* (Phil.) Reiche
Arbusto. Nativa. 2300-4200 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(ANT).

Salicornia magellanica Phil.

Sin.: *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp. var. *procumbens* Speg., *Sarcocornia magellanica* (Phil.) M.A. Alonso & M.B. Crespo
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Salicornia neei Lag.

Sin.: *Salicornia bergii* Lorentz & Niederl., *Salicornia copiapina* Phil., *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp., *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp. f. *typica* Speg., nom. inval., *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp. var. *nachtigallii* Niederl., *Salicornia doeringii* Lorentz & Niederl., *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *corticosa* (Meyen) Gunckel, *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Speg., *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *macrostachya* Speg., *Salicornia peruviana* Kunth, *Salicornia peruviana* Kunth var. *corticosa* (Meyen) Reiche, *Salicornia peruviana* Kunth var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Reiche, *Salsola coquimbana* Molina, *Salsola corticosa* Meyen, *Sarcocornia neei* (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo, *Suaeda corticosa* Meyen
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, JFE). PRY(APY, PHA).

Salicornia pulvinata R.E. Fr.

Sin.: *Sarcocornia pulvinata* (R.E. Fr.) A.J. Scott
Hierba. Nativa. 3600-4200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Salsola L.

Salsola kali L. var. **hirsuta** Hornem.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, NEU, RNE).

Salsola kali L. var. **kali**

Hierba. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(MAL).

Salsola tragus L.

Sin.: *Salsola kali* L. *subsp. tragus* (L.) Celak., *Salsola kali* L. var. *tragus* (L.) Moq.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR).

Soda (Dumort.) Fourr.

Soda inermis Fourr.

Sin.: *Kali inermis* Moench, nom. superfl., *Salsola soda* L. var. *pumila* Albert & Jahand ex Asch. & Graebn., *Salsola soda* L. var. *soda*
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Suaeda Forssk. ex J.F. Gmel.

Suaeda altissima (L.) Pall.

Sin.: *Chenopodium altissimum* L., *Salsola altissima* (L.) L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(NEU, RNE).

Suaeda argentinensis A. Soriano

Sin.: *Lerchea fruticosa* (L.) Moench var. *brachyphylla* Speg., *Lerchea fruticosa*

(L.) Moench var. *megalosperma* Speg., *Suaeda fruticosa* (L.) Forssk. var. *brachyphylla* (Speg.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

Suaeda densiflora Giusti ex N.F. Brignone
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE).

Suaeda divaricata Moq.
Sin.: *Dondia divaricata* (Moq.) Standl., *Lerchea divaricata* (Moq.) Kuntze, *Salsola mendocinensis* Gillies ex Moq.
Arbusto. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ANT).

Suaeda foliosa Moq.
Sin.: *Suaeda brevifolia* Phil., *Suaeda divaricata* Moq. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda foliosa* Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Standl., *Suaeda parvifolia* Phil., *Suaeda tenuifolia* Phil.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Suaeda multiflora Phil.
Arbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Suaeda nesophila I.M. Johnst.
Sin.: *Suaeda divaricata* Moq. var. *microphylla* F. Phil.
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(IDE).

Suaeda neuquenensis M.A. Alonso, Conticello & Cerazo
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: ARG(NEU).

Suaeda paradoxa (Bunge) Regel
Sin.: *Belowia paradoxa* Bunge
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(RNE).

Suaeda patagonica Speg.
Sin.: *Lerchea patagonica* (Speg.) Speg., *Suaeda patagonica* Speg. var. *crassiuscula* A. Soriano
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(MAG).

CHLORANTHACEAE

Hedyosmum Sw.

Hedyosmum brasiliense Miq.
Sin.: *Hedyosmum acutifolium* Cordem., *Hedyosmum grandifolium* Occhioni, *Hedyosmum weddellianum* Cordem., *Tafallaea brasiliensis* (Miq.) Kuntze, *Tafallaea weddelliana* (Cordem.) Kuntze
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

CHRYSOBALANACEAE

Couepia Aubl.

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f.

Sin.: *Couepia formosana* Taub., *Couepia suberosa* Pilg., *Moquilea grandiflora* Mart. & Zucc.
Árbol. Nativa. 300-1400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

Couepia uiti (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f.
Sin.: *Couepia paraguariensis* Hassl., *Moquilea uiti* Mart. & Zucc.
Árbol. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(CON).

Hirtella L.

Hirtella burchellii Britton
Sin.: *Hirtella sprucei* Benth. ex Hook. f. subsp. *meridionalis* Hassl.
Árbol. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Hirtella hebeclada Moric. ex DC.
Sin.: *Hirtella gardneri* Benth., *Hirtella selloana* Hook. f., *Hirtella tomentella* Schott ex Spreng.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Parinari Aubl.

Parinari brasiliensis (Schott) Hook. f.
Sin.: *Petrocarya brasiliensis* Schott
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Parinari obtusifolia Hook. f.
Arbusto. Nativa. 200-1200 m.
Países: PRY.

CISTACEAE

Crocanthemum Spach

Crocanthemum brasiliense (Lam.) Spach

Sin.: *Cistus brasiliensis* Lam., *Halimium brasiliense* (Lam.) Grosser, *Helianthemum brasiliense* (Lam.) Pers., *Helianthemum polygalifolium* Sweet, *Hudsonia australis* Spreng.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(PAY, SJO).

brevipes Hauman, *Cleome paludosa* Willd. ex Eichler var. *major* Chodat & Hassl., *Cleome serrata* Jacq. subsp. *paludosa* (Willd. ex Eichler) H.H. Iltis
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE). PRY(APY, BOQ, CON, ÑEE, PHA).

Dactylaena Schrad. ex Schultes & Schult.f.

Dactylaena pauciflora Griseb.

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).

CLEOMACEAE

Andinocleome H.H. Iltis & Cochrane

Andinocleome chilensis (DC.) H.H. Iltis ex E.M. McGinty & Roalson

Sin.: *Cleome chilensis* DC., *Cleome chilensis* DC. var. *pubescens* DC.

Hierba. Nativa. 300-700 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Cleome L.

Cleome chodatiana H.H. Iltis

Sin.: *Physostemon hasslerianum* Chodat
Hierba o arbusto. Endémica. 400-600 m.

Países: PRY(CAU, SPE).

Cleoserrata H.H. Iltis

Cleoserrata paludosa (Willd. ex Eichler) H.H. Iltis ex Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome paludosa* Willd. ex Eichler, *Cleome paludosa* Willd. ex Eichler var.

Melidiscus Raf.

Melidiscus giganteus (L.) Raf.

Sin.: *Cleome friesii* Heilborn, *Cleome gigantea* L., *Cleome viridiflora* Schreb.
Arbusto. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, GUA, PAI).

Tarenaya Raf.

Tarenaya aculeata (L.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome aculeata* L., *Hemiscola aculeata* (L.) Raf.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Tarenaya bicolor (Gardner) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome bicolor* Gardner
Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tarenaya cordobensis (Eichler ex Griseb.) Arana & Oggero

Sin.: *Cleome aculeata* L. var. *cordobensis* (Eichler & Griseb.) Kuntze, *Cleome cordobensis* Eichler ex Griseb.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Tarenaya crenopetala (A. DC.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome crenopetala* A. DC.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Tarenaya diffusa (Banks ex DC.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome diffusa* Banks ex DC.

Hierba. Nativa. - m.

Países: BRA(SCA).

Tarenaya eosina (J.F. Macbr.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome eosina* J.F. Macbr., *Cleome microcarpa* Hassl., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, BOQ, CHO, CON, PHA).

Tarenaya guaranítica (Chodat & Hassl.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome guaranítica* (Chodat & Hassl.) Briq., *Cleome rosea* Vahl ex DC. var. *armata* Chodat & Hassl., *Cleome rosea* Vahl ex DC. var. *guaranítica* Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

Tarenaya houtteana (Schltdl.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome hassleriana* Chodat, *Cleome houtteana* Schltdl., *Tarenaya hassleriana* (Chodat) H.H. Iltis

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, GUA, ITA, PHA, SPE).

Tarenaya inermis (Malme) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome inermis* Malme

Hierba. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Tarenaya lilloi (S.A. Gómez) Arana & Oggero

Sin.: *Cleome lilloi* S.A. Gómez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY).

Tarenaya longicarpa Soares Neto & Roalson

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Tarenaya parviflora (Kunth) H.H. Iltis

Sin.: *Cleome brasiliensis* Weinm., *Cleome parviflora* Kunth, *Cleome villosa* Gardner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, GUA, SPE). URY(ART, SAO).

Tarenaya psoraleifolia (DC.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome parviflora* Kunth subsp. *psoraleifolia* (DC.) Iltis, *Cleome psoraleifolia* DC.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(ERI, SAL). PRY(COA, GUA, SPE).

Tarenaya rosea (Vahl ex DC.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome rosea* Vahl ex DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Tarenaya titubans (Speg.) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome montevidense* Arechav., *Cleome titubans* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CLA, MON, ROC, SJO).

Tarenaya trachycarpa (Klotzsch ex Eichler) Soares Neto & Roalson

Sin.: *Cleome psoraleifolia* DC. var. *trachycarpa* (Klotzsch ex Eichler) Kuntze, *Cleome selloana* Klotzsch ex Eichler, *Cleome trachycarpa* Klotzsch ex Eichler

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, CON, PHA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TYT).

Tarenaya tucumanensis (H.H. Iltis) Arana & Oggero

Sin.: *Cleome flexuosa* Griseb., nom. illeg., *Cleome tucumanensis* H.H. Iltis

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

CLETHRACEAE

Clethra L.

Clethra scabra Pers. var. *laevigata* (Meisn.) Sleumer

Sin.: *Clethra gardneri* Turcz., *Clethra laevigata* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Clethra scabra Pers. var. *scabra*

Sin.: *Clethra brasiliensis* Cham., *Clethra maromensis* Villa, *Crossophrys brasiliensis* (Cham.) Meisn., *Crossophrys chamissonis* Klotzsch ex Meisn.

Árbol. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).

Clethra scabra Pers. var. *venosa* (Meisn.) Sleumer

Sin.: *Clethra brasiliensis* Cham. var. *venosa* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Clethra uleana Sleumer

Arbusto o árbol. Endémica. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CLUSIACEAE

Clusia L.

Clusia criuva Cambess. subsp. *criuva*

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Clusia criuva Cambess. subsp. *parviflora* (Saldanha ex Engl.) Vesque

Sin.: *Clusia parviflora* Saldanha ex Engl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Garcinia L.

Garcinia brasiliensis Mart.

Sin.: *Rheedia brasiliensis* (Mart.) Planch. & Triana
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA, PAI).

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi

Sin.: *Rheedia gardneriana* Planch. & Triana
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Garcinia guacopary (S. Moore) M. Nee

Sin.: *Rheedia achachairu* Rusby, *Rheedia guacopary* S. Moore
Árbol. Nativa.
Países: ARG(FOR, MIS).

Tovomitopsis Planch. & Triana

Tovomitopsis paniculata (Spreng.) Planch & Triana
Sin.: *Bertolonia paniculata* Spreng.
Árbol o arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

COLUMELLIACEAE

Desfontainia Ruiz & Pav.

Desfontainia spinosa Ruiz & Pav.

Sin.: *Desfontainia chilensis* Gay, *Desfontainia fulgens* D. Don, *Desfontainia hookeri* Dunal, *Desfontainia ilicifolia* Phil., *Desfontainia novemdentata* Gand., *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *chilensis* (Gay) Reiche, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *hookeri* (Dunal) Reiche, *Linkia peruviana*

Pers., *Linkia spinosa* (Ruiz & Pav.) Poir.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

COMBRETACEAE

Combretum Loebl., nom. cons.

Combretum duarteanum Cambess.

Sin.: *Combretum anfractuosum* Mart. var. *macrostachyum* Hassl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON).

Combretum fruticosum (Loebl.) Stuntz

Sin.: *Combretum loeflingii* Eichler, nom. superfl., *Combretum micropetalum* DC., *Combretum occidentale* L., nom. illeg., *Combretum secundum* Jacq., *Gaura fruticosa* Loebl.
Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(RNO, SAO).

Combretum lanceolatum Pohl ex Eichler

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON, PHA, SPE).

Combretum laxum Jacq.

Sin.: *Combretum bugi* Cambess., *Combretum jacquinii* Griseb. f. *bugi* (Cambess.) Eichler, *Combretum jacquinii* Griseb. f. *laxum* (Jacq.) Eichler, *Combretum jacquinii* Griseb., nom. superfl., *Combretum jacquinii* Griseb. var. *laxum* (Jacq.) Pulle,

Combretum mexicanum Bonpl., *Combretum mexicanum* Bonpl. var. *obovatum* DC., *Combretum variabile* Mart.

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CEN, CON, PAI, SPE).

Combretum leprosum Mart.

Sin.: *Combretum hasslerianum* Chodat
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Notas: Especie excluida de la Flora Argentina

Combretum mellifluum Eichler

Sin.: *Combretum mellifluum* Eichler var. *cuspidatum* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Conocarpus L.

Conocarpus erectus L.

Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Laguncularia C.F. Gaertn.

Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn.

Sin.: *Conocarpus racemosus* L.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Terminalia L., nom. cons.

Terminalia argentea Mart. & Zucc.

Sin.: *Myrobalanus argentea* (Mart.) Kuntze, *Myrobalanus biscutella* (Eichler) Kuntze, *Terminalia biscutella* Eichler, *Terminalia modesta* Eichler,

hom. illeg., *Terminalia sericea*
Cambess.

Arbusto o arbolito. Endémica. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Notas: Cita dudosa para la Argentina

***Terminalia australis* Cambess.**

Sin.: *Myrobalanus australis* (Cambess.)
Kuntze

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).
URY(COL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

***Terminalia catappa* L.**

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Terminalia glabrescens* Mart.**

Sin.: *Chuncoa brasiliensis* Cambess.,
Myrobalanus glabrescens (C. Mart.)
Kuntze

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, CON).

***Terminalia kleinii* (Exell) Gere & Boatwr.**

Sin.: *Buchenavia igarataensis* N.F.
Mattos, *Buchenavia kleinii* Exell

Árbol. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Terminalia triflora* (Griseb.) Lillo**

Sin.: *Chuncoa triflora* Griseb.,
Myrobalanus balansae Kuntze,
Myrobalanus triflora (Griseb.) Kuntze,
Terminalia balansae (Kuntze) K.
Schum., *Terminalia balansae* (Kuntze)
K. Schum. var. *bernardiensis* (Chodat)
Hassl., *Terminalia hassleriana* Chodat,
Terminalia hassleriana Chodat var.
bernardinensis Chodat, *Terminalia*
reitzii Exell, *Terminalia uleana* Engl. ex
Alwan & Stace

Arbusto o árbol. Nativa. 300-1700 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,
JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,
SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU,
CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA,
ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

COMMELINACEAE

***Callisia* Loeffl.**

***Callisia monandra* (Sw.) Schult. & Schult.
f.**

Sin.: *Apoleia diffusa* Raf., *Apoleia*
monandra (Sw.) H. E. Moore, *Callisia*
umbellulata Lam., *Leptocallisia*
monandra (Sw.) A.Ludw. & Rohweder,
Leptocallisia umbellulata (Lam.)
Pichon, *Tradescantia monandra* Sw.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR,
RGS, SCA).

***Callisia repens* (Jacq.) L.**

Sin.: *Hapalanthus repens* Jacq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CEN, PAI).

***Commelina* L.**

***Commelina benghalensis* L.**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

***Commelina catharinensis* Hassemer,
J.P.R. Ferreira, Funez & J.D. Medeiros**

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

***Commelina dielsii* Herter**

Sin.: *Commelina erecta* L. f. *dielsii* (Herter)
Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(ERI). URY(PAY).

***Commelina diffusa* Burm. f.**

Sin.: *Commelina cayennensis* Rich.,
Commelina diffusa Burm. f. var. *gigas*
(Small) Faden, *Commelina longicaulis*
Jacq., *Commelina schomburgkiana*
Klotzsch, *Commelina sellowiana* Kunth
Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).
PRY(CAN, CEN, CON, COA, GUA,
MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA,
RNO, SAO, SJO, TYT).

***Commelina erecta* L.**

Sin.: *Commelina angustifolia* Michx.,
Commelina assurgens Larrañaga,
Commelina cyanantha Rojas Acosta,
Commelina elegans Kunth,
Commelina erecta L. f. *candida* Standl.
& Steyer., *Commelina erecta* L. f.
hamipila (Wright) Brashier, *Commelina*
erecta L. f. *roseo-purpurea* (Herter)
Bacigalupo, *Commelina erecta* L. f.
villosa (C.B. Clarke) Standl. &
Steyer., *Commelina erecta* L. var.
angustifolia (Michx.) Fernald,
Commelina erecta L. var. *hamipila*
(Wright) Fernald, *Commelina*
guaranitica C.B. Clarke ex Chodat &
Hassl., *Commelina hamipila* Wright,
Commelina pohliana Seub.,
Commelina roseo-purpurea Herter,
Commelina sulcata Willd. ex Roem. &
Schult., *Commelina villosa* (C.B.
Clarke) C.B. Clarke, *Commelina*
virginica L. var. *angustifolia* (Michx.)
C.B. Clarke, *Commelina virginica* L.
var. *australis* C.B. Clarke, *Commelina*

virginica L. var. *villosa* C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, RME). PRY(AMA, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, PAY, ROC).

***Commelina obliqua* Vahl**

Sin.: *Cervi* & Tardivo, *Commelina robusta* Kunth, *Commelina vestita* Seub., *Commelina vilavelhensis* D. Corrêa da Maia

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, MIE). URY(ART).

***Commelina platyphylla* Klotzsch ex Seub.**

Sin.: *Commelina balansae* (C.B. Clarke) Herter, *Commelina platyphylla* Klotzsch ex Seub. var. *balansae* C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CAU, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART).

***Commelina tuberosa* L.**

Sin.: *Commelina alpestris* Standl. & Steyerl., *Commelina cayennensis* Rich. var. *pubescens* Griseb., *Commelina clandestina* Mart., *Commelina coelestis* Willd., *Commelina elliptica* Kunth, *Commelina fasciculata* Ruiz & Pav., *Commelina fasciculata* Ruiz & Pav. subsp. *chacoensis* Slanis & Bulacio

Hierba. Nativa. 1000-2800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

***Dichorisandra* J.C. Mikan, nom. cons.**

***Dichorisandra hexandra* (Aubl.) C.B. Clarke**

Sin.: *Commelina hexandra* Aubl., *Dichorisandra aubletiana* Schult. f., *Dichorisandra aubletiana* Schult. f. var. *intermedia* (Mart.) C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

***Dichorisandra incurva* Mart. ex Schult. f.**

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Dichorisandra paranaensis* D. Corrêa da Maia, Cervi & Tardivo**

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Dichorisandra pubescens* Mart. ex Schult. f.**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Dichorisandra thyrsoiflora* J.C. Mikan**

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Floscopa* Lour.**

Floscopa glabrata* (Kunth) Hassk. var. *glabrata

Sin.: *Dithyrocarpus glabratus* Kunth

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(RIV).

***Floscopa glabrata* (Kunth) Hassk. var. *hirsuta* (Kunth) C.B. Clarke**

Sin.: *Dithyrocarpus hirsutus* Kunth

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Gibasis* Raf.**

***Gibasis geniculata* (Jacq.) Rohweder**

Sin.: *Aneilema geniculatum* (Jacq.) Woodson, *Tradescantia geniculata* Jacq.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, GUA, PHA, SPE).

***Murdannia* Royle**

***Murdannia nudiflora* (L.) Brenan**

Sin.: *Commelina nudiflora* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Murdannia paraguayensis* (C.B. Clarke ex Chodat) G. Brückn.**

Sin.: *Aneilema paraguayense* C.B. Clarke ex Chodat, *Phaeneilema paraguayense* (C.B. Clarke ex Chodat) G. Brückn. na

Hierba. Nativa.

Países: PRY(AMA, CAN).

***Tinantia* Scheidw., nom. cons.**

***Tinantia erecta* (Jacq.) Schltdl.**

Sin.: *Tinantia fugax* Scheidw., *Tinantia fugax* Scheidw. var. *erecta* (Jacq.) Drumm. ex C.B. Clarke, *Tradescantia erecta* Jacq., *Tradescantia latifolia* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 600-1600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR, SCA).

Tradescantia L.

Tradescantia boliviiana (Hassk.) J.R. Grant

Sin.: *Mandonia boliviiana* Hassk.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, COA, GUA, PAI).

Tradescantia catharinensis Hassemer & Funez

Sin.: *Tradescantia crassula* Link & Otto var. *gaudichaudii* C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(SCA).

Tradescantia cerinthoides Kunth

Sin.: *Tradescantia blossfeldiana* Mildbraed, *Tradescantia koernickeana* Seub.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(SJO).

Tradescantia chrysophylla Pellegr.

Sin.: *Tradescantia serrana* Hassemer & Funez

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tradescantia crassula Link & Otto

Sin.: *Tradescantia schwirkowskiana* Funez, Hassemer & J.P.R. Ferreira

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(CLA, MON, ROC, TYT).

Tradescantia cymbispatha C.B. Clarke

Hierba. Nativa.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA, ITA, PAI, SPE).

Tradescantia decora W. Bull

Sin.: *Tradescantia multibracteata* M. Ferrarese, Büneker & Canto-Dorow, *Tradescantia valida* G. Brückn.

Hierba. Endémica. 100-300 m.

Países: BRA(RGS).

Tradescantia fluminensis Vell.

Sin.: *Tradescantia albiflora* Kunth

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LSR, LLA, JFE). PRY(APA, CEN, COA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Notas: Introducida en Chile

Tradescantia insularis Hassemer & Funez

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(SCA).

Tradescantia mundula Kunth

Hierba. Nativa.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MON, RNO, ROC, TYT).

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt

Sin.: *Setcreasea pallida* Rose

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Tradescantia seubertiana Pellegr.

Hierba. Endémica. 700-1800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Tradescantia spathacea Sw.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tradescantia tenella Kunth

Sin.: *Tradescantia anagallidea* Seub., *Tradescantia fluminensis* Vell. var. *tenella* (Kunth) C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA). URY(ART, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Tradescantia tucumanensis Pellegr.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(GUA, MIE, ÑEE).

Tradescantia umbraculifera Hand.-Mazz.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, PAI).

Tradescantia zanonía (L.) Sw.

Sin.: *Commelina zanonía* L.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tradescantia zebrina Bosse

Sin.: *Tradescantia pendula* (Schnizl.) D.R. Hunt, *Zebrina pendula* Schnizl., *Zebrina purpusii* G. Brückn.

Hierba. Introducida. 400-700 m.

Países: ARG(BAI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Tripogandra Raf.

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos

Sin.: *Tradescantia diuretica* Mart., *Tradescantia elongata* G. Mey. var. *diuretica* (Mart.) C.B. Clarke,

Tripogandra elongata (G. Mey.)
Woodson f. *diuretica* (Mart.) Standl. &
Steyerm.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAA, CAN, CEN, GUA).
URY(MON).

Tripogandra glandulosa (Seub.)
Rohweder

Sin.: *Descantaria glandulosa* (Seub.) G.
Brückn., *Descantaria pflanzii* G.
Brückn., *Descantaria radiata* (C.B.
Clarke) G. Brückn., *Tradescantia*
glandulosa Seub., *Tradescantia*
pflanzii G. Brückn., *Tradescantia*
radiata C.B. Clarke, *Tripogandra*
pflanzii (G. Brückn.) Burkart, comb.
superfl., *Tripogandra pflanzii* (G.
Brückn.) Celarier, *Tripogandra radiata*
(C.B. Clarke) Bacigalupo

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA,
GUA, ÑEE, PHA, SPE). URY(CLA,
RIV, TYT).

Tripogandra multiflora (Sw.) Raf.

Sin.: *Tradescantia multiflora* Sw.,
Tradescantia multiflora Sw. var.
parviflora (Ruiz & Pav.) C.B. Clarke,
Tradescantia parviflora Ruiz & Pav.,
Tripogandra multiflora (Sw.) Raf. f.
parviflora (Ruiz & Pav.) Bacigalupo

Hierba. Nativa. 500-800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Tripogandra purpurascens (Schauer)
Handlos subsp. **australis** Handlos
Hierba. Nativa. 200-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL,
TUC).

CONNARACEAE

Connarus L.

Connarus rostratus (Vell.) L.B. Sm.

Sin.: *Canicidia rostrata* Vell., *Connarus*
cymosus Planch.

Arbusto o arbolito. Nativa. 100-700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rourea Aubl., nom. cons.

Rourea gracilis G. Schellenb.

Liana. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

CONVOLVULACEAE

Aniseia Choisy

Aniseia argentina (N.E. Br.) O'Donell

Sin.: *Aniseia cernua* Moric. var. *ambigua*
Meisn., *Ipomoea argentina* N.E. Br.,
Ipomoea argentinensis Speg.,
Ipomoea cernua (Moric.) Arechav. f.
chacoensis Hassl., *Ipomoea cernua*
(Moric.) Arechav. f. *palmirensis*
Arechav., *Ipomoea cernua* (Moric.)
Arechav. f. *platensis* (N.E. Br.) Hassl.,
Ipomoea cernua (Moric.) Arechav. f.
yapeyuana Arechav., *Ipomoea cernua*
(Moric.) Arechav. var. *ambigua*
(Meisn.) Arechav.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, MIS, SFE). BRA(RGS).
PRY(CON, ÑEE, PHA). URY(ART,
CLA, COL, DUR, PAY, RNO, RIV,
SAO, SOR, TYT).

Aniseia luxurians (Moric.) Athiê-Souza &
Buriel

Sin.: *Ipomoea grisebachiana* Meisn.,
Ipomoea jamesonii Choisy, *Ipomoea*
luxurians Moric., *Ipomoea sericantha*
Griseb., nom. illeg., *Ipomoea sericea*
Spreng. ex Choisy, nom. illeg., *Iseia*
luxurians (Moric.) O'Donell,
Jacquemontia luxurians (Moric.)
Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR). PRY(ÑEE).

Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy

Sin.: *Aniseia cernua* Moric. f. *parviflora*
Chodat & Hassl., *Aniseia martinicensis*
(Jacq.) Choisy var. *ambigua* Hallier f.,
Aniseia uniflora (Burm. f.) Choisy,
Convolvulus martinicensis Jacq.,
Convolvulus uniflorus Burm. f.,
Ipomoea cernua (Moric.) Arechav. f.
acutifolia Hassl., *Ipomoea cernua*
(Moric.) Arechav. f. *obtusifolia* Hassl.,
nom. superfl., *Ipomoea cernua* (Moric.)
Arechav. f. *paraguariensis* Hassl.,
Ipomoea lanceolata G. Don, *Ipomoea*
martinicensis (Jacq.) G. Mey.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).

Bonamia Thouars, nom. cons.

Bonamia agrostopolis (Vell.) Hallier f.

Sin.: *Bonamia agrostopolis* (Vell.) Hallier f.
var. *velutina* Hallier f., *Bonamia*
tomentosa Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA,
AMA, CAU).

Bonamia balansae Hallier f.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(APA, AMA, CON).

Bonamia sericea (Griseb.) Hallier f. var. **latifolia** O'Donnell

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(SDE, TUC).

Bonamia sericea (Griseb.) Hallier f. var. **sericea**Sin.: *Breweria sericea* Griseb.,
Convolvulus breweraceus Kuntze

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, LRI, SLU, SDE, TUC).

Bonamia subsessilis Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(AMA).

Calystegia R. Br., nom. cons.**Calystegia brummittii** P.P.A. Ferreira & Sim.-Bianch.

Enredadera. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Calystegia tuguriorum (G. Forst.) R. Br. ex Hook. f.Sin.: *Calystegia hantelmannii* Phil.,
Calystegia sepium (L.) R. Br. var.
hantelmannii (Phil.) Reiche,
Convolvulus tuguriorum G. Forst.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: CHL(LSR, AIS, JFE).

Camonea Raf.**Camonea umbellata** (L.) Simões & StaplesSin.: *Convolvulus umbellatus* L., *Ipomoea polyanthes* Roem. & Schult., *Ipomoea umbellata* (L.) G. Mey., nom. illeg.,
Merremia umbellata (L.) Hallier f.,*Merremia umbellata* (L.) Hallier f. var.
occidentalis Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL).
BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CEN,
CON).**Convolvulus** L.**Convolvulus arvensis** L.Sin.: *Convolvulus arvensis* L. var.
hastulatus Meisn., *Convolvulus*
arvensis L. var. *villosus* Choisy

Enredadera. Introducida. 0-3200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU,
RNE, SCR, SFE, SJU, SLU).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,
MAG, RME, JFE). URY(CAS, COL,
MON).**Convolvulus bonariensis** Cav.Sin.: *Aniseia diversifolia* Walp.,
Convolvulus bonariensis Cav. var.
multiflorus Phil., *Convolvulus dissectus*
Cav. var. *diversifolius* (Walp.) Reiche,
Convolvulus triflorus Phil., nom. illeg.

Enredadera. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU,
RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL,
RME). PRY(COA). URY(LAV).**Convolvulus chilensis** Pers.Sin.: *Convolvulus canescens* Phil.,
Convolvulus dissectus Cav., nom.
illeg., *Convolvulus dissectus* Cav. var.
canescens (Phil.) ReicheHierba o enredadera. Endémica. 0-
1800 m.Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, RME).**Convolvulus crenatifolius** Ruiz & Pav.
subsp. **crenatifolius**

Enredadera. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, RNE,
SAL, SJU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,
CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, SPE).
URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL,
PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC).**Convolvulus crenatifolius** Ruiz & Pav.
subsp. **montevidensis** (Spreng.)

J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Sin.: *Breweria montevidensis* Peter,
Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav.
var. *argentinicus* Hallier f.,
Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav.
var. *montevidensis* (Spreng.) Hallier f.,
Convolvulus montevidensis Spreng.,
Convolvulus montevidensis Spreng.
var. *megapotamicum* Meisn.,
Convolvulus montevidensis Spreng.
var. *ottonis* (Meisn.) Chodat & Hassl.,
Convolvulus ottonis Meisn., *Ipomoea*
montevidensis (Spreng.) G. Don,
Ipomoea ottoensis Choisy

Enredadera. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, MIS, SDE,
TUC). BRA(PAR, RGS). URY(CAS,
COL, CLA, MON, RNO, SAO).**Convolvulus demissus** ChoisySin.: *Convolvulus andinus* Phil.,
Convolvulus demissus Choisy var.
andinus (Phil.) Reiche, *Convolvulus*
demissus Choisy var. *ovatus* (Phil.)
Reiche, *Convolvulus ovatus* Phil.,
nom. illeg.

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ,
LBO, MAU, RME).**Convolvulus ensifolius** P.P.A. Ferreira & Sim.-Bianch.

Subarbusto. Endémica.

- Países: BRA(PAR, RGS).
- Convolvulus hasslerianus** (Chodat) O'Donnell
Sin.: *Breweria hassleriana* Chodat, *Convolvulus mollis* Meisn., hom. illeg. f. *amplexicaule* Hassl., *Convolvulus mollis* Meisn., hom. illeg. var. *hasslerianus* (Chodat) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, SPE).
- Convolvulus hermanniae** L'Hér. subsp. **erosus** (Desr.) J.R.I. Wood & R.W. Scotland
Sin.: *Aniseia costata* (Meyen) Walp., *Convolvulus costatus* Meyen, *Convolvulus erosus* Desr., *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *albido-villosus* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *elongatus* Choisy, nom. illeg., *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *viridis* Meisn., *Convolvulus mollis* Meisn., hom. illeg. var. *albido-villosus* Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-2800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(RME). PRY(COA). URY(MON).
- Convolvulus hermanniae** L'Hér. subsp. **hermanniae**
Sin.: *Convolvulus crenatus* Jacq., *Convolvulus incanus* Vahl, *Ipomoea hermanniae* (L'Hér.) G. Don
Enredadera. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA). URY(FLO, MON, PAY, SAO, SJO, TAC).
- Convolvulus laciniatus** Desr.
Sin.: *Convolvulus geranioides* Phil., *Convolvulus laciniatus* Desr. f. *pinnatisecta* Arechav., *Convolvulus laciniatus* Desr. f. *subglabra* Arechav., *Convolvulus laciniatus* Desr. var. *hirsutus* Desr., *Convolvulus laciniatus* Desr. var. *peduncularis* Meisn., *Convolvulus lasianthus* Cav., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn., nom. illeg. var. *glabra* Griseb.
Enredadera. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL). URY(ART, CAS, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).
- Convolvulus liloi** O'Donnell
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
Notas: Citado para Paraguay (Chiarini & Ariza Espinar 2006) sin indicar localidad ni material de referencia.
- Convolvulus montanus** Ooststr.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, MEN, SJU).
- Convolvulus schulzei** O'Donnell
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
- Convolvulus selloi** Meisn.
Enredadera. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Convolvulus sepium** L. subsp. **americana** (Sims) Brummitt
Sin.: *Aniseia arifolia* Meisn., *Calystegia rosea* Phil., *Calystegia sepium* (L.) R. Br. subsp. *americana* (Sims) Brummitt, *Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *americana* (Sims) Kitag., *Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *rosea* Choisy, nom. illeg., *Convolvulus sepium* L. var. *americanus* Sims
Enredadera. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, RME, IPA). URY(CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).
- Convolvulus sepium** L. subsp. **sepium**
Sin.: *Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *sepium*, *Volvulus sepium* (L.) Junger
Enredadera. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN). BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME, JFE, IPA).
- Convolvulus soldanella** L.
Sin.: *Calystegia soldanella* (L.) Roem. & Schult.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA). URY(CAS, MAL, MON, ROC).
- Cressa** L.
- Cressa nudicaulis** Griseb.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).
- Cressa truxillensis** Kunth
Sin.: *Cressa australis* R. Br. var. *petiolata* Meisn., *Cressa cretica* L. var. *truxillensis* (Kunth) Choisy
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, RME). PRY(APY). URY(MON).

Cuscuta L.**Cuscuta alataloba** Yunck.

Sin.: *Cuscuta alataloba* Yunck. var. *monosperma* Yunck.

Enredadera parásita. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Cuscuta americana L.

Sin.: *Cuscuta americana* L. var. *spectabilis* (Choisy) Progel, *Cuscuta spectabilis* Choisy

Enredadera parásita. Nativa.

Países: ARG(JUU).

Cuscuta andina Phil.

Sin.: *Cuscuta decora* Choisy var. *integriscula* Engelm., *Cuscuta indecora* Choisy var. *integriscula* (Engelm.) Yunck., *Cuscuta racemosa* Mart. var. *andina* (Phil.) Reiche

Enredadera parásita. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(MAU, RME).

Cuscuta argentinana Yunck. var. **argentinana**

Enredadera parásita. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Cuscuta argentinana Yunck. var. **parviflora** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(TUC).

Cuscuta boliviana Yunck. var. **boliviana**

Sin.: *Cuscuta boliviana* Yunck. var. *typica* Hunz., nom. inval.

Enredadera parásita. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).

Cuscuta boliviana Yunck. var. **paranensis** Hunz.

Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Cuscuta campestris Yunck.

Sin.: *Cuscuta arvensis* Beyr. var. *calycina* (Engelm.) Engelm., *Cuscuta pentagona* Engelm. var. *calycina* Engelm.

Enredadera parásita. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(CAS).

Cuscuta chilensis Ker Gawl.

Sin.: *Cuscuta aurea* Phil., nom. illeg.

Enredadera parásita. Nativa. 1000-2300 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Cuscuta corniculata Engelm.

Enredadera parásita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cuscuta cristata Engelm. var. **chacoensis** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, SFE).

Cuscuta cristata Engelm. var. **cristata**

Enredadera parásita. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LRI, SDE). URY(COL).

Cuscuta epilinum Weihe

Enredadera parásita. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR).

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. var. **angustissima** (Engelm.) Yunck.

Sin.: *Cuscuta epithymum* (L.) Murray ex L. f. *angustissima* Engelm.

Enredadera parásita. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Notas: Cita dudosa para Chile [Costea & Teillier, Gayana Bot. 79(2): 86. 2022]

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. var. **epithymum**

Sin.: *Cuscuta europaea* L. var. *epithymum* L.

Enredadera parásita. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE).

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. var. **macranthera** (Heldr. & Sartori ex Boiss.) Engelm.

Sin.: *Cuscuta macranthera* Heldr. & Sartori ex Boiss.

Enredadera parásita. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Cuscuta flossdorfii Hicken var. **flossdorfii**

Sin.: *Cuscuta brevisquamata* Yunck.

Enredadera parásita. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(COR, LRI, TUC).

Cuscuta flossdorfii Hicken var. **microstyla** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(LRI).

- Cuscuta flossdorfii** Hicken var. **pampagrandensis** Hunz.
Enredadera parásita. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL).
- Cuscuta flossdorfii** Hicken var. **tucumanensis** Hunz.
Enredadera parásita. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(TUC).
- Cuscuta friesii** Yunck.
Enredadera parásita. Endémica. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUU).
- Cuscuta globiflora** Engelm.
Enredadera parásita. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Cuscuta grandiflora** Kunth
Enredadera parásita. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Cuscuta incurvata** Progel
Sin.: *Cuscuta incurvata* Progel var. *apaensis* Chodat & Hassl.
Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).
- Cuscuta indecora** Choisy var. **indecora**
Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, NEU, RNE, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY).
- Cuscuta indecora** Choisy var. **longisepala** Yunck.
Enredadera parásita. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,
- MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(GUA).
- Cuscuta indecora** Choisy var. **neuropetala** (Engelm.) Hitchc.
Sin.: *Cuscuta neuropetala* Engelm.
Enredadera parásita. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Cuscuta insquamata** Yunck. var. **argentina** Hunz.
Enredadera parásita. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(SAL).
- Cuscuta longiloba** Yunck.
Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).
- Cuscuta membranacea** Yunck.
Enredadera parásita. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, LRI, SAL, TUC).
- Cuscuta micrantha** Choisy
Sin.: *Cuscuta micrantha* Choisy var. *holwayi* Yunck., *Cuscuta micrantha* Choisy var. *latiflora* Engelm., *Cuscuta sparsiflora* Phil. ex Reiche
Enredadera parásita. Endémica. 3000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, RME).
- Cuscuta microstyla** Engelm.
Sin.: *Cuscuta bicolor* Hunz., *Cuscuta microstyla* Engelm. var. *bicolor* (Hunz.) Hunz.
Enredadera parásita. Endémica. 1600-3100 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, LBO, BIO, RME).
- Cuscuta obtusiflora** Kunth
Sin.: *Cuscuta stuckertii* Yunck.
Enredadera parásita. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MEN, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(CEN).
- Cuscuta odorata** Ruiz & Pav. var. **botryoides** Engelm.
Enredadera parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Cuscuta odorata** Ruiz & Pav. var. **odorata**
Enredadera parásita. Nativa. 600-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, LBO).
- Cuscuta orbiculata** Yunck.
Enredadera parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Cuscuta parodiana** Yunck. var. **parodiana**
Sin.: *Cuscuta odorata* Ruiz & Pav. var. *holwayana* Yunck.
Enredadera parásita. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Cuscuta parodiana** Yunck. var. **tucumana** (Yunck.) Hunz.
Sin.: *Cuscuta tucumana* Yunck.
Enredadera parásita. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(TUC).
- Cuscuta partita** Choisy
Enredadera parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Cuscuta pauciflora** Phil.
Sin.: *Cuscuta pusilla* Phil. ex Yunck.
Enredadera parásita. Endémica. 500-3300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SJU, SCR). CHL(MAU, ARA, LSR, LLA).

Cuscuta platyloba Progel var. **pampeana** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR).

Cuscuta platyloba Progel var. **platyloba**

Sin.: *Cuscuta platyloba* Progel var. *triangulata* Yunk., *Cuscuta racemosa* Mart. var. *calycina* Engelm.

Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, MON, RIV, ROC, SJO).

Cuscuta purpurata Phil.

Sin.: *Cuscuta purpurata* Phil. f. *pallida* Yunk.

Enredadera parásita. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cuscuta racemosa Mart. var. **nuda** Engelm.

Enredadera parásita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cuscuta racemosa Mart. var. **racemosa**

Enredadera parásita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cuscuta rojasii Hunz.

Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Cuscuta rotundiflora Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Cuscuta rustica Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 4000 m.

Países: CHL(COQ).

Cuscuta suaveolens Ser.

Sin.: *Cuscuta floribunda* Phil., nom. illeg., *Cuscuta racemosa* Mart. var. *chiliana* Engelm.

Enredadera parásita. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, MEN, SJU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(DUR, SAO, SJO).

Notas: Citada para Brasil por Hunziker (1950b) sin mencionar material de referencia.

Cuscuta taimensis P.P.A. Ferreira & Dettke

Enredadera parásita. Endémica.

Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, TYT).

Cuscuta werdermannii Hunz.

Sin.: *Cuscuta suaveolens* Ser. var. *papillata* Yunk.

Enredadera parásita. Endémica. 300 m

Países: CHL(COQ).

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **carinata** (Yunk.) Yunk.

Sin.: *Cuscuta trichostyla* Engelm. var. *carinata* Yunk.

Enredadera parásita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CEN, COA). URY.

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **lanceolata** Yunk.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **longibracteata** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(FOR).

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **xanthochortos**

Sin.: *Cuscuta corniculata* Engelm. var. *racemulosa* Engelm., *Cuscuta trichostyla* Engelm., *Cuscuta xanthochortos* Mart. ex Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Cuscuta yunckeriana Hunz.

Enredadera parásita. Endémica.

Países: ARG(RNE).

Dichondra J.R. Forst. & G. Forst.

Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Dichondra evolvulacea* (L. f.) Britton var. *argentea* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze

Hierba. Nativa. 2000-3500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, SLU).

Dichondra macrocalyx Meisn.

Sin.: *Dichondra evolvulacea* (L. f.) Britton f. *macrocalyx* (Meisn.) Kuntze,

Dichondra evolvulacea (L. f.) Britton var. *villosa* (D. Parodi) Kuntze,

Dichondra repens J.R. Forst. & G. Forst. var. *macrocalyx* (Meisn.)

Hoehne, *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *villosa* (D. Parodi)

O'Donnell, *Dichondra villosa* D. Parodi Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada para Paraguay (Chiarini & Ariza Espinar 2006) sin indicar localidad o material de referencia.

Dichondra micrantha Urb.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(RGS, SCA).

Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris

Sin.: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *microcalyx* Hallier f., *Dichondra sericea* Sw. var. *microcalyx* (Hallier f.) H.T. Buck

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SJU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, ARA). PRY(COA, GUA, ÑEE). URY(CLA, DUR, FLA, MON, ROC).

Dichondra sericea Sw. var. **holosericea**

(O'Donell) Fabris

Sin.: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *holosericea* O'Donell

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU, SDE). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA). URY(ART, FLO, FLA, MAL, MON, SJO, SOR).

Dichondra sericea Sw. var. **sericea**

Sin.: *Dichondra evolvulacea* (L. f.) Britton var. *sericea* (Sw.) Kuntze, *Dichondra parvifolia* Meisn., *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *sericea* (Sw.) Choisy

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). PRY(CEN, COA, PAI). URY(CLA, LAV, MAL, MON, ROC, SOR).

Dichondra sericea Sw. var. **tomentosa**

H.T. Buck ex Tronc. & Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI). URY(RIV, SJO, TAC).

Distimake Raf.

Distimake aegyptius (L.) Simões & Staples

Sin.: *Convolvulus pentaphyllus* L., nom. illeg., *Ipomoea aegyptia* L., *Ipomoea pentaphylla* (L.) Jacq., nom. illeg., *Merremia aegyptia* (L.) Urb., *Merremia pentaphylla* (L.) Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL). PRY(APY, AMA).

Distimake cissoides (Lam.) Simões & Staples

Sin.: *Batatas cissoides* (Lam.) Choisy, *Convolvulus cissoides* Lam., *Ipomoea cissoides* (Lam.) Griseb., *Ipomoea cissoides* (Lam.) Griseb. f. *diminuta* Meisn., *Ipomoea cissoides* (Lam.) Griseb. f. *major* Meisn., *Ipomoea cissoides* (Lam.) Griseb. f. *subsessilis* Meisn., *Ipomoea cissoides* (Lam.) Griseb. f. *viscidula* Meisn., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *diminuta* (Meisn.) Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *guaranitica* Hassl. & Chodat, *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *major* (Meisn.) Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *tomentosa* Hassl. & Chodat, *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *vulgaris* (Meisn.) Hassl., *Pharbitis cissoides* (Lam.) Peter

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, CAN, CON, COA, PAI, PHA).

Distimake digitatus (Spreng.) Simões & Staples

Sin.: *Gerardia digitata* Spreng., *Merremia digitata* (Spreng.) Hallier f. var. *digitata*

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Distimake dissectus (Jacq.) Simões & Staples var. **dissectus**

Sin.: *Convolvulus dissectus* Jacq., *Distimake dissectus* (Jacq.) Simões & Staples var. *chacoensis* (O'Donell) Petrongari & Sim.-Bianch., *Distimake dissectus* (Jacq.) Simões & Staples var. *edentatus* (Meisn.) Petrongari & Sim.-Bianch., *Ipomoea dissecta* (Jacq.) Pursh var. *maximiliani* (Meisn.) Lorentz, *Ipomoea fulva* Bertol., *Ipomoea maximiliani* Meisn., *Ipomoea sinuata* Ortega, *Ipomoea sinuata* Ortega var. *edentata* Meisn., *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *chacoensis* O'Donell, *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *edentata* (Meisn.) O'Donell, *Merremia sinuata* (Ortega) Hoehne var. *edentata* (Meisn.) Hoehne

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(ART, PAY).

Distimake hasslerianus (Chodat) Simões & Staples

Sin.: *Ipomoea hassleriana* Chodat & Hassl. f. *hassleriana*, *Ipomoea hassleriana* Chodat & Hassl. f. *mucronulatodenticulata* Chodat & Hassl., *Ipomoea hassleriana* Chodat & Hassl. f. *sinuatolobata* Chodat & Hassl., *Ipomoea hassleriana* Chodat var. *robusta* Hassl., *Merremia hassleriana* (Chodat & Hassl.) Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CAU, CON).

Distimake macrocalyx (Ruiz & Pav.)
Simões & Staples

Sin.: *Batatas glabra* (Aubl.) Benth.,
Convolvulus contortus Vell.,
Convolvulus glaber Aubl., nom. illeg.,
Convolvulus macrocalyx Ruiz & Pav.,
Ipomoea glabra (Aubl.) Choisy,
Ipomoea macrocalyx (Ruiz & Pav.)
Choisy, *Merremia glabra* (Aubl.) Hallier
f., *Merremia macrocalyx* (Ruiz & Pav.)
O'Donnell
Enredadera. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, APY, AMA, CAN, COA,
GUA, PAI).

Distimake maragniensis (Choisy)
Petrongari & Sim.-Bianch.

Sin.: *Ipomoea maragniensis* Choisy,
Merremia digitata (Spreng.) Hallier f.
var. *elongata* (Choisy) D.F. Austin &
Staples
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Distimake tomentosus (Choisy)
Petrongari & Sim.-Bianch.

Sin.: *Ipomoea tomentosa* Choisy,
Merremia tomentosa (Choisy) Hallier f.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Evolvulus L.

Evolvulus alsinoides (L.) L.

Sin.: *Convolvulus alsinoides* L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CEN, COA,
PAI).

Evolvulus arizonicus A. Gray

Hierba o enredadera. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE,
SDE, TUC). PRY(APY, PHA).
URY(SAO).

Evolvulus aurigenius Mart.

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Evolvulus barbatus Meisn.

Sin.: *Evolvulus aurigenius* Mart. var.
viscidulus Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA).

Evolvulus cardiophyllus Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA, PAI).

Evolvulus chamaepitys Mart. var.
paraguayensis Ooststr.

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(AMA).

Evolvulus chrysotrichos Meisn.

Sin.: *Evolvulus guaraniticus* Chodat &
Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: . PRY(AMA, PAI).

Evolvulus convolvuloides (Willd.)
Stearn

Sin.: *Evolvulus campestris* Brandegees,
Evolvulus glaber Spreng., *Nama*
convolvuloides Willd. ex Schult.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL,
TUC). PRY(APY, PHA).

Evolvulus corumbaensis Hoehne

Sin.: *Evolvulus pseudofilipes* Hassl., nom.
nud.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: . PRY(AMA, CON).

Evolvulus elegans Moric. var.
capillaceus Meisn.

Subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: . PRY(AMA).

Evolvulus filipes Mart.

Sin.: *Evolvulus filipes* Mart. var. *exilis*
(Meisn.) Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA,
CEN, COA).

Evolvulus glomeratus Nees & Mart. f.
echioides (Moric.) Ooststr.

Sin.: *Evolvulus echioides* Moric.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Evolvulus glomeratus Nees & Mart.
subsp. **grandiflorus** (D. Parodi)
Ooststr.

Sin.: *Evolvulus grandiflorus* D. Parodi,
Evolvulus martii Meisn. f. *saltense*
Arechav., *Evolvulus paraguariensis*
Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU,
GUA, ÑEE). URY(PAY, SAO).

Evolvulus hasslerianus Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(APA, AMA, CON).

Evolvulus latifolius Ker Gawl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR).
PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Evolvulus linarioides Meisn.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(PHA).

Evolvulus nummularius (L.) L.

Sin.: *Convolvulus nummularius* L.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Evolvulus pusillus Choisy

Subarbutifome. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Evolvulus sericeus Sw. f. **pedunculatus**

Ooststr.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(ERI, FOR, JUJ, SFE).

Notas: Podría tratarse de un individuo anómalo de *E. sericeus* (cfr. Chiarini & Ariza Espinar 2006: 28)

Evolvulus sericeus Sw. var. **elongatus**

(Choisy) O'Donell

Sin.: *Evolvulus falcatus* Griseb., *Evolvulus incanus* Pers. var. *elongatus* Choisy, *Evolvulus sericeus* Sw. var. *falcatus* (Griseb.) Ooststr., *Leucomalla lanuginosa* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TUC). CHL(RME).

Evolvulus sericeus Sw. var. **sericeus**

Sin.: *Evolvulus anomalus* Meisn., *Evolvulus araucanus* Phil., *Evolvulus holosericeus* Kunth, *Evolvulus sericeus* Sw. var. *holosericeus* (Kunth) Ooststr., *Evolvulus sericeus* Sw. var. *latis* Meisn.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI).

URY(CAS, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, TAC).

Evolvulus serpyllodes Meisn.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR).

Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy var.

cinereus Chodat & Hassl.

Subarbutifome. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS, SAL). PRY(CEN, COA, PAI).

Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy var.

tenuis

Subarbutifome. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA, GUA, PAI).

Ipomoea L., nom. cons.

Ipomoea abutiloides (Kunth) G. Don

Liana. Nativa. 0-600 m.

Países: . PRY(APY).

Ipomoea acutisepala O'Donell

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).

Ipomoea aemilii (O'Donell) J.R.I. Wood &

R. Degen

Sin.: *Ipomoea malpighipila* O'Donell var. *aemilii* O'Donell

Hierba. Endémica.

Países: PRY(APA).

Ipomoea aequiloba J.R.I. Wood & R.W.

Scotland

Enredadera. Nativa. 100-200 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CON).

Ipomoea alba L.

Sin.: *Calonyction aculeatum* (L.) House, *Calonyction bona-nox* (L.) Bojer, *Calonyction pulcherrimum* D. Parodi,

Calonyction speciosum Choisy, nom. illeg., *Convolvulus aculeatus* L., *Convolvulus aculeatus* L. var. *bona-nox* (L.) Kuntze, *Convolvulus bona-nox* (L.) Spreng., *Convolvulus pulcherrimus* Vell., *Ipomoea aculeata* (L.) Kuntze var. *bona-nox* (L.) Kuntze, *Ipomoea bona-nox* L., nom. superfl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(MON).

Ipomoea altoparanaensis O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

Ipomoea amnicola Morong

Sin.: *Ipomoea amnicola* Morong subsp. *chiliantha* (Hallier f.) J.R.I. Wood & Scotland, *Ipomoea chiliantha* Hallier f., *Ipomoea nuda* N.E. Br., nom. illeg.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE). PRY(APY, BOQ, COA, PAI, PHA).

Ipomoea aprica House

Sin.: *Ipomoea angustifolia* Choisy, nom. illeg.

Subarbutifome. Nativa.

Países: PRY(AMA, CAN).

Ipomoea argentea Meisn.

Hierba voluble. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Ipomoea argentinica Peter

Sin.: *Argyreia juramenti* (Kuntze) K. Schum., *Ipomoea juramenti* (Kuntze) O'Donell, *Murucoia juramenti* Kuntze, nom. superfl.

Hierba o enredadera. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(SCA). PRY(APY).

Notas: Wood et al. (2020) señalan que la cita de Brasil es dudosa.

***Ipomoea aristolochiifolia* G. Don**

Sin.: *Convolvulus aristolochiifolius* Kunth, nom. illeg., *Ipomoea austin-smithii* Standl., *Ipomoea concinna* House, *Ipomoea cordata* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Ipomoea peckoltii* Meisn., *Ipomoea peninsularis* Brandege, *Ipomoea tuerckheimii* Vatke ex Donn. Sm., *Ipomoea tweediei* Hook.

Enredadera. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA).

***Ipomoea asarifolia* (Desr.) Roem. & Schult.**

Sin.: *Convolvulus asarifolius* Desr., *Ipomoea nymphaeifolia* Griseb., nom. illeg., *Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, comb. superfl. var. *heterosepala* Chodat & Hassl., *Ipomoea urbica* Choisy, *Ipomoea urbica* Choisy var. *muricata* Choisy

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(APY, CON, COA, SPE).

***Ipomoea australis* (O'Donell) J.R.I. Wood & P. Muñoz**

Sin.: *Ipomoea cordatotriloba* Dennst. var. *australis* (O'Donell) D.F. Austin, *Ipomoea trichocarpa* Elliot, nom. illeg., *Ipomoea trichocarpa* Elliot, nom. illeg. var. *australis* O'Donell

Enredadera. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

***Ipomoea austrobrasiliensis* J.R.I. Wood & R.W. Scotland**

Enredadera. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Ipomoea batatas* (L.) Lam.**

Sin.: *Convolvulus batatas* L.

Enredadera. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Ipomoea bonariensis* Hook.**

Sin.: *Convolvulus hookerianus* D. Dietr., nom. superfl., *Ipomoea biglandulosa* Arechav., *Ipomoea bonariensis* Hook. subsp. *bonariensis* var. *chacoensis* O'Donell, *Ipomoea bonariensis* Hook. subsp. *bonariensis* var. *cordifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. subsp. *bonariensis* var. *grandiflora* Chodat & Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. subsp. *bonariensis* var. *bonariensis* var. *rupestris* Chodat & Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. subsp. *mollis* Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. subsp. *mollis* Hassl. var. *grandiflora* (Chodat & Hassl.) Hassl. f. *cordata* Hassl., nom. superfl., *Ipomoea bonariensis* Hook. subsp. *mollis* Hassl. var. *grandiflora* (Chodat & Hassl.) Hassl. f. *glabrata* Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. subsp. *mollis* Hassl. var. *grandiflora* (Chodat & Hassl.) Hassl. f. *intermedia* Hassl., nom. illeg., *Ipomoea bonariensis* Hook. subsp. *mollis* Hassl. var. *pubisepala* Hassl., nom. superfl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *calvescens* Hallier f., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *erecta* J.R.I. Wood & R.W. Scotland, *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Ipomoea heterotricha* Meisn., nom. illeg., *Ipomoea obtusiloba* Meisn., *Ipomoea obtusiloba* Meisn. var. *tridens* Meisn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, COL, SAO).

***Ipomoea cairica* (L.) Sweet**

Sin.: *Batatas cavanillesii* (Roem. & Schult.) G. Don, *Convolvulus cairicus* L., *Convolvulus cavanillesii* (Roem. & Schult.) Spreng., *Convolvulus heptaphyllus* Roxb., nom. illeg., *Convolvulus limphaticus* Vell., *Convolvulus tuberculatus* Desr., *Ipomoea cairica* (L.) Sweet var. *uniflora* (Meisn.) Hoehne, *Ipomoea cavanillesii* Roem. & Schult., *Ipomoea funaria* Larrañaga, *Ipomoea gracilipes* Hassl., *Ipomoea heptaphylla* Voigt, nom. illeg., *Ipomoea palmata* Forssk., *Ipomoea pentaphylla* Cav., nom. illeg., *Ipomoea pulchella* Roth var. *lineariloba* Hassl., *Ipomoea rosea* Choisy var. *pluripartita* Hassl., *Ipomoea stipulacea* Jacq., *Ipomoea stipulacea* Jacq. f. *uniflora* Meisn., *Ipomoea tuberculata* (Desr.) Roem. & Schult.

Enredadera. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, COL, MON, PAY).

***Ipomoea campestris* Meisn.**

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ipomoea carnea* Jacq. subsp. *carnea

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA, RGS).

Ipomoea carnea Jacq. subsp. **fistulosa**
(Mart. ex Choisy) D.F. Austin

Sin.: *Batatas crassicaulis* Benth., *Ipomoea crassicaulis* (Benth.) B.L. Rob., *Ipomoea fistulosa* Mart. ex Choisy, *Ipomoea gossypoides* D. Parodi, *Ipomoea texana* J.M. Coult.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA).

Ipomoea cheirophylla O'Donell

Enredadera. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY).

Ipomoea chodatiana O'Donell

Sin.: *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn., nom. illeg. f. *argentea* Hassl., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn., nom. illeg. f. *canescens* Hassl., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn., nom. illeg. var. *discolor* Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. f. *retusa* Chodat & Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. var. *elliptica* Chodat & Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. var. *glabrata* Chodat & Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. var. *sericea* Chodat & Hassl.

Hierba o enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CEN).

Ipomoea chondrosepala Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN, GUA, PAI, SPE).

Ipomoea cordillerae J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *ovata* Hallier f.

Enredadera. Endémica.

Países: PRY(COA, GUA, PAI).

Notas: Extinta (EX)

Ipomoea corymbosa (L.) Roth ex Roem. & Schult.

Sin.: *Convolvulus corymbosus* L., *Rivea corymbosa* var. *paniculata* Hassl., *Turbina corymbosa* (L.) Raf.

Liana. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Ipomoea crinicalyx S. Moore

Sin.: *Convolvulus crinicalyx* (S. Moore) Kuntze, *Ipomoea seleri* Millsp.

Enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

Ipomoea delphinioides Choisy

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada para Paraguay (Ferreira & Miotto, 2009) sin indicar ejemplar de referencia

Ipomoea descolei O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(ITA).

Ipomoea dolichopoda J.R.I. Wood & R. Degen

Hierba o enredadera. Endémica. 100-300 m.

Países: PRY(CAA).

Ipomoea dumetorum Willd. ex Roem. & Schult.

Sin.: *Convolvulus dumetorum* Kunth, *Convolvulus glaucescens* Kunth, *Convolvulus pauciflorus* Willd. ex Roem. & Schult., nom. illeg., *Convolvulus pauciflorus* Willd. ex Roem. & Schult. var. *chilensis* (A. Braun & Bouché) Kuntze, *Convolvulus pulchellus* Kunth, *Ipomoea chilensis* A.

Braun & Bouché, *Ipomoea dumetorum* Willd. ex Roem. & Schult. var. *glaucescens* (Kunth) Choisy, *Ipomoea oligantha* Choisy, *Ipomoea paposana* Phil., *Ipomoea pulchella* (Kunth) G. Don, comb. illeg.

Enredadera. Nativa. 900-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(ANT). PRY(APY).

Ipomoea dumosa (Benth.) L.O. Williams

Sin.: *Exogonium dumosum* Benth.

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ipomoea estrellensis O'Donell

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Ipomoea fiebrigii Hassl. ex O'Donell

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

Ipomoea fimbriosepala Choisy

Sin.: *Aniseia hastata* Meisn., *Ipomoea assumptionis* Britton, *Ipomoea phylloneura* Baker

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, PHA). URY(COL, ROC).

Ipomoea goyazensis Gardner

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ipomoea grandifolia (Dammer) O'Donell

Sin.: *Jacquemontia grandifolia* Dammer

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

- URY(ART, CLA, LAV, MON, PAY, SAO, SJO).
- Ipomoea graniticola** J.R.I. Wood & R.W. Scotland
Enredadera. Nativa.
Países: PRY(APY).
- Ipomoea granulosa** Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON).
- Ipomoea guaranitica** Chodat & Hassl.
Sin.: *Ipomoea cornucopia* Chodat & Hassl., *Ipomoea patula* Choisy var. *villosa* Meisn.
Enredadera. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).
- Ipomoea hederifolia** L.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).
- Ipomoea heptaphylla** Sweet
Sin.: *Ipomoea pulchella* Roth, *Ipomoea spiralis* House, *Ipomoea wrightii* A. Gray
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(PHA).
- Ipomoea hieronymi** (Kuntze) O'Donell
Sin.: *Argyria hieronymi* (Kuntze) K. Schum., *Argyria megapotamica* Griseb., *Ipomoea hieronymi* (Kuntze) O'Donell var. *calchaquina* O'Donell, *Ipomoea hieronymi* (Kuntze) O'Donell var. *kurtziana* (O'Donell) O'Donell, *Ipomoea kurtziana* O'Donell, *Murucoa hieronymi* Kuntze, *Murucoa megapotamica* (Griseb.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 500-2400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).
- Ipomoea hirsutissima** Gardner
Sin.: *Ipomoea hirsutissima* Gardner var. *integrifolia* Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa.
Países: PRY(APA, CAN).
- Ipomoea homotrichoidea** O'Donell
Sin.: *Ipomoea bonariensis* Hook. f. *lobata* Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. subsp. *aspera* Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *hispida* Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *tomentosa* Hassl., *Ipomoea heterotricha* Meisn., hom. illeg. var. *homotricha* Chodat & Hassl. f. *cordifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea heterotricha* Meisn., hom. illeg. var. *homotricha* Chodat & Hassl. f. *dentata* Chodat & Hassl., *Ipomoea heterotricha* Meisn., hom. illeg. var. *homotricha* Chodat & Hassl. f. *homotricha*, *Ipomoea heterotricha* Meisn., hom. illeg. var. *homotricha* Chodat & Hassl. f. *suborbiculata* Chodat & Hassl., *Ipomoea heterotricha* Meisn., hom. illeg. var. *homotricha* Chodat & Hassl. f. *subtriloba* Chodat & Hassl.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, PAI, SPE).
- Ipomoea imperati** (Vahl) Griseb.
Sin.: *Convolvulus imperati* Vahl
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Ipomoea indica** (Burm.) Merr.
Sin.: *Convolvulus acuminatus* Vahl, *Convolvulus bogotensis* Kunth, *Convolvulus congestus* (R. Br.) Spreng., *Convolvulus indicus* Burm., *Convolvulus mollis* Kunth, nom. illeg., *Convolvulus portoricensis* Spreng., *Ipomoea acuminata* (Vahl) Roem. & Schult., *Ipomoea bogotensis* (Kunth) G. Don, *Ipomoea cathartica* Poir.,
- Ipomoea congesta* R. Br., *Ipomoea mollis* G. Don, *Ipomoea portoricensis* (Spreng.) G. Don, *Ipomoea vahliana* House, *Pharbitis acuminata* (Vahl) Choisy, *Pharbitis acuminata* (Vahl) Choisy var. *congesta* (R. Br.) Choisy, *Pharbitis bogotensis* (Kunth) Choisy, *Pharbitis cathartica* (Poir.) Choisy, *Pharbitis mollis* Choisy, *Pharbitis rosea* Choisy
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(JFE). PRY(APA, CEN, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, COL, MON, PAY, SOR).
- Ipomoea indivisa** (Vell.) Hallier f.
Sin.: *Convolvulus indivisus* Vell.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MON, PAY, ROC, SOR, TAC).
- Ipomoea itapuaensis** J.R.I. Wood & R. Degen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAA, ITA).
- Ipomoea jujuyensis** O'Donell
Enredadera. Nativa. 1000-2600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Ipomoea lanuginosa** O'Donell
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(ITA).
- Ipomoea lilloana** O'Donell
Hierba. Nativa. 0-2600 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
- Ipomoea lobata** (Cerv.) Thell.
Sin.: *Mina lobata* Cerv.
Enredadera. Introducida. 0-800 m.

- Países: ARG(JUU).
- Ipomoea magna** Sim.-Bianch. & J.R.I. Wood
Liana. Nativa.
Países: PRY(AMA).
- Ipomoea malpighipila** O'Donell
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(APA, AMA, COA).
- Ipomoea malvaeoides** Meisn.
Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *albiflora* Hallier f., *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *argentea* O'Donell, *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *lineariloba* Hallier f., *Ipomoea pinifolioides* Arechav.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(CAN, CEN, CON, COA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, RIV).
- Ipomoea marginisepala** O'Donell
Enredadera. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).
- Ipomoea maurandioides** Meisn.
Sin.: *Ipomoea maurandioides* Meisn. var. *subtomentosa* (Chodat & Hassl.) J.R.I. Wood & R.W. Scotland, *Ipomoea serpens* Meisn. f. *crassifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea serpens* Meisn. var. *albiflora* Hallier f., *Ipomoea serpens* Meisn. var. *subtomentosa* Chodat & Hassl., *Ipomoea subtomentosa* (Chodat & Hassl.) O'Donell f. *albiflora* (Hallier f.) O'Donell, *Ipomoea subtomentosa* (Chodat & Hassl.) O'Donell f. *subtomentosa*
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).
- Ipomoea megalantha** J.R.I. Wood & R.W. Scotland
Hierba o subarbusto. Endémica.
Países: PRY(CAU).
- Ipomoea megapotamica** Choisy
Sin.: *Argyrea megapotamica* Griseb. var. *puberula* Griseb., *Ipomoea megapotamica* Choisy var. *cordifolia* Hassl., *Ipomoea megapotamica* Choisy var. *pauciflora* Meisn., *Ipomoea riograndensis* P.P.A. Ferreira & Miotto
Enredadera. Nativa. 300-500 m.
Países: ARG(SAL). BRA(RGS).
PRY(APY, AMA, PAI, PHA, SPE).
- Ipomoea mirabilis** P.P.A. Ferreira & Sim.-Bianch.
Enredadera o liana. Endémica.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).
- Ipomoea morongii** Britton
Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *heterophylla* Hallier f., *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *trifida* Hallier f.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, COA).
- Ipomoea mucronifolia** J.R.I. Wood & R.W. Scotland
Enredadera. Nativa.
Países: PRY(APY).
- Ipomoea muricata** (L.) Jacq.
Sin.: *Calonyction muricatum* (L.) G. Don, *Convolvulus muricatus* L., *Ipomoea turbinata* Lag., nom. illeg.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Ipomoea nil** (L.) Roth
Sin.: *Convolvulus nil* L., *Convolvulus tomentosus* Vell., *Ipomoea cuspidata* Ruiz & Pav., *Ipomoea longicuspis* Meisn., *Ipomoea scabra* Forssk., *Pharbitis cuspidata* (Ruiz & Pav.) G. Don
Enredadera. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(SAO).
- Ipomoea nitida** Griseb. subsp. **kravovickasii** J.R.I. Wood & R.W. Scotland
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
- Ipomoea nitida** Griseb. subsp. **nitida**
Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *nitida* (Griseb.) Hallier f.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). URY(ART, PAY).
- Ipomoea oblongifolia** (Hassl.) O'Donell
Sin.: *Ipomoea argyrea* (Choisy) Meisn. f. *oblongifolia* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(AMA).
- Ipomoea oranensis** O'Donell
Enredadera. Nativa. 500-1800 m.
Países: ARG(SAL).
- Ipomoea padillae** O'Donell
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
- Ipomoea paludicola** J.R.I. Wood & R.W. Scotland
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA, PAI, SPE).

***Ipomoea paludosa* O'Donell**

Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. f. *apiculata* Chodat & Hassl., *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *integrifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *uliginosa* Chodat & Hassl., *Ipomoea paludosa* O'Donell var. *uliginosa* (Chodat & Hassl.) O'Donell

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

***Ipomoea pampeana* P.P.A. Ferreira & Miotto**

Enredadera. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(RGS).

***Ipomoea paraguariensis* Peter**

Sin.: *Ipomoea argyreia* (Choisy) Meisn. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Ipomoea argyreia* (Choisy) Meisn. f. *salicifolia* Hassl., nom. illeg., *Ipomoea argyreia* (Choisy) Meisn. var. *discolor* Hassl., *Ipomoea argyreia* (Choisy) Meisn. var. *paraguariensis* (Peter) Chodat & Hassl., *Ipomoea nitens* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, PAI).

***Ipomoea paranaensis* Hoehne**

Sin.: *Ipomoea ramboi* O'Donell

Hierba. Nativa.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

***Ipomoea pes-caprae* (L.) R. Br.**

Sin.: *Convolvulus brasiliensis* L., *Convolvulus pes-caprae* L., *Ipomoea pes-caprae* (L.) R. Br. subsp. *brasiliensis* (L.) Ooststr.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).

***Ipomoea philomega* (Vell.) House**

Sin.: *Convolvulus philomega* Vell.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Ipomoea platensis* Ker Gawl.**

Sin.: *Convolvulus platensis* (Ker Gawl.) Spreng., *Ipomoea digitata* L. var. *septempartita* Meisn., nom. illeg., *Ipomoea lineariloba* Peter, *Ipomoea platensis* Ker Gawl. f. *subseptempartita* Hassl., *Ipomoea platensis* Ker Gawl. var. *erecta* Hassl., *Ipomoea platensis* Ker Gawl. var. *quinquepartita* Hassl., *Ipomoea platensis* Ker Gawl. var. *subnovempartita* Hassl.

Enredadera. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(CEN, GUA, PHA, SPE). URY(MON, SJO).

***Ipomoea plummerae* A. Gray**

Sin.: *Ipomoea capillacea* (Kunth) G. Don var. *patens* A. Gray, *Ipomoea cuneifolia* A. Gray, hom. illeg., *Ipomoea minuta* R.E. Fr., *Ipomoea minuta* R.E. Fr. f. *adiantifolia* (Ooststr.) O'Donell, *Ipomoea patens* (A. Gray) House, *Ipomoea plummerae* A. Gray f. *adiantifolia* Ooststr., *Ipomoea plummerae* A. Gray var. *cuneifolia* (A. Gray) J.F. Macbr.

Enredadera. Nativa. 1000-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

***Ipomoea procumbens* Mart. ex Choisy**

Sin.: *Ipomoea kunthiana* Meisn., *Ipomoea procumbens* Mart. ex Choisy var. *elliptica* Chodat & Hassl., *Ipomoea procumbens* Mart. ex Choisy var.

longepedunculata Chodat & Hassl., *Ipomoea tacuarembensis* Arechav. f. *foliosa* Arechav.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, COA, GUA, MIE). URY(CLA, RIV, TAC).

***Ipomoea procurrens* Meisn.**

Sin.: *Ipomoea procurrens* Meisn. var. *pilosula* Chodat & Hassl.

Enredadera. Nativa.

Países: PRY(AMA).

***Ipomoea pseudocalystegia* Hassl.**

Enredadera. Endémica.

Países: BRA(RGS). PRY(AMA, SPE).

***Ipomoea pseudomalvaeoides* Chodat & Hassl.**

Sin.: *Ipomoea pseudomalvaeoides* Chodat & Hassl. f. *palmata* Chodat & Hassl., *Ipomoea pseudomalvaeoides* Chodat & Hassl. f. *sericea* Chodat & Hassl., *Ipomoea pseudomalvaeoides* Chodat & Hassl. f. *trispaululata* Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN, SPE).

***Ipomoea pubescens* Lam.**

Sin.: *Batatas papiru* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Batatas subtriloba* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Convolvulus papiru* (Ruiz & Pav.) Spreng., *Convolvulus pubescens* (Lam.) Willd., *Ipomoea papiru* Ruiz & Pav., *Ipomoea papiru* Ruiz & Pav. var. *subtriloba* (Ruiz & Pav.) Pers., *Ipomoea subtriloba* Ruiz & Pav., *Pharbitis pubescens* (Lam.) Choisy

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

***Ipomoea purpurea* (L.) Roth**

Sin.: *Convolvulus purpureus* L., *Ipomoea glandulifera* Ruiz & Pav., *Ipomoea*

hirsutula J. Jacq., *Ipomoea purpurea* (L.) Roth var. *diversifolia* (Lindl.) O'Donell, *Pharbitis diversifolia* Lindl., *Pharbitis hispida* (Zuccagni) Choisy, *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, RME). PRY(APA, SPE). URY(MON, PAY).

Ipomoea quamoclit L.

Sin.: *Quamoclit vulgaris* Choisy
Enredadera. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy

Sin.: *Convolvulus cymosus* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Convolvulus ramosissimus* Poir., *Ipomoea dichotoma* Choisy, nom. illeg., *Ipomoea ramosissima* (Poir.) Choisy f. *rosea* (Hallier f.) O'Donell, *Ipomoea ramosissima* (Poir.) Choisy var. *rosea* Hallier f.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

Ipomoea rojasii Hassl.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAA, CON, COA).

Ipomoea rubens Choisy

Sin.: *Ipomoea riparia* G. Don, *Ipomoea vilcalyx* N.E. Br.
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA, ITA, PHA).

Ipomoea rubriflora O'Donell

Enredadera. Nativa. 500-3400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Notas: Citada para Paraguay (Austin & Huamán 1996; Chiarini & Ariza Espinar 2006) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Ipomoea saopaulista O'Donell

Sin.: *Ipomoea paulistana* O'Donell, nom. illeg.
Enredadera. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Ipomoea schulziana O'Donell

Enredadera. Nativa. 800-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Ipomoea sericosepala J.R.I. Wood & Scotland

Sin.: *Rivea cordata* Choisy, *Turbina cordata* (Choisy) D.F. Austin & Staples
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ipomoea setifera Poir.

Sin.: *Calystegia setifera* (Poir.) Meisn., *Convolvulus ruber* Vahl, *Convolvulus setifer* (Poir.) Spreng., *Ipomoea rubra* (Vahl) Millsp.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, APY, CON, ITA, MIE).

Ipomoea setosa Ker Gawl.

Sin.: *Batatas setosa* (Ker Gawl.) Lindl., *Calonyction setosum* (Ker Gawl.) Hallier f., *Convolvulus setosus* (Ker Gawl.) Spreng., *Gomphipus setosus* (Ker Gawl.) Raf., *Ipomoea pavonii* Choisy, *Ipomoea setosa* Ker Gawl. subsp. *pavonii* (Hallier f.) J.R.I. Wood & Scotland
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(SCA).

Ipomoea stuckertii O'Donell

Sin.: *Maripa decemlobata* Stuck. ex Seckt, nom. nud.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, SDE, SLU).

Ipomoea subalata Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Ipomoea subrevoluta Choisy

Sin.: *Ipomoea dactylophylla* Griseb., *Ipomoea subrevoluta* Choisy f. *acutiloba* Hassl., *Ipomoea subrevoluta* Choisy var. *genuina* Hassl., nom. inval.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CEN, CON, GUA, PAI).

Ipomoea subspicata (Meisn.) O'Donell

Sin.: *Ipomoea subspicata* (Meisn.) O'Donell var. *induta* Hassl., *Ipomoea virgata* Meisn. var. *subspicata* Meisn.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ipomoea sulina P.P.A. Ferreira & Miotto

Enredadera. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Ipomoea syringifolia Meisn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, PAI).

Ipomoea tacuarembensis Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(TAC).

Ipomoea theodori O'Donell

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(CAU).

Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy

Sin.: *Convolvulus tiliaceus* Willd.

- Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Ipomoea tricolor** Cav.
Enredadera. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, SAL).
- Ipomoea triloba** L.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Ipomoea uruguayensis** Meisn.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA).
- Ipomoea valenzuelensis** Chodat & Hassl.
Sin.: *Ipomoea valenzuelensis* Chodat & Hassl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA, GUA, PAI).
- Ipomoea variifolia** Meisn.
Hierba o liana. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).
- Ipomoea vivianae** Krapov.
Liana. Nativa.
Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY).
- Ipomoea volcanensis** O'Donell
Enredadera. Nativa. 1000-2200 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR).
- Jacquemontia** Choisy
- Jacquemontia anomala** O'Donell
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA).
- Jacquemontia blanchetii** Moric.
Sin.: *Ipomoea filipedunculata* Rusby
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
- Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, GUA, PAI, PHA).
- Jacquemontia cataractae** Krapov.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA).
- Jacquemontia confusa** Meisn.
Enredadera. Nativa.
Países: PRY(APY).
- Jacquemontia densiflora** (Meisn.) Hallier f.
Sin.: *Jacquemontia densiflora* Rusby, nom. illeg., *Jacquemontia rusbyana* Standl., *Jacquemontia violacea* (Vahl) Choisy var. *densiflora* Meisn.
Enredadera. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). PRY(AMA, CEN, PHA).
- Jacquemontia estrellensis** Krapov.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(SAL). PRY(APY).
- Jacquemontia evolvuloides** (Moric.) Meisn.
Sin.: *Convolvulus agrestis* Choisy, *Convolvulus secundiflorus* Fernald, *Ipomoea evolvuloides* Moric., *Ipomoea prostrata* Meisn. var. *longepedunculata*, *Jacquemontia agrestis* (Choisy) Meisn., *Jacquemontia decumbens* O'Donell, *Jacquemontia diantha* Urb., *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. var. *grandiflora* Hassl. f. *albiflora* Hassl., nom. superfl., *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. var. *grandiflora* Hassl. f. *hirsutula* Hassl., *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. var. *grandiflora* Hassl. f. *tomentosula* Hassl., *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. var. *longepedunculata* Meisn., hom. illeg., *Jacquemontia hirsuta* Choisy var. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Jacquemontia palmeri* S. Watson, *Jacquemontia secundiflora* (Fernald) O'Donell, *Montejacquia evolvuloides* (Moric.) Roberty
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SAL, SLU). BRA(RGS).
PRY(APY, AMA, CEN, CON, ITA, PAI, PHA, SPE).
Notas: De acuerdo a Chiarini & Ariza Espina (2006: 76-77) se trata de un taxón dudoso
- Jacquemontia ferruginea** Choisy
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA).
- Jacquemontia frankeana** (Schltdl.) M. Pastore & Sim.-Bianch.
Sin.: *Convolvulus frankeanus* Schltdl.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Jacquemontia fruticulosa** Hallier f.
Sin.: *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. f. *angustifolia* Hassl., *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. f. *subsericea* Hassl., *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. f. *viscosissima* Hassl., *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. var. *genuina* Hassl., nom. inval.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA).
- Jacquemontia glabrescens** (Meisn.) M. Pastore & Sim.-Bianch.
Sin.: *Jacquemontia grandiflora* Meisn. var. *glabrescens* Meisn.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Jacquemontia guaranitica Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Jacquemontia heterotricha O'Donell

Sin.: *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.)

Meisn. var. *tweediei* Meisn.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

PRY(CON, COA).

Jacquemontia holosericea (Weinm.)

O'Donell

Sin.: *Ipomoea holosericea* Weinm.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, GUA).

Jacquemontia linoides (Choisy) Meisn.

Sin.: *Ipomoea linoides* Choisy

Enredadera. Nativa.

Países: PRY(AMA).

Jacquemontia lorentzii (Kuntze) Peter

ex O'Donell

Sin.: *Convolvulus lorentzii* Kuntze

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

PRY(APY, COA, PAI).

Jacquemontia martii Choisy

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAA).

Jacquemontia mucronifer (Choisy)

Hallier f.

Sin.: *Convolvulus mucronifer* Choisy

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Jacquemontia paraguayensis Britton

Sin.: *Jacquemontia fusca* (Meisn.) Hallier

f. *f. glabrior* Chodat & Hassl.,

Jacquemontia fusca (Meisn.) Hallier f.

var. *altosiana* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G.

Don

Sin.: *Convolvulus pentanthos* Jacq.

Enredadera. Nativa.

Países: PRY(COA, PAI, PHA).

Jacquemontia rojasiana O'Donell

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Jacquemontia selloi (Meisn.) Hallier f.

Sin.: *Ipomoea selloi* Meisn.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA).

Jacquemontia sphaerostigma (Cav.)

Rusby

Sin.: *Convolvulus sphaerostigma* Cav.,

Jacquemontia hirsuta Choisy f.

racemosa Chodat & Hassl.,

Jacquemontia hirsuta Choisy var.

adenotricha Hassl., *Jacquemontia*

laxiflora O'Donell, *Jacquemontia*

viscidulosa Hoehne

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA,

CAN, CON).

Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb.

Sin.: *Convolvulus praelongus* S. Moore,

Convolvulus tamnifolius (L.) G. Mey.,

Ipomoea tamnifolia L., *Jacquemontia*

matogrossensis Hoehne,

Jacquemontia rondonii Hoehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN,

COA, PHA).

Jacquemontia turneroides (Chodat &

Hassl.) Hassl.

Sin.: *Ipomoea turneroides* Chodat &

Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, SPE).

Odonellia K.R. Robertson

Odonellia eriocephala (Moric.) K.R.

Robertson

Sin.: *Ipomoea eriocephala* Moric.

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Operculina Silva Manso

Operculina hamiltonii (G. Don) D.F.

Austin & Staples

Sin.: *Ipomoea hamiltonii* G. Don,

Operculina alata (Ham.) Urb. var.

pubescens (Pilg.) O'Donell, *Operculina*

pterodes (Choisy) Meisn. f. *pubescens*

Pilg.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CON).

CORIARIACEAE

Coriaria L.

Coriaria ruscifolia L.

Arbusto o arbolito. Endémica. 500-1600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

CORSIACEAE

Arachnitis Phil., nom. cons.

Arachnitis uniflora Phil.

Sin.: *Arachnitis quetruhuensis* Dimitri

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

COSTACEAE

Costus L.

Costus arabicus L.

Sin.: *Costus pilgeri* K. Schum., *Costus verschaffeltii* Lem.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).

Costus scaber Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe

Sin.: *Alpinia spiralis* Jacq.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CRASSULACEAE

Crassula L.

Crassula caudiculata Bacigalupo & Rossow
Hierba. Endémica.
Países: ARG(BAI, ERI). URY(FLA).

Crassula closiana (Gay) Reiche

Sin.: *Tillaea closiana* Gay
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **connata**

Sin.: *Crassula erecta* (Hook. & Arn.) Berger, *Crassula minima* (Miers) Reiche, comb. illeg., *Crassula tillaea* Lest.-Garl., *Tillaea connata* Ruiz & Pav., *Tillaea erecta* Hook. & Arn., *Tillaea minima* Gay, *Tillaea minima* Miers ex Hook. & Arn., nom. illeg., *Tillaea minima* Miers, nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, NEU, SAL, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, RME). URY(CAS, LAV, MAL, MON, SJO).

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **erectoides** M. Bywater & Wickens

Hierba. Nativa.
Países: CHL(VAL, MAU, RME).
Notas: Citada para Chile por Bywater & Wickens (1984), sin indicar material de referencia.

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **muscooides** M. Bywater & Wickens

Sin.: *Tillaea muscosa* Gay, hom. illeg.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Crassula decumbens Thunb.

Sin.: *Crassula ovallei* (Phil.) Reiche, *Crassula radicans* (Phil.) Reiche, *Tillaea ovallei* Phil., *Tillaea radicans* Phil., *Tillaea rencana* Phil.
Hierba. Nativa.
Países: CHL(VAL).

Crassula drummondii (Torr. & A. Gray) Fedde

Sin.: *Tillaea aquatica* L. var. *drummondii* (Torr. & A. Gray) Jeps, *Tillaea drummondii* Torr. & A. Gray,

Tillaea drummondii (Torr. & A. Gray) Britton

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, FOR, MIS, SJU, SLU). CHL(MAU, RME). PRY(PAI). URY(CAS).

Crassula longipes (Rose) M. Bywater & Wickens

Sin.: *Tillaea longipes* (Rose) J. Meyrán, *Tillaea longipes* Rose
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). URY(FLA, PAY).

Crassula minutissima Skottsbo.

Sin.: *Tillaea minutissima* (Skottsbo.) V.V. Byalt
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Crassula moschata G. Forst.

Sin.: *Bulliarda magellanica* DC., nom. nud., *Bulliarda moschata* (G. Forst.) d'Urv., *Crassula magellanica* (Willd. ex Schult.) Macloskie, *Tillaea chiloensis* Gay, *Tillaea magellanica* Willd. ex Schult., *Tillaea moschata* (G. Forst.) DC.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(RNE, SCR, TDF). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

Crassula peduncularis (Sm.) Cambess.

Sin.: *Bulliarda bonariensis* DC., nom. nud., *Crassula bonariensis* (DC.) Cambess., nom. illeg., *Crassula paludosa* Schltdl. ex Dusén, nom. illeg., *Crassula paludosa* Schltdl. ex Reiche, *Tillaea bonariensis* DC. ex Britton, nom. illeg., *Tillaea paludosa* Schltdl. ex Lechl., nom. nud., *Tillaea peduncularis* Sm., *Tillaea simplex* Phil., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ,

MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON, SJO).

Notas: Citada para Paraguay (Bywater & Wickens, 1984) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Crassula phascoides (Griseb.) M. Bywater

Sin.: *Crassula androsace* Sparre ex Rossow, *Tillaea androsace* (Sparre ex Rossow) V.V. Byalt, *Tristicha phascoides* Griseb.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Crassula solieri (Gay) F. Meigen

Sin.: *Crassula andicola* (Phil.) F. Meigen, *Tillaea andicola* Phil., *Tillaea solieri* Gay

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: CHL(MAU, BIO, RME).

Crassula venezuelensis (Steyerm.) M. Bywater & Wickens

Sin.: *Tillaea venezuelensis* Steyerm.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(COR).

Notas: Crece en Bolivia y probablemente en Chile (Bywater & Wickens, 1984)

Echeveria DC.

Echeveria argentinensis Hutchison ex Pino, R. Kiesling, W. Ale & D. Marquiegui var. **argentinensis**

Hierba. Endémica. 2700-3600 m.

Países: ARG(JUU).

Echeveria argentinensis Hutchison ex Pino, R. Kiesling, W. Ale & D.

Marquiegui var. **kieslingii** Pino, W. Ale & D. Marquiegui

Hierba. Endémica. 2000-2400 m.

Países: ARG(SAL).

Echeveria saltensis Pino, W. Ale & D. Marquiegui

Hierba. Endémica. 1100-1200 m.

Países: ARG(SAL).

Kalanchoe Adans.

Kalanchoe crenata (Andrews) Haw.

Sin.: *Kalanchoe brasiliensis* Larrañaga, *Vereia crenata* Andrews

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier

Sin.: *Bryophyllum daigremontianum* (Raym.-Hamet & H. Perrier) A. Berger

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, DFE, MIS).

Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh.

Sin.: *Bryophyllum delagoense* (Eckl. & Zeyh.) Schinz, *Bryophyllum tubiflorum* Harv.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, COR, ERI). BRA(PAR, SCA).

Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier

Sin.: *Bryophyllum fedtschenkoi* (Raym.-Hamet & H. Perrier) Lauz.-March.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, MIS, SAL). BRA(PAR).

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

Sin.: *Bryophyllum pinnatum* (Lam.) Oken, *Cotyledon pinnata* Lam., *Vereia pinnata* (Lam.) Spreng.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Petrosedum Grulich

Petrosedum orientale ('t Hart) Grulich

Sin.: *Petrosedum thartii* (L.P. Hebert) Niederle, *Sedum montanum* Songeon & E.P. Perrier subsp. *orientale* 't Hart, *Sedum thartii* L.P. Hebert

Hierba. Introducida. 1400-1400 m.

Países: ARG(COR).

Sedum L., nom. cons.

Sedum acre L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Sedum cymatopetalum Fröd.

Hierba. Nativa. 1000-4200 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Sedum jujuyense Zardini

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Sedum mexicanum Britton

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CUCURBITACEAE

Abobra Naudin

Abobra tenuifolia (Gillies) Cogn.

Sin.: *Abobra viridiflora* Naudin, *Bryonia tenuifolia* Gillies

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, SLU, SFE, SDE). URY(CAS).

Anisosperma Silva Manso

Anisosperma passiflora (Vell.) Silva Manso
Sin.: *Fevillea passiflora* Vell.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Apodanthera Arn.

Apodanthera anatuyana (Mart.Crov.) Pozner
Sin.: *Melothria anatuyana* Mart. Crov.
Enredadera. Nativa. 100-400 m.
Países: ARG(FOR, SAL, SDE).

Apodanthera hirtella Cogn.
Enredadera. Nativa. 1800-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Apodanthera laciniosa (Schltdl.) Cogn.
Sin.: *Anguria laciniosa* Schltdl.
Enredadera. Nativa. 200-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Apodanthera linearis (Cogn.) Mart.Crov. var. **dissecta** (Cogn.) Belgrano
Sin.: *Apodanthera sagittifolia* (Griseb.) Mart.Crov. var. *dissecta* (Cogn.) Mart.Crov., *Wilbrandia sagittifolia* Griseb. var. *dissecta* (Cogn.) Mart.Crov., *Wilbrandia villosa* Cogn. var. *dissecta* Cogn.
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, SFE). URY(COL, SJO).

Apodanthera linearis (Cogn.) Mart.Crov. var. **linearis**
Sin.: *Apodanthera sagittifolia* (Griseb.) Mart.Crov. var. *villosa* (Cogn.) Mart.Crov., *Wilbrandia linearis* Cogn., *Wilbrandia sagittifolia* Griseb. var. *villosa* (Cogn.) Mart.Crov., *Wilbrandia villosa* Cogn.
Enredadera. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, SJU, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, SJO).

Apodanthera sagittifolia (Griseb.) Mart.Crov.
Sin.: *Wilbrandia sagittifolia* Griseb., *Wilbrandia sagittifolia* Griseb. var. *typica* Mart. Crov., nom. inval.
Enredadera. Endémica. 900-2300 m.
Países: ARG(COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

Apodanthera ulei (Cogn.) Mart.Crov.
Sin.: *Apodanthera catharinensis* Mart. Crov., *Melothria ulei* Cogn., *Wilbrandia dusenii* Harms
Enredadera. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cayaponia Silva Manso, nom. cons.

Cayaponia alarici M.L. Porto
Enredadera. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart.Crov.
Sin.: *Antagonia sandia* Griseb., *Bryonia bonariensis* Mill., *Bryonia ficifolia* Lam., nom. superfl., *Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart.Crov. f. *dissecta* (Cogn.) Mart.Crov., *Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart.Crov. var. *rigida* (Cogn.) M.L. Porto, *Cayaponia ficifolia* (Lam.) Cogn. var. *dissecta* (Cogn.) Cogn.,

Cayaponia ficifolia (Lam.) Cogn. var. *rigida* (Cogn.) Cogn., *Cayaponia sandia* Griseb., *Trianosperma ficifolium* (Lam.) Cogn. var. *dissectum* Cogn., *Trianosperma ficifolium* (Lam.) Cogn. var. *genuinum* Cogn., nom. inval., *Trianosperma ficifolium* (Lam.) Cogn. var. *rigidum* Cogn., *Trianosperma hilarianum* Naudin
Enredadera. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA). URY(CAS, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).

Cayaponia breviloba (Griseb. ex Cogn.) Pozner
Sin.: *Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn. ex Griseb. var. *breviloba* Griseb. ex Cogn.
Enredadera. Endémica.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Cayaponia cabocla (Vell.) Mart.
Sin.: *Bryonia cabocla* Vell., *Cayaponia cordifolia* Cogn., *Cayaponia glaziovii* Cogn.
Enredadera. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cayaponia citrullifolia (Griseb.) Cogn. ex Griseb.
Sin.: *Antagonia citrullifolia* Griseb., *Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn. ex Griseb. var. *genuina* Cogn., nom. inval., *Cayaponia latifolia* Cogn.
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APA, APY, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(CAS, MON, PAY).

Cayaponia diversifolia (Cogn.) Cogn.

Sin.: *Trianosperma diversifolium* Cogn.,
Trianosperma diversifolium Cogn. var.
subintegrifolia Cogn.

Enredadera. Nativa. 100-1400 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS).
PRY(APA, CAN, PAI).

Cayaponia espelina (Silva Manso) Cogn.

Sin.: *Perianthopodus espelina* Silva
Manso

Enredadera. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA,
CAU, CAN, SPE).

Cayaponia fluminensis (Vell.) Cogn.

Sin.: *Bryonia fluminensis* Vell.

Enredadera. Nativa. 1500 m.

Países: BRA(SCA).

Cayaponia glandulosa (Poepp. & Endl.)
Cogn.

Sin.: *Bryonia glandulosa* Poepp. & Endl.,
Cayaponia ottoniana Cogn.,
Cayaponia poeppigii Cogn.

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cayaponia martiana (Cogn.) Cogn.

Sin.: *Bryonia tayuya* Mart., hom. illeg.,
Cayaponia martiana (Cogn.) Cogn.
var. *acutiloba* (Cogn.) Cogn.,
Trianosperma martianum Cogn.,
Trianosperma martianum Cogn. var.
acutilobum Cogn., *Trianosperma*
martianum Cogn. var. *genuinum*
Cogn., nom. inval., *Trianosperma*
tibiricae Naudin

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON,
ROC).

Cayaponia membranacea Gomes-Klein

Enredadera. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Cayaponia palmata Cogn.

Sin.: *Cayaponia biflora* Cogn. ex Harms,
Cayaponia laxa Cogn. ex Harms,
Cayaponia saldanhaei Cogn.

Enredadera. Nativa. 200-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Cayaponia pilosa (Vell.) Cogn.

Sin.: *Bryonia pilosa* Vell., *Cayaponia*
diffusa Silva Manso, *Dermophylla*
elliptica Silva Manso

Enredadera. Nativa. 200-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Cayaponia podantha Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE).
BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN,
CON, COA, PAI, PHA). URY(PAY).

Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn.

Sin.: *Bryonia tayuya* Vell.

Enredadera. Nativa. 600 m

Países: BRA(PAR, RGS).

Cayaponia ternata (Vell.) Cogn.

Sin.: *Bryonia ternata* Vell.

Enredadera. Nativa. 300-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cayaponia trifoliolata (Cogn.) Cogn.

Sin.: *Trianosperma trifoliolatum* Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cayaponia trilobata (Cogn.) Cogn.

Sin.: *Trianosperma trilobata* Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cayaponia ulei Cogn. ex Harms

Sin.: *Cayaponia ulei* Cogn. ex Harms var.
dentata Cogn. ex Harms, *Cayaponia*

ulei Cogn. ex Harms var. *subtrilobata*
Cogn. ex Harms, *Cayaponia ulei*
Cogn. ex Harms var. *villosa* Cogn. ex
Harms

Enredadera. Endémica. 500-2100 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Cayaponia villosissima Cogn.

Enredadera. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Ceratosanthes Adans.

Ceratosanthes hilariana Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CON).

Ceratosanthes multiloba Cogn.

Sin.: *Ceratosanthes diazii* Lillo,
Ceratosanthes fiebrigii Cogn.,
Ceratosanthes hassleri Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS).
PRY(APA, AMA, CAU, PHA).
URY(RIV, TAC).

Ceratosanthes palmata (L.) Urb.

Sin.: *Trichosanthes palmata* L.

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Citrullus Schrad., nom. cons.

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.

Sin.: *Cucumis colocynthis* L.

Hierba o enredadera. Introducida. 0-
500 m.

Países: ARG(BAI, SDE). PRY(APY).

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. &
Nakai subsp. **lanatus**

Sin.: *Momordica lanata* Thunb., nom. cons.
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SLU).

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai subsp. **vulgaris** (Schrad. ex Eckl. & Zeyh.) Fursa
Sin.: *Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh., *Cucurbita citrullus* L.
Enredadera. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cucumis L.

Cucumis anguria L.

Sin.: *Cucumis anguria* L. var. *longipes* (Hook. f.) A. Meeuse, *Cucumis anguria* Vell., hom. illeg., *Cucumis angurioides* M. Roem., *Cucumis arada* L. ex Naudin & F. Muell., *Cucumis echinatus* Moench, nom. illeg., *Cucumis longipes* Hook. f., *Cucumis parviflorus* Salisb., nom. superfl.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU). BRA(SCA). PRY(APY).

Cucumis melo L. var. **dudaim** (L.) Naudin
Sin.: *Cucumis dudaim* L., *Cucumis odoratissimus* Moench, nom. illeg.
Enredadera. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(COR, ERI, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cucumis prophetarum L.
Enredadera. Introducida.
Países: ARG(SJU).

Cucurbita L.

Cucurbita ficifolia Bouché
Enredadera. Introducida. 1000-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Cucurbita maxima Duchesne subsp. **andreana** (Naudin) Filov
Sin.: *Cucurbita andreana* Naudin
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LRI, MEN, SDE, SLU). URY(SOR).

Cucurbita maxima Duchesne subsp. **maxima**
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR, ERI, JUJ, MEN).

Cucurbita moschata Duchesne
Sin.: *Cucurbita pepo* L. var. *moschata* (Duchesne) Duchesne
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, FOR).

Cucurbita pepo L.
Sin.: *Cucurbita mammeata* Molina
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COR, ERI, SJU, SFE). BRA(PAR).

Cucurbitella Walp.

Cucurbitella asperata (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Sin.: *Cucurbita asperata* Gillies ex Hook. & Arn., *Cucurbita urkupinana* Cárdenas, *Cucurbitella cucumifolia* (Griseb.) Cogn., *Cucurbitella duriaei* (Naudin) Cogn., *Cucurbitella integrifolia* Cogn., *Cucurbitella integrifolia* Cogn. var. *glabrior* Cogn., *Cucurbitella urkupinana* (Cárdenas) C. Jeffrey, *Prasopepon cucumifolius* Griseb., *Prasopepon duriaei* Naudin, *Schizostigma asperata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn.
Enredadera. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA). URY(MON, SOR).

Cyclanthera Schrad.

Cyclanthera australis Cogn.
Sin.: *Pseudocyclanthera australis* (Cogn.) Mart.Crov.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, CON).

Cyclanthera eichleri Cogn.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cyclanthera hystrix (Gillies) Arn.
Sin.: *Momordica hystrix* Gillies
Enredadera. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, PAI). URY(CAS, COL, RNO, TAC).

Cyclanthera oligoechinata L.F.P. Lima & Pozner
Enredadera. Endémica. 100-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APY, SPE).

Cyclanthera pedata (L.) Schrad.
Sin.: *Cyclanthera digitata* Arn., nom. nud., *Cyclanthera edulis* Naudin ex Huber, *Cyclanthera pedata* Arn. var. *edulis* (Naudin) Cogn., *Momordica pedata* L.
Enredadera. Introducida. 500-2800 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Cyclanthera quinquelobata (Vell.) Cogn.
Sin.: *Cyclanthera boliviensis* Mart. Crov., *Cyclanthera brasiliensis* Cogn., *Cyclanthera killipii* Standl. ex J.F. Macbr., *Cyclanthera trianaei* Cogn.,

Cyclanthera trigonoloba Toledo,
Cyclanthera trigonoloba Toledo var.
caudata Toledo, *Momordica*
quinquelobata Vell.
Enredadera. Nativa. 300-2900 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS).

Cyclanthera tamnifolia Griseb.

Sin.: *Cyclanthera microcarpa* Cogn.
Enredadera. Nativa. 700-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
TUC).

Cyclanthera tenuifolia Cogn.

Sin.: *Cyclanthera kuhlmanniana* Toledo
Enredadera. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyclanthera tenuisepala Cogn.

Sin.: *Cyclanthera elegans* Cogn.,
Cyclanthera elegans Cogn. var.
genuina Cogn., nom. inval.,
Cyclanthera elegans Cogn. var.
grandifolia Cogn., *Cyclanthera elegans*
Cogn. var. *obtusiloba* Cogn.,
Cyclanthera elegans Cogn. var.
warmingii Cogn., *Cyclanthera tonduzii*
Cogn.
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Echinopepon Naudin

Echinopepon disjunctus Pozner

Enredadera. Endémica. 400-600 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Echinopepon racemosus (Steud.) C.
Jeffrey

Sin.: *Echinocystis araneosa* Griseb.,
Echinocystis muricata Cogn.,
Echinocystis racemosa (Steud.)
Mart.Crov., *Momordica muricata* Vell.,

hom. illeg., *Momordica racemosa*
Steud.
Enredadera. Nativa. 300-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, SCA).

Fevillea L.

Fevillea trilobata L.

Sin.: *Fevillea cordifolia* Vell., hom. illeg.,
Hypanthera guapeva Silva Manso,
Nhandiroba trilobata (L.) Kuntze
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA).

Halosicyos Mart. Crov.

Halosicyos ragonesei Mart. Crov.

Enredadera. Endémica. 700-900 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,
SJU, SLU).

Lagenaria Ser.

Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

Sin.: *Cucurbita lagenaria* L., *Cucurbita*
siceraria Molina, *Lagenaria leucantha*
Rusby, nom. illeg., *Lagenaria siceraria*
(Molina) Standl. var. *laevisperma*
Millán, *Lagenaria vulgaris* Ser.,
Lagenaria vulgaris Ser. subsp. *asiatica*
Kobyakova
Hierba o enredadera. Introducida. 0-
500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAA,
PAI). URY(SOR).

Luffa Mill.

Luffa aegyptiaca Mill.

Sin.: *Momordica cylindrica* L., *Momordica*
luffa L.
Enredadera. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS).
PRY(CEN).

Melothria L.

Melothria campestris (Naudin) H.
Schaeff. & S.S. Renner

Sin.: *Melancium campestre* Naudin
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

Melothria cucumis Vell.

Sin.: *Melothria uliginosa* Cogn.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAA, CAN, COA, PAI,
PHA). URY(CAS, MON).

Melothria hirsuta Cogn.

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Melothria pendula L.

Sin.: *Melothria fluminensis* Gardner
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS,
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA,
ITA, ÑEE, PAI, PHA).

Melothria schulziana Mart. Crov.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE).
BRA(RGS). PRY(CEN).

Melothria trilobata Cogn.

Sin.: *Melothria candolleana* Cogn.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, CON, COA, GUA, PHA).

Melothria warmingii Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Melothrianthus Mart. Crov.

Melothrianthus smilacifolius (Cogn.) Mart.Crov.

Sin.: *Apodanthera smilacifolia* Cogn.

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Momordica L.

Momordica charantia L.

Sin.: *Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.

Hierba o enredadera. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, JUJ, LRI, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, ÑEE).

Psiguria Neck. ex Arn.

Psiguria ternata (M. Roem.) C. Jeffrey

Sin.: *Anguria grandiflora* Cogn., *Anguria ternata* M. Roem.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

Pteropepon (Cogn.) Cogn.

Pteropepon parodii Mart. Crov.

Sin.: *Pteropepon argentinense* Mart. Crov.

Enredadera. Nativa. 1400-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Sicydium Schltdl.

Sicydium gracile Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sicydium nereoi Pozner

Enredadera. Endémica.

Países: ARG(COS).

Sicyos L.

Sicyos baderoa Hook. & Arn. var. **ambrosianus** (Skotts.) Martic. & Quezada

Sin.: *Sicyos bryoniaefolius* Moris var. *ambrosianus* Skotts.

Enredadera. Endémica. 400-500 m.

Países: CHL(IDE).

Sicyos baderoa Hook. & Arn. var. **baderoa**

Sin.: *Sicyos bryoniaefolius* Moris

Enredadera. Nativa. 0-900 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, JFE).

Sicyos edulis Jacq.

Sin.: *Sechium edule* (Jacq.) Sw.

Enredadera. Nativa.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sicyos ignarus Mart. Crov.

Enredadera. Endémica.

Países: ARG(SAL).

Sicyos kunthii Cogn.

Enredadera. Nativa. 1000-3100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Sicyos malvifolius Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(CAT, COR, SAL, SDE, SJU, TUC). URY(MON).

Sicyos odonelli Mart. Crov.

Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Sicyos polyacanthus Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(PAY, SAO).

Sicyos warmingii Cogn. var. **longispinus** Mart. Crov.

Enredadera. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Sicyos warmingii Cogn. var. **warmingii**

Enredadera. Nativa. 100-3100 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(PAR).

Siolmatra Baill.

Siolmatra brasiliensis (Cogn.) Baill.

Sin.: *Alsomitra brasiliensis* Cogn., *Alsomitra brasiliensis* Cogn. var. *pubescens* Griseb., *Fevillea triphylla* Griseb., nom. nud., *Siolmatra brasiliensis* (Cogn.) Baill. var. *pubescens* (Griseb.) Cogn., *Siolmatra paraguayensis* Cogn.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Wilbrandia Silva Manso

Wilbrandia ebracteata Cogn. var.
bracteata Mart. Crov.
 Enredadera. Endémica. 300-500 m.
 Países: ARG(MIS).

Wilbrandia ebracteata Cogn. var.
ebracteata
 Sin.: *Wilbrandia longisepala* Cogn. var.
angustiloba Cogn.
 Enredadera. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAU, CAN, GUA, SPE).

Wilbrandia ebracteata Cogn. var.
pedunculata Mart. Crov.
 Enredadera. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). PRY(PAI, SPE).

Wilbrandia hibiscoides Silva Manso
 Enredadera. Nativa. 500-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Wilbrandia longisepala Cogn.
 Enredadera. Endémica. 0-900 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Wilbrandia verticillata (Vell.) Cogn.
 Sin.: *Momordica verticillata* Vell.,
Wilbrandia riedeli Silva Manso
 Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

CUNONIACEAE

Caldcluvia D. Don

Caldcluvia paniculata (Cav.) D. Don
 Sin.: *Dieterica paniculata* (Cav.) Ser. ex A.
 DC., *Weinmannia dentata* Ruiz & Pav.
 ex López, *Weinmannia paniculata*
 Cav.

Árbol. Endémica. 0-900 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
 CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Eucryphia Cav.

Eucryphia cordifolia Cav.
 Sin.: *Eucryphia patagonica* Speg., *Pellinia chilensis* Molina, *Pellinia cordifolia* (Cav.) Molina
 Árbol. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
 CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Eucryphia glutinosa (Poepp. & Endl.)
 Baill.
 Sin.: *Eucryphia pinnatifolia* Gay, *Fagus glutinosa* Poepp. & Endl.
 Árbol. Endémica.
 Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Lamanonia Vell.

Lamanonia cuneata (Cambess.) Kuntze
 Sin.: *Belangera cuneata* Cambess.,
Belangera paraguayensis Pamp.,
Belangera tomentosa Cambess. var.
calvata Chodat & Hassl.
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).

Lamanonia ternata Vell.

Sin.: *Belangera glabra* Cambess.,
Belangera tomentosa Cambess.,
Lamanonia tomentosa (Cambess.)
 Kuntze, *Polystemon pentaphyllus* D.
 Don
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(GUA, PAI).

Weinmannia L., nom. cons.

Weinmannia boliviensis R.E. Fr.
 Sin.: *Weinmannia hieronymi* Engl.
 Árbol. Nativa. 1000-3000 m.
 Países: ARG(JUU, SAL).

Weinmannia discolor Gardner
 Sin.: *Weinmannia paulliniifolia* Pohl ex
 Ser. f. *janeirensis* Pamp., *Windmannia discolor* (Gardner) Kuntze
 Arbusto. Nativa. 900-1300 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Weinmannia humilis Engl.
 Sin.: *Weinmannia microphylla* Ruiz & Pav.
 f. *humilis* (Engl.) Pamp., *Windmannia humilis* (Engl.) Kuntze
 Arbusto o arbolito. Nativa. 100-1700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Weinmannia organensis Gardner
 Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser.
 Sin.: *Windmannia paulliniifolia* (Pohl ex
 Ser.) Kuntze
 Árbol. Nativa. 0-1900 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Weinmannia pinnata L.
 Árbol o arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Weinmannia trichosperma Cav.
 Sin.: *Windmannia trichosperma* (Cav.)
 Kuntze
 Árbol. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
 CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS,
 MAG).

CYCLANTHACEAE

Asplundia Harling**Asplundia brachypus** (Drude) Harling

Sin.: *Asplundia glaucophylla* Harling,
Asplundia polymera (Hand.-Mazz.)
 Harling subsp. *reitzii* Harling,
Carludovica brachypus Drude
 Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CYMODACEAE**Halodule** Endl.**Halodule wrightii** Asch.

Sin.: *Halodule brasiliensis* Lipkin
 Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(SCA).

CYPERACEAE**Abildgaardia** Vahl**Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral

Sin.: *Abildgaardia monostachyos* (L.)
 Vahl, *Carex ovata* Burm. f., *Cyperus*
monostachyos L., *Fimbristylis*
monostachyos (L.) Hassk., *Fimbristylis*
ovata (Burm. f.) J. Kern.
 Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
 JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU,
 CON, GUA, PHA, SPE). URY(ART,
 CAS, CLA, DUR, MON, PAY, RNO,
 ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Amphiscirpus Oteng-Yeb.**Amphiscirpus nevadensis** (S. Watson)

Oteng-Yeb.

Sin.: *Isolepis oreophila* Phil.,
Schoenoplectus nevadensis (S.
 Watson) Soják, *Scirpus nevadensis* S.
 Watson, *Scirpus nevadensis* S.
 Watson var. *remireoides* (Griseb.)
 Beetle, *Scirpus remireoides* Griseb.
 Hierba. Nativa. 0-4000 m.
 Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, NEU,
 RNE, SAL, SCR, TDF). CHL(ANT,
 ATA, MAG).

Becquerelia Brongn.**Becquerelia cymosa** Brongn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Becquerelia muricata Nees

Sin.: *Scleria muricata* (Nees) Boeckeler
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Bolboschoenus (Asch.) Palla**Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla
 subsp. **maritimus**

Sin.: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla
 subsp. *cymosus* (Rchb.) Soják,
Schoenoplectus maritimus (L.) Lye,
Scirpus maritimus L., *Scirpus*
maritimus L. f. *cymosus* (Rchb.) T.
 Koyama, *Scirpus maritimus* L. var.
cymosus Rchb.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI). CHL(LLA).

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
 subsp. **paludosus** (A. Nelson) T.
 Koyama

Sin.: *Bolboschoenus paludosus* (A.
 Nelson) Soó, *Scirpus maritimus* L. var.

digynus Godr., *Scirpus maritimus* L.
 var. *paludosus* (A. Nelson) Kük.,
Scirpus paludosus A. Nelson, *Scirpus*
robustus Pursh var. *paludosus* (A.
 Nelson) Fernald

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,
 FOR, LPA, MEN, RNE, SFE, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA).

Bolboschoenus robustus (Pursh) Soják

Sin.: *Bolboschoenus robustus* (Pursh) T.
 Koyama, comb. superfl.,
Schoenoplectus robustus (Pursh) M.T.
 Strong, *Scirpus maritimus* L. var.
macrostachyus Michx., *Scirpus*
maritimus L. var. *robustus* (Pursh)
 Kük., *Scirpus robustus* Pursh
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, FOR, SFE).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).
 URY(MON, SJO).

Bulbostylis Kunth, nom. cons.**Bulbostylis amambayensis** Barros

Sin.: *Bulbostylis spectabilis* Kral & M.T.
 Strong
 Hierba. Nativa. 100-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

Bulbostylis aspera M.G. López

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, PAI,
 SPE).

Bulbostylis brevifolia Palla

Sin.: *Bulbostylis aphylla* Barros
 Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
 CON, COA, ITA, MIE, PAI, SPE).
 URY(TAC).

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke

Sin.: *Abildgaardia capillaris* (L.) Lye,
Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke
var. *microstachyus* (Boeckeler) Barros,
Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke
var. *pyriformis* C.B. Clarke ex Lindm.,
Fimbristylis capillaris (L.) A. Gray,
Fimbristylis tenella Raddi, *Isolepis*
capillaris (L.) Roem. & Schult., *Scirpus*
capillaris L., *Stenophyllus capillaris* (L.)
Britton, *Scirpus microstachyus*
Boeckeler

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU,
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, PAI). URY(ART,
CLA, FLA, MON, PAY, RNO, RIV,
SJO, SOR, TAC).

Bulbostylis communis M.G. López &
D.A. Simpson var. **communis**

Sin.: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke
f. *fasciculata* Osten, *Bulbostylis*
capillaris (L.) C.B. Clarke var. *elatior*
(Griseb.) Osten, *Scirpus capillaris* L.
var. *elatior* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, MIS, SFE, SDE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAU, ITA, PHA). URY(ART, CLA,
FLA, MON, PAY, RNO, RIV, SJO,
TAC).

Bulbostylis communis M.G. López &
D.A. Simpson var. **scabrida** M.G.
López & D.A. Simpson

Hierba. Nativa. 400-1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, MIS, TUC). BRA(RGS).
PRY(APY, CEN, COA, ITA, PAI, PHA).

Bulbostylis conifera (Kunth) C.B. Clarke

Sin.: *Isolepis conifera* Kunth

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Bulbostylis conostachya (Boeckeler)
Beetle

Sin.: *Isolepis conostachya* Boeckeler

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Bulbostylis consanguinea (Kunth) C.B.
Clarke

Sin.: *Isolepis consanguinea* Kunth,
Oncostylis kunthiana Nees, *Scirpus*
consanguineus (Kunth) Boeckeler

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA). URY(TYT).

Bulbostylis contracta (Kük. ex Osten)
M.G. López & D.A. Simpson

Sin.: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke
f. *contracta* Kük. ex Osten, *Bulbostylis*
capillaris (L.) C.B. Clarke f. *stenantha*
Kük. ex Barros, *Bulbostylis capillaris*
(L.) C.B. Clarke var. *contracta* (Kük. ex
Osten) Barros, *Bulbostylis juncoides*
(Vahl) Kük. ex Herter f. *leucocarpa*
(Barros) Barros

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LRI, SLU,
SDE). URY(MON).

Bulbostylis edwalliana (Boeckeler) Prata
Sin.: *Scirpus edwallianus* Boeckeler

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Bulbostylis eleocharoides Kral & M.T.
Strong

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Bulbostylis fimbriata (Nees) C.B. Clarke

Sin.: *Oncostylis fimbriata* Nees

Hierba. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Bulbostylis funckii (Steud.) C.B. Clarke

Sin.: *Bulbostylis tenuispicata* (Boeckeler)
Barros, *Isolepis funckii* Steud., *Scirpus*
tenuispicatus Boeckeler

Hierba. Nativa. 1800-2100 m.

Países: ARG(COR, TUC).

Bulbostylis guaglianoneae M.G. López

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(MIS).

Bulbostylis jacobinae (Steud.) Lindm.

Sin.: *Fimbristylis jacobinae* Steud.,
Scirpus glaucophyllus Boeckeler

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,
COA).

Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B.
Clarke

Sin.: *Bulbostylis papillosa* Kük., *Isolepis*
junciformis Kunth, *Oncostylis*
junciformis (Kunth) Nees var.
humboldtiana (Spreng.) Nees, *Scirpus*
humboldtiana Spreng., *Scirpus*
junciformis (Kunth) Kuntze, comb.
illeg., *Scirpus junciformis* (Kunth) Poir.,
comb. illeg., *Scirpus juncoides* Willd.
ex Kunth, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA,
CAA, CAN, COA, SPE).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex
Herter f. **hirtella** Osten

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR). URY(CLA,
DUR, FLO, SOR, TYT).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex
Herter f. **subfimbriata** Kük. ex Osten

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ,
MIS, SAL, TUC). URY(TAC).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **ampleiceps** Kük. ex Osten
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(CLA, CLA, RIV).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**

Sin.: *Bulbostylis arenaria* (Nees) Lindm., *Bulbostylis fendleri* C.B. Clarke, *Bulbostylis glaziovii* (Boeckeler) C.B. Clarke, *Bulbostylis hirtella* (Schrader ex Schult.) Urb., *Bulbostylis juncoides* (Vahl) Kük. ex Herter var. *genuina* Osten, nom. inval., *Bulbostylis juncoides* (Vahl) Kük. ex Osten, comb. superfl., *Bulbostylis langsdorffiana* (Kunth) C.B. Clarke, *Isolepis arenaria* Nees, nom. nud., *Isolepis hirtella* Schrad. ex Schult., *Isolepis langsdorffiana* Kunth, *Oncostylis arenaria* Nees, *Oncostylis hirtella* (Schrader ex Schult.) Nees, *Schoenus juncoides* Vahl, *Scirpus glaziovii* Boeckeler, *Scirpus hirtellus* (Schrader ex Nees) Boeckeler, *Scirpus niederleinianus* Boeckeler, *Stenophyllus hirtellus* (Schrader ex Schult.) H. Pfeiff.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(MON, PAY, SAO, TAC).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeckeler) Kük. ex Osten

Sin.: *Bulbostylis argentina* Palla, *Fimbristylis argentina* (Palla) Molfino, *Scirpus lorentzii* Boeckeler, *Stenophyllus argentinus* (Palla) Killip
Hierba. Nativa. 200-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SDE, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(ITA). URY(CLA, COL, FLA, MON, PAY, SAO, SJO, TYT).

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **nana** (Griseb.) Barros

Sin.: *Scirpus juncoides* Willd. ex Kunth var. *nanus* Griseb.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CAT, COR, SLU).

Bulbostylis loefgrenii (Boeckeler) Prata & M.G. López

Sin.: *Scirpus loefgrenii* Boeckeler

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CON, SPE).

Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm.

Sin.: *Schoenus paradoxus* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR).

Bulbostylis rugosa M.G. López

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CEN, CON, COA, SPE).

Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke

Sin.: *Fimbristylis scabra* (J. Presl & C. Presl) Hauman & Vanderveken, hom. illeg., *Fimbristylis urvilleana* Steud., *Isolepis scabra* J. Presl & C. Presl

Hierba. Nativa. 100-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, ITA, MIE, PHA, SPE). URY(COL, MAL, RNO, RIV, SJO).

Bulbostylis sellowiana (Kunth) Palla

Sin.: *Fimbristylis sellowiana* (Kunth) Hauman & Vanderveken, *Isolepis sellowiana* Kunth

Hierba. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

Bulbostylis sphaerocephala (Boeckeler) Lindm.

Sin.: *Bulbostylis sphaerocephala* (Boeckeler) Lindm. var. *macrocephala* (Maury) Kük. ex Osten, *Bulbostylis sphaerocephala* (Boeckeler) Lindm. var. *brunneo-vaginata* (Boeckeler) C.B. Clarke, *Fimbristylis brunneo-vaginata* (Boeckeler) H. Pfeiff., *Fimbristylis sphaerocephala* (Boeckeler) Hauman & Vanderveken, hom. illeg., *Scirpus brunneo-vaginat* Boeckeler, *Scirpus setifolius* Boeckeler, *Scirpus sphaerocephalus* Boeckeler, *Scirpus sphaerocephalus* Boeckeler var. *macrocephalus* Maury
Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Bulbostylis sphaerolepis (Boeckeler) Beetle

Sin.: *Bulbostylis closii* Barros, *Bulbostylis major* Palla, *Bulbostylis scabra* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke f. *evolutior* Lindm., *Scirpus sphaerolepis* Boeckeler

Hierba. Nativa. 700-900 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Bulbostylis stenocarpa Kük.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Bulbostylis subtilis M.G. López

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
AMA, CAU, ITA, MIE, PAI).

Bulbostylis svensoniana Steyererm.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: PRY(AMA).

Bulbostylis tenuifolia (Rudge) J.F.

Macbr.

Sin.: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke
var. *tenuifolia* (Rudge) C.B. Clarke,
Scirpus tenuifolius Rudge

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bulbostylis truncata (Nees) M.T. Strong

Sin.: *Oncostylis truncata* Nees

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Bulbostylis vestita (Kunth) C.B. Clarke

Sin.: *Isolepis vestita* Kunth

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bulbostylis wanderleyana Prata & M.G.

López

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Calyptracarya Nees

Calyptracarya glomerulata (Brongn.)

Urb.

Sin.: *Becquerelia glomerulata* Brongn.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN, GUA).

Carex L., nom. cons.

Carex acaulis d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Carex aematorhyncha E. Desv.

Sin.: *Carex aematorhyncha* E. Desv. var.
corralensis (Phil.) Kük., *Carex*
campyloxys Steud., *Carex corralensis*
Phil., *Carex filiformis* L. subsp.
aematorhyncha (E. Desv.) Kük., *Carex*
filiformis L. var. *gracilis* Kurtz ex Kük.,
Carex potamostruosus Steud.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, MAG).

Carex andersonii Boott

Sin.: *Carex eleopsammodes* Steud.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Carex andina Phil.

Sin.: *Carex andina* Phil. var.
subabscondita Kük.

Hierba. Endémica. 1200-3300 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS,
MAG, RME).

Carex antucensis Kunze

Sin.: *Carex chillanensis* Phil., *Carex*
melanolepis Phil.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, AIS,
MAG, RME).

Carex aphylla Kunth

Sin.: *Carex ebracteata* Phil.

Hierba. Endémica. 700-2700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LLA, RME).

Carex arctogena Harry Sm.

Sin.: *Carex antarctogena* Roiv., *Carex*
capitata L. f. *arctogena* (Harry Sm.)
Raymond, *Carex rahuiensis* Kurtz ex
V.I. Krecz.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Carex argentina Barros

Hierba. Endémica. 1000-2600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR). CHL(MAU, ARA, RME).

Carex aspericaulis (G.A. Wheeler) J.R.
Starr

Sin.: *Uncinia aspericaulis* G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 900

Países: CHL(JFE).

Carex atropicta Steud.

Sin.: *Carex fuegina* Phil., *Carex lechleri*
Phil., hom. illeg., *Carex pampae* Kalela
Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU,
RNE, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ,
VAL, AIS, MAG, RME).

Carex aureolensis Steud.

Sin.: *Carex atrovirens* Boeckeler, *Carex*
involuta Boeckeler

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).
PRY.

Carex austroamericana G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG,
RME).

Carex banksii Boott var. **banksii**

Sin.: *Carex banksii* Boott var. *abbreviata*
Kük., *Carex germana* Boott, *Carex*
ochrostachya Phil., *Carex trifida* Cav.
var. *franchetii* Kurtz, *Carex trifida*
Franch., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1900 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Carex banksii Boott var. **fonkii** (Phil.) Kük.

Sin.: *Carex fonkii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAG).

Carex banksii Boott var. **gilliesii** (Phil.) Kük.

Sin.: *Carex dessaueri* Phil., *Carex gilliesii* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: CHL(RME).

Carex berteroniana Steud.

Sin.: *Carex paleata* Boott

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(JFE).

Carex boelckeiana Barros

Hierba. Endémica. 2000-2100 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(ARA).

Carex boliviensis Van Heurck & Müll. Arg.

Sin.: *Carex galbana* L.H. Bailey, *Carex lorentziana* Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-2300 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. **bonariensis**

Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. f. *pumila* Osten, *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. f. *remota* (Kük.) Kük., *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *remota* Kük., *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *trachycystis* (Griseb.) Kük., *Carex papillosa* Nees, *Carex trachycystis* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, BIO, ARA). PRY(CAN, ÑEE, PHA). URY(CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. **glabrescens** Kurtz ex Kük.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(COR, TUC).

Carex brachycalama Griseb.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(COR).

Carex bracteosa (Kunze ex Rchb.) Kunth

Sin.: *Carex illustranda* Steud., *Vignea bracteosa* Kunze ex Rchb.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Carex brasiliensis A. St.-Hil.

Sin.: *Carex gynaecandra* H. Pfeiff., *Carex procera* Kunth, *Carex tetrasticha* Boeckeler

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA). URY(RIV).

Carex brongniartii Kunth

Sin.: *Carex hypoxanthos* Steud., *Carex muehlenbergii* Brongn., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, DFE, ERI, MIS, TUC). BRA(RGS). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO, ROC, TAC).

Carex caduca Boott

Sin.: *Carex caduca* Boott var. *ortegae* (Phil.) Kük., *Carex ortegae* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Carex camptoglochin V.I. Krecz.

Sin.: *Carex microglochin* Wahlenb. subsp. *fuegina* Kük., *Carex microglochin* Wahlenb. var. *oligantha* (Boott) Kük., *Carex oligantha* Boott, *Uncinia microglochin* (Wahlenb.) Spreng. var. *fuegina* (Kük.) Macloskie

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(LRI, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Carex canescens L.

Sin.: *Carex canescens* L. var. *alpicola* Kurtz, hom. illeg., *Carex canescens* L. var. *curta* (Gooden.) Macloskie, *Carex canescens* L. var. *dubia* Kük., hom. illeg., *Carex canescens* L. var. *fallax* Kurtz ex Kük., *Carex canescens* L. var. *robustior* Blytt ex Andersson, *Carex curta* Gooden. var. *robustior* (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater, *Carex similis* d'Urv., *Carex skottsbergii* Gand.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Carex catamarcensis C.B. Clarke ex Kük.

Sin.: *Carex latibracteolata* Kük.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, TUC). CHL(COQ).

Carex catharinensis Boeckeler

Sin.: *Carex fuscula* d'Urv. subsp. *catharinensis* (Boeckeler) Luceño & M.V. Alves

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

- Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS).
- Carex chilensis** Brongn. ex Duperrey
Sin.: *Carex incrassata* Schltdl., *Carex riparia* Curtis f. *incrassata* (Schltdl.) Kük., *Carex riparia* Curtis subsp. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük., *Carex riparia* Curtis var. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük., *Carex vacillans* Steud.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, NEU, RNE, SJU, SFE). BRA(RGS). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS). PRY(PAI). URY(CAS, MON, RNO, SJO, SOR).
- Carex chlorolepis** Steud.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(LRI, JFE).
- Carex crassiflora** Kük.
Sin.: *Carex brunnescens* Boeckeler, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Carex darwinii** Boott var. *darwinii*
Sin.: *Carex incompta* Franch.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).
- Carex darwinii** Boott var. *serranoi* (Phil.) Kük.
Sin.: *Carex darwinii* Boott var. *robustior* Kük., *Carex serranoi* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(LLA, AIS, MAG).
Notas: Es probable su presencia en la Argentina (Barros, 1947).
- Carex darwinii** Boott var. *urolepis* (Franch.) Kük.
- Sin.: *Carex darwinii* Boott var. *aristata* C.B. Clarke ex Kük., *Carex urolepis* Franch.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(LLA, AIS, MAG).
- Carex decidua** Boott
Sin.: *Carex decidua* Boott var. *minor* Kük., *Carex pedicellata* Phil., hom. illeg., *Carex rahmeri* Phil., *Carex vulgaris* R.E. Fr. var. *antucensis* Kük.
Hierba. Nativa. 0-2400 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).
- Carex delacosta** Kuntze
Sin.: *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth var. *macloviana* (Gaudich.) C.B. Clarke, *Uncinia delacosta* Steud., nom. nud., *Uncinia macloviana* Gaudich., *Uncinia montana* Phil.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).
- Carex divisa** Huds.
Sin.: *Carex praegracilis* W. Boott
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(BAI). CHL(VAL, RME). URY(MON).
- Carex divulsa** Stokes
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI).
- Carex dolichophylla** J.R. Starr
Sin.: *Uncinia bella* Phil., *Uncinia bracteosa* Phil., *Uncinia macrophylla* Steud., *Uncinia phalaroides* C.B. Clarke
Hierba. Endémica. 100-1100 m.
Países: CHL(BIO, LLA).
- Carex dusenii** Kük. ex Dusén
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SCR). CHL(LLA, MAG).
- Carex ecuadorica** Kük.
Hierba. Nativa. 3000-3100 m.
Países: CHL(ANT).
- Carex erinacea** Cav.
Sin.: *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers., *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers. var. *angustata* Kük., *Uncinia longearistata* Steud., *Uncinia longifolia* Kunth, *Uncinia macrotricha* Franch., *Uncinia philippii* Steud.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).
- Carex excelsa** Poepp. ex Kunth
Sin.: *Carex lechleri* Steud., *Carex pseudocyperus* L. var. *haenkeana* (J. Presl & C. Presl) Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *lechleri* Boott, *Carex psilostachys* Steud.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE). BRA(PAR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).
- Carex fecunda** Steud.
Sin.: *Carex atropurpurea* Boeckeler, *Carex seditiosa* Steud., nom. nud.
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Carex feddeana** H. Pfeiff.
Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *achalensis* Kurtz ex Kük.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(SJO).

Carex fernandesiana (Nees ex Boeckeler) J.R. Starr

Sin.: *Uncinia angustata* Boeckeler, *Uncinia douglasii* Boott, *Uncinia fernandesiana* Nees ex Boeckeler

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Carex fernandezensis Mack. ex G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 300-600 m.

Países: CHL(JFE).

Carex firmicaulis Kalela

Sin.: *Carex andicola* G.A. Wheeler, *Carex macrorrhiza* Boeckeler var. *simplex* Kük., *Carex nebulorum* Phil. f. *major* (Kük.) Kük., *Carex pycnostachya* Kar. & Kir. var. *major* Kük.

Hierba. Endémica. 100-1300 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, BIO, LLA).

Carex firmula (Kük.) J.R. Starr var. **firmula**

Sin.: *Uncinia tenuis* Poepp. ex Kunth f. *firmula* Kük.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Carex firmula (Kük.) J.R. Starr var. **tenuis** (Poepp. ex Kunth) Jim. Mejías & R. Ridl.

Sin.: *Uncinia gracilis* Decne., hom. illeg., *Uncinia tenuis* Poepp. ex Kunth

Hierba. Endémica.

Países: CHL(JFE).

Carex flacca Schreb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Carex fossa G.A. Wheeler

Sin.: *Carex involucrata* Boott, hom. illeg., *Carex sororia* Kunth var. *involucrata* (Boott) Kük.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SAL, SFE). BRA(RGS). URY(LAV, SOR).

Notas: Citada para Paraguay (Wheeler, 2002b) sin mencionar localidad o ejemplar de referencia

Carex fuscula d'Urv.

Sin.: *Carex araucana* Phil., *Carex calbucana* Phil., *Carex distenta* Kunze ex Kunth, *Carex fuscula* d'Urv. f. *elator* Kurtz, *Carex fuscula* d'Urv. f. *indecora* (Kunth) Kük., *Carex fuscula* d'Urv. var. *distenta* (Kuntze ex Kunth) Kük., *Carex fuscula* d'Urv. var. *hieronymi* (Boeckeler) Kük., *Carex fuscula* d'Urv. var. *pseudextensa* (Kük.) Kük., *Carex hieronymi* Boeckeler, *Carex huitensis* Steud., *Carex inconspicua* Steud., *Carex inconspicua* Steud. var. *fuscula* (d'Urv.) Kük., *Carex inconspicua* Steud. var. *pseudoextensa* Kük., *Carex indecora* Kunth, *Carex indecora* Kunth var. *humilis* Kunth, *Carex pseudopunctata* Boeckeler, *Carex valdiviana* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, TDF, TUC). BRA(SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). URY(LAV, MAL).

Carex gayana E. Desv.

Sin.: *Carex diclina* Phil., *Carex gayana* E. Desv. var. *densa* Kük., *Carex gayana* E. Desv. var. *rufa* Kük., *Carex gayana* E. Desv. var. *schedonautos* (Steud.) Kük., *Carex gayana* E. Desv. var.

taurina (Phil.) Kük., *Carex nitens* Phil., *Carex schedonautos* Steud., *Carex taurina* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Carex gibertii G.A. Wheeler

Sin.: *Carex phalaroides* Kunth subsp. *crassiflora* (Kük.) Luceño & M.V. Alves, *Carex phalaroides* Kunth var. *crassiflora* Kük.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS). URY(MON, SJO).

Carex giovanniana Jim. Mejías

Hierba. Nativa. 1700-1900 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Carex hamata Sw.

Sin.: *Uncinia hamata* (Sw.) Urb., *Uncinia jamaicensis* Pers.

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Carex herteri G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(FLA).

Carex hilairei Boott

Sin.: *Carex glazioviana* Boeckeler, *Carex hilairei* Boott var. *glazioviana* (Boeckeler) Kük.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Carex hookeri Kunth

Sin.: *Carex beecheyana* Boott ex E. Desv.

Hierba. Nativa.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, LLA, RME).

Carex humahuacaensis G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).

Carex hypoleucos E. Desv.
Sin.: *Carex kurtziana* Kük., *Carex nebularum* Phil. var. *kurtziana* (Kük.) Kük.
Hierba. Endémica. 1500-2300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

Carex hypsipedos C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 3200-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Carex kingii (Boott) Reznicek
Sin.: *Uncinia kingii* Boott
Hierba. Endémica. 700-1000 m.
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Carex lamprocarpa Phil.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(ARA, LRI).

Carex lechleriana (Steud.) J.R. Starr
Sin.: *Uncinia lechleriana* Steud.
Hierba. Endémica. 100-800 m.
Países: ARG(CHU, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Carex leporina L.
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Carex longii Mack. subsp. **meridionalis** (Kük.) Luceño & M.V. Alves
Sin.: *Carex albolutescens* Schwein. var. *meridionalis* Kük., *Carex longii* Mack. var. *meridionalis* (Kük.) G.A. Wheeler, *Carex meridionalis* (Kük.) Herter
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, COL, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SOR, TAC).

Carex macloviana d'Urv. var. **macloviana**
Sin.: *Carex allomacros* Steud., *Carex festiva* Dewey, *Carex inciso-dentata* Steud., *Carex macloviana* d'Urv. f. *bracteata* (Kük.) Kük., *Carex pratensis* Phil., hom. illeg., *Carex propinqua* Nees & Meyen
Hierba. Nativa. 0-3800 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Carex macloviana d'Urv. var. **pseudoleporina** Kük.
Sin.: *Carex leporina* L. var. *elatior* Boeckeler
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG).

Carex macloviana d'Urv. var. **thermarum** (Phil.) Kük.
Sin.: *Carex macloviana* d'Urv. var. *incrassata* Kük., *Carex thermarum* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, TUC). CHL(VAL, MAU, BIO, RME).

Carex macloviformis (G.A. Wheeler) J.R. Starr
Sin.: *Uncinia macloviformis* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 1100-1400 m.
Países: CHL(JFE).

Carex macrorrhiza Boeckeler
Sin.: *Carex curvifolia* Boeckeler
Hierba. Endémica. 2000-4200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, TUC). CHL(TAR, RME).

Carex macrosolen Steud.
Sin.: *Carex macrocarpa* Phil.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Carex macrotrichoides J.R. Starr
Sin.: *Uncinia chilensis* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA).

Carex magellanica Lam.
Sin.: *Carex atrata* L. var. *magellanica* (Lam.) Wahlenb., *Carex cernua* Phil., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Carex malmei Kalela
Sin.: *Carex atropicta* Steud. var. *platycarpa* Phil. ex Kük.
Hierba. Endémica. 2600-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Carex mandoniana Boeckeler
Hierba. Nativa.
Países: ARG(SAL, TUC).

Carex manuelbarrosii Jim. Mejías, Donadio, Muñoz-Schüler & A.Mor.Alons.
Sin.: *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *neuquensis* Barros
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ARA).

Carex maritima Gunnerus
Sin.: *Carex incurva* Lightf., *Carex incurva* Lightf. var. *misera* (Phil.) Kük., *Carex melanocystis* E. Desv. var. *misera* (Phil.) Kük.
Hierba. Nativa. 200-4200 m.

- Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, MAG).
- Carex melanocystis** E. Desv.
Sin.: *Carex incurva* Lightf. var. *melanocystis* (E. Desv.) Kük., *Carex misera* Phil., *Carex oligantha* Phil., hom. illeg., *Carex psammogaea* Steud.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(SJU). CHL(RME).
- Carex melliza** A.Mor.Alons., Donadio & Jim. Mejías
Hierba. Endémica. 1600-3400 m.
Países: ARG(JUU, LRI, SAL, TUC).
- Carex meridensis** (Steyerm.) J.R. Starr
Sin.: *Uncinia macrolepis* Decne., *Uncinia meridensis* Steyerm., *Uncinia smithii* Philcox
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).
- Carex microglochin** Wahlenb.
Hierba. Nativa. 200-4100 m.
Países: ARG(JUU, LRI, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(ATA, COQ, AIS, MAG).
- Carex minutissima** Barros
Hierba. Endémica. 500-1700 m.
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(AIS, MAG).
- Carex molinae** Phil.
Hierba. Endémica. 2200-2400 m.
Países: CHL(MAU).
- Carex monodynamia** (Griseb.) G.A. Wheeler
Sin.: *Carex atropicta* Steud. f. *monodynamia* (Griseb.) Kük., *Carex atropicta* Steud. f. *pallescens* (Kurtz ex
- Kük.) Kük., *Carex atropicta* Steud. var. *monodynamia* Griseb.
Hierba. Endémica. 2600-2900 m.
Países: ARG(COR).
- Carex moorei** G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 600-800 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).
- Carex multifaria** (Nees ex Boott) J.R. Starr
Sin.: *Uncinia macrostachya* E. Desv., *Uncinia multifaria* Nees ex Boott, *Uncinia multifaria* Nees ex Boott var. *macrostachya* (E. Desv.) Kük.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, JFE).
- Carex multispicata** Kunze ex Kunth
Sin.: *Carex acutata* Boott var. *multispicata* (Kunze ex Kunth) Kük., *Carex anwandteri* Phil., *Carex foeminea* Steud.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(ATA, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).
- Carex nebularum** Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2200 m.
Países: CHL(MAU, BIO, AIS, RME).
- Carex negeri** (Kük.) J.R. Starr
Sin.: *Uncinia negeri* Kük., *Uncinia negeri* Kük. var. *araucana* Gunckel
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).
- Carex nelmesiana** Barros
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).
- Carex niederleiniana** Boeckeler
Sin.: *Carex acutata* Boott var. *hirtisquama* Kük., *Carex acutata* Boott var.
- niederleiniana* (Boeckeler) Kük., *Carex tucumanensis* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 2000-2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, RNE, TUC).
- Carex odontolepis** Phil.
Sin.: *Carex banksii* Boott var. *odontolepis* (Phil.) Kük., *Carex promaucana* Phil.
Hierba. Endémica. 100-2300 m.
Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, RME).
- Carex otrubae** Podp.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(MON).
- Carex ownbeyi** G.A. Wheeler
Hierba. Nativa. 2500-3800 m.
Países: ARG(TUC).
- Carex paraguayensis** Maury
Sin.: *Carex phalaroides* Kunth subsp. *paraguayensis* (Maury) Luceño & M.V. Alves, *Carex phalaroides* Kunth var. *paraguayensis* (Maury) Kük., *Carex setispica* C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 500-1700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CAS, FLA, MAL).
- Carex patagonica** Speg.
Hierba. Endémica. 200-1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, BIO, RME).
- Carex pedicularis** Jim.-Mejías & Naczi
Hierba. Endémica.
Países: ARG(COS, ERI, TUC). PRY(PHA). URY(FLA).
- Carex pendula** Huds.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(LRI).

Carex phalaroides Kunth var. **humilis** Boeckeler
Hierba. Nativa. 1400-1600 m.
Países: BRA(SCA).

Carex phalaroides Kunth subsp. **phalaroides**
Sin.: *Carex capitellata* Boeckeler, hom. illeg., *Carex macella* Kunth, *Carex moesta* Kunth, *Carex phalaroides* Kunth subsp. *moesta* (Kunth) Luceño & M.V. Alves, *Carex phalaroides* Kunth var. *capitellata* Kük., *Carex phalaroides* Kunth var. *elongata* Kük., *Carex phalaroides* Kunth var. *macella* (Kunth) Kük., *Carex phalaroides* Kunth var. *moesta* (Kunth) Kük., *Carex schenkiana* Boeckeler, *Uncinia phalaroides* (Kunth) Nees
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Carex phleoides Cav.
Sin.: *Uncinia lasiocarpa* Steud. ex Boeckeler, *Uncinia leptostachya* Phil., hom. illeg., *Uncinia longifolia* E. Desv., hom. illeg., *Uncinia montteana* Phil., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *brachytricha* Speg., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *nux-nigra* C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 0-2700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME, JFE).

Carex phylloscirpoides Saldivia, S. Gebauer, Martín-Bravo & Jim. Mejías
Hierba. Endémica. 4100-4400 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Carex pisanoi G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(MAG).

Carex pleioneura G.A. Wheeler
Sin.: *Carex pycnostachya* E. Desv., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1900-3400 m.
Países: ARG(SJU). CHL(AYP, TAR, COQ, RME).

Carex plurinervata J.R. Starr
Sin.: *Uncinia costata* Kük.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(JFE).

Carex poeppigii C.B. Clarke ex G.A. Wheeler
Sin.: *Carex lamprocarpa* Phil. var. *rotundata* Kük.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Carex polystachya Sw. ex Wahlenb.
Sin.: *Carex cladostachya* Wahlenb., *Carex cladostachya* Wahlenb. var. *maxima* Kük.
Hierba. Nativa. 800-1400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Carex polysticha Boeckeler
Sin.: *Carex pseudocyperus* L. var. *platygluma* C.B. Clarke, *Carex pseudocyperus* L. var. *polysticha* (Boeckeler) Kük.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN). URY(CLA, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO).

Carex pseudomacloviana G.A. Wheeler
Hierba. Nativa. 2900 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Carex pumila Thunb.
Sin.: *Carex sepulta* Phil., *Carex urvillei* Brongn.
Hierba. Introducida. 0-400 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG).

Carex pungens Boeckeler
Sin.: *Carex berteriana* E. Desv., hom. illeg., *Carex colchaguensis* Phil., *Carex moelleri* Phil., *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *berteroana* (E. Desv.) Gunckel, *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *colchaguensis* (Phil.) Kük., *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *pungens* (Boeckeler) Kük., *Isolepis heterolepis* Steud.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
Notas: Probablemente en Argentina (Barros 1947, 1969)

Carex punicola D.B. Poind., Jim. Mejías & M. Escudero
Sin.: *Carex phalaroides* Kunth var. *parvula* R. Gross, *Carex umbellata* Schkuhr ex Willd. var. *depressa* Kük.
Hierba. Nativa. 2500-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Carex purpureovaginata Boeckeler
Sin.: *Carex sphaerogyna* Baker var. *brasiliensis* H. Pfeiff.
Hierba. Nativa. 1200-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Carex quinquin Jim. Mejías & Dorr
Sin.: *Uncinia chlorostachya* Phil., *Uncinia loliacea* Phil., *Uncinia longispica* Boeckeler, *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *longispica* (Boeckeler) C.B. Clarke, *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *trichocarpa* (C.A. Mey.) C.B. Clarke, *Uncinia trichocarpa* C.A. Mey., *Uncinia urvillei* Steud.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LSR).

Carex recondita Muñoz-Schüler, Martín-Bravo & Jim. Mejías
Hierba. Endémica. 2700-2900 m.
Países: CHL(RME).

Carex reicheana Boeckeler
Hierba. Endémica. 1200-1300 m.
Países: CHL(ARA).

Carex reichei Kük.
Sin.: *Carex aueri* Kalela
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAU, MAG).

Carex rupicola (Pedersen) G.A. Wheeler
Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *rupicola* Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(CAS).

Carex ruthsatziae G.A. Wheeler
Hierba. Nativa. 4400-4500 m.
Países: ARG(SAL).

Carex sagei Phil.
Sin.: *Carex barrosii* Nelves, *Carex flava* L. subsp. *brevirostrata* Kük.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, MAG).

Carex saltaensis R. Gross
Hierba. Endémica. 2500 m.
Países: ARG(SAL).

Carex salticola J.R. Starr
Sin.: *Uncinia andina* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 700-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA).

Carex scabrida J.R. Starr
Sin.: *Uncinia scabriuscula* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 200-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, AIS).

Carex sellowiana Schltld.
Sin.: *Carex sellowiana* Schltld. var. *tenuis* Boeckeler, *Uncinia sellowiana* (Schltld.) Nees
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, RNO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Carex seticulmis Boeckeler
Sin.: *Carex uleana* Boeckeler, *Uncinia phyllostachya* Nees
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Carex setifolia Kunze ex Kunth
Sin.: *Carex piptolepis* Desv., *Carex pissisii* Phil., *Carex ruiziana* Boeckeler, *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *minor* Boott, *Isolepis variegata* Steud., *Scirpus cumingii* Boeckeler
Hierba. Nativa. 0-2400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Carex skottsbergiana Kük.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(AIS).

Carex soriano Barros
Hierba. Endémica. 100-800 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

Carex sororia Kunth
Sin.: *Carex apiathyensis* Palla, *Carex involucrata* Boott var. *pseudobracteosa* Kük., *Carex involucrata* Boott var. *submuricata*

C.B. Clarke ex Kük., *Carex sororia* Kunth f. *paupera* Osten, *Carex sororia* Kunth var. *pseudobracteosa* (Kük.) Kük.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, RNE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Carex stuessyi G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 900-1400 m.
Países: CHL(JFE).

Carex subandrogyna G.A. Wheeler & Guagl.
Hierba. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Carex subantarctica Speg.
Sin.: *Carex chubutensis* C.B. Clarke
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(AIS, MAG).

Carex subdivulsa (Kük.) G.A. Wheeler
Sin.: *Carex involucrata* Boott var. *subdivulsa* Kük., *Carex sororia* Kunth f. *subdivulsa* (Kük.) Kük.
Hierba. Nativa. 2500-2800 m.
Países: ARG(LRI, TUC).

Carex subfuegiana G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 0-2400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU).

Carex toroensis G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Carex transandina G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 300-600 m.

- Países: CHL(MAG).
- Carex triangula** J.R. Starr
Sin.: *Uncinia lechleriana* Steud. var. *triquetra* (Kük.) Kük., *Uncinia triquetra* Kük.
Hierba. Endémica. 100-1300 m.
Países: ARG(CHU, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).
- Carex trichodes** Steud. ex Boott
Sin.: *Carex involucrata* Steud., nom. nud., *Carex lateriflora* Phil., *Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *lateriflora* (Phil.) Kük., *Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *major* Kük.
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).
- Carex trifida** Cav.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).
- Carex turbaria** J.R. Starr
Sin.: *Uncinia austroamericana* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LLA, MAG).
- Carex tweedieana** Nees
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).
- Carex uruguensis** Boeckeler
Sin.: *Carex involucrata* Boott var. *angustata* Kük., *Carex pseudoechinata* Boeckeler, *Carex sororia* Kunth subsp. *uruguensis* (Boeckeler) Luceño & M.V. Alves, *Carex uruguensis* Boeckeler
- var. *angustata* (Kük.) Kük., *Carex uruguensis* Boeckeler var. *pseudoechinata* (Boeckeler) Kük., *Carex uruguensis* C.B. Clarke, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MON).
- Carex vallis-pulchrae** Phil. var. **vallis-pulchrae**
Sin.: *Carex castellanosi* Barros
Hierba. Endémica. 2000-3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, LBO, MAG, RME).
- Carex vallis-pulchrae** Phil. subsp. **barrosiana** (G.A. Wheeler) Jim. Mejías & A.Mor.Alons.
Sin.: *Carex vallis-pulchrae* Phil. var. *barrosiana* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).
- Carex vixdentata** (Kük. ex Osten) G.A. Wheeler
Sin.: *Carex extensa* Gooden. var. *vixdentata* Kük.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, RNE, SFE). BRA(RGS). PRY(CAA). URY(CAS, MAL, MON).
- Carex werdermannii** R. Gross
Hierba. Endémica. 1000 m.
Países: CHL(LRI, LLA).
- Carex wheeleri** J.R. Starr
Sin.: *Uncinia araucana* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 1400-1700 m.
Países: CHL(ARA).
- Carpha** Banks & Sol. ex R. Br.
- Carpha schoenoides** Banks & Sol. ex Hook. f.
Sin.: *Carpha alpina* R. Br. var. *schoenoides* (Banks & Sol. ex Hook. f.) Kük., *Carpha viridis* Phil.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).
- Cladium** P. Browne
- Cladium jamaicense** Crantz
Sin.: *Cladium effusum* Torr., *Cladium mariscus* (L.) Pohl subsp. *jamaicense* (Crantz) Kük., *Mariscus jamaicensis* (Crantz) Britton, *Rhynchospora arundinacea* Boeckeler
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(COS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(CAS, MON, ROC).
- Cladium mariscus** (L.) Pohl
Sin.: *Schoenus mariscus* L.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Cyperus** L.
- Cyperus affinis** Roem. & Schult.
Sin.: *Cyperus comosus* Poir., *Papyrus comosus* Kunth, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). PRY(CEN, ITA).
- Cyperus aggregatus** (Willd.) Endl.
Sin.: *Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl. var. *gigas* (Lindm.) Guagl., *Cyperus argentinus* Boeckeler, *Cyperus cayennensis* (Lam.) Britton, nom. illeg., *Cyperus cayennensis* (Lam.) Britton var. *gigas* (Lindm.) Barros,

- Cyperus cayennensis* (Lam.) Britton var. *umbellato-flavus* (C.B. Clarke) Barros, *Cyperus flavomariscus* Griseb., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees, nom. illeg., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *aggregatus* (Willd.) Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *angustatus* Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *argentinus* (Boeckeler) Kük. ex Osten, *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *australis* Osten, *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *gigas* (Lindm.) Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *laevis* Kük., *Cyperus retrorsus* Chapm. var. *australis* (Lindm.) Kük., *Didymia cyperomorpha* Phil., *Kyllinga cayennensis* Lam., *Mariscus aggregatus* Willd., *Mariscus cayennensis* (Lam.) Urb., *Mariscus cylindricus* Elliot var. *australis* Lindm., *Mariscus flavus* Vahl, *Mariscus flavus* Vahl f. *umbellato-flavus* C.B. Clarke, *Mariscus flavus* Vahl var. *gigas* Lindm. Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).
- Cyperus alternifolius** L.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Cyperus andinus** Palla ex Kük.
Sin.: *Cyperus achalensis* Hieron.
Hierba. Nativa. 2500-4100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC).
- Cyperus andreanus** Maury var. **andreanus**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Citada para Paraguay (Barros, 1960; Araujo & Longhi-Wagner, 1996) sin indicar localidad o material de referencia.
- Cyperus andreanus** Maury var. **capitinduensis** (Maury) Kük.
Sin.: *Cyperus capitinduensis* Maury, *Cyperus ferrugineus* Boeckeler, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 100-900 m.
Países: ARG(ERI, JUJ, MIS). BRA(SCA). PRY(APA, CAA).
- Cyperus andreanus** Maury var. **yguazensis** Kük.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).
- Cyperus anisitsii** Kük.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(GUA).
- Cyperus articulatus** L.
Sin.: *Cyperus articulatus* L. var. *nodosus* (Willd.) Kük., *Cyperus corymbosus* Rottb. var. *corymbosus*, *Cyperus nodosus* Willd.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Cyperus barrosianus** Herter
Sin.: *Cyperus lanceolatus* Poir. var. *tener* (C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.) Kük. ex Barros, *Cyperus tener* (C.B. Clarke) Barros, hom. illeg., *Pycneus tener* C.B. Clarke
Hierba. Nativa. Sin datos
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(CLA, COL, MON, TYT).
- Cyperus berroi** (C.B. Clarke) Barros
Sin.: *Bisboeckelera berroi* (C.B. Clarke) Standl., *Cyperus berroi* (C.B. Clarke) T. Koyama, comb. superfl., *Hoppia berroi* C.B. Clarke
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, DUR, MAL, RNO, ROC, SAO, TAC).
- Cyperus bipartitus** Torr.
Sin.: *Cyperus argentinus* C.B. Clarke, hom. illeg., *Cyperus lagunetto* Steud., *Cyperus pauper* Phil., hom. illeg., *Cyperus rivularis* Kunth, *Cyperus rivularis* Kunth f. *subacaulis* Kük., *Cyperus rivularis* Kunth subsp. *lagunetto* (Steud.) Kük., *Pycneus bipartitus* (Torr.) C.B. Clarke, *Pycneus lagunetto* (Steud.) C.B. Clarke, *Pycneus rivularis* (Kunth) Palla
Hierba. Nativa. 400-2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, SAL, SLU, TUC).
- Cyperus blepharoleptos** Steud.
Sin.: *Anosporum ablepharum* (Griseb.) Maury, *Anosporum cubense* (Poepp. & Kunth) Boeckeler, *Anosporum piliferum* Maury, *Blepharolepis leucoblepharis* Nees, *Oxycaryum cubense* (Poepp. & Kunth) Palla f. *cubense*, *Oxycaryum piliferum* (Maury) Palla, *Oxycaryum schomburgkianum* Nees, *Scirpus ablepharus* Griseb., *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth, *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth var. *gracilis* (Boeckeler) Beetle
Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, PHA). URY(ROC).
- Cyperus brasiliensis** (Kunth) Bauters
Sin.: *Ascolepis brasiliensis* (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke, *Ascolepis*

leucocephala (Nees) L.T. Eiten,
Platylepis brasiliensis Kunth, *Platylepis*
leucocephala Nees, *Platylepis*
xanthocephala Nees
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA,
MIE, PAI). URY(COL, RIV).

Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk.
Sin.: *Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. &
Kük. ex Kük. f. *gracilis* (Boeckeler)
Kük., *Kyllinga brevifolia* Rottb.,
Kyllinga brevifolia Rottb. var. *longifolia*
Boeckeler, *Kyllinga cruciformis*
Schrud. ex Roem. & Schult., *Kyllinga*
sororia Kunth, *Kyllinga tenuis* Baldwin
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APA,
AMA, CAA, CEN, GUA, ÑEE, SPE).
URY(COL).

Cyperus burkartii Guagl.
Hierba. Nativa. 200-400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Cyperus byssaceus Pereira-Silva
Sin.: *Androcoma speciosa* Nees,
Androtrichum giganteum (Kunth) H.
Pfeiff., *Androtrichum speciosum*
(Nees) Herter, *Scirpus giganteus*
Kunth
Hierba palustre. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
ERI, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(COA, PAI). URY(CAS, COL,
FLO, FLA, MON, RNO, ROC, SJO,
SOR).

Cyperus cellulosoreticulatus Boeckeler
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Cyperus cephalanthus Torr. & Hook.
Sin.: *Cyperus laetus* J. Presl var.
cephalanthus (Torr. & Hook.) Kük.,
Cyperus rigens J. Presl & C. Presl
subsp. *cephalanthus* (Torr. & Hook.)
Pedersen
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(COS). PRY(CAU, CEN,
COA).

Cyperus chalaranthus J. Presl & C.
Presl
Sin.: *Cyperus diffusus* Vahl subsp.
chalaranthus (J. Presl & C. Presl)
Kük., *Cyperus diffusus* Vahl var.
chalaranthus (J. Presl & C. Presl) C.B.
Clarke
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CEN, COA, GUA).

Cyperus compressus L.
Hierba. Nativa. 100-200 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).

Cyperus cornelii-ostenii Kük. var.
cornelii-ostenii
Hierba. Nativa. 100-1600 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ,
MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY,
CAU, CAN, CEN, COA, PAI).

Cyperus cornelii-ostenii Kük. var.
pilcomayensis Kük.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, JUJ,
SAL, SFE). PRY(APY).

Cyperus corymbosus Rottb. var.
subnodosus (Nees & Meyen) Kük.
Sin.: *Chlorocyperus cordobensis* Palla,
Cyperus cordobensis (Palla) Hicken,
Cyperus nodosus Willd. var.
subnodosus (Nees & Meyen)

Boeckeler, *Cyperus subnodosus* Nees
& Meyen
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,
MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,
TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN,
PHA). URY(ART, CLA, COL, MON,
RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Cyperus cyperoides (L.) Kuntze
Sin.: *Scirpus cyperoides* L.
Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: CHL(IPA).

Cyperus difformis L.
Hierba. Introducida. 100-200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(LBO, MAU, BIO). URY(ROC).

Cyperus digitatus Roxb.
Sin.: *Cyperus digitatus* Roxb. f. *contraction*
Kük., *Cyperus digitatus* Roxb. var.
obtusifructus Kük.
Hierba palustre. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL,
SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR). PRY(APY, CEN, CHO,
COA, ÑEE, PAI, PHA).

Cyperus distans L. f.
Sin.: *Cyperus purpureo-vaginat*
Boeckeler, *Cyperus squamulatus*
Steud.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Cyperus drummondii Torr. & Hook.
Sin.: *Cyperus robustus* Kunth, *Cyperus*
virens Michx. var. *drummondii* (Torr. &
Hook.) Kük., *Cyperus virens* Michx.
var. *robustus* (Kunth) Kük.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR).

Cyperus entrerianus Boeckeler var. **enterianus**

Sin.: *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. f. *conoideus* (Rich.) Nees, *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. var. *entrerianus* (Boeckeler) Barros, *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. var. *tucumanensis* (Boeckeler) C.B. Clarke ex Chodat, *Cyperus surinamensis* Rottb. var. *strictus* Kük., *Cyperus tucumanensis* Boeckeler

Hierba palustre. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Cyperus entrerianus Boeckeler var. **parvicapitulatus** Kük.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, ERI, FOR, MIS, SAL).

Cyperus eragrostis Lam.

Sin.: *Cyperus compressus* Jacq., *Cyperus declinatus* Moench, *Cyperus eragrostis* Lam. f. *latifrons* Kük., *Cyperus eragrostis* Lam. f. *tener* Kük., *Cyperus eragrostis* Lam. var. *compactus* (E. Desv.) Kük., *Cyperus limbatus* Maury, *Cyperus lutescens* Phil., hom. illeg., *Cyperus monandrus* Roth, *Cyperus vegetus* Willd., *Cyperus vegetus* Willd. var. *compactus* E. Desv., *Cyperus vegetus* Willd. var. *trigonus* Kuntze, *Cyperus vegetus* Willd. var. *obtusangulus* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,

BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Cyperus esculentus L.

Sin.: *Chlorocyperus phymatodes* (Muhl.) Palla, *Cyperus esculentus* L. var. *leptostachyus* Boeckeler, *Cyperus esculentus* L. var. *lutescens* (Torr. & Hook.) Kük. ex Osten *Cyperus esculentus* L. var. *phymatodes* (Muhl.) Kük., *Cyperus lutescens* Torr. & Hook., *Cyperus esculentus* L. var. *macrostachyus* Boeckeler, *Cyperus nervosus* Bertol., *Cyperus phymatodes* Muhl.

Hierba. Introducida. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CEN, CHO). URY(ART, CAS, CLA, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SOR, TAC, TYT).

Cyperus felipponei Kük.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, FLO, SOR).

Cyperus flavescens L.

Sin.: *Cyperus flavescens* L. var. *paraensis* (Nees) Boeckeler, *Cyperus flavescens* L. var. *piceus* (Liebm.) Fernald, *Cyperus piceus* Liebm., *Cyperus tristachyus* Boeckeler, *Pycnus flavescens* (L.) Rchb. var. *piceus* (Liebm.) Fernald, *Pycnus paraensis* Nees

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA, RGS). PRY(COA). URY(MON, RIV).

Cyperus friburgensis Boeckeler

Sin.: *Cyperus fusco-ferrugineus* Boeckeler, *Cyperus martianus* Schrad. ex Nees, hom. illeg.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, GUA).

Cyperus fuscus L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(BIO).

Cyperus gardneri Nees

Hierba acuática flotante. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS).

Cyperus giganteus Vahl

Sin.: *Chlorocyperus giganteus* (Vahl) Palla

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, ITA, MIE, ÑEE, PHA). URY(ART, CLA, COL, RNO, RIV, ROC, SOR, TAC, TYT).

Cyperus grammicus Kunze ex Kunth

Sin.: *Cyperus parvulus* Steud., *Pycnus grammicus* (Kunze ex Kunth) C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Cyperus haspan L. var. **haspan**

Sin.: *Cyperus adenophorus* Schrad., *Cyperus americanus* (Boeckeler) Palla, *Cyperus cayennensis* Willd. ex Link, *Cyperus efoliatus* Boeckeler, *Cyperus haspan* L. subsp. *juncoides* (Lam.) Kük., *Cyperus haspan* L. var. *adenophorus* (Schrad.) Kük., *Cyperus haspan* L. var. *americanus* Boeckeler, *Cyperus haspan* L. var. *amplissimus* Kük., *Cyperus haspan* L. var.

coarctatus Nees, *Cyperus haspan* L. var. *riparius* (Schr. ex Nees) Kük., *Cyperus juncoides* Lam., *Cyperus riparius* Schrad. ex Nees, *Scirpus autumnalis* Rottb., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, NEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.

Sin.: *Carex hermaphrodita* Jacq., *Cyperus hermaphroditus* (Jacq.) Standl. var. *longespicus* (Boeckeler) Kük., *Cyperus incompletus* (Jacq.) Link, *Cyperus longespicus* Boeckeler, *Cyperus ruizianus* Boeckeler, *Kyllinga incompleta* Jacq., *Mariscus hermaphroditus* (Jacq.) Urb., *Mariscus jacquinii* Kunth

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, ITA).

Cyperus hieronymi Boeckeler

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).

Cyperus hortensis (Salzm. ex Steud.) Dorr

Sin.: *Cyperus densicaespitosus* Mattf. & Kük., *Cyperus tenuifolius* (Steud.) Dandy, *Kyllinga caespitosa* Nees, *Kyllinga flexuosa* Boeckeler, *Kyllinga hortensis* Salzm. ex Steud., *Kyllinga pumila* Michx., *Kyllinga tenuifolia* Steud.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA). URY(CLA).

Cyperus imbricatus Retz.

Sin.: *Cyperus imbricatus* Retz. var. *viridispicus* (Boeckeler) Kük., *Cyperus involucratus* Poir., *Cyperus radiatus* Vahl, *Cyperus viridispicus* Boeckeler

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, MAU, LLA, RME). PRY(APY, APA, ITA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, FLO, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Cyperus incomtus Kunth

Sin.: *Cyperus cinereus* Maury, *Cyperus curvifolius* Boeckeler, *Cyperus incomtus* Kunth var. *venturii* (Kük.) Barros, *Cyperus venturii* Kük.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, COL, CLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC, TYT).

Cyperus infucatus Kunth

Hierba. Nativa. 1300-1800 m.

Países: ARG(TUC).

Cyperus inops C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 200-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cyperus intricatus Schrad. ex Schult.

Sin.: *Cyperus chamissoi* Schrad. ex Nees, *Cyperus ciliolatus* Boeckeler, *Cyperus consanguineus* Kunth, *Cyperus consanguineus* Kunth var. *chamissoi*

(Schr. ex Nees) Kük., *Cyperus consanguineus* Kunth var. *usterii* (Palla) Kük., *Cyperus consanguineus* Kunth var. *varius* (Boeckeler) Kük., *Cyperus longicaulis* Boeckeler, *Cyperus reflexus* Vahl var. *intricatus* (Schr. ex Schult.) Kük., *Cyperus schenckianus* Boeckeler, *Cyperus schraderi* Herter, hom. illeg., *Cyperus usterii* Palla, *Cyperus varius* Boeckeler, *Cyperus virens* Michx. var. *widgrenii* (Boeckeler) C.B. Clarke ex Barros, *Cyperus widgrenii* Boeckeler

Hierba. Nativa. 1300-1800 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyperus involucratus Rottb.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COR, MEN, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT, MAU, LLA, RME).

Cyperus iria L.

Sin.: *Cyperus panicoides* Lam.

Hierba. Introducida. 100-1600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART).

Cyperus laevigatus L.

Sin.: *Acorellus laevigatus* (L.) Palla, *Acorellus pallae* Kneuck., *Chlorocyperus laevigatus* (L.) Palla, *Cyperus laevigatus* L. f. *reptans* C.B. Clarke, *Cyperus laevigatus* L. var. *pallae* (Kneuck.) Kük., *Cyperus laevigatus* L. var. *reptans* (C.B. Clarke) Kük., *Cyperus mucronatus* Rottb., *Juncellus laevigatus* (L.) C.B. Clarke, *Juncellus laevigatus* (L.) C.B. Clarke var. *junciformis* C.B. Clarke, *Pycnus laevigatus* (L.) Nees, *Pycnus mucronatus* (Roxb.) Nees

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, MAU).

Cyperus lanceolatus Poir.

Sin.: *Cyperus helvus* Liebm., nom. superfl., *Cyperus lepidus* Phil., *Cyperus olfersianus* Kunth, *Cyperus olfersianus* Kunth var. *maximiliani* Boeckeler, *Pycnus helvus* (Liebm.) C.B. Clarke, *Pycnus lanceolatus* (Poir.) C.B. Clarke, *Pycnus olfersianus* (Kunth) Nees, *Pycnus propinquus* Nees

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU). PRY(CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, MON, RNO, RIV, SAO, TAC).

Cyperus laxus Lam.

Sin.: *Cyperus diffusus* Vahl, *Cyperus diffusus* Vahl var. *umbrosus* (Lindl. & Nees) Kük., *Cyperus umbrosus* Lindl. ex Nees

Hierba palustre. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Cyperus ligularis L.

Sin.: *Cyperus glauco-viridis* Boeckeler, *Cyperus trigonus* Boeckeler, *Mariscus ligularis* (L.) Urb., *Mariscus longus* Schrad. ex Nees, *Mariscus rufus* Kunth

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON, PAI, SPE).

Notas: Probablemente en Argentina

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.

Sin.: *Cyperus bangianus* Gand., *Cyperus conoideus* Rich., *Cyperus sphaerostachys* Link, *Scirpus luzulae* L.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CON, GUA, MIE, SPE).

Cyperus macrostachyos Lam.

Sin.: *Cyperus albomarginatus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud., *Cyperus albomarginatus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. var. *pachyanthemos* Kük., *Cyperus albomarginatus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud. var. *sabulosus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Kük., *Cyperus flavicomus* Michx., *Cyperus sabulosus* (Mart. & Schrad. ex Nees) Steud., *Pycnus albomarginatus* Mart. & Schrad. ex Nees, *Pycnus flavicomus* (Michx.) C.D. Adams, *Pycnus macrostachyos* (Lam.) J. Raynal, *Pycnus sabulosus* Mart. & Schrad. ex Nees

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(ÑEE, SPE).

Cyperus manimae Kunth

Sin.: *Cyperus manimae* Kunth var. *phaeocephalus* (Griseb.) O'Neill & Ben. Ayers, *Cyperus phaeocephalus* Griseb., *Cyperus phaeocephalus* Griseb. var. *major* Kük., *Cyperus spectabilis* Link var. *coarctatus* Boeckeler, *Mariscus manimae* (Kunth) C.B. Clarke, *Mariscus phaeocephalus* (Griseb.) C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 700-2700 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Cyperus megapotamicus Kunth

Sin.: *Cyperus jaeggii* Boeckeler, *Cyperus mauryi* Kuntze, *Cyperus megapotamicus* Kunth var. *jaeggii* (Boeckeler) Kük. ex Barros, *Cyperus nematodes* Cham. & Schrad. ex Nees, nom. nud., *Pycnus megapotamicus* (Kunth) Nees, *Pycnus megapotamicus* (Kunth) Nees var. *jaeggii* (Boeckeler) Guagl., *Pycnus nematodes* C.B. Clarke

Hierba palustre. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Cyperus melanostachyus Kunth

Sin.: *Cyperus biradiatus* Boeckeler, *Cyperus cimicinus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus longicruris* Boeckeler, *Cyperus lorentzianus* Boeckeler, *Cyperus lorentzianus* Boeckeler var. *compressus* Boeckeler, *Cyperus lorentzianus* Boeckeler var. *elatus* Boeckeler, *Cyperus niger* Ruiz & Pav., hom. illeg., *Cyperus niger* Ruiz & Pav. var. *lorentzianus* (Boeckeler) Kük., *Cyperus pergracilis* Boeckeler, *Cyperus variegatus* Kunth, *Pycnus cimicinus* (J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff., *Pycnus melanostachyus* (Kunth) C.B. Clarke, nom. inval., *Pycnus niger* Cufod., *Pycnus niger* T. Koyama

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA).

Cyperus meridionalis Barros

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA,

COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Cyperus meyenianus Kunth

Sin.: *Chlorocyperus paranaguensis* Palla, *Cyperus meyenianus* Kunth var. *breviradiatus* Maury, *Cyperus meyenianus* Kunth var. *oligostachys* (Schr.) Kük., *Cyperus meyenianus* Kunth var. *paranaguensis* (Palla) Kük., *Cyperus meyenianus* Kunth var. *patentissimus* Kük., *Cyperus palustris* (Schr.) Kük., hom. illeg., *Cyperus prionensis* Boeckeler, *Mariscus meyenianus* (Kunth) Nees, *Mariscus oligostachys* Schr., *Mariscus palustris* Schr.

Hierba palustre. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA, PHA). URY(ART, CLA, RNO).

Cyperus mundtii (Nees) Kunth

Sin.: *Pycnus decumbens* T. Koyama, *Pycnus mundtii* Nees
Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyperus mundulus Kunth

Sin.: *Cyperus glaziovianus* Boeckeler
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyperus muniziae G.C. Tucker

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(CEN, PAI).

Cyperus niederleinianus Boeckeler

Sin.: *Pycnus niederleinianus* (Boeckeler) Lindm.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

Cyperus obtusatus (J. Presl & C. Presl) Mattf. & Kük.

Sin.: *Kyllinga obtusata* J. Presl & C. Presl, *Kyllinga peruviana* Lam., *Kyllinga pungens* Link, *Kyllinga rigida* Baldwin, *Kyllinga stricta* Schrad. ex Nees, *Kyllinga tenuis* Boeckeler, hom. illeg., *Kyllinga vaginata* Lam.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, COA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, COL, CLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Cyperus ochraceus Vahl

Sin.: *Cyperus ochraceus* Vahl var. *excelsior* Kük.
Hierba. Nativa. 0-2400 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, PAI).

Cyperus odoratus L.

Sin.: *Cyperus densiflorus* G. Mey., *Cyperus engelmannii* Steud., *Cyperus ferax* Rich. subsp. *engelmannii* (Steud.) Kük., *Cyperus ferax* Rich. subsp. *speciosus* (Vahl) Kük., *Cyperus ferax* Rich. var. *bulbiferus* Barros, *Cyperus ferax* Rich. var. *maximiliani* (Schr.) ex Nees Boeckeler, *Cyperus ferox* Vahl, *Cyperus hamiltonii* Kunth, *Cyperus huarmensis* (Kunth) M.C. Johnst., *Cyperus jubiiflorus* Rudge, *Cyperus maximiliani* (Schr.) ex Nees Griseb., *Cyperus pohlianus* (Nees) Kuntze, *Cyperus speciosus* Vahl, *Dididium lenticulare* Schr. ex Nees, *Dididium lomentaceum* (Nees & Meyen ex Kunth) Nees, *Dididium maximiliani* Schr. ex Nees, *Dididium odoratum* (L.) Schr. ex Nees, *Dididium uliginosum* Schr. ex Nees, *Mariscus pohlianus* Nees, *Torulinium*

confertum Desv. ex Ham., *Torulinium odoratum* (L.) Hooper

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJO, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, LSR). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

Cyperus oxylepis Nees ex Steud.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CON, PHA).

Cyperus papyrus L.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyperus pearcei C.B. Clarke

Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUJ). PRY(APY, PAI).

Cyperus pedunculatus (R.Br.) J. Kern

Sin.: *Remirea maritima* Aubl., *Remirea pedunculata* R.Br.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyperus poeppigii Kunth

Sin.: *Torulinium poeppigii* (Kunth) C.B. Clarke
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(LBO, BIO, RME).

Cyperus pohlii (Nees) Steud.

Sin.: *Mariscus setigulumis* C.B. Clarke, *Papyrus pohlii* Nees
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, SFE). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PHA, SPE). URY(RNO, RIV, ROC, TAC).

Cyperus polystachyos Rottb.

Sin.: *Cyperus elongatus* Steud., *Cyperus paniculatus* Rottb., *Cyperus polystachyos* Rottb. var. *paniculatus* (Rottb.) C.B. Clarke, *Cyperus teretifructus* Steud., *Pycneus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv., *Pycneus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv. subsp. *riograndensis* D.A. Simpson

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY, COA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, ROC, SJO).

Cyperus prolixus Kunth

Sin.: *Comostemum schottii* Nees, *Cyperus amplissimus* Steud., *Cyperus bisumbellatus* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

Cyperus redolens Maury ex Micheli

Sin.: *Cyperus flavus* (Vahl) Nees subsp. *redolens* (Maury) Osten, *Mariscus flavus* Vahl var. *humilis* C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, SFE). PRY(APY). URY(MAL, PAY, RIV, SOR).

Cyperus reflexus Vahl

Sin.: *Cyperus fraternus* Kunth, *Cyperus haematostachys* Steud., *Cyperus*

reflexus Vahl f. *capitatus* Osten, *Cyperus reflexus* Vahl f. *major* Maury, *Cyperus reflexus* Vahl var. *fraternus* (Kunth) Kuntze, *Cyperus reflexus* Vahl var. *macrostachys* Boeckeler, *Cyperus sellowii* Link

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, RNE, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, MIE, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl. var. **impolitus** (Kunth) Hefler & Longhi-Wagner

Sin.: *Chlorocyperus balansae* (Maury) Palla, *Chlorocyperus serrae* Palla, *Cyperus balansae* Maury, *Cyperus impolitus* Kunth, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *balansae* (Maury) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *capitatus* Boeckeler, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *hassleri* (C.B. Clarke) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *impolitus* (Kunth) Kük., *Cyperus wacketii* Kük., *Mariscus balansae* (Maury) C.B. Clarke, *Mariscus hassleri* C.B. Clarke, *Mariscus impolitus* (Kunth) J. Raynal

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, FLO, MAL, MON, RIV, SAO, SJO).

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl var. **rigens**

Sin.: *Chlorocyperus oostachyus* (Nees) Palla, *Cyperus aurescens* Boeckeler, *Cyperus chilensis* Boeckeler, *Cyperus conceptionis* Steud., *Cyperus lacustris* Phil., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl f. *contracta* Osten, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *conceptionis* (Steud.) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *laeviculmis* Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *maximus* Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *parciflorus* Kük., *Cyperus nocha* Phil., *Cyperus oostachyus* Nees, *Cyperus paposanus* Phil., *Cyperus quinquespicatus* Boeckeler, *Cyperus rancoanus* Phil., *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl subsp. *serrae* (Boeckeler) Pedersen, *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *capitatus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *maximus* (Kük.) Pedersen, *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *selmirae* Pedersen, *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *umbellatus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus serrae* Boeckeler, *Cyperus surinamensis* Rottb. var. *formosus* (Vahl) Kük., *Mariscus conceptionis* (Steud.) C.B. Clarke, *Mariscus rigens* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ANT, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, COL, FLO, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl
subsp. **arechavaletae** (Boeckeler)
Pedersen

Sin.: *Cyperus arechavaletae* Boeckeler,
Cyperus laetus J. Presl & C. Presl var.
arechavaletae (Boeckeler) Kük.,
Cyperus *purpureovariegatus*
Boeckeler
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(MON).

Cyperus rotundus L.

Sin.: *Chlorocyperus rotundus* (L.) Palla
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS,
SAL, SJU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA,
COQ, VAL, MAU, BIO, RME).
PRY(COA). URY(CAS, MON, PAY,
RNO, SOR).

Cyperus sellowianus (Kunth) T. Koyama
Sin.: *Hypolytrum glomeratum* Schrad. ex
Nees, nom. nud., *Lipocarpa*
glomerata Nees, *Lipocarpa*
humboldtiana Nees, *Lipocarpa*
sellowiana Kunth

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA,
MIE, PAI, SPE). URY(CLA, CLA,
MON, RNO, RIV, ROC, TAC).

Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. &
Kük. ex Kük.

Sin.: *Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. &
Kük. ex Kük. f. *bulbiferus* (Kük.) Kük.,
Kyllinga leucocephala Baldwin,
Kyllinga martiana Schrad. ex Nees,
Kyllinga monocephala Kunth, nom.
illeg., *Kyllinga odorata* Vahl, *Kyllinga*
odorata Vahl var. *bulbifera* Kük.,
Kyllinga odorata Vahl var. *genuina*
Osten, nom. inval., *Kyllinga odorata*

Vahl var. *gracilis* Boeckeler, *Kyllinga*
odorata Vahl var. *rigida* Boeckeler,
Kyllinga pellucido-albida Boeckeler,
Kyllinga sesquiflora Torr.

Hierba palustre. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SCR,
SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN,
CHO, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE,
PAI, SPE). URY(ART, CLA, FLO, FLA,
LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC,
SAO, SJO, TYT).

Cyperus shepherdii G.C. Tucker &
Gandhi

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Cyperus spectabilis Link var. **jujuyensis**
Kük.

Hierba. Endémica. 1100-2400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Cyperus sphacelatus Rottb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyperus squarrosus L.

Sin.: *Cyperus aristatus* Rottb., nom. illeg.,
Cyperus aristatus Rottb. var. *inflexus*
(Muhl.) Boeckeler ex Kük., *Cyperus*
inflexus Muhl., *Mariscus squarrosus*
(L.) C.B. Clarke, *Scirpus intricatus* L.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, ERI, JUJ, LPA,
MEN, NEU, RNE, SJU, TUC).
BRA(PAR). CHL(COQ, LBO, MAU,
BIO, LSR, LLA, RME). PRY(APY,
CON, COA). URY(CLA, DUR, ROC,
SAO, SOR, TAC).

Cyperus strongii G.C. Tucker & Gandhi

Sin.: *Cyperus acicularis* (Schrad. ex Nees)
Steud., hom. illeg., *Cyperus ferax*

Rich. var. *acicularis* (Nees) Kük.,
Diclidium aciculare Schrad. ex Nees

Hierba. Nativa.

Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS).

Cyperus subsquarrosus (Muhl.) Bauters

Sin.: *Hemicarpha micrantha* (Vahl) Britton,
comb. superfl., *Hemicarpha micrantha*
(Vahl) Pax, *Hemicarpha subsquarrosa*
(Muhl.) Nees, *Isolepis micrantha*
(Vahl) Roem. & Schult., *Lipocarpa*
micrantha (Vahl) G.C. Tucker, *Scirpus*
micranthus Vahl, *Scirpus minimus*
Pursh, hom. illeg., *Scirpus*
subsquarrosus Muhl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).
PRY(COA). URY(CLA).

Cyperus surinamensis Rottb. var.
lutescens Boeckeler

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(APY, COA).

Cyperus surinamensis Rottb. var.
surinamensis

Sin.: *Cyperus denticulatus* Schrad. ex
Schult.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN,
COA, GUA, ÑEE, PHA). URY(ART,
CLA, COL, DUR, FLA, PAY, RNO,
SAO, TAC).

Cyperus tenuis Sw.

Sin.: *Cyperus caracasanus* Kunth

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, PAI).

Cyperus trigynus Spreng.

Sin.: *Abildgaardia polycephala* Brongn.,
Androtrichum montevidense (Link)

- Barros, comb. illeg., *Androtrichum polycephalum* (Brongn.) Kunth, *Androtrichum trigynum* (Spreng.) H. Pfeiff., *Comostemum globuliferum* Nees, *Comostemum montevidense* (Link) Nees, *Cyperus globulifer* J. Presl & C. Presl, *Cyperus preslii* A. Dietr., *Eriophorum montevidense* Link, *Scirpus montevidensis* (Link) C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, MAL, MON, ROC, SJO).
- Cyperus tweediei** C.B. Clarke
Hierba. Endémica. 200-2700 m.
Países: ARG(TUC). CHL(VAL).
- Cyperus uncinulatus** Schrad. ex Nees
Sin.: *Cyperus hamatus* Schrad. ex Nees, *Cyperus paraguayensis* C.B. Clarke
Hierba palustre. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, COA, PAI, SPE). URY(RNO).
- Cyperus unicolor** Boeckeler
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(RGS, SCA). PRY(APA). URY(PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).
- Cyperus unioides** R. Br.
Sin.: *Cyperus angulatus* Nees, *Cyperus bromoides* Willd. ex Link, *Cyperus taubertii* Boeckeler, *Cyperus unioides* R. Br. var. *bromoides* (Link) C.B. Clarke, *Pycneus angulatus* (Nees) Nees ex C.B. Clarke, *Pycneus unioides* (R. Br.) Urb.
Hierba acuática. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, PAI). URY(PAY, RNO, RIV).
- Cyperus virens** Michx. var. **minarum** (Boeckeler) Denton
Sin.: *Cyperus consanguineus* Kunth var. *minarum* (Boeckeler) Kük., *Cyperus minarum* Boeckeler
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA).
- Cyperus virens** Michx. var. **montanus** (Boeckeler) Denton
Sin.: *Cyperus montanus* Boeckeler, *Cyperus uleanus* Boeckeler
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS, SFE). CHL(BIO).
- Cyperus virens** Michx. var. **virens**
Sin.: *Cyperus acutangulus* Boeckeler, *Cyperus baenitzii* Boeckeler, *Cyperus formosus* Vahl, *Cyperus vegetus* Willd. var. *acutangulus* (Boeckeler) Kuntze, *Cyperus virens* Michx. var. *acutangulus* (Boeckeler) Kük.
Hierba palustre. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, ARA). PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).
- Cyperus volckmannii** Phil.
Sin.: *Cyperus araeus* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ, MAU).
- Cyperus xanthostachyus** Steud.
Sin.: *Cyperus lechleri* Steud.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).
- Eleocharis** R. Br.
- Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult. subsp. **acutangula**
Sin.: *Eleocharis fistulosa* Schult., *Eleocharis planiculmis* Steud., *Limnochloa acutangula* (Roxb.) Nees, *Limnochloa fistulosa* (Schult.) Nees, *Scirpus acutangulus* Roxb., *Scirpus fistulosus* Poir., hom. illeg.
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(CLA, RIV, TAC).
- Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult. subsp. **brevisetata** Roseng.
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Eleocharis angustirostris** R. Trevis. & Boldrini
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Eleocharis argentina** Barros
Hierba. Endémica. 200-700 m.
Países: ARG(MEN).
- Eleocharis atacamensis** Phil.
Hierba. Nativa. 500-3600 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, SAL, SCR, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, BIO, LLA, MAG).
- Eleocharis atrobrunnea** R. Trevis. & S. González
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Eleocharis atropurpurea** (Retz.) J. Presl & C. Presl
Sin.: *Eleocharis atropurpurea* (Retz.) Kunth, comb. superfl., *Eleocharis erratica* (Rota ex De Not.) Steud., *Eleocharis laetevirens* (Nees) Nees ex

- Steud., *Eleocharis monandra* Hochst. ex Steud., *Eleocharis atropurpureus* (Retz.) Nees, *Eleocharis laetevirens* Nees, *Isolepis atropurpurea* (Retz.) Roem. & Schult., *Scirpus atropurpureus* Retz., *Scirpus erraticus* Rota ex De Not.
Hierba palustre. Nativa. 100-1100 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL). PRY(APY).
- Eleocharis baldwinii** (Torr.) Chapm.
Sin.: *Chaetocyperus baldwinii* Torr.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(MON).
- Eleocharis barrosii** Svenson
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). BRA(SCA).
Notas: Citada para Paraguay (Barros, 1960) sin indicar localidad o material de referencia.
- Eleocharis bicolor** Chapm.
Sin.: *Eleocharis minima* Kunth var. *bicolor* (Chapm.) Svenson, *Eleocharis villaricensis* Maury
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAA, PHA).
- Eleocharis bonariensis** Nees
Sin.: *Chaetocyperus bonariensis* (Nees) Nees, *Chaetocyperus obtusatus* Nees, *Eleocharis aciculariformis* Greenm., *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. & Schult. subsp. *bonariensis* (Nees) Osten, *Eleocharis striatula* E. Desv., *Scirpus striatulus* (E. Desv.) Griseb.
Hierba palustre. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
- CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(CAS, DUR, FLA, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).
- Eleocharis canindeyuensis** Mereles & S. González
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).
- Eleocharis capillacea** Kunth
Sin.: *Chaetocyperus capillaceus* (Kunth) Nees
Hierba acuática. Nativa. 200-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, MIE, PAI, SPE).
- Eleocharis confervoides** (Poir.) Steud.
Sin.: *Rhynchospora ruppioides* Benth., *Scirpus confervoides* Poir., *Scirpus submersus* C. Wright, *Websteria confervoides* (Poir.) Hooper, *Websteria limnophila* C. Wright, *Websteria submersa* (C. Wright) Britton
Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).
- Eleocharis contracta** Maury
Sin.: *Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult. var. *subnodulosa* Svenson, *Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult. var. *tenuis* Boeckeler, *Eleocharis posadensis* Kük.
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, PAY, SAO, TAC).
- Eleocharis cordillerana** S. González, Guagl. & Ruthsatz
Hierba. Endémica. 500-900 m.
Países: CHL(LSR, LLA).
- Eleocharis crinalis** (Griseb.) C.B. Clarke
Sin.: *Eleocharis brehmeriana* Boeckeler, *Scirpus crinalis* Griseb.
Hierba palustre. Nativa. 500-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). PRY(AMA, CON).
- Eleocharis cylindrica** Buckley
Sin.: *Eleocharis spegazzinii* Barros, *Eleocharis texana* Britton
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, CAA, CEN, GUA, PAI, PHA).
- Eleocharis debilis** Kunth
Hierba palustre. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, PHA).
- Eleocharis densicaespitosa** R. Trevis. & Boldrini
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, GUA).
- Eleocharis dombeyana** Kunth
Sin.: *Chaetocyperus stoloniferus* Nees, *Eleocharis bivaginata* Steud., *Eleocharis stolonifera* (Nees) Boeckeler, *Eleocharis truncata* Schltld., *Limnochloa truncata* (Schltld.) Liebm.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA, RME).
- Eleocharis dunensis** Kük.
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).

Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult.

Sin.: *Scirpus crassiculmis* (Nees) Schrad. ex Griseb., *Scirpus elegans* Kunth
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, PAY, SJO, TAC).

Eleocharis elongata Chapm.

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Eleocharis emarginata (Nees) Klotzsch ex Boeckeler

Sin.: *Chaetocyperus emarginatus* Nees, *Eleocharis quinquangularis* Boeckeler
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, SPE).

Eleocharis exigua (Kunth) Roem. & Schult.

Sin.: *Chaetocyperus costulatus* Nees & Meyen ex Kunth, *Eleocharis acicularis* (L.) R. Br. var. *lilliputiana* Speg., *Eleocharis costulata* Nees & Meyen ex Kunth, *Eleocharis lindheimeri* (C.B. Clarke) Svenson, *Eleocharis radicans* (A. Dietr.) Kunth, *Eleocharis rivularis* Phil., *Eleogiton radicans* A. Dietr., *Scirpus exiguus* Kunth, *Scirpus radicans* Poir., hom. illeg.

Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR,

RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG). PRY(APA, MIE). URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO).

Eleocharis filiculmis Kunth

Sin.: *Eleocharis balansiana* Boeckeler, *Eleocharis purpureovaginata* Boeckeler, *Eleocharis rothiana* Boeckeler, *Eleocharis sulcata* Nees ex Boeckeler, *Eleocharis sulcata* Nees, nom. nud., *Scirpidium sulcatum* Nees, *Scirpus filiculmis* Schrad., nom. nud., *Scirpus sulcatus* Roth, hom. illeg.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, RNE, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Eleocharis flavescens (Poir.) Urb.

Sin.: *Eleocharis albivaginata* Boeckeler var. *flaccida* (Rchb. ex Spreng.) Boeckeler, *Eleocharis albivaginata* Boeckeler var. *humilis* Boeckeler, *Eleocharis albivaginata* Boeckeler var. *stricta* Boeckeler, *Eleocharis arechavaletae* Boeckeler, *Eleocharis flaccida* (Rich. ex A. Spreng.) Urb., *Eleocharis flaccida* (Rich. ex A. Spreng.) Urb. var. *arechavaletae* (Boeckeler) Osten, *Eleocharis ochreatea* (Nees) Steud., *Eleogenus ocreatus* Nees var. *flaccidus* Nees, *Eleogenus ocreatus* Nees var. *minor* Nees, *Eleogenus ocreatus* Nees var. *pallens* Nees, *Scirpus flaccidus* Rchb. ex Spreng., *Scirpus flavescens* Poir., *Scirpus gaudichaudianus* Kunth

Hierba acuática. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, RME). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI). URY(CAS, SJO).

Eleocharis fuscopurpurea (Steud.) H. Pfeiff.

Sin.: *Eleocharis hyalinovaginata* Boeckeler, *Eleocharis melanocarpa* Phil., hom. illeg., *Eleocharis univaginata* Boeckeler, *Eleocharis vincentina* Phil., *Eleocharis vincentina* Phil. var. *arcuata* (Kunze ex Johow) C.B. Clarke, *Isolepis fuscopurpurea* Steud., *Scirpus desvauxii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, SFE, SJU, TUC). CHL(MAU, BIO, LSR, LLA, JFE).

Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.

Sin.: *Chlorocharis capitata* (R. Br.) Rikli, *Eleocharis caduca* (Delile) Schult., *Eleocharis capitata* (L.) R. Br., *Eleocharis caribaea* (Rottb.) S.F. Blake, *Eleocharis geniculata* (L.) Roem. & Schult. var. *minor* (Vahl) Roem. & Schult., *Eleocharis microformis* Buckley, *Eleogenus capitatus* (L.) Nees, *Limnochloa geniculata* (L.) Nees, *Scirpus brownii* Spreng., *Scirpus caducus* Delile, *Scirpus capitatus* Willd., *Scirpus caribaeus* Rottb., *Scirpus geniculatus* L., *Scirpus geniculatus* L. var. *minor* Vahl

Hierba palustre. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE). URY.

Eleocharis glaucovirens Boeckeler

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).

Eleocharis grandirostris (Lindm.) Mereles

Sin.: *Eleocharis sulcata* Nees ex Boeckeler var. *grandirostris* Lindm.
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

Eleocharis guaglianioniana J.P.R.
Ferreira, Silv. Venturi & R. Trevis.
Hierba. Endémica. 1300-1400 m.
Países: BRA(SCA).

Eleocharis hatschbachii R. Trevis.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(COS).

Eleocharis haumaniana Barros
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, RNE, SFE). URY(CAS, COL, FLA, MON, PAY, RNO, TAC).

Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult.
Sin.: *Scirpus interstinctus* Vahl
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, COA, ÑEE, SPE).

Eleocharis jelskiana Boeckeler
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eleocharis kleinii Barros
Hierba. Endémica. 500-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eleocharis laeviglumis R. Trevis. & Boldrini
Hierba palustre. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Eleocharis lechleri Boeckeler
Hierba. Nativa. 400-900 m.
Países: ARG(JUU, RNE, SAL, TUC). CHL(LSR, LLA).

Eleocharis loefgreniana Boeckeler
Sin.: *Eleocharis leptostachys* Lindm.
Hierba. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eleocharis macrostachya Britton
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME). URY(CAS, FLA, LAV, MON, PAY, ROC, SJO).

Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult.
Sin.: *Eleocharis gracilis* Nees, *Eleocharis lehmanniana* Boeckeler, *Eleocharis maculosa* (Vahl) Roem. & Schult. var. *genuina* Osten, nom. inval., *Eleogenus ocreatus* Nees var. *albo-ater* Nees, *Eleogenus ocreatus* Nees var. *binocreatus* Nees, *Eleogenus schottianus* Nees, *Scirpus maculosus* Vahl
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, LPA, NEU, RNE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, LLA, JFE). URY(CAS, MON, RIV).

Eleocharis melanocephala E. Desv.
Sin.: *Scirpus melanocephalus* (E. Desv.) Griseb.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, NEU, RNE, SAL, TUC). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

Eleocharis melanomphala C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TUC). CHL(RME).

Eleocharis melanostachys (d'Urv.) C.B. Clarke

Sin.: *Eleocharis funebris* Speg., *Eleocharis litoralis* Phil., *Eleocharis macrorrhiza* Boeckeler, *Eleocharis simulans* C.B. Clarke, *Eleocharis valdiviana* Phil., *Fimbristylis melanostachys* (C.B. Clarke) Brongn., *Isolepis heteromorpha* Steud., *Scirpus melanostachys* d'Urv.
Hierba. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ATA, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Eleocharis mendocina Phil.
Hierba. Endémica. 200-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU, TUC).

Eleocharis minarum Boeckeler
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA). PRY(MIE).

Eleocharis minima Kunth
Sin.: *Chaetocyperus polymorphus* Lindl. & Nees, *Eleocharis durandii* Boeckeler, *Eleocharis tenuissima* Boeckeler, *Eleocharis wrightiana* Boeckeler
Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult.

Sin.: *Eleocharis consanguinea* Kunth, *Eleocharis montana* (Kunth) Roem. & Schult. var. *nodulosa* (Roth) Svenson, *Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult., *Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult. f. *trigyna* Barros, *Eleogenus nodulosus* (Roth) Nees, *Scirpus montanus* Kunth, *Scirpus nodulosus* Roth

Hierba acuática. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

Eleocharis montevidensis Kunth

Sin.: *Eleocharis arenicola* Torr. ex Engelm. & A. Gray, *Eleocharis montana* (Kunth) Roem. & Schult. subsp. *montevidensis* (Kunth) Osten, *Limnochloa montevidensis* (Kunth) Nees
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, DFE, ERI, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult.

Sin.: *Scirpus mutatus* L.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, PHA, SPE).

Eleocharis nana Kunth

Sin.: *Chaetocyperus punctatus* Nees, *Eleocharis punctata* Boeckeler
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

Eleocharis neesii R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Eleocharis niederleinii Boeckeler

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA).

Eleocharis nigrescens (Nees) Steud.

Sin.: *Scirpidium nigrescens* Nees
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Eleocharis nubigena C.B. Clarke

Sin.: *Eleocharis albibracteata* Nees & Meyen ex Kunth var. *nubigena* (C.B. Clarke) Barros
Hierba. Nativa. 900-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Eleocharis nudipes (Kunth) Palla

Sin.: *Eleocharis grandis* (Nees) Boeckeler, *Eleocharis pachystyla* C.B. Clarke var. *angustostachya* H. Pfeiff., *Eleocharis pachystyla* C.B. Clarke var. *macrostachya* H. Pfeiff., *Isolepis nudipes* Kunth, *Scirpidium grande* Nees
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, SPE). URY(RNO, RIV, TAC).

Eleocharis obtusa (Willd.) Schult.

Sin.: *Scirpus obtusus* Willd.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, SFE).

Eleocharis obtusetrigona (Lindl. & Nees) Steud.

Sin.: *Eleocharis fistulosa* Schult. var. *obtusetrigona* (Lindl. & Nees) Barros, nom. inval., *Eleocharis strobilacea* Pedersen, *Limnochloa obtusetrigona* Lindl. & Nees
Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, SPE). URY(ART, RNO).

Eleocharis occidentalis Mereles

Hierba palustre. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(PHA).

Notas: Es probable su presencia en la Argentina

Eleocharis ochrostachys Steud.

Hierba palustre. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Eleocharis pachycarpa E. Desv.

Sin.: *Eleocharis dubia* Phil., *Eleocharis fuscousanguinea* Boeckeler, *Eleocharis lepida* Phil., *Eleocharis leptocaulis* Steud., *Eleocharis liocarpa* Phil.
Hierba. Nativa. 0-2400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Eleocharis parodii Barros

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(FLO, FLA, LAV, PAY, RNO).

Eleocharis parvispicula R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(PAR).

Eleocharis pauciglumis R. Trevis. & D.J. Rosen

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

Eleocharis plicarhachis (Griseb.) Svenson

Sin.: *Eleocharis elata* Boeckeler, *Scirpus plicarhachis* Griseb.
Hierba palustre. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, COS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, PAI, SPE).

Eleocharis pseudoalbibracteata S. González & Guagl.

Hierba. Nativa. 400-4400 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, IPA).

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz

Sin.: *Eleocharis pauciflora* (Lightf.) Link, *Isolepis andina* Phil., *Scirpus andinus* Phil., *Scirpus baeothryon* Ehrh., *Scirpus pauciflorus* Lightf., *Scirpus quinqueflorus* Hartmann

Hierba. Nativa. 2200-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, SAL, SCR, SJU). CHL(ANT, ATA, BIO).

Eleocharis rabenii Boeckeler

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Eleocharis ramboana R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eleocharis riograndensis R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eleocharis rostellata (Torr.) Torr.

Sin.: *Scirpus rostellatus* Torr.

Hierba. Nativa. 300-1800 m.

Países: ARG(SJU, TUC).

Eleocharis sellowiana Kunth

Sin.: *Eleocharis albivaginata* Boeckeler var. *macrostachya* Boeckeler, *Eleocharis galapagensis* Svenson, *Eleocharis mesopotamica* Boeckeler, *Eleogenus sellowianus* (Kunth) Nees, *Scirpus sellowianus* (Kunth) Griseb.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, MON, SJO).

Eleocharis squamigera Svenson

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eleocharis subarticulata (Nees) Boeckeler

Sin.: *Chaetocyperus subarticulatus* Nees, *Eleocharis widgrenii* Boeckeler

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, PHA, SPE). URY(RIV, TAC).

Eleocharis tucumanensis Barros

Hierba. Nativa. 3900-4600 m.

Países: ARG(JUJ, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

Eleocharis uniflora Seberg

Sin.: *Chillania pusilla* Roiv.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO).

Eleocharis urceoloides R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(CEN, COA).

Eleocharis viridans Kük. ex Osten

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON, ROC, TYT).

Ficinia Schrad.

Ficinia nodosa (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson

Sin.: *Isolepis monocephala* Steud., *Isolepis nodosa* (Rottb.) R. Br., *Scirpus molinianus* Beetle, *Scirpus nodosus* Rottb.

Hierba. Cosmopolita. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE).

Fimbristylis Vahl

Fimbristylis aspera (Schr.) Boeckeler

Sin.: *Schoenus asper* Schrad.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult.

Sin.: *Cyperus autumnalis* (L.) Vahl, *Isolepis autumnalis* (L.) J. Presl & C. Presl, *Scirpus autumnalis* L., *Scirpus mucronulatus* Michx.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Fimbristylis boldriniana R. Trevis. & H.N. Ronchi

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Fimbristylis campestris R. Trevis. & H.N. Ronchi

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS). PRY(CEN). URY(PAY).

Notas: Probablemente se encuentre en la Argentina

Fimbristylis complanata (Retz.) Link

Sin.: *Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Barros, comb. superfl., *Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Kük., *Scirpus complanatus* Retz.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, ITA, ÑEE, SPE). URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO).

Fimbristylis cymosa R. Br.

Sin.: *Fimbristylis glomerata* (Schrad.) Ness, *Fimbristylis spathacea* Roth, *Isolepis glomerata* Schrad.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl var. **dichotoma**

Sin.: *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult., *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult. f. *tomentosa* (Vahl) Kük., *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult. var. *diphylla* (Retz.) Kük., *Fimbristylis brachyphylla* Schult., *Fimbristylis communis* Kunth, *Fimbristylis diphylla* (Retz.) Vahl, *Fimbristylis diphylla* (Retz.) Vahl var. *tomentosa* (Vahl) Barros, *Fimbristylis dregeana* Kunth, *Fimbristylis ecklonii* Nees, *Fimbristylis laxa* Vahl, *Fimbristylis polymorpha* Boeckeler, *Fimbristylis subtristachya* Steud., *Fimbristylis tomentosa* Vahl, *Scirpus annuus* All., *Scirpus dichotomus* L., *Scirpus diphyllus* Retz.

Hierba acuática. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

URY(ART, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl var. **floribunda** (Miq.) T. Koyama

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).

Fimbristylis littoralis Gaudich.

Sin.: *Fimbristylis miliacea* (L.) Vahl, *Scirpus miliaceus* L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).

Fimbristylis spadicea (L.) Vahl

Sin.: *Fimbristylis castanea* (Michx.) Vahl, *Scirpus castaneus* Michx., *Scirpus spadiceus* L.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN). URY(MON, SJO).

Fimbristylis squarrosa Vahl

Sin.: *Fimbristylis hirta* (Kunth) Roem. & Schult., *Isolepis hirta* Kunth, *Pogonostylis squarrosus* Bertol.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, PHA). URY(CLA, DUR, PAY, RNO, SAO, TAC).

Fimbristylis stipitata R. Trevis. & H.N.

Ronchi

Hierba. Endémica.

Países: ARG(COS). BRA(RGS).

Fimbristylis vahlii (Lam.) Link

Sin.: *Isolepis vahlii* (Lam.) Kunth, *Scirpus vahlii* Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). PRY(CON, ITA).

Fuirena Rottb.**Fuirena incompleta** Nees

Sin.: *Fuirena hexachaeta* Schldl., *Fuirena incompleta* Nees f. *glabra* Maury, *Scirpus incompletus* (Nees) T. Koyama

Hierba palustre. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CEN, COA, PAI, SPE). URY(CLA, PAY, RNO, RIV).

Fuirena robusta Kunth

Sin.: *Fuirena bahiensis* Nees

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, MIE, PAI, SPE).

Fuirena stricta Steud.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Fuirena truncata Reutemann & M.G. López

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(MIS).

Fuirena umbellata Rottb.

Sin.: *Fuirena brasiliensis* Raddi, *Scirpus umbellatus* (Rottb.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, ÑEE, SPE).

Hypolytrum Rich.**Hypolytrum schraderianum** Nees

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Isolepis R. Br.

Isolepis aucklandica Hook. f.

Sin.: *Scirpus aucklandicus* (Hook. f.) Boeckeler
Hierba. Nativa.
Países: ARG(RNE).

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.

Sin.: *Cyperus pumilio* Steud., *Fimbristylis pygmaea* Vahl, *Isolepis brachyphylla* J. Presl & C. Presl, *Isolepis brevis* (d'Urv.) Brongn., *Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult. f. *aphylla* (Boeckeler) Vegetti, *Isolepis chlorostachya* Nees, *Isolepis erubescens* Steud., *Isolepis heterophylla* Steud., *Isolepis krausei* Phil., *Isolepis leptalea* (Koch) Schult., *Isolepis magellanica* Gaudich., *Isolepis microstachys* F. Phil. ex C.B. Clarke, *Isolepis modesta* Phil., *Isolepis monostachya* Phil., hom. illeg., *Isolepis pholidodes* Steud., *Isolepis pumilio* (Steud.) Boeckeler, *Isolepis purpurascens* Steud., *Isolepis pygmaea* (Vahl) Kunth, *Isolepis pygmaea* (Vahl) Kunth var. *brevis* Hook. f., *Isolepis pygmaea* (Vahl) Kunth var. *elongata* Hook. f., *Isolepis saviana* Schult., *Schoenoplectus cernuus* (Vahl) Hayek, *Schoenus krausei* (Phil.) Gunckel, *Schoenus nitens* (R. Br.) Poir. subsp. *krausei* (Phil.) Kük., *Scirpus aegialites* Phil., *Scirpus aphyllus* Boeckeler, *Scirpus arechavaletae* Boeckeler, *Scirpus brevis* d'Urv., *Scirpus cernuus* Vahl, *Scirpus cernuus* Vahl f. *aphyllus* (Boeckeler) Barros, *Scirpus chloroticus* Phil., *Scirpus hookeri* Kunth, *Scirpus leptaleus* Koch, *Scirpus minimus* Hook. & Arn., hom. illeg., *Scirpus modestus* (Phil.) F. Phil., *Scirpus nudipes* Griseb., *Scirpus pygmaeus* (Vahl) A. Gray, *Scirpus riparius* Poir., hom. illeg., *Scirpus savii*

Sebast. & Mauri, *Scirpus spadiceus* Phil., hom. illeg., *Scirpus terminalis* F. Phil.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME). URY(CAS, CLA, MAL, MON, SJO, TAC).

Isolepis nigricans Kunth

Sin.: *Cyperus urvilleanus* Steud., *Isolepis albescens* E. Desv., *Isolepis angachillensis* Steud., *Isolepis conceptionis* Steud., *Isolepis nana* Phil., *Isolepis psilocarpa* Kunth, nom. nud., *Isolepis ramulosa* Steud., *Isolepis tristachya* F. Phil., *Isolepis urvillei* Steud., *Isolepis vivipara* Schrad. ex E. Desv., *Scirpus albescens* F. Phil., *Scirpus angachillensis* (Steud.) Boeckeler, *Scirpus bridgesii* Boeckeler, *Scirpus constitutionis* F. Phil., *Scirpus didymostachyus* Phil., *Scirpus gaudichaudii* Boeckeler var. *tenuis* Boeckeler, *Scirpus nigricans* (Kunth) Poir., *Scirpus phaeocarpus* F. Phil., *Scirpus philippii* C.B. Clarke, *Scirpus trichocaulos* F. Phil.

Hierba. Nativa. 500-4000 m.

Países: ARG(LPA, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Isolepis ranko (Steud.) Vegetti

Sin.: *Cyperus ranko* Steud., *Isolepis perpusilla* (Boeckeler) F. Phil., hom. illeg., *Scirpus perpusillus* Boeckeler, nom. illeg., *Scirpus ranko* (Steud.) Beetle, comb. superfl., *Scirpus ranko* (Steud.) Gunckel
Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(BIO, LSR, AIS).

Isolepis varians Steud.

Sin.: *Isolepis valdiviae* F. Phil. ex Boeckeler, nom. superfl., *Isolepis valdiviae* Steud., *Scirpus varians* (Steud.) Boeckeler
Hierba. Endémica. 700-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHU). CHL(BIO, ARA, LLA).

Lagenocarpus Nees

Lagenocarpus junciformis (Kunth) Kuntze

Sin.: *Cryptangium junciforme* (Kunth) Boeckeler, *Scleria junciformis* Kunth
Hierba. Nativa. 800-1300 m.
Países: BRA(RGS).

Lagenocarpus polyphyllus (Nees) Kuntze

Sin.: *Acrocarpus polyphyllus* Nees, *Cryptangium polyphyllum* (Nees) Boeckeler
Hierba. Nativa. 200-900 m.
Países: BRA(PAR).

Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees subsp. **rigidus**

Sin.: *Lagenocarpus dusenii* H. Pfeiff., *Lagenocarpus giganteus* H. Pfeiff., *Lagenocarpus rigidus* (Kunth) Nees subsp. *tremulus* (Nees) T. Koyama & Maguire, *Lagenocarpus scalariformis* H. Pfeiff., *Lagenocarpus topazinus* Nees, *Lagenocarpus tremulus* Nees, *Scleria rigida* Kunth
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees subsp. **tenuifolius** (Boeckeler) T. Koyama & Maguire

Sin.: *Cryptangium tenuifolium* Boeckeler,
Lagenocarpus lapaensis H. Pfeiff.,
Lagenocarpus tenuifolius (Boeckeler)
 C.B. Clarke
 Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Lagenocarpus triqueter (Boeckeler)
 Kuntze
 Sin.: *Cryptangium triquetum* Boeckeler
 Hierba. Nativa. 900-1300 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Machaerina Vahl

Machaerina austrobrasiliensis M.T.
 Strong
 Hierba. Nativa. 1000-2000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Machaerina ensifolia (Boeckeler) T.
 Koyama
 Sin.: *Baumea ensifolia* (Boeckeler) Palla,
Cladium ensifolium (Boeckeler) Benth.
 & Hook. f. ex B.D. Jacks., *Elynanthus*
ensifolius Boeckeler
 Hierba. Nativa. 900-2600 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Machaerina ficticia (Hemsl.) T. Koyama
 Sin.: *Cladium ficticium* Hemsl.
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Machaerina scirpoidea (Steud.) T.
 Koyama
 Sin.: *Agylla ensifolia* F. Phil., *Cladium*
ensifolium (F. Phil.) H. Pfeiff., hom.
 illeg., *Cladium scirpoideum* (Steud.)
 Benth. & Hook. f. ex Hemsl., *Mariscus*
scirpoideus (Steud.) Kuntze, *Terobera*
scirpoidea Steud., *Vincentia scirpoidea*
 (Steud.) Boeckeler
 Hierba. Endémica. 100-700 m.
 Países: CHL(JFE).

Oreobolus R. Br.

Oreobolus obtusangulus Gaudich.
 Sin.: *Oreobolus clandestinus* Phil.,
Oreobolus obtusangulus Gaudich. f.
borealis Skottsb.
 Hierba. Nativa. 0-1600 m.
 Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).
 CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG,
 JFE).

Oxycaryum Nees

Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth)
 Palla f. **paraguayense** (Maury)
 Pedersen
 Sin.: *Anosporum paraguayense* Maury,
Oxycaryum paraguayense (Maury)
 Palla, *Scirpus cubensis* Poepp. &
 Kunth var. *paraguayensis* (Maury)
 Kük. ex Barros, *Scirpus paraguayensis*
 (Maury) Herter
 Hierba acuática. Nativa. 0-600 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
 ERI, FOR, SFE). BRA(RGS).
 PRY(APY, CEN, PHA). URY(RNO,
 TAC).

Phylloscirpus C.B. Clarke

Phylloscirpus acaulis (Phil.) Goetgh. &
 D.A. Simpson
 Sin.: *Phylloscirpus andesinus* C.B. Clarke,
Scirpus acaulis Phil., *Scirpus*
atacamensis (Phil.) Boeckeler var.
exscapus Kurtz, *Scirpus macrolepis*
 Phil., *Scirpus nubigenus* Phil., *Scirpus*
sessiliflorus Phil.
 Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
 Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU,
 SAL, SCR, SJU, TUC). CHL(AYP,
 TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO,
 MAU, BIO, ARA, RME).

Phylloscirpus boliviensis (Barros)
 Dhooge & Goetgh.

Sin.: *Scirpus boliviensis* Barros
 Hierba. Nativa. 4100-4800 m.
 Países: CHL(TAR).

Phylloscirpus deserticola (Phil.) Dhooge
 & Goetgh.

Sin.: *Scirpus deserticola* Phil., *Scirpus*
deserticola Phil. var. *semisubterraneus*
 (Boeckeler) Barros, *Scirpus*
distichophyllus Boeckeler, *Scirpus*
semisubterraneus Boeckeler, *Scirpus*
thermalis Spruce, nom. inval.
 Hierba. Nativa. 2000-4800 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
 NEU, SAL, SJU, SCR, TUC).
 CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,
 RME).

Rhodoscirpus Lévillé-Bourret,
 Donadio & J.R. Starr

Rhodoscirpus asper (J. Presl & C. Presl)
 Lévillé-Bourret, Donadio & J.R. Starr
 Sin.: *Scirpus asper* J. Presl & C. Presl,
Scirpus asper J. Presl & C. Presl var.
diffusus (Beetle) Beetle, *Scirpus asper*
 J. Presl & C. Presl var. *polystachya*
 Clarke, *Scirpus brachycaulos* Phil.,
Scirpus glaucus Nees & Meyen ex
 Kunth, nom. illeg., *Scirpus subasper*
 Beetle, *Scirpus subasper* Beetle var.
diffusus Beetle, *Scirpus trachycaulos*
 Phil.
 Hierba. Nativa. 700-3200 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
 MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU,
 TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ,
 VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Rhynchospora Vahl

Rhynchospora albiceps Kunth

Sin.: *Dichromena canescens* Maury,
Haplostylis albiceps (Kunth) Nees
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAU, CAN, GUA).

Rhynchospora albobracteata A.C.
Araújo

Sin.: *Dichromena rigida* Kunth,
Rhynchospora consanguinea (Kunth)
Boeckeler var. *rigida* (Kunth) Kük.,
Rhynchospora rigida (Kunth)
Boeckeler, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Rhynchospora barrosiana Guagl.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA,
MIE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, MAL,
MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC,
TYT).

Rhynchospora biflora Boeckeler

Sin.: *Rhynchospora cryptantha* C.B.
Clarke, *Rhynchospora uniflora*
Boeckeler
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora boeckeleriana Silva Filho
& Boldrini

Sin.: *Rhynchospora luzuliformis* Boeckeler
var. *spicata* Kük., *Rhynchospora*
megapotamica (A. Spreng.) H. Pfeiff.
var. *spicata* Kük., *Rhynchospora*
spicata Boeckeler, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 700-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora brasiliensis Boeckeler

Hierba. Nativa. 900-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora breviuscula H. Pfeiff.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Rhynchospora brittonii Gale

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY(CAS, DUR, MON, PAY,
SJO).

Rhynchospora brownii Roem. & Schult.
subsp. **americana** Guagl.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(ARA). PRY(AMA, CEN, MIE).
URY(CLA, FLA, LAV, MON, RNO,
SJO, TYT).

Rhynchospora caduciglumis P. Weber
& R. Trevis.

Hierba. Endémica. 300-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Rhynchospora calyptrocaryoides (R.
Gross) W.W. Thomas

Sin.: *Pleurostachys arcuata* W.W.
Thomas, M.V. Alves & R. Trevis.,
Pleurostachys calyptrocaryoides R.
Gross
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Rhynchospora castanea T. Koyama

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Rhynchospora catharinensis Barros

Hierba. Endémica. 100-1100 m.
Países: BRA(SCA).

Rhynchospora conferta (Nees)
Boeckeler

Sin.: *Psilocarya conferta* Nees
Hierba. Nativa.

Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA).

Rhynchospora confinis (Nees) C.B.
Clarke

Sin.: *Rhynchospora lundii* Boeckeler,
Spermodon confinis Nees
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, LRI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CAU, CAA, COA, GUA, ITA).

Rhynchospora consanguinea (Kunth)
Boeckeler

Sin.: *Dichromena consanguinea* Kunth,
Rhynchospora consanguinea (Kunth)
Boeckeler f. *subrigida* Kük.,
Rhynchospora consanguinea (Kunth)
Boeckeler f. *subspeciosa* Kük.
Hierba. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAU,
CAN).

Rhynchospora contracta (Nees) J.
Raynal

Sin.: *Dichromena micrantha* (Vahl) Kunth,
comb. illeg., *Haloschoenus contractus*
Nees, *Haloschoenus sparsus* (Sieber
ex C. Presl) Nees, comb. illeg., *Juncus*
parviflorus Poir., nom. illeg.,
Rhynchospora micrantha Vahl var.
contracta (Nees) Kük., *Rhynchospora*
minutiflora (Rich. ex Spreng.) C.D.
Adams, comb. illeg., *Rhynchospora*
parviflora Vahl ex Nees, nom. inval.,
Rhynchospora sparsa Sieber ex C.
Presl, nom. inval., *Scleria minutiflora*
Rich. ex Spreng., nom. inval.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY).
Notas: Cita dudosa para Argentina
(Rocha & Luceño 2002)

Rhynchospora coriifolia Boeckeler

Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton
var. **corymbosa**

Sin.: *Calyptrostylis asperula* Nees, *Calyptrostylis fascicularis* Nees, *Calyptrostylis florida* (Rudge) Nees, *Dichromena corymbosa* (L.) J.F. Macbr., *Rhynchospora asperula* (Nees) Steud., *Rhynchospora aurea* Vahl, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton f. *angustirostris* Barros, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton f. *chacoensis* Barros, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *angustirostris* (Barros) Guagl., *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *asperula* (Nees) Kük., *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *bonariensis* Barros ex Cabrera & G. Dawson, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *chacoensis* (Barros) Svenson, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *florida* (Rudge) Kük., *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *singularis* Kük., *Rhynchospora florida* (Rudge) Schult., *Rhynchospora surinamensis* (Rottb.) Nees, *Schoenus floridus* Rudge, *Schoenus surinamensis* Rottb., *Scirpus corymbosus* L.

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton
var. **legrandii** (Kük. ex Barros) Guagl.

Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton subsp. *legrandii* (Kük. ex Barros) Luceño & Vanzela, *Rhynchospora legrandii* Kük. ex Barros

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, SCA). URY(MON, SJO).

Rhynchospora crinigera Boeckeler

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, SJO).

Rhynchospora dentinix C.B. Clarke

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Rhynchospora dissitispicula T. Koyama

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Rhynchospora distichophylla Boeckeler

Sin.: *Pleurostachys densefoliata* H. Pfeiff., *Pleurostachys distichophylla* (Boeckeler) C.B. Clarke

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rhynchospora edwalliana Boeckeler

Sin.: *Rhynchospora flexuosa* C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 800-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora elatior Kunth var.

brevispiculosa (Kük.) A.C. Araújo

Sin.: *Haplostylis minor* Nees, *Rhynchospora diamantina* Kük., nom. illeg., *Rhynchospora diamantina* Kük. var. *brevispiculosa* Kük., *Rhynchospora leucostachys*

Boeckeler, *Rhynchospora minor* (Nees) Steud., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 200-600 m.

Países: PRY(CON).

Rhynchospora elatior Kunth var. **elatior**

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Rhynchospora emaciata (Nees)
Boeckeler

Sin.: *Haloschoenus emaciatus* Nees, *Rhynchospora tenuis* Link var. *emaciata* (Nees) Lindm.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, RIV).

Rhynchospora exaltata Kunth

Sin.: *Dichromena exaltata* (Kunth) J.F. Macbr., *Echinoschoenus beyrichii* Nees, *Rhynchospora beyrichii* (Nees) Steud., *Rhynchospora exaltata* Kunth var. *beyrichii* (Nees) Kük., *Schoenus brasiliensis* Raddi

Hierba. Nativa. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).

Rhynchospora eximia (Nees) Boeckeler

Sin.: *Spermodon eximius* Nees

Hierba. Nativa

Países: BRA(PAR).

Rhynchospora foliosa (Kunth) L.B. Sm.

Sin.: *Nomochloa foliosa* (Kunth) Nees, *Pleurostachys cimaensis* H. Pfeiff., *Pleurostachys foliosa* Kunth, *Pleurostachys sellowii* Kunth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rhynchospora gaudichaudii (Brongn.)
L.B. Sm.

Sin.: *Pleurostachys gaudichaudii* Brongn., *Pleurostachys gaudichaudii* Brongn. f. *minor* (Nees) H. Pfeiff., *Pleurostachys gracilis* Boeckeler, *Pleurostachys graminifolia* Brongn. var. *gracilis* (Boeckeler) Kük. & R. Gross

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora gigantea Link

Sin.: *Calyptrostylis gigantea* (Link) Nees, *Dichromena gigantea* (Link) J.F. Macbr., *Rhynchospora gigantea* Link var. *scaberrima* (Boeckeler) Kük., *Rhynchospora scaberrima* Boeckeler
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora glaziovii Boeckeler

Sin.: *Rhynchospora floribunda* Boeckeler, *Rhynchospora hieronymi* Boeckeler var. *floribunda* (Boeckeler) Kük.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.

Sin.: *Cephaloschoenus globosus* (Kunth) Nees, *Cephaloschoenus pohlianus* Nees, *Chaetospora globosa* Kunth, *Rhynchospora alta* Boeckeler, *Rhynchospora cephalantha* A. Rich., hom. illeg., *Rhynchospora perrigida* Boeckeler, *Rhynchospora pohliana* (Nees) Steud., *Rhynchospora presleana* Steud.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, COA, SPE). URY(RIV, TAC).

Rhynchospora gollmeri Boeckeler

Hierba. Nativa. 600-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora hassleri C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(AMA).

Rhynchospora hatschbachii T. Koyama

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora hieronymi Boeckeler
subsp. **hieronymi**

Hierba. Nativa. 600-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Citada para Uruguay (Thomas, 1992) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Rhynchospora hieronymi Boeckeler
subsp. **montevidensis** (Barros)

Guagl.
Sin.: *Rhynchospora hieronymi* Boeckeler f. *compacta* Kük., *Rhynchospora hieronymi* Boeckeler var. *montevidensis* Barros, *Rhynchospora montevidensis* (Barros) Herter
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, RNO, SJO).

Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter

Sin.: *Cephaloschoenus polycephalus* (Pers.) Nees, *Ephippiorhynchium polycephalum* (Pers.) Nees, *Ephippiorhynchium tenuirostre* Nees, *Rhynchospora arechavaletae* Boeckeler, *Rhynchospora arechavaletae* Boeckeler var. *ostenii* (Kük.) Kük., *Rhynchospora cyperoides* Mart., *Rhynchospora cyperoides* Mart. var. *triceps* (Vahl) Kük., *Rhynchospora ostenii* Kük., *Rhynchospora polycephala* Wydler ex Kunth, *Schoenus cyperoides* Sw., hom. illeg., *Schoenus holoschoenoides* Rich., *Schoenus polycephalus* Pers., nom. superfl., *Schoenus triceps* Vahl
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, ITA). URY(CAS, MON, ROC).

Rhynchospora iberae Guagl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(SCA). PRY(SPE).

Rhynchospora junciformis (Kunth) Boeckeler

Sin.: *Dichromena junciformis* Kunth
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora latibracteata Guagl.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). URY(RNO).

Rhynchospora loefgrenii Boeckeler

Sin.: *Rhynchospora globosa* (Kunth) Roem. & Schult. var. *loefgrenii* (Boeckeler) Kük.
Hierba. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, GUA, SPE). URY(TAC).

Rhynchospora marisculus Lindl. & Nees

Sin.: *Dichromena marisculus* (Lindl. & Nees) J.F. Macbr., *Rhynchospora borinquensis* Britton, *Rhynchospora marisculus* Nees var. *elatior* Boeckeler, *Rhynchospora rigida* Schrad. ex Nees, nom. nud., *Rhynchospora tenuiseta* C. Wright ex Sauvalle, *Rhynchospora uleana* Boeckeler, *Schoenus marisculus* Lindl. ex Nees, nom. nud., *Schoenus marisculus* Salzm. ex Steud., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO, RIV, SJO).

Rhynchospora megapotamica (A. Spreng.) H. Pfeiff.

Sin.: *Rhynchospora kunthii* Nees var. *composita* Nees, nom. nud., *Rhynchospora luzuliformis* Boeckeler, *Rhynchospora maculata* Maury, *Scirpus megapotamicus* A. Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CEN). URY(ART, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SOR, TYT).

Rhynchospora nardifolia (Kunth) Boeckeler

Sin.: *Dichromena nardifolia* Kunth

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler

Sin.: *Dichromena ciliata* Vahl var. *vahlia* (Griseb.) C.B. Clarke, *Dichromena nervosa* Vahl, *Dichromena persooniana* Nees, *Rhynchospora exigua* Boeckeler, *Rhynchospora persooniana* (Nees) Griseb., *Rhynchospora vahlia* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, PAI, SPE).

Rhynchospora orbigniana (Brongn.) L.B. Sm.

Sin.: *Nemochloa beyrichii* Nees, *Nemochloa millegrana* Nees, *Pleurostachys beyrichii* (Nees) Steud. var. *beyrichii*, *Pleurostachys beyrichii* (Nees) Steud. var. *panicoides* H. Pfeiff., *Pleurostachys millegrana* (Nees) Steud., *Pleurostachys montana* Palla, *Pleurostachys orbignyana* Brongn., *Pleurostachys panicoides* (H. Pfeiff.) H. Pfeiff., *Pleurostachys puberula* Boeckeler, *Pleurostachys puberula* Boeckeler var. *montana* (Palla) Kük. & R. Gross

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora organensis C.B. Clarke

Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *organensis* (C.B. Clarke) Kük.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, SPE). URY(DUR, FLA, RNO, SOR).

Rhynchospora panicoides Nees ex L.B. Sm.

Sin.: *Pleurostachys hoehneana* R. Gross, *Pleurostachys muelleri* Boeckeler, *Pleurostachys rabenii* Boeckeler, *Pleurostachys stricta* Kunth, *Pleurostachys stricta* Kunth var. *angustocarpa* H. Pfeiff., *Pleurostachys stricta* Kunth var. *rabenii* (Boeckeler) H. Pfeiff.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora paranaensis A.C. Araújo & W.W. Thomas

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

Rhynchospora patuligluma C.B. Clarke ex Lindm.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Rhynchospora pedersenii Guagl.

Sin.: *Rhynchospora gigantea* Link var. *latifolia* H. Pfeiff.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

Rhynchospora pilosa (Kunth) Boeckeler

Sin.: *Dichromena pilosa* Kunth

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

Rhynchospora polyantha Steud.

Sin.: *Rhynchospora multiflora* Nees, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 1000-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora polyphylla (Vahl) Vahl

Sin.: *Schoenus polyphyllus* Vahl

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Rhynchospora praecincta Maury ex Micheli

Sin.: *Rhynchospora hyalinolepis* Boeckeler

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(ÑEE, PAI). URY(ART, FLA, PAY, SAO).

Rhynchospora pseudomacrostachya

Gerry Moore, Guagl. & Zartman

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Rhynchospora pura (Nees) Griseb.

Sin.: *Dichromena ciliata* Vahl, hom. illeg., *Dichromena pura* Nees, *Rhynchospora ciliata* Kük., nom. illeg., *Rhynchospora nervosa* (Vahl) Boeckeler subsp. *ciliata* T. Koyama, *Rhynchospora nervosa* (Vahl) Boeckeler var. *ciliata* Kük., *Schoenus ciliatus* G. Mey.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Probablemente en Argentina y Paraguay

Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. subsp. **microcephala** (Bertero ex Spreng.) W.W. Thomas

Sin.: *Dichromena microcephala* Bertero ex Spreng., *Rhynchospora microcephala* (Bertero ex Spreng.) Kük.

- Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Rhynchospora radicans** (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. subsp. **radicans**
Sin.: *Dichromena radicans* Schltdl. & Cham.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APA).
- Rhynchospora reitzii** Silva-Filho, W.W. Thomas & Boldrini
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA).
- Rhynchospora riparia** (Nees) Boeckeler
Sin.: *Haloschoenus riparius* Nees
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(AMA).
- Rhynchospora rugosa** (Vahl) Gale
Sin.: *Dichromena glauca* (Vahl) J.F. Macbr., *Rhynchospora glauca* Vahl, *Rhynchospora glauca* Vahl var. *altior* Kük. ex O.C. Schmidt, *Rhynchospora pungens* Liebm., *Schoenus rugosus* Vahl
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, ÑEE). URY(PAY, TYT).
- Rhynchospora rupestris** A.C. Araújo & W.W. Thomas
Hierba. Nativa. 700-1200 m.
Países: PRY(AMA).
- Rhynchospora scalaris** L.B. Sm.
Sin.: *Nemochloa urvillei* (Brongn.) Nees, *Pleurostachys dusenii* (H. Pfeiff.) H. Pfeiff., *Pleurostachys paranensis* Palla, *Pleurostachys paranensis* Palla var. *dusenii* H. Pfeiff., *Pleurostachys paranensis* Palla var. *ypirangensis* H. Pfeiff., *Pleurostachys ulei* Boeckeler, *Pleurostachys urvillei* Brongn., *Pleurostachys urvillei* Brongn. f. *dusenii* (H. Pfeiff.) Kük. & R. Gross, *Pleurostachys urvillei* Brongn. f. *ypirangensis* (H. Pfeiff.) Kük. & R. Gross, *Pleurostachys ypirangensis* (H. Pfeiff.) H. Pfeiff.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Rhynchospora scutellata** Griseb.
Sin.: *Calyptrostylis asperula* Nees var. *minor* Nees, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *minor* (Nees) Kük., *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *puncticulata* (Kük. ex Osten) Kük., *Rhynchospora indianolensis* Small, *Rhynchospora pringlei* Greenm., *Rhynchospora puncticulata* Kük. ex Osten, *Rhynchospora puncticulata* Kük. ex Osten var. *pleiocephala* Osten
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, PAY, RIV, SAO, TAC).
- Rhynchospora serrana** Silva-Filho, W.W. Thomas & Boldrini
Hierba. Endémica. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Rhynchospora setigera** (Kunth) Griseb.
Sin.: *Dichromena setigera* Kunth, *Rhynchospora stelligera* Herter
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, GUA, SPE). URY(CLA, RIV, ROC, TAC, TYT).
- Rhynchospora smithii** W.W. Thomas
Hierba. Endémica. 1200-1300 m.
- Países: BRA(SCA).
- Rhynchospora splendens** Lindm. f. **composita** Kük.
Hierba. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Rhynchospora splendens** Lindm. f. **splendens**
Hierba. Nativa.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Rhynchospora spruceana** C.B. Clarke
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Rhynchospora subsetosa** C.B. Clarke
Sin.: *Rhynchospora selloiana* Boeckeler
Hierba. Nativa. Sin datos
Países: BRA(PAR, SCA).
- Rhynchospora subtilis** Boeckeler
Hierba. Nativa. 1000-2200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Rhynchospora tenella** (Nees) Boeckeler
Sin.: *Haloschoenus tenellus* Nees
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Rhynchospora tenerrima** Nees ex Spreng.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Rhynchospora tenuiflora** (Brongn.) L.B. Sm.
Sin.: *Nemochloa tenuiflora* (Brongn.) Nees, *Pleurostachys tenuiflora* Brongn.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Rhynchospora tenuis** Link subsp. **austro-brasiliensis** T. Koyama

Sin.: *Haloschoenus capillaris* Nees var. *minor* Nees, nom. inval.

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN).

Rhynchospora tenuis Link subsp. **tenuis**

Sin.: *Dichromena brasiliensis* Raddi, *Dichromena linkii* J.F. Macbr., nom. superfl., *Fuirena gracilis* Spreng., *Haloschoenus capillaris* Nees, nom. illeg., *Haloschoenus capillaris* Nees var. *congestus* Nees, nom. inval., *Rhynchospora curvula* (Nees) Boeckeler, hom. illeg., *Rhynchospora gracilis* (Spreng.) Kuntze, hom. illeg., *Spermodon curvulus* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(CAS, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Rhynchospora terminalis (Nees) Steud.

Sin.: *Calyptrastylis terminalis* Nees, *Rhynchospora crassipes* Boeckeler, *Rhynchospora terminalis* (Nees) Steud. var. *crassipes* (Boeckeler) Kük.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CON, GUA).

Rhynchospora triflora Vahl

Sin.: *Dichromena triflora* (Vahl) J.F. Macbr., *Ephippiorhynchium triflorum* (Vahl) Nees, *Schoenus triflorus* (Vahl) Poir.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

Rhynchospora trispicata (Nees) Schrad. ex Steud.

Sin.: *Ephippiorhynchium trispicatum* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA, AMA, CAN, CON).

Rhynchospora velutina (Kunth) Boeckeler

Sin.: *Dichromena robusta* Kunth, *Dichromena sellowiana* Kunth, *Dichromena velutina* Kunth, *Psilocarya pohlii* Nees, *Psilocarya robusta* (Kunth) Nees, *Psilocarya rufa* Nees, *Psilocarya sellowiana* (Kunth) Nees, *Psilocarya velutina* (Kunth) Nees, *Rhynchospora kuekenthali* Herter, hom. illeg., *Rhynchospora robusta* (Kunth) Boeckeler, *Rhynchospora rufa* (Nees) Boeckeler, *Rhynchospora semihirsuta* Boeckeler, *Rhynchospora velutina* (Kunth) Boeckeler var. *pohlii* (Nees) Boeckeler ex Kük., *Rhynchospora velutina* (Kunth) Boeckeler var. *sellowiana* (Kunth) Boeckeler, *Schoenus velutinus* Schrad. ex Kunth, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA, ITA, ÑEE). URY(CLA, RNO, RIV, TAC).

Rhynchospora waytii Silva Filho & P. Weber

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(ERI).

Schoenoplectiella Lye

Schoenoplectiella mucronata (L.) J. Jung & H.K. Choi

Sin.: *Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla, *Scirpus mucronatus* L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

Schoenoplectiella supina (L.) Lye

Sin.: *Isolepis supina* (L.) R. Br., *Schoenoplectus supinus* (L.) Palla, *Scirpus guaraniticus* Pedersen, *Scirpus supinus* L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

Schoenoplectus (Rchb.) Palla, nom. cons.

Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller

Sin.: *Scirpus americanus* Pers., *Scirpus americanus* Pers. var. *longispicatus* Britton, *Scirpus chilensis* Nees & Meyen var. *longisetis* (Kük.) Beetle, *Scirpus olneyi* A. Gray, *Scirpus olneyi* A. Gray var. *longisetis* Kük.

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, ERI, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA). URY(CAS, DUR, MON, SOR).

Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.)

Sin.: *Dichromena atrosanguinea* E. Desv., *Elytrospermum californicum* C.A. Mey., *Malacochaete assimilis* Ces., *Malacochaete chilense* Nees & Meyen ex Boeckeler, *Malacochaete oligostachya* Phil., *Malacochaete riparia* Nees & Meyen, *Malacochaete riparia* Nees & Meyen var. *chamissoi* Nees, *Malacochaete sanguinolenta* Nees & Meyen ex Boeckeler, *Malacochaete tatora* Nees & Meyen, nom. nud., *Schoenoplectus californicus* (C.A. Mey.) Soják var. *spoliatus* (Barros) Vegetti, *Schoenoplectus californicus* (C.A. Mey.) Soják var. *tereticulmis* (Steud.) Vegetti, *Schoenoplectus riparius* (Nees & Meyen) Palla, *Scirpus pseudotriquetus* Steud., *Scirpus riparius* J. Presl & C. Presl var.

tereticulmis (Steud.) C.B. Clarke, *Scirpus tereticulmis* Steud. *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Britton, comb. superfl., *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud., *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. subsp. *tatora* (Kunth) T. Koyama, *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. var. *spoliatus* Barros, *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. var. *tatora* (Kunth) Barros, *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. var. *tereticulmis* (Steud.) Beetle, *Scirpus decipiens* A. St.-Hil. ex Nees, *Scirpus rigidus* Schrad. ex Nees, *Scirpus riparius* J. Presl & C. Presl

Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, IPA). PRY(APY, CEN, CHO, COA, ÑEE, PHA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, LAV, MON, SJO, SOR).

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Sm.

Sin.: *Scirpus americanus* Pers. subsp. *monophyllus* (J. Presl & C. Presl) T. Koyama, *Scirpus americanus* Pers. var. *polyphyllus* (Boeckeler) Beetle, *Scirpus badius* J. Presl & C. Presl, *Scirpus monophyllus* J. Presl & C. Presl, *Scirpus olneyi* A. Gray f. *australis* Barros & Osten, *Scirpus olneyi* A. Gray f. *minor* Barros, *Scirpus pungens* Vahl var. *longisetis* Benth. & F. Muell., *Scirpus pungens* Vahl var. *nanus* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, JUJ, MEN, SAL, SFE, TUC).

CHL(ATA, MAU, LLA). URY(COL, FLA, MON, SJO, SOR).

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Sm.

Sin.: *Schoenoplectus americanus* (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller subsp. *longispicatus* (Britton) Soják, *Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla subsp. *longispicatus* (Britton) A. Löve & D. Löve, *Scirpus americanus* Pers. var. *longibracteatus* Barros & Osten, *Scirpus americanus* Pers. var. *longispicatus* Britton, *Scirpus americanus* Pers. var. *polyphyllus* (Boeckeler) Beetle, *Scirpus longispicatus* (Britton) Smyth, comb. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, RNE, SFE, SLU). CHL(COQ). URY(FLA).

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. **pungens**

Sin.: *Scirpus americanus* Pers. f. *cordilleranus* (Kük. & Barros) Barros, *Scirpus americanus* Pers. var. *conglomeratus* (Kunth) T. Koyama, *Scirpus americanus* Pers. var. *pungens* (Vahl) Barros & Osten, *Scirpus conglomeratus* Kunth, *Scirpus pungens* Vahl

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, RME).

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla

Sin.: *Schoenoplectus validus* (Vahl) A. Löve & D. Löve, *Schoenoplectus validus* (Vahl) T. Koyama, comb. superfl., *Scirpus lacustris* L. subsp. *validus* (Vahl) Osten, *Scirpus lacustris*

L. subsp. *validus* (Vahl) T. Koyama, comb. superfl., *Scirpus lacustris* L. var. *validus* (Vahl) Kük., *Scirpus tabernaemontani* C.C. Gmel., *Scirpus validus* Vahl

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(COL, MON).

Schoenus L.

Schoenus andinus (Phil.) H. Pfeiff.

Sin.: *Carpha andina* Phil., *Elynanthus sodalium* (Har.) Planch., *Schoenus sodalium* Har.

Hierba. Endémica. 200-1900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Schoenus antarcticus (Hook. f.) Dusén

Sin.: *Carpha antarctica* (Hook. f.) C.B. Clarke, *Chaetospora antarctica* Hook. f., *Elynanthus antarcticus* (Hook. f.) Franch.

Hierba. Endémica. 100-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Schoenus lymanismithii M.T. Strong

Hierba. Endémica. 1600-1700 m.

Países: BRA(SCA).

Schoenus nigricans L.

Hierba. Introducida. 0-400 m.

Países: URY(MON).

Schoenus rhynchosporoides (Steud.) Kük.

Sin.: *Carpha laxa* (Hook. f.) H. Pfeiff., *Carpha paniculata* Phil., *Chaetosperma rhynchospermoides* F. Phil., nom. nud., *Chaetospora laxa*

Hook. f., *Chaetospora rhynchosporoides* Steud., *Elynanthus laxus* (Hook. f.) Macloskie
Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: ARG(RNE, TDF). CHL(MAU, LSR, LLA, AIS, MAG).

Scirpus L., nom. cons.

Scirpus angustisquamis Beetle
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ARA, LLA).

Scirpus chubutensis C.B. Clarke
Hierba. Endémica. 400-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU).

Scirpus melanocaulos Phil.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(LBO, LSR, LLA).

Scirpus L., nom. cons.

Scirpus spegazzinianus Barros
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Scirpus reichei Boeckeler
Hierba. Endémica.
Países: CHL.

Scleria Bergius

Scleria alpina Core
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR)

Scleria bracteata Cav.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Scleria ciliata Michx.
Sin.: *Scleria ciliata* Michx. var. *glabrescens* Maury, *Scleria pauciflora* Muhl. ex Willd., nom. inval.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, SPE).

Scleria colorata Core
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Scleria composita (Nees) Boeckeler
Sin.: *Hypoporum compositum* Nees, *Scleria scabrosa* Maury
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU, CAA, CEN, GUA).

Scleria cuyabensis Pilg.
Hierba. Nativa.
Países: PRY(SPE).

Scleria distans Poir.
Sin.: *Hypoporum humile* Nees, nom. nud., *Hypoporum nutans* (Willd. ex Kunth) Nees, *Scleria nutans* Willd. ex Kunth
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SJO).

Scleria filiculmis Boeckeler
Sin.: *Scleria georgiana* Core var. *filiculmis* (Boeckeler) H. Pfeiff.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Scleria flagellum-nigrorum P.J. Bergius
Sin.: *Scleria schulzii* Barros
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS). PRY(AMA, MIE, PHA).

Scleria gaertneri Raddi
Sin.: *Scleria melaleuca* C. Rchb. ex Schldl. & Cham., *Scleria pratensis* Lindl. ex Nees, *Scleria pterota* C. Presl, nom. nud., *Scleria simplicior* Steud.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Scleria georgiana Core subsp. **australis** A.C. Araújo
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Scleria hirtella Sw.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Scleria lacustris C. Wright
Hierba. Nativa.
Países: PRY(AMA).

Scleria latifolia Sw.
Sin.: *Schizolepis latifolia* (Sw.) Nees, *Schizolepis trigonocarpa* Nees, *Scleria arundinacea* Kunth, *Scleria cyanocarpa* Kunth, *Scleria latifolia* Sw. var. *arundinacea* (Kunth) H. Pfeiff., *Scleria olyroides* Kunth, *Scleria sylvestris* Poepp. & Kunth
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Scleria leptostachya Kunth
Sin.: *Hypoporum leptostachyum* (Kunth) Nees, *Scleria catharinensis* Boeckeler
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU). URY(MON, PAY, RNO, ROC, SOR).

Scleria longigluma Kük.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, SPE).

Scleria macrophylla J. Presl & C. Presl

Hierba. Nativa.

Países: PRY(APY).

Scleria microcarpa Nees ex Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, COA, SPE).

Scleria mitis Bergius

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Scleria myricocarpa Kunth

Sin.: *Schizolepis myricocarpa* (Kunth) Nees

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Scleria obtusa Core

Hierba. Nativa.

Países: PRY(CON).

Scleria panicoides Kunth

Sin.: *Schizolepis panicoides* (Kunth) Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA, GUA, ITA).

Scleria plusiophylla Steud.

Sin.: *Schizolepis foliosa* Nees, *Scleria latifolia* Sw. subsp. *foliosa* (Nees) T. Koyama

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,

CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI).

Scleria reticularis Michx.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS).

Scleria scabra Willd.

Hierba. Nativa.

Países: PRY(APY, AMA).

Scleria schiedeana Schltdl.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Scleria secans (L.) Urb.

Sin.: *Mastigoscleria reflexa* (Kunth) Nees, *Schoenus secans* L., *Scleria caricifolia* Schrad., nom. nud., *Scleria reflexa* Kunth, *Scleria renggeriana* Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

Scleria sellowiana Kunth

Sin.: *Chondrolomia sellowiana* (Kunth) Nees, *Scleria balansae* Maury, *Scleria sellowiana* Kunth f. *glabriuscula* Osten, *Scleria sellowiana* Kunth var. *balansae* (Maury) C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC, TYT).

Scleria uleana Boeckeler

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Scleria variegata (Nees) Steud.

Sin.: *Hypoporum variegatum* Nees

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Scleria virgata (Nees) Steud.

Sin.: *Hypoporum virgatum* Nees, *Scleria diffusa* C.B. Clarke, hom. illeg., *Scleria trigonocarpa* Boeckeler, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Trichophorum Pers.

Trichophorum rigidum (Boeckeler)

Goetgh., Muasya & D.A. Simpson

Sin.: *Isolepis rigidus* Steud., nom. nud., *Scirpus rigidus* Boeckeler

Hierba. Nativa. 3600-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Zameioscirpus Dhooge & Goetgh.

Zameioscirpus atacamensis (Phil.)

Dhooge & Goetgh.

Sin.: *Isolepis atacamensis* Phil., *Scirpus atacamensis* (Phil.) Boeckeler, *Scirpus hieronymi* Boeckeler

Hierba. Nativa. 3200-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(TAR, ATA, COQ).

Zameioscirpus gaimardioides (E. Desv.)

Dhooge & Goetgh.

Sin.: *Carex gaimardioides* E. Desv.

Hierba. Nativa. 3100-4000 m.

Países: ARG(NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Zameioscirpus muticus Dhooge &

Goetgh.

Sin.: *Zameioscirpus muticus* Dhooge & Goetgh., nom. nud.

Hierba. Nativa. 4100-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

DILLENACEAE**Curatella** Loebl.**Curatella americana** L.

Árbol. Nativa. 100-200 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Davilla Vand.**Davilla elliptica** A. St.-Hil.

Sin.: *Davilla castaneifolia* A. St.-Hil.,
Davilla castaneifolia A. St.-Hil. var.
floribunda A. St.-Hil., *Davilla elliptica*
A. St.-Hil. var. *castaneifolia* (A. St.-Hil.)
Eichler

Arbusto o liana. Nativa. 100-300 m.

Países: PRY(CAN).

Davilla grandiflora A. St.-Hil. & Tul.

Arbusto. Nativa. 100-300 m.

Países: PRY(AMA).

Davilla rugosa Poir.

Sin.: *Davilla brasiliensis* DC., *Davilla pilosa*
Miq.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN).

Doliocarpus Rol.**Doliocarpus dentatus** (Aubl.) Standl.Sin.: *Tigarea dentata* Aubl.

Liana. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, SPE).

Doliocarpus glomeratus Eichler

Liana. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Doliocarpus schottianus EichlerSin.: *Doliocarpus lasiogyne* Benoist

Liana. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Tetracera L.**Tetracera oblongata** DC.

Sin.: *Davilla radula* Mart., *Tetracera*
carpinifolia Eichler, *Tetracera gardneri*
Eichler, *Tetracera oblongata* DC. var.
acutifolia Kuntze, *Tetracera oblongata*
DC. var. *obtusifolia* Kuntze, *Tetracera*
radula (Mart.) Eichler

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, GUA, SPE).

Tetracera parviflora (Rusby) Sleumer

Sin.: *Davilla lechleri* Rusby, *Davilla*
parviflora Rusby

Liana. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN, COA, SPE).

Tetracera sellowiana Schlttdl.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Tetracera volubilis L.

Sin.: *Tetracera acuminata* DC., *Tetracera*
japurensis Mart. & Zucc.

Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(AMA).

DIOSCOREACEAE**Dioscorea** L.**Dioscorea acanthogene** Rusby

Sin.: *Dioscorea gouanioides* (Chodat &
Hassl.) R. Knuth, *Dioscorea multiflora*

Mart. ex Griseb. var. *gouanioides*Chodat & Hassl., *Dioscorea**paraguayensis* R. Knuth

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: . PRY(APY, CON).

Dioscorea acerifolia Phil.

Enredadera. Endémica.

Países: CHL(LLA).

Dioscorea alata L.

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Dioscorea amaranthoides C. PreslSin.: *Dioscorea amaranthoides* C. Preslvar. *crumenigera* (Mart. ex Griseb.)Uline ex R. Knuth, *Dioscorea**amaranthoides* C. Presl var.*elegantula* R. Knuth, *Dioscorea**apaensis* Chodat & Hassl., *Dioscorea**silvestris* Vell.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA, CON).

Dioscorea andina Phil.

Enredadera. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU,

BIO, ARA).

Dioscorea antucoana Uline ex R. Knuth

Enredadera. Endémica.

Países: CHL(BIO).

Dioscorea araucana Phil.

Enredadera. Endémica. 1500 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Dioscorea aristolochiifolia Poepp.Sin.: *Dioscorea trichoneura* Phil.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Dioscorea aspera Humb. & Bonpl. ex

Willd.

Sin.: *Dioscorea scabra* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *aspera* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Uline, *Helmia aspera* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Dioscorea auriculata Poepp.

Sin.: *Dioscorea acutifolia* Phil., *Dioscorea helicifolia* Kunth
Enredadera. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

Dioscorea axilliflora Phil.

Enredadera. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Dioscorea ayardei Asesor

Enredadera. Endémica. 1500-2800 m.
Países: ARG(JUJ).

Dioscorea beecheyi R. Knuth

Enredadera. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Dioscorea bermejensis R. Knuth

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL).

Dioscorea besseriana Kunth var. **berteroi** Uline ex R. Knuth

Enredadera. Endémica.
Países: CHL(RME).

Dioscorea besseriana Kunth var. **besseriana**

Enredadera. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Dioscorea biloba (Phil.) Caddick & Wilkin subsp. **biloba**

Sin.: *Epipetrum bilobum* Phil.
Hierba. Endémica. 400-500 m.

Países: CHL(ANT, COQ).

Dioscorea biloba (Phil.) Caddick & Wilkin subsp. **coquimbana** Viruel, Segarra & L. Villar

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Dioscorea brachybotrya Poepp. var. **brachybotrya**

Sin.: *Dioscorea buchtienii* R. Knuth, *Dioscorea novemloba* Steud. ex F. Phil., *Dioscorea scandens* Kunze ex Kunth

Enredadera. Endémica. 1500-1600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Dioscorea brachybotrya Poepp. var. **germainii** Uline ex R. Knuth

Enredadera. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Dioscorea brachystachya Phil.

Enredadera. Endémica. Sin datos
Países: CHL(BIO).

Dioscorea bryoniifolia Poepp.

Sin.: *Dioscorea hederacea* Miers ex Bertero
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Dioscorea bulbifera L.

Enredadera. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Dioscorea bulbotricha Hand.-Mazz.

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dioscorea calcarea R. Knuth

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dioscorea campestris Griseb.

Sin.: *Dioscorea campestris* Griseb. f. *paraguayensis* R. Knuth, *Dioscorea campestris* Griseb. var. *longispicata* Hauman, *Dioscorea violacea* R. Knuth, nom. illeg., *Helmia campestris* (Griseb.) Kunth

Enredadera. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PAI). URY(ART, PAY, RNO, SOR, TAC).

Dioscorea castilloniana Hauman

Enredadera. Endémica.
Países: ARG(JUJ).

Dioscorea ceratandra Uline ex R. Knuth

Sin.: *Dioscorea congestiflora* R. Knuth, *Dioscorea martiana* Griseb. var. *caudata* R. Knuth, *Dioscorea quirogae* R. Knuth

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON).

Dioscorea chondrocarpa Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA, RGS).

Dioscorea cienegensis R. Knuth

Sin.: *Dioscorea monadelphica* (Kunth) Pax var. *opaca* Hicken
Enredadera. Endémica. 1500-1600 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS).

Dioscorea cinnamomifolia Hook.

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
Notas: Citada para Paraguay (Pedralli, 2004) sin indicar localidad o material de referencia.

Dioscorea cissophylla Phil.

Enredadera. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(LSR, LLA).

Dioscorea commutata R. Knuth

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Dioscorea coronata Hauman

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PHA). URY(CLA, TAC, TYT).**Dioscorea curitybensis** R. Knuth

Enredadera. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Dioscorea delicata R. Knuth

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Dioscorea demourae Uline ex R. Knuth

Enredadera. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA).**Dioscorea dodecaneura** Vell.Sin.: *Dioscorea bangii* R. Knuth,
Dioscorea discolor R. Knuth,
Dioscorea huallagensis R. Knuth,
Dioscorea illustrata W. Bull, *Dioscorea*
racemosa Rusby

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS,
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAU, PAI, SPE).**Dioscorea entomophila** HaumanSin.: *Dioscorea entomophila* Hauman var.
tomentosa Hauman

Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, TUC).

Dioscorea fastigiata GaySin.: *Dioscorea cylindrostachya* I.M.Johnst., *Dioscorea geissei* Phil.,*Dioscorea thinophila* Phil.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Dioscorea flexuosa (Poir.) C.A. Zanotti & ZuloagaSin.: *Dioscorea bridgesii* Griseb. ex Kunth,
nom. superfl., *Rajania flexuosa* Poir.

Enredadera. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).**Dioscorea fractiflexa** R. Knuth

Enredadera. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Dioscorea furcata Griseb.Sin.: *Dioscorea fracta* Griseb., *Helmia*
fracta (Griseb.) Kunth, *Helmia furcata*
(Griseb.) Kunth

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY.
URY(SAO).**Dioscorea gayi** Phil.

Enredadera. Endémica.

Países: CHL(ATA).

Dioscorea glandulosa Klotzsch ex KunthSin.: *Dioscorea paranensis* R. Knuth,
Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl.
ex Willd. var. *glandulosa* Klotzsch ex
Griseb.

Enredadera. Nativa. 300-1200 m.

Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA,
CON, GUA).**Dioscorea glomerulata** HaumanSin.: *Dioscorea boliviensis* R. Knuth,
Dioscorea burroyacensis R. Knuth,*Dioscorea lorentzii* R. Knuth,*Dioscorea nodosa* R. Knuth

Enredadera. Nativa. 1200-2600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Dioscorea gracilis Hook. & Arn.Sin.: *Dioscorea humifusa* Poepp. var.*gracilis* (Hook. & Arn.) L.E. Navas

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(VAL, BIO, RME).

Dioscorea grandiflora Mart. ex Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

Dioscorea grisebachii Kunth

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dioscorea hassleriana ChodatSin.: *Dioscorea hassleriana* Chodat var.
triloba Chodat & Hassl., *Dioscorea*
hastata Vell. var. *hassleriana* (Chodat)
R. Knuth

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR,
RGS). PRY(AMA, CEN, CON, COA,
GUA, PAI).**Dioscorea haumanii** Xifreda

Enredadera. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

Dioscorea heterophylla Poepp. var.
heterophylla

Enredadera. Endémica.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
RME).**Dioscorea heterophylla** Poepp. var.
longifolia (Phil.) L.E. NavasSin.: *Dioscorea longifolia* Phil.

Enredadera. Endémica.

Países: CHL(RME).

Dioscorea hieronymi R. Knuth

Sin.: *Dioscorea chiquiacensis* R. Knuth,
Dioscorea megalantha Griseb. var.
subsessilis Hauman, *Dioscorea*
tafiensis R. Knuth
Enredadera. Nativa. 500-2400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Dioscorea humifusa Poepp.

Sin.: *Dioscorea ionophylla* Uline ex R.
Knuth, *Dioscorea nigrescens* Phil.
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, RME).

Dioscorea humilis Bertero ex Colla
subsp. **humilis**

Sin.: *Dioscorea pusilla* Hook., *Epipetrum*
humile (Bertero ex Colla) Phil.
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
RME).

Dioscorea humilis Bertero ex Colla
subsp. **polyanthes** (F. Phil.) Viruel,
Segarra & L. Villar

Sin.: *Dioscorea polyanthes* (F. Phil.)
Caddick & Wilkin, *Epipetrum*
polyanthes F. Phil.
Enredadera. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Dioscorea laxiflora Mart. ex Griseb.

Sin.: *Dioscorea calystegioides* Kunth,
Dioscorea laxiflora Mart. ex Griseb.
var. *calystegioides* (Kunth) Uline ex R.
Knuth, *Dioscorea laxiflora* Mart. ex
Griseb. var. *cincinnata* Uline ex R.
Knuth
Enredadera. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dioscorea litoralis Phil.

Enredadera. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(VAL, BIO).

Dioscorea longipes Phil.

Enredadera. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(MAU, ARA).

Dioscorea macrantha Uline ex R. Knuth

Enredadera. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Dioscorea marginata Griseb.

Sin.: *Dioscorea albinervia* R. Knuth,
Dioscorea spicata (Vell.) Pedralli, hom.
illeg., *Smilax spicata* Vell.
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dioscorea martiana Griseb.

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dioscorea megalantha Griseb.

Sin.: *Dioscorea lilloi* (Hauman) Hauman,
Dioscorea megalantha Griseb. var.
lilloi Hauman
Enredadera. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, SDE, TUC).

Dioscorea microbotrya Griseb.

Sin.: *Dioscorea gibertii* R. Knuth,
Dioscorea microbotrya Griseb. var.
grandifolia Hauman, *Dioscorea*
tweediei R. Knuth
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE,
TUC). BRA(PAR, SCA). URY(PAY,
RNO, SOR, TAC).

Dioscorea microcephala Uline

Enredadera. Endémica. Sin datos
Países: BRA(RGS).

Dioscorea modesta Phil.

Sin.: *Dioscorea aristolochiifolia* Poepp.
var. *parvifolia* (Phil.) L.E. Navas &
Erba, *Dioscorea parvifolia* Phil.
Enredadera. Endémica.

Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Dioscorea monadelpha (Kunth) Griseb.

Sin.: *Dioscorea acutata* R. Knuth,
Dioscorea guaranítica Chodat & Hassl.
f. *membranacea* Chodat & Hassl.,
Dioscorea monadelpha (Kunth) Pax,
comb. superfl., *Dioscorea praetervisa*
R. Knuth, *Dioscorea similis* R. Knuth,
Helmia monadelpha Kunth
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(RIV, TAC).
Notas: Cita dudosa para Argentina y
Paraguay (Pedralli, 2004)

Dioscorea monandra Hauman

Enredadera. Endémica. 2000-2200 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.

Sin.: *Dioscorea concepcionis* Chodat &
Hassl., *Dioscorea macrocapsa* Uline,
Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.
var. *asuncionensis* R. Knuth,
Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.
var. *concepcionis* (Chodat & Hassl.)
Pellegr., *Dioscorea multiflora* Mart. ex
Griseb. var. *loefgrenii* R. Knuth,
Dioscorea niederleinii R. Knuth,
Helmia multiflora (Mart. ex Griseb.)
Kunth
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN,
CON, COA, GUA, ITA, PAI).
URY(ART, SAO).

Dioscorea multispicata R. Knuth

Enredadera. Nativa.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
PRY(AMA).

Dioscorea nana Poepp.

Enredadera. Endémica. 100-1300 m.

- Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).
- Dioscorea nitida** R. Knuth
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CON).
- Dioscorea obtusifolia** Hook. & Arn. var. **obtusifolia**
Enredadera. Endémica. Sin datos
Países: CHL(RME).
- Dioscorea obtusifolia** Hook. & Arn. var. **philippii** Uline ex R. Knuth
Enredadera. Endémica. Sin datos
Países: CHL(BIO, RME).
- Dioscorea olfersiana** Klotzsch ex Griseb.
Sin.: *Dioscorea catharinensis* R. Knuth
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dioscorea oligophylla** Phil.
Enredadera. Endémica.
Países: CHL(VAL, RME).
- Dioscorea ovata** Vell.
Sin.: *Dioscorea adenocarpa* Mart. ex Griseb., *Dioscorea adenocarpa* Mart. ex Griseb. var. *balansae* Uline, *Dioscorea adenocarpa* Mart. ex Griseb. var. *chartacea* Uline ex R. Knuth, *Dioscorea puncticulata* R. Knuth, *Dioscorea trachyandra* Griseb., *Helmia adenocarpa* (Mart. ex Griseb.) Kunth
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, CON, COA, PAI).
Notas: Cita dudosa para la Flora Argentina (Xifreda, 1996^a; Pedralli, 2004)
- Dioscorea pallidinervia** R. Knuth
Enredadera. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Dioscorea parviflora** Phil.
Sin.: *Dioscorea skottsbergii* R. Knuth, *Dioscorea stenocolpus* Phil.
Enredadera. Endémica
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).
- Dioscorea paupera** Phil.
Enredadera. Endémica. Sin datos
Países: CHL(ATA, COQ).
- Dioscorea pedicellata** Phil.
Enredadera. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Dioscorea pencana** Phil.
Enredadera. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(BIO).
- Dioscorea pilcomayensis** Hauman
Sin.: *Dioscorea pedicellata* Morong, nom. illeg., *Dioscorea pellegrinii* Hassl. ex R. Knuth, nom. superfl., *Dioscorea tamifolia* Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY, AMA, CON, PHA).
- Dioscorea piperifolia** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dioscorea polygonoides** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dioscorea reticulata** Gay
Sin.: *Dioscorea brachybotrya* Poepp. var. *reticulata* (Gay) Uline ex R. Knuth, *Dioscorea nervosa* Phil., *Dioscorea pedatifida* Phil., *Dioscorea reticulata* Gay var. *nervosa* (Phil.) L.E. Navas & Erba, *Dioscorea thermarum* Phil.
- Enredadera. Endémica. 200-2300 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).
- Dioscorea rumicoides** Griseb.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dioscorea saxatilis** Poepp.
Sin.: *Dioscorea arenaria* Kunth, *Dioscorea linearis* Bertero ex Colla
Enredadera. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).
- Dioscorea scabra** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dioscorea sellowiana** Uline ex R. Knuth
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(RGS).
- Dioscorea sinuata** Vell.
Sin.: *Dioscorea bonariensis* Ten., *Dioscorea crenata* Kunth, nom. nud., *Dioscorea crenata* Vell., *Dioscorea sinuata* Vell. var. *bonariensis* (Ten.) Hauman, *Dioscorea variifolia* Kunze, nom. nud.
Enredadera. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PHA). URY.
- Dioscorea spectabilis** R. Knuth
Enredadera. Nativa.
Países: ARG(JUJ).
- Dioscorea stegelmanniana** R. Knuth
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dioscorea stenopetala Hauman

Sin.: *Dioscorea tucumanensis* R. Knuth
Enredadera. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Dioscorea subhastata Vell.

Sin.: *Dioscorea friesii* R. Knuth, *Dioscorea guaranítica* Chodat & Hassl., *Dioscorea guaranítica* Chodat & Hassl. f. *subcoriacea* Chodat & Hassl., *Dioscorea guaranítica* Chodat & Hassl. var. *balansae* Pellegr., *Dioscorea lagoasanta* Uline ex R. Knuth, *Dioscorea piratinyensis* R. Knuth
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Dioscorea tenella Phil.

Enredadera. Endémica. 400-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Dioscorea tenuis R. Knuth

Enredadera. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Dioscorea toldosensis R. Knuth

Enredadera. Nativa.
Países: ARG(JUU, SAL).

Dioscorea trifurcata Hauman

Enredadera. Nativa. 1200-1700 m.
Países: ARG(CAT). BRA(RGS).

Dioscorea trisecta Griseb.

Sin.: *Helmia grisebachii* Kunth
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dioscorea tubuliflora Uline ex R. Knuth

Enredadera. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Dioscorea uliginosa Phil.

Enredadera. Endémica.

Países: CHL(BIO, ARA).

Dioscorea valdiviensis R. Knuth

Enredadera. Endémica. Sin datos
Países: CHL(ARA, LLA).

Dioscorea variifolia Bertero ex Colla

Sin.: *Dioscorea acuminata* Steud., *Dioscorea microphylla* Steud.
Enredadera. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME).

Dioscorea volckmannii Phil.

Hierba. Endémica. 2300-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

DROSERACEAE

Drosera L.

Drosera brevifolia Pursh

Sin.: *Drosera maritima* A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-2100 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(CAS, MAL).

Drosera capillaris Poir.

Sin.: *Drosera brevifolia* Pursh var. *major* Hook.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(CAS).

Drosera communis A. St.-Hil.

Sin.: *Drosera montana* A. St.-Hil. f. *parviflora* Chodat, *Drosera parvifolia* A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).

Drosera grantsau Rivadavia

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Drosera latifolia (Eichler) Gonella & Rivadavia

Sin.: *Drosera villosa* A. St.-Hil. var. *latifolia* Eichler
Hierba. Nativa. 700-2600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Drosera montana A. St.-Hil.

Sin.: *Drosera communis* A. St.-Hil. var. *pauciflora* Eichler
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Drosera rotundifolia L.

Hierba. Introducida.
Países: ARG(RNE).

Drosera uniflora Willd.

Sin.: *Drosera macloviana* Gand.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Drosera viridis Rivadavia

Hierba. Nativa. 800-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

EBENACEAE

Diospyros L.

Diospyros hassleri Hieron.

Arbusto. Nativa. 200-500 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Diospyros inconstans Jacq. subsp. **obovata** (Mart. ex Miq.) B. Walln.
 Sin.: *Maba inconstans* (Jacq.) Griseb., *Maba inconstans* (Jacq.) Griseb. var. *obovata* (Mart. ex Miq.) Hiern, *Macreightia inconstans* (Jacq.) A. DC., *Macreightia obovata* Mart. ex Miq.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RNO, SAO).

Diospyros lasiocalyx (Mart.) B. Walln.
 Sin.: *Annona lasiocalyx* Mart., *Diospyros hispida* A. DC.
 Árbol. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

ELAEAGNACEAE

Elaeagnus L.

Elaeagnus angustifolia L.
 Sin.: *Elaeagnus argentea* Moench, *Elaeagnus hortensis* M. Bieb., *Elaeagnus incana* Lam., *Elaeagnus orientalis* L., *Elaeagnus spinosa* L., *Elaeagnus tomentosa* Moench
 Arbolito o árbol. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(LPA, NEU, RNE, SJU, SCR). BRA(PAR).

ELAEOCARPACEAE

Aristotelia L'Hér., nom. cons.

Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz
 Sin.: *Aristotelia glandulosa* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Aristotelia macqui* L'Hér.,

Aristotelia macqui L'Hér. var. *alpestris* Reiche, *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *andina* Phil., *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *leucocarpa* Dimitri, *Cornus chilensis* Molina
 Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME, JFE).
 Notas: Introducida en las islas de Juan Fernández (Chile)

Crinodendron Molina

Crinodendron brasiliense Reitz & L.B. Sm.
 Arbusto o arbolito. Endémica. 1400-2000 m.
 Países: BRA(SCA).

Crinodendron hookerianum Gay

Sin.: *Crinodendron eriocladium* Gand., *Tricuspidaria hookeriana* (Gay) A. Cunn., *Tricuspidaria lanceolata* Miq.
 Árbol. Endémica. 0-1100 m.
 Países: CHL(ARA, LSR, LLA).

Crinodendron patagua Molina

Sin.: *Crinodendron dependens* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Tricuspidaria dependens* Ruiz & Pav., *Tricuspidaria hexapetala* Turcz., *Tricuspidaria patagua* (Molina) Miers
 Árbol. Endémica. 0-1800 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE).

Crinodendron tucumanum Lillo

Sin.: *Crinodendron boliviensis* Villa
 Árbol. Nativa. 1000-3000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Sloanea L.

Sloanea garckeana K. Schum.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.

Sin.: *Ablania guianensis* Aubl.
 Árbol. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sloanea hatschbachii D. Sampaio & V.C. Souza
 Árbol. Endémica.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth.

Sin.: *Dasynema hirsutum* Schott
 Árbol. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sloanea lasiocoma K. Schum.

Sin.: *Sloanea hirsuta* (Schott) Planch. ex Benth. subsp. *australis* T.D. Penn., *Sloanea monosperma* Vell. var. *coriacea* K. Schum.
 Árbol. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sloanea terniflora (DC.) Standl.

Sin.: *Lecostemon terniflorum* DC.
 Árbol. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Vallea Mutis ex L.f.

Vallea stipularis L. f.
 Árbol. Nativa. 1500-4000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

ELATINACEAE

Elatine L.

Elatine lindbergii Rohrb.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elatine lorentziana Hunz.

Sin.: *Elatine opposita* Bacig.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, SFE).

Elatine triandra Schkuhr var. **brachysperma** (A. Gray) Fassett

Sin.: *Elatine brachysperma* A. Gray

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, FOR).
URY(MAL, SJO).

Elatine triandra Schkuhr var. **triandra**

Sin.: *Elatine chilensis* Naudin, *Elatine hydropiper* L. var. *triandra* (Schkuhr)

Fiori, *Elatine nivalis* Speg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MEN, RNE, SFE).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

ERICACEAE

Agarista D. Don ex G. Don

Agarista boliviensis (Sleumer) Judd

Sin.: *Leucothoe boliviensis* Sleumer

Arbusto o arbolito. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Agarista chlorantha (Cham.) G. Don

Sin.: *Agarista serrulata* (Cham.) G. Don,
Andromeda chlorantha Cham.,
Andromeda serrulata Cham.,

Leucothoe chlorantha (Cham.) DC.,
Leucothoe serrulata (Cham.) DC.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(RIV).

Agarista eucalyptoides (Cham. & Schltdl.) G. Don

Sin.: *Agarista multiflora* (Pohl) G. Don,
Andromeda eucalyptoides Cham. & Schltdl., *Andromeda multiflora* Pohl,
Leucothoe eucalyptoides (Cham. & Schltdl.) DC., *Leucothoe multiflora* (Pohl) DC. var. *eucalyptoides* (Cham. & Schltdl.) Meisn.

Arbolito o árbol. Nativa. 200-2300 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(RIV).

Agarista minensis (Glaz. ex Sleumer) Judd

Sin.: *Leucothoe minensis* Glaz. ex Sleumer, *Leucothoe minensis* Glaz., nom. nud.

Arbusto. Nativa. 900-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Agarista niederleinii (Sleumer) Judd var. **acutifolia** Judd

Arbusto o arbolito. Endémica. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Agarista niederleinii (Sleumer) Judd var. **niederleinii**

Sin.: *Leucothoe niederleinii* Sleumer

Arbusto o arbolito. Endémica. 800-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Agarista nummularia (Cham. & Schltdl.) G. Don

Sin.: *Andromeda nummularia* Cham. & Schltdl., *Leucothoe nummularia* (Cham. & Schltdl.) DC., *Leucothoe*

nummularia (Cham. & Schltdl.) DC.
var. *floccigera* Sleumer

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Agarista oleifolia G. Don

Sin.: *Andromeda oleifolia* Cham., hom. illeg.

Árbol o arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Agarista paraguayensis (Sleumer) Judd

Sin.: *Leucothoe paraguayensis* Sleumer,
Leucothoe paraguayensis Sleumer
var. *calva* Sleumer

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, COA, PAI).

Agarista pulchella Cham. ex G. Don var. **cordifolia** (Meisn.) Judd

Sin.: *Leucothoe cordifolia* Meisn.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Agarista pulchella Cham. ex G. Don var. **pulchella**

Sin.: *Leucothoe pulchella* (Cham. ex G. Don) DC.

Arbusto. Nativa. 100-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Empetrum L.

Empetrum rubrum Vahl ex Willd.

Sin.: *Empetrum nigrum* L. var. *andinum* DC., *Empetrum nigrum* L. var. *rubrum* (Vahl ex Willd.) A. DC.

Subarbusto. Nativa. 2600-2800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Gaultheria L.**Gaultheria antarctica** Hook. f.

Sin.: *Arbutus serpyllifolia* Lam., *Brossaea antarctica* (Hook. f.) Kuntze, *Gaultheria serpyllifolia* (Lam.) Skottsb., hom. illeg., *Pernettya serpyllifolia* (Lam.) DC.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Gaultheria arassatubensis R.R. Silva & Cervi

Hierba. Endémica. 1400-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Gaultheria bradeana Sleumer

Subarbusto. Nativa. 1600-2500 m.

Países: BRA(SCA).

Gaultheria caespitosa Poepp. & Endl.

Sin.: *Gaultheria minima* (Phil.) Sandwith, *Pernettya minima* Phil., *Pernettya quadrifida* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Gaultheria corvensis (R.R. Silva & Cervi) Romão & Kin.-Gouv.

Sin.: *Gaylussacia corvensis* R.R. Silva & Cervi

Subarbusto. Endémica. 1400-1500 m.

Países: BRA(SCA).

Gaultheria erecta Vent.

Sin.: *Gaultheria saltensis* Sleumer

Arbusto. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(SCA).

Gaultheria insana (Molina) D.J. Middleton

Sin.: *Arbutus furiens* Hook. & Arn., *Arbutus punctata* Hook. & Arn., *Arbutus vernalis* Poepp. & Endl., *Brossaea vernalis* (Poepp. & Endl.) Kuntze, *Gaultheria furiens* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Gaultheria punctata* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Gaultheria vernalis* (Poepp. & Endl.) Kunze, *Hippomanica insana* Molina, *Pernettya furiens* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Pernettya insana* (Molina) Gunkel, *Pernettya melanocarpa* Phil., *Pernettya punctata* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Pernettya vernalis* (Poepp. & Endl.) Phil.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(CHU). CHL(TAR, ANT, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Gaultheria itatiaiae Wawra

Sin.: *Agarista itatiaiae* (Wawra) Wawra, *Gaultheria glaziovii* Warm. ex Glaz., nom. nud., *Leucothoe itatiaiae* (Wawra) Drude

Arbusto. Nativa. 1000-2300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gaultheria linifolia (Phil.) Teillier & R. Rodr.

Sin.: *Gaultheria poeppigii* DC. var. *linifolia* (Phil.) D.J. Middleton, *Pernettya leucocarpa* DC. var. *linearis* Reiche, *Pernettya linifolia* Phil., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *linifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *linifolia* (Phil.) Kausel, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *linifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *linifolia* (Phil.) Sleumer

Arbusto. Endémica. 0-1900 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Gaultheria marticorenae Teillier & P.W. Fritsch

Sin.: *Gaultheria angustifolia* (Lindl.) Teillier, hom. illeg., *Gaultheria mucronata* (L. f.) Hook. & Arn. var. *angustifolia* (Lindl.) D.J. Middleton, *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn., hom. illeg. var. *minor* Hook. & Arn., *Pernettya angustifolia* Lindl., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *angustifolia* (Lindl.) Reiche

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG).

Gaultheria mucronata (L. f.) Hook. & Arn.

Sin.: *Arbutus mucronata* L. f., *Arbutus rigida* Bertero ex Colla, *Gaultheria mucronata* (L. f.) Hook. & Arn. var. *microphylla* (Hombr.) D.J. Middleton, *Pernettya litoralis* Phil., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *microphylla* Hombr. & Jacquinot ex Decne, *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *parvifolia* (Phil.) Skottsb., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *rupicola* (Phil.) Reiche, *Pernettya oblongifolia* Hombr. & Jacquinot ex Decne., *Pernettya ovalifolia* Hombr. & Jacquinot ex Decne., *Pernettya parvifolia* Phil., *Pernettya philippii* Gand., *Pernettya rupicola* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Gaultheria myrsinoides Kunth

Sin.: *Andromeda prostrata* Cav., *Pernettya cavanillesiana* G. Don, nom. illeg., *Pernettya densa* Rusby, *Pernettya*

pentlandii DC., *Pernettya prostrata* (Cav.) DC., *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *pentlandii* (DC.) Sleumer, *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *purpurea* (D. Don ex G. Don) Sleumer, *Pernettya prostrata* (Cav.) Sleumer, comb. superfl., *Pernettya purpurea* D. Don ex G. Don, *Pernettya purpurea* D. Don ex G. Don var. *pentlandii* (DC.) Kuntze
 Arbusto. Nativa. 2800-4100 m.
 Países: ARG(JUU, SAL).

Gaultheria nubigena (Phil.) B.L. Burt & Sleumer
 Sin.: *Pernettya nubigena* Phil.
 Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA).

Gaultheria phillyreifolia (Pers.) Sleumer
 Sin.: *Arbutus phillyreifolia* Pers., *Gaultheria florida* Phil., *Gaultheria lanceolata* Phil., hom. illeg., *Gaultheria mucronata* Phil., hom. illeg., *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn., hom. illeg. var. *myrtilloides*, *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn., hom. illeg. var. *racemosa* Phil. ex Reiche, *Gaultheria phillyreifolia* (Pers.) Sleumer var. *florida* (Phil.) Kausel, *Pernettya ilicifolia* Miq., nom. nud., *Pernettya palenae* Phil., *Pernettya phillyreifolia* (Pers.) DC.
 Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Gaultheria poeppigii DC.
 Sin.: *Gaultheria myrtilloides* Poepp. & Endl., nom. illeg., *Gaultheria poeppigii* DC. var. *nana* (Sleumer) D.J. Middleton, *Pernettya buxifolia* Phil., hom. illeg., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *buxifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya*

mucronata (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *cordobensis* Sleumer, *Pernettya myrtillofolia* Griseb. ex Phil., *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *myrtilloides*, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *nana* (Sleumer) Sleumer, *Pernettya patagonica* Speg., *Pernettya philippiana* Speg., *Pernettya phillyreifolia* (Pers.) DC. var. *araucana* Kuntze, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *nana* Sleumer
 Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
 Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Gaultheria pumila (L. f.) D.J. Middleton var. **leucocarpa** (DC.) D.J. Middleton
 Sin.: *Pernettya andina* Meigen, nom. nud., *Pernettya breviflora* Phil., *Pernettya empetrifolia* (Lam.) Gaudich. var. *leucocarpa* (DC.) Wedd., *Pernettya gayana* (DC.) Decne., *Pernettya leucocarpa* DC., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *gayana* DC., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook. var. *leucocarpa* (DC.) Kausel
 Arbusto. Endémica. 600-3200 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Gaultheria pumila (L. f.) D.J. Middleton var. **pumila**
 Sin.: *Andromeda empetrifolia* Lam., *Andromeda humilis* Banks & Sol. ex Hook. f., *Arbutus pumila* L. f., *Gaultheria pumila* (L. f.) D.J. Middleton var. *crassifolia* (Phil.) D.J. Middleton, *Pernettya crassifolia* Phil., *Pernettya empetrifolia* (Lam.) Gaudich., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook. var. *crassifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya pumila* (L. f.) Hook. var. *empetrifolia*

(Lam.) Hook. f., *Pernettya trinervia* Gand.
 Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Gaultheria racemulosa (DC.) D.J. Middleton
 Sin.: *Pernettya bridgesii* Phil., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *mutica* Hook. & Arn., *Pernettya racemulosa* DC., *Pernettya rigida* (Bertero ex Colla) DC.
 Arbusto. Endémica. 100-1400 m.
 Países: CHL(JFE).

Gaultheria renjifoana Phil.
 Arbusto. Endémica.
 Países: CHL(BIO).

Gaultheria serrata (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv. var. **organensis** (Meisn.) Luteyn
 Sin.: *Brossea organensis* (Meisn.) Kuntze, *Gaultheria organensis* Meisn.
 Arbusto. Nativa. 1000-2700 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Gaultheria serrata (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv. var. **serrata**
 Sin.: *Andromeda serrata* Vell.
 Arbusto o subarbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Gaultheria tenuifolia (Phil.) Sleumer
 Sin.: *Gaultheria elegans* (Phil.) Reiche, *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn., hom. illeg. var. *major* Hook. & Arn., *Gaultheria promaucana* Phil., *Gaultheria salicifolia* Phil., *Gaultheria tenuifolia* (Phil.) Sleumer var. *elegans* (Phil.) Kausel, *Gaultheria tenuifolia* (Phil.) Sleumer var. *promaucana* (Phil.) Kausel, *Pernettya elegans* Phil., *Pernettya promaucana* Phil., *Pernettya*

reticulata Phil., *Pernettya tenuifolia* Phil.

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Gaultheria ulei Sleumer

Arbusto. Endémica. 1200-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gaylussacia Kunth

Gaylussacia amoena Cham.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Gaylussacia angustifolia Cham.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gaylussacia arassatubensis R.R. Silva & Cervi

Hierba. Endémica. 1300-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn.

Sin.: *Gaylussacia brasiliensis* (Spreng.) Meisn. var. *pubescens* (Cham. & Schltld.) Meisn., *Gaylussacia pseudovaccinium* Cham. & Schltld., *Gaylussacia pseudovaccinium* Cham. & Schltld. var. *pubescens* Cham. & Schltld., *Vaccinium brasiliense* Spreng.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN).

Gaylussacia caratuvensis R.R. Silva & Cervi

Arbusto. Endémica. 1200-1800 m.

Países: BRA(PAR).

Gaylussacia cardenasii A.C. Sm.

Arbusto. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(SAL).

Gaylussacia densa Cham.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

Gaylussacia paranaensis Romão & Kin.-Gouv.

Arbusto. Endémica. 800-1700 m.

Países: BRA(PAR).

Gaylussacia pseudogaultheria Cham. & Schltld.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gaylussacia rhododendron Cham. & Schltld.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Lebetanthus Endl., nom. cons.

Lebetanthus myrsinites (Lam.) Dusén

Sin.: *Andromeda myrsinites* Lam., *Arbutus microphylla* G. Forst., *Gaultheria microphylla* (G. Forst.) Hook. f., *Lebetanthus americanus* (Hook.) Endl., *Pernettya hookeri* Nied., *Pernettya myrsinites* (Lam.) G. Don, *Prionotes americana* Hook., *Prionotes myrsinites* (Lam.) Skottsb.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Vaccinium L.

Vaccinium floribundum Kunth

Sin.: *Vaccinium floribundum* Kunth var. *ramosissimum* (Dunal) Sleumer, *Vaccinium ramosissimum* Dunal

Arbusto. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(SAL).

ERIOCAULACEAE

Actinocephalus (Körn.) Sano

Actinocephalus polyanthus (Bong.) Sano

Sin.: *Dupatya polyantha* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon polyanthum* Bong., *Paepalanthus polyanthus* (Bong.) Kunth, *Paepalanthus polyanthus* (Bong.) Kunth f. *villosus* (Beauverd) Moldenke & L.B. Sm., *Paepalanthus polyanthus* (Bong.) Kunth var. *villosus* Beauverd

Hierba. Nativa. 900-2300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Comanthera L.B. Sm.

Comanthera xeranthemoides (Bong.) L.R. Parra & Giul.

Sin.: *Eriocaulon xeranthemoides* Bong.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cryptanthella (Suess.) Andrino

Cryptanthella bella (Moldenke) Andrino

Sin.: *Paepalanthus bellus* Moldenke

Hierba. Endémica. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Cryptanthella caldensis (Malme) Andrino

Sin.: *Paepalanthus caldensis* Malme,
Paepalanthus decipiens Ruhland,
Paepalanthus dusenii Ruhland ex
Moldenke, nom. nud., *Paepalanthus*
ruhlandii Silveira ex Ruhland
Hierba. Nativa. 600-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cryptanthella catharinae (Ruhland)
Andrino var. **catharinae**
Sin.: *Paepalanthus catharinae* Ruhland
Hierba. Endémica. 200-2200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cryptanthella catharinae (Ruhland)
Andrino var. **hatschbachii** (Moldenke)
Andrino
Sin.: *Paepalanthus catharinae* Ruhland
var. *hatschbachii* (Moldenke)
Moldenke & L.B. Sm., *Paepalanthus*
hatschbachii Moldenke
Hierba. Endémica. 1000-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cryptanthella tessmannii (Moldenke)
Andrino
Sin.: *Paepalanthus tessmannii* Moldenke
Hierba. Endémica. 1000-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eriocaulon L.

Eriocaulon arechavaletae Herter
Sin.: *Eriocaulon latifolium* Arechav., hom.
illeg.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS,
TAC).

Eriocaulon caaguazuensis Ruhland
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, CAU, CAN).

Eriocaulon crassiscapum Bong.
Sin.: *Eriocaulon molle* Mart. ex Körn.,
nom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA).

Eriocaulon dictyophyllum Körn.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eriocaulon elichrysoides Bong.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

Eriocaulon gomphrenoides Kunth
Hierba. Nativa. 1000-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eriocaulon leptophyllum Kunth
Sin.: *Eriocaulon argentinum* A. Cast.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, GUA).
URY(CAS).

Eriocaulon ligulatum (Vell.) L.B. Sm.
Sin.: *Dupatya ligulata* Vell., *Eriocaulon*
kunthii Körn., *Eriocaulon vaginatum*
Körn.
Hierba. Nativa. 700-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eriocaulon macrobolax Körn.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eriocaulon magnificum Ruhland
Sin.: *Eriocaulon deslandesii* Silveira
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(ROC).

Eriocaulon magnum Abbiatti
Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,
CAN, COA, PAI).

Eriocaulon megapotamicum Malme
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Eriocaulon missionum A. Cast.
Hierba. Endémica. 200 m.
Países: ARG(MIS).

Eriocaulon modestum Kunth
Sin.: *Eriocaulon candidum* Moldenke,
Eriocaulon modestum Kunth f.
viviparum Herzog ex Moldenke,
Eriocaulon moldenkei Herter,
Eriocaulon proximum Steud.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAU, SPE). URY(CAS).

Eriocaulon reitzii Moldenke & L.B. Sm.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Eriocaulon sellowianum Kunth
Sin.: *Eriocaulon brevifolium* Mart. ex
Körn., nom. illeg., *Eriocaulon*
paranense Moldenke, *Eriocaulon*
sellowianum Kunth var. *paranense*
(Moldenke) Moldenke & L.B. Sm.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN,
SPE).

Eriocaulon ulaei Ruhland
Sin.: *Eriocaulon itapevense* Aff & Stützel,
Eriocaulon radiosum (Ruhland) A.
Oliveira, *Eriocaulon ulaei* Ruhland var.
radiosum Ruhland
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eriocaulon weddellianum A. Oliveira
Sin.: *Eriocaulon sellowianum* Kunth var.
longifolium Moldenke
Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Floralia Andrino & F.N. Costa

Floralia flaccida (Bong.) Andrino
Sin.: *Eriocaulon flaccidum* Bong.,
Paepalanthus decorus Abbiatti,
Paepalanthus flaccidus (Bong.) Kunth
Hierba. Nativa. 200-300 m.
Países: BRA(RGS).

Leiothrix Ruhland

Leiothrix arechavaletae Ruhland
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MON, RIV).

Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland
var. **flavescens**
Sin.: *Dupatya flavescens* (Bong.) Kuntze,
Eriocaulon flavescens Bong., *Leiothrix*
affinis Silveira, *Leiothrix edwallii*
Silveira, *Leiothrix flavescens* (Bong.)
Ruhland var. *glabra* Silveira, *Leiothrix*
flavescens (Bong.) Ruhland var.
parvifolia Moldenke, *Leiothrix tenuifolia*
Silveira, *Paepalanthus flavescens*
(Bong.) Körn.
Hierba. Nativa. 1000-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland
var. **polystemma** (Silveira) Giul. &
Hensold
Sin.: *Leiothrix polystemma* Silveira,
Leiothrix polystemma Silveira var.
robusta Silveira
Hierba. Nativa. 1000-1800 m.
Países: BRA(PAR).

Paepalanthus Mart., nom. cons.

Paepalanthus albovaginatus Silveira
var. **albobracteatus** Tissot-Squalli
Hierba. Endémica. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paepalanthus albovaginatus Silveira
var. **albovaginatus**
Hierba. Nativa. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paepalanthus albovaginatus Silveira
var. **fuscobracteatus** Tissot-Squalli
Hierba. Endémica. 1100-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paepalanthus balansae Ruhland
Sin.: *Paepalanthus balansae* Ruhland var.
densiflorus Moldenke
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,
GUA, SPE).

Paepalanthus bryoides (Riedel ex
Bong.) Kunth
Sin.: *Dupatya bryoides* (Riedel ex Bong.)
Kuntze, *Eriocaulon bryoides* Riedel ex
Bong.
Hierba. Nativa. 600-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Paepalanthus henriquei Silveira &
Ruhland
Hierba. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Paepalanthus kleinii (Moldenke & L.B.
Sm.) Trovó
Sin.: *Paepalanthus leiseringii* Ruhland var.
kleinii Moldenke & L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(SCA).

Paepalanthus paulensis Ruhland
Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Paepalanthus planifolius (Bong.) Körn.
Sin.: *Dupatya planifolia* (Bong.) Kuntze,
Eriocaulon planifolium Bong.,
Paepalanthus iridifolius Kunth,
Paepalanthus monticola Mart.,
Paepalanthus planifolius (Bong.) Körn.
var. *major* Körn.
Hierba. Nativa. 1100-2100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU).

Paepalanthus pruinosis Ruhland
Hierba. Nativa. 900-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Syngonanthus Ruhland

Syngonanthus anthemiflorum (Bong.)
Ruhland
Sin.: *Eriocaulon anthemiflorum* Bong.,
Paepalanthus anthemiflorus (Bong.)
Kunth
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Syngonanthus caulescens (Poir.)
Ruhland
Sin.: *Dupatya caulescens* (Poir.) Kuntze,
Eriocaulon caulescens Poir.,
Eriocaulon splendens Bong.,
Paepalanthus caulescens (Poir.)
Kunth, *Syngonanthus caulescens*
(Poir.) Ruhland var. *angustifolius*
Moldenke, *Syngonanthus caulescens*
(Poir.) Ruhland var. *proliferus*
Moldenke
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,
CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA,
ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(MAL).

Syngonanthus chrysanthus (Bong.) Ruhland

Sin.: *Dupatya chrysantha* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon chrysanthum* Bong., *Eriocaulon morulum* (Kunth) Steud., *Paepalanthus chrysanthus* (Bong.) Körn., *Paepalanthus morulus* Kunth
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON).

Syngonanthus fischerianus (Bong.) Ruhland

Sin.: *Dupatya fischeriana* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon fischerianum* Bong., *Eriocaulon nardifolium* (Kunth) Steud., *Paepalanthus fischerianus* (Bong.) Körn., *Paepalanthus nardifolius* Kunth, *Syngonanthus brevircemosus* Diogo
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland

Sin.: *Dupatya gracilis* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon gracile* Bong., *Paepalanthus arechavaletae* Körn. ex Arechav., *Paepalanthus gracilis* (Bong.) Körn.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CON, SPE). URY(CAS).

Syngonanthus helminthorrhizus (Mart. ex Körn.) Ruhland

Sin.: *Dupatya helminthorrhiza* (Mart. ex Körn.) Kuntze, *Eriocaulon umbellatum* Bong., *Paepalanthus helminthorrhizus* Mart. ex Körn.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(AMA).

Syngonanthus nitens (Bong.) Ruhland

Sin.: *Dupatya nitens* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon nitens* Bong., *Paepalanthus nitens* (Bong.) Körn., *Syngonanthus chrysanthus* (Bong.) Ruhland var.

castrensis Moldenke & L.B. Sm., *Syngonanthus nanus* Moldenke
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

ERYTHROXYLACEAE**Erythroxylum** P. Browne**Erythroxylum ambiguum** Peyr.

Sin.: *Erythroxylum ambiguum* Peyr. var. *hymenophyllum* O.E. Schulz
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Erythroxylum anguifugum Mart.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON, SPE).

Erythroxylum argentinum O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum argentinum* O.E. Schulz var. *calophyllum* O.E. Schulz
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Erythroxylum buxus Peyr.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Erythroxylum campestre A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Erythroxylum catharinense Amaral

Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum cuneifolium* (Mart.) O.E. Schulz var. *silvaticum* O.E. Schulz, *Erythroxylum cuneifolium* (Mart.) O.E. Schulz var. *squarrosum* O.E. Schulz, *Erythroxylum microphyllum* A. St.-Hil. var. *cuneifolium* Mart.

Arbusto. Nativa. 1800-2000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE).

Erythroxylum cuspidifolium Mart.

Sin.: *Erythroxylum ectinocalyx* Mart.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Erythroxylum deciduum A. St.-Hil.

Sin.: *Erythroxylum deciduum* A. St.-Hil. var. *brevifolium* (Mart.) O.E. Schulz, *Erythroxylum hasslerianum* Chodat, *Erythroxylum hasslerianum* Chodat f. *angustifolium* Chodat & Hassl., *Erythroxylum nanum* A. St.-Hil., *Erythroxylum nitidum* Mart. var. *brevifolium* Mart.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Erythroxylum gonoclados (Mart.) O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum microphyllum* A. St.-Hil. var. *gonoclados* Mart.
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Erythroxylum microphyllum A. St.-Hil.

Sin.: *Erythroxylum perpusillum* Fern. Casas
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, COA, SPE). URY(ART, TYT).

Erythroxylum myrsinites Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, GUA, MIE). URY(ART, RIV, TAC).

Erythroxylum pachyneurum O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum hasslerianum* Chodat f. *ellipticum* Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU).

Erythroxylum paraguariense (Chodat & Hassl.) O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum distortum* Mart. var. *paraguariense* Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON, COA, SPE).

Erythroxylum patentissimum O.E. Schulz

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON).

Erythroxylum pelleterianum A. St.-Hil.

Sin.: *Erythroxylum verruculosum* O.E. Schulz

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

Erythroxylum suberosum A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Erythroxylum substriatum O.E. Schulz

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Erythroxylum umbu Costa-Lima

Sin.: *Erythroxylum amplifolium* (Mart.) O.E. Schulz, nom. illeg., *Erythroxylum microphyllum* A. St.-Hil. var. *amplifolium* Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, MON).

ESCALLONIACEAE

Escallonia Mutis ex L.f.

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. **alpina**

Sin.: *Escallonia alpina* Poepp. ex DC. var. *glaberrima* Phil., *Escallonia araucana* Phil., *Escallonia britteniana* Rendle, *Escallonia fonkii* Phil., *Escallonia fonkii* Phil. var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Escallonia misella* Gand., *Escallonia sparsiflora* Phil.

Arbusto. Endémica. 200-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. **glabrata** (Phil.) Sleumer

Sin.: *Escallonia glabrata* Phil.

Arbusto. Endémica. 600-2000 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Escallonia angustifolia C. Presl

Sin.: *Escallonia angustifolia* C. Presl var. *coquimbensis* (J. Remy) Acevedo & Kausel, *Escallonia coquimbensis* J. Remy, *Escallonia coquimbensis* J. Remy var. *salicifolia* Reiche, *Escallonia graefiana* Hosseus

Arbusto o árbol. Nativa. 0-3300 m.

Países: ARG(SJU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ).

Escallonia bifida Link & Otto

Sin.: *Bonpl. & Kunth* var. *montevidensis* Cham. & Schltld., nom. illeg., *Escallonia floribunda* Humb., *Escallonia montevidensis* (Cham. & Schltld.) DC., *Escallonia pugae* Phil.

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA). URY(MAL, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).

Escallonia callcottiae Hook. & Arn.

Sin.: *Escallonia callcottiae* Hook. & Arn. var. *fernandeziana* (Phil.) Engl., *Escallonia fernandeziana* Phil., *Escallonia rubricaulis* Colla

Arbusto o árbol. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(JFE).

Escallonia carmelitana Meyen

Sin.: *Escallonia alpina* Poepp. ex DC. var. *carmelitana* (Meyen) Acevedo & Kausel, *Escallonia flavescens* C. Presl

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Escallonia chlorophylla Cham. & Schltld.

Sin.: *Escallonia candida* Lem., *Escallonia canescens* A. St.-Hil., *Escallonia tomentosa* Cambess. ex Niederl., nom. nud.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Escallonia cordobensis (Kuntze) Hosseus

Sin.: *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *cordobensis* Kuntze

Arbusto. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Escallonia farinacea A. St.-Hil.

Sin.: *Escallonia farinacea* A. St.-Hil. var. *jordanensis* (Sleumer) Sleumer, *Escallonia jordanensis* Sleumer
Arbusto. Nativa. 800-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Escallonia florida Poepp. ex DC.

Arbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Escallonia gayana Acevedo & Kausel

Sin.: *Escallonia paniculata* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Escallonia hypoglaucula Herzog

Arbusto o árbol. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Escallonia illinita C. Presl var. *illinita*

Sin.: *Escallonia cupularis* Gillies ex Hook. & Arn., nom. inval., *Escallonia grahamiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Escallonia illinita* C. Presl var. *cupularis* Reiche, *Escallonia mertensiana* Rupr. ex A. Gray, nom. nud.
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Escallonia illinita C. Presl var. *pubicalycina* Briq.

Sin.: *Escallonia illinita* C. Presl var. *stenopetala* (Kunze) Acevedo & Kausel, *Escallonia stenopetala* Kunze
Arbusto. Endémica. 100-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Escallonia laevis (Vell.) Sleumer

Sin.: *Escallonia humilis* A. St.-Hil., *Vigiera laevis* Vell.
Arbusto. Nativa. 800-2300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Escallonia ledifolia Sleumer

Arbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Escallonia leucantha J. Remy

Sin.: *Escallonia bellidifolia* Phil., *Escallonia modesta* Briq., *Escallonia pycnantha* Briq.
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Escallonia megapotamica Spreng.

Sin.: *Escallonia megapotamica* Spreng. var. *spiraeifolia* (Cham. & Schltdl.) Sleumer, *Escallonia resinosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *dodoneifolia* Cham. & Schltdl., *Escallonia resinosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *spiraeifolia* Cham. & Schltdl., *Escallonia sellowiana* DC., *Escallonia sellowiana* DC. var. *salicifolia* A. St.-Hil., *Escallonia sellowiana* DC. var. *spiraeifolia* (Cham. & Schltdl.) DC., *Escallonia spiraeoides* A. St.-Hil., *Escallonia vaccinioides* A. St.-Hil., *Escallonia vaccinioides* A. St.-Hil. var. *guaranitica* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO).

Escallonia millegrana Griseb.

Sin.: *Clethra bridgesii* B. Fedtsch., *Escallonia bridgesii* Rusby
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Escallonia myrtilloides L. f.

Sin.: *Escallonia adscendens* Rusby, *Escallonia corymbosa* (Ruiz & Pav.) Pers., *Escallonia hypsophila* Diels,

Escallonia tortuosa Kunth, *Stereoxylon corymbosum* Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Nativa. 2800-4000 m.
Países: ARG(SAL).

Escallonia myrtoidea Bertero ex DC.

Sin.: *Escallonia andina* Phil., *Escallonia arguta* C. Presl, *Escallonia claudii* Killip, *Escallonia illinita* C. Presl var. *andina* (Phil.) Reiche, *Escallonia microcarpa* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Escallonia reflexa* Gillies, *Escallonia revoluta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *berteroana* Kausel
Arbusto o árbol. Endémica. 100-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Escallonia obtusissima A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Escallonia petrophila Rambo & Sleumer

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.)

Pers. var. *glabra* Engl.
Sin.: *Escallonia berteroana* DC., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *berteroana* (DC.) Pamp., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *resiniflua* (Walp.) Pamp., *Escallonia resiniflua* Walp.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.)

Pers. var. *pulverulenta*
Sin.: *Escallonia spinulosa* Kunth ex Engl., nom. nud., *Stereoxylon pulverulentum* Ruiz & Pav.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Escallonia revoluta (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Escallonia affinis* Rupr. ex A. Gray, nom. nud., *Escallonia hirsuta* C. Presl, *Escallonia thyrsoides* Bertero, nom. nud., *Stereoxylon revolutum* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR).

Escallonia rosea Griseb.

Sin.: *Escallonia chonotica* Phil., *Escallonia longidens* Phil., *Escallonia montana* Phil., *Escallonia pterocladon* Hook., *Escallonia rosea* Griseb. var. *rupestris* (Phil.) Reiche, *Escallonia rupestris* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glutinosa** (Phil.) Reiche

Sin.: *Escallonia glutinosa* Phil.

Arbusto. Endémica. 100-2100 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **macrantha** (Hook. & Arn.) Reiche

Sin.: *Escallonia macrantha* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**

Sin.: *Escallonia concinna* Phil., *Escallonia dumetorum* Phil., *Escallonia duplicatoserrata* J. Remy, *Escallonia glandulosa* Sm., *Escallonia littoralis* Phil., *Escallonia littoralis* Phil. var. *concinna* (Phil.) Reiche, *Escallonia macrantha* Hook. & Arn. var.

duplicatoserrata (J. Remy) Engl., *Escallonia poeppigiana* DC., *Escallonia poeppigiana* DC. var. *longifolia* DC., *Escallonia punctata* DC., *Escallonia rahmeri* Phil., *Escallonia rahmeri* Phil. var. *obovata* Speg., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *albiflora* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *dumetorum* (Phil.) Acevedo & Kausel, *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *glabriuscula* Hook. & Arn., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *multiflora* Poepp. & Endl., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *poeppigiana* (DC.) Reiche, *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *punctata* (DC.) Hook. f., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *uniflora* Poepp. & Endl., *Stereoxylon rubrum* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **thalassica** Kausel

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Escallonia schreiteri Sleumer

Sin.: *Escallonia paniculata* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. var. *acuminatissima* Kuntze

Arbusto o arbolito. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Escallonia serrata Sm.

Sin.: *Celastrus venustus* Banks & Sol. ex Hook. f., *Escallonia serrata* Sm. var. *microphylla* Pamp., *Stereoxylon serratum* (Sm.) Poir.

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Escallonia tucumanensis Hosseus

Sin.: *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *albiflora* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 500-2900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Escallonia angustifolia* Phil., nom. illeg., *Escallonia patagonica* Gand., *Escallonia philippiana* (Engl.) Mast., *Escallonia stenophylla* Phil., *Escallonia stricta* J. Remy, *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *pavoniana* Pamp., *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *philippiana* Engl., *Stereoxylon virgatum* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Rayenia Menegoz & A.E. Villarreal

Rayenia malalcurensis Menegoz & A.E. Villarreal

Hierba. Endémica. 1200-1900 m.

Países: CHL(BIO).

Tribeles Phil.

Tribeles australis Phil.

Sin.: *Chalepoa magellanica* Hook. f.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

Valdivia Gay ex J. Remy

Valdivia gayana J. Remy
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(LSR).

EUPHORBIACEAE

Acalypha L.

Acalypha amblyodonta (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Sin.: *Acalypha amblyodonta* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *gaudichaudii* Müll. Arg., *Acalypha amblyodonta* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *hispida* Müll. Arg., *Acalypha amblyodonta* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *repanda* (Baill.) Müll. Arg., *Acalypha amblyodonta* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *villosa* Müll. Arg., *Acalypha cuspidata* Jacq. var. *amblyodonta* Müll. Arg., *Acalypha cuspidata* Jacq. var. *oxyodonta* Müll. Arg., *Acalypha dupraeana* Baill., *Acalypha dupraeana* Baill. var. *gaudichaudii* Baill., *Acalypha dupraeana* Baill. var. *hilarii* Baill., *Acalypha lagoensis* Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Acalypha oxyodonta* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Ricinocarpus amblyodontus* (Müll. Arg.) Kuntze, *Ricinocarpus oxyodontus* (Müll. Arg.) Kuntze
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA).

Acalypha apetiolata Allem & Waetcher
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Acalypha boliviensis Müll. Arg.
Sin.: *Ricinocarpus boliviensis* (Müll. Arg.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC).

Acalypha brasiliensis Müll. Arg. subsp. **psilophylla** (Müll. Arg.) Cardiel & A.A.C. Souza

Sin.: *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. f. *cordata* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *angustifolia* Pax & K. Hoffm., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *brevipes* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *cordata* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *glabrata* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *longipes* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *mollis* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *psilophylla* Müll. Arg., *Acalypha brevibracteata* Müll. Arg., *Acalypha dupraeana* Baill. var. *sylvicola* Baill., *Acalypha fragilis* Pax & K. Hoffm., *Acalypha major* Salzm. ex Baill., *Acalypha noronhae* Ridl., *Acalypha weddelliana* Baill. var. *major* (Salzm. ex Baill.) Müll. Arg., *Ricinocarpus brasiliensis* (Müll. Arg.) Kuntze
Arbusto. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(JUU, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Acalypha chaquensis Cardiel & I. Montero
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY).

Acalypha claussenii (Turcz.) Müll. Arg.
Sin.: *Odonteilema claussenii* Turcz.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **apicalis** (N.E. Br.) Cardiel & P. Muñoz
Sin.: *Acalypha apicalis* N.E. Br., *Acalypha communis* Müll. Arg. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Acalypha communis*

Müll. Arg. subsp. *communis* f. *longipetiolata* Chodat & Hassl., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *guaranitica* Chodat & Hassl.

Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). PRY(APA, APY, AMA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **communis**

Sin.: *Acalypha agrestis* Morong ex Britton, *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *agrestis* (Morong ex Britton) Chodat, *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *tomentella* Müll. Arg., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *tomentosa* Müll. Arg., *Acalypha gracilis* Griseb., hom. illeg., *Ricinocarpus communis* (Müll. Arg.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) Cardiel & P. Muñoz

Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *salicifolia* Pax & K. Hoffm., *Acalypha paraguariensis* Chodat & Hassl.
Endémica. 100-200 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS). PRY(APY, AMA, CEN, PAI, PHA, SPE).

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **saltensis** (Pax & K. Hoffm.) Cardiel & P. Muñoz

Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *saltensis* Pax & K. Hoffm., *Acalypha friesii* Pax & K. Hoffm.
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, TUC).

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. ***tracheliifolia*** (Pax & K. Hoffm.) Cardiel & P. Muñoz

Sin.: *Acalypha tracheliifolia* Pax & K. Hoffm.
Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(ERI). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, TAC).

Acalypha digynostachya Baill.

Sin.: *Acalypha striolata* Lingelsh., *Ricinocarpus digynostachyus* (Baill.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA).

Acalypha gracilis Spreng.

Sin.: *Acalypha divaricata* Klotzsch ex Baill., *Acalypha gracilis* Spreng. var. *divaricata* (Baill.) Pax & K. Hoffm., comb. illeg., *Acalypha gracilis* Spreng. var. *fruticulosa* Müll. Arg., *Acalypha gracilis* Spreng. var. *pubescens* Müll. Arg., *Ricinocarpus gracilis* (Spreng.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA). URY(ART, PAY, SAO).

Acalypha hassleriana Chodat

Sin.: *Acalypha glandulosa* Chodat & Hassl., hom. illeg., *Acalypha glandulosa* Chodat & Hassl. var. *brevistachya* Chodat & Hassl.,

Acalypha hassleriana Chodat var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Acalypha hassleriana* Chodat var. *glandulosa* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Acalypha sehnemii* Allem & Irgang

Hierba. Endémica. 100-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(CAN, COA, SPE).

Acalypha herzogiana Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Acalypha dimorpha* Chodat & Hassl., nom. illeg., *Acalypha nitschkeana* Pax & K. Hoffm.

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Acalypha lycioides Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Acalypha divaricata* Griseb., nom. illeg.

Arbusto. Nativa. 300-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Acalypha multicaulis Müll. Arg.

Sin.: *Acalypha lagoensis* Müll. Arg., *Acalypha multicaulis* Chodat & Hassl., nom. nud., *Acalypha multicaulis* Müll. Arg. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm., *Acalypha pruriens* Chodat & Hassl., nom. illeg., *Acalypha pruriens* Ness & Mart., *Acalypha ruderalis* Mart. ex Britton, *Acalypha ruderalis* Mart. ex Colla, *Acalypha tenuicaulis* Baill., *Ricinocarpus lagoensis* (Müll. Arg.) Kuntze, *Ricinocarpus multicaulis* (Müll. Arg.) Kuntze, *Ricinocarpus pruriens* (Nees & Mart.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE,

ÑEE, PAI, PHA). URY(COL, CLA, SAO, TYT).

Acalypha plicata Müll. Arg.

Sin.: *Acalypha cordifolia* Griseb., hom. illeg., *Acalypha cordifolia* Hook. f. var. *polyadenia* Griseb., *Acalypha flabellifera* Rusby, *Acalypha plicata* Griseb., nom. illeg., *Ricinocarpus cordifolius* Kuntze, *Ricinocarpus plicatus* (Müll. Arg.) Kuntze

Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Acalypha poiretii Spreng.

Sin.: *Acalypha macrostachyos* Poir., hom. illeg., *Ricinocarpus poiretii* (Spreng.) Kuntze

Hierba. Nativa. 400-1300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(SCA).

Acalypha schreiteri Lillo ex Lourteig & O'Donnell

Arbusto o árbol. Endémica. 1500-1800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Acalypha senilis Baill.

Sin.: *Acalypha rotundifolia* Herter, *Ricinocarpus senilis* (Baill.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU). URY(DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC, TYT).

Acalypha uleana L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

Acalypha variabilis Klotzsch ex Baill.

Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg. f. *hirsutissima* Chodat & Hassl., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *hirta* (Spreng.) Müll. Arg., comb. illeg., *Acalypha cordobensis* Müll. Arg., *Acalypha cordobensis* Müll. Arg. var. *rotundata* Griseb., *Acalypha hirta* Spreng., hom. illeg., *Acalypha montevidensis* Klotzsch ex Pax & K. Hoffm., nom. nud., *Acalypha variabilis* Klotzsch ex Baill. var. *albescens* Baill., *Acalypha variabilis* Klotzsch ex Baill. var. *angustifolia* Baill.

Subarbusto o arbusto. Nativa. 300-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(AMA, CAU, COA, MIE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, FLO, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR).

Acalypha velamea Baill.

Sin.: *Acalypha brevipes* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Acalypha communis* Müll. Arg. f. *decumbens* Müll. Arg., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *brevipes* Müll. Arg., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *brevipetiolata* Chodat & Hassl., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *pallida* Müll. Arg., *Acalypha goyazensis* Glaz., *Ricinocarpus brevipes* (Müll. Arg.) Kuntze, *Ricinocarpus velameus* (Baill.) Kuntze

Hierba. Nativa. 300-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS). PRY(AMA).

Acalypha villosa Jacq.

Sin.: *Ricinocarpus villosus* (Jacq.) Kuntze
Arbusto. Nativa. 100-400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CON).

Acalypha wilkesiana Müll. Arg.

Arbusto. Introducida. 0-100 m.

Países: PRY(CEN).

Actinostemon Mart. ex Klotzsch

Actinostemon conceptionis (Chodat & Hassl.) Hochr.

Sin.: *Dactylostemon klotzschii* D. Dietr. var. *conceptionis* Chodat & Hassl., *Dactylostemon klotzschii* D. Dietr. var. *heterophyllus* Müll. Arg., *Dactylostemon klotzschii* D. Dietr. var. *obtusatus* Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg.

Sin.: *Actinostemon multiflorus* Müll. Arg., *Actinostemon oligandrus* (Müll. Arg.) Baill., *Actinostemon polymorphus* Müll. Arg., *Dactylostemon oligandrus* Müll. Arg., *Excoecaria concolor* (Spreng.) Spreng., *Gussonia concolor* Spreng., *Gymnanthes concolor* (Spreng.) Müll. Arg., *Stillingia concolor* (Spreng.) Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(TYT).

Actinostemon echinatus Müll. Arg.

Árbol o arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Actinostemon klotzschii (Didr.) Pax

Sin.: *Dactylostemon klotzschii* Didr.

Árbol o arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Actinostemon roseliae L. Oliveira, A.L.

Melo & M.F. Sales

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Adelia L., nom. cons.

Adelia membranifolia (Müll. Arg.) Chodat & Hassl.

Sin.: *Adelia membranifolia* (Müll. Arg.) Chodat & Hassl. f. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Adelia membranifolia* (Müll. Arg.) Chodat & Hassl. var. *spinosa* Chodat & Hassl., *Adelia peduncularis* (Kuntze) Pax & K. Hoffm., *Adelia spinosa* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Adelia spinosa* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. var. *hassleri* Pax & K. Hoffm., *Adelia spinosa* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. var. *hirsuta* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Ricinella membranifolia* Müll. Arg., *Ricinella membranifolia* Müll. Arg. var. *spinosa* Chodat & Hassl., *Ricinella peduncularis* Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

Adenopeltis Bertero ex A. Juss.

Adenopeltis serrata (W.T. Aiton) I.M. Johnst.

Sin.: *Adenopeltis colliguaya* Bertero ex A. Juss., *Excoecaria colliguaya* (Bertero ex A. Juss.) Baill., *Excoecaria serrata* W.T. Aiton, *Stillingia glandulosa* Dombey ex Baill.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Alchornea Sw.**Alchornea castaneifolia** (Willd.) A. Juss.

Sin.: *Alchornea castaneifolia* (Willd.) A. Juss. var. *genuina* Chodat & Hassl., *Alchornea castaneifolia* (Willd.) A. Juss. var. *salicifolia* (Baill.) Baill., *Hermesia castaneifolia* Willd., *Hermesia salicifolia* Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). PRY(APY, CON, COA).

Alchornea glandulosa Poepp. subsp. **iricurana** (Casar.) Secco

Sin.: *Alchornea iricurana* Casar.

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, ITA, PAI).

Alchornea sidifolia Müll. Arg.

Sin.: *Alchornea columnaris* Müll. Arg., *Alchornea pycnogyne* Müll. Arg., *Alchornea sidaefolia* Klotzsch, *Alchornea sidifolia* Müll. Arg. f. *eusidifolia* Pax & K. Hoffm., *Alchornea sidifolia* Müll. Arg. f. *intermedia* Pax & K. Hoffm., *Alchornea sidifolia* Müll. Arg. f. *pycnogyne* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.

Árbol. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.

Sin.: *Alchornea janeirensis* Casar., *Alchornea nemoralis* Mart., *Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg. var. *iricuranoide*s Chodat & Hassl., *Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg. var. *janeirensis* (Casar.) Müll. Arg., *Alchornea triplinervia*

(Spreng.) Müll. Arg. var. *nemoralis* (Mart.) Pax & K. Hoffm., *Antidesma triplinervium* Spreng.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, PAI).

Aleurites J.R. Forst. & G. Forst.**Aleurites moluccanus** (L.) Willd.

Sin.: *Camerium moluccanum* (L.) Kuntze, *Jatropha moluccana* L., *Mallotus moluccanus* (L.) Müll. Arg., *Mallotus moluccanus* (L.) Müll. Arg. var. *genuinus* Müll. Arg., *Manihot moluccana* (L.) Crantz, *Rottlera moluccana* (L.) Scheff.

Árbol. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

Argythamnia P. Browne**Argythamnia acaulis** (Herter ex Arechav.) J.W. Ingram

Sin.: *Ditaxis acaulis* Herter ex Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(GUA). URY(TAC).

Argythamnia breviramea Müll. Arg.

Sin.: *Ditaxis breviramea* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.

Subarbusto. Nativa. 300-2500 m.

Países: ARG(COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Argythamnia jablonszkyana (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram

Sin.: *Ditaxis jablonszkyana* Pax & K. Hoffm.

Hierba o arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Argythamnia malpighipila (Hicken) J.W. Ingram

Sin.: *Croton malpighipilus* Hicken, *Ditaxis malpighipila* (Hicken) L.C. Wheeler

Subarbusto. Endémica. 400-1700 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SJU).

Argythamnia montevidensis (Didr.) Müll. Arg.

Sin.: *Aphora catamarcensis* Griseb., *Argythamnia catamarcensis* (Griseb.) Pax, *Ditaxis catamarcensis* (Griseb.) Pax, *Ditaxis montevidensis* (Didr.) Pax, *Ditaxis trinervia* Baill., *Stenonia montevidensis* Didr.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APA, APY, BOQ, PHA). URY(PAY, RNO, SJO).

Argythamnia salina (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram

Sin.: *Ditaxis salina* Pax & K. Hoffm.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). PRY(PAI).

Argythamnia sellowiana (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram

Sin.: *Argythamnia rhizantha* (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram, *Argythamnia rosularis* (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram, *Ditaxis rhizantha* Pax & K. Hoffm., *Ditaxis rosularis* Pax & K. Hoffm., *Ditaxis sellowiana* Pax & K. Hoffm., *Paxia rhizantha* (Pax & K. Hoffm.) Herter, *Paxia rosularis* (Pax & K. Hoffm.) Herter, *Paxia sellowiana* (Pax & K. Hoffm.) Herter, *Paxiuscula rhizantha* (Pax & K. Hoffm.) Herter, *Paxiuscula rosularis* (Pax & K. Hoffm.)

Herter, *Paxiuscula sellowiana* (Pax & K. Hoffm.) Herter

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(GUA). URY(ART,
PAY, RIV, TAC).

Astraea Klotzsch

Astraea cincta (Müll. Arg.) Caruzo & Cordeiro

Sin.: *Astraea aureomarginata* (Chodat & Hassl.) P.E. Berry, *Astraea hauthalii* (Kuntze) P.E. Berry, *Croton aureomarginatus* Chodat & Hassl., *Croton cinctus* Müll. Arg., *Croton hauthalii* (Kuntze) K. Schum., *Croton rumicifolius* Chodat & Hassl., *Oxydectes cincta* (Müll. Arg.) Kuntze, *Oxydectes hauthalii* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAN, PAI, SPE).

Astraea gracilis (Müll. Arg.) O.L.M. Silva & Cordeiro

Sin.: *Croton lobatus* lusus *gracilis* Müll. Arg., *Croton lobatus* L. var. *gracilis* (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(AMA).

Astraea jatropa (Müll. Arg.) B.W. van Ee

Sin.: *Astraea manihot* (Müll. Arg.) O.L.M. Silva & Cordeiro, *Croton jatropa* Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 200-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Astraea lobata (L.) Klotzsch

Sin.: *Astraea seemannii* Klotzsch, *Croton lobatus* L., *Croton lobatus* L. var. *intermedius* Müll. Arg., *Croton lobatus*

L. var. *palmaris* Müll. Arg., *Croton lobatus* L. var. *seemannii* (Klotzsch) Müll. Arg., *Croton lobatus* L. var. *sericeus* Müll. Arg., *Croton mocinoi* Radcl.-Sm. & Govaerts, *Croton trilobatus* Sessé & Moç., *Oxydectes lobata* (L.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA, PAI, PHA). URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

Astraea paulina Didr.

Arbusto. Nativa. 300-1500 m.

Países: PRY(CAN).

Avellanita Phil.

Avellanita bustillosii Phil.

Arbusto. Endémica. 300-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Bernardia Houst. ex Mill.

Bernardia alarici Allem & Irgang

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Bernardia argentinensis Lourteig & O'Donnell

Arbusto. Endémica. 300-800 m.

Países: ARG(CAT, COR, SAL, SDE, TUC).

Bernardia asplundii Lourteig

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(COS, ERI).

Bernardia caperoniifolia (Baill.) Müll. Arg.

Sin.: *Adelia caperoniifolia* Baill., *Bernardia apaensis* Chodat & Hassl., *Bernardia apaensis* Chodat & Hassl. var. *subintegra* Chodat & Hassl., *Bernardia guaranitica* Chodat & Hassl., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *apaensis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *fistulosa* Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *obovata* Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *subintegra* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Bernardia multicaulis* Müll. Arg., *Polyboea lorentzii* (Müll. Arg.) Griseb.

Subarbusto. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SLU). PRY(AMA, CAN, GUA, MIE, PAI).

Bernardia flexuosa Pax & K. Hoffm.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Bernardia fluviatilis J.F. Carrión

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(APY).

Bernardia hassleriana Chodat

Sin.: *Bernardia hassleriana* Chodat var. *tobatyensis* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

Bernardia leptostachys Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.

Países: PRY(CAN).

Bernardia longipedunculata (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Bernardia peduncularis* Müll. Arg. f. *spiciflora* Chodat & Hassl., *Bernardia peduncularis* Müll. Arg. f. *subcapituliflora* Chodat & Hassl.,

Bernardia peduncularis Müll. Arg. var. *longipedunculata* Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(CON).

Bernardia odonellii Villa

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Bernardia paraguariensis Chodat & Hassl.

Sin.: *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *rhombifolia* Chodat & Hassl., *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *fruticosa* Chodat & Hassl., *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *orbiculata* Chodat & Hassl., *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *parvifolia* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA).

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. var. **curuguatensis**

Sin.: *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *salicina* Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 200-700 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. var. **polymorpha**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: PRY(AMA, CAA, CAN, CON).

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. var. **setosa** Chodat & Hassl.

Sin.: *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *angustifolia* Pax & K. Hoffm., *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *elliptica* Pax & K. Hoffm.

Arbusto. Endémica. 200-700 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg.

Sin.: *Adelia pulchella* Baill., *Bernardia ambigua* Pax & K. Hoffm., *Bernardia brasiliensis* Müll. Arg. var. *lanceolata* Müll. Arg., *Bernardia brasiliensis* Müll. Arg. var. *longifolia* Müll. Arg., *Bernardia brasiliensis* Müll. Arg. var. *major* Müll. Arg., *Bernardia brasiliensis* Müll. Arg. var. *parvifolia* Müll. Arg., *Bernardia confertifolia* Müll. Arg. var. *glabrata* Pax & K. Hoffm., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *acuminata* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *acutidens* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *acutidentata* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *breviserrata* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *lanceolata* Müll. Arg., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Bernardia sellowii Müll. Arg.

Sin.: *Bernardia geniculata* Allem & J.L. Waechter, *Bernardia hagelundii* Allem & Irgang

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(PAY).

Bernardia simplex Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 100-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Bernardia spartioides (Baill.) Müll. Arg.

Sin.: *Passaea spartioides* Baill.

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Bia Klotzsch

Bia alienata Didr.

Sin.: *Bia lhotzkyana* Klotzsch, nom. nud., *Bia sellowiana* Klotzsch ex Baill., *Tragia alienata* (Didr.) Múlgura & M.M. Gut., *Tragia cissoides* Müll. Arg., *Tragia japurensis* Müll. Arg., *Tragia sellowiana* (Baill.) Müll. Arg., *Tragia sellowiana* (Baill.) Müll. Arg. var. *glabrifolia* Britton ex Rusby

Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).

Breynia J.R. Forst. & G. Forst., nom. cons.

Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Caperonia A. St.-Hil.

Caperonia altissima Eskuche

Hierba palustre. Endémica. 200-500 m.

Países: PRY(SPE).

Caperonia buettneriacea Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Caperonia capiibariensis Eskuche

Hierba palustre. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(GUA, PAI, PHA, SPE).

Caperonia castaneifolia (L.) A. St.-Hil.

Sin.: *Caperonia bahiensis* Müll. Arg. f. *latior* Chodat & Hassl., *Caperonia latior* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Caperonia paraguayensis* Pax & K. Hoffm., *Croton castaneifolius* L.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(SAO).

Caperonia cordata A. St.-Hil.

Sin.: *Argythamnia cordata* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Caperonia cordata* A. St.-Hil. var. *mollis* Pax & K. Hoffm., *Ditaxis cordata* (A. St.-Hil.) Baill.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAA, ITA, ÑEE, PHA). URY(CLA).

Caperonia glabrata Pax & K. Hoffm.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(MIE, ÑEE, PHA).

Caperonia hystrix Pax & K. Hoffm.

Hierba. Nativa.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI). BRA(RGS).

Caperonia itapevae Kulkamp

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).

Caperonia linearifolia A. St.-Hil.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, MON, ROC, SJO, TYT).

Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil.

Sin.: *Argythamnia palustris* (L.) Kuntze, *Caperonia palustris* (L.) A. St.-Hil. var. *linearifolia* Standl. & L.O. Williams, *Caperonia pubescens* S.F. Blake, *Croton palustris* L., *Meterana palustris* (L.) Raf.
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CAU, CEN, ÑEE, PHA). URY(ART).

Chiropetalum A. Juss.

Chiropetalum anisotrichum (Müll. Arg.)

Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia anisotricha* Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Chiropetalum argentinense Skottsb.

Sin.: *Argythamnia argentinense* (Skottsb.) Allem & Irgang, *Chiropetalum tricuspidatum* (Lam.) A. Juss. var. *angustifolium* Griseb.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, LPA, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC).

Chiropetalum berterioanum Schltdl. var. **berterioanum**

Sin.: *Argythamnia berterioana* (Schltdl.) Müll. Arg., *Chiropetalum berterioanum* Schltdl. f. *macrantha* Skottsb.

Subarbusto. Endémica. 200-1800 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

Chiropetalum berterioanum Schltdl. var. **psiladenium** Skottsb.

Sin.: *Argythamnia berterioana* (Schltdl.) Müll. Arg. var. *psiladenia* (Skottsb.) J.W. Ingram

Subarbusto. Endémica. 600 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Chiropetalum boliviense (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia boliviensis* Müll. Arg., *Argythamnia triandra* (Griseb.) Allem & Irgang, *Chiropetalum triandrum* Griseb.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-3100 m.

Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Chiropetalum canescens Phil.

Sin.: *Argythamnia canescens* (Phil.) F. Phil., *Argythamnia sponiella* Müll. Arg., *Chiropetalum gigouxii* Espinosa, *Chiropetalum sponiella* (Müll. Arg.) Pax

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Chiropetalum cremnophilum I.M. Johnst.

Sin.: *Argythamnia cremnophila* (I.M. Johnst.) J.W. Ingram

Subarbusto. Endémica. 200 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Chiropetalum foliosum (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia foliosa* Müll. Arg.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Chiropetalum griseum Griseb.

Sin.: *Argythamnia grisea* (Griseb.) Allem & Irgang, *Chiropetalum cupreum* Pax & K. Hoffm.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SLU, SFE). PRY(APY, ÑEE, PHA). URY(SJO).

Chiropetalum intermedium Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia intermedia* (Pax & K. Hoffm.) Allem & Irgang
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, FLO, FLA).

Chiropetalum latifolium (Chodat & Hassl.) Külkamp & Iganci

Sin.: *Chiropetalum lineatum* Klotzsch, nom. nud., *Chiropetalum tricoccum* (Vell.) Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). PRY(CEN, PAI). URY(PAY, SAO).

Chiropetalum molle (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia mollis* Müll. Arg., *Argythamnia pilosistyla* Allem & Irgang, *Chiropetalum pilosistylum* (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(RIV).

Chiropetalum patagonicum (Speg.) O'Donnell & Lourteig

Sin.: *Aonikena patagonica* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SCR, SLU).

Chiropetalum phalacradenium (J.W. Ingram) L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Argythamnia phalacradenia* J.W. Ingram
Subarbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Chiropetalum puntaloberense Alonso Paz & Bassagoda

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(ROC).

Chiropetalum ramboi (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Argythamnia ramboi* Allem & Irgang
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Chiropetalum tricoccum (Vell.) Chodat & Hassl.

Sin.: *Argythamnia gymnadenia* Müll. Arg., *Argythamnia lineata* (Klotzsch) Baill., comb. illeg., *Argythamnia tricocca* (Vell.) Müll. Arg., *Chiropetalum gymnadenium* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm., *Desfontaena tricocca* Vell.
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI). URY(DUR, FLO, FLA, RNO, SAO).

Chiropetalum tricuspidatum (Lam.) A. Juss.

Sin.: *Argythamnia tricuspidata* (Lam.) Müll. Arg., *Argythamnia tricuspidata* (Lam.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Argythamnia tricuspidata* (Lam.) Müll. Arg. var. *lanceolata* (Cav.) Müll. Arg., *Chiropetalum lanceolatum* (Cav.) A. Juss., *Chiropetalum ovatum* Phil., *Chiropetalum tricuspidatum* (Lam.) A. Juss. var. *lanceolatum* (Cav.) Pax & K. Hoffm., *Croton lanceolatus* Cav., *Croton tricuspidatus* Lam., *Odotalon lanceolata* (Cav.) Raf., *Odotalon tricuspidata* (Lam.) Raf.
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR).

Cnidoscolus Pohl

Cnidoscolus albomaculatus (Pax) I.M. Johnst.

Sin.: *Cnidoscolus campanulatus* (Pax) Pax, *Cnidoscolus tetracyclus* Pax & K. Hoffm., *Jatropha albomaculata* Pax, *Jatropha albomaculata* Pax var. *nana* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha albomaculata* Pax var. *stimulosissima* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha albomaculata* Pax var. *subcuneata* Pax, *Jatropha campanulata* Pax, *Jatropha vitifolia* Mill. f. *nana* Chodat & Hassl., *Jatropha vitifolia* Mill. f. *stimulosissima* Chodat & Hassl.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, CON, COA, NAS, PAI, SPE).

Cnidoscolus appendiculatus (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha appendiculata* Pax & K. Hoffm.
Hierba. Endémica. 100-600 m.
Países: PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CON, SPE).

Cnidoscolus cnicodendron Griseb.

Sin.: *Cnidoscolus vitifolius* (Mill.) Pohl var. *cnicodendron* (Griseb.) Lourteig & O'Donnell, *Jatropha vitifolia* Mill. var. *cnicodendron* (Griseb.) Pax, *Jatropha vitifolia* Mill. var. *grisebachii* Pax, *Jatropha vitifolia* Mill. var. *maritima* Müll. Arg.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL). PRY(APY, BOQ, PAI).

Cnidoscolus hasslerianus (Pax) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha hassleriana* Pax
Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Cnidoscolus leuconeurus (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Jatropha leuconeura* Pax & K. Hoffm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAA).

Cnidoscolus loasoides (Pax) I.M. Johnst.
Sin.: *Jatropha loasoides* Pax
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
PRY(ITA).

Cnidoscolus maracayensis (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Jatropha maracayensis* Chodat & Hassl.
Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(CAN).

Cnidoscolus pteroneurus Fern. Casas
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Cnidoscolus serrulatus (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Jatropha serrulata* Pax & K. Hoffm.
Hierba o arbusto. Endémica. 100-700 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Cnidoscolus subinteger (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Jatropha subintegra* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Jatropha vitifolia* Mill. f. *subintegra* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 100-300 m.
Países: PRY(ITA).

Cnidoscolus tenuifolius I.M. Johnst.
Sin.: *Jatropha tenuifolia* Pax & K. Hoffm., nom. illeg.
Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Cnidoscolus urens (L.) Janti
Sin.: *Bivonea urens* (L.) Arthur,
Cnidoscolus loefgrenii (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm., *Cnidoscolus loefgrenii* (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm., *Cnidoscolus marcgravii* Pohl, *Cnidoscolus neglectus* Pohl, *Cnidoscolus osteocarpus* Pohl, *Cnidoscolus quinquelobus* Pohl, *Cnidoscolus tubulosus* (Müll. Arg.) I.M. Johnst. var. *trilobus* (Müll. Arg.) Lourteig & O'Donnell, *Cnidoscolus urens* (L.) Janti var. *neglectus* (Pohl) Lourteig, *Cnidoscolus vitifolius* (Mill.) Pohl var. *repandus* Griseb., *Janipha urens* (L.) Poir. ex Pohl, *Jatropha loefgrenii* Pax & K. Hoffm., *Jatropha loefgrenii* Pax & K. Hoffm., *Jatropha osteocarpa* Schott ex Pohl, *Jatropha tubulosa* Müll. Arg. var. *triloba* Müll. Arg., *Jatropha urens* L., *Jatropha urens* L. f. *osteocarpa* (Pohl) Müll. Arg., *Jatropha urens* L. var. *brachyloba* Müll. Arg., *Jatropha urens* L. var. *marcgravii* (Pohl) Müll. Arg., *Jatropha urens* L. var. *neglecta* (Pohl) Müll. Arg., *Jatropha urens* L. var. *osteocarpa* (Pohl) Müll. Arg., *Jatropha vitifolia* Mill. var. *repanda* (Griseb.) Pax, *Manihot urens* (L.) Crantz
Arbusto. Nativa. 300-2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SDE, TUC).
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, GUA, PAI).

Colliguaja Molina

Colliguaja brasiliensis Klotzsch ex Baill.
Arbusto o árbol. Endémica. 500-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Citada para Paraguay y Uruguay (Govaerts et al., 2000) sin indicar distribución o material de referencia.

Colliguaja dombeyana A. Juss.
Arbusto. Endémica. 0-2700 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, RME).

Colliguaja integerrima Gillies & Hook.
Arbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, SDE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, MAG, RME).

Colliguaja odorifera Molina
Sin.: *Colliguaja obtusa* Regel, *Colliguaja triquetra* Gillies & Hook., *Croton colliguay* Molina
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Colliguaja salicifolia Gillies & Hook.
Sin.: *Colliguaja dombeyana* Gay, nom. illeg.
Arbusto. Endémica. 200-1800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Conceveibum Rich. ex A. Juss.

Conceveibum cordatum A. Juss.
Sin.: *Aparisthium cordatum* (A. Juss.) Baill.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Croton L.

Croton aberrans Müll. Arg.
Sin.: *Croton guaraniticus* Chodat & Hassl., *Croton guaraniticus* Chodat & Hassl. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Croton guaraniticus* Chodat & Hassl. f. *latifolius* Chodat & Hassl., *Croton guaraniticus* Chodat & Hassl. f.

microphylla Chodat & Hassl., *Croton guaraniticus* Chodat & Hassl. var. *virgatus* Chodat & Hassl., *Oxydectes aberrans* (Müll. Arg.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, MIE, PAI, SPE).

Croton ackermannianus (Müll. Arg.) G.L. Webster

Sin.: *Julocroton ackermannianus* Müll. Arg.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAA, PAI).

Croton andinus Müll. Arg.

Sin.: *Croton pachecensis* S. Moore, *Croton psammophilus* Lillo

Hierba. Nativa. 100-1300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, PHA).

Croton antisiphiliticus Mart.

Sin.: *Croton antisiphiliticus* Mart. var. *cordiifolius* Müll. Arg., *Croton antisiphiliticus* Mart. var. *latifolius* (Baill.) Müll. Arg., *Croton perdicipes* Baill. var. *latifolius* Baill.

Hierba o subarbusto. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Notas: Citada para Paraguay (Rossi Carizo & Cordeiro 2007: 577) sin indicar localidad ni material de referencia.

Croton apostolon Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton subpannosus* (Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg. var. *posadensis* Croizat, *Julocroton vulpinus* Croizat

Subarbusto. Nativa. 100-300 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

Croton argenteus L.

Sin.: *Cicca argentea* (L.) Kuntze, *Cicca montevidensis* (Klotzsch ex Baill.) Kuntze, *Cieca argentea* (L.) Kuntze, *Cieca montevidensis* Kuntze, *Croton integer* (Chodat) Radcl.-Sm. & Govaerts, *Croton lepidus* (S. Moore) Radcl.-Sm. & Govaerts, *Julocroton argenteus* (L.) Didr., *Julocroton camporum* Chodat & Hassl., *Julocroton elaeagnoides* S. Moore, *Julocroton integer* Chodat, *Julocroton integer* Chodat f. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Julocroton lepidus* S. Moore, *Julocroton linearifolius* (Chodat & Hassl.) Croizat, *Julocroton montevidensis* Klotzsch ex Baill. var. *genuinus* Müll. Arg., *Julocroton montevidensis* Klotzsch ex Müll. Arg., *Julocroton montevidensis* Klotzsch ex Müll. Arg. var. *linearifolius* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, ITA, ÑEE, PHA).

Croton argentinus Müll. Arg.

Sin.: *Croton argentinus* Müll. Arg. var. *chloropetalus* Müll. Arg.

Arbusto. Endémica. 200-2100 m.

Países: ARG(CAT, COR, SAL, SLU). BRA(RGS). URY(MON).

Croton argyrophyllus Kunth

Sin.: *Croton argyroglossus* Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(APY, CAN).

Croton bacupariensis Valduga & Iganci

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Croton beetlei Croizat

Árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Croton berberifolius Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(AMA, PAI).

Croton bonplandianus Baill.

Sin.: *Croton nivifer* S. Moore, *Croton pauperulus* Müll. Arg., *Croton rivinoides* Chodat, *Croton sparsiflorus* Morong, *Oxydectes bonplandiana* (Baill.) Kuntze, *Oxydectes pauperula* (Müll. Arg.) Kuntze, *Oxydectes sparsiflora* (Morong) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CON, COA, ÑEE, PHA). URY(ART).

Croton bresolinii L.B. Sm. & Downs

Arbusto o subarbusto. Endémica. 100 m.

Países: BRA(SCA).

Croton calyciglandulosus Allem

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Croton calycireduplicatus Allem

Arbusto. Endémica. 900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Croton campestris A. St.-Hil.

Hierba, subarbusto o arbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).

Croton catamarcensis Ahumada

Subarbusto. Endémica. 700-1200 m.

Países: ARG(CAT, COR, SLU).

Croton ceanothifolius Baill.

Sin.: *Croton ceanothifolius* Baill. var. *itabirensis* Baill., *Croton fallax* Müll. Arg., *Croton itacolumii* Müll. Arg., *Croton minarum* Müll. Arg., *Croton pallidulus* Baill.
Arbusto. Nativa. 600-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton celtidifolius Baill.

Sin.: *Croton cynanchicus* Baill., *Croton oreophilus* Müll. Arg.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton chaetophorus Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Croton chamaepitys Baill.

Sin.: *Croton arechavaletae* Herter ex Arechav., *Croton pycnocephalus* Baill. var. *chamaepitys* (Baill.) Müll. Arg., *Croton trichocephalus* Müll. Arg. var. *brevifolius* Müll. Arg., *Croton trichocephalus* Müll. Arg. var. *intermedius* Müll. Arg.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). URY(LAV, MAL).

Croton chilensis Müll. Arg.

Sin.: *Croton collinus* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 300-800 m.
Países: CHL(ANT).

Croton chloroleucus Müll. Arg.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Croton chodatii (Croizat) P.E. Berry

Sin.: *Julocroton chodatii* Croizat, *Julocroton pycnophyllus* Schltdl. f. *latifolia* Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica.
Países: PRY(CAN).

Croton cinerellus Müll. Arg.

Sin.: *Croton cinerellus* Müll. Arg. f. *parvifolius* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa.
Países: PRY(COA, GUA, PAI).

Croton confinis L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 1000-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Croton cooperianus (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton cooperianus* Croizat
Subarbusto. Nativa.
Países: PRY(AMA).

Croton cuchillae-nigrae Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(MON, RIV, TAC).

Croton curiosus Croizat

Subarbusto. Nativa. 1500-2800 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Croton dichrous Müll. Arg.

Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Croton didrichsenii G.L. Webster

Sin.: *Croton lanceolaris* G.L. Webster, *Croton lithrifolius* (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts, *Julocroton humilis* Dir., *Julocroton lithrifolius* Croizat, *Julocroton typhicephalus* Croizat
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAN, CEN, COA, PAI, SPE).
Notas: Citado para Uruguay (Rossi Caruzo & Cordeiro 2007: 578) sin mencionar localidad ni ejemplar de referencia.

Croton doratophylloides (Croizat) G.L. Webster

Sin.: *Julocroton doratophylloides* Croizat
Arbusto. Nativa. 100-200 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

Croton dracunculoides Baill.

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Croton dusenii Croizat

Subarbusto. Endémica. 900-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton echinulatus (Griseb.) Croizat

Sin.: *Croton pycnocephalus* Baill. var. *echinulatus* Griseb.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(SAO).

Croton ericoides Baill.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).

Croton erythroxyloides Baill.

Sin.: *Croton buxifolius* Müll. Arg., *Croton riedelianus* Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 1400-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Croton floribundus Spreng.

Sin.: *Croton maracayuensis* Chodat & Hassl.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Croton fulvus Mart.

Sin.: *Croton bridgesii* Müll. Arg., *Croton cordobensis* Ahumada, *Croton ituzaingensis* Ahumada, *Croton missionum* Croizat, *Croton orbignyanus* Müll. Arg., *Croton peraffinis* Müll. Arg., *Croton rhamnifolius* Kunth f. *lanceolata-ovata* Chodat & Hassl., *Croton vepretorum* Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, LRI, MIS, SAL, SLU, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CAU, COA, GUA, PHA).

Croton fuscus (Didr.) Müll. Arg.

Sin.: *Myriogomphus fuscus* Dirr.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Croton glandulosus L.

Sin.: *Croton divaricatus* Sw., *Croton glandulosus* L. var. *scordioides* (Lam.) Müll. Arg., *Croton scordioides* Lam., *Decarinium glandulosum* (L.) Raf., *Geiseleria glandulosa* (L.) Klotzsch, *Oxydectes glandulosa* (L.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(SAO).

Croton glechomifolius Müll. Arg.

Sin.: *Croton tragifolius* Baill.

Hierba. Nativa. 500-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

Croton gnaphalii Baill.

Sin.: *Croton eskucheii* Ahumada, *Croton herteri* Arechav., *Croton leptophyllus* Müll. Arg., *Croton santolinus* Baill., *Croton troncosoi* Ahumada

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, ÑEE). URY(COL, SJO).

Croton goyazensis Müll. Arg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-600 m.

Países: PRY(CAN).

Croton gracilipes Baill.

Sin.: *Croton abutilifolius* Croizat, *Croton adenopetalus* Müll. Arg., *Croton caladiifolius* Croizat, *Croton gracilipes* Baill. f. *tiliifolius* Chodat & Hassl., *Croton gracilipes* Baill. var. *angustifolius* Müll. Arg., *Croton gracilipes* Baill. var. *macradenius* Müll. Arg., *Croton gracilipes* Baill. var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Croton hasslerianus* Chodat, *Croton lachnostachyus* Baill., *Croton sarcopetaloides* S. Moore, *Croton sarcopetalus* Müll. Arg., *Croton sarcopetalus* Müll. Arg. var. *longipetiolatus* Pax & K. Hoffm., *Croton tucumanensis* Griseb., *Croton tucumanensis* Griseb. var. *oblongatus* Griseb., *Croton xanthochylus* Croizat, *Croton yungensis* Croizat, *Oxydectes gracilipes* (Baill.) Kuntze, *Oxydectes lachnostachya* (Baill.) Kuntze, *Oxydectes sarcopetala* (Müll. Arg.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Croton grandivelus Baill.

Sin.: *Croton curuguayensis* Ahumada, *Croton grandivelus* Baill. var. *pannosus* Müll. Arg., *Croton occidentalis* Müll. Arg., *Croton occidentalis* Müll. Arg. f. *rupestris* Chodat & Hassl., *Croton occidentalis* Müll. Arg. var. *intermedius* Chodat & Hassl., *Croton occidentalis* Müll. Arg. var. *oblongifolius* Chodat & Hassl., *Croton occidentalis* Müll. Arg. var. *ovalifolius* Chodat & Hassl., *Croton occidentalis* Müll. Arg. var. *parvifolius* Chodat & Hassl., *Croton occidentalis* Müll. Arg. var. *setosus* Chodat &

Hassl., *Croton pohlianus* Müll. Arg. var. *macrophyllus* Chodat & Hassl., *Croton pycnocarpus* Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 100-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CAN, CEN, COA, ITA, PAI, SPE).

Croton guaritensis A.P.N. Pereira & Caruzo

Arbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: BRA(RGS).

Croton helichrysum Baill.

Subarbusto. Endémica. Sin datos.

Países: BRA(RGS).

Croton heterodoxus Baill.

Sin.: *Croton debilis* Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton hieronymi Griseb.

Sin.: *Croton corumbensis* S. Moore, *Croton doctoris* S. Moore, *Oxydectes hieronymi* (Griseb.) Kuntze

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1600 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA).

Croton hilarii Baill.

Sin.: *Croton emporiorum* Croizat, *Croton heteroneurus* Müll. Arg., *Croton stenotrichus* Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 1500-2200 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MON, ROC, TYT).

Croton hirtus L'Hér.

Sin.: *Brachystachys hirta* (L'Hér.) Klotzsch, *Croton glandulosus* L. subsp. *hirtus* (L'Hér.) Croizat, *Croton glandulosus* L. var. *cordovens* Müll.

Arg., *Croton glandulosus* L. var. *hirtus* (L'Hér.) Müll. Arg., *Oxydectes glandulosa* (L.) Kuntze var. *hirta* (L'Hér.) Kuntze, *Podostachys hirta* (L'Hér.) Klotzsch
Hierba. Nativa. 100-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, MIE, PAI, SPE).

Croton holodiscus (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton holodiscus* Croizat
Subarbusto. Nativa.
Países: PRY(CAU).

Croton ichthyogaster L.B. Sm. & Downs
Arbusto. Endémica. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Croton integrilobus Croizat
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Croton isabellei Baill.
Arbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Croton julopsidium Baill.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Croton kleinii L.B. Sm. & Downs
Arbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Croton lachnostephanus Baill.
Sin.: *Croton paxianus* Herter ex Arechav., *Croton pycnocephalus* Baill. var. *lachnostephanus* (Baill.) Müll. Arg., *Croton trichocephalus* Müll. Arg. var. *rigidus* Müll. Arg.
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(MAL).

Croton lanatus Lam.
Sin.: *Croton astrogynus* Baill., *Croton crassirameus* Müll. Arg., *Croton harmsianus* Herter ex Arechav., *Croton lanatus* Lam. var. *astrogynus* (Baill.) P.E. Berry, *Croton lanatus* Lam. var. *lorentzii* (Müll. Arg.) P.E. Berry, *Croton lanatus* Lam. var. *ruderalis* (Ahumada) P.E. Berry, *Croton lanatus* Lam. var. *tatacuensis* (Ahumada) P.E. Berry, *Croton laseguei* Müll. Arg., *Croton lorentzii* Müll. Arg., *Croton macrostigma* Chodat, *Croton ruderalis* Ahumada, *Croton silvanus* Croizat, *Croton tatacuensis* Ahumada, *Oxydectes lanata* (Lam.) Kuntze, *Triplandra lanata* (Lam.) Raf.
Arbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, LRI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, PAI). URY(LAV, MAL, MON).

Croton landoltii Ahumada
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS, MIS).

Croton laureltyanus Ahumada
Sin.: *Croton multirameus* Ahumada
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE).

Croton linearifolius Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Croton lombardianus Croizat
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON).

Croton longicarpus A.P.N. Pereira, Caruzo & Riina
Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Croton longicolumellus B.W. van Ee & P.E. Berry
Sin.: *Croton microcarpus* Müll. Arg., hom. illeg.
Subarbusto. Nativa. 100-300 m.
Países: PRY(CEN).

Croton lundianus (Didr.) Müll. Arg.
Sin.: *Croton glandulosus* L. var. *lundianus* (Didr.) L.B. Sm. & B.J. Downs, *Croton yacaensis* Croizat, *Podostachys lundianus* Didr.
Hierba, subarbusto o arbusto. Nativa. 400-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Croton lythrifolius (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton lythrifolius* Croizat
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS). PRY(CAA).

Croton macrobothrys Baill.
Sin.: *Croton vauthieri* Müll. Arg.
Árbol. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton malacotrichus Müll. Arg.
Sin.: *Croton lanuginosus* Baill., nom. illeg.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Croton montevidensis Spreng.
Sin.: *Croton penaeaceus* Baill., *Oxydectes montevidensis* (Spreng.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). URY(FLA, LAV, MAL).

Croton muellerianus L.R. Lima
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1100-1800 m.
Países: BRA(PAR).

Croton myrianthus Müll. Arg.

Sin.: *Croton pallidulus* Baill. var. *myrianthus* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & S.F. Sm.
 Arbusto. Endémica. 700-1700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton nitrariifolius Baill.

Sin.: *Croton codonocalyx* Baill., *Croton nitrariifolius* Baill. var. *velleriflorus* (Baill.) Müll. Arg., *Croton polymorphus* Müll. Arg. var. *glabrescens* Müll. Arg., *Croton polymorphus* Müll. Arg. var. *velleriflorus* (Baill.) Müll. Arg., *Croton velleriflorus* Baill.
 Arbusto. Nativa. 0-300 m.
 Países: BRA(RGS). URY(LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).

Croton odontadenius Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 100-500 m.
 Países: PRY(APA).

Croton ovalifolius Vahl

Sin.: *Barhamia ovalifolia* (Vahl) Klotzsch, *Croton escathos* Croizat, *Croton ovalifolius* Vahl var. *genuinus* Müll. Arg., *Croton siderophyllus* Baill. var. *hirsutus* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Croton siderophyllus* Müll. Arg. var. *hirsutus* Griseb., hom. illeg., *Croton venturii* Croizat, *Croton venturii* Croizat var. *cheirotenos* Croizat, *Oxydectes ovalifolia* (Vahl) Kuntze
 Hierba. Nativa. 100-800 m.
 Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, PHA).

Croton paraguayensis Chodat

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).

Croton parvifolius Müll. Arg.

Sin.: *Croton subdioecus* (Kuntze) K. Schum., *Croton ventanicolus* Speg., *Oxydectes subdioeca* Kuntze
 Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
 Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(ROC, TYT).

Croton patrum L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.
 Países: BRA(SCA).

Croton pedicellatus Kunth

Arbusto o subarbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Croton perviscosus Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
 Países: PRY(AMA).

Croton phyllanthus (Chodat & Hassl.)

G.L. Webster

Sin.: *Julocroton phyllanthus* Chodat & Hassl.
 Arbusto. Endémica. 100-500 m.
 Países: PRY(CAN, SPE).

Croton pilulifer Rusby

Sin.: *Croton densiflorus* Pax & K. Hoffm.
 Árbol. Nativa. 500-2500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Croton polygonoides L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton pycnocephalus Baill.

Sin.: *Croton pycnocephalus* Baill. var. *argyrocomus* Baill., *Croton pycnocephalus* Baill. var. *genuinus* Müll. Arg., nom. inval.
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS). URY(MAL, MON).

Croton pygmaeus L.R. Lima

Arbusto. Endémica.
 Países: BRA(RGS).

Croton quintasii Allem

Subarbusto. Endémica.
 Países: BRA(RGS).

Croton ramboi Allem

Subarbusto. Endémica.
 Países: BRA(RGS).

Croton ramellae Ahumada

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(APA, AMA).

Croton reitzii L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Croton catharinensis* L.B. Sm. & Downs
 Arbolito. Endémica. 400-700 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton robustior (L.B. Sm. & Downs) Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton humilis* Didr. var. *robustior* L.B. Sm. & Downs
 Arbusto. Endémica. 100-1000 m.
 Países: BRA(SCA). PRY(CEN). URY.

Croton rupestris (Chodat & Hassl.) G.L. Webster

Sin.: *Julocroton montevidensis* Klotzsch ex Müll. Arg. f. *longipetiolata* Chodat & Hassl., *Julocroton rupestris* Chodat & Hassl., *Julocroton rupestris* Chodat & Hassl. var. *velutinus* Chodat & Hassl., *Julocroton velutinus* (Chodat & Hassl.) Croizat
 Arbusto. Endémica. 0-300 m.
 Países: PRY(AMA, CAA, CAN, CON, COA, PAI).

Croton rutilus (Chodat & Hassl.) G.L. Webster

Sin.: *Julocroton pulcher* Croizat,
Julocroton rutilus Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica.
Países: PRY(CAA, CAN).

Croton saltensis Griseb.

Sin.: *Croton saltensis* Griseb. var. *discolor*
Griseb.
Arbusto. Nativa. 400-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Croton salutaris Casar.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Croton senescens Croizat

Sin.: *Croton fuscus* Müll. Arg. var.
microbracteatus Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(CAU, COA).

Croton serpyllifolius Baill.

Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Croton serratifolius Baill.

Sin.: *Croton corrientesiana* Baill. ex Müll.
Arg., *Croton garckeanus* Baill., *Croton*
garckeanus Baill. f. *latifolius* Chodat &
Hassl., *Croton garckeanus* Baill. var.
genuinus Müll. Arg., nom. inval.,
Croton garckeanus Baill. var.
guaraniticus Chodat & Hassl., *Croton*
garckeanus Baill. var. *major* Müll. Arg.,
Croton myriadenus Müll. Arg., *Croton*
myriadenus Müll. Arg. f. *abortivus* Müll.
Arg., *Croton myriadenus* Müll. Arg.
var. *normalis* Müll. Arg., nom. inval.,
Croton myriodontus Müll. Arg., *Croton*
pimeleus Baill., *Croton serratifolius*
Baill. f. *tomentosa* Chodat & Hassl.,
Croton serratifolius Baill. var. *rupestris*
Chodat & Hassl., *Croton serratifolius*
Baill. var. *silvaticus* Chodat & Hassl.,
Croton staechadis Baill. var. *silvaticus*
(Chodat & Hassl.) Croizat, *Oxydectes*

corrientesiana (Baill. ex Müll. Arg.)
Kuntze, *Oxydectes garckeanus* (Baill.)
Kuntze, *Oxydectes myriodontus* (Müll.
Arg.) Kuntze, *Oxydectes serratifolia*
(Baill.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(COR, COS, MIS, SLU).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,
AMA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI,
SPE). URY(RIV, TAC).

Croton setiger Hook.

Sin.: *Eremocarpus setiger* (Hook.) Benth.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO,
RME).

Croton solanaceus (Müll. Arg.) G.L.
Webster

Sin.: *Croton pyrosoma* (Croizat) Radcl.-
Sm. & Govaerts, *Julocroton humilis*
Didr. var. *solanaceus* Müll. Arg.,
Julocroton pyrosoma Croizat,
Julocroton solanaceus (Müll. Arg.)
Müll. Arg., *Julocroton solanaceus*
(Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *niveus*
Chodat & Hassl., *Julocroton*
solanaceus Klotzsch ex Baill.
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA).

Croton splendidus Mart. ex Colla

Sin.: *Croton migrans* Casar., *Croton*
splendidus Baill., nom. illeg.
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton subcinerellus Croizat

Sin.: *Croton subcinerellus* Croizat var.
aquidabanensis Croizat
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CEN, PAI).

Croton subpannosus Müll. Arg. ex
Griseb.

Sin.: *Croton dentosus* Griseb., *Croton*
malvoides (Croizat) Radcl.-Sm. &
Govaerts, *Croton thellungianus* (Herter
ex Arechav.) Radcl.-Sm. & Govaerts,
Croton villosissimus (Chodat & Hassl.)
Radcl.-Sm. & Govaerts, *Julocroton*
brittonianum Morong, *Julocroton*
malvoides Croizat, *Julocroton serratus*
Müll. Arg., *Julocroton subpannosus*
(Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg.,
Julocroton subpannosus (Müll. Arg. ex
Griseb.) Müll. Arg. var. *chacoensis*
Croizat, *Julocroton subpannosus*
(Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg. var.
formosensis Croizat, *Julocroton*
subpannosus (Müll. Arg. ex Griseb.)
Müll. Arg. var. *uruguayensis* Croizat,
Julocroton thellungianus Herter ex
Arechav., *Julocroton villosissimus*
Chodat & Hassl., *Oxydectes*
subpannosa (Müll. Arg. ex Griseb.)
Kuntze, *Oxydectes subpannosa* (Müll.
Arg. ex Griseb.) Kuntze var. *serrata*
(Müll. Arg.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS). PRY(CAN, COA,
ITA, ÑEE, PHA). URY(DUR).

Croton subvillosus Müll. Arg.

Sin.: *Croton pedersenii* Ahumada
Subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: . PRY(CAU).

Croton thamarum Müll. Arg.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 600-800
m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Croton thymelinus Baill.

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Croton tricolor Klotzsch ex Baill.
Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Croton trinitatis Millsp.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

Croton triqueter Lam.

Sin.: *Cicca triquetra* (Lam.) Kuntze, *Cieca nervosa* (Baill.) Kuntze, *Cieca peruviana* (Müll. Arg.) Kuntze, *Croton allemii* G.L. Webster, *Croton calonervosus* G.L. Webster, *Croton cordatus* Vell., *Croton flavispicatus* Rusby, *Julocroton nervosus* Baill., *Julocroton paniculatus* Pax & K. Hoffm., *Julocroton peruvianus* Müll. Arg., *Julocroton peruvianus* Müll. Arg. var. *flavispicatus* (Rusby) Croizat, *Julocroton phagedaenicus* Mart., *Julocroton ramboi* L.B. Sm. & Downs, *Julocroton triqueter* (Lam.) Didr.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, PAI, SPE).

Croton urucurana Baill.

Sin.: *Croton dracona* Larrañaga, *Croton paulinianus* Müll. Arg., *Croton succiruber* D. Parodi, *Croton urucurana* Baill. var. *albidus* Müll. Arg., *Croton urucurana* Baill. var. *draconoideus* Müll. Arg., *Oxydectes pauliniana* (Müll. Arg.) Kuntze, *Oxydectes urucurana* (Baill.) Kuntze

Arbolito o árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(PAY, SAO).

Croton uruguayensis Baill.

Sin.: *Croton coelebogyne* Baill., *Croton gaudichaudii* Baill., *Croton minutiflorus*

Müll. Arg., *Croton tenuissimus* Baill., nom. nud.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, GUA, PAI). URY(FLO, PAY, ROC, SAO, SOR, TYT).

Croton verbascoides G.L. Webster

Sin.: *Croton spissirameus* Radcl.-Sm. & Govaerts, *Julocroton crassirameus* Croizat, *Julocroton verbascifolius* (Klotzsch) Müll. Arg. var. *angustifolius* Chodat & Hassl., *Julocroton verbascifolius* Müll. Arg., hom. illeg.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAA, CAN, SPE).

Croton viridulus (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton viridulus* Croizat

Subarbusto. Endémica. Sin datos.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton vulnerarius Baill.

Sin.: *Croton stenandrus* Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 800-1400 m.

Países: BRA(PAR).

Croton yerbalium Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica.

Países: PRY(CAN, SPE).

Dalechampia L.

Dalechampia anomala Pax & K. Hoffm.

Hierba voluble. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Dalechampia bangii Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Dalechampia boliviana* Gand., hom. illeg.

Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Notas: Citada para Rio Grande do Sul (Brasil) por Webster & Ambruster (1991) y Govaerts et al. (2000) sin indicar ejemplar de referencia

Dalechampia clauseniana Baill.

Sin.: *Dalechampia triphylla* Lam. var. *clauseniana* (Baill.) Müll. Arg., *Dalechampia triphylla* Lam. var. *villosa* Müll. Arg.

Hierba voluble. Nativa. 800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Dalechampia ficifolia Lam.

Hierba voluble. Nativa. 200-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Dalechampia glechomifolia Baill.

Sin.: *Dalechampia gruenigiana* Pax, *Dalechampia microphylla* Müll. Arg., *Dalechampia ulmifolia* Chodat & Hassl., *Dalechampia ulmifolia* Chodat & Hassl. var. *gruenigiana* (Pax) Pax

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA).

Dalechampia guaranitica Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.

Países: PRY(CAU, CAA, CAN, SPE).

Dalechampia hassleriana Chodat

Hierba voluble. Endémica. 100-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(SPE).

Dalechampia leandrii Baill.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Dalechampia linearis Baill.

Sin.: *Dalechampia angustifolia* Mart. ex Pax & K. Hoffm., nom. nud., *Dalechampia linearis* Baill. var. *goyazensis* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia linearis* Baill. var.

hilariana Baill., *Dalechampia linearis* Baill. var. *subintegra* Müll. Arg.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Dalechampia meridionalis Müll. Arg.
Sin.: *Dalechampia pallida* Klotzsch ex Pax & K. Hoffm.
Hierba voluble. Nativa.
Países: BRA(PAR). URY.

Dalechampia micromeria Baill.
Sin.: *Dalechampia crenulata* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia micromeria* Baill. var. *angustifolia* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia micromeria* Baill. var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Dalechampia sellowiana* Müll. Arg., *Dalechampia sellowiana* Müll. Arg. var. *serrata* Müll. Arg., *Dalechampia sellowiana* Müll. Arg. var. *subintegra* Müll. Arg.
Hierba voluble. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Dalechampia pentaphylla Lam.
Hierba voluble. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dalechampia reitzkleinii L.B. Sm. & Downs
Hierba voluble. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dalechampia riparia L.B. Sm. & Downs
Hierba voluble. Endémica. 100 m.
Países: BRA(SCA).

Dalechampia scandens L.
Sin.: *Dalechampia fimbriata* Kunth, *Dalechampia scandens* L. var. *fimbriata* (Kunth) Müll. Arg.
Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(CEN, COA, PHA).

Dalechampia serrula Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Dalechampia caperonioides* Baill. var. *lanceolata* Chodat & Hassl., nom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Dalechampia stenosepala Müll. Arg.
Sin.: *Dalechampia patagonica* Pax & K. Hoffm.
Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Dalechampia stipulacea Müll. Arg.
Sin.: *Dalechampia stipulacea* Müll. Arg. f. *minor* Müll. Arg., *Dalechampia stipulacea* Müll. Arg. var. *minor* (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Dalechampia sylvestris S. Moore
Hierba voluble. Introducida. 200-700 m.
Países: PRY(AMA).

Dalechampia triphylla Lam.
Hierba voluble. Nativa. 0-600 m.
Países: PRY(PAI).

Dalechampia weddelliana Baill.
Sin.: *Dalechampia amambayensis* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia morifolia* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia trichophila* Pax & K. Hoffm.
Subarbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: PRY(AMA, SPE).

Dysopsis Baill.

Dysopsis chilensis (Gay) J. Murillo, P. López & G. Fuentes
Sin.: *Molina chilensis* Gay
Hierba. Endémica. 500-1400 m.
Países: CHL(COQ, BIO, ARA, AIS).

Dysopsis glechomoides (A. Rich.) Müll. Arg.
Sin.: *Dysopsis gayana* Baill., nom. illeg., *Dysopsis glechomoides* (A. Rich.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Hydrocotyle glechomoides* A. Rich.
Hierba. Nativa. 600-1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Dysopsis hirsuta (Müll. Arg.) Skottsb.
Sin.: *Dysopsis glechomoides* (A. Rich.) Müll. Arg. var. *hirsuta* Müll. Arg.
Hierba. Endémica. 200-700 m.
Países: CHL(JFE).

Euphorbia L.

Euphorbia acerensis Boiss.
Sin.: *Euphorbia longipila* Rusby
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Euphorbia adenoptera Bertol.
Sin.: *Chamaesyce adenoptera* (Bertol.) Small
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SFE). PRY(PHA).

Euphorbia amandi Oudejans
Sin.: *Euphorbia klotzschii* Oudejans var. *dentata* (R.E. Fr.) Oudejans, *Euphorbia minuta* Phil., hom. illeg., *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *dentata* R.E. Fr.

Hierba. Endémica. 2200-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Euphorbia andina Phil.

Sin.: *Euphorbia collina* Phil. var. *andina* (Phil.) Subils, *Euphorbia dasyclada* Dusén
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(MAU, ARA, MAG).

Euphorbia araucana Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA).

Euphorbia argillosa Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica.
Países: PRY(CON).

Euphorbia bahiensis (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Anisophyllum bahiense* Klotzsch & Garcke
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Euphorbia berteriana Spreng.

Sin.: *Anisophyllum berterianum* (Balb. ex Spreng.) Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce barberiana* Croizat, *Chamaesyce berteriana* (Spreng.) Millsp.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(PHA).

Euphorbia besseri (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Anisophyllum besseri* Klotzsch & Garcke
Hierba. Endémica.
Países: CHL

Euphorbia burkartii Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(COS, ERI).

Euphorbia caespitosa Lam.

Sin.: *Euphorbia caespitosa* Lam. subsp. *typica* Croizat, nom. inval., *Euphorbia caespitosa* Lam. subsp. *ventanicola* Croizat, *Euphorbia caespitosa* Lam. var. *ventanicola* (Croizat) Subils, *Tithymalus caespitosus* (Lam.) Soják
Hierba. Nativa. 300-600 m.
Países: ARG(BAI, COS, LPA, MEN). URY(MON, ROC).

Euphorbia catamarcensis (Croizat)

Subils
Sin.: *Chamaesyce catamarcensis* Croizat
Hierba. Endémica. 300-1800 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Euphorbia chamaerhodos Boiss.

Sin.: *Anisophyllum nanum* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce chamaerhodos* (Boiss.) Croizat, *Chamaesyce nana* (Klotzsch & Garcke) M.P. Simmons & W.J. Hayden, *Euphorbia chamaerhodos* Boiss. var. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Euphorbia macrorrhiza* Glaz., nom. nud., *Euphorbia nana* Klotzsch ex Boiss., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CON, MIE, PAI).

Euphorbia comosa Vell.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Euphorbia copiapina Phil.

Sin.: *Euphorbia calderensis* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT, ATA).

Euphorbia crypta Ewest

Hierba. Endémica. 400-500 m.

Países: CHL(ANT).

Euphorbia cyanofolia Ewest

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Euphorbia cyathophora Murray

Sin.: *Euphorbia heterophylla* L. var. *cyathophora* (Murray) Boiss., *Poinsettia cyathophora* (Murray) Bartl., *Tithymalus cyathophorus* (Murray) Moench
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT). PRY(GUA).

Euphorbia davidii Subils

Hierba. Introducida. 100-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, SLU).

Euphorbia dilloniana Haager & Sedivá

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Euphorbia dioeca Kunth

Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Euphorbia eichleri Müll. Arg.

Sin.: *Chamaesyce eichleri* (Müll. Arg.) Croizat
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Euphorbia elodes Boiss.

Hierba. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Euphorbia elquiensis Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ).

Euphorbia engelmannii Boiss.

Sin.: *Euphorbia engelmannii* Boiss. var. *depressa* Boiss., *Euphorbia hortensis* Engelm. ex Boiss., nom. nud., *Euphorbia inclinata* Boiss., nom. nud., *Euphorbia rotundifolia* Hook. & Arn., nom. illeg.
Hierba. Endémica. 900-2000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

Euphorbia falcata L.

Hierba. Introducida. - m.
Países: CHL(RME).

Euphorbia germainii Phil.

Hierba. Endémica. 1600-3200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Euphorbia graminea Jacq.

Sin.: *Adenopetalum gramineum* (Jacq.) Klotzsch & Garcke, *Agaloma graminea* (Jacq.) D.B. Ward, *Eumecanthus gramineus* (Jacq.) Millsp., *Euphorbia graminea* Jacq. var. *lancifolia* Millsp., *Euphorbia graminea* Jacq. var. *virgata* Millsp.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUU). BRA(PAR, SCA).

Euphorbia guachanca Azara

Sin.: *Euphorbia huanchahana* (Klotzsch & Garcke) Boiss., *Euphorbia huanchahana* (Klotzsch & Garcke) Boiss. subsp. *penazuelensis* Croizat, *Euphorbia huanchahana* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *peperomioides* Croizat, *Tithymalus huanchahanus* Klotzsch & Garcke
Hierba. Nativa. 2900-4300 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Euphorbia guaraniorum P. Carrillo & V.W. Steinm.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: PRY(ITA, MIE).

Euphorbia helioscopia L.

Sin.: *Euphorbion helioscopium* (L.) St.-Lag., *Galarhoeus helioscopius* (L.) Haw., *Tithymalus helioscopius* (L.) Hill
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, MIS). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, LLA, RME).

Euphorbia heterophylla L.

Sin.: *Cyathophora heterophylla* (L.) Raf., *Euphorbia aureocincta* Croizat, *Euphorbia heterophylla* L. var. *genuina* Boiss., *Poinsettia geniculata* (Ortega) Klotzsch & Garcke var. *heterophylla* (L.) Klotzsch & Garcke, *Poinsettia heterophylla* (L.) Klotzsch & Garcke, *Tithymalus heterophyllus* (L.) Haw.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI). URY(SAO).

Euphorbia hieronymi Subils

Sin.: *Euphorbia dioica* Hieron. f. *parvifolia* Hieron., *Euphorbia dioica* Hieron., nom. illeg., *Euphorbia hieronymi* Subils f. *parvifolia* (Hieron.) Oudejans, *Tithymalus hieronymi* (Subils) Soják
Hierba. Endémica. 1400-2300 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).

Euphorbia hinkleyorum I.M. Johnst.

Sin.: *Tithymalus hinkleyorum* (I.M. Johnst.) Soják
Hierba. Nativa. 2000-3300 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Euphorbia hirta L.

Sin.: *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp., *Ditrita hirta* (L.) Raf., *Euphorbia pilulifera* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl.,

Euphorbia pilulifera L. var. *hirta* (L.) Thell.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, IPA). PRY(APY, CEN).

Euphorbia hirtella Boiss.

Sin.: *Chamaesyce hirtella* (Boiss.) Croizat, *Chamaesyce lorentzii* (Müll. Arg.) Croizat, *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *lorentzii* Müll. Arg. ex Griseb., *Euphorbia hirtella* Boiss. var. *brevifolia* Müll. Arg., *Euphorbia hirtella* Boiss. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Euphorbia lorentzii* Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS).

Euphorbia hunzikeri Subils

Sin.: *Chamaesyce hunzikeri* (Subils) Holub
Hierba. Endémica. 600-2000 m.
Países: ARG(COR, LRI, SAL, TUC).

Euphorbia hypericifolia L.

Sin.: *Anisophyllum hypericifolium* (L.) Haw., *Chamaesyce glomerifera* Millsp., *Chamaesyce hypericifolia* (L.) Millsp., *Euphorbia glomerifera* (Millsp.) L.C. Wheeler
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). CHL(VAL, IPA). PRY(APY).

Euphorbia hyssopifolia L.

Sin.: *Anisophyllum hyssopifolium* (L.) Haw., *Chamaesyce brasiliensis* (Lam.) Small, *Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small, *Euphorbia brasiliensis* Lam., *Euphorbia brasiliensis* Lam. f. *pruinosa*

Chodat, *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *hyssopifolia* (L.) Boiss., *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *paraguayensis* Chodat, *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *uniflora* Chodat & Hassl., *Euphorbia hyssopifolia* L. var. *paraguayensis* (Chodat) Oudejans, *Euphorbia hyssopifolia* L. var. *pruinosa* (Chodat) Oudejans, *Euphorbia hyssopifolia* L. var. *uniflora* (Chodat & Hassl.) Oudejans

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA, PAI). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO).

Euphorbia insulana Vell.

Sin.: *Euphorbia anomala* Salzm. ex Boiss., *Euphorbia insulana* Vell. subsp. *pilcomayense* Croizat, *Euphorbia insulana* Vell. var. *pilcomayensis* (Croizat) Oudejans, *Poinsettia insulana* (Vell.) Klotzsch & Garcke

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, PHA).

Euphorbia invaginata Croizat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Euphorbia klotzschii Oudejans var. **klotzschii**

Sin.: *Anisophyllum ovalifolium* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Croizat, *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small var. *montevidensis* (Boiss.) Croizat, *Euphorbia klotzschii* Oudejans var. *argentina* (Müll. Arg. ex Griseb.)

Oudejans, *Euphorbia klotzschii* Oudejans var. *schizosepala* (Engelm. ex Boiss.) Oudejans, *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss., hom. illeg., *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *argentina* Müll. Arg. ex Griseb., *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *montevidensis* Boiss., *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *schizosepala* Engelm. ex Boiss., *Euphorbia serpens* Kunth var. *montevidensis* (Boiss.) Cabrera, *Euphorbia serpens* Kunth var. *ovalifolia* (Engelm. ex Klotzsch & Garcke) Allem

Hierba. Endémica. 300-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(APY, BOQ, ÑEE, PAI). URY(COL, MON, TAC).

Euphorbia kurtzii Subils

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COR, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC).

Euphorbia lactiflua Phil.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Euphorbia lasiocarpa Klotzsch

Sin.: *Anisophyllum lasiocarpum* (Klotzsch) Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce lasiocarpa* (Klotzsch) Arthur, *Euphorbia lasiocarpa* Klotzsch var. *subprostrata* Boiss.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Euphorbia lathyris L.

Sin.: *Epurga lathyris* (L.) Fourr., *Euphorbion lathyrum* (L.) St.-Lag., *Galarhoeus lathyris* (L.) Haw., *Keraselma lathyris* (L.) Raf., *Tithymalus lathyris* (L.) Hill

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SFE, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE).

Euphorbia lutulenta (Croizat) Oudejans

Sin.: *Chamaesyce lutulenta* Croizat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(FLA).

Euphorbia macraulonia Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Euphorbia maculata L.

Sin.: *Anisophyllum maculatum* (L.) Haw., *Chamaesyce maculata* (L.) Small, *Chamaesyce supina* (Raf.) Moldenke, *Euphorbia supina* Raf., *Tithymalus maculatus* (L.) Moench, *Xamesike maculata* (L.) Raf.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME). URY(SJO).

Euphorbia marayensis Subils

Sin.: *Chamaesyce marayensis* (Subils) Holub

Hierba. Endémica. 700-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU).

Euphorbia marginata Pursh

Sin.: *Agaloma marginata* (Pursh) Á. Löve & D. Löve, *Dichrophyllum marginatum* (Pursh) Klotzsch & Garcke, *Lepadena*

marginata (Pursh) Nieuwl., *Tithymalus marginatus* (Pursh) Cockerell
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MEN). BRA(RGS).

Euphorbia melicaea Ewest

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Euphorbia meyeniana Klotzsch

Sin.: *Chamaesyce meyeniana* (Klotzsch) Croizat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ATA). PRY(APY, PHA).

Euphorbia ophthalmica Pers.

Sin.: *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp. subsp. *procumbens* (Boiss.) Croizat, *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp. var. *procumbens* (Boiss.) Moldenke, *Chamaesyce ophthalmica* (Pers.) D.G. Burch, *Euphorbia hirta* L. var. *ophthalmica* (Pers.) Allem & Irgang, *Euphorbia hirta* L. var. *procumbens* (Boiss.) N.E. Br., *Euphorbia pilulifera* L. var. *procumbens* Boiss., *Euphorbia procumbens* DC., hom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(TAR, VAL). PRY(APY). URY(ART, MON, PAY, SAO).

Euphorbia oranensis (Croizat) Subils

Sin.: *Chamaesyce oranensis* Croizat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY).

Euphorbia ovalleana Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Euphorbia pampeana Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(CAS).

Euphorbia papillosa A. St.-Hil.

Sin.: *Euphorbia erythrorrhiza* (Klotzsch & Garcke) Boiss., *Euphorbia papillosa* A. St.-Hil. var. *cabreræ* Subils, *Euphorbia papillosa* A. St.-Hil. var. *erythrorrhiza* (Klotzsch & Garcke) Subils, *Euphorbia papillosa* A. St.-Hil. var. *minor* A. St.-Hil., *Tithymalus adrianus* Klotzsch & Garcke, *Tithymalus erythrorrhizus* Klotzsch & Garcke, *Tithymalus papillosus* (A. St.-Hil.) Soják
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, PAI). URY(SAO).

Euphorbia paranensis Dusén

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Euphorbia pedersenii Subils

Sin.: *Tithymalus pedersenii* (Subils) Soják
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS). BRA(RGS).

Euphorbia pentadactyla Griseb.

Sin.: *Poinsettia pentadactyla* (Griseb.) Dressler
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(PHA).

Euphorbia peperomioides Boiss.

Hierba. Nativa. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Euphorbia peplus L.

Sin.: *Esula peplus* (L.) Haw., *Euphorbion peplum* (L.) St.-Lag., *Galarhoeus*

peplus (L.) Haw. ex Rydb., *Keraselma peplus* (L.) Raf., *Tithymalus peplus* (L.) Hill

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE, IPA). URY(MON).

Euphorbia philippiana (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Euphorbia pygmaea* Phil., hom. illeg., *Tithymalus philippianus* Klotzsch & Garcke
Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Euphorbia platyphyllos L.

Sin.: *Galarhoeus platyphyllos* (L.) Haw., *Tithymalus platyphyllos* (L.) Hill
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(PHA).

Euphorbia porphyrantha Phil.

Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Euphorbia portulacoides L. subsp. **collina** (Phil.) Croizat

Sin.: *Euphorbia collina* Phil., *Euphorbia collina* Phil. var. *glaucescens* (Chodat & Wilczek) Subils, *Euphorbia collina* Phil. var. *minor* (Hicken) Subils, *Euphorbia collina* Phil. var. *nahuelhuapina* (Croizat) Subils, *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *nahuelhuapina* Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. var. *collina* (Phil.) Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. var. *glaucescens* Chodat & Wilczek, *Euphorbia portulacoides* L. var. *minor*

- Hicken, *Tithymalus collinus* (Phil.) Klotzsch & Garcke
Hierba. Endémica. 0-3200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).
- Euphorbia portulacoides** L. subsp. **major** (Müll. Arg.) Croizat
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *andensis* Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. var. *major* Müll. Arg.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, SAL, SLU, TUC).
- Euphorbia portulacoides** L. subsp. **portulacoides**
Sin.: *Euphorbia chilensis* Gay, *Euphorbia chrysophylla* (Klotzsch & Garcke) Boiss., *Euphorbia collina* Phil. var. *chrysophylla* (Klotzsch & Garcke) Subils, *Euphorbia collina* Phil. var. *patagonica* (Hieron.) Subils, *Euphorbia collina* Phil. var. *spathulata* (Chodat & Wilczek) Subils, *Euphorbia ipecacuanhae* L. var. *portulacoides* (L.) Boiss., *Euphorbia patagonica* Hieron., *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *major* (Müll. Arg.) Croizat var. *obtusifolia* (Müll. Arg.) Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *normalis* (Kuntze) Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. var. *acutifolia* Boiss., *Euphorbia portulacoides* L. var. *bridgesii* Boiss., *Euphorbia portulacoides* L. var. *glabra* Phil., *Euphorbia portulacoides* L. var. *normalis* Kuntze, *Euphorbia portulacoides* L. var. *obtusifolia* Müll. Arg., *Euphorbia portulacoides* L. var. *porphyrantha* Kuntze, *Euphorbia portulacoides* L. var. *spathulata* Chodat & Wilczek, *Euphorbia portulacoides* L. var. *trinervia* Boiss., *Euphorbia portulacoides* L. var. *xanthantha* Kuntze, *Tithymalus bridgesii* Klotzsch & Garcke, *Tithymalus chilensis* (Gay) Klotzsch & Garcke, *Tithymalus chrysophyllus* Klotzsch & Garcke, *Tithymalus portulacoides* (L.) Standl., *Vallaris portulacoides* (L.) Raf.
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON).
- Euphorbia potentilloides** Boiss.
Sin.: *Anisophyllum caecorum* Klotzsch & Garcke, nom. nud., *Chamaesyce caecorum* (Mart. ex Boiss.) Croizat, *Chamaesyce potentilloides* (Boiss.) Croizat, *Euphorbia caecorum* Mart. ex Boiss., *Euphorbia caecorum* Mart. ex Boiss.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, PAI). URY(RIV).
- Euphorbia prostrata** Aiton
Sin.: *Anisophyllum prostratum* (Aiton) Haw., *Aplarina prostrata* (Aiton) Raf., *Chamaesyce boliviana* (Rusby) Croizat, *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small, *Euphorbia boliviana* Rusby, *Tithymalus prostratus* (Aiton) Samp.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, SPE). URY(ART).
- Euphorbia raphilippii** Oudejans
Sin.: *Euphorbia lanceolata* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica.
- Países: CHL(COQ).
- Euphorbia rhabdodes** Boiss.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Euphorbia rochaensis** (Croizat) Alonso Paz & Marchesi
Sin.: *Chamaesyce koernerana* (Allem & Irgang) V.S. Raju & P.N. Rao, *Chamaesyce rochaensis* Croizat, *Euphorbia koernerana* Allem & Irgang
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(ROC).
- Euphorbia ruizlealii** Subils
Sin.: *Chamaesyce ruizlealii* (Subils) Holub
Hierba. Endémica. 500-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).
- Euphorbia sarcoceras** O.L.M. Silva & Cordeiro
Arbusto o hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).
- Euphorbia schickendantzii** Hieron.
Sin.: *Euphorbia evonymicarpa* Chodat & Wilczek, *Tithymalus schickendantzii* (Hieron.) Soják
Hierba. Endémica. 300-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).
- Euphorbia sciadophila** Boiss.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CHO, PAI, SPE). URY(ART).
- Euphorbia selloi** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Sin.: *Anisophyllum selloi* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce selloi* (Klotzsch

& Garcke) Croizat, *Chamaesyce selloi* (Klotzsch & Garcke) Croizat var. *brevisemina* Croizat, *Euphorbia hassleriana* Chodat, *Euphorbia hebegyne* Pax & K. Hoffm. ex Emrich, *Euphorbia setosa* (Boiss.) Müll. Arg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(GUA). URY(COL, PAY, RIV).

Euphorbia serpens Kunth

Sin.: *Anisophyllum emarginatum* Klotzsch & Garcke, *Anisophyllum serpens* (Kunth) Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce emarginata* (Klotzsch & Garcke) Croizat, *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small, *Euphorbia emarginata* (Klotzsch & Garcke) Boiss., hom. illeg., *Euphorbia serpens* Kunth var. *microphylla* Müll. Arg.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME, IPA). PRY(APY, BOQ, PHA). URY(COL, FLA, MON, PAY, RNO, TAC).

Euphorbia serpillifolia Pers.

Sin.: *Chamaesyce hirtula* (Engelm. ex S. Watson) Millsp., *Chamaesyce serpillifolia* (Pers.) Small, *Chamaesyce serpillifolia* (Pers.) Small subsp. *hirtula* (Engelm. ex S. Watson) Koutnik, *Euphorbia hirtula* Engelm. ex S. Watson, *Euphorbia serpillifolia* Pers. subsp. *hirtula* (Engelm. ex S. Watson) Oudejans, *Euphorbia serpillifolia* Pers. var. *hirtula* (Engelm. ex S. Watson) L.C. Wheeler
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SLU, TUC).

Euphorbia spathulata Lam.

Sin.: *Euphorbia dictyosperma* Fisch. & C.A. Mey., *Euphorbia pseudopeplus* Speg., *Keraselma spathulatum* (Lam.) Raf., *Tithymalus spathulatus* (Lam.) W.A. Weber
Hierba. Introducida. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, LPA, MIS, RNE). BRA(RGS, SCA). URY(MON).

Euphorbia stenophylla (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Tithymalus stenophyllus* Klotzsch & Garcke
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, RIV).
Notas: Citada para Paraguay (Govaerts et al., 2000) sin indicar localidad o material de referencia.

Euphorbia subilsiae Mayfield

Hierba. Endémica.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, SAL, SLU, SFE, TUC).

Euphorbia tarapacana Phil.

Hierba. Endémica. 100-1300 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Euphorbia terracina L.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

Euphorbia thinophila Phil.

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Euphorbia thymifolia L.

Sin.: *Anisophyllum thymifolium* (L.) Haw., *Chamaesyce portucasadiana* Croizat, *Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp., *Euphorbia portucasadiana* (Croizat) Subils

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, SAL). BRA(SCA). PRY(CEN, PHA).

Euphorbia verna Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(BIO).

Euphorbia vervoorstii Subils

Hierba. Nativa. 500-1200 m.
Países: ARG(CAT, SAL).

Gymnanthes Sw.

Gymnanthes boticario Esser, M.F.A. Lucena & M.V. Alves
Árbol o arbusto. Nativa.
Países: PRY(APY).

Gymnanthes discolor (Spreng.) Müll. Arg.

Sin.: *Gussonia discolor* Spreng., *Gymnanthes discolor* (Spreng.) Müll. Arg. var. *subconcolor* Müll. Arg., *Sebastiania discolor* (Spreng.) Müll. Arg., *Sebastiania discolor* (Spreng.) Müll. Arg. var. *fiebrigii* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania discolor* (Spreng.) Müll. Arg. var. *subconcolor* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Stillingia discolor* (Spreng.) Baill.
Arbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS). PRY(APA, CEN, COA).

Gymnanthes edwalliana (Pax & K. Hoffm.) Esser & L.S. Oliveira

Sin.: *Sebastiania edwalliana* Pax & K. Hoffm.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-600 m.
Países: PRY(APY, COA, GUA, PAI).

Gymnanthes nervosa Müll. Arg.

Sin.: *Sebastiania nervosa* (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Notas: Citada para Brasil por Goevarts et al. (2000) sin mencionar ejemplar de referencia.

Hevea Aubl.

Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.
Sin.: *Siphonia brasiliensis* Willd. ex A. Juss.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Jatropha L., nom. cons.

Jatropha breviloba (Morong) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Jatropha gossypifolia* L. var. *breviloba* Morong, *Jatropha ribifolia* (Pohl) Baill. var. *breviloba* (Morong) Pax
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). PRY(APY, AMA, CEN).

Jatropha curcas L.

Sin.: *Castiglionia lobata* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Curcas curcas* (L.) Britton & Millsp., *Manihot curcas* (L.) Crantz
Arbusto o arbolito. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(COA).

Jatropha dissecta (Chodat & Hassl.) Pax
Sin.: *Jatropha gossypifolia* L. var. *dissecta* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: BRA (RGS). PRY(AMA, CAN, CEN, COA, PAI).

Jatropha elliptica (Pohl) Oken
Sin.: *Adenoropium ellipticum* Pohl, *Jatropha eglandulosa* Pax, *Jatropha elliptica* (Pohl) Oken var. *guaranitica* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 200-400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, PAI, SPE).

Jatropha excisa Griseb.
Sin.: *Jatropha excisa* Griseb. var. *pubescens* Lourteig & O'Donnell, *Jatropha excisa* Griseb. var. *viridiflora* Lourteig & O'Donnell, *Jatropha fortunatoi* Fern. Casas, *Jatropha hippocastanifolia* Croizat
Arbusto. Nativa. 500-2200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

Jatropha flavovirens Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Jatropha matacensis* A. Cast.
Arbusto. Nativa. 600-700 m.
Países: ARG(FOR).

Jatropha gossypifolia L.
Sin.: *Adenoropium elegans* Pohl, *Jatropha elegans* (Pohl) Klotzsch, *Jatropha gossypifolia* L. var. *elegans* (Pohl) Müll. Arg., *Manihot gossypifolia* (L.) Crantz
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(SDE). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, MIE, NAS).

Jatropha grossidentata Pax & K. Hoffm.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL). PRY(APY, PHA).

Jatropha guaranitica Speg.
Sin.: *Jatropha guaranitica* Speg. var. *stipularis* Pax & K. Hoffm., *Jatropha*

katharinae Pax, *Jatropha ribifolia* (Pohl) Baill. var. *ambigua* Pax, *Jatropha tacumbensis* Pax & K. Hoffm.
Hierba. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, PHA).

Jatropha hieronymi Kuntze

Sin.: *Jatropha paraguayensis* Radcl.-Sm. & Govaerts, *Jatropha ricinifolia* Pax, hom. illeg.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CHO, CON, PHA).

Jatropha intermedia (Chodat & Hassl.) Pax

Sin.: *Jatropha gossypifolia* L. f. *glabrata* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. var. *intermedia* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, COA, ITA, SPE).

Jatropha isabellei Müll. Arg.

Sin.: *Jatropha antisiphilitica* Speg., *Jatropha gossypifolia* L. var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. var. *palmata* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. var. *rhombifolia* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. var. *typica* Chodat & Hassl., nom. inval., *Jatropha isabellei* Müll. Arg. var. *antisiphilitica* (Speg.) Pax, *Jatropha isabellei* Müll. Arg. var. *cuneifolia* Pax, *Jatropha isabellei* Müll. Arg. var. *grandifolia* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha isabellei* Müll. Arg. var. *guaranitica* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha isabellei* Müll. Arg. var. *palmata* (Chodat & Hassl.) Pax,

Jatropha isabellei Müll. Arg. var. *rhombifolia* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha puncticulata* Pax & K. Hoffm., *Jatropha rigidifolia* Pax & K. Hoffm., *Jatropha rigidifolia* Pax & K. Hoffm. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm.
Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, COA, MIE, PAI, SPE).

Jatropha macrocarpa Griseb.
Sin.: *Jatropha multiflora* Pax & K. Hoffm., *Jatropha papyrifera* Pax & K. Hoffm.
Arbusto. Nativa. 100-1600 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(APY).

Jatropha multifida L.
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(PAI).

Jatropha pedersenii Lourteig
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(ITA, MIE).

Jatropha peiranoi Lourteig & O'Donnell
Sin.: *Jatropha chacoana* Fern. Casas
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill.
Sin.: *Adenoropium ribifolium* Pohl, *Jatropha bornmuelleri* Pax
Arbusto. Nativa. 500 m.
Países: BRA(RGS).

Jatropha weddeliana Baill.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CAU, CON).

Mabea Aubl.

Mabea fistulifera Mart. subsp. **robusta** Emmerich
Arbusto. Nativa. 200-600 m.
Países: PRY(AMA).

Manihot Mill.

Manihot anisophylla (Griseb.) Müll. Arg.
Sin.: *Janipha anisophylla* Griseb., *Manihot carthagenensis* (Jacq.) Müll. Arg. var. *anisophylla* (Griseb.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 400-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, PHA).

Manihot anomala Pohl subsp. **anomala**
Sin.: *Manihot katharinae* Pax, *Manihot variifolia* Pax
Arbusto. Endémica. 200-700 m.
Países: PRY(AMA).

Manihot anomala Pohl subsp. **glabrata** (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot glabrata* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Manihot langsdorfii* Müll. Arg. var. *glabra* Chodat & Hassl., *Manihot multiflora* Pax & K. Hoffm., *Manihot pseudoheterophylla* Pax & K. Hoffm., *Manihot pubescens* Pohl f. *glabrata* Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, PAI, SPE).

Manihot anomala Pohl subsp. **pavoniana** (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot pavoniana* Müll. Arg., *Manihot weberbaueri* Pax & K. Hoffm.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, TUC).

Manihot caerulea Pohl emend. D.J. Rogers & Appan subsp. **macrantha** (Pax & K. Hoffm.) D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot macrantha* Pax & K. Hoffm., *Manihot speciosa* Chodat & Hassl., nom. illeg.
Arbusto o árbol. Endémica. 100-700 m.
Países: PRY(APA, APY, AMA, CAN).

Manihot esculenta Crantz
Sin.: *Manihot flabellifolia* Pohl
Subarbusto. Introducida. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). PRY(AMA, GUA, PAI, PHA).

Manihot gracilis Pohl
Sin.: *Manihot depauperata* Pax
Subarbusto. Nativa. 200-600 m.
Países: PRY(AMA).

Manihot grahamii Hook.
Sin.: *Manihot enneaphylla* Pax & K. Hoffm., *Manihot lobata* (Chodat & Hassl.) Pax, *Manihot tweedieana* Müll. Arg., *Manihot tweedieana* Müll. Arg. f. *nana* Chodat & Hassl., *Manihot tweedieana* Müll. Arg. var. *lobata* Chodat & Hassl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA, MON, RIV, SAO, TAC, TYT).

Manihot guaranitica Chodat & Hassl.
Sin.: *Janipha violacea* Griseb., *Manihot anisitsii* Pax & K. Hoffm., *Manihot fiebrigii* Pax & K. Hoffm., *Manihot grandistipula* Pax & K. Hoffm., *Manihot recognita* Pax
Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, COA, PHA).

Manihot hassleriana Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Manihot hunzikeriana Mart. Crov.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(APA, CAU, CAA, CAN).

Manihot inflata Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Manihot mirabilis Pax

Arbolito. Endémica. 200-700 m.
Países: PRY(AMA).

Manihot neusana Nassar

Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Manihot pentaphylla Pohl subsp.
graminifolia (Chodat & Hassl.) D.J.
Rogers & Appan

Sin.: *Manihot graminifolia* Chodat & Hassl.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 100-700 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Manihot populifolia Pax

Sin.: *Manihot cordifolia* Pax
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON).

Manihot procumbens Müll. Arg.

Sin.: *Manihot meeboldii* Pax, *Manihot procumbens* Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN, SPE).

Manihot takape De Egea & Peña-Chocarro

Subarbusto. Endémica.
Países: PRY(APY, PHA).

Manihot tenella Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 600-700 m.
Países: PRY(AMA).

Manihot tripartita (Spreng.) Müll. Arg.

Sin.: *Jatropha tripartita* Spreng., *Manihot tripartita* (Spreng.) Müll. Arg. var. *apaensis* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Nativa. 200-700 m.
Países: PRY(AMA).

Maprounea Aubl.

Maprounea brasiliensis A. St.-Hil.

Sin.: *Stillingia hilariana* Baill.
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Maprounea guianensis Aubl.

Árbol. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR).

Mercurialis L.

Mercurialis annua L.

Sin.: *Synema annuum* (L.) Dulac
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MEN, TDF).
CHL(ANT, VAL).

Microstachys A. Juss.

Microstachys corniculata (Vahl) Griseb.

Sin.: *Microstachys bicornis* A. Juss.,
Sebastiania corniculata (Vahl) Müll.
Arg., *Sebastiania corniculata* (Vahl)

Müll. Arg. var. *hassleriana* Chodat,
Tragia corniculata Vahl

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, ITA).

Microstachys dasycarpa Pscheidt, Esser
& Cordeiro

Subarbusto. Endémica.
Países: PRY(APY).

Microstachys hispida (Mart.) F. Dietr.

Sin.: *Cnemidostachys hispida* Mart.,
Sebastiania corniculata (Vahl) Müll.
Arg. var. *paraguayensis* Chodat,
Sebastiania hispida (Mart.) Pax,
Sebastiania hispida (Mart.) Pax var.
aspera Pax & K. Hoffm., *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax var. *graciliramea* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax var. *paraguayensis* (Chodat) Pax & K. Hoffm.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COR, COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CON, COA, ITA, PHA, SPE).

Microstachys nana M.J. Silva & Esser

Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Microstachys serrulata (Mart.) Müll. Arg.

Sin.: *Cnemidostachys serrulata* Mart.,
Sebastiania serrulata (Mart.) Müll. Arg.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, ITA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Microstachys stipulacea (Müll. Arg.)
Esser & M.J. Silva

Sin.: *Gymnanthes stipulacea* Müll. Arg.,
Sebastiania stipulacea (Müll. Arg.)
Müll. Arg., *Stillingia stipulacea* (Müll.
Arg.) Baill.
Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Ophthalmoblapton Allemão

Ophthalmoblapton crassipes Müll. Arg.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Pachystroma Müll. Arg.

Pachystroma longifolium (Nees) I.M. Johnst.

Sin.: *Ilex longifolia* Nees, *Pachystroma ilicifolium* Müll. Arg., *Pachystroma ilicifolium* Müll. Arg. var. *ellipticum* Müll. Arg., *Pachystroma longifolium* (Nees) I.M. Johnst. var. *ellipticum* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & Downs

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pausandra Radlk.

Pausandra morisiana (Casar.) Radlk.

Sin.: *Thouinia morisiana* Casar.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Philyra Klotzsch

Philyra brasiliensis Klotzsch

Sin.: *Argythamnia brasiliensis* (Klotzsch) Müll. Arg., *Ditaxis brasiliensis* (Klotzsch) Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI).

Ricinus L.

Ricinus communis L.

Sin.: *Ricinus communis* L. var. *americanus* Müll. Arg., *Ricinus communis* L. var. *genuinus* Müll. Arg., *Ricinus communis* L. var. *typicus* Fiori, nom. inval.

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI). URY(MON).

Romanoa Trevis.

Romanoa tamnoides (A. Juss.) Radcl.-Sm.

Sin.: *Anabaena tamnoides* A. Juss., *Anabaenella tamnoides* (A. Juss.) Pax & K. Hoffm., *Anabaenella tamnoides* (A. Juss.) Pax & K. Hoffm. var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval.

Hierba voluble. Nativa. 200-700 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Sapium Jacq., nom. cons.

Sapium glandulosum (L.) Morong

Sin.: *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. f. *oblongata* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. f. *obovata* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. var. *aucuparia* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. var. *glandulata* (Vell.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. var. *klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg.

var. *leptadenia* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. var. *montevidensis* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. var. *petiolaris* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. var. *serrata* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria occidentalis* Müll. Arg., *Hippomane aucuparia* Crantz, *Hippomane biglandulosa* L., nom. illeg., *Hippomane glandulosa* L., *Omphalea glandulata* Vell., *Sapium aucuparium* Jacq., *Sapium aucuparium* Jacq. var. *petiolare* (Müll. Arg.) Griseb., *Sapium aucuparium* Jacq. var. *salicifolium* (Kunth) Griseb., *Sapium biglandulosum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* Müll. Arg. f. *oblongatum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* Müll. Arg. f. *obovatum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* Müll. Arg. var. *aucuparium* (Jacq.) Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* Müll. Arg. var. *klotzschianum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* Müll. Arg. var. *serratum* Müll. Arg., *Sapium cremostachyum* (Baill.) I.M. Johnst., *Sapium fragile* Pax & K. Hoffm., *Sapium glandulatum* (Vell.) Pax, *Sapium haemospermum* Müll. Arg. var. *saltensis* O'Donnell & Lourteig, *Sapium ixiamasense* Jabl., *Sapium klotzschianum* (Müll. Arg.) Huber, *Sapium leptadenium* (Müll. Arg.) Huber, *Sapium montevidense* (Müll. Arg.) Huber, *Sapium montevidense* Klotzsch ex Baill., *Sapium muelleri* Hemsl., *Sapium occidentale* (Müll. Arg.) Huber, *Sapium paranaense* Pax & K. Hoffm., *Sapium salicifolium* Kunth, *Sapium saltense* (O'Donnell ex Lourteig) Jabl., nom. illeg., *Sapium serratum* (Müll. Arg.) Klotzsch ex Baill., *Sapium submarginatum* Huber, *Stillingia aucuparia* Oken, *Stillingia biglandulosa* Baill., *Stillingia cremostachya* Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, ITA). URY(MON, ROC, SOR, TAC, TYT).

Sapium haematospermum Müll. Arg.

Sin.: *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. f. *longifolia* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. f. *squarrosa* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. var. *angustifolia* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. var. *longifolia* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. var. *squarrosa* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* Müll. Arg. var. *stenophylla* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria haematosperma* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria marginata* Kuntze ex Baill. f. *stenophylla* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria tijucensis* Müll. Arg., *Sapium aucuparium* Jacq. var. *stenophyllum* (Müll. Arg.) Griseb., *Sapium biglandulosum* Müll. Arg. f. *longifolia* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* Müll. Arg. f. *longissimum* Chodat & Hassl., *Sapium biglandulosum* Müll. Arg. f. *squarrosus* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* Müll. Arg. var. *longifolia* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* Müll. Arg. var. *stenophyllum* Müll. Arg., *Sapium bolivianum* Pax & K. Hoffm., *Sapium cupuliferum* Herzog, hom. illeg., *Sapium gibertii* Hemsl., *Sapium haematospermum* Müll. Arg. f. *arboreum* Chodat & Hassl., *Sapium linearifolium* Hemsl., *Sapium longifolium* (Müll. Arg.) Huber, *Sapium marginatum* Müll. Arg. f. *stenophyllum* Müll. Arg., *Sapium rojasii* H. Lév., *Sapium stenophyllum* (Müll. Arg.) Huber, *Sapium tijucensis* (Müll. Arg.)

Huber, *Stillingia sylvatica* L. var. *paraguayensis* Morong

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, PAY, RIV, SAO).

Sapium obovatum Klotzsch ex Müll. Arg.

Sin.: *Excoecaria obovata* (Klotzsch ex Müll. Arg.) Müll. Arg., *Sapium hasslerianum* Huber, nom. illeg., *Sapium marginatum* Müll. Arg. var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Sapium obovatum* Klotzsch ex Müll. Arg. var. *ellipticum* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 100-700 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Sebastiania Spreng.

Sebastiania klotzschiana (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Sin.: *Actinostemon unciformis* Jabl., *Adenogyne brachyclada* (Müll. Arg.) Klotzsch, *Adenogyne marginata* Klotzsch, nom. nud., *Excoecaria marginata* Kuntze ex Baill., *Gymnanthes brachyclada* Müll. Arg., *Gymnanthes klotzschiana* Müll. Arg., *Gymnanthes marginata* Baill., *Gymnanthes ypanemensis* Müll. Arg., *Sebastiania argutidens* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania brachyclada* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Sebastiania commersoniana* (Baill.) L.B. Sm. & Downs, *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *brachyclada* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Sebastiania klotzschiana*

(Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *trichoneura* Müll. Arg., *Sebastiania ypanemensis* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Stillingia commersoniana* Baill., *Stillingia ypanemensis* (Müll. Arg.) Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA, ÑEE, PAI). URY(COL, CLA, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Sebastiania longispicata Pax & K. Hoffm.

Arbusto o árbol. Endémica. 200-700 m.

Países: PRY(AMA).

Sebastiania pachyphylla Pax & K. Hoffm.

Arbusto o árbol. Endémica. 100-500 m.

Países: PRY(CAN).

Sebastiania pusilla Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(ART, PAY, SAO).

Sebastiania ramosissima (A. St.-Hil.) A.L. Melo & M.F. Sales

Sin.: *Actinostemon anisandrus* (Griseb.) Pax, *Actinostemon luquensis* Morong, *Dactylostemon anisandrus* Griseb., *Microstachys ramosissima* A. St.-Hil., *Sebastiania anisandra* (Griseb.) Lillo, *Sebastiania brasiliensis* Spreng. var. *brachystachya* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania brasiliensis* Spreng. var. *brevispicata* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania brasiliensis* Spreng. var. *genuina* Pax, nom. inval., *Sebastiania brasiliensis* Spreng. var. *ramosissima* (A. St.-Hil.) Müll. Arg., *Sebastiania*

rhombofolia Müll. Arg., *Stillingia ramosissima* (A. St.-Hil.) Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(DUR, MAL, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

Notas: Citada para Chile sin indicar material de referencia. (de Melo et al., 2020)

Sebastiania riparia Schrad.

Sin.: *Excoecaria subulata* Müll. Arg., *Sapium subulatum* (Müll. Arg.) Chodat & Hassl., *Sebastiania subulata* (Müll. Arg.) Pax

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA, PAI).

Sebastiania schottiana (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Sin.: *Excoecaria hippophaifolia* Griseb., *Gymnanthes angustifolia* Müll. Arg., *Gymnanthes schottiana* Müll. Arg., *Sebastiania hippophaifolia* (Griseb.) Pax & K. Hoffm., *Sebastiania schottiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *angustifolia* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia schottiana* (Müll. Arg.) Baill.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, PAI). URY(PAY, RIV, ROC, SAO, SOR).

Sebastiania serrata (Baill. ex Müll. Arg.) Müll. Arg.

Sin.: *Gymnanthes serrata* Baill. ex Müll. Arg., *Gymnanthes serrata* Baill. ex Müll. Arg. var. *glabra* Müll. Arg., *Gymnanthes serrata* Baill. ex Müll. Arg. var. *pubescens* Müll. Arg.,

Sebastiania grandifolia (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Sebastiania serrata* (Baill. ex Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Stillingia serrata* (Baill. ex Müll. Arg.) Klotzsch ex Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, PAI). URY(COL, RIV, SAO, TAC).

Sebastiania subsessilis (Müll. Arg.) Pax

Sin.: *Excoecaria subsessilis* Müll. Arg., *Sapium subsessile* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(CAA, MIE).

Spegazziniophytum Esser

Spegazziniophytum patagonicum (Speg.) Esser

Sin.: *Colliguaja patagonica* Speg., *Sapium patagonicum* (Speg.) D.J. Rogers, *Stillingia patagonica* (Speg.) Pax & K. Hoffm.

Arbusto. Endémica. 100-2100 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Stillingia Garden ex L.

Stillingia bodenbenderi (Kuntze) D.J. Rogers

Sin.: *Excoecaria bodenbenderi* (Kuntze) K. Schum., *Sapium bodenbenderi* Kuntze, *Sapium subsessile* Hemsl., *Stillingia dusenii* Pax & K. Hoffm.

Arbusto o arbolito. Nativa. 900-1400 m.

Países: ARG(COR). BRA(PAR).

Stillingia oppositifolia Baill. ex Müll. Arg. Arbusto o árbol. Nativa. 600-1000 m. Países: BRA(RGS).

Stillingia salpingadenia (Müll. Arg.) Huber

Sin.: *Excoecaria salpingadenia* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Sapium cupuliferum* Hemsl., *Sapium salpingadenium* Müll. Arg., *Sapium salpingadenium* Müll. Arg. var. *salicina* Chodat & Hassl., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber subsp. *anadena* Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber subsp. *saxatilis* Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *angustior* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *cupulifera* (Hemsl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *elliptica* Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *grandifolia* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *salicina* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. f. *angustior* Chodat & Hassl., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. f. *latior* Chodat & Hassl., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. var. *salicifolia* Chodat & Hassl., *Stillingia scutellifera* D.J. Rogers

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Stillingia tenella (Pax & K. Hoffm.) Esser

Sin.: *Sapium tenellum* Pax & K. Hoffm., *Stillingia yungasensis* Belgrano & Pozner

Arbusto o arbolito. Nativa. 1300-1700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Tetrorchidium Poepp.

Tetrorchidium rubrivenium Poepp.

Sin.: *Tetrorchidium dusenii* Pax & K. Hoffm.
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA).

Tragia L.

Tragia bahiensis Müll. Arg.

Sin.: *Tragia bahiensis* Müll. Arg. var. *flexuosa* Pax & K. Hoffm., *Tragia depauperata* Pax & K. Hoffm., *Tragia emrichii* Herter, *Tragia lagoensis* Müll. Arg.
 Hierba. Nativa. 0-700 m.
 Países: ARG(COS, ERI, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CON). URY(RIV).

Tragia caperonioides Pax & K. Hoffm.

Hierba voluble. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(APY).

Tragia chlorocaulon Baill.

Sin.: *Tragia adenophilla* Pax & K. Hoffm. var. *ferruginea* Pax & K. Hoffm., *Tragia adenophilla* Pax & K. Hoffm. var. *mollis* Pax & K. Hoffm., *Tragia tristis* Müll. Arg. f. *subvolubilis* Chodat & Hassl., *Tragia tristis* Müll. Arg. f. *volubilis* Chodat & Hassl.
 Hierba voluble. Nativa. 0-700 m.
 Países: PRY(AMA, CAU, CEN, COA).

Tragia dodecandra Griseb.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COR, LRI, SDE, SLU).

Tragia friesii Pax & K. Hoffm.

Hierba voluble. Nativa. 500-1500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Tragia geraniifolia Klotzsch ex Baill.

Sin.: *Tragia geraniifolia* Klotzsch ex Baill. var. *multifida* Griseb.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, ÑEE). URY(ART, COL, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Tragia giardelliae M.M. Gut. & Múlgura

Hierba voluble. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

Tragia hassleriana Chodat

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
 Países: PRY(CAN).

Tragia hieronymi Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Tragia oligantha* Pax & K. Hoffm., *Tragia tenella* Pax & K. Hoffm.
 Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Tragia incana Klotzsch ex Baill.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MON, RIV, ROC, TAC).

Tragia melochioides Griseb.

Sin.: *Tragia bangii* Rusby, *Tragia micrococca* Pax & K. Hoffm., *Tragia pseudomelochioides* Pax & K. Hoffm.
 Subarbusto. Nativa. 0-2600 m.
 Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN, CON, GUA, PAI, SPE). URY(RNO, SOR).

Tragia paxii Lourteig & O'Donnell

Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(GUA, PAI).

Tragia pinnata (Poir.) A. Juss.

Sin.: *Acalypha pinnata* Poir.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, FLA, MAL, MON, SOR).

Tragia polyandra Vell.

Sin.: *Leptorhachis hastata* Klotzsch, *Tragia emilii* Pax & K. Hoffm., *Tragia hastata* (Klotzsch) Müll. Arg.
 Hierba voluble. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA).

Tragia uberabana Müll. Arg. var. **discolor** Chodat & Hassl.

Sin.: *Tragia bahiensis* Müll. Arg. var. *subsessilis* Chodat & Hassl., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *canescens* Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *discolor* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *subsessilis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Tragia websteri* Allem & Waetcher
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, MIS).

Tragia uberabana Müll. Arg. var. **uberabana**

Sin.: *Tragia arechavaletae* Herter ex Arechav., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *macrophylla* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Tragia uberabana* Müll. Arg. var. *macrophylla*

Chodat & Hassl., *Tragia wingei* Allem & Waetcher

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CON, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, LAV, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Tragia volubilis L.

Sin.: *Tragia diffusa* Vell., *Tragia pedicellaris* Müll. Arg., *Tragia triangularis* Vell., *Tragia volubilis* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Tragia volubilis* L. var. *pedicellaris* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.

Hierba voluble. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CON, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RIV, TYT).

Vernicia Lour.

Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw

Sin.: *Aleurites fordii* Hemsl.

Árbol. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(MIS). PRY(ITA).

FABACEAE

Abrus Adans.

Abrus precatorius L.

Liana. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acacia Mill.

Acacia mangium Willd.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acaciella Britton & Rose

Acaciella angustissima (Mill.) Britton & Rose

Sin.: *Acacia angustissima* (Mill.) Kuntze, *Acacia boliviana* Rusby, *Mimosa angustissima* Mill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Acosmium Schott

Acosmium cardenasii H.S. Irwin & Arroyo

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Adenocarpus DC.

Adenocarpus complicatus (L.) A. Gray

Sin.: *Spartium complicatum* L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: URY(RIV).

Adesmia DC., nom. cons.

Adesmia aconcaguensis Burkart

Hierba. Endémica. 3200-4800 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Adesmia acuta Burkart

Sin.: *Adesmia acuta* Burkart f. *choiquesica*

Burkart

Subarbusto. Endémica. 1700-2800 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Adesmia adrianii M.N. Correa

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

Adesmia aegiceras Phil.

Sin.: *Adesmia glanduligera* I.M. Johnst., *Adesmia remyana* Phil., *Adesmia subumbellata* Phil., *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. var. *remyana* (Phil.) Burkart, *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. var. *robustior* Hook. & Arn., *Patagonium aegiceras* (Phil.) Kuntze, *Patagonium aegiceras* (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Patagonium trijugum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *remyanum* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémica. 1500-3800 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, RME).

Adesmia ameghinoi Speg.

Sin.: *Patagonium ameghinoi* (Speg.) Speg.
Subarbusto. Endémica. 200-900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Adesmia aphanantha Speg.

Sin.: *Patagonium aphananthum* (Speg.) Speg.
Hierba. Endémica. 200-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Adesmia aphylla Clos

Sin.: *Patagonium aphyllum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia arachnipes Clos

Sin.: *Adesmia oresigena* Phil., *Patagonium arachnipes* (Clos) Kuntze, *Patagonium oresigenum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 1600-3500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Adesmia araucana Phil.

Sin.: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 800-1500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

Adesmia araujoi Burkart

Hierba. Endémica. 700-1400 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adesmia arenicola (R.E. Fr.) Burkart

Sin.: *Patagonium arenicola* R.E. Fr.
 Arbusto. Endémica. 3000-3500 m.
 Países: ARG(JUU).

Adesmia argentea Meyen

Sin.: *Adesmia cinerea* Clos, *Patagonium argenteum* (Meyen) Kuntze, *Patagonium cinereum* (Clos) Kuntze
 Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
 Países: CHL(TAR, ATA, COQ, VAL).

Adesmia argyrophylla Phil.

Sin.: *Adesmia divaricata* Phil., nom. nud., *Adesmia furcata* Phil., *Adesmia kingii* Phil., *Adesmia sessiliflora* Phil., *Patagonium argyrophyllum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium kingii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium sessiliflorum* (Phil.) Kuntze
 Arbusto. Endémica. 200-2800 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia arillata Miotto

Hierba subleñosa. Endémica. 900-1200 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Adesmia aromatica Burkart

Arbusto. Endémica. 1100-1300 m.
 Países: CHL(COQ).

Adesmia aspera Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium asperum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium*

mucronatum (Hook. & Arn.) Kuntze
 var. *asperum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
 Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
 Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Adesmia atacamensis Phil.

Sin.: *Adesmia glandulosa* Phil., *Patagonium atacamense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium glandulosum* (Phil.) Kuntze
 Arbusto. Endémica. 2500-3300 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Adesmia auri Burkart

Subarbusto. Endémica. 200-1500 m.
 Países: ARG(NEU, RNE, SCR).

Adesmia aurantiaca (Dusén) Burkart

Sin.: *Adesmia pumila* Hook. f. var. *aurantiaca* Dusén
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Adesmia australis Ulibarri & B.B. Simpson

Subarbusto. Endémica. 600-800 m.
 Países: ARG(SCR).

Adesmia balsamica Bertero ex Colla

Sin.: *Patagonium balsamicum* (Bertero ex Colla) Kuntze
 Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Adesmia bedwellii Skottsb.

Arbusto. Endémica. 200-700 m.
 Países: CHL(COQ, RME).

Adesmia bicolor (Poir.) DC.

Sin.: *Adesmia glabriuscula* Vogel, *Adesmia pendula* (Poir.) DC., *Adesmia radicans* Clos, hom. illeg., *Hedysarum bicolorum* Poir., *Hedysarum pendulum* Poir., *Patagonium bicolor* (Poir.)

Kuntze, *Patagonium glabriusculum* (Vogel) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2200 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, MIS, RNE, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO, ARA, RME). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

Adesmia bijuga Phil.

Sin.: *Patagonium bijugum* (Phil.) Reiche
 Arbusto. Endémica. 200-400 m.
 Países: CHL(MAU).

Adesmia boelckeana Burkart

Subarbusto. Endémica. 1200-1500 m.
 Países: ARG(NEU).

Adesmia bonariensis Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI). URY(LAV).

Adesmia boronioides Hook. f.

Sin.: *Patagonium boronioides* (Hook. f.) Kuntze
 Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Adesmia brachysemone Phil.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.
 Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Adesmia bracteata Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium bracteatum* (Hook. & Arn.) Kuntze
 Arbusto. Endémica. 1200-2600 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, RME).

Adesmia brevivexillata Burkart

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
 Países: CHL(VAL, BIO, ARA, RME).

Adesmia burkartii M.N. Correa
Hierba. Endémica. 1200-1500 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Adesmia calycicomosa Burkart
Arbusto. Endémica. 1100-1400 m.
Países: CHL(COQ).

Adesmia candida Hook. f. var. **cabreræ**
(Burkart) Ulibarri & Burkart
Sin.: *Adesmia cabreræ* Burkart
Subarbusto. Endémica. 1000- m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Adesmia candida Hook. f. var. **candida**
Sin.: *Adesmia canescens* (A. Gray) Speg.,
hom. illeg., *Patagonium candidum*
(Hook. f.) Macloskie, *Streptodesmia*
canescens A. Gray
Subarbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,
RNE, SCR).

Adesmia capitellata (Clos) Hauman
Sin.: *Adesmia oligophylla* Phil., *Hosackia*
capitellata (Clos) Brand, *Lotus*
capitellatus Clos, *Patagonium*
oligophyllum (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2300-4200 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Adesmia ciliata Vogel
Sin.: *Adesmia ciliata* Vogel var.
graminetorum Burkart, *Patagonium*
ciliatum (Vogel) Kuntze
Hierba. Endémica. 700-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adesmia colinensis (Phil. ex Reiche)
Martic.
Sin.: *Patagonium colinense* Phil. ex
Reiche
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Adesmia coluteoides Gillies ex Hook. &
Arn.
Arbusto. Endémica. 1500-1900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL).

Adesmia conferta Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia brachycarpa* Phil., *Adesmia*
izquierdi Phil. ex Reiche, *Adesmia*
stipulacea Clos, *Adesmia venosa* Phil.,
nom. nud., *Patagonium brachycarpum*
(Phil.) Kuntze, *Patagonium confertum*
(Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium*
stipulaceum (Clos) Kuntze,
Patagonium venosum Reiche
Hierba. Endémica. 100-1800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Adesmia confusa Ulibarri
Sin.: *Adesmia arborea* Bertero ex Clos,
hom. illeg., *Adesmia berteroniana*
Steud., nom. nud., *Patagonium*
arboreum Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Adesmia coquimbensis Burkart
Arbusto. Endémica. 1900- m.
Países: CHL(COQ).

Adesmia cordobensis Burkart var.
appendiculata Ulibarri & Burkart
Subarbusto. Endémica. 900-1100 m.
Países: ARG(SLU).

Adesmia cordobensis Burkart var.
cordobensis
Sin.: *Adesmia comechingona* C.A. Bianco
& Weberling
Subarbusto. Endémica. 900-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL).

Adesmia coronilloides Gillies ex Hook. &
Arn.
Sin.: *Adesmia atuelensis* Burkart,
Adesmia codonocalyx G.F. Grandjot &

K. Grandjot, *Adesmia germainii* Phil.,
Adesmia glauca Phil., *Patagonium*
coronilloides (Gillies ex Hook. & Arn.)
Kuntze, *Patagonium coronilloides*
(Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var.
glaucum (Phil.) Reiche, comb. superfl.,
Patagonium coronilloides (Gillies ex
Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl.,
Patagonium germainii (Phil.) Kuntze,
Patagonium germainii (Phil.) Reiche,
comb. superfl., *Patagonium glaucum*
(Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2200-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(MAU, RME).

Adesmia corymbosa Clos var.
corymbosa
Sin.: *Adesmia aucaensis* Burkart,
Adesmia dubia M.N. Correa, *Adesmia*
fernandezii Phil., *Adesmia glandulifera*
(Rendle) Skottsb., *Adesmia palenae*
Phil., *Adesmia subsericea* (Chodat &
Wilczek) Hauman, *Adesmia*
subsericea (Chodat & Wilczek)
Hauman var. *nigro-punctata* Hauman,
Adesmia tenuis Phil., *Adesmia vallis-*
pulchrae Phil., nom. nud., *Patagonium*
corymbosum (Clos) Kuntze,
Patagonium glanduliferum Rendle,
Patagonium palenae (Phil.) Reiche,
Patagonium subsericeum Chodat &
Wilczek, *Patagonium vallis-pulchrae*
Reiche
Hierba. Endémica. 200-3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,
RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU,
ARA, AIS, MAG).

Adesmia corymbosa Clos var.
sinepenna Ulibarri & Burkart
Hierba. Endémica. 800-3500 m.
Países: ARG(SCR).

Adesmia crassicaulis Phil.
Sin.: *Patagonium crassicaule* (Phil.)
Reiche

Subarbusto. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
Notas: Probablemente en el norte de Chile

Adesmia cuneata Meyen

Sin.: *Patagonium cuneatum* (Meyen) Kuntze
Hierba. Endémica. 2100-2800 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Adesmia curvifolia Clos

Sin.: *Patagonium curvifolium* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia cytisoides Griseb.

Sin.: *Adesmia caragana* Griseb., *Adesmia cytisoides* Griseb. var. *oleae* Burkart, *Adesmia cytisoides* Griseb. var. *pugionata* (Griseb.) Burkart, *Adesmia pugionata* Griseb., *Patagonium cytisoides* (Griseb.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Adesmia darapskyana (Phil. ex Reiche) Martic.

Sin.: *Patagonium darapskyanum* Phil. ex Reiche
Hierba o subarbusto. Endémica. 2300-2800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Adesmia davilae Phil.

Sin.: *Patagonium davilae* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2000- m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Adesmia denticulata Clos

Sin.: *Patagonium denticulatum* (Clos) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-1600 m.
Países: CHL(MAU, ARA).

Adesmia denudata Phil.

Sin.: *Patagonium denudatum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2300- m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia dessaueri (Phil. ex Reiche) Ulibarri

Sin.: *Patagonium dessaueri* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA, LBO).

Adesmia dichotoma Clos

Sin.: *Patagonium cinereum* (Clos) Kuntze var. *dichotomum* (Clos) Reiche, *Patagonium dichotomum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 900-2800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Adesmia digitata Burkart

Subarbusto. Endémica. 2800-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Adesmia disperma Phil.

Sin.: *Patagonium dispernum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Adesmia dumosa Phil.

Sin.: *Patagonium dumosum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ, RME).

Adesmia echinus C. Presl

Sin.: *Adesmia gayana* Phil., *Patagonium echinus* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium gayanum* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 2800-4400 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU).

Adesmia elata Clos

Sin.: *Patagonium elatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elatum* (Clos) Reiche, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *macrostachyum* Phil. ex Reiche
Hierba. Endémica. 700-1300 m.
Países: CHL(ATA, COQ, MAU, BIO, ARA, LSR, AIS).

Adesmia elegans Clos

Sin.: *Patagonium elegans* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Adesmia emarginata Clos

Sin.: *Patagonium emarginatum* (Clos) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 200-2700 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI).

Adesmia eremophila Phil.

Sin.: *Adesmia latistipula* Phil. ex Reiche, *Patagonium eremophilum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium latistipula* Phil. ex Reiche
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Adesmia erinacea Phil.

Sin.: *Adesmia senticula* Phil., *Patagonium erinaceum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium erinaceum* (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Patagonium senticulum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 2500-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
CHL(TAR, ANT, ATA, MAU).

Adesmia exilis Clos

Sin.: *Adesmia berteroi* Phil. ex Kuntze, nom. nud., *Adesmia decumbens* Phil., *Adesmia decumbens* Phil. var. *berteroi* Phil. ex G.F. Grandjot & K. Grandjot,

- Adesmia humifusa* Phil., *Adesmia inconspicua* Phil., *Adesmia tristis* Hauman, *Adesmia valdesia* Clos, *Patagonium berteroi* (Kuntze) Speg., *Patagonium confertum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *berteroi* Kuntze, *Patagonium decumbens* (Phil.) Kuntze, *Patagonium exile* (Clos) Kuntze, *Patagonium humifusum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium inconspicuum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium triste* Chodat & Wilczek, hom. illeg., *Patagonium valdesia* (Clos) Kuntze
Hierba. Endémica. 1400-3300 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Adesmia filicaulis** Phil.
Sin.: *Patagonium filicaule* (Phil.) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze var. *filicaule* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: CHL(BIO, ARA).
- Adesmia filifolia** Clos
Sin.: *Patagonium filifolium* (Clos) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).
- Adesmia filipes** A. Gray
Sin.: *Adesmia filipes* A. Gray var. *obcordata* Hicken, *Adesmia filipes* A. Gray var. *obtusifolia* Speg., *Patagonium filipes* (A. Gray) Speg.
Hierba. Endémica. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR).
- Adesmia friesii** Burkart ex Ulibarri
Arbusto. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Adesmia frigida** Phil.
Sin.: *Adesmia adenophora* Phil., *Patagonium adenophorum* (Phil.) Reiche, *Patagonium frigidum* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 1900-4500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).
- Adesmia fuentesii** G.F. Grandjot
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Adesmia gilliesii** Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia muricata* (Jacq.) DC. var. *gilliesii* (Hook. & Arn.) Burkart, *Patagonium gilliesii* (Hook. & Arn.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SLU, SFE).
- Adesmia glandulifolia** Steibel & Ulibarri
Arbusto. Endémica. 1200-1700 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
- Adesmia glaucescens** Phil.
Sin.: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze var. *glaucescens* (Phil.) Reiche, *Patagonium glaucescens* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(BIO, ARA).
- Adesmia globosa** Davyt & Izag.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, FLA, SAO).
- Adesmia glomerula** Clos var. *australior* Burkart
Hierba. Endémica. 1700-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, RME).
- Adesmia glomerula** Clos var. *glomerula*
Sin.: *Adesmia compacta* Phil., *Adesmia humilis* Phil., *Patagonium compactum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium glomerulum* (Clos) Kuntze, *Patagonium humile* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(MAU, BIO, ARA, RME).
- Adesmia glutinosa** Hook. & Arn.
Sin.: *Patagonium glutinosum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 700-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).
- Adesmia godoyae** (Phil. ex Reiche) Martic.
Sin.: *Patagonium godoyae* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: CHL(ATA, RME).
- Adesmia gracilis** Meyen ex Vogel
Sin.: *Patagonium gracile* (Meyen ex Vogel) Kuntze
Arbusto. Endémica. 200-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(COQ, VAL, MAU, RME).
- Adesmia gracillima** I.M. Johnst.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT, RME).
- Adesmia graminidea** Speg.
Sin.: *Patagonium graminideum* Speg.
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
- Adesmia grandiflora** Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia calocarpa* Phil., *Adesmia grandiflora* Gillies ex Hook. & Arn. var. *calocarpa* (Phil.) Kurtz, *Adesmia grandiflora* Gillies ex Hook. & Arn. var. *gracilis* Kurtz, *Patagonium calocarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium grandiflorum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

Adesmia grisea Hook. f.

Sin.: *Adesmia angulata* Hook. f., *Adesmia incana* Vogel var. *grisea* (Hook. f.) Burkart, *Patagonium griseum* (Hook. f.) Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, RNE, SLU, SFE). URY(COL, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO).

Adesmia guttulifera Sandwith

Arbusto. Endémica. 100-1600 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Adesmia hemisphaerica Hauman

Subarbusto. Endémica. 3200-3600 m.
Países: ARG(MEN). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, RME).

Adesmia hirsuta Phil.

Sin.: *Patagonium hirsutum* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

Adesmia horrida Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia capricornica* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Adesmia horridiuscula* Burkart, *Adesmia horridiuscula* Burkart f. *sericea* Burkart, *Adesmia leucopogon* Phil., *Adesmia pyramidata* Burkart, *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *minor* Reiche, *Patagonium leucopogon* (Phil.) Reiche
Arbusto. Nativa. 2800-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Adesmia hunzikeri Burkart

Hierba. Endémica. 2200-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Adesmia hystrix Phil.

Sin.: *Adesmia sentis* Phil., *Adesmia villanuevae* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium hystrix* (Phil.) Kuntze, *Patagonium sentis* (Phil.) Reiche, *Patagonium villanuevae* Reiche
Arbusto. Endémica. 2000-4100 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Adesmia incana Vogel

Sin.: *Adesmia incana* Vogel var. *heterotricha* Burkart, *Adesmia incana* Vogel var. *oblata* Davyt & Izag., *Patagonium incanum* (Vogel) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MIS, SAL, SLU). BRA(RGS). URY(CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC, TYT).

Adesmia inflexa Griseb.

Sin.: *Adesmia tucumanensis* Burkart
Arbusto. Nativa. 1800-3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Adesmia jilesiana Burkart

Hierba. Endémica. 3000-4200 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

Adesmia karraikensis Speg.

Sin.: *Adesmia negeri* Dusén, *Patagonium karraikense* (Speg.) Speg., *Patagonium negeri* (Dusén) Macloskie
Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: ARG(SCR).

Adesmia lanata Hook. f.

Sin.: *Patagonium lanatum* (Hook. f.) Kuntze
Hierba. Endémica. 100-900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(ARA, MAG).

Adesmia landbeckii Phil.

Sin.: *Patagonium landbeckii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze var. *landbeckii* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Adesmia latifolia (Spreng.) Vogel

Sin.: *Aeschynomene latifolia* Spreng., *Patagonium latifolium* (Spreng.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Adesmia laxa Clos

Sin.: *Patagonium laxum* (Clos) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Adesmia leiocarpa Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia psilocarpa* Phil., *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium psilocarpum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Adesmia leptobotrys Burkart

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Adesmia lihuelensis Burkart

Hierba. Endémica. 300-500 m.
Países: ARG(LPA).

Adesmia littoralis Burkart

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia longipes Phil.

Sin.: *Adesmia glareosa* (Chodat & Wilczek) Hauman, *Patagonium glareosum* Chodat & Wilczek, *Patagonium longipes* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 1300-3200 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Adesmia longiseta DC.

Sin.: *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2000-3200 m.
Países: CHL(COQ, LBO, BIO, ARA, RME).

Adesmia lotoides Hook. f.

Sin.: *Adesmia lotoides* Hook. f. f. brachypoda Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. elata Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. normalis Speg., nom. inval., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. petiolulata Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. tipica Speg., nom. inval., *Adesmia lotoides* Hook. f. var. vaginata Hook. f., *Adesmia unifoliolata* Skottsb., *Patagonium lotoides* (Hook. f.) Kuntze, *Patagonium lotoides* (Hook. f.) Reiche, comb. superfl.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Adesmia loudonia Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Adesmia macrostachya Benth.

Sin.: *Patagonium macrostachyum* (Benth.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, SLU, SFE).

Adesmia medinae (Phil. ex Reiche) Ulibarri

Sin.: *Patagonium medinae* Phil. ex Reiche
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Adesmia melanocaulos Phil.

Sin.: *Adesmia diaziana* I.M. Johnst., *Patagonium melanocaulon* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Adesmia melanthes Phil.

Sin.: *Patagonium melanthes* (Phil.) Reiche
Arbusto. Nativa. 3700-4200 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Adesmia mendozana Ulibarri

Arbusto. Endémica. 1700-2400 m.
Países: ARG(MEN).

Adesmia micrantha Phil.

Sin.: *Patagonium micranthum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *micranthum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Adesmia microcalyx Phil. var. **calvescens** Burkart

Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Adesmia microcalyx Phil. var. **microcalyx**

Sin.: *Patagonium microcalyx* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Adesmia microphylla Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia spinosa* A. Lesson, *Patagonium microphyllum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Adesmia minor (Hook. & Arn.) Burkart var. **caespitosa** (Phil.) Ulibarri & Burkart

Sin.: *Adesmia caespitosa* Phil., *Patagonium caespitosum* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémica. 3800-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(ANT).

Adesmia minor (Hook. & Arn.) Burkart var. **minor**

Sin.: *Adesmia caespitosa* Gillies ex Hook., nom. nud., *Adesmia horrida* Gillies ex Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., *Adesmia subterranea* Clos var. *glabriuscula* Phil., nom. nud.
Subarbusto. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(MEN).

Adesmia minor (Hook. & Arn.) Burkart var. **riojana** (Burkart) Ulibarri

Sin.: *Adesmia riojana* Burkart
Subarbusto. Endémica. 3500-3800 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

Adesmia miottoae Cobra, Iganci & Fort-Perez

Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).

Adesmia miraflorensis J. Remy

Sin.: *Adesmia clarenii* (R.E. Fr.) Burkart, *Adesmia nordenskioldii* (R.E. Fr.) Hicken ex Cárdenas, *Adesmia polyacantha* Wedd., *Adesmia vicina* J.F. Macbr., *Patagonium clarenii* R.E. Fr., *Patagonium miraflorensis* (J. Remy) Rusby, *Patagonium nordenskioldii* R.E. Fr.
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Adesmia monosperma Clos

Sin.: *Adesmia calycosa* Phil., *Patagonium calycosum* (Phil.) Reiche, *Patagonium monospermum* (Clos) Kuntze
 Arbusto. Endémica. 200-2600 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia montana Phil.

Sin.: *Patagonium montanum* (Phil.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 2100-2800 m.
 Países: CHL(COQ, LBO, RME).

Adesmia mucronata Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia closii* Phil., *Patagonium closii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-2600 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Adesmia multicuspis Clos

Sin.: *Adesmia melanocarpa* Phil. ex Reiche, *Adesmia oxalidophylla* Phil., *Patagonium multicuspe* (Clos) Kuntze, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze var. *melanocarpum* Phil. ex Reiche
 Hierba. Endémica. 1100-2300 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia muricata (Jacq.) DC.

Sin.: *Adesmia affinis* Hook. f., *Adesmia hedysaroides* (Schrank) Hauman, *Adesmia muricata* (Jacq.) DC. var. *affinis* (Hook. f.) Burkart, *Adesmia muricata* (Jacq.) DC. var. *incana* (Kuntze) Burkart, *Adesmia muricata* (Jacq.) DC. var. *rionegrensis* Burkart, *Hedysarum muricatum* Jacq., *Patagonium affine* (Hook. f.) Macloskie, *Patagonium hedysaroides* Schrank, *Patagonium muricatum* (Jacq.) Kuntze, *Patagonium*

muricatum (Jacq.) Kuntze var. *incanum* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC).

Adesmia nanolignea Burkart

Subarbusto. Endémica. 3000-4000 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Adesmia neglecta M.N. Correa

Subarbusto. Endémica. 1200-1300 m.
 Países: ARG(CHU).

Adesmia neuquenensis Burkart

Hierba. Endémica. 1100-1700 m.
 Países: ARG(NEU).

Adesmia obcordata Clos

Sin.: *Adesmia karraikensis* Speg. f. *relaxata* Hicken, *Patagonium obcordatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze
 Arbusto. Endémica. 200-2500 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, RME).

Adesmia obovata Clos

Sin.: *Adesmia leptacantha* Phil., *Patagonium leptacanthum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze
 Arbusto. Endémica. 200-2500 m.
 Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Adesmia obscura Clos

Sin.: *Adesmia graveolens* Phil., *Adesmia serrazziana* Speg., *Adesmia villosa* Phil., hom. illeg., *Patagonium graveolens* (Phil.) Kuntze, *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze, *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze var.

graveolens (Phil.) Reiche, *Patagonium serrazzianum* (Speg.) Speg., *Patagonium villosum* Reiche
 Arbusto. Endémica. 2000-3400 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia occulta (R.E. Fr.) Burkart

Sin.: *Adesmia patancana* Ulbr., *Patagonium occultum* R.E. Fr., *Patagonium patancanum* (Ulbr.) Rusby
 Subarbusto. Nativa. 3000-4400 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Adesmia odontophylla Phil.

Sin.: *Patagonium odontophyllum* (Phil.) Kuntze
 Arbusto. Endémica.
 Países: CHL(ATA).

Adesmia ovallensis Ulibarri

Arbusto. Endémica. 200-300 m.
 Países: CHL(COQ).

Adesmia pampeana Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI).

Adesmia papposa (Lag.) DC. var. **papposa**

Sin.: *Adesmia arvensis* Phil., *Adesmia chillanensis* Phil., *Adesmia elongata* Phil., *Aeschynomene papposa* Lag., *Patagonium arvense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium chillanense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium elongatum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elongatum* (Phil.) Reiche, *Patagonium papposum* (Lag.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-2500 m.
 Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Adesmia papposa (Lag.) DC. var. **radicifolia** (Clos) M.N. Correa

Sin.: *Adesmia radiculifolia* Clos, *Patagonium radiculifolium* (Clos) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-3100 m.
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Adesmia paranensis Burkart

Sin.: *Adesmia psoraleoides* Vogel var. *glabrata* Benth.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Adesmia parviflora Clos

Sin.: *Adesmia diffusa* Bertero ex Steud., *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *diffusum* (Bertero ex Steud.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAG, RME).

Adesmia parvifolia Phil.

Sin.: *Adesmia axillaris* Phil., *Adesmia parvifolia* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Reiche, *Patagonium axillare* (Phil.) Kuntze, *Patagonium lanatum* (Hook. f.) Kuntze var. *axillaris* (Phil.) Speg., *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche, *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche var. *axillare* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Adesmia patagonica Speg.

Sin.: *Adesmia patagonica* Speg. var. *nana* Speg., *Patagonium patagonicum* (Speg.) Speg.
Subarbusto. Endémica. 1100-1500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE, SCR).

Adesmia pauciflora Vogel

Sin.: *Patagonium pauciflorum* (Vogel) Kuntze
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(RME).

Adesmia pedicellata Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia calopogon* Phil., *Adesmia deserticola* Phil., *Adesmia genistoides* C. Presl, *Adesmia ulicina* C. Presl, *Patagonium calopogon* Phil. ex Reiche, *Patagonium deserticolum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Reiche, comb. superfl., *Patagonium pedicellatum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium ulicinum* (C. Presl) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-2800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia pentaphylla Phil.

Sin.: *Patagonium pentaphyllum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 2200-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Adesmia peraltae (Phil. ex Reiche) Ulibarri

Sin.: *Patagonium peraltae* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia phylloidea Clos

Sin.: *Adesmia virgata* Bertero ex Steud., nom. nud., *Patagonium phylloideum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 100-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Adesmia pimpinellifolia (Poir.) Cobra

Sin.: *Adesmia dentata* (Lag.) DC., *Adesmia muricata* (Jacq.) DC. var. *dentata* (Lag.) Benth., *Adesmia muricata* (Jacq.) DC. var. *pimpinellifolia* (Poir.) Burkart,

Aeschynomene dentata Lag., *Hedysarum pimpinellifolium* Poir., *Patagonium dentatum* (Lag.) Kuntze, *Patagonium grandidentatum* Rusby
Hierba. Nativa. 300-2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC).

Adesmia pinifolia Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium pinifolium* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 1500-3700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, RME).

Adesmia pirionii I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 100-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Adesmia polyphylla Phil.

Sin.: *Patagonium polyphyllum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Nativa. 3200-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Adesmia propinqua Clos

Sin.: *Adesmia concinna* Phil., *Adesmia dendroidea* Phil., *Adesmia pearcei* Phil., *Patagonium dendrodes* (Phil.) Kuntze, *Patagonium pearcei* (Phil.) Kuntze, *Patagonium propinquum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 100-1500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Adesmia prostrata Clos var. **eglandulosa** Burkart

Sin.: *Adesmia coluteoides* Phil., *Patagonium coluteoides* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, RME).

Adesmia prostrata Clos var. **prostrata**

Sin.: *Adesmia meyeniana* Phil., *Patagonium meyenianum* (Phil.)

- Kuntze, *Patagonium prostratum* (Clos) Kuntze
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).
- Adesmia pseudincana** Burkart
Hierba. Endémica. 1200-1700 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
- Adesmia pseudogrisea** Burkart
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).
- Adesmia psoraleoides** Vogel
Sin.: *Patagonium psoraleoides* (Vogel) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 700-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Adesmia pumahuasiana** Ulibarri
Arbusto. Nativa. 3400-4000 m.
Países: ARG(JUU).
- Adesmia pumila** Hook. f.
Sin.: *Adesmia leptopoda* Speg., *Patagonium leptopodum* (Speg.) Speg., *Patagonium pumilum* (Hook. f.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).
- Adesmia punctata** DC.
Sin.: *Adesmia calycina* Vogel, *Adesmia glutinosa* Arechav., hom. illeg., *Adesmia herteri* Looser, *Adesmia punctata* DC. var. *sessiliflora* Davyt & Izag., *Hedysarum punctatum* Poir., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
- Adesmia pungens** Clos
Sin.: *Adesmia intricata* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium intricatum* Phil. ex Reiche, *Patagonium pungens* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-2100 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Adesmia pusilla** Phil.
Sin.: *Patagonium pusillum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 100-600 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).
- Adesmia quadripinnata** (Hicken) Burkart
Sin.: *Adesmia oligophylla* Phil. var. *quadripinnata* Hicken, *Adesmia quadripinnata* (Hicken) Burkart f. *punctata* Burkart, *Adesmia quadripinnata* (Hicken) Burkart var. *pygmaea* Burkart
Hierba. Endémica. 800-2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU). CHL(MAU).
- Adesmia ragonesei** Burkart
Arbusto. Endémica. 1700-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU).
- Adesmia rahmeri** Phil.
Sin.: *Patagonium rahmeri* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 2600-4400 m.
Países: ARG(CAT, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA).
- Adesmia ramosissima** Phil.
Sin.: *Patagonium ramosissimum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(COQ, LBO).
- Adesmia reclinata** Muñoz
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ).
- Adesmia reitziana** Burkart
Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.
- Países: BRA(SCA).
- Adesmia renjifoana** (Phil. ex Reiche) Ulibarri
Sin.: *Adesmia renjifoana* Phil. ex Reiche, *Patagonium renjifoanum* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémica. 1500-2600 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO).
- Adesmia resinosa** (Phil. ex Reiche) Martic.
Sin.: *Patagonium resinosum* Phil. ex Reiche
Arbolito. Endémica. 1700-2000 m.
Países: CHL(VAL, RME).
- Adesmia retrofracta** Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia polygaloides* (Chodat & Wilczek) Burkart, *Adesmia rafaelsensis* (Chodat & Wilczek) Hicken, *Adesmia retrofracta* Hook. & Arn. var. *rectirostris* (Chodat & Wilczek) Burkart, *Patagonium polygaloides* Chodat & Wilczek, *Patagonium rafaelsense* Chodat & Wilczek, *Patagonium retrofractum* Chodat & Wilczek var. *rectirostre* Chodat & Wilczek
Hierba. Endémica. 1000-1800 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).
- Adesmia retusa** Griseb.
Sin.: *Adesmia grisebachii* Phil., *Patagonium retusum* (Griseb.) Kuntze, *Patagonium retusum* (Griseb.) Kuntze var. *grisebachii* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, LLA).
- Adesmia riograndensis** Miotto
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Adesmia rocinhensis Burkart
Hierba. Endémica. 100-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adesmia rubroviridis Burkart
Arbusto. Endémica. 2200-2600 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Adesmia ruiz-lealii Burkart ex M.N. Correa
Hierba. Endémica. 1600-2000 m.
Países: ARG(SCR).

Adesmia salamancensis Burkart
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(CHU).

Adesmia salicornioides Speg.
Sin.: *Adesmia carnososa* Dusén,
Patagonium carnosum (Dusén) Speg.,
Patagonium salicornioides (Speg.)
Speg.
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Adesmia sandwithii Burkart
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE).

Adesmia sanjuanensis Burkart
Arbusto o subarbusto. Endémica. 2300-3000 m.
Países: ARG(SJU).

Adesmia schickendantzii Griseb.
Sin.: *Adesmia amblysepala* Solms
Subarbusto. Nativa. 2900-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Adesmia schneideri Phil.
Sin.: *Adesmia rigida* Skotts., *Patagonium schneideri* (Phil.) Kuntze, *Patagonium schneideri* (Phil.) Reiche, comb. superfl.
Arbusto. Endémica. 200-3300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).
CHL(ATA, LBO, RME).

Adesmia securigerifolia Herter
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).
URY(CAS, CLA, DUR, FLA, LAV,
PAY, SAO, TAC, TYT).

Adesmia serrana M.N. Correa
Subarbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: ARG(CHU, RNE).

Adesmia sessilifolia Iganci & Miotto
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Adesmia silvestrii (Speg.) Burkart
Sin.: *Patagonium silvestrii* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Adesmia smithiae DC.
Sin.: *Patagonium smithiae* (DC.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, RNE,
SCR).

Adesmia spinosissima Meyen
Sin.: *Adesmia rupicola* Wedd.,
Patagonium alcornutum Rusby,
Patagonium spinosissimum (Meyen)
Kuntze
Arbusto. Nativa. 2700-4300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP,
TAR, ANT, ATA).

Adesmia spuma Werderm. ex Burkart
Hierba. Endémica. 2000-4600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
CHL(ATA, COQ).

Adesmia stenocaulon Hauman
Sin.: *Adesmia fabrisii* Burkart
Hierba. Endémica. 2700-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Adesmia subterranea Clos
Sin.: *Patagonium subterraneum* (Clos)
Kuntze
Subarbusto. Endémica. 3100-4300 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL).

Adesmia subtropicalis Cobra
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Adesmia suffocata Hook. f.
Sin.: *Patagonium suffocatum* (Hook. f.)
Macloskie
Subarbusto. Endémica. 300-500 m.
Países: ARG(SCR).

Adesmia sulina Miotto
Hierba subleñosa. Endémica. 1000-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adesmia tehuelcha Speg.
Sin.: *Patagonium tehuelches* (Speg.)
Speg.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CHU, SCR).

Adesmia tenella Hook. & Arn. var.
macrocarpa Ulibarri
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Adesmia tenella Hook. & Arn. var.
misera (Phil.) Skotts. b.
Sin.: *Adesmia smithiae* DC. var. *misera*
Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
RME).

Adesmia tenella Hook. & Arn. var.
tenella
Sin.: *Adesmia angustifolia* Hook. & Arn.,
Adesmia parvula Phil., *Adesmia tenuicaulis* Phil., *Adesmia vesicaria*

Bertero ex Colla, *Patagonium parvulum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium tenuicaule* (Phil.) Reiche, *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Kuntze, *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Adesmia tomentosa Meyen

Hierba. Endémica. 200-300 m.

Países: CHL(VAL, MAU).

Adesmia torcaea Phil.

Sin.: *Patagonium torcaeum* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 200-3200 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Adesmia trifoliata Phil.

Sin.: *Adesmia philippiana* (Hosseus) Burkart, *Patagonium philippianum* Hosseus, *Patagonium trifoliatum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium triphyllum* Speg.

Arbusto. Endémica. 1300-2200 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Adesmia trifoliolata Gillies ex Hook. & Arn. var. **epunctata** Burkart

Hierba. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Adesmia trifoliolata Gillies ex Hook. & Arn. var. **trifoliolata**

Sin.: *Patagonium trifoliolatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.

Hierba. Endémica. 200-2300 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, RME).

Adesmia trijuga Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia arnottiana* Gillies ex Hook., *Adesmia capricornu* Phil., *Adesmia cervicornis* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *brevisetosa* Burkart,

Adesmia inflexa Griseb. var. *sericeophylla* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *tenuispina* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *viscidisepala* Burkart, *Patagonium trijugum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 900-3700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC).

Adesmia tristis Vogel

Subarbusto. Endémica. 500-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adesmia tunuianica Burkart

Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(MEN).

Adesmia uruguayana Arechav.

Sin.: *Adesmia punctata* DC. var. *hilariana*

Benth., *Adesmia viciifolia* Herter

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS). URY(LAV, MAL, TAC).

Adesmia uspallatensis Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium uspallatense* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 1900-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, RME).

Adesmia vallsii Miotto

Hierba subleñosa. Endémica. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Adesmia verrucosa Meyen

Sin.: *Patagonium scabridum* Rusby

Arbusto. Nativa. 3000-3400 m.

Países: CHL(AYP).

Adesmia villosa Hook. f.

Sin.: *Adesmia morenonis* Harms ex Kuntze, nom. nud., *Adesmia villosa* Hook. f. var. *acutifolia* Speg., *Adesmia villosa* Hook. f. var. *glabrata* (Speg.) Burkart, *Patagonium morenonis* (Harms) Kuntze, *Patagonium villosum* (Hook. f.) Speg., hom. illeg., *Patagonium villosum* (Hook. f.) Speg. var. *glabratum* Speg.

Hierba. Endémica. 0-2400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Adesmia viscida Bertero ex Colla

Sin.: *Adesmia aprica* Phil., *Adesmia simonsii* Phil., *Patagonium apricum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *apricum* (Phil.) Reiche, *Patagonium simonsii* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Adesmia viscidissima I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 700-800 m.

Países: CHL(ANT).

Adesmia viscosa Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia pulchra* Phil., *Patagonium pulchrum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium viscosum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 300-800 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

Adesmia volckmannii Phil.

Sin.: *Adesmia campestris* (Rendle) Rowlee, *Adesmia quadrijuga* Phil., *Patagonium campestre* Rendle, *Patagonium quadrijugum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Reiche, comb. superfl.

Arbusto. Endémica. 200-2200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Adesmia zoellneri Ulibarri
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL).

Aeschynomene L.

Aeschynomene americana L.

Sin.: *Aeschynomene americana* L. var. *depila* Millsp., *Aeschynomene americana* L. var. *glandulosa* (Poir. ex Lam.) Rudd, *Aeschynomene glandulosa* Poir. ex Lam.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, COA, GUA, PHA).

Aeschynomene denticulata Rudd

Sin.: *Aeschynomene sensitiva* Sw. f. *paucifoliolata* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CHO, COA, GUA, ÑEE). URY(ART, RNO, SAO).

Aeschynomene evenia C. Wright var. **evenia**

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR).

Aeschynomene evenia C. Wright var. **serrulata** Rudd

Hierba o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Aeschynomene fluminensis Vell.

Sin.: *Aeschynomene scoparia* Splitg.

Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Aeschynomene fructipendula Abruzzi de Oliveira

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Aeschynomene indica L.

Sin.: *Aeschynomene cachemiriana* Cambess., *Aeschynomene diffusa* Klein ex Willd., *Aeschynomene glaberrima* Poir., *Aeschynomene indica* L. var. *punctata* Pers., *Aeschynomene indica* L. var. *viscosa* Miq., *Aeschynomene macropoda* DC., *Aeschynomene montana* Span., *Aeschynomene oligantha* Welw. ex Baker, *Aeschynomene pumila* L., *Aeschynomene punctata* Steud., *Aeschynomene quadrata* Schumacher & Thonn., *Aeschynomene roxburghii* Spreng., *Aeschynomene subviscosa* DC., *Hedysarum alpinum* Lour., *Hedysarum neli-tali* Roxb., *Hedysarum virginicum* Lour.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Aeschynomene magna Rudd

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Aeschynomene montevidensis Vogel

Sin.: *Aeschynomene montevidensis* Vogel var. *microphylla* Chodat & Hassl., *Macromiscus brasiliensis* Turcz.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, COR, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, COL, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Aeschynomene paraguayensis Rudd

Sin.: *Aeschynomene selloi* Vogel f. *scabra* Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA, PAI).

Aeschynomene parviflora Micheli

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, PAI).

Aeschynomene pratensis Small var. **caribaea** Rudd

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(SPE).

Aeschynomene rudis Benth.

Sin.: *Aeschynomene bonariensis* Speg., *Aeschynomene natans* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, PHA, SPE). URY(SOR).

Aeschynomene selloi Vogel

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Aeschynomene sensitiva Sw.

Sin.: *Aeschynomene sensitiva* P. Beauv., nom. superfl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Albizia Durazz.

Albizia julibrissin Durazz.

Árbol. Introducida.
Países: ARG(COR, SFE).

Albizia lebbeck (L.) Benth.

Sin.: *Mimosa lebbeck* L.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Albizia lophantha (Willd.) Benth.

Sin.: *Acacia lophantha* Willd., *Albizia distachya* J.F. Macbr., *Feuillea distachya* Kuntze, *Mimosa distachya* Vent., hom. illeg., *Mimosa lophantha* (Willd.) Pers., *Paraserianthes lophantha* (Willd.) I.C. Nielsen

Árbol. Introducida. 0-800 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, RME, JFE).

Alysicarpus Neck. ex Desv.

Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J. Léonard

Sin.: *Hedysarum ovalifolium* Schumach.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

Sin.: *Hedysarum vaginale* L.

Hierba o subarbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Amburana Schwacke & Taub.

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm.

Sin.: *Torresea cearensis* Allemão

Árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY, AMA, CON).

Amicia Kunth

Amicia andicola (Griseb.) Harms

Sin.: *Zornia andicola* Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-3400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Amicia fimbriata Harms ex Kuntze

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Amicia medicaginea Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Amorpha L.

Amorpha fruticosa L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, MEN, SFE, TUC). URY(CLA, FLA, MON).

Anadenanthera Speg.

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. **colubrina**

Sin.: *Mimosa colubrina* Vell., *Piptadenia colubrina* (Vell.) Benth.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR).

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. **glabra** O.G. Martínez & D.E. Prado

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan

Sin.: *Acacia cebil* Griseb., *Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan var. *cebil* (Griseb.) Altschul, *Piptadenia cebil* (Griseb.) Griseb., *Piptadenia hassleriana* Chodat, *Piptadenia hassleriana* Chodat var. *fruticosa* Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth., *Piptadenia*

macrocarpa Benth. f. *microcarpa* Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth. f. *puberula* Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth. f. *rupestris* Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth. var. *cebil* (Griseb.) Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth. var. *plurifoliata* Hoehne, *Piptadenia macrocarpa* Benth. var. *vestita* Chodat & Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE).

Anadenanthera peregrina (L.) Speg.

Sin.: *Acacia angustiloba* DC., *Acacia microphylla* Willd., *Acacia niopo* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth, *Acacia peregrina* (L.) Willd., *Anadenanthera falcata* (Benth.) Speg., *Anadenanthera peregrina* (L.) Speg. var. *falcata* (Benth.) Altschul, *Mimosa acacioides* Benth., *Mimosa niopo* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir., *Mimosa parvifolia* Poir., *Mimosa peregrina* L., *Niopa peregrina* (L.) Britton & Rose, *Piptadenia falcata* Benth., *Piptadenia niopo* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spruce, *Piptadenia peregrina* (L.) Benth., *Piptadenia peregrina* (L.) Benth. var. *falcata* (Benth.) Chodat & Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, ÑEE, PAI).

Anarthrophyllum Benth.

Anarthrophyllum andicolum (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.

Sin.: *Anarthrophyllum andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil. var. *bridgesii* Chodat & Wilcz., *Anarthrophyllum juniperinum* (Meyen) F. Phil., *Genista andicola* Gillies ex Hook. & Arn., *Genista juniperina* Meyen
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Anarthrophyllum burkartii Sorarú
Subarbusto. Endémica. 1400-2100 m.
Países: ARG(NEU).

Anarthrophyllum capitatum Sorarú
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(NEU).

Anarthrophyllum catamarcense Sorarú
Arbusto. Endémica. 2700-3000 m.
Países: ARG(CAT).

Anarthrophyllum cumingii (Hook. & Arn.) F. Phil.
Sin.: *Anarthrophyllum cumingii* (Hook. & Arn.) F. Phil. var. *angustifolia* Chodat & Wilcz., *Genista cumingii* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. **desideratum**
Sin.: *Anarthrophyllum beaufilsii* Kuntze, *Anarthrophyllum bergii* Hieron., *Anarthrophyllum desideratum* (DC.) Benth. var. *bergii* (Hieron.) Speg., *Anarthrophyllum desideratum* Neger, nom. illeg., *Anarthrophyllum prichardii* Rendle, *Genista desiderata* DC.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. **morenonis** (Kuntze) Speg.
Sin.: *Anarthrophyllum morenonis* Kuntze

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. **mustersii** Speg.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Anarthrophyllum elegans (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.
Sin.: *Anarthrophyllum pungens* Chodat, *Genista elegans* Gillies ex Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(VAL).

Anarthrophyllum gayanum (A. Gray) B.D. Jacks.
Sin.: *Anarthrophyllum umbellatum* F. Phil., *Genista gayana* A. Gray, *Genista umbellata* Clos, hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 2000-3700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Anarthrophyllum macrophyllum Sorarú
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(MEN, NEU).

Anarthrophyllum ornithopodum
Sandwith
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU).

Anarthrophyllum patagonicum Speg.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Anarthrophyllum pedicellatum Sorarú
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN).

Anarthrophyllum rigidum (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.

Sin.: *Anarthrophyllum brevistipula* Phil., *Anarthrophyllum negeri* Chodat & Wilczek, *Anarthrophyllum rigidum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron. var. *toninii* (Kuntze) Speg., *Anarthrophyllum toninii* Kuntze, *Genista rigida* Gillies ex Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 200-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, MAG).

Anarthrophyllum strigulipetalum Sorarú
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Anarthrophyllum subandinum Speg.
Sin.: *Anarthrophyllum subandinum* Speg. var. *nahuelhuapensis* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Ancistrotropis A. Delgado

Ancistrotropis clitorioides (Mart. ex Benth.) A. Delgado
Sin.: *Phaseolus clitorioides* Mart. ex Benth., *Phaseolus peduncularis* Kunth f. *pilus* (Mart. ex Benth.) Hassl., *Phaseolus peduncularis* Kunth var. *clitorioides* (Mart. ex Benth.) Hassl., *Phaseolus pilus* Mart. ex Benth., *Vigna peduncularis* (Kunth) Fawc. & Rendle var. *clitorioides* (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, ITA, MIE, SPE). URY(CLA, RIV, TAC).

Ancistrotropis firmula (Mart. ex Benth.) A. Delgado
Sin.: *Phaseolus crassifolius* Mart. ex Benth., *Phaseolus firmulus* Mart. ex Benth., *Phaseolus firmulus* Mart. ex

Benth. var. *crassifolius* (Mart. ex Benth.) Hassl., *Vigna firmula* (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA, GUA).

Ancistrotropis peduncularis (Fawc. & Rendle) A. Delgado

Sin.: *Phaseolus clitorioides* Mart. ex Benth. var. *modestus* Benth., *Phaseolus modestus* Mart. ex Benth., *Phaseolus oblongifolius* Micheli, *Phaseolus pascuorum* Mart. ex Benth., *Phaseolus peduncularis* Kunth, *Phaseolus peduncularis* Kunth f. *oblongifolius* (Micheli) Hassl., *Phaseolus peduncularis* Kunth f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus spixianus* Mart. ex Benth., *Vigna peduncularis* Fawc. & Rendle
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAN, ITA).

Ancistrotropis serrana Snak, J.L.A. Moreira & A.M.G. Azevedo
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Andira Lam., nom. cons.

Andira anthelmia (Vell.) J.F. Macbr.
Sin.: *Andira stipulacea* Vell., *Lumbricida anthelmia* Vell.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Andira fraxinifolia Benth.

Sin.: *Andira anthelmia* (Vell.) J.F. Macbr. var. *gracilis* N.F. Mattos, *Andira bahiensis* N.F. Mattos, *Andira fraxinifolia* Benth. var. *lanceata* N.F. Mattos, *Andira fraxinifolia* Benth. var. *latifoliolata* N.F. Mattos, *Andira*

fraxinifolia Benth. var. *rosea* (Mart. ex Benth.) Benth., *Andira handroana* N.F. Mattos, *Andira micans* Taub. ex Glaz., *Andira parvifolia* Mart. ex Benth., *Andira pernambucensis* N.F. Mattos, *Andira pisonis* Mart. ex Benth., *Andira pisonis* Mart. ex Benth. var. *emarginata* N.F. Mattos, *Andira pisonis* Mart. ex Benth. var. *puberula* N.F. Mattos, *Andira rosea* Mart. ex Benth., *Vouacapoua fraxinifolia* (Benth.) Kuntze, *Vouacapoua parvifolia* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Vouacapoua pisonis* (Mart. ex Benth.) Kuntze
Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Andira humilis Mart. ex Benth.

Sin.: *Andira humilis* Mart. ex Benth. var. *cordata* N.F. Mattos, *Andira laurifolia* Benth., *Andira pauciflora* Benth., *Vouacapoua humilis* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Vouacapoua laurifolia* (Benth.) Kuntze
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Andira inermis (W. Wright) DC.

Sin.: *Andira excelsa* Kunth, *Andira inermis* (W. Wright) DC. var. *riedelii* Benth., *Andira riparia* Kunth, *Geoffroea inermis* W. Wright, *Glycyrrhiza undulata* Ruiz & Pav. ex G. Don, *Vouacapoua inermis* (W. Wright) Lyon
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(MIE).

Apuleia Mart., nom. cons.

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr.

Sin.: *Apuleia molaris* Spruce ex Benth., *Apuleia praecox* Mart., *Leptolobium leiocarpum* Vogel, *Platymiscium ellipticum* Rusby
Árbol. Nativa. 100-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA, ITA, PAI).

Apurimacia Harms

Apurimacia dolichocarpa (Griseb.) Burkart
Sin.: *Tephrosia dolichocarpa* Griseb.
Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.
Países: ARG(COR).

Arachis L.

Arachis batizocoi Krapov. & W.C. Greg.
Sin.: *Arachis batizocae* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: PRY(APY).

Arachis burkartii Handro

Sin.: *Arachis marginata* Gardner f. *submarginata* Hoehne
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, PAY, RIV, SAO, TAC).

Arachis cardenasii Krapov. & W.C. Greg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Arachis correntina (Burkart) Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis villosa* Benth. var. *correntina* Burkart
Hierba. Endémica. 0-500 m.

- Países: ARG(COS). PRY(CEN, PAI, PHA).
- Arachis diogoi** Hoehne
Sin.: *Arachis chacoense* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud., *Arachis villosa* Benth. subsp. *diogoi* (Hoehne) A. Chev.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APA, PAI, PHA).
- Arachis duranensis** Krapov. & W.C. Greg.
Sin.: *Arachis argentinensis* Speg. ex Hoehne, nom. nud., *Arachis duranensis* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud., *Arachis spegazzinii* M.P. Greg. & W.C. Greg., nom. nud.
Hierba. Nativa. 200-1300 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY).
- Arachis glabrata** Benth. var. **glabrata**
Sin.: *Arachis argentinensis* Speg. ex Hoehne, nom. nud., *Arachis duranensis* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud., *Arachis glabrata* Benth. f. *major* Hoehne, nom. nud., *Arachis glabrata* Benth. f. *minor* Hoehne, nom. nud., *Arachis glabrata* Benth. var. *membranifolia* Benth. ex A. Chev., *Arachis prostrata* Benth. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Arachis prostrata* Benth. var. *pseudomarginata* Chodat & Hassl., *Arachis spegazzinii* M.P. Greg. & W.C. Greg., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART).
- Arachis glabrata** Benth. var. **hagenbeckii** (Harms ex Kuntze) F.J. Herm.
Sin.: *Arachis angustifolia* (Chodat & Hassl.) Killip ex Hoehne, *Arachis hagenbeckii* Harms ex Kuntze, *Arachis marginata* Gardner subsp. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) A. Chev., *Arachis prostrata* Benth. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Arachis prostrata* Benth. f. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) Hoehne, *Arachis prostrata* Benth. subsp. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) Hoehne, *Arachis prostrata* Benth. var. *angustifolia* Chodat & Hassl. ex Hoehne
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
- Arachis guaranítica** Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
- Arachis hassleri** Krapov., Valls & C.E. Simpson
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON, PHA).
- Arachis hoehnei** Krapov. & W.C. Greg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).
- Arachis lignosa** (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C. Greg.
Sin.: *Arachis marginata* Gardner var. *lignosa* (Chodat & Hassl.) A. Chev., *Arachis prostrata* Benth. f. *lignosa* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CON, PHA).
- Arachis major** Krapov. & W.C. Greg.
Sin.: *Arachis diogoi* Hoehne subsp. *major* Hoehne, nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(AMA, CON).
- Arachis microsperma** Krapov., W.C. Greg. & Valls
Hierba. Nativa. 0-500 m.
- Países: PRY(AMA, CON).
- Arachis monticola** Krapov. & Rigoni
Hierba. Endémica. 1200-1600 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Arachis nitida** Valls, Krapov. & C.E. Simpson
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
- Arachis paraguariensis** Chodat & Hassl.
Sin.: *Arachis diogoi* Hoehne f. *submarginata* Hoehne
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON, COA, PAI).
- Arachis pflugeae** C.E. Simpson, Krapov. & Valls
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CON).
- Arachis pintoii** Krapov. & W.C. Greg.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Arachis pseudovillosa** (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C. Greg.
Sin.: *Arachis prostrata* Benth. var. *pseudovillosa* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
- Arachis repens** Handro
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Arachis schininii** Krapov., Valls & C.E. Simpson
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).
- Arachis sesquijuga** Valls, L.C. Costa & Custodio
Hierba. Nativa. 600-700 m.

Países: PRY(AMA).
Arachis stenophylla Krapov. & W.C. Greg.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(CON).

Arachis stenosperma Krapov. & W.C. Greg.
 Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Arachis villosa Benth.
 Sin.: *Arachis prostrata* Benth. var. *villosa* (Benth.) A. Chev.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Arquita E. Gagnon, C.E. Hughes & G.P. Lewis

Arquita mimosifolia (Griseb.) E. Gagnon, G.P. Lewis & C.E. Hughes
 Sin.: *Caesalpinia mimosifolia* Griseb.
 Arbusto. Endémica. 500-2500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Arquita trichocarpa (Griseb.) E. Gagnon, G.P. Lewis & C.E. Hughes
 Sin.: *Caesalpinia trichocarpa* Griseb.
 Arbusto. Nativa. 1500-3200 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Astragalus L.

Astragalus amatus Clos
 Sin.: *Astragalus brachypterus* (Phil.) Reiche, *Astragalus chilensis* E. Sheld., *Astragalus ferrugineus* Clos, *Astragalus leucomallus* Phil.,

Astragalus litoreus Phil., *Astragalus procumbens* Hook. & Arn., *Astragalus subandinus* Speg., *Astragalus tricolor* (Clos) Reiche, *Phaca brachyptera* Phil., *Phaca tricolor* Clos, *Tragacantha brevilata* Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Astragalus ameghinoi Speg.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Astragalus anni-novi Burkart
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Astragalus arequipensis Vogel
 Sin.: *Astragalus bolivianus* Phil., *Astragalus drepanophorus* Griseb., *Astragalus orbignyanus* Wedd., *Astragalus sinocarpus* Rusby
 Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Astragalus argentinus Manganaro
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI).

Astragalus arnottianus (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
 Sin.: *Astragalus nanus* (Phil.) Reiche, *Astragalus philippii* Speg., *Astragalus reedii* (Phil.) Hauman, *Phaca arnottiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Phaca nana* Phil., *Phaca reedii* Phil., *Phaca uspallatensis* Phil.
 Hierba. Endémica. 2000-4500 m.
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Astragalus asplundii I.M. Johnst.
 Hierba. Nativa. 1000-4800 m.
 Países: ARG(JUJ, LRI, SJU).

Astragalus austroargentinus Gómez-Sosa
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(SCR).

Astragalus bellus (Kuntze) R.E. Fr.
 Sin.: *Astragalus pulchellus* (Clos) Reiche, hom. illeg., *Phaca pulchella* Clos, *Tragacantha bella* Kuntze
 Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ).

Astragalus bergii Hieron.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SLU).

Astragalus berterioanus (Moris) Reiche
 Sin.: *Astragalus aconcaguensis* Speg., *Astragalus canescens* (Hook. & Arn.) Reiche, *Astragalus dolichostachys* (Phil.) Reiche, *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche, hom. illeg., *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche var. *dissitiflora* (Phil.) Reiche, *Astragalus oblongifolius* Clos, *Astragalus placens* Clos var. *oblongifolius* (Clos) Reiche, *Astragalus sphaerocarpus* Clos, hom. illeg., *Phaca berterioana* Moris, *Phaca canescens* Hook. & Arn., *Phaca dissitiflora* Phil., *Phaca dolichostachya* Phil., *Phaca laxiflora* Phil.
 Hierba. Endémica. 0-1200 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Astragalus berteroi Colla
 Sin.: *Astragalus alberjilla* Steud., *Astragalus cauquenensis* Phil., *Astragalus concinnus* (Phil.) Reiche, *Astragalus elongatus* Reiche, *Astragalus filifolius* Clos, *Astragalus gratus* (Clos) Reiche, *Astragalus penganus* Phil., *Astragalus prostratus* Hook. & Arn., hom. illeg., *Astragalus rhudolphii* Speg., *Phaca concinna*

Phil., *Phaca elongata* Phil., hom. illeg.,
Phaca grata Clos, *Tragacantha longior*
Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, RME).

Astragalus boelckei Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Astragalus bonariensis Gómez-Sosa

Sin.: *Astragalus distans* Gray var. *beta*
Gray

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE).

Astragalus burkartii I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3000-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Astragalus bustillosii Clos

Sin.: *Astragalus atacamensis* (Kuntze)
R.E. Fr., *Astragalus brachycalyx* Phil.,
hom. illeg., *Astragalus depauperatus*
(Phil.) Reiche, hom. illeg., *Astragalus*
tarapacanus Speg., *Phaca*
depauperata Phil., *Phaca saxifraga*
Phil., *Tragacantha atacamensis*
Kuntze

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL,
SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT,
ATA, COQ).

Astragalus cachinalensis Phil.

Sin.: *Tragacantha cachinalensis* (Phil.)
Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Astragalus carinatus (Hook. & Arn.)

Reiche

Sin.: *Phaca andicola* Gillies ex Hook. &
Arn., nom. nud., *Phaca carinata* Hook.
& Arn.

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(COR, MEN, SAL, TUC).

Astragalus chamissonis (Vogel) Reiche

Sin.: *Astragalus araucanus* (F. Phil.)
Reiche, *Astragalus chilensis* (Nees)
Reiche, hom. illeg., *Astragalus*
laetevirens Phil., *Astragalus*
monospermus Phil., *Astragalus*
ochroleucus (Hook. & Arn.) A. Gray,
hom. illeg., *Astragalus ovalensis* Clos,
Astragalus placens Clos, *Astragalus*
volckmannii Phil., *Phaca araucana* F.
Phil., *Phaca chamissonis* Vogel,
Phaca chilensis Nees, *Phaca*
ochroleuca Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Astragalus chubutensis Speg.

Hierba. Endémica. 300-3300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SAL, SCR).

Astragalus colhuensis Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU).

Astragalus complicatus Gillies ex Hook.
& Arn.

Hierba. Endémica. 2700-2900 m.

Países: ARG(MEN).

Astragalus confinis I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: CHL(TAR).

Astragalus coquimbensis (Hook. & Arn.)

Reiche

Sin.: *Astragalus vasticola* I.M. Johnst.,
Phaca atacamensis Phil., *Phaca*
carrizalensis Phil., *Phaca*
coquimbensis Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Astragalus cruckshanksii (Hook. & Arn.)
Griseb.

Sin.: *Astragalus amunategui* Phil.,
Astragalus landbecki (Phil.) Reiche,
Phaca cruckshanksii Hook. & Arn.,
Phaca landbecki Phil., *Tragacantha*
cruckshanksii (Hook. & Arn.) Kuntze
var. *glabrescens* Kuntze

Hierba. Endémica. 800-3600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, MAG, RME).

Astragalus crymophilus I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 3500-4200 m.

Países: ARG(JUJ).

Astragalus crypticus I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU,
TUC).

Astragalus cryptobotrys I.M. Johnst.

Sin.: *Astragalus clandestinus* (Phil.)
Reiche, hom. illeg., *Astragalus*
clandestinus (Phil.) Reiche var.
flossdorfii Hicken, *Astragalus*
cryptanthus Wedd., *Phaca clandestina*
Phil., *Phaca cryptantha* Phil.

Hierba. Endémica. 3700-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Astragalus curvicaulis (Clos) Reiche

Sin.: *Astragalus elatus* (Hook. & Arn.)
Reiche, comb. superfl., *Phaca*
curvicaulis Clos, *Phaca elata* Hook. &
Arn., *Tragacantha curvicaulis* (Clos)
Kuntze

Hierba. Endémica. 2300-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Astragalus cuyanus Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 1700-2100 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Astragalus darumbium (Bertero ex Colla) Clos

Sin.: *Astragalus atuelii* Chodat & Wilczek, *Astragalus macrophysus* (Phil.) Reiche, hom. illeg., *Astragalus macrophysus* (Phil.) Reiche var. *robustus* (Phil.) Reiche, *Phaca macrophysa* Phil., *Phaca robusta* Phil., *Sutherlandia darumbium* Bertero ex Colla, *Tragacantha firma* Kuntze
Hierba. Endémica. 1500-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, RME).

Astragalus darwinianus Gómez-Sosa
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(SCR).

Astragalus diminutivus (Phil.) Gómez-Sosa var. **dielsii** (J.F. Macbr.) Gómez-Sosa
Sin.: *Astragalus dielsii* J.F. Macbr.
Hierba. Nativa. 3600-4400 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Astragalus diminutivus (Phil.) Gómez-Sosa var. **diminutivus**
Sin.: *Astragalus deminutivus* I.M. Johnst., *Phaca diminutiva* Phil.
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(TAR).

Astragalus distinens Macloskie
Sin.: *Astragalus distans* Gray
Hierba. Endémica. 0-4200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). URY(COL, MON, RNO, SJO, SOR).

Astragalus dodtii Phil.
Sin.: *Astragalus melanogonatus* I.M. Johnst., *Astragalus rengifoii* Phil., *Tragacantha dodtii* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Astragalus domeykoanus (Phil.) Reiche
Sin.: *Astragalus orites* (Phil.) Reiche, *Phaca domeykoana* Phil., *Phaca orites* Phil., *Tragacantha procumbens* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *glabrescens* Kunze
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA).

Astragalus edmonstonei (Hook.) B.L. Rob.
Sin.: *Astragalus affinis* Steud., nom. nud., *Astragalus chrysanthus* (Moris) Reiche, nom. illeg., *Astragalus flavus* (Hook. & Arn.) E. Sheld., hom. illeg., *Astragalus hohenacheri* Speg., nom. illeg., *Phaca acutidens* Phil., *Phaca chrysantha* Moris, *Phaca edmonstonei* Hook., *Phaca flava* Hook. & Arn., *Phaca podocarpa* Phil., hom. illeg., *Tragacantha chrysantha* (Moris) Kuntze, *Tragacantha flava* (Hook. & Arn.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU).

Astragalus fabrisii Gómez-Sosa
Hierba. Endémica. 4300-4700 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Astragalus famatinae I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 3000-3200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

Astragalus flavocreatus I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 3600-4600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Astragalus garbancillo Cav.
Sin.: *Astragalus benthamianus* Gillies ex Hook. & Arn., *Astragalus minor* Clos, *Astragalus unifultus* L'Hér., *Tragacantha benthamiana* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Tragacantha*

garbancillo (Cav.) Kuntze, *Tragacantha minor* (Clos) Kuntze
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Astragalus germainii Phil.
Sin.: *Astragalus alfalfalis* Phil., *Astragalus azureus* Phil. ex Reiche, *Astragalus closianus* Phil., *Astragalus dessaueri* Phil., *Astragalus dilectus* Phil., *Astragalus germainii* Phil. var. *azureus* Phil. ex Fr., *Astragalus segethii* Phil., *Tragacantha closiana* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha dilecta* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha germainii* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha segethii* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Astragalus hickenii Gómez-Sosa
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MEN, RNE).

Astragalus hypsogenus I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Astragalus illinii I.M. Johnst.
Sin.: *Astragalus moyanoi* Speg. var. *villosula* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, RNE).

Astragalus joergensenii I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Astragalus johnstonii Gómez-Sosa
Hierba. Endémica. 1000-1400 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Astragalus limariensis Muñoz
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, COQ).

Astragalus looseri I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Astragalus magellanicus Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SCR). CHL(AIS, MAG).

Astragalus maulensis Speg.

Sin.: *Astragalus brachytropis* Reiche, nom. superfl., *Phaca brachytropis* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(MAU).

Astragalus mendocinus Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(MEN).

Astragalus micranthellus Wedd.

Sin.: *Astragalus capitellus* Britton, *Astragalus patancanus* Ulbr., *Tragacantha arequibensis* Kuntze var. *tenuifolia* Kuntze, *Tragacantha arequipensis* Kuntze var. *minima* Kuntze, *Tragacantha micranthella* (Wedd.) Kuntze

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Astragalus minimus Vogel

Hierba. Nativa. 3000-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ). CHL(AYP).

Astragalus minutissimus Wedd.

Sin.: *Tragacantha minutissima* (Wedd.) Kuntze

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Astragalus monteroi I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ARA).

Astragalus monticola Phil.

Sin.: *Astragalus barceloi* Phil., *Tragacantha monticola* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(RME).

Astragalus moyanoi Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU).

Astragalus nelidae Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.

Países: ARG(SJU).

Astragalus neoburkartianus Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Astragalus neocarpus Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 800-1000 m.

Países: ARG(CHU).

Astragalus neoorthocarpus Zuloaga & C.A. Zanotti

Sin.: *Astragalus oliganthus* (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Astragalus orthocarpus* I.M. Johnst., hom. illeg., *Phaca oligantha* Phil., *Tragacantha oligantha* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(LBO).

Astragalus neuquenensis Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU).

Astragalus nicorae Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 3200-3600 m.

Países: ARG(SJU).

Astragalus nivicola Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Astragalus nudus Clos

Sin.: *Tragacantha nuda* (Clos) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Astragalus palenae (Phil.) Reiche var. **grandiflorus** Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Astragalus palenae (Phil.) Reiche var. **palenae**

Sin.: *Astragalus brevicaulis* Dusén, nom. illeg., *Astragalus dusenii* Macloskie, *Astragalus palenae* (Phil.) Reiche var. *dusenii* (Macloskie) I.M. Johnst., *Astragalus pallens* Reiche ex K. Schum., *Astragalus rahmeri* (Phil.) Reiche, *Phaca oreophila* Phil., *Phaca palenae* Phil., *Phaca rahmeri* Phil., *Tragacantha oreophila* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, ARA, LLA, AIS, MAG).

Astragalus paposanus I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 200-2600 m.

Países: CHL(ANT, COQ).

Astragalus parodii I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(COR).

Astragalus patagonicus (Phil.) Speg.

Sin.: *Phaca patagonica* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Astragalus pauranthus I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 200-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR).

Astragalus pehuenches Niederl.

Sin.: *Astragalus grandis* (Kuntze) Speg., *Astragalus inflatus* Gillies ex Steud., nom. inval., *Astragalus macrocarpus* (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Astragalus macrocarpus* (Phil.) Reiche var. *petiolatus* Hauman, *Astragalus megalocarpus* Speg., *Astragalus striatus* (Clos) Reiche, *Phaca inflata* Gillies ex Hook. & Arn., *Phaca macrocarpa* Phil., *Phaca striata* Clos, *Tragacantha bisinflata* Kuntze, *Tragacantha grandis* Kuntze, *Tragacantha striata* (Clos) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-2300 m.
 Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Astragalus peruvianus Vogel

Hierba. Nativa. 3000-4800 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Astragalus pissisii (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Astragalus canescens* (Hook. & Arn.) Reiche var. *pissisii* (Phil.) Reiche, *Phaca pissisii* Phil., *Tragacantha pissisii* (Phil.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Astragalus pulviniformis I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
 Países: ARG(SJU).

Astragalus punae I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.
 Países: ARG(JUU).

Astragalus pusillus Vogel

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
 Países: ARG(JUU, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Astragalus reichei Speg.

Sin.: *Astragalus compactus* (Phil.) Reiche, *Phaca compacta* Phil.
 Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
 Países: CHL(TAR, ANT).

Astragalus ruiz-lealii I.M. Johnst.

Hierba. Endémica.
 Países: ARG(MEN).

Astragalus sanctae-crucis Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR).

Astragalus schinetorum Barneby

Hierba. Endémica. 2800- m.
 Países: CHL(COQ).

Astragalus spegazzinii I.M. Johnst.

Sin.: *Astragalus rengifo* Phil. var. *lejocarpa* Speg.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(NEU, RNE).

Astragalus tacorensis Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 3700-4500 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Astragalus tarijensis Wedd.

Sin.: *Astragalus hieronymi* Ulbr., *Tragacantha tarijensis* (Wedd.) Kuntze
 Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Astragalus tehuelches Speg.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU).

Astragalus triflorus (DC.) A. Gray

Sin.: *Astragalus viciiformis* Ulbr., *Phaca triflora* DC., *Tragacantha triflora* (DC.) Kuntze
 Hierba. Nativa. 0-2500 m.
 Países: CHL(TAR, ANT).

Astragalus trifolius Phil.

Sin.: *Astragalus valparadisiensis* Speg., *Tragacantha trifoliata* (Phil.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(VAL).

Astragalus uniflorus DC.

Sin.: *Astragalus herzogii* Ulbr., *Tragacantha uniflora* (DC.) Kuntze
 Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
 Países: ARG(SAL, TUC).

Astragalus urbanianus Ulbr.

Hierba. Nativa. 2800-3700 m.
 Países: ARG(JUU, SAL).

Astragalus vagus (Clos) Reiche

Sin.: *Astragalus echegarayi* Hieron., *Astragalus san-romani* (Phil.) Reiche, *Astragalus striatus* (Clos) Reiche var. *echegarayi* (Hieron.) Hosseus, *Phaca san-romani* Phil., *Phaca vaga* Clos, *Tragacantha vaga* (Clos) Kuntze
 Hierba. Endémica. 2700-4000 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Astragalus valerianensis I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
 Países: CHL(ATA).

Astragalus venturii I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 3000-4700 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Astragalus verticillatus (Phil.) Reiche

Sin.: *Phaca verticillata* Phil.
 Hierba. Endémica. 200-1800 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

Astragalus vesiculosus Clos

Sin.: *Astragalus meyenianus* Speg., *Astragalus meyenianus* Speg. var. *paucifoliolata* Hicken, *Astragalus nubigenus* (E. Mey ex Vogel) Taub., hom. illeg. *Astragalus rupestris* Reiche, *Phaca bustillosii* Phil., *Phaca*

- nubigena* E. Mey ex Vogel,
Tragacantha andina Kuntze
Hierba. Endémica. 2300-4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Astragalus weddellianus** (Kuntze) I.M. Johnst.
Sin.: *Astragalus modestus* Wedd., nom. illeg., *Astragalus pilgeri* J.F. Macbr., *Astragalus punensis* J.F. Macbr., *Tragacantha weddelliana* Kuntze
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Astragalus werdermannii** I.M. Johnst.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUU, TUC). CHL(TAR).
- Ateleia** (DC.) Benth.
- Ateleia glazioveana** Baill.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CON).
- Balsamocarpon** Clos
- Balsamocarpon brevifolium** Clos
Sin.: *Caesalpinia brevifolia* (Clos) Benth.
Arbusto. Endémica. 0-1900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Bauhinia** L.
- Bauhinia acuruana** Moric.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
- Bauhinia affinis** Vogel
Sin.: *Pauletia affinis* (Vogel) A. Schmitz
- Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
- Bauhinia amambayensis** Fortunato
Sin.: *Bauhinia uniflora* Hassl., hom. illeg.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).
- Bauhinia argentinensis** Burkart var. **argentinensis**
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, GUA, PHA).
- Bauhinia argentinensis** Burkart var. **megasiphon** (Burkart) Fortunato
Sin.: *Bauhinia megasiphon* Burkart
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL).
- Bauhinia bauhinioides** (Mart.) J.F. Macbr.
Sin.: *Bauhinia microphylla* Vogel, *Pauletia bauhinioides* (Mart.) A. Schmitz, *Perlebia bauhinioides* Mart.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE).
- Bauhinia cheilantha** (Bong.) Steud.
Sin.: *Bauhinia aromatica* Ducke, *Pauletia cheilantha* Bong.
Arbusto. Nativa.
Países: PRY(AMA, CAN, CON).
- Bauhinia estrellensis** Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: PRY(AMA).
- Bauhinia forficata** Link subsp. **forficata**
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Bauhinia forficata** Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin
Sin.: *Bauhinia candicans* Benth., *Bauhinia forficata* Link var. *candicans* (Benth.) Hassl. ex Latzina, *Bauhinia forficata* Link var. *pruinosa* (Vogel) Hassl., *Bauhinia pruinosa* Vogel, *Pauletia candicans* (Benth.) A. Schmitz, *Pauletia pruinosa* (Vogel) A. Schmitz
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, COA, ITA). URY(MON, PAY, ROC, SAO).
- Bauhinia hagenbeckii** Harms
Sin.: *Bauhinia hassleriana* Chodat, *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *acuminata* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat var. *marginata* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
- Bauhinia holophylla** (Bong.) Steud.
Sin.: *Bauhinia cordata* Vogel, *Bauhinia dodecandra* (Bong.) Steud., *Bauhinia rufa* (Bong.) Steud. var. *cordata* (Vogel) Benth., *Bauhinia rufa* (Bong.) Steud. var. *dodecandra* (Bong.) Benth., *Pauletia dodecandra* Bong., *Pauletia holophylla* Bong., *Pauletia rufa* Bong. var. *cordata* (Vogel) A. Schmitz, *Pauletia rufa* Bong. var. *dodecandra* (Bong.) A. Schmitz
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Bauhinia kleiniana BurkartSin.: *Binaria kleiniana* (Burkart) A. Schmitz

Liana. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.Sin.: *Bauhinia geminata* Vogel, *Bauhinia obtusata* Vogel, *Bauhinia recurva* R.S. Cowan, *Pauletia longifolia* Bong.

Arbusto o arbolito. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Bauhinia mollis (Bong.) D. Dietr. var. **mollis**Sin.: *Bauhinia appendiculata* Hassl., *Bauhinia corumbensis* S. Moore, *Bauhinia mollis* (Bong.) D. Dietr. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Bauhinia mollis* (Bong.) D. Dietr. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Pauletia mollis* Bong.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). PRY(APY, AMA, CON, COA, SPE).

Bauhinia mollis (Bong.) D. Dietr. var. **notophila** (Griseb.) FortunatoSin.: *Bauhinia notophila* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Bauhinia unguolata L. var. **cuyabensis** (Bong.) VazSin.: *Bauhinia angulicaulis* Harms, *Bauhinia cataholo* Hoehne, *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud. f. *vestita* Chodat & Hassl., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Walp., hom. illeg., *Bauhinia cuyabensis* (Bong.) Steud., *Bauhinia cuyabensis* (Bong.) Steud. f. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Bauhinia cuyabensis* (Bong.) Steud. var. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Bauhinia hiemalis* Malme, *Pauletia cuyabensis* Bong.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON, GUA).

Bauhinia unguolata L. var. **ungulata**Sin.: *Bauhinia benthamiana* Taub., *Bauhinia macrostachya* Benth., *Bauhinia macrostachya* Benth. var. *tenuifolia* Ducke, *Cansenia unguolata* (L.) Raf., *Pauletia unguolata* (L.) A. Schmitz

Arbusto. Nativa.

Países: PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Bauhinia uruguayensis Benth.Sin.: *Bauhinia guaranítica* Lindm., *Bauhinia hermesiana* N.F. Mattos, *Bauhinia venturii* Lillo, *Binaria uruguayensis* (Benth.) A. Schmitz

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Bauhinia variegata L. var. **candida** VoigtSin.: *Bauhinia candida* Roxb., nom. inval. Arbusto o arbolito. Introducida. 1000-2500 m.

Países: ARG(SAL).

Betencourtia A. St.-Hil.**Betencourtia australis** (Malme) L.P. QueirozSin.: *Galactia australis* (Malme) Ceolin & Miotto, *Galactia neesii* DC. var. *australis* Malme

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CLA, LAV, MAL, PAY, RIV, TAC, TYT).

Betencourtia gracillima (Benth.) L.P. QueirozSin.: *Galactia gracillima* Benth., *Galactia linearifolia* Hoehne

Hierba, subarbusto o enredadera. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(CLA, FLA, MON, PAY, TAC).

Betencourtia martioides (Burkart) L.P. QueirozSin.: *Galactia martioides* Burkart

Hierba o enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS). URY(RIV).

Betencourtia neesii (DC.) L.P. QueirozSin.: *Galactia macropoda* R.S. Cowan, *Galactia martii* DC. var. *acuta* Burkart, *Galactia neesii* DC., *Galactia neesii* DC. var. *macropoda* (R.S. Cowan) Burkart

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, COA, MIE, PAI).

Betencourtia scarlatina (Mart. ex Benth.) L.P. QueirozSin.: *Camptosema scarlatinum* (Mart. ex Benth.) Burkart, *Camptosema scarlatinum* (Mart. ex Benth.) Burkart var. *pohlianum* (Benth.) Burkart, *Collaea scarlatina* Mart. ex Benth., *Collaea scarlatina* Mart. ex Benth. var. *calycina* Benth., *Collaea scarlatina* Mart. ex Benth. var. *latifolia* Benth., *Collaea scarlatina* Mart. ex Benth. var. *oblongifolia* Benth., *Collaea scarlatina* Mart. ex Benth. var. *pohliana* Benth., *Galactia scarlatina* (Mart. ex Benth.) Taub., *Galactia scarlatina* (Mart. ex Benth.) Taub. var. *brevibracteolata* Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, PAI).

Biancaea Tod.

Biancaea decapetala (Roth) O. Deg.

Sin.: *Caesalpinia decapetala* (Roth) Alston, *Caesalpinia sepiaria* Roxb., *Reichardia decapetala* Roth
Arbusto. Introducida. 100-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sin.: *Camptosema paraguariense* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Galactia paraguariensis* Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

roseiflora Chodat & Hassl., *Calliandra glabra* (Chodat & Hassl.) Hassl.
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU, COA, ITA, PAI, SPE).
Notas: Es probable su presencia en Uruguay

Bowdichia Kunth

Bowdichia virgilioides Kunth

Sin.: *Bowdichia densiflora* Benth., *Bowdichia major* (Mart.) Mart. ex Benth., *Bowdichia virgilioides* Kunth f. *major* (Mart.) Yakovlev, *Bowdichia virgilioides* Kunth var. *glabrata* Benth., *Sebipira major* Mart.
Arbusto o arbolito. Nativa. 100-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN).

Caesalpinia L.

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

Sin.: *Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw. var. *flava* L.H. Bailey & Rehder, *Poinciana bijuga* Lour., *Poinciana elata* Lour., *Poinciana pulcherrima* L.
Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA, RGS). PRY(COA).

Caetangil L.P. Queiroz

Caetangil chacoensis L.P. Queiroz

Sin.: *Camptosema paraguariense* (Chodat & Hassl.) Hassl. var. *parviflorum* Hassl.
Liana. Nativa.
Países: ARG. BRA(RGS). PRY.

Caetangil paraguariensis (Chodat & Hassl.) L.P. Queiroz

Cajanus Adans.

Cajanus cajan (L.) Huth

Sin.: *Cajanus bicolor* DC., *Cajanus flavus* DC., *Cajanus indicus* Spreng., *Cytisus cajan* L., *Cytisus pseudocajan* Jacq.
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI).

Calliandra Benth.

Calliandra brevicaulis Micheli var. **brevicaulis**

Sin.: *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *hirsutula* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *intermedia* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *robusta* Chodat & Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *puberula* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *pubescens* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *tomentosa* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 200-600 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, MIE).

Calliandra brevicaulis Micheli var. **glabra** Chodat & Hassl.

Sin.: *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *grandiflora* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *parviflora* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f.

Calliandra brevipes Benth.

Sin.: *Acacia selloi* Spreng., *Anneslia brevipes* (Benth.) Lindm., *Calliandra selloi* (Spreng.) J.F. Macbr., *Calliandra yucunensis* Mattos, *Feuillea brevipes* (Benth.) Kuntze
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CLA, MON, RIV).

Calliandra chilensis Benth.

Sin.: *Acacia nigra* Clos, *Feuillea chilensis* (Benth.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 1100- m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Calliandra dysantha Benth. var. **macrocephala** (Benth.) Barneby

Sin.: *Calliandra macrocephala* Benth.
Arbusto. Nativa. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Calliandra dysantha Benth. var. **opulenta** Barneby

Arbusto. Nativa. 400-600 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Calliandra foliolosa Benth.

Sin.: *Calliandra sancti-pauli* Hassk., *Calliandra tweediei* Benth. var. *sancti-pauli* (Hassk.) Benth., *Feuillea foliolosa* (Benth.) Kuntze
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI).

Calliandra harrisii (Lindl.) Benth.

Sin.: *Calliandra cylindrocarpa* Benth.,
Clelia ornata Casar., *Feuillea harrisii*
 (Lindl.) Kuntze, *Inga harrisii* Lindl.
 Arbusto. Nativa. 0-800 m.
 Países: PRY(APY).

Calliandra longipes Benth.

Sin.: *Calliandra longipes* Benth. f. *nana*
 Chodat & Hassl., *Calliandra longipes*
 Benth. var. *valenzuelensis* Chodat &
 Hassl., *Calliandra pyrophila*
 Fern.Casas & Schinini, *Feuillea*
longipes (Benth.) Kuntze
 Arbusto. Nativa. 200-800 m.
 Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA,
 CAU, COA, MIE).

Calliandra parviflora Benth.

Sin.: *Acacia pachyloma* Mart., nom. nud.,
Feuillea pachyloma Kuntze
 Arbusto. Nativa. 200-800 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA,
 CON, COA, SPE).

Calliandra parvifolia (Hook. f. & Arn.)
Speg.

Sin.: *Anneslia parvifolia* (Hook. & Arn.)
 Britton, *Calliandra bicolor* Benth.,
Calliandra diademata Lem., *Calliandra*
falcifera Ducke, *Calliandra microcalyx*
 Harms, *Calliandra microphylla* Benth.,
Calliandra myriophylla Benth.,
Calliandra peckoltii Benth., *Feuillea*
bicolor (Benth.) Kuntze, *Feuillea*
multifoliolata Kuntze, *Feuillea*
myriophylla (Benth.) Kuntze, *Feuillea*
peckoltii (Benth.) Kuntze, *Inga*
parvifolia Hook. f. & Arn.
 Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
 CAU, PAI). URY(ART, COL, MAL,
 MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

Calliandra tweediei Benth.

Sin.: *Anneslia tweediei* (Benth.) Lindm.,
Feuillea tweedii (Benth.) Kuntze, *Inga*
pulcherrima Cerv. ex Sweet, nom.
 nud., *Inga pulcherrima* Sweet ex
 Paxton, *Mimosa yaguaronensis*
 Larrañaga
 Arbusto. Nativa. 0-600 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(PAI). URY(ART,
 CLA, DUR, FLA, MAL, MON, PAY,
 RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Calopogonium Desv.**Calopogonium caeruleum** (Benth.) C.
Wright

Sin.: *Calopogonium caeruleum* (Benth.)
 Britton, nom. illeg., *Calopogonium*
caeruleum (Benth.) C. Wright var.
glabrescens (Benth.) Malme,
Calopogonium caeruleum (Benth.)
 Hemsl., nom. illeg., *Stenolobium*
caeruleum Benth. var. *caeruleum*,
Stenolobium caeruleum Benth. var.
glabrescens Benth., *Stenolobium*
caeruleum Benth. var. *villosius* Benth.,
Stenolobium glabrum Benth.,
Stenolobium tomentosum Benth.
 Liana. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS, SFE). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(CON).

Calopogonium mucunoides Desv.

Sin.: *Calopogonium sericeum* (Benth.)
 Chodat & Hassl., *Calopogonium*
sericeum (Benth.) Chodat & Hassl. f.
glabrescens Chodat & Hassl.,
Calopogonium sericeum (Benth.)
 Chodat & Hassl. var. *villicalyx* Chodat
 & Hassl., *Stenolobium caeruleum*
 Benth. var. *sericeum* Benth.
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).
 BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA,
 CAU, CAN, COA, GUA, MIE, SPE).

Calopogonium velutinum (Benth.)
Amshoff

Sin.: *Stenolobium velutinum* Benth.
 Liana. Nativa.
 Países: BRA(RGS).

Camptosema Hook. & Arn.**Camptosema rubicundum** Hook. & Arn.

Sin.: *Camptosema rubicunda* Hook. & Arn.
 f. *angustifolia* Chodat & Hassl.,
Kennedia ovata Sims, *Kennedia*
splendens Meisn.
 Liana. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
 BRA(RGS). PRY(APA, CEN).
 URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO,
 FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV,
 SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Canavalia Adans., nom. cons.**Canavalia bonariensis** Lindl.

Sin.: *Canavalia cryptodon* Meisn.,
Canavalia monodon E. Mey.,
Canavalia paranensis Hook. & Arn.,
Canavalia tortilis Frapp. ex Cordem.
 Liana. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
 JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(ITA). URY(ART, CAS,
 CLA, COL, MON, RNO, SJO, TAC).

Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth.

Sin.: *Canavalia anomala* Piper, *Canavalia*
campylocarpa Piper, *Canavalia*
caribaea Urb., *Canavalia fendleri*
 Piper, *Canavalia leptophylla* Piper,
Canavalia mexicana Piper, *Canavalia*

panamensis Piper, *Canavalia*
paraguayensis Piper, *Canavalia*
prolifera Piper ex Ricker
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CEN,
CON).

Canavalia ensiformis (L.) DC.

Sin.: *Canavalia ensiformis* (L.) DC. var.
albida DC., *Canavalia ensiformis* (L.)
DC. var. *truncata* Ricker, *Canavalia*
gladiata (L.) DC. f. *leucocarpa* Taub.
ex Glaz., nom. nud., *Canavalia*
gladiata (L.) DC. var. *leucosperma*
Voigt, *Dolichos acinaciformis* Jacq.,
Dolichos ensiformis L., *Dolichos*
pugioniformis Raeusch., *Malocchia*
ensiformis (L.) Savi
Liana. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS,
SAL).BRA(PAR, RGS). URY(MON).

Canavalia mattogrossensis (Barb.
Rodr.) Malme

Sin.: *Canavalia lasiocalyx* Kuntze, *Mucuna*
mattogrossensis Barb. Rodr.,
Wenderothia mattogrossensis (Barb.
Rodr.) Piper
Enredadera o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,
COA, GUA, PAI, SPE).

Canavalia picta Mart. ex Benth.

Sin.: *Canavalia lenta* Benth., *Wenderothia*
lenta (Benth.) Piper, *Wenderothia picta*
(Mart. ex Benth.) Piper
Enredadera o liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Canavalia piperi Killip & J.F. Macbr.

Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(SAL).

Canavalia rosea (Sw.) DC.

Sin.: *Canavalia apiculata* Piper, *Canavalia*
arenicola Piper, *Canavalia baueriana*
Endl., *Canavalia emarginata* (Jacq.) G.
Don, *Canavalia maritima* (Aubl.) Urb.,
nom. illeg., *Canavalia maritima*
Thouars, *Canavalia miniata* (Kunth)
DC., *Canavalia obtusifolia* DC.,
Canavalia obtusifolia DC. var.
emarginatus (Jacq.) DC., *Canavalia*
obtusifolia DC. var. *insularis* Ridl.,
Dolichos emarginatus Jacq., *Dolichos*
littoralis Vell., *Dolichos maritimus*
Aubl., *Dolichos miniatus* Kunth,
Dolichos roseus Sw.
Enredadera o liana. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cascaronia Griseb.

Cascaronia astragalina Griseb.

Árbol. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Cassia L.

Cassia fastuosa Willd. ex Benth.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cassia ferruginea (Schr.) Schrad. ex
DC. var. **ferruginea**

Sin.: *Bactrylobium ferrugineum* Schrad.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Cassia ferruginea (Schr.) Schrad. ex
DC. var. **velloziana** H.S. Irwin &
Barneby
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Cassia grandis L. f.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Cassia leptophylla Vogel

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cenostigma Tul.

Cenostigma macrophyllum Tul.

Árbol o arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cenostigma marginatum (Tul.) E.
Gagnon & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia marginata* Tul.,
Cenostigma sclerophyllum Malme
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CHO, CON).

Cenostigma pluviosum (DC.) E. Gagnon
& G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia floribunda* Tul.,
Caesalpinia pluviosa DC., *Caesalpinia*
taubertiana S. Moore, *Poincianella*
pluviosa (DC.) L.P. Queiroz
Árbol. Nativa. 400-1300 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, APY, AMA, CAN, CON).

Centrolobium Mart. ex Benth.

Centrolobium microchaete (Mart. ex
Benth.) H.C. Lima

Sin.: *Centrolobium robustum* (Vell.) Mart.
ex Benth. var. *microchaete* Mart. ex
Benth.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Centrolobium tomentosum Guill. ex
Benth.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Centrosema (DC.) Benth.

Centrosema angustifolium (Kunth) Benth.

Sin.: *Bradburya angustifolia* (Kunth) Kuntze, *Centrosema brasilianum* (L.) Benth. var. *angustifolium* (Benth.) Amshoff, comb. illeg., *Clitoria angustifolia* Kunth

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Centrosema arenarium Benth.

Sin.: *Bradburya arenaria* (Benth.) Kuntze, *Centrosema brachypodium* Benth., *Centrosema rigidulum* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Centrosema bracteosum Benth.

Sin.: *Bradburya bracteosa* (Benth.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Centrosema brasilianum (L.) Benth.

Sin.: *Bradburya brasiliana* (L.) Kuntze, *Bradburya insulana* (Arráb.) Kuntze, *Centrosema insulanum* (Arráb.) Steud., *Clitoria brasiliana* L., *Clitoria formosa* Kunth, *Clitoria insulana* Arráb., hom. illeg., *Clitoria insulana* Vell., *Vexillaria brasiliana* (L.) Hoffmanns.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, SPE).

Centrosema grandiflorum Benth.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Centrosema kermesil Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR).

Centrosema pascuorum Mart. ex Benth.

Sin.: *Bradburya pascuorum* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Bradburya virginiana* (L.) Kuntze f. *pascuorum* (Mart. ex Benth.) Lindm., *Centrosema sinuatum* (Desv.) Benth., *Clitoria sinuata* Desv.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APY).

Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth.

Sin.: *Bradburya plumieri* (Turpin ex Pers.) Kuntze, *Clitoria plumieri* Turpin ex Pers., *Cruminium giganteum* Desv.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, CEN, COA, GUA, PAI).

Centrosema pubescens Benth.

Sin.: *Centrosema molle* Mart. ex Benth.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Centrosema sagittatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee

Sin.: *Bradburya dubia* (Kunth) Kuntze, *Bradburya sagittata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rose, *Centrosema dubium* (Kunth) Benth., *Centrosema hastatum* Benth., *Centrosema sagittatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Malme, nom. illeg., *Glycine sagittata* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Rudolphia dubia* Kunth

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, GUA, ITA, PAI).

Centrosema variifolium Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SAL).

Centrosema virginianum (L.) Benth.

Sin.: *Bradburya biflora* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Bradburya conjugata* (Lehm.) Kuntze, *Bradburya decumbens* (Mart.) Kuntze, *Bradburya virginiana* (L.) Kuntze, *Centrosema biflorum* Mart. ex Benth., *Centrosema decumbens* Mart. ex Benth., *Centrosema micranthum* Steud., *Centrosema scabriusculum* Hassk., *Centrosema virginianum* (L.) Benth. var. *angustifolium* Griseb., *Clitoria alabamensis* Bertol., *Clitoria amoena* Roth, *Clitoria gemina* Vell., *Clitoria virginiana* L., *Cruminium virginianum* (L.) Britton, *Glycine pugiunculus* Desv., *Steganotropis conjugata* Lehm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CEN, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, MAL, MON, RIV, ROC, SOR, TAC).

Cerradicola L.P. Queiroz

Cerradicola boavista (Vell.) L.P. Queiroz

Sin.: *Collaea macrophylla* Benth., *Cytisus boavista* Vell., *Galactia boavista* (Vell.) Burkart, *Galactia macrophylla* (Benth.) Taub., *Galactia macrophylla* (Benth.) Taub. var. *ovalifolia* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN).

Cerradicola elliptica (Desv.) L.P. Queiroz

Sin.: *Camptosema ellipticum* (Desv.) Burkart, *Rudolphia elliptica* Desv.

- Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Cerradicola eriosematoides** (Harms) L.P. Queiroz
Sin.: *Galactia eriosematoides* Harms
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: PRY(AMA). URY(RIV, TAC).
- Cerradicola grewiifolia** (Benth.) L.P. Queiroz
Sin.: *Collaea grewiifolia* Benth., *Galactia grewiifolia* (Benth.) Taub.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(AMA, CON, SPE).
- Cerradicola praeandina** (Burkart) L.P. Queiroz
Sin.: *Camptosema praeandinum* Burkart
Enredadera. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Chamaecrista** Moench
- Chamaecrista absus** (L.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia absus* L.
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: PRY(COA).
- Chamaecrista amambaya** (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia amambaya* H.S. Irwin & Barneby, *Cassia cathartica* Mart. subsp. *floribunda* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: PRY(AMA).
- Chamaecrista arachiphylla** Barneby
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL). PRY(APY).
- Chamaecrista calycioides** (DC. ex Collad.) Greene
Sin.: *Cassia aristellata* (Pennell) Cory ex Cory & Parks, *Cassia calycioides* DC. ex Collad., *Cassia pedersenii* Burkart, *Chamaecrista aristellata* Pennell
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, SDE). PRY(CAU, CON).
- Chamaecrista campestris** H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia camporum* Benth., *Cassia hispidula* Vahl var. *oblongifolia* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 400-800 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
- Chamaecrista cardiostegia** H.S. Irwin & Barneby
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Chamaecrista cathartica** (Mart.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia cathartica* Mart.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Chamaecrista cordistipula** (Mart.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia cordistipula* Mart., *Cassia psammophila* Benth., *Cassia schlimii* Benth., *Chamaecrista schlimii* (Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip
Hierba. Nativa. 0-400 m.
Países: PRY(COA, PAI).
- Chamaecrista crommyotricha** (Harms) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia crommyotricha* Harms
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **brevipes** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia brevipes* DC. ex Collad., *Cassia desvauxii* (Collad.) Killip var. *stipulacea* Pilg., *Cassia desvauxii* Collad. var. *brevipes* Benth., *Cassia tetraphylla* Martyn var. *brevipes* (Benth.) H.S. Irwin, *Chamaecrista brevipes* (DC. ex Collad.) Greene
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
- Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **desvauxii**
Sin.: *Cassia adscendens* Mart. ex Colla, *Cassia borbonioides* Vogel, *Cassia chartacea* H.S. Irwin, *Cassia desvauxii* Collad., *Cassia langsдорffii* Kunth ex Vogel, *Cassia langsдорffii* Kunth ex Vogel var. *longipedicellata* H.S. Irwin, *Cassia tetraphylla* Martyn var. *littoralis* H.S. Irwin, *Cassia uniflora* Mill. var. *glaucescens* Vogel, *Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip var. *langsдорffii* (Kunth ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby, *Chamaecrista langsдорffii* (Kunth ex Vogel) Britton ex Pittier
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, PAI).
- Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **latistipula** (Benth.) G.P. Lewis
Sin.: *Cassia arlindo-andradei* Hoehne, *Cassia arlindo-andradei* Hoehne var. *maior* Hoehne, *Cassia latistipula* Benth., *Cassia latistipula* Benth. var. *glauca* Hassl., *Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip var. *glauca* (Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Hierba o subarbusto. Nativa. 100-1600 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).
- Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia bartlettii* Standl., *Cassia desvauxii* Collad. var. *mollissima* Benth., *Cassia lanceolata* Pers., *Cassia madrensis* (Rose ex Britton & Rose) H.S. Irwin, *Cassia persoonii* Collad., *Cassia pulchra* Kunth, *Cassia tecta* Vogel, *Cassia tetraphylla* Martyn var. *colombiana* H.S. Irwin, *Cassia tetraphylla* Martyn var. *longifolia* Amshoff, *Cassia tetraphylla* Martyn var. *mollissima* (Benth.) H.S. Irwin, *Chamaecrista madrensis* Rose, *Chamaecrista persoonii* (Collad.) Greene, *Chamaecrista pulchra* (Kunth) Britton & Killip
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, COA, SPE).

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. **piribebuiensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia piribebuiensis* Chodat & Hassl.
 Hierba. Endémica. 200-400 m.
 Países: PRY(CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Chamaecrista flexuosa (L.) Greene
 Sin.: *Cassia arenaria* Kunth, *Cassia flexuosa* L., *Cassia flexuosa* L. var. *cuyabensis* Pilg., *Cassia flexuosa* L. var. *pubescens* Benth., *Cassia picachensis* Brandegees, *Chamaecrista amplistipulata* Rose
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PAI). URY(COL, RNO, SAO).

Chamaecrista glandulosa (L.) Greene var. **brasiliensis** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia chamaecrista* L. var. *brasiliensis* Vogel
 Arbusto o subarbusto. Nativa.
 Países: BRA(RGS, PAR, SCA).

Chamaecrista glandulosa (L.) Greene var. **glandulosa**
 Sin.: *Cassia glandulosa* L.
 Arbusto o subarbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Chamaecrista gonoclada (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia gonoclada* Benth.
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA).

Chamaecrista hassleri (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia hassleri* H.S. Irwin & Barneby, *Cassia trachycarpa* Vogel subsp. *macrophylla* Hassl.
 Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
 Países: PRY(AMA).

Chamaecrista incana (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia incana* Vogel
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 600-1200 m.
 Países: BRA(PAR).

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia broughtonii* Fawc. & Rendle, *Cassia leptadenia* Greenm. var. *jaliscensis* Greenm., *Cassia nicoyana* (Britton) Standl., *Cassia riparia* Kunth, *Cassia wilsonii* (Britton & Rose) Standl., *Chamaecrista leptadenia* (Greenm.) Cockerell var. *jaliscensis* Greenm., *Chamaecrista longicoma* Britton & Rose, *Chamaecrista nicoyana* Britton, *Chamaecrista riparia*

(Kunth) Britton, *Chamaecrista wilsonii* Britton & Rose
 Hierba. Nativa.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia browniana* (Britton & Rose) Philipson, nom. illeg., *Cassia chamaecrista* L. var. *hypnotica* (Vell.) N.F. Mattos, *Cassia flavicoma* Humb., Bonpl. & Kunth var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Cassia gemina* Vell., *Cassia hypnotica* Vell., *Cassia pennelliana* Amshoff, *Cassia simplex* (Standl.) Standl., *Chamaecrista browniana* Britton & Rose, *Chamaecrista simplex* Standl., nom. nud.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(CAA, CAN, COA).

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi
 Sin.: *Cassia biglandulosa* Bertol., *Cassia patellaria* DC. ex Collad., *Cassia patellaria* DC. ex Collad. var. *longifolia* Benth., *Cassia patellaria* DC. ex Collad. var. *ramosa* Vogel, *Cassia villosissima* (Britton & Rose) Lundell, *Chamaecrista patellaria* (DC. ex Collad.) Greene, *Chamaecrista villosissima* Britton & Rose
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, ÑEE).

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia comayaguana* (Britton & Rose) Lundell, *Cassia erecta* Willd. ex Steud., *Cassia fenixensis* (Britton &

- Rose) Lundell, *Cassia mayana* Lundell, *Cassia propinqua* Kunth, *Cassia riparia* Kunth var. *pilosa* Benth., *Cassia stenocarpa* Vogel var. *stenocarpoides* (Britton) Schery, *Cassia stenocarpoides* (Britton) Lundell, *Chamaecrista comayaguana* Britton & Rose, *Chamaecrista konzattii* Britton & Rose, *Chamaecrista riparia* (Kunth) Britton var. *pilosa* Benth., *Chamaecrista salvadorensis* Britton, *Chamaecrista stenocarpoides* Britton, *Chamaecrista tonduzii* Britton & Rose
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA).
- Chamaecrista nictitans** (L.) Moench subsp. **brachypoda** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia brachypoda* Benth.
Hierba. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA, PHA).
- Chamaecrista nictitans** (L.) Moench subsp. **disadena** (Steud.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia disadena* Steud., *Chamaecrista stenocarpa* (Vogel) Standl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).
- Chamaecrista punctata** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia punctata* Vogel
Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chamaecrista ramosa** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **parvifoliola** (H.S. Irwin) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia langsдорffii* Kunth ex Vogel var. *parvifoliola* H.S. Irwin
Subarbusto. Nativa. 600-1000 m.
- Países: BRA(PAR).
- Chamaecrista ramosa** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **ramosa**
Sin.: *Cassia ramosa* Vogel, *Chamaecrista nictitans* (L.) Moench var. *ramosa* (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chamaecrista repens** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia apaensis* Chodat & Hassl., *Cassia repens* Vogel
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, ITA, MIE). URY(ART, PAY, RIV, SAO).
- Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia bauhiniifolia* Kunth, *Cassia bifoliola* Pers. ex R. Knuth, *Cassia filipes* Benth., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *bauhiniifolia* (Kunth) Benth., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *grandiflora* Benth., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *grandiflora* Micheli, nom. nud., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *longepedicellata* Chodat & Hassl., nom. nud., *Chamaecrista bauhiniifolia* (Kunth) Gleason
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA).
- Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **rotundifolia**
Sin.: *Cassia bifoliolata* DC. ex Collad., *Cassia bifoliolata* DC. ex Collad. var. *pentandra* (Raddi) Desv., *Cassia bifoliolata* DC. ex Collad. var. *rotundifolia* (Pers.) Desv., comb. illeg., *Cassia fabaginifolia* Kunth, *Cassia monophylla* Vell., *Cassia pentandra* Raddi, *Cassia pentandria* Larrañaga, hom. illeg., *Cassia rotundifolia* Pers., *Chamaecrista bifoliolata* (DC. ex Collad.) Greene
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA). URY(COL, PAY, RNO, TAC).
- Chamaecrista serpens** (L.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia serpens* L. var. *grandiflora* Benth., *Cassia tenella* Kunth, *Chamaecrista tenella* (Kunth) Pittier
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(CEN, COA). URY(RNO).
- Chamaecrista serpens** (L.) Greene var. **serpens**
Sin.: *Cassia flexuosa* Mill., hom. illeg., *Cassia prostrata* Kunth, *Cassia serpens* L., *Ophiocaulon serpens* (L.) Raf.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). PRY(APY).
- Chamaecrista venturiana** H.S. Irwin & Barneby
Hierba o subarbusto. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(COR, SAL, TUC). PRY(CAU, ITA).
- Chamaecrista vestita** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia vestita* Vogel
Hierba o subarbusto. Nativa. 600-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Chamaecrista viscosa (Kunth) H.S. Irwin & Barneby var. **paraguayensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia barbata* Nees & Mart. var. *paraguayensis* Chodat & Hassl., *Cassia paraguensis* Micheli, *Cassia viscosa* (Kunth) H.S. Irwin & Barneby var. *paraguayensis* (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(CAN, COA).

Chloroleucon Britton & Rose

Chloroleucon chacoense (Burkart) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Pithecellobium chacoense* Burkart
Arbusto o arbolito. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY).

Chloroleucon foliolosum (Benth.) G.P. Lewis

Sin.: *Calliandra aristulata* Rizzini, *Calliandra grisebachiana* (Harms) Speg., *Pithecellobium foliolosum* Benth., *Pithecellobium grisebachianum* Harms, *Pithecellobium myriophyllum* Malme, hom. illeg., *Pithecellobium oligandrum* Rizzini
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Calliandra brachyandra* Speg., *Feuillea scalaris* (Griseb.) Kuntze, *Pithecellobium anajuliae* Rizzini, *Pithecellobium scalare* Griseb., *Pithecellobium scalare* Griseb. f. *parvifolium* Chodat & Hassl., *Pithecellobium scalare* Griseb. var. *hirsutum* Chodat & Hassl., *Pithecellobium tenuiflorum* Benth.,

Pithecellobium tortum Mart. f. *scalare* (Griseb.) Hassl., *Pithecellobium tortum* Mart. var. *pubescens* Benth.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(CAA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Cleobulia Mart. ex Benth.

Cleobulia coccinea (Vell.) L.P. Queiroz
Sin.: *Cleobulia multiflora* Mart. ex Benth., *Dolichos coccineus* Vell.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Clitoria L.

Clitoria cordobensis Burkart
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, SFE).

Clitoria densiflora (Benth.) Benth.
Sin.: *Clitoria burkartii* Rizzini, *Clitoria densiflora* (Benth.) Benth. var. *mucronata* Hassl., *Neurocarpum densiflorum* Benth., *Ternatea densiflora* (Benth.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Clitoria epetiolata Burkart var. **angustissima** Fantz
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Clitoria epetiolata Burkart var. **epetiolata**
Sin.: *Clitoria epetiolata* Burkart var. *latiuscula* Burkart
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

Clitoria fairchildiana R.A. Howard
Sin.: *Clitoria racemosa* Benth., hom. illeg.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Clitoria falcata Lam. var. **aurantiaca** (Benth.) Fantz
Sin.: *Clitoria glycinoides* DC. var. *aurantiaca* Benth., *Clitoria rufescens* (Benth.) Benth., *Neurocarpum rufescens* Benth.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Clitoria falcata Lam. var. **falcata**
Sin.: *Clitoria glycinoides* DC., *Clitoria rubiginosa* Juss. ex Pers., *Clitoria tetragona* Poir. ex DC., nom. nud., *Martia physodes* Leandro, *Martusia physalodes* Schult., *Neurocarpum falcatum* (Lam.) DC., *Ternatea rubiginosa* (Juss. ex Pers.) Kuntze
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, SPE).

Clitoria guianensis (Aubl.) Benth.
Sin.: *Clitoria guianensis* (Aubl.) Standl., nom. illeg., *Crotalaria guianensis* Aubl., *Ternatea guianensis* (Aubl.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Clitoria laurifolia Poir.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Clitoria nana Benth.
Sin.: *Ternatea nana* (Benth.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(RIV, TAC).

Clitoria ternatea L.
Liana. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Cochliasanthus Trew

Cochliasanthus caracalla (L.) Trew
Sin.: *Caracalla pulcherrima* Tod.,
Phaseolus bertonii Franceschi ex
Benth., *Phaseolus caracalla* L.,
Phaseolus cochleatus Vell., *Phaseolus*
longirostratus Ducke, *Vigna caracalla*
(L.) Verdc.
Hierba o enredadera. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR,
JUU, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA). URY(MON).

Collaea DC.

Collaea argentina Griseb.
Sin.: *Collaea formosa* Griseb., *Galactia*
argentina (Griseb.) Kuntze, *Galactia*
formosa (Griseb.) Stuck. ex Seckt,
Galactia speciosa (Loisel.) Britton f.
argentina (Griseb.) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS,
SAL, SLU, TUC).

Collaea aschersoniana (Taub.) Burkart
Sin.: *Galactia aschersoniana* Taub.
Arbusto. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Collaea caerulea A.C. Oliveira & L.P.
Queiroz
Arbusto. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(SCA).

Collaea paraguariensis (Hassl.) R.
García

Sin.: *Galactia speciosa* (Loisel.) Britton f.
paraguariensis Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500
m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAU).

Collaea riparia Abruzzi de Oliveira
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Collaea speciosa (Loisel.) DC.
Sin.: *Collaea velutina* Benth., *Cytisus*
speciosus Loisel., *Galactia speciosa*
(Loisel.) Britton
Subarbusto. Endémica. 1000-3400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Collaea stenophylla (Hook. & Arn.)
Benth.
Sin.: *Collaea virgata* Benth., *Galactia*
hassleriana Chodat, *Galactia*
stenophylla Hook. & Arn., *Galactia*
stenophylla Hook. & Arn. var.
hassleriana (Chodat) Hassl., *Galactia*
stenophylla Hook. & Arn. var. *virgata*
(Benth.) Hassl., *Galactia virgata*
(Benth.) Chodat & Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAA, CAN, COA, SPE). URY(CLA,
COL, MON, PAY, RIV, SAO, SOR,
TAC).

Cologania Kunth

Cologania broussonetii (Balb.) DC.
Sin.: *Amphicarpaea ovalifolia* (Kunth)
Seckt, *Amphicarpaea pulchella*
(Kunth) Taub., *Clitoria broussonetii*
Balb., *Cologania affinis* M. Martens &
Galeotti, *Cologania australis* Griseb.,
Cologania congesta Rose, *Cologania*
glabrior Rose, *Cologania jaliscana* S.
Watson, *Cologania lozanoi* Rose,

Cologania ovalifolia Kunth, *Cologania*
pulchella Kunth, *Cologania rufescens*
Rose, *Cologania tenuis* Rose, *Falcata*
ovalifolia (Kunth) Kuntze, *Galactia*
lorentzii Griseb.
Subarbusto. Nativa. 1500-3400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
SLU, TUC).

Colutea L.

Colutea arborescens L.
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(LPA). CHL(BIO).

Condylostylis Piper

Condylostylis candida (Vell.) A. Delgado
Sin.: *Phaseolus amplus* Benth., *Phaseolus*
appendiculatus Benth., *Phaseolus*
candidus Vell., *Phaseolus candidus*
Vell. f. *appendiculatus* (Benth.) Hassl.,
Phaseolus candidus Vell. f.
obliquifolius (Benth.) Hassl.,
Phaseolus candidus Vell. f. *sublobatus*
(Micheli) Hassl., *Phaseolus candidus*
Vell. var. *genuinus* Hassl., nom. inval.,
Phaseolus candidus Vell. var.
membranaceus (Benth.) Hassl.,
Phaseolus maritimus Salzm. ex
Benth., nom. nud., *Phaseolus*
membranaceus Benth., *Phaseolus*
obliquifolius Mart. ex Benth., *Vigna*
candida (Vell.) Maréchal, Mascherpa &
Stainier
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ,
MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, COA, PAI). URY(SAO).

Copaifera L.

Copaifera langsdorffii Desf. var. **glabra** (Vogel) Benth.

Sin.: *Copaifera glabra* Vogel, *Copaifera laevis* Dwyer, *Copaifera langsdorffii* Desf. f. *parvifolia* Chodat & Hassl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, PAI).

Copaifera langsdorffii Desf. var. **langsdorffii**

Sin.: *Copaiba langsdorffii* (Desf.) Kuntze, *Copaifera langsdorffii* Desf. f. *minor* Chodat & Hassl., *Copaifera langsdorffii* Desf. var. *rupestris* Hassl., *Copaifera langsdorffii* Desf. var. *laxa* (Hayne) Benth., *Copaifera laxa* Hayne, *Copaifera nitida* Mart. ex Hayne, *Copaifera sellowii* Hayne

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Copaifera langsdorffii Desf. var. **grandifolia** Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(COA).

Copaifera trapezifolia Hayne

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Coronilla L.

Coronilla varia L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, SFE).

Coursetia DC.

Coursetia brachyrhachis Harms

Sin.: *Tephrosia craccoides* Lillo

Arbusto o árbol. Nativa. 500-2600 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Coursetia hassleri Chodat

Sin.: *Benthamantha caribaea* (Jacq.)

Kuntze var. *dubia* Kuntze,

Benthamantha glabrescens (Benth.)

Burkart, comb. superfl., *Coursetia*

guaranitica Chodat, *Cracca corumbae*

Hoehne

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, CEN).

Cratylia Mart. ex Benth.

Cratylia intermedia (Hassl.) L.P. Queiroz & R. Monteiro

Sin.: *Cratylia floribunda* Benth. var. *intermedia* Hassl.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Crotalaria L., nom. cons.

Crotalaria balansae Micheli

Sin.: *Crotalaria pohliana* Benth. var. *balansae* (Micheli) Chodat & Hassl., *Crotalaria stipularia* Desv. var. *balansae* (Micheli) Hassl., *Crotalaria velutina* Benth. var. *sellowii* Taub.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

Crotalaria breviflora DC.

Sin.: *Crotalaria breviflora* DC. var. *pohliana* (Benth.) Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria breviflora* DC. var. *riedelii* Taub., *Crotalaria divergens* Benth., *Crotalaria pohliana* Benth., *Crotalaria regnellii* Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Crotalaria chaco-serranensis H. Bach & Fortunato

Sin.: *Crotalaria incana* L. var. *australis* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 500-900 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Crotalaria grahamiana Wight & Arn.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(IPA).

Crotalaria hilariana Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Crotalaria incana L.

Sin.: *Chrysocalyx schimperii* Hochst. ex A. Rich., *Crotalaria affinis* DC., *Crotalaria criocaula* S. Schauer, *Crotalaria cubensis* DC., *Crotalaria diffusa* Vell., hom. illeg., *Crotalaria eriocaula* Schauer, *Crotalaria glabrescens* Andersson, hom. illeg., *Crotalaria herbacea* Schweigg. ex Schrank, *Crotalaria hirta* Lag., hom. illeg., *Crotalaria incana* L. f. *microphylla* Chodat & Hassl., *Crotalaria megapotamica* Burkart, *Crotalaria montana* A. Rich., *Crotalaria picensis* Phil., *Crotalaria pubescens* Moench, *Crotalaria purpurascens* Lam., *Crotalaria radiata* Merr., *Crotalaria setifera* DC., *Lupinus rotundifolius* Sessé & Moç.

Hierba o arbusto. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ANT). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(SAO).

Crotalaria juncea L.

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

Crotalaria lanceolata E. Mey.

Sin.: *Crotalaria mossambicensis* Klotzsch
Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Crotalaria martiana Benth. subsp. **mohlenbrockii** (Windler & S.G. Skinner) Planchuelo

Sin.: *Crotalaria bellii* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria foliosa* Benth., hom. illeg., *Crotalaria hatschbachii* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria hatschbachii* Windler & S.G. Skinner var. *sericea* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria mohlenbrockii* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria paraguayensis* Windler & S.G. Skinner
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAU, CON, COA, GUA, PAI).

Crotalaria maypurensis Kunth

Sin.: *Crotalaria depauperata* Mart. ex Benth., *Crotalaria leptophylla* Benth., *Crotalaria maypurensis* Kunth var. *depauperata* (Benth.) Windler & S.G. Skinner

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3400 m.

Países: ARG(COS, JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON).

Crotalaria micans Link

Sin.: *Crotalaria anagyroides* Kunth, *Crotalaria brachystachya* Benth., *Crotalaria dombeyana* DC., *Crotalaria stipulata* Vell., *Crotalaria triphylla* Vell.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, ÑEE, SPE). URY(COL, SOR).

Crotalaria ochroleuca G. Don

Subarbusto. Introducida.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Crotalaria pallida Aiton

Sin.: *Crotalaria mucronata* Desv., *Crotalaria striata* DC.

Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).

Crotalaria paulina Schrank

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: ARG(MIS).

Crotalaria pilosa Mill.

Sin.: *Crotalaria genistella* DC., nom. illeg., *Crotalaria genistella* Kunth, *Crotalaria hexaptera* Schrank, *Crotalaria pilosa* Mill. var. *skutchii* Senn, *Crotalaria pterocaula* Desv., *Crotalaria pterocaula* Desv. var. *genistella* (Kunth) Benth.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). PRY(AMA).

Crotalaria pumila Ortega

Sin.: *Crotalaria lupulina* Kunth

Hierba. Nativa. 400-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).

Crotalaria retusa L.

Subarbusto. Introducida. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Crotalaria sagittalis L.

Sin.: *Crotalaria belizensis* Lundell, *Crotalaria fruticosa* Mill., *Crotalaria lunulata* Raf., *Crotalaria matthewsana*

Benth., *Crotalaria parviflora* Roth, *Crotalaria pilosa* Raf., hom. illeg., *Crotalaria platycarpa* Link, *Crotalaria pringlei* A. Gray, *Crotalaria sagittalis* L. var. *blumeriana* H.Senn, *Crotalaria sagittalis* L. var. *fruticosa* (Mill.) Fawc. & Rendle, *Crotalaria sagittalis* L. var. *oblonga* Michx., *Crotalaria sagittatas* Hill, *Crotalaria tuerckheimii* Senn
Hierba. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(CAU).

Crotalaria spectabilis Roth

Hierba o arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Crotalaria stipularia Desv.

Sin.: *Crotalaria espadilla* Kunth, *Crotalaria sagittalis* Vell., hom. illeg., *Crotalaria serpyllifolia* Lamb. ex DC., nom. nud., *Crotalaria stipularia* Desv. f. *elliptica* Chodat & Hassl., *Crotalaria stipularia* Desv. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(CAN, CEN).

Crotalaria subdecurrens Mart. ex Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Crotalaria trichotoma Bojer

Subarbusto. Introducida.

Países: BRA(RGS).

Crotalaria tweediana Benth.

Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Crotalaria vespertilio Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Crotalaria virgulata Klotzsch

Sin.: *Crotalaria grantiana* Harv., *Crotalaria shamvaensis* Verd., *Crotalaria virgulata* Klotzsch subsp. *grantiana* (Harv.) Polhill
Subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Crotalaria vitellina Ker Gawl.

Sin.: *Crotalaria brasila* Schrank, *Crotalaria cajanifolia* Kunth, *Crotalaria guatemalensis* Benth.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ctenodon Baill.**Ctenodon brasilianus** (Poir.) D.B.O.S.
Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima

Sin.: *Aeschynomene brasiliana* (Poir.) DC., *Hedysarum brasilianum* Poir.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Ctenodon elegans (Schltdl. & Cham.) D.B.O.S. Cardoso & A. Delgado

Sin.: *Aeschynomene arenicola* Brandege, *Aeschynomene elegans* Schltdl. & Cham., *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. f. *glabrior* Kuntze, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *elegans* (Schltdl. & Cham.) Kuntze, *Aeschynomene tecta* Vogel
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ctenodon falcatus (Poir.) D.B.O.S.
Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima var. **falcatus**

Sin.: *Aeschynomene apoloana* Rusby, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *falcata*, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *paucijuga* Benth., *Hedysarum*

diffusum Vell., *Hedysarum falcatum* Poir.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Ctenodon falcatus (Poir.) D.B.O.S.
Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima var. **hassleri** (Rudd) D.B.O.S.
Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima

Sin.: *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *hassleri* Rudd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Ctenodon histrix (Poir.) D.B.O.S.
Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima var. **apanus** (Rudd) D.B.O.S.
Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima

Sin.: *Aeschynomene histrix* Poir. var. *apana* Rudd
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Ctenodon histrix (Poir.) D.B.O.S.
Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima var. **densiflorus** (Benth.) D.B.O.S. Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima

Sin.: *Aeschynomene densiflora* Benth., *Aeschynomene histrix* Poir. var. *densiflora* (Benth.) Rudd
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Ctenodon histrix (Poir.) D.B.O.S.
Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima var. **histrix**

Sin.: *Aeschynomene conferta* Benth., *Aeschynomene echinus* Vogel, *Aeschynomene histrix* Poir. var. *histrix*, *Aeschynomene histrix* Poir. var. *mucronulata* (Benth.) Benth.,

Aeschynomene mucronulata Benth., *Secula histrix* (Poir.) Small

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CON, PAI, PHA).

Ctenodon histrix (Poir.) D.B.O.S.
Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima var. **incanus** (Benth.) D.B.O.S.
Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima

Sin.: *Aeschynomene histrix* Poir. var. *incana* Benth., *Aeschynomene incana* Vogel, hom. illeg., *Aeschynomene puberula* DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CON, COA). URY(ART, COL, MON, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).

Ctenodon histrix (Poir.) D.B.O.S.
Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima var. **multijugus** (Chodat & Hassl.) D.B.O.S. Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima

Sin.: *Aeschynomene brasiliana* (Poir.) DC. f. *multijuga* Chodat & Hassl., *Aeschynomene histrix* Poir. var. *multijuga* (Chodat & Hassl.) Rudd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAA, CAN, CON).

Ctenodon lorentzianus (Bacigalupo & Vanni) D.B.O.S. Cardoso & H.C. Lima

Sin.: *Aeschynomene lorentziana* Bacigalupo & Vanni
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). URY(ART, SAO).

Ctenodon molliculus (Kunth) D.B.O.S.
Cardoso, Filardi & H.C. Lima

Sin.: *Aeschynomene mollicula* Kunth, *Aeschynomene pauciflora* Vogel

- Subarbusto. Nativa. 300-600 m.
Países: ARG(COS, FOR). PRY(APY, CEN, PAI).
- Ctenodon paniculatus** (Willd. ex Vogel) D.B.O.S. Cardoso, P.L.R. de Moraes & H.C. Lima
Sin.: *Aeschynomene gracilis* Miq., hom. illeg., *Aeschynomene hedysaroides* M. Martens & Galeotti, *Aeschynomene laevis* M. Martens & Galeotti, *Aeschynomene paniculata* Willd. ex Vogel
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON).
- Ctenodon viscidulus** (Michx.) D.B.O.S. Cardoso & A. Delgado
Sin.: *Aeschynomene eriocarpa* Standl. & Steyerl., *Aeschynomene prostrata* Poir., *Aeschynomene viscidula* Michx., *Secula viscidula* (Michx.) Small
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, BOQ, PHA).
- Cyclolobium** Benth.
- Cyclolobium brasiliense** Benth.
Sin.: *Cyclolobium blanchetianum* Tul., *Cyclolobium claussenii* Benth.
Árbol. Nativa. 100-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CON, COA, GUA, PAI).
- Cynometra** L.
- Cynometra bauhiniifolia** Benth. var. **bauhiniifolia**
Sin.: *Cynometra bauhiniifolia* Benth. var. *grandiflora* Dwyer, *Cynometra microflora* R.S. Cowan
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
- Cynometra bauhiniifolia** Benth. var. **meridiana** Dwyer
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR).
- Cytisus** Desf., nom. cons.
- Cytisus scoparius** (L.) Link
Sin.: *Sarothamnus scoparius* (L.) Koch, *Spartium scoparium* L.
Arbusto. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).
- Cytisus striatus** (Hill) Rothm.
Sin.: *Genista striata* Hill
Arbusto. Introducida. 0-1000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).
- Dahlstedtia** Malme
- Dahlstedtia burkartii** M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(MIS).
- Dahlstedtia floribunda** (Vogel) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
Sin.: *Lonchocarpus subglauescens* Mart. ex Benth., *Sphinctolobium floribundum* Vogel
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dahlstedtia lewisiana** M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
Árbol. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(SCA).
- Dahlstedtia muehlbergiana** (Hassl.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
Sin.: *Derris muehlbergianus* (Hassl.) N.F. Mattos, *Lonchocarpus muehlbergianus* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, SPE).
- Dahlstedtia pentaphylla** (Taub.) Burkart
Sin.: *Camptosema pentaphyllum* Taub.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dalbergia** L. f., nom. cons.
- Dalbergia brasiliensis** Vogel
Sin.: *Amerimnon brasiliense* (Vogel) Kuntze
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dalbergia ecastaphyllum** (L.) Taub.
Sin.: *Amerimnon ecastaphyllum* (L.) Standl., *Ecastaphyllum brownei* Pers., *Ecastaphyllum ecastaphyllum* (L.) Britton, nom. illeg., *Ecastaphyllum molle* Miq., *Hedysarum ecastaphyllum* L., *Pterocarpus ecastaphyllum* (L.) P.J. Bergius
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dalbergia ernest-uilei** Hoehne
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dalbergia foliolosa** Benth.
Sin.: *Miscobium polyphyllum* Benth.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dalbergia frutescens** (Vell.) Britton var. **frutescens**

Sin.: *Dalbergia variabilis* Vogel,
Pterocarpus frutescens Vell.,
Triptolemea glabra Benth.,
Triptolemea latifolia Benth.,
Triptolemea montana Mart. ex Benth.,
Triptolemea ovata Mart. ex Benth.,
Triptolemea pauciflora Mart. ex Benth.,
Triptolemea platycarpa Benth.
 Liana. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART).

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton var. **tomentosa** (Vogel) Benth.

Sin.: *Dalbergia tomentosa* Vogel
 Arbusto o liana. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Dalbergia lateriflora Benth.

Sin.: *Amerimnon lateriflorum* (Benth.) Kuntze, *Dalbergia rosei* Hoehne
 Arbusto o liana. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Dalbergia miscolobium Benth.

Sin.: *Dalbergia violacea* (Vogel) Malme, nom. illeg., *Miscolobium nigrum* Mart., nom. nud., *Miscolobium violaceum* Vogel
 Arbusto. Nativa. 700-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.

Sin.: *Pterocarpus niger* Vell.
 Árbol. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Dalea L., nom. cons.

Dalea azurea (Phil.) Reiche

Sin.: *Lotodes azureum* (Phil.) Kuntze, *Parosela azurea* (Phil.) J.F. Macbr., *Psoralea azurea* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(ANT).

Dalea boliviana Britton

Sin.: *Dalea boliviana* Britton var. *herrerae* (J.F. Macbr.) J.F. Macbr., *Dalea calliantha* Ulbr., *Dalea hofstenii* R.E. Fr., *Dalea retusifolia* Harms ex Kuntze, *Parosela boliviana* (Britton) J.F. Macbr., *Parosela boliviana* (Britton) J.F. Macbr. var. *herrerae* J.F. Macbr., *Parosela calliantha* (Ulbr.) J.F. Macbr., *Parosela hofstenii* (R.E. Fr.) J.F. Macbr.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Dalea cylindrica Hook. var. **nova** (Ulbr.) Barneby

Sin.: *Dalea nova* Ulbr.
 Hierba. Nativa. 3000-3100 m.
 Países: CHL(AYP).

Dalea elegans Gillies ex Hook. & Arn. var. **elegans**

Sin.: *Dalea stenophylla* Griseb., *Parosela elegans* (Gillies ex Hook. & Arn.) J.F. Macbr.
 Hierba. Nativa. 500-2000 m.
 Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU).

Dalea elegans Gillies ex Hook. & Arn. var. **onobrychioides** (Griseb.) Barneby

Sin.: *Dalea eosina* (J.F. Macbr.) J.F. Macbr., *Dalea onobrychioides* Griseb., *Parosela eosina* J.F. Macbr., *Parosela onobrychioides* (Griseb.) J.F. Macbr.
 Hierba. Nativa. 1800-3000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Dalea leporina (Aiton) Bullock

Sin.: *Dalea alba* Michx. ex Roem., *Dalea alopecuroides* Willd., *Dalea annua* Kuntze var. *ebracteata* Kuntze, *Dalea bigelovii* (Rydb.) B.L. Turner, *Dalea*

lagopus (Cav.) Willd., *Dalea leporina* (Aiton) Bullock var. *alba* (Michx. ex Roem.) H.D. Harr., *Dalea leporina* (Aiton) Kearney & Peebles, comb. superfl., *Dalea linnaei* Michx., *Dalea oreophila* (Cory) Cory, *Parosela leporina* (Aiton) Rydb., *Psoralea leporina* Aiton
 Hierba. Nativa. 2200-2900 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Dalea moquehuana J.F. Macbr.

Hierba. Nativa. 1900-2700 m.
 Países: CHL(AYP, TAR).

Dalea pennellii (J.F. Macbr.) J.F. Macbr. var. **chilensis** Barneby

Subarbusto. Endémica. 2500-3300 m.
 Países: CHL(AYP, TAR).

Denisophytum R. Vig.

Denisophytum stuckertii (Hassl.) E. Gagnon & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia herzogii* Harms, *Caesalpinia stuckertii* Hassl., *Caesalpinia stuckertii* Hassl. var. *robusta* Hassl.
 Arbusto. Endémica. 200-700 m.
 Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, NAS).

Desmanthus Willd.

Desmanthus acuminatus Benth.

Sin.: *Acuan acuminatum* (Benth.) Kuntze, *Desmanthus depressus* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *acuminatus* (Benth.) Burkart, *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *acuminatus* (Benth.) Isely
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, SAL, SDE, SFE), PRY(MIE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TYT).

Desmanthus brevipes B.L. Turner

Sin.: *Desmanthus chacoensis* Burkart, *Desmanthus tathuhyensis* Hoehne var. *brevipes* (B.L. Turner) Luckow
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SFE, SDE, TUC). PRY(PHA).

Desmanthus hexapetalus (Micheli) J.F. Macbr.

Sin.: *Desmanthus michelii* Hassl., *Desmanthus michelii* Hassl. f. *procumbens* Hassl., *Desmanthus michelii* Hassl. var. *hexapetalus* (Micheli) Hassl., nom. superfl., *Neptunia hexapetala* Micheli
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(CAU).

Desmanthus paspalaceus (Lindm.) Burkart

Sin.: *Acuan virgatum* (L.) Medik. f. *paspalacea* Lindm., *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *santaniensis* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(COL, FLA).

Desmanthus pernambucanus (L.) Thell.

Sin.: *Acuan bahamense* Britton & Rose, *Desmanthus diffusus* Willd., *Desmanthus strictus* Bertol., *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *strictus* Bertero ex Griseb., *Mimosa pernambucana* L.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: URY(MON).

Desmanthus tathuhyensis Hoehne var. *tathuhyensis*

Sin.: *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. f. *roseiflora* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, MIE, PAI). URY(LAV, MAL, MON, RIV, SJO).

Desmanthus virgatus (L.) Willd.

Sin.: *Acacia angustisiliqua* (Lam.) Desf., *Acacia virgata* (L.) Gaertn., *Acuan depressum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze, *Acuan texanum* Britton & Rose, *Acuan tracyi* Britton & Rose, *Desmanthus depressus* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Desmanthus pratorum* Macfad., *Desmanthus tenellus* DC., *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *depressus* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) B.L. Turner, *Mimosa angustisiliqua* Lam., nom. superfl., *Mimosa depressa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir., *Mimosa virgata* L.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP). PRY(APY, BOQ, CHO, GUA, ÑEE, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Desmodium Desv., nom. cons.

Desmodium affine Schltdl.

Sin.: *Desmodium albiflorum* Salzm. ex Benth., *Desmodium albiflorum* Salzm. ex Benth. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Meibomia affinis* (Schltdl.)

Kuntze, *Meibomia albiflora* Salzm. ex Benth.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CEN, GUA, PAI). URY(ART, CAS, PAY, RIV, TAC, TYT).

Desmodium album (Schindl.) J.F. Macbr.

Sin.: *Meibomia alba* Schindl.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR). BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

Desmodium arechavaletae Burkart

Sin.: *Desmodium asperum* (Poir.) Desv. f. *lanatum* Chodat & Hassl., *Desmodium asperum* (Poir.) Desv. f. *longepetiolatum* Chodat & Hassl., *Desmodium ramosissimum* Arechav., hom. illeg., *Meibomia ramosissima* Schindl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, GUA, SPE). URY(CLA, PAY, RIV, TAC).

Desmodium axillare (Sw.) DC.

Sin.: *Hedysarum axillare* Sw.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Desmodium bridgesii (Schindl.) Burkart

Sin.: *Desmodium longiarticulatum* (Rusby) Burkart, *Meibomia bridgesii* Schindl., *Meibomia longiarticulata* Rusby
Arbusto. Nativa. 500-1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Desmodium burkartii L.C.P. Lima & Vanni

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS).

Desmodium cajanifolium (Kunth) DC.
Sin.: *Hedysarum cajanifolium* Kunth,
Meibomia cajanifolia (Kunth) Kuntze
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Desmodium craspediferum Tozzi & M.
de L.A.A. de Oliveira
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Desmodium cuneatum Hook. & Arn.
Sin.: *Desmodium brevipes* Vogel,
Meibomia brevipes (Vogel) Kuntze,
Meibomia cuneata (Hook. & Arn.)
Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SDE, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,
CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI,
PHA). URY(MON, PAY, SAO).

Desmodium distortum (Aubl.) J.F.
Macbr.
Sin.: *Desmodium asperum* (Poir.) Desv.,
Desmodium elatum Kunth,
Desmodium hirsutum M. Martens &
Galeotti, *Desmodium pabulare*
(Hoehne) Malme, *Desmodium*
rubiginosum Benth., *Hedysarum*
asperum Poir., *Hedysarum distortum*
Aubl., *Meibomia aspera* (Poir.) Kuntze,
Meibomia distorta (Aubl.) Schindl.,
Meibomia pabularis Hoehne
Hierba. Nativa. 100-300 m.
Países: ARG(FOR, MIS). PRY(CAN,
CEN).

Desmodium glabrum (Mill.) DC.
Sin.: *Desmodium campestre* Brandegees,
Desmodium molle (Vahl) DC.,
Hedysarum glabrum Mill., *Hedysarum*
molle Vahl, *Meibomia glabra* (Mill.)
Kuntze, *Meibomia mollis* (Vahl) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY).
Desmodium guaraniticum (Chodat &
Hassl.) Malme
Sin.: *Desmodium asperum* (Poir.) Desv.
var. *guaraniticum* Chodat & Hassl.,
Meibomia guaranitica (Chodat &
Hassl.) Schindl.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Desmodium hassleri (Schindl.) Burkart
Sin.: *Meibomia hassleri* Schindl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CEN,
MIE, PAI, SPE).

Desmodium incanum (Sw.) DC.
Sin.: *Desmodium canum* (J.F. Gmel.)
Schinz & Thell., *Desmodium*
frutescens Schindl., *Desmodium*
incanum (Sw.) DC. f. *minor* Chodat &
Hassl., *Desmodium incanum* (Sw.)
DC. var. *supinum* (Sw.) Hook. & Arn.,
nom. illeg., *Desmodium supinum* (Sw.)
DC., *Hedysarum canescens* Mill.,
hom. illeg., *Hedysarum canum* J.F.
Gmel., *Hedysarum frutescens* Jacq.,
nom. illeg., *Hedysarum incanum* Sw.,
nom. cons., *Hedysarum racemosum*
Aubl., *Hedysarum supinum* Sw., hom.
illeg., *Meibomia adscendens* (Sw.)
Kuntze var. *incana* (Sw.) Kuntze,
Meibomia cana S.F. Blake, nom. illeg.,
Meibomia incana (Sw.) Hoehne,
Meibomia incana (Sw.) O.F. Cook &
G.N. Collins, *Meibomia incana* (Sw.)
Vail, *Meibomia ovalis* Rusby,
Meibomia supina (Sw.) Britton, nom.
illeg.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN,
ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA,

COL, MON, PAY, RIV, SAO, TAC,
TYT).

Desmodium intermedium Burkart
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(CHA, FOR).

Desmodium leiocarpum (Spreng.) G.
Don
Sin.: *Hedysarum leiocarpum* Spreng.,
Meibomia leiocarpa (Spreng.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA).
Notas: Lima et al. (Phytotaxa 169: 59.
2014) indican que la especie sólo
crece en Brasil.

Desmodium membranifolium L.C.P.
Lima, Tozzi & L.P. Queiroz
Sin.: *Meibomia guaranitica* (Chodat &
Hassl.) Schindl. var. *microcarpa*
Schindl.
Subarbusto. Nativa.
Países: PRY(CON).

Desmodium microcarpum (Rusby)
L.C.P. Lima, Tozzi & L.P. Queiroz
Sin.: *Desmodium hickenianum* Burkart,
Desmodium hickenianum Burkart var.
majus Burkart, *Desmodium*
pachyrrhizum Vogel var. *latifolium*
Micheli, *Meibomia microcarpa* Rusby
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SAL, SFE, TUC). BRA(PAR).
PRY(AMA, COA, SPE). URY(COL).

Desmodium pachyrrhizum Vogel
Sin.: *Desmodium pachyrrhizum* Vogel f.
intermedium Chodat & Hassl.,
Meibomia pachyrrhiza (Vogel) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APY, CAA, CAN, SPE).
URY(ART, MON, RIV, TAC).

Desmodium polygaloides Chodat & Hassl.

Sin.: *Desmodium dutrae* Malme, *Desmodium pachyrrhizum* Vogel var. *subsimplex* Benth., *Desmodium polygaloides* Chodat & Hassl. var. *dutrae* (Malme) Malme, *Desmodium subsimplex* (Benth.) Malme, *Meibomia polygaloides* (Chodat & Hassl.) Schindl., *Meibomia subsimplex* (Benth.) Schindl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, ITA, MIE). URY(RIV, TAC).

Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc.

Sin.: *Desmodium bigelovii* A. Gray, *Desmodium humile* (Schindl.) Burkart, *Desmodium lilloanum* (Schindl.) Burkart, *Desmodium neomexicanum* A. Gray, *Desmodium neomexicanum* A. Gray var. *bigelovii* (A. Gray) S. Watson, *Desmodium parvum* (Schindl.) Standl., *Desmodium spirale* (Sw.) DC., nom. illeg., *Desmodium spirale* (Sw.) DC., nom. illeg. var. *bigelovii* (A. Gray) Rob. & Greenm., nom. illeg., *Hedysarum procumbens* Mill., *Hedysarum spirale* Sw., nom. superfl., *Meibomia bigelovii* (A. Gray) Kuntze, *Meibomia humilis* Schindl., *Meibomia lilloana* Schindl., *Meibomia neomexicana* (A. Gray) Kuntze, *Meibomia parva* Schindl., *Meibomia procumbens* (Mill.) Schindl., *Meibomia spiralis* (Sw.) Kuntze, nom. illeg. Subarbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SDE, TUC). BRA(PAR).

Desmodium riedelii (Schindl.) Burkart
Sin.: *Meibomia riedelii* Schindl.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(COS).

Desmodium subsecundum Vogel

Sin.: *Desmodium discolor* Vogel, *Meibomia discolor* (Vogel) Kuntze, *Meibomia leiocarpa* (Spreng.) Kuntze var. *subsecunda* (Vogel) Schindl., *Meibomia subsecunda* (Vogel) Kuntze

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Desmodium subsericeum Malme

Sin.: *Meibomia malmei* Schindl., *Meibomia subsericea* (Malme) Schindl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada por Vanni (2001) para Paraguay sin indicar localidad o material de referencia.

Desmodium tortuosum (Sw.) DC.

Sin.: *Desmodium purpureum* (Mill.) Fawc. & Rendle, hom. illeg., *Hedysarum purpureum* Mill., *Hedysarum tortuosum* Sw., *Meibomia purpurea* (Mill.) Vail, *Meibomia tortuosa* (Sw.) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CON, ITA).

Desmodium triarticulatum Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Notas: Citada para Argentina y Uruguay (Lima et al., Phytotaxa 169: 91. 2014) sin indicar localidad o material de referencia.

Desmodium uncinatum (Jacq.) DC.

Sin.: *Desmodium uncinatum* (Jacq.) DC. var. *gracile* Burkart, *Hedysarum uncinatum* Jacq., *Meibomia uncinata* (Jacq.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, COA, GUA). URY(CLA, COL, LAV, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Desmodium venosum Vogel

Sin.: *Meibomia venosa* (Vogel) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Dimorphandra Schott

Dimorphandra mollis Benth.

Árbol. Nativa. 500- m.

Países: PRY(AMA).

Dioclea Kunth

Dioclea burkartii R.H. Maxwell

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APY).

Dioclea virgata (Rich.) Amshoff

Sin.: *Canavalia peruviana* Piper, *Dioclea lasiocarpa* Mart. ex Benth., *Dolichos virgatus* Rich., *Mucuna virgata* Desv. ex Steud.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Dipogon Liebm.

Dipogon lignosus (L.) Verdc.

Sin.: *Dolichos lignosus* L., *Verdcourtia lignosa* (L.) R. Wilczek
Liana. Introducida. 200-500 m.
Países: CHL(TAR).

Dipteryx Schreb.**Dipteryx alata** Vogel

Sin.: *Coumarouna alata* (Vogel) Kuntze,
Coumarouna alata (Vogel) Taub.
Árbol o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Diptychandra Tul.**Diptychandra aurantiaca** Tul.

Sin.: *Diptychandra epunctata* Tul. subsp.
rojasii Hassl., *Diptychandra glabra*
Benth.
Árbol o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Discolobium Benth.**Discolobium junceum** Micheli

Sin.: *Discolobium leptophyllum* Benth. f.
grandiflora Hassl., *Discolobium*
leptophyllum Benth. f. *parviflora*
Hassl., *Discolobium leptophyllum*
Benth. var. *junceum* (Micheli) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). PRY(MIE,
PHA).

Discolobium psoraleifolium Benth.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS).
BRA(RGS). URY(ART).

Discolobium pulchellum Benth.

Sin.: *Discolobium elongatum* Benth.,
Discolobium paucijugum Harms ex
Kuntze, *Discolobium pulchellum*
Benth. var. *viscosissimum* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SFE).
PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON,
MIE, ÑEE, PHA).

Dolichopsis Hassl.**Dolichopsis ligulata** (Piper) A. Delgado

Sin.: *Phaseolus dolichicarpus* Burkart,
Phaseolus ligulatus Piper
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA, SPE).

Dolichopsis paraguariensis (Benth.) Hassl.

Sin.: *Vigna paraguariensis* Benth.
Hierba o enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
SAL, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ,
CAA, ÑEE, PHA).

Enterolobium Mart.**Enterolobium contortisiliquum** (Vell.) Morong

Sin.: *Acacia melalobiata* Rojas Acosta,
Calliandra pacara Griseb.,
Enterolobium glaucescens Mart.,
Feuillea pacara (Griseb.) Kuntze,
Mimosa contortisiliqua Vell.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).
URY(CLA, MON, PAY, RNO, ROC).

Enterolobium timbouva Mart.

Sin.: *Enterolobium guaraniticum* (Chodat
& Hassl.) Hassl., *Enterolobium*
tamboril Mart., *Enterolobium timbouva*
Mart. f. *minor* Hoehne, *Enterolobium*
timbouva Mart. var. *canescens* Benth.,
Pithecellobium guaraniticum Chodat &
Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, CON).

Eriosema (DC.) Desv., nom. cons.**Eriosema boelckei** Fortunato

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Eriosema campestre Benth. var. **campestre**

Sin.: *Eriosema lagoense* Micheli
Hierba o subarbusto. Nativa. 300-1000
m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN,
SPE).

Eriosema campestre Benth. var. **delicatulum** Fortunato

Subarbusto. Nativa. 200-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS).
PRY(CAU, CAN, COA, SPE).

Eriosema campestre Benth. var. **macrophyllum** (Grear) Fortunato

Sin.: *Eriosema crinitum* (Kunth) G. Don
var. *macrophyllum* Grear
Subarbusto. Nativa. 800-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Notas: Citado por Rogalski & Miotto
(2011) para Argentina y Paraguay, sin
indicar localidad o material de
referencia.

Eriosema crinitum (Kunth) G. Don var. **crinitum**

Sin.: *Eriosema adumbratum* Pittier, *Eriosema barbatum* Desv., *Eriosema conwayi* Rusby, *Eriosema pinetorum* Standl., *Glycine crinita* Kunth, *Rhynchosia crinita* (Kunth) DC.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eriosema crinitum (Kunth) G. Don var. **discolor** Fortunato

Subarbusto. Nativa. 600-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eriosema crinitum (Kunth) G. Don var. **pulchellum** Benth.

Sin.: *Eriosema crinitum* (Kunth) G. Don var. *fusiforme* (Rusby) Grear, *Eriosema fusiforme* Rusby

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, COA, SPE).

Notas: Citado por Rogalski & Miotto (2011) para Argentina sin indicar localidad o material de referencia.

Eriosema glabrum Mart. ex Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Eriosema hasslerianum Chodat

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Eriosema heterophyllum Benth.

Hierba. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eriosema longifolium Benth.

Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).

Eriosema obovatum Benth.

Hierba. Nativa. 300-1700 m.

Países: BRA(PAR).

Notas: Citado por Rogalski & Miotto (2011) para Paraguay, sin indicar localidad o material de referencia.

Eriosema platycarpon Micheli

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Eriosema rufum (Kunth) G. Don var. **macrostachyum** (DC.) G. Don

Sin.: *Eriosema campestre* Benth. f. *pilosum* Chodat & Hassl., *Eriosema campestre* Benth. f. *pubescens* Chodat & Hassl., *Eriosema campestre* Benth. var. *pubescens* (Chodat & Hassl.) Grear, *Eriosema rufum* (Kunth) G. Don var. *flexuosum* Kuntze, *Eriosema yerbalium* Chodat & Hassl., *Eriosema yerbalium* Chodat & Hassl. f. *longifolium* Chodat & Hassl., *Eriosema yerbalium* Chodat & Hassl. f. *puberulum* Chodat & Hassl., *Rhynchosia rufa* DC. var. *macrostachya* DC.

Subarbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Eriosema rufum (Kunth) G. Don var. **rufum**

Sin.: *Glycine rufa* Kunth

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eriosema simplicifolium (DC.) G. Don

Sin.: *Eriosema lanceolatum* Benth., *Eriosema simplicifolium* (DC.) G. Don var. *micranthum* Grear, *Glycine simplicifolia* Kunth, hom. illeg., *Neurocarpum barbatum* Desv., *Rhynchosia simplicifolia* DC.

Hierba o enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA). BRA(PAR). PRY(AMA).

Eriosema strictum Benth.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, GUA).

Eriosema tacuarembense Arechav.

Sin.: *Eriosema longifolium* Benth. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Eriosema longifolium* Benth. var. *pedunculatum* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 200-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Eriosema violaceum (Aubl.) G. Don

Sin.: *Cytisus violaceus* Aubl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1800 m.

Países: PRY(AMA).

Errazurizia Phil.

Errazurizia multifoliolata (Clos) I.M. Johnst.

Sin.: *Dalea multifoliolata* (Clos) Reiche, *Errazurizia glandulifera* Phil., *Parosela multifoliolata* (Clos) J.F. Macbr., *Psoralea multifoliolata* Clos

Arbusto. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Erythrina L.

Erythrina crista-galli L. var. **crista-galli**

Sin.: *Corallodendron crista-galli* (L.) Kuntze, *Erythrina fasciculata* Benth., *Erythrina laurifolia* Jacq., *Erythrina pulcherrima* Tod., *Erythrina speciosa* Tod., *Micropteryx crista-galli* (L.)

- Walp., *Micropteryx fasciculata* (Benth.)
Walp., *Micropteryx laurifolia* (Jacq.)
Walp.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, ITA, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, DUR, MON, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
- Erythrina crista-galli** L. var. **leucochloa**
Lombardo
Árbol. Endémica. 0-300 m.
Países: URY(TYT).
- Erythrina crista-galli** L. var. **longiflora**
M.A. Zapater & E.C. Lozano
Árbol. Endémica. 200-1300 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC).
- Erythrina falcata** Benth., nom. cons.
Sin.: *Corallodendron falcatum* (Benth.) Kuntze, *Erythrina crista-galli* L. var. *inermis* Speg., nom. nud., *Erythrina martii* Colla
Árbol. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).
- Erythrina mulungu** Mart.
Sin.: *Erythrina chacoensis* Speg., nom. nud., *Erythrina dominguezii* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY, CAN, ÑEE).
- Erythrina similis** Krukoff
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA).
- Erythrina speciosa** Andrews
Sin.: *Corallodendron reticulatum* (C. Presl) Kuntze, *Erythrina poianthes* Brot.,
- Erythrina poianthes* Brot. var. *subinermis* Lindl., *Erythrina reticulata* C. Presl
Arbolito. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Erythrostemon** Klotzsch
- Erythrostemon angulatus** (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia angulata* (Hook. & Arn.) Baill., *Caesalpinia angulicaulis* Clos, *Sophora angulata* (Hook. & Arn.) Ravenna, *Zuccagnia angulata* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 0-1900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Erythrostemon argentinus** (Burkart) E. Gagnon & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia argentina* Burkart
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU).
- Erythrostemon coluteifolius** (Griseb.) E. Gagnon & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia coluteifolia* Griseb.
Arbusto. Nativa. 200-1700 m.
Países: ARG(SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, NAS).
- Erythrostemon coulterioides** (Griseb.) E. Gagnon & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia coulterioides* Griseb.
Arbusto. Nativa. 1400-2800 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Erythrostemon exilifolius** (Griseb.) E. Gagnon & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia exilifolia* Griseb.
Arbusto. Endémica. 1600-2000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
- Erythrostemon fimbriatus** (Tul.) E. Gagnon & G.P. Lewis
- Sin.: *Caesalpinia bangii* Rusby, *Caesalpinia cromantha* Burkart, *Caesalpinia fimbriata* Tul.
Arbusto. Nativa. 1300-3200 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
- Erythrostemon gilliesii** (Wall. ex Hook.) Klotzsch var. **burkartiana** (Ruíz Leal) Roger
Sin.: *Caesalpinia gilliesii* (Hook.) D. Dietr. var. *burkartiana* Ruiz Leal
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(MEN, SDE).
- Erythrostemon gilliesii** (Wall. ex Hook.) Klotzsch var. **gilliesii**
Sin.: *Caesalpinia gilliesii* (Hook.) D. Dietr., *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) Benth., nom. illeg., *Poinciana gilliesii* Wall. ex Hook.
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). URY(COL, MON, PAY, SAO).
- Exostyles** Schott
- Exostyles godoyensis** Soares-Silva & Mansano
Árbol. Endémica. 400-600 m.
Países: BRA(PAR).
- Galactia** P. Browne
- Galactia benthamiana** Micheli
Sin.: *Galactia decumbens* (Benth.) Hassl. var. *benthamiana* (Micheli) Hassl., *Galactia immarginata* Dusén
Hierba o enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, COA, GUA, PAI). URY(RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Galactia burkartii Fortunato

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: PRY(AMA, CAA).

Galactia dimorphophylla Fortunato, S.

Sede & Luckow
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). URY(RIV, TAC).

Galactia dubia DC.

Sin.: *Galactia montana* Britton
Hierba o subarbusto. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY).

Galactia fiebrigiana Burkart var.

correntina Burkart
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Galactia fiebrigiana Burkart var.
fiebrigiana

Hierba o subarbusto. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Galactia fiebrigiana Burkart var.
sericophylla Burkart

Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(SAL).

Galactia glaucescens Kunth

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(AMA, CON, ITA).

Galactia glaucophylla Harms

Sin.: *Rhynchosia sericea* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 600-1400 m.
Países: ARG(COR, SDE, SFE, SLU).

Galactia latisiliqua Desv.

Sin.: *Galactia colombiana* Killip ex L.A. Bermúdez García, nom. inval., *Galactia flaviflora* (Griseb.) Micheli, *Galactia jussiaeana* Kunth var. *velutina* (Benth.) Griseb., *Galactia latisiliqua* Desv. var. *chacoensis* Burkart, *Galactia latisiliqua* Desv. var. *orbicularis* Burkart, *Galactia neesii* DC. var. *flaviflora* Griseb., *Galactia obovata* Malme, *Galactia tenuiflora* (Klein ex Willd.) Wight & Arn. var. *flaviflora* (Micheli) Hassl., *Galactia velutina* Benth.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, CON, PHA). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO).

Galactia longifolia (Jacq.) Benth.

Sin.: *Galactia tenuiflora* (Klein ex Willd.) Wight & Arn. var. *eriocarpa* Benth. f. *angustifoliolata* Benth., *Galega longifolia* Jacq., *Sweetia longifolia* (Jacq.) DC., *Tephrosia longifolia* (Jacq.) Pers.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, SDE, SFE). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

Galactia striata (Jacq.) Urb. var.
crassirachis Burkart

Hierba o enredadera. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(TUC).

Galactia striata (Jacq.) Urb. var. **striata**

Sin.: *Galactia filiformis* (Jacq.) Benth., *Galactia striata* (Jacq.) Urb. var. *tenuiflora* (Klein ex Willd.) Burkart, *Galactia striata* (Jacq.) Urb. var. *tomentosa* (Bertol.) Urb., *Galactia tenuiflora* (Klein ex Willd.) Wight & Arn., *Glycine striata* Jacq., *Glycine tenuiflora* Klein ex Willd., *Odonia tomentosa* Bertol., *Teramnus tenuiflorus* (Klein ex Willd.) Spreng.
Hierba o enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, PAY, RIV, SAO).

Galactia texana (Scheele) A. Gray var.
degasperii Burkart

Hierba o enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR).

Galactia texana (Scheele) A. Gray var.
texana

Sin.: *Lablab texanus* Scheele
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Galega L.

Galega officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, MEN, NEU, RNE, SAL). CHL(ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(CAS, FLA, MON).

Genista L.

Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson

Sin.: *Cytisus monspessulanus* L., *Teline monspessulana* (L.) K. Koch

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). URY(MAL, RIV, ROC).

Genista tinctoria L.

Arbusto. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE).

Geoffroea Jacq.

Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart

Sin.: *Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart var. *subtropicalis* (Lillo) Burkart, *Geoffroea spinosa* (Molina) M. de Moussy, nom. illeg., *Geoffroea subtropicalis* (Lillo) Martínez Carretero, *Gourliea chilensis* Clos, *Gourliea decorticans* Gillies ex Hook. & Arn., *Gourliea decorticans* Gillies ex Hook. & Arn. var. *subtropicalis* Lillo, *Gourliea decorticata* Walp., nom. illeg., *Gourliea spinosa* (Molina) Skeels, *Lucuma spinosa* Molina

Árbol. Nativa. 100-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ). PRY(APY, PHA). URY(COL, MON, PAY, RNO, SOR).

Geoffroea spinosa Jacq.

Sin.: *Geoffroea bredemeyeri* Kunth, *Geoffroea striata* (Willd.) J.F. Macbr., comb. superfl., *Geoffroea striata* (Willd.) Morong, *Geoffroea superba* Bonpl., *Robinia striata* Willd.

Árbol. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Gleditsia L.

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. var. **amorphoides**

Sin.: *Garugandra amorphoides* Griseb.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI). URY(ART, PAY, SAO).

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. var. **anacantha** Burkart

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). URY(ART, MON).

Gleditsia triacanthos L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SAL, SFE). URY(CAS, MON, PAY, SAO).

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.

Sin.: *Robinia sepium* Jacq.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Glycyrrhiza L.

Glycyrrhiza astragalina Gillies ex Hook. & Arn.

Subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TUC). CHL(VAL, BIO).

Grona Lour.

Grona adscendens (Sw.) H. Ohashi & K. Ohashi

Sin.: *Desmodium adscendens* (Sw.) DC., *Desmodium adscendens* (Sw.) DC. var. *caeruleum* (Lindl.) DC., *Desmodium arinense* Hoehne, *Desmodium caeruleum* (Lindl.) G. Don, *Desmodium caespitosum* (Poir.) DC., *Desmodium obovatum* Vogel, *Desmodium vogelii* Steud., *Hedysarum adscendens* Sw., *Hedysarum adscendens* Sw. var. *caeruleum* Lindl., *Hedysarum caespitosum* Poir., *Meibomia adscendens* (Sw.) Kuntze, *Meibomia adscendens* (Sw.) Kuntze var. *obovata* (Vogel) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Grona barbata (L.) H. Ohashi & K. Ohashi

Sin.: *Desmodium barbatum* (L.) Benth., *Desmodium coeruleo-violaceum* (G. Mey.) DC., *Desmodium villosum* (Cham. & Schltdl.) Hemsl., nom. illeg., *Desmodium villosum* (Mill.) DC., *Hedysarum barbatum* L., *Hedysarum coeruleo-violaceum* G. Mey., *Hedysarum villosum* Mill., *Meibomia barbata* (L.) Kuntze, *Meibomia villosa* (Mill.) Kuntze, *Nicolsonia barbata* (L.) DC., *Nicolsonia villosa* Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA).

Grona triflora (L.) H. Ohashi & K. Ohashi

Sin.: *Desmodium triflorum* (L.) DC., *Hedysarum triflorum* L., *Meibomia triflora* (L.) Kuntze

Subarbusto. Introducida.

Países: BRA(SCA).

Guibourtia A.W. Benn.

Guibourtia hymenaeifolia (Moric.) J. Léonard

Sin.: *Copaifera chodatiana* Hassl., *Copaifera chodatiana* Hassl. var. *fruticosa* Hassl., *Copaifera hymenaeifolia* Moric., *Guibourtia chodatiana* (Hassl.) J. Léonard, *Guibourtia chodatiana* (Hassl.) J. Léonard var. *fruticosa* (Hassl.) J. Léonard

Árbol o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON).

Helicotropis A. Delgado

Helicotropis hookeri (Verdc.) A. Delgado

Sin.: *Phaseolus lobatus* Hook., *Vigna hookeri* Verdc.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(SAO, SJO, TAC).

Helicotropis linearis (Kunth) A. Delgado

Sin.: *Phaseolus asper* Benth., *Phaseolus coriaceus* Desv., *Phaseolus elongatus* Rose, *Phaseolus grandiflorus* Steud., *Phaseolus linearis* Kunth, *Phaseolus linearis* Kunth var. *coriaceus* (Desv.) Chodat & Hassl., *Phaseolus linearis* Kunth var. *latifolius* Benth., *Phaseolus linearis* Kunth var. *violaceus* (Vell.) Hassl., *Phaseolus violaceus* Vell., *Vigna linearis* (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier, *Vigna linearis* (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier var. *latifolia* (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Hierba, subarbusto o enredadera. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, GUA).

Hoffmannseggia Cav., nom. cons.

Hoffmannseggia aphylla (Phil.) G.P. Lewis & Sotuyo

Sin.: *Caesalpinia aphylla* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-3200 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Hoffmannseggia doellii Phil. subsp. **argentina** Ulibarri

Hierba. Endémica. 500-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Hoffmannseggia doellii Phil. subsp. **doellii**

Hierba. Endémica. 2300-3500 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Hoffmannseggia erecta Phil.

Sin.: *Hoffmannseggia falcaria* Cav. var. *andicola* Hook. & Arn., *Hoffmannseggia nana* Chodat & Wilczek, *Hoffmannseggia patagonica* Speg.
Hierba. Endémica. 100-3200 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU).

Hoffmannseggia eremophila (Phil.) Burkart ex Ulibarri

Sin.: *Hoffmannseggia andina* (Phil.) Phil., *Hoffmannseggia andina* Miers, nom. nud., *Hoffmannseggia andina* Miers var. *eremophila* (Phil.) Reiche, *Hoffmannseggia falcaria* Cav. var. *andina* Phil., *Hoffmannseggia philippiana* Hosseus, nom. superfl., *Zuccagnia eremophila* Phil.
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SAL). CHL(ANT, ATA).

Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert

Sin.: *Caesalpinia chicamana* Killip & J.F. Macbr., *Caesalpinia falcaria* (Cav.) L. Fisher, *Caesalpinia glauca* (Ortega)

Kunth, *Hoffmannseggia chicamana* (Killip & J.F. Macbr.) Eifert, *Hoffmannseggia densiflora* Benth., *Hoffmannseggia falcaria* Cav., nom. illeg., *Hoffmannseggia stricta* Benth., *Larrea densiflora* (Benth.) Britton, *Larrea glauca* Ortega
Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Hoffmannseggia minor (Phil.) Ulibarri

Sin.: *Hoffmannseggia doellii* Phil. var. *minor* Phil.
Hierba. Nativa. 800-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Hoffmannseggia prostrata Lag. ex DC.

Sin.: *Caesalpinia prostrata* (Lag. ex DC.) J.F. Macbr., *Hoffmannseggia gracilis* (Ruiz & Pav.) Hook. & Arn., *Larrea gracilis* Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. 0-2700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Hoffmannseggia pumilio (Griseb.) B.B. Simpson

Sin.: *Caesalpinia pumilio* Griseb., *Caesalpinia pumilio* Griseb. var. *riojana* (Kurtz ex Hosseus) Burkart, *Caesalpinia riojana* Kurtz ex Hosseus
Arbusto. Nativa. 1500-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SJU).

Hoffmannseggia trifoliata Cav.

Sin.: *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. f. *glandulosa* Speg., *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. f. *microphylla* Speg., *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. f. *microphylla* Speg., *Hoffmannseggia*

trifoliata Cav. f. *normalis* Speg., nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).

Hoffmannseggia viscosa (Ruiz & Pav.) Hook.

Sin.: *Caesalpinia ternata* (Phil.) J.F. Macbr., *Caesalpinia viscosa* (Ruiz & Pav.) Fisch., *Hoffmannseggia falcata* Cav. var. *glandulosa* Hook. & Arn., nom. illeg., *Hoffmannseggia ternata* Phil., *Larrea viscosa* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Hoffmannseggia yaviensis Ulibarri

Hierba. Nativa. 3400-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Holocalyx Micheli

Holocalyx balansae Micheli

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Hydrochorea Barneby & J.W. Grimes

Hydrochorea pedicellaris (DC.) M.V.B. Soares, Iganci & M.P. Morim

Sin.: *Albizia pedicellaris* (DC.) L. Rico, *Inga pedicellaris* DC.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Hymenaea L.

Hymenaea courbaril L.

Sin.: *Hymenaea confertifolia* Hayne, *Hymenaea courbaril* L. var. *stilbocarpa* (Hayne) Y.T. Lee & Langenh., *Hymenaea splendida* Vogel, *Hymenaea stilbocarpa* Hayne

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Hymenaea martiana Hayne

Sin.: *Cynometra martiana* (Hayne) Baill., *Hymenaea sellowiana* Hayne

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CON).

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne var. **pubescens** Benth.

Sin.: *Hymenaea correana* Barb. Rodr., *Hymenaea offersiana* Hayne, *Hymenaea rotunda* Hayne

Árbol o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne var. **stigonocarpa**

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, COA, PAI).

Indigofera L.

Indigofera asperifolia Bong. ex Benth.

Sin.: *Anila asperifolia* (Bong. ex Benth.) Kuntze, *Indigofera asperifolia* Hochst. ex Baker, nom. illeg., *Indigofera retrusa* N.E. Br.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, GUA, MIE, ÑEE). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Indigofera bongardiana (Kuntze) Burkart var. **bongardiana**

Sin.: *Anila bongardiana* Kuntze, *Indigofera gracilis* Benth.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, ITA, SPE).

Indigofera bongardiana (Kuntze) Burkart var. **graminoides** (Chodat & Hassl.) Burkart

Sin.: *Indigofera gracilis* Benth. var. *graminoides* Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(GUA, SPE).

Indigofera campestris Bong. ex Benth.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, GUA, ITA, PHA). URY(ART, PAY, RNO, TAC).

Indigofera guaranitica Hassl.

Sin.: *Indigofera elongata* Micheli, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL). PRY(CEN, SPE).

Indigofera hirsuta L.

Hierba o subarbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Indigofera kurtzii Harms ex Kuntze

Sin.: *Anila kurtzii* Kuntze, nom. nud., *Indigofera anil* L. var. *angustifolia* Griseb.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, SDE).

Indigofera latifolia Micheli

Sin.: *Indigofera campestris* Bong. ex Benth. f. *bifoliolata* Hassl., *Indigofera campestris* Bong. ex Benth. f.

unifoliolata Hassl., *Indigofera campestris* Bong. ex Benth. var. *latifolia* (Micheli) Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CAU, GUA, ITA).

Indigofera microcarpa Desv.

Sin.: *Anila sabulicola* (Benth.) Kuntze, *Indigofera sabulicola* Benth.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, ÑEE). URY(ART, PAY).

Indigofera parodiana Burkart

Sin.: *Indigofera campestris* Kurtz, nom. illeg., *Indigofera humilis* Kuntze, nom. illeg., *Indigofera pascuorum* Griseb., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY).

Indigofera pascuorum Benth.

Sin.: *Anila lespedezoides* (Kunth) Kuntze, *Anila pascuorum* (Benth.) Kuntze, *Indigofera lespedezioides* Kunth, *Indigofera lespedezioides* Kunth var. *pascuorum* (Benth.) Hassl., *Indigofera lespedezioides* Kunth var. *typica* Hassl., nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY, CON).

Indigofera stolonifera R.C. São Paulo & L.P. Queiroz

Hierba. Endémica.

Países: ARG(MIS).

Indigofera suffruticosa Mill.

Sin.: *Anila tinctoria* (L.) Kuntze var. *brachycarpa* (DC.) Kuntze, *Anila tinctoria* (L.) Kuntze var. *vera* Kuntze, *Indigofera anil* L., *Indigofera anil* L.

var. *polyphylla* DC., *Indigofera drepanocarpa* O. Berg, *Indigofera tinctoria* Mill., nom. illeg., *Indigofera tinctoria* Mill. var. *brachycarpa* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CON, COA, GUA). URY(COL, MAL, RNO, SJO).

Indigofera truxillensis Kunth

Hierba. Nativa.

Países: CHL(TAR).

Inga Mill.

Inga barbata Benth.

Sin.: *Feuilleea barbata* (Benth.) Kuntze

Arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Inga edulis Mart.

Sin.: *Feuilleea conferta* (Benth.) Kuntze, *Feuilleea scabriuscula* (Benth.) Kuntze, *Inga conferta* Benth., *Inga edulis* Mart. var. *parviflora* Benth., *Inga scabriuscula* Benth., *Inga scabriuscula* Benth. var. *villosior* Benth., *Inga uncinata* Spruce ex Benth., *Inga vera* Kunth, hom. illeg.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA).

Inga edwallii (Harms) T.D. Penn.

Sin.: *Affonsea dusenii* Harms, *Affonsea edwallii* Harms, *Affonsea hirsuta* Harms, *Affonsea schwebeliana* Harms

Arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Inga globularis T.D. Penn.

Sin.: *Affonsea comosa* Benth., *Affonsea juglandifolia* A. St.-Hil., *Inga comosa* (Benth.) F. Muell., hom. illeg., *Inga juglandifolia* (A. St.-Hil.) F. Muell., hom. illeg.

Arbolito. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Inga heterophylla Willd.

Sin.: *Feuilleea heterophylla* (Willd.) Kuntze, *Inga mapiriensis* Pittier, *Inga protracta* Steud., *Inga stenocarpa* Spruce ex Benth., nom. nud., *Inga umbellata* G. Don, *Inga vouapaefolia* Spruce ex Benth., nom. nud., *Mimosa heterophylla* (Willd.) Roxb., *Mimosa parae* Poir.

Árbol. Nativa. 0-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Inga laurina (Sw.) Willd.

Sin.: *Feuilleea laurina* (Sw.) Kuntze, *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. f. *pedicellaris* Hassl., *Inga tetraphylla* (Vell.) Mart., *Mimosa fagifolia* L., *Mimosa laurina* Sw., *Mimosa tetraphylla* Vell.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(CON).

Inga lentiscifolia Benth.

Sin.: *Feuilleea lentiscifolia* (Benth.) Kuntze

Árbol. Endémica. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Inga marginata Willd.

Sin.: *Feuilleea marginata* (Willd.) Kuntze, *Inga excelsa* Poepp., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. f. *genuina* Hassl., nom. inval., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. f. *pedicellaris* Hassl., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. var. *intermedia* Hassl., *Inga fagifolia* (L.)

Willd. ex Benth. var. *marginata* (Willd.) Hassl., *Inga guayaquilensis* G. Don, *Inga leptostachya* Spruce ex Benth., *Inga marginata* Willd. var. *itayensis* J.F. Macbr., *Inga odorata* G. Don, *Inga puberula* Benth., *Inga pycnostachya* Benth., *Inga sapida* Kunth, *Inga semialata* (Vell.) Mart., *Inga semialata* (Vell.) Mart. var. *latifolia* Benth., *Inga tysonii* T.S. Elias, *Mimosa semialata* Vell.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Inga saltensis Burkart

Sin.: *Inga breviflora* T.S. Elias

Árbol. Nativa. 700-2200 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Inga sellowiana Benth.

Sin.: *Feuillea sellowiana* (Benth.) Kuntze

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Inga sessilis (Vell.) Mart.

Sin.: *Feuillea sessilis* (Vell.) Kuntze, *Inga calycina* Benth., *Mimosa sessilis* Vell.

Árbol. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Inga striata Benth.

Sin.: *Feuillea catharinae* (Benth.) Kuntze, *Feuillea nuda* (Salzm. ex Benth.)

Kuntze, *Feuillea salzmänniana* (Benth.) Kuntze, *Inga canaminensis* Rusby, *Inga catharinae* Benth., *Inga dulcis* Mart., nom. illeg., *Inga nuda* Salzm. ex Benth., *Inga nuda* Salzm. ex Benth. var. *longiflora* Benth., *Inga salzmänniana* Benth., *Mimosa dulcis* Vell., hom. illeg.

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Inga subnuda Salzm. ex Benth. subsp. **luschnathiana** (Benth.) T.D. Penn.

Sin.: *Feuillea luschnathiana* (Benth.) Kuntze, *Inga eriantha* Benth., *Inga luschnathiana* Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Inga subnuda Salzm. ex Benth. subsp. **subnuda**

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Inga vera Willd.

Sin.: *Feuillea affinis* (DC.) Kuntze, *Feuillea uraguensis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Inga acutifolia* Benth., *Inga affinis* DC., *Inga arrabidae* Steud., *Inga uraguensis* Hook. & Arn., *Inga uraguensis* Hook. & Arn. f. *tomentulosa* Chodat & Hassl., *Inga uraguensis* Hook. & Arn. var. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Inga velloziana* Mart., *Inga vera* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn., *Inga vera* Willd. subsp. *uraguensis* (DC.) T.D. Penn., *Mimosa inga* L., *Mimosa umbellata* Vell., hom. illeg.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI). URY(ART, COL, PAY, RNO, SAO, SJO).

Inga virescens Benth.

Sin.: *Feuillea virescens* (Benth.) Kuntze

Arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY.

Inga vulpina Mart. ex Benth.

Sin.: *Feuillea guilleminiana* (Benth.) Kuntze, *Feuillea vulpina* (Mart. ex

Benth.) Kuntze, *Inga guilleminiana* Benth.

Arbolito. Nativa. 600-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Jupunba Britton & Rose

Jupunba brachystachya (DC.) M.V.B. Soares, M.P. Morim & Iganci

Sin.: *Abarema brachystachya* (DC.) Barneby & J.W. Grimes, *Inga brachystachya* DC.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Jupunba langsdorffii (Benth.) M.V.B. Soares, M.P. Morim & Iganci

Sin.: *Abarema langsdorffii* (Benth.) Barneby & J.W. Grimes, *Pithecellobium langsdorffii* Benth.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Kummerowia Schindl.

Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.

Sin.: *Hedysarum striatum* Thunb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Lablab Adans.

Lablab purpureus (L.) Sweet

Sin.: *Dolichos purpureus* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). CHL(IPA). URY(MON).

Laburnum Fabr.

Laburnum anagyroides Medik.

Árbol. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE).

Lachesiodendron P.G. Ribeiro, L.P.

Queiroz & Luckow

Lachesiodendron viridiflorum (Kunth)

P.G. Ribeiro, L.P. Queiroz & Luckow

Sin.: *Acacia subtilifolia* Kunth, *Acacia viridiflora* Kunth, *Piptadenia subtilifolia* (Kunth) Benth., *Piptadenia viridiflora* (Kunth) Benth., *Pityrocarpa viridiflora* (Kunth) Brenan

Arbusto o árbol. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY).

Lathyrus L.

Lathyrus cabrerianus Burkart

Sin.: *Lathyrus dumetorum* Burkart, hom. illeg., *Lathyrus pubescens* Clos, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

Lathyrus campestris Phil.

Sin.: *Lathyrus debilis* Vogel var. *campestris* (Phil.) Reiche, *Lathyrus gracillimus* Reiche

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAU, LLA).

Lathyrus cicera L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(VAL).

Lathyrus crassipes Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Lathyrus berterioanus* Colla ex Savi, *Lathyrus debilis* Vogel var.

berteroanum (Colla ex Savi) Reiche, *Lathyrus gracilis* Phil.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Lathyrus elegans Vogel

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Lathyrus hasslerianus Burkart

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lathyrus hirsutus L. var. **ecirrhosus**

Schur

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Lathyrus hirsutus L. var. **hirsutus**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(MON).

Notas: Su presencia en Chile es dudosa

Lathyrus hookeri G. Don

Sin.: *Lathyrus chilensis* Steud., *Lathyrus epetolaris* Clos, *Lathyrus heterocirrus* Phil., *Lathyrus hookeri* G. Don f. *albiflora* (Kuntze) Burkart, *Lathyrus hookeri* G. Don var. *trichocalyx* (Phil.) Burkart, *Lathyrus litoralis* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. f. *albiflorus* Kuntze, *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *araucanus* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *heterocirrus* (Phil.) Reiche, *Lathyrus ovalifolius* Phil., *Lathyrus pisaster* Clos, *Lathyrus roseus* Phil., *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn. f. *trichocalyx* (Phil.) Burkart, *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn., hom. illeg., *Lathyrus trichocalyx* Phil.

Hierba o enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(LBO, BIO, RME). URY(COL, PAY, SOR).

Lathyrus ibicuiensis Abruzzi de Oliveira

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Lathyrus japonicus Willd. var. **aleuticus** (Greene) Fernald

Sin.: *Lathyrus maritimus* (L.) Bigelow var. *aleuticus* Greene

Hierba. Introducida. 0-400 m.

Países: CHL(AIS).

Lathyrus japonicus Willd. var. **japonicus**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Lathyrus latifolius L.

Sin.: *Lathyrus laevigatus* Arechav., *Lathyrus sylvestris* L. var. *latifolius* (L.) Fiori

Hierba o enredadera. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL). URY(FLA, MON).

Lathyrus linearifolius Vogel

Hierba o enredadera. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lathyrus lomanus I.M. Johnst.

Enredadera. Endémica.

Países: CHL(ANT).

Lathyrus macropus Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Lathyrus linearifolius* Griseb., nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

- Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(VAL, ARA, RME).
- Lathyrus macrostachys** Vogel
Hierba o enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(PHA). URY(CLA, FLA, MAL, RNO, SJO, TAC).
- Lathyrus magellanicus** Lam. var. **gladiatus** (Hook.) Kuntze
Sin.: *Lathyrus gladiatus* Hook.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(ARA).
- Lathyrus magellanicus** Lam. var. **glaucescens** Speg.
Sin.: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *campestris* Dusén, *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *oxyphylla* Speg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).
- Lathyrus magellanicus** Lam. var. **longipes** (Phil.) Burkart
Sin.: *Lathyrus dumetorum* Phil. var. *longipes* (Phil.) Reiche, *Lathyrus longipes* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2400 m.
Países: ARG(CAT, NEU). CHL(LBO, RME).
- Lathyrus magellanicus** Lam. var. **magellanicus**
Sin.: *Lathyrus cryophilus* Chodat & Wilcz., *Lathyrus magellanicus* D. Don, nom. illeg., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *subsessilifolius* Kuntze, *Lathyrus patagonicus* Hauman, *Lathyrus pterocaulos* Phil.
- Hierba o enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).
- Lathyrus magellanicus** Lam. var. **tucumanensis** Burkart
Hierba. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). CHL(LLA). URY(CAS, CLA, SJO).
- Lathyrus multiceps** Clos
Sin.: *Lathyrus ecirrhosus* Phil., *Lathyrus eurypetalus* Phil., *Lathyrus multiceps* Clos var. *normalis* Burkart, *Lathyrus multiceps* Clos var. *setiger* (Phil.) Acevedo, *Lathyrus setiger* Phil., *Lathyrus setiger* Phil. var. *eurypetalus* (Phil.) Reiche
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Lathyrus nervosus** Lam.
Sin.: *Lathyrus armitageanus* Knowles & Westc., nom. illeg., *Lathyrus nervosus* Boiss., nom. illeg., *Lathyrus ovalifolius* Phil. var. *mucronatus* Phil., *Lathyrus trigonus* Vogel
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA, AIS, MAG). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TYT).
- Lathyrus nigrivalvis** Burkart
Sin.: *Lathyrus magellanicus* Lam. f. *longepetiolatus* Hassl., *Lathyrus nigrivalvis* Burkart f. *puberulus* Burkart
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(PHA).
- Lathyrus nitens** Vogel
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, RNO, RIV, SAO, TAC).
- Lathyrus odoratus** L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(COR).
- Lathyrus paraguariensis** Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).
- Lathyrus paranensis** Burkart
Sin.: *Lathyrus paranensis* Burkart f. *albiflorus* Burkart
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MEN). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TYT).
- Lathyrus parodii** Burkart var. **brevipetiolata** Burkart ex Izag. & Beyhaut
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).
- Lathyrus parodii** Burkart var. **parodii**
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS). URY(CLA, MON, RNO, RIV, SJO).
- Lathyrus pastorei** (Burkart) Rossow
Sin.: *Lathyrus multiceps* Clos var. *pastorei* Burkart
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
- Lathyrus pubescens** Hook. & Arn. var. **monticola** Burkart
Sin.: *Lathyrus pubescens* Hook. & Arn. var. *acutifolius* Griseb.
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Lathyrus pubescens Hook. & Arn. var. **pubescens**

Sin.: *Lathyrus acutifolius* Vogel, *Lathyrus andicolus* Gand., *Lathyrus dumetorum* Phil., *Lathyrus petiolaris* Vogel, *Lathyrus purpureo-coeruleus* Knowles & Westc.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SLU, SCR, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

Lathyrus pusillus Elliott

Sin.: *Lathyrus arvensis* Phil., *Lathyrus cicera* L. var. *patagonica* Speg., *Lathyrus crassipes* Phil., nom. illeg., *Lathyrus debilis* Vogel var. *arvensis* (Phil.) Reiche, *Lathyrus dicirrhus* Clos, *Lathyrus engelmanni* Bisch., *Lathyrus guaraniticus* Hassl., *Lathyrus montevidensis* Vogel, *Lathyrus stipularis* C. Presl, *Lathyrus stipularis* C. Presl var. *patagonica* (Speg.) Speg.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, NEU, RNE, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(LLA). PRY(ITA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Lathyrus sativus L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO). URY(MON).

Lathyrus sericeus Lam.

Sin.: *Lathyrus tomentosus* Lam., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, SFE). URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO).

Lathyrus subandinus Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Lathyrus subulatus Lam.

Sin.: *Lathyrus debilis* Vogel, *Lathyrus missionum* Hassl., *Lathyrus subulatus* Lam. var. *longifolius* Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Lathyrus tropicalandinus Burkart

Hierba o enredadera. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Lecointea Ducke

Lecointea hatschbachii Barneby

Arbusto o arbolito. Endémica. 200-300 m.

Países: BRA(PAR).

Leptolobium Vogel

Leptolobium elegans Vogel

Sin.: *Acosmium subelegans* (Mohlenbr.) Yakovlev *Sweetia elegans* (Vogel) Benth., *Sweetia elegans* (Vogel) Benth. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl., *Sweetia elegans* (Vogel) Benth. f. *ovatifolia* Chodat & Hassl., *Sweetia subelegans* Mohlenbr.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

Leptospron (Benth.) A. Delgado

Leptospron adenanthum (G. Mey.) A. Delgado

Sin.: *Phaseolus adenanthus* G. Mey., *Phaseolus adenanthus* G. Mey. var. *caeduorus* (Mart.) Hassl., *Phaseolus adenanthus* G. Mey. var. *genuinus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus adenanthus* G. Mey. var. *radicans* (Benth.) Hassl., *Phaseolus adenanthus* G. Mey. var. *truxillensis* (Kunth) Hassl., *Phaseolus amoenus* Macfad., hom. illeg., *Phaseolus barbulatus* Benth., *Phaseolus brevipes* Benth., *Phaseolus caeduorus* Mart., *Phaseolus cirrosus* Kunth, *Phaseolus cuernavacanus* Rose, *Phaseolus cumingii* Benth., *Phaseolus macfadyenii* Steud., *Phaseolus occidentalis* Rose, *Phaseolus radicans* Benth., *Phaseolus senegalensis* Guill. & Perr., *Phaseolus subtortus* Benth., *Phaseolus truxillensis* Kunth, *Vigna adenantha* (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Enredadera. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, SAO, SJO).

Leucaena Benth.

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit subsp. **glabrata** (Rose) Zárate

Sin.: *Leucaena glabrata* Rose

Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC).

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
subsp. **leucocephala**

Sin.: *Mimosa leucocephala* Lam.

Árbolito. Introducida.

Países: BRA(PAR). CHL(IPA).

Leucochloron Barneby & J.W. Grimes

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Mimosa incurialis* Vell.

Árbol. Nativa. 700-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Libidibia (DC.) Schltdl.

Libidibia paraguariensis (D. Parodi) G.P. Lewis

Sin.: *Acacia paraguariensis* D. Parodi, *Caesalpinia coriaria* Micheli, hom. illeg., *Caesalpinia melanocarpa* Griseb., *Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi) Burkart

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, ÑEE, NAS, PHA, SPE).

Lonchocarpus Kunth

Lonchocarpus cultratus (Vell.) Tozzi & H.C. Lima

Sin.: *Pterocarpus cultratus* Vell.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lonchocarpus lilloi (Hassl.) Burkart

Sin.: *Lonchocarpus nitidus* (Vogel) Benth. var. *lilloi* Hassl.

Árbol. Nativa.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth.

Sin.: *Derris nitidus* (Vogel) N.F. Mattos, *Sphinctolobium nitidum* Vogel

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CON, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR).

Lonchocarpus pluvialis Rusby

Sin.: *Lonchocarpus sericeus* (Poir.) Kunth subsp. *paraguariensis* Hassl.

Árbol. Nativa.

Países: PRY(PAI).

Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.

Sin.: *Robinia sericea* Poir.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Lophocarpinia Burkart

Lophocarpinia aculeatifolia (Burkart) Burkart

Sin.: *Cenostigma aculeatifolium* Burkart

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SAL). PRY(APY).

Lotus L.

Lotus angustissimus L.

Sin.: *Lotus gracilis* Waldst. & Kit.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: URY(DUR, TYT).

Lotus corniculatus L.

Sin.: *Lotus caucasicus* Kuprian., *Lotus major* Scop.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, NEU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME). URY(MON, TAC).

Lotus ornithopodioides L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: URY(MON, SOR).

Lotus pedunculatus Cav.

Sin.: *Lotus uliginosus* Schkuhr

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, ERI, NEU, RNE, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, IPA). URY(MON, TAC).

Lotus suaveolens Pers.

Sin.: *Lotus hispidus* Desf. ex DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, NEU). BRA(RGS). URY(CLA, DUR, FLA, MAL, MON, TAC, TYT).

Lotus subpinnatus Lag.

Sin.: *Hosackia subpinnata* (Lag.) Torr. & A. Gray

Hierba. Endémica. 0-2300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.

Sin.: *Lotus corniculatus* L. var. *tenuifolius* L., *Lotus glaber* Mill., *Lotus tenuifolius* (L.) Rchb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, RME). URY(MON, ROC, SJO).

Luetzelburgia Harms

Luetzelburgia guaissara Toledo

Sin.: *Luetzelburgia reitzii* Burkart
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Luetzelburgia sotoi D.B.O.S. Cardoso,

L.P. Queiroz & H.C. Lima
Arbolito. Nativa.
Países: PRY(APY)

Lupinus L.

Lupinus albescens Hook. & Arn.

Sin.: *Lupinus incanus* Graham, *Lupinus parodianus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA). URY(ART, COL, RIV, SJO, SOR, TAC).

Lupinus albus L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Lupinus andicola Gillies var. **alivillosus**

(C.P. Sm.) Planchuelo & M. Fabbroni
Sin.: *Lupinus alivillosus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Lupinus andicola Gillies var. **andicola**

Sin.: *Lupinus praedictus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Lupinus andicola Gillies var. **grisebachianus** (C.P. Sm.)
Planchuelo & M. Fabbroni

Sin.: *Lupinus brevicaulis* Griseb., hom. illeg., *Lupinus grisebachianus* C.P. Sm.
Hierba. Nativa. 3500-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Lupinus andicola Gillies var. **subacaulis**

(Griseb.) Planchuelo & M. Fabbroni
Sin.: *Lupinus chilensis* C.P. Sm., *Lupinus subacaulis* Griseb.
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Lupinus andicola Gillies var. **subinflatus**

(C.P. Sm.) Planchuelo & M. Fabbroni
Sin.: *Lupinus subinflatus* C.P. Sm.
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Lupinus angustifolius L.

Sin.: *Lupinus canaliculatus* Sweet
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(ERI). CHL(BIO). URY(FLA, MAL).

Lupinus arboreus Sims

Sin.: *Lupinus barilocheensis* C.P. Sm.
Arbusto. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, JFE).

Lupinus aureonitens Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Lupinus multiflorus* Desr. var. *paucifoliolatus* Benth., *Lupinus purolanatus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Lupinus australis C.P. Sm. var. **australis**

Sin.: *Lupinus cafayatensis* C.P. Sm., *Lupinus castillonanus* C.P. Sm.,

Lupinus catamarcensis C.P. Sm., *Lupinus sierra-zentae* C.P. Sm., *Lupinus tilcaricus* C.P. Sm.
Subarbusto. Endémica. 3000-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Lupinus australis C.P. Sm. var. **jujuyensis** (C.P. Sm.) Planchuelo

Sin.: *Lupinus jujuyensis* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Lupinus australis C.P. Sm. var. **umidicola** (C.P. Sm.) Planchuelo

Sin.: *Lupinus divorsus* C.P. Sm., *Lupinus jorgenseanus* C.P. Sm., *Lupinus schickendantzii* C.P. Sm., *Lupinus tucumanensis* C.P. Sm., *Lupinus umidicola* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Lupinus bracteolaris Desr. var. **bracteolaris**

Sin.: *Lupinus bracteolaris* Desr. var. *czermakii* (Micheli ex Briq. & Hochr.) Burkart, *Lupinus bracteolaris* Desr. var. *leptophyllus* Benth., *Lupinus czermakii* Micheli ex Briq. & Hochr., *Lupinus leptophyllus* Benth., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Lupinus bracteolaris Desr. var. **tenuifolius** (Arechav.) C.P. Sm.

Sin.: *Lupinus tenuifolius* Arechav.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(CLA, TAC).

Lupinus buchtienii Rusby

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Lupinus burkartianus C.P. Sm.

Sin.: *Lupinus amnis-churquis* C.P. Sm., *Lupinus campestris-florum* C.P. Sm., *Lupinus hiulcus* C.P. Sm., *Lupinus intortus* C.P. Sm., *Lupinus opertospicus* C.P. Sm., *Lupinus pavorum* C.P. Sm., *Lupinus solitarius* C.P. Sm., *Lupinus tafiensis* C.P. Sm., *Lupinus venturianus* C.P. Sm.

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Lupinus erectifolius C.P. Sm.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Lupinus guaraniticus (Hassl.) C.P. Sm.

Sin.: *Lupinus attenuatus* Gardner var. *guaraniticus* Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Lupinus heptaphyllus (Vell.) Hassl.

Sin.: *Cytisus heptaphyllus* Vell., *Lupinus aspersus* C.P. Sm., *Lupinus berroanus* C.P. Sm., *Lupinus bonplandianus* C.P. Sm., *Lupinus gibertianus* C.P. Sm. var. *berroanus* (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes, *Lupinus gibertianus* C.P. Sm. var. *gibertianus*, *Lupinus gibertianus* C.P. Sm. var. *reineckianus* (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes, *Lupinus hasslerianus* C.P. Sm., *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl. f. *hilarianus* Benth., *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl. f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Lupinus hilarianus* Benth., nom. superfl., *Lupinus hilarianus* Benth. var. *reineckianus* C.P. Sm., *Lupinus*

niederleinianus C.P. Sm., *Lupinus palmarum* C.P. Sm., *Lupinus propedubius* C.P. Sm., *Lupinus reineckianus* (C.P. Sm.) C.P. Sm., *Lupinus rubidus* C.P. Sm., *Lupinus sanctae-annae* C.P. Sm., *Lupinus subumbellatus* C.P. Sm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, ÑEE). URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Lupinus hieronymi C.P. Sm.

Sin.: *Lupinus honoratus* C.P. Sm., *Lupinus lilloanus* C.P. Sm., *Lupinus lorentzianus* C.P. Sm., *Lupinus monettianus* C.P. Sm., *Lupinus schreiteranus* C.P. Sm.

Hierba. Endémica. 1200-3100 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Lupinus ignobilis C.P. Sm.

Sin.: *Lupinus bailettianus* C.P. Sm., *Lupinus inferior* C.P. Sm., *Lupinus resimus* C.P. Sm.

Hierba. Nativa. 2000-3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Lupinus lanatus Benth.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). URY(ART, RIV).

Lupinus linearis Desr.

Sin.: *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl. f. *pseudolinearis* Hassl., *Lupinus hilarianus* Benth. var. *pseudolinearis* (Hassl.) C.P. Sm., *Lupinus pseudolinearis* (Hassl.) C.P. Sm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(ITA).

URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SOR, TYT).

Lupinus luteus L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(VAL).

Lupinus magnistipulatus Planchuelo & D.B. Dunn

Sin.: *Lupinus setifolius* Planchuelo & D.B. Dunn

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lupinus microcarpus Sims

Sin.: *Lupinus comberanus* C.P. Sm., *Lupinus fischeranus* C.P. Sm., *Lupinus verticillatus* C.P. Sm.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Lupinus multiflorus Desr.

Sin.: *Lupinus multiflorus* Desr. var. *grandiflorus* Benth.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO).

Lupinus oreophilus Phil.

Sin.: *Lupinus oreophilus* Greene, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 2700-4400 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Lupinus paraguariensis Chodat & Hassl.

Sin.: *Lupinus missionum* (Hassl.) C.P. Sm., *Lupinus paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *missionum* Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

- Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, COA, SPE). URY(PAY).
- Lupinus paranensis** C.P. Sm.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Lupinus polyphyllus** Lindl.
Hierba. Introducida. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).
- Lupinus reitzii** Burkart ex Pinheiro & Miotto
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Lupinus rubriflorus** Planchuelo
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Lupinus sellowianus** Harms
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
- Lupinus tarapacensis** C.P. Sm.
Arbusto. Nativa. 2500-3600 m.
Países: CHL(APY, TAR).
- Lupinus tomentosus** DC.
Arbusto. Nativa. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUJ).
- Lupinus uleanus** C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Lupinus ultramontanus** C.P. Sm.
Subarbusto. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
- Lupinus velutinus** Benth.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).
- Lupinus werdermannianus** C.P. Sm.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(TAR).
- Machaerium** Pers.
- Machaerium acutifolium** Vogel
Sin.: *Machaerium acutifolium* Benth. var. *muticum* (Benth.) Benth., *Machaerium muticum* Benth., *Sweetia atrata* Mohlenbr.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).
- Machaerium brasiliense** Vogel
Sin.: *Machaerium ciliatum* Benth., *Machaerium luschnathianum* J. Presl, *Machaerium vestitum* Vogel
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
- Machaerium debile** (Vell.) Stellfeld
Sin.: *Machaerium dimorphandrum* Hoehne, *Nissolia debile* Vell.
Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Machaerium eriocarpum** Benth.
Sin.: *Machaerium eriocarpum* Benth. f. *mucronulata* Chodat & Hassl., *Machaerium eriocarpum* Benth. f. *tomentella* Chodat & Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CEN, CON).
- Machaerium glabrum** Vogel
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).
- Machaerium hatschbachii** Rudd
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Machaerium hirtum** (Vell.) Stellfeld
Sin.: *Machaerium angustifolium* Vogel, *Machaerium angustifolium* Vogel f. *glauca* Chodat & Hassl., *Nissolia hirta* Vell.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA, RGS). PRY(APY, AMA, CAN, CON, GUA, PAI, PHA, SPE).
- Machaerium lanceolatum** (Vell.) J.F. Macbr.
Sin.: *Nissolia lanceolata* Vell.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Machaerium nyctitans** (Vell.) Benth.
Sin.: *Nissolia nyctitans* Vell.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Machaerium paraguariense** Hassl.
Sin.: *Machaerium paraguariense* Hassl. var. *cuspidatum* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, PAI).
- Machaerium ruddianum** C.V. Mend. & Tozzi
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Machaerium scleroxylon** Tul.
Sin.: *Machaerium nictitans* (Vell.) Benth. var. *scleroxylon* (Tul.) Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).
- Machaerium stipitatum** (DC.) Vogel
Sin.: *Machaerium minutiflorum* Tul., *Nissolia stipitata* DC.
Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA, PAI).

Machaerium uncinatum (Vell.) Benth.

Sin.: *Nissolia uncinata* Vell.

Arbusto o liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Machaerium villosum Vogel

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Macropsychanthus Harms ex K.

Schum. & Lauterb.

Macropsychanthus violaceus (Mart. ex

Benth.) L.P. Queiroz & Snak

Sin.: *Dioclea paraguariensis* Hassl.,

Dioclea violacea Mart. ex Benth.,

Dolichos altissimus Vell., nom. illeg.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,

COA, GUA).

Macropsychanthus wilsonii (Standl.)

L.P. Queiroz & Snak

Sin.: *Dioclea wilsonii* Standl.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Macroptilium (Benth.) Urb.

Macroptilium arenarium (Bacigalupo)

S.I. Drewes & R.A. Palacios

Sin.: *Macroptilium prostratum* (Benth.)

Urb. var. *arenarium* Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, SFE).

Macroptilium atropurpureum (Moq. &

Sessé ex DC.) Urb.

Sin.: *Phaseolus atropurpureus* Moq. & Sessé ex DC.

Hierba o enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(SFE). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(CEN).

Macroptilium bracteatum (Nees & C.

Mart.) Maréchal & Baudet

Sin.: *Phaseolus bracteatus* Nees & C.

Mart., *Phaseolus bracteatus* Nees &

C. Mart. f. *panduriformis* Hassl.,

Phaseolus bracteatus Nees & C. Mart.

f. *rhomboidalis* Hassl., *Phaseolus*

decipiens Salzm. ex Benth.

Enredadera. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,

ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC).

BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA,

CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE).

Macroptilium chacoensis (Hassl.) S.I.

Drewes & R.A. Palacios

Sin.: *Phaseolus chacoensis* Hassl.,

Phaseolus chacoensis Hassl. f. *elatus*

Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CON).

Macroptilium erythroloma (Mart. ex

Benth.) Urb.

Sin.: *Phaseolus erythroloma* Mart. ex

Benth., *Phaseolus monophyllus* Benth.

var. *rufus* (Micheli) Hassl., *Phaseolus*

rubidus Piper, *Phaseolus rufus*

Micheli, hom. illeg.

Hierba o enredadera. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE,

TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN,

COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

URY(RNO).

Macroptilium gibbosifolium (Ortega) A.

Delgado

Sin.: *Macroptilium fraterum* (Piper)

Juárez, *Phaseolus fraterum* Piper,

Phaseolus gibbosifolius Ortega,

Phaseolus panduratus Mart. ex Benth.

var. *tuberosus* Hicken

Hierba. Nativa. 500-2800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ,

SAL, TUC).

Macroptilium gracile (Poepp. ex Benth.)

Urb.

Sin.: *Macroptilium longepedunculatum*

(Mart. ex Benth.) Urb., *Phaseolus*

gracilis Poepp. ex Benth., *Phaseolus*

longepedunculatus Mart. ex Benth.,

Phaseolus longepedunculatus Mart. ex

Benth. var. *angustifolius* Benth., nom.

nud., *Phaseolus longepedunculatus*

Mart. ex Benth. var. *latifolius* Benth.,

nom. nud., *Phaseolus*

longepedunculatus Mart. ex Benth.

var. *subcoriaceus* Benth.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,

SFE). PRY(APY, CEN, COA, MIE,

ÑEE, PHA, SPE).

Macroptilium lathyroides (L.) Urb.

Sin.: *Lotus maritimus* Vell., hom. illeg.,

Phaseolus crotalarioides Mart. ex

Benth., *Phaseolus hastifolius* Mart. ex

Benth., *Phaseolus lathyroides* L.,

Phaseolus lathyroides L. f. *chacoensis*

Hassl., *Phaseolus lathyroides* L. f.

hirsutus Hassl., *Phaseolus lathyroides*

L. f. *repandus* Hassl., *Phaseolus*

lathyroides L. f. *typicus* Hassl., nom.

inval., *Phaseolus lathyroides* L. var.

genuinus Hassl., nom. inval.,

Phaseolus lathyroides L. var.

semierectus (L.) Hassl., *Phaseolus*

maritimus Benth., *Phaseolus*

psoraleoides Wight & Arn., *Phaseolus*

semierectus L., *Phaseolus*

semierectus L. var. *angustifolius*

Benth., *Phaseolus semierectus* L. var.

nanus Benth., *Phaseolus semierectus* L. var. *subhastatus* Benth., *Phaseolus strictus* A. Braun & C.D. Bouché

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, ITA, ÑEE, PHA). URY(ART).

Notas: Introducida en Chile

Macroptilium martii (Benth.) Maréchal & Baudet

Sin.: *Phaseolus martii* Benth.

Hierba o enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(APY, AMA, CON).

Macroptilium monophyllum (Benth.) Maréchal & Baudet

Sin.: *Phaseolus monophyllus* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, GUA).

Macroptilium panduratum (Mart. ex Benth.) Maréchal & Baudet

Sin.: Juárez & Pérez, *Macroptilium geophilum* (Burkart) Debouck, *Phaseolus geophilus* Burkart, *Phaseolus panduratus* Mart. ex Benth., *Phaseolus panduratus* Mart. ex Benth. f. *eupanduratus* Hassl., nom. inval.

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, CEN).

Macroptilium prostratum (Benth.) Urb.

Sin.: *Phaseolus prostratus* Benth., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *hirsutus* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *linearifoliolatus* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *macrophyllus* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *pseudo-ovatifolius* Hassl., *Phaseolus*

prostratus Benth. var. *angustifolius* Benth., *Phaseolus prostratus* Benth. var. *ovatifolius* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CLA, DUR, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

Macroptilium psammodes (Lindm.) S.I. Drewes & R.A. Palacios

Sin.: *Phaseolus panduratus* Mart. ex Benth. f. *ovatifolius* Hassl., *Phaseolus panduratus* Mart. ex Benth. f. *psammodes* (Lindm.) Hassl., *Phaseolus psammodes* Lindm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, CAS, MAL, MON, RIV, ROC).

Macroptilium sabaraense (Hoehne) V.P. Barbosa

Sin.: *Macroptilium brachycalyx* (Hassl.) Maréchal & Baudet, *Phaseolus brachycalyx* Hassl., *Phaseolus sabaraensis* Hoehne

Hierba o enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CON).

Marlimorimia L.P. Queiroz, L.M. Borges, Marc.F. Simon & P.G. Ribeiro

Marlimorimia warmingii (Benth.) L.P. Queiroz & P.G. Ribeiro

Sin.: *Mimosa warmingii* Benth., *Newtonia glaziovii* (Harms) Burkart ex Barth & Yoneshigue, *Newtonia warmingii* (Benth.) G.P. Lewis, *Piptadenia glaziovii* Harms, *Pseudopiptadenia*

warmingii (Benth.) G.P. Lewis & M.P. Lima

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Medicago L., nom. cons.

Medicago arabica (L.) Huds.

Sin.: *Medicago arabica* (L.) All., comb. superfl., *Medicago denticulata* Willd. var. *brevispina* Benth., *Medicago maculata* H. Sibth., *Medicago polymorpha* L. var. *arabica* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE, TDF). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RNO).

Medicago arborea L.

Sin.: *Medicago arborea* Aubl., nom. illeg.

Arbusto. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(MAU, RME). URY(MON).

Medicago falcata L.

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(SCR).

Medicago intertexta Mill.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: URY(FLA, MON).

Medicago lupulina L.

Sin.: *Medica lupulina* (L.) Scop.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME, JFE, IPA).

URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, SJO).

Medicago minima (L.) Bartal. var. **brevispina** Benth.

Sin.: *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *pulchella* Lowe
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA). URY(RNO).

Medicago minima (L.) Bartal. var. **minima**

Sin.: *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *canescens* Ser. ex DC., *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *mollissima* (Roth) W.D.J. Koch, *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *recta* (Desf.) Burnat, *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *vulgaris* Urb., *Medicago minima* (L.) Grufberg, comb. illeg., *Medicago mollissima* Roth, *Medicago polymorpha* L. var. *minima* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, ARA, MAG, RME). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

Medicago polymorpha L. var. **brevispina** (Benth.) Heyn

Sin.: *Medicago apiculata* Willd., *Medicago denticulata* Willd. var. *brevispina* Benth., *Medicago hispida* Gaertn. var. *apiculata* (Willd.) Burnat, comb. superfl., *Medicago hispida* Gaertn. var. *apiculata* (Willd.) Urb.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE, SFE). URY(MON).

Medicago polymorpha L. var. **confinis** (W.D.J. Koch) Ooststr. & B. Reichg.

Sin.: *Medicago apiculata* Willd. var. *confinis* W.D.J. Koch, *Medicago berteriana* Moris, *Medicago hispida* Gaertn. var. *confinis* (W.D.J. Koch) Burnat, *Medicago tuberculata* Urb.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, RNE, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, JFE). URY(COL, FLA, LAV, MON, RNO, SOR).

Medicago polymorpha L. var. **polymorpha**

Sin.: *Medicago denticulata* Willd., *Medicago hispida* Gaertn., *Medicago lappacea* Desr., *Medicago nigra* (L.) Krock., *Medicago polymorpha* L. subsp. *hispida* (Gaertn.) Ponert, *Medicago polymorpha* L. var. *nigra* L., *Medicago reticulata* Benth.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LRI, MIS, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Medicago polymorpha L. var. **vulgaris** (Benth.) Shinnars

Sin.: *Medicago denticulata* Willd. var. *vulgaris* Benth., *Medicago hispida* Gaertn. var. *denticulata* (Willd.) Asch. & Graebn.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COS, ERI, LPA, RNE, SCR, SFE). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO, ARA, LSR, RME, JFE). URY(MON).

Medicago sativa L.

Sin.: *Medica sativa* (L.) Lam., *Medicago sativa* L. f. *alba* Benke
Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, COL, MON, SJO).

Medicago scutellata (L.) Mill.

Sin.: *Medicago polymorpha* L. var. *scutellata* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(FLA, MON, SOR).

Medicago truncatula Gaertn.

Sin.: *Medicago tribuloides* Desr., *Medicago truncatula* Gaertn. subsp. *longiaculeata* (Urb.) Ponert, *Medicago truncatula* Gaertn. var. *longiaculeata* Urb.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, RNE). URY(MAL, MON, RNO).

Melilotus Mill.

Melilotus albus Medik.

Sin.: *Melilotus albus* Desr., hom. illeg., *Melilotus leucanthus* W.D.J. Koch ex DC., *Melilotus melanospermus* Ser., *Sertula alba* (Desv.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, AIS, MAG, RME). PRY(APY, BOQ). URY(CAS, MAL, MON, PAY, RNO).

Melilotus indicus (L.) All.

Sin.: *Melilotus parviflorus* Desf., *Sertula indica* (L.) Kuntze, *Trifolium indicum* L.
Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Melilotus messanensis (L.) All.

Sin.: *Melilotus siculus* (Turra) Vitman ex B.D. Jacks., *Sertula messanensis* (All.) Kuntze, *Trifolium messanense* L.
Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(MON, SJO).

Melilotus officinalis (L.) Lam.

Sin.: *Melilotus arvensis* Wallr., *Melilotus officinalis* (L.) Pall., comb. illeg., *Melilotus pallidus* Ser., *Sertula officinalis* (L.) Kuntze, *Trifolium officinale* L.
Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SCR, SFE). CHL(VAL, LBO, MAG, RME). URY(MON).

Microlobius C. Presl

Microlobius foetidus (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. **paraguensis** (Benth.) M. Sousa & G. Andrade

Sin.: *Goldmania paraguensis* (Benth.) Brenan, *Piptadenia paraguensis* (Benth.) Lindm., *Piptadenia quadrifolia*

N.E. Br., *Pithecellobium paraguense* Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Mimosa L.

Mimosa adpressa Hook. & Arn.

Sin.: *Mimosa denhardtii* L.H. Bailey, nom. superfl.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Mimosa alleniana Morong

Sin.: *Mimosa hirsutissima* Mart. f. *decumbens* Chodat & Hassl., nom. superfl., *Mimosa hirsutissima* Mart. f. *erecta* Chodat & Hassl., *Mimosa hirsutissima* Mart. var. *pseudodistans* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Nativa. 200-600 m.
Países: PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

Mimosa altoparanensis Burkart

Sin.: *Mimosa regnellii* Benth. var. *aculeata* Chodat & Hassl., *Mimosa regnellii* Benth. var. *rectispina* Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica. 300-400 m.
Países: PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA).

Mimosa amambayensis Hassl.

Sin.: *Mimosa monadelpha* Chodat & Hassl., hom. illeg., *Mimosa monadelpha* Chodat & Hassl. var. *hirsuto-puberula* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Mimosa amambayensis Hassl. var. **glabrata** Hassl.

Sin.: *Mimosa monadelpha* Chodat & Hassl. var. *glabrata* (Hassl.) Barneby
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Mimosa amphigena Burkart var. **inermis** Burkart

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(PAY, RIV, SAO, TAC).

Mimosa amphigena Burkart var. **trachycarpoides** Burkart

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(FLA, LAV, MAL, PAY, ROC, SAO).

Mimosa asperoides Izag. & Beyhaut

Hierba. Endémica.
Países: URY(LAV, RIV, TYT).

Mimosa atlantica Barneby

Arbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa aureliana Barneby & Fortunato

Arbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: PRY(AMA).

Mimosa australis Izag. & Beyhaut

Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(ART, LAV, MAL, RIV).

Mimosa axillarioides Izag. & Beyhaut

Hierba. Endémica.
Países: URY(MAL, ROC, SAO, TAC).

Mimosa axillaris Benth.

Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).

Mimosa balansae Micheli

Sin.: *Mimosa balansae* Micheli var. *robusta* Chodat & Hassl., *Mimosa balansae* Micheli var. *rojasiana* Hassl.,

- Mimosa brevipetiolata* Burkart var. *rojasiana* (Hassl.) Barneby
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, SAO).
- Mimosa balduinii** Burkart
Arbusto. Endémica. 100-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Mimosa baptistae** Schmidt-Silveira & Miotto
Arbusto o arbolito. Endémica. 200-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Mimosa barnebianae** Fortunato & Tressens
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).
- Mimosa bathyrrhena** Barneby
Arbusto. Endémica. 900-1100 m.
Países: BRA(PAR).
- Mimosa berroi** Burkart
Arbusto o subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS). URY(LAV, RNO, RIV, SJO, TAC).
- Mimosa bifurca** Benth. var. **bifurca**
Sin.: *Mimosa hassleriana* Chodat var. *multijuga* Hassl., *Mimosa hassleriana* Chodat var. *virgata* Hassl., *Mimosa rosariensis* Mattos
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, PAI, SPE). URY(TYT).
- Mimosa bifurca** Benth. var. **desmanthoides** (Hoehne) Barneby
Sin.: *Mimosa desmanthoides* Hoehne
Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-300 m.
Países: ARG(MIS).
- Mimosa bifurca** Benth. var. **hassleriana** (Chodat) Barneby
Sin.: *Mimosa hassleriana* Chodat, *Mimosa hassleriana* Chodat f. *intermedia* Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA, PAI). URY(TAC).
- Mimosa bifurca** Benth. var. **reducta** (Hassl.) Barneby
Sin.: *Mimosa hassleriana* Chodat var. *reducta* Hassl.
Arbusto. Nativa. 500- m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).
- Mimosa bimucronata** (DC.) Kuntze var. **adenocarpa** Hassl.
Arbusto o árbol. Nativa. 300-500 m.
Países: PRY(APY, AMA).
- Mimosa bimucronata** (DC.) Kuntze var. **bimucronata**
Sin.: *Acacia bimucronata* DC., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze subsp. *sepiaria* (Benth.) Hassl., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze var. *trichocarpa* Hassl., *Mimosa sepiaria* Benth., *Mimosa stuhlmannii* Harms, *Mimosa thyrsoides* Griseb.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, GUA, ITA, PAI). URY(ART, RIV, SAO).
- Mimosa bonplandii** (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth.
Sin.: *Acacia bonplandii* Gillies ex Hook. & Arn., *Acacia lepidota* Hook. & Arn., *Mimosa bonplandii* (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth. var. *minor* Benth.
- Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). URY(TAC).
- Mimosa bracteolaris** Benth.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Mimosa brevipes** Benth.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAA, CAN, COA).
- Mimosa brevipetiolata** Burkart var. **brevipetiolata**
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: ARG(MIS).
- Mimosa brevipetiolata** Burkart var. **hirtula** (Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa brevipetiolata* Burkart var. *pilosula* (Burkart) Barneby, *Mimosa oligophylla* Micheli var. *pilosula* Burkart, *Mimosa petraea* Chodat & Hassl. var. *hirtula* Burkart
Hierba o subarbusto. Endémica. 100-400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(PAI).
- Mimosa burkartii** Marchesi
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MAL, MON).
- Mimosa caaguazuensis** Barneby
Sin.: *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *macrophylla* Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(CAU, CAN, COA, MIE, ÑEE).
- Mimosa caesalpinifolia** Benth.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa cainguensis Burkart
Hierba o subarbusto. Endémica. 300-400 m.
Países: ARG(MIS). PRY(ITA, MIE).

Mimosa callidryas Barneby
Subarbusto. Endémica. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa candelabrum Hassl.
Sin.: *Mimosa candelabrum* Hassl. var. *jörgensenii* Burkart
Subarbusto. Endémica. 300-500 m.
Países: PRY(CAU, CAN).

Mimosa candollei R. Grether
Sin.: *Leptoglottis leptocarpa* (DC.) Standl., *Mimosa quadrivalvis* L. var. *leptocarpa* (DC.) Barneby, *Schrankia argentinensis* Burkart, *Schrankia leptocarpa* DC.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, GUA).

Mimosa castanoclada Barneby & Fortunato
Arbusto. Nativa. 200-500 m.
Países: PRY(APY).

Mimosa catharinensis Burkart
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Mimosa centurionis Barneby
Sin.: *Mimosa argillicola* Hassl. subsp. *major* Hassl., *Mimosa argillicola* Hassl. var. *intermedia* Hassl.
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: PRY(CON).

Mimosa ceratonia L. var. **pseudo-ovata** (Taub.) Barneby
Sin.: *Mimosa pseudo-ovata* Taub., *Mimosa pungentissima* Ducke

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Mimosa cerifera Schmidt-Silveira & Miotto
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Mimosa chacoensis Barneby & Fortunato
Subarbusto. Nativa. 200-400 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

Mimosa chaetosphaera Barneby
Sin.: *Mimosa ramosissima* Benth. var. *ulei* Burkart
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Mimosa chartostegia Barneby
Arbusto. Endémica. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa chelata Izag. & Beyhaut
Hierba. Endémica.
Países: URY(LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, TAC).

Mimosa chodatii Hassl.
Subarbusto. Endémica. 600-700 m.
Países: PRY(AMA).

Mimosa congestifolia Burkart
Arbusto. Endémica. 1100-1800 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa coniflora Burkart
Arbusto. Endémica. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa cordobensis Ariza
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR).

Mimosa cruenta Benth. var. **cruenta**
Sin.: *Mimosa amphigena* Burkart var. *amphigena*, *Mimosa amphigena* Burkart var. *eglandulosa* Burkart, *Mimosa amphigena* Burkart var. *glabrescens* Burkart, *Mimosa daleoides* Benth. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Mimosa trachycarpa* Benth.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Mimosa cruenta Benth. var. **glabra** Burkart
Sin.: *Mimosa sanguinolenta* Barneby
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV, TAC).

Mimosa cubatanensis Hoehne
Árbol. Nativa. 700-900 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa custodis Barneby
Sin.: *Mimosa conferta* Benth. f. *parvifolia* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 400-600 m.
Países: PRY(AMA).

Mimosa daleoides Benth.
Sin.: *Mimosa daleoides* Benth. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Mimosa daleoides* Benth. f. *psammophila* Burkart, *Mimosa daleoides* Benth. var. *paraguariensis* (Chodat & Hassl.) Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(DUR, LAV, RIV, TAC).

Mimosa dalyi Barneby

Subarbusto. Nativa.

Países: PRY(AMA).

Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd.var. **angusta** (Benth.) M. Morales & FortunatoSin.: *Mimosa angusta* Benth., *Mimosa nuda* Benth. var. *angusta* (Benth.) Barneby

Subarbusto. Nativa.

Países: PRY(CON).

Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd.
var. **debilis**

Sin.: *Mimosa adhaerens* Kunth, *Mimosa argentinensis* Burkart, *Mimosa argentinensis* Burkart var. *saltensis* Burkart, *Mimosa debilis* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *panamensis* Benth., *Mimosa fervida* Mart., *Mimosa glaucescens* Benth., hom. illeg., *Mimosa gracilipes* Harms, *Mimosa gracilipes* Harms f. *armata* Hassl., *Mimosa gracilipes* Harms f. *inermis* Hassl., nom. superfl., *Mimosa hostmannii* Benth., *Mimosa notata* Steud., *Mimosa nuda* Benth. f. *minor* Chodat & Hassl., *Mimosa nuda* Benth. var. *glaberrima* (Chodat & Hassl.) Barneby, *Mimosa nuda* Benth. var. *gracilipes* (Harms) Barneby, *Mimosa obtusifolia* Willd., *Mimosa panamensis* (Benth.) Standl., *Mimosa pauciseta* Benth., *Mimosa rixosa* Mart., *Mimosa velloziana* Mart. f. *acutifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. f. *hispida* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *atrostipulata* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *glaberrima* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *malmeana* Chodat & Hassl., *Mimosa viscosa*

Mart. f. *glabrifolia* Chodat, *Mimosa viscosa* Mart. var. *inermis* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, NAS, PAI, PHA, SPE).

Mimosa decepatrix Barneby

Arbusto o subarbusto. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Mimosa detinens Benth.Sin.: *Mimosa lorentzii* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Mimosa diffusa Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Mimosa diplotricha C. Wright

Sin.: *Mimosa diplotricha* C. Wright var. *inermis* (Adelb.) Verdc., *Mimosa invis* Mart. ex Colla var. *echinocarpa* Chodat & Hassl., *Mimosa invis* Mart. ex Colla var. *inermis* Adelb., *Mimosa invis* Mart., nom. illeg., *Mimosa ixiamensis* Rusby, *Mimosa longisiliqua* Lam., nom. inval., *Morongia pilosa* Standl., *Schrankia brachycarpa* Benth., *Schrankia pilosa* (Standl.) J.F. Macbr.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CEN, GUA, PAI).

Mimosa distans Benth. var. **distans**

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Notas: Su presencia en Argentina es dudosa (cfr. Burkart 1948: 221)

Mimosa distans Benth. var. **paraguariensis** Barneby

Hierba o subarbusto. Endémica. 300-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU).

Mimosa diversipila Micheli var. **diversipila**

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-400 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Mimosa diversipila Micheli var. **subglabriseta** Barneby & Fortunato

Hierba o subarbusto. Endémica. 100-300 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI).

Mimosa dolens Vell. var. **anisitsii** Lindm.

Sin.: *Mimosa dolens* Vell. var. *anisitsii* (Lindm.) Barneby, comb. superfl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *ovalifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa rigidicaulis* Burkart, *Mimosa rigidicaulis* Burkart var. *ciliata* Burkart

Subarbusto. Nativa. 200-600 m.

Países: PRY(AMA, CAN, COA). URY(RIV).

Mimosa dolens Vell. var. **deterior** Barneby

Subarbusto. Endémica. 600-700 m.

Países: PRY(AMA).

Mimosa dolens Vell. var. **dolens**Sin.: *Mimosa trachycephala* Benth.

- Subarbusto. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Mimosa dolens** Vell. var. **foliolosa** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa meticulosa* Mart. f. *glaberrima* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *pubescens* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. var. *microphylla* Benth., nom. superfl., *Mimosa rigescens* Benth. var. *foliolosa* Benth.
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CAN, COA, PAI).
- Mimosa dolens** Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa acerba* Benth. var. *aspermoides* Burkart, *Mimosa acerba* Benth. var. *latifolia* Benth., *Mimosa acerba* Benth. var. *strigosa* (Griseb.) Burkart, *Mimosa conferta* Benth., *Mimosa conferta* Benth. f. *brevipila* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth. f. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Mimosa conferta* Benth. f. *longepedunculata* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth. var. *multifoliolata* Chodat & Hassl., *Mimosa marginata* Lindl. var. *strigosa* Griseb.
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN). URY(RIV, TAC).
- Mimosa dolens** Vell. var. **pangloea** Barneby
Subarbusto. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).
- Mimosa dolens** Vell. var. **pseudorigida** Barneby
Subarbusto. Endémica. 300- m.
Países: PRY(CAN).
- Mimosa dolens** Vell. var. **pubescens** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa meticulosa* Mart. var. *pubescens* Benth.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(RIV).
- Mimosa dolens** Vell. var. **rigescens** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa rigescens* Benth.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ITA).
- Mimosa dolens** Vell. var. **rudis** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa asperima* Benth., *Mimosa rudis* Benth., *Mimosa rudis* Benth. f. *intermedia* Hassl., *Mimosa rudis* Benth. f. *latifoliolata* Hassl., *Mimosa rudis* Benth. var. *asperima* (Benth.) Hassl., *Mimosa rudis* Benth. var. *genuina* Hassl., nom. inval.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).
- Mimosa dolens** Vell. var. **uncta** Barneby
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Mimosa dolens** Vell. subsp. **acerba** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa acerba* Benth., *Mimosa acerba* Benth. var. *minor* Benth.
Subarbusto. Nativa. 700-1300 m.
- Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, SPE).
- Mimosa dolens** Vell. subsp. **callosa** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa callosa* Benth., *Mimosa callosa* Benth. var. *microphylla* Chodat & Hassl., *Mimosa setipes* Benth.
Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, COA, SPE).
- Mimosa dolens** Vell. subsp. **eriphylla** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa eriphylla* Benth., *Mimosa eriphyloides* Hoehne, *Mimosa eriphyloides* Hoehne var. *lanosa* Hoehne
Subarbusto. Nativa. 400-600 m.
Países: BRA(PAR).
- Mimosa dolens** Vell. subsp. **rigida** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa rigida* Benth.
Subarbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(RIV, TAC).
- Mimosa dryandroides** Taub. var. **extratropica** Barneby
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Mimosa dutrae** Malme var. **dutrae**
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MAL, ROC, SJO).
- Mimosa dutrae** Malme var. **major** Izag. & Beyhaut
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(LAV, MAL, ROC).

Mimosa ephedrioides (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth.

Sin.: *Prosopis ephedroides* Gillies ex Hook. & Arn.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1100-1300 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

Mimosa equisetum Barneby

Sin.: *Mimosa heterophylla* Hassl., nom. illeg.

Hierba. Endémica. 400-500 m.

Países: PRY(CAU).

Mimosa eriocarpa Benth.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Mimosa eurystegia Barneby ex M.

Morales, O.S. Ribas & J. Santos-Silva

Subarbusto. Endémica. 1500-1800 m.

Países: BRA(PAR).

Mimosa excedentis Izag. & Beyhaut

Hierba. Endémica.

Países: URY(ART, LAV, RIV, ROC).

Mimosa fachinalensis Burkart

Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Mimosa farinosa Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Mimosa fernandez-casasii Barneby & Fortunato

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Mimosa fiebrigii Hassl.

Arbusto. Endémica. 400-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Mimosa filipetiola Burkart

Hierba. Endémica. 800- m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa flagellaris Benth.

Sin.: *Mimosa flagellaris* Benth. var. *hirsuta* Benth.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU, CON, COA, GUA, PAI). URY(ART, CLA, RIV, SAO, TAC).

Mimosa flocculosa Burkart

Sin.: *Mimosa incana* (Spreng.) Benth. var. *robusta* J.F. Macbr.

Arbusto. Nativa. 200-400 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, COA).

Mimosa furfuracea Benth.

Sin.: *Mimosa furfuracea* Benth. var. *catharinensis* Burkart, *Mimosa furfuracea* Benth. var. *paranensis* Burkart

Arbusto. Nativa. 900-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa glabra Benth.

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Mimosa glandulisetia Burkart

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA).

Mimosa glutinosa Chodat & Hassl.

Sin.: *Mimosa apodocarpa* Benth. var. *intermedia* Hassl., hom. illeg., *Mimosa macrostachya* Poir. var. *glaberrima* (Chodat & Hassl.) J.F. Macbr., *Mimosa millefoliata* Scheele var. *glaberrima* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-400 m.

Países: PRY(APY, AMA, CON).

Mimosa glycyrrhizoides Barneby

Arbusto. Endémica. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Mimosa gracilis Benth. var. **leiocarpa** (Burkart) Barneby

Sin.: *Mimosa graminiformis* Chodat & Hassl., *Mimosa selloi* (Benth.) Benth. var. *leiocarpa* Burkart

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

Mimosa gracilis Benth. subsp. **capillipes** (Benth.) Barneby

Sin.: *Mimosa capillipes* Benth., *Mimosa capillipes* Benth. var. *brevifolia* Benth., *Mimosa capillipes* Benth. var. *microphylla* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, SPE).

Mimosa gracilis Benth. subsp. **gracilis**

Sin.: *Mimosa gracilis* Benth. f. *glabrifolia* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Mimosa gracilis* Benth. f. *hirsutissima* Hassl., nom. superfl., *Mimosa gracilis* Benth. f. *longepedunculata* Hassl., *Mimosa gracilis* Benth. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Mimosa gracilis* Benth. var. *intermedia* Hassl., *Mimosa serpens* Chodat & Hassl., *Mimosa serpens* Chodat & Hassl. var. *glabrifolia* Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: PRY(CAU, COA, SPE).

Mimosa guaranitica Chodat & Hassl.

Sin.: *Mimosa guaranitica* Chodat & Hassl. f. *heterotricha* Burkart

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CEN, COA, ÑEE, PAI, SPE).

Mimosa gymnas Barneby

Subarbusto. Nativa. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa hatschbachii Barneby

Arbusto. Endémica. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa hexandra Micheli

Sin.: *Mimosa acanthophora* Harms, *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze f. *miceliana* Hassl., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze f. *vepres* (Lindm.) Hassl., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze subsp. *hexandra* (Micheli) Hassl., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze var. *gymnocarpa* Hassl., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze var. *hexandra* (Micheli) J.F. Macbr., *Mimosa coroncoro* Killip & Dugand, *Mimosa fascifolia* Rizzini, *Mimosa hexandra* Micheli var. *tropica* S. Moore, *Mimosa hexandra* Micheli var. *vepres* (Lindm.) Chodat & Hassl., *Mimosa vepres* Lindm.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Notas: Citada para Rio Grande do Sul (Rambo, 1966: 31), su presencia en el Sur de Brasil es dudosa

Mimosa hilariana Barneby

Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa hirsutissima Mart.

Sin.: *Mimosa barbigera* Benth., *Mimosa dispersa* Benth., *Mimosa hirsutissima* Mart. var. *barbigera* (Benth.) Barneby, *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *alboffiana* Burkart, *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *longipila* Benth., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *missionum* Burkart, *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *villosissima*

Benth., *Mimosa studartiana* Huber, *Mimosa tomentosa* Humb. & Bonpl. ex Willd., nom. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, SPE).

Mimosa implexa Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

Mimosa incana (Spreng.) Benth.

Sin.: *Acacia incana* Spreng., *Acacia sprengelii* Hook. & Arn., *Mimosa crassipes* Arechav.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, DUR, RIV, TAC).

Mimosa insignis (Hassl.) Barneby

Sin.: *Schrankiastrum insigne* Hassl.

Arbusto. Nativa. 200- m.

Países: PRY(CON).

Mimosa intricata Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Mimosa invisá Mart. ex Colla var. **invisá**

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN, CEN, PAI, PHA).

Mimosa invisá Mart. ex Colla var. **macrostachya** (Benth.) Barneby

Sin.: *Mimosa calistachya* C. Presl, *Mimosa macrostachya* (Benth.) J.F. Macbr., nom. illeg., *Schrankia macrostachya* Benth.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Mimosa involucreta Benth.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mimosa iperoensis Hoehne var. **iperoensis**

Sin.: *Mimosa adenocarpa* Benth. f. *paraguariensis* Hassl., *Mimosa adenocarpa* Benth. var. *multiglandulosa* Hassl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU).

Mimosa iperoensis Hoehne var. **paradenia** Barneby

Sin.: *Mimosa adenocarpa* Benth. f. *inermis* Hassl.

Arbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: PRY(CAN).

Mimosa kuhnisteroides Barneby

Subarbusto. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Mimosa lanata Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mimosa lasiocephala Benth.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(RGS).

Mimosa leimonias Barneby & Fortunato

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Mimosa lepidorepens Burkart

Subarbusto. Endémica. 1000- m.

Países: BRA(SCA).

Mimosa longiracemosa (Burkart) Barneby

Sin.: *Mimosa callosa* Benth. var. *longiracemosa* Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: ARG(MIS).

Mimosa luciana Barneby

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: URY(CAS, FLA, MAL, ROC).

Mimosa lupinoides Chodat & Hassl.

Sin.: *Mimosa lupinoides* Chodat & Hassl.

f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. f. *ferruginea* Hassl., nom. superfl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. f. *glabrescens* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. f. *hirsuta* Hassl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *lupinoides* (Chodat & Hassl.) Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-400 m.

Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Mimosa macrocalyx Micheli var. **macrocalyx**

Arbusto o subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, GUA, PAI).

Mimosa macrocalyx Micheli var. **pectinata** Burkart

Arbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Mimosa magentea Izag. & Beyhaut

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: URY(LAV, MAL).

Mimosa maracayuensis Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN).

Mimosa micropteris Benth. var. **micropteris**

Arbusto. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mimosa micropteris Benth. var.**pungens** (Burkart) Barneby

Sin.: *Mimosa regnellii* Benth. var. *pungens* Burkart

Arbusto. Endémica. 400-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa morongii Britton

Sin.: *Mimosa argillicola* Hassl.

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: PRY(CEN).

Mimosa murex Barneby

Arbusto. Endémica. 1000-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa myriophylla Bong. ex Benth.

Sin.: *Mimosa pluriracemosa* Burkart

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE, PAI).

Mimosa niederleinii Burkart

Sin.: *Mimosa niederleinii* Burkart var. *riograndensis* Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 400-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mimosa nitidula Barneby

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

Mimosa oblonga Benth. var. **oblonga**

Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa oblonga Benth. var. **pinetorum**

Barneby

Arbusto o subarbusto. Endémica. 900-m.

Países: BRA(PAR).

Mimosa obstrigosa Burkart

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(PAY).

Mimosa oligophylla Micheli

Hierba o subarbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, COA, GUA, PAI).

Mimosa orthacantha Benth.

Sin.: *Mimosa botucatuana* Hoehne

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Mimosa ostenii Speg. ex Burkart

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(ERI). URY(PAY, SAO).

Mimosa paludosa Benth.

Sin.: *Mimosa setosa* Benth. subsp.

paludosa (Benth.) Barneby

Subarbusto. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Mimosa paraguayae Micheli var. **multiglandulosa** (Hassl.) Barneby

Sin.: *Mimosa cordistipula* Benth. subsp. *multiglandulosa* Hassl., *Mimosa cordistipula* Benth. var. *pubescens* Hassl.

Subarbusto. Endémica. 300-400 m.

Países: PRY(CAU).

Mimosa paraguayae Micheli var. **paraguayae**

Sin.: *Mimosa paraguayae* Micheli f. *induta* Hassl., *Mimosa paraguayae* Micheli var. *chacoensis* Hassl., *Mimosa paraguayae* Micheli var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Mimosa paraguayae* Micheli var. *induta* (Hassl.) J.F. Macbr., *Mimosa*

- trachycarpa* Benth. var. *inermis* Burkart
Arbusto. Endémica. 100-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, ITA, PHA, SPE).
- Mimosa paraguayana** Micheli var. **tomentosa** (Hassl.) Barneby
Sin.: *Mimosa cordistipula* Benth. var. *tomentosa* Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).
- Mimosa paranapiacabae** Barneby
Arbusto. Endémica. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR).
- Mimosa parvipinna** Benth.
Subarbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(CAU). URY(FLA, RIV, TAC).
- Mimosa paupera** Benth. var. **dives** Barneby
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CON).
- Mimosa paupera** Benth. var. **paupera**
Sin.: *Mimosa paupera* Benth. var. *longepedunculata* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, GUA, ITA). URY(ART, MAL, PAY, SAO).
- Mimosa pauperoides** (Burkart) Fortunato
Sin.: *Mimosa balansae* Micheli var. *pauperoides* Burkart, *Mimosa brevipetiolata* Burkart var. *pauperoides* (Burkart) Barneby
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
- Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(SAO).
- Mimosa pedersenii** Barneby
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN). URY(ART, MON, TAC, TYT).
- Mimosa pedunculosa** Micheli
Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: PRY(CAU, CAA, CAN, MIE, SPE).
- Mimosa per-dusenii** Burkart
Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Mimosa petraea** Chodat & Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CAA, COA, GUA, PAI).
- Mimosa pigra** L. var. **dehiscens** (Barneby) Glazier & Mackinder
Sin.: *Mimosa pellita* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *dehiscens* Barneby
Arbusto. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CEN, CON, COA, PAI, PHA).
- Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Sin.: *Mimosa asperata* L., *Mimosa asperata* L. f. *armata* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *aspera* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *glabrescens* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *inermis* Hassl., hom. illeg., *Mimosa asperata* L. f. *inermis* Lindm., *Mimosa asperata* L. f. *longepedunculata* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *mollis* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *pubescens* (Benth.) Hassl., *Mimosa asperata* L. var. *laevior* DC., nom. illeg., *Mimosa asperata* L. var. *pigra* (L.) Willd., comb. illeg., *Mimosa asperata* L. var. *scandens* Ducke, *Mimosa bellatrix* Hoffmanns. ex Steud., nom. nud., *Mimosa canescens* Willd., *Mimosa ciliata* Willd., *Mimosa cinerea* Benth. var. *pubescens* Benth., *Mimosa habbas* Delile, nom. superfl., *Mimosa pellita* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Mimosa polyacantha* Willd., *Mimosa procumbens* Schumacher., *Mimosa sicaria* Hoffmanns., *Mimosa vellosiella* Herter var. *pubescens* (Benth.) Burkart
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(COL, SJO, SOR).
- Mimosa pilulifera** Benth. var. **pilulifera**
Sin.: *Mimosa pilulifera* Benth. f. *calvescens* Malme, *Mimosa tacuarembensis* Arechav.
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CLA, COL, DUR, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).
- Mimosa pilulifera** Benth. var. **pseudincana** (Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa aparadensis* Burkart, *Mimosa pseudincana* Benth. var. *discolor* Burkart, *Mimosa pseudincana* Burkart, *Mimosa simulans* Burkart
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CLA, MON, PAY, RNO, SJO, TAC).
- Mimosa plumosa** Micheli
Arbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: PRY(AMA, CAU, COA, PAI).

Mimosa polycarpa Kunth var. **polycarpa**
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mimosa polycarpa Kunth var.
spgazzini (Pirota ex Hook. f.)
Burkart

Sin.: *Mimosa pachecensis* S. Moore,
Mimosa polychaeta Malme, *Mimosa*
spgazzini Pirota ex Hook. f.
Arbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI,
SPE).

Mimosa polycarpa Kunth var. **subandina**
Barneby
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Mimosa prionopus Barneby
Subarbusto. Endémica. 1100-1700 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa pseudocallosa Burkart
Subarbusto. Endémica. 1300- m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa pseudolepidota (Burkart)
Barneby
Sin.: *Mimosa niederleinii* Burkart var.
pseudolepidota Burkart
Subarbusto. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(SCA).

Mimosa pseudopetiolaris Barneby
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, PAI).

Mimosa pseudotrachycarpa Barneby
Arbusto. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Mimosa pudica L. var. **hispida** Brenan
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA, RGS).

Mimosa pudica L. var. **tetrandra** (Humb.
& Bonpl. ex Willd.) DC.
Sin.: *Mimosa tetrandra* Humb. & Bonpl. ex
Willd.
Hierba o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa ramboi Burkart
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, CAS,
PAY).

Mimosa ramentacea Burkart
Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: BRA(SCA).

Mimosa ramosissima Benth.
Arbusto. Nativa. 800-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mimosa ramulosa Benth.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA,
FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC,
TYT).

Mimosa reduviosa Barneby
Arbusto. Endémica. 600-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa regnellii Benth. var. **exuta**
Barneby
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Mimosa regnellii Benth. var. **grossiseta**
Barneby
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa regnellii Benth. var. **regnellii**
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mimosa regnellii Benth. var.
supersetosa (Burkart) Barneby

Sin.: *Mimosa supersetosa* Burkart,
Mimosa supersetosa Burkart var.
rufohispidula Burkart
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa reptans Benth.
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). URY(DUR, LAV,
MAL, RNO, RIV, TAC).

Mimosa riverensis Izag. & Beyhaut
Hierba. Endémica.
Países: URY(RIV).

Mimosa rocae Lorentz & Niederl.
Subarbusto. Endémica. 200-700 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).
URY(CLA, LAV, MAL, PAY).

Mimosa rojasii Hassl.
Subarbusto. Endémica. 300-800 m.
Países: PRY(AMA).

Mimosa rupestris Benth.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(LAV, RIV).

Mimosa scabrella Benth.
Sin.: *Mimosa bracaatinga* Hoehne,
Mimosa bracaatinga Hoehne f.
paucijuga Hoehne, *Mimosa*
bracaatinga Hoehne var. *aspericarpa*
Hoehne, *Mimosa scabrella* Benth. var.
aspericarpa (Hoehne) Burkart
Árbol. Nativa. 700-1900 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS,
SCA).
Notas: Introducida en Buenos Aires
(Argentina).

Mimosa sceptrum Barneby
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Mimosa schininii M. Morales, Grohar & Fortunato
Arbusto o subarbusto. Endémica.
Países: PRY(AMA).

Mimosa schleidenii Herter
Sin.: *Mimosa lindleyi* Burkart, *Mimosa marginata* Lindl., hom. illeg., *Mimosa prostrata* Schleid. & Vogel, nom. nud.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, TAC, TYT).

Mimosa selloi (Benth.) Benth.
Sin.: *Schrankia selloi* Benth.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mimosa sensibilis Griseb. var. **aquidabani** Barneby
Arbusto. Nativa. 300-400 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Mimosa sensibilis Griseb. var. **sensibilis**
Sin.: *Mimosa sensibilis* Griseb. var. *urucumensis* Barneby, *Mimosa velloziana* Mart. f. *moorei* Hoehne
Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-900 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY, CHO, CON).

Mimosa sensitiva L.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: PRY(AMA, CON).

Mimosa serra Burkart
Subarbusto. Endémica. 700-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, ITA).

Mimosa sobralii Grings & O.S. Ribas
Árbol. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(RGS).

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **lasiocarpa** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa acutiflora* Benth., *Mimosa lasiocarpa* Benth., *Mimosa lasiocarpa* Benth. f. *glabriflora* Hassl.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500- m.
Países: PRY(AMA).

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Sin.: *Mimosa palpitans* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Mimosa podocarpa* Benth., *Mimosa quadrijuga* Salzm. ex Benth., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. f. *viscida* Chodat & Hassl., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *glandulosa* Griseb., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *podocarpa* (Benth.) Niederl., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *quadrijuga* (Benth.) Niederl., *Mimosa somniculosa* Kunth, *Mimosa tobagensis* Urb., *Mimosa vialis* Benth., nom. nud.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA).

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **viscida** (Willd.) Barneby
Sin.: *Mimosa trijuga* Benth., *Mimosa viscida* Willd.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CON).

Mimosa sparsa Benth.
Arbusto. Endémica. 500-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mimosa sparsiformis Barneby
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Mimosa sprengelii DC.
Sin.: *Mimosa alegretense* Marchiori, *Mimosa ciliata* Spreng., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, COL, DUR, LAV, MAL, RIV, ROC, SAO, TAC).

Mimosa strigillosa Torr. & A. Gray
Sin.: *Mimosa dolichocephala* Harms, *Mimosa dolichocephala* Harms var. *sabulicola* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Mimosa sabulicola* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE, TUC). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE). URY(CLA, FLO, RNO, SOR, TAC).

Mimosa strobiliflora Burkart
Arbusto. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa subinermis Benth.
Arbolito. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Mimosa taimbensis Burkart
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Mimosa tandilensis Speg.
Arbusto. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(LAV, MAL).

Mimosa tarda Barneby
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Mimosa tenuipendula Burkart
Arbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: PRY(APY).

Mimosa terribilis Marchiori & Sobral ex Schmidt-Silveira & Miotto

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Mimosa tobatensis Barneby & Fortunato
Arbusto. Nativa. 200-600 m.
Países: PRY(CEN, COA).

Mimosa troncosoae Fortunato & Barneby
Árbol. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(APY).

Mimosa tucumensis Barneby ex O.S. Ribas, M. Morales & J. Santos-Silva
Hierba. Endémica. 1500-1700 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa tweedieana Barneby ex Glazier & Mackinder
Sin.: *Mimosa asperata* L. var. *glabrior* Hook. & Arn., *Mimosa vellosiana* Herter, nom. nud., *Mimosa vellosiella* Herter
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, PHA, SPE). URY(SJO).

Mimosa uliginosa Chodat & Hassl.
Arbusto o arbolito. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, COA).

Mimosa uninervis (Chodat & Hassl.) Hassl.
Sin.: *Mimosa papposa* Benth. var. *uninervis* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 300-400 m.
Países: PRY(CAN, SPE).

Mimosa uraguensis Hook. & Arn.
Sin.: *Mimosa uruguayensis* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, FLA, MON, PAY, RNO, SAO).

Mimosa urticaria Barneby
Arbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa velloziana Mart.
Sin.: *Mimosa heterocarpa* C. Presl, *Mimosa jiramenensis* H. Karst., *Mimosa velloziana* Mart. var. *glabra* Wawra, *Mimosa velloziana* Mart. var. *jiramenensis* (H. Karst.) Benth., *Mimosa velloziana* Mart. var. *oranensis* Burkart, *Mimosa viva* Vell., hom. illeg.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(ITA).

Mimosa weddelliana Benth.
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(AMA).

Mimosa xanthocentra Mart. subsp. *subsericea* (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa loeseneriana* Glaz., nom. nud., *Mimosa stipularis* Bong. ex Benth., *Mimosa subsericea* Benth., *Mimosa subsericea* Benth. f. *acerosa* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. f. *minor* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *hirsuto-strigosa* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *oblonga* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *strigosa* Chodat & Hassl.,
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Mimosa xanthocentra Mart. var. *mansii* (Mart.) Barneby
Sin.: *Mimosa mansii* Mart., *Mimosa polycarpa* Kunth var. *subglabrata* Hoehne, *Mimosa subsericea* Benth. f. *armata* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *strigoso-aculeata* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, GUA, PAI).

Mimosa xanthocentra Mart. var. *xanthocentra*
Sin.: *Mimosa killipii* Britton & Rose ex Britton & Killip, *Mimosa longipinna* Benth., *Mimosa stenoptera* Benth., *Mimosa subsericea* Benth. f. *acerosa* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. f. *armata* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *strigoso-aculeata* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Nativa. 200-2300 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CEN, CON, PHA).

Mimozyganthus Burkart

Mimozyganthus carinatus (Griseb.) Burkart
Sin.: *Mimosa carinata* Griseb.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

Mucuna Adans.

Mucuna pruriens (L.) DC.
Sin.: *Dolichos pruriens* L.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mucuna sloanei Fawc. & Rendle

Sin.: *Dolichos urens* Jacq., hom. illeg.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Mucuna urens (L.) Medik.

Sin.: *Dolichos urens* L., *Mucuna urens* (L.) DC., nom. inval.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Citada para la Argentina por Moura et al. (2018) sin citar ejemplar de referencia

Muelleria L. f.

Muelleria campestris (Mart. ex Benth.)

M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
Sin.: *Derris leucanthus* (Burkart) N.F. Mattos, *Lonchocarpus albiflorus* Hassl., hom. illeg., *Lonchocarpus campestris* Mart. ex Benth., *Lonchocarpus leucanthus* Burkart, *Lonchocarpus mollis* Benth.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA).

Muelleria fluvialis (Lindm.) Burkart

Sin.: *Coublandia fluvialis* Lindm., *Lonchocarpus fluvialis* (Lindm.) Fortunato & Palese, *Lonchocarpus fluvialis* (Lindm.) Gómez-Sosa, comb. superfl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SFE). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, PHA).

Muelleria graciliflora (M.J. Silva, A.M.G.

Azevedo & G.P. Lewis) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
Sin.: *Lonchocarpus graciliflorus* M.J. Silva, A.M.G. Azevedo & G.P. Lewis
Árbol. Endémica. 1000- m.
Países: BRA(PAR).

Muelleria grazielae (M.J. Silva, A.M.G.

Azevedo & G.P. Lewis) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
Sin.: *Lonchocarpus grazielae* M.J. Silva, A.M.G. Azevedo & G.P. Lewis
Árbol. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Muelleria nudiflorens (Burkart) M.J. Silva

& A.M.G. Azevedo
Sin.: *Lonchocarpus nudiflorens* Burkart
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON).

Muelleria sericea (Micheli) M.J. Silva &

A.M.G. Azevedo
Sin.: *Bergeronia sericea* Micheli
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL). PRY(CEN, CON, PHA).

Muelleria torrensii (N.F. Mattos) M.J.

Silva & A.M.G. Azevedo
Sin.: *Derris torrensii* (N.F. Mattos) N.F. Mattos, *Lonchocarpus torrensii* N.F. Mattos
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Myrocarpus Allemão

Myrocarpus frondosus Allemão

Sin.: *Leptolobium punctatum* Benth., *Myrocarpus frondosus* Allemão f. *paraguariensis* (Hallier f.) Hassl., *Myrocarpus paraguariensis* Hallier f.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI).

Myroxylon L. f., nom. cons.

Myroxylon peruiferum L. f.

Sin.: *Myrospermum pedicellatum* Lam.
Árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).

Nanogalactia L.P. Queiroz

Nanogalactia heterophylla (Gillies ex

Hook. & Arn.) L.P. Queiroz
Sin.: *Cologania heterophylla* Gillies ex Hook., *Galactia heterophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Vail, hom. illeg., *Galactia marginalis* Benth. var. *colombiana* Burkart, *Galactia marginalis* Benth. var. *marginalis*
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Nanogalactia pretiosa (Burkart) L.P.

Queiroz var. **pretiosa**
Sin.: *Galactia marginalis* Benth. subsp. *longepedunculata* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Galactia marginalis* Benth. var. *longepedunculata* Chodat & Hassl., *Galactia marginalis* Benth. var. *unifoliolata* Hassl., *Galactia pretiosa* Burkart
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA). URY(RIV, SJO).

Nanogalactia pretiosa (Burkart) L.P.

Queiroz var. **trifoliolata** (Hassl.) L.P. Queiroz
Sin.: *Galactia marginalis* Benth. var. *trifoliolata* Hassl., *Galactia pretiosa* Burkart var. *trifoliolata* (Hassl.) Burkart

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA, SPE).

Neltuma Raf.

Neltuma × vinalillo (Stuck.) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis × vinalillo* Stuck.

Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA).

Neltuma affinis (Spreng.) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis affinis* Spreng., *Prosopis algarobilla* Griseb., *Prosopis algarobilla* Griseb. var. *nandubay* (Lorentz ex Griseb.) Hassl., *Prosopis nandubey* Lorentz ex Griseb.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, SDE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO).

Neltuma alba (Griseb.) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis alba* Griseb., *Prosopis siliquastrum* (Cav. ex Lag.) DC. var. *longisiliqua* Phil.

Árbol. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA). PRY(APY, BOQ, CEN, ÑEE, PHA).

Notas: Cultivada en Uruguay

Neltuma alba (Griseb.) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **atacamensis** (Phil.) Castillo & Teillier

Sin.: *Prosopis alba* Griseb. var. *atacamensis* (Phil.) Castillo, *Prosopis atacamensis* Phil.,

Árbol. Endémica.

Países: CHL(ATA).

Neltuma alba (Spreng.) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **panta** (Griseb.) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis alba* Griseb. var. *panta* Griseb., *Prosopis panta* (Griseb.) Hieron.

Árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, JUJ, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CHO).

Neltuma alpataco (Phil.) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis alpataco* Phil., *Prosopis stenoloba* Phil.

Arbusto. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(VAL, RME).

Neltuma alpataco (Phil.) C.E. Hughes & G.P. Lewis f. **rubra** (F.A. Roig) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis alpataco* Phil. f. *rubra* F.A. Roig

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(MEN).

Neltuma alpataco (Phil.) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **lamaro** (F.A. Roig) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis alpataco* Phil. var. *lamaro* F.A. Roig

Árbol. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(LPA, MEN).

Neltuma argentina (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis argentina* Burkart

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Neltuma caldenia (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis calden* Monticelli, nom. nud., *Prosopis caldenia* Burkart

Árbol. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SLU).

Neltuma calingastana (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis calingastana* Burkart

Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(SJU).

Neltuma campestris (Griseb.) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis campestris* Griseb.

Arbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(COR, MEN, SLU, SDE).

Neltuma castellanosi (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis castellanosi* Burkart

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU).

Neltuma chilensis (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Acacia siliquastrum* Cav. ex Lag., *Ceratonia chilensis* Molina, *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz emend. Burkart var. *chilensis*, *Prosopis schinopoma* Stuck., *Prosopis siliquastrum* (Cav. ex Lag.) DC.

Árbol. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME). PRY(APY, BOQ).

Neltuma chilensis (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **berteroana** (Castillo) Castillo & Teillier

Sin.: *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz var. *berteroana* Castillo

Árbol. Endémica.

- Países: CHL(ANT).
- Neltuma chilensis** (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **catamarcana** (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz var. *catamarcana* Burkart
Árbol. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC). CHL(ATA).
- Neltuma chilensis** (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **riojana** (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz emend. Burkart var. *riojana* Burkart
Árbol. Endémica. 1900-2100 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
- Neltuma denudans** (Benth.) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis denudans* Benth.
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
- Neltuma denudans** (Benth.) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **patagonica** (Speg.) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis denudans* Benth. var. *patagonica* (Speg.) Burkart, *Prosopis patagonica* Speg.
Arbusto. Endémica. 800-1100 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR).
- Neltuma denudans** (Benth.) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **stenocarpa** (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis denudans* Benth. var. *stenocarpa* Burkart
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(CHU, LPA, SCR).
- Neltuma elata** (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis campestris* Griseb. var. *elata* Burkart, *Prosopis elata* (Burkart) Burkart
Arbusto o árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SFE, SDE). PRY(APY, BOQ, PHA).
- Neltuma fiebrigii** (Harms) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis fiebrigii* Harms
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, BOQ, PHA).
- Neltuma flexuosa** (DC.) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Acacia flexuosa* Lag., nom. illeg., *Prosopis alba* Griseb. f. *arborescens* Monticelli, nom. nud., *Prosopis flexuosa* DC., *Prosopis juliflora* (Sw.) DC. f. *arborea* Hauman, nom. nud.
Árbol. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).
- Neltuma flexuosa** (DC.) C.E. Hughes & G.P. Lewis f. **subinermis** (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis flexuosa* DC. f. *subinermis* Burkart
Árbol. Endémica.
Países: ARG(BAI, LPA, SAL, SJU, TUC).
- Neltuma flexuosa** (DC.) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **depressa** (F.A. Roig) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis alba* Griseb. f. *fruticosa* (Hauman) Monticelli, *Prosopis flexuosa* DC. var. *depressa* F.A. Roig, *Prosopis juliflora* (Sw.) DC. f. *fruticosa* Hauman
Arbusto. Endémica. 1000- m.
- Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(TAR).
- Neltuma flexuosa** (DC.) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **fruticosa** (Meyen) F.A. Roig
Sin.: *Prosopis flexuosa* DC. var. *fruticosa* (Meyen) F.A. Roig, *Prosopis fruticosa* Meyen
Arbusto. Nativa. 100-800 m.
Países: ARG(LPA, RNE). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ).
- Neltuma hassleri** (Harms) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis hassleri* Harms
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SFE). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, PHA).
- Neltuma hassleri** (Harms) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **nigroides** (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis hassleri* Harms var. *nigroides* Burkart
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SFE).
- Neltuma humilis** (Gillies ex Hook.) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis humilis* Gillies ex Hook.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SLU, SFE).
- Neltuma kuntzei** (Harms ex Kuntze) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis barbatigradis* Stuck., *Prosopis casadensis* Penz., *Prosopis kuntzei* Harms ex Kuntze
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, SAL, SFE, SDE). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

Neltuma nigra (Griseb.) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis algarobilla* Griseb. var. *nigra* Griseb., *Prosopis dulcis* Kunth var. *australis* Benth., *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR, ANT). PRY(APY, BOQ, CEN, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, PAY, RNO, SAO, SJO).

Neltuma nigra (Griseb.) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **longispina** (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *longispina* Burkart

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS).

Neltuma nigra (Griseb.) C.E. Hughes & G.P. Lewis var. **ragonesei** (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron. var. *ragonesei* Burkart

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SFE).

Neltuma nuda (Schinini) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis nuda* Schinini

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, BOQ, PHA).

Neltuma pugionata (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis pugionata* Burkart

Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

Neltuma rojasiana (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis rojasiana* Burkart, *Prosopis striata* Fiebrig & Rojas

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY, BOQ, PHA).

Neltuma rubriflora (Hassl.) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis rubriflora* Hassl.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CON).

Neltuma ruizlealii (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis ruizlealii* Burkart

Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU).

Neltuma ruscifolia (Griseb.) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis ruscifolia* Griseb.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

Neltuma sericantha (Gillies ex Hook.) C.E. Hughes & G.P. Lewis

Sin.: *Prosopis sericantha* Gillies ex Hook.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Neonotonia Lackey

Neonotonia wightii (Graham ex Wight & Arn.) Lackey

Sin.: *Glycine bujacia* Benth., *Glycine wightii* (Graham ex Wight & Arn.) Verdc., *Johnia wightii* (Graham ex Wight & Arn.) Wight & Arn., hom. illeg., *Notonia wightii* Graham ex Wight & Arn.

Hierba o enredadera. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Neptunia Lour.

Neptunia plena (L.) Benth.

Sin.: *Acacia lycopodioides* (Desf.) Desv., *Acacia punctata* (L.) Desv., hom. illeg., *Desmanthus comosus* A. Rich., *Desmanthus plenus* (L.) Willd., *Desmanthus polyphyllus* DC., *Desmanthus punctatus* (L.) Willd., *Mimosa lycopodioides* Desf., *Mimosa plena* L., *Mimosa punctata* L., *Neptunia polyphylla* (DC.) Benth.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON, PHA).

Neptunia pubescens Benth.

Sin.: *Neptunia floridana* Small, *Neptunia lindheimeri* B.L. Rob., *Neptunia mazatlana* Britton & Rose, *Neptunia pubescens* Benth. var. *floridana* (Small) B.L. Turner, *Neptunia pubescens* Benth. var. *lindheimeri* (B.L. Rob.) B.L. Turner

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA). URY(ART, CLA, DUR, RNO).

Nissolia Jacq., nom. cons.

Nissolia brasiliensis (Vogel) T.M. Moura & Fort.-Perez

Sin.: *Chaetocalyx belizensis* Standl., *Chaetocalyx brasiliensis* (Vogel) Benth., *Chaetocalyx ilheoticus* Taub., *Chaetocalyx latifolius* Benth. var. *latifolius*, *Chaetocalyx latifolius* Benth. var. *setulifera* Burkart, *Chaetocalyx*

matudae Lundell, *Rhadinocarpus brasiliensis* Vogel
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CEN, CON, COA, GUA, PHA).

Nissolia chacoensis (Vanni) T.M. Moura & Fort.-Perez
Sin.: *Chaetocalyx chacoensis* Vanni
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(APY, BOQ).

Nissolia fruticosa Jacq. var. **guatemalensis** (Rose) Rudd
Sin.: *Nissolia guatemalensis* Rose, *Pseudomachaerium rojasianum* Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(APA, CAU, CEN, GUA, PAI, SPE).

Nissolia longiflora (Benth. ex A. Gray) T.M. Moura & Fort.-Perez
Sin.: *Chaetocalyx glaziovii* Taub., *Chaetocalyx hebecarpus* Benth., *Chaetocalyx hebecarpus* Benth. var. *mollis* Benth., *Chaetocalyx hebecarpus* Benth. var. *oblongifolius* Benth., *Chaetocalyx longiflorus* Benth. ex A. Gray
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, COA).

Nissolia nigricans (Burkart) T.M. Moura & Fort.-Perez
Sin.: *Chaetocalyx nigricans* Burkart
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(ART, SAO).

Nissolia vincentina (Ker Gawl.) T.M. Moura & Fort.-Perez

Sin.: *Chaetocalyx pubescens* DC., *Chaetocalyx scandens* (L.) Urb. var. *pubescens* (DC.) Rudd, *Coronilla scandens* L., *Glycine vincentina* Ker Gawl.
Liana. Nativa.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Ononis L.

Ononis mitissima L.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(MON).

Ormosia Jacks.

Ormosia arborea (Vell.) Harms
Sin.: *Abrus arboreus* Vell., *Ormosia acuta* Vogel
Árbol. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ormosia fastigiata Tul.
Sin.: *Ormosia escragnoilliana* Glaz., *Ormosia glazioviana* Harms
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).

Ornithopus L.

Ornithopus compressus L.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(BIO).

Ornithopus micranthus (Benth.) Arechav.
Sin.: *Arthrolobium micranthum* Benth.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, DUR, FLA, MAL, MON, ROC, SJO, TAC, TYT).

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(BIO).

Ornithopus sativus Brot.
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(BIO).

Otholobium C.H. Stirt.

Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes
Sin.: *Hoita glandulosa* (L.) Rydb., *Lotodes glandulosum* (L.) Kuntze, *Psoralea glandulosa* L.
Arbusto o árbol. Nativa. 600-1400 m.
Países: CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Otholobium higuera (Gillies ex Hook.) J.W. Grimes
Sin.: *Psoralea higuera* Gillies ex Hook., *Psoralea monosperma* (Griseb.) J.F. Macbr., *Rhynchosia monosperma* Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Otholobium pubescens (Poir.) J.W. Grimes
Sin.: *Hoita hirsuta* Rusby, *Hoita versicolor* Rusby, *Psoralea lasiostachys* Vogel, *Psoralea pubescens* Poir., *Psoralea pubescens* Poir. var. *lasiostachys* (Vogel) J.F. Macbr., *Psoralea remotiflora* J.F. Macbr.
Arbusto. Nativa. 2000-3000 m.
Países: CHL(TAR).

Pachyrhizus Rich. ex DC.

Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi

Sin.: *Dolichos ahipa* Wedd., *Pachyrhizus ahipa* (Wedd.) Parodi var. *albiflora* Parodi, *Pachyrhizus ahipa* (Wedd.) Parodi var. *violacea* Parodi
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(JUU).

Manganaroa subsericea Speg.,
Senegalia visco (Lorentz ex Griseb.)
 Seigler & Ebinger
 Árbol. Nativa. 0-2500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI,
 JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU,
 SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT,
 ATA).

Pav. ex Hook.) Harms, *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.)
 Hauman, nom. illeg., *Cercidium spinosum* Tul.
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,
 JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL,
 SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
 PRY(APY, AMA, BOQ, PHA).

Parapiptadenia Brenan**Parapiptadenia excelsa** (Griseb.) Burkart

Sin.: *Piptadenia communis* Benth. var. *excelsa* Griseb., *Piptadenia excelsa* (Griseb.) Lillo, *Piptadenia excelsa* (Griseb.) Lillo f. *jujuyensis* Griseb., *Piptadenia excelsa* (Griseb.) Lillo f. *tucumanensis* Lillo, *Prosopis herzogii* Harms
 Árbol. Nativa. 600-2900 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(CEN, COA).

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan

Sin.: *Acacia angico* Mart., *Piptadenia rigida* Benth., *Piptadenia rigida* Benth. var. *grandis* Lindm.
 Árbol. Nativa. 0-1400 m.
 Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CLA, MON, RIV, ROC, SAO).

Parasenegalia Seigler & Ebinger**Parasenegalia visco** (Lorentz ex Griseb.)

Seigler & Ebinger
 Sin.: *Acacia concinna* Phil., hom. illeg., *Acacia platensis* Manganaro, *Acacia polyphylla* Clos, hom. illeg., *Acacia visco* Lorentz ex Griseb., *Lysiloma polyphyllum* Benth., *Manganaroa platensis* (Manganaro) Speg.,

Parkinsonia L.**Parkinsonia aculeata** L.

Sin.: *Parkinsonia inermis* Spreng.
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, SAL, SJU, SFE, SDE). BRA(RGS). CHL(ARA). PRY(APY, CEN, COA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, TAC).

Parkinsonia andicola (Griseb.) Varjão & Mansano

Sin.: *Cercidium andicola* Griseb., *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms var. *andicola* (Griseb.) Hosseus
 Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.
 Países: ARG(JUU, TUC).

Parkinsonia glauca (Cav.) Varjão & Mansano

Sin.: *Cercidium australe* I.M. Johnst., *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. *glaucum* (Cav.) Burkart & Carter, *Pomaria glauca* Cav.
 Árbol. Endémica.
 Países: ARG(LRI, RNE, SAL, SJU, TUC).

Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins

Sin.: *Caesalpinia praecox* Ruiz & Pav. ex Hook., *Cercidium plurifoliolatum* Micheli, *Cercidium praecox* (Ruiz &

Paubrasilia E. Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis**Paubrasilia echinata** (Lam.) E. Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia echinata* Lam.
 Árbol. Nativa.
 Países: BRA(SCA).

Peltophorum (Vogel) Benth.**Peltophorum dubium** (Spreng.) Taub.

Sin.: *Brasilettia dubia* (Spreng.) Kuntze, *Caesalpinia dubia* Spreng., *Peltophorum vogelianum* Benth., *Peltophorum vogelianum* Benth. f. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Peltophorum vogelianum* Benth. f. *glabrata* Chodat & Hassl., *Peltophorum vogelianum* Benth. f. *intermedia* Chodat & Hassl.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, MON, RNO, SAO).

Periandra Mart. ex Benth.

Periandra mediterranea (Vell.) Taub.
Sin.: *Glycinopsis mediterranea* (Vell.) Kuntze, *Glycyrrhiza mediterranea* Vell., *Periandra angulata* Benth., *Periandra dulcis* Mart. ex Benth., *Periandra mediterranea* (Vell.) Taub. var. *linearifoliolata* N.F. Mattos & F. Oliveira, *Periandra mediterranea* (Vell.) Taub. var. *microphylla* N.F. Mattos & F. Oliveira, *Periandra mediterranea* (Vell.) Taub. var. *mucronata* (Benth.) Burkart ex N.F. Mattos & F. Oliveira, *Periandra mucronata* Benth., *Periandra racemosa* Benth.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Phaseolus L.

Phaseolus augusti Harms
Sin.: *Phaseolus bolivianus* Piper
Hierba o enredadera. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Phaseolus lunatus L. var. **lunatus**
Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS).

Phaseolus lunatus L. var. **silvester** Baudet
Hierba o enredadera. Nativa. 300-1600 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). PRY(APA).

Phaseolus vulgaris L. var. **aborigineus** (Burkart) Baudet
Sin.: *Phaseolus aborigineus* Burkart, *Phaseolus vulgaris* L. subsp. *aborigineus* (Burkart) Burkart
Hierba o enredadera. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Piptadenia Benth.

Piptadenia adiantoides (Spreng.) J.F. Macbr.
Sin.: *Acacia adiantoides* Spreng.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Piptadenia affinis Burkart
Liana. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr.
Sin.: *Acacia gonoacantha* Mart., *Piptadenia communis* Benth., *Piptadenia gonoacantha* (Mart.) J.F. Macbr. var. *inermis* Burkart, *Pityrocarpa gonoacantha* (Mart.) Brenan
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON).

Piptadenia paniculata Benth.
Sin.: *Piptadenia paniculata* Benth. var. *aculeata* Burkart, *Pityrocarpa paniculata* (Benth.) Brenan
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piptadeniopsis Burkart

Piptadeniopsis lomentifera Burkart
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Plathymenia Benth.

Plathymenia reticulata Benth.
Sin.: *Pirotanthus modesta* Speg., *Plathymenia foliolosa* Benth., *Plathymenia foliolosa* Benth. var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Plathymenia modesta* (Speg.) Burkart
Árbol. Nativa. 300-1100 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Platycyamus Benth.

Platycyamus regnellii Benth.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Platymiscium Vogel

Platymiscium floribundum Vogel var. **floribundum**
Árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Platymiscium floribundum Vogel var. **latifolium** (Benth.) Benth.
Sin.: *Platymiscium cordatum* Taub., *Platymiscium floribundum* Vogel var. *majus* Benth., *Platymiscium latifolium* Benth.
Árbol. Nativa. 200-300 m.
Países: BRA(PAR).

Platypodium Vogel

Platypodium elegans Vogel
Sin.: *Platypodium elegans* Vogel var. *major* Benth.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).

Poecilanthe Benth.

Poecilanthe parviflora Benth.

Sin.: *Poecilanthe parviflora* Benth. var. *floribunda* Hassl.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).
URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

Poiretia Vent.**Poiretia angustifolia** Vogel

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Poiretia latifolia Vogel

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA).

Poiretia longipes Harms

Sin.: *Poiretia longipetiolata* Hoehne

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Poiretia tetraphylla (Poir.) Burkart

Sin.: *Poiretia psoraloides* DC., *Psoralea tetraphylla* Poir.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).

Poissonia Baill.**Poissonia heterantha** (Griseb.) Lavin

Sin.: *Coursetia heterantha* (Griseb.) Lavin,
Neocracca heterantha (Griseb.) Speg.,
Neocracca heterantha (Griseb.) Speg.
var. *minor* (R.E. Fr.) Burkart,
Neocracca kuntzei (Harms ex Kuntze)

Kuntze var. *minor* R.E. Fr., *Tephrosia heterantha* Griseb.

Hierba. Nativa. 500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Poissonia hypoleuca (Speg.) Lillo

Sin.: *Chioendaea hypoleuca* Speg.,
Coursetia hypoleuca (Speg.) Lavin,
Poissonia hypoleuca (Speg.) Hauman,
hom. illeg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Pomaria Cav.**Pomaria parviflora** (Micheli) B.B.

Simpson & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia balansae* Ulibarri,
Hoffmannseggia parviflora Micheli

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

Pomaria pilosa (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia epunctata* (Vogel) Benth.,
Caesalpinia modesta Arechav.,
Caesalpinia pilosa (Vogel) Benth.,
Cladotrichum epunctatum Vogel,
Cladotrichum pilosum Vogel

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(COA).
URY(CLA, RNO, RIV, TAC, TYT).

Pomaria rubicunda (Vogel) B.B.

Simpson & G.P. Lewis var. **hauthalii** (Harms) B.B. Simpson & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia dictamnoides* Chodat & Hassl.,
Caesalpinia dictamnoides Chodat & Hassl. f. *punctata* Chodat & Hassl.,
Caesalpinia hauthalii Harms,
Caesalpinia rubicunda (Vogel) Benth.
var. *hauthalii* (Vogel) Hassl.,

Caesalpinia rubicunda (Vogel) Benth.
var. *intermedia* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA).

Pomaria rubicunda (Vogel) B.B.

Simpson & G.P. Lewis var. **rubicunda**

Sin.: *Caesalpinia rubicunda* (Vogel) Benth.,
Caesalpinia rubicunda (Vogel) Benth. f. *subobtusata* Chodat & Hassl.,
Caesalpinia rubicunda (Vogel) Benth.
var. *genuina* Hassl., nom. inval.,
Cladotrichum rubicundum Vogel

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS).
PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, SPE).
URY(ART, MON, SAO).

Pomaria stipularis (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia stipularis* (Vogel) Benth.,
Cladotrichum stipulare Vogel

Arbusto. Nativa. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosopidastrum Burkart**Prosopidastrum angusticarpum** R.A.

Palacios & Hoc

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE, SLU).

Prosopidastrum benthamii (Chodat & Wilczek) R.A. Palacios & Hoc

Sin.: *Prosopis benthamii* Chodat & Wilczek

Arbusto. Endémica. 800-1800 m.

Países: ARG(MEN).

Prosopidastrum dehiscens R.A.

Palacios & Hoc

Arbusto. Endémica. 1400-2200 m.

- Países: ARG(MEN, SJU).
- Prosopidastrum globosum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Sin.: *Mimosa gilliesii* Benth., *Mimosa globosa* (Gillies ex Hook. & Arn.) J.F. Macbr., *Prosopis globosa* Gillies ex Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).
- Prosopidastrum gracile** R.A. Palacios & Hoc
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU).
- Prosopidastrum striatum** (Benth.) R.A. Palacios & Hoc
Sin.: *Mimosa striata* (Benth.) Speg., hom. illeg., *Prosopis striata* Benth.
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
- Pseudalbizzia** Britton & Rose
- Pseudalbizzia burkartiana** (Barneby & J.W. Grimes) E.J.M. Koenen & Duno
Sin.: *Albizia burkartiana* Barneby & J.W. Grimes
Árbol. Endémica. 600-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Pseudalbizzia edwallii** (Hoehne) E.J.M. Koenen & Duno
Sin.: *Albizia austrobrasílica* Burkart, *Albizia edwallii* (Hoehne) Barneby & J.W. Grimes, *Pithecellobium edwallii* Hoehne
Árbol. Nativa. 200-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pseudalbizzia inundata** (Mart.) E.J.M. Koenen & Duno
Sin.: *Acacia inundata* Mart., *Acacia polyantha* A. Spreng., *Albizia inundata* (Mart.) Barneby & J.W. Grimes, *Albizia polyantha* (A. Spreng.) G.P. Lewis, *Arthrosamanea polyantha* (A. Spreng.) Burkart, *Arthrosamanea polycephala* (Griseb.) Burkart, *Cathormion polyanthum* (A. Spreng.) Burkart, *Cathormion polycephalum* (Griseb.) Burkart, hom. illeg., *Enterolobium polycephalum* Griseb., *Feuillea polycephala* (Griseb.) Kuntze, *Pithecellobium multiflorum* (Kunth) Benth. var. *brevipedunculata* Chodat & Hassl., *Pithecellobium pendulum* Lindm.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN, CON, COA, PHA). URY(ART, PAY, RNO, SAO, SJO).
- Pseudalbizzia niopoides** (Spruce ex Benth.) E.J.M. Koenen & Duno
Sin.: *Acacia guacamayo* (Britton & Killip) Standl., *Albizia caribaea* (Urb.) Britton & Rose, *Albizia guacamayo* (Britton & Killip) L. Cardenas, *Albizia hassleri* (Chodat) Burkart, *Albizia niopoides* (Spruce ex Benth.) Burkart, *Albizia richardiana* King & Prain, *Feuillea niopoides* (Spruce ex Benth.) Kuntze, *Pithecellobium caribaeum* Urb., *Pithecellobium hassleri* Chodat, *Pithecellobium niopoides* Spruce ex Benth., *Senegalia guacamayo* Britton & Killip, *Senegalia liebmännii* Britton & Rose
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, PAI).
- Pseudalbizzia polycephala** (Benth.) E.J.M. Koenen & Duno
Sin.: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip ex Record, *Pithecellobium polycephalum* Benth.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Psophocarpus** Neck. ex DC.
- Psophocarpus tetragonolobus** (L.) DC.
Sin.: *Dolichos tetragonolobus* L.
Liana. Introducida.
Países: BRA(PAR).
- Psoralea** L.
- Psoralea pinnata** L. var. **speciosa** Harv.
Arbusto. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(MON, ROC).
- Pterocarpus** Jacq.
- Pterocarpus rohrii** Vahl
Sin.: *Pterocarpus violaceus* Vogel
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Pterocarpus santalinoides** L'Hér. ex DC.
Sin.: *Pterocarpus amazonicus* Huber, *Pterocarpus grandis* R.S. Cowan, *Pterocarpus michelii* Britton
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). PRY(APY, CEN, CON).
- Pterogyne** Tul.

Pterogyne nitens Tul.

Sin.: *Machaerium pseudotipe* Griseb.,
Pterogyne nitens Tul. f. *parvifolia*
Chodat & Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU,
CAN, CEN, COA, ÑEE, NAS, PAI).
URY(SAO).

Pueraria DC.

Pueraria montana (Lour.) Merr. var.
lobata (Willd.) Maesen & S.M.
Almeida ex Sanjappa & Predeep

Sin.: *Dolichos lobatus* Willd.

Enredadera o liana. Introducida. 0-500
m.

Países: ARG(MIS).

Racosperma Mart.

Racosperma dealbatum (Link) Pedley

Sin.: *Acacia dealbata* Link

Arbusto o árbol. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(COR, LPA). BRA(RGS).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR,
LLA, RME, JFE, IPA). URY(LAV, MAL,
MON, SJO).

Racosperma longifolium (Andrews)
Mart.

Sin.: *Acacia longifolia* (Andrews) Willd.,
Mimosa longifolia Andrews

Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(RME). URY(CAS,
COL, MAL, MON, ROC).

Racosperma melanoxydon (R. Br.) Mart.

Sin.: *Acacia melanoxydon* R. Br.

Árbol. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS).
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,
RME, JFE, IPA). URY(MAL, MON,
SJO).

Racosperma paradoxum (DC.) Pedley

Sin.: *Acacia armata* R. Br., *Acacia*
paradoxa DC.

Arbusto. Introducida.

Países: CHL(VAL).

Ramorinoa Speg.

Ramorinoa girolae Speg.

Arbusto. Endémica. 1400-2600 m.

Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

Rhynchosia Lour.

Rhynchosia arenicola Hassl.

Sin.: *Rhynchosia arenicola* Hassl. var.
major Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(CAU, ITA).

Rhynchosia balansae Micheli

Sin.: *Dolicholus balansae* (Micheli)
Kuntze, *Rhynchosia balansae* Micheli
var. *psilantha* Fortunato, *Rhynchosia*
hagenbeckii Harms, *Rhynchosia*
hassleriana Chodat, *Rhynchosia*
pallida Micheli, *Rhynchosia reticulata*
(Sw.) DC. f. *balansae* (Micheli) Hassl.,
Rhynchosia schomburgkii Benth. f.
pallida (Micheli) Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA,
CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI,
SPE). URY(MON).

Rhynchosia bicentrica B.L. Turner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, LPA, MIS, SLU, SFE).
BRA(RGS). URY(ART, CLA, COL,
FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO,
RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Rhynchosia burkartii Fortunato

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL).
PRY(APY, PHA).

Rhynchosia caaguazuensis Hassl.

Hierba o subarbusto. Endémica.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Rhynchosia claussenii Benth.

Sin.: *Arcyphyllum capitatum* Benth.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN, SPE).

Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth.

Sin.: *Rhynchosia corylifolia* Mart. ex
Benth. f. *glabrior* Chodat & Hassl.,
Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth.
var. *discolor* Chodat & Hassl.,
Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth.
var. *erecta* Micheli, *Rhynchosia*
corylifolia Mart. ex Benth. var.
orbiculata Chodat & Hassl.,
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. f.
oblongifolia Chodat & Hassl.,
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. f.
ovalifolia Chodat & Hassl., *Rhynchosia*
reticulata (Sw.) DC. f. *subumbellata*
Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN,
CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE,
ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART,
CLA, MAL, MON, RIV, TAC, TYT).

Rhynchosia diversifolia Micheli

Sin.: *Rhynchosia diversifolia* Micheli var.
prostrata Burkart, *Rhynchosia edensis*

Izag. & Beyhaut, *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. & Arn., *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. & Arn. f. *genuina* Hassl., nom. inval., *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. & Arn. f. *glabrata* Hassl., *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. & Arn. var. *diversifolia* (Micheli) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Rhynchosia edulis Griseb.

Sin.: *Dolicholus apoloensis* Rusby, *Dolicholus melanostictus* (Griseb.) Kuntze, *Eriosema edule* (Griseb.) Burkart, *Eriosema volubile* Micheli, *Eriosema volubile* Micheli f. *pubedensiore* Chodat & Hassl., *Rhynchosia apoloensis* (Rusby) J.F. Macbr., *Rhynchosia melanosticta* Griseb., *Rhynchosia pinetorum* Standl.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

Rhynchosia hauthalii (Kuntze) Grear

Sin.: *Dolicholus hauthalii* Kuntze, *Eriosema rotundifolium* Micheli, *Eriosema rotundifolium* Micheli var. *macrophyllum* Chodat & Hassl., *Rhynchosia uruguayana* Arechav.
Subarbusto. Nativa. 400-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(RIV, TAC).

Rhynchosia lateritia Burkart

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(PAI). URY(CLA).

Rhynchosia leucophylla (Benth.) Benth.

Sin.: *Arcyphyllum leucophyllum* Benth., *Rhynchosia leucophylla* (Benth.) Benth. f. *elliptica* Chodat & Hassl., *Rhynchosia leucophylla* (Benth.) Benth. f. *laxifolia* Chodat & Hassl., *Rhynchosia leucophylla* (Benth.) Benth. f. *pubescens* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Nativa.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON).

Rhynchosia lineata Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA). URY(ART, CLA, DUR, PAY, RNO, RIV, TAC).

Rhynchosia melanocarpa Grear

Sin.: *Rhynchosia phaseoloides* (Sw.) DC. var. *erecta* Micheli
Hierba o enredadera. Nativa. 200-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, COA, GUA, PAI, SPE).

Rhynchosia minima (L.) DC.

Sin.: *Dolicholus minimus* (L.) Medik., *Dolichos minimus* L., *Glycine lamarckii* Kunth, *Glycine littoralis* Vahl ex DC., *Glycine reflexa* Nutt., *Rhynchosia mexicana* Hook. & Arn., *Rhynchosia minima* (L.) DC. var. *pauciflora* Kuntze, *Rhynchosia punctata* DC.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(AYP). PRY(APY, CON, PHA).

Rhynchosia nainckensis Fortunato

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL). PRY(AMA, CEN, PAI, SPE).

Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC.

Sin.: *Dolicholus phaseoloides* (Sw.) Kuntze, *Glycine phaseoloides* Sw.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, PAI, SPE).

Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. var. **kuntzei** (Harms ex Kuntze) Grear

Sin.: *Dolicholus kuntzei* Harms ex Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. var. **reticulata**

Sin.: *Dolicholus reticulatus* (Sw.) Millsp., *Glycine reticulata* Sw.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). URY(MON).

Rhynchosia rojasii Hassl.

Sin.: *Rhynchosia ituana* Hoehne
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, GUA, ÑEE).

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Dolicholus angustifolius* (A. Gray) Kuntze, *Dolicholus senna* (Gillies ex Hook.) Kuntze, *Rhynchosia angustifolia* A. Gray, *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. & Arn. f. *minor* Griseb., *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. & Arn. var. *angustifolia* (A. Gray) Grear, *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. & Arn. var. *cordobensis* (Griseb.) Burkart, *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. & Arn. var. *texana* (Torr. & A. Gray) M.C. Johnst.,

Rhynchosia texana Torr. & A. Gray,
Rhynchosia texana Torr. & A. Gray f.
cordobensis Griseb., *Rhynchosia*
texana Torr. & A. Gray var.
microphylla Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL,
 SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
 BRA(RGS). PRY(APY, CHO).
 URY(ART, CLA, COL, CLA, FLA, LAV,
 MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC,
 SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Riedeliella Harms

Riedeliella graciliflora Harms

Sin.: *Riedeliella hassleri* (Chodat) Harms,
Riedeliella hassleri (Chodat) Harms
 var. *glabrescens* (Chodat) Harms,
Sweetiopsis hassleri Chodat,
Sweetiopsis hassleri Chodat var.
glabrescens Chodat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Robinia L.

Robinia pseudoacacia L.

Árbol. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE,
 LPA, NEU, RNE, SFE). CHL(VAL,
 LBO, MAU, BIO, RME, JFE, IPA).
 URY(CAS, MAL, MON).

Samanea Merr.

Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Calliandra tubulosa* Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL). PRY(AMA, CON,
 COA).

Schizolobium Vogel

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake

Sin.: *Cassia parahyba* Vell., *Schizolobium*
excelsum Vogel

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Schnella Raddi

Schnella angulosa (Vogel) Wunderlin

Sin.: *Bauhinia angulosa* Vogel, *Phanera*
angulosa (Vogel) Vaz

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Schnella microstachya Raddi

Sin.: *Bauhinia bahiensis* Bong., *Bauhinia*
lagesiana Harms, *Bauhinia*
langsдорffiana Bong., *Bauhinia*
langsдорffiana Bong. var. *bahiensis*
 (Bong.) Benth., *Bauhinia microstachya*
 (Raddi) J.F. Macbr., *Bauhinia*
microstachya (Raddi) J.F. Macbr. var.
bahiensis (Bong.) J.F. Macbr.,
Bauhinia scandens Vell., hom. illeg.,
Bauhinia spicata Vogel, *Bauhinia*
tomentosa Vell., *Bauhinia vogeliana*
 Steud., *Schnella microstachya* Raddi
 var. *bahiensis* (Bong.) A. Schmitz,
Schnella spicata (Vogel) A. Schmitz

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,
 SPE).

Sellocharis Taub.

Sellocharis paradoxa Taub.

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Senegalia Raf.

Senegalia bonariensis (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia bonariensis* Gillies ex Hook. &
 Arn.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU,
 SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA,
 MIE, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS,
 CLA, COL, CLA, FLA, MON, PAY,
 RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).

Senegalia catharinensis (Burkart ex Barth & Yonesh.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia catharinensis* Burkart ex
 Barth & Yonesh., *Acacia*
magnibracteosa Burkart, *Senegalia*
magnibracteosa (Burkart) Seigler &
 Ebinger

Arbusto. Endémica. 400-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Senegalia emilioana (Fortunato & Ciald.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia emilioana* Fortunato & Ciald.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(APY, BOQ).

Senegalia etilis (Speg.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia etilis* Speg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY,
 BOQ).

Senegalia fiebrigii (Hassl.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia fiebrigii* Hassl.

Arbusto. Nativa. 600-1300 m.

- Países: BRA(PAR). PRY(CAN).
- Senegalia gilliesii** (Steud.) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia furcata* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Acacia furcatispina* Burkart, *Acacia gilliesii* Steud., *Manganaroa furcata* Speg.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CAA).
- Senegalia grandistipula** (Benth.) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia grandistipula* Benth.
Arbusto. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Senegalia harleyi** Seigler, Ebinger & P.G. Ribeiro
Arbusto o árbol. Endémica. 500-2200 m.
Países: BRA(PAR).
- Senegalia hatschbachii** Seigler, Ebinger & P. G. Ribeiro
Arbusto o árbol. Endémica. 1000- m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Senegalia hoehnei** Seigler, M.P. Morim, M.J.F. Barros & Ebinger
Arbusto o liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Senegalia lacerans** (Benth.) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia lacerans* Benth.
Arbusto. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Senegalia lorentensis** (J.F. Macbr.) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia lorentensis* J.F. Macbr.
Árbol. Nativa
Países: BRA(PAR).
- Senegalia lowei** (L. Rico) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia lowei* L. Rico, *Acacia plumosa* Lowe
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Senegalia martii** (Benth.) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia martii* Benth., *Acacia paniculata* Willd. var. *incana* Chodat & Hassl., *Acacia paniculata* Willd. var. *martii* (Benth.) Hassl., *Manganaroa martii* (Benth.) Speg., *Manganaroa paniculata* (Willd.) Speg. var. *paraguayensis* Speg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(PAR). PRY(CON, PHA).
- Senegalia martiusiana** (Steud.) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia martiusiana* (Steud.) Burkart, *Mimosa martiusiana* Steud.
Arbusto o liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Senegalia monacantha** (Willd.) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia monacantha* Willd., *Acacia monacantha* Willd. f. *schulziana* Burkart, *Acacia rojasii* Hassl., *Acacia velutina* Benth., hom. illeg., *Manganaroa monacantha* (Willd.) Speg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, PHA).
- Senegalia nitidifolia** (Speg.) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia nitidifolia* Speg.
Arbusto. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, MIE).
- Senegalia paraensis** (Ducke) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia paraensis* Ducke
Arbusto o liana. Nativa
Países: BRA(RGS).
- Senegalia paniculata** (Willd.) Killip
Sin.: *Acacia multipinnata* Ducke, *Acacia paniculata* Willd., *Senegalia multipinnata* (Ducke) Seigler & Ebinger
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).
- Senegalia parviceps** (Speg.) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia adhaerens* Benth. var. *parviceps* Speg., *Acacia parviceps* (Speg.) Burkart
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN).
- Senegalia polyphylla** (DC.) Britton & Rose ex Britton & Killip
Sin.: *Acacia amambayensis* Hassl., *Acacia glomerosa* Benth., *Acacia polyphylla* DC., *Acacia riparia* Bertero ex Spreng., nom. illeg.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON).
- Senegalia praecox** (Griseb.) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia hassleri* Chodat, *Acacia praecox* Griseb., *Acacia praecox* Griseb. f. *hassleri* (Chodat) Burkart
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CON, PAI, PHA). URY(ART, PAY, SAO).

Senegalia rafinesqueana Terra & García
Liana. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Senegalia recurva (Benth.) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia recurva* Benth.
Arbusto. Nativa. 200-1200 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, ITA, PHA).

Senegalia riparia (Kunth) Britton & Rose
Sin.: *Acacia pseudoadhaerens* Hassl.,
Acacia riparia Kunth, *Acacia riparia*
Kunth f. *intermedia* Hassl., *Acacia*
riparia Kunth var. *angustifoliola*
Kuntze, *Acacia riparia* Kunth var.
pseudoadhaerens (Hassl.) Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CEN,
COA, GUA, PAI).

Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose
Sin.: *Acacia tenuifolia* (L.) Willd., *Mimosa*
tenuifolia L.
Arbusto o liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senegalia tucumanensis (Griseb.)
Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia riparia* Kunth var.
argentinensis Speg., *Acacia riparia*
Kunth var. *subscandens* (Griseb.)
Griseb., *Acacia riparia* Kunth var.
tucumanensis Griseb., *Acacia*
tucumanensis Griseb., *Acacia*
tucumanensis Griseb. var.
subscandens Griseb.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, MIS,
SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI,
SPE). URY(ART).

Senegalia velutina (DC.) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia velutina* Bertol., nom. illeg.,
Acacia velutina DC., *Acacia velutina*
DC. f. *ferox* Hassl., *Acacia velutina*
DC. f. *subinermis* Hassl., *Acacia*
velutina DC. var. *glabrescens* (Speg.)
Burkart, *Acacia velutina* DC. var.
monadena Hassl., *Manganaroa*
velutina (DC.) Speg., *Manganaroa*
velutina (DC.) Speg. var. *glabrescens*
Speg.
Arbusto. Nativa. 100-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN,
COA, GUA, ITA).

Senna Mill.

Senna acanthoclada (Griseb.) H.S. Irwin
& Barneby
Sin.: *Cassia acanthoclada* Griseb.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-
2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,
SJU, SLU).

Senna aculeata (Pohl ex Benth.) H.S.
Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia aculeata* Pohl ex Benth.,
Chamaesenna aculeata (Pohl ex
Benth.) Pittier
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CEN, CON,
COA, PHA).

Senna alata (L.) Roxb.
Sin.: *Cassia alata* L., *Cassia alata* L. var.
perennis Pamp., *Cassia alata* L. var.
rumphiana DC., *Cassia bracteata* L. f.,
Cassia herpetica Jacq., nom. superfl.,
Herpetica alata (L.) Raf.
Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-
1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN,
CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Senna angulata (Vogel) H.S. Irwin &
Barneby var. **miscadena** (Vogel) H.S.
Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia angulata* Vogel var.
miscadena Vogel
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senna aphylla (Cav.) H.S. Irwin &
Barneby
Sin.: *Cassia aphylla* Cav., *Cassia aphylla*
Cav. var. *rigida* Hieron., *Cassia*
aphylla Cav. var. *trichosepala* Chodat
& Wilczek, *Cassia aphylla* Cav. var.
virgata Burkart, *Cassia fabrisii* L.
Bravo, *Cassia rigida* (Hieron.) Burkart,
Cassia rigida (Hieron.) Burkart var.
inermis L. Bravo, *Cassia trichosepala*
(Chodat & Wilczek) L. Bravo, *Senna*
fabrisii (L. Bravo) H.S. Irwin &
Barneby, *Senna rigida* (Hieron.) H.S.
Irwin & Barneby, *Senna rigida*
(Hieron.) H.S. Irwin & Barneby var.
inermis (L. Bravo) L. Bravo, *Senna*
trichosepala (Chodat & Wilczek) H.S.
Irwin & Barneby
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000
m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU,
SLU, SFE, SDE, TUC).

Senna araucarietorum H.S. Irwin &
Barneby
Arbusto. Endémica. 500-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Es probable su presencia en
Misiones (Argentina).

Senna arnottiana (Gillies ex Hook.) H.S.
Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia andina* Phil., *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook., *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook. var. *andina* (Phil.) Reiche, *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook. var. *sericea* Burkart ex L. Bravo, *Cassia lorentzii* Niederl.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 800-2800 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Senna birostris (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **arequipensis** (Meyen ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia arequipensis* Meyen ex Vogel, *Cassia tarapacana* Phil.

Arbusto. Nativa. 2200-3900 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Senna birostris (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **hookeriana** (Hook.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia hookeriana* Hook.

Arbusto. Nativa. 1100-3100 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Senna birostris (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **jallaguensis** Laporta & R.A. Palacios

Arbusto. Nativa. 2000-4100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Senna brongniartii (Gaudich.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia brongniartii* Gaudich., *Cassia conjugata* Ruiz & Pav. ex Benth., *Cassia misera* Phil.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1100 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Senna burkartiana (Villa) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia burkartiana* Villa

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Senna candolleana (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia bicapsularis* L. var. *chilensis* Benth., *Cassia candolleana* Vogel, *Cassia closiana* Phil., *Cassia emarginata* Clos, nom. illeg., *Cassia obtusa* Clos

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Senna cernua (Balb.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia cernua* Balb., *Cassia macrocarpa* Micheli, *Cassia sulcata* DC.

Subarbusto. Nativa. 300-1500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, COA, GUA, PAI).

Senna chloroclada (Harms) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia chloroclada* Harms

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SFE). PRY(APY, PHA).

Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Adipera corymbosa* (Lam.) Britton & Rose, *Cassia corymbosa* Lam., *Cassia crassifolia* Ortega, *Cassia falcata* Dum. Cours., hom. illeg., *Chamaefistula corymbosa* (Lam.) G. Don

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, DUR,

FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Senna crassiramea (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia crassiramea* Benth., *Cassia rigidicaulis* Burkart ex L. Bravo, *Senna rigidicaulis* (Burkart ex L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby

Arbusto o subarbusto. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Senna cruckshanksii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia campanae* Phil., *Cassia confusa* Phil. var. *campanae* (Phil.) Reiche, *Cassia cruckshanksii* Hook. & Arn., *Cassia stipulacea* Aiton var. *tenuistipula* Bertero ex Vogel

Arbusto. Endémica. 400-600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **alcaparra** (Phil.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia alcaparra* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **coquimbensis** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia coquimbensis* Vogel, *Cassia flaccida* Clos

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **cumingii**

Sin.: *Cassia cumingii* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **eremobia** (Phil.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia eremobia* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT).

Senna hilariana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia hilariana* Benth.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).
Notas: Es posible su presencia en Misiones, Argentina

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **hirta** H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia leptocarpa* Benth. var. *hirsuta* Benth.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **leptocarpa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia leptocarpa* Benth.
Hierba o subarbusto. Nativa. 100-700 m.
Países: PRY(CEN).

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **puberula** H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia longisiliqua* Blanco, *Cassia occidentalis* L. f. *ovato-lanceolata* Chodat & Hassl., *Cassia pubescens* Jacq., *Cassia sulcata* Blanco, hom. illeg.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA).

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **streptocarpa** H.S. Irwin & Barneby

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV).

Senna huidobriana (Phil.) Zoellner & San Martin

Sin.: *Cassia huidobriana* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(COQ).

Senna kurtzii (Harms) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia egregia* Sandwith, *Cassia kurtzii* Harms
Subarbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Senna leiophylla (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia leiophylla* Vogel
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS). PRY(GUA).

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby var. **macranthera**

Sin.: *Cassia macranthera* DC. ex Collad.
Árbol. Introducida. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, SPE).

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby var. **nervosa** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia nervosa* Vogel
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senna morongii (Britton) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia acinacarpa* Rusby, *Cassia cochabambae* Herzog, *Cassia morongii* Britton, *Cassia rojasiana* Hassl., *Cassia tomentosa* L. f. var. *paucijuga* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CON, MIE, PHA).

Senna mucronifera (Mart. ex Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia mucronifera* Mart. ex Benth.
Hierba. Nativa. 300-1000 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA).

Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby var. **peregrinatrix** H.S. Irwin & Barneby

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby subsp. **lindleyana** (Gardner) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia lindleyana* Gardner, *Cassia multijuga* Rich. var. *lindleyana* (Gardner) Benth.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senna nana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia nana* Benth.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). URY(ART, DUR, PAY, SAO, SOR, TAC, TYT).

Senna neglecta (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia neglecta* Vogel
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

- Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Senna nudicaulis** (Burkart) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia nudicaulis* Burkart
Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
- Senna oblongifolia** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia oblongifolia* Vogel
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, RIV, TAC).
- Senna obtusifolia** (L.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia humilis* Collad., *Cassia obtusifolia* L., *Cassia tora* L. var. *humilis* Pers., *Cassia toroides* Raf., *Cassia toroides* Roxb., nom. nud., *Diallobus falcatus* Raf., nom. illeg., *Diallobus uniflorus* Raf., *Emelista tora* (L.) Britton & Rose, *Senna toroides* Roxb.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).
Notas: Su presencia es probable en Uruguay (Izaguirre & Beyhaut 2003)
- Senna occidentalis** (L.) Link
Sin.: *Cassia caroliniana* Walter, *Cassia ciliata* Raf., *Cassia falcata* L., *Cassia foetida* Pers., nom. illeg., *Cassia macradenia* Collad., *Cassia obliquifolia* Schrank, *Cassia occidentalis* L., *Cassia occidentalis* L. var. *aristata* Collad., *Cassia planisiliqua* L., *Cassia planisiliqua* Lam., hom. illeg., *Cassia plumieri* DC., *Ditremexa occidentalis* (L.) Britton & Rose ex Britton & Wilson,
- Senna occidentalis* (L.) Roxb., comb. superfl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).
- Senna organensis** (Harms) H.S. Irwin & Barneby var. **extratropica** H.S. Irwin & Barneby
Arbusto. Nativa. 1100-2300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Senna pachyrrhiza** (L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby var. **pachyrrhiza**
Sin.: *Cassia aphylla* Cav. subsp. *divaricata* (Hieron.) L. Bravo, *Cassia aphylla* Cav. var. *divaricata* Hieron., *Cassia pachyrrhiza* L. Bravo, *Senna aphylla* (Cav.) H.S. Irwin & Barneby subsp. *divaricata* (Hieron.) L. Bravo
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU).
- Senna pachyrrhiza** (L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby var. **pendula** (Robbiati & Fortunato) Robbiati & Fortunato
Sin.: *Senna aphylla* (Cav.) H.S. Irwin & Barneby var. *pendula* Robbiati & Fortunato
Arbusto o subarbusto. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).
- Senna paposana** (Phil.) Zoellner & San Martin
Sin.: *Cassia paposana* Phil.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ANT).
- Senna paradietyon** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia paradietyon* Vogel
Hierba. Nativa. 0-400 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, SPE).
- Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **eriocarpa** (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia bicapsularis* L. var. *eriocarpa* Griseb., *Cassia pendula* Willd. var. *eriocarpa* (Griseb.) Lass.
Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **glabrata** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia indecora* Kunth var. *glabrata* Vogel
Arbusto. Nativa. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).
- Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **missionum** H.S. Irwin & Barneby
Arbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
- Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **paludicola** H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia bicapsularis* L. f. *pilosa* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, MON).
- Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **recondita** H.S. Irwin & Barneby
Arbusto. Endémica. 0-100 m.

- Países: BRA(PAR, SCA).
- Senna pilifera** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **pilifera**
 Sin.: *Cassia ignorata* Hoehne, *Cassia pilifera* Vogel, *Cassia pilifera* Vogel f. *pilosa* Chodat & Hassl., *Cassia pilifera* Vogel f. *sericea* Chodat & Hassl., *Cassia tora* L. f. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Emelista pilifera* (Vogel) Pittier, comb. illeg.
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN).
- Senna pilifera** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **subglabra** (S. Moore) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia pilifera* Vogel var. *subglabra* S. Moore
 Liana. Nativa.
 Países: BRA(PAR).
- Senna pilifera** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **tubata** H.S. Irwin & Barneby
 Hierba o subarbusto. Nativa. 200-400 m.
 Países: PRY(APY).
- Senna rugosa** (G. Don) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia rugosa* G. Don
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-1300 m.
 Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).
- Senna scabriuscula** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia neglecta* Vogel var. *entreriana* Griseb., *Cassia occidentalis* L. var. *entreriana* (Griseb.) Burkart, *Cassia occidentalis* L. var. *scabriuscula* Vogel
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
- Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PAI). URY(MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR).
- Senna septemtrionalis** (Viv.) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia septemtrionalis* Viv.
 Árbol. Nativa.
 Países: BRA(SCA). CHL(LBO).
 Notas: Introducido en Chile
- Senna siamea** (Lam.) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia siamea* Lam.
 Árbol. Introducida.
 Países: BRA(RGS, SCA).
- Senna silvestris** (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **guaranitica** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia guaranitica* Chodat & Hassl., *Cassia guaranitica* Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat & Hassl.
 Arbusto. Nativa. 200-600 m.
 Países: PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).
- Senna silvestris** (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **silvestris**
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).
- Senna silvestris** (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **unifaria** H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia silvestris* (Vell.) H.S. Irwin & Barneby f. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Cassia silvestris* (Vell.) H.S. Irwin & Barneby f. *olivacea* Chodat & Hassl.
 Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 300-500 m.
 Países: PRY(AMA).
- Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia amazonica* Ducke, *Cassia carnaval* Speg., *Cassia edulis* Posada-Ar., *Cassia excelsa* Schrad. var. *acutifolia* Hassl., *Cassia humboldtiana* DC., *Cassia speciosa* Kunth, *Cassia spectabilis* DC., *Cassia totonaca* Sessé & Moç., *Cassia trinitatis* Rchb. ex DC., *Cathartocarpus speciosus* G. Don, *Cathartocarpus trinitatis* (Rchb. ex DC.) G. Don, *Pseudocassia spectabilis* (DC.) Britton & Rose
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, COA).
- Senna spiniflora** (Burkart) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia aphylla* Cav. var. *robusta* Burkart, *Cassia chacoensis* L. Bravo, *Cassia rigida* (Hieron.) Burkart var. *robusta* (Burkart) Burkart, *Cassia spiniflora* Burkart, *Senna chacoensis* (L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).
- Senna splendida** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia splendida* Vogel
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(CON).
- Senna stipulacea** (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. **anglorum** H.S. Irwin & Barneby
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME).
- Senna stipulacea** (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. **stipulacea**
 Sin.: *Cassia foetida* Ruiz & Pav. ex G. Don, *Cassia myrtifolia* Phil. ex Reiche,

Cassia pencana Phil. ex sched.,
Cassia stipulacea Aiton, *Cassia stipulacea* Willd., nom. illeg.
 Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Senna subulata (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia subulata* Griseb.
 Arbusto. Endémica. 400-2000 m.
 Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Senna tenuifolia (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia tenuifolia* Vogel
 Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Senna tropica (Vell.) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia tropica* Vell.
 Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Senna urmenetae (Phil.) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia glaucescens* Benth., hom. illeg., *Cassia oreades* Phil., *Cassia urmenetae* Phil.
 Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, RME).

Senna velutina (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
 Sin.: *Cassia velutina* Vogel
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA, CON).

Sesbania Adans.

Sesbania bispinosa (Jacq.) W. Wight
 Sin.: *Aeschynomene bispinosa* Jacq., *Coronilla aculeata* Willd., *Sesbania*

bispinosa (Jacq.) W. Wight var.
micrantha (Chiov.) J. Gillet
 Hierba. Introducida. 500-1000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Sesbania exasperata Kunth
 Sin.: *Emerus exasperatus* (Kunth) Kuntze, *Lotus palustris* Vell., nom. illeg., *Sesbania exasperata* Kunth f. *robustior* Chodat & Hassl.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).

Sesbania macroptera Micheli
 Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS). PRY(APY, COA, PAI).

Sesbania punicea (Cav.) Benth.
 Sin.: *Daubentonia punicea* (Cav.) DC., *Emerus puniceus* (Cav.) Kuntze, *Piscidia punicea* Cav., *Sesbania tripartii* (Poi.) Mouill.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ITA). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR).

Sesbania sesban (L.) Merr. var. **bicolor** (Wight & Arn.) F.W. Andrews
 Sin.: *Sesbania aegyptiaca* Poir. var. *bicolor* Wight & Arn.
 Arbusto. Introducida.
 Países: BRA(PAR).

Sesbania sesban (L.) Merr. var. **sesban**
 Sin.: *Aeschynomene sesban* L., *Sesbania aegyptiaca* Poir.
 Arbusto. Introducida. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Sesbania virgata (Cav.) Poir.
 Sin.: *Aeschynomene virgata* Cav., *Coronilla virgata* (Cav.) Willd., *Coursetia virgata* (Cav.) DC., *Sesbania marginata* Benth.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, DUR, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

Sigmoidotropis (Piper) A. Delgado

Sigmoidotropis speciosa (Kunth) A. Delgado
 Sin.: *Phaseolus speciosus* Kunth, *Vigna speciosa* (Kunth) Verdc.
 Enredadera. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR).

Sophora L.

Sophora cassioides (Phil.) Sparre
 Sin.: *Edwardsia cassioides* Phil., *Edwardsia eximia* Gand., *Edwardsia macnabiana* Graham, *Sophora macnabiana* (Graham) Skottsb.
 Árbol. Endémica. 0-900 m.
 Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Sophora fernandeziana (Phil.) Skottsb. var. **fernandeziana**
 Sin.: *Sophora tetraptera* J.S. Muell. subsp. *fernandeziana* Skottsb.
 Árbol. Endémica.
 Países: CHL(JFE).

Sophora fernandeziana (Phil.) Skottsb. var. **reedeanae** (Phil.) Skottsb.

Sin.: *Edwardsia reedeana* Phil., *Sophora reediana* (Phil.) Yakovlev
Árbol. Endémica.
Países: CHL(JFE).

Sophora linearifolia Griseb.
Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Sophora macrocarpa Sm.
Sin.: *Sophora donihuensis* Ravenna
Árbol. Endémica. 1200-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Sophora masafuerana (Phil.) Skottsbo.
Sin.: *Edwardsia masafuerana* Phil.
Árbol. Endémica.
Países: CHL(JFE).

Sophora rhynchocarpa Griseb.
Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Sophora tomentosa L. subsp. **littoralis** (Schrad.) Yakovlev
Sin.: *Sophora littoralis* Schrad.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sophora tomentosa L. subsp. **tomentosa**
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Spartium L.

Spartium junceum L.
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, LPA).
CHL(AYP, ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). URY(CAS, MON, SOR).

Sphaerophysa DC.

Sphaerophysa salsula (Pall.) DC.
Sin.: *Astragalus violaceus* R.P. St. John,
Phaca salsula Pall., *Swainsona salsula* (Pall.) Taub.
Subarbusto. Introducida.
Países: ARG(MEN).

Stenodrepanum Harms

Stenodrepanum bergii Harms
Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU).

Strombocarpa (Benth.) Engelm. & A. Gray

Strombocarpa abbreviata (Benth.) Hutch. ex C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis abbreviata* Benth.
Arbolito. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LRI, SJU, SLU, SDE).

Strombocarpa burkartii (Muñoz) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis burkartii* Muñoz
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(TAR).

Strombocarpa ferox (Griseb.) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis ferox* Griseb.
Arbusto o árbol. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Strombocarpa reptans (Benth.) A. Gray
Sin.: *Prosopis abbreviata* Benth. var. *argentina* Griseb., *Prosopis reptans* Benth.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR, LRI, RNE, SJU, SFE, SDE, TUC).

Strombocarpa strombulifera (Lam.) A. Gray var. **ruiziana** (Burkart) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *ruiziana* Burkart
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(MEN).

Strombocarpa strombulifera (Lam.) A. Gray var. **strombulifera**
Sin.: *Acacia strombulifera* (Lam.) Willd., *Mimosa circinalis* Cav., nom. illeg., *Mimosa strombulifera* Lam., *Prosopis reptans* Benth. var. *chilensis* Zoellner & M. Olivares, nom. inval., *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. var. *strombulifera*, *Spirolobium australe* Orb.
Arbusto. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO).

Strombocarpa tamarugo (Phil.) C.E. Hughes & G.P. Lewis
Sin.: *Prosopis tamarugo* Phil.
Árbol. Endémica.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Strombocarpa torquata (Cav. ex Lag.) Hutch.
Sin.: *Acacia torquata* Cav. ex Lag., *Prosopis adesmioides* Griseb., *Prosopis torquata* (Cav. ex Lag.) DC.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Stryphnodendron Mart.

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville

Sin.: *Acacia adstringens* Mart., *Mimosa barbadetimam* Vell., *Stryphnodendron barbadetimam* (Vell.) Mart.
Arbusto o arbolito. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Stryphnodendron rotundifolium Mart.

Sin.: *Stryphnodendron obovatum* Benth., *Stryphnodendron rotundifolium* Mart. f. *retusa* Chodat & Hassl.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Stylosanthes Sw.

Stylosanthes bracteata Vogel

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Stylosanthes campestris M.B. Ferreira & Sousa Costa

Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Stylosanthes capitata Vogel

Subarbusto. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var. **gracilis** (Kunth) Vogel ex Benth.

Sin.: *Astypsanthes gracilis* (Kunth) Herter, *Stylosanthes acuminata* M.B. Ferreira & Sousa Costa, *Stylosanthes gracilis* Kunth, *Stylosanthes gracilis* Kunth var. *vulgaris* Burkart, *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *marginata* Hassl., *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *robusta* t Mannetje
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var. **guianensis**

Sin.: *Stylosanthes gracilis* Kunth var. *subviscosa* (Benth.) Burkart, *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. f. *esetosa* Hassl., *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. f. *viscosissima* Hassl., *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *subviscosa* Benth., *Stylosanthes nunoi* Brandão, *Trifolium guianense* Aubl.
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Stylosanthes hippocampoides Mohlenbr.

Sin.: *Astypsanthes intermedia* (Vogel) Herter, *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *intermedia* (Vogel) Hassl., *Stylosanthes montevidensis* Vogel var. *intermedia* Vogel
Hierba. Nativa. 500-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC).

Stylosanthes leiocarpa Vogel

Sin.: *Astypsanthes leiocarpa* (Vogel) Herter
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Stylosanthes linearifolia M.B. Ferreira & Sousa Costa

Subarbusto. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Stylosanthes longiseta Micheli

Sin.: *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *longiseta* (Micheli) Hassl.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN).

Stylosanthes macrosoma S.F. Blake

Sin.: *Stylosanthes montevidensis* Vogel f. *arenosa* Hassl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, PAI).

Stylosanthes montevidensis Vogel

Sin.: *Astypsanthes montevidensis* (Vogel) Herter, *Stylosanthes juncea* Micheli, *Stylosanthes juncea* Micheli var. *setosa* Chodat & Hassl., *Stylosanthes montevidensis* Vogel f. *glabrata* Hassl., *Stylosanthes montevidensis* Vogel f. *setosa* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Stylosanthes montevidensis* Vogel var. *heterophylla* Burkart, *Stylosanthes montevidensis* Vogel var. *juncea* (Micheli) Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Stylosanthes nervosa J.F. Macbr.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, SAL). PRY(CON).

Stylosanthes recta Vanni

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Stylosanthes rostrata (Burkart) Vanni
 Sin.: *Stylosanthes gracilis* Kunth var. *rostrata* Burkart
 Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS). URY(COL).

Stylosanthes scabra Vogel
 Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1900 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CON, PHA).

Stylosanthes vallsii Sousa Costa & C. Berg
 Subarbusto. Endémica. 800-1100 m.
 Países: BRA(PAR).

Stylosanthes viscosa (L.) Sw.
 Sin.: *Astypsanthes viscosa* (L.) Herter, *Hedysarum hamatum* L. var. *viscosum* L., *Stylosanthes glutinosa* Kunth, *Stylosanthes viscosa* (L.) Sw. var. *acutifolia* Benth.
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.
 Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).

Styphnolobium Schott

Styphnolobium japonicum (L.) Schott
 Sin.: *Sophora japonica* L.
 Árbol. Introducida.
 Países: ARG(COR, LPA).

Swartzia Schreb., nom. cons.

Swartzia multijuga Vogel
 Árbol. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Swartzia oblata R.S. Cowan
 Árbol. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Swartzia submarginata (Benth.)
 Mansano
 Sin.: *Swartzia acutifolia* Vogel var. *submarginata* Benth.
 Árbol. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Sweetia Spreng., nom. cons.

Sweetia fruticosa Spreng.
 Sin.: *Ferreirea spectabilis* Allemão, *Ferreirea spectabilis* Allemão f. *fruticosa* Chodat & Hassl., *Ferreirea spectabilis* Allemão var. *paraguariensis* Chodat, *Sweetia fruticosa* Spreng. var. *hassleri* Yakovlev, *Sweetia fruticosa* Spreng. var. *paraguariensis* (Chodat) Yakovlev
 Árbol. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI).

Tachigali Aubl.

Tachigali aurea Tul.
 Sin.: *Sclerolobium aureum* (Tul.) Benth., *Sclerolobium aureum* (Tul.) Benth. var. *polyphyllum* Hassl., *Sclerolobium aureum* (Tul.) Benth. var. *velutinum* Benth.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA, CON).

Tachigali denudata (Vogel) Oliveira-Filho
 Sin.: *Sclerolobium denudatum* Vogel
 Árbol. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Tachigali paratyensis (Vell.) H.C. Lima
 Sin.: *Cassia paratyensis* Vell.
 Árbol. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Tara Molina

Tara spinosa (Molina) Britton & Rose
 Sin.: *Caesalpinia pectinata* Cav., *Caesalpinia spinosa* (Molina) Kuntze, *Caesalpinia tara* Ruiz & Pav., *Caesalpinia tinctoria* Benth. ex Taub., *Caesalpinia tinctoria* Dombey ex DC., nom. nud., *Coulteria tinctoria* Kunth, *Poinciana spinosa* Molina
 Árbol. Nativa. 0-3000 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, COQ, VAL).

Tephrosia Pers., nom. cons.

Tephrosia adunca Benth.
 Sin.: *Cracca adunca* (Benth.) Kuntze, *Tephrosia adunca* Benth. f. *glabrior* Chodat & Hassl., *Tephrosia adunca* Benth. f. *paraguayensis* (Ulbr.) Hassl., *Tephrosia adunca* Benth. f. *pseudomarginata* Hassl., *Tephrosia adunca* Benth. var. *intermedia* Chodat & Hassl., *Tephrosia adunca* Benth. var. *rufescens* (Benth.) Hassl., *Tephrosia adunca* Benth. var. *subglabrata* Hassl., *Tephrosia rufescens* Benth., *Tephrosia rufescens* Benth. var. *paraguayensis* Ulbr.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, ITA). URY(RIV).

Tephrosia chaquenha R.T. Queiroz & A.M.G. Azevedo
 Sin.: *Tephrosia cinerea* (L.) Pers. f. *pseudoadunca* Hassl.

Subarbusto. Endémica.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
PRY(COA, GUA, MIE).

Tephrosia cinerea (L.) Pers.

Sin.: *Cracca cinerea* (L.) Morong, *Galega cinerea* L., *Tephrosia cinerea* Malme ex Hassl., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, COA, MIE, PAI, PHA). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TAC).

Tephrosia fertilis R.T. Queiroz & A.M.G.

Azevedo

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Tephrosia guaranitica Chodat & Hassl.

Sin.: *Tephrosia adunca* Benth. var. *guaranitica* (Chodat & Hassl.) Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(SPE).

Tephrosia hassleri Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(COA).

Tephrosia marginata Hassl.

Sin.: *Tephrosia adunca* Benth. var. *acutifolia* Chodat & Hassl., *Tephrosia marginata* Hassl. var. *cinerascens* Hassl., nom. inval., *Tephrosia marginata* Hassl. var. *pseudorufescens* Hassl., *Tephrosia nervosa* Chodat & Hassl., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
PRY(APY, CON). URY(ART, MON, PAY, SAO).

Teramnus uncinatus (L.) Sw.

Sin.: *Dolichos uncinatus* L.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Tipuana (Benth.) Benth.

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze

Sin.: *Machaerium fertile* Griseb., *Machaerium tipu* Benth., *Tipuana speciosa* Benth., *Tipuana tipa* Lillo

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, ERI, JUJ, SAL, TUC). URY(CAS, MON).

Trifolium L.

Trifolium amabile Kunth var. **amabile**

Sin.: *Lupinaster amabilis* (Kunth) C. Presl, *Trifolium bolivianum* P.B. Kenn, *Trifolium humboldtii* Spreng., *Trifolium lozanoi* House, *Trifolium mathewsii* A. Gray, *Trifolium pauciflorum* Willd. ex Steud., *Trifolium reflexum* Schtdl. & Cham., hom. illeg., *Trifolium schiedeanum* S. Watson
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Trifolium amabile Kunth var. **hemsleyi**

(Lojac.) D. Heller & Zohary

Sin.: *Trifolium hemsleyi* Lojac., *Trifolium macrorrhizum* Ulbr.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COR, JUJ).

Trifolium angustifolium L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). URY(CAS).

Trifolium antucoense D. Heller

Sin.: *Lupinaster circumdatus* C. Presl, *Trifolium circumdatum* Kunze, nom. illeg., *Trifolium inconspicuum* Poepp. ex D. Heller, nom. nud.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO, BIO, LLA).

Trifolium arvense L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, NEU, RNE).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG). URY(FLA, MON).

Trifolium aureum Pollich

Sin.: *Trifolium strepens* Crantz, nom. illeg.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAG).

Trifolium campestre Schreb.

Sin.: *Trifolium procumbens* L., nom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-1600 m.

Países: ARG(NEU, RNE). BRA(PAR, RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, JFE).
URY(CAS, CLA, FLA, MON).

Trifolium cernuum Brot.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(LBO, MAU).

Trifolium chilense Hook. & Arn.

Sin.: *Lupinaster ochreateus* C. Presl, *Trifolium ochreatum* Kunze ex Steud.

Hierba. Endémica. 600-900 m.

Países: CHL(VAL, BIO, LLA, RME).

Trifolium depauperatum Desv.

Sin.: *Lupinaster depauperatus* (Desv.) C. Presl

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Teramnus P. Browne

Trifolium dubium Sibth.

Sin.: *Amarenum flavus* C. Presl, *Trifolium filiforme* L., hom. illeg., *Trifolium filiforme* L. subsp. *dubium* (Sibth.) Gams, *Trifolium filiforme* L. var. *dubium* (Sibth.) Fiori & Paol., *Trifolium flavum* C. Presl, *Trifolium luteolum* Schur, *Trifolium minus* Sm., *Trifolium parviflorum* Bunge ex Nyman
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(FLO, MON, SOR, TAC).

Trifolium fragiferum L. subsp. **bonannii** (C. Presl) Soják

Sin.: *Amoria bonannii* (C. Presl) Roskov, *Galearia bonannii* (C. Presl) C. Presl, *Trifolium bonannii* C. Presl, *Trifolium neglectum* C.A. Mey.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI). URY(COL, MON).

Trifolium fragiferum L. subsp. **fragiferum**

Sin.: *Amoria fragifera* (L.) Roskov, *Galearia fragifera* (L.) Bobrov, nom. inval., *Galearia fragifera* (L.) C. Presl, *Trifolium congestum* Link, hom. illeg.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, NEU, RNE). CHL(MAG).

Trifolium glomeratum L.

Sin.: *Micranthemum glomeratum* (L.) C. Presl subsp. ` , *Trifolium axillare* Phil., *Trifolium duodecimnerve* Willk. & Lange
 Hierba. Introducida. 500-1000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(TYT).

Trifolium hatschbachii Vincent & Butterworth

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAU, GUA).

Trifolium hybridum L. var. **anatolicum** (Boiss.) Boiss.

Sin.: *Trifolium anatolicum* Boiss., *Trifolium parvulum* Beck ex Stapf
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).

Trifolium hybridum L. var. **hybridum**

Sin.: *Amoria hybrida* (L.) C. Presl, *Trifolium fistulosum* Gilib.
 Hierba. Introducida. 0-100 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, LLA, MAG). URY(FLA, MON, SOR).

Trifolium incarnatum L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
 Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Trifolium lappaceum L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
 Países: URY(CLA, FLA, MON, TAC).

Trifolium macraei Hook. & Arn.

Sin.: *Trifolium bicephalum* Elmer, *Trifolium catalinae* S. Watson, *Trifolium mercedense* P.B. Kenn, *Trifolium traskiae* P.B. Kenn
 Hierba. Nativa. 0-600 m.
 Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Trifolium microdon Hook. & Arn.

Sin.: *Trifolium lechleri* Phil., *Trifolium microdon* Hook. & Arn. var. *pilosum* Eastw., *Trifolium tricuspidatum* Bertero ex Steud.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: CHL(BIO, ARA, LLA, RME).

Trifolium pallidum Waldst. & Kit.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
 Países: URY(DUR, FLA).

Trifolium physanthum Hook. & Arn.

Sin.: *Trifolium valdivianum* Phil. ex D. Heller & Zohary, nom. nud.
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, LLA).

Trifolium polymorphum Poir. var. **grandiflorum** Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(ERI). CHL(MAU, BIO, RME). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, RNO, SJO, SOR, TYT).

Trifolium polymorphum Poir. var. **neuquenense** Rossow

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(NEU).

Trifolium polymorphum Poir. var. **polymorphum**

Sin.: *Amoria obcordata* (Desv.) C. Presl, *Amoria polymorpha* (Poir.) C. Presl, *Trifolium amphotropum* Phil., *Trifolium argentinense* Speg., *Trifolium brevipes* Phil., *Trifolium concinnum* Phil., *Trifolium crosnieri* Clos, *Trifolium grandiflorum* Hook. & Arn., *Trifolium indecorum* Clos, *Trifolium megalanthum* Steud., *Trifolium obcordatum* Desv., *Trifolium reflexum* Roem. ex Scheele, *Trifolium rivale* Clos, hom. illeg., *Trifolium rivale* Steud., *Trifolium roemerianum* Scheele, *Trifolium rubrum* Larrañaga, *Trifolium simplex* Clos
 Hierba. Nativa. 0-2700 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SFE). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

PRY(CAU, GUA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Trifolium pratense L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(COL, MON).

Trifolium repens L.

Sin.: *Amoria repens* (L.) C. Presl, *Lotodes repens* (L.) Kuntze, *Trifolium limonium* Phil., *Trifolium repens* L. f. *riparia* Hauman, *Trifolium repens* L. subsp. *giganteum* (Lagr.-Foss.) Ponert, *Trifolium repens* L. var. *giganteum* Lagr.-Foss., *Trifolium stipitatum* Clos
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CLA, MAL, MON, PAY).

Trifolium resupinatum L.

Sin.: *Amoria resupinata* (L.) Roskov, *Galearia resupinata* (L.) C. Presl, *Trifolium resupinatum* L. subsp. *suaveolens* (Willd.) Ponert, *Trifolium suaveolens* Willd.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(FLA, MON).

Trifolium riograndense Burkart subsp. **pseudocalyculatum** Del Puerto
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CLA, TYT).

Trifolium riograndense Burkart subsp. **riograndense**
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, SOR).

Trifolium spadiceum L.

Sin.: *Amarenus spadiceus* (L.) C. Presl, *Trifolium litigiosum* Desv., *Trifolium montanum* L., hom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Trifolium squamosum L.

Sin.: *Trifolium maritimum* Huds., *Trifolium rigidum* Savi, *Trifolium xatardii* DC.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(FLA, MON).

Trifolium striatum L.

Sin.: *Trifolium incanum* C. Presl
Hierba. Introducida.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Trifolium subterraneum L.

Sin.: *Calycomorphum subterraneum* (L.) C. Presl
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA). URY(MON, SOR).

Trifolium suffocatum L.

Sin.: *Amoria suffocata* (L.) Soják
Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Trifolium tomentosum L.

Sin.: *Trifolium resupinatum* L. subsp. *tomentosum* (L.) Gibelli & Belli
Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

Trifolium triaristatum Bertero ex Colla
Hierba. Nativa.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, LLA).

Trifolium vernum Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO).

Trifolium vestitum D. Heller & Zohary

Sin.: *Trifolium volekmanni* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Trigonella L.

Trigonella monspeliaca L.

Sin.: *Medicago monspeliaca* (L.) Trautv., *Trigonella monspeliaca* L. subsp. *subacaulis* Feinbrun
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, RME).

Ulex L.

Ulex europaeus L.

Sin.: *Ulex opistolepis* Webb
Arbusto. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG). URY(CAS, MON, ROC, SJO).

Vachellia Wight & Arn.

Vachellia albicorticata (Burkart) Seigler & Ebinger
Sin.: *Acacia albicorticata* Burkart
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn., *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn. var. *cochlearis* Griseb., *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn. var. *moniliformis* (Griseb.) Hieron., *Acacia lutea* (Mill.) Britton var. *aroma* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acacia lutea* (Mill.) Britton var. *moniliformis* (Griseb.) Kuntze, *Acacia michelii* Rusby, *Acacia moniliformis* Griseb., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *aroma* (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *leptocarpa* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *moniliformis* (Griseb.) Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *oocephala* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *pachycarpa* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *thlipsacantha* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. var. *moniliformis* (Griseb.) Speg.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, BOQ, CON, NAS, PHA).

Vachellia astringens Speg.

Sin.: *Acacia atramentaria* Benth., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *atramentaria* (Benth.) Kuntze, *Acacia prosopoma* A. Schnyd., *Prosopis astringens* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(PAY).

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia adenopa* Hook. & Arn., *Acacia caven* (Molina) Molina var. *caven*, *Acacia caven* (Molina) Molina var. *dehiscens* Burkart ex Ciald.,

Acacia caven (Molina) Molina var. *macrocarpa* Aronson, *Acacia caven* (Molina) Molina var. *microcarpa* (Speg.) Burkart ex Ciald., *Acacia caven* (Molina) Molina var. *sphaerocarpa* Burkart ex Aronson, *Acacia caven* (Molina) Molina var. *stenocarpa* (Speg.) Burkart ex Ciald., *Acacia cavenia* (Molina) Hook. & Arn., *Acacia cavenia* Colla, hom. illeg., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. f. *cavenia* (Molina) E.C. Clos, *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *brachicarpa* Kuntze, *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *cavenia* (Molina) Arechav., comb. superfl., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *cavenia* (Molina) Kuntze, *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *heterocarpa* Kuntze, *Mimosa caven* Molina, *Mimosa cavenia* Molina, *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *brachypoda* Speg., *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *cavenia* (Molina) Speg., *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *microcarpa* Speg., *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *stenocarpa* Speg.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). PRY(APY, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Vachellia curvifructa (Burkart) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia curvifructa* Burkart

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE). PRY(APY, BOQ, PHA).

Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.

Sin.: *Acacia acicularis* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia edulis* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia farnesiana* (L.) Willd., *Acacia ferox* M. Martens & Galeotti, *Mimosa farnesiana* L.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAN, PAI, PHA). URY(CAS, MON, SAO).

Vachellia horrida (L.) Kyal. & Boatwr.

Sin.: *Acacia horrida* (L.) Willd., *Mimosa horrida* L.

Árbol. Introducida. 0-900 m.

Países: CHL(ATA, RME). URY(MON).

Vachellia ibirocayensis (Marchiori) Deble & Marchiori

Sin.: *Acacia ibirocayensis* Marchiori
Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso

Sin.: *Acacia karroo* Hayne

Arbusto o arbolito. Introducida.

Países: ARG(MEN). CHL(TAR, RME).

Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia macracantha* Humb. & Bonpl. ex Willd.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Vatairea Aubl.

Vatairea heteroptera (Allemão) Ducke

Sin.: *Machaerium heteropterum* Allemão
Árbol. Nativa.

- Países: BRA(PAR).
- Vicia L.**
- Vicia andicola** Kunth
Sin.: *Vicia andicola* Kunth var. *galbina* J.F. Macbr., *Vicia andicola* Kunth var. *mathewsii* (A. Gray) J.F. Macbr., *Vicia mathewsii* A. Gray
Hierba. Nativa. 1200-2300 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
- Vicia araucana** Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU, BIO).
- Vicia benghalensis** L.
Sin.: *Vicia atropurpurea* Desf., *Vicia atropurpurea* Desf. f. *alba* B.V. Rainha, *Vicia benghalensis* L. var. *atropurpurea* (Desf.) Nègre
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(CHA, MIS, TUC). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, MAG, RME). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, SJO, SOR).
- Vicia berteriana** Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO, RME).
- Vicia bijuga** Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Lathyrus anomalus* Phil., *Vicia saffordii* Phil. ex Britton, nom. inval., *Vicia sericella* Speg., *Vicia sericella* Speg. var. *glabrata* Speg., *Vicia solisii* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, LLA, AIS, MAG, RME).
- Vicia coquimbensis** Martic.
Sin.: *Vicia truncata* Phil., hom. illeg.
- Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).
- Vicia cracca** L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).
- Vicia disperma** DC.
Sin.: *Cracca disperma* (DC.) Godr. & Gren.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU). URY(COL, MON).
- Vicia diversifolia** Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LLA).
- Vicia epetolaris** Burkart var. *epetolaris*
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(MIE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).
- Vicia epetolaris** Burkart var. *microcarpa*
Vanni & D. Kurtz
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(RGS).
- Vicia faba** L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(SOR).
- Vicia graminea** Sm. var. *graminea*
Sin.: *Vicia bidentata* Hook., *Vicia graminea* Sm. var. *heterophylla* Kuntze, *Vicia graminea* Sm. var. *multiflora* Hook. & Arn., *Vicia grata* Phil., *Vicia selloi* Vogel
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, RNE,
- SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AIS, MAG, RME). PRY(MIE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).
- Vicia graminea** Sm. var. *nigricarpa* N.R.
Bastos & Miotto
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Vicia graminea** Sm. var. *transiens*
Burkart
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, SFE). URY(CLA, COL, FLO, LAV, PAY, ROC, SJO, SOR).
- Vicia hatschbachii** Burkart ex Vanni & D. Kurtz
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Vicia hirsuta** (L.) Gray
Sin.: *Cracca hirsuta* (L.) Gennari, *Ervum hirsutum* L.
Hierba. Introducida. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU). BRA(RGS). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG).
- Vicia hybrida** L.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(MON).
- Vicia inconspicua** Phil.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ARA, LLA).
- Vicia lanceolata** Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Vicia linearifolia Hook. & Arn.

Sin.: *Vicia hookeri* G. Don, *Vicia linearifolia* Larrañaga, nom. illeg., *Vicia micrantha* Hook. & Arn., hom. illeg.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, AIS). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

Vicia magellanica Hook. f. var. **dianthes** (Phil.) Reiche

Sin.: *Vicia dianthes* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ARA).

Vicia magellanica Hook. f. var. **magellanica**

Sin.: *Vicia andicola* Phil., nom. illeg., *Vicia depauperata* Clos, *Vicia kingii* Hook. f., *Vicia morenonis* Harms ex Kuntze, *Vicia morenonis* Harms ex Kuntze var. *burmeisteri* Kuntze, *Vicia patagonica* Hook. f., *Vicia patagonica* Hook. f. var. *depauperata* (Clos) Speg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Vicia modesta Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ANT, VAL).

Vicia montevidensis Vogel

Sin.: *Vicia montevidensis* Benth., nom. nud., *Vicia montevidensis* Vogel f. *oblonga* Burkart, *Vicia obscura* Vogel

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, SJO, TAC).

Vicia mucronata Clos

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, RME).

Vicia nana Vogel

Sin.: *Vicia dentata* Gillies ex Hook., *Vicia leptantha* Phil., *Vicia nana* Kellogg, nom. illeg., *Vicia valdiviana* Phil.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). CHL(BIO, LLA). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, TYT).

Vicia nigricans Hook. & Arn.

Sin.: *Vicia andina* Phil., *Vicia apiculata* Phil., *Vicia apiculata* Phil. var. *parvifolia* Phil., *Vicia commutata* Phil., *Vicia coxii* Phil., *Vicia darapskyana* Phil., *Vicia fodinarum* Phil., *Vicia leyboldii* Phil., *Vicia macraei* Hook. & Arn., *Vicia magnifolia* Clos, *Vicia moorei* Phil., *Vicia speciosa* Phil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Vicia pallida Hook. & Arn.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Vicia pampicola Burkart var. **burkartii**

Gianguarani

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR). URY(CAS, FLA, MON, SJO).

Vicia pampicola Burkart var. **pampicola**

Sin.: *Vicia stenophylla* Vogel var. *martinezii* Burkart

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,

RNE, SJU, SLU, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS). URY(MON, RNO, SJO).

Vicia parviflora Cav.

Sin.: *Ervum gracile* (Loisel.) DC., *Ervum tenuissimum* M. Bieb., *Vicia gayi* Phil., *Vicia gracilis* Loisel., *Vicia parviflora* Hook. & Arn., nom. illeg., *Vicia tenuissima* (M. Bieb.) Schinz & Thell.

Enredadera. Introducida. 1900-4000 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC). CHL(ARA).

Vicia platensis Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). URY(MAL, MON, PAY, SJO).

Vicia sativa L. subsp. **cordata** (Wulfen ex Hoppe) Asch. & Graebn.

Sin.: *Vicia angustifolia* L. var. *cordata* (Wulfen ex Hoppe) Boiss., *Vicia cordata* Wulfen ex Hoppe

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, MEN, NEU).

Notas: Citada para Chile por Gianguarani (1982) sin mencionar material de referencia.

Vicia sativa L. subsp. **nigra** (L.) Ehrh.

Sin.: *Vicia angustifolia* L., *Vicia sativa* L. subsp. *angustifolia* (L.) Asch. & Graebn., *Vicia sativa* L. var. *angustifolia* L., *Vicia sativa* L. var. *nigra* L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, LPA, NEU, RNE). BRA(PAR, RGS). CHL(BIO, ARA, LLA, RME). URY(COL, LAV, MON, TYT).

Vicia sativa L. subsp. **sativa**

Sin.: *Vicia sativa* L. var. *obovata* Ser.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, NEU, RNE, SFE). BRA(SCA).

CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME). URY(MON, SOR).

Vicia sessiliflora Clos

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LLA).

Vicia setifolia Kunth var. **bonariensis** Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Vicia setifolia Kunth var. **setifolia**

Sin.: *Vicia acerosa* Clos, *Vicia acerosa* Clos var. *angustifolia* (Clos) Reiche, *Vicia angustifolia* Clos, hom. illeg., *Vicia graminea* Sm. var. *setifolia* (Kunth) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, NEU, SAL, SLU, SFE, TUC). CHL(BIO, LLA, RME). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON, PAY, SAO, SJO).

Vicia stenophylla Vogel

Sin.: *Vicia macrograminea* Burkart, *Vicia montevidensis* Vogel var. *macrocarpa* Chodat & Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI, PHA). URY(MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

Vicia subserrata Phil.

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: CHL(COQ, RME).

Vicia tephrosioides Vogel

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, ITA).

Notas: Su presencia es probable en Uruguay

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

Sin.: *Ervum tetraspermum* L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: CHL(AYP, TAR, VAL, LBO, MAU, AIS, MAG, RME).

Vicia vicina Clos

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Vicia villosa Roth subsp. **eriocarpa** (Hauskn.) P.W. Ball

Sin.: *Vicia eriocarpa* (Hauskn.) Halácsy, *Vicia villosa* Roth var. *eriocarpa* Hauskn.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: BRA(RGS). URY(CAS, COL, MON, PAY, SOR).

Vicia villosa Roth subsp. **varia** (Host) Corb.

Sin.: *Vicia dasycarpa* Ten., *Vicia varia* Host, *Vicia villosa* Roth subsp. *dasycarpa* (Ten.) Cavill.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: URY(MON, PAY).

Vicia villosa Roth subsp. **villosa**

Sin.: *Cracca villosa* (Roth) Godr. & Gren.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE, SAL, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Vigna Savi, nom. cons.

Vigna lasiocarpa (Mart. ex Benth.) Verdc.

Sin.: *Phaseolus balansae* Micheli, *Phaseolus hirsutus* Mart. ex Benth., *Phaseolus lasiocarpus* Mart. ex Benth., *Phaseolus lasiocarpus* Mart. ex Benth. var. *balansae* (Micheli) Chodat & Hassl., *Phaseolus lasiocarpus* Mart. ex Benth. var.

igatimianus Chodat & Hassl., *Phaseolus pilosus* Kunth, nom. illeg., *Phaseolus pilosus* Kunth var. *lasiocarpus* (Mart.) Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, PAI).

Vigna longifolia (Benth.) Verdc.

Sin.: *Phaseolus longifolius* Benth., *Phaseolus ovatus* Benth., *Phaseolus productus* Ducke, *Phaseolus schottii* Benth., *Phaseolus schottii* Benth. f. *ovatus* (Benth.) Hassl., *Phaseolus schottii* Benth. var. *genuinus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus schottii* Benth. var. *longifolius* (Benth.) Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CHO, MIE, ÑEE, PHA). URY(CAS, MAL, MON, RIV, ROC, SJO).

Vigna luteola (Jacq.) Benth.

Sin.: *Dolichos gangeticus* Roxb., *Dolichos luteolus* Jacq., *Dolichos niloticus* Delile, *Dolichos repens* L., *Phaseolus luteolus* (Jacq.) Gagnep., *Scytalis helicopus* E. Mey., *Vigna brachystachys* Benth., *Vigna bukobensis* Harms, *Vigna glabra* Savi, *Vigna helicopus* (E. Mey.) Walp., *Vigna nigerica* A. Chev., *Vigna nilotica* (Delile) Hook. f., *Vigna repens* (L.) Kuntze, nom. illeg., *Vigna villosa* Savi

Hierba o enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Vigna vexillata (L.) A. Rich.

Sin.: *Phaseolus vexillatus* L.

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Weberbauerella Ulbr.

Weberbauerella chilensis Faúndez & Saldivia
Hierba. Endémica. 2500-3600 m.
Países: CHL(TAR, ATA).

Zapoteca H.M. Hern.

Zapoteca formosa (Kunth) H.M. Hern.

Sin.: *Acacia formosa* Kunth, *Acacia gracilis* M. Martens & Galeotti, *Anneslia chapaderoana* Britton & Rose, *Anneslia cookii* Britton & Rose, *Anneslia formosa* (Kunth) Britton & Millsp., *Anneslia marginata* (Griseb. ex R.O. Williams) Moldenke, *Anneslia penduliflora* (Rose) Britton & Rose, *Calliandra capillata* Benth., *Calliandra formosa* (Kunth) Benth., *Calliandra gentryi* Standl., *Calliandra gracilis* Griseb., *Calliandra malacophylla* Benth., *Calliandra marginata* Griseb. ex R.O. Williams, *Calliandra penduliflora* Rose, *Calliandra viridiflora* Benth., *Feuilleea formosa* (Kunth) Kuntze, *Feuilleea malacophylla* (Benth.) Kuntze
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, CON, PHA).

Zapoteca portoricensis (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.
Sin.: *Calliandra flavida* Urb.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Zollernia Mart.

Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev
Sin.: *Zollernia splendens* Wied-Neuw. & Nees
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel
Sin.: *Coquebertia ilicifolia* Brongn., *Krameria glabra* Spreng., *Zollernia houletiana* Tul., *Zollernia securidacifolia* Benth., *Zollernia vogelii* Tul.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zornia J.F. Gmel.

Zornia burkartii Vanni
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU).

Zornia contorta Mohlenbr.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, SAO, TAC).

Zornia crinita (Mohlenbr.) Vanni
Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *sericea* Chodat & Hassl., *Zornia pardina* Mohlenbr. var. *crinita* Mohlenbr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, SPE).

Zornia cryptantha Arechav.
Sin.: *Zornia cryptantha* Arechav. var. *latibracteata* Vanni, *Zornia lanata* Mohlenbr., *Zornia latifolia* DC. var. *cryptantha* (Arechav.) Burkart
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, COA). URY(CLA, RIV, TAC).

Zornia curvata Mohlenbr.
Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *diversifolia* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zornia fimbriata Mohlenbr.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Zornia glabra Desv.
Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *elatior* Benth., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *perforata* (Vogel) Kuntze, *Zornia perforata* Vogel
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Zornia latifolia Sm.
Sin.: *Hedysarum gemellum* Willd., *Zornia diphylla* (L.) Pers. subsp. *gracilis* (DC.) Malme, *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *bernardinensis* Chodat & Hassl., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *gracilis* (DC.) Benth., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *pubescens* (Kunth) Benth., *Zornia gemella* Vogel, *Zornia gracilis* DC., *Zornia latifolia* Sm. var. *bernardinensis* (Chodat & Hassl.) Mohlenbr., *Zornia pubescens* Kunth, *Zornia surinamensis* Miq.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, PAY, RIV, SAO).

Zornia multinervosa Burkart ex Bacigalupo
Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR).
BRA(RGS). PRY(MIE, ÑEE).
URY(ART, CLA, SAO).

Zornia orbiculata Mohlenbr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(PAI). URY(ART,
DUR, PAY, RNO, SAO).

Zornia pardina Mohlenbr.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. f.
microphylla Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAU, CEN). URY(ART, CLA, LAV,
SAO).

Zornia ramboiana Mohlenbr.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zornia reticulata Sm.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *ciliata*
Chodat & Hassl., *Zornia diphylla* (L.)
Pers. f. *intermedia* Chodat & Hassl.,
Zornia diphylla (L.) Pers. var.
paraguariensis Chodat & Hassl.,
Zornia diphylla (L.) Pers. var. *reticulata*
(Sm.) Benth., *Zornia diphylla* (L.) Pers.
var. *rupestris* Chodat & Hassl., *Zornia*
echinata Mohlenbr., *Zornia ovata*
Vogel

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAN,
COA, GUA, SPE).

Zornia sericea Moric.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. subsp.
latifolia (DC.) Malme, *Zornia diphylla*
(L.) Pers. var. *latifolia* (DC.) Benth.,
Zornia latifolia DC., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN,
COA, PAI). URY(RIV).

Zornia trachycarpa Vogel

Sin.: *Zornia brachycarpa* Walp., *Zornia*
diphylla (L.) Pers. var. *trachycarpa*
(Vogel) Benth., *Zornia linearifoliolata*
N.F. Mattos

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, MIS, SDE, SFE, TUC).
BRA(RGS). PRY(MIE). URY(ART,
CLA, COL, CLA, PAY, RNO, RIV,
SAO, SJO, TAC).

Zornia villosa (Malme) Herter

Sin.: *Zornia latifolia* Sm. var. *villosa* Malme
Subarbusto. Nativa.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Zuccagnia Cav., nom. cons.

Zuccagnia punctata Cav.

Arbusto. Endémica. 700-2700 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,
SAL, SJU, SLU, TUC).

Zygia P. Browne

Zygia cataractae (Kunth) L. Rico

Sin.: *Calliandra schwackeana* Taub.,
Feuillea cataractae (Kunth) Kuntze,
Feuillea divaricata (Benth.) Kuntze,
Inga cataractae Kunth, *Inga glomerata*
DC., *Inga ramiflora* G. Don,
Pithecellobium cataractae (Kunth)
Benth., *Pithecellobium cauliflorum*
(Willd.) Mart. f. *niveum* Lindm.,
Pithecellobium divaricatum Benth.,
Pithecellobium glomeratum (DC.)
Benth., *Zygia divaricata* (Benth.)
Pittier, *Zygia glomerata* (DC.) Pittier

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE).
PRY(CEN).

Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle var.
glabrata (Mart.) Barneby & J.W.
Grimes

Sin.: *Pithecellobium glabratum* Mart.

Arbusto o arbolito. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(APA).

Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle var.
latifolia

Sin.: *Mimosa latifolia* L.

Arbusto o arbolito. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Zygia morongii Barneby & J.W. Grimes

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
PRY(CEN, ÑEE, PHA).

Zygia pithecolobioides (Kuntze)
Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Feuillea pithecolobioides* Kuntze,
Inga pithecolobioides Harms,
Pithecellobium pithecolobioides
(Kuntze) Hassl. var. *reductum* (Malme)
Hassl., *Pithecellobium*
pithecolobioides (Kuntze) Hassl.,
Pithecellobium pithecolobioides
(Kuntze) Hassl. var. *harmsii* Hassl.,
nom. superfl., *Pithecellobium*
reductum Malme, *Zygia reducta*
(Malme) L. Rico, comb. illeg.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS). PRY(CEN,
CON, PHA).

FAGACEAE

Quercus L.

Quercus robur L.

Árbol. Introducida.

Países: CHL(BIO, ARA, LSR, JFE).

FRANCOACEAE**Araeoandra** Lefor**Araeoandra tenuicaulis** (Barnéoud)

Lefor

Sin.: *Viviania tenuicaulis* Barnéoud

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(COQ).

Balbisia Cav., nom. cons.**Balbisia aphanifolia** (Griseb.) Hunz. &

Ariza

Sin.: *Wendtia aphanifolia* Griseb.

Subarbusto. Endémica. 1600-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).

Balbisia calycina (Griseb.) Hunz. & ArizaSin.: *Viviania calycina* Griseb., *Wendtia argentea* Griseb., *Wendtia calycina* (Griseb.) Griseb., *Wendtia calycina* (Griseb.) Griseb. var. *argentea* (Griseb.) Hieron.

Subarbusto. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Balbisia gracilis (Meyen) Hunz. & ArizaSin.: *Hyperum trifidum* C. Presl, *Larrea trigyna* Kunze ex Klotzsch, *Ledocarpon reynoldsii* Hook., *Martiniera potentilloides* Guill., *Wendtia gracilis* Meyen, *Wendtia gracilis* Meyen var. *typica* Knuth, nom. inval., *Wendtia poeppigiana* Klotzsch, *Wendtia reynoldsii* (Hook.) Endl. ex Walp., *Wendtia trigyna* Kuntze, nom.illeg., *Wendtia trigyna* Kuntze var. *gracilis* (Meyen) Kuntze, *Wendtia trigyna* Kuntze var. *poeppigiana* Kuntze, *Wendtia trigyna* Kuntze var. *radlkoferi* Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE), CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Balbisia microphylla (Phil.) ReicheSin.: *Ledocarpon microphyllum* Phil.

Subarbusto. Endémica. 3000-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

Balbisia miniata (I.M. Johnst.) Descole &O'Donell & Lourteig var. *anomala* Ariza & Novara

Hierba. Endémica. 900-2400 m.

Países: ARG(SAL).

Balbisia miniata (I.M. Johnst.) Descole &O'Donell & Lourteig var. *miniata*Sin.: *Wendtia miniata* I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(LRI, SAL, SJU).

Balbisia peduncularis (Lindl.) D. DonSin.: *Cruckshanksia cistiflora* Hook. & Arn., *Ledocarpon cistiflorum* Meyen, nom. nud., *Ledocarpon pedunculare* Lindl.

Subarbusto. Nativa. 200-500 m.

Países: CHL(AYP, ANT, ATA, COQ).

Balbisia stitchkinii Ricardi

Subarbusto. Endémica. 3800-4000 m.

Países: CHL(AYP).

Balbisia verticillata Cav.Sin.: *Balbisia weberbaueri* R. Knuth, *Ledocarpon chiloense* Desf.

Subarbusto. Nativa.

Países: ARG(JUJ).

Francoa Cav.**Francoa appendiculata** Cav. var. *appendiculata*

Hierba. Endémica. 800-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Francoa appendiculata Cav. var. *ramosa* (D. Don) RolfeSin.: *Francoa ramosa* D. Don

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Francoa appendiculata Cav. var. *sonchifolia* (Cav.) RolfeSin.: *Francoa sonchifolia* Cav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Tetilla DC.**Tetilla hydrocotylifolia** DC.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

Viviania Cav.**Viviania albiflora** (Cambess.) ReicheSin.: *Caesarea albiflora* Cambess., *Caesarea albiflora* Cambess. var. *ramosa* Cambess., *Caesarea lanceolata* Klotzsch, *Caesarea montevidensis* Klotzsch, *Caesarea ovata* Klotzsch, *Caesarea petiolata* Klotzsch, *Caesarea rubriflora* Cambess., *Viviania klotzschii* R. Knuth, *Viviania lanceolata* (Klotzsch) R. Knuth, *Viviania montevidensis* (Klotzsch) Reiche, *Viviania paranensis*

R. Knuth, *Viviania rubriflora* (Cambess.) R. Knuth, *Viviania sellowii* R. Knuth
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, TAC).

Viviania crenata (Hook.) G. Don
Sin.: *Macraea crenata* Hook.
Arbusto. Endémica. 0-2300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Viviania elegans (Poepp.) Reiche & Johow
Sin.: *Cissarobryon aristulatum* Phil., *Cissarobryon elegans* Poepp., *Cissarobryon macrophyllum* Phil., *Cissarobryon parvifolium* Phil.
Hierba o arbusto. Endémica. 200-2500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Viviania linostigma R. Knuth
Sin.: *Linostigma petiolatum* Klotzsch, *Viviania petiolata* (Klotzsch) Reiche, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1400-1600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Viviania marifolia Cav.
Sin.: *Macraea cordata* Meyen, *Macraea grandifolia* Lindl., *Macraea parvifolia* Lindl., *Macraea rosea* Lindl., *Viviania australis* Phil., *Viviania brevipedunculata* Phil., *Viviania cordata* (Meyen) R. Knuth, *Viviania grandifolia* (Lindl.) G. Don, *Viviania laxa* Phil., *Viviania parvifolia* (Lindl.) G. Don, *Viviania revoluta* R. Knuth, *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch, *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch var. *alba* Gay, *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch var. *brevipedunculata* (Phil.) Reiche, *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch var. *grandifolia* (Lindl.) Phil.,

Viviania rosea (Lindl.) Klotzsch var. *laxa* (Phil.) Reiche, *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch var. *marifolia* (Cav.) Reiche, *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch var. *rubella* R. Knuth, *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch var. *villosa* Phil., *Viviania spinescens* C. Presl
Arbusto. Endémica. 3200-4000 m.
Países: ARG(NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Viviania ovata Phil.
Sin.: *Viviania bernaesii* Phil. ex R. Knuth, *Viviania hirsuta* R. Knuth, *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch var. *ovata* (Phil.) Reiche, *Viviania viridis* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

FRANKENIACEAE

Frankenia L.

Frankenia chilensis C. Presl
Sin.: *Coldenia glabra* Phil., *Frankenia aspera* Phil., *Frankenia campestris* Schauer, *Frankenia chilensis* C. Presl var. *aspera* (Phil.) I.M. Johnst., *Frankenia chilensis* C. Presl var. *campestris* (Schauer) Gunckel, *Frankenia erecta* Gay, *Frankenia farinosa* J. Remy, *Frankenia florida* Phil., *Frankenia glabrata* Phil., *Frankenia nicotiana* Gay, *Frankenia nicotiana* Gay var. *florida* (Phil.) Reiche, *Tetrolema boliviense* Turcz.
Arbusto. Nativa.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

Frankenia chubutensis Speg.
Sin.: *Niederleinia chubutensis* (Speg.) Nied.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Frankenia fischeri Hicken
Arbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: ARG(LPA, NEU, RNE).

Frankenia juniperoides (Hieron.) M.N. Correa
Sin.: *Frankenia microphylla* Cav. var. *juniperina* (Hieron.) Speg., *Niederleinia juniperoides* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE).
Notas: La presencia de esta especie en Uruguay es dudosa (cfr. Correa, 1966a)

Frankenia microphylla Cav.
Sin.: *Franca microphylla* (Cav.) Vis., *Frankenia microphylla* Cav. var. *relaxata* Speg., *Niederleinia microphylla* (Cav.) Hieron. ex Nied.
Subarbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Frankenia patagonica Speg.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Frankenia pulverulenta L.
Sin.: *Frankenia pampeana* Speg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SFE).

Frankenia salina (Molina) I.M. Johnst.
Sin.: *Frankenia berteriana* Gay, *Frankenia micrantha* Gay, *Frankenia*

salina (Molina) I.M. Johnst. var.
micrantha (Gay) Gunckel, *Ocimum*
salinum Molina
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
 MAU, BIO, RME).

Frankenia triandra J. Remy

Sin.: *Anthobryum aretioides* Phil.,
Anthobryum clarenii (R.E. Fr.)
 Cabrera, *Anthobryum tetragonum*
 Phil., *Anthobryum triandrum* (J. Remy)
 Surgis, *Frankenia clarenii* R.E. Fr.,
Pycnophyllum sulcatum Griseb.
 Subarbusto. Nativa. 3300-4800 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
 CHL(AYP, TAR, ANT).

Frankenia vidalii F. Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 200-
 500 m.
 Países: CHL(IDE).

GENTIANACEAE

Blackstonia Huds.

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

Sin.: *Chlora perfoliata* (L.) L., *Gentiana*
perfoliata L.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, ERI, LPA, MEN).
 URY(CAS, MAL, MON).

Calolisianthus (Griseb.) Gilg

Calolisianthus amplissimus (Mart.) Gilg

Sin.: *Helia amplissima* (Mart.) Kuntze,
Irlbachia amplissima (Mart.) Maas,
Lisianthus amplissimus Mart.
 Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Calolisianthus pedunculatus (Cham. &
 Schltdl.) Gilg

Sin.: *Calolisianthus pulcherrimus* (Mart.)
 Gilg, *Irlbachia pedunculata* (Cham. &
 Schltdl.) Maas, *Lisianthus elegans*
 Mart., *Lisianthus elegans* Mart. var.
pedunculatus (Cham. & Schltdl.)
 Progel, *Lisianthus pedunculatus*
 Cham. & Schltdl., *Lisianthus*
pulcherrimus Mart.
 Hierba. Nativa. 800-1300 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Calolisianthus pendulus (Mart.) Gilg

Sin.: *Helia pendula* (Mart.) Kuntze,
Irlbachia pendula (Mart.) Maas,
Lisianthus pendulus Mart.
 Hierba. Nativa. 200-800 m.
 Países: BRA(PAR).

Calolisianthus speciosus (Cham. &
 Schltdl.) Gilg

Sin.: *Helia speciosa* (Cham. & Schltdl.)
 Kuntze, *Irlbachia speciosa* (Cham. &
 Schltdl.) Maas, *Lisianthus speciosus*
 Cham. & Schltdl.
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Centaurium Hill

Centaurium ameghinoi (Speg.) Druce

Sin.: *Erythraea ameghinoi* Speg.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Centaurium cachanlahuen (Molina) B.L.
 Rob.

Sin.: *Centaurium chilense* (Willd.) Druce,
 nom. illeg., *Chironia chilensis* Willd.,
 nom. illeg., *Erythraea chilensis* Pers.,
Erythraea chilensis Pers. var. *humilis*
 Phil., *Gentiana cachanlahuen* Molina,
Gentiana peruviana Lam.
 Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
 CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO,
 MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME,
 JFE).

Centaurium erythraea Rafn

Hierba. Introducida.
 Países: ARG(NEU, RNE). BRA(RGS).
 CHL(LLA, AIS).

Centaurium littorale (Turner) Gilmour

Sin.: *Centaurium vulgare* Rafn, nom.
 superfl., *Chironia littoralis* Turner,
Erythraea centaurium L. subsp.
littoralis (Turner) Hook., *Erythraea*
littoralis (Turner) Fr., *Gentiana*
centaurium L.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: CHL(ARA, LLA, AIS).

Centaurium pulchellum (Sw.) Hayek ex
 Hand.-Mazz., Stadlm., Janch. & Faltis

Sin.: *Gentiana pulchella* Sw.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,
 COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,
 SAL, SJU, SFE, SDE, TUC).
 BRA(RGS). CHL(LSR, LLA).
 URY(ART, MON).

Centaurium scilloides (L. f.) Samp.

Sin.: *Erythraea scilloides* (L. f.) Chaub. ex
 Puel, *Gentiana scilloides* L. f.
 Hierba. Introducida.
 Países: ARG(RNE).

Chelonanthus (Griseb.) Gilg

Chelonanthus grandiflorus (Aubl.) Engl.

Sin.: *Lisianthus grandiflorus* Aubl.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA).

Chelonanthus purpurascens (Aubl.)

Struwe, S. Nilsson & V.A. Albert

Sin.: *Lisianthus purpurascens* Aubl.
Hierba o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chelonanthus viridiflorus (Mart.) Gilg
Sin.: *Helia viridifolia* (Mart.) Kuntze,
Irlbachia alata (Aubl.) Maas subsp.
viridiflora (Mart.) J. Perss. & Maas,
Lisianthus viridiflorus Mart.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, CAU, CAN, ITA, SPE).

Cicendia Adans.

Cicendia quadrangularis (Lam.) Griseb.
Sin.: *Exacum chilense* Bertero, nom. nud.,
Exacum inflatum Hook. & Arn.,
Exacum quadrangulare (Lam.) Willd.,
Gentiana flava Larrañaga, *Gentiana*
quadrangularis Lam., *Microcala*
quadrangularis (Lam.) Griseb.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, NEU).
CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LSR, LLA, RME).
URY(ART, COL, FLO, MON, SJO).

Curtia Cham. & Schltdl.

Curtia conferta (Mart.) Knobl.
Sin.: *Curtia confusa* Grothe & Maas,
Schuebleria conferta Mart.
Hierba. Nativa. 100-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Curtia tenuifolia (Aubl.) Knobl.
Sin.: *Apophragma tenuifolium* (Aubl.)
Griseb., *Curtia malmeana* Gilg, *Curtia*
montevicensis Arechav., *Exacum*
tenuifolium Aubl., *Schuebleria patula*
Mart. var. *selloana* Progel, *Schuebleria*
tenuifolia (Aubl.) G. Don

Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, CAU, CAN).
URY(CAS).

Deianira Cham. & Schltdl.

Deianira nervosa Cham. & Schltdl.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Gentiana L.

Gentiana gayi Griseb. subsp. **gayi**
Sin.: *Gentiana minima* Phil., nom. illeg.,
Gentiana podocarpa (Phil.) Griseb.,
Gentiana prostrata Haenke var.
podocarpa (Phil.) Kusn., *Gentiana*
ramosissima Phil., nom. illeg., *Varasia*
podocarpa Phil., *Varasia sessilis* Phil.
Hierba. Nativa. 1800-4500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ,
LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU,
SCR, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR,
ANT, ATA, COQ, LBO, MAU, BIO,
ARA, MAG, RME).

Gentiana gayi Griseb. subsp.
magellanica (Kusn.) S. Pfanztelt &
K.B. Hagen
Sin.: *Gentiana prostrata* Haenke f.
magellanica Kusn.
Hierba. Endémica. 500-1100 m.
Países: CHL(MAG).
Notas: Citada para la Argentina por S.
Pfanztelt & K.B. Hagen (2015) sin
indicar localidad ni material de
referencia.

Gentianella Moench, nom. cons.

Gentianella benedictae (Gilg) Fabris
Sin.: *Gentiana benedictae* Gilg
Hierba. Nativa. 2900- m.
Países: ARG(SAL).

Gentianella bromifolia (Griseb.) T.N. Ho
& S.W. Liu
Sin.: *Gentiana bromifolia* Griseb.
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Gentianella cabreræ (Fabris) Fabris
Sin.: *Gentiana cabreræ* Fabris, H. A.
Hierba. Endémica. 3100-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Gentianella claytonioides (Gilg) T.N. Ho
& S.W. Liu
Sin.: *Gentiana claytonioides* Gilg
Hierba. Endémica. 2900-3400 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Gentianella coquimbensis (Briq.) Martic.
& Quezada
Sin.: *Gentiana coquimbensis* Briq.,
Gentianella coquimbensis (Briq.) T.N.
Ho & S.W. Liu, comb. superfl.
Hierba. Endémica. 1600-3500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Gentianella cosmantha (Griseb.) J.S.
Pringle
Sin.: *Gentiana cosmantha* Griseb.,
Gentianella cosmantha (Griseb.) J.S.
Pringle f. *violacea* Fabris, H. A.
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gentianella erythrochrysea (Gilg) Fabris
Sin.: *Gentiana erythrochrysea* Gilg
Hierba. Nativa. 3900-4000 m.
Países: ARG(SAL).

Gentianella fabrisii Filippa & Barboza
Hierba. Endémica.
Países: ARG(TUC).

Gentianella florida (Griseb.) Holub

Sin.: *Gentiana florida* Griseb., *Gentiana totorensis* Gilg, *Gentianella totorensis* (Gilg) J.S. Pringle

Hierba. Nativa. 200-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gentianella gageoides (Gilg) Fabris

Sin.: *Gentiana campanuloides* Gilg, hom. illeg., *Gentiana gageoides* Gilg, *Gentianella cupiformis* T.N. Ho & S.W. Liu

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella gynophora (Gilg) Fabris ex C.A. Zanotti & A.M. Panizza

Sin.: *Gentiana fiebrigii* Gilg, *Gentiana gynophora* Gilg, *Gentiana seminuda* Rusby, nom. illeg., *Gentianella fiebrigii* (Gilg) Holub

Hierba. Nativa. 3500-4900 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella helianthemoides (Gilg) Fabris

Sin.: *Gentiana helianthemoides* Gilg, *Gentianella helianthemoides* (Gilg) J.S. Pringle, comb. superfl.

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella hieronymi (Gilg) Fabris

Sin.: *Gentiana hieronymi* Gilg

Hierba. Endémica. 3000-4500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella imberbis (Griseb.) Filippa & Barboza

Sin.: *Gentiana imberbis* Griseb.

Hierba. Endémica. 2600-2700 m.

Países: ARG(CAT).

Gentianella kurtzii (Gilg) Fabris

Sin.: *Gentiana kurtzii* Gilg

Hierba. Endémica. 3200-4400 m.

Países: ARG(CAT, LRI, TUC).

Gentianella magellanica (Gaudich.)

Fabris ex D.M. Moore

Sin.: *Gentiana araucana* Phil., *Gentiana lactea* Phil., *Gentiana magellanica* Gaudich., *Gentiana magellanica* Gaudich. f. *albiflora* Speg., *Gentiana magellanica* Gaudich. f. *cyanescens* Speg., *Gentiana magellanica* Gaudich. f. *pumila* (Albov) Speg., *Gentiana magellanica* Gaudich. var. *darwinii* (Griseb.) Speg., *Gentiana modesta* Phil., *Gentiana patagonica* Griseb., *Gentiana patagonica* Griseb. var. *darwinii* Griseb., *Gentiana patagonica* Griseb. var. *gracilis* Albov, *Gentiana patagonica* Griseb. var. *gracilis* Albov f. *pumila-uniflora* Albov, *Gentiana pearcei* Phil., *Gentiana pearcei* Phil. f. *nana* Hauman, *Gentiana valdiviana* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Gentianella meyeniana (Griseb.) Fabris

Sin.: *Gentiana meyeniana* Griseb.

Hierba. Nativa. 4000-4600 m.

Países: ARG(JUU).

Gentianella multicaulis (Gillies ex Griseb.) Fabris

Sin.: *Gentiana achalensis* Hieron. ex Gilg, *Gentiana coerulescens* Gillies ex Griseb., *Gentiana diffusa* Kunth, nom. illeg. var. *mendozensis* Griseb., *Gentiana gilliesii* Gilg, nom. superfl., *Gentiana mendocina* Gilg, *Gentiana multicaulis* Gillies ex Griseb., *Gentiana stuckertii* Briq., *Gentianella achalensis* (Hieron. ex Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu, *Gentianella gilliesii* (Gilg) Martic. & Arroyo, nom. illeg., *Gentianella mendocina* (Gilg) J.S. Pringle

Hierba. Nativa. 1500-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL).

Gentianella multiflora (Griseb.) Fabris

Sin.: *Gentiana multiflora* Griseb.

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella myriantha (Gilg) Holub

Sin.: *Gentiana jujuyensis* Fabris, *Gentiana myriantha* Gilg, *Gentianella myriantha* (Gilg) Fabris, comb. superfl., *H. A.*

Hierba. Nativa. 1500-3500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella oranensis (Fabris) Filippa & Barboza

Sin.: *Gentiana oranensis* Fabris

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella ottonis (Phil.) Muñoz

Sin.: *Gentiana hexamera* Phil., *Gentiana ottonis* Phil., *Gentiana ottonis* Phil. var. *hexamera* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 2400-3300 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Gentianella parviflora (Griseb.) T.N. Ho

Sin.: *Gentiana coerulescens* Gillies ex Griseb. var. *parviflora* Griseb., *Gentiana galanderi* Hieron., nom. nud., *Gentiana parviflora* (Griseb.) Gilg

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(COR).

Gentianella pseudocrassula (Gilg) Fabris

Sin.: *Gentiana clarenii* Gilg, *Gentiana pseudocrassula* Gilg, *Gentianella clarenii* (Gilg) Fabris

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL).

Gentianella pulla (Griseb.) T.N. Ho & S.W. Liu
Sin.: *Gentiana pulla* Griseb.
Hierba. Endémica. 2200-4100 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Gentianella punensis (Fabris) Fabris
Sin.: *Gentiana punensis* Fabris, *H. A.*
Hierba. Endémica. 4000-4200 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella riojae (Gilg) Fabris ex J.S. Pringle
Sin.: *Gentiana riojae* Gilg
Hierba. Endémica. 2100-2400 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Gentianella silenoides (Gilg) Fabris var. **silenoides**
Sin.: *Gentiana silenoides* Gilg
Hierba. Nativa. 2500-2800 m.
Países: ARG(SAL).

Gentianella silenoides (Gilg) Fabris var. **striaticalyx** (Gilg) T.N. Ho
Sin.: *Gentiana anthosphaera* Gilg, *Gentiana herzogii* Gilg, *Gentiana striaticalyx* Gilg, *Gentianella anthosphaera* (Gilg) Fabris, comb. superfl., *Gentianella anthosphaera* (Gilg) Holub
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(SAL).

Gentianella tarapacana (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu
Sin.: *Gentiana tarapacana* Gilg
Hierba. Endémica. 3800- m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Gentianella thiosphaera (Gilg) Holub
Sin.: *Gentiana meyeri* Fabris, *Gentiana thiosphaera* Gilg, *H. A.*
Hierba. Nativa. 2500-3300 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Gentianella tubulosa (Gilg) Fabris
Sin.: *Gentiana tubulosa* Gilg
Hierba. Endémica. 2500-3800 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Halenia Borkh., nom. cons.

Halenia hieronymi Gilg
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Helia Mart.

Helia angustifolia (Kunth) Kuntze
Sin.: *Irlbachia alata* (Aubl.) Maas subsp. *angustifolia* (Kunth) J. Persoon & Maas, *Lisianthus angustifolius* Kunth
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Helia brevifolia Cham.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Helia oblongifolia Mart.
Sin.: *Helia micrantha* Gilg, *Lisianthus brevifolius* (Cham.) Griseb.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, ITA, PAI, SPE).

Macrocarpaea (Griseb.) Gilg

Macrocarpaea rubra Malme
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Schenkia Griseb.

Schenkia spicata (L.) G. Mans.
Sin.: *Centaurium spicatum* (L.) Fritsch, *Gentiana spicata* L.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(IPA).

Schultesia Mart., nom. cons.

Schultesia australis Griseb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, GUA). URY(RIV).

Schultesia guianensis (Aubl.) Malme
Sin.: *Exacum guianense* Aubl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(COA).

Schultesia heterophylla Miq.
Sin.: *Schultesia hassleriana* Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Tetrapollinia Maguire & Boom

Tetrapollinia caerulescens (Aubl.) Maguire & Boom
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Voyria Aubl.

Voyria aphylla (Jacq.) Pers.
Sin.: *Gentiana aphylla* Jacq., *Leiphaimos aphylla* (Jacq.) Gilg, *Voyria uniflora* Pers.
Saprófita. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

Voyria tenella Hook.

Saprófita. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(SCA).

Zygostigma Griseb.**Zygostigma australe** (Cham. & Schltdl.) Griseb.

Sin.: *Erythraea uniflora* Hook. & Arn.,
Gentiana rubra Larrañaga, hom. illeg.,
Sabatia australe Cham. & Schltdl.,
Zygostigma uniflorum (Hook. & Arn.)
 Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
 ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).
 URY(COL, FLA, LAV, MAL, MON,
 RIV).

GERANIACEAE**Erodium** L'Hér. ex Aiton**Erodium botrys** (Cav.) Bertol.Sin.: *Geranium botrys* Cav.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA,
 LSR, RME).

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton

Sin.: *Erodium chaerophyllum* (Cav.)
 Steud., *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér.
 ex Aiton f. *chaerophyllum* (Cav.) DC.,
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton
 var. *arenicola* (Steud.) Speg., *Erodium*
cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton var.
triviale (Jord.) Trautv., *Erodium triviale*
 Jord., *Geranium arenicola* Steud.,
Geranium chaerophyllum Cav.,
Geranium cicutarium L.

Hierba. Introducida. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
 DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS,
 NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR,
 SFE, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR,
 ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
 BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME,
 JFE). URY(PAY, SOR).

Erodium geoides A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA).
 BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, ARA).
 URY(COL, ROC).

Erodium malacoides (L.) L'Hér. ex Aiton
var. **malacoides**Sin.: *Geranium malacoides* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA,
 SDE, SFE). CHL(ANT, ATA, COQ,
 VAL, RME). URY(MON).

Erodium malacoides (L.) L'Hér. ex Aiton
var. **ribifolium** (Jacq.) DC.Sin.: *Erodium ribifolium* Jacq.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton

Sin.: *Geranium cicutarium* L. var.
moschatum L., *Geranium moschatum*
 (L.) L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, LPA,
 LRI, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ,
 VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,
 RME). URY(MON).

Geranium L.**Geranium aequale** (Bab.) AedoSin.: *Geranium molle* L. var. *aequale* Bab.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(TDF).

Geranium albicans A. St.-Hil.

Sin.: *Geranium rotundifolium* L. var.
americanum A. St.-Hil., *Geranium*
selloi Aedo & Muñoz Garm., *Geranium*
senecioides R. Knuth, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA,
 RNE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
 URY(CLA, FLO, LAV, MAL, MON,
 SOR).

Geranium arachnoideum A. St.-Hil.

Hierba. Endémica. 500-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Geranium berterianum Colla

Sin.: *Geranium andinum* Phil., *Geranium*
apricum Phil., *Geranium berterianum*
 Colla var. *apricum* (Phil.) Reiche,
Geranium berterianum Colla var.
caespitosum Reiche, *Geranium*
berterianum Colla var. *hispidum*
 Reiche, *Geranium caespitosum* Phil.,
 hom. illeg., *Geranium chilense* Aedo &
 Muñoz Garm., *Geranium collae* Aedo,
 Muñoz Garm. & Pando, *Geranium*
dissectum L. var. *patagonicum* (Hook.
 f.) Speg., *Geranium geissei* R. Knuth,
Geranium hispidum Phil., hom. illeg.,
Geranium intermedium Colla, hom.
 illeg., *Geranium neohispidum* Aedo &
 Muñoz Garm., *Geranium patagonicum*
 Hook. f., *Geranium proximum* Steud.,
Geranium submolle Steud.

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN,
 NEU, RNE, SJU, SCR, TDF).
 CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
 ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Geranium carolinianum L.

Hierba. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN,
 MIS, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR,

RGS). PRY(CEN, COA, MIE, PAI).
URY(RIV).

Geranium core-core Steud.

Sin.: *Geranium argentinum* R. Knuth, *Geranium commutatum* Steud., *Geranium commutatum* Steud. var. *ochsenii* (Phil.) Reiche, *Geranium herrerae* R. Knuth, *Geranium melanopotamicum* Speg., *Geranium moorei* Phil., *Geranium ochsenii* Phil., *Geranium rapulum* A. St.-Hil. & Naudin, *Geranium squamosum* Phil., *Geranium subsericeum* R. Knuth

Hierba. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TDF). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Geranium dissectum L.

Sin.: *Geranium dissectum* L. var. *typicum* R. Knuth, nom. inval.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(FLA, SJO, SOR).

Geranium fallax Steud.

Hierba. Nativa. 1200-3600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Geranium glanduligerum R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(FOR). BRA(RGS, SCA).

Geranium leucanthum Griseb.

Sin.: *Geranium delphinifolium* R. Knuth, nom. illeg., *Geranium tafiense* Aedo & Muñoz Garm.

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Geranium magellanicum Hook. f.

Sin.: *Geranium magellanicum* Hook. f. var. *typicum* R. Knuth, nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Geranium molle L.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI, LPA, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME). URY(MON).

Geranium parodii I.M. Johnst.

Sin.: *Geranium magellanicum* Hook. f. var. *multifoliosum* R. Knuth, *Geranium magellanicum* Hook. f. var. *pumilum* R. Knuth, *Geranium sessiliflorum* Cav. var. *glabriusculum* Kuntze

Hierba. Endémica. 1800-2600 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Geranium planum Halloy

Hierba. Endémica. 4000-4600 m.

Países: ARG(TUC).

Geranium purpureum Vill.

Sin.: *Geranium robertianum* L. var. *incisum* A. St.-Hil.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR). URY(MON, PAY).

Geranium pusillum L.

Sin.: *Geranium pusillum* Burm. f., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN). CHL(MAU, AIS, MAG, RME).

Geranium robertianum L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME, JFE). URY(FLO, FLA).

Geranium rupicola Wedd.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Geranium sessiliflorum Cav.

Sin.: *Geranium santacruzense* R. Knuth, *Geranium sessiliflorum* Cav. f. *albiflorum* Kuntze, nom. nud., *Geranium sessiliflorum* Cav. var. *typicum* R. Knuth, nom. inval., *Geranium tucumanum* R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-4800 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, COQ, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Geranium skottsbergii R. Knuth

Sin.: *Geranium berterianum* Colla var. *ciliatum* Reiche, *Geranium berterianum* Colla var. *philippi* (J.F. Macbr.) L.E. Navas, *Geranium ciliatum* Phil., hom. illeg., *Geranium philippii* J.F. Macbr.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, AIS, RME).

Geranium venturianum R. Knuth

Hierba. Nativa. 500-3200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hypseocharis J. Remy

Hypseocharis pimpinellifolia J. Remy

Sin.: *Hypseocharis corydalifolia* R. Knuth

Hierba. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Hypseocharis tridentata Griseb.
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

GESNERIACEAE

Asteranthera Klotzsch & Hanst.

Asteranthera ovata (Cav.) Hanst.
Sin.: *Asteranthera chiloensis* Klotzsch & Hanst., nom. nud., *Columnnea ovata* Cav.
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Besleria L.

Besleria selloana Klotzsch & Hanst.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Codonanthe (Mart.) Hanst., nom. cons.

Codonanthe cordifolia Chautems
Subarbusto. Nativa. 400-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Codonanthe devosiana Lem.
Sin.: *Coccanthera devosiana* (Lem.) C. Koch & Hanst.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Codonanthe gracilis (Mart.) Hanst.
Sin.: *Codonanthe ventricosa* (Vell.) Hoehne, *Columnnea gracilis* (Mart.) Kuntze, *Hypocyrtia gracilis* Mart., *Orobancha ventricosa* Vell.

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gloxinia L'Hér.

Gloxinia erinoides (DC.) Roalson & Boggan
Sin.: *Achimenes argyrostigma* Hook., *Achimenes erinoides* DC., *Koellikeria argyrostigma* (Hook.) Regel, *Koellikeria erinoides* (DC.) Mansf.
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Gloxinia major (Fritsch) C.A. Zanotti & Lizarazu
Sin.: *Koellikeria major* Fritsch
Hierba. Nativa. 500-700 m.
Países: ARG(SAL).

Gloxinia perennis (L.) Fritsch
Sin.: *Martynia perennis* L.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mitraria Cav., nom. cons.

Mitraria coccinea Cav.
Sin.: *Gesneria chilensis* Feuillée ex Molina
Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Napeanthus Gardner

Napeanthus primulifolius (Raddi) Sandwith
Sin.: *Oxalis primulifolia* Raddi
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Napeanthus reitzii (L.B. Sm.) B.L. Burt & Leeuwenb.

Sin.: *Hatschbachia reitzii* L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Nematanthus Schrad., nom. cons.

Nematanthus australis Chautems
Subarbusto. Endémica. 200-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nematanthus fissus (Vell.) L.E. Skog
Sin.: *Hypocyrtia fissa* (Vell.) Handro & L.B. Sm., *Hypocyrtia selloana* Klotzsch & Hanst., *Nematanthus selloanus* (Klotzsch & Hanst.) H. E. Moore, *Orobancha fissa* Vell.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nematanthus jolyanus (Handro) Chautems
Sin.: *Hypocyrtia jolyana* Handro
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Nematanthus maculatus (Fritsch) Wiehler
Sin.: *Hypocyrtia maculata* Fritsch
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Nematanthus tessmannii (Hoehne) Chautems
Sin.: *Hypocyrtia tessmannii* Hoehne
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nematanthus wettsteinii (Fritsch) H. E. Moore
Sin.: *Hypocyrtia dusenii* Malme, *Hypocyrtia wettsteinii* Fritsch
Subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Sarmienta Ruiz & Pav., nom. cons.

Sarmienta scandens (J.D. Brandis ex Molina) Pers.

Sin.: *Sarmienta repens* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Urceolaria chilensis* Molina, *Urceolaria scandens* J.D. Brandis ex Molina
Subarbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Seemannia Regel, nom. cons.

Seemannia gymnostoma (Griseb.) Toursark.

Sin.: *Achimenes gymnostoma* (Griseb.) Fritsch, *Fiebrigia digitaliflora* Fritsch, *Gloxinia gymnostoma* Griseb.
Hierba. Nativa. 1200-1700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Seemannia nematanthodes (Kuntze) K. Schum.

Sin.: *Achimenes gracilis* Britton ex Rusby, *Fritschiantha nematanthodes* Kuntze, *Gloxinia nematanthodes* (Kuntze) Wiehler
Hierba. Nativa. 1600-1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Seemannia sylvatica (Kunth) Hanst.

Sin.: *Gesneria sylvatica* Kunth, *Gloxinia sylvatica* (Kunth) Wiehler
Hierba. Nativa. 200-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Sinningia Nees

Sinningia aggregata (Ker Gawl.) Wiehler
Sin.: *Gesneria aggregata* Ker Gawl., *Rechsteineria aggregata* (Ker Gawl.) Kuntze f. *litoralis* Hoehne

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, COA, PAI).

Sinningia allagophylla (Mart.) Wiehler

Sin.: *Corytholoma allagophyllum* (Mart.) Fritsch, *Gesneria allagophylla* Mart., *Rechsteineria allagophylla* (Mart.) Regel, *Rechsteineria montevidensis* Decne., nom. nud., *Sinningia lutea* Buzatto & R.B. Singer
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

Sinningia amambayensis Chautems

Hierba. Nativa. 200-400 m.
Países: PRY(AMA).

Sinningia bullata Chautems & M. Peixoto

Hierba. Endémica. 300-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Sinningia calcaria (Dusén ex Malme) Chautems

Sin.: *Corytholoma calcarium* Dusén ex Malme, *Corytholoma oliganthum* Dusén ex Malme, *Rechsteineria calcaria* (Dusén ex Malme) Hoehne f. *macrophylla* Hoehne, *Rechsteineria oligantha* (Dusén ex Malme) Hoehne
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Sinningia canescens (Mart.) Wiehler

Sin.: *Corytholoma canescens* (Mart.) Fritsch, *Gesneria canescens* Mart., *Rechsteineria canescens* (Mart.) Kuntze
Hierba. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Sinningia conspicua (Seem.) G. Nicholson

Sin.: *Biglandularia conspicua* Seem., *Rosanowia conspicua* (Seem.) Regel, *Sinningia caulina* Malme
Hierba. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sinningia cooperi (Paxton) Wiehler

Sin.: *Corytholoma cooperi* (Paxton) Voss, *Gesneria cooperi* Paxton, *Rechsteineria cooperi* (Paxton) Kuntze
Hierba epífita. Nativa. 500-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sinningia curtiflora (Malme) Chautems

Sin.: *Corytholoma curtiflorum* Malme, *Rechsteineria curtiflora* (Malme) Hoehne
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sinningia douglasii (Lindl.) Chautems

Sin.: *Corytholoma confertifolium* (Hanst.) Fritsch, *Corytholoma douglasii* (Lindl.) Voss, *Corytholoma douglasii* (Lindl.) Voss var. *verticillatum* (Hook.) Toursark., *Gesneria confertifolia* Hanst., *Gesneria douglasii* Lindl., *Gesneria douglasii* Lindl. var. *verticillata* Hook., *Gesneria verticillata* Hook., nom. illeg., *Rechsteineria confertifolia* (Hanst.) Kuntze, *Rechsteineria douglasii* (Lindl.) Kuntze
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada para Paraguay (Xifreda & Seo 2008a) sin indicar localidad o material de referencia.

Sinningia elatior (Kunth) Chautems

Sin.: *Corytholoma igneum* (Mart.) Fritsch, hom. illeg., *Corytholoma strictum* (Hook. & Arn.) Decne., *Gesneria elatior* Kunth, *Gesneria sceptrum* Mart.

- var. *igneum* Mart., *Gesneria stricta* Hook. & Arn., *Rechsteineria stricta* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sinningia stricta* (Hook. & Arn.) Wiehler
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, RNO).
- Sinningia eumorpha** H. E. Moore
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Sinningia gerdiana** Chautems
Hierba. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Sinningia hatschbachii** Chautems
Hierba. Nativa. 700-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Sinningia leopoldii** (Scheidw. ex Planch.) Chautems
Sin.: *Gesneria leopoldii* Scheidw. ex Planch., *Rechsteineria leopoldii* (Scheidw. ex Planch.) Kuntze, *Rechsteineria oligantha* (Dusén ex Malme) Hoehne f. *rupestris* Hoehne
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Sinningia leucotricha** (Hoehne) H. E. Moore
Sin.: *Rechsteineria leucotricha* Hoehne
Hierba. Endémica. 600-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Sinningia lineata** (Hjelmq.) Chautems
Sin.: *Rechsteineria lineata* Hjelmq.
Hierba. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sinningia macropoda** (Sprague) H. E. Moore
Sin.: *Corytholoma cyclophyllum* Dusén ex Täckh., *Corytholoma macropodum* Sprague, *Rechsteineria cyclophylla* (Dusén ex Täckh.) Hjelmq.
Hierba. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).
- Sinningia macrostachya** (Lindl.) Chautems
Sin.: *Corytholoma latifolia* (Mart.) Fritsch, *Gesneria latifolia* Mart., *Gesneria macrostachya* Lindl., *Rechsteineria latifolia* (Mart.) Kuntze, *Rechsteineria macrostachya* (Lindl.) L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA).
- Sinningia mauroana** Chautems
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Sinningia nivalis** Chautems
Hierba. Endémica. 800-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Sinningia polyantha** (DC.) Wiehler
Sin.: *Corytholoma polyanthum* (DC.) Fritsch, *Gesneria polyantha* DC., *Rechsteineria polyantha* (DC.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Sinningia ramboi** G.E. Ferreira, Waechter & Chautems
Hierba. Endémica. 1000-1100 m.
Países: BRA(RGS).
- Sinningia reitzii** (Hoehne) L.E. Skog
Sin.: *Rechsteineria reitzii* Hoehne
Arbusto. Endémica. 400-800 m.
Países: BRA(SCA).
- Sinningia sellovii** (Mart.) Wiehler
Sin.: *Corytholoma sellovii* (Mart.) Kuntze, *Gesneria coccinea* Rojas, *Gesneria sellovii* Mart., *Rechsteineria ramboi* Hoehne
Hierba o subarbusto. Nativa. 100-600 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, GUA, PAI). URY(RIV).
- Sinningia tubiflora** (Hook.) Fritsch
Sin.: *Achimenes tubiflora* (Hook.) Britton, *Dolichodeira tubiflora* (Hook.) Hanst, *Gesneria tubiflora* (Hook.) Griseb., hom. illeg., *Gloxinia tubiflora* Hook.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE). PRY(CAA, CEN, ÑEE, PHA, SPE). URY(PAY, RNO, SAO).
- Sinningia warmingii** (Hiern) Chautems
Sin.: *Corytholoma sceptum* (Mart.) Decne. var. *arenosa* Chodat & Hassl., *Corytholoma warmingii* (Hiern) Toursark., *Gesneria warmingii* Hiern, *Rechsteineria lindleyi* (Hook.) Fritsch var. *macrophylla* Hoehne, *Rechsteineria multiflora* Fritsch, *Rechsteineria schlickmannii* Hoehne, *Rechsteineria warmingii* (Hiern) Hjelmq.
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).
- Sinningia x vacariensis** G.E. Ferreira, Waechter & Chautems
Hierba. Endémica. 600-800 m.
Países: BRA(RGS).

GOMORTEGACEAE

Gomortega Ruiz & Pav.

Gomortega keule (Molina) Baill.

Sin.: *Adenostemum nitidum* (Ruiz & Pav.)
Pers., *Gomortega nitida* Ruiz & Pav.,
Keulia chilensis Molina, *Lucuma keule*
Molina
Árbol. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

GOODENIACEAE

Goodenia Sm.

Goodenia radicans (Cav.) Pers.

Sin.: *Selliera radicans* Cav.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS,
RME).

Scaevola L., nom. cons.

Scaevola plumieri (L.) Vahl

Sin.: *Lobelia plumieri* L.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000
m.
Países: BRA(PAR, SCA).

GRISELINIACEAE

Griselinia J.R. Forst., nom. cons.

Griselinia carlomunozii M.O. Dillon & M.
Muñoz
Arbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(ANT).

Griselinia jodinifolia (Griseb.) Taub.

Sin.: *Decostea jodinifolia* Griseb.
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR,
LLA).

Griselinia racemosa (Phil.) Taub.

Sin.: *Decostea racemosa* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU). CHL(ARA, LSR,
LLA, AIS).

Griselinia ruscifolia (Clos) Ball

Sin.: *Decostea ruscifolia* Clos, *Griselinia*
ruscifolia (Clos) Taub., comb. superfl.,
Griselinia ruscifolia (Clos) Ball var.
itaitiaiae (Wawra) Taub., *Maytenus*
itaitiaiae Wawra
Arbusto. Endémica. 400-2700 m.
Países: ARG(CHU, RNE). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(LSR, LLA, AIS,
MAG).

Griselinia scandens (Ruiz & Pav.) Taub.

Sin.: *Decostea scandens* Ruiz & Pav.,
Griselinia alata Ball
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, LLA, AIS).

GROSSULARIACEAE

Ribes L.

Ribes bicolor Phil.

Sin.: *Ribes glandulosum* Ruiz & Pav.,
hom. illeg., *Ribes ruizii* Rehder
Arbusto. Endémica. 1700- m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO,
ARA, RME).

Ribes catamarcanum Jancz.

Arbusto. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Ribes cucullatum Hook. & Arn.

Sin.: *Ribes brachystachyum* Phil., *Ribes*
chubutense Gand., *Ribes cucullatum*
Hook. & Arn. var. *andicola* Chodat,
Ribes lacarense Phil., *Ribes*
montanum Phil., *Ribes nebulare*
Phil., *Ribes ovallei* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, BIO,
ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Ribes densiflorum Phil.

Sin.: *Ribes cucullatum* Hook. & Arn. var.
densiflorum (Phil.) Sparre, *Ribes*
nitidissimum Neger
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LLA).

Ribes integrifolium Phil.

Arbusto. Endémica. 1100-1400 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Ribes magellanicum Poir. subsp.
magellanicum

Sin.: *Ribes spegazzinii* Jancz.
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Ribes magellanicum Poir. subsp.
parviflorum (Phil.) Sparre

Sin.: *Ribes ahrendsii* Phil., *Ribes filiforme*
Poepp., nom. inval., *Ribes micranthum*
Phil., *Ribes palenae* Phil., *Ribes*
parviflorum Phil.
Arbusto. Endémica. 500-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Ribes nemorosum Phil.

Arbusto. Endémica. 1400-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Ribes nubigenum Phil.

Arbusto. Endémica. 1400-1500 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Ribes polyanthes Phil.

Sin.: *Ribes parvifolium* Phil., *Ribes rupicola* Phil., *Ribes stolpii* Phil.
Arbusto. Endémica. 1800-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Ribes punctatum Ruiz & Pav.

Sin.: *Rebis alpinoides* Spach, *Rebis ebracteolata* Spach, *Rebis punctata* (Ruiz & Pav.) Spach, *Ribes berterioanum* Phil., *Ribes collinum* Phil., *Ribes ebracteolatum* (Spach) Gay, *Ribes georgianum* Phil., *Ribes heterophyllum* Phil.
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Ribes trilobum Meyen

Sin.: *Ribes gayanum* (Spach) Reiche, *Ribes molle* Poepp. ex Rach, *Ribes villosum* Gay, hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 0-2400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Ribes valdivianum Phil.

Sin.: *Ribes valdivianum* Phil. var. *sessiliflorum* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

GUNNERACEAE

Gunnera L.

Gunnera apiculata Schindl.

Sin.: *Gunnera chilensis* A. DC., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 1800-3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Gunnera berteroi Phil.

Sin.: *Gunnera laxiflora* Phil.
Hierba. Nativa. 2700-3100 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Gunnera bracteata Steud. ex G. Benn.

Sin.: *Gunnera glabra* Phil., *Gunnera insularis* Phil., *Gunnera pyramidalis* Schindl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Gunnera herteri Mattf.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ROC).

Gunnera lobata Hook. f.

Sin.: *Dysemone lobata* Banks & Sol. ex Hook. f., *Misandra lobata* (Hook.f.) Oerst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Gunnera magellanica Lam.

Sin.: *Dysemone integrifolia* Banks & Sol. ex Forst., *Gunnera falklandica* Hook. f., *Gunnera integrifolia* Blume, *Gunnera plicata* Vahl, *Gunnera reichei* Schindl., *Gunnera reniformis* Blume, *Misandra magellanica* (Lam.) J.F. Gmel.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Gunnera manicata Lindl. ex André

Sin.: *Gunnera brasiliensis* Schindl.

Hierba. Endémica. 600-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gunnera masafueriae Skottsbo.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Gunnera peltata Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Gunnera schindleri L.E. Mora

Hierba. Nativa. 2500-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. var. **meyeri** (L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González

Sin.: *Gunnera chilensis* Lam. var. *meyeri* L.E. Mora
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. var. **tinctoria**

Sin.: *Gunnera chilensis* Lam., *Gunnera rheifolia* Schindl., *Gunnera scabra* Ruiz & Pav., *Panke caulescens* J.F. Gmel., *Panke tinctoria* Molina, *Pankea chilensis* Oerst.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE).

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. var. **valdiviensis** (L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González

Sin.: *Gunnera chilensis* Lam. var. *valdiviensis* L.E. Mora
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(LLA).

HALORAGACEAE

Haloragis J.R. Forst. & G. Forst.

Haloragis masafuerana Skottsb. var.
asperrima (Skottsb.) Orchard
Sin.: *Haloragis asperrima* Skottsb.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(JFE).

Haloragis masafuerana Skottsb. var.
masafuerana
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(JFE).

Haloragis masatierrana Skottsb. var.
applanata Danton
Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(JFE).

Haloragis masatierrana Skottsb. var.
masatierrana
Sin.: *Haloragis alata* Jacq.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(JFE).

Haloragis masatierrana Skottsb. var.
scabrida Danton & C. Perrier
Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(JFE).

Laurembergia Bergius

Laurembergia tetrandra (Schott) Kanitz
Sin.: *Haloragis tetrandra* Schott, *Serpicula brasiliensis* Cambess.
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA). URY(CAS).

Myriophyllum L.

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.
Sin.: *Enydria aquatica* Vell., *Myriophyllum brasiliense* Cambess., *Myriophyllum proserpinacoides* Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME). PRY(APY, CEN, CHO, COA, GUA, ÑEE). URY(DUR, MON, SJO).

Myriophyllum quitense Kunth
Sin.: *Myriophyllum elatinoides* Gaudich., *Myriophyllum elatinoides* Gaudich. var. *ternatum* (Gaudich.) Reiche, *Myriophyllum ternatum* Gaudich., *Myriophyllum ternatum* Gaudich. var. *tetraphyllum* Hook. & Arn.

Hierba acuática. Nativa. 0-4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, TDF, TUC). BRA(RGS).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON, SJO).

Proserpinaca L.

Proserpinaca palustris L.
Sin.: *Proserpinaca palustris* L. var. *australis* Fassett
Hierba acuática. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(MON).

HALOPHYTACEAE

Halophytum Speg.

Halophytum ameghinoi (Speg.) Speg.
Sin.: *Tetragonia ameghinoi* Speg.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU).

HELICONIACEAE

Heliconia L., nom. cons.

Heliconia farinosa Raddi
Sin.: *Heliconia brasiliensis* Hook. f., *Heliconia velloziana* Emygdio
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Heliconia hirsuta L. f.
Sin.: *Heliconia cannoidea* Rich. var. *villosa* Petersen
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAU, CON, SPE).

Heliconia psittacorum L. f.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Heliconia subulata Ruiz & Pav. subsp. **gracilis** (Petersen) L.Andersson
Sin.: *Heliconia psittacorum* L. f. var. *gracilis* Petersen
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).
PRY(CAN).

HUMIRIACEAE

Vantanea Aubl.

Vantanea compacta (Schnizl.) Cuatrec.

Sin.: *Humirium compactum* Schnizl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

HYDNORACEAE

Prosopanche de Bary

Prosopanche americana (R. Br.) Baill.

Sin.: *Hydnora americana* R. Br.,

Prosopanche burmeisteri de Bary,

Prosopanche costaricensis L.D.

Gómez & Gómez-Laur.

Hierba parásita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,

LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU,

SDE). PRY(PHA).

Prosopanche bonacinae Speg.

Sin.: *Prosopanche bertonensis* Bertoni,

Prosopanche burmeisteri de Bary var.

minor Speg. ex Bettfr., *Prosopanche*

clavata Chodat, *Prosopanche*

mazzuchii Speg., *Prosopanche minor*

(Speg. ex Bettfr.) Chodat

Hierba parásita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ,

LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SLU,

TUC). BRA(RGS). PRY(APA).

Notas: Citada para Paraguay (Chodat,

1916) sin mencionar ejemplar de

referencia. Se encuentra en Bolivia

Prosopanche cocuccii Tavares de

Carvalho, Záchia & Mariath

Hierba parásita. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Prosopanche demogorgoni Funez

Hierba parásita. Endémica.

Países: BRA(SCA).

HYDRANGEACEAE

Hydrangea Gronov. ex L.

Hydrangea serratifolia (Hook. & Arn.) F.

Phil.

Sin.: *Cornidia integerrima* Hook. & Arn.,

Cornidia serratifolia Hook. & Arn.,

Hydrangea integerrima (Hook. & Arn.)

Engl., *Hydrangea scandens* Poepp. ex

DC.

Liana. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(VAL,

LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS,

RME).

Philadelphus L.

Philadelphus inodorus L.

Sin.: *Philadelphus grandiflorus* Willd.,

Philadelphus inodorus L. var.

grandiflorus (Willd.) A. Gray

Arbusto. Introducida. 1600-1700 m.

Países: ARG(TUC).

HYDROCHARITACEAE

Apalanthe Planch.

Apalanthe granatensis (Humb. & Bonpl.)

Planch.

Sin.: *Elodea granatensis* Bonpl.

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, MIS).

Egeria Planch.

Egeria densa Planch.

Sin.: *Anacharis densa* (Planch.) Vict.,

Elodea densa (Planch.) Casp.,

Philotria densa (Planch.) Small

Hierba acuática. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,

MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

CHL(VAL, BIO, LSR, LLA, RME).

URY(CAS, FLO, FLA, MON, ROC).

Egeria najas Planch.

Sin.: *Anacharis najas* (Planch.) Vict.,

Elodea guianensis Rich. f. *longifolia*

Chodat & Hassl., *Elodea kochii* Herter,

Elodea najas (Planch.) Casp., *Elodea*

paraguayensis Herter, nom. illeg.

Hierba acuática. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR). PRY(COA, ITA, ÑEE,

SPE). URY(TAC).

Elodea Michx.

Elodea callitrichoides (Rich.) Casp.

Sin.: *Anacharis callitrichoides* Rich.,

Elodea ernstae H. St. John, *Elodea*

richardii H. St. John

Hierba acuática. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,

ERI, JUJ, RNE, SFE). URY(MON).

Elodea potamogeton (Bertero) Espinosa

Sin.: *Anacharis chilensis* Planch.,

Anacharis potamogeton (Bertero)

Vict., *Diplandra potamogeton* Bertero,

Egeria chilensis (Planch.) Benth. &

Hook., *Elodea chilensis* (Planch.)

Casp.

Hierba acuática. Nativa. 0-4500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, VAL, LBO,

MAU, BIO, RME).

Limnobium Rich.

Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine

Sin.: *Hydrocharis stolonifera* (G. Mey.) Kuntze, *Hydromystria laevigata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Díaz-Mir. & Philcox, comb. superfl., *Hydromystria laevigata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hunz., *Hydromystria sinclairii* (Benth.) Hauman, *Hydromystria stolonifera* G. Mey., *Limnobium sinclairii* Benth., *Limnobium spongia* (Bosc) Steud. subsp. *laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden, *Limnobium stoloniferum* (G. Mey.) Griseb., *Salvinia laevigata* Humb. & Bonpl. ex Willd.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, LSR, RME). PRY(ÑEE, PHA). URY(ROC).

Najas L.

Najas conferta (A. Braun) A. Braun

Sin.: *Najas arguta* Kunth var. *conferta* A. Braun

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus

Sin.: *Caulinia guadalupensis* Spreng., *Najas arcana* Subils & Hunz., *Najas microdon* A. Braun

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, COS, SAL, SLU). BRA(RGS).

Najas marina L.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MEN, SLU, SFE).

Ottelia Pers.

Ottelia brasiliensis (Planch.) Walp.

Sin.: *Benedictaea brasiliensis* (Planch.) Toledo, *Damasonium brasiliense* Planch.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN).

HYDROLEACEAE

Hydrolea L., nom. cons.

Hydrolea elatior Schott

Sin.: *Hydrolea albiflora* (Chodat & Hassl.) Brand, *Hydrolea albiflora* (Chodat & Hassl.) Brand var. *depressa* Brand, *Hydrolea cryptantha* Brand var. *meridionalis* Hassl., *Hydrolea glabra* Schumach. & Thonn. f. *albiflora* Chodat & Hassl., *Hydrolea glabra* Schumach. & Thonn. var. *spinosa* Chodat & Hassl., *Hydrolea multiflora* Mart. ex Choisy

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, ÑEE, PHA). URY(FLA).

Hydrolea palustris (Aubl.) Raeusch.

Sin.: *Sagonea palustris* Aubl.

Arbusto o subarbusto. Introducida.

Países: BRA(RGS).

Hydrolea spinosa L. var. **paraguayensis** (Chodat) Davenp.

Sin.: *Hydrolea mollis* Chodat, *Hydrolea paraguayensis* Chodat, *Hydrolea paraguayensis* Chodat f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Hydrolea paraguayensis* Chodat var. *inermis* Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, COA, ÑEE, PAI, SPE).

Notas: Citada para Uruguay por Davenport (1988) sin indicar localidad o material de referencia.

Hydrolea spinosa L. var. **spinosa**

Sin.: *Hydrolea cryptantha* Brand, *Hydrolea megapotamica* Spreng., *Hydrolea spinosa* L. var. *megapotamica* (Spreng.) Brand, *Nama megapotamica* (Spreng.) Kuntze, *Nama spinosa* (L.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CEN, COA, PAI, PHA).

Notas: Citada para Uruguay (Davenport, 1988) sin indicar localidad o material de referencia.

HYDROPHYLLACEAE

Phacelia Juss.

Phacelia artemisioides Griseb.

Sin.: *Phacelia glandulosa* Nutt. var. *patagonica* Ball

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(MAL, MON, SJO).

Phacelia brachyantha Benth.

Sin.: *Phacelia brachyantha* Benth. var. *paniculata* A.DC., *Phacelia clinopodioides* Bertero, *Phacelia simplicifolia* Colla, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAG, RME).

Phacelia cumingii (Benth.) A. Gray

Sin.: *Eutoca cumingii* Benth., *Eutoca frigida* Phil., *Eutoca grandis* Phil., *Eutoca litoralis* Phil., *Eutoca peraltae* Phil., *Eutoca pinnatifida* Phil., *Eutoca pusilla* Phil., *Microgenetes cumingii* (Benth.) A. DC., *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *frigida* (Phil.) Brand, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *grandis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *pusilla* (Phil.) Reiche, *Phacelia frigida* (Phil.) Reiche, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 3200-3800 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd.

Sin.: *Eutoca lomarifolia* Phil., *Phacelia boliviana* Brand, *Phacelia foliosa* Phil., *Phacelia nana* Wedd., *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. f. *minor* Hicken, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *decumbens* Brand, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *elator* Griseb., *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *foliosa* (Phil.) Reiche, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *lobulata* Hicken, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *robusta* Wedd., *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *setigera* (Phil.) Reiche, *Phacelia sanzini* Hicken, *Phacelia setigera* Phil. var. *humahuaguense* Deginani, *Phacelia setigera* Phil. var. *setigera*,

Phacelia sinuata Phil., *Phacelia viscosa* Phil.

Hierba. Nativa. 1000-4600 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Phacelia secunda J.F. Gmel. var. **pinnata** (Vahl) Deginani

Sin.: *Aldea pinnata* Ruiz & Pav., *Heliotropium pinnatum* Vahl, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *amoena* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *pinnata* (Vahl) Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *robusta* Brand, *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. var. *robusta* (Brand) J.F. Macbr., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *pinnata* (Ruiz & Pav.) Constance

Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TUC). CHL(MAU, MAG).

Phacelia secunda J.F. Gmel. var. **secunda**

Sin.: *Aldea circinata* Willd., nom. superfl., *Hydrophyllum magellanicum* Lam., *Phacelia circinata* J. Jacq., nom. illeg., *Phacelia circinata* J. Jacq., nom. illeg. var. *acutiloba* A. DC., *Phacelia circinata* J. Jacq., nom. illeg. var. *obtusiloba* A. DC., *Phacelia circinata* J. Jacq., nom. illeg. var. *paniculata* A. DC., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *andina* Phil. ex Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *genuina* Brand, nom. inval., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *plantaginea* Brand, *Phacelia parviflora* Phil., hom. illeg., *Phacelia secunda*

J.F. Gmel. subsp. *parviflora* (Phil.) Constance, *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *plantaginea* (Brand) Constance

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

HYPERICACEAE

Hypericum L.

Hypericum androsaemum L.

Hierba. Introducida. 0-400 m.

Países: CHL(LBO, MAU, LSR, LLA).

Hypericum austrobrasilense Vog. Ely, Boldrini & Bordignon

Hierba o subarbusto. Endémica. 900-1700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Hypericum bordignonii Vog. Ely & Boldrini

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

Hypericum brasiliense Choisy

Sin.: *Hypericum anceps* Larrañaga, *Hypericum brasiliense* Choisy var. *angustifolium* Reichardt, *Hypericum brasiliense* Choisy var. *latifolium* Reichardt, *Hypericum brasiliense* Choisy var. *linoides* (A. St.-Hil.) C. Rodr. Jim., *Hypericum brasiliense* Choisy var. *punctulatum* (A. St.-Hil.) R. Keller, *Hypericum campestre* Cham. & Schltdl. subsp. *campestre*, *Hypericum campestre* Cham. & Schltdl. subsp. *pauciflorum* N. Robson, *Hypericum*

campestre Cham. & Schltdl. subsp. *tenue* N. Robson, *Hypericum laxiusculum* A. St.-Hil., *Hypericum linoides* A. St.-Hil., *Hypericum punctulatum* A. St.-Hil., *Receveura graveolens* Vell., *Sarothra brasiliensis* (Choisy) Y. Kimura

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, MIE). URY(ART, FLO, FLA, MON, RNO, RIV, TAC, TYT).

Hypericum brevistylum Choisy

Hierba. Nativa. 3200-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Hypericum caespitosum Cham. & Schltdl.

Sin.: *Hypericum chilense* Gay, *Hypericum chilense* Gay var. *muscoides* (Phil.) Reiche, *Hypericum muscoides* Phil., *Hypericum uliginosum* Kunth var. *prostratum* R. Keller

Hierba. Endémica. 100-1500 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Hypericum caprifolium Cham. & Schltdl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypericum carinatum Griseb.

Sin.: *Hypericum altissimum* R. Keller, *Hypericum megapotamicum* Malme, *Hypericum paraguayense* R. Keller

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, CON, GUA, MIE, SPE). URY(CLA, RIV, ROC, TYT).

Hypericum cavernicola L.B. Sm.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(TAC).

Hypericum connatum Lam.

Sin.: *Brathys connata* (Lam.) Spach, *Hypericum chlorifolium* A. St.-Hil., *Hypericum connatum* Lam. var. *chlorifolium* (A. St.-Hil.) Reichardt, *Hypericum connatum* Lam. var. *fiebrigii* Briq., *Hypericum connatum* Lam. var. *obscurum* Briq., *Hypericum connatum* Lam. var. *paraguariense* Briq., *Hypericum cyathifolium* Larrañaga, *Sarothra connata* (Lam.) Y. Kimura

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CAS, COL, LAV, MAL, RIV, ROC, TYT).

Hypericum cordiforme A. St.-Hil.

Sin.: *Hypericum cordatum* (Vell.) N. Robson subsp. *cordatum*, *Hypericum cordatum* (Vell.) N. Robson subsp. *kleinii* N. Robson, *Hypericum cordiforme* A. St.-Hil. var. *genuinum* Briq., *Receveura cordata* Vell.

Hierba o subarbusto. Nativa. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypericum denudatum A. St.-Hil.

Sin.: *Hypericum rigidum* A. St.-Hil. var. *humile* Reichardt

Arbusto o subarbusto. Endémica. 700-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypericum gentianoides (L.) Britton, Stern & Poggenb.

Sin.: *Hypericum sarothra* Michx., *Sarothra gentianoides* L.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PAI).

Notas: Especie de Norte América, podría tratarse de una antigua disyunción

Hypericum humifusum L.

Hierba. Introducida. 800-900 m.

Países: ARG(NEU).

Notas: La especie habitaría también en Chile (cfr. Puntieri & Brion, 2006: 294)

Hypericum legrandii L.B. Sm.

Sin.: *Hypericum ericoides* Arechav.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(RIV).

Hypericum lorentzianum Gilg ex R. Keller

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CON, GUA). URY(ART, CAS, MON, ROC).

Hypericum microlicioides L.B. Sm.

Hierba o subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hypericum mutilum L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE). URY(RIV).

Hypericum myrianthum Cham. & Schltdl.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL,
RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Hypericum pedersenii N. Robson
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).

Hypericum perforatum L.
Hierba. Introducida. 0-1900 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU,
RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LSR, LLA, RME, JFE).
URY(MON).

Hypericum piriai Arechav.
Sin.: *Hypericum hilaireanum* L.B. Sm.,
Hypericum tenuifolium A. St.-Hil.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(MAL, ROC).

Hypericum polyanthemum Klotzsch ex
Reichardt
Sin.: *Hypericum rivulare* Arechav.
Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA).
URY(CLA, TAC).

Hypericum rigidum A. St.-Hil.
Sin.: *Hypericum meridionale* L.B. Sm.,
Hypericum rigidum A. St.-Hil. subsp.
bracteatum N. Robson, *Hypericum*
rigidum A. St.-Hil. subsp. *meridionale*
(L.B. Sm.) N. Robson, *Hypericum*
rigidum A. St.-Hil. subsp. *sellowianum*
(R. Keller) N. Robson, *Hypericum*
rufescens Klotzsch ex Reichardt, hom.
illeg., *Hypericum sellowianum* R.
Keller
Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1500
m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypericum robsonii H.A. Keller & S.
Crockett

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Hypericum salvadorenses N. Robson
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Hypericum silenoides Juss.
Sin.: *Hypericum bonariense* Griseb.,
Hypericum dichotomum Phil., hom.
illeg., *Hypericum indecorum* Kunth,
Hypericum multiflorum Kunth,
Hypericum paposanum I.M. Johnst.,
Hypericum tarquense Kunth
Hierba. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
CHL(ANT, ARA, LSR).

Hypericum tamariscinum Cham. &
Schltdl.
Sin.: *Hypericum brigittae* Herter, nom.
nud., *Hypericum myrianthum* Cham. &
Schltdl. subsp. *tamariscinum* (Cham. &
Schltdl.) N. Robson, *Hypericum notiale*
L.B. Sm., *Hypericum parviflorum* A.
St.-Hil., *Hypericum pelleterianum* A.
St.-Hil., *Hypericum pelleterianum* A.
St.-Hil. var. *tamariscinum* (Cham. &
Schltdl.) Arechav.
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV,
MAL, MON, SJO).

Hypericum teretiusculum A. St.-Hil.
Sin.: *Hypericum subliberum* L.B. Sm.,
Sarothra teretiuscula (A. St.-Hil.) Y.
Kimura
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(GUA).

Hypericum ternum A. St.-Hil.
Subarbusto. Nativa. 800-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

HYPOXIDACEAE

Curculigo Gaertn.

Curculigo scorzonifolia (Lam.) Baker
Sin.: *Heliacme scorzonifolia* (Lam.)
Ravenna, *Hypoxis scorzonifolia*
Lam.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY,
AMA, CON, NAS).

Hypoxis L.

Hypoxis atlantica Funez, Hassemer &
J.P.R. Ferreira
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Hypoxis catamarcensis Brackett
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT).

Hypoxis decumbens L.
Sin.: *Hypoxis decumbens* L. var. *major*
Seub.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN,
CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE).
URY(RNO, ROC).

Hypoxis humilis Kunth
Hierba. Nativa.
Países: ARG(COR).

Molineria Colla

Molineria capitulata (Lour.) Herb.
Sin.: *Curculigo capitulata* (Lour.) Kuntze,
Curculigo recurvata Dryand.,
Leucojum capitulatum Lour.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(DFE).

ICACINACEAE

Casimirella Hassl.

Casimirella guaranitica Hassl.
Sin.: *Casimirella guaranitica* Hassl. f.
calvata Hassl., *Dichapetalum prancei*
Fern. Casas
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-300
m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN,
CON, SPE).

IRIDACEAE

Babiania Ker Gawl.

Babiania angustifolia Sweet
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Calydorea Herb.

Calydorea alba Roitman & A. Castillo
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART).

Calydorea amabilis (Ravenna) Goldblatt
& Henrich
Sin.: *Catila amabilis* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).
URY(ART, PAY, RNO).

Calydorea approximata R.C. Foster
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, APY, CAU, CAA, GUA,
ITA, MIE, SPE).

Calydorea azurea Klatt
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).
URY(PAY, SAO, TYT).

Calydorea basaltica Ravenna
Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Calydorea bifida Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(MAU).

Calydorea campestris (Klatt) Baker
Sin.: *Botherbe campestris* Klatt
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN, GUA).

Calydorea charruana Deble
Hierba. Endémica.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).
URY(CLA, MON, PAY, RIV, SAO,
SJO, TAC).

Calydorea crocoides Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Calydorea gardneri Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Calydorea longipes Ravenna
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Calydorea luteola (Klatt) Baker
Sin.: *Botherbe luteola* Klatt
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS). URY(RIV).

Calydorea minima Roitman & A. Castillo
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(CAA).

Calydorea minuana Deble & F.S. Alves
Hierba. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV).

Calydorea nuda (Herb.) Baker
Sin.: *Cardiostigma nudum* (Herb.) Klatt,
Gelasine nuda Herb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).
URY(CLA, MON).

Calydorea pallens Griseb.
Sin.: *Tamia pallens* (Griseb.) Ravenna
Hierba. Endémica. 800-2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
SAL, SLU, SDE, TUC).

Calydorea riograndensis Deble
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Calydorea undulata Ravenna
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Calydorea xiphioides (Poepp.) Espinosa
Sin.: *Calydorea speciosa* (Hook.) Herb.,
nom. inval., *Sisyrinchium grandiflorum*
Poepp., hom. illeg., *Sisyrinchium*
speciosum Hook., *Sisyrinchium*
xiphioides Poepp.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO).

Cardenanthus R.C. Foster

Cardenanthus venturii R.C. Foster
Hierba. Endémica. 3500-4600 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Chasmanthe N.E. Br.

Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E. Br.
Sin.: *Antholyza floribunda* Salisb.
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

Cipura Aubl.

Cipura paludosa Aubl. subsp.
boliviensis Ravenna
Hierba. Nativa. 0-400 m.
Países: PRY(APY, AMA, CAA, CON, COA, GUA, ÑEE, SPE).

Crocasmia Planch.

Crocasmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E. Br.
Sin.: *Montbretia crocosmiiflora* Lemoine
Hierba. Introducida. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, ARA, LLA, JFE).

Cypella Herb.

Cypella alonsoana Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(RIV, TAC).

Cypella amambaica Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: PRY(AMA).

Cypella aquatilis Ravenna
Hierba acuática. Endémica. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cypella armosa Ravenna
Sin.: *Cypella gracilis* (Herb.) Klatt f. *humilis* Baker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Cypella aurinegra Deble & A. González subsp. **aurinegra**
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: URY(CLA).

Cypella aurinegra Deble & A. González subsp. **albipurpurata** Deble
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: URY(CLA).

Cypella charruana Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV).

Cypella crenata (Vell.) Ravenna
Sin.: *Cypella laxa* Ravenna, *Sisyrinchium crenatum* Vell.
Hierba. Nativa. 100-1300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN). URY(RIV).

Cypella cruenta Deble
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Cypella curuzupensis Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(GUA).

Cypella discolor Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV).

Cypella exilis Ravenna
Sin.: *Cypella amplimaculata* Chauveau & L. Eggers, *Cypella gracilis* (Klatt) Baker, nom. illeg., *Polia gracilis* Klatt
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS). URY(ART, CLA, CLA, FLA, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).
Notas: Según Eggers et al. (2019) es un taxón dudoso para Brasil.

Cypella fucata Ravenna
Sin.: *Cypella osteniana* Beauverd subsp. *aurantiaca* Roitman & A. Castillo
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CLA, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SAO).

Cypella guttata Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV).

Cypella herbertii (Herb.) Herb. subsp. **brevicristata** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART).

Cypella herbertii (Herb.) Herb. subsp. **herbertii**
Sin.: *Cypella bonariensis* (Ten.) Niederl., *Cypella catharinensis* Ravenna, *Moraea herbertii* Lindl., *Polia bonariensis* Ten., *Tigridia herbertii* Herb.
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Notas: Deble & Alves (Balduinia 66: 11. 2020) consideran a *C. catharinensis* Ravenna como un taxón independiente de *C. herbertii*. Sin embargo, aluden que se requieren estudios adicionales para confirmar la separación entre ambas entidades

Cypella herbertii (Herb.) Herb. subsp. **reflexa** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(ART, PAY, RNO, SAO).

Cypella herbertii (Herb.) Herb. subsp. **wolffhugelii** (Hauman) Ravenna
Sin.: *Cypella wolffhugeli* Hauman
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Cypella laeta Ravenna
Sin.: *Cypella yatayphila* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). URY(PAY, SAO).

Cypella lapidosa Ravenna
Sin.: *Cypella altouruguaya* Chauveau & L. Eggers
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Cypella lilacea Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Cypella linearis (Kunth) Baker
Sin.: *Larentia linearis* (Kunth) Klatt, *Moraea linearis* Kunth
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Cypella luteogibbosa Deble
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV).

Cypella magnicristata Deble
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).

Cypella osteniana Beauverd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CAS, CLA, FLO, LAV, MON, RIV, SAO, TAC, TYT).

Cypella pabstiana Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR).

Cypella parviflora Ravenna ex Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Cypella pusilla (Link & Otto) Benth. & Hook. f.
Sin.: *Cypella gloriana* Deble & F.S. Alves, *Ferraria pusilla* Link & Otto
Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: BRA(RGS).

Cypella ravenniana Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Cypella rivularis Chauveau & L. Eggers
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART).

Cypella suffusa Ravenna
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS).

Cypella trimontina Ravenna
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(COS).

Cypella uliginosa Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).

Eleutherine Herb., nom. cons.

Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb.
Sin.: *Eleutherine plicata* Herb. ex Klatt, *Galatea americana* (Aubl.) Kuntze, *Galatea bulbosa* (Mill.) Britton, *Ixia americana* Aubl., *Marica plicata* Ker Gawl., *Moraea plicata* Sw., nom. illeg., *Sisyrinchium bulbosum* Mill.
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: BRA(PAR).

Eleutherine latifolia (Standl. & L.O. Williams) Ravenna
Sin.: *Cipura latifolia* Standl. & L.O. Williams, *Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb. subsp. *citriodora* Ravenna, *Eleutherine citriodora* (Ravenna) Ravenna
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC). PRY(PHA).

Ennealophus N.E. Br.

Ennealophus euryandrus (Griseb.) Ravenna subsp. **euryandrus**
Sin.: *Alophia euryandra* (Griseb.) Lillo, *Herbertia euryandra* Griseb., *Sphenostigma euryandra* (Griseb.) Baker
Hierba. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Ennealophus euryandrus (Griseb.) Ravenna subsp. **oxydandrus** Ravenna
Hierba. Endémica. 3700- m.
Países: ARG(CAT).

Ennealophus fimbriatus Ravenna
Hierba. Endémica. 1600-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Ennealophus simplex (Ravenna)
 Roitman & A. Castillo
 Sin.: *Tucma simplex* Ravenna
 Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
 Países: ARG(JUJ, TUC).

Ennealophus tucumanensis Huaylla
 Hierba. Nativa. 2300-2700 m.
 Países: ARG(TUC).

Freesia Eckl. ex Klatt

Freesia alba (G.L. Mey.) Gumb.
 Sin.: *Freesia refracta* (Jacq.) Klatt var.
alba G.L. Mey.
 Hierba. Introducida. 0-200 m.
 Países: ARG(BAI).

Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt & J.C.
 Manning
 Sin.: *Gladiolus laxus* Thunb.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(COS).

Gelasine Herb.

Gelasine coerulea (Vell.) Ravenna
 Sin.: *Alophia sellowiana* Klatt,
Sisyrinchium coeruleum Vell.,
Sphenostigma sellowianum (Klatt)
 Baker
 Hierba. Nativa. 0-2600 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(APA, CAU).

Gelasine elongata (Graham) Ravenna
 Sin.: *Alophia stricta* (Griseb.) Hauman,
Ferraria elongata Graham, *Gelasine*
azurea Herb., *Herbertia stricta* Griseb.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS,
 SCA). URY(PAY).

Gelasine paranaensis Ravenna
 Hierba. Nativa. 800-1200 m.
 Países: BRA(PAR).

Gelasine uruguaiensis Ravenna subsp.
orientalis Ravenna
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: URY(CLA).

Gelasine uruguaiensis Ravenna subsp.
uruguaiensis
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS). URY(DUR).

Gladiolus L.

Gladiolus communis L.
 Sin.: *Gladiolus byzantinus* Mill.
 Hierba. Introducida. 0-200 m.
 Países: ARG(BAI).

Gladiolus dalenii Van Geel
 Hierba. Introducida.
 Países: ARG(MIS).

Gladiolus tristis L.
 Hierba. Introducida. 0-200 m.
 Países: ARG(BAI).

Herbertia Sweet

Herbertia amabilis Deble & F.S. Alves
 Hierba. Endémica.
 Países: BRA(RGS).

Herbertia darwinii Roitman & A. Castillo
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Herbertia furcata (Klatt) Ravenna
 Sin.: *Calydorea furcata* (Klatt) Baker,
Herbertia crosae Roitman & A.
 Castillo, *Nemastylis furcata* Klatt

Hierba. Endémica. 0-300 m.
 Países: ARG(COS). BRA(RGS).
 URY(ART).

Herbertia guyunusae Deble
 Hierba. Endémica. 0-400 m.
 Países: BRA(RGS).

Herbertia lahue (Molina) Goldblatt subsp.
amoena (Griseb.) Goldblatt
 Sin.: *Alophia amoena* (Griseb.) Kuntze,
Alophia lahue (Molina) Espinosa
 subsp. *amoena* (Griseb.) Ravenna,
Herbertia amoena Griseb., *Trifurcia*
lahue (Molina) Goldblatt subsp.
amoena (Griseb.) Goldblatt
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
 ERI, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS,
 SCA). PRY(ITA, MIE, ÑEE).
 URY(MON).

Herbertia lahue (Molina) Goldblatt subsp.
lahue
 Sin.: *Alophia lahue* (Molina) Espinosa,
Ferraria lahue Molina, *Trifurcia lahue*
 (Molina) Goldblatt subsp. *lahue*
 Hierba. Endémica. 0-400 m.
 Países: ARG(RNE). CHL(VAL, LBO,
 MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, JFE).

Herbertia pulchella Sweet
 Sin.: *Alophia pulchella* (Sweet) Kuntze,
Herbertia amatorum C.H. Wright,
Trifurcia pulchella (Sweet) Ravenna
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS). URY(LAV).

Herbertia quareimana Ravenna
 Hierba. Endémica. 0-400 m.
 Países: ARG(COS). BRA(RGS).
 URY(ART).

Herbertia tigridioides (Hicken) Goldblatt
 Sin.: *Alophia tigridioides* Hicken, *Trifurcia*
tigridioides (Hicken) Goldblatt

- Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Herbertia zebrina** Deble
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Iris** L.
- Iris domestica** (L.) Goldblatt & Mabb.
Sin.: *Belamcanda chinensis* (L.) Redouté,
Ixia chinensis L., *Epidendrum domesticum* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(PAI).
- Iris germanica** L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(COR). CHL(JFE).
- Iris orientalis** Mill.
Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA).
- Iris pseudacorus** L.
Sin.: *Iris acoriformis* Boreau, *Iris bastardii*
Boreau, *Iris curtropetala* D. Delaroche
ex Redouté, *Iris lutea* Lam., *Iris paludosa* Pers.
Hierba palustre. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI).
CHL(LLA). URY(CAS, MON, ROC,
SJO, TYT).
- Iris unguicularis** Poir.
Hierba. Introducida. 800-900 m.
Países: ARG(COR).
- Kelissa** Ravenna
- Kelissa brasiliensis** (Baker) Ravenna
Sin.: *Alophia brasiliensis* (Baker) Kuntze,
Cypella brasiliensis (Baker) Roitman &
A. Castillo, *Herbertia brasiliensis*
Baker, *Trifurcia brasiliensis* (Baker)
Goldblatt
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Libertia** Spreng., nom. cons.
- Libertia chilensis** (Molina) Gunkel
Sin.: *Choeradodia chilensis* (Molina)
Herb., *Libertia chilensis* Klotzsch ex
Baker, nom. nud., *Libertia crassa*
Graham, *Libertia elegans* Poepp.,
Libertia formosa Graham, *Libertia formosa* Graham var. *crassa* (Graham)
Baker, *Libertia formosa* Graham var.
grandiflora (Phil.) Johow, *Libertia grandiflora* Phil., *Libertia insignis*
Ravenna, *Libertia umbellata* Ravenna,
Roterbe elegans Steud. ex Baker,
nom. nud., *Sisyrinchium fernandezianum* Steud. & Hochst. ex
Steud., nom. nud., *Strumaria chilensis*
Molina
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU,
BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).
- Libertia sessiliflora** (Poepp.) Skottsb.
Sin.: *Libertia caerulescens* Kunth & C.D.
Bouché, *Sisyrinchium caerulescens*
(Kunth & C.D. Bouché) F. Muell.,
Sisyrinchium huismo Dombey ex
Baker, nom. nud., *Sisyrinchium sessiliflorum* Poepp.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LSR, LLA).
- Libertia tricocca** Phil.
Sin.: *Libertia falcata* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
- Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA,
LSR, LLA).
- Mastigostyla** I.M. Johnst.
- Mastigostyla brachiandra** Ravenna
Hierba. Endémica. 3500- m.
Países: ARG(SAL).
- Mastigostyla cabreræ** R.C. Foster
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Mastigostyla coronata** Pozner
Hierba. Endémica. 3900-4000 m.
Países: ARG(JUU).
- Mastigostyla cyrtophylla** I.M. Johnst.
Sin.: *Cypella cyrtophylla* (I.M. Johnst.)
Diels
Hierba. Nativa. 2000-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Mastigostyla implicata** Ravenna
Hierba. Endémica. 3500-3600 m.
Países: ARG(JUU).
- Mastigostyla johnstonii** R.C. Foster
Hierba. Endémica. 3200-3600 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
- Mastigostyla mirabilis** Ravenna
Hierba. Endémica. 3500- m.
Países: ARG(TUC).
- Mastigostyla spathacea** (Griseb.)
Ravenna
Sin.: *Chlamydestylus spathaceus*
(Griseb.) Griseb., *Mastigostyla joergensenii* R.C. Foster, *Nemastylis spathacea* Griseb.
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC).

Misionella Deble**Misionella hauthalii** (Kuntze) Deble

Sin.: *Alophia hauthalii* Kuntze, *Cypella hauthalii* (Kuntze) R.C. Foster subsp. *hauthalii*, *Herbertia hauthalii* (Kuntze) K. Schum., *Trifurcia hauthalii* (Kuntze) Goldblatt
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). PRY(ITA, PAI).

Misionella opalina (Ravenna) Deble subsp. **minuticristata** (Chauveau & L. Eggers) Deble

Sin.: *Cypella hauthalii* (Kuntze) R.C. Foster subsp. *minuticristata* Chauveau & L. Eggers, *Cypella opalina* (Ravenna) Deble subsp. *minuticristata* (Chauveau & L. Eggers) Deble
 Hierba. Endémica. 200-600 m.
 Países: BRA(RGS).

Misionella opalina (Ravenna) Deble subsp. **opalina**

Sin.: *Cypella hauthalii* (Kuntze) R.C. Foster subsp. *opalina* Ravenna, *Cypella opalina* (Ravenna) Deble
 Hierba. Endémica. 0-400 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(ITA).

Neomarica Sprague**Neomarica caerulea** (Ker Gawl.) Sprague

Sin.: *Marica caerulea* Ker Gawl., *Trimezia caerulea* (Ker Gawl.) Ravenna
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA).

Neomarica candida (Hassl.) Sprague

Sin.: *Marica candida* Hassl., *Trimezia candida* (Hassl.) Ravenna
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, COA, GUA, PAI, SPE).

Neomarica glauca (Seub. ex Klatt) Sprague

Sin.: *Cypella glauca* Seub. ex Klatt, *Marica glauca* (Seub. ex Klatt) Baker
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(SCA).

Neomarica gracilis (Herb.) Sprague

Sin.: *Cypella gracilis* (Herb.) Klatt, *Marica gracilis* Herb.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(CAN, COA, PAI).

Neomarica imbricata (Hand.-Mazz.) Sprague

Sin.: *Marica imbricata* Hand.-Mazz., *Trimezia bauensis* Ravenna
 Hierba. Endémica. 500-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Neomarica latifolia (Ravenna) A. Gil

Sin.: *Trimezia latifolia*
 Hierba. Endémica. 900-1500 m.
 Países: BRA(PAR).

Neomarica northiana (Schneev.) Sprague

Sin.: *Moraea northiana* Schneev.
 Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Neomarica speciosa (Liebm.) A. Gil & Bittrich

Sin.: *Galathea speciosa* Liebm.
 Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Olsynium Raf.**Olsynium acaule** (Klatt) Goldblatt

Sin.: *Sisyrinchium acaule* Klatt
 Hierba. Endémica. 3600-4400 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Olsynium biflorum (Thunb.) Goldblatt

Sin.: *Galaxia narcissoides* (Cav.) Willd., *Gladiolus biflorus* Thunb., *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster, *Phaiophleps odoratissima* (Lindl.) Raf., *Phaiophleps patagonica* (Speg.) R.C. Foster, *Sisyrinchium narcissoides* Cav., *Sisyrinchium odoratissimum* Lindl., *Solenomelus biflorus* (Thunb.) Baker, *Symphystemon biflorus* (Thunb.) Dusén, *Symphystemon narcissoides* (Cav.) Miers ex Klatt, *Symphystemon patagonicum* Speg.
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Olsynium bodenbenderi (Kurtz) Goldblatt

Sin.: *Chamelum bodenbenderi* Kurtz, *Chamelum rubellum* Ravenna
 Hierba. Endémica. 500-2000 m.
 Países: ARG(MEN, NEU).

Olsynium chrysochromum J.M. Watson & A.R. Flores

Sin.: *Chamelum luteum* Phil., *Olsynium luteum* (Phil.) Goldblatt, hom. illeg.
 Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
 Países: CHL(COQ, RME).

Olsynium filifolium (Gaudich.) Goldblatt

Sin.: *Sisyrinchium filifolium* Gaudich., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex J. Presl subsp. *filifolium* (Gaudich.) Ravenna
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(SCR, TDF).
 Notas: Excluida de la flora de Chile (Rodríguez R. & Marticorena, 2001)

Olsynium frigidum Goldblatt

Sin.: *Chamelum andinum* (Phil.) Benth. & Hook., *Chamelum frigidum* Ravenna, *Sisyrinchium andinum* Phil., *Sisyrinchium frigidum* Poepp., nom. illeg., *Solenomelus andinus* (Phil.) Baker, *Solenomelus frigidus* Klatt, *Susarium andinum* (Phil.) Phil.
Hierba. Endémica. 1100-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **colchaguense** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores

Sin.: *Sisyrinchium colchaguense* Phil., *Sisyrinchium eleutherostemon* Phil., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *colchaguense* (Phil.) R. Rodr., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *colchaguense* (Phil.) Baker
Hierba. Endémica. 1500-2600 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **depauperatum** (Phil.) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrinchium depauperatum* Phil., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *depauperatum* (Phil.) R. Rodr.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. **junceum**

Sin.: *Olsynium argentinense* (Hauman) Ravenna, *Sisyrinchium argentinense* Hauman, *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl, *Sisyrinchium junciforme* Poepp., *Sisyrinchium middletonii* Baker, *Sisyrinchium pauciflorum* Phil., *Sisyrinchium roseum* Herb.

Hierba. Nativa. 200-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Olsynium lyckholmii (Dusén) Goldblatt

Sin.: *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster subsp. *lyckholmii* (Dusén) D.M. Moore, *Symphyostemon lyckholmii* Dusén
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Olsynium nicolae J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Endémica. 2000-2200 m.
Países: ARG(NEU).

Olsynium nigricans (Phil.) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Phaiophleps nigricans* (Phil.) R.C. Foster, *Sisyrinchium maulense* Ravenna, *Solenomelus nigricans* (Phil.) Baker, *Susarium nigricans* Phil., *Symphyostemon nigricans* (Phil.) Benth. ex Baker
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA).

Olsynium obscurum (Cav.) Goldblatt

Sin.: *Galaxia obscura* Cav., *Ona obscura* (Cav.) Ravenna, *Tapeinia obscura* (Cav.) D.M. Moore
Hierba. Endémica. 900- m.
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Olsynium philippii (Klatt) Goldblatt subsp. **illapelinum** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores

Sin.: *Sisyrinchium illapelinum* Phil., *Sisyrinchium philippii* Klatt subsp. *illapelinum* (Phil.) Rodr., *Sisyrinchium roseum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 2000-3200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Olsynium philippii (Klatt) Goldblatt subsp. **philippii**

Sin.: *Sisyrinchium philippii* Klatt, *Sisyrinchium scabrum* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Olsynium scirpoideum (Poepp.) Goldblatt subsp. **leucanthum** (Colla) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrinchium bifolium* Phil., *Sisyrinchium filiforme* Steud., nom. inval., *Sisyrinchium leucanthum* Colla, *Sisyrinchium nuno* Colla var. *leucanthum* (Colla) Baker, *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *leucanthum* (Colla) R. Rodr., *Sisyrinchium stenophyllum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

Olsynium scirpoideum (Poepp.) Goldblatt subsp. **luridum** (Ravenna) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrinchium luridum* Ravenna, *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *luridum* (Ravenna) R. Rodr.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO).

Olsynium scirpoideum (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpeum** (Phil.) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrinchium scirpeum* Phil., *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *scirpeum* (Phil.) R. Rodr., *Sisyrinchium stenopetalum* Phil.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(BIO).

Olsynium scirpoideum (Poepp.) Goldblatt subsp. **scirpoideum**

Sin.: *Sisyrinchium asperulum* Phil.,
Sisyrinchium berterianum Phil.,
Sisyrinchium floribundum Phil.,
Sisyrinchium gracile Phil.,
Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl var. *asperulum* (Phil.) Baker,
Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl var. *gracile* (Phil.) Baker,
Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl var. *scirpiforme* (Poepp.) Baker,
Sisyrinchium junciforme Poepp. var. *nivale* Phil., *Sisyrinchium nivale* Phil.,
Sisyrinchium nunna Steud.,
Sisyrinchium nuno Colla, *Sisyrinchium scirpiforme* Poepp., *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp., *Sisyrinchium strictum* Phil., nom. nud.
 Hierba. Endémica. 0-2300 m.
 Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
 Notas: Citada para Argentina (Goldblatt et al., 1990) sin indicar localidad o material de referencia.

Onira Ravenna

Onira unguiculata Baker ex Ravenna
 Sin.: *Cypella unguiculata* (Baker ex Ravenna) Roitman & A. Castillo,
Herbertia unguiculata Baker
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV, TAC).

Orthrosanthus Sweet

Orthrosanthus occissapungus (Ruiz ex Klatt) Diels
 Sin.: *Orthrosanthus chimboracensis* (Kunth) Baker subsp. *tunariensis* (Kuntze) Ravenna, *Orthrosanthus nigrorhynchus* Rusby, *Orthrosanthus*

tunariensis Kuntze, *Sisyrinchium occissapungum* Ruiz ex Klatt
 Hierba. Nativa. 3200-4000 m.
 Países: ARG(JUU, SAL).

Phalocallis Herb.

Phalocallis coelestis (Lehm.) Ravenna
 Sin.: *Cypella coelestis* (Lehm.) Diels, *Cypella plumbea* Lindl., *Marica coelestis* Lehm., *Phalocallis plumbea* (Lindl.) Herb., *Tigridia coelestis* Lehm.
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, MAL, RIV, ROC, TAC).

Phalocallis geniculata (Klatt) Ravenna
 Sin.: *Alophia geniculata* Klatt, *Cypella geniculata* (Klatt) Ravenna, *Sisyrinchium coeruleum* Vell.
 Hierba. Nativa. 1100-1500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Phalocallis oreophila (Speg.) Ravenna
 Sin.: *Cypella oreophila* Speg.
 Hierba. Nativa. 200-2800 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, BOQ, CAA, NAS).

Pseudotrimezia R.C. Foster

Pseudotrimezia juncifolia (Klatt) Lovo & A. Gil
 Sin.: *Lansbergia juncifolia* Klatt, *Trimezia juncifolia* (Klatt) Benth. & Hook. f.
 Hierba. Nativa. 500-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Romulea Maratti, nom. cons.

Romulea rosea (L.) Eckl.
 Sin.: *Calydorea chilensis* M. Muñoz, *Ixia rosea* L.
 Hierba. Introducida. 0-200 m.
 Países: ARG(BAI). CHL(VAL, MAU, BIO).
 Notas: Roitman et al. (2009: 292) comentan que esta especie se encontraría también asilvestrada en Uruguay.

Sisyrinchium L.

Sisyrinchium albilapidense Ravenna
 Hierba. Endémica. 900-1000 m.
 Países: BRA(SCA).

Sisyrinchium andinopatagonicum Ravenna
 Hierba. Endémica. 1500-1600 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Sisyrinchium annuum Ravenna
 Sin.: *Sisyrinchium annuum* Ravenna, nom. inval., *Sisyrinchium minus* Engelm. & A. Gray subsp. *everrucosum* Ravenna
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS).

Sisyrinchium arenarium Poepp. subsp. **adenostemon** (Phil.) Ravenna
 Sin.: *Sisyrinchium adenostemon* Phil., *Sisyrinchium pauperculum* Phil.
 Hierba. Endémica. 1000-3200 m.
 Países: ARG(MEN, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Sisyrinchium arenarium Poepp. subsp. **arenarium**
 Sin.: *Sisyrinchium adenostemon* Phil. subsp. *microspatum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium angustifolium* Phil., *Sisyrinchium antucense* Ravenna,

- Sisyrinchium arenarium* Poepp. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium breviamium* Ravenna, *Sisyrinchium flexuosum* Lindl., *Sisyrinchium limarinum* Ravenna, *Sisyrinchium microspathum* Phil., *Sisyrinchium multiflorum* Phil., *Sisyrinchium nervosum* Phil., *Sisyrinchium oligostachyum* Phil., *Sisyrinchium striatum* Sm. var. *microspathum* (Phil.) Speg. Hierba. Endémica. 0-2500 m. Países: ARG(CHA, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).
- Sisyrinchium avenaceum*** Klatt
Sin.: *Sisyrinchium aurantiacum* Griseb., *Sisyrinchium clarazii* Baker, *Sisyrinchium monostachyum* Baker Hierba. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, ERI, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(MON, PAY).
- Sisyrinchium azureum*** Phil.
Hierba. Nativa.
Países: CHL(ANT, ATA).
- Sisyrinchium balansae*** Baker
Sin.: *Sisyrinchium deflexum* R.C. Foster Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA).
Notas: Citada para Misiones, Argentina (Ravenna, 2003j) sin indicar ejemplar de referencia
- Sisyrinchium biflorum*** Griseb.
Hierba. Endémica. 2600-4000 m. Países: ARG(TUC).
- Sisyrinchium brasiliense*** (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Phaiophleps brasiliensis* Ravenna, *Sisyrinchium spicatum* Seub. ex Klatt, hom. illeg.
- Hierba. Endémica. 0-800 m. Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).
- Sisyrinchium brevipes*** Baker
Hierba. Nativa. 4000-4500 m. Países: ARG(JUU, TUC).
- Sisyrinchium bromelioides*** R.C. Foster subsp. ***angustus*** Ravenna Hierba. Endémica. 0-800 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS).
- Sisyrinchium bromelioides*** R.C. Foster subsp. ***bromelioides*** Hierba. Endémica. 0-800 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium caeteaenum*** Ravenna Hierba. Nativa. 1200-1300 m. Países: BRA(SCA).
- Sisyrinchium calathinum*** Ravenna Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: PRY(CAU, CAN, SPE).
- Sisyrinchium caratuense*** Inácio & E.D. Lozano Hierba. Endémica. 1600-1700 m. Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium chilense*** Hook. subsp. ***chilense***
Sin.: *Sisyrinchium arrayanicum* Ravenna, *Sisyrinchium graminifolium* Bertero ex Steud., *Sisyrinchium iridifolium* Kunth subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium micranthum* Cav. subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium ramosum* Herb. var. *chilense* (Hook.) Herb., *Sisyrinchium uniflorum* Gay ex Phil., *Sisyrinchium valdivianum* Phil., *Sisyrinchium vulgare* Herter Hierba. Nativa. 0-3700 m.
- Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME). PRY(CAA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, MON, TAC).
- Sisyrinchium chilense*** Hook. subsp. ***macranthum*** (Griseb.) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium macranthum* Griseb. Hierba. Endémica. 1500-3500 m. Países: ARG(CAT, COR).
- Sisyrinchium ciliolatum*** (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium vaginatum* Spreng. subsp. *ciliolatum* Ravenna Hierba. Endémica. 0-200 m. Países: ARG(COS, ERI).
- Sisyrinchium claritae*** Herter Hierba. Endémica. 400-500 m. Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(LAV, ROC).
- Sisyrinchium coalitum*** Ravenna Hierba. Endémica. 800-900 m. Países: BRA(SCA).
- Sisyrinchium commutatum*** Klatt subsp. ***capillare*** (Baker) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium capillare* Baker Hierba. Nativa. Países: BRA(RGS).
- Sisyrinchium commutatum*** Klatt subsp. ***commutatum***
Sin.: *Sisyrinchium secundiflorum* Klatt Hierba. Nativa. 0-1700 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CLA).

Sisyrinchium congestum Klatt
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sisyrinchium cuspidatum Poepp.
Sin.: *Sisyrinchium adenocarpum* Steud.,
Sisyrinchium convallium Ravenna,
Sisyrinchium flexuosum Phil.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Sisyrinchium cylindrocarpum Herter
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY.

Sisyrinchium dasyspathum (Ravenna)
Ravenna subsp. **dasyspathum**
Sin.: *Sisyrinchium hirsutum* Baker subsp.
dasyspathum Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(ITA, PAI).

Sisyrinchium dasyspathum (Ravenna)
Ravenna subsp. **glabrum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS).

Sisyrinchium decumbens Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium antemeridianum* Aita &
L. Eggers
Hierba. Endémica. 1000-1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Sisyrinchium densiflorum Ravenna
Hierba. Endémica. 900-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sisyrinchium deseadense Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CHU, SCR).

Sisyrinchium diversicarpum Inácio & L.
Eggers

Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Sisyrinchium elegantulum Ravenna
Hierba. Endémica. 700-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Sisyrinchium eserrulatum I.M. Johnst.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Sisyrinchium exilifolium Ravenna
Hierba. Endémica. 1600-1700 m.
Países: ARG(MEN).

Sisyrinchium fasciculatum Klatt
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(CAU, CAA, CAN, COA, PAI,
SPE).

Sisyrinchium fiebrigii I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAA, CAN,
COA, PAI).

Notas: Citada para Misiones, Argentina
(Ravenna, 2003j) sin indicar ejemplar
de referencia

Sisyrinchium flabellatum Aita & L.
Eggers
Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(RGS).

Sisyrinchium foliosum I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, TUC).
BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PAI).

Sisyrinchium glaziovii Baker
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Sisyrinchium graminifolium Lindl.
Sin.: *Echthronema graminifolia* (Lindl.)
Herb., *Echthronema maculata* (Hook.)

Herb., *Echthronema pumila* (Lindl.)
Herb., *Sisyrinchium ascendens*
Poepp., *Sisyrinchium dasycarpum*
Phil., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl.
subsp. *luteum* (Bertero ex Steud.) R.
Rodr., comb. illeg., *Sisyrinchium*
graminifolium Lindl. var. *ascendens*
(Poepp.) Baker, *Sisyrinchium*
graminifolium Lindl. var. *maculatum*
(Hook.) Klatt, *Sisyrinchium*
graminifolium Lindl. var. *pumilum*
Lindl., *Sisyrinchium gratissimum*
Ravenna, *Sisyrinchium guttatum*
Moris, *Sisyrinchium luteum* Bertero ex
Steud., nom. nud., *Sisyrinchium*
maculatum Hook., *Sisyrinchium*
maipoanum Ravenna, *Sisyrinchium*
majale Link, *Sisyrinchium orbiculatum*
Ravenna, *Sisyrinchium piligerum* Phil.,
Sisyrinchium pymaeum Klotzsch ex
Klatt, nom. nud., *Sisyrinchium tingens*
Steud., *Sisyrinchium tofoense*
Ravenna, *Sisyrinchium valparadiseum*
Ravenna, *Sisyrinchium vestitum*
Ravenna, *Sisyrinchium volckmannii*
Phil.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(RNE, TDF). CHL(ANT,
ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, RME).

Sisyrinchium hasslerianum Baker
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN,
CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI,
SPE).

Sisyrinchium hirsutum Baker
Sin.: *Sisyrinchium gilbertii* Kraenzl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, SPE).

- Sisyrinchium hoehnei** I.M. Johnst.
Sin.: *Sisyrinchium fasciculatum* Klatt
subsp. *hoehnei* (I.M. Johnst.)
Ravenna
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, MIE).
- Sisyrinchium humahuacense** C.A. Zanotti
Hierba. Endémica. 3900-4200 m.
Países: ARG(JUJ).
- Sisyrinchium humile** Phil.
Sin.: *Sisyrinchium macrocarpum* Hieron.
subsp. *laetum* Ravenna, *Sisyrinchium papillosum* R.C. Foster
Hierba. Endémica. 400-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
- Sisyrinchium hypsophilum** I.M. Johnst.
ex R.C. Foster
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
- Sisyrinchium igatimiense** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CON).
- Sisyrinchium iguazuenum** Inácio, L. Eggers & Chauveau
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
- Sisyrinchium jamesonii** Baker
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, SAL).
- Sisyrinchium latiusculum** Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: ARG(MIS).
- Sisyrinchium luzula** Klotzsch ex Klatt
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
- Sisyrinchium macrocarpum** Hieron.
Hierba. Endémica. 1800-2700 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, RNE, SJU).
- Sisyrinchium marchioides** Ravenna
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGC, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, ITA, PAI, PHA).
- Sisyrinchium megapotamicum** Malme
Sin.: *Sisyrinchium gracile* Klotzsch ex Baker, hom. illeg., *Sisyrinchium obconicum* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, SOR).
- Sisyrinchium micranthum** Cav.
Sin.: *Sisyrinchium laxum* Otto ex Sims, *Sisyrinchium metae* Herter, *Sisyrinchium schottii* Herter
Hierba. Nativa. 0-2900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, RNE, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MON, ROC, SJO).
- Sisyrinchium minus** Engelm. & A. Gray
subsp. *minus*
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI). BRA(RGS, SCA). PRY(ITA). URY(PAY, SJO).
- Sisyrinchium minutiflorum** Klatt
Hierba. Endémica. 0-800 m.
- Sisyrinchium nanum** Phil.
Sin.: *Sisyrinchium graminifolium* Lindl.
subsp. *nanum* (Phil.) Ravenna
Hierba. Endémica. 700-2300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, LLA, AIS, MAG).
- Sisyrinchium nembyense** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS). PRY(CEN, COA).
- Sisyrinchium nidulare** (Hand.-Mazz.) I.M. Johnst.
Sin.: *Sisyrinchium palmifolium* L. var. *nidulare* Hand.-Mazz.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Sisyrinchium ostenianum** Beauverd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, CLA, MON, SJO, TAC).
- Sisyrinchium oxyspathum** Ravenna
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, GUA).
- Sisyrinchium pachyrhizum** Baker subsp. *columellosum* Ravenna
Hierba. Nativa. 3000-3800 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
- Sisyrinchium pachyrhizum** Baker subsp. *pachyrhizum*
Sin.: *Sisyrinchium chilense* Hook. var. *exaltatum* (Kuntze) Hicken, *Sisyrinchium exaltatum* (Klatt) Herter, *Sisyrinchium glandulosum* Kraenzl., *Sisyrinchium johnstonii* Roseng.,

- Sisyrinchium pachyrhizum* Baker f. *cyaneum* Ravenna, *Sisyrinchium pachyrhizum* Baker subsp. *pertenue* Ravenna, *Sisyrinchium scabrum* Cham. & Schltdl. var. *exaltatum* Klatt
Hierba. Nativa. 0-3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).
- Sisyrinchium pachyrhizum*** Baker subsp. ***procerum*** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI).
- Sisyrinchium palmifolium*** L. subsp. ***fuscoviride*** (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium macrocephalum* Graham subsp. *fuscoviride* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(CAU).
- Sisyrinchium palmifolium*** L. subsp. ***palmifolium***
Sin.: *Sisyrinchium altissimum* Ten., *Sisyrinchium grande* Baker, *Sisyrinchium macrocephalum* Graham, *Sisyrinchium macrocephalum* Graham subsp. *giganteum* Ravenna, *Sisyrinchium marginatum* Klatt
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, GUA, ITA, SPE). URY(CLA, FLA, MAL, RNO, SJO).
- Sisyrinchium pampeanum*** Inácio & L. Eggers
Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART).
- Sisyrinchium patagonicum*** Phil. ex Baker
Sin.: *Sisyrinchium inclinatum* Ravenna, *Sisyrinchium lechleri* Phil., *Sisyrinchium nudicaule* Phil., *Sisyrinchium palenae* Phil., *Sisyrinchium rahmeri* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).
- Sisyrinchium paucispathum*** Ravenna
Hierba. Endémica. 300-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
- Sisyrinchium pearcei*** Phil.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).
- Sisyrinchium pendulum*** Ravenna
Hierba. Endémica. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium pictum*** Kraenzl.
Sin.: *Sisyrinchium laterale* Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN, COA, SPE).
- Sisyrinchium platense*** I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, MIE). URY(CAS, CLA, MON, PAY, SJO, SOR).
- Sisyrinchium platycaule*** Baker
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).
- Sisyrinchium plicatulum*** Ravenna
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
- Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).
- Sisyrinchium purpurellum*** Ravenna
Hierba. Endémica. 700-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium rambonis*** R.C. Foster
Hierba. Nativa. 700-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium rectilineum*** Ravenna
Hierba. Nativa. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium reitzii*** R.C. Foster
Hierba. Nativa. 200-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAN).
- Sisyrinchium restioides*** Spreng.
Sin.: *Sisyrinchium vaginatum* Spreng. subsp. *restioides* (Spreng.) Beauverd
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, SPE). URY(LAV, RIV).
- Sisyrinchium rigidifolium*** Baker
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUJ).
- Sisyrinchium rosengurtii*** I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, FLA, MAL).
- Sisyrinchium scalarium*** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS).
- Sisyrinchium scariosum*** I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, FLA,

- LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, TAC).
- Sisyrinchium sectiandrum** Inácio & L. Eggers
Hierba. Endémica. 700-1300 m.
Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium sellowianum** Klatt
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA). URY(DUR, MON, SJO).
- Sisyrinchium setaceum** Klatt
Sin.: *Sisyrinchium humidum* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, MIS, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium sinuosum** Ravenna
Hierba. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(CAU, CAN).
- Sisyrinchium soboliferum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, PAI).
- Sisyrinchium somuncurense** Ravenna
Hierba. Endémica. 2000- m.
Países: ARG(RNE).
- Sisyrinchium striatum** Sm.
Sin.: *Bermudiana striata* (Sm.) Moench, *Marica striata* (Sm.) Ker Gawl., *Moraea sertula* Jacq., *Paneguia striata* (Sm.) Raf., *Sisyrinchium bracteosum* Phil., *Sisyrinchium laevigatum* Ravenna, *Sisyrinchium libertioides* Steud., *Sisyrinchium lutescens* Lodd., *Sisyrinchium nigricans* Gay, *Sisyrinchium spicatum* Cav.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
- Países: ARG(CHU, MEN). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Sisyrinchium subnudum** I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, AMA, PAI).
- Sisyrinchium subtile** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).
- Sisyrinchium tafiense** Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: ARG(TUC).
- Sisyrinchium teleanthum** Ravenna
Hierba. Endémica. 1100-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Sisyrinchium tinctorium** Kunth
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
- Sisyrinchium trichospatum** (Ravenna) Inácio & L. Eggers
Sin.: *Sisyrinchium purpurellum* Ravenna subsp. *trichospathum* Ravenna
Hierba. Endémica. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium trinerve** Baker
Sin.: *Olsynium trinerve* (Baker) R. Rodr. & Martic.
Hierba. Nativa. 2500-4100 m.
Países: CHL(TAR).
- Sisyrinchium tucumanum** Ravenna
Hierba. Endémica. 500-1300 m.
Países: ARG(TUC).
- Sisyrinchium uliginosum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium unguiculatum** Griseb.
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SJO, SLU, TUC).
- Sisyrinchium vaginatum** Spreng. subsp. **marchio** (Vell.) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium marchio* (Vell.) Steud., *Souza marchio* Vell.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(RGS). PRY(CAN).
- Sisyrinchium vaginatum** Spreng. subsp. **vaginatum**
Sin.: *Sisyrinchium alatum* Hook., *Sisyrinchium distantiflorum* Kraenzl., *Sisyrinchium incurvatum* Gardner, *Sisyrinchium parvifolium* Baker
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, COL, MON, PAY, RIV, SJO).
- Sisyrinchium weirii** Baker
Hierba. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN).
- Sisyrinchium wettsteinii** Hand.-Mazz.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, SPE).
- Solenomelus** Miers
- Solenomelus pedunculatus** (Gillies ex Hook.) Hochr.
Sin.: *Sisyrinchium longistylum* Lem., *Sisyrinchium pedunculatum* Gillies ex

Hook., *Sisyrinchium scabriusculum*
Steud., *Solenomelus chilensis* Miers
Hierba. Endémica. 0-1900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Solenomelus segethii (Phil.) Kuntze

Sin.: *Lechlera sisyrinchium* Griseb., nom.
nud., *Sisyrinchium segethii* Phil.,
Solenomelus lechleri Baker,
Solenomelus sisyrinchium (Griseb.)
Pax, nom. illeg., *Susarium segethii*
(Phil.) Phil., *Symphyostemon segethii*
(Phil.) Macloskie
Hierba. Endémica. 0-2700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Sparaxis Ker Gawl.

Sparaxis bulbifera (L.) Ker Gawl.

Sin.: *Ixia bulbifera* L.
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

Sparaxis tricolor (Schneev.) Ker Gawl.

Sin.: *Ixia tricolor* Schneev.
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

Tapeinia Comm. ex Juss.

Tapeinia pumila (G. Forst.) Baill.

Sin.: *Ixia magellanica* Lam., *Ixia pumila* G.
Forst., *Moraea magellanica* (Lam.)
Willd., *Sisyrinchium pumilum* (G.
Forst.) Hook., *Tapeinia magellanica*
(Lam.) Ker Gawl., *Witsenia*
magellanica (Lam.) Pers., *Witsenia*
pumila (G. Forst.) Vahl
Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LSR,
LLA, AIS, MAG).

Tigridia Juss.

Tigridia philippiana I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Tigridia riedemanniae Aldunate, Muñoz-

Schick & V. Morales
Hierba. Nativa. 2600-3700 m.
Países: CHL(AYP).

Trimezia Salisb. ex Herb.

Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb.

Sin.: *Iris martinicensis* Jacq.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Trimezia rotundata Ravenna

Sin.: *Neomarica rotundata* (Ravenna)
Chukr
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Trimezia spathata (Klatt) Baker

Sin.: *Anomalostylus coriifolius* (Baker ex
Chodat & Hassl.) R.C. Foster,
Anomalostylus crateriformis R.C.
Foster, *Anomalostylus grandis*
(Kraenzl.) R.C. Foster, *Cypella*
coriifolia Baker, *Cypella grandis*
Kraenzl., *Lansbergia spathata* Klatt,
Marica martii Baker, *Neomarica martii*
(Baker) Sprague, *Trimezia martii*
(Baker) R.C. Foster, *Trimezia spathata*
(Klatt) Baker subsp. *grandis* (Kraenzl.)
Ravenna, *Trimezia spathata* (Klatt)
Baker subsp. *martii* (Baker) Ravenna
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA,
CAN, CEN, CON, GUA, ITA, PAI,
SPE).

Watsonia Mill.

Watsonia borbonica (Pourr.) Goldblatt
subsp. **ardernei** (Sander) Goldblatt

Sin.: *Watsonia ardernei* Sander
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

JUGLANDACEAE

Carya Nutt., nom. cons.

Carya illinoensis (Wangenh.) C. Koch

Sin.: *Juglans illinoensis* Wangenh.
Árbol. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA).

Juglans L.

Juglans australis Griseb.

Sin.: *Juglans brasiliensis* Dode
Árbol. Nativa. 600-1900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Pterocarya Kunth

Pterocarya stenoptera C. DC.

Árbol. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

JUNCACEAE

Distichia Nees & Meyen, nom. cons.

Distichia filamentosa Buchenau

Sin.: *Agapatea filamentosa* Buchenau, nom. nud., *Distichia filamentosa* (Buchenau) Griseb., nom. inval.

Hierba. Nativa. 3500-4700 m.

Países: CHL(AYP).

Distichia muscoides Nees & Meyen

Hierba. Nativa. 3600-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Juncus L.

Juncus acuminatus Michx.

Sin.: *Juncus acuminatus* Michx. var. *multiceps* (Kunze ex Kunth) Barros, *Juncus multiceps* Kuntze ex Kunth

Hierba. Nativa.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Juncus acutus L. var. **decompositus** Guss.

Hierba. Endémica. 600.

Países: CHL(ANT, COQ).

Juncus acutus L. subsp. **leopoldii** (Parl.) Snogerup

Sin.: *Juncus acutus* L. var. *leopoldii* (Parl.) Buchenau, *Juncus leopoldii* Parl.

Hierba. Nativa. 900-2400 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LLA, RME). URY(MON).

Juncus andersonii Buchenau

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: URY(MON).

Juncus articulatus L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE).

Juncus austrobrasiliensis Balslev

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Juncus balticus Willd. subsp. **andicola** (Hook.) Snogerup

Sin.: *Juncus andicola* Hook., *Juncus arcticus* Willd. var. *andicola* (Hook.) Balslev, *Juncus balticus* Willd. var. *pictus* (Phil.) Griseb., *Juncus conceptionis* Steud., *Juncus deserticola* Phil., *Juncus pictus* Phil.

Hierba. Nativa. 0-4100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, BIO, LSR, LLA, RME).

Juncus balticus Willd. subsp. **mexicanus** (Willd. ex Roem. & Schult.) Snogerup

Sin.: *Juncus arcticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Balslev, *Juncus balticus* Willd. var. *columnaris* Buchenau, *Juncus balticus* Willd. var. *crassiculmis* Buchenau ex Griseb., *Juncus balticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd. ex Schult. & Schult. f.) Kuntze, *Juncus crassiculmis* (Buchenau) Herter, *Juncus mexicanus* Willd. ex Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-3900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Juncus brasiliensis Breistr.

Sin.: *Juncus ustulatus* Buchenau, hom. illeg.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Juncus bufonius L. var. **bufonius**

Sin.: *Juncus bufonius* L. var. *congestus* Wahlb., *Juncus bufonius* L. var. *genuinus* Cout., nom. inval., *Juncus bufonius* L. var. *pumilio* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-4100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, MON).

Juncus bufonius L. var. **condensatus** Cout.

Sin.: *Juncus bufonius* L. var. *halophilus* Fernald & Buchenau

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, SCR, TUC). URY(MON).

Juncus bulbosus L.

Sin.: *Juncus supinus* Moench

Hierba. Introducida. 100-300 m.

Países: CHL(LLA).

Juncus burkartii Barros

Hierba. Endémica.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Juncus capillaceus Lam.

Sin.: *Juncus capillaceus* Lam. var. *montevicensis* Buchenau, *Juncus tenuifolius* Steud.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LRI, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LSR, LLA, JFE). URY(COL, FLA, MON).

Juncus capitatus Weigel

Hierba. Introducida. 200.

Países: BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA). URY(MAL, ROC, TYT).

Notas: Cita dudosa para Argentina (cfr. Novara 2008: 24)

Juncus cordobensis Barros

Sin.: *Juncus arequipensis* Balslev, *Juncus cordobensis* Barros, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, TUC). BRA(RGS).

Notas: Citada para Paraguay y Uruguay (Novara 2008: 12) sin indicar localidad o material de referencia.

Juncus cyperoides Laharpe

Sin.: *Juncus graminifolius* E. Mey., *Juncus rivularis* Poepp. ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Juncus debilis A. Gray, nom. cons.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(SCA).

Juncus densiflorus Kunth

Sin.: *Juncus densiflorus* Kunth var. *pohlil* (Steud.) Buchenau, *Juncus pohlil* Steud.

Hierba palustre. Nativa. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(FLA).

Juncus dichotomus Elliot

Sin.: *Juncus cognatus* Kunth, *Juncus tenuis* A. Gray, hom. illeg., *Juncus tenuis* Willd. var. *dichotomus* (Elliott) Wood

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, NEU, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). PRY(GUA). URY(MON).

Juncus diemii Barros

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, LLA).

Juncus effusus L. var. **effusus**

Sin.: *Juncus bogotensis* Kunth, *Juncus conglomeratus* L.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, RNE, SAL, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS). URY(CLA).

Juncus effusus L. var. **subglomeratus** DC.

Sin.: *Juncus effusus* L. var. *compactus* Lej. & Courtois

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: CHL(LLA, AIS).

Juncus ernesti-barrosii Barros

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO).

Juncus filiformis L.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Notas: Cita dudosa para Argentina (cfr. Novara 2008: 24)

Juncus homalocaulis F. Muell. ex Benth.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(IPA).

Juncus imbricatus Laharpe

Sin.: *Juncus capillaceus* Lam. var. *chilensis* Buchenau, *Juncus chamissonis* Kunth, *Juncus chamissonis* Kunth f. *pusillus* Buchenau, *Juncus collinus* Steud., *Juncus imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau, *Juncus imbricatus* Laharpe var. *lechleri* (Steud.) Buchenau, *Juncus lechleri* Steud., *Juncus multiflorus* Bertero ex Steud., *Juncus spanianthus* Steud., *Juncus urvillei* Steud.

Hierba. Nativa. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). URY(COL, FLA, MON, SOR).

Juncus kleinii Barros

Hierba. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Juncus kraussii Hochst.

Sin.: *Juncus austerus* Buchenau, *Juncus kraussii* Hochst. subsp. *austerus* (Buchenau) Snogerup

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA). CHL(LLA). URY(MON).

Juncus llanquihuensis Barros

Sin.: *Juncus mendocinus* Barros

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN). CHL(LLA).

Juncus marginatus Rostk.

Sin.: *Juncus aristulatus* Michx., *Juncus buchenau* Sved., *Juncus canaliculatus* Liebm., *Juncus marginatus* Rostk. var. *aristulatus* (Michx.) Coville, *Luzula juncoides* Poir.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, PAI, SPE). URY(MAL, MON, SJO).

Juncus micranthus Schrad. ex E. Mey., nom. cons.

Sin.: *Juncus meridionalis* (Buchenau) Herter, *Juncus scirpoides* Lam. var. *macrostemon* Gay, *Juncus scirpoides* Lam. var. *meridionalis* Buchenau

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, MIE, PAI). URY(FLA, ROC).

Juncus microcephalus Kunth

Sin.: *Juncus floribundus* Kunth, *Juncus floribundus* Phil., nom. illeg., *Juncus involucratus* Steud. ex Buchenau, *Juncus luzuloxiphium* Griseb., *Juncus microcephalus* Kunth f. *conglobatus* Barros, *Juncus microcephalus* Kunth var. *floribundus* (Kunth) Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *intermedius* Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *Juncus microcephalus* Kunth var. *virens* Griseb., *Juncus rudis* Kunth, *Juncus sellowianus* Kunth, *Juncus timotensis* Barros

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). PRY(CAU, CEN, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR, TYT).

Juncus occidentalis (Coville) Wiegand

Sin.: *Juncus tenuis* Willd. var. *congestus* Engelm., *Juncus tenuis* Willd. var. *occidentalis* Coville

Hierba. Nativa.

Países: ARG(SLU, SFE). CHL(MAU, RME).

Juncus pallescens Lam. var. **achalensis** (Barros) Novara

Sin.: *Juncus achalensis* Barros, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *achalensis* (Barros) Novara, *Juncus pallescens* Lam. var. *achalensis* (Barros) Novara, comb. superfl.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Juncus pallescens Lam. var. **pallescens**

Sin.: *Juncus commixtus* Steud., *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe, *Juncus*

dombeyanus J. Gay ex Laharpe var. *elatus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *pyncanthus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *Juncus fernandezianus* Steud., *Juncus longifolius* Steud., *Juncus megakoleos* Steud., *Juncus proximus* Steud.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE). PRY(CEN). URY(FLO, FLA, PAY, ROC).

Juncus planifolius R. Br.

Sin.: *Juncus demissus* Steud., *Juncus homalophyllus* Steud., *Juncus planifolius* R. Br. var. *demissus* (Steud.) Buchenau, *Juncus xantholepis* Steud.

Hierba. Introducida. 0-1300 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, JFE).

Notas: Cita dudosa para la flora Argentina (cfr. Barros 1953; Novara 2008)

Juncus procerus E. Mey.

Sin.: *Juncus valdiviae* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Juncus ramboi Barros

Sin.: *Juncus ramboi* Barros f. *explicatus* Barros

Hierba. Endémica. 900-1600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Juncus scheuchzerioides Gaudich.

Sin.: *Juncus capillaceus* Hook., hom. illeg., *Juncus exiguus* Gaudich. ex Hook. f., *Juncus inconspicuus* d'Urv., *Juncus*

scheuchzerioides Gaudich. var. *inconspicuus* (d'Urv.) Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Juncus stipulatus Nees & Meyen

Sin.: *Juncus biflorus* Phil., hom. illeg., *Juncus chilensis* Gay, *Juncus corralensis* Phil., *Juncus depauperatus* Phil., *Juncus gayanus* Steud., *Juncus mandonii* Buchenau, *Juncus microcephalus* Kunth var. *pusillus* E. Mey., *Juncus oliganthus* Phil., *Juncus stipulatus* Nees & Meyen var. *corralensis* (Phil.) Buchenau

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TDF, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Juncus tenuis Willd. var. **tenuis**

Sin.: *Juncus smithii* Kunth, *Juncus subtenius* Herter, *Juncus tenuis* Willd. var. *multicornis* E. Mey., *Juncus tenuis* Willd. var. *williamsii* Fernald

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, LLA). PRY(CEN, ITA, ÑEE). URY.

Juncus uruguensis Griseb.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SAL, SFE). URY(FLA, MON).

Juncus venturianus Castillón

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN). URY(MON).

Luzula DC., nom. cons.**Luzula alopecurus** Desv.Sin.: *Juncodes alopecurus* (Desv.)Kuntze, *Juncoides alopecurum* (Desv.)Macloskie, *Luzula villosa* Wikstr.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Luzula antarctica Hook. f.Sin.: *Juncodes antarcticus* (Hook. f.)Kuntze, *Juncoides antarcticum* (Hook. f.)

Macloskie

Hierba. Endémica. 300-1000 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Luzula brachyphylla Phil.Sin.: *Juncoides patagonicum* (Speg.)Macloskie, *Luzula chilensis* Nees &Meyen ex Kunth f. *frequentior* Barros,*Luzula corraeae* Barros, *Luzula patagonica*Speg., *Luzula racemosa* Desv. f.*brachyphylla* (Phil.) Fuentes

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Luzula campestris (L.) DC.Sin.: *Juncodes campestre* (L.) Kuntze,*Juncus campestris* L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAU, BIO, LLA, MAG).

Luzula chilensis Nees & Meyen ex KunthSin.: *Juncodes chilense* (Nees & Meyenex Kunth) Kuntze, *Luzula chilensis* Nees &Meyen ex Kunth f. *longifolia* Barros,*Luzula chilensis* Nees & Meyen ex Kunthf. *rigida* (Phil.) Fuentes, *Luzula rigida* Phil.

Hierba. Endémica. 400-3300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Luzula excelsa BuchenauSin.: *Juncodes excelsum* (Buchenau)Kuntze, *Juncodes hieronymi* (Buchenau &Griseb.) Kuntze, *Luzula castellanosi*Barros, *Luzula hieronymi* Buchenau &Griseb., *Luzula hieronymi* Buchenau &Griseb. f. *bonariensis* Barros, *Luzula**hieronymi* Buchenau & Griseb. f. *pusilla*(Castillón) Novara, *Luzula hieronymi*Buchenau & Griseb. var. *pusilla* Castillón

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SLU, TUC). CHL(MAU, ARA, AIS, MAG).

Luzula leiboldii BuchenauSin.: *Juncodes leiboldii* (Buchenau)

Kuntze

Hierba. Endémica. 100-1200 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, MAU, BIO, RME).

Luzula masafuerana Skottsbo.

Hierba. Endémica. 900-1400 m.

Países: CHL(JFE).

Luzula mendocina Barros

Hierba. Endémica. 600-3000 m.

Países: ARG(BAI, COR, MEN, NEU, SLU).

Luzula ostenii (Mattf.) HerterSin.: *Luzula campestris* (L.) DC. var.*ostenii* Mattf.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(FLA, LAV, MAL).

Luzula parvula Barros

Hierba. Endémica. 3300-3400 m.

Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Luzula peruviana Desv.Sin.: *Juncodes boliviensis* (Buchenau)Kuntze, *Juncoides peruviana* (Desv.)Kuntze, *Luzula boliviensis* Buchenau,*Luzula peruviana* Desv. var. *longispica* Barros

Hierba. Nativa. 3600-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Luzula pumila Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Luzula racemosa Desv.Sin.: *Juncodes racemosum* (Desv.)Kuntze, *Juncoides macusaniensis*(Buchenau) Kuntze, *Luzula humilis*Buchenau, *Luzula macusaniensis* Steud.ex Buchenau, *Luzula racemosa* Desv. f.*humilis* (Buchenau) Buchenau, *Luzula**racemosa* Desv. var. *humilis* (Buchenau)R.E. Fr., *Luzula racemosa* Desv. var.*traversii* Buchenau, *Luzula racemosa*Desv. var. *typica* Buchenau

Hierba. Nativa. 1500-4700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Luzula ruiz-lealii Barros

Hierba. Endémica. 3000-3200 m.

Países: ARG(CHU, MEN).

Luzula tristachya Desv.Sin.: *Luzula campestris* (L.) DC. var.*tristachya* (Desv.) Buchenau, *Luzula**pauciflora* Phil.

Hierba. Endémica. 100-600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA).

Luzula ulei BuchenauSin.: *Luzula campestris* (L.) DC. var. *ulei*

(Buchenau) Barros

Hierba. Nativa. 1200-2200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Marsippospermum Desv.

Marsippospermum grandiflorum (L. f.)
Hook. f.

Sin.: *Juncus grandiflorus* L. f.,
Marsippospermum calyculatum Desv.,
nom. illeg., *Rostkovia grandiflora* (L. f.)
Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Marsippospermum philippii (Buchenau)
Hauman

Sin.: *Marsippospermum grandiflorum* (L.
f.) Hook. f. var. *philippii* Buchenau,
Rostkovia gracilis Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO,
ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Marsippospermum reichei Buchenau

Sin.: *Rostkovia reichei* (Buchenau)
Hosseus

Hierba. Endémica. 500-1100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Oxychloe Phil.

Oxychloe andina Phil.

Sin.: *Distichia andina* (Phil.) Benth. &
Hook.

Hierba. Nativa. 3200-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,
RME).

Oxychloe bisexualis Kuntze

Sin.: *Andesia bisexualis* (Kuntze) Hauman

Hierba. Endémica. 2800-4400 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,
VAL, RME).

Oxychloe castellanosi Barros

Sin.: *Oxychloe simulans* Barros

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Oxychloe haumaniana (Barros) Barros

Sin.: *Andesia haumaniana* Barros

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA,
COQ).

Oxychloe mendocina Barros

Sin.: *Oxychloe mendocina* Barros, nom.
illeg.

Hierba. Endémica. 2800-3500 m.

Países: ARG(MEN).

Patosia Buchenau

Patosia clandestina (Phil.) Buchenau

Sin.: *Distichia clandestina* (Phil.)
Buchenau, *Oxychloe brevifolia* (Phil.)
Buchenau, *Oxychloe clandestina* (Phil.)
Hauman, *Patosia clandestina* (Phil.)
Buchenau var. *tucumanensis* (Castillón)
Barros, *Patosia tucumanensis* Castillón,
Rostkovia brevifolia Phil., *Rostkovia*
clandestina Phil.

Hierba. Nativa. 2700-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, NEU,
SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ,
VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Rostkovia Desv.

Rostkovia magellanica (Lam.) Hook. f.

Sin.: *Juncus magellanicus* Lam.,
Rostkovia magellanica (Lam.) Hook. f. f.
pumila Albov, *Rostkovia sphaerocarpa*
Desv.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

JUNCAGINACEAE

Tetroncium Willd.

Tetroncium magellanicum Willd.

Sin.: *Triglochin magellanica* Vahl ex
Kunth, nom. inval., *Triglochin reflexa* Vahl
ex Kunth, nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(NEU, SCR, TDF).
CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Triglochin L.

Triglochin maritima L.

Sin.: *Triglochin concinna* Burt Davy,
Triglochin maritima L. var. *altoandina*
Cabrera, *Triglochin maritima* L. var.
deserticola Buchenau, hom. illeg.,
Triglochin maritima L. var. *deserticola*
Phil., *Triglochin monanthos* Speg.

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LRI,
MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TDF).
CHL(TAR, ANT, ATA, VAL, MAG).

Triglochin palustris L.

Sin.: *Triglochin andina* Phil., *Triglochin*
fonticola Phil.

Hierba. Cosmopolita. 0-3900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, MEN,
RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC).
CHL(ANT, ATA, COQ, MAU, LLA, MAG,
RME).

Triglochin scilloides (Poir.) Mering &
Kadereit

Sin.: *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman,
Lilaea subulata Bonpl., *Phalangium*
scilloides Poir.

Hierba. Nativa. 0-4100 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,
ERI, LRI, RNE, SAL). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(MAU, ARA, LLA, AIS, MAG,
RME). URY(CAS, FLA, MAL, MON, SJO,
SOR).

Triglochin striata Ruiz & Pav.

Sin.: *Triglochin lechleri* Steud., *Triglochin litorea* Phil., *Triglochin montevidensis* Spreng., *Triglochin striata* Ruiz & Pav. var. *filifolia* Buchenau, *Triglochin striata* Ruiz & Pav. var. *montevidensis* (Spreng.) Buchenau, *Triglochin volkmannii* Phil.

Hierba. Cosmopolita. 0-3400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, ERI, MEN, RNE, SJU, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME). URY(CAS, COL, FLA, MON, ROC).

KRAMERIACEAE**Krameria** L. ex Loefl.**Krameria cistoidea** Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Krameria grandiflora A. St.-Hil.

Sin.: *Krameria didymandra* Turcz., *Krameria latifolia* Moric., *Krameria ruscifolia* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 100-200 m.

Países: BRA(RGS). PRY(AMA).

Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson

Sin.: *Krameria canescens* Willd. ex Schult., *Krameria iluca* Phil., *Krameria linearis* Poir., nom. illeg., *Krameria pentapetala* Ruiz & Pav., *Krameria triandra* Ruiz & Pav., *Krameria triandra* Ruiz & Pav. var. *humboldtiana* Chodat, *Landia lappacea* Dombey

Arbusto. Nativa. 300-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

LACISTEMATACEAE**Lacistema** Sw.**Lacistema hasslerianum** Chodat

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUU, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).

Lacistema lucidum Schnizl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

LAMIACEAE**Aegiphila** Jacq.**Aegiphila australis** Moldenke

Arbusto o árbol. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Aegiphila brachiata Vell.

Sin.: *Aegiphila brasiliensis* Moldenke, *Aegiphila hassleri* Briq., *Aegiphila triantha* Schauer

Arbusto o árbol. Nativa. 100-1400 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, RIV, TAC).

Aegiphila fluminensis Vell.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Aegiphila graveolens Mart. & Schauer

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks.

Sin.: *Aegiphila arborescens* Vahl, *Aegiphila sellowiana* Cham., *Callicarpa integrifolia* Jacq.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Aegiphila luschnathii Schauer

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Aegiphila mediterranea Vell.

Sin.: *Aegiphila cestrifolia* Gardner, *Aegiphila hirta* Casar., *Aegiphila paranensis* Moldenke

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

Aegiphila obducta Vell.

Árbol. Nativa. 0-2300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aegiphila saltensis Legname

Arbusto. Nativa. 600-1400 m.

Países: ARG(SAL).

Aegiphila serrata Vell.

Sin.: *Aegiphila riedeliana* Schauer

Arbusto o árbol. Nativa. 800-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aegiphila verticillata Vell.

Sin.: *Aegiphila crenata* Moldenke, *Aegiphila lhotzkiana* Cham., *Aegiphila paraguariensis* Briq., *Aegiphila splendens* Schauer, *Aegiphila tomentosa* Cham.

Subarbusto. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Aegiphila vitelliniflora Klotzsch ex Walp.

Sin.: *Aegiphila candelabrum* Briq. ex Chodat & Hassl., *Aegiphila chrysantha*

Hayek, *Aegiphila chrysantha* Hayek var. *glabra* Moldenke, *Aegiphila cuspidata* Mart. ex Schauer, *Aegiphila cuspidata* Mart. ex Schauer f. *grandiflora* Schauer, *Aegiphila cuspidata* Mart. ex Schauer f. *parviflora* Schauer, *Aegiphila densiflora* Rusby, *Aegiphila ferruginea* Glaz., nom. illeg., *Aegiphila lanceolata* Moldenke, *Aegiphila mattogrossensis* Moldenke, *Aegiphila platyphylla* Briq., *Aegiphila setiformis* Rusby, *Aegiphila vitelliniflora* Klotzsch ex Walp. var. *egleri* Moldenke
 Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, MIE, PHA, SPE).

Amasonia L. f., nom. cons.

Amasonia hirta Benth.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA).

Ballota L.

Ballota nigra L. subsp. *foetida* Hayek
 Sin.: *Ballota foetida* Lam., nom. inval., *Ballota nigra* L. var. *foetida* Vis.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI).

Ballota nigra L. subsp. *nigra*
 Sin.: *Marrubium nigrum* (L.) Garsault, nom. inval., *Stachys ballota* (L.) Kuntze
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI). URY(CAS, MON).

Ballota nigra L. subsp. *velutina* (Posp.) Patzak
 Sin.: *Ballota nigra* L. var. *velutina* (Posp.) Bég., *Ballota velutina* Posp.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, DFE).

Cantinoa Harley & J.F.B. Pastore

Cantinoa althaeifolia (Pohl ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore
 Sin.: *Cantinoa sylvularum* (A. St.-Hil. ex Benth.) Harley & J.B. Pastore, *Hyptis althaeifolia* Pohl ex Benth., *Hyptis sylvularum* A. St.-Hil. ex Benth., *Hyptis vestita* Benth., *Hyptis vestita* Benth. var. *tomentosa* J.A. Schmidt, *Mesosphaerum althaeifolium* (Pohl ex Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum sylvularum* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum vestitum* (Benth.) Kuntze
 Hierba o subar busto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Cantinoa heterodon (Epling) Harley & J.F.B. Pastore
 Sin.: *Hyptis heterodon* Epling
 Hierba. Nativa. 300-1700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore
 Sin.: *Hyptis arvensis* Poepp. ex Benth., *Hyptis aspera* M. Martens & Galeotti, *Hyptis canaminensis* Rusby, *Hyptis canescens* Kunth, *Hyptis canescens* Kunth var. *arvensis* (Poepp. ex Benth.) Benth., *Hyptis kerberi* Gand., *Hyptis micrantha* Pohl ex Benth., *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq., *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. var. *canescens* (Kunth) Briq., *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. var. *micrantha* (Pohl ex Benth.) Briq., *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. var. *polystachya* (Kunth) Briq., *Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq. var. *spicata* (Poit.) Briq., *Hyptis polystachya* Kunth, *Hyptis rostrata* Salzm. ex Benth., *Hyptis spicata* Poit., *Hyptis spicata* Poit. var. *micrantha* (Pohl ex Benth.) Benth., *Hyptis spicata* Poit. var. *rostrata* (Salzm. ex Benth.) Benth., *Hyptis tenuiflora* Benth., *Hyptis*

trichocalyx Briq. ex Micheli, *Mesosphaerum canescens* (Kunth) Kuntze, *Mesosphaerum mutabile* (Rich.) Kuntze, *Mesosphaerum mutabile* (Rich.) Kuntze var. *polystachyum* (Kunth) Kuntze, *Mesosphaerum mutabile* (Rich.) Kuntze var. *spicata* (Poit.) Kuntze, *Mesosphaerum spicatum* (Poit.) Rusby, *Mesosphaerum yungasense* Britton ex Rusby, *Nepeta mutabilis* Rich.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, COA, ITA, MIE, PAI, PHA).

Cantinoa plectranthoides (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore
 Sin.: *Hyptis plectranthoides* Benth., *Mesosphaerum plectranthoides* (Benth.) Kuntze
 Hierba. Nativa. 500-2000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Cantinoa stricta (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore
 Sin.: *Hyptis stricta* Benth., *Mesosphaerum strictum* (Benth.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CLA).

Clerodendrum L.

Clerodendrum bungei Steud.
 Arbusto. Introducida. 400-1800 m.
 Países: ARG(JUJ, TUC). BRA(PAR).

Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb.
 Sin.: *Clerodendrum fragrans* (Vent.) R. Br., hom. illeg., *Clerodendrum philippinum* Schauer, *Cryptanthus chinensis* Osbeck
 Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(ERI, MIS, SAL, TUC).
BRA(SCA). PRY(CEN).

Clerodendrum ekmanii Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).
PRY(COA).

Clerodendrum thomsoniae Balf.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN).

Clinopodium L.

Clinopodium bolivianum (Benth.)

Kuntze subsp. **bolivianum**

Sin.: *Clinopodium kuntzeanum* (Briq.)
Kuntze, *Micromeria boliviana* Benth.,
Micromeria boliviana Benth. var.
angustifolia Wedd., *Satureja boliviana*
(Benth.) Briq., *Satureja kuntzeana* Briq.,
Satureja simulans Epling, *Xenopoma*
bolivianum (Benth.) Griseb.

Arbusto. Nativa. 1200-4000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, SLU, TUC).

Clinopodium bolivianum (Benth.)

Kuntze subsp. **tarijense** (Griseb.) J.R.I.
Wood

Sin.: *Satureja boliviana* (Benth.) Briq. var.
tarijensis (Wedd. ex Griseb.) Epling,
Xenopoma bolivianum (Benth.) Griseb.
var. *tarijense* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1200-2300 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze

Sin.: *Micromeria brownei* (Sw.) Benth.,
Satureja boliviana (Benth.) Briq. var.
tarijensis (Wedd. ex Griseb.) Epling,
Satureja brownei (Sw.) Briq., *Satureja*
brownei (Sw.) Briq. subsp. *eubrownei*
Epling, nom. inval., *Thymus brownei* Sw.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).
BRA(RGS, SCA). PRY(PAI). URY(ART,
RIV).

Clinopodium chilense (Benth.) Govaerts

Sin.: *Gardoquia chilensis* Benth.,
Gardoquia gilliesii Graham, *Satureja*
chilensis (Benth.) Briq., *Satureja gilliesii*
(Graham) Briq.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-
1100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Clinopodium darwinii (Benth.) Kuntze

Sin.: *Clinopodium darwinii* (Benth.) Kuntze
var. *pusilla* (Phil.) Epling, *Micromeria*
darwinii Benth., *Micromeria darwinii*
Benth. var. *imbricatifolia* Speg.,
Micromeria darwinii Benth. var. *pallida*
Speg., *Micromeria darwinii* Benth. var.
pusilla (Phil.) Speg., *Micromeria darwinii*
Benth. var. *typica* Speg., nom. inval.,
Micromeria darwinii Benth. var. *virescens*
Speg., *Micromeria pusilla* Phil., *Satureja*
darwinii (Benth.) Briq., *Satureja pusilla*
(Phil.) Macloskie

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000
m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(AIS, MAG).

Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze

Sin.: *Bystropogon minutus* Briq.,
Micromeria eugenioides (Griseb.) Hieron.,
Micromeria gilliesii Benth., *Oreosphacus*
parvifolia Phil., *Satureja eugenioides*
(Griseb.) Loes. ex R.E. Fries, *Satureja*
oligantha Briq., *Satureja parvifolia* (Phil.)
Epling, *Xenopoma eugenioides* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1200-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ,
LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Clinopodium multiflorum (Ruiz & Pav.)
Kuntze

Sin.: *Gardoquia multiflora* Ruiz & Pav.,
Satureja multiflora (Ruiz & Pav.) Briq.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-
1200 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA).

Clinopodium odorum (Griseb.) Harley

Sin.: *Ceratominthe achalensis* Briq.,
Ceratominthe kuntzeana Briq.,
Ceratominthe odora (Griseb.) Hauman,
Micromeria odora (Griseb.) Hieron.,
Satureja odora (Griseb.) Epling,
Xenopoma odorum Griseb.

Arbusto. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
SLU, TUC).

Clinopodium vulgare L.

Sin.: *Satureja vulgaris* (L.) Fritsch

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Condea Adans.

Condea elegans (Briq.) Harley & J.F.B.
Pastore

Sin.: *Eriope elegans* Briq., *Hyptis elegans*
(Briq.) Briq. ex Micheli, *Hyptis elegans*
(Briq.) Briq. ex Micheli var. *pasculicola*
Briq. ex Micheli, *Hyptis gracilipes* Britton

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, MIE,
PAI).

Condea fastigiata (Benth.) Harley &
J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis diaphora* Briq., *Hyptis*
fasciculata Benth. subsp. *fastigiata*
(Benth.) Harley, *Hyptis fasciculata* Benth.
var. *fastigiata* (Benth.) J.A. Schmidt,
Hyptis fastigiata Benth., *Mesosphaerum*

diaphorum (Briq.) Briq., *Mesosphaerum fastigiatum* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, ITA). URY(CAS, MON, SJO, SOR).

Condea floribunda (Briq. ex Micheli) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis elegans* (Briq.) Briq. ex Micheli var. *campicola* Briq., *Hyptis floribunda* Briq. ex Micheli, *Mesosphaerum floribundum* Briq.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, COA, PAI). URY(FLO, MON).

Condea thyrsoflora (Epling) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis thyrsoflora* Epling
Hierba a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Condea undulata (Schrank) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis fasciculata* Benth., *Hyptis fasciculata* Benth. var. *tomentella* Benth., *Hyptis undulata* Schrank, *Lepechinia anomala* Epling, *Mesosphaerum fasciculatum* (Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum undulatum* (Schrank) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CAS, CLA, MON, SJO, TAC).

Cuminia Colla

Cuminia eriantha (Benth.) Benth.

Sin.: *Bystropogon erianthus* Benth., *Cuminia brevidens* Benth., *Cuminia eriantha* (Benth.) Benth. var. *fernandezia* (Colla) Harley, *Cuminia fernandezia* Colla, *Johowia fernandezia* (Colla) Epling & Looser, *Skottsbergiella fernandezia* (Colla) Epling

Arbusto. Endémica. 200-900 m.

Países: CHL(JFE).

Cunila D. Royen ex L.

Cunila angustifolia Benth.

Sin.: *Hedyosmos angustifolius* (Benth.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 200-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cunila fasciculata Benth.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Cunila galioides Benth.

Arbusto. Nativa. 400-2500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Cunila incana Benth.

Sin.: *Hedyosmos incanus* (Benth.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV).

Cunila incisa Benth.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Cunila mentiformis Epling

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

Cunila menthoides Benth.

Sin.: *Cunila arechavaletae* Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(MON).

Cunila microcephala Benth.

Sin.: *Hedyosmos microcephalus* (Benth.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLO, FLA, MON, RIV, SOR, TYT).

Cunila platyphylla Epling

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cunila spicata Benth.

Sin.: *Hedeoma hassleri* Briq., *Hedyosmos spicatus* (Benth.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(ROC, SAO, TYT).

Cunila tenuifolia Epling

Subarbusto. Endémica. 900-1500 m.

Países: BRA(SCA).

Cyanocephalus (Pohl ex Benth.)

Harley & J.F.B. Pastore

Cyanocephalus apertiflorus (Epling)

Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis apertiflora* Epling

Hierba. Endémica. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Cyanocephalus incanus (Briq.) Harley &

J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis albicoma* Epling, *Hyptis incana* Briq., *Mesosphaerum incanum* (Briq.) Briq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, GUA).

Cyanocephalus poliodes (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis poliodes* Briq. ex Micheli, *Mesosphaerum poliodes* (Briq. ex Micheli) Briq.

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: PRY(COA, SPE).

Cyanocephalus tripartitus (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis tripartita* Briq., *Mesosphaerum tripartitum* (Briq.) Briq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAU).

Eriope Humb. & Bonpl. ex Benth.

Eriope crassipes Benth. subsp. **crassipes**

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: BRA(PAR).

Eriope crassipes Benth. subsp. **trichopoda** (Briq.) Harley

Sin.: *Eriope trichopoda* Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

Eriope macrostachya Mart. ex Benth. var. **hypoleuca** Benth.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.

Países: PRY(APY, CAN, CON, PHA).

Eriope macrostachya Mart. ex Benth. var. **macrostachya**

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Galeopsis L.

Galeopsis tetrahit L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(LLA).

Glechoma L., nom. cons.

Glechoma hederacea L.

Sin.: *Nepeta hederacea* (L.) Trevis.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, TDF). CHL(ARA, LSR, LLA, MAG).

Glechon Spreng.

Glechon ciliata Benth.

Sin.: *Glechon affinis* Briq., *Glechon hassleri* Briq., *Glechon paraguariensis* Briq., *Glechon rigidula* Briq., *Glechon squarrosa* Benth.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, MIE, SPE). URY(MON).

Glechon discolor Epling

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Glechon elliptica C. Pereira & Hatschbach

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Glechon marifolia Benth.

Sin.: *Glechon candida* Benth., nom. nud., *Glechon canescens* A. St.-Hil. ex Benth., *Glechon marifolia* Benth. f. *canescens* (A. St.-Hil. ex Benth.) J.A. Schmidt, *Glechon marifolia* Benth. f. *serpyllifolia* (A. St.-Hil. ex Benth.) J.A. Schmidt, *Glechon serpyllifolia* A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, GUA). URY(FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC).

Glechon thymoides Spreng.

Sin.: *Glechon spathulata* Benth.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, TAC).

Gymneia (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Gymneia virgata (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis velascana* Briq., *Hyptis virgata* Benth., *Mesosphaerum velascanum* (Benth.) Briq., *Mesosphaerum virgatum* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Hedeoma Pers.

Hedeoma mandonianum Wedd.

Sin.: *Hedeoma adscendens* Rusby, *Hedeoma breviflorum* Griseb., nom. nud.

Hierba. Nativa. 2700-3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Hedeoma medium Epling

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). URY(PAY, SOR).

Hedeoma multiflorum Benth.

Sin.: *Hedeoma gilliesii* Benth., *Micromeria bonariensis* (Ten.) Fisch. & C.A. Mey., *Satureja bonariensis* (Fisch. & C.A. Mey.) Briq., *Satureja gilliesii* (Benth.) Briq., *Thymus bonariensis* Ten.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU, SDE). BRA(RGS). URY(PAY).

Hedeoma polygalaefolium Benth.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(RGS).

Hedeoma teyucuaensis H.A. Keller &

Tressens

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.

Países: ARG(MIS).

Hesperozygis Epling

Hesperozygis dimidiata Epling &

Mathias

Hierba o arbusto. Endémica. 1000-1300 m.

Países: BRA(SCA).

Hesperozygis kleinii Epling & Játiva

Arbusto. Endémica. 1500.

Países: BRA(SCA).

Hesperozygis nitida (Benth.) Epling

Sin.: *Keithia nitida* Benth.

Hierba o arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hesperozygis rhododon Epling

Arbusto. Endémica. 1000.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hesperozygis ringens (Benth.) Epling

Sin.: *Glechon ringens* Benth.

Hierba o arbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Hesperozygis spathulata Epling

Hierba o arbusto. Endémica. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hoehnea Epling

Hoehnea epilobioides (Epling) Epling

Sin.: *Keithia epilobioides* Epling

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(COA).

Hoehnea minima (J.A. Schmidt) Epling

Sin.: *Keithia minima* J.A. Schmidt

Hierba. Nativa. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hoehnea parvula (Epling) Epling

Sin.: *Keithia parvula* Epling

Hierba. Endémica. 900-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hoehnea scutellarioides (Benth.) Epling

Sin.: *Hedeoma scutellarioides* (Benth.)

Briq., *Keithia pilosa* Benth., *Keithia scutellarioides* Benth.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypenia (Mart. ex Benth.) Harley

Hypenia glauca (A. St.-Hil. ex Benth.)

Harley

Sin.: *Hyptis glauca* A. St.-Hil. ex Benth.,
Mesosphaerum glaucum (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Hypenia macrantha (A. St.-Hil. ex

Benth.) Harley

Sin.: *Hyptis macrantha* A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, COA).

Hypenia reticulata (Mart. ex Benth.)

Harley

Sin.: *Hyptis reticulata* Mart. ex Benth.

Hierba a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Hyptis Jacq., nom. cons.

Hyptis alata (Raf.) Shinnars subsp.

rugosula (Briq.) Harley

Sin.: *Hyptis rugosula* Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).
PRY(CAU, SPE).

Hyptis angulosa Schott ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum angulosum* (Schott ex Benth.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(SCA).

Hyptis australis Epling

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Hyptis balansae Briq.

Sin.: *Hyptis mollis* Pohl ex Benth. var.
leptoclada Briq., *Hyptis mollis* Pohl ex Benth. var. *vulgaris* Briq., *Hyptis paranensis* Epling

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, GUA, PAI).

Hyptis brevipes Poit.

Sin.: *Hyptis acuta* Benth., *Hyptis brevipes* Poit. var. *serrata* Briq., *Hyptis brevipes* Poit. var. *vulgaris* Briq., *Mesosphaerum brevipes* (Poit.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(RIV).

Hyptis caespitosa A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Hyptis caespitosa* A. St.-Hil. ex Benth. var. *elliptica* (Briq.) Briq., *Hyptis*

caespitosa A. St.-Hil. ex Benth. var. *mirabilis* (Briq.) Briq., *Hyptis elliptica* Briq. ex Micheli, *Hyptis mirabilis* Briq., *Mesosphaerum caespitosum* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum mirabile* (Briq.) Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, SPE).

Hyptis campestris Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Peltodon tomentosus* Pohl

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Hyptis comaroides (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Peltodon comaroides* Briq., *Peltodon longipes* A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Notas: Cita dudosa para la Flora de Uruguay (Rambo, 1962)

Hyptis dumetorum Morong

Sin.: *Hyptis cyrtostoma* Briq., *Hyptis dumetorum* Morong var. *genuina* Briq., nom. inval., *Hyptis dumetorum* Morong var. *inconcinna* Briq., *Hyptis dyscheres* Briq., *Hyptis gymnodontia* Briq., *Mesosphaerum dyscheres* (Briq.) Briq., *Mesosphaerum gymnodontum* (Briq.) Briq.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(FOR). BRA(PAR). PRY(APY, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Hyptis hassleri Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAU, CAN, SPE).

Hyptis hirsuta Kunth

Sin.: *Hyptis siderotricha* Briq., *Mesosphaerum hirsutum* (Kunth) Kuntze, *Mesosphaerum siderotrichum* (Briq.) Briq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, ITA, PAI).

Hyptis inodora Schrank

Sin.: *Hyptis gaudichaudii* Benth., *Mesosphaerum inodorum* (Schrank) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hyptis lacustris A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum lacustre* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hyptis lagenaria A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum lagenarium* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hyptis lanceolata Poir.

Hierba a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Hyptis lappacea Benth.

Sin.: *Hyptis cinerea* Morong, *Hyptis cinerea* Morong var. *genuina* Briq., nom. inval., *Hyptis cinerea* Morong var. *stenophylla* Briq., *Hyptis michelii* Briq. ex Micheli, *Hyptis trichoneura* Briq. ex Micheli, *Mesosphaerum cinereum* (Morong) Briq., *Mesosphaerum lappaceum* (Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum trichoneurum* (Briq. ex Micheli) Briq.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,

BOQ, CAU, CAA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(SAO, TAC).

Hyptis lappulacea Mart. ex Benth.

Sin.: *Hyptis lappacea* Benth. var. *hirsuta* Benth., *Hyptis marrubiaea* Benth., *Hyptis marrubiastra* Pohl ex Benth., *Hyptis reineckii* Briq., *Mesosphaerum lappulaceum* (Mart. ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 800-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Hyptis lavandulacea Pohl ex Benth.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Hyptis lorentziana O. Hoffm.

Sin.: *Hyptis barbarensis* Briq. ex Micheli, *Hyptis czermakii* Briq., *Hyptis paraguayensis* Briq. ex Micheli, *Mesosphaerum barbarensis* (Briq. ex Micheli) Briq., *Mesosphaerum lorentzianum* (O. Hoffm.) Kuntze, *Mesosphaerum paraguayense* (Briq. ex Micheli) Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, PAI). URY(ART, COL, RNO, SAO, TAC, TYT).

Hyptis lutescens Pohl ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum lutescens* (Pohl ex Benth.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Hyptis marrubioides Epling ex Hoehne

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Hyptis meridionalis Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Peltodon rugosus* Tolm.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Hyptis microphylla Pohl ex Benth.
Sin.: *Mesosphaerum microphyllum* (Pohl ex Benth.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Hyptis muelleri Briq.
Sin.: *Mesosphaerum muelleri* (Briq.) Briq.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(RIV).

Hyptis multibracteata Benth.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Hyptis pachyarthra Briq.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON).

Hyptis pulchella Briq.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Hyptis radicans (Pohl) Harley & J.F.B. Pastore
Sin.: *Peltodon radicans* Pohl
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hyptis recurvata Poit.
Sin.: *Hyptis imitans* Epling,
Mesosphaerum recurvatum (Poir.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

Hyptis tetracephala Bordignon
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Hyptis tetragona Pohl ex Benth.
Sin.: *Hyptis stereocaulos* Briq.,
Mesosphaerum stereocaulon (Briq.) Briq.,
Mesosphaerum tetragonum (Pohl ex Benth.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, GUA).

Hyptis tweedii Benth.
Sin.: *Mesosphaerum tweedii* (Benth.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Hyptis uliginosa A. St.-Hil. ex Benth.
Sin.: *Mesosphaerum uliginosum* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hyptis villosa Pohl
Sin.: *Mesosphaerum villosum* (Pohl) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Kurzamra Kuntze

Kurzamra pulchella (Clos) Kuntze
Sin.: *Micromeria pulchella* (Clos) Wedd.,
Soliera pulchella Clos
Hierba. Endémica. 3500-4300 m.
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA, COQ).

Lamium L.

Lamium amplexicaule L.
Hierba. Introducida. 100-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, LRI, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC).

CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME). URY(MON, SOR).

Lamium purpureum L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, TDF). CHL(MAG).

Leonotis (Pers.) R. Br.

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
Sin.: *Phlomis nepetifolia* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI). URY(ART, PAY).

Leonurus L.

Leonurus cardiaca L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR).

Leonurus japonicus Houtt.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, PAI). URY(ART, CLA, PAY, RNO).

Lepechinia Willd.

Lepechinia chilensis (Molina) R. Morales
Sin.: *Alguetlagum chilense* (Molina) Kuntze, *Dracocephalum chamaedryoides* Balb., *Lepechinia chamaedryoides* (Balb.) Epling, *Phytaxis acidissima* Molina, *Phytaxis sideritifolia* Molina, *Rosmarinus chilensis* Molina, *Sphacele campanulata*

Benth., *Sphacele chamaedryoides* (Balb.) Briq., *Sphacele chilense* (Kuntze) Briq.

Arbusto. Endémica. 0-1600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Lepechinia floribunda (Benth.) Epling

Sin.: *Alguelagum floribundum* (Benth.) Kuntze, *Alguelagum grisebachii* Kuntze, *Alguelagum hieronymi* Briq., *Lepechinia sagittata* Epling, *Sphacele floribunda* Benth., *Sphacele grisebachii* Kurtz, *Sphacele hastata* Griseb., hom. illeg., *Sphacele hieronymi* (Briq.) Briq., *Sphacele pampeana* Speg.

Subarbusto. Nativa. 500-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Lepechinia meyenii (Walp.) Epling

Sin.: *Alguelagum clinopodioides* (Griseb.) Kuntze, *Alguelagum tenuiflorum* (Benth.) Kuntze, *Sphacele clinopodioides* Griseb., *Sphacele meyenii* (Walp.) J.F. Macbr., *Sphacele tenuiflora* Benth., *Stachys meyenii* Walp.

Hierba. Nativa. 1500-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Lepechinia salviae (Lindl.) Epling

Sin.: *Alguelagum salviae* (Lindl.) Kuntze, *Gardoquia salviifolia* Colla, *Sphacele lindleyi* Benth., *Sphacele salviae* (Lindl.) Briq., *Stachys salviae* Lindl.

Arbusto. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Lepechinia subhastata (Benth.) Epling

Sin.: *Alguelagum subhastatum* (Benth.) Kuntze, *Sphacele subhastata* Benth.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL).

Lepechinia vesiculosa (Benth.) Epling

Sin.: *Alguelagum acuminatum* (Griseb.) Kuntze, *Astemon graveolens* Regel, *Hyptis vesiculosa* Benth., *Lepechinia graveolens* (Regel) Epling, *Sphacele acuminata* Griseb., *Sphacele vesiculosa* (Benth.) J.F. Macbr.

Arbusto o arbolito. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Leucas R. Br.

Leucas martinicensis (Jacq.) R. Br.

Sin.: *Clinopodium martinicense* Jacq.

Hierba a subarbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lycopus L.

Lycopus europaeus L.

Hierba. Introducida. 100.

Países: CHL(LSR, LLA).

Marrubium L.

Marrubium vulgare L.

Sin.: *Marrubium hamatum* Kunth

Hierba. Introducida. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, AIS, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, DUR, MON, PAY, RNO, SOR).

Marsypianthes Mart. ex Benth.

Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze

Sin.: *Clinopodium chamaedrys* Vahl, *Hyptis chamaedrys* (Vahl) Willd., *Marsypianthes chamaedrys* (Vahl) Rusby

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Marsypianthes hassleri Briq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, ITA, MIE, SPE).

Medusantha Harley & J.F.B. Pastore

Medusantha eriophylla (Pohl ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore var. **coriifolia** (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis eriophylla* Pohl ex Benth. var. *coriifolia* Benth.

Arbusto a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Melissa L.

Melissa officinalis L.

Hierba. Introducida. 1000-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(CLA, MON).

Mentha L.

Mentha aquatica L.

Sin.: *Mentha hirsuta* Huds.

Hierba. Introducida. 0-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, MEN, TUC). BRA(PAR). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). URY(CAS, MON).

Mentha piperita L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, TDF, TUC). CHL(TAR, VAL, LLA, RME, JFE).

Mentha pulegium L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). URY(MON, TAC).

Mentha spicata L. var. **rotundifolia** L.

Sin.: *Mentha rotundifolia* Huds., *Mentha x rotundifolia* (L.) Huds.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, COR, MEN, NEU, SJU, SLU).

Mentha spicata L. var. **spicata**

Hierba. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mentha suaveolens Ehrh.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). CHL(ANT, ATA, VAL, LBO, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). PRY(CEN).

Mesosphaerum P. Browne

Mesosphaerum pectinatum (L.) Kuntze

Sin.: *Hyptis pectinata* (L.) Poit., *Nepeta pectinata* L.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mesosphaerum sidifolium (L'Hér.)

Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Bystropogon sidifolius* L'Hér., *Hyptis graveolens* Salzm. ex Benth., hom. illeg., *Hyptis umbrosa* Salzm. ex Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze

Sin.: *Ballota suaveolens* L.

Hierba a arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Minthostachys (Benth.) Speg.

Minthostachys elongata Schmidt-Leb.

Hierba. Nativa. 2100-2200 m.

Países: ARG(SAL).

Minthostachys verticillata (Griseb.)

Epling

Sin.: *Bystropogon kuntzeanus* Briq., *Minthostachys verticillata* (Griseb.) Epling var. *eupatorioides* Epling, *Xenopoma verticillatum* Griseb.

Hierba. Endémica. 700-2300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Moluccella L.

Moluccella laevis L.

Hierba. Introducida. 500-2000 m.

Países: ARG(BAI). CHL(VAL, RME).

Nepeta L.

Nepeta cataria L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MIS, NEU, RNE, SLU). BRA(PAR, SCA).

Ocimum L.

Ocimum americanum L.

Hierba a subarbusto. Introducida.

Países: BRA(SCA).

Ocimum campechianum Mill.

Sin.: *Ocimum flexuosum* Thunb., *Ocimum guatemalense* Gand., *Ocimum micranthum* Willd.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CAU, CHO, CON, COA, PHA).

Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex Benth

Sin.: *Lumnitzera carnosus* Spreng., *Ocimum graveolens* Larrañaga, nom. illeg., *Ocimum montevidense* Larrañaga, nom. illeg., *Ocimum selloi* Benth., *Ocimum selloi* Benth. f. *serratum* Briq., *Ocimum selloi* Benth. f. *subintegrifolium* Briq., *Ocimum selloi* Benth. var. *angustifolium* Briq., *Ocimum selloi* Benth. var. *carnosum* (Spreng.) Briq., *Ocimum selloi* Benth. var. *genuinum* Briq., *Ocimum selloi* Benth. var. *tweedianum* (Benth.) Briq., *Ocimum sellowii* Benth., *Ocimum tweedianum* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO).

Ocimum gratissimum L.

Arbusto a subarbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocimum nudicaule Benth.

Sin.: *Eriope nudicaulis* Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, COA, GUA).

Ocimum ovatum Benth.

Sin.: *Ocimum balansae* Briq., *Ocimum hassleri* Briq., *Ocimum hassleri* Briq. var. *acutatum* Briq., *Ocimum hassleri* Briq. var. *obtusifolium* Briq., *Ocimum neurophyllum* Briq., *Ocimum procurrens* Epling

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, ÑEE, PHA, SPE).

Oocephalus (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore**Oocephalus oppositiflorus** (Schrank)

Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis oppositiflora* Schrank

Hierba a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Origanum L.**Origanum x majoricum** Cambess.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(TAR, JFE).

Prunella L.**Prunella laciniata** (L.) L.

Sin.: *Prunella vulgaris* L. var. *laciniata* L.

Hierba. Introducida. 600-700 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LLA).

Prunella vulgaris L.

Hierba. Introducida. 200-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, FLA).

Rhabdocalon (Benth.) Epling**Rhabdocalon erythrostachys** Epling

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhabdocalon gracile (Benth.) Epling

Sin.: *Hedeoma gracilis* (Benth.) Briq.,

Keithia gracilis Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhabdocalon grandiflorum (Funez & Hassemer) Bräuchler

Sin.: *Hoehnea grandiflora* Funez &

Hassemer

Hierba. Endémica. 800-900 m.

Países: BRA(SCA).

Rhabdocalon lavanduloides (Benth.) Epling

Sin.: *Keithia lavanduloides* Benth.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhabdocalon stenodontum (Briq.) Epling

Sin.: *Hedeoma stenodonta* Briq.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON).

Rhabdocalon strictum (Benth.) Epling

Sin.: *Cunila stricta* Benth., *Hedyosmos strictus* (Benth.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(ÑEE). URY(CLA, PAY).

Salvia L.**Salvia aliciae** E.P. Santos

Subarbusto. Nativa. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Salvia arenaria A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Salvia australis* Epling, *Salvia consimilis* Epling, *Salvia rhombifolia* Ruiz & Pav. var. *ovata* Griseb., *Salvia rypara* Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Salvia aridicola Briq.

Sin.: *Salvia dumeticola* Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN, ÑEE).

Salvia atrocyanea Epling

Sin.: *Salvia meyeri* Legname

Subarbusto. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Salvia borjensis E.P. Santos

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Salvia brevipes Benth.

Subarbusto. Nativa. 900-1200 m.

Países: PRY(MIE).

Salvia caaguazuensis Briq.

Subarbusto. Endémica. 400-500 m.

Países: PRY(APA, CAU, CAN).

Salvia calolophos Epling

Hierba. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SJU).

Salvia campicola Briq.

Subarbusto. Endémica. 400.

Países: PRY(AMA, ITA, PAI).

Salvia cardiophylla Benth.

Sin.: *Salvia approximata* Briq., *Salvia approximata* Briq. var. *kuntzeana* Briq., nom. illeg., *Salvia cinerarioides* Briq., *Salvia rojasii* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA). URY(SAO).

Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl.

Sin.: *Horminum coccineum* (Buc'hoz ex Etl.) Moench, *Salvia ciliata* Benth., hom. illeg., *Salvia coccinea* Buc'hoz ex Etl. f. *pseudococcinea* (Jacq.) Voss, *Salvia coccinea* Buc'hoz ex Etl. var. *minima* Fernald, *Salvia coccinea* Buc'hoz ex Etl. var. *pseudococcinea* (Jacq.) A. Gray, *Salvia galeottii* M. Martens & Galeotti, *Salvia glaucescens* Pohl, *Salvia mollissima* M. Martens & Galeotti, *Salvia pseudococcinea* Jacq., *Salvia rosea* Vahl

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia congestiflora Epling

Sin.: *Salvia reitzii* Epling

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Salvia cordata Benth.

Subarbusto. Endémica. 100-400 m.

Países: BRA(RGS).

Salvia curta Epling

Hierba. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia cuspidata Ruiz & Pav. subsp. **gilliesii** (Benth.) J.R.I. Wood

Sin.: *Salvia gilliesii* Benth., *Salvia gilliesii* Benth. var. *glandulosa* Griseb., *Salvia lorentzii* Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, ANT).

Salvia exserta Griseb.

Sin.: *Salvia praeclara* Epling

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Salvia guaranitica A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Salvia ambigens* Briq., *Salvia coerulea* Benth., *Salvia coerulea* Benth. var. *regnellii* Benth., *Salvia melanocalyx* Briq.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI). URY(MON, PAY, SAO).

Salvia lachnostachys Benth.

Hierba. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Salvia melissiflora Benth.

Sin.: *Salvia arenaria* A. St.-Hil. ex Benth. var. *sellowiana* Benth., *Salvia paranensis* Dusén, *Salvia platyfrons* Epling & Játiva

Hierba. Nativa. 300-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia microphylla Kunth

Sin.: *Salvia grahami* Benth., *Salvia grahamii* Benth., *Salvia lemmonii* A. Gray, *Salvia obtusa* M. Martens & Galeotti, *Salvia odoratissima* Sessé & Moç.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR; RGS; SCA).

Salvia minarum Briq.

Subarbusto. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN).

Salvia nervosa Benth.

Sin.: *Salvia hassleri* Briq., *Salvia lucida* Briq., *Salvia rigida* Benth. f. *lucida* (Briq.) Briq., *Salvia rigida* Benth., hom. illeg.,

Salvia rigida Benth., hom. illeg. var. *cryptocaulos* Briq., *Salvia rigida* Benth. var. *lucida* (Briq.) Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Salvia officinalis L.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA). BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia ovalifolia A. St.-Hil. ex Benth. var. **nitidula** (Briq.) E.P. Santos

Sin.: *Salvia isabellei* Briq., *Salvia nitidula* Briq.

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(RGS). PRY(MIE).

Salvia ovalifolia A. St.-Hil. ex Benth. var. **ovalifolia**

Sin.: *Salvia durifolia* Epling

Subarbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CAA, ITA).

Salvia ovalifolia A. St.-Hil. ex Benth. var. **villosa** Benth.

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(ART, CLA, DUR, FLO, FLA, PAY, RNO, RIV, SOR).

Salvia pachypoda Briq.

Subarbusto. Endémica. 400.

Países: PRY(CAU, MIE, SPE).

Salvia pallida Benth.

Sin.: *Salvia balansae* Briq., hom. illeg., *Salvia canescens* Benth., hom. illeg., *Salvia rouyana* Briq., *Salvia serrata* Benth., *Salvia uruguayensis* A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(COA, PHA). URY(SAO).

Salvia paraguariensis Briq.
Subarbusto. Endémica. 400.
Países: PRY(CAU).

Salvia personata Epling
Sin.: *Salvia alba* J.R.I. Wood
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Salvia procurrens Benth.
Sin.: *Salvia hederacea* Larrañaga, *Teucrium rotundifolium* Schreb.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RIV, SJO).

Salvia propinqua Benth.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Salvia reflexa Hornem.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Salvia regnelliana Briq.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia rhombifolia Ruiz & Pav.
Sin.: *Salvia foliosa* Benth., *Salvia paposana* Phil., *Salvia pilosa* Vahl, hom. illeg., *Salvia tafallae* Benth.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Salvia rosmarinoides A. St.-Hil. ex Benth.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CAN, MIE). URY(SAO).

Salvia scoparia Epling
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia scytinophylla Briq.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Salvia splendens Sellow ex Wied-Neuw.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, DFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia stachydifolia Benth.
Sin.: *Salvia matico* Griseb., *Salvia matico* Griseb. var. *cuneata* Griseb., *Salvia rhinosina* Griseb., *Salvia rhinosina* Griseb. var. *arborescens* Griseb.
Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Salvia subrotunda A. St.-Hil. ex Benth.
Sin.: *Salvia micheliana* Briq. ex Micheli
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, PAI).

Salvia tenuiflora Epling
Arbusto. Endémica. 600-1800 m.
Países: BRA(SCA).

Salvia tubiflora Sm.
Sin.: *Salvia biflora* Ruiz & Pav., *Salvia biflora* Ruiz & Pav. var. *glabrata* Benth., *Salvia excisa* Ruiz & Pav., *Salvia scrobiculata* Meyen
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Salvia uliginosa Benth.
Sin.: *Salvia lanceolata* Larrañaga, hom. illeg.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLA, MON, SAO, SJO).

Salvia verbenaca L.
Sin.: *Horminum verbenacum* (L.) Mill., *Larnastya verbenaca* (L.) Raf.
Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, SLU). CHL(RME). URY(MON).

Satureja L.

Satureja hortensis L.
Hierba. Introducida. 1000.
Países: CHL(BIO, RME).

Scutellaria L.

Scutellaria eplingii Legname
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Scutellaria nummulariifolia Hook. f.
Sin.: *Cruzia serpyllacea* Phil.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Scutellaria platensis Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(COL, SAO, SJO).

Scutellaria purpurascens Sw.
Sin.: *Scutellaria breviflora* Benth.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(SCA).

Scutellaria racemosa Pers.
Sin.: *Scutellaria bonariensis* Willd. ex Benth., *Scutellaria hastata* Larrañaga,

nom. illeg., *Scutellaria heterophylla* Willd.
ex Benth., *Scutellaria rojasii* Briq.,
Scutellaria rumicifolia Kunth
Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL,
SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR,
LLA, RME). PRY(APY, CAU, CAN, CEN,
CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).
URY(ART, CAS, CLA, FLA).

Scutellaria uliginosa A. St.-Hil. ex Benth.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAN, CEN, PAI).

Scutellaria valdiviana (Clos) Epling
Sin.: *Theresa valdiviana* Clos
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(MAU, BIO, LSR).

Scutellaria woodii J.M. Mercado
Hierba. Nativa. 2600-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Stachys L., nom. cons.

Stachys albicaulis Lindl.
Sin.: *Stachys eriophylla* Briq., *Stachys*
sideritoides Gillies ex Benth.
Hierba. Nativa. 1000-2200 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Stachys arvensis (L.) L.
Sin.: *Glechoma arvensis* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, MIS, NEU, SAL,
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(VAL, LLA, JFE, IPA). PRY(ITA).
URY(MON).

Stachys bridgesii Benth.
Hierba. Endémica. 0-2300 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO,
LSR, RME).

Stachys eremicola Epling
Sin.: *Stachys crenata* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Stachys gilliesii Benth.
Sin.: *Stachys boliviana* Briq., *Stachys*
galanderi Briq., *Stachys lorentzii* Briq.,
Stachys micheliana Briq., *Stachys*
micrantha Griseb., nom. illeg., *Stachys*
petiolosa Briq., *Stachys tucumanensis*
Briq.
Hierba. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN,
MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(APY,
PHA). URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV,
PAY, RIV, SAO, SOR, TYT).

Stachys grandidentata Lindl.
Sin.: *Stachys brevidens* Phil., *Stachys*
closii Phil., *Stachys serrata* Clos, *Stachys*
toronjilcillo Phil.
Hierba. Endémica. 0-2900 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Stachys macraei Benth.
Sin.: *Stachys chonotica* Hook. f.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Stachys ochroleuca Phil.
Sin.: *Stachys araucana* Phil., *Stachys*
dubia Briq., *Stachys litoralis* Phil., *Stachys*
meyeniana Phil., *Stachys rupestris* Phil.,
Stachys volckmannii Phil.
Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA).

Stachys pannosa Phil.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
MAU, BIO).

Stachys philippiana Vatke
Sin.: *Stachys andina* Phil., nom. superfl.,
Stachys elliptica Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1800-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Stachys sericea Cav.
Sin.: *Stachys candidissima* Phil., *Stachys*
glabrata Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 500-2500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LLA, RME).

Stachys truncata Kunze ex Benth.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, AIS).

Teucrium L.

Teucrium bicolor Sm.
Sin.: *Teucrium cavanillesii* Bertero ex
Steud., nom. nud., *Teucrium chilense*
Desf. ex Steud., nom. nud., *Teucrium*
heterophyllum Cav., hom. illeg., *Teucrium*
orchideum Lindl.
Arbusto. Endémica. 0-2100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Teucrium cubense Jacq.
Sin.: *Melosmon cubense* (Jacq.) Small,
Melosmon laevigatum (Vahl) Small,
Teucrium chamaedrifolium Mill., *Teucrium*
cubense Jacq. subsp. *chamaedrifolium*
(Mill.) Epling, *Teucrium cubense* Jacq.
subsp. *cordobense* Epling, *Teucrium*

cubense Jacq. subsp. *laevigatum* (Vahl) E.M. McClint., *Teucrium grisebachii* Hieron., nom. nud., *Teucrium laevigatum* Vahl

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LRI, MEN, MIS, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, MON, RNO).

Teucrium nudicaule Hook.

Sin.: *Teucrium leucanthum* Phil., *Teucrium nudicaule* Hook. var. *leucanthum* (Phil.) Epling, *Teucrium tripartitum* Meyen

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-2100 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Teucrium scorodonia L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(LLA).

Teucrium vesicarium Mill.

Sin.: *Teucrium carthaginense* Lange, *Teucrium hirtum* Willd. ex Spreng., hom. illeg., *Teucrium inflatum* Sw., *Teucrium mollifolium* Larrañaga, nom. illeg., *Teucrium palustre* Kunth, nom. illeg., *Teucrium picardae* Krug & Urb., *Teucrium tenuipes* Epling, *Teucrium vesicarium* Mill. var. *palustre* Epling

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, SOR).

Vitex L.

Vitex cymosa Bertero ex Spreng.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CEN, CON, COA, PAI).

Vitex flavens Kunth

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke

Sin.: *Bignonia megapotamica* Spreng., *Vitex montevidensis* Cham.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA). URY(ROC, TAC, TYT).

Vitex mexiae Moldenke

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Vitex polygama Cham. var. **bakeri** Moldenke

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Vitex polygama Cham. var. **duzenii** Moldenke

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Vitex polygama Cham. var. **polygama**

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Vitex sellowiana Cham.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Vitex vauthieri DC. ex Schauer

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

LARDIZABALACEAE

Boquila Decne.

Boquila trifoliolata (DC.) Decne.

Sin.: *Boquila discolor* (Kunze ex Poepp. & Endl.) Decne., *Boquila trifoliolata* (DC.) Decne. var. *discolor* (Kunze ex Poepp. & Endl.) Gay, *Lardizabala discolor* Kunze ex Poepp. & Endl., *Lardizabala trifoliolata* DC.

Liana. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Lardizabala Ruiz & Pav.

Lardizabala funaria (Molina) Looser

Sin.: *Cogyllia bitermata* (Ruiz & Pav.) Molina, *Cogyllia ternata* Molina, *Cogyllia tritermata* (Ruiz & Pav.) Molina, *Dolichos funarius* Molina, *Lardizabala bitermata* Ruiz & Pav., *Lardizabala infusiata* Miers, *Lardizabala silvicola* Miers, *Lardizabala ternata* Molina, *Lardizabala tritermata* Ruiz & Pav.

Arbusto o liana. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME, JFE).

LAURACEAE

Aiouea Aubl.

Aiouea acarodomatifera Kosterm.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aiouea amoena (Nees & Mart.) R. Rohde

Sin.: *Cinnamomum amoenum* (Nees) Vattimo-Gil, comb. superfl., *Cinnamomum amoenum* (Nees & Mart.) Kosterm., *Cinnamomum vesiculosum* (Nees & Mart.) Kosterm., *Ocotea amoena* (Nees & Mart.) Herter, *Oreodaphne amoena* Nees & Mart., *Oreodaphne vesiculosa* Nees &

Mart., *Phoebe amoena* (Nees & Mart.)
Mez, *Phoebe vesiculosa* (Ness & Mart.)
Kosterm.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Aiouea glaziovii (Mez) R. Rohde

Sin.: *Cinnamomum glaziovii* (Mez)

Kosterm., *Phoebe glaziovii* Mez

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aiouea hatschbachii (Vattimo-Gil) R.

Rohde

Sin.: *Cinnamomum hatschbachii* Vattimo-Gil

Árbol. Endémica. 800-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aiouea haussknechtii (Mez) R. Rohde

Sin.: *Phoebe haussknechtii* Mez

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Aiouea montana (Sw.) R. Rohde

Sin.: *Cinnamomum australe* Vattimo-Gil,
Cinnamomum paraguariense (Hassl.)

Kosterm., *Cinnamomum triplinerve* (Ruiz & Pav.) Kosterm., *Laurus montana* Sw.,
Laurus triplinervis Ruiz & Pav., *Phoebe paraguariensis* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN).

Aiouea pseudoglaziovii Lorea-Hern.

Sin.: *Cinnamomum pseudoglaziovii* (Lorea-Hern.) Van der Werff

Árbol. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aiouea saligna Meisn.

Sin.: *Aiouea gaudichaudii* Mez

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aiouea sellowiana (Nees & Mart.) R.

Rohde

Sin.: *Cinnamomum sellowianum* (Nees & Mart.) Kosterm., *Persea sellowiana* Nees & Mart., *Phoebe sellowiana* (Nees & Mart.) Meisn. ex Mez, *Phoebe sellowii* Meisn.

Árbol. Nativa. 400-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aiouea trinervis Meisn.

Sin.: *Aiouea hassleri* Mez ex Chodat,
Aiouea marginata Mez

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Aniba Aubl.

Aniba firmula (Nees & Mart.) Mez

Sin.: *Aniba laevigata* (Meisn.) Mez,
Aydendron firmulum Nees & Mart.,
Aydendron laevigatum Meisn., *Aydendron sellowii* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Beilschmiedia Nees

Beilschmiedia berteriana (Gay)

Kosterm.

Sin.: *Adenostemum nitidum* Bertero, hom. illeg., *Bellota nitida* Phil., *Bellota pauciflora* Phil., *Boldu nitidum* (Phil.) Meisn., *Cryptocarya berteriana* Gay, *Cryptocarya nitida* Phil.

Árbol. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Beilschmiedia emarginata (Meisn.)

Kosterm.

Sin.: *Cryptocarya emarginata* Meisn.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Beilschmiedia miersii (Gay) Kosterm.

Sin.: *Bellota miersii* Gay

Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Cassytha L.

Cassytha filiformis L.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cinnamomum Schaeff.

Cinnamomum glanduliferum (Wall.)

Meisn.

Sin.: *Laurus glandulifera* Wall.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE).

Cinnamomum verum J. Presl

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cryptocarya R. Br.

Cryptocarya alba (Molina) Looser

Sin.: *Cryptocarya laxiflora* Phil.,
Cryptocarya mammosa (Molina) Kosterm.,
Cryptocarya peumo (Dombey ex Lam.)
Kosterm., *Cryptocarya peumus* Nees,
Cryptocarya peumus Nees var. *laxiflora*
Phil., *Cryptocarya peumus* Nees var.
stenantha (Phil.) Mez, *Cryptocarya rubra*
(Molina) Skeels, *Cryptocarya stenantha*
Phil., *Icosandra rufescens* Phil., *Laurus*
peumo Dombey ex Lam., *Laurus peumus*
Molina, *Peumus alba* Molina, *Peumus*
mammosa Molina, *Peumus rubra* Molina
Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Cryptocarya aschersoniana Mez

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cryptocarya mandioccana Meisn.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cryptocarya moschata Nees & Mart. ex Nees

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Endlicheria Nees, nom. cons.

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr.

Sin.: *Citrosma paniculata* Spreng., *Cryptocarya hirsuta* Schott, *Endlicheria hirsuta* (Schott) Nees, *Goeppertia cantagallana* Meisn., *Nectandra lucida* Nees

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).

Laurus L.

Laurus nobilis L.

Arbusto o árbol. Introducida.

Países: ARG(BAI, COR, LPA).

Licaria Aubl.

Licaria armeniaca (Nees) Kosterm.

Sin.: *Licaria reitzkleiniana* Vattimo-Gil

Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nectandra Rol. ex Rottb., nom. cons.

Nectandra angusta Rohwer

Árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Nectandra angustifolia (Schrader.) Nees & Mart.

Sin.: *Nectandra angustifolia* (Schrader.) Nees & Mart. var. *falcifolia* Nees, *Nectandra falcifolia* (Nees) J.A. Castigl. ex Mart. Crov. & Piccinini, *Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez, *Nectandra membranacea* (Spreng.) Hassl., hom. illeg., *Nectandra membranacea* (Sw.) Griseb. f. *floribunda* Hassl., *Nectandra membranacea* (Sw.) Griseb. var. *falcifolia* (Nees) Hassl., *Nectandra membranacea* (Sw.) Griseb. var. *saligna* (Nees & Mart.) Hassl., *Nectandra saligna* Nees & Mart., *Nectandra saligna* Nees & Mart. var. *obscura* Meisn., *Nectandra tweediei* (Meisn.) Mez, *Ocotea angustifolia* Schrad., *Oreodaphne tweediei* Meisn., *Tetranthera megapotamica* Spreng.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, CLA, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Nectandra briquetii Hassl.

Árbol. Endémica.

Países: PRY(AMA).

Nectandra cissiflora Nees

Sin.: *Nectandra myriantha* Meisn., *Nectandra myriantha* Meisn. var. *attenuata* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nectandra cuspidata Nees & Mart. ex Nees

Sin.: *Nectandra pichurim* (Kunth) Mez var. *cuprea* Mez

Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Nectandra globosa (Aubl.) Mez

Sin.: *Laurus globosa* Aubl.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Nectandra grandiflora Nees

Árbol. Nativa. 600-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nectandra hihua (Ruiz & Pav.) Rohwer

Sin.: *Laurus hihua* Ruiz & Pav., *Nectandra megaphylla* Hassl.

Árbol. Nativa. 200-700 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Nectandra lanceolata Nees & Mart.

Sin.: *Nectandra lanceolata* Nees & Mart. var. *grandifolia* Mez, *Nectandra lanceolata* Nees & Mart. var. *paraguariensis* Hassl., nom. superfl., *Nectandra lanceolata* Nees & Mart. var. *parvifolia* Mez

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA, SPE).

Nectandra leucantha Nees & Mart.

Árbol. Nativa. 100-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb.

Sin.: *Laurus membranacea* Sw.

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN).

Nectandra nitidula Nees & Mart.

Arbusto o árbol. Nativa. 900-1400 m.

Países: BRA(PAR).

Nectandra oppositifolia Nees

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nectandra paranaensis Coe-Teix.

Árbol. Nativa. 200-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Nectandra puberula (Schott) Nees

Sin.: *Nectandra amara* Meisn., *Nectandra amara* Meisn. var. *australis* Meisn., *Persea puberula* Schott

Árbol. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAA).

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez

Sin.: *Laurus reticulata* Ruiz & Pav.

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

Ocotea Aubl.

Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez

Sin.: *Nectandra regnellii* Meisn., *Oreodaphne aciphylla* Nees & Mart.

Árbol. Nativa. 200.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea acutifolia (Nees) Mez

Sin.: *Oreodaphne acutifolia* Nees, *Oreodaphne acutifolia* Nees var. *prolifera* Nees, *Oreodaphne acutifolia* Nees var. *latifolia* Nees

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, ITA, PAI). URY(MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

Ocotea bicolor Vattimo-Gil

Sin.: *Ocotea gurgelii* Vattimo-Gil

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea brachybotrya (Meisn.) Mez

Sin.: *Oreodaphne brachybotrya* Meisn., *Oreodaphne lucida* Meisn.

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Ocotea catharinensis Mez

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA).

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez

Sin.: *Mespilodaphne corymbosa* Meisn., *Mespilodaphne organensis* Meisn., *Ocotea organensis* (Meisn.) Mez

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, PAI, SPE).

Ocotea daphnifolia (Meisn.) Mez

Sin.: *Ocotea vaccinioides* (Meisn.) Mez, *Oreodaphne daphnifolia* Meisn., *Oreodaphne vaccinioides* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea densiflora (Meisn.) Mez

Sin.: *Ocotea confusa* Hassl., *Persea densiflora* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, PAI, SPE).

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez

Sin.: *Ocotea pseudocorymbosa* Hassl., *Ocotea suaveolens* (Meisn.) Benth. & Hook. f. ex Hieron. var. *robusta* Hassl., *Oreodaphne diospyrifolia* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Ocotea dispersa (Nees & Mart. ex Nees) Mez

Sin.: *Ocotea hoehnei* Vattimo-Gil, *Ocotea rubiginosa* Mez, *Oreodaphne dispersa* Nees & Mart. ex Nees

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea floribunda (Sw.) Mez

Sin.: *Laurus floribunda* Sw., *Ocotea lanceolata* (Nees) Nees f. *latifolia* Hassl.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Ocotea glaziovii Mez

Árbol. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea gracilipes Mez

Sin.: *Ocotea lanceolata* (Nees) Nees var. *gracilipes* Hassl.

Árbol. Endémica.

Países: PRY(CAU, PAI).

Ocotea indecora (Schott) Mez

Sin.: *Ocotea elegans* Mez, *Ocotea indecora* Schott ex Meisn., hom. illeg., *Oreodaphne indecora* (Schott) Nees, *Persea indecora* Schott

Arbusto o árbol. Nativa. 700-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(SPE).

Ocotea lanata (Nees & Mart.) Mez

Sin.: *Oreodaphne lanata* Nees & Mart.

Arbusto o árbol. Nativa. 800.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea lancifolia (Schott) Mez

Sin.: *Ocotea lanceolata* (Nees) Nees, comb. illeg., *Ocotea lanceolata* (Nees) Nees var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Ocotea pulchra* Vattimo-Gil, *Oreodaphne lancifolia* (Schott) Nees, *Persea lancifolia* Schott, *Strychnodaphne lanceolata* Nees

Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN).

Ocotea laxa (Nees) Mez

Sin.: *Camphoromoea laxa* Nees, *Teleiandra glauca* Nees & Mart.

Arbolito. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea lobbii (Meisn.) Rohwer

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea marumbiensis Brotto & Baitello

Árbol. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea minarum (Nees & Mart.) Mez

Sin.: *Gymnobalanus minarum* Nees & Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

Ocotea nectandrifolia Mez

Sin.: *Ocotea kuhlmannii* Vattimo-Gil

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez

Sin.: *Oreodaphne notata* Nees & Mart.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea nunesiana (Vattimo-Gil) Baitello

Sin.: *Phoebe nunesiana* Vattimo-Gil

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea nutans (Nees) Mez

Sin.: *Oreodaphne nutans* Nees

Árbol. Nativa. 1000-1600 m.

Países: BRA(PAR).

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer

Sin.: *Mespilodaphne pretiosa* Nees & Mart.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea paranaensis Brotto, Baitello,

Cervi & E.P. Santos

Árbol. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso

Sin.: *Cinnamomum porosum* (Nees & Mart.) Kosterm., *Nectandra dubia* Hassl., *Nectandra speciosa* Chanc., nom. nud., *Oreodaphne porosa* Nees & Mart., *Phoebe porosa* (Nees & Mart. ex Nees) Mez

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Ocotea porphyria (Griseb.) van der Werff

Sin.: *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm., *Nectandra porphyria* Griseb., *Phoebe porphyria* (Griseb.) Mez

Árbol. Nativa. 700-1700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ocotea prolifera (Nees & Mart.) Mez

Sin.: *Mespilodaphne prolifera* Nees & Mart.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ocotea puberula (Rich.) Nees

Sin.: *Laurus puberula* Rich., *Ocotea macropoda* (Kunth) Mez, *Persea macropoda* Kunth, *Strychnodaphne puberula* (Rich.) Nees & Mart.

Árbol. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(CLA, RIV, SOR, TAC, TYT).

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez

Sin.: *Mespilodaphne pulchella* (Nees & Mart.) Meisn., *Mespilodaphne vaccinioides* Meisn., *Ocotea pulchella* (Nees) Mez var. *vaccinioides* (Meisn.) Hassl., *Oreodaphne pulchella* Nees & Mart.

Árbol. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA).

Ocotea riedeliana (Kosterm.) Kottaim.

Sin.: *Cinnamomum riedelianum* Kosterm., *Ocotea mandioccana* A. Quinet, nom. superfl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea silvestris Vattimo-Gil

Árbol. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea spectabilis (Meisn.) Mez

Sin.: *Oreodaphne spectabilis* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CEN, COA, ÑEE).

Ocotea suaveolens (Meisn.) Benth. & Hook. f. ex Hieron.

Sin.: *Ocotea suaveolens* (Meisn.) Benth. & Hook. f. ex Hieron. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Oreodaphne suaveolens* Meisn., *Strychnodaphne suaveolens* (Meisn.) Griseb.

Árbol. Nativa.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez

Sin.: *Oreodaphne teleiandra* Meisn.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea tristis (Nees & Mart.) Mez

Sin.: *Mespilodaphne cordata* Meisn., *Mespilodaphne tristis* (Nees & Mart.) Meisn., *Ocotea cordata* (Meisn.) Mez, *Oreodaphne tristis* Nees & Mart.

Árbolito. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea urbaniana Mez

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Ocotea velloziana (Meisn.) Mez

Sin.: *Oreodaphne velloziana* Meisn.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ocotea velutina (Nees) Rohwer

Sin.: *Oreodaphne velutina* Nees

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Persea Mill., nom. cons.

Persea alba Nees & Mart. ex Nees

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Persea americana Mill.

Sin.: *Laurus persea* L., *Persea edulis* Raf., nom. illeg., *Persea persea* (L.) Cockerell, nom. inval.

Árbol. Introducida. 1500-1800 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Persea fulva L.E. Kopp

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Persea lingue (Ruiz & Pav.) Nees

Sin.: *Laurus lingue* Ruiz & Pav., *Laurus lingue* Miers ex Bertero, *Nothaphoebe*

lingue (Ruiz & Pav.) Baeza, *Nothaphoebe meyeniana* Baeza, *Persea intermedia* Phil., *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees var. *canescens* Nees, *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees var. *palustris* Nees, *Persea meyeniana* Nees

Árbol. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Persea major (Meisn.) L.E. Kopp

Sin.: *Persea pyrifolia* Nees & Mart. ex Nees var. *betha* Nees

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Persea venosa Nees & Mart.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada para Paraguay (Hernández, 1997) sin indicar localidad o material de referencia.

Persea willdenovii Kosterm.

Sin.: *Persea pyrifolia* Nees & Mart., hom. illeg.

Árbol. Nativa. 1200.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rhodostemonodaphne Rohwer & Kubitzki

Rhodostemonodaphne macrocalyx

(Meisn.) Rohwer ex Madriñán

Sin.: *Goeppertia macrocalyx* Meisn., *Ocotea macrocalyx* (Meisn.) Mez

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

LECYTHIDACEAE

Cariniana

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze

Sin.: *Cariniana excelsa* Casar., *Cariniana excelsa* Casar. var. *puberula* Chodat & Hassl., *Couratari estrellensis* Raddi, *Couratari glaziovii* Taub. ex Glaz., nom. nud.

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, CON).

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze

Sin.: *Couratari legalis* Mart.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

LENTIBULARIACEAE

Genlisea

Genlisea aurea A. St.-Hil.

Sin.: *Genlisea minor* A. St.-Hil., *Genlisea ornata* Mart. ex Benj.

Hierba. Nativa. 1300-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Genlisea repens Benj.

Sin.: *Genlisea pulchella* Tutin, *Genlisea pusilla* Warm.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, SPE).

Pinguicula

Pinguicula antarctica Vahl

Sin.: *Pinguicula magellanica* Comm. ex Franch., *Pinguicula obtusa* Benj.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Pinguicula australandina Gluch

Hierba. Endémica. 1400-2300 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, ARA).

Pinguicula chilensis Gay

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Pinguicula nahuelbutensis Gluch

Hierba. Endémica. 1100-1300 m.

Países: CHL(ARA).

Utricularia L.**Utricularia breviscapa** C. Wright ex

Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(CEN, CON).

Utricularia cucullata A. St.-Hil. & Girard

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Utricularia erectiflora A. St.-Hil. & GirardSin.: *Utricularia spicata* Sylvén

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Utricularia foliosa L.Sin.: *Utricularia oligosperma* A. St.-Hil.,*Utricularia oligosperma* A. St.-Hil. var. *beta* A. St.-Hil.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA). URY(ROC).

Utricularia gibba L.Sin.: *Utricularia gayana* A.DC., *Utricularia longirostris* Leconte ex Elliott, *Utricularia obtusa* Sw., *Utricularia pallens* A. St.-Hil. & Girard, *Utricularia tenuis* Cav.,*Utricularia tenuis* Cav. var. *poepigii* A. DC.

Hierba acuática. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, MAU, BIO, ARA, LSR). PRY(APY, CEN, CON, COA, ITA, PHA). URY(COL, ROC).

Utricularia hydrocarpa Vahl

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Utricularia laxa A. St.-Hil. & GirardSin.: *Utricularia colorata* Benj., *Utricularia laxa* A. St.-Hil. & Girard var. *gaudichaudii* A. St.-Hil. & Girard

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, PAI). URY(RNO).

Utricularia myriocista A. St.-Hil. & Girard

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Utricularia nana A. St.-Hil. & Girard

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR). PRY.

Utricularia nervosa G. Weber ex Benj.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV).

Utricularia olivacea C. Wright ex Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Utricularia platensis Speg.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, RNE, SAL, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CAS, COL, ROC).

Utricularia poconensis FrommSin.: *Utricularia luetzelburgii* Merl ex Luetzelb., nom. nud.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS).

Utricularia praelonga A. St.-Hil. & GirardSin.: *Calpidisca lundii* (A. DC.) Moldenke, *Utricularia lundii* A. DC., *Utricularia polyschista* Benj.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Utricularia pusilla VahlSin.: *Utricularia leptantha* Benj.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA, MIE).

Utricularia reniformis A. St.-Hil.Sin.: *Utricularia janthina* Hook., *Utricularia maxima* G. Weber ex Benj.

Hierba. Nativa. 700-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Utricularia simulans Pilg.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(CON).

Utricularia subulata L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE). URY(CAS).

Utricularia tricolor A. St.-Hil.Sin.: *Utricularia fontana* A. St.-Hil. & Girard, *Utricularia globulariifolia* Mart. ex Benj., *Utricularia monantha* Benj.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, GUA, SPE). URY(RIV).

Utricularia tridentata Sylvén

Sin.: *Utricularia ostenii* Hicken, *Utricularia rubra* Larrañaga, *Utricularia ternata* Sylvén

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MON, SJO).

Utricularia triloba Benj.

Sin.: *Utricularia nervosa* G. Weber ex Benj. var. *capillaris* Benj.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, COA).

LILIACEAE

Lilium L.

Lilium regale E.H. Wilson

Hierba. Introducida. 700-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

LINACEAE

Cliococca Bab.

Cliococca selaginoides (Lam.) C.M. Rogers & Mildner

Sin.: *Cliococca tenuifolia* Bab., *Linum babingtonii* Planch., nom. superfl., *Linum mycophyllum* Larrañaga, nom. illeg., *Linum selaginoides* Lam., *Linum selaginoides* Lam. var. *chilense* Planch.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR). PRY(APY). URY(MON, ROC).

Linum L.

Linum bienne Mill.

Sin.: *Linum angustifolium* Huds., *Linum usitatissimum* L. subsp. *angustifolium* (Huds.) Thell., *Linum usitatissimum* L. subsp. *biene* (Mill.) Thell.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Linum brevifolium A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Linum brevifolium* A. St.-Hil. & Naudin f. *majus* Urb., *Linum brevifolium* A. St.-Hil. & Naudin f. *squamifolium* (Schiede) Urb., *Linum oligophyllum* Willd. ex Schult. var. *squamifolium* Schiede

Hierba. Nativa. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Linum burkartii Mildner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). URY(FLA).

Linum carneum A. St.-Hil.

Sin.: *Linum formosum* Urb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). URY(COL, FLA).

Linum catharticum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Linum chamissonis Schiede

Sin.: *Linum aquilinum* Molina var. *grandiflorum* Hook. & Arn., *Linum macraei* Benth. var. *cumingii* (Lodd.) Urb., *Linum macraei* Benth. var. *oligophyllum* Reiche, *Linum oligophyllum* Hook. & Arn., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Linum cremnophilum I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Linum erigeroides A. St.-Hil.

Sin.: *Linum littorale* A. St.-Hil. var. *corymbosum* Urb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS). URY.

Linum littorale A. St.-Hil. var. **littorale**

Sin.: *Linum junceum* A. St.-Hil., *Linum littorale* A. St.-Hil., *Linum littorale* A. St.-Hil. f. *paniculatum* Urb., *Linum littorale* A. St.-Hil. var. *glandulosum* A. St.-Hil., *Linum littorale* A. St.-Hil. var. *glomeratum* Urb.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLA, RIV).

Notas: Especie excluida de la Flora Argentina (Iturbe & Bach, 2017)

Linum littorale A. St.-Hil. var. **oblongifolium** (Urb.) C.M. Rogers

Sin.: *Linum junceum* A. St.-Hil. var. *oblongifolium* Urb.

Hierba. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Linum macraei Benth. var. **macraei**

Sin.: *Linum aquilinum* Molina, *Linum chironioides* Griseb., *Mesynium chilense* Raf., nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Linum macraei Benth. var. **marticorenae** Mildner

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

Linum prostratum Dombey ex Lam.

Sin.: *Linum paposanum* Phil.

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: CHL(ANT).

Linum ramosissimum Gay

Sin.: *Linum chamissonis* Schiede var. *obtusifolium* (Phil.) Reiche, *Linum chamissonis* Schiede var. *ramosissimum* (Gay) Reiche, *Linum obtusifolium* Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(COQ).

Linum scoparium Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-1600 m.

Países: ARG(COR, TUC). URY(LAV, TYT).

Linum smithii Mildner

Hierba. Endémica. 1400-1700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Linum usitatissimum L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, VAL, BIO, ARA, JFE). URY(MON).

LINDERNIACEAE

Lindernia All.

Lindernia diffusa (L.) Wettst.

Sin.: *Vandellia diffusa* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Lindernia dubia (L.) Pennell

Sin.: *Capraria gratioloides* L., nom. superfl., *Gratiola anagallidea* Michx., *Gratiola dubia* L., *Ilysanthes dubia* (L.) Barnhart, *Ilysanthes dubia* (L.) Barnhart var. *inundata* Pennell, *Ilysanthes gratioloides* (L.) Benth., *Lindernia anagallidea* (Michx.) Pennell, *Lindernia*

dubia (L.) Pennell var. *anagallidea* (Michx.) Cooperr., *Lindernia dubia* (L.)

Pennell var. *inundata* (Pennell) Pennell

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, RME). PRY(ITA). URY(ART, DUR, ROC, SOR, TYT).

Lindernia rotundifolia (L.) Alston

Sin.: *Gratiola rotundifolia* L., *Lindernia microcalyx* Pennell & Stehlé

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Micranthemum Michx., nom. cons.

Micranthemum umbrosum (J.F. Gmel.) S.F. Blake

Sin.: *Anonymos umbrosa* Walter, nom. inval., *Globifera umbrosa* J.F. Gmel., *Micranthemum emarginatum* Elliot, *Micranthemum orbiculatum* Michx., nom. illeg., *Micranthemum orbiculatum* Michx. var. *emarginatum* (Elliott) C. Mohr, *Micranthemum orbiculatum* Michx. var. *tweediei* (Benth.) J.A. Schmidt, *Micranthemum tweediei* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ). URY(COL, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TYT).

Torenia L.

Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Sin.: *Lindernia thouarsii* (Cham. & Schltdl.) Edwin, *Nortenia thouarsii* Cham. & Schltdl., *Torenia nortenia* Steud.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

LOASACEAE

Blumenbachia Schrad., nom. cons.

Blumenbachia catharinensis Urb. & Gilg

Hierba voluble. Endémica. 1300-1400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Blumenbachia dissecta (Hook. & Arn.)

Weigend & J. Grau

Sin.: *Blumenbachia espigneira* Gay, *Caiophora dissecta* (Hook. & Arn.) Urb. & Gilg, *Caiophora espigneira* (Gay) Urb. & Gilg, *Caiophora kurtzii* Urb. & Gilg ex Urb. & Gilg, *Caiophora patagonica* (Speg.) Urb. & Gilg, *Loasa dissecta* Hook. & Arn., *Loasa microcalyx* Phil., *Loasa patagonica* Speg., *Loasa spegazzinii* Macloskie, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Blumenbachia eichleri Urb.

Sin.: *Blumenbachia aspera* Urb., *Blumenbachia scabra* (Miers) Urb. var. *schenkiana* Urb., *Caiophora eichleri* (Urb.) Urb., *Caiophora scabra* (Miers) Urb. var. *schenckiana* (Urb.) Urb., *Gripidea asperata* Miers, *Mentzelia aspera* Vell., hom. illeg.

Hierba voluble. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Blumenbachia exalata Weigend

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Blumenbachia hieronymi Urb.

Sin.: *Blumenbachia multifida* Griseb., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 1900-2500 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Blumenbachia insignis Schrad.

Sin.: *Blumenbachia multifida* Hook. f., *Blumenbachia palmata* Cambess., *Caiophora sylvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Loasa helicteroides* Meyen ex Walp., *Loasa muralis* Griseb., *Loasa palmata* Spreng., *Loasa patula* Graham

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(COL, LAV, MON, ROC, SJO).

Blumenbachia latifolia Cambess.

Sin.: *Blumenbachia urens* Urb., *Loasa urens* Vell., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, GUA, MIE). URY(ART, COL, LAV, MAL, RNO).

Blumenbachia prietea Gay

Sin.: *Caiophora prietea* (Gay) Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Blumenbachia scabra (Miers) Urb.

Sin.: *Caiophora scabra* (Miers) Urb., *Gripidea scabra* Miers

Hierba voluble. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Blumenbachia sylvestris Poepp.

Sin.: *Blumenbachia domeykoana* Phil., *Blumenbachia mitis* Phil., *Blumenbachia nemorosa* Phil., *Blumenbachia scandens* Meyen, *Blumenbachia sylvestris* Poepp. var. *australis* Urb. & Gilg, *Blumenbachia sylvestris* Poepp. var. *leptocarpa* Speg.,

Caiophora scandens (Meyen) Meyen & Klotzsch ex Walp., *Caiophora scandens* (Meyen) Meyen & Klotzsch ex Walp. var. *orientalis* Urb. & Gilg ex Kuntze, *Caiophora sylvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Caiophora sylvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg var. *leptocarpa* (Speg.) Urb. & Gilg, *Caiophora sylvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg var. *mitis* (Phil.) Urb. & Gilg, *Caiophora tomentosula* Urb. & Gilg, *Loasa ochagaviae* Phil., *Loasa scandens* Meyen, *Loasa volckmannii* Phil.

Hierba. Endémica. 500-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Caiophora C. Presl

Caiophora aconquijae Sleumer

Hierba voluble. Endémica. 1500-3200 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Caiophora arechavaletae (Urb.) Urb. & Gilg

Sin.: *Blumenbachia arechavaletae* Urb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(MON).

Caiophora boliviana Urb. & Gilg

Hierba. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(SAL).

Caiophora canarinoides (Lenné & K. Koch) Urb. & Gilg

Sin.: *Caiophora macrophylla* Rusby, *Illairea canarinoides* Lenné & K. Koch, *Loasa canarinoides* (Lenné & K. Koch) Britton

Hierba. Nativa. 2900-3000 m.

Países: ARG(SAL).

Caiophora cernua (Griseb.) Urb. & Gilg ex Kurtz

Sin.: *Blumenbachia cernua* Griseb., *Caiophora joergensenii* I.M. Johnst., *Caiophora saltensis* Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 900-2800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Caiophora chuquitensis (Meyen) Urb. & Gilg

Sin.: *Blumenbachia chuquitensis* (Meyen) Hook. f., *Caiophora albiflora* (Griseb.) Urb. & Gilg, *Caiophora angustisecta* Urb. & Gilg, *Caiophora fiebrigii* Urb. & Gilg, *Caiophora heptamera* (Wedd.) Urb. & Gilg, *Caiophora heptamera* (Wedd.) Urb. & Gilg var. *albiflora* Griseb., *Caiophora horrida* Urb. & Gilg, *Caiophora lorentziana* Urb. & Gilg, *Caiophora macrocarpa* Urb. & Gilg, *Caiophora orbignyana* Urb. & Gilg, *Caiophora sphaerocarpa* Urb. & Gilg, *Caiophora superba* Phil., *Loasa chuquitensis* Meyen, *Loasa heptamera* Wedd., *Loasa heptamera* Wedd. var. *albiflora* Griseb.

Hierba o subarbusto. Nativa. 3000-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Caiophora cirsiifolia C. Presl

Sin.: *Blumenbachia sepiaria* Ruiz & Pav. ex G. Don, *Caiophora preslii* Urb. & Gilg, *Caiophora sepiaria* (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr.

Hierba voluble. Nativa. 3500.

Países: CHL(AYP, TAR).

Caiophora clavata Urb. & Gilg

Sin.: *Caiophora tucumana* Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 1900-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Caiophora coronata (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn.

Sin.: *Blumenbachia coronata* (Gillies ex Arn.) Rob., *Caiophora absinthifolia* C.

Presl, *Caiophora pycnophylla* Urb. & Gilg,
Loasa coronata Gillies ex Arn.

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Caiophora deserticola Weigend & M. Ackermann

Hierba o subarbusto. Nativa. 2900-3700 m.

Países: CHL(TAR).

Caiophora dumetorum Urb. & Gilg

Sin.: *Caiophora clavata* Urb. & Gilg var. *dumetorum* (Urb. & Gilg) Sleumer

Hierba voluble. Nativa. 2500-3700 m.

Países: ARG(JUU, LRI, MEN, SAL, TUC).

Caiophora hibiscifolia (Griseb.) Urb. & Gilg

Sin.: *Loasa hibiscifolia* Griseb.

Hierba. Nativa. 200-2700 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Caiophora lateritia Klotzsch

Sin.: *Blumenbachia lateritia* Griseb., *Caiophora platyphylla* Urb. & Gilg, *Loasa coccinea* Loudon, nom. nud., *Loasa lateritia* Hook., nom. illeg., *Raphisanthe lateritia* Lilja

Hierba voluble. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, NEU, SAL, SDE, TUC).

Caiophora mollis (Griseb.) Urb. & Gilg

Sin.: *Caiophora heptamera* (Wedd.) Urb. & Gilg var. *mollis* Griseb., *Loasa heptamera* Wedd. var. *mollis* Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

Caiophora nivalis Lillo

Hierba. Endémica. 2500-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Caiophora pulchella Urb. & Gilg

Sin.: *Loasa pulchella* (Urb. & Gilg) R.L.

Pérez-Mor. & Crespo

Hierba. Endémica. 2200-3800 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Caiophora rosulata (Wedd.) Urb. & Gilg subsp. **rosulata**

Sin.: *Caiophora anemonoides* Urb. & Gilg, *Caiophora rahmeri* Phil., *Loasa rosulata* Wedd.

Hierba. Nativa. 3500-4300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Caiophora rosulata (Wedd.) Urb. & Gilg subsp. **taraxacoides** (Killip) Weigend & M. Ackermann

Sin.: *Caiophora acanthoides* Urb. & Gilg, *Caiophora taraxacoides* Killip

Hierba. Nativa. 3600-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Caiophora sleumeri Slanis, Perea & A. Grau

Hierba. Endémica. 2700-3000 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Caiophora spagazzinii Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 2500-3200 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Caiophora vallegrandensis Slanis & Bulacio

Hierba. Endémica. 2400-2600 m.

Países: ARG(JUU).

Grausa Weigend & R.H. Acuña

Grausa acaulis (Phil.) L. Santilli, D.H. Cohen & R.H. Acuña

Sin.: *Blumenbachia acaulis* Phil., *Loasa acaulis* (Phil.) Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 1200-2500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).

Grausa gayana (Urb. & Gilg) Weigend & R. Acuña

Sin.: *Loasa gayana* Urb. & Gilg

Hierba voluble. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ARA, LSR, LLA).

Grausa lateritia (Gillies ex Arn.) Weigend & R.H. Acuña

Sin.: *Loasa lateritia* Gillies ex Arn.

Hierba. Endémica. 1300-3000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA).

Grausa martinii (Phil.) Weigend & R.H. Acuña

Sin.: *Loasa martinii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ARA, LSR, LLA).

Grausa micrantha (Poepp.) Weigend & R. Acuña

Sin.: *Loasa micrantha* Poepp., *Loasa remyi* Gay

Hierba. Endémica. 200-800 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Grausa sagittata (Hook. & Arn.) Weigend & R. Acuña

Sin.: *Loasa sagittata* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LLA).

Huidobria Gay

Huidobria chilensis Gay

Sin.: *Loasa chilensis* (Gay) Urb. & Gilg

Arbusto. Endémica. 0-1900 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Loasa Adans.

Loasa acanthifolia Desr.

Sin.: *Loasa punicea* Phil.

Hierba. Endémica. 1000.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Loasa acerifolia Dombey ex Juss.

Sin.: *Loasa furcata* Phil., *Loasa solanifolia* Gay, *Loasa vitifolia* Ruiz & Pav., *Loasa williamsii* F. Phil.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Loasa arnottiana Gay

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(COQ).

Loasa caespitosa Phil.

Hierba. Endémica. 2900-3500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Loasa chrysantha L. Santilli, R. Acuña & Lavandero

Hierba. Endémica. 2000-3300 m.

Países: CHL(ATA).

Loasa elongata Hook. & Arn.

Sin.: *Loasa bertrandii* Phil., *Loasa urmenetae* Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Loasa floribunda Hook. & Arn.

Sin.: *Loasa floribunda* Hook. & Arn. var. *brachysepala* Urb. & Gilg

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Loasa heterophylla Hook. & Arn.

Sin.: *Loasa aphanantha* Urb. & Gilg, *Loasa barneoudii* Gay, *Loasa insons* Poepp. var. *prostrata* Poepp., *Loasa parviflora* Phil., hom. illeg., *Loasa subandina* F. Phil.

Hierba. Endémica. 1700-2600 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Loasa humilis F. Phil.

Hierba. Endémica. 3000-3200 m.

Países: CHL(MAU).

Loasa illapelina Phil.

Sin.: *Loasa illapelina* Phil. var. *laciniata* (Phil.) Urb. & Gilg, *Loasa leucantha* Bertero ex Steud.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Loasa insons Poepp.

Sin.: *Loasa intricata* Gay, *Loasa meyeniana* Walp., *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *insons* (Poepp.) Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 1200-2300 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Loasa mendocina (Urb. & Gilg) R.H. Acuña, Weigend & D.H. Cohen

Sin.: *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *mendocina* Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 1300-2800 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Loasa mollensis Muñoz-Schick & Trenquale

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(VAL).

Loasa multifida Gay

Hierba. Endémica. 300-1100 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Loasa nitida Desr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Loasa pallida Gillies ex Arn.

Sin.: *Loasa aldunatea* Gay

Subarbusto. Endémica. 1400-3200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Loasa paradoxa Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 2900-3500 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Loasa placei Lindl.

Sin.: *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *placei* (Lindl.) Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 300-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Loasa prostrata Gillies ex Arn.

Sin.: *Loasa alba* D. Don, *Loasa prostrata* Gillies ex Arn. var. *cumingii* Hook. & Arn., *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *prostrata* (Gillies ex Arn.) Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 900-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Loasa rotundifolia Phil.

Hierba o subarbusto. Endémica. 800-2300 m.

Países: CHL(ATA).

Loasa sclareifolia Juss.

Sin.: *Loasa cirsiifolia* Kunze ex Walp., *Loasa nemoralis* Phil., *Loasa sclareifolia* Juss. var. *brachycarpa* Urb. & Gilg, *Loasa sclareifolia* Juss. var. *inermis* Urb. & Gilg, *Loasa sclareifolia* Juss. var. *nemoralis* (Phil.) Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Loasa sigmoidea Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 2000-3300 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Loasa tricolor Ker Gawl.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Loasa triloba Dombey ex Juss.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Mentzelia L.

Mentzelia albescens (Gillies ex Arn.) Griseb.

Sin.: *Bartonia albescens* Gillies ex Arn., *Bartonia sinuata* C. Presl, *Bartonia wrightii* (A. Gray) Walp., *Mentzelia wrightii* A. Gray, *Nuttallia albescens* (Gillies ex Arn.) Standl., *Nuttallia wrightii* (A. Gray) Greene, *Touterea wrightii* (A. Gray) Rydb.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, RME). URY(SOR).

Mentzelia aspera L.

Sin.: *Acrolasia squalida* Hook. f., *Mentzelia corumbaensis* Hoehne, *Mentzelia fragilis* Huber, *Mentzelia propinqua* F. Aresch., *Mentzelia triloba* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(JUU, MEN, SAL, TUC). PRY(APY).

Mentzelia parvifolia Urb. & Gilg ex Kurtz

Sin.: *Acrolasia elata* Phil., *Mentzelia grisebachii* Urb. & Gilg, *Mentzelia jujuyensis* Sleumer, *Mentzelia parviflora* A. Heller, *Mentzelia parvifolia* Urb. & Gilg ex Kurtz var. *transiens* Sleumer

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Mentzelia scabra Kunth subsp. **atacamensis** (Urb. & Gilg) Weigend

Sin.: *Mentzelia chilensis* Gay var. *atacamensis* Urb. & Gilg

Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(AYP, ANT, COQ).

Mentzelia scabra Kunth subsp. **chilensis** (Gay) Weigend

Sin.: *Loasa ignea* Phil., *Mentzelia chilensis* Gay, *Mentzelia fendleriana* Urb. & Gilg, *Mentzelia ignea* (Phil.) Urb. & Gilg

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Mentzelia scabra Kunth subsp. **cordobensis** (Urb. & Gilg ex Kurtz) Weigend

Sin.: *Mentzelia chilensis* Griseb., hom. illeg., *Mentzelia cordobensis* Urb. & Gilg ex Kurtz

Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Mentzelia solierii (Gay) Urb. & Gilg ex Urb.

Sin.: *Acrolasia bartonioides* C. Presl, *Acrolasia pinnatifida* Phil., *Acrolasia solierii* Gay, *Mentzelia andina* Urb. & Gilg, *Mentzelia bartonioides* (C. Presl) Urb. & Gilg, nom. illeg., *Mentzelia citrina* Urb. & Gilg, *Mentzelia haenkei* A. Gray, nom. illeg., *Mentzelia pinnatifida* (Phil.) Urb. & Gilg, *Mentzelia pinnatifida* (Phil.) Urb. & Gilg var. *uniseriata* Hauman

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ).

Nasa Weigend

Nasa urens (Jacq.) Weigend

Sin.: *Loasa urens* Jacq.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: CHL(ANT).

Pinnasa Weigend & R.H. Acuña

Pinnasa amabilis (Urb. & Gilg) R.H.

Acuña, Weigend & D.H. Cohen

Sin.: *Loasa amabilis* Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 1600-2200 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Pinnasa bergii (Hieron.) Weigend & R.H. Acuña

Sin.: *Loasa argentina* Urb. & Gilg ex Speg., *Loasa asterias* Dusén, *Loasa bergii* Hieron., *Loasa karraikensis* Macloskie, *Loasa patagonica* Urb. & Gilg, nom. nud., *Loasa pinnatifida* Gillies ex Arn. var. *gracilis* Speg., *Loasa urbanii* A. Soriano

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Pinnasa incurva (R.L. Pérez-Mor. & Crespo) D.H. Cohen, R.H. Acuña & Weigend

Sin.: *Loasa incurva* Crespo & R.L. Pérez-Mor.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Pinnasa kurtzii (Urb. & Gilg) R.H. Acuña, Weigend & D.H. Cohen

Sin.: *Loasa kurtzii* Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 2400-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Pinnasa nana (Phil.) Weigend & R.H. Acuña

Sin.: *Loasa nana* Phil.

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, RME).

Pinnasa pinnatifida (Gillies ex Arn.) Weigend & R.H. Acuña

Sin.: *Loasa acutiloba* Urb. & Gilg, *Loasa bridgesii* Urb. & Gilg, *Loasa chillana* Urb. & Gilg, *Loasa filicifolia* Poepp., *Loasa pedicularifolia* Meyen, *Loasa petrophila* Urb. & Gilg, *Loasa pinnatifida* Gillies ex

Arn., *Loasa poeppigiana* Urb. & Gilg,
Loasa tripartita Urb. & Gilg
Hierba. Endémica. 1700-2500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU,
BIO, ARA, LSR, RME).

Pinnasa volubilis (Dombey ex Juss.)
Weigend & R.H. Acuña
Sin.: *Loasa alpina* (Poepp.) Urb. & Gilg,
Loasa artemisiifolia Poepp. ex Urb. & Gilg,
Loasa multifida Ruiz & Pav., hom. illeg.,
Loasa volubilis Dombey ex Juss., *Loasa*
volubilis Dombey ex Juss. var. *alpina*
Poepp.
Hierba. Endémica. 100-2600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Presliophytum (Urb. & Gilg)
Weigend

Presliophytum incanum (Graham)
Weigend
Sin.: *Loasa incana* Graham
Hierba. Nativa.
Países: CHL(AYP).

Presliophytum malesherbioides (Phil.)
R.H. Acuña & Weigend
Sin.: *Loasa longiseta* Phil., *Loasa*
malesherbioides Phil.
Hierba. Endémica. 1400-3500 m.
Países: ARG(SJU). CHL(TAR, ANT,
ATA, COQ).

Presliophytum sessiliflorum (Phil.) R.H.
Acuña & Weigend
Sin.: *Loasa sessiliflora* Phil.
Subarbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: CHL(ATA).

Prosa R.H. Acuña & Weigend

Prosa fruticosa (Phil.) R.H. Acuña &
Weigend
Sin.: *Huidobria fruticosa* Phil., *Loasa*
fruticosa (Phil.) Urb. & Gilg
Arbusto. Endémica. 0-3700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Scyphanthus Sweet

Scyphanthus elegans Sweet
Sin.: *Grammatocarpus cumingii* C. Presl,
Grammatocarpus volubilis C. Presl,
Scyphanthus stenocarpus (Poepp.) Urb. &
Gilg
Hierba voluble. Endémica. 800-1600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Xylopodia Weigend

Xylopodia laurensis C.M. Martín & C.A.
Zanotti
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: ARG(JUJ).

LOGANIACEAE

Spigelia L.

Spigelia andina Fern. Casas
Hierba. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Spigelia beyrichiana Cham. & Schltl.
Sin.: *Spigelia dusenii* L.B. Sm.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Spigelia blanchetiana A. DC.
Sin.: *Spigelia blanchetiana* A. DC. var.
hatschbachii L.B. Sm.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Spigelia caaguazuensis Kraenzl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAU).

Spigelia catarinensis E.F. Guim. &
Fontella
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).

Spigelia flemmingiana Cham. & Schltl.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Spigelia insignis Progel
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(MIE).

Spigelia kleinii L.B. Sm.
Sin.: *Spigelia hatschbachii* Fern. Casas,
Spigelia kleinii L.B. Sm. var. *paranaensis*
E.F. Guim. & Fontella
Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000
m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU).

Spigelia martiana Cham.
Sin.: *Spigelia riparia* L.B. Sm.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, PAI).
URY(ART, SJO, SOR, TYT).

Spigelia nicotianiflora Chodat & Hassl.
Sin.: *Spigelia nicotianiflora* Chodat &
Hassl. var. *capibarensis* Chodat & Hassl.,
Spigelia nicotianiflora Chodat & Hassl.
var. *puberula* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(CAN).

Spigelia paraguariensis Chodat

Sin.: *Spigelia epilobioides* Kraenzl.,
Spigelia paraguariensis Chodat f.
subscandens Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(SCA).
 PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,
 COA, MIE, PAI).

Spigelia pusilla Mart.

Sin.: *Spigelia pauciflora* A. DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Spigelia riedeliana (Progel) E.F. Guim. & Fontella

Sin.: *Spigelia blanchetiana* A. DC. var.
riedeliana Progel

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

Spigelia rojasiana Kraenzl.

Sin.: *Spigelia reitzii* L.B. Sm.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA,
 AMA, CAU).

Spigelia scabra Cham. & Schltdl.

Sin.: *Spigelia breviflora* (Chodat & Hassl.)
 Hurley ex Fern. Casas, *Spigelia*
chamaedryoides Kraenzl., *Spigelia*
guaranitica Chodat & Hassl., *Spigelia*
guaranitica Chodat & Hassl. var. *interrupta*
 Kraenzl., *Spigelia hassleriana* Chodat,
Spigelia hassleriana Chodat f. *roseiflora*
 Chodat & Hassl., *Spigelia hassleriana*
 Chodat var. *major* Chodat & Hassl.,
Spigelia hassleriana Kraenzl., hom. illeg.,
Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl.,
Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl.
 var. *breviflora* Chodat & Hassl., *Spigelia*
humboldtiana Cham. & Schltdl. var.
obtusifolia Progel, *Spigelia humboldtiana*
 Cham. & Schltdl. var. *pubescens* Progel,
Spigelia intermedia Arechav., *Spigelia*
rubelliana Arechav., *Spigelia scabra*

Cham. & Schltdl. var. *angustata* Progel,
Spigelia uruguayana Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
 FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN,
 CON, COA, GUA, PAI). URY(RIV, SJO,
 TAC).

Spigelia stenophylla Progel

Sin.: *Spigelia araucariensis* E.F. Guim. &
 Fontella

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, PAY,
 RNO, RIV, TAC).

Spigelia tetraptera Taub.

Subarbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Spigelia valenzuelae Chodat & Hassl.

Sin.: *Spigelia ramosa* L.B. Sm., *Spigelia*
valenzuelae Chodat & Hassl. var. *major*
 Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA, PAI, SPE).

Spigelia vestita L.B. Sm.

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Strychnos L.**Strychnos brasiliensis** (Spreng.) Mart.

Sin.: *Geniostoma brasiliense* Spreng.,
Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. var.
selloana Progel, *Strychnos niederleinii*
 Gilg, *Strychnos oligoneura* Gilg, *Strychnos*
sellowiana (Progel) Gilg

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CON,
 COA, GUA). URY(ART).

Strychnos fulvotomentosa Gilg

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Strychnos nigricans Progel

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Strychnos parvifolia A. DC.

Sin.: *Strychnos parvifolia* A. DC. var.
acutifolia Hassl., nom. nud., *Strychnos*
parvifolia A. DC. var. *rupestris* Hassl.,
 nom. nud.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

Strychnos pseudoquina A. St.-Hil.

Sin.: *Strychnos pseudoquina* A. St.-Hil.
 var. *longiflora* Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Strychnos rubiginosa A. DC.

Liana. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Strychnos trinervis (Vell.) Mart.

Sin.: *Gardenia trinervis* Vell., *Strychnos*
blumenaviensis Gilg

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

LORANTHACEAE**Desmaria** Tiegh.**Desmaria mutabilis** (Poepp. & Endl.)

Tiegh. ex T. Durand & B.D. Jacks.

Sin.: *Loranthus mutabilis* Poepp. & Endl.,
Phrygilanthus mutabilis (Poepp. & Endl.)
 Eichl.

Arbusto parásito. Endémica. 0-1700 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Ligaria Tiegh.

Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh.

Sin.: *Elytranthe obmunita* (Spreng.) G. Don, *Ligaria coronata* Tiegh., *Ligaria emarginata* Tiegh., *Ligaria lanceolata* Tiegh., *Ligaria orbignyana* Tiegh., *Ligaria viscoides* Tiegh., *Loranthus cuneifolius* Ruiz & Pav., *Loranthus montevidensis* Spreng., *Loranthus obmunitus* Spreng., *Loranthus viscoideus* Poepp. ex Eichler, nom. inval., *Phrygilanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Psittacanthus coronatus* (Tiegh.) Engl., *Psittacanthus coronatus* (Tiegh.) Hauman & Irigoyen, hom. illeg., *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) G. Don subsp. *coronatus* (Tiegh.) Engl., *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) G. Don subsp. *lanceolatus* (Tiegh.) Engl., *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) G. Don subsp. *montevidensis* (Spreng.) Engl., *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) G. Don var. *flavus* Abbiatti, *Psittacanthus hortonii* Standl. & F.A. Barkley, *Psittacanthus obmunitus* Blume, nom. inval.

Arbusto parásito. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME). URY(CAS, COL, MAL, RNO, SAO, TAC, TYT).

Notanthera (DC.) G. Don

Notanthera heterophylla (Ruiz & Pav.) G. Don

Sin.: *Loranthus berteroi* Hook. & Arn., *Loranthus buxifolius* Cham. & Schltdl., *Loranthus eschscholzanus* Mart., *Loranthus heterophyllus* Ruiz & Pav., *Loranthus valdivianus* Miq., *Phrygilanthus berteroi* (Hook. & Arn.) Eichler

Arbusto parásito. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE).

Psittacanthus Mart.

Psittacanthus cordatus (Hoffmanns.) G. Don

Sin.: *Arthraxon cordatum* (Hoffmanns.) Tiegh., *Loranthus cordatus* Hoffmanns., *Psittacanthus cordatus* (Hoffmanns.) G. Don f. *latifolia* Chodat & Hassl.

Parásita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). PRY(APY, CEN, CHO, PHA, SPE).

Psittacanthus dichroos (Mart.) Mart.

Sin.: *Loranthus dichroos* Mart.

Hierba hemiparásita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Struthanthus Mart., nom. cons.

Struthanthus acuminatus (Ruiz & Pav.) Blume ex J.F. Macbr.

Sin.: *Loranthus acuminatus* Ruiz & Pav., *Notanthera acuminata* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Peltomesa acuminata* (Ruiz & Pav.) Raf., *Struthanthus acuminatus* (Ruiz & Pav.) Blume, nom. inval., *Struthanthus acuminatus* (Ruiz & Pav.) Kuijt, nom. inval.

Parásita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, PHA).

Struthanthus marginatus (Desr.) G. Don
Sin.: *Loranthus marginatus* Desr.

Hierba hemiparásita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Struthanthus rhynchophyllus Eichler

Sin.: *Struthanthus martianus* Dettke & Waechter, *Struthanthus vulgaris* Eichler, nom. illeg.

Hierba hemiparásita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Struthanthus spathulatus Rizzini

Sin.: *Struthanthus sessiliflorus* Kuijt

Hierba hemiparásita. Nativa. 400-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Struthanthus uraguensis (Hook. & Arn.) G. Don

Sin.: *Loranthus uraguensis* Hook. & Arn., *Loranthus uraguensis* Hook. & Arn. var. *angustifolius* Griseb., *Loranthus uraguensis* Hook. & Arn. var. *complexus* (Eichler) Kuntze, *Struthanthus angustifolius* (Griseb.) Hauman, *Struthanthus complexus* Eichler, *Struthanthus llanensis* Ruiz Leal, *Struthanthus rojasianus* Rizzini

Arbusto parásito. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, LRI, MIS, SLU, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON, PHA). URY(PAY, SAO, TYT).

Tripodanthus (Eichler) Tiegh.

Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh.

Sin.: *Gaiadendron eugenioides* (Kunth) G. Don, *Loranthus acutifolius* Ruiz & Pav., *Loranthus eugenioides* Kunth, *Loranthus ligustrifolius* C. Presl ex Schult. & Schult.f., *Loranthus suaveolens* Kunth, *Phrygilanthus acutifolius* (Ruiz & Pav.)

Eichler, *Phrygilanthus acutifolius* (Ruiz & Pav.) Eichler var. *eugenioides* (Kunth) Rizzini, *Phrygilanthus eugenioides* (Kunth) Eichler, *Phrygilanthus ligustrifolius* (C. Presl ex Schult. & Schult.f.) Eichler, *Phrygilanthus repens* Patsch., *Phrygilanthus suaveolens* (Kunth) Eichler, *Psittacanthus acutifolius* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Tripodanthus eugenioides* (Kunth) Tiegh., *Tripodanthus ligustrinus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Tiegh., *Tripodanthus suaveolens* (Kunth) Tiegh.

Arbusto parásito. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(ART, DUR, RIV, ROC, TAC).

Tripodanthus flagellaris (Cham. & Schltdl.) Tiegh.

Sin.: *Loranthus flagellaris* Cham. & Schltdl., *Phrygilanthus flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Eichler, *Psittacanthus flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Mart.

Arbusto parásito. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, SLU, SFE). URY(RNO).

Tristerix Mart.

Tristerix aphyllus (Miers ex DC.) Barlow & Wiens

Sin.: *Loranthus aphyllus* Miers ex DC., *Loranthus cactorum* Hook. & Arn., *Loranthus pumilus* Miers ex Schult. f., *Phrygilanthus aphyllus* (Miers ex DC.) Eichler, *Phrygilanthus aphyllus* (Miers ex DC.) Eichler f. *luteus* Follmann

Arbusto parásito. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Tristerix corymbosus (L.) Kuijt

Sin.: *Froelichia violacea* Spreng., nom. superfl., *Ixora corymbosa* (L.) Mirb.,

Lonicera corymbosa L., *Loranthus corymbosus* (L.) Desr., *Loranthus tetrandrus* Ruiz & Pav., *Loranthus utui* Molina, *Phrygilanthus corymbosus* (L.) Eichler, *Phrygilanthus tetrandrus* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Psittacanthus corymbosus* Blume, nom. inval., *Scurrula umbellata* Raf., nom. superfl., *Tristerix tetrandrus* (Ruiz & Pav.) Mart.

Arbusto parásito. Endémica. 0-2400 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE).

Tristerix verticillatus (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens

Sin.: *Loranthus poeppigii* DC., *Loranthus sternbergianus* Schult. f., *Loranthus verticillatus* Ruiz & Pav., *Metastachys verticillata* (Ruiz & Pav.) Tiegh., *Notanthera poeppigii* (DC.) G. Don, *Notanthera sternbergiana* (Schult. f.) G. Don, *Notanthera verticillata* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Phrygilanthus sternbergianus* (Schult. f.) Reiche, *Phrygilanthus verticillatus* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Phrygilanthus verticillatus* (Ruiz & Pav.) Eichler var. *flava-citrina* Ruiz Leal, *Psittacanthus sternbergianus* Blume, nom. inval.

Arbusto parásito. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

LYTHRACEAE

Adenaria Kunth

Adenaria floribunda Kunth

Sin.: *Adenaria purpurata* Kunth var. *australis* Griseb., *Antherylium floribundum* (Kunth) Spreng.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(AMA, CON).

Ammannia L.

Ammannia auriculata Willd.

Sin.: *Ammannia arenaria* Kunth, *Ammannia auriculata* Willd. var. *arenaria* (Kunth) Koehne, *Ammannia senegalensis* Lam. var. *auriculata* (Willd.) Hiern

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE). PRY(APY, BOQ, CON, PHA). URY(ART, SAO).

Ammannia coccinea Rottb.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(ERI). CHL(MAU).

Ammannia latifolia L.

Sin.: *Ammannia friesii* Koehne, *Ammannia lythrifolia* Salisb., nom. superfl.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COS, JUJ, SAL). CHL(MAU).

Ammannia robusta Heer & Regel

Sin.: *Ammannia coccinea* Rottb. subsp. *robusta* (Heer & Regel) Koehne, *Ammannia sanguinolenta* Sw. subsp. *robusta* (Heer & Regel) Koehne

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA).

Cuphea P. Browne

Cuphea antisiphilitica Kunth

Sin.: *Cuphea sessilifolia* Mart.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: PRY(CAN).

Cuphea bonplandii Lourteig

Sin.: *Cuphea origanifolia* Cham. & Schltdl.
var. *gracillima* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
PRY(COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI).

Cuphea calophylla Cham. & Schltdl.
subsp. **calophylla**

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAA, PAI).

Cuphea calophylla Cham. & Schltdl.
subsp. **mesostemon** (Koehne) Lourteig

Sin.: *Cuphea calophylla* Cham. & Schltdl.
var. *mesostemon* (Koehne) S.A. Graham,
Cuphea mesostemon Koehne, *Cuphea*
mesostemon Koehne f. *ovalifolia* Chodat,
Cuphea mesostemon Koehne var.
missionera Lourteig, *Cuphea ovalifolia*
(Chodat) Koehne

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ,
MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA,
GUA, ITA, PAI).

Cuphea campylocentra Griseb.

Sin.: *Cuphea grata* Koehne

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA,
CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).
URY(TYT).

Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F.
Macbr.

Sin.: *Cuphea balsamona* Cham. &
Schltdl., *Lythrum carthagenense* Jacq.,
Parsonsia balsamona (Cham. & Schltdl.)
Standl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA,

GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(CLA, RIV, TYT).

Cuphea confertiflora A. St.-Hil.

Sin.: *Cuphea tuberosiformis* Koehne ex
Bacig.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA).

Cuphea cordata Ruiz & Pav.

Sin.: *Cuphea ianthina* Koehne

Subarbusto. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUJ).

Cuphea corisperma Koehne subsp.
corisperma

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CAU, CEN, GUA,
MIE, PAI).

Cuphea corisperma Koehne subsp.
hexasperma (Koehne) Duré & Molero

Sin.: *Cuphea hexasperma* Koehne

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CEN, CON, COA,
GUA, MIE, PAI).

Cuphea fruticosa Spreng.

Sin.: *Cuphea bonariensis* Gillies ex Hook.
& Arn., *Cuphea commersoniana* (A. St.-
Hil.) Koehne, *Cuphea glabra* Gillies ex
Hook. & Arn., *Cuphea ligustrina* Cham. &
Schltdl., *Cuphea ligustrina* Cham. &
Schltdl. var. *commersoniana* A. St.-Hil.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ITA).
URY(COL, MON, PAY, RNO).

Cuphea glaziovii Koehne

Sin.: *Cuphea niederleinii* Koehne

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(ITA).

Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl.

Sin.: *Cuphea acinifolia* A. St.-Hil., *Cuphea*
hyssopifolia Kunth var. *brachyphylla*
Griseb., *Parsonsia glutinosa* (Cham. &
Schltdl.) A. Heller

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CAU, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE,
PAI). URY(CLA, COL, CLA, MAL, MON,
PAY, ROC).

Cuphea hatschbachii Lourteig

Hierba. Endémica. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Cuphea hirsutissima Lourteig

Subarbusto. Endémica. 200-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

Cuphea iguazuensis Lourteig

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Cuphea inaequalifolia Koehne

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Cuphea ingrata Cham. & Schltdl.

Sin.: *Cuphea obliqua* Bacig.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA).
URY(CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC).

Cuphea laeviuscula Bacig.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE).

Cuphea linarioides Cham. & Schltdl.

Sin.: *Cuphea guelichii* Speg., *Lythrum*
calcaratum Vell.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, ITA, PAI).

Cuphea lindmaniana Koehne ex Bacig.Sin.: *Cuphea varia* Koehne ex Bacig.

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(RIV, TAC).**Cuphea linifolia** (A. St.-Hil.) KoehneSin.: *Cuphea ericoides* Cham. & Schltdl.
var. *linifolia* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Cuphea lutescens Koehne

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cuphea lysimachioides Cham. & Schltdl.Sin.: *Cuphea hassleri* Koehne, *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl. f. *brevipes* Koehne, *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl. var. *crassifolia* Chodat, *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl. var. *dubia* Koehne, *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl. var. *villosa* Koehne

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(ART, RIV).**Cuphea melvilla** Lindl.Sin.: *Cuphea speciosa* (A. Anderson ex Raf.) Kuntze, *Melvilla speciosa* A. Anderson ex Raf.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, ITA).

Cuphea micrantha Kunth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Cuphea paranensis Bacig.

Hierba. Endémica. 700-1300 m.

Países: BRA(PAR).

Cuphea persistens KoehneSin.: *Cuphea persistens* Koehne var. *formosana* Lourteig

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CON, COA, SPE).

Cuphea polymorpha A. St.-Hil.Sin.: *Cuphea polymorpha* A. St.-Hil. var. *vincoides* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAN, CON, SPE).

Cuphea pterosperma KoehneSin.: *Cuphea pterosperma* Koehne var. *cuneata* Koehne

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).**Cuphea racemosa** (L. f.) Spreng. var. **palustris** Lourteig

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).
URY(CLA, FLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO).**Cuphea racemosa** (L. f.) Spreng. var. **ramosior** (Koehne) Duré & MoleroSin.: *Cuphea correntina* Lourteig, *Cuphea hirticaulis* Koehne, *Cuphea originifolia* Cham. & Schltdl. var. *ramosior* Koehne, *Cuphea racemosa* (L. f.) Spreng. subsp. *hirticaulis* (Koehne) Lourteig

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).**Cuphea racemosa** (L. f.) Spreng. subsp. **longiflora** (Koehne) Duré & MoleroSin.: *Cuphea longiflora* Koehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
PRY(APA, CAA, CEN, COA, ITA, PAI).**Cuphea racemosa** (L. f.) Spreng. subsp. **racemosa**Sin.: *Cuphea obtusifolia* Koehne ex Bacig., *Cuphea originifolia* Cham. & Schltdl., *Cuphea racemosa* (L. f.) Spreng. var. *discolor* Lourteig, *Lythrum racemosum* L. f.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).**Cuphea rusbyi** Lourteig

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON).

Cuphea sessiliflora A. St.-Hil.Sin.: *Cuphea costata* Koehne, *Cuphea rojasii* Koehne, *Cuphea talaverensis* Koehne

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR).
PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, PHA, SPE).**Cuphea stenopetala** Koehne

Hierba. Endémica. 100-400 m.

Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, SPE).

Cuphea strigulosa Kunth

Sin.: *Cuphea aperta* Koehne, *Cuphea fiebrigii* Koehne

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Cuphea thymoides Cham. & Schltdl.

Sin.: *Cuphea chodatiana* Koehne, *Cuphea mesostemon* Koehne f. *angustifolia* Chodat, *Cuphea phoenix* Koehne, *Cuphea thymoides* Cham. & Schltdl. var. *argentina* A. St.-Hil., *Cuphea thymoides* Cham. & Schltdl. var. *levis* A. St.-Hil., *Cuphea thymoides* Cham. & Schltdl. var. *pseudoerica* A. St.-Hil., *Cuphea thymoides* Cham. & Schltdl. var. *saturejoides* A. St.-Hil.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE, PAI).

Cuphea tuberosa Cham. & Schltdl.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, MIE). URY(MON, RIV, TAC, TYT).

Cuphea urbaniana Koehne var. **uleana** (Koehne) Lourteig

Sin.: *Cuphea urbaniana* Koehne f. *uleana* Koehne

Hierba o subarbusto. Endémica. 900-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cuphea urbaniana Koehne var. **urbaniana**

Sin.: *Cuphea carunculata* Koehne, *Cuphea dusenii* Koehne, *Cuphea reitzii* Lourteig

Hierba o subarbusto. Nativa. 700-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heimia Link & Otto

Heimia apetala (Spreng.) S.A. Graham & Gandhi

Sin.: *Heimia myrtifolia* Cham. & Schltdl., nom. illeg., *Lythrum apetalum* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA). URY(ART, CLA, MAL, ROC, TAC, TYT).

Heimia montana (Griseb.) Lillo

Sin.: *Heimia salicifolia* Link var. *montana* (Griseb.) Koehne, *Nesaea salicifolia* Kunth var. *montana* Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Heimia salicifolia Link

Sin.: *Nesaea salicifolia* Kunth

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, COL, FLA, MAL, RNO, ROC, TAC).

Lafoensia Vand.

Lafoensia nummularifolia A. St.-Hil.

Arbusto o arbolito. Nativa. 200-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lafoensia pacari A. St.-Hil.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl.

Sin.: *Lafoensia pacari* A. St.-Hil. f. *angustifolia* Koehne, *Lafoensia pacari* A. St.-Hil. f. *latifolia* Koehne, *Lafoensia pacari* A. St.-Hil. subsp. *petiolata* Koehne,

Lafoensia pacari A. St.-Hil. var. *campanulata* Koehne

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).

Lythrum L.

Lythrum borysthenticum (M.Bieb. ex Schrank) Litv.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(BIO).

Lythrum hyssopifolia L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, NEU, RNE, SJU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON).

Lythrum junceum Banks & Sol.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Lythrum maritimum Kunth

Sin.: *Lythrum albicaule* Bertero, *Lythrum campestre* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, VAL, RME, JFE). URY(CLA, MON).

Lythrum portula (L.) D.A. Webb

Sin.: *Peplis portula* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(ARA, LLA).

Lythrum salicaria L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU). CHL(LLA, RME).

Pleurophora D. Don

Pleurophora patagonica Speg.Sin.: *Pleurophora lignosa* L.B. Sm.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Pleurophora polyandra Hook. & Arn.Sin.: *Pleurophora polyandra* Hook. & Arn.f. *squarrosa* (Steud.) Koehne, *Pleurophora uncinata* Phil.

Hierba. Endémica. 200-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Pleurophora pungens D. DonSin.: *Pleurophora pungens* D. Don f. *imbricata* Koehne

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Pleurophora pusilla Hook. & Arn.Sin.: *Pleurophora pilosiuscula* Gay var. *glabra* Phil., *Pleurophora pusilla* Hook. & Arn. f. *vestita* Koehne

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Pleurophora saccocarpa KoehneSin.: *Pleurophora annulosa* Koehne, *Pleurophora saccocarpa* Koehne var. *fibrigii* Koehne, *Pleurophora saccocarpa* Koehne var. *glabrescens* Koehne, *Pleurophora saccocarpa* Koehne var. *hirtella* Koehne, *Pleurophora saccocarpa* Koehne var. *velutina* Koehne

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CHO, CON, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Rotala L.**Rotala mexicana** Cham. & Schltdl.Sin.: *Hypobrichia spruceana* Benth., *Rotala apetala* F. Muell., *Rotala mexicana* Cham. & Schltdl. var. *apetala* (F. Muell.) Lourteig, *Rotala mexicana* Cham. & Schltdl. var. *spruceana* (Benth.) Koehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). PRY(CON, COA, PHA).

Rotala ramosior (L.) KoehneSin.: *Ammannia ramosior* L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). PRY(APY, COA).

MAGNOLIACEAE**Magnolia** L.**Magnolia ovata** (A. St.-Hil.) Spreng.Sin.: *Magnolia paranaensis* A. Vázquez, *Talauma ovata* A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 600-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

MALESHERBIACEAE**Malesherbia** Ruiz & Pav.**Malesherbia auristipulata** Ricardi

Subarbusto. Nativa. 1500-2500 m.

Países: CHL(AYP).

Malesherbia bracteata Phil. var. **bracteata**Sin.: *Malesherbia lanceolata* Ricardi, *Malesherbia lirana* Gay var. *bracteata* (Phil.) Ricardi

Hierba. Endémica. 2900-3300 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Malesherbia bracteata Phil. var. **campanulata** (Ricardi) Bull-HereñuSin.: *Malesherbia campanulata* Ricardi

Endémica. 3100-3200 m.

Países: CHL(COQ).

Malesherbia corallina M. Muñoz & R. Pinto

Subarbusto. Endémica. 2700-2800 m.

Países: CHL(TAR).

Malesherbia densiflora Phil.

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.

Países: CHL(ATA).

Malesherbia deserticola Phil.Sin.: *Malesherbia borchersii* Phil.

Subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: CHL(ANT).

Malesherbia fasciculata D. Don var. **fasciculata**Sin.: *Gynopleura fasciculata* (D. Don) Roem., *Malesherbia thyrsoidea* Bertero ex Steud.

Subarbusto. Endémica. 400-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Malesherbia fasciculata D. Don var. **glandulosa** Ricardi

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Malesherbia humilis D. Don var. **propinqua** (Gay) ReicheSin.: *Malesherbia gabrielae* Ricardi, *Malesherbia humilis* Poepp. var. *gabrielae* (Ricardi) Gengler, *Malesherbia propinqua* Gay

Hierba. Endémica. 600-2000 m.

Países: CHL(COQ).

Malesherbia humilis Poepp. var. **humilis**Sin.: *Gynopleura dilatata* Walp., *Gynopleura humilis* Roem., *Malesherbia*

dilatata (Walp.) F. Phil., *Malesherbia humilis* D. Don, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(NEU). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Malesherbia humilis Poepp. var. **parviflora** (Phil.) Ricardi

Sin.: *Malesherbia humilis* Poepp. var. *taltalina* (Ricardi) Gengler, *Malesherbia multiflora* Ricardi, *Malesherbia parviflora* Phil., *Malesherbia taltalina* Ricardi

Hierba. Endémica. 0-2900 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Malesherbia lactea Phil. var. **crassicaulis** Bull-Hereñu

Endémica. 2700-2800 m.

Países: CHL(ATA).

Malesherbia lactea Phil. var. **lactea**

Sin.: *Malesherbia rosulata* Werderm.

Hierba. Endémica. 2500-4300 m.

Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ANT, ATA).

Malesherbia linearifolia (Cav.) Pers.

Sin.: *Gynopleura coronata* (D. Don) Roem., *Gynopleura linearifolia* Cav., *Malesherbia coronata* D. Don, *Malesherbia linearifolia* (Cav.) Poir., comb. superfl., *Malesherbia subalpina* Poepp. ex Walp.

Subarbusto. Endémica. 400-3200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Malesherbia lirana Gay var. **atacamensis** Bull-Hereñu

Endémica. 2800-3100 m.

Países: CHL(ATA).

Malesherbia lirana Gay var. **lirana**

Sin.: *Malesherbia cuneata* Phil., *Malesherbia hieronymi* Harms, *Malesherbia incana* Werderm., *Malesherbia lirana* Gay var. *hieronymi*

(Harms) Ricardi, *Malesherbia lirana* Gay var. *serpyllifolia* (Phil.) Reiche, *Malesherbia lirana* Gay var. *subtomentosa* Kuntze, *Malesherbia lirana* Gay var. *tomentosa* Kuntze, *Malesherbia serpyllifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3700 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Malesherbia lirana Gay var. **subglabrifolia** Kuntze

Sin.: *Malesherbia mendocina* Sleumer

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Malesherbia paniculata D. Don

Sin.: *Gynopleura caerulea* J. Presl, *Malesherbia linearifolia* (Cav.) Pers. var. *paniculata* (D. Don) Reiche

Subarbusto. Endémica. 400-2500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Malesherbia solanoides Meyen var. **oblongifolia** (Phil.) Bull-Hereñu

Sin.: *Malesherbia brevipedunculata* Werderm., *Malesherbia foliosa* Phil.

Subarbusto. Endémica. 1000-2300 m.

Países: CHL(ATA).

Malesherbia solanoides Meyen var. **ovata** (Phil.) Bull-Hereñu

Sin.: *Malesherbia johnstonii* Werderm., *Malesherbia obtusa* Phil. var. *johnstonii* (Werderm.) Ricardi, *Malesherbia ovata* Phil., *Malesherbia prolifera* Phil., *Malesherbia rugosa* Gay var. *pseudopulverulenta* Ricardi

Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.

Países: CHL(ATA).

Malesherbia solanoides Meyen var. **rugosa** (Gay) Bull-Hereñu

Sin.: *Malesherbia glandulifera* Werderm., *Malesherbia oblongifolia* Phil.,

Malesherbia rugosa Gay var. *rugosa*, *Malesherbia serrata* Phil.

Hierba. Endémica. 1100-3000 m.

Países: CHL(ATA).

Malesherbia solanoides Meyen var. **solanoides**

Sin.: *Malesherbia breviflora* Phil., *Malesherbia obtusa* Phil. var. *obtusa*

Subarbusto. Endémica. 800-1400 m.

Países: CHL(ATA).

Malesherbia tenuifolia D. Don

Sin.: *Gynopleura tenuifolia* (D. Don) Roem., *Malesherbia pulchra* Phil.

Subarbusto. Endémica. 2500.

Países: CHL(TAR).

Malesherbia tocopillana Ricardi

Subarbusto. Endémica. 100-400 m.

Países: CHL(ANT).

MALPIGHIACEAE

Alicia W.R. Anderson

Alicia anisopetala (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Hiraea anisopetala* A. Juss., *Hiraea macrocarpa* Chodat, *Mascagnia anisopetala* (A. Juss.) Griseb.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Amorimia W.R. Anderson

Amorimia exotropica (Griseb.) W.R. Anderson

Sin.: *Mascagnia exotropica* Griseb.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Aspicarpa Rich.**Aspicarpa schininii** W.R. Anderson

Sin.: *Aspicarpa lanata* (Chodat) Nied., nom. illeg., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl. var. *fiebrigii* (Chodat) Hassl., nom. superfl., *Camarea lanata* Chodat, *Cryptolappa lanata* (Chodat) Kuntze, *Gaudichaudia lanata* (Chodat) Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *fiebrigii* Chodat

Hierba. Nativa. 1000-1500 m.

Países: PRY(CEN, PAI).

Banisteriopsis C.B. Rob.**Banisteriopsis acerosa** (Nied.) B. GatesSin.: *Banisteria acerosa* Nied.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(AMA).

Banisteriopsis adenopoda (A. Juss.) B.

Gates

Sin.: *Banisteria adenopoda* A. Juss.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis argyrophylla (A. Juss.)

B. Gates

Sin.: *Banisteria argyrophylla* A. Juss., *Banisteria nitens* Griseb.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.)

C.V. Morton

Sin.: *Banisteria caapi* Spruce ex Griseb., *Banisteria quitensis* Nied., *Banisteriopsis inebrians* C.V. Morton, *Banisteriopsis quitensis* (Nied.) C.V. Morton

Enredadera. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(SAL).

Banisteriopsis campestris (A. Juss.)

Little

Sin.: *Banisteria campestris* A. Juss.

Arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis confusa B. Gates

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA, PAI).

Banisteriopsis laevifolia (A. Juss.) B.

Gates

Sin.: *Banisteria laevifolia* A. Juss.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.)

B. Gates

Sin.: *Malpighia malifolia* Nees & Mart.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.

Sin.: *Banisteria acanthocarpa* A. Juss., *Banisteria argentea* (Kunth) Spreng., *Banisteria illustris* (Rusby) Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *falcata* Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *sericea* Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *subrotunda* Nied., *Banisteria muricata* Cav., *Banisteriopsis argentea* (Kunth) C.B. Rob., *Banisteriopsis illustris* Rusby, *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donell & Lourteig, *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donell & Lourteig var. *sericea* (Nied.) O'Donell & Lourteig, *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donell & Lourteig var. *subrotunda* (Nied.) O'Donell & Lourteig, *Heteropterys argentea* Kunth, *Heteropterys pirayuensis* Morong

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR). PRY(CAN, GUA, PAI).

Banisteriopsis nummifera (A. Juss.) B.

Gates

Sin.: *Banisteria nummifera* A. Juss.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis oxyclada (A. Juss.) B.

Gates

Sin.: *Banisteria oxyclada* A. Juss.

Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(AMA).

Banisteriopsis paraguariensis B. Gates

Enredadera. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Banisteriopsis parviflora (A. Juss.) B.

Gates

Sin.: *Banisteria parviflora* A. Juss.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis pseudojanusia (Nied.) B.

Gates

Sin.: *Banisteria pseudojanusia* Nied.

Liana. Endémica. 500-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Banisteriopsis pulchra B. Gates

Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(AMA).

Banisteriopsis variabilis B. Gates

Arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Bronwenia W.R. Anderson & C.C.

Davis

Bronwenia ferruginea (Cav.) W.R.

Anderson & C. Davis

Sin.: *Banisteria ferruginea* Cav.,
Banisteriopsis ferruginea (Cav.) B. Gates,
Triopteris brasiliensis Poir., nom. superfl.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Bunchosia Kunth

Bunchosia maritima (Vell.) J.F. Macbr.
Sin.: *Malpighia maritima* Vell.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Bunchosia pallescens Skottsb.
Sin.: *Bunchosia missionum* Eskuche
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, CON).

Bunchosia paraguariensis Nied.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Byrsonima Rich. ex Kunth

Byrsonima brachybotrya Nied.
Arbusto. Nativa. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Byrsonima coccolobifolia Kunth
Arbusto. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
Sin.: *Byrsonima crassifolia* (L.) Kunth f.
kunthiana Nied., *Malpighia crassifolia* L.
Arbusto. Nativa. 200-900 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Byrsonima intermedia A. Juss.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Byrsonima ligustrifolia A. Juss.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Byrsonima myricifolia Griseb.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Byrsonima niedenzuiana Skottsb.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Byrsonima paulista A. Juss.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Byrsonima psilandra Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON).

Byrsonima umbellata Mart. ex A. Juss.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Byrsonima verbascifolia (L.) DC.
Sin.: *Malpighia verbascifolia* L.
Árbol a subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Callaeum Small

Callaeum psilophyllum (A. Juss.) D.M. Johnson
Sin.: *Hiraea platyptera* Griseb., *Hiraea psilophylla* A. Juss., *Mascagnia pachyptera* Rusby, *Mascagnia psilophylla* (A. Juss.) Griseb.
Enredadera o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA). URY(ART, SAO, SOR).

Camarea A. St.-Hil.

Camarea affinis A. St.-Hil.
Sin.: *Aspicarpa affinis* (A. St.-Hil.) Hassl.,
Gaudichaudia affinis (A. St.-Hil.) Chodat
Arbolito. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Carolus W.R. Anderson

Carolus chlorocarpus (A. Juss.) W.R. Anderson
Sin.: *Heladena hassleriana* Nied., *Hiraea chlorocarpa* A. Juss., *Mascagnia chlorocarpa* (A. Juss.) Griseb.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Christianella W.R. Anderson

Christianella multiglandulosa (Nied.) W.R. Anderson
Sin.: *Mascagnia multiglandulosa* Nied.
Arbusto o liana. Nativa. 0-800 m.
Países: PRY(AMA, SPE).

Cordobia Nied.

Cordobia argentea (Griseb.) Nied.
Sin.: *Cryptolappa argentea* (Griseb.) Kuntze, *Gaudichaudia argentea* (Griseb.) Chodat, *Janusia argentea* (Griseb.) Griseb., *Mionandra argentea* Griseb., *Peixotoa cordobensis* Kuntze
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

Dicella Griseb.

Dicella bracteosa (A. Juss.) Griseb.
Sin.: *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb.
var. *holosericea* (A. Juss.) Nied., *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *subglabra* Nied., nom. superfl., *Dicella holosericea* A. Juss., *Dicella holosericea* A. Juss. var. *argentea* A. Juss.

Liana. Nativa. 100-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dicella nucifera Chodat

Sin.: *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb.
var. *minutiflora* Chodat, *Dicella nucifera* Chodat f. *lancifolia* Nied., *Dicella nucifera* Chodat f. *ovatifolia* Nied., *Dicella tricarpa* Nied.

Liana. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Dinemandra A. Juss.

Dinemandra ericoides A. Juss.

Sin.: *Dinemandra ericoides* A. Juss. var. *triandra* Nied., *Dinemandra glaberrima* A. Juss., *Dinemandra glauca* Baill., *Dinemandra ramosissima* Phil., *Dinemandra strigosa* Phil., *Dinemandra subaptera* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-2800 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Dinemandra gayana (A. Juss.) R.F. Almeida & M. Pell.

Sin.: *Dinemagonum albicaule* Phil., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. f. *glanduloso-bracteolata* Nied., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. var. *parvifolium* Nied., *Dinemagonum gayanum* A. Juss., *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *albicaule* (Phil.) Reiche, *Dinemagonum gayanum* A. Juss.

var. *bridgesianum* (A. Juss.) Reiche, *Dinemagonum maculigerum* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-2600 m.

Países: CHL(TAR, ATA, COQ, VAL).

Diplopterys A. Juss.

Diplopterys lutea (Griseb.) W.R. Anderson & C.C. Davis

Sin.: *Banisteria hassleriana* Chodat, *Banisteria hispida* Nied., *Banisteria lutea* Griseb., *Banisteria nitrosiodora* Griseb., *Banisteriopsis lutea* (Griseb.) Cuatrec., *Banisteriopsis nitrosiodora* (Griseb.) O'Donnell & Lourteig, *Jubistylis mollis* Rusby

Enredadera. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, CON, PAI).

Diplopterys pubipetala (A. Juss.) W.R. Anderson & C.C. Davis

Sin.: *Banisteria pubipetala* A. Juss., *Banisteria pubipetala* A. Juss. f. *cordata* Nied., *Banisteriopsis pubipetala* (A. Juss.) Cuatrec.

Arbusto o liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Gallardoa Hicken

Gallardoa fischeri Hicken

Sin.: *Cordobia fischeri* (Hicken) Nied.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Galphimia Cav.

Galphimia amambayensis C.E. Anderson

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: PRY(AMA).

Galphimia australis Chodat

Sin.: *Galphimia australis* Chodat f. *angustifolia* Chodat, *Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. f. *angustifolia* (Chodat) Nied., *Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. var. *australis* (Chodat) Chodat, *Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. var. *pubescens* A. Juss.

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(PAY).

Galphimia platyphylla Chodat

Sin.: *Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. f. *platyphylla* (Chodat) Nied., *Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. var. *platyphylla* (Chodat) Nied.

Subarbusto. Nativa. 300-400 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Glicophyllum R.F. Almeida

Glicophyllum ambiguum (A. Juss.) R.F. Almeida

Sin.: *Hiraea ambigua* A. Juss., *Mascagnia ambigua* (A. Juss.) Griseb., *Mascagnia ambigua* (A. Juss.) Griseb. f. *paraguayensis* (Nied.) Nied., *Mascagnia paraguayensis* Nied., *Tetrapteryx ambigua* (A. Juss.) Nied., *Tetrapteryx ambigua* (A. Juss.) Nied. var. *paraguayensis* (Nied.) Nied., *Tetrapteryx paraguayensis* Nied., *Tetrapteryx pilifera* S. Moore

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, SPE).

Glicophyllum argenteum (A. Juss.) R.F. Almeida & M. Pell.

Sin.: *Tetrapterys jussieuana* Nied.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Glicophyllum hasslerianum (Nied.) R.F. Almeida
Sin.: *Tetrapterys hassleriana* Nied.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Glicophyllum salicifolium (A. Juss.) R.F. Almeida
Sin.: *Hiraea salicifolia* A. Juss., *Tetrapterys salicifolia* (A. Juss.) Nied.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(GUA).

Heladena A. Juss.

Heladena multiflora (Hook. & Arn.) Nied.
Sin.: *Bunchosia multiflora* Hook. & Arn., *Heladena australis* A. Juss., nom. superfl., *Malpighiantha volubilis* Rojas
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CAU, CAN, GUA, PAI, SPE). URY(SAO).

Heteropterys Kunth, nom. cons.

Heteropterys aenea Griseb.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heteropterys amplexicaulis Morong
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).

Heteropterys argyrophaea A. Juss.
Sin.: *Banisteria argyrophaea* (A. Juss.) C.V. Morton, *Clonodia biglandulosa* Chodat

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CAU, CON, COA, GUA, MIE, PAI). URY(SAO).

Heteropterys bicolor A. Juss.
Sin.: *Heteropterys bicolor* A. Juss. var. *elliptica* Nied., *Heteropterys bicolor* A. Juss. var. *lanceolata* Nied., *Heteropterys bicolor* A. Juss. var. *major* A. Juss.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

Heteropterys byrsonimifolia A. Juss.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Heteropterys cochleosperma A. Juss.
Sin.: *Heteropterys hassleriana* Nied., *Heteropterys hassleriana* Nied. f. *acrobasis* Nied., *Heteropterys hassleriana* Nied. f. *amblyobasis* Nied., *Heteropterys hassleriana* Nied. var. *eglandulosa* Nied., *Heteropterys hassleriana* Nied. var. *glandulifera* Nied., *Heteropterys trichanthera* A. Juss. var. *cuyabensis* Nied.
Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Heteropterys crenulata Mart. ex Griseb.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Heteropterys cultriformis Chodat
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CEN, CON, GUA).

Heteropterys dumetorum (Griseb.) Nied.
Sin.: *Banisteria dumetorum* (Griseb.) C.V. Morton, *Heteropterys paraguariensis* Nied., *Heteropterys praecox* Nied., *Mascagnia dumetorum* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, GUA).

Heteropterys dusenii Nied.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heteropterys eglandulosa A. Juss.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Heteropterys glabra Hook. & Arn.
Sin.: *Banisteria tenuis* Lindl., *Heteropterys angustifolia* Griseb., *Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *angustissima* Nied., *Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *lanceolata* Nied., *Heteropterys lanceolata* (Nied.) Herter, *Heteropterys pseudoangustifolia* Chodat
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RNO).

Heteropterys hypericifolia A. Juss.
Sin.: *Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *sinuata* Nied.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Heteropterys intermedia (A. Juss.) Griseb.
Sin.: *Heteropterys aceroides* Griseb., *Heteropterys diversifolia* A. Juss., *Heteropterys hiraeoides* A. Juss., nom. superfl., *Heteropterys laurifolia* Gardner, nom. illeg., *Heteropterys venosa* Griseb., *Hiraea floribunda* A. Juss., *Hiraea intermedia* A. Juss.
Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).

Heteropterys leschenaultiana A. Juss.
Arbusto o liana. Nativa.
Países: ARG(COS, MIS).

Heteropterys microcarpa Skottsb.
Liana. Endémica. 400-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Heteropterys mollis (Nied.) Nied.
Sin.: *Clonodia mollis* Nied.
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUU).

Heteropterys mulgurae W.R. Anderson
Liana. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
Notas: Probablemente habite en Paraguay

Heteropterys nervosa A. Juss.
Sin.: *Banisteria nervosa* (A. Juss.) R.O. Williams
Arbusto. Nativa.
Países: PRY.

Heteropterys nitida (Lam.) DC.
Sin.: *Banisteria nitida* Lam.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Heteropterys pauciflora (A. Juss.) A. Juss.
Sin.: *Hiraea pauciflora* A. Juss.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Heteropterys pteropetala A. Juss.
Sin.: *Heteropterys pteropetala* A. Juss. f. *orbicularis* Skottsb.
Arbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Heteropterys rhopalifolia A. Juss.
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(APY, CEN).

Heteropterys schulziana W.R. Anderson
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL).

Heteropterys sylvatica A. Juss.
Sin.: *Clonodia tenuifolia* Nied., *Heteropterys tenuifolia* (Nied.) Nied.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Heteropterys syringifolia Griseb.
Sin.: *Heteropterys australis* A. Juss., *Heteropterys martiana* A. Juss.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CON, SPE).

Heteropterys tomentosa A. Juss.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: PRY(AMA, CON, COA, PAI, SPE).

Heteropterys umbellata A. Juss.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, CON, ÑEE).

Hiraea Jacq.

Hiraea cuneata Griseb.
Enredadera. Nativa. 0-4500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hiraea fagifolia (DC.) A. Juss.
Sin.: *Banisteria fagifolia* DC., *Hiraea bahiensis* Moric., *Hiraea bahiensis* Moric. var. *paraguariensis* Nied., *Hiraea salzmanniana* A. Juss., *Hiraea salzmanniana* A. Juss. var. *glandulifera*

Chodat, hom. illeg., *Hiraea salzmanniana* A. Juss. var. *glandulifera* Griseb.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Hiraea hatschbachii C.E. Anderson
Liana. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS).

Hiraea reitzii C.E. Anderson
Liana. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS).

Janusia A. Juss.

Janusia guaranitica (A. St.-Hil.) A. Juss.
Sin.: *Aspicarpa guaranitica* (A. St.-Hil.) Hassl., *Gaudichaudia barbeyi* (Chodat) Chodat, *Gaudichaudia guaranitica* A. St.-Hil., *Janusia barbeyi* Chodat, *Janusia guaranitica* (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *cordifolia* Nied., nom. superfl., *Janusia guaranitica* (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *glabrata* Nied., *Janusia guaranitica* (A. St.-Hil.) A. Juss. var. *barbeyi* (Chodat) Kuntze, *Janusia prolixa* Arechav.
Enredadera. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(LAV, MAL).

Janusia linearifolia (A. St.-Hil.) A. Juss.
Sin.: *Aspicarpa linearifolia* (A. St.-Hil.) Nied., *Camarea juncea* Griseb., *Gaudichaudia linearifolia* A. St.-Hil., *Peregrina linearifolia* (A. St.-Hil.) W.R. Anderson
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Mamedea R.F. Almeida & M. Pell.

Mamedea pulchella (Griseb.) R.F. Almeida & M. Pell.

Sin.: *Aspicarpa pulchella* (Griseb.) O'Donnell & Lourteig, *Aspicarpa sericea* (A. St.-Hil.) Nied., nom. illeg., *Camarea pulchella* Griseb., *Cryptolappa pulchella* (Griseb.) Kuntze, *Cryptolappa pulchella* (Griseb.) Kuntze var. *latifolia* Kuntze, *Gaudichaudia sericea* A. St.-Hil., *Janusia sericea* (A. St.-Hil.) A. Juss.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, SPE). URY(ART, CLA, RIV).

Mamedea salicifolia (Chodat) R.F. Almeida & M. Pell.

Sin.: *Aspicarpa salicifolia* (Chodat) Nied., *Camarea salicifolia* Chodat, *Cryptolappa salicifolia* (Chodat) Kuntze, *Gaudichaudia salicifolia* (Chodat) Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(PAI).

Mamedea sericea (Griseb.) R.F. Almeida & M. Pell.

Sin.: *Aspicarpa argentea* Nied., nom. superfl., *Aspicarpa argentea* Nied. var. *robusta* (Chodat) Nied., *Aspicarpa argentea* Nied. var. *sericea* (Griseb.) Nied., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl., nom. superfl., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl. var. *sericea* (Griseb.) Hassl., nom. superfl., *Aspicarpa sericea* Griseb., *Camarea robusta* Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *sericea* (Griseb.) Chodat

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Mamedea uruguayensis (Nied.) R.F. Almeida & M. Pell.

Sin.: *Aspicarpa uruguayensis* Nied.
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: URY(TAC).

Mascagnia (Bertero ex DC.) Colla, nom. cons.

Mascagnia australis C.E. Anderson

Sin.: *Hiraea sepium* A. Juss. var. *nitens* S. Moore, *Mascagnia cordifolia* (A. Juss.) Griseb. var. *holosericea* Skottsb., *Mascagnia sepium* (A. Juss.) Griseb. var. *mediterranea* Nied., nom. superfl.

Liana. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI).

Mascagnia brevifolia Griseb.

Sin.: *Hiraea brevifolia* (Griseb.) Niederl., *Mascagnia brevifolia* Griseb. var. *malmeana* (Skottsb.) Nied., *Mascagnia brevifolia* Griseb. var. *paniculata* Nied., *Mascagnia laurifolia* Nied., *Mascagnia malmeana* Skottsb.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY, CON, PHA).

Mascagnia divaricata (Kunth) Nied.

Sin.: *Hiraea divaricata* Kunth, *Hiraea elegans* A. Juss., *Hiraea pulcherrima* Morong, *Mascagnia elegans* (A. Juss.) Griseb., *Mascagnia ixiamensis* Rusby, *Mascagnia pulcherrima* (Morong) Skottsb.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Mascagnia sepium (A. Juss.) Griseb.

Sin.: *Hiraea sepium* A. Juss.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mionandra Griseb.

Mionandra camareoides Griseb.

Sin.: *Brittonella pilosa* Rusby, *Mionandra camareoides* Griseb. f. *prostrata* Nied.

Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, SAL, SDE, SLU, TUC).

Mionandra paraguayensis Chodat

Sin.: *Mionandra camareoides* Griseb. var. *paraguayensis* (Chodat) Nied.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

Niedenzuella W.R. Anderson

Niedenzuella acutifolia (Cav.) W.R. Anderson

Sin.: *Tetrapteryx acutifolia* Cav.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Niedenzuella lucida (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Hiraea multiflora* Griseb., *Tetrapteryx lucida* A. Juss., *Tetrapteryx multiflora* (Griseb.) A. Juss.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Niedenzuella multiglandulosa (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Tetrapteryx multiglandulosa* A. Juss.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(COA).

Niedenzuella sericea (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Hiraea laurifolia* A. Juss., *Hiraea sericea* A. Juss., *Tetrapteryx chalcophylla* A. Juss., *Tetrapteryx glandulosa* Griseb., *Tetrapteryx laurifolia* (A. Juss.) Griseb.,

Tetrapteryx ligustrifolia Nied., nom. illeg.,
Tetrapteryx sericea (A. Juss.) A. Juss.
 Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
 PRY(ITA).

Niedenzuella stannea (Griseb.) W.R. Anderson
 Sin.: *Heteropteryx stannea* Griseb.,
Mascagnia sericans Nied., *Mascagnia stannea* (Griseb.) Nied.
 Liana. Nativa. 200-500 m.
 Países: PRY(AMA).

Niedenzuella suaveolens (A. Juss.) W.R. Anderson
 Sin.: *Tetrapteryx suaveolens* A. Juss.
 Liana. Nativa. 100-300 m.
 Países: PRY(COA).

Peixotoa A. Juss.

Peixotoa catarinensis C.E. Anderson
 Liana. Endémica. 100.
 Países: BRA(SCA).

Peixotoa floribunda C.E. Anderson
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(APY).

Peixotoa parviflora A. Juss.
 Sin.: *Peixotoa discolor* Griseb.
 Arbusto o liana. Nativa. 700-800 m.
 Países: BRA(PAR).

Peixotoa reticulata Griseb.
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

Ptilochaeta Turcz., nom. cons.

Ptilochaeta densiflora Nied.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(APY).

Ptilochaeta nudipes Griseb.
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

Schwannia Endl.

Schwannia mediterranea (Vell.) R.F. Almeida & M. Pell.
 Sin.: *Banisteria mediterranea* Vell.,
Janusia mediterranea (Vell.) W.R. Anderson
 Liana. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Schwannia occhionii (W.R. Anderson) R.F. Almeida & M. Pell.
 Sin.: *Janusia occhionii* W.R. Anderson
 Liana. Nativa. 100-300 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Stigmaphyllon A. Juss.

Stigmaphyllon arenicola C.E. Anderson
 Sin.: *Stigmaphyllon martianum* A. Juss.
 var. *variabile* Nied.
 Liana. Nativa. 0-400 m.
 Países: BRA(PAR).

Stigmaphyllon bonariense (Hook. & Arn.) C. E. Anderson
 Sin.: *Banisteria bonariensis* Hook. & Arn.,
Stigmaphyllon heterophyllum Hook.,
Stigmaphyllon littorale A. Juss.,
Stigmaphyllon littorale A. Juss. var. *trilobum* Nied.
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APY, APA, ITA, MIE, ÑEE).
 URY(COL, MON, RNO).

Stigmaphyllon calcaratum N.E. Br.
 Sin.: *Stigmaphyllon hasslerianum* Nied.
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, CON, PHA).

Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A. Juss.
 Sin.: *Banisteria ciliata* Lam.
 Liana. Nativa. 0-100 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 URY(MON).

Stigmaphyllon jatrophifolium A. Juss.
 Sin.: *Stigmaphyllon jatrophifolium* A. Juss.
 f. *gracile* Nied.
 Liana. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, ERI, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, CAA, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(MON, SAO).

Stigmaphyllon tomentosum A. Juss.
 Liana. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tetrapteryx Cav., nom. cons.

Tetrapteryx catarinensis W.R. Anderson
 Enredadera. Endémica. 100-1000 m.
 Países: BRA(SCA).

Tetrapteryx crispa A. Juss.
 Liana. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Tetrapteryx mollis Griseb.
 Sin.: *Tetrapteryx cinerea* Griseb.
 Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Tetrapteryx mucronata Cav.
 Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.

Sin.: *Malpighia phlomoides* Spreng.

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tetrapterys xylosteifolia A. Juss.

Enredadera. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Thryallis Mart., nom. cons.

Thryallis brachystachys Lindl.

Sin.: *Hemsleya brachystachys* (Lindl.)

Kuntze, *Thryallis brachystachys* Lindl. var.

obtusifolia Nied., *Thryallis latifolia* Mart. var.

ovatifolia (Nied.) Nied., *Thryallis ovatifolia*

Nied., *Thryallis rotundifolia* A. Gray

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CON).

Thryallis laburnum S. Moore

Sin.: *Thryallis brachystachys* Lindl. var.

acuminata Nied., nom. superfl., *Thryallis*

laburnum S. Moore var. *minor* S. Moore,

Thryallis latifolia Mart. f. *laburnum* (S.

Moore) Nied.

Arbusto o liana. Nativa. 100-300 m.

Países: PRY(APY).

Tricomaria Hook. & Arn.

Tricomaria usillo Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

MALVACEAE

Abutilon Mill.

Abutilon affine (Spreng.) G. Don

Sin.: *Abutilon rivulare* A. St.-Hil., *Sida affinis* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(MAL, ROC, TAC).

Abutilon bivalve (Cav.) Dorr

Sin.: *Bastardia bivalvis* (Cav.) Kunth ex Griseb., *Sida bivalvis* Cav.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE). PRY(APY, BOQ).

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

Sin.: *Abutilon amottianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp., *Abutilon molle* Sweet, *Abutilon sordidum* K. Schum., *Sida amottiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Sida grandifolia* Willd., *Sida mollis* Ortega, hom. illeg.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT). PRY(PAI, PHA). URY(MAL, MON, TAC).

Abutilon herzogianum R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY).

Abutilon malachroides A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Abutilon flueckigerianum* K. Schum., *Abutilon tacuarembense* Arechav.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(MON, RIV).

Abutilon ramiflorum A. St.-Hil.

Sin.: *Sida ramiflora* (A. St.-Hil.) D. Dietr., *Wissadula hassleriana* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(CAA, CEN, COA, PAI, SPE).

Abutilon terminale (Cav.) A. St.-Hil.

Sin.: *Sida terminalis* Cav.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SFE, SLU). BRA(RGS). URY(FLA, LAV, MAL, RIV).

Abutilon thyrsoendron Griseb.

Sin.: *Abutilon lilloi* Hassl.

Arbusto. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Abutilon umbelliflorum A. St.-Hil.

Sin.: *Abutilon umbelliflorum* A. St.-Hil. subsp. *occidentale* R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA). URY(ROC, TAC).

Abutilon viscosum (L.) Dorr

Sin.: *Bastardia viscosa* (L.) Kunth, *Sida viscosa* L.

Subarbusto. Nativa. 100-700 m.

Países: ARG(MIS, SAL). PRY(APY).

Acaulimalva Krapov.

Acaulimalva nubigena (Walp.) Krapov.

Sin.: *Malva nubigena* (Walp.) Wedd., *Malva parnassiifolia* (Hook.) Wedd. var. *lobulata* Wedd., *Malvastrum buchtienii* Pax, *Malvastrum fiebrigii* Ulbr., *Malvastrum nubigenum* (Walp.) Baker f., *Malvastrum nubigenum* (Walp.) Baker f. var. *bipinnatifidum* R.E. Fr., *Malvastrum parnassiaefolium* (Hook.) A. Gray var. *lobulata* Wedd., *Malvastrum tuberculatum* A. W. Hill, *Malveopsis acaulis* (Cav.) Kuntze var. *boliviensis* Kuntze, *Nototriche*

incisa Turcz., *Sida nubigena* Walp., *Sida parnassiifolia* Hook. var. *lobulata* (Wedd.) Griseb.

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Alcea L.

Alcea rosea L.

Hierba. Introducida. 1500.

Países: ARG(SJU) BRA(PAR).

Andeimalva J.A. Tate

Andeimalva chilensis (Gay) J.A. Tate

Sin.: *Malacothamnus chilensis* (Gay) Krapov., *Sphaeralcea capitata* Phil., *Sphaeralcea chilensis* Gay, *Sphaeralcea glabrata* Phil., *Sphaeralcea grandifolia* Phil., *Sphaeralcea peteroana* Phil., *Sphaeralcea viridis* Phil., *Sphaeroma chilense* (Gay) Kuntze, *Sphaeroma glabratum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 300-3000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Anoda Cav.

Anoda cristata (L.) Schltdl.

Sin.: *Anoda acerifolia* (Zuccagni) DC., hom. illeg., *Anoda brachyantha* Rchb., *Anoda cristata* (L.) Schltdl. var. *brachyantha* (Rchb.) Hochr., *Anoda fernandeziana* Steud., *Anoda hastata* Cav., *Anoda populifolia* Phil., *Sida acerifolia* Zuccagni, hom. illeg., *Sida cristata* L.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(TAR,

ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). URY(MON).

Ayenia L.

Ayenia acalyphifolia Griseb.

Sin.: *Lorentzia saltenia* Hieron.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Ayenia aprica Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(TAC).

Ayenia cordobensis (Hieron.) Hieron.

Sin.: *Lorentzia cordobensis* Hieron.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SDE, SJU, SLU).

Ayenia eliae Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 400-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

Ayenia krapovickasii Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Ayenia lingulata Griseb.

Sin.: *Lorentzia saltenia* Hieron. var. *angustifolia* Hieron.

Subarbusto. Nativa. 700-1600 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Ayenia magna L.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Ayenia mansfeldiana (Herter) Herter ex Cristóbal

Sin.: *Ayenia ekmanii* Cristóbal, *Ayenia pusilla* L. var. *glabra* K. Schum., *Tragia mansfeldiana* Herter

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(CEN, CON, COA, PAI, SPE). URY(ART, MON, RIV, SAO, TAC).

Ayenia nummularia Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, AMA).

Ayenia odonellii Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 100-800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, AMA, CON, COA, PHA, SPE).

Ayenia praecipua Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CAU, GUA, ITA).

Ayenia spinulosa R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Ayenia subtilis Cristóbal

Arbusto. Endémica. 800-1000 m.

Países: ARG(SAL).

Ayenia tomentosa L.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Bastardiopsis (K. Schum.) Hassl.

Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl.

Sin.: *Abutilon densiflorum* (Hook. & Arn.) Walp., *Bastardia densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl., *Bastardia densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl. var. *paraguariensis* Hassl., *Bastardiopsis densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl. var. *paraguariensis* (Hassl.) Hassl., *Sida densiflora* Hook. & Arn.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, GUA, ITA, PAI).

Bordasia Krapov.

Bordasia bicornis Krapov.
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(APY).

Briquetia Hochr.

Briquetia denudata (Nees & Mart.) Chodat & Hassl.
Sin.: *Anoda denudata* (Nees & Mart.) K. Schum., *Briquetia ancylocarpa* Hochr., *Sida bihamata* A. St.-Hil. & Naudin, *Sida denudata* Nees & Mart.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR). PRY(CAA, CAN, GUA, PHA).

Byttneria Loebl., nom. cons.

Byttneria acalyphifolia (Griseb.) Ariza
Sin.: *Argythamnia acalyphifolia* (Griseb.) Kuntze, *Byttneria hirsuta* Ruiz & Pav. var. *parvifolia* Kuntze, *Byttneria tucumanensis* Cristóbal, *Caperonia acalyphifolia* Griseb.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, SAL, TUC).

Byttneria australis A. St.-Hil.
Sin.: *Solanum brevipes* Dunal
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Byttneria catalpifolia Jacq. subsp. **sidifolia** (A. St.-Hil.) Cristóbal
Sin.: *Byttneria sidifolia* A. St.-Hil.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, GUA).

Byttneria dentata Pohl
Sin.: *Ayenia echinococca* K. Schum. ex Kuntze, *Byttneria campicola* Taub., *Byttneria hassleri* K. Schum.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Byttneria divaricata Benth. var. **guaranitica** K. Schum. & Hassl.
Sin.: *Byttneria arborescens* K. Schum. ex R.E. Fr.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, CON, SPE).

Byttneria filipes Mart. ex K. Schum.
Sin.: *Byttneria filipes* Mart. ex K. Schum. f. *spinis-majoribus* Chodat & Hassl., *Byttneria filipes* Mart. ex K. Schum. var. *puberula* Hassl., *Byttneria paraguayensis* (Britton) Chodat, *Chaetaea paraguayensis* Britton
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, MIE, PHA).

Byttneria gracilipes Decne. ex Baill.
Sin.: *Byttneria urticifolia* K. Schum. f. *transiens* Ekman, *Byttneria urticifolia* K. Schum. var. *transiens* (Ekman) Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, GUA).

Byttneria hatschbachii Cristóbal
Subarbusto. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Byttneria implacabilis Cristóbal
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Byttneria oblongata Pohl
Sin.: *Byttneria scalpellata* Pohl var. *glabrescens* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Byttneria oranensis Cristóbal
Liana. Nativa. 500-600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Byttneria ostenii Cristóbal
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(COA, PAI).

Byttneria palustris Cristóbal
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(AMA).

Byttneria pedersenii Cristóbal
Sin.: *Byttneria scalpellata* Pohl f. *glabra* Hassl., *Byttneria scalpellata* Pohl f. *scabra* Hassl., *Byttneria scalpellata* Pohl subsp. *rigida* Ekman
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CON, GUA, ITA, MIE).

Byttneria ramosissima Pohl
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Byttneria rhamnifolia Benth.Sin.: *Byttneria campestris* S. Moore,*Byttneria charagmocarpa* S. Moore

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). PRY(ÑEE).

Byttneria rojasii Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA, CAA, ITA, SPE).

Byttneria scabra L.Sin.: *Byttneria scabra* L. var. *dentata* A. St.-Hil., *Byttneria scabra* L. var. *serrata* K. Schum.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RNO, SAO, SJO, SOR).

Byttneria stenophylla Cristóbal

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Byttneria subsessilis Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN, SPE).

Byttneria triadenia Cristóbal

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Byttneria urticifolia K. Schum.Sin.: *Byttneria urticifolia* K. Schum. var. *genuina* Arechav., nom. inval., *Byttneria urticifolia* K. Schum. var. *subglabra* Arechav.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAN, GUA, PAI). URY(CLA, COL, LAV, MAL, SJO, TAC, TYT).

Callianthe Donnell**Callianthe amoena** (K. Schum.) DonnellSin.: *Abutilon amoenum* K. Schum., *Abutilon eriocarpum* Speg. ex Stuck., nom. nud.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).

Callianthe bedfordiana (Hook.) DonnellSin.: *Abutilon bedfordianum* A. St.-Hil. & Naudin subsp. *discolor* (K. Schum.) R.E. Fr., *Abutilon bedfordianum* A. St.-Hil. & Naudin var. *discolor* K. Schum.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Callianthe costicalyx (K. Schum. ex C.

Takeuchi & G.L. Esteves) Grings

Sin.: *Abutilon costicalyx* K. Schum. ex Takeuchi & G.L. Esteves

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Callianthe cyclonervosa (Hochr.)

Donnell

Sin.: *Abutilon bakeri* Rusby, hom. illeg., *Abutilon cyclonervosum* Hochr.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Callianthe darwinii (Hook. f.) DonnellSin.: *Abutilon darwinii* Hook. f.

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

Callianthe flava Grings

Arbusto. Endémica. 400-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Callianthe fluviatilis (Vell.) DonnellSin.: *Abutilon fluviatile* (Vell.) K. Schum., *Sida fluviatilis* Vell.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Callianthe jujuensis (Hassl.) DonnellSin.: *Abutilon jujuense* Hassl.

Arbusto. Nativa. 800-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Callianthe maritima Grings

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Callianthe megapotamica (A. Spreng.)

Dorr

Sin.: *Abutilon inflatum* Garcke & K. Schum., *Abutilon megapotamicum* (Spreng.) A. St.-Hil. & Naudin, *Sida megapotamica* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Callianthe muelleri-friderici (Gürke & K.

Schum.) Donnell

Sin.: *Abutilon muelleri-friderici* Gürke & K. Schum.

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Callianthe nivea (Griseb.) DorrSin.: *Abutilon niveum* Griseb.

Arbusto. Nativa. 200-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Callianthe pauciflora (A. St.-Hil.) Dorr=Sin.: *Abutilon melanocarpum* A. St.-Hil. & Naudin, *Abutilon pauciflorum* A. St.-Hil., *Abutilon pauciflorum* A. St.-Hil. f. *longe-corniculatum* Hassl., *Abutilon pauciflorum* A. St.-Hil. var. *cano-tomentosum* Hassl., *Abutilon rugosulum* Hochr. ex Chodat & Hassl., *Bonpl.* & Kunth

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ROC).

Callianthe picta (Gillies ex Hook. & Arn.)
Donnell

Sin.: *Abutilon pictum* (Hook. & Arn.) Walp.,
Abutilon striatum Dicks. ex Lindl. f.
palmatifidum Ekman, *Sida picta* Hook. &
Arn.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR). PRY(COA). URY(ART, CAS,
SAO).

Callianthe rufinerva (A. St.-Hil.) Donnell

Sin.: *Abutilon rufinerve* A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Callianthe striata (Dicks. ex Lindl.)
Donnell

Sin.: *Abutilon striatum* Dicks. ex Lindl.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Callianthe sulcatarinensis Grings

Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Calyculogygas Krapov.

Calyculogygas serrana Grings

Arbusto o liana. Endémica. 300-500 m.
Países: BRA(RGS).

Calyculogygas uruguayensis Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(CAS,
LAV, SJO).

Calyptraemalva Krapov.

Calyptraemalva catharinensis Krapov.

Arbusto. Endémica. 1000.
Países: BRA(SCA).

Ceiba Mill.

Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna

Sin.: *Chorisia chodatii* Hassl., *Chorisia*
insignis Kunth var. *chodatii* (Hassl.) Hassl.
Árbol. Nativa. 400-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, FOR,
JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC).
PRY(APY, CEN, PHA).

Ceiba guarani Catari, A.A. Angulo &
Drawert

Árbol. Nativa. 800-1400 m.
Países: ARG(SAL).

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum.
var. **glabriflora** Hassl.

Sin.: *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K.
Schum. f. *transiens* Hassl.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum.
var. **pubiflora**

Sin.: *Ceiba fiebrigii* Hochr., *Ceiba pubiflora*
(A. St.-Hil.) K. Schum. f. *coetanea*
Hassl., *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K.
Schum. f. *praecox* Hassl., *Ceiba pubiflora*
(A. St.-Hil.) K. Schum. var. *genuina*
Hassl., nom. inval., *Chorisia pubiflora* (A.
St.-Hil.) G. Dawson, *Eriodendron*
pubiflorum A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(COA, GUA, PAI, SPE).

Ceiba samauma (Mart.) K. Schum.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Ceiba speciosa (A. St.-Hil., A. Juss. &
Cambess.) Ravenna

Sin.: *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., A. Juss.
& Cambess., *Chorisia speciosa* A. St.-Hil.,
Juss. & Cambess. var. *paraguariensis*

Hassl., *Bombax aculeatum* Vell., hom.
illeg.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA).

Cienfuegosia Cav.

Cienfuegosia affinis (Kunth) Hochr.

Sin.: *Hibiscus affinis* Kunth
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(AMA).

Cienfuegosia argentina Gürke

Sin.: *Fugosia argentina* (Gürke) Hochr.,
Hibiscus argentinus (Gürke) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

Cienfuegosia conciliata Krapov.

Subarbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: PRY(APY).

Cienfuegosia drummondii (A. Gray)
Lewton

Sin.: *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.)
Garcke f. *intermedia* Chodat & Hassl.,
Cienfuegosia sulphurea (A. St.-Hil.)
Garcke var. *drummondii* (A. Gray) Hochr.,
Cienfuegosia sulphurea (A. St.-Hil.)
Garcke var. *glabra* Gürke, *Cienfuegosia*
sulphurea (A. St.-Hil.) Garcke var. *major*
Hassl., *Fugosia drummondii* A. Gray,
Fugosia pulverulenta (Griseb.) Hochr.,
Fugosia sulphurea A. St.-Hil. var. *trifida*
Griseb. ex Rodrigo, nom. nud., *Hibiscus*
drummondii (A. Gray) Kuntze, *Hibiscus*
pulverulentus Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS).
PRY(APY, BOQ, CEN, COA, GUA, ÑEE,
PAI, PHA).

Cienfuegosia hassleriana Hochr.

Sin.: *Cienfuegosia argentina* Gürke f. *escholtzioides* (Hochr.) Hassl., *Cienfuegosia argentina* Gürke var. *hasslerana* (Hochr.) Hassl., *Cienfuegosia escholtzioides* Hochr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(AMA, CON).

Cienfuegosia hispida R.E. Fr.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(SAL, SDE, SFE, TUC).

Cienfuegosia integrifolia (Chodat & Hassl.) Fryxell

Sin.: *Cienfuegosia subprostrata* Hochr. var. *vera* Hassl., *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke var. *integrifolia* Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 200-600 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Cienfuegosia lanceolata (A. St.-Hil.) Krapov.

Sin.: *Fugosia lanceolata* A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 200-800 m.

Países: PRY(AMA).

Cienfuegosia saraviae Krapov.

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(SAL).

Cienfuegosia schulzii Krapov.

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: ARG(FOR).

Cienfuegosia subprostrata Hochr.

Hierba. Endémica. 100-700 m.

Países: PRY(CAN, SPE).

Cienfuegosia subternata (Hassl.) Fryxell

Sin.: *Cienfuegosia heterophylla* (Vent.) Garcke subsp. *subternata* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 200-800 m.

Países: PRY(APY, AMA, CON).

Cienfuegosia sulphurea (A. St.-Hil.) Garcke

Sin.: *Cienfuegosia drummondii* (A. Gray) Lewton var. *pubescens* Hassl., nom. nud., *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke var. *genuina* Gürke, nom. inval., *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke var. *trifida* Griseb. ex Seckt, nom. nud., *Fugosia sulphurea* A. St.-Hil., *Hibiscus jussieui* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(CON, ÑEE). URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR).

Cienfuegosia ulmifolia Fryxell

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CON, ÑEE, PHA).

Corchorus L.**Corchorus hirtus** L.

Sin.: *Corchorus hirtus* L. var. *cuyabensis* K. Schum., *Corchorus hirtus* L. var. *orinocensis* (Kunth) K. Schum., *Corchorus pilolobus* Link

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

Corchorus orinocensis Kunth

Sin.: *Corchorus argutus* Kunth, *Corchorus argutus* Kunth var. *longicarpus* Kuntze, *Corchorus argutus* Kunth var. *prismatocarpus* K. Schum., *Corchorus hirtus* L. var. *argentinensis* Rodrigo, *Corchorus prismatocarpus* A. St.-Hil.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON,

COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

Corynabutilon (K. Schum.) Kearney**Corynabutilon bicolor** (Phil. ex K. Schum.) Kearney

Sin.: *Abutilon bicolor* Phil. ex K. Schum.

Arbusto. Endémica. 200-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, RME).

Corynabutilon ceratocarpum (Hook. & Arn.) Kearney

Sin.: *Abutilon ceratocarpum* (Hook. & Arn.) Gay, *Sida ceratocarpa* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 700-2400 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Corynabutilon hirsutum (Phil.) A. Martic.

Sin.: *Abutilon hirsutum* (Phil.) Reiche, hom. illeg., *Anoda hirsuta* Phil.

Arbusto. Endémica. 300-500 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Corynabutilon ochsenii (Phil.) Kearney

Sin.: *Abutilon ochsenii* (Phil.) Phil., *Abutilon ochsenii* (Phil.) Phil. var. *stellaris* Reiche, *Anoda ochsenii* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ARA, LSR).

Corynabutilon salicifolium (Reiche) Krapov.

Sin.: *Abutilon salicifolium* Reiche

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Corynabutilon viride (Phil.) A. Martic.

Sin.: *Abutilon viride* Phil.

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Corynabutilon vitifolium (Cav.) Kearney
Sin.: *Abutilon garckeii* Baker, *Abutilon vitifolium* (Cav.) D. Don, *Sida vitifolia* Cav., *Sidalcea triloba* Turcz.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LSR, LLA).

Cristaria Cav. , nom. cons.

Cristaria adenophora I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 2400-3300 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Cristaria andicola Gay
Hierba. Endémica. 2000-4700 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU).
CHL(ANT, ATA, COQ).

Cristaria argyliifolia Phil.
Sin.: *Cristaria aspera* Gay var. *pilosa* (Phil.) Reiche, *Cristaria pilosa* Phil.
Hierba. Endémica. 300-700 m.
Países: CHL(ATA).

Cristaria aspera Gay var. *aspera*
Sin.: *Cristaria intermedia* Gay, *Cristaria lata* Turcz., *Cristaria urmenetae* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cristaria aspera Gay var. *formosula* (I.M. Johnst.) M. Muñoz
Sin.: *Cristaria formosula* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Cristaria aspera Gay var. *sadae* (Phil.) M. Muñoz
Sin.: *Cristaria sadae* Phil.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Cristaria calderiana M. Muñoz
Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(ATA).

Cristaria cordato-rotundifolia Gay
Hierba. Endémica. 1300-2500 m.
Países: CHL(ATA).

Cristaria cyanea Phil. ex Baker f.
Hierba. Endémica. 1000-2400 m.
Países: CHL(TAR, ATA, COQ).

Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. *dissecta*
Sin.: *Cristaria flexuosa* Phil., *Cristaria ovallea* Gay, *Cristaria univittata* Hochr., *Lecanophora dissecta* (Hook. & Arn.) Speg.

Hierba. Endémica. 100-3700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SAL, SJU).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. *glandulosa* (Phil.) M. Muñoz
Sin.: *Cristaria glandulosa* Phil., *Cristaria glomerulata* I.M. Johnst., *Cristaria saniculifolia* Phil. ex Baker f.
Hierba. Endémica. 300-2800 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ).

Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. *inconspicua* (F. Phil.) M. Muñoz
Sin.: *Cristaria inconspicua* F. Phil.
Hierba. Endémica. 2700-3500 m.
Países: ARG(SJU). CHL(COQ).

Cristaria fuentesiana I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 100-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Cristaria glaucophylla Cav. var. *eriantha* (Hook. & Arn.) M. Muñoz
Sin.: *Cristaria australis* Phil., *Cristaria eriantha* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Cristaria glaucophylla Cav. var. *glaucophylla*

Sin.: *Cristaria betonicifolia* Cav., *Cristaria carrizalensis* Phil., *Cristaria glaucophylla* Cav. var. *simples* Reiche, *Cristaria haenkeana* C. Presl, *Cristaria hirsuta* C. Presl, *Cristaria hispida* Phil., hom. illeg., *Cristaria pannosa* Phil., *Cristaria trichocaula* Phil., *Lecanophora glaucophylla* (Cav.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Cristaria gracilis Gay
Sin.: *Cristaria divaricata* Phil. ex Baker f., *Cristaria divaricata* Phil. ex Baker f. var. *hirsuta* Phil., *Cristaria humilis* Phil., *Cristaria patens* Phil., *Cristaria ranunculifolia* Phil. ex Baker f.
Hierba. Nativa. 1000-4200 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Cristaria insularis F. Phil. var. *insularis*
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(IDE).

Cristaria insularis F. Phil. var. *johowii* (Skotts.) M. Muñoz
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(IDE).

Cristaria integerrima Phil. var. *integerrima*
Sin.: *Cristaria borchersii* Phil., *Cristaria diaziana* I.M. Johnst., *Cristaria foliosa* Phil., *Cristaria grandidentata* Phil. ex Baker f., *Cristaria intonsa* I.M. Johnst., *Cristaria larranagae* Phil., *Cristaria oxyptera* Phil., *Cristaria paposana* I.M. Johnst., *Cristaria rotundifolia* Phil., *Cristaria setosa* Phil.

Hierba, subarbusto o arbusto.
Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Cristaria integerrima Phil. var. **lobulata** (Phil.) M. Muñoz

Sin.: *Cristaria lobulata* Phil.

Hierba, subarbusto o arbusto.
Endémica. 200-500 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Cristaria leucantha I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ANT).

Cristaria molinae Gay

Sin.: *Cristaria diversifolia* Phil., *Cristaria diversifolia* Phil. f. *parvula* (Phil.) I.M. Johnst., *Cristaria grandiflora* Turcz., *Cristaria heterophylla* Phil., hom. illeg., *Cristaria parvula* Phil., *Cristaria trifida* Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cristaria multiflora Gay

Sin.: *Cristaria glabrata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: CHL(TAR, ATA, COQ, VAL).

Cristaria ovata M. Muñoz

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cristaria tenuissima M. Muñoz

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Cristaria viridiluteola Gay var. **pinnata** (Phil.) M. Muñoz

Sin.: *Cristaria pinnata* Phil., *Cristaria thinophila* I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Cristaria viridiluteola Gay var. **viridiluteola**

Sin.: *Cristaria bipinnata* Phil., *Cristaria bipinnatifida* Phil., *Cristaria sessilifolia* Turcz., *Cristaria viridiluteola* Gay var. *geraniifolia* (C. Presl) Reiche

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Dirhamphis Krapov.

Dirhamphis balansae Krapov.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, CON).

Eriotheca Schott & Endl.

Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns

Sin.: *Bombax crenulatum* K. Schum. var. *lobatum* Hassl., *Bombax crenulatum* K. Schum. var. *subintegrum* Hassl., *Bombax gracilipes* K. Schum., *Eriotheca hassleri* A. Robyns

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Eriotheca macrophylla (K. Schum.) A. Robyns

Sin.: *Bombax macrophyllum* K. Schum.

Arbusto. Nativa.

Países: PRY(SPE).

Eriotheca roseorum (Cuatrec.) A. Robyns

Sin.: *Bombax roseorum* Cuatrec., *Tartagalia roseorum* (Cuatrec.) T. Mey., *Tartagalia rubra* Capurro

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL).

Fuertesimalva Fryxell

Fuertesimalva chilensis (A. Braun & C.D. Bouché) Fryxell

Sin.: *Malva chilensis* A. Braun & C.D. Bouché, *Malva scorpioides* Turcz.,

Malvastrum hinkleyorum I.M. Johnst., *Urocarpidium chilensis* (A. Braun & C.D. Bouché) Krapov.

Hierba. Nativa. 400-2200 m.

Países: CHL(AYP, ANT, ATA, COQ).

Fuertesimalva echinata (C. Presl) Fryxell

Sin.: *Malva echinata* C. Presl, *Malvastrum shepardae* I.M. Johnst., *Urocarpidium echinatum* (C. Presl) Krapov. & Fryxell, *Urocarpidium shepardae* (I.M. Johnst.) Krapov.

Hierba. Nativa. 2000-3800 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Fuertesimalva pentacocca (Krapov.) Fryxell

Sin.: *Urocarpidium pentacoccum* Krapov.

Hierba. Nativa. 2900-3100 m.

Países: ARG(CAT).

Fuertesimalva pentandra (K. Schum.) Fryxell

Sin.: *Malvastrum catamarcense* I.M. Johnst., *Malvastrum pentandrum* K. Schum., *Urocarpidium pentandrum* (K. Schum.) Krapov.

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell

Sin.: *Malva mathewsii* Turcz., *Malva peruviana* L., *Malvastrum peruvianum* (L.) A. Gray, *Urocarpidium mathewsii* (Turcz.) Krapov.

Hierba. Nativa. 100-2300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Fuertesimalva sanambrosiana (D.M. Bates) Fryxell

Sin.: *Urocarpidium sanambrosianum* D.M. Bates

Hierba. Endémica. 200-500 m.

Países: CHL(IDE).

Gaya Kunth

Gaya albiflora Krapov.

Subarbusto. Nativa. 1500.

Países: ARG(SAL).

Gaya bordasii Krapov.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Gaya domingensis Urb.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Gaya gracilipes K. Schum.

Sin.: *Gaya gracilipes* K. Schum. var. *multicarpidiata* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

Gaya kelleri Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(MIS).

Gaya matutina Krapov.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, PHA).

Gaya meridionalis Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON).

Gaya parviflora (Phil.) Krapov.

Sin.: *Cristaria corchorifolia* Griseb., nom. illeg., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. f. *australis* Hassl., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. f. *intermedia* Hassl., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. f. *viscidula* Hassl., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. var. *catamarquensis* Hassl., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. var. *hirsutula* Hassl., *Philippimalva parviflora* (Phil.) Kuntze, *Tetraptera parviflora* Phil.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY). URY(SOR).

Gaya pilosa K. Schum.

Sin.: *Gaya pilosa* K. Schum. var. *microphylla* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA).

Gaya purpurea Krapov.

Subarbusto. Endémica. 1900-2700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Gaya tarijensis R.E. Fr.

Sin.: *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. var. *tarijensis* (R.E. Fr.) Hassl.

Hierba. Nativa. 100-2000 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC).
PRY(APY, CON, PHA).

Gossypium L.

Gossypium barbadense L.

Sin.: *Gossypium multiglandulosum* Phil.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, IPA).

Gossypium herbaceum L.

Arbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Gossypium hirsutum L.

Arbusto o subarbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Guazuma Mill.

Guazuma ulmifolia Lam. var. **tomentella** K. Schum.

Sin.: *Guazuma ulmifolia* Lam. var. *glabra* K. Schum.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Guazuma ulmifolia Lam. var. **ulmifolia**

Sin.: *Guazuma tomentosa* Kunth, *Guazuma ulmifolia* Lam. var. *tomentosa* (Kunth) K. Schum.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Helicteres L.

Helicteres brevispira A. St.-Hil.

Sin.: *Helicteres ovata* Lam. subsp. *hybantoides* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

Helicteres gardneriana A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Helicteres guazumifolia* Kunth var. *gardneriana* (A. St.-Hil. & Naudin) R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, APA, AMA, CAN, CON, PHA, SPE).

Helicteres lhotzkyana (Schott & Endl.) K. Schum. var. **lhotzkyana**

Sin.: *Orthothecium lhotzkyanum* Schott & Endl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CON).

Helicteres lhotzkyana (Schott & Endl.) K. Schum. var. **pubinervis** Kuntze

Sin.: *Helicteres amplifolia* Rusby, *Helicteres rusbyi* Britton

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(SAL).

Heliocarpus L.**Heliocarpus americanus L.**

Sin.: *Heliocarpus americanus* L. var. *popayanensis* (Kunth) K. Schum., *Heliocarpus australis* E. Watson, *Heliocarpus popayanensis* Kunth
 Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Herissantia Medik.**Herissantia crispa (L.) Brizicky**

Sin.: *Abutilon crispum* (L.) Medik., *Bogenhardia crispa* (L.) Kearney, *Gayoides crispa* (L.) Small, *Pseudobastardia crispa* (L.) Hassl., *Sida crispa* L.

Hierba. Nativa. 100-1400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

Herissantia intermedia (Hassl.) Krapov.

Sin.: *Abutilon tiubae* K. Schum. f. *annuum* Hassl., *Abutilon tiubae* K. Schum. f. *perenne* Hassl., *Abutilon tiubae* K. Schum. var. *parviflorum* Hassl., *Bogenhardia tiubae* (K. Schum.) Monteiro f. *perennis* (Hassl.) Monteiro, *Bogenhardia tiubae* (K. Schum.) Monteiro var. *intermedia* (Hassl.) Monteiro, *Bogenhardia tiubae* (K. Schum.) Monteiro var. *parviflora* (Hassl.) Monteiro, *Pseudobastardia tiubae* (K. Schum.) Hassl. f. *annua* Hassl., *Pseudobastardia tiubae* (K. Schum.) Hassl. f. *perennis* Hassl., *Pseudobastardia tiubae* (K. Schum.) Hassl. var. *intermedia* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). PRY(AMA).

Herissantia nemoralis (A. St.-Hil.)

Brizicky

Sin.: *Bastardia nemoralis* A. St.-Hil., *Bogenhardia nemoralis* (A. St.-Hil.) Monteiro, *Pseudobastardia nemoralis* (A. St.-Hil.) Hassl., *Sida nemoralis* (A. St.-Hil.) G. Don

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(PAI).

Hibiscus L.**Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern**

Hierba. Introducida. 100-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Hibiscus amambayensis Krapov. & Fryxell

Sin.: *Hibiscus cucurbitaceus* A. St.-Hil. var. *acuminatus* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 200-500 m.

Países: PRY(AMA).

Hibiscus bifurcatus Cav.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Hibiscus diversifolius Jacq.

Arbusto. Introducida.

Países: BRAPAR, RGS, SCA).

Hibiscus furcellatus Lam.

Sin.: *Hibiscus diodon* DC., *Hibiscus dominicus* Hochr., *Hibiscus furcellatus* Lam. var. *dominicus* (Hochr.) Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PHA, SPE).

Hibiscus hasslerianus Hochr.

Subarbusto. Nativa. 200-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Hibiscus radiatus Cav.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA).

Hibiscus sororius L.

Sin.: *Hibiscus crenatus* Splitg. ex de Vriese

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CEN).

Hibiscus striatus Cav.

Sin.: *Abelmoschus angustifolius* (Hook. & Arn.) Walp., *Abelmoschus cisplatinus* (A. St.-Hil.) Walp., *Hibiscus amoenus* Link & Otto, *Hibiscus angustifolius* Hook. & Arn., *Hibiscus argentinus* Speg., hom. illeg., *Hibiscus cisplatinus* A. St.-Hil., *Hibiscus domingensis* Jacq. var. *striatus* (Cav.) Willd., *Hibiscus lambertianus* Kunth, *Hibiscus lambertianus* Kunth var. *angustifolius* (Hook. & Arn.) Hochr., *Hibiscus lambertianus* Kunth var. *glaber* Gürke, *Hibiscus lambertianus* Kunth var. *lobatus* Chodat & Hassl., *Hibiscus lindmanii* Gürke, *Hibiscus linearis* A. St.-Hil. & Naudin, *Hibiscus submaritimus* Larrañaga

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, DUR, PAY, ROC, SJO, TAC).

Hibiscus trionum L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(RNE). CHL(MAU, BIO). URY(MON, SOR).

Hibiscus urticifolius A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Hibiscus selloi* Gürke, *Hibiscus selloi* Gürke var. *paraguariensis* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, SPE).

Hochreutinera Krapov.

Hochreutinera hassleriana (Hochr.) Krapov.

Sin.: *Abutilon hasslerianum* Hochr., *Abutilon hasslerianum* Hochr. f. *johnsonii* (Ekman) Hassl., *Abutilon hasslerianum* Hochr. f. *pilcomayensis* Hassl., *Abutilon johnsonii* Ekman

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Krapovickasia Fryxell

Krapovickasia flavescens (Cav.) Fryxell
Sin.: *Physalastrum flavescens* (Cav.) Monteiro, *Physalastrum prostratum* (Cav.) Monteiro, *Sida compressicaulis* Larrañaga, *Sida flavescens* Cav., *Sida intermedia* A. St.-Hil., *Sida macrodon* DC. var. *intermedia* (A. St.-Hil.) Griseb., *Sida prostrata* Cav., *Sida prostrata* Cav. var. *flavescens* (Cav.) Baker f.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(ITA). URY(ART, CAS, COL, FLO, FLA, MON, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Krapovickasia macrodon (DC.) Fryxell
Sin.: *Physalastrum macrodon* (DC.) Monteiro, *Sida cymbalaria* Hochr., *Sida macrodon* DC., *Sida macrodon* DC. var. *cymbalaria* (Hochr.) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, PAI).

Krapovickasia urticifolia (A. St.-Hil.) Fryxell

Sin.: *Physalastrum urticifolium* (A. St.-Hil.) Monteiro, *Sida hilariana* Walp., *Sida urticifolia* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, GUA, SPE). URY(RIV).

Lecanophora Speg.

Lecanophora ameghinoides (Speg.) Speg.
Sin.: *Cristaria eburnea* Sandwith, *Cristaria kuntzei* Speg., *Cristaria mutica* Hochr., *Cristaria patagonica* Kuntze, hom. illeg., *Cristaria patagonica* Phil., *Lecanophora patagonica* Speg., *Plarodrigoa ameghinoides* (Speg.) Looser, *Plarodrigoa patagonica* Looser, *Sida ameghinoides* Speg., *Sida ameghinoides* Speg. var. *appendiculata* Hicken

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).

Lecanophora chubutensis (Speg.) Rodrigo

Sin.: *Cristaria chubutensis* (Speg.) Hochr., *Plarodrigoa chubutensis* (Speg.) Looser, *Sida chubutensis* Speg.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Lecanophora ecristata (A. Gray) Krapov.
Sin.: *Cristaria ecristata* A. Gray, *Cristaria linoides* (Hieron.) Speg., *Lecanophora linoides* (Hieron.) Speg., *Malvastrum linoides* Hieron., *Sida linoides* (Hieron.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU).

Lecanophora heterophylla (Cav.) Krapov.

Sin.: *Cristaria hastata* Phil., *Cristaria heterophylla* (Cav.) Hook. & Arn., *Cristaria heterophylla* (Cav.) Hook. & Arn. var. *loasifolia* (Phil.) Reiche, *Cristaria hispida* Gillies ex Hook. & Arn., *Cristaria loasifolia* Phil., *Cristaria mendocina* Phil., *Cristaria wilczekii* Hochr., *Sida heterophylla* Cav.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).

Lecanophora jarae (Phil.) Krapov.

Sin.: *Cristaria jarae* Phil.

Hierba. Endémica. 3500-4000 m.

Países: ARG(CAT).

Lecanophora ruiz-lealii Krapov.

Hierba. Endémica. 1400-1500 m.

Países: ARG(RNE).

Lecanophora subacaulis Krapov.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Luehea Willd., nom. cons.

Luehea candicans Mart.

Sin.: *Luehea uniflora* A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Luehea conwentzii K. Schum.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR).

Luehea divaricata Mart.

Sin.: *Thespesia brasiliensis* Spreng.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,

CON, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).
URY(ART, CLA, MAL, PAY, RNO, RIV,
ROC, SAO, SOR, TAC).

Luehea fiebrigii Burret

Arbolito o árbol. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Luehea grandiflora Mart.

Sin.: *Luehea rufescens* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY,
APA, AMA, CAN, CON).
Notas: Citada para Uruguay por Cunha
(1985), su presencia es dudosa

Luehea microcarpa R.E. Fr. var.
microcarpa

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(AMA, CON).

Luehea microcarpa R.E. Fr. var.
polymorpha Hassl.

Árbol. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(CON).

Luehea paniculata Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, COA).

Luehea speciosa Willd.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Malachra L.

Malachra radiata (L.) L.

Sin.: *Sida radiata* L.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

Malva L.

Malva arborea (L.) Webb & Berthel.

Sin.: *Lavatera arborea* L., *Lavatera
ericalyx* Steud., *Malva dendromorpha*
M.F. Ray, nom. superfl., *Malva ericalyx*
(Steud.) Molero & J.M. Monts.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, SFE).
CHL(AYP, TAR, ANT, VAL, LBO, MAU,
LLA).
Notas: Citada para Uruguay (Ray,
1998) sin indicar localidad o material de
referencia.

Malva assurgentiflora (Kellogg) M.F.
Ray

Sin.: *Lavatera assurgentiflora* Kellogg
Arbusto. Introducida. 0-400 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
COQ, VAL, MAU, JFE).

Malva moschata L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(LLA,
AIS).

Malva neglecta Wallr.

Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN,
NEU, RNE, SCR). BRA(RGS). CHL(VAL,
ARA, RME).

Malva nicaeensis All.

Sin.: *Malva cordistipula* Steud.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, NEU,
RNE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LSR, RME, JFE).
URY(MON).

Malva parviflora L.

Hierba. Introducida. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,
ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL,
SFE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL,

LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, IDE,
JFE). PRY(CEN). URY(MON, SOR).

Malva sylvestris L.

Sin.: *Malva simpliciuscula* Steud.
Hierba. Introducida. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,
ERI, JUJ, NEU, RNE). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(ANT, VAL, AIS, RME).
URY(MON, SJO).

Malva verticillata L.

Arbusto. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(ANT).

Malvastrum A. Gray, nom. cons.

Malvastrum amblyphyllum R.E. Fr.

Sin.: *Malvastrum scabrum* (Cav.) A. Gray
var. *amblyphyllum* (R.E. Fr.) Hassl.,
Malvastrum scabrum (Cav.) A. Gray var.
paraguariense Hassl., *Malvastrum
scabrum* (Cav.) A. Gray var. *tucumanense*
Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE,
TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, PHA).

Malvastrum americanum (L.) Torr.

Sin.: *Malva americana* L., *Malva betulina*
Desr., *Malva curassavica* Desr., *Malva
fluminensis* Vell., *Malva ovata* Cav., *Malva
polystachya* Cav., *Malva spicata* L., *Malva
spicata* L. var. *foliis subcordatis* DC.,
Malva sublobata Desr., *Malva timoriensis*
DC., *Malvastrum spicatum* (L.) A. Gray,
Malveopsis americana (L.) Kuntze,
Malveopsis spicata (L.) Kuntze, *Melochia
spicata* (L.) Fryxell, *Sphaeralcea
americana* (L.) Metz

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA, PHA).

Malvastrum coromandelianum (L.)
Garcke var. **congestum** R.E. Fr.
Sin.: *Malvastrum tricuspidatum* (Aiton) A.
Gray var. *congestum* (R.E. Fr.) Stuck.
Subarbusto. Nativa. 200-2500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Malvastrum coromandelianum (L.)
Garcke subsp. **capitatospicatum**
(Kuntze) S.R. Hill
Sin.: *Malvastrum tricuspidatum* (Aiton) A.
Gray var. *capitatospicatum* (Kuntze)
Stuck., *Malveopsis coromandeliana* (L.)
Morong var. *capitatospicata* Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,
JUU, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE,
TUC).

Malvastrum coromandelianum (L.)
Garcke subsp. **coromandelianum**
Sin.: *Malva coromandeliana* L., *Malva*
tricuspidata Aiton, *Malvastrum*
carpinifolium (Medik.) A. Gray,
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke
f. *breviaristata* Hassl., *Malvastrum*
tricuspidatum (Aiton) A. Gray, *Malveopsis*
coromandeliana (L.) Morong
Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS,
SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, RME,
IPA). PRY(APY, CAU, CEN, CON, COA,
PAI, PHA, SPE). URY(ART).

Malvastrum cristobalianum Krapov.
Arbusto. Nativa. 300-400 m.
Países: PRY(APY).

Malvastrum interruptum K. Schum.
Subarbusto. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
SLU, TUC).

Malvastrum ionthocarpum Krapov.
Hierba. Nativa. 200-400 m.
Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY).

Malvastrum multicuspidatum Krapov.
Hierba. Endémica. 1400-1500 m.
Países: ARG(LRI).

Malvastrum spiciflorum (Hassl.) Krapov.
Sin.: *Malvastrum pentandrum* K. Schum.
subsp. *spiciflorum* Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-3000
m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).

Malvastrum tomentosum (L.) S.R. Hill
Sin.: *Malva tomentosa* L., *Malvastrum*
guaraniticum Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-500
m.
Países: PRY(AMA).

Malvastrum uniapiculatum Krapov.
Arbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(MIS).

Malvella Jaub. & Spach

Malvella leprosa (Ortega) Krapov.
Sin.: *Disella hederacea* (Douglas) Greene,
Malva albifolia Larrañaga, *Malva*
hederacea Douglas, *Malva leprosa*
Ortega, *Malva sulphurea* Gillies ex Hook.
& Arn., *Malvastrum sulphureum* (Gillies ex
Hook. & Arn.) Griseb., *Sida hederacea*
(Douglas) Torr. ex A. Gray, *Sida*
hederacea (Douglas) Torr. ex A. Gray var.
sulphurea (Gillies ex Hook. & Arn.) Baker
f., *Sida leprosa* (Ortega) K. Schum., *Sida*
leprosa (Ortega) K. Schum. var. *sulphurea*
(Hook. & Arn.) Hochr., *Sida sulphurea*
(Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,
ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE,

SCR, SFE, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT,
ATA, COQ, VAL, RME). URY(CAS, MON,
PAY).

Melochia L., nom. cons.

Melochia anomala Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC).

Melochia arenosa Benth.
Sin.: *Melochia cinerea* A. St.-Hil. & Naudin
var. *discolor* Hassl., nom. nud.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, CON,
COA, ÑEE).

Melochia argentina R.E. Fr.
Sin.: *Malvastrum casabambense* Stuck.,
Melochia argentina Hassl., hom. illeg.,
Melochia argentina R.E. Fr. var. *genuina*
Hassl., nom. inval., *Melochia argentina*
R.E. Fr. var. *lanceolata* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 600-1700 m.
Países: ARG(COR, JUJ, MIS, SAL,
TUC). PRY(PAI).

Melochia canescens Cristóbal
Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL).
PRY(APY, BOQ, ÑEE).

Melochia chamaedrys A. St.-Hil. var.
chamaedrys
Sin.: *Melochia chamaedrys* A. St.-Hil. f.
typica Ekman, nom. inval., *Melochia*
chamaedrys A. St.-Hil. var. *loretensis*
Hassl., nom. nud.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAA, COA, ITA).
URY(ART, RIV, SAO, SJO, TAC).

Melochia chamaedrys A. St.-Hil. var. **decumbens** (R.E. Fr.) Goldberg

Sin.: *Melochia chamaedrys* A. St.-Hil. f. *decumbens* (R.E. Fr.) Ekman, *Melochia chamaedrys* A. St.-Hil. var. *viscidula* Hassl., nom. nud., *Melochia decumbens* R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CON). URY(RIV, SAO, TAC).

Melochia goldbergii Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). PRY(APY).

Melochia graminifolia A. St.-Hil.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Melochia hassleriana Chodat

Sin.: *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil. f. *albovillosa* R.E. Fr., *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil. f. *brevipedunculata* K. Schum. & Hassl., *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil. f. *hassleriana* (Chodat) K. Schum. & Hassl., *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil. f. *sericea* K. Schum. & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Melochia hermannioides A. St.-Hil.

Sin.: *Melochia hermannioides* A. St.-Hil. f. *heterophylla* Hassl., *Melochia hermannioides* A. St.-Hil. f. *typica* Hassl., nom. inval., *Melochia hermannioides* A. St.-Hil. var. *lacinulata* (K. Schum. & Hassl.) Hassl., *Melochia hermannioides* A. St.-Hil. var. *lanceolata* Hassl., *Melochia lacinulata* K. Schum. & Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Melochia ministella Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, CON, PHA).

Melochia morongii Britton

Sin.: *Melochia morongii* Britton var. *denudata* R.E. Fr., *Melochia parvifolia* Kunth f. *intermedia* Hassl., *Melochia parvifolia* Kunth f. *tomentosa* Hassl., *Melochia parvifolia* Kunth var. *morongii* (Britton) Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Melochia parvifolia Kunth var. **fasciculata** (Benth.) Hassl.

Sin.: *Melochia fasciculata* Benth., *Melochia parvifolia* Kunth f. *albiflora* K. Schum. & Hassl., *Melochia parvifolia* Kunth f. *microphylla* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CEN, CON, PHA).

Melochia parvifolia Kunth var. **parvifolia**

Sin.: *Melochia parvifolia* Kunth f. *genuina* Hassl., nom. inval., *Melochia parvifolia* Kunth f. *induta* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: PRY(APY, CAN, PHA).

Notas: Cita dudosa para Argentina (Goldberg, 1967)

Melochia pilosa (Mill.) Fawc. & Rendle

Sin.: *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil., *Melochia venosa* Sw., *Sida pilosa* Mill.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV).

Melochia pyramidata L.

Sin.: *Melochia pyramidata* L. f. *intermedia* Hassl., *Melochia pyramidata* L. f. *transitoria* K. Schum. & Hassl., *Melochia pyramidata* L. var. *hieronymi* K. Schum., *Melochia pyramidata* L. var. *pseudotomentosa* Hassl., *Melochia tomentosa* L. var. *mattogrossensis* R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, SJO).

Melochia simplex A. St.-Hil.

Sin.: *Melochia missionum* Ekman, *Melochia sorocabensis* K. Schum., *Melochia stricta* K. Schum., *Melochia stricta* K. Schum. f. *missionum* (Ekman) Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, ITA, SPE).

Melochia spicata (L.) Fryxell var. **tomentosa** (K. Schum.) Dorr

Sin.: *Melochia hirsuta* Cav. f. *albiflora* K. Schum. & Hassl., *Melochia hirsuta* Cav. f. *ferruginea* K. Schum. & Hassl., *Melochia hirsuta* Cav. f. *minus-induta* K. Schum. & Hassl., *Melochia hirsuta* Cav. var. *calophylla* K. Schum., *Melochia hirsuta* Cav. var. *macrophylla* K. Schum., *Melochia hirsuta* Cav. var. *tomentosa* K. Schum., *Melochia subcordata* Morong, *Melochia villosa* (Mill.) Fawc. & Rendle var. *tomentosa* (K. Schum.) Goldberg

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Melochia thymifolia (C. Presl) Goldberg
Sin.: *Riedlea thymifolia* C. Presl
Subarbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUU, TUC).

Melochia villosa (Mill.) Fawc. & Rendle
var. **villosa**
Sin.: *Melochia hirsuta* Cav., *Melochia hirsuta* Cav. var. *paraguayensis* Chodat, *Sida villosa* Mill.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Melochia werdermannii Goldberg
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Modiola Moench

Modiola caroliniana (L.) G. Don
Sin.: *Abutilodes carolinianum* (L.) Kuntze, *Malva caroliniana* L., *Malva eriocarpa* DC., *Malva prostrata* Cav., *Malva radicans* Larrañaga, *Malva urticifolia* Kunth, *Modanthos caroliniana* (L.) Alef., *Modanthos decumbens* (Willd.) Alef., *Modanthos eriocarpa* (DC.) Alef., *Modanthos prostrata* (Cav.) Alef., *Modanthos reptans* (A. St.-Hil.) Alef., *Modanthos urticifolia* (Kunth) Alef., *Modiola caroliniana* (L.) G. Don var. *brevipes* Griseb., *Modiola eriocarpa* (DC.) G. Don, *Modiola multifida* Moench, nom. illeg., *Modiola prostrata* (Cav.) A. St.-Hil., *Modiola reptans* A. St.-Hil., *Modiolastrum jaeggianum* K. Schum.
Hierba. Nativa. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). PRY(APA, CEN, SPE). URY(CLA, MON, RIV, ROC, TAC).

Modiolastrum K. Schum.

Modiolastrum australe Krapov.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

Modiolastrum gilliesii (Steud.) Krapov.
Sin.: *Malva geranioides* Gillies ex Hook., nom. illeg., *Malva gilliesii* Steud., *Malvastrum gilliesii* (Steud.) Baker f., *Modanthos geranioides* Alef., *Modiola geranioides* Walp., *Modiolastrum geranioides* (Walp.) Baker f.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, SDE, SFE). PRY(ITA). URY(FLO).

Modiolastrum lateritium (Hook.) Krapov.
Sin.: *Malva lasiocarpa* A. St.-Hil. & Naudin, *Malva lateritia* Hook., *Malva peduncularis* Hook. & Arn., *Malvastrum lasiocarpum* (A. St.-Hil. & Naudin) Griseb., *Malvastrum lateritium* (Hook.) G. Nicholson, *Malveopsis lateritia* (Hook.) Morong, *Modiola lateritia* (Hook.) K. Schum.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, ITA). URY(PAY, RIV).

Modiolastrum malvifolium (Griseb.) K. Schum.
Sin.: *Malvastrum modioliforme* (Kuntze) K. Schum., *Malvastrum tweediei* Baker f., *Malveopsis modioliformis* Kuntze, *Modiola malvifolia* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART).

Modiolastrum palustre (Ekman) Krapov.
Sin.: *Malvastrum palustre* Ekman
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Monteiroa Krapov.

Monteiroa bullata (Ekman) Krapov.
Sin.: *Malvastrum bullatum* Ekman
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Monteiroa catharinensis Krapov.
Arbusto. Endémica. 1000-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Monteiroa dusenii (Ekman) Krapov.
Sin.: *Malvastrum dusenii* Ekman
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Monteiroa glomerata (Hook. & Arn.) Krapov.
Sin.: *Malva concinna* Knowles & Westc., *Malva glomerata* Hook. & Arn., *Malvastrum garckeanum* K. Schum., *Malvastrum garckeanum* K. Schum. var. *paranensis* K. Schum., *Malvastrum glomeratum* (Hook. & Arn.) Griseb.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, SJO).

Monteiroa hatschbachii Krapov.
Arbusto. Endémica. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Monteiroa ptarmicifolia (A. St.-Hil. & Naudin) Krapov.
Sin.: *Malva ptarmicifolia* A. St.-Hil. & Naudin
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Monteiroa reitzii Krapov.

Arbusto. Endémica. 900-1900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Monteiroa rubra Grings

Subarbusto. Endémica. 600-700 m.

Países: BRA(RGS).

Monteiroa smithii Krapov.

Arbusto. Endémica. 900-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Monteiroa triangularifolia Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Neobaclea Hochr.**Neobaclea crispifolia** (Cav.) Krapov.Sin.: *Abutilon crispifolium* (Cav.) Dusén, *Abutilon vidalii* (Phil.) Speg., *Cristaria vidalii* Phil., *Neobaclea spirostegia* Hochr., *Sida crispifolia* Cav., *Sphaeralcea crispifolia* (Cav.) Baker f.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Nototriche Turcz.**Nototriche alternata** A.W. HillSin.: *Malvastrum sajamense* Hieron., *Nototriche sajamensis* (Hieron.) A.W. Hill

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.

Países: CHL(AYP).

Nototriche anthemidifolia (J. Remy) A.W. HillSin.: *Malvastrum anthemidifolium* (J. Remy) A. Gray, *Malvastrum hirtipes* Speg., *Malvastrum saltense* (Kuntze) R.E. Fr., *Malveopsis saltensis* Kuntze, *Nototriche cheilanthifolia* Turcz.,*Nototriche discolor* Turcz., nom. inval., *Nototriche hirtipes* (Speg.) B.L. Burt & A.W. Hill, *Nototriche pseudoglabra* A.W. Hill, *Nototriche saltensis* A.W. Hill, *Sida anthemidifolia* J. Remy

Hierba. Nativa. 3500-4800 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR).

Nototriche argentea A.W. Hill

Hierba. Nativa. 3300-4500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Nototriche auricoma (Phil.) A.W. HillSin.: *Malvastrum auricomum* Phil.

Hierba. Nativa. 4200-4700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Nototriche borussica (Meyen) A.W. HillSin.: *Sida borussica* Meyen

Hierba. Nativa. 4600-4700 m.

Países: CHL(TAR).

Nototriche cabrae Krapov.

Hierba. Endémica. 4500-4600 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Nototriche caesia A. W. HillSin.: *Nototriche rosulata* A.W. Hill

Hierba. Endémica. 3700-4500 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Nototriche cajonensis Krapov.

Hierba. Endémica. 4100-4300 m.

Países: ARG(CAT, SAL).

Nototriche calchaquensis Krapov.

Hierba. Endémica. 4700-5000 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Nototriche castillonii B.L. Burt & A.W. Hill

Hierba. Endémica. 4000-4500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Nototriche chaniensis C.A. Zanotti & J.C. Ospina

Hierba. Endémica. 4600-4700 m.

Países: ARG(JUU).

Nototriche chuculaensis Krapov.

Hierba. Endémica. 4500-4700 m.

Países: ARG(CAT).

Nototriche clandestina (Phil.) A.W. HillSin.: *Malvastrum clandestinum* (Phil.) Baker f., *Sida clandestina* Phil.

Hierba. Endémica. 3000-5100 m.

Países: ARG(CAT). CHL(ANT, ATA).

Nototriche compacta (A. Gray) A.W. HillSin.: *Malvastrum compactum* A. Gray, *Malvastrum megalorrhizum* (Phil.) Baker f., *Nototriche holoserica* A.W. Hill, *Nototriche megalorrhiza* (Phil.) A.W. Hill, *Nototriche transandina* A.W. Hill, *Sida compacta* Gay, hom. illeg., *Sida megalorrhiza* Phil.

Hierba. Endémica. 3200-4500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Nototriche copon Krapov.

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(LRI, SJU).

Nototriche diminutiva (Phil.) I.M. Johnst.Sin.: *Malva diminutiva* Phil.

Hierba. Endémica. 3800-4000 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Nototriche estipulata A.W. Hill ex B.L. Burt

Hierba. Endémica. 3000-4700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Nototriche famatinensis A.W. Hill

Hierba. Endémica. 3500-5000 m.

Países: ARG(LRI).

Nototriche friesii A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-5700 m.
Países: ARG(JUU).

Nototriche glabra Krapov.
Hierba. Endémica. 4000-4100 m.
Países: ARG(LRI).

Nototriche glauca A.W. Hill
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Nototriche hieronymi A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(LRI).

Nototriche hillii Krapov.
Hierba. Nativa. 4000-4700 m.
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).
CHL(AYP, TAR, ATA).

Nototriche hunzikeri Krapov.
Hierba. Endémica. 3900-4100 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Nototriche kurtzii Krapov.
Hierba. Endémica. 4500.
Países: ARG(LRI).

Nototriche leucosphaera A.W. Hill
Hierba. Nativa. 4300-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Nototriche lorentzii A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Nototriche macrotuba Krapov.
Hierba. Endémica. 4600-4800 m.
Países: ARG(JUU).

Nototriche meyenii Ulbr.
Hierba. Nativa. 4000-4800 m.
Países: CHL(AYP).

Nototriche nana A.W. Hill
Hierba. Endémica. 3700-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Nototriche niederleinii A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(LRI).

Nototriche obcuneata (Baker f.) A.W. Hill
var. **cinerea** A.W. Hill
Hierba. Nativa. 4400-4900 m.
Países: CHL(AYP).

Nototriche obcuneata (Baker f.) A.W. Hill
var. **obcuneata**
Sin.: *Malvastrum obcuneatum* Baker f.
Hierba. Nativa. 4000-4400 m.
Países: CHL(AYP).

Nototriche orbignyana (Wedd.) A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum orbignyanum* Wedd.
Hierba. Nativa. 4400-4500 m.
Países: CHL(AYP).

Nototriche ovata Krapov.
Hierba. Endémica. 3800-4100 m.
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA).

Nototriche parviflora (Phil.) A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum parviflorum* Phil.
Hierba. Nativa. 4100-5000 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Nototriche pedicularifolia (Meyen) A.W. Hill
Sin.: *Nototriche incana* Turcz., *Sida pedicularifolia* Meyen
Hierba. Nativa. 4200-4400 m.
Países: CHL(TAR).

Nototriche philippii A.W. Hill
Hierba. Nativa. 3200-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SJU).
CHL(AYP, ANT, ATA).

Nototriche pulverulenta B.L. Burtt & A.W. Hill
Hierba. Nativa. 4200-4500 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR).

Nototriche pulvilla A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(LRI).

Nototriche pulvinata A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-4900 m.
Países: CHL(AYP).

Nototriche pusilla A.W. Hill
Hierba. Nativa. 3800-4800 m.
Países: ARG(JUU, LRI, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Nototriche pygmaea (J. Remy) A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum pygmaeum* (J. Remy) A. Gray, *Nototriche sarmentosa* A.W. Hill, *Nototriche werdermannii* Ulbr., *Sida pygmaea* J. Remy
Hierba. Nativa. 3500-4600 m.
Países: ARG(JUU, LRI, TUC).
CHL(AYP, TAR).

Nototriche rohmederi Krapov.
Hierba. Endémica. 4500-5200 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Nototriche rugosa (Phil.) A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum pedicularifolium* (Meyen) A. Gray var. *rugosum* (Phil.) Reiche, *Malvastrum rugosum* Phil.
Hierba. Endémica. 1900-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SJU).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Nototriche sleumeri Krapov.
Hierba. Endémica. 4700-4900 m.
Países: ARG(JUU).

Nototriche stipularis (Phil.) A. Martic.
Sin.: *Malvastrum stipulare* Phil.
Hierba. Nativa. 3200-4400 m.

- Países: CHL(TAR, ANT).
- Nototriche tucumana** Krapov.
Hierba. Endémica. 4100-4200 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
- Nototriche turritella** A.W. Hill
Hierba. Nativa. 3600-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR).
- Nototriche viridula** Krapov.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT).
- Pachira** Aubl.
- Pachira glabra** Pasq.
Árbol. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Palaua** Cav.
- Palaua concinna** (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Sida concinna* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT).
- Palaua dissecta** Benth.
Sin.: *Palaua flexuosa* Mast.
Hierba. Nativa. 100-400 m.
Países: CHL(TAR, ANT).
- Palaua inconspicua** I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: CHL(ANT).
- Palaua modesta** (Phil.) Reiche
Sin.: *Sida modesta* Phil.
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(ANT).
- Pavonia** Cav.
- Pavonia angustipetala** Krapov. & Cristóbal
Sin.: *Pavonia schrankii* Spreng. var. *angustifolia* R.E. Fr.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pavonia apiculata** R.E. Fr.
Sin.: *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. var. *apiculata* (R.E. Fr.) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(CON).
- Pavonia argentina** Gürke
Sin.: *Asterochlaena argentina* (Gürke) Stuck., *Lassa argentina* (Gürke) Kuntze, *Pavonia campestris* R.E. Fr.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY).
- Pavonia aspera** Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA).
- Pavonia aurelii** Fryxell
Arbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(AMA).
- Pavonia aurigloba** Krapov. & Cristóbal
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, MIS, SLU). BRA(RGS). URY(CLA, COL, MAL, MON, RIV, SJO, TAC).
- Pavonia balansae** Gürke
Sin.: *Asterochlaena balansae* (Gürke) Hassl., *Asterochlaena balansae* (Gürke) Hassl. f. *intermedia* Hassl., *Asterochlaena balansae* (Gürke) Hassl. f. *longipetiolata* Hassl., *Asterochlaena balansae* (Gürke) Hassl. subsp. *tenax* (Hassl.) Hassl., *Asterochlaena sidifolia* (Kunth) Hassl. f. *crenata* Hassl., *Pseudopavonia tenax* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON, PAI).
- Pavonia belophylla** Hochr.
Sin.: *Pavonia hastata* Cav. f. *belophylla* (Hochr.) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAN).
- Pavonia betonicifolia** C. Presl
Sin.: *Pavonia consobrina* N.E. Br., *Pavonia hastata* Cav. var. *consobrina* (N.E. Br.) Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, PHA). URY(CAS, CLA, MON, PAY, SJO, TAC).
- Pavonia biflora** Fryxell
Arbusto. Nativa. 200-300 m.
Países: BRA(PAR).
- Pavonia bullulata** Hochr. ex Chodat & Hassl.
Sin.: *Pavonia hastata* Cav. f. *bullulata* (Hochr. ex Chodat & Hassl.) Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(SCA). PRY(CAU, COA).
- Pavonia cancellata** (L.) Cav.
Sin.: *Hibiscus cancellatus* L., *Pavonia cancellata* (L.) Cav. var. *cordata* Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).
- Pavonia communis** A. St.-Hil.
Sin.: *Pavonia arechavaletana* Krapov. & Fryxell, *Pavonia ramosissima* (Arechav.) Fryxell & Krapov., *Pavonia sepium* A. St.-Hil. var. *ramosissima* Arechav., *Pavonia spinifex* (L.) Cav. subsp. *communis* (A.

St.-Hil.) Gürke, *Pavonia urticifolia* Arechav., hom. illeg.

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI). URY(RIV, TAC).

Pavonia commutata Garcke

Sin.: *Pavonia engleriana* Gürke, *Pavonia exserta* Krapov. & Cristóbal, *Pavonia gamophylla* Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia cryptica Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(COL).

Pavonia cymbalaria A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Pavonia hastata* Cav. f. *cymbalaria* (A. St.-Hil. & Naudin) Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI). URY(MAL, TYT).

Pavonia distinguenda A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Pavonia malmeana* R.E. Fr., *Pavonia pedersenii* Fryxell, *Pavonia urbaniana* Gürke, *Pavonia urbaniana* Gürke var. *macrantha* R.E. Fr., *Pavonia urbaniana* Gürke var. *tomentosa-velutina* Gürke

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, RIV, SJO).

Pavonia dusenii Krapov.

Subarbusto. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia eurychlamys Ulbr.

Arbusto. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Pavonia exasperata Grings & Boldrini

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Pavonia flavispina Miq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Pavonia formosa Fryxell

Arbusto o subarbusto. Nativa. 800-2500 m.

Países: ARG(SAL).

Pavonia friesii Krapov.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA, MON, TAC).

Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle

Sin.: *Pavonia typhalaea* (L.) Cav., *Sida fruticosa* Mill., *Urena typhalaea* L.

Arbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Pavonia glechomoides A. St.-Hil.

Sin.: *Lassa glechomoides* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Pavonia hirta* Spreng., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SJO, TAC).

Pavonia glutinosa Krapov. & Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, MIS). BRA(RGS). URY(SJO).

Pavonia gracilis R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: PRY(AMA).

Pavonia guerkeana R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia hassleriana Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, PAI).

Pavonia hastata Cav.

Sin.: *Greevesia cleisocalyx* F. Muell., *Lassa hastata* (Cav.) Kuntze, *Pavonia hastata* Cav. f. *brevifolia* Gürke, *Pavonia hastata* Cav. var. *pubescens* Gürke

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, TAC).

Pavonia hatschbachii Krapov.

Sin.: *Pavonia hoehnei* Baker f.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). URY(MON, SJO).

Pavonia hexaphylla (S. Moore) Krapov.

Sin.: *Pavonia mutisii* Kunth var. *hexaphylla* S. Moore

Subarbusto. Nativa. 100-800 m.

Países: PRY(AMA, CEN, COA).

Pavonia hieronymi Gürke

Sin.: *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. f. *angustiphylla* Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. subsp. *brevipila* Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. var. *grandiflora* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. var. *montana* Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. var. *pseudoapiculata* Hassl., *Asterochlaena morongii* (S. Moore) Hassl., *Lassa hieronymi* (Gürke) Kuntze, *Pavonia geminiflora* Moric. var. *grandiflora* Chodat & Hassl., *Pavonia hieronymi* Gürke subsp. *tomentella* R.E. Fr., *Pavonia morongii* S. Moore, *Pavonia sidifolia* Kunth f. *morongii* (S. Moore) Hassl.

Subarbusto. Nativa. 100-2800 m.
Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

Pavonia horrida Krapov.
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Pavonia immaculata R.E. Fr.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Pavonia kleinii Krapov. & Cristóbal
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia lanata R.E. Fr.
Subarbusto. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia laxifolia A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 200-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Pavonia mattogrossensis R.E. Fr.
Sin.: *Pavonia mattogrossensis* R.E. Fr.
var. *lobata* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Pavonia missionum Ekman
Arbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA).

Pavonia nana R.E. Fr.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(DUR, RIV, SAO, TAC).

Pavonia narcissi Krapov.
Sin.: *Pavonia communis* A. St.-Hil. var. *balansae* (Gürke) Hassl., *Pavonia sepium* A. St.-Hil. var. *balansae* Gürke

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE).
PRY(CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI).

Pavonia neei Fryxell
Sin.: *Asterochlaena morongii* (S. Moore)
Hassl. var. *intermedia* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(FOR). PRY(PHA).

Pavonia nemoralis A.St.-Hil. & Naudin
Arbusto a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia opulifolia S. Moore
Arbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR).
PRY(APY, CEN, COA).

Pavonia orientalis Krapov.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(LAV, MAL, ROC, SJO).

Pavonia pabstii Krapov. & Cristóbal
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(FOR). BRA(SCA).

Pavonia patuliloba Chodat & Hassl.
Sin.: *Pavonia subhastata* Triana & Planch. f. *patuliloba* (Hochr.) Hassl., *Pavonia subhastata* Triana & Planch. f. *quingueloba* Hassl., *Pavonia subhastata* Triana & Planch. subsp. *paludosa* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, SFE).
PRY(APY, CEN, CHO, CON, ÑEE, PHA).

Pavonia platyloba R.E. Fr.
Sin.: *Asterochlaena platyloba* (R.E. Fr.) Hassl., *Asterochlaena platyloba* (R.E. Fr.) Hassl. var. *grandiflora* Hassl., *Asterochlaena platyloba* (R.E. Fr.) Hassl. var. *hirsutula* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON).

Pavonia psilophylla Ekman
Sin.: *Pavonia hastata* Cav. var. *glabriuscula* Gürke
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Pavonia pulchra Hochr.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Pavonia ramboi Krapov. & Cristóbal
Arbusto. Endémica. 800.
Países: BRA(RGS).

Pavonia reitzii Krapov. & Cristóbal
Arbusto. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(SCA).

Pavonia renifolia Krapov.
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Pavonia restiaria Bertoni
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA).

Pavonia reticulata Garcke
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(TAC).

Pavonia revoluta Krapov. & Cristóbal
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LRI, SAL, SJU, SLU). URY(MON).

Pavonia rhodantha Hochr.
Sin.: *Pavonia rhodantha* Hochr. var. *discolor* Hassl., *Pavonia rhodantha* Hochr. var. *pusilla* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Pavonia rojasii Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Pavonia rosengurtii Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, ROC, SJO).

Pavonia rubra Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS).

Pavonia rupestris (Hassl.) Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Asterochlaena sidifolia* (Kunth) Hassl. var. *rupestris* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CEN, COA, PHA).

Pavonia sagittata A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia salmonea Grings & Boldrini

Arbusto o subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).

Pavonia sapucayensis Hassl.

Sin.: *Pavonia mattogrossensis* R.E. Fr. var. *minor* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR). PRY(GUA, PAI).

Pavonia schiedeana Steud.

Sin.: *Pavonia brachysepala* A. St.-Hil. & Naudin, *Pavonia nemoralis* A. St.-Hil. & Naudin
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, GUA).

Pavonia schininii Krapov. & Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Pavonia schrankii Spreng.

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia secreta Grings & Krapov.

Arbusto. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(RGS).

Pavonia sepium A. St.-Hil.

Sin.: *Hibiscus hexaphyllus* Larrañaga, *Lassa sepium* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Pavonia flava* Spring, *Pavonia malvacea* (Vell.) Krapov. & Cristóbal, *Pavonia sepium* A. St.-Hil. var. *silvatica* Arechav., *Sida malvacea* Vell.
Arbusto. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(FLO, FLA, MAL, MON, TYT).

Pavonia sidifolia Kunth

Sin.: *Asterochlaena sidifolia* (Kunth) Hassl., *Asterochlaena sidifolia* (Kunth) Hassl. subsp. *diuretica* (A. St.-Hil.) Hassl., *Asterochlaena sidifolia* (Kunth) Hassl. var. *paraguariensis* Hassl., *Pavonia diuretica* A. St.-Hil.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE).

Pavonia stenopetala Krapov.

Hierba. Endémica. 200-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia subrotunda A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Asterochlaena orbicularis* (Ulbr.) Hassl., *Asterochlaena orbicularis* (Ulbr.) Hassl. var. *decumbens* Hassl., *Asterochlaena orbicularis* (Ulbr.) Hassl.

var. *ekmanii* Hassl., *Pavonia orbicularis* Ulbr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CAA, CEN, ITA, SPE).

Pavonia vannii Fryxell

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, COA).

Pavonia vitifolia Hochr.

Arbusto. Nativa. 100-600 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CON, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

Pavonia xanthogloea Ekman

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(APA). URY(COL, TAC).

Peltaea (C. Presl) Standl.

Peltaea edouardii (Hochr.) Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Pavonia edouardii* (Hochr.) Krapov. & Cristóbal f. *fruticosa-erecta* Hochr. ex Chodat & Hassl., *Pavonia edouardii* Hochr.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CON, SPE).

Peltaea lasiantha Krapov. & Cristóbal

Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY.

Peltaea obsita (Mart. ex Colla) Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Pavonia sessiliflora* Kunth f. *ecostata* Hassl., *Pavonia sessiliflora* Kunth var. *acutifolia* Gürke, *Peltaea acutifolia* (Gürke) Krapov. & Cristóbal, *Sida obsita* Mart. ex Colla
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Peltaea polymorpha (A. St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Pavonia polymorpha* A. St.-Hil., *Pavonia speciosa* Kunth subsp. *polymorpha* (A. St.-Hil.) Gürke

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Peltaea speciosa (Kunth) Standl.

Sin.: *Pavonia speciosa* Kunth

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Pseudabutilon R.E. Fr.

Pseudabutilon aristulosum (K. Schum.) Krapov.

Sin.: *Abutilon aristulosum* K. Schum., *Wissadula aristulosa* (K. Schum.) Monteiro

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL). PRY(AMA).

Pseudabutilon balansae (Hassl.) H.A. Keller

Sin.: *Abutilon balansae* Hassl., *Wissadula balansae* Hassl., hom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CEN, GUA, PAI).

Pseudabutilon benense (Britton) Fryxell
Sin.: *Abutilon benense* (Britton) Baker f., *Sida benensis* Britton, *Wissadula balansae* Baker f.

Subarbusto. Nativa.

Países: PRY(AMA).

Pseudabutilon callimorphum (Hochr.) R.E. Fr. var. **callimorphum**

Sin.: *Sida callimorpha* Hochr., *Wissadula callimorpha* (Hochr.) Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL). PRY(APY, CON, PHA).

Pseudabutilon callimorphum (Hochr.) R.E. Fr. var. **intermedium** Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). PRY(PHA).

Pseudabutilon cinereum (Griseb.) Krapov.

Sin.: *Abutilon cinereum* Griseb., *Pseudabutilon longepilosum* R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE, SJU).

Pseudabutilon pedunculatum (R.E. Fr.) Krapov.

Sin.: *Pseudabutilon callimorphum* (Hochr.) R.E. Fr. var. *friesii* (Hassl.) R.E. Fr., *Pseudabutilon stuckertii* R.E. Fr., *Wissadula callimorpha* (Hochr.) Hassl. var. *friesii* Hassl., *Wissadula pedunculata* R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

Pseudabutilon virgatum (Cav.) Fryxell
Sin.: *Abutilon grevilleanum* (Hook. & Arn.) Walp., *Abutilon mendocinum* Phil., *Abutilon paranthemoides* Griseb., *Abutilon saltense* Hassl., *Abutilon virgatum* (Cav.) Sweet, *Abutilon virgatum* (Cav.) Sweet var. *tomentosum* K. Schum., *Sida grevilleana* Gillies ex Hook. & Arn., *Sida sessiliflora* Hook., *Sida virgata* Cav.

Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, PHA).

Pseudobombax Dugand

Pseudobombax argentinum (R.E. Fr.) A. Robyns

Sin.: *Bombax argentinum* R.E. Fr., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *apaense* Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *arboreum* Chodat & Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *argentinum* (R.E. Fr.) Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *fibrigii* Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *paraguayense* (R.E. Fr.) Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *rupestre* Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. var. *cuspidatum* Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. var. *intermedium* Hassl., *Bombax paraguayense* R.E. Fr.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, AMA, CON, COA, PAI).

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns

Sin.: *Bombax album* (Lodd.) Bakh., *Bombax cyathophorum* (Casar.) K. Schum., *Bombax grandiflorum* Cav., *Carolinea alba* Lodd., *Pachira commersonii* Planch. ex Decn., *Pachira cyathophora* Casar.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pseudobombax longiflorum (Mart.) A. Robyns

Sin.: *Bombax cyathophorum* (Casar.) K. Schum. var. *latifoliatum* Hassl., *Bombax cyathophorum* (Casar.) K. Schum. var.

longipes Hassl., *Bombax longiflorum* (Mart.) K. Schum., *Bombax longiflorum* (Mart.) K. Schum. f. *elegans* (R.E. Fr.) Hassl., *Bombax longiflorum* (Mart.) K. Schum. f. *multifoliatum* Hassk., *Carolinea longiflora* Mart., *Pachira longiflora* (Mart. & Zucc.) Decne., *Pachira macrantha* A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA).

Pseudobombax majus (A. Robyns) Carv.-Sobr.

Sin.: *Pseudobombax grandiflorum* (Cav.) A. Robyns var. *majus* A. Robyns

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) A. Robyns

Sin.: *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. subsp. *genuinum* Hassl., nom. Inval., *Pachira marginata* A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Pseudobombax tomentosum (Mart.) A. Robyns

Sin.: *Bombax martianum* K. Schum., *Bombax martianum* K. Schum. subsp. *guaraniticum* Hassl., *Carolinea tomentosa* Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CON, COA).

Rhynchosida Fryxell

Rhynchosida physocalyx (A. Gray) Fryxell

Sin.: *Physalastrum physocalyx* (A. Gray) Monteiro, *Sida hastata* A. St.-Hil., hom. illeg., *Sida hastata* A. St.-Hil., hom. illeg.

var. *glabriuscula* R.E. Fr., *Sida hastata* A. St.-Hil., hom. illeg. var. *tomentosa* R.E. Fr., *Sida inflata* Larrañaga, *Sida physocalyx* A. Gray

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CON, PHA). URY(COL, DUR, MAL, PAY, SOR).

Sida L.

Sida adrianopolitana Krapov.

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Sida albiflora (Chodat & Hassl.) Krapov.

Sin.: *Sida anomala* A. St.-Hil. f. *albiflora* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA, PAI).

Sida ambatense Krapov.

Subarbusto. Nativa. 900-1200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Sida anomala A. St.-Hil.

Sin.: *Sida ciliaris* L. f. *rubra* Kuntze, *Sida ciliaris* L. var. *anomala* (A. St.-Hil.) K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PHA, SPE). URY(PAY).

Sida argentina K. Schum. var. **argentina**

Sin.: *Sida lilloana* Rodrigo

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(PAI).

Sida argentina K. Schum. var. **tucumanensis** Hassl. ex Rodrigo

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

Sida ascendens A. St.-Hil.

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

Sida bordasiana Krapov.

Arbusto. Endémica.

Países: PRY(APY).

Sida cabreriana Krapov.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Sida calchaquiensis Rodrigo

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(LRI, SAL, SJU, TUC).

Sida caudata A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Sida margaritensis* Hassl., *Sida melanocaulon* Hassl., *Sida tomentella* Miq.

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, COA, GUA).

Sida centuriata Clement

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CAU, CON).

Sida cerradoensis Krapov.

Sin.: *Sida elata* (Hassl.) Hassl., *Sida potentilloides* A. St.-Hil. subsp. *elata* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, SPE).

Sida charpinii Krapov.

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: PRY(APY).

Sida ciliaris L.

Hierba. Nativa.

Países: PRY(APY).

Sida confusa Hassl.

Sin.: *Sida argentina* K. Schum. var. *paraguayensis* Ulbr., *Sida krapovickasii* H.A. Keller, *Sida martiana* A. St.-Hil. f. *latifolia* Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CON).

Sida cordifolia L.

Sin.: *Malvastrum cordifolium* Rojas Acosta, *Sida althaeifolia* Sw., *Sida cordifolia* L. var. *breviaristata* Monteiro, *Sida rotundifolia* Lam. ex Cav.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(PAY, SAO, SJO).

Sida cristobaliana Krapov.

Hierba. Nativa.

Países: PRY(APY, PHA).

Sida dictyocarpa Griseb. ex K. Schum.

Subarbusto. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, PHA). URY(CAS, RIV).

Sida dubia A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Sida multicrena* Hochr., *Sida multicrena* Hochr. var. *longearistata* (Hassl.) Hochr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(CEN). URY(SAO, SJO, TAC).

Sida dureana Krapov.

Hierba. Nativa.

Países: PRY(APY, AMA, CON).

Sida emilei Hochr.Sin.: *Sida chacoensis* Hassl., nom. nud.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: PRY(APY, CEN, CON, PAI).

Sida esperanzae R.E. Fr.

Sin.: *Sida dictyocarpa* Griseb. ex K. Schum. var. *esperanzae* (R.E. Fr.) Rodrigo, *Sida glutinosa* Cav. var. *longearistata* Monteiro

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

Sida farroupilhensis Krapov.

Hierba. Endémica. 800-800 m.

Países: BRA(RGS).

Sida ferrucciana Krapov.

Hierba. Nativa.

Países: PRY(AMA, CAU, CON, GUA, PAI, SPE).

Sida glaziovii K. Schum.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Sida glomerata Cav.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, COA, PAI, SPE).

Sida gracillima Hassl.

Hierba. Endémica. 200.

Países: PRY(CON).

Sida hassleri Hochr.

Sin.: *Sida fiebrigii* Ulbr., *Sida hassleri* Hochr. var. *brevis* Hochr., *Sida linifolia* Juss. ex Cav. var. *brevis* (Hochr.) Clement, *Sida linifolia* Juss. ex Cav. var. *hassleri* (Hochr.) Hassl.

Subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(AMA, CAA, CAN, CON).

Sida hatschbachii Krapov.

Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Sida honoriana Krapov.

Subarbusto. Nativa. 100-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Sida ignaciana Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Sida jussiaeana DC.

Sin.: *Anoda decumbens* (A. St.-Hil. & Naudin) Hochr., *Physalastrum stoloniferum* (Salzm. ex Turcz.) Monteiro, *Sida decumbens* A. St.-Hil. & Naudin, *Sida stolonifera* Salzm. ex Turcz.

Hierba. Nativa. 300-600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Sida kelleri Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

Sida kranzii Krapov. & R.M. Bueno

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Sida lilianae Krapov.

Subarbusto. Nativa.

Países: ARG(MIS).

Sida linearifolia A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Sida linifolia Juss. ex Cav.

Sin.: *Sida linifolia* Juss. ex Cav. var. *flaviflora* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Sida lonchitis A. St.-Hil. & Naudin
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sida loreтана Krapov.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Sida monteiroi Krapov.
Sin.: *Sida ciliaris* L. f. *flava* Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, CON, PAI, PHA).

Sida nemorensis Mart. ex Colla
Sin.: *Sida tomentella* Miq. var. *brevicalyx* K. Schum.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA).

Sida palustris Krapov.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Sida paradoxa Rodrigo
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS).

Sida parva Krapov.
Hierba. Endémica. 1200-1300 m.
Países: BRA(SCA).

Sida pedersenii Krapov.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY).

Sida pindapoyensis Krapov.
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(MIS).

Sida planicaulis Cav.
Sin.: *Malvinda carpinifolia* Medik., *Sida acuta* Burm. f. var. *carpinifolia* (Medik.) K. Schum., *Sida carpinifolia* L. f., hom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sida poeppigiana (K. Schum.) Fryxell
Sin.: *Sida rhombifolia* L. var. *poeppigiana* K. Schum.
Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC).

Sida potentilloides A. St.-Hil.
Sin.: *Sida anarthra* Ekman, *Sida cordifolia* L. var. *potentilloides* (A. St.-Hil.) Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, PAI). URY(CLA).

Sida pseudocymbalaria (Hassl.) Hassl.
Sin.: *Sida pseudocymbalaria* (Hassl.) Hassl. var. *parviflora* Hassl., *Sida rubifolia* A. St.-Hil. subsp. *pseudocymbalaria* Hassl.
Hierba. Endémica. 100-400 m.
Países: PRY(CON, COA).

Sida pseudopotentilloides Monteiro var. **manresana** Leite & Monteiro
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Sida ramoniana Krapov.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Sida regnellii R.E. Fr.
Sin.: *Sida cordifolia* L. f. *regnellii* (R.E. Fr.) Hassl., *Sida multicrena* Hochr. var. *regnellii* (R.E. Fr.) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(ITA, PAI).

Sida reitzii Krapov.
Subarbusto. Endémica. 300-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Sida rhizomatosa Krapov.
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(MIS).

Sida rhombifolia L.
Sin.: *Sida rhombifolia* L. var. *canariensis* (Willd.) Griseb., *Sida rhombifolia* L. var. *rhomboidea* (Roxb.) Mast., *Sida rhomboidea* Roxb., *Sida subrhombiformis* Larrañaga
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, IPA). PRY(APY, BOQ, CON, COA, ÑEE, PHA). URY(MON, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).
Notas: En Chile es Introducida

Sida riedelii K. Schum.
Sin.: *Sida spinosa* L. var. *riedelii* (K. Schum.) Rodrigo
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE). BRA(RGS). PRY(APY, GUA, PHA).

Sida rodrigo Monteiro
Arbusto. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Sida rubifolia A. St.-Hil.
Sin.: *Sida pseudorubifolia* Krapov. & R.M. Bueno
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Sida rufescens A. St.-Hil.
Sin.: *Sida urens* L. f. *warmingiana* Monteiro, *Sida urens* L. var. *aurea* Hassl.,

Sida urens L. var. *rufescens* (A. St.-Hil.) Baker f.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CON, PAI, SPE).

***Sida rupicola* Hassl.**

Sin.: *Sida rupicola* Hassl. var. *grandiflora* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, COA, PAI, PHA).

***Sida santarensis* Monteiro**

Sin.: *Sida rhombifolia* L. var. *subtomentosa* K. Schum., *Sida santarensis* Monteiro var. *krapovickasiana* Monteiro

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

***Sida saraviae* Krapov.**

Arbusto. Nativa. 800-2000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

***Sida schumanniana* Krapov.**

Sin.: *Sida urens* L. var. *grandiflora* K. Schum.

Subarbusto. Nativa. 200-800 m.

Países: ARG(SAL). PRY(AMA).

***Sida setosa* Mart. ex Colla**

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

***Sida spinosa* L.**

Sin.: *Sida angustifolia* Lam., hom. illeg., *Sida escobilla* Larrañaga, *Sida spinosa* L. var. *angustifolia* (Lam.) Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

BRA(PAR, RGS). CHL(AYP, IPA). PRY(APY, COA, GUA, PHA). URY(CAS, MON).

Notas: Introducida en Chile

***Sida tapiraguensis* Krapov.**

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, SPE).

***Sida tressensiae* Krapov.**

Hierba. Endémica.

Países: ARG(COS).

***Sida tuberculata* R.E. Fr. var. *pseudorhombifolia* Monteiro**

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA). URY(SAO).

Sida tuberculata* R.E. Fr. var. *tuberculata

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(PHA).

***Sida urens* L.**

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

***Sida variegata* (Griseb.) Krapov.**

Sin.: *Sida cordifolia* L. var. *variegata* Griseb., *Sida montana* K. Schum., hom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA). URY(SJO).

***Sida vespertina* Ekman**

Sin.: *Sida multicrena* Hochr. var. *vespertina* (Ekman) Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(ITA).

***Sida viarum* A. St.-Hil.**

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

***Sidastrum* Baker f.**

***Sidastrum micranthum* (A. St.-Hil.) Fryxell**

Sin.: *Sida micrantha* A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR).

***Sidastrum multiflorum* (Jacq.) Fryxell**

Sin.: *Sida acuminata* DC., *Sida acuminata* DC. var. *grandiflora* Hassl., *Sida acuminata* DC. var. *rojasii* (Hassl.) Hassl., *Sida candolleana* Monteiro, *Sida multiflora* Jacq., *Sida paniculata* L. var. *compacta* Baker f., *Sida rojasii* Hassl., *Sidastrum acuminatum* (DC.) Fryxell

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR). PRY(APY, PHA).

***Sidastrum paniculatum* (L.) Fryxell**

Sin.: *Sida paniculata* L.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, BOQ, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

***Sphaeralcea* A. St.-Hil.**

Sphaeralcea australis Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA, RNE).

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb.

Sin.: *Malva bonariensis* Cav., *Malva incana* Godr., hom. illeg., *Malvastrum incanum* (Godr.) Thell., *Sphaeralcea cisplatina* A. St.-Hil., *Sphaeralcea cisplatina* A. St.-Hil. var. *quercifolia* A. St.-Hil., *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *cisplatina* (A. St.-Hil.) K. Schum., *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *rhombifolia* (Griseb.) K. Schum., *Sphaeralcea rhombifolia* Griseb., *Sphaeroma bonariense* (Cav.) Kuntze, *Sphaeroma bonariense* (Cav.) Kuntze var. *cisplatinum* (A. St.-Hil.) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, PHA). URY(COL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Sphaeralcea brevipes (Phil.) Krapov.

Sin.: *Malva brevipes* Phil., *Malva violacea* Phil., *Malvastrum violaceum* (Phil.) Hieron., *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *violacea* (Phil.) Ulbr.

Subarbusto. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).

Sphaeralcea chenopodifolia Rodrigo

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE).

Sphaeralcea cordobensis Krapov.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(COR, SDE, SLU).

Sphaeralcea crispa Hook. & Baker f.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SLU).

Sphaeralcea decipiens (A. St.-Hil. & Naudin) Krapov.

Sin.: *Malvastrum decipiens* (A. St.-Hil. & Naudin) K. Schum., *Malvastrum nudum* K. Schum., *Sida decipiens* A. St.-Hil. & Naudin

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(CAS, MON).

Sphaeralcea laciniata (K. Schum.) Krapov.

Sin.: *Sphaeralcea bonariensis* (Cav.) Griseb. var. *laciniata* K. Schum.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, SLU, SFE, SDE, TUC).

Sphaeralcea mendocina Phil.

Sin.: *Malva patagonica* Niederl., *Malvastrum wilczekii* Hochr., *Malvastrum wilczekii* Hochr. var. *macrocarpum* Hochr., *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *mendocina* (Phil.) K. Schum., *Sphaeralcea patagonica* (Niederl.) Speg., *Sphaeralcea patagonica* (Niederl.) Speg. var. *argentea* Speg., *Sphaeralcea patagonica* (Niederl.) Speg. var. *cinerascens* Speg., *Sphaeralcea patagonica* (Niederl.) Speg. var. *oxyodonta* Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).

Sphaeralcea miniata (Cav.) Spach

Sin.: *Malva erodiifolia* C. Presl, *Malva gilliesii* Phil., hom. illeg., *Malva mendocina* Phil., *Malva miniata* Cav., *Malvastrum erodiifolium* (C. Presl) Reiche, *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *schickendantzii* Ulbr., *Sphaeroma bonariense* (Cav.) Kuntze var. *miniatum* (Cav.) Kuntze, *Sphaeroma miniatum* (Cav.) Garcke

Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, RNE, SDE, SJU, SLU, TUC).

Sphaeralcea obtusiloba (Hook.) G. Don

Sin.: *Malva asterocarpa* Steud., *Malva berteroniana* Steud., *Malva obtusiloba* Hook., *Sphaeralcea arenaria* Phil., *Sphaeralcea berteroniana* Phil., *Sphaeralcea circinata* Phil., *Sphaeralcea collina* Phil., *Sphaeralcea coquimbana* Phil., *Sphaeralcea floribunda* Phil., *Sphaeralcea gayana* Phil., *Sphaeralcea rupestris* Phil., *Sphaeralcea valparadisea* Phil., *Sphaeralcea vidalii* Phil., *Sphaeroma berteroniana* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma collinum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma coquimbarum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma gayanum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma obtusilobum* (Gay) Kuntze, *Sphaeroma rupestre* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma valparadiseum* (Phil.) Kuntze

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, ARA, RME).

Sphaeralcea philippiana Krapov.

Sin.: *Malva prostrata* Phil., hom. illeg., *Malvastrum prostratum* Hieron.

Hierba. Endémica. 2000-3400 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Sphaeralcea purpurata (Lindl.) Krapov.

Sin.: *Malva belloa* Gay, *Malva campanulata* Paxton, *Malva laeta* Phil., *Malva macropoda* Steud., *Malva polyantha* Steud., *Malva purpurata* Lindl., *Malva purpurea* Gay, *Malva tenuifolia* Hook. & Arn., nom. illeg., *Malvastrum campanulatum* (Paxton) G. Nicholson, *Malvastrum tenuifolium* (Hook. & Arn.) Baker f.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(BAI). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA).

Sphaeralcea tehuelches (Speg.) Krapov.
 Sin.: *Lecanophora tehuelches* (Speg.)
 Speg., *Plarodrigoa tehuelches* (Speg.)
 Looser, *Sida tehuelches* Speg.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHU, SCR).

Spirotheca Ulbr.

Spirotheca rivieri (Decne.) Ulbr. var.
passifloroides (Cuatrec.) P.E. Gibbs &
 W.S. Alverson
 Sin.: *Spirotheca passifloroides* Cuatrec.
 Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Spirotheca rivieri (Decne.) Ulbr. var.
rivieri
 Sin.: *Ceiba rivieri* (Decne.) K. Schum.,
Eriodendron rivieri Decne., *Xylon rivieri*
 (Decne.) Kuntze
 Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(SCA).

Sterculia L.

Sterculia striata A. St.-Hil. & Naudin
 Árbol. Nativa. 100-500 m.
 Países: PRY(APY, AMA, CEN, CON,
 COA).

Talipariti Fryxell

Talipariti pernambucense (Arruda)
 Bovini
 Sin.: *Hibiscus pernambucensis* Arruda,
Hibiscus tiliaceus L. subsp.
pernambucensis (Arruda) A. Cast.,
Hibiscus tiliaceus L. var. *pernambucensis*
 (Arruda) I.M. Johnst., *Talipariti tiliaceum*
 (L.) Fryxell var. *pernambucense* (Arruda)
 Fryxell

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tarasa Phil.

Tarasa alberti Phil.
 Sin.: *Malvastrum albertii* (Phil.) Reiche,
Malvastrum corymbosum Sandwith
 Subarbusto. Endémica. 500-2100 m.
 Países: ARG(MEN, NEU).

Tarasa antofagastana (Phil.) Krapov.
 Sin.: *Malva antofagastana* Phil.,
Malvastrum antofagastanum (Phil.) Baker
 f., *Malveopsis antofagastana* (Phil.)
 Kuntze, *Malveopsis geranioides* (Cham. &
 Schltdl.) Kuntze var. *galanderi* Kuntze,
Malveopsis geranioides (Cham. & Schltdl.)
 Kuntze var. *subsessilis* Kuntze
 Hierba. Nativa. 1500-3600 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
 MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ANT,
 ATA).

Tarasa capitata (Cav.) D.M. Bates
 Sin.: *Malva capitata* Cav., *Malvastrum*
capitatum (Cav.) Griseb., *Malvastrum*
jorgensenii I.M. Johnst., *Malveopsis*
capitatum (Cav.) Kuntze, *Tarasa*
jorgensenii (I.M. Johnst.) Krapov.
 Arbusto. Nativa. 1000-2500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
 TUC).

Tarasa congestiflora (I.M. Johnst.)
 Krapov.
 Sin.: *Malvastrum congestiflorum* I.M.
 Johnst.
 Hierba. Nativa. 2000-3800 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Tarasa heterophylla (Griseb.) Krapov.
 Sin.: *Malvastrum bolivianum* Baker f.,
Malvastrum heterophyllum Griseb.,
Malveopsis heterophylla (Griseb.) Kuntze,

Sphaeralcea heterophylla (Griseb.) Baker
 f.
 Hierba. Nativa. 1800-3400 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Tarasa humilis (Gillies ex Hook. & Arn.)
 Krapov.
 Sin.: *Malva humilis* Gillies ex Hook. &
 Arn., *Malva subacaulis* Phil., hom. illeg.,
Malvastrum humile (Gillies ex Hook. &
 Arn.) A. Gray, *Malvastrum humile* (Gillies
 ex Hook. & Arn.) A. Gray var. *subacaulis*
 (Phil.) Reiche, *Malvastrum subacaulis*
 Baker f.
 Hierba. Endémica. 900-3300 m.
 Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
 CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Tarasa latearistata Krapov.
 Hierba. Nativa. 3500.
 Países: ARG(JUJ).

Tarasa martiniana Krapov.
 Hierba. Endémica. 3000-3100 m.
 Países: CHL(ANT).

Tarasa meyeri Krapov.
 Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
 Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Tarasa odonellii Krapov.
 Hierba. Nativa. 2600-3800 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Tarasa operculata (Cav.) Krapov.
 Sin.: *Malva operculata* Cav., *Malva*
plumosa C. Presl, *Malvastrum*
operculatum (Cav.) Hochr., *Malvastrum*
plumosum (C. Presl) A. Gray, *Malvastrum*
plumosum (C. Presl) A. Gray var.
atacamense Baker f., *Tarasa plumosa*
 (Cav.) Kearney, *Tarasa rahmeri* Phil.,
Tarasa rahmeri Phil. var. *atacamensis*
 (Baker f.) Bruns
 Subarbusto. Nativa. 1500-3800 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Tarasa pediculata Krapov.
Hierba. Endémica. 1800-3700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Tarasa reichei (Phil.) Krapov.
Sin.: *Malva reichei* Phil., *Sida reichei* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Tarasa tarapacana (Phil.) Krapov.
Sin.: *Malva tarapacana* Phil., *Malvastrum tarapacana* (Phil.) Baker f.
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SJU).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Tarasa tenella (Cav.) Krapov.
Sin.: *Malva tenella* Cav., *Malvastrum micranthum* Rusby, hom. illeg., *Malvastrum multicaule* Britton, *Malvastrum pygmaeum* Griseb., hom. illeg., *Malvastrum tenellum* (Cav.) Hieron.
Hierba. Nativa. 2500-3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Tarasa trisecta (Griseb.) Krapov.
Sin.: *Malvastrum peruvianum* (L.) A. Gray var. *trisectum* Griseb.
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Tarasa umbellata Krapov.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(VAL, MAU).

Tarasa urbaniana (Ulbr.) Krapov.
Sin.: *Malvastrum urbanianum* Ulbr.
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(TUC).

Thespesia Sol. ex Corrêa

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa
Sin.: *Hibiscus populneus* L.
Árbol. Nativa.
Países: CHL(IPA).

Triumfetta L.

Triumfetta bogotensis DC.
Sin.: *Triumfetta pilosa* Kunth, hom. illeg., *Triumfetta sepium* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CEN, GUA).

Triumfetta guaranítica Villa
Arbusto. Nativa. 600-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Triumfetta rhomboidea Jacq.
Sin.: *Triumfetta bartramia* L.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, SPE).

Triumfetta semitriloba Jacq.
Sin.: *Triumfetta abutiloides* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess., *Triumfetta obscura* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess., *Triumfetta tricuspidis* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 100-3100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(IPA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI).

Tropidococcus Krapov.

Tropidococcus pinnatipartitus (A. St.-Hil. & Naudin) Krapov.
Sin.: *Malva pinnatipartita* A. St.-Hil. & Naudin

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Urena L.

Urena lobata L.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA).

Urocarpidium Ulbr.

Urocarpidium albiflorum Ulbr.
Hierba. Nativa. 2600.
Países: CHL(AYP).

Waltheria L.

Waltheria albicans Turcz.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL, SDE). PRY(APY, AMA, PHA).

Waltheria carmensarae J. G. Saunders
Subarbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(COS). PRY(ITA, ÑEE).

Waltheria carpinifolia A. St.-Hil. & Naudin
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Waltheria communis A. St.-Hil.
Sin.: *Waltheria douradinha* A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV).

Waltheria indica L.

Sin.: *Waltheria americana* L., *Waltheria americana* L. var. *indica* (L.) K. Schum.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, IPA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Waltheria macrophylla Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU).

Waltheria operculata Rose

Sin.: *Waltheria excelsa* Turcz. var. *hirsuta* Hassl., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: PRY(APY, CON).

Waltheria ovata Cav.

Arbusto. Nativa. 0-400 m.

Países: CHL(TAR).

Waltheria procumbens J. G. Saunders & Soria

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(AMA).

Waltheria viscosissima A. St.-Hil.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Wissadula Medik.**Wissadula contracta** (Link) R.E. Fr.

Sin.: *Sida contracta* Link

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Wissadula decora S. Moore

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). PRY(PHA).

Wissadula densiflora R.E. Fr. var. **densiflora**

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Wissadula densiflora R.E. Fr. var. **schulzii** R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA).

Wissadula excelsior (Cav.) C. Presl

Sin.: *Abutilon patens* A. St.-Hil., *Sida excelsior* Cav., *Wissadula patens* (A. St.-Hil.) Garcke

Arbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

Wissadula glechomifolia (A. St.-Hil.) R.E. Fr.

Sin.: *Abutilon glechomifolium* A. St.-Hil., *Sida glechomifolia* (A. St.-Hil.) D. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, PAY).

Wissadula gymnanthemum (Griseb.) K. Schum.

Sin.: *Abutilon gymnanthemum* Griseb., *Wissadula conjungens* R.E. Fr., *Wissadula gymnanthemum* (Griseb.) K. Schum. var. *subtomentosa* R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Wissadula hernandioides (L'Hér.) Garcke

Sin.: *Abutilon amplissimum* (L.) Kuntze var. *subpeltatum* Kuntze, *Sida hernandioides* L'Hér., *Wissadula periplocifolia* (L.) C. Presl ex Griseb. f. *cordata* Chodat & Hassl., *Wissadula periplocifolia* (L.) C. Presl ex Thwaites f.

suborbiculata Chodat & Hassl., *Wissadula subpeltata* (Kuntze) R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Wissadula indivisa R.E. Fr.

Arbusto. Nativa.

Países: PRY(CON).

Wissadula krapovickasiana Bovini

Subarbusto. Nativa.

Países: PRY(APY, CON, COA).

Wissadula macrantha R.E. Fr. var. **brevipedunculata** R.E. Fr.

Sin.: *Wissadula grandifolia* Baker f. var. *brevipedunculata* (R.E. Fr.) Shinnars

Arbusto. Endémica. 100-300 m.

Países: PRY(PAI).

Wissadula macrantha R.E. Fr. var. **macrantha**

Sin.: *Wissadula grandifolia* Baker f. var. *macrantha* (R.E. Fr.) Shinnars

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON, PHA).

Wissadula paraguariensis Chodat

Sin.: *Wissadula oligomera* Chodat, *Wissadula periplocifolia* C. Presl f. *transiens* Hassl., *Wissadula periplocifolia* C. Presl var. *genuina* Hochr., *Wissadula periplocifolia* Griseb. f. *parvifolia* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA).

Wissadula parviflora (A. St.-Hil.) R.E. Fr.

Sin.: *Abutilon parviflorum* A. St.-Hil., *Abutilon parviflorum* A. St.-Hil. var. *luteum* A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Wissadula periplocifolia (L.) C. Presl ex Thwaites
Sin.: *Sida periplocifolia* L.
Subarbusto. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Wissadula setifera Krapov.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(APY).

Wissadula tucumanensis R.E. Fr.
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC).

Wissadula wissadifolia (Griseb.) Krapov.
Sin.: *Abutilon wissadifolium* Griseb.,
Wissadula grisebachii R.E. Fr.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

MARANTACEAE

Ctenanthe Eichler

Ctenanthe capusoides Petersen
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ctenanthe compressa (A. Dietr.) Eichler
Sin.: *Maranta compressa* A. Dietr.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ctenanthe glabra (Körn.) Eichler
Sin.: *Maranta glabra* Körn.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ctenanthe lanceolata Petersen
Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ctenanthe lubbersiana (E. Morren) Eichler ex Petersen
Sin.: *Stromanthe lubbersiana* E. Morren
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ctenanthe luschnathiana (Regel & Körn.) Eichler
Sin.: *Maranta luschnathiana* Regel & Körn.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ctenanthe marantifolia (Vell.) J.M.A. Braga & H. Gomes
Sin.: *Thalia marantifolia* Vell.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ctenanthe muelleri Petersen
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA).

Ctenanthe oppenheimiana (E. Morren) K. Schum.
Sin.: *Calathea oppenheimiana* E. Morren
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ctenanthe setosa (Roscoe) Eichler
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Goeppertia Ness

Goeppertia aemula (Körn.) Borchs. & S. Suárez
Sin.: *Calathea aemula* Körn.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Goeppertia cylindrica (Roscoe) Borchs. & S. Suárez
Sin.: *Phrynium cylindricum* Roscoe
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Goeppertia eichleri (Petersen) Borchs. & S. Suárez
Sin.: *Calathea eichleri* Petersen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Goeppertia flavescens (Lindl.) Borchs. & S. Suárez
Sin.: *Calathea flavescens* Lindl., *Calathea grandiflora* (Roscoe) K.Schum., *Phrynium grandiflorum* Roscoe
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Goeppertia joffilyana (J.M.A. Braga) Borchs. & S. Suárez
Sin.: *Calathea joffilyana* J.M.A. Braga
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Goeppertia longibracteata (Sweet) Borchs. & S. Suárez
Sin.: *Calathea longibracteata* (Sweet) Lindl., *Phrynium longibracteatum* Sweet
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Goeppertia monophylla (Vell.) Borchs. & S. Suárez
Sin.: *Calathea communis* Wand. & S. Vieira, *Calathea monophylla* (Vell.) Körn., *Maranta monophylla* Vell.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Goeppertia prolifera (Vell.) Borchs. & S. Suárez
Sin.: *Maranta prolifera* Vell.
Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Goeppertia sellowii (Körn.) Borchs. & S.

Suárez

Sin.: *Calathea sellowii* Körn.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Goeppertia zebrina (Sims) Nees

Sin.: *Calathea zebrina* (Sims) Lindl.,

Maranta zebrina Sims

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Ischnosiphon Körn.

Ischnosiphon ovatus Körn.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maranta L.

Maranta arundinacea L.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maranta divaricata Roscoe

Sin.: *Maranta arundinacea* L. var. *divaricata* (Roscoe) Hauman, *Maranta purpurascens* Link ex A. Dietr.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, PAI, SPE).

Maranta sobolifera L.Andersson

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

Saranthe (Regel & Körn.) Eichler

Saranthe eichleri Petersen

Sin.: *Ctenanthe casupoides* Petersen var.

subtropicalis Hauman

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, CAN).

Saranthe leptostachya (Regel & Körn.)

Eichler

Sin.: *Maranta leptostachya* Regel & Körn.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Saranthe ustulata Petersen

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

Stromanthe Sond.

Stromanthe boliviana K. Schum.

Hierba. Nativa. 300-1400 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Stromanthe glabra Yosh.-Arns

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stromanthe papillosa Petersen

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stromanthe thalia (Vell.) J.M.A. Braga

Sin.: *Heliconia thalia* Vell.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler

Sin.: *Maranta tonckat* Aubl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Thalia L.

Thalia geniculata L.

Sin.: *Maranta geniculata* (L.) Lam., *Thalia geniculata* L. var. *pubescens* Körn., *Thalia trichocalyx* Gagnep.

Hierba palustre. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CHO, CON, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, RIV, SAO, SOR).

Thalia multiflora Horkel ex Körn.

Sin.: *Calathea macrostachya* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, ROC, SAO, TYT).

MARCGRAVIACEAE

Marcgravia L.

Marcgravia polyantha Delpino

Liana. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Norantea Aubl.

Norantea goyasensis Cambess.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Norantea guianensis Aubl. subsp. **guianensis**

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Norantea guianensis Aubl. subsp. **japurensis** (Mart.) Bedell

Sin.: *Norantea japurensis* Mart.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Países: ARG(BAI, MIS, TUC). BRA(PAR, SCA).

Schwartzia Vell.

Schwartzia brasiliensis (Choisy) Bedell
ex Giraldo-Cañas

Sin.: *Norantea brasiliensis* Choisy
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

MARTYNIACEAE

Craniolaria L.

Craniolaria integrifolia Cham.
Sin.: *Craniolaria argentina* Speg.,
Craniolaria integrifolia Cham. f. *longiflora*
Chodat & Hassl., *Martynia integrifolia*
(Cham.) Steud.
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(CAT, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, PAI, PHA). URY(RNO).

Ibicella (Stapf) Van Eselt.

Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt.
Sin.: *Martynia lutea* Lindl., *Martynia montevidensis* Cham., *Proboscidea lutea*
(Lindl.) Stapf
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA). URY(ART, MON, SJO).

Ibicella parodii Abbiatti
Hierba. Nativa. 0-1500 m.

MAYACACEAE

Mayaca Aubl.

Mayaca fluviatilis Aubl.
Sin.: *Mayaca aubletii* Michx., *Mayaca caroliniana* Gand., *Mayaca vandellii*
Schott & Endl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CON, GUA, MIE, ÑEE, PAI).

Notas: Citado para Uruguay (Lourteig, 1965; Klein, 1976) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Mayaca kunthii Seub.

Sin.: *Mayaca fluviatilis* Aubl. f. *kunthii*
(Seub.) Lourteig
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Mayaca sellowiana Kunth

Sin.: *Mayaca boliviana* Rusby
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

MAZACEAE

Mazus Lour.

Mazus japonicus (Thunb.) Kuntze
Sin.: *Lindernia japonica* Thunb.
Hierba. Introducida. 0-500 m.

Mazus pumilus (Burm. f.) Steenis
Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

MELASTOMATACEAE

Aciotis D. Don

Aciotis paludosa (Mart. ex DC.) Triana
Sin.: *Rhexia herbacea* Raddi, *Spennera paludosa* Mart. ex DC.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Acisanthera P. Browne

Acisanthera alata Cogn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Acisanthera alsinifolia (DC.) Triana
Sin.: *Acisanthera alsinifolia* (DC.) Triana
var. *glazioviana* Cogn., *Acisanthera alsinifolia* (DC.) Triana var. *parvifolia*
Cogn., *Microlicia alsinifolia* DC., *Uranthera alsinifolia* (DC.) Naudin
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Acisanthera paraguayensis (Hook. f.) Cogn.
Sin.: *Cambessedesia paraguayensis*
Hook. f.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, PAI).

Acisanthera uniflora (Vahl) GleasonSin.: *Rhexia uniflora* Vahl

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Acisanthera variabilis (DC.) TrianaSin.: *Microlicia variabilis* DC., *Uranthera variabilis* (DC.) Naudin

Subarbusto. Nativa. 800-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bertolonia Raddi, nom. cons.**Bertolonia acuminata** GardnerSin.: *Bertolonia raulinoi* Brade

Subarbusto. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bertolonia leuzeana (Bonpl.) DC.Sin.: *Rhexia leuzeana* Bonpl.

Arbusto. Nativa. 1000-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Bertolonia margaritacea NaudinSin.: *Bertolonia ulaei* Cogn., *Salpinga margaritacea* (Naudin) Triana

Subarbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bertolonia mosenii Cogn.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bertolonia paranensis (Wurdack)

Baumgratz

Sin.: *Bertolonia acuminata* Gardner subsp. *paranensis* Wurdack

Subarbusto. Nativa. 100-700 m.

Países: BRA(PAR).

Brachyotum (A. DC.) Triana**Brachyotum microdon** (Naudin) TrianaSin.: *Chaetogastra microdon* Naudin

Arbusto. Nativa. 1500-4000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Cambessedesia DC., nom. cons.**Cambessedesia espora** (A. St.-Hil. ex Bonpl.) DC. subsp. **espora**Sin.: *Rhexia espora* A. St.-Hil. ex Bonpl.

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cambessedesia espora DC. subsp.**ilicifolia** (Schrank & Mart. ex DC.) A.B. MartinsSin.: *Cambessedesia espora* DC. var. *ilicifolia* Schrank & Mart. ex DC.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cambessedesia hilariana (Kunth) DC.Sin.: *Rhexia hilariana* Kunth

Subarbusto. Nativa. 800.

Países: BRA(PAR).

Chaetogastra DC.**Chaetogastra brachyphylla** (Gleason)

P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Chaetogastra montana* P.J.F. Guim. & Michelangeli, *Tibouchina alpestris* Cogn., *Tibouchina brachyphylla* Gleason

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Chaetogastra cisplatensis (Cogn.)

P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina cisplatensis* Cogn.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Notas: Citada para Uruguay (Souza, 1988) sin indicar localidad o material de referencia.

Chaetogastra clinopodifolia DC.Sin.: *Micranthella clinopodifolia* (DC.)Naudin, *Pleroma clinopodifolium* (DC.)Triana, *Tibouchina clinopodifolia* (DC.)Cogn., *Tibouchina clinopodifolia* (DC.)Cogn. var. *rukikiana* Cham.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chaetogastra cogniauxiana F.S. Mey. & R. Goldenb.Sin.: *Tibouchina gracilis* Cogn. var.*gracillima* Cogn., *Tibouchina gracilis*Cogn. var. *longisetosa* Cogn.

Subarbusto. Nativa. 800-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chaetogastra cordeiroi F.S. Mey. & R. Goldenb.

Subarbusto. Endémica. 800-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chaetogastra crassifolia F.S. Mey. & R. Goldenb.

Subarbusto. Endémica. 1300-1700 m.

Países: BRA(PAR).

Chaetogastra cristaensis F.S. Mey. & R. Goldenb.

Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Chaetogastra debilis Cham.Sin.: *Pleroma debile* (Cham.) Triana, *Tibouchina debilis* (Cham.) Cogn.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Chaetogastra gracilis (Bonpl.) DC.Sin.: *Chaetogastra fraterna* DC.,*Chaetogastra hirsuta* DC., *Lasiandra*

gracilis (Bonpl.) Naudin, *Lasiandra hirsuta* (DC.) Naudin, *Pleroma gracile* (Bonpl.) A. Gray, *Pleroma pulchellum* Griseb., *Pleroma pulchrum* Griseb., hom. illeg., *Rhexia agrostemma* Mart. & Schrad. ex DC., nom. nud., *Rhexia gracilis* Bonpl., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *australis* Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *chamissoana* Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *grandiflora* Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *paucisetosa* Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *robusta* Cogn.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(CLA, TAC, TYT).

Chaetogastra hassleri (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Sin.: *Tibouchina guimaraensii* Brade, *Tibouchina hassleri* Cogn.

Subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Chaetogastra herbacea (DC.) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Sin.: *Arthrostemma cerastifolium* DC. ex Naudin, nom. nud., *Arthrostemma herbaceum* DC., *Arthrostemma hirsutissimum* DC., *Chaetogastra cerastifolia* (Naudin) P.J.F. Guim. & Michelangeli, *Pterolepis cerastifolia* (Naudin) Triana, *Pterolepis herbacea* (DC.) Triana, *Rhexia herbacea* Schrad. & Mart. ex DC., nom. nud., *Tetrameris ceratifolia* Naudin, *Tibouchina cerastifolia* (Naudin) Cogn., *Tibouchina cerastifolia* (Naudin) Cogn. var. *hirsuta* Cogn., *Tibouchina herbacea* (DC.) Cogn., *Tibouchina herbacea* (DC.) Cogn. f. *grandifolia* Cogn., *Tibouchina herbacea*

(DC.) Cogn. f. *parvifolia* Cogn., *Tibouchina herbacea* (DC.) Cogn. var. *rosea* Cogn.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CLA, RNO, SJO).

Chaetogastra herincquiana (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Sin.: *Tibouchina herincquiana* Cogn.
Subarbusto. Nativa. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Chaetogastra longipilosa (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Sin.: *Tibouchina longipilosa* Cogn.
Subarbusto. Endémica. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Chaetogastra nitida (Graham) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Sin.: *Arthrostemma nitidum* Graham, *Comolia platensis* Speg., *Pterolepis nitida* (Graham) Triana, *Tetrameris nitida* (Graham) Naudin, *Tibouchina nitida* (Graham) Cogn.

Hierba o arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, SPE). URY(COL).

Chaetogastra paratropica (Griseb.) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Sin.: *Pleroma paratropicum* Griseb., *Tibouchina paratropica* (Griseb.) Cogn.
Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(SCA).

Chaetogastra parviflora (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Sin.: *Tibouchina parviflora* Cogn.
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-500 m.
Países: PRY(AMA).

Chaetogastra riograndensis F.S. Mey.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Chaetogastra rojasii (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Sin.: *Tibouchina rojasii* Cogn. var. *robusta* Cogn., *Tibouchina rojasii* Cogn. var. *rojasii* Cogn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, AMA).

Chaetogastra rupestris (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Sin.: *Tibouchina rupestris* Cogn.
Hierba o subarbusto. Endémica. 900-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chaetogastra saxicola (F.S. Mey., P.J.F. Guim. & R. Goldenb.) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Sin.: *P.J.F. Guim. & R. Goldenb.*, *Tibouchina saxicola* F.S. Mey.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chaetogastra sebastianopolitana (Raddi) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chaetogastra simplicicaulis (Naudin) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Sin.: *Pterolepis simplicicaulis* (Naudin) Triana, *Tetrameris simplicicaulis* Naudin, *Tibouchina simplicicaulis* (Naudin) Cogn.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Chaetogastra urbanii (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Sin.: *Tibouchina urbanii* Cogn.
Hierba o subarbusto. Nativa. 1400-1900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Chaetogastra versicolor (Lindl.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Arthrostemma versicolor* (Lindl.) DC., *Pterolepis versicolor* (Lindl.) Triana, *Rhexia versicolor* Lindl., *Tetrameris isanthera* Naudin, *Tetrameris versicolor* (Lindl.) Naudin, *Tibouchina versicolor* (Lindl.) Cogn., *Tibouchina versicolor* (Lindl.) Cogn. var. *robusta* Cogn.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chaetogastra violacea (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina violacea* Cogn.

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.

Países: PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, MIE, PAI).

Chaetostoma DC.

Chaetostoma armatum (Spreng.) Cogn.

Sin.: *Chaetostoma pungens* DC., *Rhexia armata* Spreng.

Subarbusto. Nativa. 900.

Países: BRA(PAR).

Clidemia D. Don

Clidemia urceolata DC.

Sin.: *Miconia neourceolata* Michelangeli

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Desmoscelis Naudin

Desmoscelis villosa (Aubl.) Naudin

Sin.: *Melastoma villosum* Aubl.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(AMA).

Henriettea DC.

Henriettea glabra Penneys, Michelangeli, Judd & Almeda

Sin.: *Melastoma glabrum* Vell.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Heterocentron Hook. & Arn.

Heterocentron subtripplinervium (Link & Otto) A. Braun & C.D. Bouché

Sin.: *Melastoma subtripplinervium* Link & Otto

Arbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS).

Huberia DC.

Huberia insignis (Cham.) Bochner & R. Goldenb.

Sin.: *Behuria insignis* Cham.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR).

Huberia semiserrata DC.

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lavoisiera DC.

Lavoisiera imbricata DC.

Sin.: *Lavoisiera phyllocalycina* Cogn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Lavoisiera pulchella Cham.

Subarbusto. Nativa. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Leandra Raddi

Leandra amplexicaulis DC.

Sin.: *Leandra longistyla* Cogn., *Leandra pectinata* Cogn., *Miconia pectinata* (Cogn.) R. Goldenb.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra barbinervis (Cham. ex Triana) Cogn.

Sin.: *Leandra trauninensis* Cogn., *Miconia trauninensis* (Cogn.) R. Goldenb.,

Oxymeris barbinervis Cham. ex Triana

Arbolito. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra brackenridgei (A. Gray) Cogn.

Sin.: *Leandra pilonensis* Wurdack, *Miconia brackenridgei* (A. Gray) R. Goldenb.,

Miconia pilonensis (Wurdack) R. Goldenb.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra calvescens Cogn.

Sin.: *Miconia leacalvescens* R. Goldenb.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra carassana (DC.) Cogn.

Sin.: *Clidemia dispar* Gardner, *Leandra dispar* (Gardner) Cogn.,

Leandra sublanata Cogn., *Miconia leadispar* R. Goldenb.,

Miconia sublanata (Cogn.) R. Goldenb.

Arbolito. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leandra debilis Cogn.

Sin.: *Leandra ramboi* Brade, *Miconia leadebilis* R. Goldenb., *Miconia learamboi* R. Goldenb.,

Oxymeris debilis Triana

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leandra glazioviana Cogn.

Sin.: *Leandra melastomoides* Raddi var. *paulina* Cogn., *Leandra pubistyla* Wurdack, *Leandra scabra* DC. var. *luederwaldtii* Hoehne, *Miconia pubistyla* (Wurdack) R. Goldenb.

Arbusto. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra gracilis Cogn.

Sin.: *Miconia leagracilis* R. Goldenb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra hirtella Cogn.

Sin.: *Miconia leahirtella* R. Goldenb.

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra luctatoris Wurdack

Sin.: *Miconia luctatoris* (Wurdack) R. Goldenb.

Arbolito. Endémica. 1200-1600 m.

Países: BRA(SCA).

Leandra macropora (Triana) Cogn.

Sin.: *Miconia macropora* (Triana) R. Goldenb.

Subarbusto. Endémica. 1500.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra multiplinervis (Naudin) Cogn.

Sin.: *Clidemia multiplinervis* Naudin, *Clidemia oocarpa* A. Gray, *Leandra longisetosa* Cogn., *Miconia oocarpa* (A. Gray) R. Goldenb.

Arbusto. Nativa. 900.

Países: BRA(PAR).

Leandra neglecta Brade

Sin.: *Miconia neglecta* (Brade) R. Goldenb.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra opaca Brade

Sin.: *Miconia opaca* (Brade) R. Goldenb.

Arbusto. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(RGS).

Leandra pallida Cogn.

Sin.: *Leandra pallida* Cogn. var. *brevifolia* Cogn., *Miconia leapallida* R. Goldenb.

Subarbusto. Nativa. 1400-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leandra planifilamentosa Brade

Sin.: *Leandra kleinii* Brade, *Miconia planifilamentosa* (Brade) R. Goldenb.

Arbusto o arbolito. Endémica. 600-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leandra polystachya (Naudin) Cogn.

Sin.: *Clidemia polystachya* Naudin, *Clidemia simplicicaulis* Naudin, *Leandra simplicicaulis* (Naudin) Cogn., *Miconia polystachya* (Naudin) R. Goldenb., *Miconia simplicicaulis* (Naudin) R. Goldenb., *Oxymeris polystachya* (Naudin) Triana

Arbusto o subarbusto. Nativa. 800-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leandra purpurascens (DC.) Cogn.

Sin.: *Clidemia microstachya* Naudin, *Clidemia purpurascens* DC., *Miconia microstachya* (Naudin) R. Goldenb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leandra purpureovillosa Hoehne

Sin.: *Leandra navicularis* Brade, *Miconia purpureovillosa* (Hoehne) R. Goldenb.

Arbusto. Nativa. 1000.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leandra refracta Cogn.

Sin.: *Miconia refracta* (Cogn.) R. Goldenb.

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra reitzii Wurdack

Sin.: *Miconia reitzii* (Wurdack) R. Goldenb.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CEN, COA, PAI).

Leandra reversa (DC.) Cogn.

Sin.: *Clidemia reversa* DC., *Miconia reversa* (DC.) G. Ocampo & Almeda

Arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra riograndensis (Brade) Wurdack

Sin.: *Leandra strigilliflora* (Naudin) Cogn. var. *australis* Cogn., *Miconia riograndensis* (Brade) R. Goldenb.,

Ossaea riograndensis Brade

Arbusto. Endémica. 300-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leandra sericea DC.

Sin.: *Miconia raddii* R. Goldenb.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Leandra strigilliflora (Naudin) Cogn.

Sin.: *Clidemia strigilliflora* Naudin

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Leandra sulfurea (Naudin) Cogn.

Sin.: *Clidemia sulfurea* Naudin, *Miconia sulfurea* (Naudin) R. Goldenb.

Arbolito. Nativa. 1200-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra tetraquetra (Cham.) Cogn.

Sin.: *Clidemia tetraquetra* Cham., *Miconia tetraquetra* (Cham.) R. Goldenb.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra xanthocoma (Naudin) Cogn.
 Sin.: *Clidemia xanthocoma* Naudin, *Leandra erinacea* Cogn., *Leandra xanthocoma* (Naudin) Cogn. var. *grandifolia* Cogn., *Miconia xanthocoma* (Naudin) R. Goldenb., *Oxymeris xanthocoma* (Naudin) Triana
 Arbusto. Nativa. 0-1100 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Leandra xanthostachya Cogn.
 Sin.: *Miconia xanthostachya* (Cogn.) R. Goldenb.
 Arbusto. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Macairea DC.

Macairea radula (Bonpl.) DC.
 Sin.: *Macairea adenostemon* DC.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA, PAI).

Marcetia DC.

Marcetia taxifolia (A. St.-Hil.) DC.
 Sin.: *Rhexia taxifolia* A. St.-Hil.
 Subarbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Miconia Ruiz & Pav., nom. cons.

Miconia acutiflora (Naudin) R. Goldenb.
 Sin.: *Clidemia acutiflora* Naudin, *Clidemia pickeringii* A. Gray, *Leandra acutiflora* (Naudin) Cogn., *Leandra membranifolia* Cogn., *Leandra nutans* Cogn. var. *robertii* Brade, *Oxymeris pickeringii* (A. Gray) Triana, *Oxymeris widgrenii* Triana
 Arbusto. Nativa. 200-1200 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia albicans (Sw.) Steud.
 Sin.: *Melastoma albicans* Sw.
 Arbusto. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, PAI).

Miconia alterninervia (Cogn.) R. Goldenb.
 Sin.: *Leandra alterninervia* Cogn., *Leandra balduinii* Brade, *Leandra pustulata* Cogn., *Leandra regnellii* (Triana) Cogn., *Leandra schenckii* Cogn., *Oxymeris regnellii* Triana
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia amygdaloides (DC.) R. Goldenb.
 Sin.: *Clidemia amygdaloides* DC., *Clidemia brachystachya* DC., *Ossaea amygdaloides* (DC.) Triana, *Ossaea brachystachya* (DC.) Triana, hom. illeg.
 Arbusto. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Miconia auricoma (Spring ex Mart.) R. Goldenb.
 Sin.: *Clidemia aurea* Cham., *Leandra aurea* (Cham.) Cogn., *Leandra auricoma* Spring ex Mart., *Leandra lacunosa* Cogn., *Miconia lacunosa* (Cogn.) R. Goldenb.
 Arbusto. Nativa. 500-1700 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(COA).

Miconia australis (Cham.) R. Goldenb.
 Sin.: *Clidemia australis* Cham., *Clidemia phaeotricha* Naudin, *Leandra atropurpurea* Cogn., *Leandra australis* (Cham.) Cogn. var. *angustifolia* Cogn., *Leandra australis* (Cham.) Cogn. var. *australis*, *Leandra australis* (Cham.) Cogn. var. *phaeotricha* (Naudin) Cogn., *Oxymeris australis* (Cham.) Triana
 Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA). URY(ART, CLA).

Miconia balansae (Cogn.) R. Goldenb.
 Sin.: *Leandra balansae* Cogn.
 Arbusto. Nativa. 0-700 m.
 Países: ARG(MIS, SAL). BRA(SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, PAI).

Miconia biserrata (DC.) Michelangeli
 Sin.: *Clidemia biserrata* DC.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA).

Miconia blepharodes (DC.) R. Goldenb.
 Sin.: *Adelobotrys lindenii* Naudin, *Clidemia blepharodes* DC., *Clidemia scandens* Gardner, *Melastoma coccinea* Vell., hom. illeg., *Pleiochiton blepharodes* (DC.) Reginato, R. Goldenb. & Baumgratz, *Staphidium blepharodes* (DC.) Wawra
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia brasiliensis (Spreng.) Triana
 Sin.: *Melastoma brasiliense* Spreng.
 Arbolito. Nativa. 0-300 m.
 Países: BRA(SCA).

Miconia brunnea DC.
 Sin.: *Miconia flammea* Casar. var. *major* Cogn.
 Árbol. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia buddlejoides Triana
 Sin.: *Miconia amambayensis* Kraenzl.
 Arbusto. Nativa. 200-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CON).

Miconia bullosa (DC.) Michelangeli
 Sin.: *Clidemia bullosa* DC.
 Arbusto. Nativa. 100-500 m.

- Países: PRY(AMA, CAN).
- Miconia calvescens** DC.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, SAL).
BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CON, COA, PAI).
- Miconia camporum** (Brade) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra camporum* Brade
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).
- Miconia catharinensis** (Cogn.) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra catharinensis* Cogn.,
Ossaea ramboi Brade
Arbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Miconia chaetodonta** R. Goldenb. & Michelangeli
Sin.: *Clidemia chaetodon* (DC.) Naudin,
Leandra chaetodon (DC.) Cogn.,
Spennera chaetodon DC.
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(AMA).
- Miconia chamissois** Naudin
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR).
PRY(CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).
- Miconia ciliolata** (Cogn.) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra ciliolata* Cogn., *Leandra laevigata* (Triana) Cogn., *Oxymeris laevigata* Triana
Arbolito. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Miconia cinerascens** Miq.
Sin.: *Miconia cinerascens* Miq. var. *robusta* Wurdack, *Miconia lagunensis* Ule, *Miconia paulensis* Naudin
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.
- Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, PAI).
- Miconia cinnamomifolia** (DC.) Naudin
Sin.: *Cremanium cinnamomifolium* DC.,
Miconia candolleana Triana, hom. illeg.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia collatata** Wurdack
Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, COA, GUA).
- Miconia corcovadensis** (Raddi) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra angustifolia* DC., *Leandra corcovadensis* Raddi, *Ossaea angustifolia* (DC.) Triana
Arbusto. Nativa. 200-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia cordigera** (Triana) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra cordigera* (Triana) Cogn.,
Leandra cordigera (Triana) Cogn. var. *transiens* Wurdack, *Oxymeris cordigera* Triana
Arbusto. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia crenata** (Vahl) Michelangeli
Sin.: *Clidemia hirta* (L.) D. Don, *Melastoma crenatum* Vahl, *Melastoma hirtum* L.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA).
- Miconia cubatanensis** Hoehne
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Miconia dasytricha** (A. Gray) R. Goldenb.
- Sin.: *Clidemia dasytricha* A. Gray,
Leandra dasytricha (A. Gray) Cogn.,
Leandra variabilis Raddi
Arbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Miconia discolor** DC.
Sin.: *Miconia discolor* DC. var. *subconcolor* Cogn., *Miconia kleinii* Brade
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, APY, CAA, CAN).
- Miconia dodecandra** Cogn.
Sin.: *Melastoma dodecandrum* Desr.,
hom. illeg.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Miconia dolichostachya** (Naudin) R. Goldenb.
Sin.: *Clidemia dolichostachya* Naudin,
Leandra glabrata (Bunbury) Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Miconia dubia** (DC.) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra bergiana* Cogn., *Leandra dubia* DC., *Leandra hirta* Raddi, *Oxymeris dubia* (DC.) Triana
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia dusenii** (Cogn.) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra dusenii* Cogn., *Leandra microphylla* Cogn.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Miconia ebracteata** (Triana) R. Goldenb.
Sin.: *Pleiochiton ebracteatum* Triana
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia erostrata (DC.) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia erostrata* DC., *Clidemia weddellii* Naudin, *Leandra erostrata* (DC.) Cogn. var. *erostrata*, *Leandra erostrata* (DC.) Cogn. var. *minor* Cogn., *Oxymeris erostrata* (DC.) Triana

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Miconia fasciculata Gardner

Sin.: *Miconia fasciculata* Gardner subsp. *catharinensis* Wurdack

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia fastigiata (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra fastigiata* Cogn.

Subarbusto. Nativa. 600-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Miconia flammea Casar.

Sin.: *Miconia chartacea* Triana, *Miconia chartacea* Triana var. *miqueliana* Cogn.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia formosa Cogn.

Sin.: *Miconia cabucu* Hoehne

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia hatschbachii (Brade) R.

Goldenb.

Sin.: *Leandra hatschbachii* Brade

Arbolito. Endémica. 1300-1800 m.

Países: BRA(PAR).

Miconia herincquiana (Cogn.) R.

Goldenb.

Sin.: *Leandra herincquiana* Cogn.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU).

Miconia horrida (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra echinata* Cogn., *Leandra horrida* Cogn., *Leandra horrida* Cogn. var. *reitzii* Brade, *Miconia leaechinata* R. Goldenb.

Subarbusto. Endémica. 300-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia hyemalis A. St.-Hil. & Naudin

Árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV).

Miconia ibaguensis (Bonpl.) C. Wright

Sin.: *Melastoma ibaguense* Bonpl., *Miconia ibaguensis* (Bonpl.) Triana

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(SPE).

Miconia inaequidens (DC.) Naudin

Sin.: *Cremanium inaequidens* DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Miconia inconspicua Miq.

Sin.: *Miconia excelsa* A. St.-Hil. ex Triana

Arbusto o árbol. Nativa. 900.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia ioneura Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Miconia ionopogon (Mart.) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia renggeri* Steud., *Leandra ionopogon* (Mart.) Cogn., *Tschudya ionopogon* Mart.

Arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia itatiaiae (Wawra) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra itatiaiae* (Wawra) Cogn., *Oxymeris itatiaiae* Wawra

Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia latecrenata (DC.) Naudin

Sin.: *Cremanium latecrenatum* DC.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia leaconfusa R. Goldenb.

Sin.: *Leandra confusa* Cogn.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Miconia leacordifolia R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia cordifolia* Naudin, *Leandra cardiophylla* Cogn., *Leandra cordifolia* (Naudin) Cogn., *Leandra urbaniana* Cogn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia leacrenata R. Goldenb. & Michelangeli

Sin.: *Clidemia crenata* D. Don, *Clidemia lambertiana* DC., *Clidemia lutescens* Naudin, *Leandra crenata* (D. Don) Cogn.

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(MIS, SAL). PRY(APA, COA, PAI).

Miconia leaeichleri R. Goldenb.

Sin.: *Leandra eichleri* Cogn.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Miconia leaericalyx R. Goldenb.

Sin.: *Leandra ericalyx* Cogn., *Leandra laxa* Cogn.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia leafallax R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia fallax* Cham., *Leandra fallax* (Cham.) Cogn., *Oxymeris fallax* (Cham.) Triana

Arbusto. Nativa. 200-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia leafoveolata R. Goldenb.
Sin.: *Leandra foveolata* (DC.) Cogn.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Miconia leahumilis R. Goldenb.
Sin.: *Leandra humilis* (Cogn.) Wurdack,
Leandra humilis (Cogn.) Wurdack var.
glabrata (Cogn.) Wurdack, *Ossaea humilis*
Cogn., *Ossaea humilis* Cogn. var. *glabrata*
Cogn.
Arbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Miconia ligustroides (DC.) Naudin
Sin.: *Cremanium ligustroides* DC.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia longicuspis Cogn.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia lymanii Wurdack
Arbolito. Nativa. 300-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia melastomoides (Raddi) R.
Goldenb.
Sin.: *Leandra fragilis* Cogn., *Leandra*
melastomoides Raddi, *Leandra scabra*
DC.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia miconiastrum (Naudin) R.
Goldenb.
Sin.: *Clidemia miconiastrum* Naudin,
Leandra miconiastrum (Naudin) Cogn.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Miconia molybdea Naudin
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Miconia niederleinii (Cogn.) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra niederleinii* Cogn.
Hierba. Endémica. 300-500 m.
Países: ARG(MIS).

Miconia paniculata (DC.) Naudin
Sin.: *Cremanium paniculatum* DC.,
Miconia doriana Cogn.
Arbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia paraguayensis Cogn.
Sin.: *Miconia paraguayensis* Cogn. var.
angustifolia Cogn.
Arbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Miconia paucidens DC.
Sin.: *Miconia langsdorffii* Cogn.
Arbusto o árbol. Nativa. 200-400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA,
CAU, SPE).

Miconia petropolitana Cogn.
Sin.: *Miconia inconspicua* Miq. var.
glabrata Wurdack
Arbusto o árbol. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAN).

Miconia prasina (Sw.) DC.
Sin.: *Melastoma prasinum* Sw., *Miconia*
attenuata DC., *Miconia prasina* (Sw.) DC.
var. *attenuata* (DC.) Cogn.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin
Sin.: *Cremanium pusilliflorum* DC.,
Melastoma hymenonervium Raddi,
Miconia gardneriana Naudin, *Miconia*
hymenonervia (Raddi) Cogn., *Miconia*
rigidiuscula Cogn.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA).

Miconia quinqueidentata (DC.) R.
Goldenb.
Sin.: *Clidemia quinqueidentata* (DC.)
Naudin, *Leandra quinqueidentata* (DC.)
Cogn., *Oxymeris quinqueidentata* DC.
Arbusto. Nativa. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia quinquenodis (DC.) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra quinquenodes* (DC.) Cogn.,
Oxymeris quinquenodis DC.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia racemifera (DC.) Triana
Sin.: *Leandra racemifera* DC.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Miconia ramboi Brade
Arbolito. Endémica. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia sabiaensis (Brade) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra sabiaensis* Brade
Arbusto. Endémica. 600-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia salicina (Ser. ex DC.) Mabb.
Sin.: *Leandra parvifolia* Cogn., *Leandra*
salicina (DC.) Cogn.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-800
m.
Países: BRA(PAR).

Miconia sellowiana Naudin
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia splendens (Sw.) Griseb.
Sin.: *Melastoma splendens* Sw.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Miconia staminea (Desr.) DC.

Sin.: *Jucunda olfersiana* Cham., *Melastoma stamineum* Desr., *Miconia jucunda* (DC.) Triana, *Miconia jucunda* (DC.) Triana var. *olfersiana* (Cham.) Cogn., *Miconia staminea* (Desr.) DC. var. *parvifolia* Cogn., *Osbeckia jucunda* DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, GUA, PAI, SPE).

Miconia stenostachya DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Miconia tetraquetra (Cham.) R. Goldenb.

Arbusto o arbolito. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia theizans (Bonpl.) Cogn.

Sin.: *Melastoma theizans* Bonpl., *Miconia theizans* (Bonpl.) Cogn. subsp. *flavescens* Cogn.

Arbusto. Nativa. 100-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, PAI).

Miconia tristis Spring

Sin.: *Miconia tristis* Spring subsp. *australis* Wurdack

Arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia ulei (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra ulei* Cogn.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Miconia valtheri Naudin

Sin.: *Miconia eichleri* Cogn., *Miconia eichleri* Cogn. var. *australis* Cogn.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia willdenowii Naudin

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Microlicia D. Don**Microlicia myrtoidea** Cham.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Mouriri Aubl.**Mouriri brevipes** Hook.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Mouriri chamissoana Cogn.

Arbolito. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ossaea DC.**Ossaea confertiflora** (DC.) Triana

Sin.: *Clidemia althaeoides* Naudin, *Clidemia confertiflora* DC., *Leandra rubella* Raddi, *Miconia rubella* (Raddi) R. Goldenb.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ossaea flaccida Brade

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Ossaea fragilis Cogn.

Sin.: *Miconia leafragilis* R. Goldenb.,

Ossaea kleinii Brade

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Ossaea marginata (Desr.) Triana

Sin.: *Clidemia marginata* (Desr.) DC., *Melastoma marginatum* Desr., *Miconia*

leamarginata R. Goldenb., *Ossaea sanguinea* Cogn. var. *viridifolia* Cogn.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

Ossaea meridionalis D'El Rei Souza

Sin.: *Miconia meridionalis* (D'El Rei Souza) R. Goldenb.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Ossaea sanguinea Cogn.

Sin.: *Miconia leacuneata* R. Goldenb., *Miconia leasanguinea* R. Goldenb., *Ossaea cuneata* Cogn.

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pleroma D. Don**Pleroma andersregnellii** P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina regnellii* Cogn.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Pleroma asperius (Cham.) Triana

Sin.: *Lasiandra asperior* Cham., *Tibouchina asperior* (Cham.) Cogn.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Pleroma caissarum F.S. Mey.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pleroma clavatum (Pers.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Melastoma clavatum* Pers., *Tibouchina clavata* (Pers.) Wurdack

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pleroma dubium (Cham.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Lasiandra dubia* Cham., *Tibouchina dubia* (Cham.) Cogn., *Tibouchina glazioviana* Cogn., *Tibouchina hieronymi* Cogn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pleroma dusenii (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina catharinensis* Brade, *Tibouchina dusenii* Cogn.

Arbusto. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pleroma floribundum (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina floribunda* Cogn., *Tibouchina ovata* Cogn.

Subarbusto. Nativa. 1200-100 m.

Países: BRA(PAR).

Pleroma frigidulum (Schrack & Mart. ex DC.) Triana

Sin.: *Lasiandra frigidula* DC., *Tibouchina frigidula* (DC.) Cogn.

Subarbusto. Nativa. 1000.

Países: BRA(PAR).

Pleroma goldenbergii (F.S. Mey., P.J.F. Guim. & Kozera) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *P.J.F. Guim. & Kozera*, *Tibouchina goldenbergii* F.S. Mey.

Arbusto. Endémica. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

Pleroma quartelaense F.S. Mey. & R. Goldenb.

Arbusto. Nativa. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Pleroma hatschbachii (Wurdack) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina hatschbachii* Wurdack

Arbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Pleroma heteromallum (D. Don) D. Don

Sin.: *Lasiandra multiflora* (Gardner) Naudin, *Melastoma heteromallum* D. Don, *Pleroma multiflorum* Gardner, *Tibouchina multiflora* (Gardner) Cogn.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Pleroma hospitum (Schrack & Mart. ex DC.) Triana

Sin.: *Lasiandra albiflora* (Gardner) Naudin, *Lasiandra hospita* Schrank & Mart. ex DC., *Pleroma albiflorum* Gardner, *Purpurella albiflora* (Gardner) Triana, *Tibouchina hospita* (Schrack & Mart. ex DC.) Cogn., *Tibouchina hospita* (Schrack & Mart. ex DC.) Cogn. var. *australis* Cogn.

Arbusto. Nativa. 0-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pleroma joelsilvae F.S. Mey. & Brotto

Arbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Pleroma kleinii (Wurdack) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina kleinii* Wurdack

Subarbusto. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pleroma littorale F.S. Mey. & R. Goldenb.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pleroma martiale (Cham.) Triana

Sin.: *Lasiandra martialis* Cham., *Tibouchina martialis* (Cham.) Cogn.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Pleroma martiusianum (DC.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Lasiandra martiusiana* DC., *Tibouchina martiusiana* (DC.) Cogn.

Subarbusto. Nativa. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

Pleroma marumbiense (Wurdack) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina marumbiensis* Wurdack

Arbusto. Endémica. 600-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Pleroma molle (Cham.) Triana

Sin.: *Tibouchina chamissoana* Cogn.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Pleroma oleifolium (DC.) R. Romero & Versiane

Sin.: *Microlepis oleifolia* (DC.) Triana

Arbusto a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Pleroma pilosum (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina pilosa* Cogn. var. *glandulosa* Wurdack, *Tibouchina pilosa* Cogn. var. *pilosa*

Arbolito. Endémica. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pleroma raddianum (DC.) Gardner

Sin.: *Lasiandra pulchra* Cham., *Lasiandra raddiana* DC., *Pleroma pulchrum* (Cham.) Triana, *Tibouchina pulchra* (Cham.) Cogn.

Árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pleroma ramboi (Brade) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina ramboi* Brade

Arbolito. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Pleroma reitzii (Brade) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina reitzii* Brade, *Tibouchina reitzii* Brade var. *alpestris* Brade

Arbusto. Nativa. 600-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pleroma riedelianum (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina riedeliana* Cogn.

Arbusto. Nativa. 700-800 m.

Países: BRA(PAR).

Pleroma sellowianum (Cham.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Lasiandra sellowiana* Cham., *Pleroma raddianum* (DC.) Triana, *Tibouchina sellowiana* (Cham.) Cogn.

Arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pleroma setosociliatum (Cogn.) F.S. Mey. & F.B. Matos

Sin.: *Tibouchina setosociliata* Cogn.

Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pleroma trichopodum DC.

Sin.: *Lasiandra multiceps* Naudin, *Lasiandra tibouchinoides* DC., *Lasiandra trichopoda* (DC.) Naudin, *Rhexia tibouchinoides* Schrad. & Mart. ex DC., nom. nud., *Tibouchina multiceps* (Naudin) Cogn., *Tibouchina trichopoda* (DC.) Baill., *Tibouchina trichopoda* (DC.) Baill. var. *tibouchinoides* (DC.) Cogn.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pleroma ursinum (Cham.) Triana

Sin.: *Lasiandra ursina* Cham., *Lasiandra villosa* Naudin, *Tibouchina ursina* (Cham.) Cogn.

Subarbusto. Nativa. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Notas: Citada para Misiones, Argentina, (Wurdack, 1962) sin mencionar material de referencia.

Pleroma urvilleanum (DC.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Sin.: *Tibouchina urvilleana* (DC.) Cogn. var. *glandulifera* Wurdack, *Tibouchina urvilleana* (DC.) Cogn. var. *urvilleana*

Arbolito. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pterolepis (DC.) Miq., nom. cons.

Pterolepis buraeavii Cogn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(PAI).

Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq.

Sin.: *Arthrostemma brachyandrum* Cham., *Pterolepis glomerata* (Rottb.) Miq. var. *brachyandra* (Cham.) Cogn., *Rhexia glomerata* Rottb.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, PHA).

Pterolepis repanda (DC.) Triana

Sin.: *Chaetogastra repanda* (DC.) Mart., *Osbeckia repanda* DC., *Pterolepis balansaei* Cogn., *Pterolepis balansaei* Cogn. var. *elator* Cogn., *Pterolepis balansaei* Cogn. var. *latifolia* Cogn., *Pterolepis herincuiiana* Cogn.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS). PRY(AMA, CAU, CAN, COA, PAI, PHA).

Rhynchanthera DC., nom. cons.

Rhynchanthera brachyrhyncha Cham.

Sin.: *Rhynchanthera brachyrhyncha* Cham. var. *catharinensis* Brade,

Rhynchanthera kleinii Brade, *Rhynchanthera reitzii* Brade

Subarbusto. Nativa. 700-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchanthera cordata DC.

Subarbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

Rhynchanthera dichotoma (Desr.) DC.

Sin.: *Melastoma dichotoma* Desr.

Subarbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rhynchanthera novemnervia DC.

Sin.: *Rhynchanthera secundiflora* Naudin

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA). PRY(AMA, COA, PAI).

Rhynchanthera verbenoides Cham.

Sin.: *Rhynchanthera hassleriana* Kraenzl., *Rhynchanthera rosea* Cogn., *Rhynchanthera ternata* Cogn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI).

Siphanthera Pohl ex DC.

Siphanthera cordata Pohl ex DC.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Trembleya DC.

Trembleya parviflora (D. Don) Cogn.

Sin.: *Meriania parviflora* D. Don

Subarbusto. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Trembleya phlogiformis DC.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

MELIACEAE

Cabralea A. Juss.

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.

Sin.: *Cabralea brachystachya* C. DC., *Cabralea glaberrima* A. Juss., *Cabralea multijuga* C. DC., *Cabralea oblongifoliola* C. DC., *Cabralea rojasii* C. DC., *Trichilia canjerana* Vell.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA).

Cedrela P. Browne

Cedrela angustifolia DC.

Sin.: *Cedrela boliviana* Rusby, *Cedrela lilloi* C. DC., *Cedrela steinbachii* Harms, *Surenus angustifolia* (Moc. & Sessé ex DC.) Kuntze

Árbol. Nativa. 1100-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cedrela balansae C. DC.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(COA).

Cedrela fissilis Vell.

Sin.: *Cedrela barbata* C. DC., *Cedrela brasiliensis* A. Juss., *Cedrela brasiliensis* A. Juss. var. *australis* A. Juss., *Cedrela fissilis* Vell. var. *glabrior* C. DC., *Cedrela fissilis* Vell. var. *macrocarpa* C. DC., *Cedrela hirsuta* C. DC., *Cedrela tubiflora* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni f.

angustifolia Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni f. *grandifolia* (Bertoni) M. Buchinger & Falcone, *Cedrela tubiflora* Bertoni f. *parvifoliola* M. Buchinger & Falcone, *Cedrela tubiflora* Bertoni f. *parvifoliola* M. Buchinger & Falcone, *Cedrela tubiflora* Bertoni subsp. *bertoniensis* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni var. *grandifolia* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni var. *intermedia* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni var. *lagenaria* Bertoni, *Surenus fissilis* (Vell.) Kuntze

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Cedrela odorata L.

Sin.: *Cedrela hassleri* (C. DC.) C. DC., *Cedrela mexicana* M. Roem., *Cedrela paraguariensis* Mart., *Cedrela paraguariensis* Mart. var. *brachystachya* C. DC., *Cedrela paraguariensis* Mart. var. *hassleri* C. DC., *Cedrela paraguariensis* Mart. var. *multijuga* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, CEN, COA, PAI).

Cedrela saltensis Zapater & del Castillo

Árbol. Nativa. 700-1100 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Guarea F. Allam., nom. cons.

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Sin.: *Guarea campestris* C. DC., *Guarea francavillana* C. DC., *Guarea rubescens* C. DC., *Guarea trichiloides* L., *Samyda guidonia* L.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, PAI).

Guarea kunthiana A. Juss.

Sin.: *Guarea pohlii* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Guarea macrophylla Vahl subsp. **pachycarpa** (C. DC.) T.D. Penn.

Sin.: *Guarea trichiloides* L. var. *pachycarpa* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Guarea macrophylla Vahl subsp. **spiciflora** (A. Juss.) T.D. Penn.

Sin.: *Guarea angustifolia* C. DC., *Guarea balansae* C. DC., *Guarea diversifolia* C. DC., *Guarea dumetorum* C. DC., *Guarea fiebrigii* C. DC., *Guarea frutescens* C. DC., *Guarea hassleri* C. DC., *Guarea hassleri* C. DC. var. *esulcata* C. DC., *Guarea leucantha* C. DC., *Guarea nemorensis* C. DC., *Guarea parvifoliola* C. DC., *Guarea ripicola* C. DC., *Guarea silvicola* C. DC., *Guarea spiciflora* A. Juss., *Guarea subnudipetala* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, SAO).

Guarea macrophylla Vahl subsp. **tuberculata** (Vell.) T.D. Penn.

Sin.: *Guarea coriacea* C. DC., *Guarea lessoniana* A. Juss., *Guarea muelleri* C. DC., *Guarea tuberculata* Vell.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Melia L.

Melia azedarach L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(PAI). URY(PAY, RNO).

Trichilia P. Browne, nom. et typ. cons.**Trichilia casaretti** C. DC.

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Trichilia catigua A. Juss.

Sin.: *Trichilia affinis* A. Juss., *Trichilia alba* Rojas Acosta, nom. nud., *Trichilia catigua* A. Juss. var. *affinis* (A. Juss.) C. DC., *Trichilia catigua* A. Juss. var. *longifoliola* C. DC., *Trichilia catigua* A. Juss. var. *pallens* C. DC., *Trichilia polyclada* C. DC.

Árbol. Nativa. 100-600 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Trichilia clausenii C. DC.

Sin.: *Trichilia bradei* Harms, *Trichilia clausenii* C. DC. var. *microcarpa* C. DC., *Trichilia hieronymi* Griseb., *Trichilia lagoensis* C. DC., *Trichilia lagoensis* C. DC. var. *pubescens* C. DC., *Trichilia tartagalensis* C. DC., *Trichilia triphyllaria* C. DC., *Trichilia velutina* C. DC.

Árbol. Nativa. 200-1500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CON).

Trichilia elegans A. Juss.

Sin.: *Trichilia alba* C. DC., *Trichilia elegans* A. Juss. var. *latifoliola* C. DC., *Trichilia graciliflora* Harms, *Trichilia hassleri* C. DC., *Trichilia hirsuta* C. DC.,

Trichilia warmingii C. DC., *Trichilia warmingii* C. DC. var. *macrophylla* C. DC.

Árbol. Nativa. 100-700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, SOR).

Trichilia hirta L.

Sin.: *Trichilia cathartica* Mart. var. *glabrior* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, PAI).

Trichilia lepidota Mart. subsp. **lepidota**

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Trichilia lepidota Mart. subsp. **schumanniana** (Harms) T.D. Penn.

Sin.: *Trichilia angustior* Harms, *Trichilia schumanniana* Harms, *Trichilia toledoana* Handro

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Trichilia pallens C. DC.

Sin.: *Trichilia brachythyrus* Harms, *Trichilia columnata* Girardi, *Trichilia fragrans* C. DC., *Trichilia glabriramea* C. DC., *Trichilia levis* C. DC., *Trichilia orgaosana* C. DC., *Trichilia petiolulata* C. DC., *Trichilia puberulanthera* C. DC., *Trichilia selloi* C. DC.

Árbol. Nativa. 500-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN).

Trichilia pallida Sw.

Sin.: *Trichilia mollis* C. DC., *Trichilia pauciflora* Rusby, *Trichilia weddellii* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI).

Trichilia pseudostipularis (A. Juss.) C. DC.

Sin.: *Moschoxylum pseudostipulare* A. Juss., *Trichilia pseudostipularis* (A. Juss.) C. DC. var. *sanctae-catharinae* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Trichilia silvatica C. DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Trichilia stellato-tomentosa Kuntze

Sin.: *Trichilia stellipila* C. DC.

Árbol. Nativa. 200-700 m.

Países: PRY(AMA, CON).

MENISPERMACEAE**Abuta** Aubl.**Abuta selloana** Eichler

Liana. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anomospermum Miers**Anomospermum reticulatum** (Mart.)

Eichler subsp. **nitidum** (Miers) Krukoff & Barneby

Sin.: *Anomospermum nitidum* Miers

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Anomospermum reticulatum (Mart.)

Eichler subsp. **reticulatum**

Sin.: *Cocculus reticulatus* Mart.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cissampelos L.

Cissampelos andromorpha DC.

Enredadera. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cissampelos arenicola M. Nee & R. Ortiz

Enredadera o liana. Nativa. 300-500 m.
Países: ARG(SAL). PRY(APY, PHA).

Cissampelos glaberrima A. St.-Hil.

Sin.: *Cissampelos glaberrima* A. St.-Hil.
var. *orbicularis* Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Cissampelos laxiflora Moldenke

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, GUA).

Cissampelos ovalifolia DC.

Sin.: *Cissampelos communis* A. St.-Hil.,
Cissampelos ovalifolia DC. f. *latifolia*
Chodat & Hassl., *Cissampelos ovalifolia*
DC. f. *longepetiolata*, *Cissampelos*
ovalifolia DC. f. *ovato-mucronata* Chodat
& Hassl., *Cissampelos ovalifolia* DC. f.
reniformis Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, AMA, CAN, CON, SPE).

Cissampelos pareira L.

Sin.: *Cissampelos auriculata* Miers,
Cissampelos australis A. St.-Hil.,
Cissampelos caapeba L., *Cissampelos*
hederacea Miers, *Cissampelos litoralis* A.
St.-Hil., *Cissampelos littoralis* A. St.-Hil.,
Cissampelos monoica A. St.-Hil.,
Cissampelos pareira L. f. *emarginato-*
mucronata Chodat & Hassl., *Cissampelos*
pareira L. f. *reniformis* Chodat & Hassl.,
Cissampelos pareira L. var. *australis* (A.
St.-Hil.) Diels, *Cissampelos pareira* L. var.
caapeba (L.) Eichler, *Cissampelos pareira*

L. var. *gardneri* Diels, *Cissampelos*
pareira L. var. *monoica* (A. St.-Hil.)
Eichler, *Cissampelos pareira* L. var.
tamoides (Willd. ex DC.) Diels,
Cissampelos tamoides Willd. ex DC.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,
BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA,
ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(RNO).

Cissampelos tropaeolifolia DC.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APA,
CAN, PAI).

Disciphania Eichler

Disciphania contraversa Barneby

Liana. Endémica. 300-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Disciphania ernstii Eichler var. **glaziovii**

(Taub. ex Diels) Barneby
Sin.: *Disciphania glaziovii* Taub. ex Diels,
Disciphania hassleri Chodat ex Hassl.
Subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(AMA).

Hyperbaena Miers ex Benth., nom. et
typ. cons.

Hyperbaena domingensis (DC.) Benth.

Sin.: *Cocculus domingensis* DC.,
Hyperbaena tweediei Miers ex Benth.,
Pachygone domingensis (DC.) Eichler
Enredadera. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hyperbaena hassleri Diels

Sin.: *Abuta parvifolia* Rusby ex Moldenke,
nom. nud.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR).
BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, CON, GUA,
ÑEE).

Hyperbaena oblongifolia (Eichler)
Chodat & Hassl.

Sin.: *Cocculus oblongifolius* Mart., nom.
illeg., *Pachygone oblongifolia* Eichler
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).
PRY(APA, COA, PAI).

Odontocarya Miers

Odontocarya acuparata Miers

Liana o epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(GUA).

Odontocarya asarifolia Barneby

Liana o epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, MIS,
SAL, TUC). PRY(APY, PAI, PHA).

Odontocarya tamoides (DC.) Miers var.
canescens (Miers) Barneby

Sin.: *Odontocarya hederifolia* Miers var.
canescens Miers, *Odontocarya tamoides*
(DC.) Miers var. *paupera* (Griseb.) Hassl.
Liana. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(AMA).

MENYANTHACEAE

Nymphoides Ség.

Nymphoides indica (L.) Kuntze

Sin.: *Limnanthemum humboldtianum*
(Kunth) Griseb., *Menyanthes indica* L.,
Nymphoides humboldtiana (Kunth)
Kuntze, *Villarsia humboldtiana* Kunth

Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MAL, ROC).

Nymphoides verrucosa (R.E. Fr.) A. Galán & G. Navarro

Sin.: *Limnanthemum verrucosum* R.E. Fr.

Hierba acuática. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS). PRY(CON, COA).

MICROTEACEAE

Microtea Sw.

Microtea celosioides (Spreng.) Moq. ex Sennikov & Sukhor.

Sin.: *Galenia celosioides* Spreng., *Microtea paniculata* Moq. var. *linifolia* Moq., *Microtea paniculata* Moq. var. *paniculata*

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, SPE).

Microtea debilis Sw.

Sin.: *Schollera debilis* (Sw.) Rohr

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(PHA).

Microtea maypurensis (Kunth) G. Don

Sin.: *Ancistrocarpus maypurensis* Kunth, *Microtea glochidiata* Moq. f. *lanceolata* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CON, COA, SPE).

Microtea scabrida Urb.

Sin.: *Microtea foliosa* Chodat, *Microtea paniculata* Moq. var. *latifolia* Kuntze,

Microtea paniculata Moq. var. *scabrida* (Urb.) Kuntze, *Microtea scandens* Rusby

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(ART, PAY, RNO).

Microtea sulcicaulis Chodat

Sin.: *Microtea sulcicaulis* Chodat var. *fremontii* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, SPE).

MISODENDRACEAE

Misodendrum Banks ex DC.

Misodendrum angulatum Phil.

Subarbusto parásito. Endémica. 500-1300 m.

Países: ARG(RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Misodendrum brachystachyum DC.

Sin.: *Archiphyllum brachystachyum* (DC.) Tiegh., *Archiphyllum macrophyllum* (Phil.) Tiegh., *Misodendrum macrophyllum* Phil., *Misodendrum planifolium* Banks & Sol. ex Hook. f.

Subarbusto parásito. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Misodendrum gayanum Tiegh.

Sin.: *Misodendrum diemii* E. N. Ruiz, *Misodendrum patagonicum* Speg.

Subarbusto parásito. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Misodendrum linearifolium DC.

Sin.: *Angelopogon linearifolium* (DC.) Poepp. ex Tiegh., *Misodendrum contractum* (Skottsb.) Orfila, *Misodendrum densifolium* Orfila, *Misodendrum linearifolium* DC. f. *monoica* Skottsb., *Misodendrum linearifolium* DC. var. *contractum* Skottsb., *Misodendrum microphyllum* Hook. & Arn., *Misodendrum reflexum* Orfila, *Misodendrum reflexum* Orfila var. *brevisetaceum* Orfila

Subarbusto parásito. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Misodendrum macrolepis Phil.

Subarbusto parásito. Endémica. 900-900 m.

Países: CHL(LLA, AIS).

Misodendrum oblongifolium DC.

Sin.: *Archiphyllum oblongifolium* (DC.) Tiegh., *Misodendrum oblongifolium* DC. var. *lilacinum* Orfila

Subarbusto parásito. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Misodendrum punctulatum Banks ex DC.

Sin.: *Misodendrum antarcticum* Gand., *Misodendrum commersonii* Tiegh., nom. superfl., *Misodendrum imbricatum* Poepp. & Endl., *Misodendrum punctulatum* Banks ex DC. var. *boreale* DC., *Misodendrum punctulatum* Banks ex DC. var. *magellanicum* DC., *Misodendrum punctulatum* Banks ex DC. var. *subumbellatum* DC., nom. superfl., *Misodendrum punctulatum* Banks ex

J.R.Forst., nom. nud., *Misodendrum recurvum* Tiegh., *Misodendrum rioquinoense* Kuntze

Subarbusto parásito. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Misodendrum quadriflorum DC.

Sin.: *Telophyllum quadriflorum* (DC.) Tiegh.

Subarbusto parásito. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

MOLLUGINACEAE

Glinus L.

Glinus radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb.

Sin.: *Mollugo radiata* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APY, CEN, COA). URY(TAC).

Mollugo L.

Mollugo pentaphylla L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(SCA).

Mollugo verticillata L.

Sin.: *Mollugo arenaria* Kunth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CEN, COA, PAI, PHA). URY(MON, PAY).

MONIMIACEAE

Hennecartia J. Poiss.

Hennecartia omphalandra J. Poiss.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, SPE).

Laurelia Juss., nom. cons.

Laurelia sempervirens (Ruiz & Pav.) Tul.

Sin.: *Atherosperma sempervirens* (Ruiz & Pav.) Baill., *Laurelia aromatica* Juss. ex Poir., nom. illeg. superfl., *Laurelia serrata* Bertero, *Pavonia sempervirens* Ruiz & Pav., *Thiga chilensis* Molina

Árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Mollinedia Ruiz & Pav.

Mollinedia argyrogyna Perkins

Arbolito. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR).

Mollinedia boracensis Peixoto

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Mollinedia clavigera Tul.

Sin.: *Mollinedia blumenaviana* Perkins, *Mollinedia pfitzeriana* Perkins

Arbusto. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mollinedia elegans Tul.

Sin.: *Mollinedia fruticulosa* Perkins,

Mollinedia hatschbachii Peixoto

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mollinedia eugeniifolia Perkins

Arbusto o árbol. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Mollinedia howeana Perkins

Arbolito. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

Mollinedia leucantha Molz & D. Silveira

Árbol. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Mollinedia luizae Peixoto

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Mollinedia ovata Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins

Sin.: *Citrosma schottiana* Spreng., *Mollinedia calodonta* Perkins, *Mollinedia chrysolaena* Perkins, *Mollinedia floribunda* Tul.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mollinedia triflora (Spreng.) Tul.

Sin.: *Citrosma triflora* Spreng., *Citrosma triflora* Spreng., *Mollinedia chrysophylla* Perkins

Arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mollinedia uleana Perkins

Sin.: *Mollinedia iomalla* Perkins

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mollinedia widgrenii A. DC.Sin.: *Mollinedia warmingii* Perkins

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Peumus Molina, nom. cons.**Peumus boldus** MolinaSin.: *Boldea boldus* (Molina) Looser,*Boldea fragrans* (Ruiz & Pav.) Gay,*Boldus chilensis* Molina, *Peumus fragrans*(Ruiz & Pav.) Pers., *Ruizia fragrans* Ruiz

& Pav.

Arbolito o árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

MONTIACEAE**Calandrinia** Kunth, nom. cons.**Calandrinia acaulis** KunthSin.: *Calandrinia megarhiza* Hemsl.,*Calandrinia saltensis* Hauman, *Claytonia**megarhiza* (Hemsl.) Kuntze, nom. illeg.,*Lewisia megarhiza* (Hemsl.) MacBryde,*Oreobroma megarhizum* (Hemsl.) Standl.& Steyerl., *Oreobroma mexicanum* Rydb.

Hierba. Nativa. 2500-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ATA).

Calandrinia affinis Gillies ex Arn.

Hierba. Endémica. 1500-4500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Calandrinia caespitosa Gillies ex Arn.Sin.: *Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn.var. *skottsbergii* (Gand.) Añon,*Calandrinia densa* Phil., nom. illeg.,*Calandrinia densiflora* Phil., hom. illeg.,*Calandrinia diffusa* Gillies ex Arn.,*Calandrinia gayana* Barnéoud var.*glomerata* Reiche, *Calandrinia rupestris*Barnéoud, *Calandrinia rupestris* Barnéoudvar. *skottsbergii* (Gand.) Skottsb.,*Calandrinia skottsbergii* Gand., *Claytonia**caespitosa* (Gillies ex Arn.) Kuntze,*Claytonia diffusa* (Gillies & Hook.) Kuntze,hom. illeg., *Claytonia rupestris* (Barnéoud)

Kuntze

Hierba. Endémica. 300-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, ARA, AIS, MAG, RME).

Calandrinia carolinii Hershk. & D.I. FordSin.: *Baitaria acaulis* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 2900-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC.Sin.: *Calandrinia bonariensis* Hauman,*Calandrinia caulescens* Kunth, *Calandrinia**feltonii* Skottsb., *Talinum ciliatum* Ruiz &

Pav.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, SAL, TDF, TUC). CHL(VAL, LBO, BIO, LLA, RME).

Calandrinia colchaguensis Barnéoud

Hierba. Nativa. 900-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Calandrinia compacta BarnéoudSin.: *Calandrinia armeriifolia* Phil.,*Calandrinia occulta* Phil.

Hierba. Nativa. 500-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

Calandrinia compressa Schrad. ex DC.Sin.: *Calandrinia gaudichaudii* Barnéoud,*Calandrinia macilenta* Barnéoud,*Calandrinia procumbens* Moris,*Calandrinia tenella* Hook. & Arn.,*Calandrinia virgata* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Calandrinia fuegiana Gand.Sin.: *Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn.var. *australis* Skottsb.

Hierba. Endémica. 600-1200 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Calandrinia graminifolia Phil.Sin.: *Calandrinia affinis* Gillies ex Arn. var.*graminifolia* (Phil.) Reiche

Hierba. Nativa. 1800-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Calandrinia jompomae Hershk.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(BIO, LRI, LLA).

Calandrinia monandra (Ruiz & Pav.) DC.Sin.: *Corrigiola deltoidea* Hook. & Arn.,*Monocosmia corrigioides* Fenzl,*Monocosmia monandra* (Ruiz & Pav.)Baill., *Talinum monandrum* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Calandrinia nitida (Ruiz & Pav.) DC.Sin.: *Calandrinia axilliflora* Barnéoud,*Calandrinia multicaulis* Phil., *Talinum**diffusum* Colla, *Talinum nitidum* Ruiz &

Pav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, LSR, RME).

Calandrinia ranunculina J.M. Watson,
A.R. Flores & Elvebakk
Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Cistanthe Spach

Cistanthe aegialitis (F. Phil.) Carolin ex
Hershk.
Sin.: *Calandrinia aegialitis* F. Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Cistanthe arenaria (Cham.) Carolin ex
Hershk.
Sin.: *Calandrinia arenaria* Cham.,
Calandrinia arenaria Cham. var.
chamissoi (Barnéoud) Reiche, *Calandrinia*
arenaria Cham. var. *subverticillata* (Phil.)
Reiche, *Calandrinia chamissoi* Barnéoud,
Calandrinia nana Phil., *Calandrinia solisii*
Phil., *Calandrinia subverticillata* Phil.,
Calandrinia venulosa Hook. & Arn.,
Cistanthe chamissoi (Barnéoud) Carolin
ex Hershk.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(RNE). CHL(ATA, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Cistanthe cabreræ (Añon) Peralta
Sin.: *Calandrinia cabreræ* Añon
Hierba. Endémica. 1800-2500 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA).

Cistanthe cachinalensis (Phil.) Peralta &
D.I. Ford
Sin.: *Calandrinia cachinalensis* Phil.,
Calandrinia taltalensis I.M. Johnst.
Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cistanthe celedoniana J.M. Watson,
A.R. Flores & Elvebakk
Hierba. Endémica. 0-2100 m.
Países: CHL(VAL).

Cistanthe cephalophora (I.M. Johnst.)
Carolin ex Hershk.
Sin.: *Calandrinia cephalophora* I.M.
Johnst.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Cistanthe chrysantha (I.M. Johnst.)
Peralta & D.I. Ford
Sin.: *Calandrinia chrysantha* I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT).

Cistanthe coquimbensis (Barnéoud)
Carolin ex Hershk.
Sin.: *Calandrinia coquimbensis* Barnéoud
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Cistanthe crassifolia (Phil.) Carolin ex
Hershk.
Sin.: *Calandrinia crassifolia* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Cistanthe cymosa (Phil.) Hershk.
Sin.: *Calandrinia cymosa* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cistanthe fenzlii (Barnéoud) Carolin ex
Hershk.
Sin.: *Calandrinia fenzlii* Barnéoud,
Calandrinia lancifolia Phil., *Calandrinia*
sanguinea Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO, BIO, ARA).

Cistanthe floresiorum J.M. Watson
Hierba. Endémica. 1100-1200 m.
Países: CHL(ATA).

Cistanthe frigida (Barnéoud) Peralta
Sin.: *Calandrinia frigida* Barnéoud,
Calandrinia macrocalyx Hauman,
Calandrinia picta Gillies ex Arn. var. *frigida*

(Barnéoud) Reiche, *Cistanthe macrocalyx*
(Hauman) Carolin ex Hershk., *Cistanthe*
picta (Gillies ex Arn.) Carolin ex Hershk.
var. *frigida* (Barnéoud) Hershk.
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA,
COQ, VAL, RME).

Cistanthe grandiflora (Lindl.) Schltdl.
Sin.: *Calandrinia discolor* Schrad.,
Calandrinia glauca Schrad. ex DC.,
Calandrinia grandiflora Lindl., *Calandrinia*
speciosa Lehm., *Calandrinia spectabilis*
Otto & Dietr., *Cistanthe discolor* (Schrad.)
Spach, *Cistanthe grandiflora* (Lindl.)
Carolin ex Hershk., comb. superfl.,
Cistanthe speciosa (Lehm.) Lilja ex
Heynh.
Hierba. Endémica. 0-2200 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Cistanthe humilis (Phil.) Peralta
Sin.: *Calandrinia humilis* Phil., *Calandrinia*
oblongifolia Barnéoud var. *humilis* (Phil.)
Reiche
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

Cistanthe josetomasallendeana Hershk.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(COQ).

Cistanthe lamprosperma (I.M. Johnst.)
Peralta & D.I. Ford
Sin.: *Calandrinia lamprosperma* I.M.
Johnst.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT).

Cistanthe laxiflora (Phil.) Peralta & D.I.
Ford
Sin.: *Calandrinia laxiflora* Phil.
Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Cistanthe litoralis (Phil.) Carolin ex Hershk.

Sin.: *Calandrinia litoralis* Phil.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(ATA).

Cistanthe longiscapa (Barnéoud) Carolin ex Hershk.

Sin.: *Calandrinia longiscapa* Barnéoud

Hierba. Endémica. 0-3800 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cistanthe mucronulata (Meyen) Carolin ex Hershk.

Sin.: *Calandrinia mucronulata* Meyen

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO, MAU).

Cistanthe neominata J.M. Watson

Sin.: *Cistanthe subspeciosa* Hershk., nom. inval.

Hierba. Endémica. -700 m.

Países: CHL(ATA).

Cistanthe oblongifolia (Barnéoud) Carolin ex Hershk.

Sin.: *Calandrinia oblongifolia* Barnéoud, *Calandrinia stricta* Phil., *Cistanthe stricta* (Phil.) Peralta

Hierba. Endémica. 2800-3300 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

Cistanthe philhershkovitziana Hershk.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Cistanthe picta (Gillies ex Arn.) Carolin ex Hershk.

Sin.: *Calandrinia picta* Gillies ex Arn., *Calandrinia picta* Gillies ex Arn. var. *portulacifolia* (Phil.) Hicken, *Calandrinia portulacifolia* Phil., *Calandrinia villanuevae* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4200 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Cistanthe portulacifolia (Phil.) Teillier & S.T. Ibáñez

Sin.: *Calandrinia portulacifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 3800-4100 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Cistanthe thyrsoides (Reiche) Peralta & D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia thyrsoides* Reiche

Hierba. Endémica. 0-2900 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA, COQ).

Cistanthe trigona (Colla) Hershk.

Sin.: *Claytonia trigona* (Colla) Kuntze, *Talinum trigonum* Colla

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO).

Cistanthe vicina (Phil.) Carolin ex Hershk.

Sin.: *Calandrinia arenaria* Cham. var. *vicina* (Phil.) Reiche, *Calandrinia vicina* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Cistanthe villanuevae (Phil.) Teillier & S.T. Ibáñez

Sin.: *Calandrinia villanuevae* Phil.

Hierba. Endémica. 3600-3700 m.

Países: CHL(ATA).

Claytonia L.

Claytonia perfoliata Donn ex Willd.

Sin.: *Montia perfoliata* (Donn ex Willd.) Howell

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).

Lenzia Phil.

Lenzia chamaepitys Phil.

Hierba. Endémica. 3600-4400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

Montia L.

Montia fontana L.

Sin.: *Calandrinia cerrateae* Añon, *Calandrinia pusilla* Barnéoud, *Claytonia chamissonis* Eschsch. var. *tenerrima* A. Gray, *Claytonia hallii* A. Gray, *Monocosmia verrucosa* Phil., *Montia alsine-facie* Gilib., *Montia arvensis* Wallr., *Montia chaberti* Gand., *Montia decumbens* St.-Lag., *Montia dipetala* Suksd., *Montia erecta* Steud., *Montia fontana* L. subsp. *amporitana* Sennen, *Montia fontana* L. subsp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters, *Montia fontana* L. subsp. *intermedia* (Beeby) Walters, *Montia fontana* L. subsp. *lamprosperma* (Cham.) Lindb., *Montia fontana* L. subsp. *variabilis* Walters, *Montia fontana* L. var. *chondrosperma* Fenzl, *Montia fontana* L. var. *intermedia* Beeby, *Montia fontana* L. var. *tenerrima* (A. Gray) Fernald & Wiegand, *Montia funstonii* Rydb., *Montia hallii* (A. Gray) Greene, *Montia lamprosperma* Cham., *Montia lamprosperma* Cham. var. *boreo-rivularis* Lindb., *Montia limosa* Decker, *Montia linearifolia* d'Urv., *Montia lusitanica* Samp., *Montia major* Steud., *Montia minima* Rydb., *Montia minor* C.C. Gmel., nom. illeg., *Montia pentandra* Willd. ex Cham., *Montia rivularis* C.C. Gmel., *Montia rivularis* C.C. Gmel. f. *aquatica* Glück, *Montia rivularis* C.C. Gmel. f. *terrestris* Glück, *Montia stenophylla* Rydb., *Montia tenella* Steud., *Montia terrestris* Dumort., *Montia verna* Neck., nom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-4500 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME). URY(SJO).

Montiopsis Kuntze

Montiopsis andicola (Gillies) D.I. Ford
Sin.: *Calandrinia andicola* Gillies, *Calandrinia andicola* Gillies var. *denticulata* (Gillies) Hicken, *Calandrinia denticulata* Gillies, *Calandrinia denticulata* Gillies var. *andicola* (Gillies) Reiche, *Calandrinia denticulata* Gillies var. *echinata* Barnéoud, *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *lanceolata* Hauman, *Calandrinia oligantha* Phil., *Calandrinia saxifraga* Barnéoud, *Calandrinia saxifraga* Barnéoud var. *oligantha* (Phil.) Reiche, *Calandrinia tricolor* Phil.

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Montiopsis berteroa (Phil.) D.I. Ford
Sin.: *Calandrinia berteroa* Phil., *Calandrinia floribunda* Phil., *Calandrinia rosea* Phil.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Montiopsis capitata (Hook. & Arn.) D.I. Ford
Sin.: *Calandrinia capitata* Hook. & Arn., *Calandrinia capituligera* Phil., *Calandrinia eritrichioides* Phil., *Calandrinia erythrocoma* Phil., *Calandrinia petiolata* Phil., *Calandrinia prostrata* Phil.

Hierba. Endémica. 800-3000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(AYP, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, RME).

Montiopsis cistiflora (Gillies ex Arn.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia cistiflora* Gillies ex Arn., *Calandrinia dianthoides* Phil., *Calandrinia splendens* Barnéoud, *Calandrinia splendens* Barnéoud var. *dianthoides* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 1700-2700 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Montiopsis conferta (Gillies ex Arn.) Peralta

Sin.: *Calandrinia caesia* F. Phil., *Calandrinia conferta* Gillies ex Arn., *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *hirtella* (Phil.) Reiche, *Calandrinia glandulifera* Phil., *Calandrinia hirtella* Phil., *Calandrinia rahmeri* Phil., *Calandrinia vidali* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(MEN). CHL(MAU).

Montiopsis copiapina (Phil.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia copiapina* Phil., *Calandrinia polia* Phil.

Hierba. Endémica. 1900-4300 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

Montiopsis cumingii (Hook. & Arn.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia cumingii* Hook. & Arn., *Montiopsis boliviana* Kuntze

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, MAU, RME).

Montiopsis demissa (Phil.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia demissa* Phil., *Calandrinia depressa* Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, RME).

Montiopsis gayana (Barnéoud) D.I. Ford
Sin.: *Calandrinia acutisepala* Añon, *Calandrinia calycotricha* Phil., *Calandrinia gayana* Barnéoud, *Calandrinia multibracteata* Hauman, *Calandrinia patagonica* Speg., *Calandrinia tenuifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 500-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Montiopsis gilliesii (Hook. & Arn.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia canescens* Phil., *Calandrinia gilliesii* Hook. & Arn., *Calandrinia leucotricha* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *sessiliflora* (Phil.) Hauman, *Calandrinia sessiliflora* Phil., *Calandrinia setosa* Phil. var. *longifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Montiopsis glomerata (Phil.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia callithrix* Phil., *Calandrinia glomerata* Phil., *Calandrinia leucocephala* Phil.

Hierba. Endémica. 2700-4000 m.

Países: ARG(MEN, SAL, SJU). CHL(ATA, COQ).

Montiopsis modesta (Phil.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia modesta* Phil.

Hierba. Endémica. 1900-4000 m.

Países: ARG(LRI, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

Montiopsis parviflora D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia bandurrae* Phil., *Calandrinia parviflora* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 500-2600 m.

Países: CHL(AYP, ATA, COQ).

Montiopsis polycarpoides (Phil.) Peralta
 Sin.: *Calandrinia polycarpoides* Phil.,
Calandrinia polycarpoides (Phil.) R.
 Franz
 Hierba. Nativa. 1500-2500 m.
 Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
 CHL(ANT, VAL).

Montiopsis potentilloides (Barnéoud)
 D.I. Ford
 Sin.: *Calandrinia nivalis* Phil., *Calandrinia*
potentilloides Barnéoud, *Calandrinia*
sericea Hook. & Arn. var. *uspallatensis*
 (Phil.) Reiche, *Calandrinia setosa* Phil.,
Calandrinia uspallatensis Phil., *Montiopsis*
uspallatensis (Phil.) D.I. Ford
 Hierba. Endémica. 2300-4200 m.
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,
 VAL, RME).

Montiopsis ramosissima (Hook. & Arn.)
 D.I. Ford
 Sin.: *Calandrinia landbeckii* Phil.,
Calandrinia poeppigiana Walp.,
Calandrinia ramosissima Hook. & Arn.
 Hierba. Endémica. 0-1600 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
 RME).

Montiopsis sericea (Hook. & Arn.) D.I.
 Ford
 Sin.: *Calandrinia argentea* Phil.,
Calandrinia ferruginea Barnéoud,
Calandrinia potentilloides Barnéoud var.
minor Gay, *Calandrinia sericea* Hook. &
 Arn., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var.
aequipes Hook. & Arn., *Calandrinia*
sericea Hook. & Arn. var. *longipes* Hook.
 & Arn., *Calandrinia sericea* (Hook. &
 Arn.) E. Franz
 Hierba. Endémica. 1800-2500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Montiopsis trifida (Hook. & Arn.) D.I.
 Ford

Sin.: *Calandrinia aurea* Barnéoud,
Calandrinia calycina Phil., hom. illeg.,
Calandrinia capitata Hook. & Arn. var.
prolifera (Phil.) Reiche, *Calandrinia*
caulescens Phil., hom. illeg., *Calandrinia*
involucrata Phil., *Calandrinia leucopogon*
 Phil., *Calandrinia montana* Phil.,
Calandrinia prolifera Phil., *Calandrinia*
trifida Hook. & Arn., *Calandrinia*
montana (Phil.) R. Franz
 Hierba. Endémica. 0-2000 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
 COQ, VAL, LBO, RME).

Montiopsis umbellata (Ruiz & Pav.) D.I.
 Ford
 Sin.: *Calandrinia chubutensis* Speg.,
Calandrinia hispida Phil., *Calandrinia*
phalacra Phil., *Calandrinia sanfurgoi* Phil.,
Calandrinia sericea Hook. & Arn. var.
phalacra (Phil.) Reiche, *Calandrinia*
umbellata (Ruiz & Pav.) DC.,
Calandrinia umbellata (Ruiz & Pav.)
 R. Franz, *Colobanthus chubutensis*
 (Speg.) Macloskie, *Talinum umbellatum*
 Ruiz & Pav.
 Hierba. Endémica. 700-3000 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
 CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
 LLA, RME).

Phemeranthus Raf.

Phemeranthus punae (R.E. Fr.) Eggli &
 Nyffeler
 Sin.: *Calandrinia punae* R.E. Fr., *Talinum*
punae (R.E. Fr.) Carolin
 Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Schreiteria Carolin

Schreiteria macrocarpa (Speg.) Carolin
 Sin.: *Calandrinia macrocarpa* Speg.
 Subarbusto. Endémica. 2000-3000 m.
 Países: ARG(TUC).

Silvaea Phil.

Silvaea amarantoides Phil.
 Sin.: *Cistanthe amarantoides* (Phil.)
 Carolin ex Hershk., *Philippiamra*
amaranthoides (Phil.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-1300 m.
 Países: CHL(ANT, ATA).

Silvaea arancioana (Peralta) Teillier &
 S.T. Ibáñez
 Sin.: *Cistanthe arancioana* Peralta,
Philippiamra arancioana (Peralta) Hershk.
 Hierba. Endémica. 900-2700 m.
 Países: CHL(ANT).

Silvaea barneoudii (Phil.) Teillier & S.T.
 Ibáñez
 Sin.: *Calandrinia barneoudii* Phil.
 Hierba. Endémica. 1900-3800 m.
 Países: CHL(ANT, ATA).

Silvaea calycina (Phil.) Teillier & S.T.
 Ibáñez
 Sin.: *Calandrinia calycina* Phil.,
Calandrinia copiapensis Phil., *Cistanthe*
calycina (Phil.) Carolin ex Hershk.,
Philippiamra calycina (Phil.) Hershk.
 Hierba. Nativa. 0-1400 m.
 Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Silvaea capitata Phil.
 Hierba. Endémica. 200-600 m.
 Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Silvaea celosioides Phil. var. **altiplanica**
 Teillier & S.T. Ibáñez
 Hierba. Nativa. 1200-3700 m.
 Países: CHL(AYP).

Silvaea celosioides Phil. var. **celosioides**

Sin.: *Cistanthe celosioides* (Phil.) Carolin ex Hershk., *Philippiamra celosioides* (Phil.) Kuntze, *Philippiamra fastigiata* (Phil.) Pax & K. Hoffm., *Silvaea fastigiata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Silvaea corrigioloides Phil.

Hierba. Endémica. 500-700 m.

Países: CHL(ATA).

Silvaea densiflora (Barnéoud) Teillier & S.T. Ibáñez

Sin.: *Calandrinia densiflora* Barnéoud, *Calandrinia fasciculata* Phil., *Calandrinia spicata* Phil., *Calandrinia viridis* Phil., *Cistanthe densiflora* (Barnéoud) Hershk., *Philippiamra densiflora* (Barnéoud) Hershk.

Hierba. Endémica. 1000-3400 m.

Países: ARG(MEN, SAL, SJU).
CHL(ATA, COQ).

Silvaea minuscula (Añón) S.T. Ibáñez & Teillier

Sin.: *Calandrinia minuscula* Añón, *Cistanthe minuscula* (Añón) Peralta, *Philippiamra minuscula* (Añón) Hershk.

Hierba. Endémica. 2500-4500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
CHL(ANT).

Silvaea pachyphylla Phil.

Sin.: *Philippiamra pachyphylla* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 700-1400 m.

Países: CHL(ANT).

Silvaea salsoloides (Barnéoud) Teillier & S.T. Ibáñez

Sin.: *Calandrinia acuminata* Phil., *Calandrinia calocephala* Phil., *Calandrinia salsoloides* Barnéoud, *Calandrinia*

spicigera Phil., *Cistanthe salsoloides* (Barnéoud) Carolin ex Hershk., *Philippiamra salsoloides* (Barnéoud) Hershk.

Hierba. Endémica. 900-3200 m.

Países: ARG(CAT, SAL, SJU).
CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

MORACEAE

Artocarpus J.R. Forst. & G. Forst., nom. cons.

Artocarpus heterophyllus Lam.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Brosimum Sw., nom. cons.

Brosimum gaudichaudii Trécul

Sin.: *Brosimum gaudichaudii* Trécul f. *macrophyllum* Hassl., *Brosimum pusillum* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Brosimum glaziovii Taub.

Sin.: *Alicastrum glaziovii* (Taub.) Taub.

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg

Sin.: *Brosimopsis lactescens* S. Moore

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Broussonetia L'Hér. ex Vent., nom. cons.

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

Sin.: *Morus papyrifera* L., *Papyrius papyrifera* (L.) Kuntze, *Papyrius polymorphus* Cav.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SFE). CHL(IPA).

Dorstenia Plum. ex L.

Dorstenia brasiliensis Lam.

Sin.: *Dorstenia brasiliensis* Lam. f. *balansae* Chodat, *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *guaranitica* Chodat, *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *major* Chodat & Hassl., *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *palustris* Hassl., *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *tomentosa* (Fisch. & C.A. Mey.) Hassl., *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *tubicina* (Ruiz & Pav.) Chodat & Vischer, *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *typica* Hassl., nom. inval., *Dorstenia montevidensis* Miq., *Dorstenia schulzii* Carauta, C. Valente & Dunn de Araujo, *Dorstenia tomentosa* Fisch. & C.A. Mey., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. f. *major* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. f. *subexcentrica* Hassl., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. f. *typica* Hassl., nom. inval., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. var. *opifera* (Mart.) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CHO, COA, GUA, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, RIV, SAO, TAC).

Dorstenia carautae C.C. Berg

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dorstenia cayapia Vell.

Sin.: *Dorstenia cayapia* Vell. f. *paraguariensis* Hassl., *Dorstenia cayapia* Vell. subsp. *paraguariensis* (Hassl.) C.C. Berg, *Dorstenia paraguariensis* (Hassl.) Carauta

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON, COA, SPE).

Dorstenia hirta Desv.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR).

Dorstenia tenuis Bonpl. ex Bureau

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Notas: Citada para Uruguay (Berg, 2001b) sin indicar localidad o material de referencia.

Dorstenia urceolata Schott

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Dorstenia vitifolia Gardner

Sin.: *Dorstenia bryoniifolia* Mart. ex Miq., *Dorstenia cayapia* Vell. subsp. *vitifolia* (Gardner) C.C. Berg, *Dorstenia morifolia* Fisch. & C.A. Mey.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Ficus L.**Ficus adhatodifolia** Schott

Sin.: *Ficus anthelmintica* Mart., *Ficus anthelmintica* Mart. var. *missionum* Hauman, *Ficus guapoi* D. Parodi, *Ficus morongii* Hassl., *Ficus officinalis* L.B. Sm., *Ficus perforata* (Miq.) Miq. f. *roseiflora* Chodat, *Pharmacosycea adhatodifolia* (Schott) Miq., *Pharmacosycea anthelmintiica* (Mart.) Miq.,

Pharmacosycea radula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Miq. var. *latifolia* Miq.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Ficus calyptroceras (Miq.) Miq.

Sin.: *Ficus calyptroceras* (Miq.) Miq. var. *elliottiana* (S. Moore) Chodat, *Ficus elliottiana* S. Moore, *Ficus rojasii* Hassl., hom. illeg., *Urostigma calyptroceras* Miq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

Ficus carica L.

Arbusto o árbol. Introducida.

Países: ARG(COR). BRA(PAR; RGS; SCA). CHL(ANT, JFE).

Ficus castelviana Dugand

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ficus cestrifolia Schott

Sin.: *Ficus organensis* Miq., *Ficus pohliana* (Miq.) Miq., *Ficus tweediana* (Miq.) Miq., *Urostigma organense* Miq., *Urostigma tweedianum* Miq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

Ficus citrifolia Mill.

Sin.: *Ficus eximia* Schott f. *paraguariensis* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, SPE).

Ficus clusiifolia Schott

Árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Ficus crocata (Miq.) Miq.

Sin.: *Ficus tomentella* (Miq.) Miq., *Urostigma crocatum* Miq., *Urostigma tomentellum* Miq.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Miq.

Sin.: *Urostigma enorme* Mart. ex Miq.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ficus ernanii Carauta, Pederneiras, P.P. de Souza, A.F.P. Machado, M.D.M. Vianna Fil

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(PAI).

Ficus eximia Schott

Sin.: *Ficus glabra* Vell.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché

Sin.: *Ficus acarouaniensis* Benoist, *Ficus doliaria* (Miq.) Miq., *Urostigma doliarium* Miq., *Urostigma gomelleira* (Kunth & C.D. Bouché) Miq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ficus guaranitica Chodat

Árbol. Nativa.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Ficus lagoensis C.C. Berg & Carauta

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.

Sin.: *Ficus diabolica* Herter, *Ficus diabolica* Herter f. *laurina* Herter, *Ficus diabolica* Herter f. *major* Herter, *Ficus*

diabolica Herter f. *minor* Herter, *Ficus horquetensis* Chodat & Vischer, *Ficus ibapohi* Orb. ex Rojas Acosta, *Ficus monckii* Hassl., *Ficus monckii* Hassl. f. *subcuneata* Hassl., *Ficus monckii* Hassl. var. *san-martinianus* Parodi, *Ficus speciosa* Rojas Acosta, *Urostigma luschnathianum* Miq.

Árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CLA, COL, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Ficus obtusifolia Kunth

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ficus obtusiuscula (Miq.) Miq.

Sin.: *Ficus guapoi* D. Parodi var. *minor* D. Parodi, *Ficus mima* Standl., *Ficus perforata* (Miq.) Miq., comb. illeg., *Pharmacosycea obtusiuscula* Miq., *Pharmacosycea perforata* Miq., *Pharmacosycea perforata* Miq. f. *angustifolia* Miq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CON, COA, PAI).

Ficus pertusa L. f.

Sin.: *Ficus arpazusa* Casar., *Ficus elliptica* (Herzog) Herter, comb. illeg., *Ficus prinoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *subtriplinervia* (C. Mart.) Kuntze, *Ficus subtriplinervia* C. Mart.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON).

Ficus pulchella Schott

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ficus rojasii H. Lévl.

Sin.: *Ficus maroma* A. Cast.

Árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Ficus trigona L. f.

Sin.: *Urostigma trigonum* (L. f.) Miq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maclura Nutt., nom. cons.

Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid.

Sin.: *Ioxylon pomiferum* Raf.

Árbol. Introducida.

Países: ARG(COR).

Maclura tinctoria (L.) G. Don subsp. **mora** (Griseb.) Vázq.Avila

Sin.: *Chlorophora mora* (Griseb.) Lillo, *Chlorophora reticulata* Herzog, *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. subsp. *mora* (Griseb.) Hassl., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. var. *mora* (Griseb.) Lillo, *Ioxylon mora* (Griseb.) Kuntze, *Maclura mora* Griseb., *Maclura trilobata* Rojas Acosta

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY, ÑEE, PHA).

Maclura tinctoria (L.) G. Don subsp. **tinctoria**

Sin.: *Broussonetia tinctoria* (L.) Dum. Cours., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. f. *miqueliana* Hassl., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. f. *polyneura* (Miq.) Hassl., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. f. *tataiiba* Hassl., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. var. *zanthoxylon* (L.) Hassl., *Fusticus tinctoria* (L.) Raf., *Maclura polyneura* Miq., *Maclura tinctoria* (L.) G. Don var. *polyneura* (Miq.)

Bureau, *Morus tinctoria* L., *Morus zanthoxylon* L.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Morus L.

Morus alba L.

Sin.: *Morus tatarica* L.

Árbol. Introducida. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, GUA). URY(PAY, RNO).

Paratrophis Blume

Paratrophis insignis (Bureau) E.M. Gardner

Sin.: *Morus insignis* Bureau, *Morus marmolii* Legname, *Morus peruviana* Planch. ex Koidz., *Morus trianae* Leroy

Árbol. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Pseudolmedia Trécul

Pseudolmedia hirtula Kuhlman

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pseudolmedia laevigata Trécul

Sin.: *Pseudolmedia guaranitica* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: PRY(AMA).

Sorocea A. St.-Hil.

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess.Boer

Sin.: *Pseudosorocea bonplandii* Baill., *Sorocea ilicifolia* Miq. f. *laxiflora* Hassl., *Sorocea sylvicola* Chodat, *Sorocea sylvicola* Chodat var. *caaguazuensis* Chodat

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Sorocea hilarii Gaudich.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Sorocea jureiana Romaniuc

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Sorocea saxicola Hassl.

Sin.: *Maclura brasiliensis* (Mart.) Endl. var. *reticulata* Chodat, *Pseudosorocea sprucei* Baill., *Sorocea saxicola* Hassl. f. *subrepanda* Hassl., *Sorocea saxicola* Hassl. var. *dentata* Hassl., *Sorocea sprucei* (Baill.) J.F. Macbr. subsp. *saxicola* (Hassl.) C.C. Berg, *Trophisomia edulis* Rojas Acosta

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

MUNTINGIACEAE

Muntingia L.

Muntingia calabura L.

Árbol. Nativa. 300-600 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

MUSACEAE

Musa L.

Musa ornata Roxb.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Musa velutina H. Wendl. & Drude

Hierba. Introducida.

Países: BRA(SCA).

MYRICACEAE

Morella Lour.

Morella chevalieri Parra-Os.

Sin.: *Myrica pubescens* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *glabra* A. Chev.

Arbusto o árbol. Nativa. 1600-1900 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Morella pavonis (C. DC.) Parra

Sin.: *Myrica pavonis* C. DC.

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-3200 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

MYRISTICACEAE

Virola Aubl.

Virola bicuhyba (Schott) Warb.

Sin.: *Myristica bicuhyba* Schott

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

MYRTACEAE

Acca O. Berg

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

Sin.: *Feijoa obovata* (O. Berg) O. Berg, *Feijoa schenkiana* Kiaersk., *Feijoa sellowiana* (O. Berg) O. Berg, *Orthostemon obovatus* O. Berg, *Orthostemon sellowianus* O. Berg

Arbusto o árbol. Endémica. 500-1400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, PAY, RIV, TAC, TYT).

Amomyrtella Kausel

Amomyrtella guili (Speg.) Kausel

Sin.: *Eugenia guili* Speg., *Myrtus guili* (Speg.) D. Legrand, *Pseudocaryophyllus guili* (Speg.) Burret

Árbol. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Amomyrtus (Burret) D. Legrand & Kausel

Amomyrtus luma (Molina) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia darwinii* Hook. f., *Myrcia lechleriana* Miq., *Myrtus darwinii* (Hook. f.) Barnéoud, *Myrtus luma* Molina, *Myrtus multiflora* Juss. ex J. St.-Hil., *Myrtus valdiviana* Phil., *Pseudocaryophyllus darwinii* (Hook. f.) Burret

Arbusto o árbol. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Amomyrtus meli (Phil.) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Myrtus meli* Phil., *Pseudocaryophyllus meli* (Phil.) Burret

Árbol. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Blepharocalyx O. Berg

Blepharocalyx cruckshanksii (Hook. & Arn.) Nied.

Sin.: *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied., *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *obovatus* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *ovalis* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *pauciflorus* (O. Berg) Reiche, *Eugenia cruckshanksii* Hook. & Arn., *Eugenia divaricata* O. Berg, *Eugenia divaricata* O. Berg var. *obovata* O. Berg, *Eugenia divaricata* O. Berg var. *ovalis* O. Berg, *Eugenia divaricata* O. Berg var. *pauciflora* O. Berg, *Eugenia elliptica* Phil., hom. illeg., *Luma cruckshanksii* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Temu divaricatum* (O. Berg) O. Berg

Arbusto o árbol. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg

Sin.: *Blepharocalyx amarus* O. Berg, *Blepharocalyx angustifolius* O. Berg, *Blepharocalyx angustissimus* O. Berg, *Blepharocalyx brunneus* O. Berg, *Blepharocalyx depauperatus* (Cambess.) O. Berg, *Blepharocalyx gigantea* Lillo, *Blepharocalyx gigantea* Lillo var. *montana* Lillo, *Blepharocalyx lanceolatus* O. Berg var. *arborescens* O. Berg, *Blepharocalyx lanceolatus* O. Berg var. *frutescens* O. Berg, *Blepharocalyx minutiflorus* Mattos & D. Legrand, *Blepharocalyx montanus* Lillo, *Blepharocalyx myrcianthoides* Mattos, *Blepharocalyx picrocarpus* O. Berg, *Blepharocalyx pilosus* O. Berg, *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg f. *catharinae* D. Legrand, *Blepharocalyx*

salicifolius (Kunth) O. Berg var. *longipes* (O. Berg) D. Legrand, *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg var. *tweediei* (Hook. & Arn.) D. Legrand, *Blepharocalyx strictus* O. Berg, *Blepharocalyx suaveolens* (Cambess.) Burret, *Blepharocalyx suaveolens* (Cambess.) Burret var. *abrupticulmen* D. Legrand, *Blepharocalyx suaveolens* (Cambess.) Burret var. *cuneatus* D. Legrand, *Blepharocalyx tweediei* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Blepharocalyx tweediei* (Hook. & Arn.) O. Berg f. *catharinae* (D. Legrand) Mattos, *Blepharocalyx tweediei* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *angustifolius* (O. Berg) D. Legrand, *Blepharocalyx tweediei* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *setentrionalis* Mattos, *Blepharocalyx umbilicata* (Cambess.) Burret var. *paranaensis* Mattos, *Eugenia depauperata* Cambess., *Eugenia ipehuensis* Barb. Rodr., nom. nud., *Eugenia salicifolia* (Kunth) DC., *Eugenia suaveolens* Cambess., *Eugenia tweediei* Hook. & Arn., *Myrcianthes cisplantensis* (Cambess.) O. Berg var. *brevipedunculata* O. Berg, *Myrciaria dichotoma* D. Legrand, *Myrtus salicifolia* Kunth

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Campomanesia Ruiz & Pav.

Campomanesia adamantium (Cambess.) O. Berg

Sin.: *Campomanesia cambessedeano* O. Berg, *Campomanesia cambessedeano* O. Berg var. *nana* D. Legrand, *Campomanesia lancifolia* Barb. Rodr. ex

Chodat & Hassl., nom. nud., *Campomanesia paraguayensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Campomanesia resinosa* Barb. Rodr., *Psidium adamantium* Cambess.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Campomanesia aurea O. Berg

Sin.: *Campomanesia aurea* O. Berg var. *hatschbachii* (Mattos) D. Legrand, *Campomanesia cyanea* O. Berg, *Campomanesia cyanea* O. Berg var. *ovata* O. Berg, *Campomanesia gracilis* Kausel, *Campomanesia hatschbachii* Mattos, *Campomanesia maracayuensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(RIV).

Campomanesia eugenioides (Cambess.) D. Legrand ex Landrum

Sin.: *Campomanesia montana* D. Legrand, *Psidium eugenioides* Cambess.

Arbusto o arbolito. Nativa. 300-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.

Sin.: *Campomanesia guaviroba* (DC.) Kiaersk. var. *insulae* D. Legrand, *Campomanesia guaviroba* (DC.) Kiaersk. var. *itaitiaiae* D. Legrand, *Psidium guaviroba* DC.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, PAI).

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg

Sin.: *Abbevillea rugosa* O. Berg, *Britoa guazumifolia* (Cambess.) D. Legrand ex Landrum, *Britoa hassleriana* Barb. Rodr.

ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Britoa sellowiana* O. Berg, *Psidium guazumifolium* Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, GUA, MIE, PAI, SPE).

Campomanesia littoralis D. Legrand

Sin.: *Campomanesia xanthocarpa* O. Berg var. *littoralis* (D. Legrand) Landrum

Arbusto o árbol. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Campomanesia neriiflora (O. Berg) Nied.

Sin.: *Abbevillea neriiflora* O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Campomanesia pubescens (DC.) O. Berg

Sin.: *Campomanesia affinis* O. Berg, *Campomanesia australis* O. Berg, *Campomanesia campestris* O. Berg, *Campomanesia diversifolia* Barb. Rodr., *Campomanesia hassleri* Barb. Rodr., *Campomanesia obversa* (Miq.) O. Berg, *Campomanesia paranensis* D. Legrand, *Campomanesia trichosepala* Barb. Rodr., *Psidium hians* Mart. ex DC., *Psidium nutans* O. Berg, *Psidium obversum* Miq., *Psidium pubescens* DC., *Psidium rufinervum* Barb. Rodr.

Arbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).

Campomanesia reitziana D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Campomanesia rhombea O. Berg

Sin.: *Campomanesia rhombea* O. Berg var. *grandifolia* O. Berg

Árbol. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Campomanesia schlechtendaliana (O. Berg) Nied.

Sin.: *Abbevillea schlechtendaliana* O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Campomanesia sessiliflora (O. Berg) Mattos

Sin.: *Abbevillea bullata* Barb. Rodr., *Campomanesia apaensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Campomanesia bullata* (Barb. Rodr.) Chodat & Hassl., *Campomanesia igatimiensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Campomanesia mollicarpa* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Campomanesia nitidifolia* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Campomanesia rugosa* O. Berg var. *lanuginosa* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Campomanesia sessiliflora* (O. Berg) Mattos var. *bullata* (Barb. Rodr.) Landrum, *Campomanesia sessiliflora* (O. Berg) Mattos var. *lanuginosa* (Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl.) Landrum

Arbusto. Nativa. 100-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, SPE).

Campomanesia thea (Seem.) Gilg & Strauss

Sin.: *Citrosma thea* Seem.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Campomanesia xanthocarpa O. Berg

Sin.: *Campomanesia crenata* O. Berg, *Campomanesia dusenii* Kausel, *Campomanesia malifolia* O. Berg,

Campomanesia rhombea O. Berg var. *kleinii* D. Legrand, *Campomanesia xanthocarpa* O. Berg var. *malifolia* (O. Berg) D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI).

Curitiba Salywon & Landrum

Curitiba prismatica (D. Legrand) Salywon & Landrum

Sin.: *Eugenia prismatica* D. Legrand, *Mosiera prismatica* (D. Legrand) Landrum

Arbusto o árbol. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eucalyptus L'Hér.

Eucalyptus camaldulensis Deginani

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Benth.

Árbol. Introducida. 400-1400 m.

Países: ARG(COR). BRA(PAR, RGS, SCA).

Eucalyptus globulus Labill.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, JFE, IPA).

Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden

Árbol. Introducida. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA).

Eucalyptus quadrangulata H. Deane & Maiden
Árbol. Introducida. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ).

Eucalyptus robusta Sm.
Árbol. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eucalyptus sideroxylon A. Cunn. & Woolls
Árbol. Introducida. 400-500 m.
Países: ARG(COR). BRA(PAR).

Eucalyptus tereticornis Sm.
Árbol. Introducida. 400-500 m.
Países: ARG(COR). BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia L.

Eugenia acutata Miq.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eugenia adenantha O. Berg
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA, PHA).

Eugenia angelyana Mattos
Sin.: *Eugenia krapovickasiana* Mattos
Árbol. Endémica. 700.
Países: BRA(SCA).

Eugenia angustissima O. Berg
Sin.: *Eugenia herbacea* O. Berg, *Eugenia leptophylla* Barb. Rodr., *Myrciaria leptophylla* (Barb. Rodr.) Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). PRY(APA, CAN).

Eugenia anomala D. Legrand
Sin.: *Eugenia humilis* (O. Berg) Benth. ex Nederl., hom. illeg., *Eugenia myrcianthes* Nied. var. *nana* D. Legrand, *Eugenia*

vallsiana Mattos, *Hexachlamys anomala* (D. Legrand) D. Legrand, *Hexachlamys humilis* O. Berg
Subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(ART, TAC).

Eugenia arenosa Mattos
Sin.: *Eugenia hagelundii* Mattos
Subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(PAI).

Eugenia astringens Cambess.
Sin.: *Eugenia umbelliflora* O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia aurata O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Eugenia bacopari D. Legrand
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia beaurepairiana (Kiaersk.) D. Legrand
Sin.: *Myrtus beaurepairiana* Kiaersk.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia bimarginata DC.
Sin.: *Eugenia maracayuensis* Barb. Rodr., *Eugenia pleurantha* O. Berg, *Eugenia umbellata* Spreng., *Myrciaria atiraensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).
Notas: Su presencia en Argentina es dudosa (Rotman 1995).

Eugenia brasiliensis Lam.
Arbusto o árbol. Nativa. 100-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia brunneopubescens Mazine
Árbol. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Eugenia bunchosiifolia Nied.
Sin.: *Phyllocalyx grandifolius* O. Berg
Arbusto. Nativa. 400.
Países: BRA(PAR).

Eugenia burkartiana (D. Legrand) D. Legrand
Sin.: *Pseudocaryophyllus burkartianus* D. Legrand
Árbol. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA).

Eugenia candolleana DC.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eugenia catharinae O. Berg
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia catharinensis D. Legrand
Arbusto o árbol. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia cerasiflora Miq.
Sin.: *Eugenia itacolumensis* O. Berg, *Eugenia lucida* Cambess., *Luma lucidissima* Herter
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia cereja D. Legrand
Sin.: *Eugenia paranaguensis* Mattos & D. Legrand
Árbol. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia chlorophylla O. Berg
Sin.: *Eugenia multiovulata* Mattos & D. Legrand
Árbol. Nativa. 900.

- Países: BRA(PAR, SCA).
- Eugenia coetanea** O. Berg
Árbol. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Eugenia copacabanensis** Kiaersk.
Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR).
- Eugenia corrientina** Barb. Rodr.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APA, CAU, CAN).
- Eugenia dimorpha** O. Berg
Sin.: *Eugenia dimorpha* O. Berg var. *australis* Mattos, *Luma dimorpha* (O. Berg) Herter
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).
- Eugenia disperma** Vell.
Sin.: *Eugenia oblongata* O. Berg, *Eugenia striata* Mattos & D. Legrand
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).
- Eugenia dodonaeifolia** Cambess.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Eugenia egensis** DC.
Sin.: *Eugenia parodiana* Morong
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, COA, PHA, SPE).
- Eugenia excelsa** O. Berg
Sin.: *Eugenia cuspidata* O. Berg, hom. illeg., *Eugenia obovata* O. Berg, hom. illeg., *Eugenia rostratofalcata* Mattos & D. Legrand
Árbol. Nativa. 700-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Eugenia expansa** Spring ex Mart.
Sin.: *Eugenia cuprea* (O. Berg) Mattos, *Eugenia grandisepala* Mattos, *Phyllocalyx cupreus* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).
- Eugenia florida** DC.
Sin.: *Eugenia gardneriana* O. Berg, *Eugenia moraviana* O. Berg, *Eugenia moraviana* O. Berg var. *gardneriana* (O. Berg) Mattos, *Eugenia moraviana* O. Berg var. *impunctata* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).
- Eugenia fusca** O. Berg
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Eugenia gracillima** Kiaersk.
Sin.: *Eugenia klappenbachiana* Mattos & D. Legrand, *Eugenia multipunctata* Mattos & D. Legrand, hom. illeg., *Eugenia neomultipunctata* Sobral
Árbol. Nativa. 400-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Eugenia hamiltonii** (Mattos) Mattos
Sin.: *Eugenia meridionalis* Mattos, *Eugenia sehnemiana* (Mattos) Mattos, *Hexachlamys hamiltonii* Mattos, *Hexachlamys hamiltonii* Mattos var. *sehnemiana* Mattos, *Hexachlamys sehnemiana* (Mattos) Mattos
Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Eugenia handroana** D. Legrand
Sin.: *Eugenia lepida* Mattos & D. Legrand
Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Eugenia handroi** (Mattos) Mattos
Sin.: *Hexachlamys handroi* Mattos, *Hexachlamys itatiaiensis* Mattos var. *kleinii* D. Legrand, *Hexachlamys kleinii* (D. Legrand) Mattos
Árbol. Nativa. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Eugenia hiemalis** Cambess. var. *hiemalis*
Sin.: *Eugenia cycliantha* D. Legrand, *Myrciaria itacurubiensis* Barb. Rodr., nom. nud.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, ÑEE, PAI).
- Eugenia hiemalis** Cambess. var. *marginata* (O. Berg) D. Legrand
Sin.: *Eugenia polycarpa* O. Berg var. *marginata* O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(COA, PAI).
- Eugenia ilhensis** O. Berg
Árbol. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(CON, PHA).
- Eugenia involucrata** DC.
Sin.: *Eugenia aemilii* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Eugenia chodatii* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Eugenia incertissima* Sobral, *Eugenia involucrata* DC. var. *minutifolia* Mattos & D. Legrand, *Eugenia jaguariaivensis* Mattos, *Eugenia jaguariaivensis* Mattos var. *brevipedunculata* Mattos, *Eugenia minutifolia* (Mattos & D. Legrand) Mattos, *Eugenia obtusa* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Eugenia paraguayensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Eugenia stricta* (O. Berg) Kiaersk., *Eugenia suffrutescens* Nied., *Phyllocalyx herbaceus* O. Berg, *Phyllocalyx involucratus* (DC.) O. Berg, *Phyllocalyx laevigatus* O. Berg,

Phyllocalyx strictus O. Berg, *Stenocalyx involucratus* (DC.) Kausel

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, COA, GUA). URY(PAY).

Eugenia janeirensis O. Berg

Árbol. Nativa. 900.

Países: BRA(PAR).

Eugenia joenssonii Kausel

Sin.: *Eugenia lanosa* Mattos & D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia kleinii D. Legrand var. **aristata**

D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 900.

Países: BRA(PAR).

Eugenia kleinii D. Legrand var. **kleinii**

Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia leptoclada O. Berg

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Eugenia ligustrina (Sw.) Willd.

Sin.: *Eugenia ophthalmantha* Kiaersk., *Myrtus ligustrina* Sw.

Árbol. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia lilloana D. Legrand

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Eugenia longipedunculata Nied.

Sin.: *Eugenia blasthantha* (O. Berg) D. Legrand, *Stenocalyx blasthantha* O. Berg, *Stenocalyx longipes* O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 900-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia macrobracteolata Mattos

Árbol. Endémica. 100-200 m.

Países: BRA(PAR).

Eugenia magnibracteolata Mattos & D.

Legrand

Árbol. Endémica. 100.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia malacantha D. Legrand

Sin.: *Calycorectes lourteigii* Mattos & D.

Legrand, *Eugenia lourteigii* (Mattos & D. Legrand) Mattos

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia mansoi O. Berg

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI). URY(PAY).

Eugenia mattosii D. Legrand

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Eugenia melanogyna (D. Legrand)

Sobral

Sin.: *Eugenia stictosepala* Kiaersk. var. *melanogyna* D. Legrand

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia membranifolia Nied.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Eugenia modesta DC.

Sin.: *Eugenia racemulosa* O. Berg

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia mosenii (Kausel) Sobral

Sin.: *Myrceugenia mosenii* Kausel

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia multicostata D. Legrand var. **multicostata**

Sin.: *Eugenia multicostata* D. Legrand var. *octocostata* D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia myrcianthes Nied.

Sin.: *Eugenia edulis* Benth. & Hook. f. ex Griseb., hom. illeg., *Eugenia montevidensis* Mattos, *Hexachlamys edulis* (O. Berg) Kausel & D. Legrand, *Hexachlamys excelsa* (Cambess.) Mattos, *Myrcia gemmiflora* O. Berg, *Myrcia sparsifolia* Barb. Rodr., *Myrcianthes edulis* O. Berg, *Myrtus excelsa* Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

Eugenia myrciariifolia Soares-Silva & Sobral

Arbusto. Endémica. 200-800 m.

Países: BRA(PAR).

Eugenia neomyrtifolia Sobral

Sin.: *Eugenia myrtifolia* Cambess., *Eugenia paranapitanguensis* Mattos

Árbol. Nativa. 400-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia neosilvestris Sobral

Sin.: *Stenocalyx silvestris* O. Berg

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

Eugenia neotristis Sobral

Sin.: *Eugenia tristis* D. Legrand, hom. illeg.

Árbol. Endémica. 100-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia neoverrucosa Sobral

Sin.: *Eugenia verrucosa* D. Legrand, hom. illeg.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia nutans O. Berg

Sin.: *Eugenia eurysepala* Kiaersk., *Eugenia schadrackiana* D. Legrand

Árbol. Nativa. 800-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia oeidocarpa O. Berg

Sin.: *Eugenia dimorpha* O. Berg var. *oeidocarpa* (O. Berg) Mattos

Arbusto. Nativa. 1100.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia pachyclada D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia pantagensis O. Berg

Arbusto. Nativa. 600-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Eugenia paracatuana O. Berg

Árbol. Nativa.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI, SPE).

Eugenia piloesis Cambess.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Eugenia piresiana Cambess.

Árbol. Nativa. 400.

Países: BRA(PAR).

Eugenia pisiformis Cambess.

Sin.: *Eugenia microcarpa* O. Berg

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia pitanga (O. Berg) Kiaersk.

Sin.: *Eugenia camporum* Morong, *Eugenia montigena* Barb. Rodr., *Eugenia pitanga* (O. Berg) Kiaersk. var. *camporum* (Morong) Mattos, *Stenocalyx pitanga* O. Berg

Arbusto. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, GUA, MIE, PAI).

Eugenia platysema O. Berg

Sin.: *Eugenia floscellus* D. Legrand, *Eugenia oblongata* Mattos & D. Legrand, hom. illeg., *Eugenia pinhaesensis* Mattos

Árbol. Nativa. 900-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia pluriflora DC.

Sin.: *Eugenia bresolinii* D. Legrand, *Eugenia osoriana* Mattos & D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Eugenia prasina O. Berg

Sin.: *Eugenia stictosepala* Kiaersk.

Árbol. Nativa. 300.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia pruinosa D. Legrand

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia pseudomalacantha D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia punicifolia (Kunth) DC.

Sin.: *Eugenia chacoensis* (D. Legrand) Kausel, *Eugenia decorticans* O. Berg, *Eugenia diantha* O. Berg, *Eugenia flava* O. Berg, *Eugenia kunthiana* DC., *Eugenia ovalifolia* Cambess., *Eugenia ovalifolia* Cambess. var. *chacoensis* D. Legrand, *Eugenia rubrescens* Mattos & D. Legrand,

Eugenia triphylla O. Berg, *Myrtus punicifolia* Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Eugenia pyriformis Cambess. var. **argentea** Mattos & D. Legrand

Árbol. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Eugenia pyriformis Cambess. var. **pyriformis**

Sin.: *Eugenia dumicola* Barb. Rodr., *Eugenia hassleriana* Barb. Rodr., *Eugenia pyriformis* Cambess. f. *ponhi* D. Legrand, *Eugenia pyriformis* Cambess. var. *uvalha* (Cambess.) D. Legrand ex Landrum, *Eugenia turbinata* O. Berg, *Eugenia uvalha* Cambess., *Myrciaria dumicola* (Barb. Rodr.) Chodat & Hassl., *Pseudomyrcianthes pyriformis* (Cambess.) Kausel

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(SAO).

Eugenia quiriri Sobral & F.C.S. Vieira

Árbol. Endémica. 900-1300 m.

Países: BRA(SCA).

Eugenia ramboi D. Legrand

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Eugenia reitziana D. Legrand

Subarbusto. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Eugenia repanda O. Berg

Sin.: *Luma repanda* (O. Berg) Herter

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN). URY(ART, RNO, SOR).

Eugenia rojasiana (D. Legrand) Mattos
Sin.: *Hexachlamys anomala* (D. Legrand) D. Legrand var. *rojasiana* D. Legrand, *Hexachlamys rojasiana* (D. Legrand) D. Legrand

Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(ITA, PAI, SPE).

Eugenia rostrifolia D. Legrand
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Eugenia rotundicosta D. Legrand
Arbusto o árbol. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Eugenia sclerocalyx D. Legrand
Sin.: *Eugenia sclerocalyx* D. Legrand var. *cambajuvensis* D. Legrand
Árbol. Endémica. 800-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Eugenia sonderiana O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eugenia speciosa Cambess.
Sin.: *Phyllocalyx retusus* O. Berg
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA). URY(PAY).

Eugenia squamiflora Mattos
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eugenia stigmatosa DC.
Sin.: *Eugenia stigmatosa* DC. var. *acutata* O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia subavenia O. Berg
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia suberosa Cambess.
Sin.: *Eugenia atrata* Mattos & D. Legrand
Árbol. Nativa. 400-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Eugenia subglomerata (Kuntze) Sobral
Sin.: *Eugenia glomerata* Spring ex Mart., *Eugenia neoglomerata* Sobral
Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia subterminalis DC.
Sin.: *Calycorectes paraguayensis* Mattos, *Calycorectes paranaensis* Mattos, *Calycorectes psidiiflorus* (O. Berg) Sobral var. *schantzianus* (Mattos) Mattos, *Calycorectes psidiiflorus* (O. Berg) Sobral var. *triflorus* Mattos, *Calycorectes riedelianus* O. Berg, *Calycorectes schultzeanus* Mattos, *Calycorectes striatulus* Mattos, *Eugenia paranaensis* (Mattos) Mattos, *Eugenia psidiiflora* O. Berg var. *psidiiflora*, *Eugenia psidiiflora* O. Berg var. *riedeliana* (O. Berg) Mattos, *Eugenia psidiiflora* O. Berg var. *schantziana* (Mattos) Mattos, *Eugenia psidiiflora* O. Berg var. *triflora* (Mattos) Mattos
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, COA, ITA).

Eugenia sulcata Spring ex Mart.
Sin.: *Stenocalyx sulcatus* (Spring ex Mart.) O. Berg
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia supra-axillaris Spring
Sin.: *Eugenia convexinervia* D. Legrand
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia tenuipedunculata Kiaersk.
Sin.: *Calycorectes australis* D. Legrand, *Calycorectes australis* D. Legrand var. *impresso-venosa* D. Legrand, *Calycorectes duarteanus* D. Legrand, *Eugenia brevistyla* D. Legrand, *Eugenia falkenbergiana* Mattos, *Eugenia imaruensis* D. Legrand, *Eugenia neoaustralis* Sobral var. *impresso-venosa* (D. Legrand) Mattos, *Eugenia neoaustralis* Sobral var. *neoaustralis*
Árbol. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia uniflora L.
Sin.: *Eugenia michelii* Lam., *Stenocalyx michelii* (Lam.) O. Berg, *Stenocalyx nhampiri* Barb. Rodr.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(DUR, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Eugenia uruguayensis Cambess.
Sin.: *Eugenia guabiju* O. Berg, *Eugenia maschalantha* O. Berg, *Eugenia opaca* O. Berg, *Eugenia opaca* O. Berg var. *brasiliensis* O. Berg, *Eugenia opaca* O. Berg var. *montevicensis* O. Berg, *Eugenia uruguayensis* Cambess. var. *opaca* (O. Berg) D. Legrand, *Luma uruguayensis* (Cambess.) Herter
Árbol. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(DUR, PAY, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Eugenia verticillata (Vell.) Angely
Sin.: *Eugenia brevipedunculata* Kiaersk., *Eugenia riedeliana* O. Berg, *Eugenia schuechiana* O. Berg
Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia viridiflora Cambess.

Sin.: *Eugenia capitulifera* O. Berg

Árbol. Nativa. 1000-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Legrandia Kausel

Legrandia concinna (Phil.) Kausel

Sin.: *Eugenia concinna* Phil.

Árbol. Endémica. 500-1000 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

Luma A. Gray

Luma apiculata (DC.) Burret

Sin.: *Eugenia affinis* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Eugenia apiculata* DC., *Eugenia apiculata* DC. var. *arnyan* Hook. f., *Eugenia barneoudii* O. Berg, hom. illeg., *Eugenia cuspidata* Phil., hom. illeg., *Eugenia ebracteata* F. Phil., *Eugenia gilliesii* Hook. & Arn., *Eugenia hookeri* Steud., *Eugenia modesta* Phil., hom. illeg., *Eugenia mucronata* Phil., hom. illeg., *Eugenia palenae* Phil., *Eugenia proba* O. Berg, *Eugenia spectabilis* Phil., *Luma gilliesii* (Hook. & Arn.) Burret, *Luma hookeri* (Steud.) Burret, *Luma spectabilis* (Phil.) Burret, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel var. *australis* Kausel, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel var. *genuina* Kausel, nom. inval., *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel var. *nahuelhuapensis* Kausel, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel var. *spectabilis* (Phil.) Kausel, *Myrceugenella grandjotii* Kausel, *Myrceugenia apiculata* (DC.) Nied., *Myrtus chekenilla* Kuntze

Arbusto o árbol. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Luma chequen (Molina) A. Gray

Sin.: *Eugenia bella* Phil., hom. illeg., *Eugenia chequen* Molina, *Eugenia gayana* Barnéoud, *Eugenia myrtomimeta* Diels, *Eugenia pulchra* O. Berg, *Luma gayana* (Barnéoud) Burret, *Myrceugenella chequen* (Molina) Kausel, *Myrceugenella chequen* (Molina) Kausel var. *myrtomimeta* (Diels) Kausel, *Myrceugenella gayana* (Barnéoud) Kausel, *Myrceugenella langerfeldtii* Kausel, *Myrtus chequen* (Molina) Spreng., *Myrtus gayana* (Barnéoud) O. Berg, *Myrtus uliginosa* Miq., *Myrtus uliginosa* Miq. f. *major* Miq.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Metrosideros Banks ex Gaertn.

Metrosideros stipularis (Hook. & Arn.) Hook. f.

Sin.: *Myrtus stipularis* Hook. & Arn., *Tepualia patagonica* Phil., *Tepualia philippiana* Griseb., *Tepualia stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb., *Tepualia stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *patagonica* (Phil.) Reiche, *Tepualia stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *philippiana* (Griseb.) Speg.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, TDF).
CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Myrceugenia O. Berg

Myrceugenia acutata D. Legrand

Sin.: *Myrceugenia ovata* (Hook. & Arn.) O.

Berg var. *acutata* (D. Legrand) Landrum

Arbusto o árbol. Nativa. 200-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia acutiflora (Kiaersk.) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia acutiflora* Kiaersk., *Luma acutiflora* (Kiaersk.) Burret

Arbusto o árbol. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia alpigena (DC.) Landrum

Sin.: *Eugenia alpigena* DC., *Eugenia fuliginea* O. Berg, *Eugenia fuliginea* O. Berg var. *rufa* O. Berg, *Luma alpigena* (DC.) Burret, *Myrceugenia alpigena* (DC.) Landrum var. *fuliginea* (O. Berg) Landrum, *Myrceugenia alpigena* (DC.) Landrum var. *rufa* (O. Berg) Landrum, *Myrceugenia bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kausel var. *alpigena* (DC.) D. Legrand, *Myrceugenia bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kausel var. *australis* D. Legrand, *Myrceugenia bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kausel var. *fuliginea* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kausel var. *guaratubensis* Mattos, *Myrceugenia catharinae* D. Legrand, *Myrceugenia leptorhyncha* D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 1200-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia basicordata F.C.S. Vieira, Molz & Sobral

Árbol. Endémica. 100-200 m.

Países: BRA(SCA).

Myrceugenia bocaiuvensis Mattos

Arbusto o árbol. Endémica. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

Myrceugenia bracteosa (DC.) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia bracteosa* DC.

- Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Myrceugenia brevipedicellata** (Burret) D. Legrand & Kausel
Sin.: *Luma brevipedicellata* Burret
Árbol. Nativa.
Países: BRA(SCA).
- Myrceugenia campestris** (DC.) D. Legrand & Kausel
Sin.: *Eugenia campestris* DC., *Eugenia distans* O. Berg, *Luma campestris* (DC.) Burret, *Luma distans* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia campestris* (DC.) D. Legrand & Kausel var. *distans* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia distans* (O. Berg) D. Legrand & Kausel
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Myrceugenia chrysocarpa** (O. Berg) Kausel
Sin.: *Eugenia buxifolia* Phil., *Eugenia chrysocarpa* O. Berg, *Eugenia patagonica* Phil., *Eugenia patagonica* Phil. var. *macrophylla* Phil., *Eugenia patagonica* Phil. var. *microphylla* Phil., *Eugenia petiolata* Phil., *Eugenia philippii* O. Berg, *Luma chrysocarpa* (O. Berg) Burret, *Luma philippii* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia buxifolia* (Phil.) Reiche
Arbusto o árbol. Endémica. 500-1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).
- Myrceugenia colchaguensis** (Phil.) L.E. Navas
Sin.: *Eugenia colchaguensis* Phil., *Myrceugenia malvillana* Kausel
Arbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Myrceugenia correifolia** (Hook. & Arn.) O. Berg
Sin.: *Eugenia correifolia* Hook. & Arn., *Eugenia maritima* Barnéoud, *Eugenia thalassaia* O. Berg, *Luma correifolia* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Myrceugenia johowii* Gusinde, *Myrceugenia maritima* Kausel, *Myrceugenia thalassaia* (O. Berg) Gusinde ex Fuentes
Arbusto o árbol. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU).
- Myrceugenia cucullata** D. Legrand
Arbusto o árbol. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Myrceugenia euosma** (O. Berg) D. Legrand
Sin.: *Eugenia aprica* O. Berg, *Eugenia euosma* O. Berg, *Eugenia euosma* O. Berg var. *lutescens* O. Berg, *Eugenia euosma* O. Berg var. *rufescens* O. Berg, *Eugenia nana* O. Berg, *Eugenia nana* O. Berg var. *congesta* O. Berg, *Eugenia nana* O. Berg var. *effusa* O. Berg, *Luma aprica* (O. Berg) Burret, *Luma cinerea* Burret, *Luma euosma* (O. Berg) Burret, *Luma nana* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia euosma* (O. Berg) D. Legrand var. *oblongata* Mattos
Arbusto o árbol. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA, PAI). URY(CLA, RIV, TAC, TYT).
- Myrceugenia exsucca** (DC.) O. Berg
Sin.: *Eugenia corralensis* Phil., *Eugenia exsucca* DC., *Eugenia exsucca* DC. var. *apiculata* O. Berg, *Eugenia exsucca* DC. var. *patagua* O. Berg, *Eugenia exsucca* DC. var. *peruviana* O. Berg, nom. inval., *Eugenia exsucca* DC. var. *temu* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Eugenia multiflora* Hook. & Arn., hom. illeg., *Eugenia pitra* O. Berg, *Eugenia temu* Hook. & Arn., *Luma corralensis* (Phil.) Burret, *Luma exsucca* (DC.) Burret, *Luma pitra* (O. Berg) Burret, *Luma temu* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Myrceugenia camphorata* O. Berg, *Myrceugenia lechleriana* O. Berg, *Myrceugenia multiflora* (Hook. & Arn.) Kausel
Árbol. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).
- Myrceugenia fernandeziana** (Hook. & Arn.) Johow
Sin.: *Eugenia fernandeziana* (Hook. & Arn.) Barnéoud, *Eugenia lumilla* Phil., *Luma fernandeziana* (Hook. & Arn.) Burret, *Myrceugenia luma* O. Berg, *Myrtus fernandeziana* Hook. & Arn., *Nothomyrcia fernandeziana* (Hook. & Arn.) Kausel
Árbol. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(JFE).
- Myrceugenia foveolata** (O. Berg) Sobral
Sin.: *Eugenia foveolata* O. Berg, *Myrceugenia leptocalyx* D. Legrand, *Myrceugenia leptocalyx* D. Legrand var. *coriacea* Mattos
Árbol. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Myrceugenia franciscensis** (O. Berg) Landrum
Sin.: *Eugenia franciscensis* O. Berg, *Myrceugenia bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kausel var. *franciscensis* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia longipedunculata* Mattos & D. Legrand
Arbusto. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR).
- Myrceugenia gertii** Landrum
Sin.: *Calyptrogenia hatschbachii* D. Legrand
Arbusto o árbol. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Myrceugenia glaucescens (Cambess.)

D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia araujoana* O. Berg, *Eugenia bagensis* O. Berg, *Eugenia bagensis* O. Berg var. *angustifolia* O. Berg, *Eugenia bagensis* O. Berg var. *avenia* O. Berg, *Eugenia bagensis* O. Berg var. *latifolia* O. Berg, *Eugenia cambessedeani* O. Berg, *Eugenia canelonensis* O. Berg, *Eugenia elegans* O. Berg, *Eugenia glaucescens* Cambess., *Eugenia pallida* O. Berg, *Eugenia ribeireana* O. Berg, *Luma angustior* Burret, *Luma araujoana* (O. Berg) Burret, *Luma bagensis* (O. Berg) Burret, *Luma canelonensis* (O. Berg) Burret, *Luma elegans* (O. Berg) Burret, *Luma glaucescens* (Cambess.) Burret, *Luma latior* Burret, *Luma pallida* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel f. *catharinensis* D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel f. *debilis* D. Legrand & R.M. Klein, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel f. *pallida* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel var. *latior* (Burret) Landrum, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel var. *pallida* (O. Berg) Kausel, *Myrceugenia grisea* D. Legrand, *Myrceugenia latior* (Burret) D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia pallida* (O. Berg) D. Legrand & Kausel

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

Myrceugenia hamoniana (Mattos) SobralSin.: *Eugenia hamoniana* Mattos, *Myrceugenia smithii* Landrum

Arbusto. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Myrceugenia hatschbachii Landrum

Arbusto. Endémica. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Myrceugenia hoehnei (Burret) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Luma hoehnei* Burret

Arbusto. Nativa. 1000-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia joinvillensis F.C.S. Vieira

Arbusto o arbolito. Endémica. 400-700 m.

Países: BRA(SCA).

Myrceugenia kleinii D. Legrand & Kausel

Árbol. Nativa. 200-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia lanceolata (Juss. ex J. St.-Hil.) Kausel

Sin.: *Eugenia dombeyana* DC., *Eugenia gudilla* (Colla) Barnéoud, *Eugenia stenophylla* Hook. & Arn., *Eugenia stenophylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* Hook. ex O. Berg, *Luma dombeyana* (DC.) Burret, *Luma stenophylla* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Myrceugenia stenophylla* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Myrtus gudilla* Colla, *Myrtus lanceolata* Juss. ex J. St.-Hil.

Arbusto. Endémica. 200-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Myrceugenia leptospermoides (DC.) Kausel

Sin.: *Eugenia leptospermoides* DC., *Eugenia leptospermoides* DC. var. *latifolia* O. Berg, *Eugenia leptospermoides* DC. var. *longifolia* O. Berg, *Eugenia leptospermoides* DC. var. *microphylla* O. Berg, *Eugenia thymifolia* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Myrceugenia mesomischa (Burret) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Luma mesomischa* Burret

Árbol. Endémica. 400-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Myrceugenia miersiana (Gardner) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia miersiana* Gardner, *Eugenia miersiana* Gardner var. *costata* O. Berg, nom. inval., *Luma brevipes* Burret, *Luma fuscovelutina* Burret, *Luma miersiana* (Gardner) Burret, *Myrceugenia brevipes* (Burret) D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia fuscovelutina* (Burret) D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia miersiana* (Gardner) D. Legrand & Kausel var. *venosa* (O. Berg) D. Legrand & Klein, *Myrceugenia nothorufa* D. Legrand var. *venosa* D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 300-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia myrcioides (Cambess.) O. Berg

Sin.: *Eugenia acrophylla* O. Berg, *Eugenia estrellensis* O. Berg, *Eugenia myrcioides* Cambess., *Luma acrophylla* (O. Berg) Burret, *Luma estrellensis* (O. Berg) Burret, *Luma myrcioides* (Cambess.) Burret, *Luma ulei* Burret, *Myrceugenia acrophylla* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia acrophylla* (O. Berg) D. Legrand var. *ulei* (Burret) D. Legrand, *Myrceugenia estrellensis* (O. Berg) D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia ferreira-limana* Klein & D. Legrand, *Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O. Berg var. *acrophylla* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O. Berg var. *hypericifolia* (Gardner) D. Legrand, *Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O. Berg var. *paranensis* D. Legrand, *Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O. Berg var. *ulei* (Burret) D. Legrand, *Myrceugenia paranaguensis* Mattos

Árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia myrtoidea O. Berg

Sin.: *Luma cinnamomeotomentosa* Burret, *Luma myrtoidea* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia camargoana* Mattos, *Myrceugenia montevidensis* O. Berg, *Myrceugenia montevidensis* O. Berg var. *sellowiana* (O. Berg) Mattos, *Myrceugenia myrtoidea* O. Berg var. *conferta* O. Berg, *Myrceugenia myrtoidea* O. Berg var. *stricta* O. Berg, *Myrceugenia sellowiana* O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, TAC).
Notas: Posiblemente habite en el noreste de Argentina

Myrceugenia obtusa (DC.) O. Berg

Sin.: *Eugenia obtusa* DC., *Eugenia polyantha* Phil., *Eugenia raran* (Colla) Barnéoud, *Luma obtusa* (DC.) A. Gray, *Myrceugenia chilensis* O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *berteroana* O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *polyantha* (Phil.) O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *raran* (Colla) O. Berg, *Myrtus raran* Colla

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Myrceugenia ovalifolia (O. Berg) Landrum

Sin.: *Mitranthes maria-emiliae* D. Legrand, *Mitranthes ovalifolia* O. Berg, *Mitropsidium ovalifolium* (O. Berg) Burret

Arbusto o árbol. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia ovata (Hook. & Arn.) O. Berg var. **nannophylla** (Burret) Landrum

Sin.: *Luma nannophylla* Burret, *Myrceugenia montana* Kausel,

Myrceugenia nannophylla (Burret) Kausel, *Myrceugenia valientei* Kausel

Arbusto o árbol. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Myrceugenia ovata (Hook. & Arn.) O. Berg var. **ovata**

Sin.: *Eugenia cumingii* Hook. & Arn., *Eugenia ovata* Hook. & Arn., *Eugenia trichocarpa* Phil., *Luma cumingii* (Hook. & Arn.) Burret, *Luma ovata* (Hook. & Arn.) Burret

Arbusto o árbol. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Myrceugenia oxysepala (Burret) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Luma macrosepala* Burret, *Luma oxysepala* Burret, *Myrceugenia macrosepala* (Burret) D. Legrand & Kausel

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia parvifolia (DC.) Kausel

Sin.: *Eugenia parvifolia* DC., *Luma baেকেoides* Griseb.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Myrceugenia pilotantha (Kiaersk.) Landrum

Sin.: *Eugenia pilotantha* Kiaersk., *Luma pilotantha* (Kiaersk.) Burret, *Myrceugenia nothorufa* D. Legrand, *Myrceugenia nothorufa* D. Legrand var. *major* D. Legrand, *Myrceugenia pilotantha* (Kiaersk.) Landrum var. *major* (D. Legrand) Landrum, *Myrceugenia pilotantha* (Kiaersk.) Landrum var. *nothorufa* (D. Legrand) Landrum, comb. illeg., *Myrceugenia ramboi* D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 200-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia pinifolia (Reiche) Kausel

Sin.: *Eugenia pinifolia* F. Phil., *Myrceugenia stenophylla* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *pinifolia* (F. Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Myrceugenia planipes (Hook. & Arn.) O. Berg

Sin.: *Eugenia distoma* O. Berg, *Eugenia planipes* Hook. & Arn., *Eugenia planipes* Hook. & Arn. var. *genuina* O. Berg, nom. inval., *Eugenia planipes* Hook. & Arn. var. *grandifolia* O. Berg, *Myrceugenia distoma* (O. Berg) Kausel, *Myrcia planipes* (Hook. & Arn.) Kiaersk.

Árbol. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Myrceugenia regnelliana (O. Berg) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia itatiaensis* Kiaersk., *Eugenia regnelliana* O. Berg, *Eugenia xanthochlora* O. Berg, *Luma gracilis* Burret, *Luma regnelliana* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia itatiaensis* (Kiaersk.) D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia ovata* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *gracilis* (Burret) Landrum, *Myrceugenia ovata* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *regnelliana* (O. Berg) Landrum, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel f. *itatiaensis* (Kiaersk.) D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel f. *xanthochlora* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *capillaris* D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *coriacea* D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *gracilis* (Burret) D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D.

Legrand & Kausel var. *leptophylla* D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 500-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia reitzii D. Legrand & Kausel

Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia rufa (Colla) Skotts. ex Kausel

Sin.: *Eugenia ferruginea* Hook. & Arn., hom. illeg., *Eugenia rufa* (Colla) Barnéoud, *Luma ferruginea* A. Gray, *Luma rufa* (Colla) Burret, *Myrceugenia ferruginea* Reiche, *Myrtus rufa* Colla

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Myrceugenia rufescens (DC.) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia poeppigiana* O. Berg, *Eugenia rufescens* DC., *Luma rufescens* (DC.) Burret, *Myrceugenia jonssonii* Kausel, *Myrceugenia rufescens* (DC.) D. Legrand & Kausel var. *alegrensis* D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia schulzei Johow

Sin.: *Luma schulzei* (Johow) Burret

Árbol. Endémica. 400.

Países: CHL(JFE).

Myrceugenia scutellata D. Legrand

Árbol. Nativa. 600-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia seriatoramosa (Kiaersk.) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia seriatoramosa* Kiaersk., *Luma seriato-ramosa* (Kiaersk.) Burret

Árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia venosa D. Legrand

Sin.: *Myrceugenia miersiana* (Gardner) D.

Legrand & Kausel var. *lanceolata* D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia DC.

Myrcia aethusa (O. Berg) N. Silveira

Sin.: *Aulomyrcia aethusa* O. Berg, *Aulomyrcia feniziana* O. Berg, *Myrcia kauseliana* D. Legrand, *Myrcia oligantha* O. Berg, *Myrcia richardiana* O. Berg var. *feniziana* (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia richardiana* O. Berg var. *richardiana*

Árbol. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia amazonica DC.

Sin.: *Myrcia leptoclada* DC.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Notas: Probablemente habite en el noreste de Argentina (Rotman, 1994)

Myrcia anacardiifolia Gardner

Sin.: *Gomidesia anacardiifolia* (Gardner) O. Berg

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia anomala Cambess.

Sin.: *Myrcia alpestris* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Myrcia anomala* Cambess. var. *multiceps* O. Berg, *Myrcia atropilosa* (O. Berg) N. Silveira, *Myrcia cotonosa* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

Myrcia barituensis (Legname) B. Holst

Sin.: *Gomidesia barituensis* Legname

Árbol. Nativa. 1000-1500 m.

Países: ARG(SAL).

Myrcia bella Cambess.

Sin.: *Aulomyrcia bella* (Cambess.) O.

Berg, *Myrcia dasyblastia* O. Berg

Arbusto. Nativa. 0-400 m.

Países: PRY(AMA, CON, COA).

Myrcia bicarinata (O. Berg) D. Legrand

Sin.: *Aulomyrcia bicarinata* O. Berg

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia brasiliensis Kiaersk.

Sin.: *Gomidesia freyreissiana* O. Berg, *Gomidesia schaueriana* O. Berg, *Myrcia freyreissiana* (O. Berg) Kiaersk.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia chrysotrichoma T. Fern. & Stagg.

Arbolito o árbol. Endémica. 100-800 m.

Países: BRA(PAR).

Myrcia conduplicata (B. Holst) A.R.

Lourenço & E. Lucas

Sin.: *Calyptanthus conduplicata* B. Holst

Árbol. Nativa.

Países: PRY(CAA).

Myrcia costeira M.F. Santos

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia diaphana (O. Berg) N. Silveira

Sin.: *Aulomyrcia diaphana* O. Berg

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia dichrophylla D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia eugeniopsoides (D. Legrand & Kausel) Mazine

Sin.: *Calyptanthus eugeniopsoides* D. Legrand & Kausel, *Marlierea eugeniopsoides* (D. Legrand & Kausel) D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia excoriata (Mart.) E. Lucas & C.E. Wilson

Sin.: *Marlierea excoriata* Mart., *Marlierea parviflora* O. Berg var. *parviflora*

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia ferruginosa Mazine

Sin.: *Eugenia sylvatica* Gardner, hom. illeg., *Eugeniopsis silvatica* O. Berg, *Marlierea silvatica* (O. Berg) Kiaersk.

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia flagellaris (D. Legrand) Mattos

Sin.: *Gomidesia flagellaris* D. Legrand

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia florida Lem.

Sin.: *Aulomyrcia trichantha* Wawra, *Gomidesia feniziana* O. Berg, *Myrcia ilheosensis* Kiaersk., *Myrcia trichantha* (Wawra) Sobral

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia garuvana F.C.S. Vieira & Sobral

Árbol. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Myrcia glabra (O. Berg) D. Legrand

Sin.: *Aulomyrcia acrantha* O. Berg, *Aulomyrcia glabra* O. Berg

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia glomerata (Cambess.) G.P. Burton & E. Lucas

Sin.: *Calyptanthus concinna* DC., *Calyptanthus concinna* DC. var. *glomerata* (Cambess.) D. Legrand ex Landrum, *Calyptanthus concinna* DC. var. *paulistana* D. Legrand, nom. illeg., *Calyptanthus glomerata* Cambess., *Calyptanthus kleinii* D. Legrand, *Calyptanthus paraguayensis* Barb. Rodr., *Calyptanthus reitziana* D. Legrand, *Calyptanthus variabilis* O. Berg var. *oblongata* O. Berg, *Calyptanthus variabilis* O. Berg var. *pulchella* O. Berg, *Calyptanthus variabilis* O. Berg var. *riparia* O. Berg, *Calyptanthus variabilis* O. Berg var. *stricta* O. Berg, *Myrcia cruciflora* A.R. Lourenço & E. Lucas

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(RIV, SAO, TAC, TYT).

Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

Sin.: *Aulomyrcia alternifolia* O. Berg, *Aulomyrcia fragilis* O. Berg, *Aulomyrcia maritima* O. Berg, *Aulomyrcia obscura* O. Berg, *Aulomyrcia obtecta* O. Berg, *Aulomyrcia scrobiculata* O. Berg, *Eugenia guianensis* Aubl., *Myrcia alternifolia* Miq., *Myrcia incisa* D. Legrand, *Myrcia obtecta* (O. Berg) Kiaersk., *Myrcia obtecta* (O. Berg) Kiaersk. var. *alternifolia* (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia scrobiculata* (O. Berg) O. Berg, *Myrcia stemmeriana* D. Legrand

Arbusto. Nativa. 200-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).

Myrcia hartwegiana (O. Berg) Kiaersk.

Sin.: *Gomidesia hartwegiana* O. Berg, *Gomidesia sellowiana* O. Berg

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia hatschbachii D. Legrand

Árbol. Endémica. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia hebepetala DC.

Sin.: *Gomidesia affinis* (Cambess.) D. Legrand ex Landrum var. *pohlana* (O. Berg) D. Legrand, *Gomidesia candolleana* O. Berg, *Gomidesia pohliana* O. Berg, *Myrcia candolleana* (O. Berg) Kiaersk., *Myrcia catharinensis* (D. Legrand) NicLugh.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Myrcia heringii D. Legrand

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia hexasticha Kiaersk.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Myrcia insularis Gardner

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Myrcia isaiana G.M. Barroso & Peixoto

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Myrcia legrandii A.R. Lourenço & E. Lucas

Sin.: *Calyptanthus hatschbachii* D. Legrand, *Calyptanthus obovata* Kiaersk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia lonchophylla A.R. Lourenço & E. Lucas

Sin.: *Calyptanthus lanceolata* O. Berg, *Calyptanthus lanceolata* O. Berg var. *catharinensis* D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 300-400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia loranthifolia (DC.) G.P. Burton & E. Lucas

Sin.: *Calypttranthes brasiliensis* Spreng., *Calypttranthes brasiliensis* Spreng. var. *mutabilis* (O. Berg) D. Legrand, *Calypttranthes grandifolia* O. Berg var. *grandifolia*, *Calypttranthes grandifolia* O. Berg var. *macrantha* D. Legrand, *Calypttranthes grandifolia* O. Berg var. *rufa* (O. Berg) D. Legrand, *Calypttranthes loranthifolia* DC., *Calypttranthes loranthifolia* DC. var. *mutabilis* (O. Berg) D. Legrand, *Calypttranthes mutabilis* O. Berg, *Calypttranthes rufa* O. Berg, *Myrcia neobrasiliensis* A.R. Lourenço & E. Lucas

Arbusto o árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia multiflora (Lam.) DC.

Sin.: *Aulomyrcia glaucescens* O. Berg, *Aulomyrcia ovalifolia* O. Berg, *Eugenia multiflora* Lam., *Myrcia multiflora* (Lam.) DC. f. *ovalifolia* (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia multiflora* (Lam.) DC. var. *glaucescens* (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia ovalifolia* (O. Berg) Kiaersk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, ÑEE, PAI, SPE).

Myrcia neolucida A.R. Lourenço & E. Lucas

Sin.: *Calypttranthes lucida* Mart. ex DC. f. *hilariana* D. Legrand & R.M. Klein, *Calypttranthes lucida* Mart. ex DC. var. *lucida*, *Calypttranthes lucida* Mart. ex DC. var. *polyantha* (O. Berg) D. Legrand, *Calypttranthes polyantha* O. Berg

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia neoobscura E. Lucas & C.E. Wilson

Sin.: *Marlierea obscura* O. Berg

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia neoregeliana E. Lucas & C.E. Wilson

Sin.: *Marlierea regeliana* O. Berg

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Myrcia neoriedeliana E. Lucas & C.E. Wilson

Sin.: *Eugeniopsis riedeliana* O. Berg, *Eugeniopsis riedeliana* O. Berg, *Marlierea riedeliana* (O. Berg) D. Legrand

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia neorubella A.R. Lourenço & E. Lucas

Sin.: *Calypttranthes rubella* (O. Berg) D. Legrand, *Calypttranthes variabilis* O. Berg var. *rubella* O. Berg, *Myrcia rubella* (O. Berg) A.R. Lourenço & E. Lucas

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia neosuaveolens E. Lucas & C.E. Wilson

Sin.: *Marlierea suaveolens* Cambess.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia oblongata DC.

Sin.: *Aulomyrcia bombycina* O. Berg, *Myrcia bombycina* (O. Berg) Kiaersk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, PAI).

Myrcia palustris DC.

Sin.: *Gomidesia bergiana* D. Legrand, nom. nud., *Gomidesia garopabensis* (Cambess.) D. Legrand ex Landrum, *Gomidesia palustris* (DC.) D. Legrand, comb. illeg., *Gomidesia palustris* (DC.) D. Legrand var. *angustifolia* (O. Berg) Mattos, *Gomidesia palustris* (DC.) Kausel,

Myrcia palustris DC. var. *angustifolia* O. Berg, *Myrcia palustris* DC. var. *bracteata* O. Berg, *Myrcia palustris* DC. var. *stictophylla* O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(RIV, TAC).

Myrcia pileata (D. Legrand) A.R. Lourenço & E. Lucas

Sin.: *Calypttranthes dusenii* Kausel, *Calypttranthes pileata* D. Legrand var. *pileata*, *Calypttranthes pileata* D. Legrand var. *riograndensis* D. Legrand

Árbol. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia plusiantha Kiaersk.

Árbol. Nativa. 600-900 m.

Países: BRA(PAR).

Myrcia pubiflora DC.

Sin.: *Aulomyrcia pohliana* O. Berg, *Myrcia calumbaensis* Kiaersk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia pubipetala Miq.

Sin.: *Myrcia pubipetala* Miq. var. *magnifolia* D. Legrand

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia racemosa (O. Berg) Kiaersk.

Sin.: *Aulomyrcia gaudichaudiana* O. Berg, *Aulomyrcia racemosa* O. Berg

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia reitzii (D. Legrand) Mazine

Sin.: *Marlierea reitzii* D. Legrand

Árbol. Nativa. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia reticulosa Miq.

Sin.: *Myrcia dictyophleba* (O. Berg) D. Legrand

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia retorta Cambess.

Sin.: *Myrcia arborescens* O. Berg

Árbol. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia ribeirensis T. Fern. & D.F. Lima

Arbolito o árbol. Nativa. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

Myrcia rupicola D. Legrand

Árbol. Nativa. 800-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia selloi (Spreng.) N. Silveira

Sin.: *Aulomyrcia assumptionis* (Morong)

Kausel, *Aulomyrcia laruotteana*

(Cambess.) O. Berg var. *paraguayensis*

O. Berg, *Aulomyrcia ramulosa* (DC.) O.

Berg, *Aulomyrcia selloi* (Spreng.) Kausel,

Aulomyrcia undulata O. Berg, *Myrcia*

assumptionis Morong, *Myrcia*

corrientinensis Barb. Rodr. ex Chodat &

Hassl., *Myrcia dealbata* Barb. Rodr. ex

Chodat & Hassl., nom. nud., *Myrcia*

hassleriana Barb. Rodr., *Myrcia lajeana* D.

Legrand, *Myrcia laruotteana* Cambess.

var. *australis* D. Legrand, *Myrcia*

laruotteana Cambess. var. *laruotteana*,

Myrcia laruotteana Cambess. var.

paraguayensis (O. Berg) D. Legrand,

Myrcia microsiphonata D. Legrand, *Myrcia*

perorebimi Barb. Rodr., *Myrcia ramulosa*

DC., *Myrcia ramulosa* DC. var.

megapotamica D. Legrand, *Myrcia*

ramulosa DC. var. *microsiphonata* (D.

Legrand) D. Legrand, *Myrcia selloi*

(Spreng.) N. Silveira var. *megapotamica*

(D. Legrand) N. Silveira, *Myrcia selloi*

(Spreng.) N. Silveira var. *microsiphonata*

(D. Legrand) N. Silveira, *Myrcia smithii* D.

Legrand, *Myrtus selloi* Spreng.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,

MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON,

COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

URY(ART, RIV, SAO).

Myrcia spectabilis DC.

Sin.: *Gomidesia browniana* (Gardner) O.

Berg, *Gomidesia spectabilis* (DC.) O.

Berg, *Myrcia browniana* Gardner

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia splendens (Sw.) DC.

Sin.: *Myrcia catharinae* O. Berg, *Myrcia*

gracilis O. Berg, *Myrcia gracilis* O. Berg

var. *opaca* O. Berg, *Myrcia pellucida* O.

Berg, *Myrcia rostrata* DC. f. *flexuosa*

Soares-Silva, *Myrcia rostrata* DC. f.

gracilis (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia*

rostrata DC. f. *rostrata*, *Myrtus splendens*

Sw.

Árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, CAN).

Myrcia squamata (Mattos & D. Legrand)

Mattos

Sin.: *Gomidesia squamata* Mattos & D.

Legrand

Arbolito. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia strigipes Mart.

Sin.: *Marlierea spathulata* O. Berg,

Marlierea tomentosa Cambess., *Myrcia*

neotomentosa E. Lucas & C.E. Wilson

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia strigosa A.R. Lourenço & E.

Lucas

Sin.: *Calyptanthus strigipes* O. Berg

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia subacuminata (Kiaersk.) M.F.

Santos

Sin.: *Marlierea krapovickae* D. Legrand,

Marlierea subacuminata Kiaersk.

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Myrcia subcordata DC.

Sin.: *Aulomyrcia breviamis* O. Berg,

Myrcia breviamis (O. Berg) D. Legrand,

Myrcia jaguariaivensis Mattos & D.

Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia tenuivenosa Kiaersk.

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia tijucensis Kiaersk.

Sin.: *Gomidesia tijucensis* (Kiaersk.) D.

Legrand

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.

Sin.: *Eugenia tomentosa* Aubl.

Árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Myrcia tortuosa (O. Berg) N. Silveira

Sin.: *Aulomyrcia pachyclada* O. Berg,

Aulomyrcia tortuosa O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Myrcia triconia (D. Legrand) A.R.

Lourenço & E. Lucas

Sin.: *Calyptanthus iraiensis* Mattos,

Calyptanthus triconia D. Legrand

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA).

Myrcia undulata O. BergSin.: *Myrcia sosias* D. Legrand

Árbol. Nativa. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia vellozoi MazineSin.: *Marlierea racemosa* Kiaersk., *Myrtus racemosa* Vell., hom. illeg.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Myrcia venulosa DC. var. **dives** (O. Berg) Soares-SilvaSin.: *Aulomyrcia reticulata* O. Berg var. *dives* O. Berg

Árbol. Endémica. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Myrcia venulosa DC. var. **venulosa**Sin.: *Aulomyrcia castrensis* O. Berg, *Aulomyrcia dictyophleba* O. Berg, *Aulomyrcia laureola* O. Berg, *Aulomyrcia reticulata* O. Berg var. *pauciflora* O. Berg, *Myrcia castrensis* (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia laureola* (O. Berg) Kiaersk.

Árbol. Nativa. 300-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia verticillaris O. Berg

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(MIE). URY(ART, CLA, RIV, TAC).

Myrcianthes O. Berg**Myrcianthes callicoma** McVaugh

Árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(TUC).

Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. BergSin.: *Blepharocalyx ellipticus* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Eugenia apiculata* (O. Berg) Nied., comb. illeg., *Eugenia cisplatensis* Cambess., *Eugenia cisplatina* Arechav.,*Eugenia elliptica* Hook. & Arn., *Luma cisplatensis* (Cambess.) Herter, *Myrcianthes apiculata* O. Berg

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(COL, DUR, MAL, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

Myrcianthes coquimbensis (Barnéoud) Landrum & GrifoSin.: *Aspidogenia coquimbensis* (Barnéoud) Burret, *Myrtus coquimbensis* Barnéoud, *Reichea coquimbensis* (Barnéoud) Kausel

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ).

Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D. LegrandSin.: *Eugenia cisplatensis* Cambess. var. *gigantea* D. Legrand

Árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, TYT).

Myrcianthes mato (Griseb.) McVaughSin.: *Acreugenia mato* (Griseb.) Kausel, *Eugenia mato* Griseb.

Árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Myrcianthes minimifolia (McVaugh) McVaughSin.: *Eugenia minimifolia* McVaugh

Árbol. Nativa. 2000-2300 m.

Países: ARG(JUJ).

Myrcianthes pedersenii D. Legrand

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: PRY(APA, GUA, MIE).

Myrcianthes pseudomato (D. Legrand) McVaughSin.: *Eugenia pseudomato* D. Legrand, *Pseudomyrcianthes pseudomato* (D. Legrand) Kausel

Árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. LegrandSin.: *Acreugenia pungens* (O. Berg) Kausel, *Eugenia pungens* O. Berg

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, CEN, GUA, ÑEE, PAI). URY(CLA, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).

Myrcianthes riparia Sobral, Grippa & T.B. Guimarães

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Myrciaria O. Berg**Myrciaria cuspidata** O. BergSin.: *Eugenia alegrensis* Kiaersk., *Myrciaria apiculata* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Myrciaria recurvipetala* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Myrciaria delicatula (DC.) O. BergSin.: *Eugenia delicatula* DC., *Myrciaria linearifolia* O. Berg, *Myrciaria micrantha* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Paramyrciaria delicatula* (DC.) Kausel var. *argentinensis* Kausel, *Paramyrciaria delicatula* (DC.) Kausel var. *delicatula*, *Paramyrciaria delicatula* (DC.) Kausel var. *linearifolia* (O. Berg) Kausel

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, COA, ITA, PAI).

Myrciaria floribunda (West ex Willd.) O. Berg

Sin.: *Eugenia ciliolata* Cambess., *Eugenia floribunda* West ex Willd., *Myrciaria arborea* D. Legrand, *Myrciaria axillaris* O. Berg, *Myrciaria ciliolata* (Cambess.) O. Berg, *Myrciaria leucophloea* O. Berg, *Myrciaria tolypantha* O. Berg, *Paramyrciaria ciliolata* (Cambess.) Rotman

Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, PAI, SPE).

Myrciaria glazoviana (Kiaersk.) G.M. Barroso ex Sobral

Sin.: *Eugenia cabelludo* Kiaersk. var. *glazioviana* Kiaersk., *Paramyrciaria glazioviana* (Kiaersk.) Sobral

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Myrciaria leucadendron O. Berg

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Myrciaria plinioides D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Myrciaria rojasii D. Legrand

Sin.: *Myrciaria tapiraguayensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Paramyrciaria tapiraguayensis* (Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl.) Sobral

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, PAI, SPE).

Myrciaria tenella (DC.) O. Berg

Sin.: *Eugenia tenella* DC., *Myrciaria undulata* O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(CLA, TAC).

Myrrhinium Schott

Myrrhinium atropurpureum Schott

Sin.: *Myrrhinium atropurpureum* Schott var. *octandrum* Benth., *Myrrhinium loranthoides* (Hook. & Arn.) Burret, *Myrrhinium rubriflorum* O. Berg, *Myrrhinium salicinum* Gand., *Myrrhinium sarcopetalum* Lem., *Tetrastemon loranthoides* Hook. & Arn.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(DUR, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Myrteola O. Berg, nom. cons.

Myrteola nummularia (Poir.) O. Berg

Sin.: *Eugenia humifusa* Phil., *Eugenia humilis* Phil., *Myrteola barneoudii* (O. Berg) O. Berg, *Myrteola barneoudii* (O. Berg) O. Berg var. *humifusa* (Phil.) Reiche, *Myrteola bullata* O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg var. *pentamera* O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg var. *tetramera* O. Berg, *Myrteola humifusa* (Phil.) O. Berg, *Myrteola leucomyrtillus* (Griseb.) Reiche, *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg var. *barneoudii* (O. Berg) Kausel, *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg var. *repens* (Phil.) Reiche, *Myrteola repens* (Phil.) O. Berg, *Myrtus barneoudii* O. Berg, *Myrtus leucomyrtillus* Griseb., *Myrtus nummularia* Poir., *Myrtus nummularia* Poir. var. *major* Hook. f., *Myrtus repens* Phil.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Neomitranthes (Kausel) D. Legrand

Neomitranthes cordifolia (D. Legrand)

D. Legrand

Sin.: *Mitranthes cordifolia* D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Neomitranthes gemballae (D. Legrand)

D. Legrand

Sin.: *Mitranthes gemballae* D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Neomitranthes glomerata (D. Legrand)

D. Legrand

Sin.: *Calypttranthes ranulphii* D. Legrand,

Mitranthes glomerata D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Neomitranthes gracilis (Burret) N.

Silveira

Sin.: *Mitranthes gracilis* Burret

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Neomitranthes obscura (DC.) N. Silveira

Sin.: *Calypttranthes obscura* DC.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Neomitranthes warmingiana (Kiaersk.)

Mattos

Sin.: *Calypttranthes warmingiana* Kiaersk.,

Mitranthes dusenii Kausel, *Mitranthes*

hoehnei Burret

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Pimenta Lindl.

Pimenta pseudocaryophyllus (B.A. Gomes) Landrum var. **hoehnei** (Burret) Landrum

Sin.: *Pseudocaryophyllus hoehnei* Burret
Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

Pimenta pseudocaryophyllus (B.A. Gomes) Landrum var. **pseudocaryophyllus**

Sin.: *Eugenia acuminata* Link, *Myrtus pseudocaryophyllus* B.A. Gomes, *Pseudocaryophyllus acuminatus* (Link) Burret
Arbusto o árbol. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plinia L.

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel
Sin.: *Myrtus cauliflora* Mart.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Plinia cordifolia (D. Legrand) Sobral
Sin.: *Myrciaria cordifolia* D. Legrand
Arbolito. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plinia edulis (Vell.) Sobral
Sin.: *Eugenia edulis* Vell.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plinia hatschbachii (Mattos) Sobral
Sin.: *Myrciaria hatschbachii* Mattos
Árbol. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Plinia peruviana (Poir.) Govaerts
Sin.: *Eugenia cauliflora* Miq., hom. illeg., *Eugenia guapurium* DC., *Guapurium*

peruvianum Poir., *Myrciaria guapurium* (DC.) O. Berg, *Myrciaria peruviana* (Poir.) Mattos, *Myrciaria peruviana* (Poir.) Mattos var. *trunciflora* (O. Berg) Mattos, *Myrciaria trunciflora* O. Berg, *Plinia trunciflora* (O. Berg) Kausel

Árbol. Nativa. 1000-1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI).

Plinia pseudodichasiantha (Kiaersk.) G.M. Barroso ex Sobral
Sin.: *Eugenia pseudodichasiantha* Kiaersk., *Marlierea parviflora* Berg var. *brachybotrya* D. Legrand, *Plinia brachybotrya* (D. Legrand) Sobral
Árbol. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman
Sin.: *Eugenia rivularis* Cambess., *Myrciaria baporetii* D. Legrand, *Myrciaria rivularis* (Cambess.) O. Berg, *Myrciaria rivularis* (Cambess.) O. Berg var. *baporetii* (D. Legrand) D. Legrand, *Myrciariopsis baporetii* (D. Legrand) Kausel, *Plinia baporetii* (D. Legrand) Rotman, *Siphoneugena baporetii* (D. Legrand) Kausel
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

Plinia silvestris (Vell.) Mazine & Sobral
Sin.: *Plinia complanata* M.L. Kawas. & B. Holst
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Psidium L.

Psidium acidum (DC.) Landrum
Sin.: *Psidium acutangulum* DC. var. *acidum* DC.
Árbol. Nativa. 700-800 m.
Países: BRA(PAR).

Psidium acutangulum DC.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Psidium araucanum Soares-Silva & Proença
Árbol. Nativa. 700-800 m.
Países: BRA(PAR).

Psidium australe Cambess.
Sin.: *Guajava argentea* (O. Berg) Kuntze, *Guajava suffruticosa* (O. Berg) Kuntze, *Psidium argenteum* O. Berg, *Psidium australe* Cambess. var. *argenteum* (O. Berg) Landrum, *Psidium australe* Cambess. var. *suffruticosum* (O. Berg) Landrum, *Psidium cuneatum* Cambess., *Psidium mucronatum* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium piribebuiense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium suffruticosum* O. Berg, *Psidium triphyllum* Barb. Rodr.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, ITA, MIE, PAI, SPE).

Psidium bergianum (Nied.) Burret
Sin.: *Myrtus bergiana* Nied.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Psidium cattleianum Sabine
Sin.: *Psidium littorale* Raddi, *Psidium variabile* O. Berg
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, ROC, TYT).

Psidium grandifolium DC.

Sin.: *Guajava cinerea* Mart. ex DC., *Guajava grandifolia* (DC.) Kuntze, *Guajava incanescens* (DC.) Kuntze, *Psidium apaense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium cinereum* Mart. ex DC., *Psidium cinereum* Mart. ex DC. var. *incanescens* (Mart. ex DC.) D. Legrand, *Psidium cinereum* Mart. ex DC. var. *paraguayae* D. Legrand, *Psidium eriophyllum* Barb. Rodr., *Psidium grandifolium* DC. var. *intermedium* O. Berg, *Psidium incanescens* Mart. ex DC., *Psidium incanescens* Mart. ex DC. var. *rotundifolium* O. Berg, *Psidium lanatum* Barb. Rodr., *Psidium paraguayense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium psychrophilum* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium spodophyllum* Barb. Rodr., *Psidium yacaense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Psidium guajava L.

Sin.: *Psidium guava* Griseb., *Psidium igatemyense* Barb. Rodr., *Psidium pyrifolium* L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Psidium guineense Sw.

Sin.: *Guajava guineensis* (Sw.) Kuntze, *Guajava ooidea* (O. Berg) Kuntze, *Psidium araca* Raddi, *Psidium hasslerianum* Barb. Rodr., *Psidium ooideum* O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,

CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI).

Psidium kennedyanum Morong

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Psidium laruotteanum Cambess.

Sin.: *Myrtus formosa* Barb. Rodr., *Psidium capibaryense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Psidium formosum* (Barb. Rodr.) Burret, *Psidium glaucescens* O. Berg, *Psidium quinquentatum* Amshoff

Arbusto. Nativa. 300-900 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Psidium longipetiolatum D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Psidium missionum D. Legrand

Arbusto o subarbusto. Endémica. 100-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CAA, GUA, ITA, PAI).

Psidium myrtoide O. Berg

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Psidium oligospermum DC.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(JUJ).

Psidium ovale (Spreng.) Burret

Sin.: *Myrtus ovalis* Spreng., *Psidium hatschbachii* D. Legrand, *Psidium imaruinense* Mattos, *Psidium spathulatum* Mattos

Arbusto. Nativa. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Psidium rufum Mart. ex DC. var. **rufum**

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Psidium rufum Mart. ex DC. var. **widgrenianum** (O. Berg) Proença

Sin.: *Psidium widgrenianum* O. Berg

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Psidium salutare (Humb., Bonpl. & Kunth) O. Berg var. **decussatum** (DC.) Landrum

Sin.: *Psidium decussatum* DC.

Subarbusto. Nativa. 1000-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Psidium salutare (Humb., Bonpl. & Kunth) O. Berg var. **mucronatum** (Cambess.) Landrum

Sin.: *Myrtus acutata* O. Berg, *Myrtus cuspidata* O. Berg, *Myrtus cuspidata* O. Berg var. *pentamera* O. Berg, *Myrtus cuspidata* O. Berg var. *tetramera* O. Berg, *Myrtus lurida* Spreng., *Myrtus mucronata* Cambess., *Myrtus mucronata* Cambess. var. *opaca* O. Berg, *Myrtus mucronata* Cambess. var. *thea* (Griseb.) Griseb., *Myrtus ovalis* O. Berg, hom. illeg., *Myrtus pauciflora* Cambess., *Myrtus suffruticosa* O. Berg, *Myrtus suffruticosa* O. Berg var. *angustifolia* O. Berg, *Myrtus suffruticosa* O. Berg var. *latifolia* O. Berg, *Psidium acutatum* (O. Berg) Burret, *Psidium luridum* (Spreng.) Burret, *Psidium luridum* (Spreng.) Burret var. *cinereum* Mattos, *Psidium pubifolium* Burret, *Psidium pubifolium* Burret f. *nanum* Rotman, *Psidium thea* Griseb.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Psidium salutare (Humb., Bonpl. & Kunth) O. Berg var. **sericeum** (Cambess.) Landrum

Sin.: *Myrtus incana* O. Berg, *Myrtus nivea* O. Berg, *Myrtus sericea* Cambess., *Myrtus*

sericea Cambess. var. *fruticosa* O. Berg, *Psidium incanum* (O. Berg) Burret, *Psidium niveum* (O. Berg) Herter, *Psidium thea* Griseb. var. *incanum* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, MIE, PAI). URY(CLA, DUR, MON, PAY, RIV, SJO, TAC).

Psidium salutare (Kunth) O. Berg var. **salutare**

Sin.: *Myrcianthes reptans* D. Legrand, *Myrtus salutaris* Kunth, *Psidium deltosepalum* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Psidium reptans* (D. Legrand) Soares-Silva & Proença, *Psidium valenzuelense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, COA, SPE).

Psidium sartorianum (O. Berg) Nied.

Sin.: *Mitranthes sartoriana* O. Berg

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Psidium striatulum Mart. ex DC.

Sin.: *Psidium kennedyanum* Morong, *Psidium paranense* O. Berg, *Psidium persicifolium* O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(APA, APY, CAU, CON, COA, GUA, PHA).

Siphoneugena O. Berg

Siphoneugena crassifolia (DC.) Proença & Sobral

Sin.: *Calycorectes widgrenianus* (O. Berg) Nied., *Eugenia crassifolia* DC., *Eugenia widgreniana* (O. Berg) Kiaersk.,

Mitranthes widgreniana (O. Berg) Burret, *Siphoneugena widgreniana* O. Berg

Árbol. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Siphoneugena guilfoyleiana Proença

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Siphoneugena occidentalis D. Legrand

Árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(SAL).

Siphoneugena reitzii D. Legrand

Sin.: *Siphoneugena boraceiensis* Mattos & Silveira, *Siphoneugena dusenii* Kausel, *Siphoneugena gomesiana* Mattos

Árbol. Nativa. 700-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Syzygium Gaertn., nom. cons.

Syzygium cumini (L.) Skeels

Sin.: *Myrtus cumini* L.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Syzygium jambos (L.) Alston

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).

Ugni Turcz.

Ugni candollei (Barnéoud) O. Berg

Sin.: *Myrtus candollei* Barnéoud, *Myrtus krausei* Phil., *Ugni candollei* (Barnéoud) O. Berg f. *litoralis* Kausel, *Ugni candollei* (Barnéoud) O. Berg f. *monticola* Kausel, *Ugni krausei* (Phil.) O. Berg

Arbusto. Endémica. 100-800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Ugni molinae Turcz.

Sin.: *Eugenia ugni* (Molina) Hook. & Arn., *Myrtus molinae* Barnéoud, *Myrtus ugni* Molina, *Ugni myrtus* Macloskie, *Ugni philippii* O. Berg, *Ugni poeppigii* O. Berg, *Ugni ugni* (Molina) Macloskie, nom. inval.

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, JFE).

Ugni selkirkii (Hook. & Arn.) O. Berg

Sin.: *Eugenia selkirkii* Hook. & Arn., *Myrtus berteroi* Phil., *Ugni berteroi* (Phil.) F. Phil.

Arbusto. Endémica. 400-800 m.

Países: CHL(JFE).

NAMACEAE

Nama L., nom. cons.

Nama dichotoma (Ruiz & Pav.) Choisy

Sin.: *Hydrolea dichotoma* Ruiz & Pav., *Marilaunidium dichotomum* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Marilaunidium strictum* (Phil.) Kuntze, *Nama dichotoma* (Ruiz & Pav.) Choisy f. *amplifolia* Brand, *Nama dichotoma* (Ruiz & Pav.) Choisy f. *stricta* (Phil.) Brand, *Nama dichotoma* (Ruiz & Pav.) Choisy var. *amplifolia* (Brand) C.L. Hitchc., *Nama stricta* Phil.

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, RME).

Nama jamaicensis L.

Sin.: *Conanthus jamaicensis* (L.) A. Heller, *Hydrolea jamaicensis* (L.) Raeusch., *Marilaunidium jamaicense* (L.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC).

Nama undulata Kunth var. **australis** C.L. Hitchc.

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU). CHL(ATA).

Nama undulata Kunth var. **undulata**

Sin.: *Conanthus echioides* (Griseb.) Kuntze, *Marilaunidium echioides* (Griseb.) Kuntze, *Marilaunidium undulatum* (Kunth) Kuntze, *Nama echioides* Griseb., *Nama echioides* Griseb. var. *hispida* Griseb., *Nama undulata* Kunth var. *hispida* (Griseb.) Brand

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

NOTHOFAGACEAE

Nothofagus Blume

Nothofagus alessandri Espinosa

Sin.: *Fuscospora alessandri* (Espinosa) Heenan & Smissen

Árbol. Endémica. 100-500 m.

Países: CHL(MAU).

Nothofagus alpina (Poepp. & Endl.) Oerst.

Sin.: *Fagus alpina* Poepp. & Endl., *Fagus nervosa* Phil., *Fagus procera* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Lophozonia alpina* (Poepp. & Endl.) Heenan & Smissen, *Nothofagus nervosa* (Phil.) Dimitri & Milano, comb. superfl., *Nothofagus nervosa* (Phil.) Krasser, *Nothofagus procera* (Poepp. & Endl.) Oerst., comb. illeg., *Nothofagus procera* Oerst.

Árbol. Endémica. 200-1400 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst.
Sin.: *Calucechinus antarctica* (G. Forst.) Hombr. & Jacq. ex Decne., *Calucechinus montagni* Hombr. & Jacq., *Fagus antarctica* G. Forst., *Fagus antarctica* G. Forst. f. *latifolia* Kurtz ex Albov, *Fagus antarctica* G. Forst. var. *microphylla* Phil., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *palustris* Albov, *Fagus antarctica* G. Forst. var. *subalpina* Albov, *Fagus antarctica* G. Forst. var. *sublobata* A. DC., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *uliginosa* A. DC., *Fagus uliginosa* Phil., *Nothofagus montagnei* Hombr. & Jacq.

Árbol. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst.

Sin.: *Betula antarctica* G. Forst. ex Willd., *Betula antarctica* G. Forst., nom. nud., *Calusparassus betuloides* (Mirb.) Hombr. & Jacq. ex Decne., *Calusparassus forsteri* Hombr. & Jacq., *Fagus betuloides* Mirb., *Fagus dubia* Mirb., *Fagus forsteri* Hook., *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Blume, comb. illeg., *Nothofagus patagonica* Gand.

Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst.

Sin.: *Fagus dombeyi* Mirb., *Fagus dombeyi* Mirb. var. *microphylla* Phil., *Nothofagus dombeyi* (Mirb.) Blume, comb. illeg.

Árbol. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Nothofagus glauca (Phil.) Krasser

Sin.: *Fagus glauca* Phil., *Lophozonia glauca* (Phil.) Heenan & Smissen,

Nothofagus megalocarpa Reiche, *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *glauca* (Phil.) Reiche

Árbol. Endémica. 100-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Nothofagus macrocarpa (A. DC.) F.M. Vázquez & R. Rodr.

Sin.: *Fagus obliqua* Mirb. var. *macrocarpa* A. DC., *Fagus procera* Phil., hom. illeg., *Lophozonia macrocarpa* (A. DC.) Heenan & Smissen, *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *macrocarpa* (A. DC.) Reiche

Árbol. Endémica. 800-2200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Nothofagus nitida (Phil.) Krasser

Sin.: *Fagus nitida* Phil.

Árbol. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst.

Sin.: *Fagus obliqua* Mirb., *Fagus obliqua* Mirb. var. *dentatosquamata* Kuntze, *Fagus obliqua* Mirb. var. *integrisquamata* Kuntze, *Fagus obliqua* Mirb. var. *macranthera* A. DC., *Fagus obliqua* Mirb. var. *valdiviana* (Phil.) A. DC., *Fagus valdiviana* Phil., *Lophozonia heterocarpa* Turcz., *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan & Smissen subsp. *andina* (F.M. Vázquez & R. Rodr.) Heenan & Smissen, *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan & Smissen subsp. *obliqua*, *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan & Smissen subsp. *valdiviana* (Phil.) Heenan & Smissen, *Nothofagus leoni* Espinosa, *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Blume, comb. illeg., *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. subsp. *andina* F.M. Vázquez & R. Rodr., *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. subsp. *valdiviana* (Phil.) F.M. Vázquez & R. Rodr.

Árbol. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser

Sin.: *Calusparassus pumilio* Hombr. & Jacq., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *bicrenata* A. DC., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *pumilio* (Poepp. & Endl.) Kunze, *Fagus pumilio* Poepp. & Endl., *Nothofagus pumilio* (Poepp. & Endl.) Reiche, comb. illeg.

Árbol. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

NYCTAGINACEAE

Allionia L., nom. cons.

Allionia choisyi Standl.

Sin.: *Allionia glabra* (Choisy) Standl., *Allionia incarnata* L. f. *glutinosissima* Heimerl, *Allionia incarnata* L. f. *multiserrata* Heimerl, *Allionia incarnata* L. var. *glabra* Choisy, *Wedelia glabra* (Choisy) Standl.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Allionia incarnata L.

Sin.: *Allionia bandurrae* Phil., *Allionia cristata* (Standl.) Standl., *Allionia incarnata* L. var. *villosa* (Standl.) Munz, *Allionia jarae* Phil., *Allionia mendocina* Phil., *Allionia puberula* Phil., *Wedelia cristata* Standl., *Wedelia incarnata* (L.) Kuntze, *Wedelia incarnata* (L.) Kuntze subsp. *villosa* Standl., *Wedeliella cristata* (Standl.) Cockerell, *Wedeliella incarnata* (L.) Cockerell, *Wedeliella incarnata* (L.)

Cockerell var. *anodonta* (Standl.) Cockerell

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA). URY(PAY).

Boerhavia L.

Boerhavia coccinea Mill.

Sin.: *Boerhavia adscendens* Willd., *Boerhavia decumbens* Vahl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Boerhavia cordobensis Kuntze

Sin.: *Boerhavia ciliato-bracteata* Heimerl, *Boerhavia paniculata* Rich. var. *cordobensis* (Kuntze) Heimerl

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SDE, SLU).

Boerhavia diffusa L. var. **leiocarpa** (Heimerl) C.D. Adams

Sin.: *Boerhavia coccinea* Mill. var. *leiocarpa* (Heimerl) Standl., *Boerhavia friesii* Heimerl, *Boerhavia paniculata* Rich. f. *leiocarpa* Heimerl, *Boerhavia paniculata* Rich. f. *setosa* Heimerl, *Boerhavia paniculata* Rich. var. *guaranítica* Heimerl, *Boerhavia paniculata* Rich. var. *leiocarpa* (Heimerl) Heimerl

Hierba. Introducida. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(PHA).

Boerhavia diffusa L., nom. cons. var. **diffusa**

Sin.: *Boerhavia coccinea* Mill. var. *paniculata* (Rich.) Moscoso, *Boerhavia paniculata* Rich.

Hierba. Introducida. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, IPA). PRY(APY, CAA, CEN, GUA, PHA). URY(MON).

Boerhavia pulchella Griseb.

Sin.: *Oxybaphus cretaceus* Chodat & Wilczek

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, LRI, MEN, RNE, SDE, SJU, SLU).

Boerhavia spicata Choisy

Hierba. Introducida. 800-900 m.

Países: ARG(CAT).

Bougainvillea Comm. ex Juss.

Bougainvillea campanulata Heimerl

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

Bougainvillea glabra Choisy

Sin.: *Bougainvillea glabra* Choisy var. *graciliflora* Heimerl

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bougainvillea infesta Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, JUJ, SAL). PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

Bougainvillea praecox Griseb.

Sin.: *Bougainvillea praecox* Griseb. var. *spinosa* Chodat & Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY, BOQ, PHA).

Bougainvillea spectabilis Willd.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bougainvillea spinosa (Cav.) Heimerl

Sin.: *Bougainvillea patagonica* Decne., *Bougainvillea patagonica* Decne. f. *eubracteata* Heimerl, *Bougainvillea patagonica* Decne. f. *microbracteata* Heimerl, *Bougainvillea spinosa* (Cav.) Heimerl f. *eubracteata* (Heimerl) Heimerl, *Bougainvillea spinosa* (Cav.) Heimerl f. *microbracteata* (Heimerl) Heimerl, *Bougainvillea spinosa* (Cav.) Heimerl f. *parviflora* (Phil.) Heimerl, *Bougainvillea spinosa* (Cav.) Heimerl var. *conferta* Chodat, *Tricycla spinosa* Cav., *Tricycla spinosa* Cav. var. *parviflora* Phil.

Arbusto. Nativa. 0-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU). PRY(APY).

Bougainvillea stipitata Griseb.

Sin.: *Bougainvillea frondosa* Griseb., *Bougainvillea longispinosa* Rusby, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *fiebrigii* Heimerl, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *grisebachiana* Heimerl, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *kuntzeana* Heimerl, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *longispinosa* (Rusby) Heimerl, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *stuckertiana* Heimerl

Arbusto o árbol. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

Colignonia Endl.

Colignonia glomerata Griseb.

Sin.: *Colignonia glomerata* Griseb. var. *boliviana* Heimerl, *Colignonia glomerata* Griseb. var. *typica* Heimerl, nom. inval.

Hierba. Nativa. 1000-1700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Guapira Aubl.

Guapira areolata (Heimerl) Lundell

Sin.: *Guapira luteovirens* (Heimerl) Lundell, *Guapira paraguayensis* (Heimerl) Lundell, *Pisonia areolata* Heimerl, *Pisonia luteovirens* Heimerl, *Pisonia paraguayensis* Heimerl

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Guapira hassleriana (Heimerl) Lundell

Sin.: *Pisonia hassleriana* Heimerl, *Torrubia hassleriana* (Heimerl) Standl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON).

Guapira hirsuta (Choisy) Lundell

Sin.: *Guapira asperula* (Standl.) Lundell, *Guapira opposita* (Vell.) Reitz var. *warmingii* (Heimerl) Reitz, *Guapira warmingii* (Heimerl) Lundell, *Pisonia hirsuta* Choisy, *Pisonia olfersiana* Link, Klotzsch & Otto var. *warmingii* (Heimerl) Heimerl, *Pisonia warmingii* Heimerl, *Torrubia asperula* Standl., *Torrubia hirsuta* (Choisy) Standl., *Torrubia olfersiana* (Link, Klotzsch & Otto) Standl. var. *warmingii* (Heimerl) Reitz, *Torrubia warmingii* (Heimerl) Standl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Guapira laurifolia (J.A. Schimdt) E.C.O. Chagas & Costa-Lima

Sin.: *Pisonia laurifolia* J.A. Schmidt

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Guapira nitida (J.A. Schmidt) Lundell

Sin.: *Pisonia nitida* J.A. Schmidt

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Guapira obtusata (Jacq.) Little

Sin.: *Pisonia obtusata* Jacq.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Guapira opposita (Vell.) Reitz

Sin.: *Torrubia opposita* Vell.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Mirabilis L.

Mirabilis acuta (Reiche) Heimerl

Sin.: *Oxybaphus ovatus* (Ruiz & Pav.) Vahl var. *acutus* Reiche

Hierba. Endémica. 500-2900 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Mirabilis bracteosa (Griseb.) Heimerl var. **bracteosa**

Sin.: *Allionia bracteosa* (Griseb.) Kuntze, *Oxybaphus bracteosus* Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Mirabilis bracteosa (Griseb.) Heimerl var. **micrantha** Toursark.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).

Mirabilis cordifolia (Kunze ex Choisy) Heimerl

Sin.: *Oxybaphus cordifolius* Kunze ex Choisy

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Mirabilis elegans (Choisy) Heimerl

Sin.: *Allionia elegans* (Choisy) Kuntze, *Oxybaphus elegans* Choisy

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Mirabilis expansa (Ruiz & Pav.) Standl.
Sin.: *Allionia expansa* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Calyxhymenia expansa* Ruiz & Pav., *Oxybaphus expansus* (Ruiz & Pav.) Vahl

Hierba. Nativa. 100-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, VAL).

Mirabilis jalapa L.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, BIO, JFE, IPA). PRY(PAI). URY.

Mirabilis ovata (Ruiz & Pav.) F. Meigen
Sin.: *Allionia ovata* (Ruiz & Pav.) Standl. var. *toscae* (Lorentz) Hauman & Irigoyen, *Allionia ovata* (Ruiz & Pav.) Standley, hom. illeg., *Calyxhymenia ovata* Ruiz & Pav., *Mirabilis campestris* (Griseb.) I.M. Johnst., *Mirabilis ovata* (Ruiz & Pav.) F. Meigen f. *glabriuscula* Stuck. & Heimerl, *Mirabilis ovata* (Ruiz & Pav.) F. Meigen f. *pantothrix* Stuck. & Heimerl, *Mirabilis tosciae* (Lorentz) Macloskie, *Oxybaphus campestris* Griseb., *Oxybaphus chilensis* Steud., *Oxybaphus ovatus* (Ruiz & Pav.) Vahl, *Oxybaphus tosciae* Lorentz

Hierba. Nativa. 0-3200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Mirabilis prostrata (Ruiz & Pav.) Heimerl
Sin.: *Allionia micrantha* (Choisy) Molfino, *Calyxhymenia prostrata* Ruiz & Pav., *Oxybaphus micranthus* Choisy, *Oxybaphus prostratus* (Ruiz & Pav.) Vahl
Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Mirabilis trollii Heimerl
Hierba. Endémica. 2200 m.
Países: CHL(TAR).

Neea Ruiz & Pav.

Neea hermaphrodita S. Moore
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(APA, AMA, CON).

Neea pendulina Heimerl
Sin.: *Neea schwackeana* Heimerl
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

Pisonia L.

Pisonia aculeata L.
Sin.: *Pisonia aculeata* L. var. *guaranitica* Chodat, *Pisonia yaguapinda* D. Parodi
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Pisonia ambigua Heimerl
Sin.: *Pisonia aculeata* L. f. *inermis* Kuntze, *Pisonia aculeata* L. var. *hirsutissima* J.A. Schmidt, *Pisonia ambigua* Heimerl var. *lilloana* Heimerl
Árbol. Nativa.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Pisonia zapallo Griseb.
Sin.: *Pisonia zapallo* Griseb. var. *guaranitica* Toursark.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CEN, CON, PHA).

Pisoniella (Heimerl) Standl.

Pisoniella arborescens (Lag. & Rodr.) Standl. var. **glabrata** (Heimerl) Heimerl
Sin.: *Bonpl.* & Kunth f. *glabrata* Heimerl, *Pisonia hirtella* Humb., *Pisoniella glabrata* (Heimerl) Standl.
Arbusto. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Reichenbachia Spreng.

Reichenbachia paraguayensis (D. Parodi) Dugand & Daniel
Sin.: *Elaeagnus paraguayensis* D. Parodi
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(APY, CEN).

NYMPHAEACEAE

Nelumbo Adans.

Nelumbo nucifera Gaertn.
Hierba acuática. Introducida.
Países: PRY(CEN).

Nymphaea L., nom. cons.

Nymphaea alba L.
Sin.: *Castalia alba* (L.) Green, comb. illeg., *Castalia alba* (L.) Wood
Hierba acuática. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Nymphaea amazonum Mart. & Zucc.

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nymphaea caerulea Savigny

Sin.: *Nymphaea capensis* Thunb.

Hierba acuática. Introducida. 200-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Nymphaea gardneriana Planch.

Sin.: *Leuconymphaea gardneriana* (Planch.) Kuntze

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, ÑEE, PAI, SPE).

Nymphaea jamesoniana Planch.

Sin.: *Castalia gibertii* Morong, *Castalia jamesoniana* (Planch.) Britton & P. Wilson, *Leuconymphaea jamesoniana* (Planch.) Kuntze, *Nymphaea gibertii* (Morong) Conard

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE, TUC). PRY(CEN, COA, PHA).

Nymphaea lotus L.

Hierba acuática. Introducida.

Países: BRA(SCA).

Nymphaea odorata Aiton

Hierba acuática. Introducida.

Países: BRA(RGS).

Nymphaea oxypetala Planch.

Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.

Países: PRY(PHA).

Nymphaea pedersenii (Wiersema) C.T. Lima & Giul.

Sin.: *Nymphaea amazonum* Mart. & Zucc. subsp. *pedersenii* Wiersema

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS). URY(ART, TYT).

Notas: Probablemente esta especie se encuentre en Paraguay (Wiersema, 1987)

Nymphaea prolifera Wiersema

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, COA, ÑEE, PAI). URY(ART).

Nymphaea pulchella DC.

Sin.: *Nymphaea nervosa* Lehm.

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Nymphaea rudgeana G. Mey.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Victoria R.H. Schomb.

Victoria amazonica (Poepp.) Klotzsch

Sin.: *Euryale amazonica* Poepp., *Victoria argentina* Burmeister, nom. nud., *Victoria cruziana* Orb., *Victoria regia* Lindl.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(CEN, ÑEE, PHA).

OCHNACEAE

Ouratea Aubl.

Ouratea claudaei G.S. Salvador, E.P. Santos & Cervi

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ouratea multiflora Engl.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Ouratea paraguayensis Hassl. ex Sastre & Offroy

Arbusto. Nativa. 100-1900 m.

Países: PRY(AMA, CON, SPE).

Ouratea parviflora (DC.) Baill.

Sin.: *Gomphia parviflora* DC.

Árbolito. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ouratea salicifolia (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.

Sin.: *Gomphia salicifolia* A. St.-Hil. & Tul.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ouratea sellowii (Planch.) Engl.

Sin.: *Gomphia sellowii* Planch.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ouratea spectabilis (Mart. ex Engl.) Engl.

Sin.: *Gomphia spectabilis* Mart. ex Engl.

Árbol. Nativa. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Ouratea vaccinioides (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.

Sin.: *Gomphia vaccinioides* A.St.-Hil. & Tul.

Árbol. Nativa. 1200-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Sauvagesia L.

Sauvagesia capillaris (A.St.-Hil.) Sastre

Sin.: *Lavradia capillaris* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Sauvagesia erecta L.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PHA, SPE).

Sauvagesia racemosa A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, SPE).

Sauvagesia vellozii (Vell. ex A. St.-Hil.)

Sastre

Sin.: *Lavradia vellozii* Vell. ex A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

OLACACEAE

Heisteria Jacq., nom. cons.

Heisteria perianthomega (Vell.) Sleumer

Sin.: *Heisteria salicifolia* Engl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

Heisteria silvianii Schwacke

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tetrastylidium Engl.

Tetrastylidium grandifolium (Baill.)

Sleumer

Sin.: *Schoepfia grandifolia* Baill.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ximenia L.

Ximenia americana L. var. **americana**

Arbusto o árbol. Nativa. 300-900 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA).

Ximenia americana L. var. **argentiniensis** De Filippis

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Ximenia intermedia (Chodat & Hassl.)

De Filippis

Sin.: *Ximenia coriacea* Engl. var. *intermedia* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(AMA).

OLEACEAE

Chionanthus L.

Chionanthus crassifolius (Mart.) P.S.

Green

Sin.: *Linociera crassifolia* Mart., *Mayepea*

crassifolia (Mart.) Kuntze

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Chionanthus filiformis (Vell.) P.S. Green

Sin.: *Bonamica filiformis* Vell.

Árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chionanthus trichotomus (Vell.) P.S.

Green

Sin.: *Linociera arborea* Eichler, *Linociera glomerata* Pohl, *Mayepea arborea* (Eichler) Kuntze, *Mayepea pohliana* Kuntze, *Minuta trichotoma* Vell.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

Fraxinus L.

Fraxinus excelsior L.

Sin.: *Fraxinus apetala* Lam.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA). CHL(BIO).

Fraxinus ornus L.

Sin.: *Fraxinus paniculata* Mill.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA).

Fraxinus pennsylvanica Marshall

Sin.: *Fraxinus michauxii* Britton, *Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *austini* Fernald, *Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fernald, *Fraxinus pubescens* Lam.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, RNE, TUC). URY(PAY, RNO).

Fraxinus velutina Torr.

Sin.: *Fraxinus pennsylvanica* Marshall

subsp. *velutina* (Torr.) G. N. Mill.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA).

Jasminum L.

Jasminum fluminense Vell.

Arbusto o liana. Introducida

Países: BRA(PAR, SCA).

Jasminum mesnyi Hance

Arbusto. Introducida. 800-900 m.

Países: ARG(COR).

Ligustrum L.

Ligustrum lucidum W.T. Aiton

Árbol. Introducida. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SAL, SFE, TUC). URY(PAY, RNO, SJO).

Ligustrum ovalifolium Hassk.
Arbusto o arbolito. Introducida.
Países: CHL(JFE).

Ligustrum sinense Lour.
Arbusto o árbol. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). URY(COL, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR).

Ligustrum vulgare L.
Arbusto. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

Menodora Bonpl.

Menodora decemfida (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray
Sin.: *Bolivaria decemfida* Gillies ex Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 1000-2700 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, TUC).

Menodora integrifolia (Cham. & Schltdl.) Steud.
Sin.: *Bolivaria integrifolia* Cham. & Schltdl., *Bolivaria trifida* Cham. & Schltdl., *Menodora hassleriana* Chodat, *Menodora integrifolia* (Cham. & Schltdl.) Steud. var. *odonelliana* T. Mey., *Menodora integrifolia* (Cham. & Schltdl.) Steud. var. *pinnatisecta* (Steyerm.) Burkart, *Menodora integrifolia* (Cham. & Schltdl.) Steud. var. *trifida* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, *Menodora integrifolia* (Cham. & Schltdl.) Steud. var. *trifida* (Cham. & Schltdl.) Steyerm., comb. superfl., *Menodora pinnatisecta* Steyerm., *Menodora pinnatisecta* Steyerm. var. *missionum* T. Mey., *Menodora trifida* (Cham. & Schltdl.) Steud.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(AMA, CEN, GUA, PAI). URY(FLA, TAC).

Menodora linoides Phil.
Arbusto. Endémica. 1200-1800 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Menodora pulchella Markgr.
Arbusto. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUU).

Menodora robusta (Benth.) A. Gray
Sin.: *Bolivaria robusta* Benth.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Olea L.

Olea europea L.
Arbusto. Introducida.
Países: ARG(COR).

Priogymnanthus P.S. Green

Priogymnanthus hasslerianus (Chodat) P.S. Green
Sin.: *Linociera hassleriana* (Chodat) Hassl., *Mayepea hassleriana* Chodat
Arbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Syringa L.

Syringa vulgaris L.
Arbusto. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(RNE).

ONAGRACEAE

Camissonia Link

Camissonia dentata (Cav.) Reiche subsp. **dentata**
Sin.: *Camissonia acuminata* (Phil.) Reiche, *Camissonia flava* Link, *Camissonia paradoxa* (Spach) Reiche var. *divaricata* (Gay) Reiche, *Camissonia tenuifolia* (Spach) Reiche, *Holostigma argutum* Spach, *Holostigma heterophyllum* Spach, *Holostigma tenuifolium* Spach, *Oenothera chamissonis* Link, *Oenothera chilensis* D. Dietr., hom. illeg., *Oenothera contorta* Douglas var. *divaricata* (Gay) Munz, *Oenothera dentata* Cav., *Oenothera heterophylla* (Spach) Steud., hom. illeg., *Oenothera micrantha* Spreng. var. *acuminata* (Phil.) Munz, *Oenothera minutiflora* D. Dietr., *Oenothera torulosa* H. Lév. f. *chilensis* (D. Dietr.) H. Lév., *Sphaerostigma chamissonis* (Link) Fisch. & C.A. Mey., *Sphaerostigma dentatum* (Cav.) Gay, *Sphaerostigma divaricatum* Gay, *Sphaerostigma heterophylla* (Spach) Gay, *Sphaerostigma ramosissimum* Phil.
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Camissonia dentata (Cav.) Reiche subsp. **littoralis** P.H. Raven & D.M. Moore
Sin.: *Sphaerostigma acuminatum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Clarkia Pursh

Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr.

Sin.: *Oenothera amoena* Lehm.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE).

Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. **ambigua** (Phil.) D.M. Moore & F.H. Lewis ex Martic.

Sin.: *Clarkia tenella* (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. *ambigua* (Phil.) D.M. Moore & F.H. Lewis, comb. illeg., *Godetia ambigua* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO, ARA).

Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. **araucana** D.M. Moore & F.H. Lewis

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. **tenella**

Sin.: *Godetia cavanillesii* Spach, *Godetia dasycarpa* Phil., *Godetia quadrivulnera* (Douglas) Spach var. *tenella* Jeps., *Godetia tenella* (Cav.) Steud., *Godetia tenella* (Cav.) Steud. var. *dasycarpa* (Phil.) Munz, *Oenothera auricula* H. Lév. var. *tenella* (Cav.) H. Lév., *Oenothera prismatica* H. Lév. var. *dasycarpa* (Phil.) H. Lév., *Oenothera quadrivulnera* Douglas var. *dasycarpa* (Phil.) Thell. ex Probst, *Oenothera tenella* Cav.

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. **tenuifolia** (Cav.) D.M. Moore & F.H. Lewis

Sin.: *Godetia gayana* Spach, *Godetia tenuifolia* (Cav.) Spach, *Oenothera gayana* (Spach) Steud., *Oenothera*

prismatica H. Lév. var. *tenuifolia* (Cav.) H. Lév., *Oenothera tenella* Cav. var. *tenuifolia* (Cav.) Lindl., *Oenothera tenuifolia* Cav.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Epilobium L.

Epilobium australe Poepp. & Hausskn.

Sin.: *Epilobium antarcticum* (Hook. f.) Kuntze, *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. var. *andinum* (Phil.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. var. *interruptum* (Sam.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. var. *lechleri* (Phil. & Hausskn. ex Hausskn.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. var. *pumilum* Sam., *Epilobium deflexum* Sam., *Epilobium interruptum* Sam., *Epilobium lechleri* Phil. & Hausskn. ex Hausskn., *Epilobium lechleri* Phil. & Hausskn. ex Hausskn. var. *antarcticum* Macloskie, hom. illeg., *Epilobium tetragonum* L. var. *antarcticum* Hook. f., *Epilobium transandinum* Sam.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Epilobium barbeyanum H. Lév.

Hierba. Endémica. 1000-3500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Epilobium brachycarpum C. Presl

Sin.: *Epilobium paniculatum* Nutt. ex Torr. & A. Gray

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO).

Epilobium campestre (Jeps.) Hoch & W.L. Wagner

Sin.: *Boisduvalia campestris* Jeps., *Boisduvalia glabella* (Nutt.) Walp., *Boisduvalia glabella* (Nutt.) Walp. var. *typica* Munz, nom. inval., *Boisduvalia pygmaea* Munz, *Epilobium pygmaeum* (Munz) Hoch & P.H. Raven, *Oenothera glabella* Nutt., *Oenothera pygmaea* Speg., hom. illeg.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(RME).

Epilobium ciliatum Raf.

Sin.: *Epilobium aconcaguinum* Phil., *Epilobium albiflorum* Phil., *Epilobium argentinum* Sam., *Epilobium caesiovirens* Sam., *Epilobium chilense* Hausskn., *Epilobium chilense* Hausskn. var. *latifolium* Sam., *Epilobium chilense* Hausskn. var. *macrum* Sam., *Epilobium constrictum* Sam., *Epilobium cunninghamii* Hausskn., *Epilobium hookerianum* Hausskn. ex Skottsb., *Epilobium leiophyton* Sam., *Epilobium longipes* Sam., *Epilobium magellanicum* Phil. & Hausskn. ex Hausskn., *Epilobium pedicellare* J. Presl var. *latifolium* Walp., *Epilobium santacruzense* Dusén, *Epilobium valdivense* Hausskn. var. *alboffii* Macloskie, *Epilobium valdiviense* Hausskn.

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Epilobium conjungens Skottsb.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Epilobium densifolium Hausskn.

Sin.: *Epilobium lignosum* F. Phil., *Epilobium nivale* Meyen var. *lignosum* (F.

Phil.) Hosseus, *Epilobium pauciflorum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 1000-3300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

Epilobium denticulatum Ruiz & Pav.

Sin.: *Epilobium andicola* Hausskn., *Epilobium caesium* Hausskn.

Hierba. Nativa. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, BIO).

Epilobium fragile Sam.

Hierba. Nativa. 3300-4200 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Epilobium glaucum Phil.

Sin.: *Epilobium glaucum* Phil. var. *stenophyllum* Macloskie & Dusén, *Epilobium nubigenum* Phil., *Epilobium patagonicum* Rendle, *Epilobium ramosum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Epilobium hirsutum L.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(RNE).

Epilobium hirtigerum A. Cunn.

Sin.: *Epilobium arechavaletae* H. Lév., *Epilobium brasiliense* Hausskn., *Epilobium junceum* Spreng. var. *hirtigerum* (A. Cunn.) Curtis

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, ROC, SJO).

Epilobium nivale Meyen

Sin.: *Epilobium andinum* Phil.

Hierba. Nativa. 1900-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Epilobium obscurum Schreb.

Hierba. Introducida. 0-1200 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Epilobium puberulum Hook. & Arn.

Sin.: *Epilobium gracile* Phil., hom. illeg., *Epilobium pedunculatum* Phil.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Epilobium subdentatum (Meyen) Lievens & Hoch

Sin.: *Boisduvalia concinna* (D. Don) Spach, *Boisduvalia subulata* (Ruiz & Pav.) Raim., *Boisduvalia tocomalii* Gay, *Boisduvalia volckmannii* Phil., *Cratericarpium argyrophyllum* Spach, *Epilobium concinnum* (D. Don) Hoch & P.H. Raven, hom. illeg., *Nierembergia subdentata* Meyen, *Oenothera concinna* D. Don, *Oenothera gauroides* Hornem., *Oenothera subulata* Ruiz & Pav., *Oenothera uniflora* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Epilobium tetragonum L. subsp. **lamyi** (F.W. Schultz) Nyman

Sin.: *Epilobium lamyi* F.W. Schultz

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Fuchsia L.

Fuchsia boliviana Carrière

Sin.: *Fuchsia boliviana* Carrière f. *puberulenta* Munz

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Fuchsia brevilibis P.E. Berry

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

Fuchsia hatschbachii P.E. Berry

Arbusto o subarbusto. Endémica. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Fuchsia lycioides Andrews

Sin.: *Fuchsia rosea* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Fuchsia magellanica Lam.

Sin.: *Dorvalla eucharis* Comm. ex Lam., *Fuchsia araucana* F. Phil. ex Phil., *Fuchsia chonotica* Phil., *Fuchsia coccinea* Aiton var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Hook., *Fuchsia coccinea* Aiton var. *robustior* Hook. f., *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *chonotica* (Phil.) Reiche, *Fuchsia conica* Lindl., *Fuchsia discolor* Lindl., *Fuchsia gracilis* Lindl., *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Lindl., *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *multiflora* Lindau, *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *tenella* Lindl., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *conica* (Lindl.) Sweet, *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Lindl.) D. Don, *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *grandiflora* Hook., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *tenella* (Lindl.) DC., *Fuchsia magellanica* Lam. var. *conica* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *discolor* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *eburnea* Pisano, *Fuchsia magellanica*

Lam. var. *gracilis* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Munz, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *molinae* Espinosa, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *typica* Munz, nom. inval., *Thilcum tinctorium* Molina

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Fuchsia regia (Vell.) Munz subsp. **reitzii** P.E. Berry

Sin.: *Fuchsia pubescens* Cambess.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 800-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Fuchsia regia (Vell.) Munz subsp. **serrae** P.E. Berry

Sin.: *Fuchsia affinis* Cambess.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gayophytum A. Juss.

Gayophytum humile A. Juss.

Sin.: *Gayophytum densifolium* Phil., *Gayophytum humile* A. Juss. var. *densifolium* (Phil.) Reiche, *Gayophytum minutum* Phil., *Gayophytum nuttallii* Torr. & A. Gray

Hierba. Endémica. 1800-2800 m.

Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Gayophytum micranthum Hook. & Arn.

Sin.: *Camissonia paradoxa* (Spach) Reiche, *Gayophytum gracile* Phil., *Gayophytum humile* A. Juss. var. *gracile* (Phil.) Reiche, *Gayophytum humile* A. Juss. var. *robustum* (Phil.) Reiche, *Gayophytum robustum* Phil., *Holostigma*

paradoxum Spach, *Oenothera gracilis* (Phil.) H. Lév., hom. illeg., *Oenothera micrantha* C. Presl, *Sphaerostigma paradoxum* (Spach) Gay

Hierba. Nativa. 1700-4100 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, SJU, SLU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Ludwigia L.

Ludwigia bonariensis (Micheli) H. Hara

Sin.: *Jussiaea bonariensis* Micheli

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PHA). URY(ART, RNO, SAO, SJO, SOR).

Ludwigia bullata (Hassl.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea bullata* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, COA).

Ludwigia caparosa (Cambess.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea caparosa* Cambess.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(ROC).

Ludwigia decurrens Walter

Sin.: *Jussiaea bertonii* H. Lév., *Jussiaea decurrens* (Walter) DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, SAO).

Ludwigia elegans (Cambess.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea elegans* Cambess., *Jussiaea elegans* Cambess. f. *australis*

Malme, *Jussiaea elegans* Cambess. f. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Jussiaea elegans* Cambess. var. *intermedia* Hassl., *Jussiaea elegans* Cambess. var. *typica* Munz, nom. inval., *Jussiaea octofila* DC. var. *elegans* (Cambess.) H. Lév.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, ITA, SPE). URY(COL, SJO).

Ludwigia erecta (L.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea erecta* L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(GUA).

Ludwigia filiformis (Micheli)

Ramamoorthy

Sin.: *Jussiaea filiformis* Micheli, *Jussiaea longifolia* DC. subsp. *filiformis* (Micheli) Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *warmingii* Hassl., nom. superfl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

Sin.: *Jussiaea grandiflora* Michx., *Jussiaea repens* L. f. *intermedia* Hassl., *Jussiaea repens* L. var. *grandiflora* (Michx.) Hassl., *Jussiaea repens* L. var. *hispidula* Hauman, *Jussiaea repens* L. var. *major* Hassl., *Jussiaea repens* L. var. *uruguayensis* (Cambess.) Hassl., *Jussiaea stenophylla* Gillies ex Hook., *Jussiaea stuckertii* H. Lév., *Jussiaea uruguayensis* Cambess., *Jussiaea uruguayensis* Cambess. var. *genuina* Munz, nom. inval., *Ludwigia grandiflora* (Michx.) Zardini, H. Gu & P.H. Raven, hom. illeg., *Ludwigia uruguayensis* (Cambess.) H. Hara

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).

Ludwigia hassleriana (Chodat) Ramamoorthy
Sin.: *Jussiaea hassleriana* Chodat, *Jussiaea myrtifolia* Cambess. f. *brevifolia* Hassl., *Jussiaea myrtifolia* Cambess. f. *hassleriana* (Chodat) Hassl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

Ludwigia helminthorrhiza (Mart.) H. Hara
Sin.: *Jussiaea helminthorrhiza* Mart., *Jussiaea natans* Bonpl., *Jussiaea natans* Bonpl. f. *latifolia* Hassl., *Jussiaea natans* Bonpl. var. *emersa* Hassl., *Jussiaea natans* Bonpl. var. *genuina* Hassl., nom. inval.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CEN, CHO, CON, PHA).

Ludwigia hexapetala (Hook. & Arn.) Zardini, A.G. Gu & P.H. Raven
Sin.: *Jussiaea hexapetala* Hook. & Arn., *Jussiaea uruguayensis* Cambess. f. *major* (Hassl.) Munz, *Ludwigia grandiflora* (Michx.) Greuter & Burdet subsp. *hexapetala* (Hook. & Arn.) G.L. Nesom & Kartesz, *Ludwigia uruguayensis* (Cambess.) H. Hara var. *major* (Hassl.) Munz
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, NEU, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, RME). PRY(CEN, PHA).

Notas: Citada para Uruguay (Zardini et al., 1991) sin indicar localidad o material de referencia.

Ludwigia hookeri (Micheli) H. Hara
Sin.: *Jussiaea hookeri* Micheli
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MON).

Ludwigia humboldtiana Funez, D.M. Farias, Hassemer & Gasper
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell
Sin.: *Jussiaea hyssopifolia* G. Don
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ludwigia irregularis Funez, Hassemer, D.M. Farias & Gasper
Arbusto o subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).

Ludwigia irwinii Ramamoorthy
Sin.: *Jussiaea lanceolata* Cambess.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CAA, ÑEE, PAI).

Ludwigia lagunae (Morong) H. Hara
Sin.: *Jussiaea brachycarpa* Lam. subsp. *epilobioides* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Jussiaea brachycarpa* Lam. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Jussiaea brachycarpa* Lam. var. *grandiflora* Hassl., *Jussiaea brachycarpa* Lam. var. *paraguayensis* (Chodat) Hassl., *Jussiaea brachycarpa* Lam. var. *parviflora* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Jussiaea brachycarpa* Lam. var. *puberula* Hassl., *Jussiaea brachycarpa* Micheli, hom. illeg., *Jussiaea epilobioides* Chodat & Hassl., *Jussiaea epilobioides*

Chodat & Hassl. var. *parviflora* Chodat & Hassl., *Jussiaea lagunae* Morong, *Jussiaea lagunae* Morong var. *paraguayensis* (Chodat) Munz, *Jussiaea lagunae* Morong var. *typica* Munz, nom. inval., *Jussiaea leveilleana* Bertoni, *Jussiaea paraguayensis* Chodat, *Jussiaea suffruticosa* L. var. *epilobioides* (Chodat & Hassl.) Bertoni, *Jussiaea suffruticosa* L. var. *paraguayensis* (Chodat) Bertoni, *Jussiaea suffruticosa* L. var. *parviflora* (Chodat & Hassl.) Bertoni
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA, GUA, ÑEE, PHA, SPE).

Ludwigia laruotteana (Cambess.) H. Hara
Sin.: *Jussiaea laruotteana* Cambess., *Jussiaea laruotteana* Cambess. var. *pubescens* Micheli
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hara
Sin.: *Jussiaea leptocarpa* Nutt., *Jussiaea leptocarpa* Nutt. f. *biacuminata* (Rusby) Munz, *Jussiaea leptocarpa* Nutt. var. *genuina* Munz, nom. inval., *Jussiaea pilosa* Kunth var. *pterocarpa* Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, PHA). URY(CLA, ROC).

Ludwigia litoranea Cocco & Boldrini
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Ludwigia longifolia (DC.) H. Hara
Sin.: *Jussiaea longifolia* DC., *Jussiaea longifolia* DC. var. *minor* Micheli, nom. superfl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *typica* Hassl., nom. inval., *Jussiaea octofila* DC.

f. *longifolia* (DC.) H. Lév., *Jussiaea peruviana* L. var. *longifolia* (DC.) H. Lév. ex Bertoni

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA). URY(CAS, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR).

Ludwigia major (Micheli) Ramamoorthy
Sin.: *Jussiaea longifolia* DC. f. *filifolia* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *apaensis* Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *major* Micheli, *Jussiaea longifolia* DC. var. *vulgaris* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea pseudonarcissus* Chodat & Hassl. f. *filifolia* Chodat & Hassl., *Jussiaea pseudonarcissus* Chodat & Hassl. var. *leptophylla* Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, FLO, PAY, RNO).

Ludwigia martii (Micheli) Ramamoorthy
Sin.: *Jussiaea martii* Micheli, *Jussiaea myrtifolia* Cambess. f. *foliosa* Hassl., *Jussiaea myrtifolia* Cambess. f. *pohlana* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea nervosa* Poir. f. *microphylla* Chodat & Hassl., *Jussiaea nervosa* Poir. var. *microphylla* (Chodat & Hassl.) Bertoni, *Jussiaea sericea* Cambess. var. *villosissima* Micheli

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, ÑEE).

Ludwigia multinervia (Hook. & Arn.) Ramamoorthy

Sin.: *Jussiaea multinervia* Hook. & Arn.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(ROC).

Ludwigia myrtifolia (Cambess.) H. Hara
Sin.: *Jussiaea myrtifolia* Cambess.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ludwigia neograndiflora (Munz) H. Hara
Sin.: *Jussiaea neograndiflora* Munz

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

Ludwigia nervosa (Poir.) H. Hara
Sin.: *Jussiaea nervosa* Poir., *Jussiaea nervosa* Poir. f. *foliosa* Chodat & Hassl., *Jussiaea nervosa* Poir. var. *pubescens* Micheli

Arbusto o árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA).

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven
Sin.: *Jussiaea macropoda* C. Presl, *Jussiaea octonervia* Lam., *Jussiaea suffruticosa* L. f. *linearifolia* (Hassl.) Munz, *Jussiaea suffruticosa* L. var. *ligustrifolia* (Kunth) Griseb., *Jussiaea suffruticosa* L. var. *linearifolia* Hassl., *Jussiaea suffruticosa* L. var. *macropoda* (C. Presl) Munz, *Jussiaea suffruticosa* L. var. *sessiliflora* (Micheli) Hassl., *Ludwigia octovalvis* (Jacq.) P.H. Raven subsp. *macropoda* (C. Presl) P.H. Raven, *Oenothera octovalvis* Jacq.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, AMA, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven subsp. **montevidensis** (Spreng.) P.H. Raven

Sin.: *Jussiaea glandulosa* Larrañaga, *Jussiaea montevidensis* Spreng., *Jussiaea repens* L., *Jussiaea repens* L.

var. *montevidensis* (Spreng.) Munz, *Ludwigia adscendens* (L.) H. Hara var. *montevidensis* (Spreng.) H. Hara

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, ERI, MEN, SJU). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(CAS, COL, FLA, MON, ROC, SAO, SOR).

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven subsp. **peploides**

Sin.: *Jussiaea peploides* Kunth, *Jussiaea repens* L. var. *peploides* (Kunth) Griseb., *Jussiaea repens* L. var. *ramulosa* (DC.) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PHA). URY(CAS, COL, PAY, SAO, SOR).

Ludwigia peruviana (L.) H. Hara
Sin.: *Jussiaea peruviana* L., *Jussiaea peruviana* L. f. *hirsuta* Hassl., *Jussiaea peruviana* L. f. *tomentosa* Hassl., *Jussiaea peruviana* L. var. *typica* Munz, nom. inval.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, BIO). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA). URY(CAS, COL, PAY).

Ludwigia pseudonarcissus (Chodat & Hassl.) Ramamoorthy

Sin.: *Jussiaea lithospermifolia* Micheli var. *meridionalis* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea longifolia* DC. f. *grandiflora* Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. f. *parviflora* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea longifolia* DC. subsp. *pseudonarcissus* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *intermedia* Hassl., *Jussiaea nervosa* Poir.

f. *salicina* Chodat & Hassl., *Jussiaea pseudonarcissus* Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

Ludwigia quadrangularis (Micheli) H. Hara

Sin.: *Jussiaea quadrangularis* Micheli

Suabarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ludwigia sedoides (Humb. & Bonpl.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea sedoides* Humb. & Bonpl.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Ludwigia sericea (Cambess.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea myrtifolia* Cambess. f. *brasiliensis* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea myrtifolia* Cambess. f. *paraguayensis* Hassl., *Jussiaea myrtifolia* Cambess. var. *sericea* (Cambess.) Hassl., *Jussiaea sericea* Cambess., *Jussiaea sericea* Cambess. var. *genuina* Munz, nom. inval.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, SAO).

Ludwigia torulosa (Arn.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea torulosa* Arn.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Oenothera L.

Oenothera acaulis Cav.

Sin.: *Lavauxia mutica* Spach, *Oenothera mutica* (Spach) Gay

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Oenothera affinis Cambess.

Sin.: *Oenothera berteriana* Spach, *Oenothera chilensis* Fisch. & C.A. Mey., *Raimannia berteriana* (Spach) Sprague & Riley

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, RME, JFE). PRY(APA). URY(MON, ROC).

Oenothera arequipensis Munz & I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: CHL(ANT).

Oenothera bahia-blancae W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU).

Oenothera biennis L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, DFE, MEN). BRA(PAR). CHL(VAL).

Oenothera catharinensis Cambess.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Oenothera centaureifolia (Spach) Steud.

Sin.: *Lavauxia centaureifolia* Spach

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SDE, SFE). URY(CAS).

Oenothera coquimbensis Gay

Sin.: *Oenothera coquimbensis* Gay var. *grandidentata* (Phil.) Reiche, *Oenothera grandidentata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Oenothera curtiflora W.L. Wagner & Hoch

Sin.: *Gaura australis* Griseb., *Gaura parviflora* Douglas ex Hook.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(COR, MEN, SAL, SLU).

Oenothera elongata Rusby

Sin.: *Oenothera serratifolia* Krause

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT).

Oenothera glazioviana Micheli

Sin.: *Oenothera erythrosepala* (Borbás) Borbás, *Onagra erythrosepala* Borbás

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, SFE). BRA(PAR). CHL(LBO, LLA). URY(MON).

Oenothera grisea W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(VAL).

Oenothera indecora Cambess.

Sin.: *Oenothera argentinae* H. Lév. & Thell., *Oenothera argentinae* H. Lév. & Thell. var. *longipila* Kloos & Thell., *Oenothera indecora* Cambess. subsp. *bonariensis* W. Dietr.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, GUA, ITA). URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, RIV, SAO, SJO, TYT).

Oenothera laciniata Hill

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COR, SLU).

Oenothera lasiocarpa Griseb.

Hierba. Endémica. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Oenothera longiflora L. subsp. **grandiflora** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI).

Oenothera longiflora L. subsp. **longiflora**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(COL, MON, RNO, ROC, SJO).**Oenothera longituba** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Oenothera magellanica Phil.Sin.: *Oenothera hirsuta* F. Meigen, hom. illeg., *Oenothera magellanica* Phil. var. *chubutensis* Macloskie, *Oenothera polymorpha* H. Lév. var. *magellanica* (Phil.) H. Lév.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU). CHL(AIS, MAG).

Oenothera mendocinensis Gillies ex Hook. & Arn.Sin.: *Oenothera argentinae* H. Lév. & Thell. var. *camptotricha* Kloos & Thell., *Raimannia mendocinensis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Sprague & Riley

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR).

Oenothera mollissima L.Sin.: *Oenothera mollissima* L. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Oenothera mollissima* L. var. *villosa* Spreng., *Onagra mollissima* (L.) Moench, *Raimannia mollissima* (L.) Sprague & Riley

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, ROC, SJO).

Oenothera montevidensis W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(CAS, MON).

Oenothera nana Griseb.

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT).

Oenothera odorata Jacq.Sin.: *Oenothera ibarii* Phil., *Oenothera mollissima* L. subsp. *odorata* (Jacq.) Thell., *Oenothera odorata* Jacq. f. *media* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. var. *glabrescens* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. var. *glaucescens* Ser. ex DC., *Oenothera odorata* Jacq. var. *undulata* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. var. *virescens* Ser., *Oenothera odoratissima* Tausch, *Oenothera undulata* Aiton, *Onagra undulata* Moench, nom. illeg., *Raimannia odorata* (Jacq.) Sprague & Riley

Hierba. Endémica. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(AIS, MAG).

Oenothera parodiana MunzSin.: *Oenothera argentinae* H. Lév. & Thell. var. *heterotricha* Kloos & Thell., *Oenothera parodiana* Munz subsp. *brasiliensis* W. Dietr., *Oenothera parodiana* Munz subsp. *strigulosa* W. Dietr., *Oenothera pseudolongiflora* W. Dietr., *Oenothera ravenii* W. Dietr. subsp. *argentinae* W. Dietr., *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link subsp. *argentinae* W. Dietr.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SDE, SFE, SLU,

TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).

Oenothera pedunculifolia W. Dietr.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Oenothera peruana W. Dietr.

Hierba. Nativa. 2500-3300 m.

Países: CHL(TAR).

Oenothera picensis Phil. subsp. **bonariensis** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SLU).

Oenothera picensis Phil. subsp. **cordobensis** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, SLU, TUC).

Oenothera picensis Phil. subsp. **picensis**

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME, JFE).

Oenothera punae KuntzeSin.: *Oenothera kuntziana* H. Lév., *Raimannia punae* (Kuntze) Sprague & Riley

Hierba. Nativa. 2000-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Oenothera ravenii W. Dietr. subsp. **chilensis** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LSR, LLA).

Oenothera ravenii W. Dietr. subsp. **ravenii**

Sin.: *Oenothera mollissima* L. var. *paraguayensis* Chodat

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI). URY(CLA, LAV, MON, ROC, SAO).

Oenothera rivadaviae W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, SCR).

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton

Sin.: *Godetia heuckii* Phil.

Hierba. Introducida. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, MEN, SAL, SFE, TUC). BRA(SCA).
CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE, IPA). URY(MON).

Oenothera sandiana Hassk.

Sin.: *Oenothera rubida* Rusby

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Oenothera santarii W. Dietr.

Sin.: *Oenothera odorata* Jacq. var. *brachycarpa* Hauman

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(COR, MEN, SJU, SLU).

Oenothera scabra Krause

Sin.: *Oenothera burkartiana* Bartlett

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Oenothera siambonensis W. Dietr.

Sin.: *Oenothera acuticarpa* W. Dietr.,
Oenothera cordobensis W. Dietr.,
Oenothera hechtii W. Dietr., *Oenothera*
tucumanensis W. Dietr.

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Oenothera stricta Ledeb. ex Link subsp. **altissima** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Oenothera stricta Ledeb. ex Link subsp. **stricta**

Sin.: *Oenothera arguta* Greene,
Oenothera brachysepala Spach,
Oenothera bracteata Phil., *Oenothera*
bracteata Phil. var. *glabrescens* (Phil.)
Reiche, *Oenothera glabrescens* Phil.,
Oenothera mollissima L. subsp. *propinqua*
(Spach) Thell., *Oenothera mollissima* L.
var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Oenothera*
propinqua Spach, *Oenothera propinqua*
Spach var. *parsiflora* Phil., *Oenothera*
stricta Ledeb. ex Link var. *propinqua*
(Spach) Reiche, *Oenothera valdiviana*
Phil., *Onagra arguta* (Greene) Small

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE, SFE).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, IPA).

Notas: Probablemente introducida en Argentina desde Chile (Hoch, 1988)

Oenothera suffrutescens (Ser.) W.L. Wagner & Hoch

Sin.: *Gaura coccinea* Pursh

Hierba. Introducida.

Países: BRA(RGS).

Oenothera tafiensis W. Dietr. subsp. **parviflora** W. Dietr.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(TUC).

Oenothera tafiensis W. Dietr. subsp. **tafiensis**

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Oenothera versicolor Lehm.

Sin.: *Oenothera campylocalyx* C. Koch & Bouché

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Oenothera villaricae W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(ARA, LSR, LLA).

Oenothera villosa Thunb.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, MEN, SJU).

OPILIACEAE

Agonandra Miers ex Hook. f.

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(AMA, CON, SPE).

Agonandra excelsa Griseb.

Sin.: *Agonandra spegazzini* Molino

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA).

ORCHIDACEAE

Aa Juss.

Aa achalensis Schltr.

Sin.: *Aa lorentzii* Schltr., *Aa*
schickendantzii Schltr.

Hierba. Endémica. 1500-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SJU, TUC).

Aa fiebrigii (Schltr.) Schltr.

Sin.: *Altensteinia fiebrigii* Schltr.

Hierba. Nativa. 1700-2700 m.

Países: ARG(JUU, TUC).

Aa hieronymi (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Aa tenebrosa* C.M. Martín & G.J.

Scrocchi, *Altensteinia hieronymi* Cogn.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Aa weddelliana (Rchb. f.) Schltr.

Sin.: *Altensteinia weddelliana* Rchb. f.

Hierba. Nativa. 1300-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Acianthera Scheidw.

Acianthera acuminatipetala (A. Samp.)

Luer

Sin.: *Pleurothallis acuminatipetala* A.

Samp.

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Acianthera adirii (Brade) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis adirii* Brade, *Specklinia adirii* (Brade) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Acianthera alborosea (Kraenzl.) Luer

Sin.: *Octomeria alborosea* Kraenzl., *Pleurothallis alborosea* (Kraenzl.) Brade

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera antennata (Garay) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis antennata* Garay

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Acianthera aphthosa (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis aphthosa* Lindl., *Pleurothallis foetens* Lindl., *Pleurothallis macrophyta* Barb. Rodr., *Pleurothallis pelioxantha* Barb. Rodr., *Specklinia aphthosa* (Lindl.) F. Barros

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, PAI).

Acianthera atropurpurea (Barb. Rodr.)

Chiron & Van den Berg

Sin.: *Pleurobotryum atropurpureum* Barb.

Rodr., *Pleurothallis teretifolia* Rolfe

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

Acianthera aurantio-lateritia (Speg.)

Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis aurantio-lateritia* Speg.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL).

Acianthera auriculata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Arthrosia auriculata* (Lindl.) Luer, *Pleurothallis anthoxantha* Rchb. f., *Pleurothallis auriculata* Lindl., *Pleurothallis compressiflora* Barb. Rodr., *Specklinia auriculata* (Lindl.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera bicarinata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Acianthera binotii* (Regel) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis bicarinata* Lindl., *Pleurothallis binotii* Regel

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

Acianthera bidentula (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis bidentula* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera boliviana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Humboldtia boliviana* (Rchb. f.) Kuntze, *Pleurothallis boliviana* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 1000-1200 m.

Países: ARG(SAL).

Acianthera brachiloba (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis brachiloba* Hoehne, *Specklinia brachiloba* (Hoehne) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera bragae (Ruschi) F. Barros

Sin.: *Acianthera sarracenia* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, *Phloeophila pubescens* (Barb. Rodr.) Garay, *Physosiphon bragae* Ruschi, *Physosiphon pubescens* Barb. Rodr., *Pleurothallis sarracenia* Luer, *Sarracenella pubescens* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera caldensis (Hoehne & Schltr.) F. Barros

Sin.: *Arthrosia caldensis* (Hoehne & Schltr.) Luer, *Pleurothallis caldensis* Hoehne & Schltr., *Specklinia caldensis* (Hoehne & Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Acianthera calopedilon Toscano & Luer

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Acianthera capanemae (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis capanemae* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

- Países: BRA(PAR).
- Acianthera capillaris** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Acianthera longicaulis* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Arthrosia floribunda* (Lindl.) Luer, *Humboldtia capillaris* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis capillaris* Lindl., *Pleurothallis longicaulis* Lindl., *Pleurothallis montana* Barb. Rodr., *Specklinia capillaris* (Lindl.) Luer, *Specklinia floribunda* Lindl., *Specklinia longicaulis* (Lindl.) Luer, *Specklinia montana* (Barb. Rodr.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Acianthera crepiniana** (Cogn.) Chiron & Van den Berg
Sin.: *Pleurobotryum albopurpureum* (Kraenzl.) Garay, *Pleurobotryum crepinianum* (Cogn.) Hoehne, *Pleurothallis albopurpurea* Kraenzl., *Pleurothallis crepiniana* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Acianthera crinita** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Acianthera renipetala* (Barb. Rodr.) Luer, *Lepanthes crinita* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Lepanthes renipetala* Barb. Rodr., *Pleurothallis crinita* Barb. Rodr., *Specklinia crinita* (Barb. Rodr.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Acianthera cryptantha** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Acianthera juergensii* (Schltr.) F. Barros, *Acianthera langeana* (Kraenzl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera neojuergensii* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, *Cryptophoranthus cryptanthus* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Cryptophoranthus dusenii* Schltr., *Cryptophoranthus juergensii* Schltr., *Cryptophoranthus langeanus* (Kraenzl.) Garay, *Pleurothallis cryptantha* Barb. Rodr., *Pleurothallis langeana* Kraenzl., *Pleurothallis neojuergensii* Luer
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Acianthera dutrae** (Pabst) C.N. Gonçalves & J.L. Waechter
Sin.: *Pleurothallis dutrae* Pabst, *Specklinia dutrae* (Pabst) Luer
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: BRA(RGS).
- Acianthera echinosa** Luer & Toscano
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(SCA).
- Acianthera exarticulata** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis exarticulata* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Acianthera fenestrata** (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Acianthera spicata* (Dutra) Pridgeon & M.W. Chase, *Cryptophoranthus fenestratus* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Cryptophoranthus fenestratus* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr. var. *angustifolius* Cogn., *Cryptophoranthus spicatus* Dutra, *Pleurothallis fenestrata* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Acianthera glanduligera** (Lindl.) Luer
Sin.: *Acianthera cearensis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera cryptoceras* (Rchb. f.) F. Barros, *Acianthera iguapensis* (Schltr.) F. Barros, *Anathallis iguapensis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis altoserrana* Hoehne, *Pleurothallis cearensis* Schltr., *Pleurothallis cryptoceras* Rchb. f., *Pleurothallis glanduligera* Lindl., *Pleurothallis iguapensis* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Acianthera glumacea** (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Humboldtia glumacea* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis crocea* Barb. Rodr., *Pleurothallis glaziovii* Cogn., *Pleurothallis glumacea* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Acianthera gouveiae** (A. Samp.) F. Barros & L. Guimarães
Sin.: *Pleurothallis gouveiae* A. Samp.
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Acianthera gracilisepala** (Brade) Luer
Sin.: *Pleurothallis gracilisepala* Brade
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Acianthera guimaraensii** (Brade) F. Barros
Sin.: *Pleurothallis guimaraensii* Brade, *Specklinia guimaraensii* (Brade) Luer
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Acianthera hatschbachii** (Schltr.) Chiron & C. Berg
Sin.: *Pleurobotryum hatschbachii* (Schltr.) Hoehne, *Pleurothallis hatschbachii* Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 300-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Acianthera hoffmannseggiana** (Rchb. f.) F. Barros
Sin.: *Pleurothallis hoffmannseggiana* Rchb. f., *Pleurothallis loefgrenii* Cogn.,

Pleurothallis ophiantha Cogn.,
Pleurothallis ophicephala Barb. Rodr.
 Hierba epífita. Nativa. 200-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera hygrophila (Barb. Rodr.)
 Pridgeon & M.W. Chase
 Sin.: *Acianthera barbacenensis* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Arthrosia hygrophila* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis barbacenensis* Barb. Rodr., *Pleurothallis barbacenensis* Barb. Rodr. var. *angustifolia* (Pabst) Pabst, *Pleurothallis hygrophila* Barb. Rodr., *Pleurothallis hygrophila* Barb. Rodr. var. *elongata* Hauman, *Pleurothallis hygrophila* Barb. Rodr. var. *longicaulis* Dutra ex Pabst, *Pleurothallis platysemos* Rchb. f. var. *angustifolia* Pabst, *Pleurothallis platysemos* Rchb. f. var. *platysemos*, *Specklinia barbacenensis* (Barb. Rodr.) Luer, *Specklinia hygrophila* (Barb. Rodr.) Luer, *Stelis hygrophila* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
 Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

Acianthera hystrix (Kraenzl.) F. Barros
 Sin.: *Acianthera raduliglossa* (Pabst) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera similis* (Schltr.) Karremans, *Apoda-prorepentia raduliglossa* (Pabst) Luer, *Chiron* & C. Berg, *Cryptophoranthus hystrix* (Kraenzl.) Garay, *Cryptophoranthus similis* Schltr., *Phloeophila hystrix* (Kraenzl.) Garay, *Phloeophila similis* (Schltr.) Garay, *Physosiphon hystrix* Kraenzl., *Pleurothallis raduliglossa* Pabst, *Pleurothallis similis* (Schltr.) Luer, *Specklinia hystrix* (Kraenzl.) Luer
 Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera jordanensis (Brade) F. Barros
 Sin.: *Cryptophoranthus jordanensis* Brade
 Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(SCA).

Acianthera karlii (Pabst) C.N. Gonçalves & J.L. Waechter
 Sin.: *Apoda-prorepentia karlii* (Pabst) Luer, *Pleurothallis karlii* Pabst
 Hierba epífita. Endémica. 800-1200 m.
 Países: BRA(PAR, RGS).

Acianthera klingelfusii Luer, Toscano & D.H. Baptista
 Hierba epífita. Endémica. 300-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Acianthera klotzschiana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
 Sin.: *Humboldtia klotzschiana* (Rchb. f.) Kuntze, *Pleurothallis klotzschiana* Rchb. f.
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Acianthera leptotifolia (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
 Sin.: *Pabstiella leptotifolia* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis leptotifolia* Barb. Rodr., *Specklinia leptotifolia* (Barb. Rodr.) Luer
 Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS).

Acianthera luteola (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
 Sin.: *Acianthera rodriguesii* (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis caespitosa* Barb. Rodr., *Pleurothallis caespitosa* Barb. Rodr. var. *platycaulis* (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst, *Pleurothallis luteola* Lindl., *Pleurothallis platycaulis* Rchb. f. ex Cogn., *Pleurothallis rodriguesii* Cogn., *Pleurothallis subcordifolia* Cogn., *Specklinia luteola* (Lindl.) F. Barros
 Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera macropoda (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
 Sin.: *Pleurothallis macropoda* Barb. Rodr., *Pleurothallis macropoda* Barb. Rodr. var. *laevis* Barb. Rodr.
 Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera macuconensis (Barb. Rodr.) F. Barros
 Sin.: *Pleurothallis gonzalezii* Pabst, *Pleurothallis macuconensis* Barb. Rodr., *Specklinia gonzalezii* (Pabst) Luer
 Hierba epífita. Nativa. 200-800 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(SCA).
 Notas: Citada para Paraguay sin mencionar localidad o material de referencia. (cfr. Rojasiana 9: 44. 2010).

Acianthera malacantha (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
 Sin.: *Arthrosia malacantha* (Rchb. f.) Luer, *Pleurothallis malacantha* Rchb. f., *Specklinia malacantha* (Rchb. f.) Luer
 Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR).

Acianthera mantiquyrana (Barb. Rodr.) V.T. Rodrigues & F. Barros
 Sin.: *Acianthera rhabdosepala* (Schltr.) Chiron & C. Berg, *Pleurobotryum mantiquyranum* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Pleurobotryum rhabdosepalum* (Schltr.) Hoehne, *Pleurothallis mantiquyrana* Barb. Rodr., *Pleurothallis rhabdosepala* Schltr.
 Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.
 Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera marumbyana (Garay) Luer
 Sin.: *Pleurothallis marumbyana* Garay
 Hierba epífita. Endémica. 200-500 m.
 Países: BRA(PAR).

Acianthera modestissima (Rchb.f. & Warm.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis modestissima* Rchb.f. & Warm.

Hierba terrestre o rupícola. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Acianthera murexoides (Pabst) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis murexoides* Pabst, *Specklinia murexoides* (Pabst) Luer

Hierba epífita. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(SCA).

Acianthera muscosa (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Arthrosia muscosa* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis muscosa* Barb. Rodr., *Pleurothallis muscosa* Barb. Rodr. var. *parviflora* Hoehne, *Specklinia muscosa* (Barb. Rodr.) Luer, *Specklinia muscosa* (Barb. Rodr.) Luer var. *parvifolia* (Hoehne) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Acianthera myrticola (Barb. Rodr.) F. Barros & L.R.S. Guim.

Sin.: *Arthrosia myrticola* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis myrticola* Barb. Rodr., *Specklinia myrticola* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Acianthera nemorosa (Barb. Rodr.) F. Barros

Sin.: *Acianthera farinosa* (Pabst) Luer, *Acianthera nemorosa* (Barb. Rodr.) Luer, comb. superfl., *Pleurothallis farinosa* Pabst, *Pleurothallis nemorosa* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera oligantha (Barb. Rodr.) F. Barros

Sin.: *Pleurothallis oligantha* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera panduripetala (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis panduripetala* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera papillosa (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis papillosa* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Acianthera pardipes (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis pardipes* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera parva (Rolfe) F. Barros & L. Guimarães

Sin.: *Pleurothallis parva* Rolfe

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Acianthera pectinata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis pectinata* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).

Acianthera perdusenii (Hoehne) F. Barros & L.R.S. Guim.

Sin.: *Pleurothallis perdusenii* Hoehne

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis porphyrantha* Kraenzl., *Pleurothallis pubescens* Lindl., *Pleurothallis riograndensis* Barb. Rodr.,

Pleurothallis riograndensis Barb. Rodr. var. *longicaulis* Cogn., *Pleurothallis riograndensis* Barb. Rodr. var. *viridicata* Barb. Rodr., *Pleurothallis smithiana* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, GUA, PAI). URY(CLA, ROC).

Acianthera ramosa (Barb. Rodr.) F. Barros

Sin.: *Acianthera ramosa* (Barb. Rodr.) Luer, comb. superfl., *Pleurothallis ramosa* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis bistuberculata* Barb. Rodr., *Pleurothallis curitybensis* Kraenzl., *Pleurothallis lamproglossa* Schltr., *Pleurothallis leucorhoda* Schltr., *Pleurothallis lilacina* Barb. Rodr. var. *microphylla* Barb. Rodr., *Pleurothallis recurva* Lindl., *Pleurothallis recurva* Lindl. var. *microphylla* (Barb. Rodr.) Garay, *Specklinia recurva* (Lindl.) F. Barros

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA, ÑEE).

Acianthera saundersiana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis ascendens* Garay, *Pleurothallis butantanensis* Hoehne & Schltr., *Pleurothallis felislingua* Barb. Rodr., *Pleurothallis josephensis* Barb. Rodr., *Pleurothallis juergensii* Schltr., *Pleurothallis repens* Rolfe, hom. illeg., *Pleurothallis saundersiana* Rchb. f., *Specklinia saundersiana* (Rchb. f.) F. Barros

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, SPE).

Acianthera saurocephala (Lodd.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Humboldtia saurocephala* (Lodd.) Kuntze, *Pleurothallis saurocephala* Lodd.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera serpentula (Barb. Rodr.) F. Barros

Sin.: *Pleurothallis punctata* Barb. Rodr., hom. illeg., *Pleurothallis serpentula* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera sonderiana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis sonderiana* Rchb. f., *Pleurothallis sonderiana* Rchb. f. var. *longicaulis* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, SPE). URY(CLA).

Acianthera spilantha (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Myoxanthus spilanthus* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis spilantha* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Acianthera strupifolia (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis strupifolia* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera translucida (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Pleurothallis translucida* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Acianthera tricarinata (Poepp. & Endl.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis platystachys* Regel, *Pleurothallis trialata* Cogn., *Pleurothallis tricarinata* Poepp. & Endl.

Hierba epífita. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera tristis (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis tristis* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS).

Acianthera violaceomaculata (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis violaceomaculata* Hoehne, *Specklinia violaceomaculata* (Hoehne) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Acianthera wagneriana (Klotzsch) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis convexifolia* Barb. Rodr., *Pleurothallis wagneriana* Klotzsch, *Pleurothallis xylobiochila* Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acronia C. Presl

Acronia alopex Luer

Sin.: *Pleurothallis alopex* Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.

Países: PRY(APA).

Anathallis Barb. Rodr.

Anathallis adenochila (Loefgr.) F. Barros

Sin.: *Anathallis aquinoi* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Panmorphia adenochila* (Loefgr.) Luer, *Pleurothallis adenochila*

Loefgr., *Pleurothallis aquinoi* Schltr., *Specklinia adenochila* (Loefgr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis bertonensis (Hauman) Luer

Sin.: *Pleurothallis bertonensis* Hauman, *Specklinia bertonensis* (Hauman) Luer, *Stelis bertonensis* (Hauman) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Endémica. 300-500 m.

Países: PRY(APA).

Anathallis bleyensis (Pabst) F. Barros

Sin.: *Anathallis bleyensis* (Pabst) Luer, comb. illeg., *Pleurothallis bleyensis* Pabst, *Specklinia bleyensis* (Pabst) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anathallis bocainensis (Porto & Brade) F. Barros & Barberena

Sin.: *Pleurothallis bocainensis* Porto & Brade

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Anathallis brevipes (H. Focke) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Anathallis modesta* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Lepanthes modesta* Barb. Rodr., *Panmorphia brevipes* (H. Focke) Luer, *Panmorphia modesta* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis brevipes* H. Focke, *Pleurothallis modesta* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia modesta* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Anathallis caroli (Schltr.) F. Barros & Barberena

Sin.: *Pleurothallis caroli* Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(RGS).

Anathallis ciliolata (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Panmorphia ciliolata* (Schltr.) Luer, *Pleurothallis ciliolata* Schltr., *Specklinia ciliolata* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Anathallis corticicola (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Panmorphia corticicola* (Schltr. ex Hoehne) Luer, *Pleurothallis corticicola* Schltr. ex Hoehne, *Pleurothallis kleinii* Pabst, *Specklinia corticicola* (Schltr. ex Hoehne) Luer, *Specklinia kleinii* (Pabst) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis dryadum (Schltr.) F. Barros

Sin.: *Pabstiella dryadum* (Schltr.) Luer, *Pleurothallis dryadum* Schltr., *Pleurothallis maculosa* Garay, *Specklinia dryadum* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis fernandiana (Barb. Rodr.) F. Barros

Sin.: *Lepanthes ferdinandiana* Barb. Rodr., *Pleurothallis ferdinandiana* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis fernandiana* Hoehne, *Specklinia fernandiana* (Hoehne) F. Barros, *Stelis fernandiana* (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Anathallis gerthatschbachii (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis gerthatschbachii* Hoehne, *Specklinia gerthatschbachii* (Hoehne) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis globifera (Pabst) F. Barros & Barberena

Sin.: *Pleurothallis globifera* Pabst

Hierba epífita. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

Anathallis heloisae F.J. de Jesus, M.R. Miranda & Chiron f. **camboriensis** A.S.

Medeiros, W. Campos & Pegoraro

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Anathallis heterophylla Barb. Rodr.

Sin.: *Acianthera heterophylla* Barb. Rodr., *Anathallis liparanges* (Rchb. f.) Luer, *Pleurothallis heterophylla* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis hoehnei* Schltr., *Pleurothallis liparanges* Rchb. f., *Specklinia heterophylla* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anathallis imbricata (Barb. Rodr.) F. Barros & F. Pinheiro

Sin.: *Anathallis imbricata* (Barb. Rodr.) Luer, comb. illeg., *Pleurothallis imbricata* Barb. Rodr., *Specklinia imbricata* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Anathallis johnsonii Luer & Toscano

Hierba epífita. Endémica.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Anathallis kleinii (Pabst) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anathallis klingelfusii Luer & Toscano

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Anathallis laciniata (Barb. Rodr.) Luer & Toscano

Sin.: *Lepanthes laciniata* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Panmorphia laciniata* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis laciniata* Barb. Rodr., *Specklinia laciniata* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.

Países: BRA(RGS).

Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Anathallis margaritifera* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Anathallis rigidula* (Cogn.) Luer, *Pleurothallis convallium* Kraenzl., *Pleurothallis convergens* R.C.J. Gerard, *Pleurothallis depauperata* Cogn., *Pleurothallis eugenii* Pabst, *Pleurothallis glossochila* Kraenzl., *Pleurothallis linearifolia* Cogn., *Pleurothallis margaritifera* Schltr., *Pleurothallis rigidula* Cogn., *Specklinia eugenii* (Pabst) Luer, *Specklinia linearifolia* (Cogn.) Luer, *Specklinia rigidula* (Cogn.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o material del referencia (cfr. Rojasiana 9: 49. 2010).

Anathallis malmeana (Dutra ex Pabst) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis malmeana* Dutra ex Pabst, *Specklinia malmeana* (Dutra ex Pabst) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Anathallis marginata (Barb. Rodr.) F. Barros & Barberena

Sin.: *Lepanthes marginata* Barb. Rodr., *Panmorphia limbata* (Cogn.) Luer, *Pleurothallis limbata* Cogn., *Specklinia limbata* (Cogn.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Anathallis microblephara (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Panmorphia microblephara* (Schltr.) Luer, *Pleurothallis microblephara* Schltr., *Specklinia microblephara* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(PAR).

Anathallis microphyta (Barb. Rodr.) C.O. Azevedo & C. Berg

Sin.: *Anathallis microgemma* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Anathallis microphyta* (Barb. Rodr.) Luer, comb. illeg., *Anathallis paranaensis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Lepanthes microphyta* Barb. Rodr., *Panmorphia paranaensis* (Schltr.) Luer, *Pleurothallis microgemma* Schltr., *Pleurothallis microphyta* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis microphyta* (Barb. Rodr.) Cogn. var. *missionum* Hauman, *Pleurothallis paranaensis* Schltr., *Specklinia microphyta* (Barb. Rodr.) Luer, *Specklinia paranaensis* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis microtis (Schltr.) Karremans

Sin.: *Pleurothallis microtis* Schltr., *Specklinia microtis* (Schltr.) Luer, *Stelis microtis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, nom. illeg., *Stelis pumila* Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

Anathallis muscoidea (Lindl.) F. Barros & Barberena

Sin.: *Pleurothallis muscoidea* Lindl., *Specklinia muscoidea* (Lindl.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 100-500 m.

Países: BRA(SCA).

Anathallis obovata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Anathallis citrina* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Anathallis densiflora* Barb. Rodr., *Anathallis fasciculata* Barb. Rodr., *Anathallis micrantha* Barb. Rodr., *Humboldtia obovata* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis albida* Lindl., *Pleurothallis angustilabia* Schltr., *Pleurothallis citrina* Schltr., *Pleurothallis citrina* Schltr. var. *elliptica* C. Schweinf., *Pleurothallis densiflora* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis densiflora* (Barb. Rodr.) Cogn. var. *parvifolia* Garay, *Pleurothallis fasciculata* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis minutiflora* Cogn., *Pleurothallis modestiflora* Schltr., *Pleurothallis obovata* (Lindl.) Lindl., *Specklinia citrina* (Schltr.) Luer, *Specklinia obovata* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Anathallis pabstii (Garay) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis pabstii* Garay, *Specklinia pabstii* (Garay) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis petersiana (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis petersiana* Schltr., *Specklinia petersiana* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Anathallis piratiningana (Hoehne) F. Barros

Sin.: *Pleurothallis piratiningana* Hoehne, *Specklinia piratiningana* (Hoehne) F. Barros, *Specklinia piratiningana* (Hoehne) Luer, comb. superfl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Anathallis rubens (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis montserratii* Porsch, *Pleurothallis rubens* Lindl., *Specklinia rubens* (Lindl.) F. Barros, *Stelis neorubens* Chiron

Hierba epífita. Nativa. 300-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis rubrolimbata (Hoehne) Luer & Toscano

Sin.: *Panmorphia rubrolimbata* (Hoehne) Luer, *Pleurothallis rubrolimbata* Hoehne, *Specklinia rubrolimbata* (Hoehne) Luer

Hierba epífita. Nativa. 800.

Países: BRA(RGS).

Anathallis rudolfii (Pabst) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Panmorphia rudolfii* (Pabst) Luer, *Pleurothallis rudolfii* Pabst, *Specklinia rudolfii* (Pabst) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Anathallis sclerophylla (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Anathallis racemosa* Barb. Rodr., *Anathallis secunda* Barb. Rodr., *Pleurothallis listrostachys* Rchb. f., *Pleurothallis ottonis* Schltr., *Pleurothallis racemosa* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis sclerophylla* Lindl., *Pleurothallis stenopetala* Lodd. ex Lindl., *Pleurothallis triura* Schltr., *Specklinia sclerophylla* (Lindl.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anathallis seidelii Luer, Toscano & D.H. Baptista

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Anathallis sororcula (Schltr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis sororcula* Schltr.,
Specklinia sororcula (Schltr.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Anathallis vitorinoi (Luer & Toscano)
Luer & Toscano
Sin.: *Pleurothallis vitorinoi* Luer & Toscano
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Anathallis ypirangae (Kraenzl.) Pridgeon
& M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis ypirangae* Kraenzl.,
Specklinia ypirangae (Kraenzl.) Luer
Hierba epífita. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Aspasia Lindl.

Aspasia lunata Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aspidogyne Garay

Aspidogyne argentea (Vell.) Garay
Sin.: *Ophrys argentea* Vell., *Physurus*
callodictyus Kraenzl., *Physurus pictus*
Lindl.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, CAN, CON, COA, PAI).

Aspidogyne bidentifera (Schltr.) Garay
Sin.: *Aspidogyne serripetala* (Garay)
Garay, *Erythodes bidentifera* (Schltr.)
Garay, *Erythodes schlechteriana*
(Hoehne) Pabst, *Erythodes serripetala*
Garay, *Microchilus bidentifer* (Schltr.) E.C.
Smidt & M.W. Chase, *Physurus*
bidentiferus Schltr., *Physurus*

schlechterianus Hoehne, *Platythelys*
schlechteriana (Hoehne) Garay
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CEN).

Aspidogyne bruxelii (Pabst) Garay
Sin.: *Erythodes bruxelii* Pabst
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA).

Aspidogyne commelinoides (Barb.
Rodr.) Garay
Sin.: *Erythodes commelinoides* (Barb.
Rodr.) Ames, *Physurus commelinoides*
Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aspidogyne debilis (Lindl.) Meneguzzo
Sin.: *Physurus debilis* Lindl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(CEN).

Aspidogyne decora (Rchb. f.) Garay &
G. Romero
Sin.: *Aspidogyne bicolor* (Barb. Rodr.)
Garay, *Erythodes bicolor* (Barb. Rodr.)
Ames, *Physurus bicolor* Barb. Rodr.,
Physurus decorus Rchb.f.
Hierba. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, CAN).

Aspidogyne fimbrillaris (Buyss.) Garay
Sin.: *Erythodes nobilis* (Rchb. f.) Pabst,
Erythodes picta (Lindl.) Ames, *Physurus*
fimbrillaris Buyss., *Physurus nobilis* Rchb.
f., *Physurus nobilis* Rchb. f. var.
argyrocentrus Hoehne
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aspidogyne foliosa (Poepp. & Endl.)
Garay

Sin.: *Aspidogyne longicornu* (Cogn.)
Garay, *Aspidogyne malmei* (Kraenzl.)
Garay, *Erythodes densiflora* (Lindl.)
Ames, *Erythodes foliosa* (Poepp. & Endl.)
Ames, *Erythodes longicornu* (Cogn.)
Ames, *Erythodes malmei* (Kraenzl.)
Pabst, *Pelexia foliosa* Poepp. & Endl.,
Physurus densiflorus Lindl., *Physurus*
foliosus (Poepp. & Endl.) Lindl., *Physurus*
longicalcaratus Schltr., *Physurus*
longicornu Cogn., *Physurus malmei*
Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAN).

Barbosella Schltr.

Barbosella australis (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Barbosella australis* (Cogn.) Schltr.
var. *genuina* Hoehne, *Restrepia australis*
Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Barbosella cogniauxiana (Speg. &
Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Barbosella handroi* Hoehne,
Barbosella porschii (Kraenzl.) Schltr.,
Barbosella riograndensis Dutra ex Pabst,
nom. nud., *Pleurothallis hamburgensis*
Kraenzl., *Pleurothallis spegazziniana* L.O.
Williams, *Restrepia cogniauxiana* Speg. &
Kraenzl., *Restrepia porschii* Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Barbosella crassifolia (Edwall) Schltr.
Sin.: *Barbosella crassifolia* (Edwall) Schltr.
var. *hamburgensis* (Kraenzl.) Garay,
Barbosella hamburgensis (Kraenzl.)
Hoehne, *Restrepia crassifolia* Edwall
Hierba epífita. Nativa. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Barbosella dusenii (A. Samp.) Schltr.
Sin.: *Barbosella gardneri* (Lindl.) Schltr.
var. *dusenii* (A. Samp.) Hoehne, *Restrepia dusenii* A. Samp.

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Barbosella gardneri (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Barbosella microphylla* (Barb. Rodr.) Schltr., *Pleurothallis gardneri* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Barbosella miersii (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Barbrodia miersii* (Lindl.) Luer, *Pleurothallis miersii* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Barbosella trilobata Pabst
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Baskervilla Lindl.

Baskervilla paranaensis (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Ponthieva paranaensis* Kraenzl.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Beloglottis Schltr.

Beloglottis boliviensis Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500 m.
Países: ARG(SAL).

Bifrenaria Lindl.

Bifrenaria aureofulva (Hook.) Lindl.
Sin.: *Adipe aureofulva* (Hook.) M. Wolff, *Bifrenaria secunda* Pabst, *Maxillaria aureo-fulva* Hook., *Maxillaria stenopetala* Knowles & Westc., *Stenocoryne secunda* Vell.

Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bifrenaria hadwenii Lindl.
Sin.: *Scuticaria hadwenii* (Lindl.) Hoehne
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 800-1800 m.
Países: BRA(SCA).

Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb. f.
Sin.: *Bifrenaria aurea* Barb. Rodr., *Bifrenaria harrisoniae* (Hook.) Rchb. f. var. *alba* Kraenzl., *Bifrenaria harrisoniae* (Hook.) Rchb. f. var. *grandiflora* Hort, *Bifrenaria harrisoniae* (Hook.) Rchb. f. var. *pubifera* Rchb. f., *Dendrobium harrisoniae* Hook.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bifrenaria inodora Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bifrenaria racemosa (Hook.) Lindl.
Sin.: *Maxillaria racemosa* Hook., *Stenocoryne racemosa* (Hook.) Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 200-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Bifrenaria stefanae V.P. Castro
Hierba epífita. Nativa. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bifrenaria tetragona (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Bifrenaria tetragona* (Lindl.) Schltr. var. *umbrophila* Hoehne, *Epidendrum calcaratum* Vell., *Maxillaria tetragona* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bipinnula Comm. ex Juss.

Bipinnula biplumata (L. f.) Rchb. f.
Sin.: *Arethusa biplumata* L. f., *Bipinnula bonariensis* Spreng., hom. illeg., *Bipinnula commersonii* Lindl., nom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS). URY(MAL, MON).

Bipinnula fimbriata (Poepp.) I.M. Johnst.
Sin.: *Bipinnula mystacina* Lindl., *Chloraea fimbriata* Poepp.
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Bipinnula gabriel P.A. Bravo & G.M. Baeza
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(MAU).

Bipinnula gibertii Rchb. f.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, CLA, LAV, MAL, MON, RIV, SJO).

Bipinnula montana Arechav.
Sin.: *Bipinnula canisii* Dutra ex Pabst
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, RIV).

Bipinnula penicillata (Rchb. f.) Cisternas & Salazar
Sin.: *Asarca arechavaletae* (Kraenzl.) Kuntze, *Chloraea arechavaletae* Kraenzl., *Chloraea bergii* Hieron., *Chloraea penicillata* Rchb. f., *Chloraea teixeirana* (Barb. Rodr.) Cogn., *Geoblasta arechavaletae* (Kraenzl.) Szlach. & Margónska, *Geoblasta bergii* (Hieron.) Szlach. & Margónska, *Geoblasta*

penicillata (Rchb. f.) Hoehne ex M.N. Correa, *Geoblasta teixeirana* Barb. Rodr.

Hierba. bEndémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, RNO, SJO, SOR, TAC).

Bipinnula plumosa Lindl.

Sin.: *Bipinnula philipporum* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Bipinnula polysyca Kraenzl.

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Bipinnula taltalensis I.M. Johnst.

Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.

Países: CHL(ANT).

Bipinnula volckmannii Kraenzl.

Hierba epífita. Endémica.

Países: CHL(BIO, ARA).

Bletia Ruiz & Pav.

Bletia catenulata Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(SAL). PRY(AMA).

Bletia wagneri Rchb. f.

Hierba. Nativa. 800-1200 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Brachionidium Lindl.

Brachionidium restrepioides (Hoehne) Pabst

Sin.: *Brachionidium dungsii* Pabst, *Yolanda restrepioides* Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 100-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Brachystele Schltr.

Brachystele arechavaletae (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Diskiphogyne arechavaletae* (Kraenzl.) Szlach. & R. González, *Spiranthes arechavaletae* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, ROC, TAC).

Notas: Citada para Paraguay (cfr. Rojasiana 9: 56. 2010) sin indicar localidad o material de referencia.

Brachystele bicrinita Szlach.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(SCA).

Brachystele bracteosa (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes bracteosa* Lindl.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(PAI).

Brachystele burkartii M.N. Correa

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Brachystele camporum (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Brachystele pappulosa* Szlach., *Spiranthes camporum* Lindl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Brachystele cyclochila (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Brachystele cycloglossa* (Kraenzl.) Schltr., *Spiranthes cyclochila* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA). URY(LAV, MAL, RNO, SAO, SOR).

Brachystele delicatula (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes delicatula* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 300-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(APA).

Brachystele dilatata (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Brachystele hoehnei* Pabst, *Brachystele icmadophila* (Barb. Rodr.) Schltr. ex Pabst, *Brachystele ulaei* (Cogn.) Schltr., *Brachystele waldemarii* Szlach., *Cyclopogon icmadophilus* (Barb. Rodr.) Schltr., *Spiranthes dilatata* Lindl., *Spiranthes icmadophila* Barb. Rodr., *Spiranthes ulaei* Cogn., *Stenorrhynchus icmadophilus* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Brachystele morronei Picca & Giussani

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: ARG(BAI, ERI).

Brachystele scabrilingua Szlach.

Sin.: *Diskiphogyne scabrilingua* (Szlach.) Szlach. & R. González

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(SCA).

Brachystele subfiliformis (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes subfiliformis* Cogn.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Brachystele unilateralis (Poir.) Schltr.

Sin.: *Odontorrhynchus chilensis* (A. Rich.) Garay, *Odontorrhynchus domeykoanus* Szlach., *Odontorrhynchus erosus* Szlach., *Odontorrhynchus variabilis* Garay, *Ophrys*

unilateralis Poir., *Spiranthes chilensis* A. Rich., *Spiranthes diuretica* (Willd.) Lindl.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Brachystele widgrenii (Rchb. f.) Schltr.

Sin.: *Acraea widgrenii* Rchb. f., *Brachystele atramentaria* (Kraenzl.) Schltr., *Spiranthes atramentaria* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA).

Brasiliorchis R.B. Singer, S. Koehler & Carnevali

Brasiliorchis chrysantha (Barb. Rodr.)

R.B. Singer, S. Koehler & Carnevali

Sin.: *Maxillaria chrysantha* Barb. Rodr., *Maxillaria chrysantha* Barb. Rodr. var. *pallidiflora* Hoehne, *Maxillaria serotina* Hoehne, hom. illeg., *Maxillaria serotina* Regnell & Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Brasiliorchis picta (Hook.) R.B. Singer, S. Koehler & Carnevali

Sin.: *Epidendrum uniflorum* Vell., *Maxillaria leucocheile* Hoffm., *Maxillaria monoceros* Rchb. f., *Maxillaria picta* Hook., *Maxillaria picta* Hook. var. *brunnea* Rchb. f., *Maxillaria picta* Hook. var. *rupestris* (Barb. Rodr.) Cogn., *Maxillaria rupestris* Barb. Rodr., *Maxillaria rupestris* Barb. Rodr. var. *brevis* (Hoehne & Schltr.) Hoehne, *Maxillaria rupestris* Barb. Rodr. var. *minor* Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Brassavola R. Br., nom. cons.

Brassavola ceboletta Rchb. f.

Sin.: *Brassavola chacoensis* Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, MIS). PRY(GUA, ÑEE).

Brassavola tuberculata Hook.

Sin.: *Brassavola fragans* Barb. Rodr., *Brassavola perrinii* Lindl. var. *pluriflora* Hauman, *Brassavola revoluta* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, GUA, ÑEE, SPE).

Buchtienia Schltr.

Buchtienia boliviensis Schltr.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: PRY(APY).

Buchtienia nitida (Vell.) Fraga & Meneguzzo

Sin.: *Sauroglossum nitidum* (Vell.) Schltr., *Serapias nitida* Vell., *Spiranthes excelsa* Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CAT, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Bulbophyllum Thouars, nom. cons.

Bulbophyllum atropurpureum Barb. Rodr.

Sin.: *Bulbophyllum paranaense* Schltr., *Bulbophyllum paranaense* Schltr. var. *pauloense* Hoehne & Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bulbophyllum chloroglossum Rchb. f. & Warm.

Sin.: *Bulbophyllum punctatum* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAN).

Bulbophyllum dusenii Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

Bulbophyllum epiphytum Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Bulbophyllum exaltatum Lindl.

Sin.: *Bulbophyllum teresense* Ruschi, *Bulbophyllum warmingianum* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 200-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bulbophyllum gladiatum Lindl.

Sin.: *Bulbophyllum laciniatum* (Barb. Rodr.) Cogn. var. *janeirense* Cogn., *Bulbophyllum laciniatum* (Barb. Rodr.) Cogn. var. *laciniatum*, *Didactyle laciniata* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bulbophyllum glutinosum (Barb. Rodr.) Cogn.

Sin.: *Bulbophyllum luederwaldtii* Hoehne & Schltr., *Didactyle glutinosa* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bulbophyllum granulosum Barb. Rodr.

Sin.: *Didactyle granulosa* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bulbophyllum x guartelae Mancinelli & E.C. Smidt

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Bulbophyllum malachadenia Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 100-900 m.
Países: BRA(PAR).

Bulbophyllum mentosum Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Bulbophyllum meridense Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

Bulbophyllum micranthum Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Bulbophyllum napelli Lindl.
Sin.: *Bulbophyllum napelloides* Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Bulbophyllum perii Schltr.
Sin.: *Bulbophyllum proencai* Leite
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Bulbophyllum plumosum (Barb. Rodr.) Cogn.
Sin.: *Didactyle plumosa* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Bulbophyllum regnellii Rchb. f.
Sin.: *Bulbophyllum sturmhoefelii* Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 700-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Bulbophyllum rupicola Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Bulbophyllum tripetalum Lindl.
Sin.: *Bulbophyllum jaguarahyvae* Kraenzl., *Bulbophyllum rojasii* L.O. Williams
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Campylocentrum Benth.

Campylocentrum brachycarpum Cogn.
Sin.: *Campylocentrum aromaticum* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, TYT).

Campylocentrum crassirhizum Hoehne
Sin.: *Campylocentrum iglesiasii* Brade
Epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Campylocentrum densiflorum Cogn.
Sin.: *Campylocentrum dutraei* Schltr., *Campylocentrum hasslerianum* Hoehne, *Campylocentrum hatschbachii* Schltr., *Campylocentrum rhomboglossum* Hoehne & Schltr., *Campylocentrum trachycarpum* Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, PAI). URY(CLA, TYT).

Campylocentrum grisebachii Cogn.
Sin.: *Campylocentrum burchellii* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN).

Campylocentrum hirtellum Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Campylocentrum insulare C.E. Siqueira & E. Pessoa

Hierba epífita. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(SCA).

Campylocentrum kuntzei Cogn. ex Kuntze
Hierba epífita. Nativa. 200-700 m.
Países: PRY(GUA).

Campylocentrum micranthum (Lindl.) Maury
Sin.: *Angraecum micranthum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 200-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

Campylocentrum neglectum (Rchb. f. & Warm.) Cogn.
Sin.: *Aeranthus neglecta* Rchb. f. & Warm., *Campylocentrum acutilobum* Cogn., *Campylocentrum neglectum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn. var. *angustifolium* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Campylocentrum organense (Rchb. f.) Rolfe
Sin.: *Aeranthus organensis* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Campylocentrum ornithorrhynchum (Lindl.) Rolfe
Sin.: *Angraecum ornithorrhynchum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE).

Campylocentrum parahybunense (Barb. Rodr.) Rolfe
Sin.: *Aeranthus parahybunensis* Barb. Rodr., *Campylocentrum parahybunense* (Barb. Rodr.) Rolfe var. *gracile* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Campylocentrum pauloense Hoehne & Schltr.
Sin.: *Campylocentrum linearifolium* Schltr. ex Mansf.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Campylocentrum poeppigii (Rchb. f.) Rolfe
Sin.: *Angraecum poeppigii* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 700-900 m.
Países: BRA(SCA).

Campylocentrum robustum Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Campylocentrum schlechterianum E. Pessoa & M.V. Alves
Hierba epífita. Endémica. 500-700 m.
Países: BRA(SCA).

Campylocentrum sellowii (Rchb. f.) Rolfe
Sin.: *Angraecum sellowii* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Campylocentrum spannagelii Hoehne ex Hoehne
Sin.: *Campylocentrum spannagelii* Hoehne, nom. nud.
Epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Campylocentrum ulaei Cogn.
Sin.: *Campylocentrum gracile* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Capanemia Barb. Rodr.

Capanemia adelaidae Porto & Brade
Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Capanemia brachycion (Griseb.) Schltr.
Sin.: *Sigmatostalix brachycion* Griseb.
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
Países: ARG(JUJ).

Capanemia carinata Barb. Rodr.
Sin.: *Capanemia ensata* Pabst, *Capanemia gehrtii* Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Capanemia micromera Barb. Rodr.
Sin.: *Capanemia angustilabia* Schltr., *Capanemia australis* (Kraenzl.) Schltr., *Capanemia riograndensis* Pabst, *Capanemia spathuliglossa* Pabst, *Quekettia australis* Kraenzl., *Quekettia micromera* (Barb. Rodr.) Cogn., *Quekettia microscopica* Lindl. var. *naboulettiana* Hauman
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CAN, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, RIV, ROC, TAC, TYT).

Capanemia paranaensis Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Capanemia superflua (Rchb. f.) Garay
Sin.: *Capanemia juergensiana* (Kraenzl.) Schltr., *Capanemia superflua* (Rchb. f.) Garay var. *rosea* Izag., *Capanemia uliginosa* Barb. Rodr., *Oncidium superfluum* Rchb. f., *Rodriguezia anomala* Rolfe, *Rodriguezia juergensiana* Kraenzl., *Rodriguezia uliginosa* (Barb. Rodr.) Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL).

Capanemia thersiae Barb. Rodr.
Sin.: *Capanemia duseniana* (Kraenzl.) Porto & Brade, *Capanemia hatschbachii* Schltr., *Quekettia duseniana* Kraenzl., *Quekettia thersiae* (Barb. Rodr.) Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 600-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Catasetum Rich. ex Kunth

Catasetum atratum Lindl.
Sin.: *Catasetum mentosum* Lem.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Catasetum cernuum (Lindl.) Rchb. f.
Sin.: *Myanthus cernuus* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Catasetum discolor (Lindl.) Lindl.
Sin.: *Monachanthus discolor* Lindl.
Hierba rupícola o terrestre. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton
Sin.: *Catasetum fimbriatum* (C. Morren) Lindl. & Paxton subsp. *fissum* Rchb. f., *Catasetum fimbriatum* (C. Morren) Lindl. & Paxton var. *micranthum* Mansf., *Catasetum fimbriatum* (C. Morren) Lindl. & Paxton var. *morrenianum* Mansf., *Catasetum fimbriatum* (C. Morren) Lindl. & Paxton var. *ornitorrhynchum* (Porsch) Mansf., *Catasetum fimbriatum* (C. Morren) Lindl. & Paxton var. *subtropicale* Hauman, *Catasetum ornitorrhynchum* Porsch, *Catasetum pflanzii* Schltr., *Myanthus fimbriatus* C. Morren
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PHA, SPE).

Catasetum micranthum Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Catasetum rodigasianum Rolfe
Sin.: *Catasetum cernuum* (Lindl.) Rchb. f.
var. *rodigasianum* (Rolfe) Mansf.,
Catasetum rohrii Pabst
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(SCA).

Catasetum socco (Vell.) Hoehne
Sin.: *Catasetum trulla* Lindl., *Cypripedium socco* Vell.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Catasetum triodon Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cattleya Lindl.

Cattleya acuensis (Fowlie) Van den Berg
Sin.: *Cattleya riograndensis* (Rosim & Campacci) J.M.H. Shaw & H.C. Pritch.,
Hadrolaelia acuensis (Fowlie) Chiron & V.P. Castro, *Sophronitis acuensis* Fowlie,
Sophronitis riograndensis Rosim & Campacci
Hierba rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cattleya cernua (Lindl.) Van den Berg
Sin.: *Epidendrum humile* Vell., hom. illeg.,
Sophronia cernua Lindl., *Sophronitis cernua* (Lindl.) Lindl., *Sophronitis hoffmannseggii* Rchb. f. ex Hoffmanns.,
Sophronitis isopetala Hoffm., *Sophronitis modesta* Lindl., *Sophronitis nutans* Hoffm.,
Sophronitis pterocarpa Lindl. & Paxton
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Cattleya coccinea Lindl.
Sin.: *Hadrolaelia coccinea* (Lindl.) Chiron & V.P. Castro, *Sophronitis coccinea* (Lindl.) Rchb. f., *Sophronitis grandiflora* (Lindl.) Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cattleya forbesii Lindl.
Sin.: *Cattleya pauper* (Vell.) Stellfeld, *Epidendrum forbesii* (Lindl.) Rchb. f., *Epidendrum pauper* Vell.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cattleya guttata Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Cattleya intermedia Graham
Sin.: *Cattleya intermedia* Graham var. *macrochila* Barb. Rodr., *Epidendrum intermedium* (Graham) Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cattleya loddigesii Lindl.
Sin.: *Epidendrum loddigesii* (Lindl.) Rchb. f., *Epidendrum violaceum* Lodd.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Cattleya lundii (Rchb. f. & Warm.) Van den Berg
Sin.: *Bletia lundii* Rchb. f. & Warm., *Laelia regnelli* Barb. Rodr., *Laelia reichenbachiana* H. Wendl. & Kraenzl., *Microaelia lundii* (Rchb. f. & Warm.) Chiron & V.P. Castro, *Sophronitis lundii* (Rchb. f. & Warm.) C. Berg & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, CAN, GUA).

Cattleya porphyroglossa L. Linden & Rchb. f.

Sin.: *Epidendrum porphyroglossum* (L. Linden & Rchb. f.) Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cattleya purpurata (Lindl. & Paxton) Beer
Sin.: *Hadrolaelia purpurata* (Lindl. & Paxton) Chiron & V.P. Castro, *Laelia purpurata* Lindl., *Sophronitis purpurata* (Lindl.) Van den Berg & M.W. Chase
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Cattleya tigrina A. Rich.
Sin.: *Cattleya guttata* Lindl. var. *leopardina* Linden, *Cattleya guttata* Lindl. var. *russelliana* Hook., *Cattleya leopoldii* Verschaff. ex Lem., *Cattleya leopoldii* Verschaff. ex Lem. var. *leopardina* (L. Linden & Rodigas) Fowlie
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Chaubardia Rchb. f.

Chaubardia gehrtiana (Hoehne) Garay
Sin.: *Hoehneella gehrtiana* (Hoehne) Ruschi, *Warczewiczella gehrtiana* Hoehne
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Chloraea Lindl.

Chloraea alpina Poepp.
Sin.: *Asarca alpina* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea cholilensis* Kraenzl., *Chloraea ferruginea* Kraenzl., *Chloraea hookeriana* Kraenzl., *Chloraea perez-moreau* Garay, *Chloraea xerophila* Kraenzl.
Hierba. Endémica. 400-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Chloraea apinnula (Gosewijn) Szlach.

Sin.: *Bipinnula apinnula* Gosewijn, *Ulantha apinnula* (Gosewijn) Szlach.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU).

Chloraea barbata Lindl.

Sin.: *Asarca aurea* (Phil.) Kuntze, *Asarca barbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea aurea* Phil.

Hierba. Endémica. 800-2200 m.

Países: ARG(NEU). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Chloraea bella Hauman

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(ERI). URY(RNO).

Chloraea bidentata (Poepp. & Endl.)

M.N. Correa

Sin.: *Asarca bidentata* Poepp. & Endl., *Chloraea bicallosa* Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 800-2500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Chloraea biserialis Griseb.

Sin.: *Chloraea ignea* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 800-1200 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Chloraea bletioides Lindl.

Sin.: *Chloraea grandis* Kraenzl., *Chloraea ulantha* Rolfe, *Chloraea ulanthoides* Lindl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Chloraea boliviana (Rchb. f.) Kraenzl.

Sin.: *Bieneria boliviana* Rchb. f.

Hierba. Nativa. 2100-2200 m.

Países: ARG(TUC).

Chloraea castillonii Hauman

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Chloraea chrysantha Poepp.

Sin.: *Asarca aurantiaca* Lindl., *Asarca chrysantha* (Poepp.) Kuntze, *Asarca crocata* (Phil.) Kuntze, *Asarca speciosa* Lindl., *Chloraea aurantiaca* (Lindl.) Lindl., *Chloraea crocata* Phil., *Chloraea pavonii* Lindl.

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Chloraea chrysochlora Phil.

Sin.: *Asarca lechleri* (Lindl. ex Kraenzl.) Kuntze, *Chloraea collicensis* Kraenzl., *Chloraea hemichloris* Kraenzl., *Chloraea lechleri* Lindl. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 800-2800 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

Chloraea cogniauxii Hauman

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUU).

Chloraea crispa Lindl.

Sin.: *Asarca crispa* (Lindl.) Kuntze, *Asarca cygnaea* (Phil.) Kuntze, *Chloraea cygnaea* Phil., *Chloraea spectabilis* Phil.

Hierba. Endémica. 800-2800 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

Chloraea cristata Lindl.

Sin.: *Asarca dasypogon* (Phil.) Kuntze, *Asarca pogonata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea dasypogon* Phil., *Chloraea pogonata* Phil.

Hierba. Endémica. 1200-2800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, LLA).

Chloraea cuneata Lindl.

Sin.: *Asarca cuneata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca obovata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea nervosa* Kraenzl., *Chloraea obovata* Phil.

Hierba. Endémica. 1200-2800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Chloraea curicana Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU).

Chloraea cylindrostachya Poepp.

Sin.: *Asarca cylindrostachya* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea densiflora* Rolfe, *Chloraea leptopetala* Reiche, *Chloraea major* Ravenna, *Chloraea papillosa* Phil., *Correorchis cylindrostachya* (Poepp.) Szlach., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 300-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Chloraea deflexa Ravenna

Hierba. Endémica. 1000-1200 m.

Países: CHL(COQ).

Chloraea disoides Lindl.

Sin.: *Asarca disoides* (Lindl.) Kuntze, *Chileorchis disoides* (Lindl.) Szlach., *Chloraea disoides* Lindl. var. *picta* (Phil. ex Kraenzl.) M.N. Correa, *Chloraea macrostachya* Kraenzl., *Chloraea picta* Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 200-500 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Chloraea elegans M.N. Correa

Hierba. Endémica. 800-1200 m.

Países: ARG(SAL).

Chloraea galeata Lindl.

Sin.: *Asarca alaris* (Lindl.) Lindl., *Asarca besseri* (Rchb. f.) Kuntze, *Asarca maculosa* Poepp., *Asarca secunda* (Phil.) Kuntze, *Asarca suaveolens* (Phil.) Kuntze, *Chloraea alaris* Lindl., *Chloraea berteriana* Kraenzl., *Chloraea besseri*

Rchb. f., *Chloraea secunda* Phil., *Chloraea suaveolens* Phil.

Hierba. Endémica. 1000-1300 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Chloraea gaudichaudii Brongn.

Sin.: *Arethusa lutea* Gaudich., *Asarca fonkii* (Phil.) Kuntze, *Asarca gaudichaudii* (Brongn.) Kuntze, *Asarca inconspicua* (Phil.) Kuntze, *Chloraea falklandica* Kraenzl., *Chloraea fonckii* Phil., *Chloraea inconspicua* Phil.

Hierba. Endémica. 600-900 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Chloraea gavilu Lindl.

Sin.: *Asarca sceptrum* (Rchb. f.) Kuntze, *Asarca virescens* Kuntze, *Chloraea lindleyi* Poepp., *Chloraea lotensis* Rolfe, *Chloraea sceptrum* Rchb. f., *Chloraea semitensis* Phil. ex Kraenzl., *Cymbidium luteum* Willd.

Hierba. Endémica. 400-1200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Chloraea grandiflora Poepp.

Sin.: *Asarca grandiflora* (Poepp.) Kuntze, *Ulantha grandiflora* (Poepp.) Szlach., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 1500-1700 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Chloraea heteroglossa Rchb. f.

Sin.: *Asarca heteroglossa* (Rchb. f.) Kuntze

Hierba. Endémica. 200-300 m.

Países: CHL(VAL).

Chloraea lamellata Lindl.

Sin.: *Asarca lamellata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca pearcei* (Phil.) Kuntze, *Asarca semibarbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea*

decipiens Poepp., *Chloraea pearcei* Phil., *Chloraea semibarbata* Lindl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(LBO, BIO, ARA, LSR, LLA).

Chloraea laxiflora Hauman

Hierba. Nativa. 1800-3200 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Chloraea longipetala Lindl.

Sin.: *Asarca affinis* (Lindl.) Kuntze, *Asarca longipetala* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea affinis* Lindl., *Chloraea liliacea* Kraenzl., *Chloraea multilamellata* Kraenzl., *Chloraea panduriformis* Kraenzl., *Chloraea reicheana* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 600-800 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

Chloraea magellanica Hook. f.

Sin.: *Asarca magellanica* (Hook. f.) Kuntze, *Chloraea bouganvilleana* Franch., *Chloraea histrix* Speg. & Kraenzl., *Chloraea kraenzliniana* Hoehne, *Chloraea leontoglossa* Kraenzl. & Speg., *Chloraea spegazziniana* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 200-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Chloraea membranacea Lindl.

Sin.: *Chloraea membranacea* Lindl. var. *paranensis* Schltr.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).

Chloraea multiflora Lindl.

Sin.: *Asarca campestris* (Poepp.) Kuntze, *Asarca densa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca multiflora* (Lindl.) Kuntze, *Asarca*

poepigiana (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea campestris* Poepp., *Chloraea densa* A. Rich., *Chloraea poepigiana* A. Rich., *Chloraea pseudocampestris* Kraenzl., *Chloraea stenantha* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 800-1800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Chloraea nudilabia Poepp.

Sin.: *Asarca homopetala* (Phil.) Kuntze, *Asarca nudilabia* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea homopetala* Phil., *Chloraea leucojiflora* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 800-2800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Chloraea parviflora (Poepp.) Mourgues & Novoa

Sin.: *Asarca parviflora* Poepp., *Asarca rypaloglossa* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea reflexa* Phil., *Chloraea rypaloglossa* A. Rich.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO).

Chloraea philippii Rchb. f.

Sin.: *Asarca philippii* (Rchb. f.) Kuntze, *Chloraea lagunae-pacis* Kraenzl., *Chloraea lineata* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea modesta* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

Chloraea phoenicea Speg.

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Chloraea praecincta Speg. & Kraenzl.

Sin.: *Chloraea praecincta* Speg. & Kraenzl. var. *intermedia* Hauman

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Chloraea prodigiosa Rchb. f.

Sin.: *Asarca calopogon* (Phil.) Kuntze, *Asarca prodigiosa* (Rchb. f.) Kuntze, *Chloraea calopogon* Phil.

Hierba. Endémica. 1200-1500 m.

Países: CHL(LBO, MAU, LLA, RME).

Chloraea reticulata Schltr.

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Chloraea riojana A. Sobral & Novoa

Hierba. Endémica.

Países: ARG(LRI).

Chloraea speciosa Poepp.

Sin.: *Asarca gayana* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea gayana* A. Rich., *Chloraea speciosa* Poepp. f. *sterilis* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 500-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(BIO, ARA, LLA).

Chloraea subpandurata Hauman

Hierba. Endémica. 2000-2700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Chloraea tectata Ravenna

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.

Países: CHL(COQ).

Chloraea virescens (Willd.) Lindl.

Sin.: *Asarca chlorosticta* (Phil.) Kuntze, *Asarca fimbriata* Kuntze, *Asarca incisa* (Poepp.) Kuntze, *Asarca odontoglossa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca patagonica* (Phil.) Kuntze, *Asarca unguis-cati* (Rchb. f.) Kuntze, *Chloraea chlorosticta* Phil., *Chloraea fimbriata* Phil., nom. illeg., *Chloraea incisa* Poepp., *Chloraea odontoglossa* A. Rich., *Chloraea patagonica* Phil., *Chloraea pigichen* Kuntze, *Chloraea piquichen* Lindl., *Chloraea pleistodactyla* Kraenzl. & Speg., *Chloraea unguis-cati* Rchb. f., *Cymbidium virescens* Willd.

Hierba. Endémica. 1200-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, BIO, ARA, LSR, LLA).

Chloraea viridiflora Poepp.

Sin.: *Asarca viridiflora* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea leontoglossa* Kraenzl., hom. illeg., *Chloraea viridiflora* Poepp. var. *reticulata* Reiche

Hierba. Endémica. 1200-1400 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO).

Chloraea volkmannii Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 2000-2800 m.

Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).

Chytroglossa Rchb.f.**Chytroglossa aurata** Rchb.f.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Chytroglossa marileoniae Rchb.f.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

x Cirrhaea Lindl.**x Cirrhaea dependens** Rchb. f.

Sin.: x *Cirrhaea dependens* Rchb. var. *trigina* Porsch, x *Cirrhaea hoffmannseggii* Heynh. ex Rchb. f., x *Cirrhaea tristis* Lindl., x *Cirrhaea violacea* Hoffm., x *Cirrhaea viridi-purpurea* (Hook.) Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

x Cirrhaea fuscolutea Lindl.

Sin.: x *Cirrhaea saccata* Lindl., x *Cirrhaea seidelii* Pabst

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

x Cirrhaea loddigesii Lindl.

Sin.: x *Cirrhaea loddigesii* Lindl. var. *trigina* Porsch

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

x Cirrhaea longiracemosa Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Cleistes Rich. ex Lindl.**Cleistes aphylla** (Barb. Rodr.) Hoehne

Sin.: *Pogonia aphylla* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 500-900 m.

Países: BRA(PAR).

Cleistes exilis Hoehne

Sin.: *Cleistes cipoana* Hoehne

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Cleistes montana Gardner

Sin.: *Cleistes australis* Schltr., *Cleistes brasiliensis* (Barb. Rodr.) Schltr., *Cleistes fragrans* (Schltr.) Schltr., *Cleistes humidicola* (Schltr.) Schltr., *Cleistes itatiaiae* Pabst, *Cleistes libonii* (Rchb. f.) Schltr., *Cleistes macrantha* (Barb. Rodr.) Schltr., *Cleistes magnifica* (Schltr.) Schltr., *Cleistes mantiqueirae* Rchb. f. & Warm., *Cleistes quadricallosa* (Barb. Rodr.) Schltr., *Cleistes revoluta* (Barb. Rodr.) Schltr., *Cleistes vinosa* (Barb. Rodr.) Schltr., *Pogonia brasiliensis* Barb. Rodr., *Pogonia fragrans* Schltr., *Pogonia humidicola* Schltr., *Pogonia libonii* Rchb. f., *Pogonia macrantha* Barb. Rodr., *Pogonia magnifica* Schltr., *Pogonia montana* (Gardner) Rchb. f., *Pogonia quadricallosa* Barb. Rodr., *Pogonia revoluta* Barb. Rodr., *Pogonia vinosa* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cleistes pallida Funez & Pansarin
Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(SCA).

Cleistes paranaensis (Barb. Rodr.)
Schltr.
Sin.: *Pogonia paranaensis* Barb. Rodr.,
Pogonia paranaensis Barb. Rodr. var.
major Schltr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAN).

Cleistes parviflora Lindl.
Sin.: *Cleistes moritzii* (Rchb. f.) Garay &
Dunst., *Cleistes pluriflora* (Barb. Rodr.)
Schltr., *Pogonia pluriflora* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Cleistes ramboi Pabst
Sin.: *Cleistes uliginosa* Pabst
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Cleistes rodriguesii (Cogn.) Campacci
Sin.: *Cleistes gracilis* Schltr., *Pogonia*
gracilis Barb. Rodr., *Pogonia rodriguesii*
Cogn.
Hierba. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Cleistes rosea Lindl.
Sin.: *Cleistes castanoides* Hoehne,
Cleistes catharinensis (Cogn.) Hoehne,
Pogonia catharinensis Cogn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Cleistes tenuis (Rchb. f. ex Griseb.)
Schltr.
Sin.: *Cleistes gert-hatschbachiana*
Hoehne, *Pogonia tenuis* Rchb. f. ex
Griseb.
Hierba. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Codonorchis Lindl.

Codonorchis canisioi Mansf.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl.
Sin.: *Calopogon lessonii* Brongn.,
Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl. var.
poeppigii (Lindl.) Reiche, *Codonorchis*
lessonii (Brongn.) Lindl. var. *skottsbergii*
(Kraenzl.) Reiche, *Codonorchis poeppigii*
Lindl., *Codonorchis skottsbergii* Kraenzl.,
Codonorchis tetraphylla (Poepp. & Endl.)
L.O. Williams, *Pogonia tetraphylla* Poepp.
& Endl.
Hierba. Endémica. 100-600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,
AIS, MAG).

Comparettia Poepp. & Endl.

Comparettia coccinea Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Constantia Barb. Rodr.

Constantia australis (Cogn.) Porto &
Brade
Sin.: *Sophronitis australis* Cogn.
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(SCA).

Constantia rupestris Barb. Rodr.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Corymborkis Thouars

Corymborkis flava (Sw.) Kuntze
Sin.: *Chloidia decumbens* Lindl., *Corymbis*
decumbens (Lindl.) Cogn., *Corymborkis*
decumbens (Lindl.) L.O. Williams,
Serapias flava Sw.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN,
COA, GUA, ITA, PAI).

Cranichis Sw.

Cranichis candida (Barb. Rodr.) Cogn.
Sin.: *Cranichis micrantha* Griseb., hom.
illeg., *Cranichis parviflora* L.O. Williams,
Cystochilum candidum Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Cranichis castellanosi L.O. Williams
Hierba. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Cranichis ciliata Kunth
Sin.: *Aa mandonii* (Rchb. f.) Schltr.,
Cranichis mandonii Schltr., *Ophrys ciliata*
Kunth
Hierba. Nativa. 1700 m.
Países: ARG(JUJ).

Cranichis hassleri Cogn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Cranichis muscosa Sw.
Sin.: *Cranichis bradei* Schltr.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Crocodeilanthe Rchb.f. & Warsz.

Crocodeilanthe spiralis (Lindl.) Toscano
Sin.: *Physosiphon spiralis* Lindl.
Pseudostelis spiralis (Lindl.) Schltr.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cyanaeorchis Barb. Rodr.

Cyanaeorchis arundinae (Rchb. f.) Barb. Rodr.
Sin.: *Eulophia arundinae* Rchb. f.
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, MIE).

Cyanaeorchis minor Schltr.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyclopogon C. Presl

Cyclopogon alexandrae (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes alexandrae* Kraenzl.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Cyclopogon apricus (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Beadlea aprica* (Lindl.) Garay,
Beadlea diversifolia (Cogn.) Garay,
Cyclopogon diversifolius (Cogn.) Schltr.,
Cyclopogon paludosus (Cogn.) Schltr.,
Cyclopogon platyunguis Schltr.,
Spiranthes amblysepala Kraenzl.,
Spiranthes aprica Lindl., *Spiranthes diversifolia* Cogn., *Spiranthes paludosa* Cogn.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).

Cyclopogon argyriifolius Barb. Rodr.
Sin.: *Beadlea argyriifolia* (Barb. Rodr.) Garay
Hierba. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(RGS).

Cyclopogon bicolor (Ker Gawl.) Schltr.
Sin.: *Beadlea bicolor* (Ker Gawl.) Garay,
Cyclopogon bicolor (Ker Gawl.) Schltr.
var. *minor* Hoehne, *Neottia bicolor* Ker Gawl.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Cyclopogon calophyllus (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Sin.: *Beadlea calophylla* (Barb. Rodr.) Garay,
Spiranthes calophylla Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS).

Cyclopogon chloroleucus (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes chloroleuca* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS). URY(ART, CLA, RIV, TAC).

Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne
Sin.: *Beadlea congesta* (Vell.) Garay,
Cyclopogon alpestris (Barb. Rodr.) Schltr.,
Cyclopogon langei Schltr., *Serapias congesta* Vell., *Spiranthes alpestris* Barb. Rodr., *Spiranthes alpestris* Barb. Rodr.
var. *bidentata* Barb. Rodr.
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(CLA, FLA, LAV, MAL, ROC, SAO).

Cyclopogon deminkiorum Burns-Bal. & M.S.Foster

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
Países: PRY(ITA).

Cyclopogon draculoides (Szlach.) J.M.H. Shaw
Sin.: *Stigmatosema draculoides* Szlach.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Cyclopogon dusenii Schltr.
Sin.: *Beadlea dusenii* (Schltr.) Garay
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyclopogon dutraei Schltr.
Sin.: *Beadlea dutraei* (Schltr.) Garay
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Notas: Especie excluida de la Flora del Uruguay [Pérez et al., Lankesteriana 20(3): 388. 2020]

Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr.
Sin.: *Beadlea elata* (Sw.) Small,
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. var. *ovatus* (Cogn.) Hoehne, *Satyrium elatum* Sw., *Spiranthes elata* (Sw.) Rich., *Spiranthes elata* (Sw.) Rich. var. *ovata* Cogn.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Cyclopogon elegans Hoehne
Sin.: *Beadlea elegans* (Hoehne) Garay
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Cyclopogon garayanus (Szlach.) J.M.H. Shaw

Sin.: *Stigmatosema garayanum* Szlach.

Hierba. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Cyclopogon graciliscapus Schltr.

Sin.: *Beadlea graciliscapa* (Schltr.) Garay

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Cyclopogon hatschbachii Schltr.

Sin.: *Beadlea hatschbachii* (Schltr.) Garay

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Cyclopogon iguapensis Schltr.

Sin.: *Beadlea iguapensis* (Schltr.) Garay

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cyclopogon itatiaensis (Kraenzl.)

Hoehne

Sin.: *Beadlea itatiaensis* (Kraenzl.) Garay,

Spiranthes itatiaensis Kraenzl.

Hierba. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cyclopogon longibracteatus (Barb. Rodr.) Schltr.

Sin.: *Beadlea longibracteata* Barb. Rodr.,

Spiranthes longibracteata Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Cyclopogon micranthus (Barb. Rodr.) Schltr.

Sin.: *Cyclopogon candidus* (Kraenzl.)

Pabst, *Hapalorchis candida* (Kraenzl.)

Schltr., *Hapalorchis micrantha* (Barb.

Rodr.) Hoehne, *Sauroglossum candidum*

Kraenzl., *Spiranthes micrantha* Barb.

Rodr.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CAS, CLA, CLA, ROC).

Cyclopogon multiflorus Schltr.

Sin.: *Beadlea multiflora* (Schltr.) Garay

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyclopogon odileana (Szlach.) J.M.H.

Shaw

Sin.: *Stigmatosema odileanum* Szlach.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(COS). BRA(SCA).

Cyclopogon oliganthus (Hoehne)

Hoehne & Schltr.

Sin.: *Beadlea oligantha* (Hoehne) Garay,

Spiranthes oligantha Hoehne

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, MON,
RNO, RIV, ROC).

Cyclopogon pabstii U.B. Deshmukh & J.M.H. Shaw

Sin.: *Brachystele hatschbachii* Pabst,

Stigmatosema hatschbachii (Pabst) Garay

Hierba. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Cyclopogon subalpestris Schltr.

Sin.: *Beadlea subalpestris* (Schltr.) Garay

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Cyclopogon taquaremboensis (Barb.

Rodr.) Schltr.

Sin.: *Beadlea taquaremboensis* (Barb.

Rodr.) Garay, *Stenorrhynchos*

taquaremboense Barb. Rodr.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: URY(LAV, SAO).

Cyclopogon trifasciatus Schltr.

Sin.: *Beadlea trifasciata* (Schltr.) Garay

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Cyclopogon variegatus Barb. Rodr.

Sin.: *Beadlea variegata* (Barb. Rodr.)

Garay, *Cyclopogon bradei* Schltr.,

Spiranthes variegata (Barb. Rodr.) Cogn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAN).

Cyclopogon vittatus Dutra ex Pabst

Sin.: *Beadlea vittata* (Dutra ex Pabst)

Garay

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Cyclopogon warmingii (Rchb. f.) Schltr.

Sin.: *Beadlea warmingii* (Rchb. f.) Schltr.,

Spiranthes warmingii Rchb. f.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyrtopodium R. Br.

Cyrtopodium andersonii (Lam. ex Andrews) R. Br.

Sin.: *Cymbidium andersonii* Lam. ex Andrews

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cyrtopodium brandonianum Barb. Rodr.

Sin.: *Cyrtopodium purpureum* Rchb. f. & Warm.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).
PRY(CAN). URY(RIV).

Cyrtopodium dusenii Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Cyrtopodium eugenii Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

Cyrtopodium flavum Link & Otto ex Rchb.

Sin.: *Cyrtopodium paranaense* Schltr., *Cyrtopodium polyphyllum* (Vell.) Pabst ex F. Barros, *Epidendrum polyphyllum* Vell.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyrtopodium gigas (Vell.) Hoehne

Sin.: *Epidendrum gigas* Vell.

Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyrtopodium hatschbachii Pabst

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, SPE).

Cyrtopodium izaguirreae A. González & J.A.N. Bat.

Hierba. Endémica.

Países: URY(RIV).

Cyrtopodium kleinii J.A.N. Bat. & Bianchetti

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cyrtopodium lageanum (J.A.N. Bat. & Bianch.) J.A.N. Bat

Sin.: *Cyrtopodium brandonianum* Barb. Rodr. subsp. *lageanum* J.A.N. Bat. & Bianchetti

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Cyrtopodium lamellaticallosum J.A.N. Bat. & Bianch.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cyrtopodium pallidum Rchb. f. & Warm.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA).

Cyrtopodium palmifrons Rchb. f. & Warm.

Sin.: *Cyrtopodium palmifrons* Rchb. f. var. *longifolia* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA).

Cyrtopodium paludicola Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Cyrtopodium paniculatum (Ruiz & Pav.) Garay

Sin.: *Maxillaria paniculata* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 1100-1400 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Cyrtopodium parviflorum Lindl.

Sin.: *Cyrtopodium falcilobium* Hoehne & Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Cyrtopodium pflanzii Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, PHA).

Cyrtopodium saintlegerianum Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY.

Notas: Citada por Romero González et al. (2008) para Paraguay sin indicar localidad ni ejemplar de referencia.

Cyrtopodium valebellae J.A.N. Bat.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Cyrtopodium virescens Rchb. f. & Warm.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).

Cyrtopodium witeckii L.C. Menezes

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Dichaea Lindl.

Dichaea anchorifera Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Dichaea brevicaulis Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Dichaea bryophila Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Dichaea calyculata Poepp. & Endl.

Sin.: *Dichaea australis* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Dichaea cogniauxiana Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Dichaea pendula (Aubl.) Cogn.

Sin.: *Limodorum pendulum* Aubl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dichaea trulla Rchb. f.

Sin.: *Dichaea coriacea* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Dryadella Luer

Dryadella aviceps (Rchb. f.) Luer

Sin.: *Dryadella obrieniana* (Rolfe) Luer, *Masdevallia aviceps* Rchb. f., *Masdevallia*

obrieniana Rolfe, *Pleurothallis aviceps* (Rchb. f.) Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(PAI).

Dryadella catharinensis Imig, Mancinelli & E.C. Smidt

Hierba epífita. Endémica. 200-300 m.

Países: BRA(SCA).

Dryadella lilliputana (Cogn.) Luer

Sin.: *Dryadella paranaensis* (Schltr.) Luer, *Masdevallia lilliputana* Cogn., *Masdevallia paranaensis* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dryadella wuerstlei Luer

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(RGS, SCA).

Dryadella zebrina (Porsch) Luer

Sin.: *Dryadella edwallii* (Cogn.) Luer, *Masdevallia edwallii* Cogn., *Masdevallia zebrina* Porsch

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elleanthus C. Presl

Elleanthus brasiliensis (Lindl.) Rchb. f.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elleanthus linifolius C. Presl

Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.

Países: BRA(PAR).

Eltroplectris Raf.

Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & Sweet

Sin.: *Notylia calcarata* Sw., *Pelexia setacea* Lindl.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).

Eltroplectris paranaensis M.E. Engels & E.C. Smidt

Hierba. Endémica. 1100-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Eltroplectris schlechterana (Porto & Brade) Pabst

Sin.: *Centrogenium schlechteranum* Porto & Brade

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst

Sin.: *Centrogenium trilobum* (Lindl.) Schltr., *Pelexia triloba* Lindl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, TUC). BRA(RGS). PRY(CAN, CEN, COA, PAI).

Encyclia Hook.

Encyclia argentinensis (R. Speg.) Hoehne

Sin.: *Encyclia burlemarxii* Pabst, *Encyclia piracanjubensis* L.C. Menezes, *Encyclia saltensis* Hoehne, *Epidendrum argentinense* R. Speg.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR).

Encyclia linearifolioides (Kraenzl.) Hoehne

Sin.: *Epidendrum linearifolioides* Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(SPE).

Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Encyclia cardimii* Pabst & A.F. Mello, *Epidendrum longifolium* Barb. Rodr., *Epidendrum oncidioides* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(PHA).

Encyclia osmantha (Barb. Rodr.) Schltr.

Sin.: *Epidendrum osmanthum* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Encyclia patens Hook. var. **patens**

Sin.: *Encyclia flava* (Lindl.) M.L. Porto & Brade, *Encyclia odoratissima* (Lindl.) Schltr., *Epidendrum flavum* Lindl., *Epidendrum odoratissimum* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Encyclia patens Hook. var. **serroniana** (Barb. Rodr.) Romanini & F. Barros

Sin.: *Encyclia serroniana* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Epidendrum serronianum* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Encyclia pauciflora (Barb. Rodr.) Porto

Sin.: *Encyclia dutrae* Pabst, *Epidendrum dutrae* (Pabst) Hawkes, *Epidendrum pauciflorum* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Endémica. 300-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Epidendrum L., nom. cons.

Epidendrum anceps Jacq.

Sin.: *Epidendrum viridipurpureum* Hook.

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum armeniacum Lindl.

Sin.: *Amblostoma armeniacum* (Lindl.) Brieger ex Pabst

- Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Epidendrum avicula** Lindl.
Sin.: *Lanium avicula* (Lindl.) Benth., *Lanium berkeleyi* Rolfe
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Epidendrum bermejoense** Muruaga & Parrado
Hierba epífita. Nativa. 500-1300 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Epidendrum caldense** Barb. Rodr.
Sin.: *Epidendrum hatschbachii* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Epidendrum coronatum** Ruiz & Pav.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).
- Epidendrum crassinervium** Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 600-1100 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Epidendrum cristatum** Ruiz & Pav.
Sin.: *Epidendrum alexandri* Schltr., *Epidendrum calliferum* Lem., *Epidendrum longovarium* Barb. Rodr., *Epidendrum raniferum* Lindl., *Epidendrum raniferum* Lindl. var. *loefgrenii* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Epidendrum dendrobioides** Thunb.
Sin.: *Epidendrum aquaticum* Lindl.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR).
- Epidendrum densiflorum** Hook.
Sin.: *Epidendrum andres-johnsonii* Hágsater & E. Santiago, *Epidendrum brachythyrus* Kraenzl., *Epidendrum floribundum* Kunth
Hierba epífita. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).
- Epidendrum fulgens** Brongn.
Sin.: *Epidendrum mosenii* Rchb. f., *Epidendrum planiceps* Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Epidendrum geniculatum** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Epidendrum hassleri** Cogn.
Sin.: *Epidendrum noackii* Cogn.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN).
- Epidendrum henschenii** Barb. Rodr.
Sin.: *Epidendrum brevicolle* Kraenzl.
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Epidendrum latilabre** Lindl.
Sin.: *Epidendrum arachnoideum* Barb. Rodr., *Epidendrum raddiatum* Hoffmanns., *Neolehmannia latilabris* (Lindl.) Pabst
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Epidendrum loefgrenii** Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Epidendrum nocturnum** Jacq.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Epidendrum obergii** A.D. Hawkes
Hierba epífita. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Epidendrum paniculatum** Ruiz & Pav.
Hierba epífita. Nativa.
Países: PRY(APY, CAN, PAI).
- Epidendrum parahybunense** Barb. Rodr.
Sin.: *Epidendrum corymbosum* Lindl., hom. illeg., *Epidendrum ecostatum* Pabst
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Epidendrum paranaense** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Epidendrum proligerum** Barb. Rodr.
Sin.: *Epidendrum burgeri* Schltr., *Epidendrum ochrochlorum* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 100-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Epidendrum pseudavicula** Kraenzl.
Sin.: *Epidendrum rojasii* Cogn.
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).
- Epidendrum pseudodifforme** Hoehne & Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Epidendrum puniceoluteum** F. Pinheiro & F. Barros
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Epidendrum purpureum** Barb. Rodr.
Sin.: *Epidendrum denticulatum* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Epidendrum ramosum** Jacq.
Sin.: *Epidendrum pedale* Schltr.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum rigidum Jacq.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum samaipatense Dodson & R. Vásquez

Hierba epífita. Nativa. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Epidendrum saxatile Lindl.

Sin.: *Epidendrum weddellii* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAN).

Epidendrum saximontanum Pabst

Hierba epífita. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Epidendrum secundum Jacq. f. **albescens** (Pabst) F. Barros

Sin.: *Epidendrum crassifolium* Lindl. var. *albescens* Pabst, *Epidendrum secundum* Jacq. var. *albescens* (Pabst) F. Barros

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

Epidendrum secundum Jacq. f. **secundum**

Sin.: *Epidendrum ansiferum* Rchb. f., *Epidendrum ellipticum* Graham, *Epidendrum elongatum* Jacq., *Epidendrum versicolor* Hoehne & Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Epidendrum strobiliferum Rchb. f.

Sin.: *Epidendrum rodriguesii* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum tridactylum Lindl.

Sin.: *Amblostoma cernuum* Scheidw.,

Amblostoma dusenii Kraenzl.,

Amblostoma tridactylum (Lindl.) Rchb. f.,

Amblostoma tridactylum (Lindl.) Rchb. f.

var. *dusenii* (Kraenzl.) Garay, *Amblostoma tridactylum* (Lindl.) Rchb. f. var. *pallidum* (Knowles & Westc.) Garay, *Epidendrum amblostoma* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum vesicatum Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epistephium Kunth

Epistephium sclerophyllum Lindl.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAA, CAN).

Epistephium williamsii Hook. f.

Sin.: *Epistephium lucidum* Cogn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Eulophia R. Br., nom. cons.

Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle

Sin.: *Cyrtopera longifolia* (Kunth) Rchb. f.,

Cyrtopera vellosiana Barb. Rodr.,

Dendrobium longifolium Kunth, *Eulophia*

longifolia (Kunth) Schltr., *Eulophia*

longifolia (Kunth) Schltr. var. *flavescens*

Schltr., *Eulophia woodfordii* Rolfe,

Limodorum altum L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, PAI).

Eurystyles Wawra

Eurystyles actinosophila (Barb. Rodr.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes actinosophila* Barb. Rodr., *Stenoptera actinosophila* (Barb. Rodr.) Cogn., *Synanthes bertonii* Burns-Bal., H. Rob. & M.S. Foster, *Trachelosiphon actinosophilus* (Barb. Rodr.) Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Eurystyles cogniauxii (Kraenzl.) Pabst

Sin.: *Pseudoeurystyles cogniauxii*

(Kraenzl.) Hoehne, *Pseudoeurystyles*

gardneri (Lindl. ex Gardner) Hoehne,

Spiranthes gardneri Lindl. ex Gardner,

Stenorrhynchos cogniauxii Kraenzl.,

Trachelosiphon cogniauxii (Kraenzl.)

Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eurystyles cotyledon Wawra

Sin.: *Eurystyles paranaensis* (Schltr.)

Schltr., *Stenoptera ananassocomos* Rchb.

f., *Trachelosiphon paranensis* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eurystyles lorenzii (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Pseudoeurystyles lorenzii* (Cogn.)

Hoehne, *Stenoptera lorenzii* Cogn.,

Trachelosiphon lorenzii (Cogn.) Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eurystyles splendissima Szlach.

Sin.: *Pseudoeurystyles splendissima*

(Szlach.) Szlach. & R. González

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Galeandra Lindl.

Galeandra beyrichii Rchb. f.

Sin.: *Galeandra hysternantha* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, PAI,
SPE). URY(ART, RIV).

Galeandra junceaoides Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CON).

Galeandra paraguayensis Cogn.

Sin.: *Galeandra paranaensis* Schltr.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Galeandra stylomisantha (Vell.) Hoehne

Sin.: *Orchis stylomisantha* Vell.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAN, CON, ÑEE, PHA).

Galeandra xerophila Hoehne

Hierba. Nativa. 300-500 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Gavilea Poepp.

Gavilea araucana (Phil.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca araucana* Phil., *Asarca araucana* Phil. var. *incisa* Hauman, *Gavilea araucana* (Phil.) M.N. Correa var. *incisa* Hauman

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,
AIS, MAG, RME).

Gavilea australis (Skottsb.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca australis* Skottsb., *Asarca enigmatica* Hauman

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Gavilea cardioglossa (Reiche) Martic.

var. **cardioglossa**

Sin.: *Asarca cardioglossa* Reiche, *Gavilea cardioglossa* (Reiche) M.N. Correa, comb. illeg.

Hierba. Endémica. 500-1200 m.

Países: CHL(ARA, LSR, LLA).

Gavilea cardioglossa (Reiche) Martic.

var. **tumbesiana** Teillier, D. Alarcón, Novoa, A. Martic. & E. Thielemann

Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(BIO).

Gavilea chica (Speg. & Kraenzl.)

Chemisquy

Sin.: *Chloraea chica* Speg. & Kraenzl., *Chloraea kruegeri* F. Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LLA, AIS, MAG, RME).

Gavilea gladysiae Chemisquy

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Gavilea glandulifera (Poepp.) M.N.

Correa

Sin.: *Asarca appendiculata* Phil. ex Kraenzl., *Asarca glandulifera* Poepp., *Chloraea albo-rosea* Kraenzl. & Speg., *Chloraea volucris* Lindl., *Gavilea auriculata* Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LLA, AIS, MAG, RME).

Gavilea insularis M.N. Correa

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: CHL(JFE).

Gavilea kingii (Hook. f.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca kingii* Hook. f.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: CHL(LLA, MAG).

Gavilea littoralis (Phil.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca littoralis* (Phil.) Reiche, *Asarca macroptera* Kraenzl., *Chloraea littoralis* Phil., *Gavilea macroptera* (Kraenzl.) M.N. Correa

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ARA,
LSR, LLA, AIS, MAG).

Gavilea longibracteata (Lindl.) Sparre ex L.E. Navas

Sin.: *Asarca berteroi* Rchb. f., *Asarca longibracteata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca longibracteata* (Lindl.) Skottsb., comb. illeg., *Asarca sinuata* Lindl., nom. illeg., *Asarca spectabilis* Phil., *Asarca verrucosa* A. Rich. ex Gay, *Chloraea longibracteata* Lindl.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Gavilea lutea (Pers.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca acutiflora* Poepp. & Endl., *Asarca brachychila* Phil., *Asarca commersonii* (Brongn.) Hook., *Asarca lutea* (Pers.) Skottsb., *Asarca tenuiflora* Rolfe, *Asarca thermarum* Phil. & Kraenzl., *Chloraea commersonii* Brongn., *Serapias lutea* Pers.

Hierba. Endémica. 500-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Gavilea odoratissima Poepp.

Sin.: *Asarca chrysostachya* Phil., *Asarca odoratissima* (Poepp.) Poepp. & Endl., *Asarca sulphurea* Phil., *Asarca ventanae* Hauman, *Chloraea odoratissima* (Poepp.) Macloskie

Hierba. Endémica. 100-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Gavilea platyantha (Rchb. f.) Ormerod
Sin.: *Asarca glandulifera* Poepp. var. *illapeliana* Reiche, *Asarca platyantha* Rchb. f., *Cisternas*, *Gavilea glandulifera* (Poepp.) M.N. Correa var. *illapelina* (Reiche) Novoa, J. Espejo, M. Rubió & Erwin Domínguez, com

Hierba. Endémica. 900-1300 m.
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA, RME).

Gavilea supralabellata M.N. Correa
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Gavilea trullata Ormd.
Sin.: *Asarca cardioglossa* Reiche var. *patagonica* Garay, *Gavilea cardioglossa* (Reiche) M.N. Correa var. *patagonica* (Garay) M.N. Correa
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Gavilea venosa (Lam.) Garay & Ormd.
Sin.: *Asarca feuilleana* Kraenzl., *Asarca leucantha* (Poepp.) Poepp. & Endl., comb. illeg., *Gavilea feuilleana* (Kraenzl.) Lehnbeach, *Gavilea leucantha* Poepp., nom. illeg., *Limodorum venosum* Lam.
Hierba. Endémica. 1200-2500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, LSR, LLA, RME).

Gavilea wittei (Hicken) Ormd.
Sin.: *Asarca patagonica* Skotts., hom. illeg., *Chloraea wittei* Hicken, *Gavilea patagonica* M.N. Correa
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR). CHL(AIS, MAG).

Gomesa R. Br.

Gomesa albinoi (Schltr.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium albinoi* Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa barbaciae (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Gomesa fuscans* (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams, *Oncidium barbaciae* Lindl., *Oncidium fuscans* Rchb. f., *Oncidium montanum* Barb. Rodr., *Oncidium uliginosum* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa barbata (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Alatiglossum barbatum* (Lindl.) D.H. Baptista, *Oncidium barbatum* Lindl., *Oncidium microglossum* Klotzsch
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR). URY(CLA).

Gomesa bifolia (Sims) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Gomesa viperina* (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams, *Oncidium bifolium* Sims, *Oncidium bifolium* Sims var. *majus* Hort, *Oncidium viperinum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, COA). URY(ART, CLA, COL, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Gomesa brieniana (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium brienianum* Rchb.f., *Oncidium verrucosissimum* Cogn.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, GUA).

Gomesa ciliata (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Alatiglossum ciliatum* (Lindl.) D.H. Baptista, *Alatiglossum micropogon* (Rchb. f.) D.H. Baptista, *Oncidium ciliatum* Lindl., *Oncidium micropogon* Rchb. f., *Oncidium reisii* Hoehne & Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa cogniauxiana (Schltr.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium cogniauxianum* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa concolor (Hook.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium concolor* Hook., *Oncidium concolor* Hook. var. *ottonis* (Schltr.) Pabst, *Oncidium ottonis* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA). BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa cornigera (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium chrysorapis* Rchb. f., *Oncidium cornigerum* Lindl., *Oncidium cruciatum* Rchb. f., *Oncidium fimbriatum* Lindl., *Oncidium godseffianum* Kraenzl., *Oncidium hecatanthum* Kraenzl., *Oncidium pubes* Lindl. var. *flavescens* Hook.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, GUA, PAI, SPE).

Gomesa discifera (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium disciferum* Lindl., *Oncidium fuchsii* Königer, *Rhinocidium fuchsii* (Königer) Docha Neto
Hierba epífita. Nativa. 1000-1100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(CEN).

Gomesa flexuosa (Lodd.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium flexuosum* Lodd., *Oncidium flexuosum* Lodd. var. *radiatum* Rchb. f., *Oncidium haematochrysum* Rchb. f., *Oncidium haematoxanthum* Rchb. f. ex Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA).

Gomesa florida (Vell.) Meneguzzo f. **concolor** Meneguzzo

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Gomesa florida (Vell.) Meneguzzo f. **florida**

Sin.: *Epidendrum floridum* Vell., *Gomesa longicornu* (Mutel) M.W. Chase & N.H. Williams, *Gomesa macronyx* (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams, *Oncidium gautieri* Regel, *Oncidium longicornu* Mutel, *Oncidium macronyx* Rchb., *Oncidium monoceras* Hook., *Oncidium unicombe* Lindl., *Oncidium unicomutum* Knowles & Westc.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa gardneri (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Gomesa curta* (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams, *Oncidium curtum* Lindl., *Oncidium elegantissimum* Rchb. f., *Oncidium gardneri* Lindl., *Oncidium gardnerianum* Hort

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Gomesa glaziovii Cogn.

Sin.: *Gomesa duseniana* Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 500-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa gomezoides (Barb. Rodr.) Pabst

Sin.: *Gomesa theodorea* (Barb. Rodr.) Cogn., *Rodrigueziella gomezoides* (Barb. Rodr.) Pabst, *Theodorea gomezoides* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa herzogii (Schltr.) Lückel

Sin.: *Alatiglossum herzogii* (Schltr.) Docha Neto, *Oncidium herzogii* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gomesa hydrophila (Barb. Rodr.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium hydrophilum* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Gomesa imperatoris-maximiliani (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium imperatoris-maximiliani* Rchb. f., *Oncidium crispum* Lodd., *Oncidium crispum* Lodd. var. *rodriguesii* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa jucunda (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Gomesa handroi* (Hoehne) Pabst, *Mesospinidium jucundum* Rchb. f., *Rodrigueziella handroi* (Hoehne) Pabst, *Theodorea handroi* Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa kleinii Szlach., Chiron & Kolan.

Hierba epífita. Endémica. 300-400 m.

Países: BRA(SCA).

Gomesa laxiflora (Lindl.) Klotzsch ex Rchb. f.

Sin.: *Rodriguezia laxiflora* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa leinigii (Pabst) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium leinigii* Pabst

Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

Gomesa lietzei (Regel) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium lietzei* Regel

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

Gomesa macropetala (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Alatiglossum emilii* (Schltr.) D.H. Baptista, *Alatiglossum macropetalum* (Lindl.) D.H. Baptista, *Gomesa emilii* (Schltr.) M.W. Chase & N.H. Williams, *Oncidium emilii* Schltr., *Oncidium macropetalum* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(SCA). PRY(APY).

Gomesa maculosa (Lindl.) Meneguzzo

Sin.: *Oncidium maculosum* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR).

Notas: Citada para Paraguay sin mencionar material de referencia.

Gomesa microphyta (Barb. Rodr.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Gomesa eleutherosepala* (Barb. Rodr.) M.W. Chase & N.H. Williams, *Rodriguezia eleutherosepala* Barb. Rodr., *Rodriguezia microphyta* Barb. Rodr., *Rodrigueziopsis eleutherosepala* (Barb. Rodr.) Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa paranensoides M.W. Chase
N.H. Williams

Sin.: *Gomesa paranaensis* (Kraenzl.)
M.W. Chase & N.H. Williams, *Oncidium hatschbachii* Schltr., *Oncidium paranaense* Kraenzl., *Oncidium schadei* L.O. Williams

Hierba epífita. Nativa. 800-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa pectoralis (Lindl.) M.W. Chase
& N.H. Williams

Sin.: *Oncidium pectorale* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Gomesa praetexta (Rchb. f.) M.W. Chase
& N.H. Williams

Sin.: *Gomesa gravesiana* (Rolfe) M.W. Chase & N.H. Williams, *Oncidium gravesianum* Rolfe, *Oncidium praetextum* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa psyche (Schltr.) M.W. Chase &
N.H. Williams

Sin.: *Alatiglossum chrysopteranthum* (Lückel) D.H. Baptista, *Oncidium chrysopteranthum* Lückel, *Oncidium micropogon* Rchb. f. var. *chrysopterum* Rchb. f., *Oncidium psyche* Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa pubes (Lindl.) M.W. Chase &
N.H. Williams

Sin.: *Baptistonia pubes* (Lindl.) Chiron &
V.P. Castro, *Oncidium pubes* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CAN, COA, SPE).

Gomesa radicans (Rchb. f.) M.W. Chase
& N.H. Williams

Sin.: *Ornithophora quadricolor* Barb.
Rodr., *Ornithophora radicans* (Rchb. f.)
Garay & Pabst, *Sigmatostalix radicans*
Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa ramosa (Lindl.) M.W. Chase &
N.H. Williams

Sin.: *Gomesa blanchetii* (Rchb. f.) M.W.
Chase & N.H. Williams, *Gomesa martiana*
(Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams,
Oncidium batemannianum J. Parm. ex
Knowles & Westc., *Oncidium blancheti*
Rchb. f., *Oncidium martianum* Lindl.,
Oncidium mixtum Schltr., *Oncidium*
pontagrossense Campacci, *Oncidium*
ramosum Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa ranifera (Lindl.) M.W. Chase &
N.H. Williams f. **albescens** (Pabst)
Meneguzzo

Sin.: *Menezesiella paranaensis* Chiron &
V.P. Castro, *Oncidium hookeri* Rolfe f.
albescens (Pabst) F. Barros & J.A.N. Bat.,
Oncidium hookeri Rolfe var. *albescens*
Pabst

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa ranifera (Lindl.) M.W. Chase &
N.H. Williams f. **ranifera**

Sin.: *Gomesa hookeri* (Rolfe) M.W. Chase
& N.H. Williams, *Gomesa loefgrenii*
(Cogn.) M.W. Chase & N.H. Williams,
Oncidium hookeri Rolfe f. *hookeri*,
Oncidium loefgrenii Cogn., *Oncidium*
raniferum Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa recurva R. Br.

Sin.: *Gomesa barkeri* (Hook.) Rolfe,
Gomesa crispa (Lindl.) Klotzsch ex Rchb.

f., *Gomesa divaricata* Hoffmanns.,
Gomesa fischeri Regel, *Gomesa foliosa*
(Hook.) Klotzsch ex Rchb. f., *Gomesa*
planifolia Klotzsch & Rchb. f., *Gomesa*
reclinata Hoffmanns., *Odontoglossum*
recurvum (R. Br.) Rchb. f., *Pleurothallis*
foliosa Hook., *Rodriguezia barkeri* Hook.,
Rodriguezia crispa Lindl., *Rodriguezia*
planifolia Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, APY, CAN).

Gomesa riograndensis (Cogn.) M.W.
Chase & N.H. Williams

Sin.: *Baptistonia riograndense* (Cogn.)
V.P. Castro & Chiron, *Leiochilus*
spiegazzinianus Kraenzl., *Oncidium*
riograndense Cogn.

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa sarcodes (Lindl.) M.W. Chase &
N.H. Williams

Sin.: *Oncidium sarcodes* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa uniflora (Booth ex Lindl.) M.W.
Chase & N.H. Williams

Sin.: *Gomesa longipes* (Lindl. & Paxton)
M.W. Chase & N.H. Williams, *Oncidium*
biflorum Barb. Rodr., *Oncidium hassleri*
Cogn., *Oncidium janeirense* Rchb. f.,
Oncidium longipes Lindl., *Oncidium*
longipes Lindl. var. *monophyllum* Regel,
Oncidium oxyacanthosum Lem., *Oncidium*
uniflorum Booth ex Lindl., *Oncidium*
uniflorum Booth ex Lindl. var. *longipes*
(Lindl.) Teusch., *Oncidium uniflorum*
Booth ex Lindl. var. *robustum* Regel

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU,
CAN). URY(CLA, MON, TYT).

Notas: Citada para Argentina y Paraguay (Zubek et al., Rodríguez 75: 21. 2024) sin indicar distribución o ejemplar de referencia

Gomesa varicosa (Lindl. & Paxton) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium euxanthinum* Rchb. f., *Oncidium geraense* Barb. Rodr., *Oncidium rogersii* Hort ex Bateman, *Oncidium rogersii* Bateman, *Oncidium varicosum* Lindl. & Paxton var. *rogersii* (Bateman) Rchb. f., *Oncidium varicosum* Lindl. & Paxton var. *varicosum*, *Oncidium varicosum* Lindl. & Paxton var. *vexillarium* Rchb. f. ex Kraenzl., *Oncidium vexillarium* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, COS, JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

Gomesa venusta (Drapiez) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium dimorphum* Regel, *Oncidium trulliferum* Lindl., *Oncidium venustum* Drapiez

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa widgrenii (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium brienianum* Rchb. f. var. *rufida-maculis* Rchb. f., *Oncidium odontochilum* Barb. Rodr., *Oncidium widgrenii* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Gongora Ruiz & Pav.

Gongora bufonia Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Gongora quinquenervis Ruiz & Pav.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

Govenia Lindl.

Govenia utriculata (Sw.) Lindl.

Sin.: *Govenia boliviensis* Rolfe, *Govenia gardneri* Hook., *Govenia sulphurea* Rchb. f., *Govenia tingens* Poepp. & Endl., *Limodorum utriculatum* Sw.

Hierba. Nativa. 600-800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada para Paraguay (Hoehne, F.C. 1942b) sin indicar material de referencia.

Grandiphyllum Docha Neto

Grandiphyllum auricula (Vell.) Docha Neto

Sin.: *Epidendrum auricula* Vell.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Grandiphyllum divaricatum (Lindl.) Docha Neto

Sin.: *Grandiphyllum pulvinatum* (Lindl.) Docha Neto, *Grandiphyllum sphegiferum* (Lindl.) Docha Neto, *Oncidium divaricatum* Lindl., *Oncidium divaricatum* Lindl. var. *cupreum* Lindl., *Oncidium pulvinatum* Lindl., *Oncidium sphegiferum* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, SPE).

Grandiphyllum edwallii (Cogn.) Docha Neto

Sin.: *Oncidium edwallii* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Grandiphyllum hians (Lindl.) Docha Neto
Sin.: *Oncidium hians* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Grobya Lindl.

Grobya amherstiae Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Grobya fascifera Rchb. f.

Sin.: *Grobya bibrachiata* Hoehne, *Grobya bibrachiata* Hoehne var. *riograndensis* Pabst

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Grobya galeata Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Grobya guieselii F. Barros & R. Lourenço

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Habenaria Willd.

Habenaria achalensis Kraenzl.

Sin.: *Habenaria achalensis* Kraenzl. var. *angustifolia* Kraenzl., *Habenaria angustiloba* Lillo & Hauman

Hierba. Nativa.

Países: ARG(COR, MIS, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(SJO).

Habenaria alpestris Cogn.

Sin.: *Habenaria melanopoda* Hoehne & Schltr.

Hierba. Nativa. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CAS).

Habenaria amambayensis Schltr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CEN).

Habenaria anisitsii Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Habenaria araneiflora Barb. Rodr.

Hierba rupícola. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Habenaria armata Rchb. f.

Sin.: *Habenaria elegantula* Hoehne, hom. illeg.
Hierba palustre. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria australis J.A.N. Bat., A.A. Vale & Menini

Hierba. Endémica. 1100-1200 m.
Países: BRA(RGS).

Habenaria balansae Cogn.

Sin.: *Habenaria butantanensis* Hoehne & Schltr., *Habenaria nigripes* Kraenzl., *Habenaria retusa* Barb. Rodr., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU).

Habenaria bractescens Lindl.

Sin.: *Habenaria hauman-merckii* Hicken, *Habenaria kleyi* Schltr., *Habenaria pontagrossensis* Kraenzl., *Habenaria sartor* Lindl. f. *minor* Cogn., *Kusibabella bractescens* (Lindl.) Szlach.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, RIV, TAC).

Habenaria brasiliensis R.Kr. Singh & Sanjeet Kumar

Sin.: *Habenaria gracilis* Lindl., nom. illeg.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Habenaria campylogyna J.A.N. Bat. & Bianch.

Sin.: *Habenaria humilis* Cogn.
Hierba. Nativa. 500-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria crassipes Schltr.

Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Habenaria distans Griseb.

Sin.: *Habenaria glaucophylla* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 1500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Habenaria dusenii Schltr.

Sin.: *Habenaria sylvicultrix* Lindl. ex Kraenzl.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Habenaria dutraei Schltr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Habenaria edwallii Cogn.

Sin.: *Habenaria adenosepala* Kraenzl., *Habenaria physophora* Kraenzl.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Habenaria ekmaniana Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(SPE).

Habenaria exaltata Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria sceptrum* Schltr.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(TAC).

Habenaria gourlieana Gillies ex Lindl.

Sin.: *Habenaria burkartiana* Hoehne, *Habenaria spegazziniana* Kraenzl., *Kusibabella burkartiana* (Hoehne) Szlach., *Kusibabella gourlieana* (Gillies ex Lindl.) Szlach., *Macrocentrum mendocinum* Phil.
Hierba palustre. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, ÑEE, SPE). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Habenaria guentheriana Kraenzl.

Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Habenaria guilleminii Rchb. f.

Sin.: *Habenaria ourobranquensis* Hoehne
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA).
Notas: Citada por Batista et al (2011a) para la Argentina y Uruguay sin indicar material de referencia.

Habenaria gustavi-edwallii Hoehne

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Habenaria habenarioides (Hoehne) R.E. Nogueira & R.J.V. Alves

Sin.: *Itaculumia habenarioides* Hoehne
Hierba. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Habenaria hatschbachii Pabst

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Habenaria hassleriana Cogn.

Sin.: *Habenaria fiebrigii* Schltr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, PAI).

Habenaria heleogena Schltr.

Sin.: *Habenaria trapezoidea* Hoehne & Schltr.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Habenaria henscheniana Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria henscheniana* Barb. Rodr. var. *densiflora* Cogn.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Habenaria hexaptera Lindl.

Sin.: *Habenaria hieronymi* Kraenzl., *Habenaria hieronymi* Kraenzl. var. *saltensis* Hauman

Hierba. Nativa. 200-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS).

Habenaria imbricata Lindl.

Sin.: *Habenaria graciliscapa* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(CAS, SAO).

Habenaria inconspicua Cogn.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS).

Habenaria integripetala Cogn.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(AMA, CAU, SPE).

Habenaria jaguarahyvae Kraenzl.

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Habenaria johannensis Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria vaupelli* Rchb. f. & Warm.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, ÑEE).

Habenaria josephensis Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria bradeana* Kraenzl.,

Habenaria foliosissima Kraenzl.,

Habenaria heterophylla Schltr.

Hierba. Nativa. 300-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Habenaria kleinii Menini & J.A.N. Bat.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS).

Habenaria leptoceras Hook.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA)

Habenaria leprieurii Rchb. f.

Sin.: *Habenaria amazonica* Schltr.,

Habenaria platydictyla Kraenzl.,

Habenaria schwackei Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN, ITA).

Habenaria leucosantha Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria berroana* Barb. Rodr.,

Habenaria leucosantha Barb. Rodr. var.

berroana (Barb. Rodr.) Pabst, *Habenaria*

leucosantha Barb. Rodr. var.

riograndensis Pabst

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA). URY(RIV).

Habenaria macrodactyla Kraenzl.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Habenaria macronectar (Vell.) Hoehne

Sin.: *Habenaria juergensii* Schltr.,

Habenaria sartor Lindl., *Habenaria*

sartoroides Schltr., *Kusibabella macronectar* (Vell.) Szlach., *Kusibabella sartor* (Lindl.) Szlach., *Orchis macronectar* Vell.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(CLA, RNO, SJO, SOR, TAC).

Habenaria megapotamensis Hoehne

Hierba. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Habenaria montevidensis Spreng.

Sin.: *Habenaria arechavaletae* Kraenzl.,

Habenaria arechavaletae Kraenzl. var.

elata Cogn., *Habenaria arechavaletae*

Kraenzl. var. *obovatifetala* (Schltr.) Pabst,

Habenaria obovatipetala Schltr.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, MON, RIV, SJO, TAC).

Habenaria montiswilhelminae Renz

Hierba. Nativa. 400-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Habenaria nemorosa Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria nuda Lindl.

Sin.: *Habenaria nuda* Lindl. var. *pygmaea*

Hoehne, *Habenaria trichoceras* Barb.

Rodr.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria obtusa Lindl.

Sin.: *Habenaria megaceras* Barb. Rodr.,

Habenaria ornithoides Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Habenaria paivaeana Rchb. f.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(COR, COS, JUJ, SAL, TUC). URY(CLA, LAV, MAL, MON, SJO, TAC).

Habenaria paranaensis Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria campos-portoi* Schltr., *Habenaria janeirensis* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(PAI, SPE).

Habenaria parviflora Lindl.

Sin.: *Habenaria brachyphyton* Schltr. ex Mansf., *Habenaria caaguazuensis* Cogn., *Habenaria montevidensis* Lindl., hom. illeg., *Habenaria montevidensis* Spreng. f. *nana* (Schltr.) Pabst, *Habenaria montevidensis* Spreng. f. *parviflora* (Lindl.) Pabst, *Habenaria montevidensis* Spreng. f. *reichenbachiana* (Barb. Rodr.) Pabst, *Habenaria montevidensis* Spreng. var. *tucumanensis* Griseb., *Habenaria nana* Schltdl., hom. illeg., *Habenaria paulensis* Porsch, *Habenaria reichenbachiana* Barb. Rodr., *Habenaria uruguayensis* Garay

Hierba. Endémica. 0-3400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Habenaria pentadactyla Lindl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Habenaria petalodes Lindl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Habenaria piraquarensis Hoehne

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Habenaria platanthera Rchb. f.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA, MAL).

Habenaria pleiophylla Hoehne & Schltr.

Sin.: *Habenaria paranaguaensis* Hoehne

Hierba palustre. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Habenaria pumila Poepp.

Sin.: *Habenaria brachyceras* Phil., *Habenaria germainii* Phil., *Habenaria paucifolia* Lindl., *Habenaria uliginosa* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Habenaria regnellii Cogn.

Sin.: *Habenaria flaccida* Kraenzl., *Habenaria poissoniana* Cogn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citado para Paraguay (Batista et al. 2011: 253) sin indicar localidad o material de referencia.

Habenaria repens Nutt.

Sin.: *Habenaria aranifera* Lindl., *Habenaria paucifolia* Lindl. var. *stolonifera* M.N. Correa, *Habenaria polygonoides* Schltr., *Habenaria repens* Nutt. var. *gracilis* Lüderw. & Hoehne, *Habenaria taubertiana* Cogn.

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SAO, SJO).

Habenaria rodeiensis Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria corcovadensis* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON).

Habenaria rolfeana Schltr.

Hierba rupícola. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria rupicola Barb. Rodr.

Hierba. Nativa

Países: ARG(COR). BRA(PAR, SCA).

Habenaria schenckii Cogn.

Sin.: *Habenaria lindmaniana* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(TUC).

Habenaria secunda Lindl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Habenaria secundiflora Barb. Rodr.

Hierba palustre. Nativa. 300-500 m.

Países: BRA(PAR).

Habenaria sobraliana J.A.N. Bat., A.A.

Vale & Menini

Hierba. Endémica. 1100-1300 m.

Países: BRA(RGS).

Habenaria subfiliformis Cogn.

Sin.: *Habenaria mitomorpha* Kraenzl., *Habenaria rudolfi-schlechteri* Hoehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAU).

Habenaria subviridis Hoehne & Schltr.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria tamanduensis Schltr.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Habenaria trifida Kunth

Sin.: *Habenaria flexa* Rchb. f. ex Kraenzl., *Habenaria pauciflora* (Lindl.) Rchb. f. var. *pluriflora* Cogn.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL, SJU, TUC). PRY(APY, CON).

Habenaria ulei Cogn.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria umbraticola Barb. Rodr.

Hierba palustre. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria warmingii Rchb. f.

Hierba. Nativa. 2000-2200 m.
Países: ARG(SAL).

Hapalorchis Schltr.

Hapalorchis lineata (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Cyclopogon lineatus* (Lindl.) Pabst, *Cyclopogon pauciflorus* (Porto & Brade) Pabst, *Hapalorchis pauciflora* Porto & Brade, *Spiranthes lineata* Lindl.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MAL, RNO).

Hapalorchis stellaris Szlach.

Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS).

Homalopetalum Rolfe

Homalopetalum joinvillense Mancinelli & E.C. Smidt

Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Houlletia Brongn.

Houlletia brocklehurstiana Lindl.

Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Huntleya Bateman ex Lindl.

Huntleya meleagris Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ionopsis Kunth

Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl.

Sin.: *Epidendrum utricularioides* Sw., *Ionopsis burchellii* Rchb. f., *Ionopsis gardneri* Lindl., *Ionopsis paniculata* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Isabelia Barb. Rodr.

Isabelia x pabstii (Leinig) Van den Berg & M.W. Chase

Sin.: *Isanitella pabstii* Leinig

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Isabelia pulchella (Kraenzl.) Van den Berg & M.W. Chase

Sin.: *Isabelia pulchella* (Kraenzl.) Senghas & Teusch., nom. illeg., *Neolauchea pulchella* Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Isabelia violacea (Lindl.) Van den Berg & M.W. Chase

Sin.: *Sophronia violacea* (Lindl.) Kuntze, *Sophronitella violacea* (Lindl.) Schltr., *Sophronitis violacea* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Isabelia virginalis Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Isochilus R. Br.

Isochilus linearis (Jacq.) R. Br.

Sin.: *Epidendrum lineare* Jacq., *Isochilus brasiliensis* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, SPE).

Jacquinella Schltr.

Jacquinella globosa (Jacq.) Schltr.

Sin.: *Epidendrum globosum* Jacq.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Laelia Lindl.

Laelia gloriosa (Rchb. f.) L.O. Williams

Sin.: *Schomburgkia gloriosa* Rchb.f.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Lankesterella Ames

Lankesterella caespitosa (Lindl.) Hoehne

Sin.: *Cladobium epiphytum* (Barb. Rodr.) Schltr., *Hetaeria caespitosa* Lindl., *Lankesterella epiphyta* (Barb. Rodr.) Brade ex Hoehne, comb. superfl., *Lankesterella epiphyta* (Barb. Rodr.)

Mansf., *Lankesterella salehi* Pabst,
Spiranthes epiphyta Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lankesterella ceracifolia (Barb. Rodr.)
Ames
Sin.: *Cladobium ceracifolium* (Barb. Rodr.)
Schltr., *Lankesterella majus* (Hoehne &
Schltr.) Hoehne, *Lankesterella mentiens*
Hoehne, *Stenorhynchos ceracifolium*
Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAN).

Lepanthopsis (Cogn.) Ames

Lepanthopsis floripecten (Rchb. f.)
Ames
Sin.: *Pleurothallis floripecten* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leptotes Lindl.

Leptotes bicolor Lindl.
Sin.: *Leptotes bicolor* Lindl. var.
glaucophylla Hook., *Leptotes glaucophylla*
Hoffmanns., *Leptotes serrulata* Lindl.,
Tetramicra bicolor (Lindl.) Rolfe,
Tetramicra serrulata (Lindl.) G. Nicholson
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(ITA).

Leptotes pauloensis Hoehne
Hierba epífita. Nativa
Países: BRA(SCA).

Leptotes tenuis Rchb. f.
Sin.: *Leptotes minuta* (Rolfe) Rolfe,
Tetramicra minuta Rolfe

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Leptotes unicolor Barb. Rodr.
Sin.: *Leptotes paranaensis* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAN, SPE).

Liparis Rich., nom. cons.

Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
Sin.: *Epidendrum nervosum* (Thunb.)
Thunb., *Liparis elata* Lindl., *Liparis elata*
Lindl. var. *longifolia* Cogn., *Ophrys*
nervosa Thunb.
Hierba epífita o epipéfrica. Nativa. 0-
1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA).

Liparis vexillifera (Lex) Cogn.
Sin.: *Cymbidium vexilliferum* Lex., *Liparis*
vexillifera (Lex) Cogn. var. *galeottiana* (A.
Rich. & Galeotti) Ames & Correll, *Liparis*
vexillifera (Lex) Cogn. var. *latifolia* Cogn.,
Malaxis elliptica A. Rich. & Galeotti,
Malaxis galeottiana A. Rich. & Galeotti
Hierba. Nativa. 2000-2700 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Lockhartia Hook.

Lockhartia lunifera (Lindl.) Rchb. f.
Sin.: *Fernandezia lunifera* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Loefgrenianthus Hoehne

Loefgrenianthus blanche-amesii
(Loefgr.) Hoehne
Sin.: *Leptotes blanche-amesii* Loefgr.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Lyroglossa Schltr.

Lyroglossa grisebachii (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Lyroglossa euglossa* (Kraenzl.)
Hoehne & Schltr., *Spiranthes euglossa*
Kraenzl., *Spiranthes grisebachii* Cogn.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Macradenia R. Br.

Macradenia paraensis Barb. Rodr.
Sin.: *Macradenia multiflora* (Kraenzl.)
Cogn., *Trichopilia multiflora* Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Malaxis Sol. ex Sw.

Malaxis cogniauxiana (Schltr.) Pabst
Sin.: *Microstylis cogniauxiana* Schltr.,
Microstylis gracilis Cogn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Malaxis cordilabia Portalet
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(RGS).

Malaxis engelsii T.F. Santos & E.C.
Smidt
Hierba. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Malaxis excavata (Lindl.) Kuntze

Sin.: *Cheiropterocephalus sertuliferus* Barb. Rodr., *Malaxis hastilabia* (Rchb. f.) Kuntze, *Malaxis sertulifera* (Barb. Rodr.) Pabst, *Microstylis excavata* Lindl., *Microstylis hastilabia* Rchb. f., *Microstylis muelleri* Schltr., *Microstylis paranaensis* Schltr., *Microstylis sertulifera* (Barb. Rodr.) Schltr., *Pycnantha orchiioides* Ravenna
 Hierba. Nativa. 600-1900 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA).

Malaxis hieronymi (Cogn.) L.O. Williams

Sin.: *Microstylis hieronymi* Cogn.
 Hierba. Nativa. 1500-3300 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
 BRA(PAR).

Malaxis histionantha (Link) Garay & Dunst.

Sin.: *Microstylis histionantha* Link
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Malaxis irmae Radins & Salazar

Hierba. Endémica. 0-200 m.
 Países: ARG(COS, MIS). URY(FLA, LAV).

Malaxis jaraguae (Hoehne & Schltr.)

Pabst
 Sin.: *Microstylis jaraguae* Hoehne & Schltr.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Malaxis pabstii (Schltr.) Pabst

Sin.: *Microstylis pabstii* Schltr.
 Hierba. Endémica. 500-1200 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Malaxis padilliana L.O. Williams

Hierba. Endémica. 1200-1800 m.
 Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Malaxis parthonii C. Morren

Sin.: *Malaxis argentinensis* L.O. Williams, *Microstylis ovatilabia* Schltr., *Microstylis parthonii* (C. Morren) Klotzsch
 Hierba. Nativa. 0-700 m.
 Países: ARG(COS, JUJ, MIS, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

Malaxis pubescens (Lindl.) Kuntze

Sin.: *Microstylis pubescens* Lindl.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Malaxis spicata Sol. ex Sw.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: URY(FLA).

Malaxis warmingii (Rchb. f.) Kuntze

Sin.: *Microstylis warmingii* Rchb. f.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS).

Malaxis ybytus T.F. Santos & E.C. Smidt

Hierba. Endémica. 1500-1600 m.
 Países: BRA(PAR).

Masdevallia Ruiz & Pav.**Masdevallia infracta** Lindl.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria Ruiz & Pav.**Maxillaria bradei** Schltr. ex Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria brasiliensis Brieger & Illg

Sin.: *Heterotaxis brasiliensis* (Brieger & Illg) F. Barros
 Hierba saxícola. Nativa. 0-1500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria chlorantha Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria cleistogama Brieger & Illg

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria crassifolia (Lindl.) Rchb. f.

Sin.: *Heterotaxis crassifolia* Lindl.
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR).

Maxillaria crocea Lindl.

Sin.: *Maxillaria lindleyana* Schltr.
 Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria desvauxiana Rchb. f.

Sin.: *Maxillaria coriacea* Barb. Rodr.
 Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria discolor (G. Lodd. ex Lindl.)

Rchb. f.
 Sin.: *Dicrypta discolor* G. Lodd. ex Lindl.
 Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
 Países: BRA(PAR).

Maxillaria echinophyta Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR).

Maxillaria elluziae Molinari

Sin.: *Trigonidium latifolium* Lindl.
 Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria fernandiana Barb. Rodr.

Sin.: *Maxillaria ferdinandiana* Barb. Rodr.
 var. *virescens* Cogn., *Maxillaria parahybunensis* Barb. Rodr.
 Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria humilis (Link & Otto) Schuit. & M.W. Chase

Sin.: *Bletia humilis* Link & Otto, *Maxillaria gracilis* Lodd., *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *angustifolia* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *intermedia* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *macrantha* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *minor* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *queirogana* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Maxillaria pallidiflora* Rchb. f., *Maxillaria penduliflora* Fenzl ex Van Houtte, *Maxillaria queirogana* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria imbricata Barb. Rodr.

Sin.: *Camaridium carinatum* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Camaridium hoehnei* Pabst, *Camaridium hoehnei* Pabst var. *carinatum* (Barb. Rodr.) Pabst, *Camaridium hoehnei* Pabst var. *iguapense* (Hoehne & Schltr.) Pabst, *Camaridium imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne, hom. illeg., *Camaridium imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne, hom. illeg. var. *carinatum* (Barb. Rodr.) Pabst, *Camaridium imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne, hom. illeg. var. *iguapense* (Hoehne & Schltr.) Hoehne, *Maxillaria carinata* Barb. Rodr., *Maxillaria iguapensis* Hoehne & Schltr., *Maxillaria jenischiana* (Rchb. f.) C. Schweinf. var. *iguapensis* (Hoehne & Schltr.) Pabst

Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria johannis Pabst

Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria kautskyi Pabst

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Maxillaria leucaimata Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria macrantha (Barb. Rodr.) Molinari

Sin.: *Trigonidium macranthum* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Maxillaria marginata Fenzl

Sin.: *Maxillaria consanguinea* Hoehne var. *pallida* Hoehne, *Maxillaria crassipes* Kraenzl., *Maxillaria murilliana* Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria neowiedii Rchb. f.

Sin.: *Maxillaria neowiedii* Rchb. f. var. *longifolia* Cogn., *Maxillaria vernicosa* Barb. Rodr., *Maxillaria vitelliniflora* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria notylioglossa Rchb. f.

Sin.: *Maxillaria cerifera* Barb. Rodr., *Maxillaria divaricata* (Barb. Rodr.) Cogn., *Maxillaria nervosa* Rolfe, *Ornithidium ceriferum* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Ornithidium divaricatum* Barb. Rodr., *Ornithidium flavoviridium* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Rhetinantha notylioglossa* (Rchb. f.) M.A. Blanco

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria obtusa (Lindl.) Molinari

Sin.: *Trigonidium obtusum* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria ochroleuca Lodd. ex Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria pachyphylla Schltr. ex Hoehne

Sin.: *Maxillaria pachyphylla* Schltr. ex

Hoehne var. *brunneo-fusca* Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria paranaensis Barb. Rodr.

Sin.: *Maxillaria acicularis* Herb. ex Lindl. var. *brevifolia* Cogn., *Maxillaria cogniauxiana* Hoehne, *Maxillaria cogniauxiana* Hoehne var. *intermedia* Hoehne, *Maxillaria cogniauxiana* Hoehne var. *longifolia*, *Maxillaria heterophylla* Hoehne var. *acicularifolia* Hoehne, *Maxillaria heterophylla* Hoehne var. *intermedia* Hoehne, *Maxillaria heterophylla* Hoehne var. *longifolia* Hoehne, *Maxillaria juergensii* Schltr., *Maxillaria spegazziniana* Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada para Argentina por Zubek et al. (2024) sin datos

Maxillaria parviflora (Poepp. & Endl.) Garay

Sin.: *Camaridium purpureum* Spreng., hom. illeg., *Maxillaria conferta* (Griseb.) C. Schweinf. ex León, *Maxillaria purpurea* (Spreng.) Ames & Correll, *Ornithidium chloroleucum* Barb. Rodr., *Ornithidium confertum* Griseb., *Ornithidium parviflorum* (Poepp. & Endl.) Rchb. f., *Pseudomaxillaria chloroleuca* (Rchb. f.) Hoehne, *Scaphyglottis parviflora* Poepp. & Endl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria phoenicanthera Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Maxillaria porphyrostele Rchb. f.

Sin.: *Maxillaria porphyrostele* Rchb. f. var. *chrysanthoides* Hoehne, *Maxillaria porphyrostele* Rchb. f. var. *minutipunctulata* Hoehne, *Maxillaria porphyrostele* Rchb. f. var. *submarginata* Hoehne

Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria porrecta Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Maxillaria pumila Hook.

Sin.: *Maxillaria minuta* Cogn., *Maxillaria plebeja* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria rigida Barb. Rodr.

Sin.: *Camaridium rigidum* (Barb. Rodr.) Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

Maxillaria rufescens Lindl.

Sin.: *Maxillaria abelei* Schltr., *Maxillaria articulata* Klotzsch, *Maxillaria rufescens* Lindl. var. *flavida* Rchb. f., *Maxillaria rugosa* Scheidw.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria subulata Lindl.

Sin.: *Maxillaria acicularis* Herb., *Maxillaria cepula* Rchb. f., *Maxillaria echinochila* Kraenzl., *Maxillaria hatschbachii* Schltr., *Maxillaria madida* Lindl., *Maxillaria madida* Lindl. var. *cepula* (Rchb. f.) Hoehne, *Maxillaria mosenii* Kraenzl., *Maxillaria mosenii* Kraenzl. var. *echinochila* (Kraenzl.) Hoehne, *Maxillaria mosenii* Kraenzl. var. *hatschbachii* (Schltr.) Hoehne, *Maxillaria paulistana* Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria ubatubana Hoehne

Sin.: *Maxillaria ubatubana* Hoehne var. *mantiqueirana* Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria valenzuelana (A. Rich.) Nash

Sin.: *Dicrypta irisphyta* Barb. Rodr., *Marsupiaria valenzuelana* (A. Rich.) Garay, *Maxillaria iridifolia* Rchb. f., *Pleurothallis valenzuelana* A. Rich.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mesadenella Pabst & Garay**Mesadenella atroviridis** (Barb. Rodr.) Garay

Sin.: *Cyclopogon atroviridis* Barb. Rodr., *Garaya atroviridis* (Barb. Rodr.) Szlach., *Spiranthes atroviridis* (Barb. Rodr.) Cogn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Mesadenella pumila (Vell.) Campacci

Sin.: *Cyclopogon albo-punctatus* Barb. Rodr., *Mesadenella cuspidata* (Lindl.) Garay, *Mesadenella esmeraldae* (Lindl. & Rchb. f.) Pabst & Garay, *Serapias pumila* Vell., *Spiranthes cuspidata* Lindl., *Spiranthes esmeraldae* Lindl. & Rchb. f., *Spiranthes margaritifera* Lindl. & Rchb. f., *Stenorrhynchos esmeraldae* (Lindl. & Rchb. f.) Cogn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA).

Microchilus C. Presl**Microchilus arietinus** (Rchb. f. & Warm.) Ormd.

Sin.: *Erythrodes arietina* (Rchb. f. & Warm.) Ames, *Microchilus pedrojuanensis* Ormd., *Microchilus rojasii* Ormd., *Physurus arietinus* Rchb. f. & Warm., *Physurus micranthus* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Microchilus austrobrasiliensis (Porsch) Ormd.

Sin.: *Erythrodes austrobrasiliensis* (Porsch) Pabst, *Physurus austrobrasiliensis* Porsch

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Microchilus juruenensis (Hoehne) E.C. Smidt & M.W. Chase

Sin.: *Erythrodes juruensis* (Hoehne) Garay, *Ligeophila juruenensis* (Hoehne) Garay, *Physurus juruensis* Hoehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Microchilus kuczynskii (Porsch) E.C. Smidt & M.W. Chase

Sin.: *Aspidogyne kuczynskii* (Porsch) Garay, *Erythrodes dichopetala* (Kraenzl.) L.O. Williams, *Erythrodes kuczynskii* (Porsch) Garay, *Physurus dichopetalus* Kraenzl., *Physurus kuczynskii* Porsch

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA, SPE).

Microchilus lindleyanu (Cogn.) E.C. Smidt & M.W. Chase

Sin.: *Aspidogyne lindleyana* (Cogn.) Garay, *Erythrodes lindleyana* (Cogn.) Ames, *Physurus lindleyanus* Cogn., *Physurus lindmanii* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, SPE).

Microchilus metallescens (Barb. Rodr.) E.C. Smidt & M.W. Chase
Sin.: *Aspidogyne metallescens* (Barb. Rodr.) Garay, *Physurus metallescens* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Microchilus pedicellatus (Cogn.) E.C. Smidt & M.W. Chase
Sin.: *Aspidogyne pedicellata* (Cogn.) Meneguzzo, *Erythodes paranaensis* (Kraenzl.) Pabst, *Physurus paranaensis* (Kraenzl.) Schltr., *Platythelys paranaensis* (Kraenzl.) Garay, *Platythelys pedicellata* (Cogn.) Szlach., *Spiranthes pedicellata* Cogn., *Wulfschlaegelia paranaensis* Kraenzl.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Microchilus platensis (Hauman) E.C. Smidt & M.W. Chase
Sin.: *Erythodes platensis* (Hauman) L.O. Williams, *Physurus platensis* Hauman, *Platythelys platensis* (Hauman) Garay
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). PRY(CAN, CEN, PAI).

Microchilus roseus (Lindl.) D. Dietr.
Sin.: *Erythodes rosea* (Lindl.) Ames, *Ligeophila rosea* (Lindl.) Garay, *Physurus roseus* Lindl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAN).

Miltonia Lindl., nom. cons.

Miltonia cuneata Lindl.
Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Miltonia flavescens Lindl.
Sin.: *Cystochilum flavescens* Lindl., *Cystochilum stellatum* Lindl., *Miltonia flavescens* Lindl. var. *stellata* (Lindl.) Regel, *Miltonia loddigesii* Regel, *Miltonia stellata* (Lindl.) Lindl., *Oncidium flavescens* (Lindl.) Rchb. f., *Oncidium stellatum* (Lindl.) Beer
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, SPE).

Miltonia phymatochila (Lindl.) N.H. Williams & M.W. Chase
Sin.: *Oncidium phymatochilum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Miltonia regnellii Rchb. f.
Sin.: *Miltonia cereola* Lem., *Miltonia regnellii* Rchb. f. var. *citrina* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miltonia russelliana (Lindl.) Lindl.
Sin.: *Anneliesia russelliana* (Lindl.) Senghas & Lückel, *Miltonia quadrijuga* Dusén & Kraenzl., *Oncidium russellianum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Muscarella Luer

Muscarella cryptophyta (Barb. Rodr.) Bogarín & Karremans
Sin.: *Humboldtia parvifolia* (Lindl.) Kuntze, *Lepanthes cryptophyta* Barb. Rodr., *Pabstiella parvifolia* (Lindl.) Luer, *Pleurothallis parvifolia* Lindl., *Pleurothallis succedanea* Hoehne & Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myoxanthus Poepp. & Endl.

Myoxanthus exasperatus (Lindl.) Luer
Sin.: *Myoxanthus parahybunensis* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis exasperata* Lindl., *Pleurothallis macropus* Schltr., *Pleurothallis peduncularis* Lindl., hom. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrosmodes Rchb. f.

Myrosmodes gymnandra (Rchb. f.) C.A. Vargas
Sin.: *Altensteinia gymnandra* Rchb. f.
Hierba. Nativa. 3500-3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Myrosmodes nervosa (Kraenzl.) Novoa, C. Vargas & Cisternas
Sin.: *Aa nervosa* (Kraenzl.) Schltr., *Altensteinia nervosa* Kraenzl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Myrosmodes noemiae Monsalvo, M.I. Sánchez & Fortunato
Hierba. Endémica. 4200-4300 m.
Países: ARG(JUJ).

Myrosmodes paludosa (Rchb. f.) P. Ortiz
Sin.: *Aa paludosa* (Rchb. f.) Schltr., *Altensteinia paludosa* Rchb. f., *Myrosmodes paludosa* (Rchb. f.) C.A. Vargas, nom. illeg.
Hierba. Nativa. 3200-4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Notylia Lindl.**Notylia hemitricha** Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Notylia lyrata S. MooreSin.: *Notylia lyrata* S. Moore var. *major* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CEN, CON, GUA).**Notylia pubescens** Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Octomeria R. Br.**Octomeria alexandri** Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Octomeria anceps Porto & BradeSin.: *Octomeria crassilabia* Pabst,
Octomeria reitzii Pabst

Hierba epífita. Nativa. 800-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Octomeria caetensis Pabst

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Octomeria chamaeleptotes Rchb. f.Sin.: *Octomeria hatschbachii* Schltr.,
Octomeria riograndensis Schltr.,
Octomeria sancti-angeli Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 400-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Octomeria chloidophylla (Rchb. f.)

Garay

Sin.: *Pleurothallis chloidophylla* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(SCA).

Octomeria concolor Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Octomeria crassifolia Lindl.Sin.: *Octomeria alpina* Barb. Rodr.,
Octomeria densiflora Barb. Rodr.,
Octomeria ementosa Barb. Rodr.,
Octomeria gehrtii Hoehne & Schltr.,
Octomeria gracilicaulis Schltr., *Octomeria*
serrana Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU).

Notas: Citada para Uruguay (Pabst & Dungs, 1975) sin mencionar localidad o material de referencia

Octomeria cucullata Porto & Brade

Hierba epífita. Nativa. 1900-2000 m.

Países: BRA(PAR).

Octomeria decumbens Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-700 m.

Países: BRA(PAR).

Octomeria diaphana Lindl.Sin.: *Octomeria albopurpurea* Barb. Rodr.,
Octomeria fialhoensis Dutra ex Pabst,
Octomeria glazioviana Regel

Hierba epífita. Nativa. 700-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Octomeria fibrifera Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Octomeria flabellifera Pabst

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Octomeria gracilis Lodd. ex Lindl.Sin.: *Octomeria gracilis* Lodd. ex Lindl.
var. *paulensis* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Octomeria grandiflora Lindl.Sin.: *Octomeria grandiflora* Lindl. var.
robusta (Barb. Rodr.) Cogn., *Octomeria*
robusta Rchb. f. & Warm., *Octomeria*
ruthiana Hoehne, *Octomeria seegeriana*
Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Octomeria imigiae T.F. Santos, Toscano & E.C. Smidt

Hierba epífita. Endémica. 800-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Octomeria irrorata Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Octomeria juncifolia Barb. Rodr.Sin.: *Octomeria juncifolia* Barb. Rodr. var.
revoluta Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Octomeria leptophylla Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Octomeria lichenicola Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Octomeria lilliputana W. Forst., F.

Barros & V.C. Souza

Hierba epífita. Endémica. 600-700 m.

Países: BRA(PAR).

Octomeria linearifolia Barb. Rodr.Sin.: *Octomeria bradei* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

- Países: BRA(PAR).
- Octomeria lithophila** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Sin.: *Gigliolia lithophila* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).
- Octomeria micrantha** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).
- Octomeria ochroleuca** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria octomeriantha** (Hoehne) Pabst
Sin.: *Octomeria elobata* Pabst, *Pleurothallis octomeriantha* Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria palmyrabellae** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria praestans** Barb. Rodr.
Sin.: *Octomeria paulensis* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Octomeria pusilla** Lindl.
Sin.: *Octomeria juergensii* Schltr., *Octomeria umbonulata* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria rodriguesii** Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria rohrii** Pabst
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).
- Octomeria rotundiglossa** Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria rubrifolia** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa
Países: BRA(RGS).
- Octomeria stellaris** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Octomeria tricolor** Rchb. f.
Sin.: *Octomeria albina* Barb. Rodr., *Octomeria lacerata* Hoehne & Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Octomeria tweediei** Luer & Toscano
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(RGS)
- Octomeria unguiculata** Schltr.
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Octomeria warmingii** Rchb. f.
Sin.: *Octomeria iguapensis* Schltr., *Octomeria oxychela* Barb. Rodr. var. *gracilis* Cogn., *Octomeria oxychela* Barb. Rodr. var. *oxychela*, *Octomeria pinicola* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).
- Odontorrhynchus** M.N. Correa
- Odontorrhynchus castillonii** (Hauman) M.N. Correa
Sin.: *Spiranthes castillonii* (Hauman) L.O. Williams, *Stenorrhynchos castillonii* Hauman
Hierba. Nativa. 1200-2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC).
- Odontorrhynchus chlorops** (Rchb. f.) Garay
Sin.: *Brachystele chlorops* (Rech. f.) Schltr., *Spiranthes chlorops* Rchb. f.
Hierba. Nativa. 2800-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Oeceoclades** Lindl.
- Oeceoclades maculata** (Lindl.) Lindl.
Sin.: *Angraecum maculatum* Lindl., *Eulophia maculata* (Lindl.) Rchb. f., *Eulophidium maculatum* (Lindl.) Pfitzer, *Eulophidium maculatum* (Lindl.) Pfitzer var. *pterothallus* Hauman, *Oeceoclades maculata* (Lindl.) Lindl. var. *pterothallus* (Hauman) Garay & P. Taylor
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
- Oncidium** Sw., nom. cons.
- Oncidium emaculatum** Ravenna
Hierba epífita. Endémica. 1200 m.
Países: BRA(SCA).
- Ornithocephalus** Hook.
- Ornithocephalus brachystachyus** Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(RGS).
- Ornithocephalus myrticola** Lindl.
Sin.: *Ornithocephalus pygmaeus* Rchb. f. & Warm., *Ornithocephalus reitzii* Pabst
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Orthochilus Hochst. ex A. Rich.**Orthochilus ruwenzoriensis** (Rendle) Bytebier

Sin.: *Cyrtopodium galeandroides* Cogn., *Eulophia argentina* Schltr., *Eulophia ruwenzoriensis* Rendle, *Pteroglossaspis argentina* Rolfe

Hierba epífita. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA). URY(MAL, RNO).

Pabstiella Brieger & Senghas**Pabstiella alligatorifera** (Rchb. f.) Luer

Sin.: *Acianthera alligatorifera* (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, *Lepanthes blumenawii* Barb. Rodr., *Pleurothallis alligatorifera* Rchb. f., *Pleurothallis blumenawii* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia alligatorifera* (Rchb. f.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella arcuata (Lindl.) Luer

Sin.: *Humboldtia arcuata* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis arcuata* Lindl., *Pleurothallis ocellata* Porsch, *Specklinia arcuata* (Lindl.) Luer, *Stelis arcuata* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella armeniaca (Barb. Rodr.) L. Kollmann

Sin.: *Lepanthes armeniaca* Barb. Rodr., *Pleurothallis armeniaca* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia armeniaca* (Barb. Rodr.) F. Barros & V.T. Rodrigues

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Pabstiella aveniformis (Hoehne) Luer

Sin.: *Acianthera aveniformis* (Hoehne) C.N. Gonçalves & J.L. Waechter, *Pleurothallis aveniformis* Hoehne, *Specklinia aveniformis* (Hoehne) Luer, comb. illeg.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella bacillaris (Pabst) Luer

Sin.: *Pleurothallis bacillaris* Pabst, *Specklinia bacillaris* (Pabst) Luer

Hierba epífita. Endémica. 800-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Pabstiella bradei (Schltr.) Luer

Sin.: *Pleurothallis bradei* Schltr., *Specklinia bradei* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella calcarata (Cogn.) Luer

Sin.: *Pleurothallis calcarata* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella campestris (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Pabstiella mouraeoides* (Hoehne) Luer, *Pleurothallis campestris* Barb. Rodr., *Pleurothallis mouraeoides* Hoehne, *Specklinia campestris* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx mouraeoides* (Hoehne) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Pabstiella carinifera (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Lepanthes carinifera* Barb. Rodr., *Pleurothallis carinifera* (Barb. Rodr.) Cogn., *Trichosalpinx carinifera* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella colorata (Pabst) Luer & Toscano

Sin.: *Pleurothallis colorata* Pabst, *Specklinia colorata* (Pabst) F. Barros & V.T. Rodrigues

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella curti-bradei (Pabst) Luer

Sin.: *Pleurothallis curti-bradei* Pabst, *Pleurothallis curti-bradei* Pabst var. *minor* (Schltr. & Hoehne) Pabst, *Pleurothallis microcharis* Schltr. ex Hoehne, *Specklinia curti-bradei* (Pabst) Luer, *Trichosalpinx curti-bradei* (Pabst) Luer

Hierba epífita. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Pabstiella fusca (Lindl.) Chiron & Xim.Bols.

Sin.: *Humboldtia hypnicola* (Lindl.) Kuntze, *Pabstiella hypnicola* (Lindl.) Luer, *Pabstiella sparsiflora* (Schltr.) Luer, *Pleurothallis fusca* Lindl., *Pleurothallis hypnicola* Lindl., *Pleurothallis sparsiflora* Schltr., *Specklinia hypnicola* (Lindl.) F. Barros, comb. illeg., *Specklinia hypnicola* (Lindl.) Luer, *Specklinia sparsiflora* (Schltr.) Luer, *Stelis hypnicola* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella hians (Lindl.) Luer

Sin.: *Pleurothallis hians* Lindl., *Specklinia hians* (Lindl.) Luer, *Stelis hians* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Pabstiella intraptila Chiron & Xim. Bols.

Hierba epífita. Endémica. 1200 m.

Países: BRA(PAR).

Pabstiella matinhensis (Hoehne) Luer
Sin.: *Pleurothallis matinhensis* Hoehne, *Specklinia matinhensis* (Hoehne) Luer, *Trichosalpinx matinhensis* (Hoehne) Luer
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella mentigera (Kraenzl.) L. Kollmann
Sin.: *Pleurothallis magnicalcarata* Loefgr., *Pleurothallis mentigera* Kraenzl., *Specklinia mentigera* (Kraenzl.) F. Barros & Barberena
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella miniatolineolata (Hoehne) Luer
Sin.: *Pleurothallis miniatolineolata* Hoehne, *Specklinia miniatolineolata* (Hoehne) F. Barros
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Pabstiella mirabilis (Schltr.) Brieger & Senghas
Sin.: *Anthereon mirabilis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis longicornu* Kraenzl., *Pleurothallis mirabilis* Schltr., *Specklinia mirabilis* (Schltr.) Luer
Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella miragliae (Leite) Luer
Sin.: *Pleurothallis miragliae* Leite, *Specklinia miragliae* (Leite) Luer
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella pellifeloidis (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes pellifeloidis* Barb. Rodr., *Pleurothallis pellifeloidis* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia pellifeloidis* (Barb. Rodr.) Luer, *Stelis pellifeloidis* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Pabstiella piraquarensis (Hoehne) Luer
Sin.: *Pleurothallis piraquarensis* Hoehne, *Specklinia piraquarensis* (Hoehne) Luer, *Stelis piraquarensis* (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Pabstiella pleurothalloides (Cogn.) Luer
Sin.: *Pleurothallis edwallii* Dusén & Schltr., *Pleurothallis pfisteri* Braem & Braas, *Pleurothallis pleurothalloides* (Cogn.) Handro, *Restrepia pleurothalloides* Cogn., *Specklinia pleurothalloides* (Cogn.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella podoglossa (Hoehne) Luer
Sin.: *Pleurothallis podoglossa* Hoehne, *Specklinia podoglossa* (Hoehne) Luer, *Trichosalpinx podoglossa* (Hoehne) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella pristeoglossa (Rchb. f. & Warm.) Luer
Sin.: *Pleurothallis pristeoglossa* Rchb. f. & Warm., *Specklinia pristeoglossa* (Rchb. f. & Warm.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Pabstiella pterophora (Cogn.) Chiron
Sin.: *Pleurothallis pterophora* Cogn., *Trichosalpinx pterophora* (Cogn.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(SCA).

Pabstiella punctatifolia (Barb. Rodr.) Chiron
Sin.: *Lepanthes punctatifolia* Barb. Rodr., *Pabstiella punctatifolia* (Barb. Rodr.) Luer, comb. illeg., *Pleurothallis punctatifolia*

(Barb. Rodr.) Pabst, *Specklinia punctatifolia* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx punctatifolia* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella quadridentata (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes bicolor* Barb. Rodr., *Lepanthes quadridentata* Barb. Rodr., *Pabstiella bicolor* (Barb. Rodr.) Luer & Toscano, *Pleurothallis bicolor* (Barb. Rodr.) Cogn., hom. illeg., *Pleurothallis mouraei* Cogn., *Pleurothallis palmeirensis* Pabst, *Pleurothallis quadridentata* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia quadridentata* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx bicolor* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx quadridentata* (Barb. Rodr.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella recurviloba Toscano & Luer
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS).

Pabstiella rubrolineata (Hoehne) Luer
Sin.: *Pleurothallis rubrolineata* Hoehne, *Specklinia rubrolineata* (Hoehne) F. Barros
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Pabstiella sarcopetala (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes sarcopetala* Barb. Rodr., *Pleurothallis sarcopetala* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia sarcopetala* (Barb. Rodr.) Luer, *Stelis sarcopetala* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Pabstiella seriata (Lindl.) Luer & Toscano
Sin.: *Anathallis seriata* (Lindl.) Luer & Toscano, *Humboldtia seriata* (Lindl.)

Kuntze, *Panmorphia seriata* (Lindl.) Luer,
Pleurothallis seriata Lindl., *Pleurothallis*
sphaeroglossa Hoehne, *Specklinia seriata*
 (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
 Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella sordida (Kraenzl.) Luer
 Sin.: *Pleurothallis sordida* Kraenzl.,
Specklinia sordida (Kraenzl.) Luer,
Trichosalpinx sordida (Kraenzl.) Luer
 Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella stictophylla (Schltr.) J.O.
 Caetano & L.R.S. Guim.
 Sin.: *Pleurothallis stictophylla* Schltr.,
Specklinia stictophylla (Schltr.) Luer
 Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella tenera (Barb. Rodr.) Luer
 Sin.: *Lepanthes tenera* Barb. Rodr.,
Pleurothallis tenera (Barb. Rodr.) Cogn.,
Specklinia tenera (Barb. Rodr.) Luer,
Trichosalpinx tenera (Barb. Rodr.) Luer
 Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
 Países: BRA(RGS).

Pabstiella tricolor (Barb. Rodr.) Luer
 Sin.: *Lepanthes tricolor* Barb. Rodr.,
Pleurothallis tricolor (Barb. Rodr.) Cogn.,
Specklinia tricolor (Barb. Rodr.) Luer,
Stelis tricolor (Barb. Rodr.) Pridgeon &
 M.W. Chase
 Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella trifida (Lindl.) Luer
 Sin.: *Pleurothallis bicristata* Cogn.,
Pleurothallis curtii Schltr., *Pleurothallis*
trifida Lindl., *Specklinia trifida* (Lindl.) Luer
 Hierba epífita. Nativa. 500-700 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella tripterantha (Rchb. f.) F.
 Barros
 Sin.: *Anthereon tripteranthus* (Rchb. f.)
 Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis*
procumbens Lindl., *Pleurothallis*
trippterantha Rchb. f., *Specklinia*
trippterantha (Rchb. f.) Luer
 Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Pabstiella uniflora (Lindl.) Luer
 Sin.: *Pleurothallis leontoglossa* Rchb. f.,
Pleurothallis uniflora Lindl., *Specklinia*
leontoglossa (Rchb. f.) Luer, *Specklinia*
uniflora (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
 Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella varellae Toscano, Luer & J.
 Klein
 Sin.: *Pabstiella mouraeoides* Hoehne var.
riograndensis Pabst, *Pleurothallis*
mouraeoides Hoehne var. *riograndensis*
 Pabst
 Hierba epífita. Endémica. 800-1000 m.
 Países: BRA(RGS).

Pabstiella vellozoana (Schltr.) Luer
 Sin.: *Pleurothallis vellozoana* Schltr.
 Hierba epífita. Endémica. 100-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS).

Pabstiella wacketii (Handro & Pabst)
 Luer
 Sin.: *Pleurothallis wacketii* Handro &
 Pabst, *Specklinia wacketii* (Handro &
 Pabst) Luer
 Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR).

Pabstiella wawraeana (Barb. Rodr.)
 Chiron & Xim. Bols.
 Sin.: *Lepanthes wawraeana* Barb. Rodr.,
Pleurothallis cuneifolia Cogn.
 Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pachygenium (Schltr.) Szlach., R.
 González & Rutkowski

Pachygenium arechavaletae Mytnik,
 Szlach. & Górniak
 Sin.: *Pelexia arechavaletae* (Mytnik,
 Szlach. & Górniak) J.M.H. Shaw
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: URY(MON).

Pachygenium laureense C.M. Martín &
 Szlach.
 Hierba. Endémica. 900-100 m.
 Países: ARG(JUJ).

Pachygenium paraguayensis (Garay)
 Szlach., R. González & Rutk.
 Sin.: *Pelexia paraguayensis* Garay,
Pelexia vaginata (Cogn.) Schltr.,
Stenorrhynchos vaginatum Cogn., nom.
 inval.
 Hierba. Endémica. 0-300 m.
 Países: PRY(CAU, CEN, PAI).

Paradisanthus Rchb. f.

Paradisanthus bahiensis Rchb. f. subsp.
bahiensis
 Hierba. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Paradisanthus bahiensis Rchb. f. subsp.
micranthus (Rchb. f.) Meneguzzo
 Sin.: *Paradisanthus micranthus* (Barb.
 Rodr.) Schltr., *Paradisanthus mosenii*
 Rchb. f., *Paradisanthus paranaensis* Barb.
 Rodr., *Zygopetalum micranthum* Barb.
 Rodr.
 Hierba. Nativa. 500-1200 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Pelexia Poit. ex Lindl., nom. cons.

Pelexia albicans (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Stenorrhynchos albicans* Cogn.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: PRY(CAU).

Pelexia bonariensis (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Gyrostachys bonariensis* (Lindl.)

Kuntze, *Pachygenium bonariense* (Lindl.)

Szlach., R. González & Rutk.,

Pachygenium callosum (M.N. Correa)

Mytnik, Szlach. & Górniak, *Pelexia*

bonariensis (Lindl.) Schltr. var.

bombylifera (Rchb. f. & Warm.) Hoehne,

Pelexia bonariensis (Lindl.) Schltr. var.

robusta Cogn., *Pelexia ekmanii* (Kraenzl.)

Schltr., *Pelexia loefgrenii* (Porsch) Schltr.,

Pelexia saltensis (Griseb.) Schltr.,

Spiranthes bonariensis Lindl., *Spiranthes*

ekmanii (Kraenzl.) Hauman, *Spiranthes*

saltensis Griseb., *Stenorrhynchos*

bonariense (Lindl.) Cogn., *Stenorrhynchos*

ekmanii Kraenzl., *Stenorrhynchos*

loefgrenii Porsch, *Stenorrhynchos*

saltensis (Griseb.) Cogn.,

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,

SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA,

CEN, GUA, ITA, PAI). URY(CAS, MAL,

MON, RIV, ROC, SJO, TAC).

Pelexia burgeri Schltr.

Sin.: *Pachygenium burgeri* (Schltr.)

Szlach., R. González & Rutk.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

Pelexia collocliae Szlach.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Pelexia goyazensis (Cogn.) Garay

Sin.: *Cyclopogon aphyllus* Schltr.,

Spiranthes goyazensis Cogn.

Hierba. Nativa. 300-800 m.

Países: BRA(PAR).

Pelexia gracilis Schltr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Pelexia hysternantha (Barb. Rodr.) Schltr.

Sin.: *Pachygenium hysternanthum* (Barb.

Rodr.) Szlach., *Pelexia orthosepala*

(Rchb. f. & Warm.) Schltr., R. González &

Rutkowski, *Spiranthes hysternantha* Barb.

Rodr., *Spiranthes orthosepala* Rchb. f. &

Warm., *Stenorrhynchos hysternanthum*

Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

Pelexia incurvidens Schltr.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(RGS).

Pelexia itatiayae Schltr.

Sin.: *Pachygenium itatiayae* (Schltr.)

Szlach., R. González & Rutkowski

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: BRA(RGS).

Pelexia laminata Schltr.

Sin.: *Pachygenium laminatum* (Schltr.)

Szlach., R. González & Rutkowski

Hierba. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Pelexia laxa (Poepp. & Endl.) Lindl.

Sin.: *Pelexia lindmaniana* (Kraenzl.)

Schltr., *Stenorrhynchos laxum* Poepp. &

Endl., *Stenorrhynchos lindmanianum*

Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR,

RGS).

Pelexia lindmanii Kraenzl.

Sin.: *Pelexia stictophylla* Schltr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS). PRY(SPE). URY(RNO,

ROC).

Pelexia macropoda (Barb. Rodr.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes macropoda* Barb. Rodr.,

Stenorrhynchos macropodum (Barb.

Rodr.) Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pelexia novofriburgensis (Rchb. f.)

Garay

Sin.: *Pelexia hypnophila* (Barb. Rodr.)

Schltr., *Pelexia polyantha* Schltr. ex

Mansf., *Spiranthes hypnophila* Barb.

Rodr., *Stenorrhynchos hypnophilum*

(Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Stenorrhynchos*

novofriburgense Rchb. f.

Hierba. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Pelexia oestrifera (Rchb. f. & Warm.)

Schltr.

Sin.: *Gyrostachys oestrifera* (Rchb. f. &

Warm.) Kuntze, *Spiranthes oestrifera*

Rchb. f. & Warm., *Stenorrhynchos*

oestriferum (Rchb. f. & Warm.) Cogn.,

Stenorrhynchos oestriferum (Rchb. f. &

Warm.) Cogn. var. *minor* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Pelexia orobanchoides (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Stenorrhynchos orobanchoides*

Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

Pelexia ovatifolia M.N. Correa

Hierba. Endémica. 500-600 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Pelexia paludosa M.N. Correa

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS).

Pelexia parva (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Pelexia viridis* (Cogn.) Schltr.,
Stenorrhynchos parvum Cogn.,
Stenorrhynchos viride Cogn.
 Hierba. Nativa. 800-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Pelexia pterygantha (Rchb. f. & Warm.) Schltr.

Sin.: *Pelexia dolichorhiza* Schltr.,
Spiranthes pterygantha Rchb. f. & Warm.,
Stenorrhynchos pteryganthum (Rchb. f. & Warm.) Cogn.
 Hierba. Nativa. 500-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pelexia robusta (Kraenzl.) Hoehne

Sin.: *Pachygenium robustum* (Kraenzl.)
 Szlach., *Stenorrhynchos robustum*
 Kraenzl.
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: BRA(PAR).

Pelexia sceptrum Schltr.

Sin.: *Pachygenium sceptrum* (Schltr.)
 Szlach., *R. González* & Rutkowski
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR).

Pelexia schmidtiana (Mytnik, Szlach. & Górnjak) J.M.H. Shaw

Sin.: *Pachygenium schmidtianum* Mytnik,
 Szlach. & Górnjak
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(GUA).

Pelexia tamanduensis (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Pachygenium tamanduense*
 (Kraenzl.) Szlach., *R. Gonzalez* & Rutk.,
Stenorrhynchos holosericeum Kraenzl.,
Stenorrhynchos tamanduense Kraenzl.
 Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: BRA(PAR).

Pelexia tenuior Schltr.

Sin.: *Pachygenium tenuius* (Schltr.)
 Szlach., *R. González* & Rutkowski
 Hierba. Endémica. 800-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Pelexia ventricosa (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Stenorrhynchos ventricosum* Cogn.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA, CAU, CAN, GUA,
 SPE).

Phloeophila Hoehne & Schltr.**Phloeophila nummularia** (Rchb. f.)

Garay
 Sin.: *Pabstiella nummularia* (Rchb. f.)
 Chiron, *Phloeophila echinantha* (Barb.
 Rodr.) Garay, *Phloeophila echinantha*
 (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase,
 comb. superfl., *Phloeophila paulensis*
 Hoehne & Schltr., *Physosiphon*
echinanthus (Barb. Rodr.) Cogn.,
Pleurothallis echinantha Barb. Rodr.,
Pleurothallis nummularia Rchb. f.,
Pleurothallis paulensis (Hoehne & Schltr.)
 Luer
 Hierba epífita. Endémica. 100-500 m.
 Países: BRA(SCA).

Phymatidium Lindl.**Phymatidium aquinoi** Schltdl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Phymatidium delicatulum Lindl. var. **curvicepalum** Toscano

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Phymatidium delicatulum Lindl. var. **delicatulum**

Sin.: *Phymatidium denticulatum* Steud.,
Phymatidium myrtophilum Barb. Rodr.,
Phymatidium paranaense A. Samp., nom.
 nud.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(APA).

Phymatidium falcifolium Lindl.

Sin.: *Phymatidium tillandsioides* Barb.
 Rodr.
 Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Phymatidium hysternanthum Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Phymatidium microphyllum (Barb. Rodr.) Toscano var. **microphyllum**

Sin.: *Ornithocephalus microphyllus* Barb.
 Rodr.
 Hierba epífita. Nativa. 900-1200 m.
 Países: BRA(PAR, RGS).

Phymatidium microphyllum Barb. Rodr. var. **herteri** (Schltr.) Toscano

Sin.: *Phymatidium herteri* Schltr.
 Hierba epífita. Endémica. 800-1200 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Platyrhiza Barb. Rodr.**Platyrhiza quadricolor** Barb. Rodr.

Sin.: *Platyrhiza juergensii* Schltr.
 Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Platystele Schltr.**Platystele oxyglossa** (Schltr.) Garay

Sin.: *Platystele brasiliensis* Brade,
Platystele pygmaea (Hoehne) Pabst,

Pleurothallis oxyglossa Schltr.,
Pleurothallis pygmaea Hoehne
 Hierba. Nativa. 800-1500 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Pogoniopsis Rchb. f.

Pogoniopsis schenckii Cogn.
 Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR).

Polystachya Hook., nom. cons.

Polystachya caespitosa Barb. Rodr.
 Sin.: *Polystachya bradei* Schltr. ex Mansf.,
Polystachya juergensii Schltr.
 Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polystachya caracasana Rchb. f.
 Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet
 Sin.: *Dendrorchis estrellensis* (Jacq.) Kuntze, *Epidendrum concretum* Jacq.,
Polystachya estrellensis Rchb. f.
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, GUA, SPE).

Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f.
 Sin.: *Polystachya edwallii* Hoehne & Schltr., *Polystachya micrantha* Schltr.,
Polystachya nana (Poepp. & Endl.) Rchb. f., *Polystachya pinicola* Barb. Rodr.,
Polystachya rupicola Brade
Stelis foliosa Hook.
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, PAI).

Polystachya paulensis Rchb.f
 Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(SCA).

Ponthieva R. Br.

Ponthieva hassleri Schltr.
 Hierba. Endémica. 0-300 m.
 Países: PRY(AMA).

Ponthieva mandonii Rchb. f.
 Sin.: *Ponthieva mandonii* Rchb. f. var. *bilobipetala* Hoehne, *Ponthieva parvilabris* Griseb.
 Hierba. Nativa. 1000-2500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Prescottia Lindl.

Prescottia densiflora (Brongn.) Lindl.
 Sin.: *Decaisnea densiflora* Brongn.
 Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prescottia lancifolia Lindl.

Sin.: *Prescottia epiphyta* Barb. Rodr.,
Prescottia octopollinica Barb. Rodr.,
Prescottia truncicola Schltr.
 Hierba. Nativa. 400-1700 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Prescottia montana Barb. Rodr.
 Sin.: *Prescottia serrana* M.N. Correa, nom. nud.
 Hierba. Nativa. 700-2700 m.
 Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA).

Prescottia oligantha (Sw.) Lindl.

Sin.: *Cranichis micrantha* Spreng.,
Cranichis oligantha Sw., *Prescottia filiformis* Schltr., *Prescottia gracilis* Schltr.,
Prescottia micrantha Lindl., *Prescottia*

microrhiza Barb. Rodr., *Prescottia myosurus* Rchb. f., *Prescottia nivalis* Barb. Rodr., *Prescottia panamensis* Schltr.,
Prescottia pubescens Barb. Rodr., *Prescottia tenuis* Lindl., *Prescottia viacola* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-2900 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN). URY(CAS).

Prescottia ostenii Pabst

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(CAS).

Prescottia phleoides Lindl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Prescottia plantaginifolia Lindl. ex Hook.

Sin.: *Prescottia plantaginea* Hook.,
Prescottia plantaginea Hook. var. *macrostachya* Hoehne, *Prescottia rodeiensis* Barb. Rodr., *Prescottia stricta* Schltr.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl.

Sin.: *Cranichis stachyodes* Sw., *Prescottia colorans* Lindl., *Prescottia longipetiolata* Barb. Rodr., *Prescottia paulensis* Cogn.,
Prescottia petiolaris Lindl.

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, PAI).

Promenaea Lindl.

Promenaea stapelioides (Link & Otto) Lindl. subsp. **rollissonii** (Lindl.) Meneguzzo

Sin.: *Maxillaria rollissonii* Lindl.,
Promenaea albescens Schltr., *Promenaea paranaensis* Schltr. var. *albescens*

(Schltr.) Hoehne, *Promenaea riograndensis* Schltr., *Promenaea rollissonii* (Lindl.) Lindl., *Zygopetalum rollissonii* (Lindl.) Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Promenaea stapelioides (Link & Otto) Lindl. subsp. **stapelioides**

Sin.: *Promenaea dusenii* Schltr., *Zygopetalum stapelioides* (Link & Otto) Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Promenaea stapelioides (Link & Otto) Lindl. subsp. **xanthina** (Lindl.) Meneguzzo

Sin.: *Maxillaria xanthina* Lindl., *Promenaea acuminata* Schltr., *Promenaea catharinensis* Schltr., *Promenaea fuerstenbergiana* Schltr., *Promenaea guttata* Rchb. f., *Promenaea xanthina* Lindl., *Zygopetalum guttatum* (Rchb. f.) Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosthechea Knowles & Westc.

Prosthechea aemula (Lindl.) W.E. Higgins

Sin.: *Epidendrum aemulum* Lindl.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Prosthechea bulbosa (Vell.) W.E. Higgins

Sin.: *Encyclia bulbosa* (Vell.) Pabst, *Encyclia inversa* (Lindl.) Pabst, *Epidendrum bulbosum* Vell., *Epidendrum inversum* Lindl., *Prosthechea inversa* (Lindl.) W.E. Higgins

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosthechea fausta (Rchb. f. ex Cogn.) W.E. Higgins

Sin.: *Anacheilium faustum* (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst, Moutinho & A.V. Pinto, *Encyclia fausta* (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst, *Epidendrum faustum* Rchb. f. ex Cogn.

Hierba epífita. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosthechea glumacea (Lindl.) W.E. Higgins

Sin.: *Anacheilium glumaceum* (Lindl.) Pabst, *Encyclia almasii* (Hoehne) Pabst, *Encyclia glumacea* (Lindl.) Pabst, *Epidendrum almasii* Hoehne, *Epidendrum glumaceum* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosthechea pachysepala (Klotzsch) Chiron & V.P. Castro

Sin.: *Epidendrum pachysepalum* Klotzsch

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Prosthechea papilio (Vell.) W.E. Higgins

Sin.: *Encyclia papilio* (Vell.) Pabst, *Epidendrum papilio* Vell., *Epidendrum widgrenii* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Prosthechea pygmaea (Hook.) W.E. Higgins

Sin.: *Encyclia pygmaea* (Hook.) Dressler, *Epidendrum pygmaeum* Hook., *Hormidium tripterum* (Brongn.) Cogn.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosthechea vespa (Vell.) W.E. Higgins

Sin.: *Encyclia vespa* (Vell.) Dressler, *Epidendrum variegatum* Hook., hom. illeg., *Epidendrum vespa* Vell.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Psilochilus Barb. Rodr.

Psilochilus dusenianus Kraenzl. ex Garay & Dunst.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Psilochilus hatschbachii Kolan.

Hierba. ndémica. 1100-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Psilochilus modestus Barb. Rodr.

Sin.: *Pogonia modesta* (Barb. Rodr.) Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pterichis Lindl.

Pterichis boliviana Schltr.

Sin.: *Stenoptera aspidistrifolia* Hauman

Hierba. Nativa. 1200-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Pterichis multiflora (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Acraea multiflora* Lindl.

Hierba. Nativa. 2000-3400 m.

Países: ARG(SAL).

Pteroglossa Schltr.

Pteroglossa glazioviana (Cogn.) Garay

Sin.: *Cogniauxiocharis glazioviana* (Cogn.) Hoehne, *Pelexia glazioviana* Cogn., *Pelexia glazioviana* Cogn. var. *paraguayensis* Cogn.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAA).

Pteroglossa lurida (M.N. Correa) Garay
Sin.: *Centrogenium luridum* M.N. Correa,
Eltroplectris lurida (M.N. Correa) Pabst
Hierba saxícola. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, SAL). BRA(SCA).
PRY(PHA).

Pteroglossa luteola Garay
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(COS).

Pteroglossa macrantha (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Pteroglossa regia* (Kraenzl.) Schltr.,
Spiranthes macrantha Rchb. f.,
Stenorrhynchos macranthum (Rchb. f.)
Cogn., *Stenorrhynchos macranthum*
(Rchb. f.) Cogn. f. *robustior* Cogn.,
Stenorrhynchos regius Kraenzl.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).
PRY(AMA).

Pteroglossa magnifica Szlach. ex
Szlach.
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(AMA).

Pteroglossa rhombipetala Garay
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SFE). PRY(GUA).

Pteroglossa roseoalba (Rchb. f.) Salazar
& M.W. Chase
Sin.: *Centrogenium roseo-album* (Rchb. f.)
Schltr., *Eltroplectris roseoalba* (Rchb. f.)
Hamer & Garay, *Eltroplectris travassosii*
(Rolfe) Garay, *Pelexia roseo-alba* Rchb. f.,
Pelexia travassosii Rolfe
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL).

Rodriguezia Ruiz & Pav.

Rodriguezia bracteata (Vell.) Hoehne
Sin.: *Epidendrum bracteatum* Vell.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Rodriguezia decora (Lem.) Rchb. f.
Sin.: *Burlingtonia amoena* Planch.,
Burlingtonia decora Lem.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA).

Rodriguezia obtusifolia (Lindl.) Rchb. f.
Sin.: *Burlingtonia obtusifolia* Lindl.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Rodriguezia pubescens (Lindl. &
Paxton) Rchb. f.
Sin.: *Burlingtonia pubescens* Lindl. &
Paxton
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Rodriguezia sticta M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Rudolfiella Hoehne

Rudolfiella lindmaniana (Kraenzl.)
Hoehne
Sin.: *Bifrenaria lindmaniana* Kraenzl.
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Sacoila Raf.

Sacoila argentina (Griseb.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos argentinum* Griseb.,
Stenorrhynchos argentinum Griseb. var.
minor Cogn.
Hierba. Nativa. 100-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ,
LRI). PRY(APY).

Sacoila duseniana (Kraenzl.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos bradei* Schltr.,
Stenorrhynchos dusenianum Kraenzl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sacoila hassleri (Cogn.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos hassleri* Cogn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay
Sin.: *Limodorum lanceolatum* Aubl.,
Sacoila apetala (Kraenzl.) Garay, *Sacoila*
riograndensis (Kraenzl.) Garay, *Sacoila*
secundiflora (Lillo & Hauman) Garay,
Satyrium orchioides Sw., *Skeptrostachys*
sancti-jacobi (Kraenzl.) Garay,
Stenorrhynchos apetalum Kraenzl.,
Stenorrhynchos australe Lindl.,
Stenorrhynchos lanceolatum (Aubl.) Rich.
ex Spreng., *Stenorrhynchos orchioides*
(Sw.) Rich., *Stenorrhynchos orchioides*
(Sw.) Rich. var. *australis* Cogn.,
Stenorrhynchos riograndense Kraenzl.,
Stenorrhynchos sancti-jacobi Kraenzl.,
Stenorrhynchos secundiflorum Lillo &
Hauman

Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS,
SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,
AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE,
PAI, PHA, SPE). URY(RNO, RIV, TAC).

Sacoila pedicellata (Cogn.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos pedicellatum* Cogn.,
Stenorrhynchos pedicellatum Cogn. var.
major Cogn.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, SAL). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAU, SPE).

Sanderella Kuntze**Sanderella discolor** (Barb. Rodr.) Cogn.Sin.: *Parlatorea discolor* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS).

Sanderella riograndensis Dutra ex Pabst

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sarcoglottis C. Presl**Sarcoglottis acaulis** (Sm.) Schltr.Sin.: *Neottia acaulis* Sm., *Neottia grandiflora* (Lindl.) Hook., *Sarcoglottis fasciculata* (Vell.) Schltr., *Sarcoglottis glaucescens* Schltr., *Sarcoglottis grandiflora* (Hook.) Klotzsch, *Serapias fasciculata* Vell., *Spiranthes acaulis* (Sm.) Cogn. var. *grandiflora* Lindl. ex Rchb. f., *Spiranthes grandiflora* Lindl., *Spiranthes picta* (Anders) Lindl. var. *grandiflora* (Lindl.) L.O. Williams

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, GUA).

Sarcoglottis alexandri Schltr. ex Mansf.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Sarcoglottis biflora (Vell.) Schltr.Sin.: *Sarcoglottis itararensis* (Kraenzl.) Hoehne, *Serapias biflora* Vell., *Spiranthes biflora* (Vell.) Cogn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Sarcoglottis homalogastra (Rchb. f. & Warm.) Schltr.Sin.: *Spiranthes homalogastra* Rchb. f. & Warm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Sarcoglottis tirolensis Burns-Bal. & M.S.Foster

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: PRY(ITA).

Sarcoglottis uliginosa Barb. Rodr.Sin.: *Spiranthes uliginosa* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN).

Sarcoglottis umbrosa (Barb. Rodr.) Schltr.Sin.: *Pelexia magdalenensis* Brade & Pabst, *Pelexia sancta* (Rchb. f. & Warm.) Garay, *Sarcoglottis catharinensis* Mancinelli & E.C. Smidt, *Sarcoglottis juergensii* Schltr., *Sarcoglottis magdalenensis* (Brade & Pabst) Pabst, *Sarcoglottis sancta* (Rchb. f. & Warm.) Schltr., *Spiranthes sancta* Rchb. f. & Warm., *Spiranthes umbrosa* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sarcoglottis ventricosa (Vell.) Hoehne ex PabstSin.: *Sarcoglottis rufescens* Klotzsch, *Serapias ventricosa* Vell.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Sauroglossum Lindl.**Sauroglossum andinum** (Hauman) GaraySin.: *Schidorhynchos andinum* (Hauman) Szlach., *Spiranthes nitida* (Vell.) Cogn. var. *andina* Hauman

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sauroglossum elatum Lindl.Sin.: *Spiranthes pachychila* Kraenzl., *Spiranthes sauroglossum* G. Nicholson

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sauroglossum sellilabre (Griseb.) Schltr.Sin.: *Spiranthes sellilabris* Griseb.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC). PRY(COA).

Scaphyglottis Poepp. & Endl.**Scaphyglottis brasiliensis** (Schltr.) DresslerSin.: *Fractiunguis brasiliensis* Schltr., *Reichenbachanthus modestus* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Scaphyglottis emarginata (Garay) DresslerSin.: *Reichenbachanthus emarginatus* Garay

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Scaphyglottis modesta (Rchb. f.) Schltr.Sin.: *Tetragamestus modestus* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Skeptrostachys Garay**Skeptrostachys arechavaletanii** (Barb. Rodr.) Garay

Sin.: *Stenorrhynchos arechavaletanii* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos exaltatum* Kraenzl., *Stenorrhynchos lateritium* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, SJO, TAC, TYT).

Skeptrostachys balanophorostachya (Rchb. f. & Warm.) Garay

Sin.: *Spiranthes balanophorostachya* Rchb. f. & Warm., *Stenorrhynchos balanophorostachyum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn., *Stenorrhynchos stenophyllum* Cogn.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(CLA, CLA, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO).

Skeptrostachys berroana (Kraenzl.) Garay

Sin.: *Pelexia berroana* (Kraenzl.) Schltr., *Stenorrhynchos berroanum* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 200-400 m.

Países: URY(LAV, MAL, ROC).

Skeptrostachys congestiflora (Cogn.) Garay

Sin.: *Stenorrhynchos congestiflorum* Cogn.

Hierba. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Skeptrostachys correana Szlach.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(COS).

Skeptrostachys disoides (Kraenzl.) Garay

Sin.: *Spiranthes disoides* Kraenzl., *Spiranthes paranahybae* Kraenzl., *Stenorrhynchos densum* Hauman

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Skeptrostachys gigantea (Cogn.) Garay

Sin.: *Stenorrhynchos giganteum* Cogn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, SJO, TAC, TYT).

Skeptrostachys montevidensis (Barb. Rodr.) Garay

Sin.: *Stenorrhynchos montevidense* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos polyanthum* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, MON).

Skeptrostachys paraguayensis (Rchb. f.) Garay

Sin.: *Spiranthes paraguayensis* Rchb. f., *Stenorrhynchos paraguayense* (Rchb. f.) Cogn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, MIE). URY(CAS, MAL, PAY, RNO, ROC).

Skeptrostachys rupestris (Lindl.) Garay

Sin.: *Spiranthes rupestris* Lindl., *Stenorrhynchos rupestre* (Lindl.) Cogn.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Specklinia Lindl.

Specklinia aurantiaca (Barb. Rodr.) F. Barros & V.T. Rodrigues

Sin.: *Pleurothallis aurantiaca* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.) F. Barros

Sin.: *Humboldtia grobyi* (Bateman ex Lindl.) Kuntze, *Lepanthes marmorata* Barb. Rodr., *Lepanthes pluriflora* Barb.

Rodr., *Pleurothallis grobyi* Bateman ex Lindl., *Pleurothallis grobyi* Bateman ex Lindl. var. *marmorata* (Barb. Rodr.) Garay,

Pleurothallis lindleyana Cogn., *Pleurothallis marmorata* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis perplexa* Rchb. f.,

Pleurothallis pluriflora (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia biglandulosa* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Specklinia grobyi* (Bateman ex Lindl.) Pridgeon & M.W.

Chase, nom. illeg.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Specklinia marginalis (Rchb. f.) F. Barros

Sin.: *Humboldtia marginalis* (Rchb. f.) Kuntze, *Pleurothallis biglandulosa* Schltr., *Pleurothallis grobyi* Bateman ex Lindl. var.

marginalis (Rchb. f.) Pabst, *Pleurothallis marginalis* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada para Argentina por Zubek et al. (2024) sin indicar localidad o material de referencia.

Specklinia subpicta (Schltr.) F. Barros

Sin.: *Pleurothallis subpicta* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 500 m.

Países: BRA(PAR).

Stanhopea J. Frost ex Hook.

Stanhopea insignis J. Frost ex Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stanhopea lietzei (Regel) Schltr.

Sin.: *Stanhopea graveolens* Lindl. var. *lietzei* Regel, *Stanhopea graveolens* Lindl. var. *straminea* Porsch

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stanhopea xytriophora Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(SAL).

Stelis Sw., nom. et typ. cons.**Stelis aquinoana** Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Stelis argentata Lindl.

Sin.: *Stelis fragrans* Schltr., *Stelis littoralis* Barb. Rodr., *Stelis mucronata* Porsch, *Stelis omalosantha* Barb. Rodr., *Stelis pauciflora* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis catharinensis Lindl.

Sin.: *Stelis aprica* Lindl., *Stelis herzogii* Schltr., *Stelis miersii* Lindl., *Stelis rodriguesii* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis ciliaris Lindl.

Sin.: *Stelis leinigii* Pabst

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stelis deregularis Barb. Rodr.

Sin.: *Physosiphon deregularis* (Barb. Rodr.) Cogn., *Physosiphon minutiflorus* Ames & Schweinf., *Pleurothallis deregularis* (Barb. Rodr.) Luer, *Pseudostelis bradei* Schltr., *Pseudostelis deregularis* (Barb. Rodr.) Schltr.,

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis grandiflora Lindl.

Sin.: *Stelis macrochlamys* Hoehne & Schltr., *Stelis megantha* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis intermedia Poepp. & Endl.

Sin.: *Stelis drosophila* Barb. Rodr., *Stelis dusenii* Garay, *Stelis petropolitana* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis modesta Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa

Países: BRA(PAR, SCA).

Stelis papaquerensis Rchb. f.

Sin.: *Stelis diaphana* Schltr., *Stelis epilithica* Garay, *Stelis fraterna* Lindl., *Stelis guttifera* Porsch, *Stelis inaequisepala* Hoehne & Schltr., *Stelis juergensii* Schltr., *Stelis penduliflora* Barb. Rodr., *Stelis porschiana* Schltr., *Stelis pterostele* Hoehne & Schltr., *Stelis reflexisepala* Garay, *Stelis smaragdina* Barb. Rodr., *Stelis tweediana* Lindl., *Stelis vinosa* Barb. Rodr., *Stelis vinosa* Barb. Rodr. var. *longifolia* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis parvifolia Garay

Sin.: *Stelis microphylla* Hoehne & Schltr., hom. illeg.

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(SCA).

Stelis pauloensis Hoehne & Schltr.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stelis reitzii Garay

Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.

Países: BRA(SCA).

Stelis ruprechtiana Rchb. f.

Sin.: *Stelis hoehnei* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Trichocentrum Poepp. & Endl.**Trichocentrum cepula** (Hoffmanns.)

J.M.H. Shaw

Sin.: *Cohniella cepula* (Hoffmanns.) Carnevali & G. A. Romero, *Cohniella osteniana* (Schltr.) Christenson, *Oncidium cepula* Hoffmanns., *Oncidium ostenianum* Schltr., *Stilifolium ostenianum* (Schltr.) Königer & Pongratz, *Trichocentrum ostenianum* (Schltr.) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(FOR, MIS). PRY(CON, COA, GUA, SPE).

Trichocentrum fuscum Lindl.

Sin.: *Acoidium fuscum* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Trichocentrum jonesianum (Rchb. f.)

M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Cohniella jonesiana* (Rchb. f.) Christenson, *Oncidium jonesianum* Rchb. f., *Oncidium jonesianum* Rchb. f. var. *flavens* Rchb. f., *Oncidium jonesianum* Rchb. f. var. *phaeanthum* Sander, *Stilifolium jonesianum* (Rchb. f.) Königer & Pongratz

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Trichocentrum morenoi (Dodson & Luer)
M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Lophiaris morenoi* (Dodson & Luer)
Braem, *Oncidium morenoi* Dodson & Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: PRY(APA).

Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.
Chase & N.H. Williams

Sin.: *Epidendrum ligulatum* Vell., hom.
illeg., *Lophiaris pumila* (Lindl.) Braem,
Oncidium pumilum Lindl., *Oncidium*
pumilum Lindl. var. *angustifolium* Cogn.,
Oncidium pumilum Lindl. var. *laxum*
Kraenzl., *Oncidium pumilum* Lindl. var.
robustum Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
APY, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA,
ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA,
RNO, TYT).

Trichosalpinx Luer

Trichosalpinx montana (Barb. Rodr.)
Luer

Sin.: *Lepanthes montana* Barb. Rodr.,
Pleurothallis lepanthipoda Hoehne &
Schltr., *Pleurothallis quartzicola* (Barb.
Rodr.) Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Trichosalpinx violacea (Lem.) Luer

Sin.: *Pleurothallis catharinensis* Cogn.,
Specklinia violacea Lem.

Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Triphora Nutt.

Triphora hassleriana (Cogn. ex Chodat
& Hassl.) Schltr.

Sin.: *Pogonia hassleriana* Cogn. ex
Chodat & Hassl., *Triphora santamariensis*
Portalet

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS). PRY(CAN, PAI, SPE).

Triphora uniflora A.C. Ferreira, Baptista
& Pansarin

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Trizeuxis Lindl.

Trizeuxis falcata Lindl.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Uleiorchis Hoehne

Uleiorchis prataensis M.E. Engels &
E.C. Smidt

Hierba. Endémica. 200-400 m.

Países: BRA(PAR).

Uleiorchis ulei (Cogn.) Handro

Sin.: *Uleiorchis cogniauxiana* Hoehne,
Wulfschlaegelia ulaei Cogn.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Vanilla Mill.

Vanilla chamissonis Klotzsch

Sin.: *Vanilla argentina* Hicken, *Vanilla*
chamissonis Klotzsch var. *brevifolia*
Cogn., *Vanilla chamissonis* Klotzsch var.
longifolia Hoehne, *Vanilla velozii* Rolfe

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).

Vanilla dietschiana Edwall

Sin.: *Dictyophyllaria dietschiana* (Edwall)
Garay

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.)
Lindl.

Sin.: *Epidendrum palmarum* Salzm. ex
Lindl.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Vanilla parvifolia Barb. Rodr.

Sin.: *Vanilla bertonensis* Bertoni, *Vanilla*
edwallii Hoehne, *Vanilla organensis* Rolfe,
Vanilla perexilis Bertoni

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, APY, CAN, CEN, GUA).

Vanilla verrucosa Hauman

Sin.: *Vanilla angustipetala* Schltr., *Vanilla*
rojasiana Hoehne

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, SPE).

Veyretia Szlach.

Veyretia hassleri (Cogn.) Szlach.

Sin.: *Sarcoglottis hassleri* (Cogn.) Schltr.,
Spiranthes hassleri Cogn., *Veyretia*
undulata Szlach.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, MIE).

Veyretia sagittata (Rchb. f. & Warm.)
Szlach.

Sin.: *Sarcoglottis sagittata* (Rchb. f. & Warm.) Schltr., *Spiranthes sagittata* Rchb. f. & Warm.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(COS).

Veyretia simplex (Griseb.) Szlach.

Sin.: *Sarcoglottis butantanensis* (Hoehne) Hoehne & Schltr., *Sarcoglottis neuroptera* (Rchb. f. & Warm.) Schltr., *Spiranthes butantanensis* Hoehne, *Spiranthes lindmaniana* Kraenzl., *Spiranthes neuroptera* Rchb. f. & Warm., *Spiranthes simplex* Griseb., *Veyretia neuroptera* (Rchb. f. & Warm.) Szlach.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).

Warmingia Rchb. f., nom. cons.

Warmingia eugenii Rchb. f.

Sin.: *Warmingia loefgrenii* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Warrea Lindl.

Warrea warreana (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.

Sin.: *Koellensteinia tricolor* (Lindl.) Rchb. f., *Maxillaria warreana* Lodd. ex Lindl., *Warrea bidentata* Lindl., *Warrea speciosa* Schltr., *Warrea tricolor* Lindl., *Warrea unijugata* Regel, *Warrea warreana* (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf. var. *unijugata* (Regel) Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Wulschlaegelia Rchb. f.

Wulschlaegelia aphylla (Sw.) Rchb. f.

Sin.: *Cranichis aphylla* Sw.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA).

Xylobium Lindl.

Xylobium colleyi (Bateman ex Lindl.) Rolfe

Sin.: *Maxillaria colleyi* Bateman ex Lindl., *Xylobium brachystachyum* Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xylobium undulatum (Ruiz & Pav.) Rolfe

Sin.: *Dendrobium squalens* Lindl., *Maxillaria undulata* Ruiz & Pav., *Xylobium dusenii* Kraenzl., *Xylobium squalens* (Lindl.) Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Zeuxine Lindl., nom. et orth cons.

Zeuxine strateumatica (L.) Schltr.

Sin.: *Orchis strateumatica* L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR).

Zootrophion Luer

Zootrophion atropurpureum (Lindl.) Luer

Sin.: *Cryptophoranthus atropurpureus* (Lindl.) Rolfe, *Cryptophoranthus schenckii* Cogn., *Pleurothallis atropurpurea* (Lindl.) Lindl., *Specklinia atropurpurea* Lindl., *Zootrophion schenckii* (Cogn.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 400-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Zygopetalum Hook., nom. et orth cons.

Zygopetalum crinitum G. Lodd.

Sin.: *Zygopetalum mackayi* Hook. var. *crinitum* (G. Lodd.) Lindl., *Zygopetalum pubescens* Hoffm., *Zygopetalum stenichilum* G. Lodd., nom. inval.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zygopetalum jugosum (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Colax jugosus* (Lindl.) Lindl., *Lycaste jugosa* (Lindl.) Nichols, *Maxillaria jugosa* Lindl., *Pabstia jugosa* (Lindl.) Garay

Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zygopetalum maculatum (Kunth) Garay subsp. **maculatum**

Sin.: *Dendrobium maculatum* Kunth, *Zygopetalum brachypetalum* Lindl., *Zygopetalum intermedium* Lodd. ex Lindl., *Zygopetalum mackayi* Hook. var. *charlesworthii* R.H. Pearson, *Zygopetalum maculatum* (Kunth) Garay f. *charlesworthii* (R.H. Pearson) Meneguzzo

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zygopetalum maculatum (Kunth) Garay subsp. **triste** (Barb. Rodr.) Meneguzzo

Sin.: *Zygopetalum triste* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Zygopetalum maxillare G. Lodd.

Sin.: *Zygopetalum hasslerianum* Kraenzl., *Zygopetalum mandibulare* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN).

Zygopetalum viride (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Colax puydtii* Lindl. & André, *Colax viridis* (Lindl.) Lindl., *Colax viridis* (Lindl.) Lindl. var. *parviflorus* Hoehne, *Lycaste puydtii* (Lindl. & André) G. Nicholson, *Maxillaria placanthera* Hook., *Maxillaria viridis* Lindl., *Pabstia viridis* (Lindl.) Garay, *Pabstia viridis* (Lindl.) Garay var. *parviflorus* (Hoehne) Garay
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Zygostates Lindl.

Zygostates alleniana Kraenzl.

Sin.: *Dipteranthus lindmanii* Kraenzl., *Zygostates aquinoi* Schltr., *Zygostates lindmanii* (Kraenzl.) Schltr., *Zygostates papillosa* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Zygostates bradei (Schltr.) Garay

Sin.: *Dipteranthus bradei* Schltr., *Zygostates rotundiglossa* Pabst
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Zygostates cornuta Lindl.

Sin.: *Zygostates lunata* Lindl. var. *subintegripetala* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Zygostates dasyrhiza (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Ornithocephalus dasyrhizus* Kraenzl., *Zygostates paranaensis* Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zygostates lunata Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Zygostates multiflora (Rolfe) Schltr.

Sin.: *Ornithocephalus multiflorus* Rolfe
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Zygostates pellucida Rchb. f.

Sin.: *Dipteranthus pellucidus* (Rchb. f.) Cogn., *Dipteranthus pseudobulbifer* Barb. Rodr., *Ornithocephalus pseudobulbifer* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zygostates pustulata (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Dipteranthus pustulatus* (Kraenzl.) Pabst, *Ornithocephalus dusenianus* Kraenzl., *Ornithocephalus pustulatus* Kraenzl., *Zygostates duseniana* (Kraenzl.) Pabst
Hierba epífita. Endémica. 1000-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

OROBANCHACEAE

Agalinis Raf., nom. et typ. cons.

Agalinis communis (Cham. & Schltdl.)

D'Arcy
Sin.: *Gerardia communis* Cham. & Schltdl.
Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SJU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Agalinis digitalis (Benth.) Barringer

Sin.: *Gerardia digitalis* Benth.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(MAL).

Notas: Especie extinta según Marchesi (1997: 75)

Agalinis fiebrigii (Diels) D'Arcy

Sin.: *Gerardia fiebrigii* Diels
Subarbusto. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC).

Agalinis genistifolia (Cham. & Schltdl.)

D'Arcy
Sin.: *Agalinis rigida* (Gillies ex Benth.) D'Arcy, *Gerardia genistifolia* Cham. & Schltdl., *Gerardia rigida* Gillies ex Benth.
Subarbusto parásito. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, CON, COA). URY(COL, PAY, RNO, RIV, TAC).

Agalinis linarioides (Cham. & Schltdl.)

D'Arcy subsp. **linarioides**
Sin.: *Gerardia linarioides* Cham. & Schltdl.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ). URY(MAL, MON, RNO, SOR).

Agalinis linarioides (Cham. & Schltdl.)

D'Arcy subsp. **rojasii** Barringer
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-700 m.
Países: PRY(AMA, CON, PAI).

Agalinis meyeniana (Benth.) Barringer

Sin.: *Gerardia rigida* Gillies ex Benth. var. *meyeniana* Benth.
Hierba. Endémica. 800-1300 m.
Países: CHL(ATA).

Agalinis ramulifera Barringer

Subarbusto parásito. Nativa. 400-800 m.
Países: BRA(PAR).

Aphyllon Mitch.**Aphyllon chilense** (Phil.) A.C. Schneid.

Sin.: *Myzorrhiza chilensis* Phil.,
Orobanche chilensis (Phil.) Beck

Hierba parásita. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Bellardia All.**Bellardia trixago** (L.) All.

Sin.: *Bartsia trixago* L., *Euphrasia trixago* (L.) Vis., *Trixago apula* Steven

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SFE). BRA(RGS). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, AIS). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Bellardia viscosa (L.) Fisch. & C.A. Mey.

Sin.: *Bartsia viscosa* L., *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel

Hierba. Introducida. 0-1400 m.

Países: ARG(NEU, RNE). BRA(RGS). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME). URY(CAS, COL, FLO, MAL, MON, SJO, SOR).

Buchnera L.**Buchnera amethystina** Cham. & Schltdl.

Hierba parásita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Buchnera juncea Cham. & Schltdl.

Hierba parásita. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Buchnera lavandulacea Cham. & Schltdl.

Hierba parásita. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, GUA).

Buchnera longifolia Kunth

Sin.: *Buchnera elongata* Sw., nom. illeg., *Buchnera integrifolia* Larrañaga, *Buchnera macrocarpa* Kunth, *Buchnera rosea* Kunth var. *guaranitica* Chodat & Hassl.

Hierba parásita. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Buchnera palustris (Aubl.) Spreng.

Sin.: *Piripea palustris* Aubl.

Hierba parásita. Nativa. 300-1200 m.

Países: PRY(CON).

Buchnera ternifolia Kunth

Sin.: *Buchnera elongata* Sw. f. *grandiflora* Chodat & Hassl., *Buchnera elongata* Sw. f. *virescens* Chodat & Hassl., *Buchnera lithospermifolia* Kunth, *Buchnera lobelioides* Cham. & Schltdl.

Hierba parásita. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, APA, COA, GUA, SPE). URY(MON).

Notas: La cita para Uruguay es dudosa (cfr. Marchesi, 1997).

Castilleja Mutis ex L.f.**Castilleja arvensis** Schltdl. & Cham.

Sin.: *Castilleja arvensis* Schltdl. & Cham. var. *pastorei* (Hicken) J.M. Egger, *Castilleja communis* Benth., *Castilleja lithospermoides* Kunth var. *pastorei* Hicken

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO).

Castilleja attenuata (A. Gray) T.I. Chuang & Heckard

Sin.: *Orthocarpus attenuatus* A. Gray

Hierba. Introducida.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Castilleja laciniata Hook. & Arn.

Sin.: *Orthocarpus australis* Benth., *Orthocarpus laciniatus* (Hook. & Arn.) D.D. Keck

Hierba. Nativa. 300-700 m.

Países: CHL(COQ, BIO).

Castilleja pumila (Benth.) Wedd. ex Herrera

Sin.: *Castilleja fissifolia* L. f. var. *pumila* (Benth.) Wedd., *Castilleja fissifolia* L. subsp. *pumila* (Benth.) Wedd., *Castilleja nubigena* Kunth var. *pumila* Benth.

Hierba parásita. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Escobedia Ruiz & Pav.**Escobedia grandiflora** (L. f.) Kuntze

Sin.: *Buchnera grandiflora* L. f., *Escobedia curialis* (Vell.) Pennell, *Escobedia foliolosa* Pennell, *Escobedia longiflora* Pennell, *Escobedia parimensis* Pennell, *Escobedia parvifolia* Pennell, *Escobedia reticulata* Pennell, *Escobedia scabrifolia* Ruiz & Pav., *Escobedia scabrifolia* Ruiz & Pav. var. *laevigata* J.A. Schmidt, *Micalia grandiflora* (L. f.) Raf., *Silvia curialis* Vell.

Subarbusto parásito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

Esterhazy J.C. Mikan

Esterhazy macrodonta Cham. & Schltldl.

Sin.: *Gerardia macrodonta* Cham.
Hierba o arbusto. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(PAR).

Esterhazy splendida J.C. Mikan

Sin.: *Esterhazy triflora* R.B. Moura & R.J.V. Alves, *Gerardia gnidioides* Cham. & Schltldl., *Gerardia splendida* (J.C. Mikan) Kuntze
Subarbusto parásito. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Euphrasia L.

Euphrasia achibuenoensis J.M. Watson, D. Santos & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 1600-1900 m.
Países: CHL(MAU).

Euphrasia adenonota I.M. Johnst.

Sin.: *Euphrasia piossekii* Descole & Borsini
Hierba. Nativa. 2800-3200 m.
Países: ARG(JUU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Euphrasia andicola Benth.

Sin.: *Euphrasia aurea* F. Phil.
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Euphrasia antarctica Benth.

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Euphrasia formosissima Skottsb. subsp. **cucharensis** Danton & C. Perrier

Subarbusto. Endémica. 1000-1200 m.
Países: CHL(JFE).

Euphrasia formosissima Skottsb. subsp. **formosissima**

Subarbusto. Endémica. 700-1200 m.
Países: CHL(JFE).

Euphrasia muscosa Phil.

Sin.: *Euphrasia caespitosa* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, AIS).

Euphrasia officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LBO, AIS, MAG).

Euphrasia perpusilla Phil.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(LLA, AIS).

Euphrasia subexserta Benth.

Sin.: *Euphrasia chrysantha* Phil., *Euphrasia flavescens* Phil. ex Wettst., *Euphrasia flavicans* Phil.
Hierba. Endémica. 800-2800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Euphrasia trifida Poepp. ex Benth.

Sin.: *Euphrasia debilis* Wettst., *Euphrasia gracilis* Phil., *Euphrasia intricata* Phil., *Euphrasia meiantha* Clos, *Euphrasia montana* Phil., hom. illeg., *Euphrasia philippii* Wettst., *Euphrasia spectabilis* Phil., *Euphrasia tenuis* Wettst., *Euphrasia villaricensis* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1900 m.
Países: CHL(MAU, LLA).

Melasma P.J. Bergius

Melasma melampyroides (Rich.) Pennell
Sin.: *Alectra aspera* (Cham. & Schltldl.) L.O. Williams, *Alectra brasiliensis* Benth., *Alectra fluminensis* (Vell.) Stearn, *Alectra melampyroides* (Rich.) Kuntze, *Glossostylis aspera* Cham. & Schltldl., *Melasma brasiliensis* (Benth.) Chodat & Hassl., *Nigrina melampyroides* (Rich.) Kuntze, *Pedicularis melampyroides* Rich., *Scrophularia fluminensis* Vell.
Hierba parásita. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, MIE, PAI).

Melasma rhinanthoides (Cham.) Benth.
Sin.: *Nigrina rhinanthoides* (Cham.) Kuntze, *Physocalyx rhinanthoides* Cham.
Hierba parásita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, GUA). URY(RNO, ROC, TAC, TYT).

Melasma stricta (Benth.) Hassl.

Sin.: *Alectra stricta* Benth.
Hierba parásita. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS). PRY(AMA, CAU, SPE).

Neobartsia Uribe-Convers & Tank

Neobartsia australis (Molau) Uribe-Convers & Tank
Sin.: *Bartsia australis* Molau
Hierba. Nativa. 2700-4300 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Neobartsia chilensis (Benth.) Uribe-Convers & Tank
Sin.: *Bartsia chilensis* Benth.
Hierba. Endémica. 300-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Neobartsia crenoloba (Wedd.) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia crenoloba* Wedd.

Hierba. Nativa. 1200-4400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Neobartsia elongata (Wedd.) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia curtiflora* Edwin, *Bartsia elongata* Wedd., *Bartsia fiebrigii* Diels, *Bartsia simulans* Edwin, *Neobartsia fiebrigii* (Diels) Uribe-Convers & Tank

Hierba. Nativa. 1500-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU).

Neobartsia jujuyensis (Cabrera & Botta) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia jujuyensis* Cabrera & Botta

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Neobartsia peruviana (Walp.) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia meyeniana* Benth., *Bartsia peruviana* Walp., *Bartsia subinclusa* Benth.

Hierba. Nativa. 1100-4900 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP).

Neobartsia serrata (Molau) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia serrata* Molau

Subarbusto. Nativa. 2300-3600 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Orobanche L.

Orobanche minor Sm.

Hierba parásita. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Orobanche ramosa L.

Hierba parásita. Introducida. 0-900 m.

Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, RME).

Orobanche tarapacana Phil.

Sin.: *Aphyllon tarapacanum* (Phil.) A.C. Schneid.

Hierba parásita. Endémica. 0-2800 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Parentucellia Viv.

Parentucellia latifolia (L.) Caruel

Sin.: *Euphrasia latifolia* L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Vellosiella Baill.

Vellosiella westermanii Dusén

Hierba. Endémica. 500-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

OXALIDACEAE

Oxalis L.

Oxalis adenophylla Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Acetosella adenophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella bustillosii* (Phil.) Kuntze, *Oxalis bustillosii* Phil., *Oxalis bustillosii* Phil. var. *biflora* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Oxalis alstonii Lourteig

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Oxalis arbuscula Barnéoud

Sin.: *Acetosella arbuscula* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella fruticula* (Phil.) Kuntze, *Oxalis fruticula* Phil.

Subarbusto. Endémica. 600-1200 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Oxalis arenaria Bertero

Sin.: *Oxalis araucana* Reiche, *Oxalis biglandulosa* Steud., *Oxalis hyalinorhiza* Poepp. ex R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Oxalis argentina R. Knuth

Sin.: *Oxalis bipartita* A. St.-Hil. var. *alpina* Griseb., *Oxalis catamarcensis* R. Knuth, *Oxalis lilloi* Hicken

Hierba. Nativa. 900-3800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Oxalis articulata Savigny subsp. **articulata**

Sin.: *Acetosella articulata* (Savigny) Kuntze, *Acetosella platensis* (A. St.-Hil. & Naudin) Kuntze, *Oxalis articulata* Savigny subsp. *nodulosa* Beauverd & Felipp., *Oxalis articulata* Savigny var. *hirsuta* Progel, *Oxalis articulata* Savigny var. *sericea* Progel, *Oxalis canterai* Arechav., *Oxalis dumicola* Arechav., *Oxalis floribunda* Lehm. subsp. *floribunda*, *Oxalis guttata* Osten ex Arechav., *Oxalis halophila* Arechav., *Oxalis lasiopetala* Zucc. var. *pubescens* Progel, *Oxalis lasiophylla* A. St.-Hil. & Naudin, *Oxalis monticola* Arechav. var. *sericea* R. Knuth, *Oxalis platensis* A. St.-Hil. & Naudin, *Oxalis pseudostipulata* Arechav., *Oxalis rivalis* Arechav., *Oxalis sericea* (Progel) Arechav., comb. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, RME). PRY(COA, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Oxalis articulata Savigny subsp. **rubra** (A. St.-Hil.) Lourteig
Sin.: *Acetosella rubra* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis rubra* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, MON, SAO, SOR, TAC).

Oxalis atacamensis Reiche
Sin.: *Acetosella trichocalyx* Kuntze, *Oxalis trichocalyx* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Oxalis aureoflava Steud.
Sin.: *Acetosella aureoflava* (Steud.) Kuntze, *Oxalis corniculata* L. var. *aureoflava* (Steud.) Gunckel, *Xanthoxalis aureoflava* (Steud.) Holub
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Oxalis barrelieri L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxalis benjaminii Lourteig
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, APY, CAU).

Oxalis bifrons Progel
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS).

Oxalis bipartita A. St.-Hil. subsp. **bipartita**
Sin.: *Oxalis biloba* Fredr., *Oxalis bipartita* A. St.-Hil. f. *bulbifera* Arechav., *Oxalis bipartita* A. St.-Hil. f. *limnophila* Arechav., *Oxalis bipartita* A. St.-Hil. f. *linearifolia* Arechav., *Oxalis bipartita* A. St.-Hil. f. *majorina* Arechav., *Oxalis bipartita* A. St.-Hil. f. *minor* Arechav., *Oxalis limnophila* (Arechav.) Herter, *Oxalis tubaraensis* R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, MIE). URY(TAC).

Oxalis bipartita A. St.-Hil. subsp. **pabstii** Lourteig
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Oxalis bisecta Norlind
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxalis bisfracta Turcz.
Sin.: *Oxalis breviramulosa* Rusby
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Oxalis brasiliensis Lodd., G. Lodd. & W. Lodd. ex Hildebr.
Sin.: *Oxalis macachin* Arechav., *Oxalis maldonadoensis* R. Knuth, *Oxalis pudica* R. Knuth
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Oxalis bulbocastanum Phil.
Sin.: *Oxalis breana* Phil., *Oxalis occidentalis* R. Knuth, *Oxalis thyrsoides* Reiche
Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Oxalis caesia Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Oxalis calachaccensis R. Knuth
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Oxalis chachahuensis Alfonso, Prina & Muiño
Hierba. Endémica. 1300-1700 m.
Países: ARG(MEN).

Oxalis cinerea Zucc.
Sin.: *Acetosella lineata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella pearcei* (Phil.) Kuntze, *Acetosella spodiophylla* (Walp.) Kuntze, *Oxalis alfalfalis* Phil., *Oxalis besserii* R. Knuth, *Oxalis fernandensis* R. Knuth, *Oxalis gracilinervosa* R. Knuth, *Oxalis lineata* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis niveiphylla* R. Knuth, *Oxalis pearcei* Phil., *Oxalis spodiophylla* Walp., *Oxalis spodiophylla* Walp. var. *microphylla* Walp.
Subarbusto. Nativa. 1000-2700 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

Oxalis clandestina Phil.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

Oxalis colchaguensis Lourteig
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Oxalis compacta Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Acetosella berteriana* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella compacta* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella falconiana* (Steud.) Kuntze, *Acetosella gayana* (Phil.) Kuntze, *Acetosella*

pachyphylla (Phil.) Kuntze, *Acetosella platypila* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxalis berteriana* Barnéoud, *Oxalis berteriana* Barnéoud var. *uniflora* Phil., *Oxalis chaetocalyx* Phil., *Oxalis compacta* Gillies ex Hook. & Arn. subsp. *berteriana* (Barnéoud) Lourteig, *Oxalis falconiana* Steud., nom. inval., *Oxalis gayana* Phil., *Oxalis gilliesii* Phil., *Oxalis josephii* R. Knuth, *Oxalis landbeckii* Phil., *Oxalis macrorrhiza* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis pachyphylla* Phil., *Oxalis pastorei* Hicken, *Oxalis peraltae* Phil., *Oxalis platypila* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis pumila* Phil., hom. illeg., *Oxalis reichei* R. Knuth, *Oxalis uspallatensis* R. Knuth

Hierba. Endémica. 1600-4300 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

***Oxalis confertiflora* A. St.-Hil.**

Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(SCA).

***Oxalis conorrhiza* Jacq.**

Sin.: *Acetosella caespitosa* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Acetosella chrysantha* (Progel) Kuntze, *Acetosella cineracea* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Acetosella commersonii* (Pers.) Kuntze, *Acetosella conorrhiza* (Jacq.) Kuntze, *Acetosella megapotamica* (Spreng.) Kuntze, *Oxalis andicola* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis andicola* Gillies ex Hook. & Arn. var. *wallichiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis brevipes* Fredr., *Oxalis caespitosa* A. St.-Hil., *Oxalis chrysantha* Progel, *Oxalis chrysantha* Progel var. *pusilla* Progel, *Oxalis cineracea* A. St.-Hil., *Oxalis commersonii* Pers., nom. superfl., *Oxalis conorrhiza* Larrañaga, *Oxalis cordobensis* R. Knuth, *Oxalis cordobensis* R. Knuth var. *humilior* R. Knuth, *Oxalis corniculata* L. var. *serpens* R. Knuth, *Oxalis hassleriana* Chodat, *Oxalis linneaformis* R. Knuth,

Oxalis megapotamica Spreng., *Oxalis repens* Thunb. f. *uniflora* Hieron. & Lorentz ex R. Knuth, nom. nud., *Oxalis sexenata* Savigny, *Xanthoxalis chrysantha* (Progel) Holub, *Xanthoxalis commersonii* (Pers.) Holub, *Xanthoxalis cordobensis* (R. Knuth) Holub

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, MIE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

***Oxalis corniculata* L. var. *atropurpurea* Planch.**

Sin.: *Oxalis corniculata* L. var. *purpurascens* Speg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MEN). CHL(COQ, RME, JFE). URY(MON).

Oxalis corniculata* L. var. *corniculata

Sin.: *Acetosella corniculata* (L.) Kuntze, *Acetosella corniculata* (L.) Kuntze var. *repens* (Thunb.) Kuntze, *Oxalis steudeliana* R. Knuth, *Xanthoxalis corniculata* (L.) Small

Hierba. Cosmopolita. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME, JFE, IPA). PRY(APA, CEN, COA, GUA). URY(ART, CLA, MAL, MON, PAY, SOR).

***Oxalis cotagaitensis* R. Knuth**

Hierba. Nativa. 2200-3300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Oxalis cratensis* Oliv. var. *cratensis

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

***Oxalis cratensis* Oliv. var. *paraguayensis* (R. Knuth) Lourteig**

Sin.: *Oxalis barrelieri* L. subsp. *paraguayensis* R. Knuth, *Oxalis divaricata* Mart. ex Zucc. var. *scandens* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CAU, CON, SPE).

***Oxalis cytisoides* C. Mart. & Zucc.**

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

***Oxalis debilis* Kunth**

Sin.: *Acetosella debilis* (Kunth) Kuntze, *Acetosella martiana* (Zucc.) Kuntze, *Ionoxalis martiana* (Zucc.) Small, *Oxalis bulbifera* Herter, *Oxalis corymbosa* DC., *Oxalis debilis* Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig, *Oxalis macrophylla* Kunth, *Oxalis martiana* Zucc., *Oxalis urbica* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(JFE). PRY(APA, CAA, CEN, GUA, MIE). URY(DUR, MON, SJO).

***Oxalis dumetorum* Barnéoud**

Sin.: *Acetosella dumetorum* (Barnéoud) Kuntze, *Oxalis hookeriana* Pohl ex Progel, *Oxalis lechleri* Steud., *Oxalis prorepens* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

***Oxalis enneaphylla* Cav.**

Sin.: *Acetosella enneaphylla* (Cav.) Kuntze, *Oxalis cunninghamii* R. Knuth, *Oxalis enneaphylla* Cav. subsp. *ibari* (Phil.) Lourteig, *Oxalis enneaphylla* Cav.

var. *patagonica* (Speg.) Skotts., *Oxalis enneaphylla* Cav. var. *pumila* (d'Urv.) Hook., *Oxalis frigida* R. Knuth, *Oxalis ibari* Phil., *Oxalis patagonica* Speg., *Oxalis pumila* d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

***Oxalis eremobia* Phil.**

Sin.: *Oxalis inesitae* Phil.

Hierba. Endémica. 2100-3300 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

***Oxalis ericoides* R. Knuth**

Subarbusto. Endémica. 1500-3000 m.

Países: CHL(ANT).

***Oxalis eriocarpa* DC.**

Sin.: *Acetosella amara* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis amara* A. St.-Hil., *Oxalis amara* A. St.-Hil. var. *grandiflora* R. Knuth, *Oxalis uruguaycola* Herter, *Trifolium magellanicum* Poir., *Xanthoxalis amara* (A. St.-Hil.) Holub

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(ITA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

***Oxalis eriolepis* Wedd.**

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Oxalis erosa* R. Knuth f. *erosa

Sin.: *Oxalis pinoensis* R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, CON).

***Oxalis erosa* R. Knuth f. *rosea* Lourteig**

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CON).

***Oxalis erythrorhiza* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sin.: *Acetosella bryoides* (Phil.) Kuntze, *Acetosella erythrorhiza* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxalis bryoides* Phil., *Oxalis guessfeldtii* R. Knuth, *Oxalis hosseana* R. Knuth, *Oxalis riojana* Hieron. ex R. Knuth

Hierba. Endémica. 1500-4300 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, LBO, MAU, RME).

Oxalis famatinae* R. Knuth subsp. *famatinae

Sin.: *Oxalis contracta* R. Knuth, *Oxalis hossei* R. Knuth, *Oxalis schickendantzii* R. Knuth

Hierba. Endémica. 3000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

***Oxalis famatinae* R. Knuth subsp. *sanjuaninae* Lourteig**

Hierba. Endémica. 1300-3000 m.

Países: ARG(LRI, SJU).

***Oxalis floribunda* Lehm. subsp. *ostenii* (Arechav.) Lourteig**

Sin.: *Acetosella praecox* (Progel) Kuntze, *Oxalis ostenii* Arechav., *Oxalis praecox* Progel, *Oxalis sorianensis* R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, MIE). URY(ART, MON, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

***Oxalis frutescens* L.**

Sin.: *Acetosella frutescens* (L.) Kuntze, *Acetosella pentantha* (Jacq.) Kuntze, *Lotoxalis frutescens* (L.) Small, *Oxalis angustifolia* Kunth, *Oxalis bahiensis* Progel, *Oxalis chacoensis* R. Knuth, *Oxalis descolei* R. Knuth, *Oxalis diffusa* Pohl ex Progel, *Oxalis distans* A. St.-Hil., *Oxalis frutescens* L. subsp. *angustifolia*

(Kunth) Lourteig, *Oxalis frutescens* L. subsp. *pentantha* (Jacq.) Lourteig, *Oxalis glaucifolia* R. Knuth, *Oxalis herzogii* R. Knuth, *Oxalis hispida* Mart. ex Zucc., *Oxalis pentantha* Jacq.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(APY, CON, PHA).

***Oxalis geralensis* R. Knuth**

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

***Oxalis gigantea* Barnéoud**

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

***Oxalis grisea* A. St.-Hil. var. *mattogrossensis* (Fredr.) Lourteig**

Sin.: *Oxalis hassleri* R. Knuth, *Oxalis mattogrossensis* Fredr.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CON).

***Oxalis gyrorhiza* Bertero ex Colla**

Sin.: *Acetosella gyrorhiza* (Bertero ex Colla) Kuntze, *Oxalis autumnalis* Poepp. ex Progel, nom. illeg., *Oxalis radicans* Ruiz & Pav. ex R. Knuth

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

***Oxalis hedysarifolia* Raddi**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA). PRY(AMA).

***Oxalis hepatica* Norlind**

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR).

***Oxalis hispidula* Zucc.**

Sin.: *Acetosella hispidula* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis canelonesensis* R. Knuth, *Oxalis paraguayensis* Chodat, *Oxalis*

paraguayensis Chodat var. *alfa* Chodat, nom. inval., *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *beta* Chodat, nom. inval., *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *pauciflora* R. Knuth, *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *pluriflora* R. Knuth, nom. illeg., *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *typica* R. Knuth, nom. inval., *Oxalis uruguayensis* Arechav., *Oxalis venustula* Arechav.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, MIE, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, SAO, SJO).

***Oxalis holosericea* Phil.**

Sin.: *Acetosella holosericea* (Phil.) Kuntze, *Oxalis holosericea* Phil. f. *pedunculata* Chodat & Wilczek, *Oxalis pedunculata* (Chodat & Wilczek) Lourteig

Hierba. Endémica. 2500-2700 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU).

***Oxalis hyalotricha* Lourteig**

Sin.: *Oxalis propinqua* R. Knuth, nom. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

***Oxalis hypsophila* Phil.**

Sin.: *Oxalis coyensis* R. Knuth, *Oxalis exigua* Phil., *Oxalis fluehmannii* Phil., *Oxalis leptocaulos* Phil., *Oxalis microphylla* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 2600-5000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

***Oxalis johnstonii* R. Knuth**

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

***Oxalis laciniata* Cav.**

Sin.: *Acetosella laciniata* (Cav.) Kuntze, *Acetosella squamoso-radicosa* (Steud.) Kuntze, *Oxalis laciniata* Cav. var. *pubescens* (Skottsb.) J.M.H. Shaw, *Oxalis prichardii* Rendle, *Oxalis squamoso-radicosa* Steud., *Oxalis squamoso-radicosa* Steud. var. *pubescens* Skottsb.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

***Oxalis lasiopetala* Zucc.**

Sin.: *Acetosella lasiopetala* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis darwinii* Ball, *Oxalis gayi* Macloskie, *Oxalis gracilima* Arechav., *Oxalis herteri* R. Knuth, *Oxalis hieronymi* Griseb., *Oxalis lasiopetala* Zucc. var. *angustiloba* Progel, *Oxalis melanopotamica* Speg., nom. nud., *Oxalis mercedensis* R. Knuth, *Oxalis pallens* R. Knuth, nom. illeg., *Oxalis pallida* Herter, hom. illeg., *Oxalis rubra* A. St.-Hil. var. *patagonica* Hieron., *Oxalis stenophylla* Speg., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(MIE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Oxalis latifolia* Kunth subsp. *latifolia

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Oxalis latifolia* Kunth subsp. *schraderiana* (Kunth) Lourteig**

Sin.: *Oxalis schraderiana* Kunth

Hierba. Nativa. 900-2000 m.

Países: ARG(SAL).

***Oxalis laxa* Hook. & Arn.**

Sin.: *Acetosella cumingii* (Herb.) Kuntze, *Acetosella laxa* (Hook. & Arn.) Kuntze,

Acetosella micrantha (Bertero) Kuntze, *Acetosella platycaulis* (Steud.) Kuntze, *Acetosella puberula* Kuntze, *Acetosella pygmaea* (Phil.) Kuntze, comb. illeg., *Acetosella vinaquillo* (Steud.) Kuntze, *Oxalis adenocaulos* Phil., *Oxalis alsinoides* Walp., *Oxalis brevicaulis* Steud., *Oxalis campanensis* Lourteig, *Oxalis chosicensis* R. Knuth, *Oxalis cumingii* Herb., *Oxalis deflexa* Poepp. ex Progel, *Oxalis dichotomiflora* Steud., *Oxalis geranioides* R. Knuth, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *hispidissima* Barnéoud, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *minor* Barnéoud, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *rigida* Barnéoud, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *violacea* R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Savi, nom. superfl., *Oxalis micrantha* Bertero var. *alsinoides* (Walp.) R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero var. *major* R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero var. *purpurea* R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero var. *setifera* R. Knuth, *Oxalis platycaulis* Steud., *Oxalis puberula* Phil., hom. illeg., *Oxalis pygmaea* Phil., hom. illeg., *Oxalis rigida* (Barnéoud) Lourteig, *Oxalis san-romanii* Phil., *Oxalis torcana* Phil., *Oxalis umbellata* Kuntze ex R. Knuth, nom. nud., *Oxalis vinaquillo* Steud., *Xanthoxalis laxa* (Hook. & Arn.) Holub, *Xanthoxalis micrantha* (Bertero) Holub

Hierba. Nativa. 800-2700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

***Oxalis leucophylla* Phil.**

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA).

***Oxalis linarantha* Lourteig**

Sin.: *Acetosella liniflora* Kuntze, *Oxalis liniflora* Progel, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, PAI).

Oxalis lindneri R. Knuth

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, SFE).
BRA(RGS).

Oxalis loricata Dusén

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Oxalis lourteigiana Nuernberg-Silva & Fiaschi

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Oxalis magellanica G. Forst.

Sin.: *Acetosella magellanica* (G. Forst.) Kuntze, *Acetosella modesta* (Phil.) Kuntze, *Oxalis carnosa* Molina, nom. inval., *Oxalis cataractae* A. Cunn., *Oxalis lactea* Hook., *Oxalis modesta* Phil., *Oxalis novae-zelandiae* Gand.

Hierba. Nativa. 500-3700 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).
CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Oxalis matancillae Lourteig

Hierba. Endémica. 100-400 m.

Países: CHL(ANT).

Oxalis megalorrhiza Jacq.

Sin.: *Oxalis borchersii* Phil., *Oxalis brevis* Phil., *Oxalis carnosa* Molina var. *incana* Reiche, *Oxalis darapskyi* Phil. ex Reiche, *Oxalis illapelina* Phil., *Oxalis ornata* Phil., *Oxalis paniculata* Reiche, *Oxalis paposana* Phil., *Oxalis paposana* Phil. var. *hirta* R. Knuth, *Oxalis reticulata* Steud., *Oxalis succulenta* Barnéoud, *Oxalis tarapacana* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Oxalis mira Lourteig

Hierba. Endémica. 400-600 m.

Países: CHL(COQ).

Oxalis monticola Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(MAL, MON).

Oxalis morenoensis Lourteig

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT).

Oxalis morronei Alicia López & Múlgura

Hierba. Endémica. 2600-2800 m.

Países: ARG(SCR).

Oxalis muscoides Phil.

Sin.: *Acetosella muscoides* (Phil.) Kuntze, *Oxalis echegarayi* Hieron., *Oxalis mendozensis* R. Knuth, *Oxalis rosulata* Hauman

Hierba. Endémica. 2800-3700 m.

Países: ARG(JUU, MEN, SJU).

Oxalis myriophylla A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxalis nahuelhuapiensis Speg.

Sin.: *Oxalis comberi* R. Knuth

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(ARA, RME).

Oxalis neoincana C.A. Zanolli & Zuloaga

Sin.: *Oxalis incana* Phil., hom. Illeg.

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(RME).

Oxalis niederleiniana Hieron. ex R. Knuth

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

Oxalis niederleinii R. Knuth

Sin.: *Oxalis amara* A. St.-Hil. var. *scabra* Progel, *Oxalis refracta* A. St.-Hil. var. *debilis* A. St.-Hil., *Oxalis refracta* A. St.-Hil.

var. *erecta* Arechav., *Oxalis refracta* A. St.-Hil. var. *grandiflora* Briq., *Oxalis refracta* A. St.-Hil. var. *hirsuta* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Oxalis novemfoliolata Heibl & Martic.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA).

Oxalis nubigena Walp.

Sin.: *Oxalis aetheria* J.F. Macbr., *Oxalis leoncitensis* R. Knuth, *Oxalis pygmaea* A. Gray, hom. illeg., *Oxalis yauiensis* R. Knuth

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Oxalis odonellii Lourteig

Subarbusto. Endémica. 1600-1700 m.

Países: BRA(SCA).

Oxalis ornithopus Phil.

Sin.: *Acetosella ornithopus* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Oxalis ovalleana Phil.

Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Oxalis pachyrrhiza Wedd.

Hierba. Nativa. 3500-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Oxalis paludosa A. St.-Hil.

Sin.: *Acetosella montevidensis* (Progel) Kuntze, *Acetosella paludosa* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis corrientensis* R. Knuth,

Oxalis duricaulis R. Knuth, *Oxalis montevidensis* Progel

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, DUR, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).

Oxalis pampeana Nuernberg-Silva & Fiaschi

Sin.: *Oxalis bifrons* Progel subsp. *littoralis* Lourteig

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Oxalis paranaensis Lourteig

Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Oxalis pardoensis (Lourteig) T.S. Costa & Fiaschi

Sin.: *Oxalis neuwiedii* Zucc. subsp. *pardoensis* Lourteig

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Oxalis penicillata Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3700 m.

Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, RME).

Oxalis perdicaria (Molina) Bertero

Sin.: *Acetosella eriorhiza* (Zucc.) Kuntze, *Acetosella lobata* (Sims) Kuntze, *Acetosella mallobolba* (Cav.) Kuntze, *Acetosella perdicaria* (Molina) Kuntze, *Oxalis autumnalis* A. St.-Hil., *Oxalis delicatula* Phil., *Oxalis eriorhiza* Zucc., *Oxalis kurtziana* Arechav., *Oxalis lobata* Sims, *Oxalis lobata* Sims var. *intermedia* Herter, *Oxalis mallobolba* Cav., *Oxalis tenera* Spreng., *Sassia perdicaria* Molina

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MEN, MIS, NEU, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,

RME). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR).

Oxalis pes-caprae L.

Sin.: *Acetosella cernua* (Thunb.) Kuntze, *Oxalis cernua* Thunb., *Oxalis grandiflora* Arechav., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, MEN, SJU). BRA(PAR). CHL(COQ, VAL, BIO, LLA, RME, JFE). URY(MON).

Oxalis pinguiculacea R. Knuth

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.

Países: ARG(JUU).

Oxalis platylepis Wedd.

Sin.: *Oxalis aphylla* Rusby

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Oxalis potamophila Lourteig

Hierba. Endémica. 400-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxalis praetexta Progel

Hierba. Endémica. 800-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Oxalis pseudoviolacea R. Knuth

Hierba. Nativa. 2300-2600 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Oxalis psoraleoides Kunth subsp. *insipida* (A. St.-Hil.) Lourteig

Sin.: *Oxalis candicans* R. Knuth, *Oxalis insipida* A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY).

Oxalis purpurea L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(JFE).

Oxalis pycnophylla Wedd.

Sin.: *Oxalis hauthalii* R. Knuth

Hierba. Nativa. 2200-5000 m.

Países: ARG(JUU, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT).

Oxalis ranchillos J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Endémica. 1200-1300 m.

Países: CHL(VAL).

Oxalis refracta A. St.-Hil.

Sin.: *Acetosella amara* (A. St.-Hil.) Kuntze var. *glandulosa* Kuntze, *Acetosella refracta* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis amara* A. St.-Hil. var. *glandulosa* (Kuntze) R. Knuth, *Oxalis knuthii* Herter, *Oxalis kuntzeana* Norlind, *Oxalis subcorymbosa* Arechav., *Oxalis subcorymbosa* Arechav. var. *viscosissima* Norlind, *Oxalis uruguayensis* R. Knuth, nom. illeg., *Oxalis viscosissima* (Norlind) Cabrera, *Xanthoxalis refracta* (A. St.-Hil.) Holub

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(COL, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Oxalis renifolia R. Knuth

Sin.: *Oxalis cordifolia* R. Knuth, *Oxalis tristis* R. Knuth

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Oxalis ricardii Lourteig

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT).

Oxalis riparia Norlind

Sin.: *Oxalis irreperata* Lourteig

Hierba. Nativa. 500-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxalis rhombeo-ovata A. St.-Hil. subsp. *rhombeo-ovata*

Sin.: *Acetosella rhombeo-ovata* (A. St.-Hil.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Oxalis rhombeo-ovata A. St.-Hil. subsp. **sustenta** Lourteig

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Oxalis rosea Jacq.

Sin.: *Oxalis rosea* Jacq. var. *simplex* Reiche

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Oxalis rupestris A. St.-Hil.

Sin.: *Acetosella rupestris* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Acetosella strigulosa* (Progel) Kuntze, *Oxalis dusenii* Norlind, *Oxalis fontinalis* Osten ex Arechav., *Oxalis strigulosa* Progel

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, COA). URY.

Oxalis sarmentosa Zucc.

Hierba. Endémica. 800-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxalis sellowiana Zucc. f. **alba** Herter

Sin.: *Oxalis sellowiana* Zucc. var. *alba* Múlgura

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, RIV, ROC, TYT).

Oxalis sellowiana Zucc. f. **sellowiana**

Sin.: *Acetosella sellowiana* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis intermedia* Herter, nom. nud., *Oxalis sellowiana* Zucc. var. *caulescens* Beauverd & Felipp., *Oxalis*

sellowiana Zucc. var. *citrina* Herter, nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLO, FLA, MAL).

Oxalis sellowii Spreng. var. **alba** (Chodat) Lourteig

Sin.: *Oxalis linearis* Zucc. var. *alba* Chodat

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN, COA, SPE).

Oxalis sellowii Spreng. var. **rosea** (Chodat) Lourteig

Sin.: *Oxalis linearis* Zucc. var. *rosea* Chodat **rhombeo-ovata**

Sin.: *Acetosella rhombeo-ovata* (A. St.-Hil.) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA).

Oxalis sellowii Spreng. var. **sellowii**

Sin.: *Oxalis anthyllidifolia* R. Knuth, *Oxalis linearis* Zucc., hom. illeg. f. *graminifolia* Chodat & Hassl., *Oxalis linearis* Zucc., hom. illeg. f. *latifolia* Chodat, *Oxalis linearis* Zucc. var. *graminifolia* Chodat, *Oxalis maracayuensis* R. Knuth, *Oxalis missionum* Norlind, *Oxalis nigricans* Pohl ex Progel var. *diversifolia* R. Knuth, *Oxalis pulchriflora* R. Knuth, *Oxalis rodriguezii* R. Knuth, *Oxalis sellowii* Spreng. var. *diversifolia* R. Knuth, *Oxalis sellowii* Spreng. var. *graminifolia* (Chodat & Hassl.) R. Knuth, *Oxalis sellowii* Spreng. var. *latifolia* (Chodat & Hassl.) R. Knuth, *Oxalis tenuicalyculata* R. Knuth, *Oxalis zuccariniana* Steud.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Oxalis serpens A. St.-Hil.

Sin.: *Oxalis serpens* A. St.-Hil. var. *catharinensis* Lourteig

Hierba. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxalis sleumeri Lourteig

Hierba. Endémica. 4000-5000 m.

Países: ARG(CAT, SAL).

Oxalis spiralis Ruiz & Pav. ex G. Don subsp. **membranifolia** (R. Knuth) Lourteig

Sin.: *Oxalis membranifolia* R. Knuth

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Oxalis squamata Zucc.

Sin.: *Acetosella geminata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella macropus* (Phil.) Kuntze, *Acetosella polyantha* (Walp.) Kuntze, *Acetosella squamata* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis chilensis* R. Knuth, *Oxalis geminata* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis hirthii* Phil., *Oxalis macropus* Phil., *Oxalis polyantha* Walp., *Oxalis trichocalyx* Steud., *Xanthoxalis polyantha* (Walp.) Holub

Hierba. Endémica. 1000-3200 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Oxalis squarrosa Barnéoud

Sin.: *Acetosella coquimbana* (Phil.) Kuntze, *Acetosella glutinosa* (Phil.) Kuntze, *Acetosella squarrosa* (Barnéoud) Kuntze, *Oxalis briquetii* R. Knuth, *Oxalis coquimbana* Phil., *Oxalis glutinosa* Phil.

Subarbusto. Endémica. 1000-2800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Oxalis strictula Steud.

Sin.: *Oxalis aberrans* Reiche

Hierba. Endémica. 500-1200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Oxalis subacaulis Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Oxalis llaretensis* R. Knuth, *Oxalis minutula* Ces., *Oxalis parva* R. Knuth, *Oxalis tenera* Phil.

Hierba. Endémica. 1600-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

Oxalis subvillosa Norlind

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxalis tacorensis B.L. Burtt

Hierba. Nativa. 4200-5100 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Oxalis telmatica Lourteig

Hierba. Endémica. 1100-1300 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Oxalis tenerrima R. Knuth

Sin.: *Oxalis schwackei* R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxalis tortuosa Lindl.

Sin.: *Oxalis bridgesii* Bertero ex Colla, *Oxalis gaudichaudii* Barnéoud, *Oxalis glomerata* Hook. & Arn., *Oxalis maritima* Barnéoud, *Oxalis zonata* Liebm.

Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, JFE).

Oxalis triangularis A. St.-Hil. subsp. **papilionacea** (Hoffmanns. ex Zucc.)
Lourteig

Sin.: *Acetosella papilionacea* (Hoffmanns. ex Zucc.) Kuntze, *Acetosella regnellii* (Miq.) Kuntze, *Oxalis catharinensis* N.E. Br., *Oxalis palustris* A. St.-Hil., *Oxalis papilionacea* Hoffmanns. ex Zucc., *Oxalis regnellii* Miq., *Oxalis regnellii* Miq. var. *catharinensis* (N.E. Br.) Norlind, *Oxalis*

triangularis A. St.-Hil. f. *glabrifolia* Chodat, *Oxalis venturiana* R. Knuth, *Oxalis vernalis* Fredr. ex Norlind

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Oxalis triangularis A. St.-Hil. subsp. **triangularis**

Sin.: *Acetosella triangularis* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis delta* Vell., *Oxalis tenuis* R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Oxalis trollii R. Knuth

Sin.: *Oxalis elegans* R. Knuth var. *subuniflora* Griseb., *Oxalis elegantula* R. Knuth, nom. illeg., *Oxalis pinguiculiflora* R. Knuth

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Oxalis tuberosa Molina

Sin.: *Acetosella tuberosa* (Molina) Kuntze, *Oxalis arracacha* G. Don, *Oxalis chidligastensis* R. Knuth, *Oxalis melilotoides* Zucc. var. *argentina* Griseb., *Xanthoxalis tuberosa* (Molina) Holub

Hierba suculenta. Nativa. 1200-2800 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Notas: Citada para Chile (Lourteig, 2000) sin mencionar localidad o material de referencia.

Oxalis valdiviensis Barnéoud

Sin.: *Acetosella antucensis* (Phil.) Kuntze, *Acetosella hapalconidea* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella valdiviensis* (Barnéoud) Kuntze, *Oxalis antucensis* Phil., *Oxalis berningeri* R. Knuth, *Oxalis capillipes* R. Knuth, *Oxalis chubutensis*

Speg. ex R. Knuth, *Oxalis hapalconidea* Barnéoud, *Oxalis illini* R. Knuth, *Oxalis negrensis* R. Knuth, *Oxalis tinctoria* Poepp. ex Progel, *Oxalis tolguacensis* R. Knuth, *Oxalis valdiviana* Vilm., *Oxalis valdiviensis* Barnéoud var. *antucensis* (Phil.) Reiche, *Oxalis valdiviensis* Barnéoud var. *humilis* Speg., *Xanthoxalis valdiviensis* (Barnéoud) Holub

Hierba. Endémica. 1000-1400 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Oxalis virgosa Molina

Sin.: *Acetosella subcarnosa* (Klotzsch ex Walp.) Kuntze, *Acetosella virgosa* (Molina) Kuntze, *Oxalis subcarnosa* Klotzsch ex Walp.

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Oxalis yacutulensis R. Knuth

Sin.: *Oxalis elegans* R. Knuth var. *macrophylla* Griseb.

Hierba. Endémica. 500-1600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

PAPAVERACEAE

Argemone L.

Argemone crassifolia G.B. Ownbey

Hierba. Endémica. 1300 m.

Países: CHL(ATA).

Argemone hunnemannii Otto

Sin.: *Argemone burkartii* Sorarú, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *hunnemannii* (Otto & A. Dietr.) Fedde

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COR, LPA, MEN, SLU).
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Argemone mexicana L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Argemone rosea Hook.

Sin.: *Argemone mexicana* L. var. *rosea* (Hook.) Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *spinosa* Barnéoud ex Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *tomentosa* Barnéoud ex Reiche, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *hispid-rosea* Fedde

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Argemone subfusiformis G.B. Ownbey

Sin.: *Argemone mexicana* L. var. *glauca* Barnéoud ex Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *gynophora* (Fedde) J.F. Macbr., *Argemone mexicana* L. var. *subinermis* (Fedde) Sorarú, *Argemone subfusiformis* G.B. Ownbey subsp. *subinermis* (Fedde) G.B. Ownbey

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APY, CEN, PAI). URY(COL, MON, RNO).

Bocconia L.

Bocconia integrifolia Humb. & Bonpl.

Sin.: *Bocconia frutescens* L. var. *integrifolia* (Humb. & Bonpl.) Kuntze, *Bocconia macbrideana* Standl., *Bocconia pearcei* Hutch., *Bocconia pubibractea* Hutch.

Arbolito. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Chelidonium L.

Chelidonium majus L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE).
BRA(SCA).

Eschscholzia Cham.

Eschscholzia californica Cham.

Sin.: *Chryseis californica* (Cham.) Lindl., *Eschscholzia caespitosa* Benth. var. *hypecoides* (Benth.) A. Gray, *Eschscholzia californica* Cham. var. *crocea* (Benth.) Jeps., *Eschscholzia californica* Cham. var. *douglasii* Jeps., *Eschscholzia californica* Cham. var. *tenuifolia* (Benth.) Curran, *Eschscholzia compacta* Steud., *Eschscholzia crocea* Benth., *Eschscholzia douglasii* Benth., hom. illeg., *Eschscholzia douglasii* Benth. var. *tenuifolia* (Benth.) Torr., *Eschscholzia rosea* Hort, *Eschscholzia tenuifolia* Benth., *Eschscholzia tenuisecta* Greene, *Omonoia californica* (Cham.) Raf.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, LPA, NEU, RNE, SAL, SLU, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Fumaria L.

Fumaria agraria Lag.

Sin.: *Fumaria agraria* Lag. var. *chilensis* Parl.

Hierba. Introducida. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, SDE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Fumaria bastardii Boreau

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI).

Fumaria capreolata L.

Sin.: *Fumaria capreolata* L. f. *sciophila* Ruiz Leal, *Fumaria officinalis* L. var. *capreolata* (L.) Ewart

Hierba. Introducida. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE, IPA). URY(MON).

Fumaria densiflora DC.

Sin.: *Fumaria officinalis* L. subsp. *densiflora* (DC.) O. Schwarz, *Fumaria officinalis* L. var. *densiflora* (DC.) Parl.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COR, MEN, SJU). CHL(VAL).

Fumaria muralis Sond. ex W.D.J. Koch

Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(VAL).

Fumaria officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, TDF, TUC). CHL(VAL). URY(MON).

Fumaria parviflora Lam.

Sin.: *Fumaria officinalis* L. var. *parviflora* (Lam.) Ewart, *Fumaria vaillantii* subsp. *parviflora* (Lam.) Corb.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

Fumaria rostellata Knaf

Hierba. Introducida.
Países: CHL(VAL).

Glaucium Mill.

Glaucium corniculatum (L.) RudolphSin.: *Chelidonium corniculatum* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COR, LPA, SLU).

Glaucium flavum CrantzSin.: *Glaucium corniculatum* (L.) Rudolphvar. *flavum* (Crantz) Kuntze

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU).

Papaver L.**Papaver dubium** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, MEN). CHL(MAG).

URY(CAS, MON).

Papaver hybridum L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, LPA). CHL(VAL,

RME).

Papaver nudicaule L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Papaver rhoeas L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, LLA, RME). URY(CAS).

Papaver somniferum L.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, NEU, RNE, TDF). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LSR, MAG, RME, JFE). URY(CAS, MON, PAY).

PASSIFLORACEAE**Passiflora** L.**Passiflora actinia** Hook.Sin.: *Passiflora paulensis* Killip

Liana. Nativa. 700-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Passiflora alata CurtisSin.: *Passiflora latifolia* DC.

Liana. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, COA).

Passiflora amethystina J.C. MikanSin.: *Passiflora bangii* Mast., *Passiflora**laminensis* Barb. Rodr., *Passiflora lilacina*Roem., *Passiflora onychina* Lindl.,*Passiflora violacea* Vell.

Liana. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, GUA, ÑEE, PHA, SPE).

Passiflora caerulea L.Sin.: *Passiflora caerulea* L. var.*angustifolia* G. Don, *Passiflora caerulea* L.var. *glauca* Mast., *Passiflora caerulea* L.var. *glaucophylla* Loudon, *Passiflora**caerulea* L. var. *imbricata* Mast.,*Passiflora caerulea* L. var. *regnellii* Mast.

Liana. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, RME). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC).

Passiflora campanulata Mast.

Enredadera. Nativa. 700-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora capsularis L.Sin.: *Passiflora hassleriana* Chodat,*Passiflora hassleriana* Chodat var.*grandifolia* Chodat & Hassl., *Passiflora**hassleriana* Chodat var. *paraguariensis*Chodat & Hassl., *Passiflora**paraguayensis* Chodat, *Passiflora piligera*

Gardner

Enredadera. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Passiflora catharinensis Sacco

Enredadera. Nativa. 1200-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora cervii Milward de Azevedo

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Passiflora chrysophylla ChodatSin.: *Passiflora australis* Chodat & Hassl.,*Passiflora chrysophylla* Chodat f. *apaensis*Chodat & Hassl., *Passiflora chrysophylla*Chodat f. *solanacea* Chodat & Hassl.,*Passiflora chrysophylla* Chodat var.*concepcionis* Chodat & Hassl., *Passiflora**chrysophylla* Chodat var. *hastata* Chodat,*Passiflora chrysophylla* Chodat var.*sericea* Chodat & Hassl., *Passiflora**foetida* L. var. *vitacea* Mast.

Liana. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON, RIV, SAO, TAC).

Passiflora cincinnata Mast.Sin.: *Passiflora cincinnata* Mast. var.*imbricata* Chodat & Hassl.

Liana. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, NAS, PAI, PHA, SPE).

Passiflora coelestis Parteka & Silvério
Liana. Endémica. 1000-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Passiflora edulis Sims

Sin.: *Passiflora pomifera* M. Roem.
Liana. Nativa. 200-700 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI).

Passiflora eichleriana Mast.

Sin.: *Passiflora violacea* Vell. f. *albiflora* Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CON).

Passiflora elegans Mast.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS, SCA). URY(SAO).

Passiflora foetida L. var. *foetida*

Sin.: *Dysosmia fluminensis* Roem., *Passiflora foetida* L. var. *balansae* Chodat, *Passiflora foetida* L. var. *fluminensis* (M. Roem.) Killip, *Passiflora foetida* L. var. *gardneri* Killip, *Passiflora foetida* L. var. *nigelliflora* (Hook.) Mast., *Passiflora foetida* L. var. *sericea* Chodat & Hassl., *Passiflora nigelliflora* Hook.
Liana. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

Passiflora gibertii N.E. Br.

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Passiflora haematostigma Mart. ex Mast.
Liana. Nativa. 400-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora lepidota Mast.

Liana. Nativa. 100-1100 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Passiflora loefgrenii Vitta

Sin.: *Passiflora amethystina* J.C. Mikan var. *bolosii* Cervi
Liana. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora longilobis Hoehne

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Passiflora mediterranea Vell.

Sin.: *Passiflora colorata* Mast., *Passiflora jilekii* Wawra
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora mendoncae Harms

Enredadera. Nativa. 700-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora miersii Mast.

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Passiflora misera Kunth

Sin.: *Passiflora laticaulis* Killip, *Passiflora maximiliana* Bory, *Passiflora maximiliana* Bory var. *acutiloba* Chodat, *Passiflora maximiliana* Bory var. *expansa* Chodat & Hassl., *Passiflora maximiliana* Bory var. *retusa* Chodat & Hassl., *Passiflora microcarpa* Mast., *Passiflora retusa* Hook., *Passiflora translinearis* Rusby
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON,

COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(SAO).

Passiflora mooreana Hook. f.

Sin.: *Passiflora tweediana* Speng., nom. nud.
Liana. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

Passiflora morifolia Mast.

Sin.: *Passiflora dumetosa* Barb. Rodr., *Passiflora erosa* Rusby, *Passiflora warmingii* Mast., *Passiflora warmingii* Mast. subsp. *chacoensis* R.E. Fr.
Liana. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI).

Passiflora oerstedii Mast.

Sin.: *Passiflora rojasii* Hassl. ex Harms
Enredadera. Nativa. 100-300 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Passiflora palmatisecta Mast.

Enredadera. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Passiflora pinnatistipula Cav.

Sin.: *Passiflora chilensis* Miers, *Tacsonia pinnatistipula* (Cav.) Juss.
Liana. Introducida. 2500-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Passiflora pohlii Mast.

Enredadera. Nativa. 100-400 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Passiflora porophylla Vell.

Sin.: *Passiflora organensis* Gardner
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Passiflora quadrangularis L.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Passiflora reitzii Sacco

Enredadera. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

Passiflora rotundifolia L.

Enredadera. Introducida. 0-300 m.

Países: PRY(CAN).

Passiflora setulosa Killip

Liana. Nativa. 800-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Passiflora suberosa L. subsp. **litoralis**

(Kunth) Port.-Utl. ex M.A.M. Azevedo, Baumgratz & Gonç.-Estev.

Sin.: *Passiflora flexuosa* Gardner, *Passiflora litoralis* Kunth

Liana. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

Passiflora tenuifolia Killip

Liana. Nativa. 200-2400 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

Passiflora transversalis Milward de Azevedo

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).

Passiflora tricuspid Mast.Sin.: *Passiflora tricuspid* Mast. var. *brevifolia* Chodat & Hassl.

Liana. Nativa. 200-400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CON, PHA, SPE).

Passiflora truncata Regel

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora tucumanensis Hook.Sin.: *Passiflora naviculata* Griseb., *Passiflora tucumanensis* Hook. var. *naviculata* (Griseb.) Hicken

Liana. Nativa. 200-2800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PAI).

Passiflora umbilicata (Griseb.) HarmsSin.: *Tacsonia umbilicata* Griseb.

Liana. Nativa. 1000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Passiflora urnifolia Rusby

Liana. Nativa. 200-2500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Passiflora urubiciensis Cervi

Enredadera. Endémica. 400-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Passiflora villosa Vell.

Enredadera. Nativa. 800-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

PENTAPHYLACACEAE

Ternstroemia Mutis ex L.f., nom. cons.**Ternstroemia asymmetrica** Rusby

Árbol. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(SAL).

Ternstroemia atlantica J.R. Grande

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ternstroemia brasiliensis Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PERACEAE

Pera Mutis**Pera glabrata** (Schott) Poepp. ex Baill.Sin.: *Pera ferruginea* (Schott) Müll. Arg., *Pera obovata* (Klotzsch) Baill., *Peridium ferrugineum* Schott, *Peridium glabratum* Schott, *Peridium oblongifolium* Benth., *Peridium obovatum* Klotzsch

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PETIVERIACEAE

Gallesia Casar.**Gallesia integrifolia** (Spreng.) HarmsSin.: *Thouinia integrifolia* Spreng.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Hillieria Vell.**Hillieria latifolia** (Lam.) H. WalterSin.: *Hillieria elastica* Vell., *Mohlana latifolia* (Lam.) Moq., *Mohlana nemoralis* Mart., *Mohlana nemoralis* Mart. var. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Rivina latifolia* Lam.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(AMA, CAN).

Petiveria L.

Petiveria alliacea L. var. **alliacea**

Sin.: *Mapa graveolens* Vell., *Petiveria alliacea* L. var. *octandra* (L.) Moq., *Petiveria corrientina* Rojas Acosta, *Petiveria octandra* L., *Petiveria paraguayensis* D. Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, SAO).

Petiveria alliacea L. var. **tetrandra** (B.A. Gomes) Hauman

Sin.: *Petiveria alliacea* L. var. *tetrandra* (B.A. Gomes) Nowicke, comb. superfl., *Petiveria hexaglochin* Fisch. & C.A. Mey., *Petiveria hexaglochin* Fisch. & C.A. Mey. var. *tetrandra* (B.A. Gomes) J.A. Schmidt, *Petiveria tetrandra* B.A. Gomes

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(COA, PAI, PHA).

Rivina L.

Rivina humilis L.

Sin.: *Rivina humilis* L. var. *glabra* L., *Rivina humilis* L. var. *laevis* (L.) Millsp., *Rivina laevis* L., *Rivina laevis* L. var. *pubescens* Griseb., *Rivina paraguayensis* D. Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR,

RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY.

Schindleria H. Walter

Schindleria densiflora (Kuntze) Monach.

Sin.: *Rivina densiflora* Kuntze

Árbol. Nativa. 200-500 m.

Países: PRY(CAN).

Seguieria Loeffl.

Seguieria americana L.

Sin.: *Albertokuntzea americana* (L.) Kuntze, *Albertokuntzea parvifolia* (Benth.) Kuntze, *Seguieria aculeata* Jacq., *Seguieria elliptica* R.E. Fr., *Seguieria floribunda* Benth. f. *alutacea* Chodat, *Seguieria guaranitica* Speg., *Seguieria guaranitica* Speg. var. *microphylla* Heimerl, *Seguieria parvifolia* Benth., *Seguieria securigera* Heimerl, *Seguieria votschii* H. Walter

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Seguieria langsdorffii Moq.

Sin.: *Albertokuntzea langsdorffii* (Moq.)

Kuntze, *Seguieria glaziovii* Briq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Seguieria paraguayensis Morong

Sin.: *Seguieria inermis* H. Walter

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(CEN, COA, PAI).

Trichostigma A. Rich.

Trichostigma octandrum (L.) H. Walter

Sin.: *Rivina americana* Raf., *Rivina dodecandra* Jacq., *Rivina ehrenbergiana* Klotzsch ex Moq., nom. nud., *Rivina humilis* L. var. *scandens* L., *Rivina moritziana* Klotzsch ex Moq., nom. nud., *Rivina mutisii* Willd. ex Schult., *Rivina octandra* L., *Rivina octandra* L. var. *obtusifolia* Moq., *Rivina scandens* Mill., *Trichostigma rivinoides* A. Rich., *Villamilla octandra* (L.) Hook. f.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

PHILESIACEAE

Lapageria Ruiz & Pav.

Lapageria rosea Ruiz & Pav.

Enredadera. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Philesia Comm. ex Juss.

Philesia magellanica J.F. Gmel.

Sin.: *Philesia buxifolia* Lam.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

PHRYMACEAE

Erythranthe Spach

Erythranthe bridgesii (Benth.) G.L. Nesom

Sin.: *Mimulus acutidens* Reiche, *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos, *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos var. *integrifolius* Clos, *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos var. *stoloniformis* Clos, *Mimulus longipes* Phil., *Mimulus parviflorus* Lindl. var. *bridgesii* Benth.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Erythranthe depressa (Phil.) G.L. Nesom var. **cimum** (C. Bohlen) J.M. Watson & A.R. Flores

Sin.: *Mimulus depressus* Phil. var. *cimum* C. Bohlen

Hierba. Endémica. 2900-3100 m.

Países: CHL(ATA).

Erythranthe depressa (Phil.) G.L. Nesom var. **depressa**

Sin.: *Mimulus acaulis* Phil., *Mimulus depressus* Phil. var. *acaulis* (Phil.) Reiche, *Mimulus depressus* Phil. var. *depressus*, *Mimulus depressus* Phil. var. *pissisi* (Phil.) Reiche, *Mimulus pissisi* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4500 m.

Países: ARG(JUU, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ).

Erythranthe glabrata (Kunth) G.L. Nesom

Sin.: *Mimulus andicola* Kunth, *Mimulus glabratus* Kunth, *Mimulus glabratus* Kunth var. *externus* (Skottsb.) Skottsb., *Mimulus glabratus* Kunth var. *parviflorus* (Lindl.) Grant, *Mimulus kingii* Phil., *Mimulus parviflorus* Lindl. var. *externus* Skottsb., *Mimulus parviflorus* Lindl. var. *nanus* Wedd., *Mimulus propinquus* Lindl., *Mimulus sylvaticus* Phil., *Mimulus tener* Phil.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Erythranthe lutea (L.) G.L. Nesom var. **lutea**

Sin.: *Erythranthe cuprea* (Dombrain) G.L. Nesom, *Erythranthe lacerata* (Pennell) G.L. Nesom, *Mimulus cupreus* Dombrain, *Mimulus glabratus* Kunth var. *micranthus* (Phil.) Boivin, *Mimulus laceratus* Pennell, *Mimulus luteus* L. f. *macrophyllus* Clos, *Mimulus luteus* L. var. *alpinus* Lindl., *Mimulus luteus* L. var. *cupreus* (Dombrain) Hook., *Mimulus luteus* L. var. *luteus*, *Mimulus luteus* L. var. *micranthus* Phil., *Mimulus luteus* L. var. *nummularius* Clos, *Mimulus luteus* L. var. *rivularis* Lindl., *Mimulus luteus* L. var. *youngianus* Hook., *Mimulus punctatus* Miers ex Bertero, *Mimulus rivularis* Lodd.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Erythranthe lutea (L.) G.L. Nesom var. **variegata** (Lodd.) G.L. Nesom

Sin.: *Erythranthe naiandina* (J.M. Watson & C. Bohlen) G.L. Nesom, *Mimulus luteus* L. var. *variegatus* (Lodd.) Hook., *Mimulus naiandinus* J.M. Watson & C. Bohlen, *Mimulus variegatus* Lodd.

Hierba. Endémica. 500-2700 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

Erythranthe minima (C. Bohlen) J.M. Watson & A.R. Flores

Sin.: *Mimulus depressus* Phil. var. *nanus* (Phil.) Reiche, *Mimulus minimus* C. Bohlen, *Mimulus nanus* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ATA).

PHYLLANTHACEAE

Cicca L.

Cicca chacoensis (Morong) R.W. Bouman

Sin.: *Aporosella chacoensis* (Morong) Pax & K. Hoffm., hom. illeg., *Aporosella chacoensis* (Morong) Speg., *Aporosella hassleriana* Chodat, *Phyllanthus chacoensis* Morong

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, CHO, CON, PHA).

Emblica Gaertn.

Emblica urinaria (L.) R.W. Bouman

Sin.: *Phyllanthus urinaria* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hieronyma Allemão

Hieronyma alchorneoides Allemão

Sin.: *Hieronyma heterotricha* Pax & K. Hoffm., *Hieronyma mattogrossensis* Pax & K. Hoffm., *Hieronyma mollis* Müll. Arg.

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Margaritaria L. f.

Margaritaria nobilis L. f.

Sin.: *Phyllanthus nobilis* (L. f.) Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, GUA, PAI, SPE).

Moeroris Raf.

Moeroris amara (Schumach. & Thonn.) R.W. Bouman
Sin.: *Phyllanthus amarus* Schumach. & Thonn.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Moeroris fraterna (G.L. Webster) R.W. Bouman
Sin.: *Phyllanthus fraternus* G.L. Webster
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Moeroris lindbergii (Müll. Arg.) R.W. Bouman
Sin.: *Phyllanthus lindbergii* Müll. Arg.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAU).

Moeroris stipulata Raf.
Sin.: *Phyllanthus stipulatus* (Raf.) G.L. Webster
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

Moeroris tenella (Roxb.) R.W. Bouman
Sin.: *Phyllanthus tenellus* Roxb.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA). URY(CAS, MON).

Phyllanthus L.

Phyllanthus acuminatus Vahl
Arbusto o árbol. Nativa. 400-1000 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL). PRY(AMA).

Notas: El registro de Miisones se basa en material observado por Radins (2025)

Phyllanthus caroliniensis Walter subsp. **caroliniensis**
Hierba o arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phyllanthus caroliniensis Walter subsp. **guianensis** (Klotzsch) G.L. Webster
Sin.: *Phyllanthus guianensis* Klotzsch, *Phyllanthus montevidensis* Müll. Arg.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Phyllanthus claussenii Müll. Arg.
Hierba. Nativa. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Phyllanthus eremitus Funez & Hassemer
Subarbusto. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(SCA).

Phyllanthus fluitans Benth. ex Müll. Arg.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SFE). PRY(ÑEE, PHA).

Phyllanthus glaziovii Müll. Arg.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Phyllanthus hyssopifolioides Kunth
Hierba o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phyllanthus lobatus Marques-Torres & M.J. Silva
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Phyllanthus niruri L.
Sin.: *Phyllanthus lathyroides* Kunth, *Phyllanthus lathyroides* Kunth f. *rosellus* Müll. Arg., *Phyllanthus microphyllus* Mart., hom. illeg., *Phyllanthus niruri* L. subsp. *lathyroides* (Kunth) G.L. Webster, *Phyllanthus rosellus* (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Phyllanthus orbiculatus Rich.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).

Phyllanthus perpusillus Baill.
Hierba. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Phyllanthus pinifolius Baill.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Phyllanthus pseudoguyanensis Herter & Mansf.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(RIV).

Phyllanthus pulcherrimus Herter ex Arechav.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(RNO).

Phyllanthus ramillosus Müll. Arg.
Sin.: *Diasperus cordobensis* Kuntze, *Phyllanthus cordobensis* (Kuntze) K. Schum.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(ROC).

Phyllanthus riedelianus Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Phyllanthus sellowianus (Klotzsch) Müll.

Arg.

Sin.: *Asterandra sellowiana* Klotzsch,*Diasperus sellowianus* (Klotzsch) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, ITA). URY(DUR, FLA, MON, PAY, ROC, SAO, SOR, TYT).

Phyllanthus submarginatus Müll. Arg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Phyllanthus timboensis Funez, J.P.R.

Ferreira & Hassemer

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(SCA).

Richeria Vahl**Richeria grandis** VahlSin.: *Richeria australis* Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Savia Willd.**Savia dictyocarpa** Müll. Arg.Sin.: *Kleinodendron riosulense* L.B. Sm. & Downs

Arbusto o árbol. Nativa. 300-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

PHYTOLACCACEAE**Anisomeria** D. Don**Anisomeria coriacea** D. DonSin.: *Anisomeria drastica* (Bertero ex Ruschenb.) Moq., *Phytolacca drastica* (Bertero ex Ruschenb.) Poepp. & Endl., *Pircunia drastica* Bertero ex Ruschenb.

Hierba. Endémica. 2000-2600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Anisomeria littoralis (Poepp. & Endl.)

Moq.

Sin.: *Anisomeria chilensis* Miers ex H. Walter, *Phytolacca chilensis* Miers, nom. nud., *Phytolacca littoralis* Poepp. & Endl.

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Ercilla A. Juss.**Ercilla spicata** (Bertero) Moq.Sin.: *Apodostachys densiflora* Turcz., *Bridgesia spicata* (Bertero) Hook. & Arn., *Ercilla volubilis* A. Juss., *Galvezia spicata* Bertero, *Phytolacca volubilis* (A. Juss.) Heimerl, *Suriana volubilis* (A. Juss.) Dombey & Cav. ex D. Don

Liana. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, LSR, RME).

Ercilla syncarpellata Nowicke

Enredadera. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(MAU, LSR, LLA, AIS).

Phytolacca L.**Phytolacca americana** L.Sin.: *Phytolacca decandra* L.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, TYT).

Phytolacca bogotensis KunthSin.: *Phytolacca australis* Phil. ex H. Walter, *Phytolacca micrantha* H. Walter, *Phytolacca parviflora* Hauman

Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(SCA). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA). PRY(APA, ITA).

Phytolacca chilensis (Miers ex Moq.) H.

Walter

Sin.: *Pircunia chilensis* Miers ex Moq.

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Phytolacca dioica L.Sin.: *Phytolacca arborea* Hort, *Phytolacca dioica* L. var. *ovatifolia* Chodat, *Phytolacca populifolia* Salisb., *Pircunia dioica* (L.) Moq., nom. illeg., *Sarcoca dioica* (L.) Raf.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI). URY(MON).

Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(SAL).

Phytolacca tetramera Hauman

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(BAI).

Phytolacca thyrsoiflora Fenzl ex J.A.

Schmidt

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, ITA).

PICRAMNIACEAE

Alvaradoa Liebm.

Alvaradoa subovata Cronquist

Sin.: *Alvaradoa amorphoides* Liebm. var. *puberulenta* Monach., *Alvaradoa puberulenta* (Monach.) Sleumer, *Alvaradoa subovata* Cronquist var. *puberulenta* (Monach.) Cronquist, *Alvaradoa subovata* Cronquist var. *typica* Cronquist, nom. illeg.

Arbolito. Nativa. 1000-1600 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Picramnia Sw.

Picramnia excelsa Kuhl. ex Pirani

Arbolito o árbol. Endémica. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Picramnia parvifolia Engl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, PAI).

Picramnia ramiflora Planch.

Sin.: *Picramnia camboita* Engl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Picramnia sellowii Planch.

Sin.: *Picramnia pendula* Tul., *Picramnia sellowii* Planch. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Picramnia sellowii* Planch. f. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Picramnia sellowii* Planch. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Picramnia sellowii* Planch. var. *latifolia* Engl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

PICRODENDRACEAE

Parodiodendron Hunz.

Parodiodendron marginivillosum

(Speg.) Hunz.

Sin.: *Phyllanthus marginivillosus* Speg.

Hierba o arbusto. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

PIPERACEAE

Manekia Trel.

Manekia obtusa (Miq.) T. Arias, Callejas & Bornst.

Sin.: *Artanthe ampla* (Kunth) Miq., *Artanthe obtusa* Miq., *Piper amplum* Kunth, *Piper fluminense* Raddi., *Piper lindbergii* C. DC., *Sarcorhachis obtusa* (Miq.) Trel., *Sarcorhachis obtusa* (Miq.) Trel. var. *cordata* Yunck., *Sarcorhachis schwackei* Yunck., *Steffensia ampla* Kunth

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia Ruiz & Pav.

Peperomia aceroana C. DC.

Sin.: *Peperomia malmeana* Dahlst., *Peperomia pseudoreflexa* C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). PRY(APY, ÑEE, PHA).

Peperomia alata Ruiz & Pav.

Sin.: *Peperomia alata* Ruiz & Pav. var. *angustifolia* C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Peperomia aldrinii Villa

Hierba. Endémica. 400-500 m.

Países: ARG(SAL).

Peperomia arifolia Miq.

Sin.: *Peperomia arifolia* Miq. var. *epeltata* C. DC., *Peperomia arifolioides* Yunck., *Peperomia misionensis* Yunck.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Peperomia armondii Yunck.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia armstrongii Villa

Hierba. Nativa. 1000-2400 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Peperomia augescens Miq.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia balansana C. DC.

Hierba suculenta. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, GUA).

Peperomia barbarana C. DC.

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, MIE).

Peperomia bernhardiana C. DC.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia berteriana Miq.

Sin.: *Peperomia berteriana* Miq. subsp. *tristanensis* (Christoph.) Valdeb., *Peperomia tristanensis* Christoph.
 Hierba. Endémica. 0-600 m.
 Países: CHL(JFE).

Peperomia blanda (Jacq.) Kunth

Sin.: *Micropiper langsdorffii* Miq., *Peperomia blanda* (Jacq.) Kunth var. *langsdorffii* (Miq.) Henschen, *Peperomia langsdorffii* (Miq.) Miq., *Piper blandum* Jacq.

Hierba epífita o terrestre. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia brasiliensis (Miq.) Miq.

Sin.: *Verhuelia brasiliensis* Miq.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia calophylla Yunck.

Hierba suculenta. Endémica. 100-300 m.
 Países: BRA(PAR).

Peperomia campinasana C. DC.

Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Peperomia castelosensis Yunck.

Hierba. Nativa. 1000-1400 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia catharinae Miq.

Sin.: *Peperomia herteri* Trel., *Peperomia sellowiana* Miq., *Peperomia uruguayana* Trel.
 Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, ROC, TYT).

Peperomia circinnata Link var. **circinnata**

Sin.: *Peperomia cyclophylla* Miq. var. *parvifolia* C. DC., *Piper circinnatum* (Link) Schult., *Piper circulare* Desf. ex C. DC.
 Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA).

Peperomia circinnata Link var. **orbicularis** (C. DC.) Yunck.

Sin.: *Peperomia orbicularis* C. DC.
 Hierba epífita. Nativa. 1200 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Peperomia clivicola Yunck.

Hierba. Nativa. 500-600 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia collinsii Villa

Hierba epífita. Nativa. 1000-2000 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Peperomia comarapana C. DC.

Sin.: *Peperomia comarapana* C. DC. f. *pubescens* Yunck.
 Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, SFE). PRY(APY, BOQ). URY(ART, PAY, RNO).

Peperomia coquimbensis Skottsb.

Hierba epífita. Endémica. 500 m.
 Países: CHL(COQ).

Peperomia corcovadensis Gardner f. **corcovadensis**

Sin.: *Peperomia corcovadensis* Gardner f. *latifolia* Yunck., *Peperomia blumenauana* C. DC.
 Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia corcovadensis Gardner f. **longifolia** (Dahlst.) Yunck.

Sin.: *Peperomia distans* Miq. f. *longifolia* Dahlst.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia cordigera Dahlst.

Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Peperomia crinicaulis C. DC.

Hierba. Nativa. 700-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Peperomia crystallina Ruiz & Pav.

Sin.: *Peperomia fortunati* Trel., *Peperomia mandonii* C. DC., *Peperomia mandonii* C. DC. var. *excelsis* C. DC., *Peperomia nonhispidula* Trel., *Peperomia umbelliformis* C. DC., *Piper crystallinum* (Ruiz & Pav.) Vahl
 Hierba. Nativa. 0-3200 m.
 Países: ARG(JUU, TUC). BRA(RGS, SCA).

Peperomia dahlstedtii C. DC.

Hierba. Nativa. 500-1200 m.
 Países: BRA(PAR).

Peperomia delicatula Henschen

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia diaphanoides Dahlst.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Peperomia divaricata Yunck.

Hierba. Nativa.
 Países: BRA(SCA).

Peperomia doellii Phil.

Hierba suculenta. Endémica. 0-700 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Peperomia duartei Yunk.
Hierba. Nativa. 500-600 m.
Países: BRA(PAR).

Peperomia emarginella (Sw.) C. DC.
Sin.: *Piper emarginellum* Sw. ex Wikstr.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Peperomia fernandeziana Miq.
Sin.: *Peperomia chilensis* C. DC.,
Peperomia fernandeziana Miq. f.
oblongifolia Skottsbo.
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LSR, LLA, JFE).

Peperomia galioides Kunth
Sin.: *Piper galioides* (Kunth) Poir.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. var. **glabella**
Sin.: *Peperomia caulibarbis* Miq., *Piper glabellum* Sw.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. var. **nervulosa** (C. DC.) Yunk.
Sin.: *Peperomia melanostigma* Miq. var. *nervulosa* C. DC.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. var. **nigropunctata** (Miq.) Dahlst.
Sin.: *Peperomia nigropunctata* Miq.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(SCA).

Peperomia glazioui C. DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia gracilicaulis Yunk.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia gracilis Dahlst.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Peperomia hadrostachya Yunk.
Hierba. Nativa. 1200-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Peperomia hernandiifolia (Vahl) A. Dietr.
Sin.: *Piper hernandiifolium* Vahl
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Peperomia hilariana Miq.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia hispidula (Sw.) A. Dietr. var. **hispidula**
Sin.: *Piper hispidulum* Sw.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(TAC).

Peperomia hispidula (Sw.) A. Dietr. var. **sellowiana** (Miq.) Dahlst.
Sin.: *Acrocarpidium sellowianum* Miq.
Hierba. Nativa. 400-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TAC).
Notas: Citada para Paraguay (Keller & Tressens, 2005) sin indicar localidad o material de referencia.

Peperomia hispiduliformis Trel.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Peperomia hydrocotylodes Miq.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Peperomia ibiramana Yunk.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia inaequalilimba C. DC.
Hierba. Endémica. 800-2500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Peperomia increscens Miq.
Sin.: *Peperomia blanda* (Jacq.) Kunth var. *pseudodindygulensis* (C. DC.) Yunk.,
Peperomia pseudodindygulensis C. DC.,
Peperomia radicans C. DC., *Peperomia rojasii* C. DC., *Peperomia saxigaudens* C. DC.
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, COA, GUA, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, PAY, RIV, ROC, TAC).

Peperomia lorentzii C. DC. ex Kuntze
Hierba epífita. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Peperomia loxensis Kunth
Sin.: *Piper loxense* (Kunth) Poir.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Peperomia lyman-smithii Yunk. var. **lyman-smithii**
Hierba. Nativa. 400-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Peperomia lyman-smithii Yunk. var. **macrophylla** Yunk.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Peperomia macrostachyos (Vahl) A. Dietr.

Sin.: *Peperomia elongata* Kunth, *Peperomia rupestris* Kunth, *Peperomia rupestris* Kunth var. *cordifolia* Wawra, *Piper macrostachyon* Vahl, *Piper rupestre* Poir.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A. Dietr.

Sin.: *Piper magnoliifolium* Jacq.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Peperomia mandioccana Miq.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia margaritifera Bertero ex Hook.

Sin.: *Peperomia margaritifera* Bertero ex Hook. var. *umbraticola* Skotts. ex Yunck.

Hierba. Endémica. 200-400 m.

Países: CHL(JFE).

Peperomia martiana Miq.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Peperomia megapotamica Dahlst.

Hierba. Nativa. 400-700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Peperomia morungavana Yunck.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Peperomia nitida Dahlst., nom. cons.

Hierba. Nativa. 500-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA).

Peperomia nudifolia C. DC.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia nummularioides Griseb.

Sin.: *Peperomia australis* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, LSR, LLA, AIS).

Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr.

Sin.: *Peperomia cuneata* Miq., *Peperomia obtusifolia* (L.) A. Dietr. var. *cuneata* (Miq.) Griseb., *Piper obtusifolium* L.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia parvifolia C. DC.

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Peperomia pellucida (L.) Kunth var. **argentina** Yunck.

Hierba suculenta. Endémica. 500-700 m.

Países: ARG(SAL).

Peperomia pellucida (L.) Kunth var. **pellucida**

Sin.: *Piper pellucidum* L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA).

Peperomia pereskiifolia (Jacq.) Kunth

Sin.: *Piper pereskiifolium* Jacq.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(MAL, ROC).

Peperomia perlongicaulis Yunck.

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Peperomia peruviana Dahlst.

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Peperomia pilicaulis C. DC.

Sin.: *Peperomia ouabianae* C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia pseudobcordata Yunck.

Hierba epífita. Endémica. 1600-1700 m.

Países: BRA(SCA).

Peperomia pseudoestrellensis C. DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia psilostachya C. DC. var. **angustifolia** C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Peperomia psilostachya C. DC. var. **psilostachya**

Sin.: *Peperomia trapezoidalis* Yunck.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN, GUA, PAI). URY(CLA, RIV).

Peperomia punicea Dahlst.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Peperomia quadrifolia (L.) Kunth

Sin.: *Piper quadrifolium* L.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia ramboi Yunck.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia renifolia Dahlst.

Sin.: *Peperomia ulei* C. DC.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia retivenulosa Yunck.

Hierba. Endémica. 700 m.

- Países: BRA(PAR).
- Peperomia rhombea** Ruiz & Pav.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Peperomia rizzinii** Yunk.
Hierba. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Peperomia rotundifolia** (L.) Kunth
Sin.: *Acrocarpidium nummularifolia* Miq.
var. *obcordata* Miq., *Acrocarpidium rotundifolium* (L.) Miq., *Peperomia rotundifolia* (L.) Kunth f. *obcordata* (Miq.) Dahlst., *Piper rotundifolium* L.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).
- Peperomia rubricaulis** (Nees) A. Dietr.
var. *parvifolia* Yunk.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia rubricaulis** (Nees) A. Dietr.
var. *rubricaulis*
Sin.: *Peperomia pereirae* Yunk., *Piper rubricaulis* Nees
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).
- Peperomia santaelisae** C. DC.
Sin.: *Peperomia lilloi* C. DC., *Peperomia sanpedritoi* Trel., *Peperomia stuckertii* C. DC.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(PHA).
- Peperomia schenkiana** Dahlst.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).
- Peperomia schwackei** C. DC.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia skottsbergii** C. DC.
Hierba. Nativa. 100-600 m.
Países: CHL(JFE).
- Peperomia stroemfeltii** Dahlst.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia submarginata** Yunk.
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia subretusa** Yunk.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Peperomia subrubripica** C. DC.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Peperomia tenella** (Sw.) A. Dietr.
Sin.: *Acrocarpidium tenellum* (Sw.) Miq., *Peperomia tenella* (Sw.) A. Dietr. var. *glabra* C. DC., *Piper tenellum* Sw.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia tetragona** Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Peperomia tetraphylla** Hook. & Arn. var. *americana* (Dahlst.) Yunk.
Sin.: *Peperomia americana* (Miq.) Herter, *Peperomia reflexa* Kunth f. *americana* Miq., *Peperomia reflexa* Kunth var. *americana* Dahlst.
Hierba epífita. Nativa. 200-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Peperomia tetraphylla** Hook. & Arn. var. *tenera* (Miq.) Yunk.
- Sin.: *Peperomia reflexa* Kunth var. *tenera* Miq.
Hierba epífita. Nativa. 500-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Peperomia tetraphylla** Hook. & Arn. var. *tetraphylla*
Sin.: *Peperomia arechavaletae* C. DC. var. *minor* Herter, *Peperomia berroi* Trel., *Peperomia reflexa* (L. f.) A. Dietr., hom. illeg. f. *argentina* C. DC., *Peperomia reflexa* (L. f.) A. Dietr., hom. illeg. f. *robustior* C. DC., *Peperomia reflexa* (L. f.) A. Dietr., nom. illeg., *Peperomia tacuariana* Trel., *Peperomia tetraphylla* Hook. & Arn. f. *protractifolia* Yunk., *Piper reflexum* L. f., *Piper tetraphyllum* G. Forst.
Hierba epífita. Nativa. 600-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA). URY(CLA, MAL, RIV, ROC, TYT).
- Peperomia tetraphylla** Hook. & Arn. var. *valantoides* (Miq.) Yunk.
Sin.: *Peperomia reflexa* Kunth var. *valantoides* (Miq.) C. DC., *Peperomia valantoides* Miq.
Hierba epífita. Nativa. 700 m.
Países: BRA(SCA).
- Peperomia theodori** Trel.
Sin.: *Peperomia reflexa* (L. f.) A. Dietr., hom. illeg. f. *longilimba* C. DC.
Hierba epífita. Nativa. 300-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Peperomia tominana** C. DC.
Sin.: *Peperomia fiebrigii* C. DC., *Peperomia fiebrigii* C. DC. f. *glabrata* Yunk., *Peperomia tominana* C. DC. f. *pubifolia* Yunk.
Hierba epífita. Nativa. 700-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Peperomia transparens** Miq.
Hierba suculenta. Nativa.

- Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Peperomia trichocarpa** Miq.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Peperomia trinervis** Ruiz & Pav. var. **minor** C. DC.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(RGS).
- Peperomia trinervis** Ruiz & Pav. var. **trinervis**
Hierba. Nativa.
Países: BRA(RGS).
- Peperomia trineura** Miq.
Hierba. Nativa. 600-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Peperomia trineuroides** Dahlst.
Sin.: *Peperomia arechavaletae* C. DC.
var. *arechavaletae*
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(CLA, RIV, ROC, TAC, TYT).
- Peperomia urocarpa** Fisch. & C.A. Mey.
Sin.: *Acrocarpidium urocarpum* (Fisch. & C.A. Mey) Miq., *Peperomia subpubistachya* Yunck.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, MIE).
- Peperomia velloziana** Miq.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Piper** L.
- Piper abutiloides** Kunth
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Piper aduncum** L.
Sin.: *Artanthe adunca* (L.) Miq., *Artanthe elongata* (Vahl) Miq., *Piper aduncum* L. var. *cordulatum* (C. DC.) Yunck., *Piper angustifolium* Lam., *Piper angustifolium* Ruiz & Pav., hom. illeg., *Piper angustifolium* Ruiz & Pav., nom. illeg. var. *cordulatum* C. DC., *Piper cardenasii* Trel., *Piper elongatum* Vahl, *Piper elongatum* Vahl var. *cordulatum* (C. DC.) C. DC., *Piper guanaianum* C. DC., *Steffensia adunca* (L.) Kunth, *Steffensia elongata* (Vahl) Kunth
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Notas: Citado para Uruguay (Ruschel & Waechter, 2004) sin indicar localidad o material de referencia.
- Piper aequale** Vahl
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Piper alnoides** Kunth
Sin.: *Artanthe alnoides* (Kunth) Miq., *Steffensia alnoides* Kunth
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Piper amalago** L.
Sin.: *Artanthe plantaginea* (Lam.) Miq., *Enckea plantaginea* (Lam.) Kunth, *Enckea sieberi* Miq., *Piper amalago* L. var. *medium* (Jacq.) Yunck., *Piper henshenii* C. DC., *Piper plantagineum* Lam., *Piper reticulatum* Vell., hom. illeg., *Piper saurooides* Desv. ex Ham., *Piper sieberi* (Miq.) C. DC., *Piper syringaefolium* Balb. ex Kunth
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).
- Piper arboreum** Aubl. var. **arboreum**
Sin.: *Piper geniculatum* Sw.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA).
- Piper arboreum** Aubl. var. **falcifolium** (Trel.) Yunck.
Sin.: *Piper falcifolium* Trel.
Arbusto o arbolito. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Piper arboreum** Aubl. var. **hirtellum** Yunck.
Sin.: *Piper arboreum* Aubl. var. *latifolium* (C. DC.) Yunck., *Piper geniculatum* Sw. var. *latifolium* C. DC.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Piper asperilimum** C. DC.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).
- Piper bradei** Yunck.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Piper caldasianum** (Miq.) Yunck.
Sin.: *Artanthe caldasiana* Miq.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Piper caldense** C. DC.
Sin.: *Piper pardinum* C. DC., *Piper pseudolanceolatum* C. DC.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Piper callosum** Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Piper cernuum** Vell.
Sin.: *Artanthe richardiifolia* (Kunth) Miq., *Piper cernuum* Vell. var. *biformipilum*

Yunck., *Piper cernuum* Vell. var. *glabricaule* Yunck., *Piper richardiifolium* Kunth, *Steffensia richardiifolia* Kunth
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piper clausenianum (Miq.) C.DC.
Sin.: *Artanthe clauseniana* Miq.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Piper corcovadensis (Miq.) C. DC. var. **corcovadensis**
Sin.: *Ottonia corcovadensis* Miq., *Ottonia propinqua* Kunth f. *propinqua*, *Piper grazielae* M. Carv.-Silva & E.F. Guim.
Arbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piper corcovadensis (Miq.) C. DC. var. **longiracemosum** (Yunck.) E.F. Guim. & M. Carvalho-Silva
Sin.: *Ottonia propinqua* Kunth f. *longiracemosa* Yunck.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Piper crassinervium Kunth
Sin.: *Artanthe exserens* Miq., *Peltobryon exserens* (Miq.) Miq., *Piper exserens* (Miq.) C. DC., *Steffensia crassinervia* (Kunth) Kunth
Arbusto. Nativa. 0 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piper dilatatum Rich.
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA).

Piper diospyrifolium Kunth
Sin.: *Artanthe diospyrifolia* (Kunth) Miq., *Steffensia diospyrifolia* (Kunth) Kunth
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piper duartei E.F. Guim. & M. Carvalho-Silva
Sin.: *Ottonia villosa* Yunck.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Piper flavicans C. DC.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Piper forzzae G.A. Queiroz & E.F. Guim.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Piper fuligineum Kunth
Sin.: *Artanthe amplexans* Miq., *Piper amplexans* (Miq.) C. DC.
Arbusto. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Piper gaudichaudianum Kunth
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piper glabratum Kunth
Sin.: *Artanthe glabrata* (Kunth) Miq., *Steffensia glabrata* Kunth
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Piper hassleri C. DC.
Arbolito. Endémica.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Piper hatschbachii Yunck.
Arbusto. Endémica. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Piper hemmendorffii C. DC.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Piper hieronymi C. DC.
Sin.: *Piper argentinum* (C. DC.) Trel., *Piper gaudichaudianum* Kunth f. *argentinum* C. DC., *Piper*

gaudichaudianum Kunth var. *argentinum* C. DC., *Piper hieronymi* C. DC. var. *glabrum* C. DC. ex Kuntze, *Piper venturii* Trel., *Piper venturii* Trel. var. *yesoanum* Trel.
Arbusto o arbolito. Nativa. 400-2000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC).

Piper hispidum Sw.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAA, CAN).

Piper hoffmannseggianum Roem. & Schult.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Piper jaramilloae G.A. Queiroz & E.F. Guim.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piper kleinii Yunck.
Arbusto. Endémica. 900-1100 m.
Países: BRA(SCA).

Piper laevigatum Kunth
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(PAI).

Piper lanceolatum Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Piper lepturum (Kunth) DC.
Sin.: *Artanthe leptura* (Kunth) Miq., *Artanthe lucaeana* (Kunth) Miq., *Piper lucaeana* Kunth, *Schilleria leptura* Kunth, *Schilleria lucaeana* Kunth
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piper lhotzkyanum Kunth

Sin.: *Artanthe lhotzkyana* (Kunth) Miq.,
Steffensia lhotzkyana (Kunth) Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper macedoi Yunc.

Arbusto o arbolito. Nativa. 700-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper malacophyllum (C. Presl) C. DC.

Sin.: *Artanthe malacophylla* C. Presl

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN).

Piper mapireense C. DC.

Sin.: *Piper mapireense* C. DC. var.
magnifolium C. DC., *Piper rectispicum*
Trel., *Piper sanctae-crucis* C. DC. ex
Kuntze

Arbusto. Nativa. 300-800 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
PRY(CAU, CAN).

Piper marginatum Jacq.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Piper mikanianum (Kunth) Steud. var.
mikanianum

Sin.: *Artanthe mikaniana* (Kunth) Miq.,
Piper debile C. DC., *Piper mikanianum*
(Kunth) Steud. f. *clausum* Yunc., *Piper*
misionesanum C. DC., *Piper parthenium*
Mart. ex C. DC., *Piper parthenium* Mart.
ex C. DC. var. *pilosius* C. DC., *Schilleria*
mikaniana Kunth

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAA, GUA). URY(TAC).

Piper mikanianum (Kunth) Steud. var.
pilosius C. DC.

Arbusto. Nativa.

Países: PRY(APA, GUA).

Piper miquelianum C. DC.

Sin.: *Ottonia apodostachya* Trel., *Ottonia*
cordulatifolia Trel., nom. illeg. var.
cordulatifolia, *Ottonia cordulatifolia* Trel.
var. *hirtella* (C. DC.) Trel., *Ottonia dusenii*
Trel., *Ottonia dusenii* Trel. var.
heterophylla Trel., *Ottonia dusenii* Trel.
var. *variifolia* Trel., *Ottonia martiana* Miq.,
Ottonia martiana Miq. var. *latifolia* Yunc.,
Ottonia muelleri Trel., *Ottonia palhosana*
Trel., *Ottonia schwackeae* Trel., *Piper*
ovatum Vahl var. *hirtellum* C. DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAU, CAN).

Piper mollicomum Kunth

Sin.: *Artanthe mollicoma* (Kunth) Miq.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN).

Piper mosenii C. DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper ottonoides Yunc.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Piper ovatum Vahl

Sin.: *Ottonia frutescens* (C. DC.) Trel.,
Piper boucheanum C. DC., *Piper*
frutescens C. DC.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper peltatum L.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Piper permucronatum Yunc.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Piper regnellii (Miq.) C. DC.

Sin.: *Artanthe regnellii* Miq., *Piper*
fulvescens C. DC., *Piper fulvescens* C.
DC. var. *subglabrum* C. DC., *Piper*
pallidescens C. DC., *Piper regnellii* (Miq.) C.
DC. var. *pallidescens* (C. DC.) Yunc.

Hierba o arbusto. Nativa. 100-200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA,
MIE, PAI, SPE).

Piper reitzii Yunc.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper rivinoides Kunth f. **magnifolium**
Yunc.

Arbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: BRA(SCA).

Piper rivinoides Kunth f. **rivinoides**

Sin.: *Artanthe rivinoides* (Kunth) Miq.,
Schilleria rivinoides Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper solmsianum C. DC. var.
hilarianum (Kunth) Yunc.

Sin.: *Artanthe hilariana* (Kunth) Miq., *Piper*
hilarianum (Kunth) C. DC., *Schilleria*
hilariana Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper solmsianum C. DC. var.
solmsianum

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piper subcinereum C. DC.

Sin.: *Piper piritubanum* Yunc.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piper tuberculatum Jacq.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Piper tucumanum C. DC.

Sin.: *Piper lorentzii* Trel.

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-1400 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Piper ulei C. DC.

Arbusto. Nativa. 200-300 m.

Países: BRA(SCA).

Piper umbellatum L.

Sin.: *Pothomorphe umbellata* (L.) Miq.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piper vicosanum Yunk.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Piper viminifolium Trel.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper xylostioides (Kunth) Steud.

Sin.: *Artanthe xylostioides* (Kunth) Miq.,
Piper pabstii C. DC., *Schilleria xylostioides*
Kunth

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PITTOSPORACEAE

Pittosporum Banks ex Gaertn., nom.
et typ. cons.

Pittosporum crassifolium Banks & Sol.
ex A. Cunn.

Arbusto o arbolito. Introducida.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, JFE).

Pittosporum undulatum Vent.

Arbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(VAL).

PLANTAGINACEAE

Angelonia Bonpl.

Angelonia integerrima Spreng.

Sin.: *Angelonia hassleriana* Chodat

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA,
GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART,
CLA, CLA, RNO, RIV, SJO, TAC).

Angelonia perennis (Chodat & Hassler)

Scatigna & V.C. Souza

Sin.: *Angelonia micrantha* Benth. var.
perennis Chodat & Hassl., *Monopera*
perennis (Chodat & Hassl.) Barringer

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: PRY(CON).

Angelonia salicariifolia Bonpl.

Sin.: *Angelonia evitae* Descole & Borsini,
Angelonia gardneri Hook., *Angelonia hirta*
Cham.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, MIS, SFE). PRY(APY, AMA, CEN,
COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Antirrhinum L.

Antirrhinum majus L.

Hierba o arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI).
URY(MON).

Bacopa Aubl., nom. cons.

Bacopa australis V.C. Souza

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(COA, SPE).

Bacopa axillaris (Benth.) Standl.

Sin.: *Herpestis axillaris* Benth., *Moniera*
axillaris Kuntze

Hierba acuática. Nativa.

Países: PRY(AMA, COA).

Bacopa congesta Chodat & Hassl.

Sin.: *Bacopa congesta* Chodat & Hassl.
var. *hirsuta* Hassl., *Bacopa hirsuta*
(Hassl.) Descole & Borsini, *Bacopa*
paraguariensis (S. Moore) Hassl. subsp.
congesta (Chodat & Hassl.) Hassl.,
Bacopa paraguariensis (S. Moore) Hassl.
var. *hirsuta* (Hassl.) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA,
ITA, PAI, SPE).

Bacopa dubia Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).
PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE,
ÑEE, PAI).

Bacopa gratioloides (Cham.) Edwall

Sin.: *Caconapea gratioloides* Cham.,
Herpestis caconapea (Cham.) Steud.,
nom. illeg. superfl., *Herpestis gratioloides*
(Cham.) Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Bacopa lanigera (Cham. & Schltdl.)
Wettst.

Sin.: *Herpestis lanigera* Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 600-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Bacopa monnieri (L.) Wettst.

Sin.: *Bacopa monnieri* (L.) Pennell, *Bramia indica* Lam., *Bramia monnieri* (L.) Drake, *Bramia monnieri* (L.) Pennell, *Capraria monnieri* (L.) Roxb., *Gratiola monnieri* (L.) L., *Herpestis monnieri* (L.) Kunth, *Lysimachia monnieri* L.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU). PRY(CAA, CEN, COA, ÑEE, PHA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).

Bacopa monnierioides (Cham.) B.L. Rob.

Sin.: *Bacopa conferta* (Pennell) Standl., *Bacopa parviflora* Standl., *Bacopa ranaria* (Benth.) Chodat & Hassl., *Bacopa ranaria* (Benth.) Chodat & Hassl. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Caconapea appressa* Pennell, *Caconapea conferta* Pennell, *Herpestis ranaria* Benth., nom. superfl., *Monniera monnierioides* (Cham.) Kuntze, *Monniera ranaria* Fritsch, *Ranaria monnierioides* Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(COA, GUA, SPE).

Bacopa myriophylloides (Benth.) Wettst.

Sin.: *Herpestis myriophylloides* Benth., *Monniera myriophylloides* (Benth.) Kuntze, *Naiadothrix myriophylloides* (Benth.) Pennell

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Bacopa paraguariensis (S. Moore) Hassl.

Sin.: *Herpestis paraguariensis* S. Moore

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). PRY(CAU, GUA).

Bacopa repens (Sw.) Wedd.

Sin.: *Bacopa cladostyla* Chodat ex Eskuche, *Bacopa limosa* (Pennell) Standl., *Gratiola repens* Sw., *Herpestis repens* (Sw.) Schltld. & Cham., *Macuillamia limosa* Pennell, *Macuillamia repens* (Sw.) Pennell

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, SFE). PRY(CEN, ITA, PHA).

Bacopa rotundifolia (Michx.) Wettst.

Sin.: *Bacopa nobisiana* H. Rainer, *Bacopa simulans* Fernald, *Bacopa tweediei* (Benth.) Parodi, *Herpestis rotundifolia* (Michx.) Pursh, *Herpestis tweediei* Benth., *Macuillamia rotundifolia* (Michx.) Raf., *Monniera rotundifolia* Michx., *Monniera tweediei* (Benth.) Kuntze, *Ranapalus rotundifolius* (Michx.) Pennell

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, SAL, SFE). PRY(CAA, CEN, CON, PAI, PHA).

Bacopa salzmännii (Benth.) Wettst. ex Edwall

Sin.: *Bacopa humilis* (Pennell) Standl., *Bacopa lilacina* (Pennell) Standl., *Bacopa violacea* (Pennell) Standl., *Herpestis salzmännii* Benth., *Monocardia humilis* Pennell, *Monocardia lilacina* Pennell, *Monocardia violacea* Pennell

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Bacopa scabra (Benth.) Descole & Borsini var. **laxiflora** (Benth.) V.C. Souza

Sin.: *Bacopa auriculata* (B.L. Rob.) GreeNM., *Bacopa laxiflora* (Benth.)

Wettst. ex Edwall, *Caconapea auriculata* (B.L. Rob.) Pennell, *Herpestis auriculata* B.L. Rob., *Herpestis laxiflora* Benth., *Herpestis parvula* S. Moore, *Mella laxiflora* (Benth.) Pennell

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CON, GUA, ÑEE).

Bacopa scabra (Benth.) Descole & Borsini var. **scabra**

Sin.: *Bacopa hassleriana* Chodat, *Bacopa rojasii* Hassl., nom. nud., *Herpestis scabra* Benth., *Monniera scabra* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, SPE).

Bacopa scoparioides (Cham. & Schltld.) Scatigna

Sin.: *Conobea scoparioides* (Cham. & Schltld.) Benth., *Sphaerotheca scoparioides* Cham. & Schltld.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Bacopa serpyllifolia (Benth.) Pennell

Sin.: *Bacopa ciliata* (Pennell) Pennell, *Bacopa lanigera* (Cham. & Schltld.) Wettst. var. *serpyllifolia* (Benth.) Edwall, *Herpestis ciliata* Pennell, *Herpestis lanigera* Cham. & Schltld. var. *serpyllifolia* (Benth.) J.A. Schmidt, *Herpestis serpyllifolia* Benth.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA, SPE).

Bacopa stricta (Schr.) Edwall

Sin.: *Bacopa domingensis* (Spreng.) Pennell, *Bacopa elongata* (Benth.) Pennell, *Bacopa monosticta* (Schltld.) Pennell, *Bacopa stricta* (Schr.) B.L. Rob., nom. illeg., *Herpestis diffusa* J.A. Schmidt, *Herpestis domingensis* Spreng.,

Herpestis elongata Benth., *Herpestis monosticta* Schtdl., *Herpestis polyantha* Benth., *Herpestis stricta* Schrad., *Moniera stricta* (Schrad.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, COA).

Bacopa verticillata (Pennell & Gleason) Pennell

Sin.: *Bacopa pedersenii* Rossow,

Caconapea verticillata Pennell & Gleason

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(SPE).

Basistemom Turcz.

Basistemom spinosus (Chodat) Moldenke

Sin.: *Basistemom violaceum* (Herzog) Baehni & J.F. Macbr., *Hassleropsis spinosa* Chodat, *Saccanthus violaceus* Herzog

Arbusto. Nativa. 700-1500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

Callitriche L.

Callitriche albomarginata Fassett

Hierba. Endémica. 2700 m.

Países: CHL(RME).

Callitriche antarctica Engelm. ex Hegelm.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

Callitriche berteriana (Hegelm.) Lansdown & Hassemer

Sin.: *Callitriche berteriana* Steud., *Callitriche lechleri* (Hegelm.) Fassett var.

berteroana (Hegelm.) Fassett, *Callitriche marginata* Torr. var. *berteroana* Hegelm.

Hierba. Endémica. 1200-1300 m.

Países: CHL(VAL, ARA).

Callitriche ciliata Lansdown & Hassemer

Hierba. Nativa. 3900-5000 m.

Países: ARG(SCR).

Callitriche concinna Lansdown & Hassemer

Hierba. Endémica.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI). CHL(MAG).

Callitriche deflexa A. Braun ex Hegelm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA). PRY(CEN). URY(MON).

Callitriche heterophylla Pursh

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI, JUJ, RNE, SCR). BRA(RGS). CHL(BIO, ARA, LLA, MAG). URY(DUR).

Callitriche heteropoda Engelm. ex Hegelm.

Hierba acuática. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(COR, TUC).

Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett

Sin.: *Callitriche marginata* Torr. var. *lechleri* Hegelm.

Hierba acuática. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(LAV).

Callitriche oblongicarpa Fassett

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). URY(LAV).

Callitriche praetermissa Lansdown & Hassemer

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAG).

Callitriche rimosa Fassett

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE). URY(CAS, FLA, MON, ROC).

Callitriche stagnalis Scop.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(TDF). CHL(BIO).

Callitriche terrestris Raf.

Sin.: *Callitriche austinii* Engelm., *Callitriche deflexa* A. Braun ex Hegelm. var. *austinii* (Engelm.) Hegelm., *Callitriche deflexa* A. Braun ex Hegelm. var. *subsessilis* Fassett, *Callitriche terrestris* Raf. subsp. *subsessilis* (Fassett) Bacigalupo, *Callitriche verna* L. var. *terrestris* (Raf.) Shinnars

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(SCA). PRY(CEN, GUA, PAI, SPE).

Callitriche truncata Guss.

Hierba acuática. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS, NEU, SCR). CHL(ARA, MAG).

Callitriche turfosa Bertero emend. Hegelm.

Sin.: *Callitriche deflexa* A. Braun ex Hegelm. var. *phaerocarpa* Hegelm., *Callitriche terrestris* Raf. subsp. *turfosa* (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(ANT, VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Cymbalaria Hill

Cymbalaria muralis C.F. Gaertn., G. Mey. & Scherb.

Sin.: *Antirrhinum cymbalaria* L., *Linaria cymbalaria* (L.) Mill.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, MEN, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, RME, JFE). URY(CAS, MON, RNO).

Darcya B.L. Turner & C.P. Cowan

Darcya vandellioides (Benth.) Scatigna

Sin.: *Conobea vandellioides* Benth., *Lindernia vandellioides* (Benth.) Pennell ex G.M. Barroso, *Stemodia vandellioides* (Benth.) V.C. Souza

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Digitalis L.

Digitalis purpurea L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, NEU, RNE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE). URY(ROC).

Fonkia Phil.

Fonkia uliginosa Phil.

Sin.: *Braunblanquetia littoralis* Eskuche, *Gratiola peruviana* L. var. *uliginosa* (Phil.) Reiche, *Gratiola uliginosa* (Phil.) F. Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LSR, LLA).

Geochorda Cham. & Schltdl.

Geochorda glechomoides (Spreng.) Kuntze

Sin.: *Conobea glechomoides* (Spreng.) V.C. Souza, *Geochorda cuneata* Cham. & Schltdl., nom. illeg., *Herpestis glechomoides* Spreng.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR). URY(FLO, PAY, SAO, SJO, TAC).

Gratiola L.

Gratiola peruviana L.

Sin.: *Gratiola bogotensis* Cortés

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, NEU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA). PRY(PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).

Hippuris L.

Hippuris vulgaris L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, SCR, TDF). CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

Kickxia Dumort.

Kickxia elatine (L.) Dumort.

Sin.: *Antirrhinum elatine* L., *Elatinoides elatine* (L.) Wettst., *Linaria elatine* (L.) Mill.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(ERI). CHL(BIO, ARA, RME, JFE). URY(CAS, MON, PAY, SJO, TAC).

Limosella L.

Limosella australis R. Br.

Sin.: *Limosella americana* Glück, *Limosella americana* Glück f. *natans* Glück, *Limosella americana* Glück f. *submersa* Glück, *Limosella americana* Glück f. *terrestris* Glück, *Limosella aquatica* L. var. *tenuifolia* (Nutt.) Hook. f., *Limosella australis* R. Br. f. *natans* Glück, *Limosella australis* R. Br. f. *submersa* Glück, *Limosella australis* R. Br. f. *terrestris* Glück, *Limosella lineata* Glück, *Limosella tenuifolia* Nutt.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE, TDF). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Linaria Mill.

Linaria genistifolia (L.) Mill. subsp. **dalmatica** (L.) Maire & Petitm.

Sin.: *Antirrhinum dalmaticum* L., *Linaria dalmatica* (L.) Mill.

Hierba. Introducida. 700-800 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

Linaria purpurea (L.) Mill.

Sin.: *Antirrhinum purpureum* L.

Hierba. Introducida. 700-800 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR).

Linaria vulgaris Mill.

Sin.: *Antirrhinum linaria* L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(NEU). BRA(PAR, RGS). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, AIS).

Littorella P.J. Bergius

Littorella australis Griseb. ex Benth. & Hook. f.

Sin.: *Plantago araucana* Rahn

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU, SCR, TDF).
CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Lophospermum D. Don

Lophospermum erubescens D. Don

Sin.: *Maurandya erubescens* (D. Don) A. Gray

Enredadera. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Lysimachia Tourn. ex L.

Lysimachia neolongipedicellata M. Idress & J.M.H. Shaw

Sin.: *Funez* & Hassemer, nom. illeg.,

Lysimachia longipedicellata R. Trevis.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

Matourea Aubl.

Matourea ocymoides (Cham. & Schltdl.)

Colletta & V.C. Souza

Sin.: *Achetaria ocymoides* (Cham. & Schltdl.) Wettst., *Beyrichia ocymoides* Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Maurandella (A. Gray) Rob.

Maurandella antirrhiniflora (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rothm.

Sin.: *Asarina antirrhiniflora* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pennell, *Maurandya antirrhiniflora* Humb. & Bonpl. ex Willd.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE).

Maurandya Ortega

Maurandya barclayana Lindl.

Sin.: *Asarina barclayana* (Lindl.) Pennell

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Mecardonia Ruiz & Pav.

Mecardonia berroi Marchesi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(ART, PAY).

Mecardonia grandiflora (Benth.) Pennell

Sin.: *Bacopa grandiflora* (Benth.) Descole & Borsini, hom. illeg., *Herpestis grandiflora* Benth., *Monniera grandiflora* (Benth.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mecardonia kamogawae Greppi & J.C. Hagiw.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(COS).

Mecardonia procumbens (Mill.) Small

var. **caespitosa** (Cham.) V.C. Souza

Sin.: *Bacopa caespitosa* (Cham.) Edwall, *Herpestis caespitosa* Cham., *Mecardonia caespitosa* (Cham.) Pennell, *Monniera caespitosa* (Cham.) Kuntze

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mecardonia procumbens (Mill.) Small

var. **flagellaris** (Cham. & Schltdl.) V.C. Souza

Sin.: *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst. var. *flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Chodat & Hassl., *Bacopa flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Edwall, *Bacopa radicata* (Benth.) Descole & Borsini, *Bacopa veronicaefolia* (Cham. & Schltdl.) Descole & Borsini, *Bacopa versicolor* Herter & Melch., *Herpestis flagellaris* Cham. & Schltdl., *Herpestis flagellaris* Cham. & Schltdl. var. *veronicaefolia* Cham. & Schltdl., *Herpestis radicata* Benth., *Mecardonia flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Rossow, *Mecardonia flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Rossow subsp. *radicata* (Benth.) Rossow, *Mecardonia montevidensis* (Spreng.) Pennell var. *veronicaefolia* (Cham. & Schltdl.) G. Dawson, *Mecardonia radicata* (Benth.) Pennell, *Monniera flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, *Monniera procumbens* (Mill.) Kuntze f. *albiflora* Kuntze, *Monniera procumbens* (Mill.) Kuntze var. *flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, *Monniera radicata* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, NEU, RNE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, MAU). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Mecardonia procumbens (Mill.) Small

var. **herniarioides** (Cham.) V.C. Souza

Sin.: *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst. var. *microphylla* (J.A. Schmidt) Edwall, *Bacopa herniarioides* (Cham.) Edwall, *Herpestis chamaedryoides* Kunth var. *microphylla* J.A. Schmidt, *Herpestis herniarioides* Cham., *Mecardonia herniarioides* (Cham.) Pennell, *Mecardonia tenella* (Cham. & Schltdl.) Pennell var. *microphylla* (J.A. Schmidt)

Rossow, *Monniera herniarioides* (Cham.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, ÑEE).
URY(COL).

Mecardonia procumbens (Mill.) Small
var. **procumbens**

Sin.: *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst., *Bacopa dianthera* (Sw.) Descole & Borsini, *Bacopa procumbens* (Mill.) GreenM., *Erinus procumbens* Mill., *Herpestis chamaedryoides* Kunth, *Herpestis procumbens* (Mill.) Urb., *Lindernia dianthera* Sw., *Mecardonia dianthera* (Sw.) Pennell, *Monniera dianthera* (Sw.) Millsp., *Monniera procumbens* (Mill.) Kuntze, *Pagesia dianthera* (Sw.) Pennell, *Pagesia procumbens* (Mill.) Pohl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU).

Mecardonia procumbens (Mill.) Small
var. **tenella** (Cham. & Schltdl.) V.C. Souza
Sin.: *Bacopa tenella* (Cham. & Schltdl.) Edwall, *Bacopa uruguayensis* Herter & Melch., *Herpestis tenella* Cham. & Schltdl., *Mecardonia tenella* (Cham. & Schltdl.) Pennell, *Monniera tenella* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, SOR, TAC, TYT).

Mecardonia pubescens Rossow

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Mecardonia reneeae Greppi & M.M. Sosa

Hierba. Endémica. 100-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE).
PRY(APY, CEN, GUA, PHA).

Mecardonia serpylloides (Cham. & Schltdl.) Pennell

Sin.: *Bacopa serpylloides* (Cham. & Schltdl.) Edwall, *Herpestis pusilla* (Mart.) D. Dietr., *Herpestis serpylloides* Cham. & Schltdl., *Mecardonia pusilla* Mart., *Monniera serpylloides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Melosperma Benth.

Melosperma andicola Benth. var. **andicola**

Sin.: *Melosperma glabra* Phil.

Subarbusto. Endémica. 2300-3900 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Melosperma andicola Benth. var. **angustifolia** (Phil.) Rossow

Sin.: *Melosperma angustifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 2500-4500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Misopates Raf.

Misopates orontium (L.) Raf.

Sin.: *Antirrhinum orontium* L., *Orontium arvense* Pers.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(DFE, ERI, SFE, TUC).
BRA(PAR, SCA). URY(SJO).

Monttea Gay

Monttea aphylla (Miers) Hauman

Sin.: *Monttea aphylla* (Miers) Hauman var. *glandulifera* Rossow, *Oxycladus aphyllus* Miers

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

Monttea chilensis Gay var. **chilensis**

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Monttea chilensis Gay var. **taltalensis** Reiche

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, COQ).

Monttea schickendantzii Griseb.

Arbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, TUC).

Nuttallanthus D.A. Simpson

Nuttallanthus canadensis (L.) D.A. Webb

Sin.: *Antirrhinum canadense* L., *Linaria canadensis* (L.) Dum. Cours.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR). URY(CAS, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, SJO, SOR).

Ourisia Comm. ex Juss.

Ourisia alpina Poepp. & Endl.

Sin.: *Ourisia alpina* Poepp. & Endl. var. *glabra* Phil., *Ourisia alpina* Poepp. & Endl. var. *pallens* (Poepp. & Endl.) Benth., *Ourisia pallens* Poepp. & Endl., *Ourisia rancoana* Phil., *Ourisia rosea* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Ourisia breviflora Benth. subsp. **breviflora**

Sin.: *Ourisia antarctica* Hook. f.
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(AIS, MAG).

Ourisia breviflora Benth. subsp. **uniflora** (Phil.) Meudt

Sin.: *Ourisia breviflora* Benth. var. *uniflora* (Phil.) Reiche, *Ourisia uniflora* Phil.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(BIO, LLA).

Ourisia coccinea (Cav.) Pers. subsp. **coccinea**

Sin.: *Dichroma coccinea* Cav., *Ourisia pearcei* Phil., *Ourisia villosa* Molina, nom. superfl.
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Ourisia coccinea (Cav.) Pers. subsp. **elegans** (Phil.) Meudt

Sin.: *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. var. *elegans* (Phil.) Reiche, *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. var. *minor* Benth., *Ourisia elegans* Phil.
Hierba. Endémica. 100-2600 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR).

Ourisia fragrans Phil.

Hierba. Endémica. 1300-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(LLA).

Ourisia fuegiana Skottsb.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Ourisia microphylla Poepp. & Endl.

Subarbusto. Endémica. 800-2200 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO).

Ourisia muscosa Benth.

Hierba. Nativa. 3800-5000 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Ourisia polyantha Poepp. & Endl.

Sin.: *Ourisia diazii* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1300-2400 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Ourisia pulchella Wedd.

Sin.: *Ourisia pratioides* Diels
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(SAL).

Ourisia pygmaea Phil.

Hierba. Endémica. 1400-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Ourisia ruellioides (L. f.) Kuntze

Sin.: *Chelone ruellioides* L. f., *Ourisia glabra* Molina, nom. superfl., *Ourisia magellanica* C.F. Gaertn., *Ourisia poeppigii* Benth., *Ourisia racemosa* Clos, *Ourisia ruellioides* (L. f.) Kuntze var. *poeppigii* (Benth.) H.S. Irwin
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Ourisia serpyllifolia Benth.

Sin.: *Ourisia melospermoides* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1000-2200 m.
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Plantago L.

Plantago aparadensis D.B. Falkenb.

Sin.: *Plantago corvensis* Hassemer
Hierba. Endémica. 800-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Plantago arenaria Waldst. & Kit.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Plantago argentina Pilg.

Sin.: *Plantago argentina* Pilg. var. *glabra* Pilg., *Plantago oreades* Decne. var. *chamaestachya* Griseb.
Hierba. Endémica. 1500-2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Plantago australis Lam. subsp. **australis**

Sin.: *Plantago accrescens* Pilg., *Plantago australis* Lam. subsp. *angustifolia* (Pilg.) Rahn, *Plantago australis* Lam. subsp. *macrostachya* (Decne.) Rahn, *Plantago bicallosa* Decne. var. *angustifolia* Pilg., *Plantago candollei* Rapin, *Plantago denudata* Pilg., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago gigantea* Decne., *Plantago hirtella* Kunth var. *glabrescens* (Schltdl. ex J.A. Schmidt) Pilg., *Plantago hirtella* Kunth var. *platensis* Pilg., *Plantago hypolasia* Pilg., *Plantago kurtzii* Pilg., *Plantago macropus* Pilg., *Plantago macrostachys* Decne., *Plantago macrostachys* Decne. f. *brachypus* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *accrescens* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *angustifolia* Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *brachypus* (Pilg.) Pilg., *Plantago*

macrostachys Decne. var. *catamarcensis* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *denudata* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *gigantea* (Decne.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *platensis* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *stuckertii* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *typica* Pilg., nom. inval., *Plantago myosuros* Lam. var. *latifolia* Speg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *hypolasia* (Pilg.) Pilg., *Plantago refracta* Pilg., *Plantago stuckertii* Pilg., *Plantago stuckertii* Pilg. subsp. *catamarcensis* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *hypolasia* (Pilg.) Pilg.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE). PRY(CAA, CEN, GUA, MIE). URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, ROC).

Plantago australis Lam. subsp. **cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Rahn

Sin.: *Plantago calbucana* Phil., *Plantago carrenleofuensis* Speg., *Plantago carrenleofuensis* Speg. var. *latifolia* Pilg., *Plantago cumingiana* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago cumingiana* Fisch. & C.A. Mey. var. *minor* Pilg., *Plantago fonckii* Phil., *Plantago julietii* Phil., *Plantago laevigata* Phil., *Plantago macrostachys* Decne. var. *subandina* Speg., *Plantago ovata* Phil., hom. illeg., *Plantago pugae* Phil., *Plantago tomentosa* Lam. var. *fonckii* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR). CHL(VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Plantago australis Lam. subsp. **hirtella** (Kunth) Rahn

Sin.: *Plantago bicallosa* Decne., *Plantago cantagallensis* Zahlbr. ex Wawra, *Plantago hirtella* Kunth, *Plantago leptophylla* Decne., *Plantago virginica* L. var. *hirtella* (Kunth) Kuntze

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC).

Plantago barbata G. Forst. subsp. **barbata**

Sin.: *Plantago andicola* Decne. ex Barnéoud, *Plantago andicola* Gillies ex Hook. f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *eubarbata* Pilg., nom. inval., *Plantago barbata* G. Forst. var. *imberbis* Hook. f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *parva* Barnéoud, *Plantago barbata* G. Forst. var. *pauciflora* (Gay) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. var. *puberula* Pilg., *Plantago imberbis* Hook. f., *Plantago pachyrrhiza* Phil., *Plantago pauciflora* Gay, hom. illeg., *Plantago pauciflora* Hook. f. var. *taraxacoides* Speg., *Plantago pauciflora* Lam., hom. illeg., *Plantago pauciflora* Lam. var. *major* Barnéoud

Hierba. Endémica. 500-3600 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Plantago barbata G. Forst. subsp. **gigantea** Rahn

Hierba. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Plantago berroi Pilg.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI). URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, SOR).

Plantago bismarckii Niederl.

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI).

Plantago brasiliensis Sims

Sin.: *Plantago bonariensis* Steud., *Plantago brasiliensis* Sims var. *chilensis* (Rapin) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *cinereo villosa* Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *cordobensis* Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *decaisnei* (Barnéoud) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *eubrasiliensis* Pilg., nom. inval., *Plantago brasiliensis* Sims var. *flavidohirsuta* Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *gayana* (Decne. ex Barnéoud) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *lasiothrix* (Decne.) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *obtusata* (Decne.) Pilg., *Plantago chilensis* Rapin, *Plantago coriacea* Cham. & Schltdl., *Plantago coriacea* Cham. & Schltdl. var. *glabriuscula* Kuntze, *Plantago decaisnei* Barnéoud, *Plantago dolichophylla* Phil., *Plantago gayana* Decne. ex Barnéoud, *Plantago lasiothrix* Kunze ex Decne., *Plantago obtusata* Decne., *Plantago sericea* Ruiz & Pav. var. *decaisnei* (Barnéoud) Wedd., *Plantago sericea* Ruiz & Pav. var. *obtusata* (Decne.) Wedd., *Plantago vidalii* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, COS, ERI, LRI, NEU, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, RIV, SAO).

Plantago buchtienii Pilg.

Sin.: *Plantago achalensis* Pilg. var. *hirtula* Pilg., *Plantago australis* Lam. subsp. *buchtienii* (Pilg.) Rahn

Hierba. Nativa. 1000-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Plantago campestris Hassemer

Hierba. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Plantago catharinea Decne.

Sin.: *Plantago catharinea* Decne. var. *spathulifolia* (Pilg.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *spathulifolia* Pilg.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plantago commersoniana Decne. & Barnéoud

Sin.: *Plantago bradei* Pilg., *Plantago selloi* J.A. Schmidt, *Plantago yhuensis* Hassl., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(LAV, MAL, MON, ROC).

Plantago coronopus L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: BRA(RGS). CHL(COQ, LBO, BIO, ARA). URY(MON).

Plantago densa (Pilg.) Rahn

Sin.: *Plantago brasiliensis* Sims subsp. *densa* (Pilg.) Rahn, *Plantago linearis* Kunth var. *densa* Pilg.

Hierba. Endémica. 100-1800 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Plantago dielsiana Pilg.

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp. *dielsiana* (Pilg.) Rahn

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS). URY(CAS, MON, ROC).

Plantago fernandezia Bertero ex Barnéoud

Sin.: *Robinsonia nervosa* Phil.

Arbusto. Endémica. 500-600 m.

Países: CHL(JFE).

Plantago firma Kunze ex Walp.

Sin.: *Plantago brachystachys* Walp., *Plantago clausa* Steud., *Plantago leonensis* Steud., *Plantago marginata* Steud., *Plantago skottsbergii* Pilg.,

Plantago truncata Cham. & Schltdl. subsp. *firma* (Kuntze ex Walp.) Pilg., *Plantago truncata* Cham. & Schltdl. subsp. *skottsbergii* (Pilg.) Pilg., *Plantago truncata* Cham. & Schltdl. var. *canohirsuta* Pilg., *Plantago virginica* L. var. *firma* (Walp.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME, JFE).

Plantago grandiflora Meyen

Sin.: *Plantago frigida* Kunze ex Walp., hom. illeg., *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud, *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *argentea* Phil., *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *hirsuta* Phil., *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *nitidifolia* Barnéoud, *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *trichophylla* Phil., *Plantago platypetala* Wallr. ex Walp.

Hierba. Endémica. 1300-2800 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Plantago guilleminiana Decne.

Hierba. Nativa. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plantago hatschbachiana Hassemer

Hierba. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Plantago heterophylla Nutt.

Sin.: *Plantago aquatilis* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA). BRA(RGS). PRY(COA). URY(PAY).

Plantago hispidula Ruiz & Pav.

Sin.: *Plantago albida* Phil., *Plantago callosa* Colla, *Plantago disticha* Phil., *Plantago heterophylla* Phil., nom. illeg., *Plantago macrosperma* Steud., *Plantago*

stenopetala Phil., *Plantago stenopetala* Phil. var. *stricta* Phil., *Plantago subtrinervis* Phil., *Plantago tumida* Link

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Plantago humboldtiana Hassemer

Hierba. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Plantago johnstonii Pilg.

Hierba. Endémica. 300-400 m.

Países: CHL(ANT).

Plantago jujuyensis Rahn

Hierba. Endémica. 2500-3300 m.

Países: ARG(JUJ).

Plantago lanceolata L.

Hierba. Introducida. 0-2900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, MON, PAY, RNO, ROC).

Plantago litorea Phil.

Sin.: *Plantago glabriuscula* Phil., *Plantago oligantha* Phil., *Plantago philippiana* Vatke

Hierba. Endémica. 0-3600 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Plantago lundborgii Sparre

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(IDE).

Plantago major L.

Sin.: *Plantago major* L. f. *rocae* (Lorentz) Pilg., *Plantago rocae* Lorentz

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, MON).

Plantago maritima L.

Sin.: *Plantago juncooides* Lam., *Plantago juncooides* Lam. subsp. *scabrior* Pilg., *Plantago maritima* L. subsp. *juncooides* (Lam.) Hultén, *Plantago maritima* L. var. *juncooides* (Lam.) A. Gray, *Plantago maritima* L. var. *macrophylla* Speg., *Plantago maritima* L. var. *pauciflora* Speg., *Plantago maritima* L. var. *scabrior* (Pilg.) Pilg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

Plantago monanthos d'Urv. var. **monanthos**

Sin.: *Plantago barbata* G. Forst. f. *elongata* Pilg., nom. illeg., *Plantago barbata* G. Forst. f. *uncialis* (Decne. ex Barnéoud) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. subsp. *austroandina* Rahn, *Plantago barbata* G. Forst. subsp. *monanthos* (d'Urv.) Rahn, *Plantago barbata* G. Forst. var. *caespitosa* (Phil.) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. var. *elongata* Hook. f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *monanthos* (d'Urv.) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. var. *uncialis* (Decne. ex Barnéoud) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. var. *uncialis* (Decne. ex Barnéoud) Wedd., *Plantago caespitosa* Phil., *Plantago coelorhiza* Morris & Macloskie, *Plantago correae* Rahn, *Plantago oxyphylla* Speg., *Plantago polymorpha* Banks & Sol. ex Hook. f., *Plantago pulvinata* Speg., *Plantago uncialis* Decne. ex Barnéoud, *Plantago uniflora* Phil., hom. illeg., *Plantago*

uniglumis Wallr. ex Walp., *Plantago uniglumis* Wallr. ex Walp. f. *maxima* Pilg., *Plantago uniglumis* Wallr. ex Walp. var. *brevicuspis* Pilg., *Plantago uniglumis* Wallr. ex Walp. var. *oxyphylla* (Speg.) Pilg.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, AIS, MAG, RME).

Plantago monanthos d'Urv. var. **muscooides** Hook. f.

Sin.: *Plantago barbata* G. Forst. f. *abbreviata* (Hook. f.) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. f. *muscooides* (Hook. f.) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. subsp. *muscooides* (Hook. f.) Rahn, *Plantago monanthos* d'Urv. var. *abbreviata* Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Plantago monticola Decne.

Sin.: *Plantago monticola* Decne. subsp. *eumonticola* Pilg., nom. inval., *Plantago monticola* Decne. subsp. *sericans* Pilg., *Plantago sericea* Ruiz & Pav. subsp. *sericans* (Pilg.) Rahn

Hierba. Nativa. 2900-4400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP).

Plantago moorei Rahn

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Plantago myosuros Lam.

Sin.: *Plantago chubutensis* Pilg., *Plantago humilior* Pilg., *Plantago humilis* Decne., hom. illeg., *Plantago myosuros* Lam. subsp. *humilior* (Pilg.) Rahn, *Plantago myosuros* Lam. subsp. *nudiuscula* Pilg., *Plantago myosuros* Lam. var. *angustifolia* Pilg., *Plantago myosuros* Lam. var. *hirta* Speg., *Plantago myosuros* Lam. var. *major* Pilg., *Plantago myosuros* Lam. var.

parviflora Pilg., *Plantago myosuros* Lam. var. *taraxacoides* Speg., *Plantago nigritella* Pilg., *Plantago pseudomyosuros* Pilg., *Plantago rojasii* Pilg., *Plantago taraxacoides* (Speg.) Pilg.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, DUR, FLA, MAL, MON, ROC).

Plantago napiformis (Rahn) Hassemer

Sin.: *Plantago paralias* Decne. subsp. *napiformis* Rahn, *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *napiformis* (Rahn) Rahn

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, GUA, MIE, SPE).

Plantago nebularis Hassemer

Hierba. Endémica. 800-1200 m.

Países: CHL(ANT).

Plantago nubicola (Decne.) Rahn

Sin.: *Bougueria nubicola* Decne.

Hierba. Nativa. 3900-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Plantago orbignyana Steinh. ex Decne. subsp. **niederleinii** (Pilg.) Rahn

Sin.: *Plantago niederleinii* Pilg.

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Plantago orbignyana Steinh. ex Decne. subsp. **orbignyana**

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp. *orbignyana* (Steinh. ex Decne.) Rahn, *Plantago hirtella* Kunth var. *orbignyana* (Steinh. ex Decne.) A. Gray, *Plantago*

orbignyana Steinh. ex Decne. var.
lasiantha Pilg.

Hierba. Nativa. 3500-4400 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Plantago orbignyana Steinh. ex Decne.
subsp. **pseudomollior** (Rahn) Rahn

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp.
pseudomollior Rahn

Hierba. Nativa. 3100-3800 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Plantago pachyneura Steud.

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp.
pachyneura (Steud.) Rahn, *Plantago*
berteroi Steinh. ex Decne., *Plantago*
durvillei Fisch. & C.A. Mey. subsp.
eupachyneura (Pilg.) Pilg., *Plantago*
durvillei Fisch. & C.A. Mey. var. *hygrophila*
(Steud.) Pilg., *Plantago hygrophila* Steud.,
Plantago pachyneura Steud. subsp.
eupachyneura Pilg., nom. inval., *Plantago*
pachyneura Steud. var. *hygrophila*
(Steud.) Pilg., *Plantago pachystachys* Phil.

Hierba. Endémica. 1300-2900 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ANT,
ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LSR, LLA, MAG, RME).

Plantago patagonica Jacq.

Sin.: *Plantago gnaphalioides* Nutt.,
Plantago patagonica Jacq. f. *glabrescens*
Pilg., *Plantago patagonica* Jacq. f. *vestita*
Pilg., *Plantago patagonica* Jacq. var.
gracilescens Speg., *Plantago patagonica*
Jacq. var. *majuscula* Pilg., *Plantago*
patagonica Jacq. var. *minuscule* Speg.,
Plantago patagonica Jacq. var. *typica*
Speg., nom. inval., *Plantago purshii*
Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,
MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE,
TDF).

Plantago penantha Griseb.

Sin.: *Plantago kuntzei* Pilg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). URY(ART, CAS, FLA, LAV,
SJO).

Plantago pretoana (Rahn) Hassemer

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp.
pretoana Rahn

Hierba. Nativa. 700-900 m.

Países: BRA(PAR).

Plantago rahniana Hassemer & R.
Trevis.

Hierba. Endémica. 1500-1800 m.

Países: BRA(SCA).

Plantago rancaguae Steud.

Sin.: *Plantago brachyantha* Phil., *Plantago*
bracteosa Phil., *Plantago deserticola* Phil.,
Plantago quillotea Vatke

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, RME).

Plantago sempervivoides Dusen

Hierba. Endémica. 700-1600 m.

Países: ARG(MEN, SCR). CHL(MAG).

Plantago sericea Ruiz & Pav. var.
lanuginosa Griseb.

Sin.: *Plantago fiebrigii* Pilg., *Plantago*
lorenzii Pilg., *Plantago tarijensis* Pilg.

Hierba. Nativa. 2200-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Plantago sericea Ruiz & Pav. var.
sericea

Nativa. 3300-4300 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Plantago tandilensis (Pilg.) Rahn

Sin.: *Plantago brasiliensis* Sims subsp.
tandilensis (Pilg.) Rahn, *Plantago*
brasiliensis Sims var. *tandilensis* Pilg.,

Plantago coriacea Cham. & Schltdl. var.
pilosula Kuntze

Arbusto. Endémica. 200-500 m.

Países: ARG(BAI).

Plantago tehuelcha Speg.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR).
CHL(BIO, MAG).

Plantago tomentosa Lam.

Sin.: *Plantago achalensis* Pilg., *Plantago*
achalensis Pilg. f. *minor* Pilg., *Plantago*
affinis Decne., *Plantago arechavaletae*
Pilg., *Plantago bicallosa* Decne. var.
hirsutior Pilg., *Plantago grisebachii*
Hieron., *Plantago hypoleuca* Pilg.,
Plantago oreades Decne. var. *lanuginosa*
Griseb., *Plantago paralias* Decne.,
Plantago paralias Decne. subsp. *affinis*
(Decne.) Pilg., *Plantago paralias* Decne.
subsp. *dasystachys* (Pilg.) Pilg., *Plantago*
paralias Decne. subsp. *euparalias* Pilg.,
nom. inval., *Plantago paralias* Decne.
subsp. *grisebachii* (Hieron.) Pilg.,
Plantago paralias Decne. subsp. *leiocalyx*
(Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne.
subsp. *petiolata* (Pilg.) Pilg., *Plantago*
paralias Decne. subsp. *schlechtendalia*
(Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne.
subsp. *selloana* (Pilg.) Pilg., *Plantago*
paralias Decne. var. *achalensis* (Pilg.)
Pilg., *Plantago paralias* Decne. var.
brevifolia (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias*
Decne. var. *cordobensis* (Pilg.) Pilg.,
Plantago paralias Decne. var. *glabrescens*
(Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var.
lasiophylla (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias*
Decne. var. *mollior* (Pilg.) Pilg., *Plantago*
paralias Decne. var. *saxicola* (Pilg.) Pilg.,
Plantago tomentosa Lam. subsp. *affinis*
(Decne.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam.
subsp. *balansai* Pilg., *Plantago tomentosa*
Lam. subsp. *dasystachys* Pilg., *Plantago*
tomentosa Lam. subsp. *grisebachii*
(Hieron.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam.

subsp. *leiocalyx* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *paralias* (Decne.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *petiolata* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *schlechtendaliana* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *selloana* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *achalensis* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *brevifolia* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *cordobensis* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *glabrescens* Schltld. ex J.A. Schmidt, *Plantago tomentosa* Lam. var. *lasiophylla* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *mollior* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *saxicola* Pilg.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).

Plantago truncata Cham. & Schltld.

Sin.: *Plantago amphibola* Phil., *Plantago angustifolia* Phil., *Plantago australis* Lam. subsp. *truncata* (Cham. & Schltld.) Rahn, *Plantago berteroniana* Steud., *Plantago bridgesii* Decne., *Plantago eschscholtziana* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago obscura* Steud., *Plantago tomentosa* Lam. var. *angustifolia* (Phil.) Reiche, *Plantago truncata* Cham. & Schltld. subsp. *eschscholtziana* (Fisch. & C.A. Mey.) Pilg., *Plantago truncata* Cham. & Schltld. var. *philippii* Pilg., *Plantago valparadisiaca* Decne.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Plantago tubulosa Decne.

Sin.: *Plantago tubulosa* Decne. f. *maxima* Pilg.

Hierba. Nativa. 2900-5000 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Plantago turficola Rahn

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Plantago ventanensis Pilg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI).

Plantago venturii Pilg.

Hierba. Endémica. 1200-2600 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Plantago weddelliana Decne.

Hierba. Nativa. 2300-3800 m.

Países: ARG(SAL).

Plantago zoellneriana Hassemer

Sin.: *Plantago sericea* Ruiz & Pav. subsp. *araucana* Rahn

Hierba. Endémica. 600-2000 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

Scoparia L.

Scoparia aemilii Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, DFE, MIS, SFE). PRY(APY, BOQ, COA, PHA).

Scoparia dulcis L.

Sin.: *Capraria dulcis* (L.) Kuntze, *Scoparia dulcis* L. var. *tenuifolia* Griseb., *Scoparia procumbens* Jacq., *Scoparia purpurea* Ridl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, SAO).

Scoparia elliptica Cham.

Sin.: *Capraria elliptica* (Cham.) Kuntze

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Scoparia ericacea Cham. & Schltld.

Sin.: *Capraria ericacea* (Cham. & Schltld.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PHA). URY(ART, RNO, RIV, SOR, TAC).

Scoparia hassleriana Chodat

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI).

Scoparia montevidensis (Spreng.) R.E. Fr.

Sin.: *Capraria montevidensis* (Spreng.) Kuntze, *Capraria montevidensis* (Spreng.) Kuntze var. *intermedia* Kuntze, *Microcarpaea montevidensis* Spreng., *Scoparia annua* Cham. & Schltld., *Scoparia excelsa* R.E. Fr., *Scoparia flava* Cham. & Schltld., *Scoparia flava* Cham. & Schltld. var. *glandulifera* Fritsch, *Scoparia glandulifera* (Fritsch) Descole & Borsini, *Scoparia grisebachii* Fritsch, *Scoparia macrantha* R.E. Fr., *Scoparia millefoliata* Fritsch, *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *flava* (Cham. & Schltld.) Chodat, *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *glandulifera* (Fritsch) R.E. Fr., *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *grisebachii* (Fritsch) Chodat, *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *intermedia* (Kuntze) Chodat, *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *neglecta* (R.E. Fr.) Chodat, *Scoparia neglecta* R.E. Fr., *Scoparia neglecta* R.E. Fr. var. *intermedia* (Kuntze) R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,

MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, ÑEE, PHA).
URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Scoparia nudicaulis Chodat

Sin.: *Scoparia nudicaulis* Chodat subsp. *praedensa* R.E. Fr., *Scoparia praedensa* (R.E. Fr.) Botta & Cabrera
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC).

Scoparia pentapetala Deble & B.P. Moreira

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS). URY(CLA).

Scoparia pinnatifida Cham.

Sin.: *Scoparia multifida* G. Don
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, ÑEE).

Scoparia plebeja Cham. & Schltdl.

Sin.: *Scoparia divaricata* R.E. Fr.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC).

Sibthorpia L.

Sibthorpia conspicua Diels

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Sibthorpia repens (L.) Kuntze

Sin.: *Sibthorpia americana* Sessé & Moç., *Sibthorpia nectarifera* Wedd., *Sibthorpia parvifolia* Mart. & Galeotti, *Sibthorpia pichinchensis* Kunth, *Sibthorpia retusa* Kunth, *Sibthorpia rotundifolia* (Ruiz & Pav.) Edwin, *Sibthorpia triandra* Suess.,

Veronica rotundifolia Ruiz & Pav., *Willichia repens* L.

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Stemodia L., nom. cons.

Stemodia diplohyptoides M.M. Sosa & Dematteis

Hierba. Endémica. 100-400 m.
Países: ARG(MIS).

Stemodia durantifolia (L.) Sw. var. **chilensis** (Benth.) C.C. Cowan

Sin.: *Stemodia chilensis* Benth., *Stemodiocris chilensis* (Benth.) Kuntze
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(RNE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Stemodia ericifolia (Kuntze) K. Schum.

Sin.: *Chodaphyton ericifolium* (Kuntze) Minod, *Stemodia ericifolia* (Kuntze) K. Schum. subsp. *vera* Hassl., *Stemodiocris ericifolia* Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). PRY(APY, BOQ, PHA).

Stemodia hassleriana Chodat

Hierba. Nativa.
Países: PRY(AMA, CON).

Stemodia hyptoides Cham. & Schltdl.

Sin.: *Scrophularia subhastata* Vell., *Stemodia hyptoides* Cham. & Schltdl. var. *auriculata* Chodat & Hassl., *Stemodia hyptoides* Cham. & Schltdl. var. *platensis* Benth., *Stemodia orbiculata* Minod, *Stemodia pilcomayensis* Minod, *Stemodia subhastata* (Vell.) Benth., *Stemodiocris hyptoides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN, COA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Stemodia lanceolata Benth.

Sin.: *Stemodia lanceolata* Benth. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Stemodia lanceolata* Benth. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Stemodia lanceolata* Benth. f. *laxiflora* Chodat & Hassl., *Stemodia lanceolata* Benth. var. *angustifolia* (Chodat & Hassl.) Minod, *Stemodia lanceolata* Benth. var. *latifolia* (Chodat & Hassl.) Minod, *Stemodiocris lanceolata* (Benth.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE). URY(SJO, SOR).

Stemodia lobelioides Lehm.

Sin.: *Gratiola hookeri* Walp., *Gratiola tetragona* Hook., hom. illeg., *Stemodia tetragona* Minod, *Stemodiocris tetragona* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, SFE). URY(COL, RNO, ROC, SJO).

Stemodia palustris A. St.-Hil.

Sin.: *Stemodia gratiolifolia* A. St.-Hil., *Stemodia linearifolia* (Morong) Conard, *Stemodia linearifolia* (Morong) Conard var. *acutifolia* Chodat & Hassl., *Stemodia palustris* A. St.-Hil. f. *salicifolia* Minod, *Stemodia palustris* A. St.-Hil. var. *simplex* J.A. Schmidt, *Stemodiocris gratiolifolia* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Stemodiocris linearifolia* Morong, *Stemodiocris palustris* (A. St.-Hil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(RGS).

PRY(APY, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Stemodia scoparioides Hassl.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(COS). PRY(AMA).

Stemodia stricta Cham. & Schltdl.

Sin.: *Stemodia hyptoides* Cham. & Schltdl.

var. *stricta* (Cham. & Schltdl.) G. Dawson,

Stemodia stricta Cham. & Schltdl. f. *minor*

Chodat & Hassl., *Stemodia stricta* Cham.

& Schltdl. var. *multidentata* Minod,

Stemodia stricta Cham. & Schltdl. var.

paucidentata Minod, *Stemodiocris stricta*

(Cham. & Schltdl.) Kuntze, *Stemodiocris*

stricta (Cham. & Schltdl.) Kuntze var. *glabriuscula* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI,

FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, COA,

GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, PAY).

Stemodia trifoliata (Link) C. Rchb.

Sin.: *Columnnea trifoliata* Link, *Stemodia*

cruciflora Casar.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stemodia verticillata (Mill.) Hassl.

Sin.: *Capraria humilis* Sol., *Erinus*

verticillatus Mill., *Lendneria humilis* (Sol.)

Minod, *Lendneria verticillata* (Mill.) Britton,

Stemodia arenaria Kunth, *Stemodia*

humilis (Sol.) G. Dawson, *Stemodia*

macrotricha Colla, *Stemodia parviflora*

W.T. Aiton, nom. superfl., *Stemodiocris*

verticillata (Mill.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,

ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE,

TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA,

CAN, COA, ÑEE). URY(ART, CLA, PAY,

RNO, RIV, SAO, TAC).

Veronica L.

Veronica anagallis-aquatica L.

Sin.: *Veronica lepidota* Phil.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,

JUU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL,

SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(RGS).

CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO,

MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME,

JFE). URY(CAS, MON).

Veronica arvensis L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,

DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU,

RNE, SAL, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS,

SCA). CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO,

ARA, LSR, LLA, MAG, RME, JFE).

URY(CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV,

MON, PAY, SOR).

Veronica beccabunga L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(LLA).

Veronica chamaedrys L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL).

CHL(LSR).

Veronica cymbalaria Bodard

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(VAL).

Veronica elliptica G. Forst.

Sin.: *Hebe elliptica* (G. Forst.) Pennell,

Hebe magellanica J.F. Gmel., *Veronica*

simpsonii Phil.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Veronica javanica Blume

Hierba. Introducida.

Países: BRA(RGS).

Veronica officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-1300 m.

Países: CHL(ARA, LSR).

Veronica peregrina L.

Sin.: *Veronica chillensis* Kunth, *Veronica*

peregrina L. f. *xalapensis* (Kunth) K. Koch,

Veronica peregrina L. subsp. *xalapensis*

(Kunth) Pennell, *Veronica peregrina* L.

var. *laurentiana* Vict. & J. Rousseau,

Veronica peregrina L. var. *xalapensis*

(Kunth) Pennell, *Veronica romana* L.,

Veronica xalapensis Kunth

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,

COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI,

MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU,

SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS,

SCA). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA,

LSR, AIS, MAG, RME). URY(ART, CAS,

CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON,

RNO, SJO, SOR, TAC).

Veronica persica Poir.

Sin.: *Veronica buxbaumii* Ten.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,

DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS,

NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA,

COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA,

RME, JFE). URY(CAS, MON, SOR).

Veronica polita Fr.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, MIS,

SFE). BRA(RGS). URY(CAS, MON).

Veronica salicifolia G. Forst.

Sin.: *Hebe salicifolia* (G. Forst.) Pennell,

Veronica fonkii Phil.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: CHL(LLA, AIS, MAG).

Veronica scutellata L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(LSR, LLA).

Veronica serpyllifolia L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

PLUMBAGINACEAE

Armeria Willd., nom. cons.

Armeria maritima (Mill.) Willd.

Sin.: *Armeria aegialea* Phil., *Armeria andina* Poepp. ex Boiss., *Armeria androsacea* Boiss., *Armeria bella* Albov ex Albov & Kurtz, *Armeria brachyphylla* Boiss., *Armeria chilensis* Boiss., *Armeria chilensis* Boiss. subsp. *andina* (Poepp. ex Boiss.) Reiche, *Armeria chilensis* Boiss. subsp. *macloviana* (Cham.) Reiche, *Armeria chilensis* Boiss. var. *andina* (Poepp. ex Boiss.) Reiche, *Armeria chilensis* Boiss. var. *bella* (Albov) Reiche, *Armeria chilensis* Boiss. var. *brevifolia* Boiss., *Armeria chilensis* Boiss. var. *curvifolia* (Bertero) Boiss., *Armeria chilensis* Boiss. var. *genuina* Reiche, nom. inval., *Armeria chilensis* Boiss. var. *magellanica* Boiss., *Armeria curvifolia* Bertero, *Armeria delfinii* Phil., *Armeria elongata* Hoffm. f. *bella* (Albov) Skottsb., *Armeria elongata* Hoffm. var. *chilensis* (Boiss.) Skottsb., *Armeria elongata* Hoffm. var. *macloviana* (Cham.) Skottsb., *Armeria elongata* Hoffm. var. *maritima* (Mill.) Skottsb., *Armeria exaristata* Phil., *Armeria macloviana* Cham., *Armeria macloviana* Cham. subsp. *andina* (Poepp. ex Boiss.) Iversen, *Armeria maritima* (Mill.) Willd. subsp. *andina* (Poepp. ex Boiss.) D.M. Moore & B. Yates, *Armeria maritima* (Mill.)

Willd. var. *andina* (Poepp. ex Boiss.) G.H.M. Lawr., *Armeria maritima* (Mill.) Willd. var. *curvifolia* (Bertero) G.H.M. Lawr., *Armeria maritima* (Mill.) Willd. var. *goodalliana* T.R. Dudley, *Armeria maritima* (Mill.) Willd. var. *macloviana* (Cham.) G.H.M. Lawr., *Armeria maritima* (Mill.) Willd. var. *patagonica* (Phil.) G.H.M. Lawr., *Armeria patagonica* Phil., *Armeria tenuifolia* Phil., *Armeria vulgaris* Willd. var. *maritima* (Mill.) Rosenv., *Statice maritima* Mill., *Statice punicea* Rendle

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Bakerolimon O.A. Lincz.

Bakerolimon plumosum (Phil.) O.A. Lincz.

Sin.: *Limonium plumosum* (Phil.) Kuntze, *Statice plumosa* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Ceratostigma Bunge

Ceratostigma plumbaginoides Bunge

Sin.: *Valoradia plumbaginoides* (Bunge) Boiss.

Hierba. Introducida. 1200-1300 m.

Países: ARG(COR).

Limonium Mill., nom. cons.

Limonium brasiliense (Boiss.) Kuntze

Sin.: *Limonium brasiliense* (Boiss.) Kuntze var. *patagonicum* (Speg.) Burkart, *Statice brasiliense* Boiss., *Statice brasiliense* Boiss. var. *antarctica* Boiss., *Statice*

brasiliense Boiss. var. *patagonica* (Speg.) Hosseus, *Statice brasiliense* Boiss. var. *uruguayensis* (Arechav.) Hauman, *Statice patagonica* Speg., *Statice uruguayensis* Arechav.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

Limonium guaicura (Molina) Kuntze

Sin.: *Plegorhiza guaicura* Molina, *Statice chilensis* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Plumbago Tourn. ex L.

Plumbago caerulea Kunth

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ).

Plumbago zeylanica L.

Sin.: *Plumbago scandens* L.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CEN, COA).

POACEAE

Aciachne Benth.

Aciachne acicularis Laegaard

Hierba. Nativa. 3600-4200 m.

Países: ARG(CAT, SAL).

Acroceras Stapf

Acroceras excavatum (Henrard) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Lasiacis excavata* (Henrard) Parodi, *Panicum excavatum* Henrard

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, GUA, MIE, PAI, SPE).

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy

Sin.: *Acroceras oryzoides* Stapf, *Panicum oryzoides* Sw., hom. illeg., *Panicum zizanioides* Kunth

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, SAO).

Agenium Nees

Agenium leptocladum (Hack.) Clayton

Sin.: *Andropogon leptocladus* Hack., *Andropogon leptocladus* Hack. f. *simplex* Hack., *Heteropogon leptocladus* (Hack.) Parodi, *Heteropogon leptocladus* (Hack.) Roberty, *Heteropogon leptocladus* (Hack.) Roberty var. *pilosus* Parodi, *Sorghum leptocladum* (Hack.) Kuntze, *isónimo*

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).

Agenium majus Pilg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

Agenium villosum (Nees) Pilg.

Sin.: *Agenium nutans* Nees, *Andropogon neesii* Kunth, hom. illeg., *Andropogon villosus* (Nees) Ekman, comb. illeg., *Heteropogon villosus* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON,

COA, GUA). URY(CLA, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

Agropyron Gaertn.

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.

Sin.: *Bromus cristatus* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(MAG).

Agrostis L., nom. cons.

Agrostis ambatoensis Asteg.

Hierba. Endémica. 4300-4500 m.

Países: ARG(CAT).

Agrostis arvensis Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(BIO, LLA).

Agrostis austroamericana Röser & Tkach

Sin.: *Agrostis muricata* (J. Presl) Kunth, *Agrostis pectinata* Hack. & Arechav., *Chaetotropis chilensis* Kunth, *Chaetotropis latifolia* Phil., *Polypogon chaetotropis* Trin., *Polypogon chilensis* (Kunth) Pilg., *Vilfa muricata* J. Presl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, MIS, RNE, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, VAL, MAU, BIO, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(GUA, PAI). URY(FLO, MON, ROC, SJO).

Agrostis brachyathera Steud.

Hierba. Endémica. 300-2200 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAU, BIO, AIS, MAG).

Agrostis breviculmis Hitchc.

Sin.: *Agrostis nana* (J. Presl) Kunth, comb. superfl., *Trichodium nanum* J. Presl

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, SAL). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, RME).

Agrostis capillaris L.

Sin.: *Agrostis capillaris* Huds., hom. illeg., *Agrostis tenuis* Sibth., *Agrostis vulgaris* With.

Hierba. Introducida. 900-1100 m.

Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Agrostis elongatiligulata Röser & Tkach

Sin.: *Alopecurus elongatus* (Kunth) Poir., *Chaetotropis elongata* (Kunth) Björkman var. *elongata*, Nowodworskya agrostoides J. Presl, *Polypogon affinis* Brongn., *Polypogon elongatus* Kunth var. *elongatus*, *Polypogon inaequalis* Trin., *Polypogon intermedius* Carmich., *Polypogon mexicanus* Hort. ex Steud., nom. inval., *Raspailia agrostoides* J. Presl

Hierba. Nativa. 400-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, VAL, MAU, BIO, LRI, LLA, RME). URY(MAL, ROC).

Agrostis gigantea Roth

Sin.: *Agrostis campestris* Phil., *Agrostis exarata* Trin. var. *mutica* Hicken

Hierba. Introducida. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME). URY(FLA, MON, SOR).

Agrostis glabra (J. Presl) Kunth var. **glabra**

Sin.: *Agrostis andina* Phil., *Agrostis gayana* E. Desv., *Agrostis pyrogea* Speg., *Agrostis pyrogea* Speg. var. *mutica* Hack., *Trichodium glabrum* J. Presl

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Agrostis glabra (J. Presl) Kunth var. **melanthes** (Phil.) Rúgolo & De Paula

Sin.: *Agrostis melanthes* Phil., *Calamagrostis laxiflora* Phil., *Deyeuxia vidalii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

Agrostis hygrometrica Nees

Sin.: *Agrostis juergensii* Hack., *Agrostis ramboi* Parodi, *Agrostis ramboi* Parodi var. *pubescens* Kämpf, *Bromidium hygrometricum* (Nees) Nees & Meyen, *Bromidium ramboi* (Parodi) Rúgolo var. *ramboi*

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Agrostis idahoensis D. L. Nash

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO, LLA, MAG).

Agrostis imberbis Phil.

Sin.: *Agrostis moyanoi* Speg. var. *plicatifolia* Speg., *Agrostis pulchella* Kunth f. *purpurascens* Stuck., *Agrostis pulchella* Kunth f. *virescens* Stuck., *Agrostis scabra* F.W. Gray f. *purpurascens* Kurtz, nom. nud., *Agrostis scabra* F.W. Gray f. *virescens* Kurtz, nom. nud., *Agrostis scotantha* Phil., *Agrostis stenophylla* Phil.

Hierba. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Agrostis inconspicua Kunze ex E. Desv.

Sin.: *Agrostis airiformis* Steud., *Agrostis airoides* Franch. var. *flaccidifolia* Speg., *Agrostis umbellata* Colla var. *mutica* Hack. ex Macloskie & Dusén

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Agrostis insularis Rúgolo & A.M. Molina

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LLA).

Agrostis koelerioides Desv.

Sin.: *Agrostis anomala* (Trin.) Herter, *Aira anomala* Trin., *Bromidium anomalum* (Trin.) Döll, *Bromidium hygrometricum* (Nees) Nees & Meyen var. *anomalum* (Trin.) Kuntze, *Deyeuxia anomala* (Trin.) Benth. & Hook. f., *Didymochaeta chilensis* Steud., *Koeleria chilensis* Steud., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Agrostis lenis Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Agrostis leptotricha E. Desv.

Sin.: *Agrostis lechleri* Steud., *Agrostis moyanoi* Speg., *Agrostis moyanoi* Speg. var. *major* Speg., *Agrostis moyanoi* Speg. var. *puberigluma* Speg.

Hierba. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Agrostis longiberbis Hack. ex L.B. Sm.

Sin.: *Agrostis longiberbis* Hack. ex Usteri, nom. nud., *Calamagrostis capillaris* Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 900-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Agrostis masafuerana Pilg.

Hierba. Endémica. 800-1400 m.

Países: CHL(JFE).

Agrostis mertensii Trin.

Sin.: *Agrostis boliviana* Mez, *Agrostis compressa* Döll, hom. illeg., *Agrostis gelida* Trin., *Agrostis poeppigiana* Phil., *Agrostis williamsii* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, NEU, SAL, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Agrostis meyenii Trin.

Sin.: *Agrostis canina* L. f. *inclusa* Hack., *Agrostis canina* L. f. *mutica* Hack., hom. illeg., *Agrostis canina* L. var. *falklandica* (Hook. f.) Hack. ex Skotts., hom. illeg., *Agrostis canina* L. var. *falklandica* (Hook. f.) Macloskie, *Agrostis conferta* Nees & Meyen, *Agrostis conferta* Nees & Meyen var. *austropatagonica* Pilg., *Agrostis falklandica* Hook. f.

Hierba. Nativa. 1500-4200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees f. **montevidensis**

Sin.: *Agrostis laxiflora* (Michx.) Richardson var. *aristata* Griseb., *Agrostis montevidensis* Spreng. ex Nees var. *aristata* Döll, nom. superfl.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees f. **submutica** (Döll) Kämpf

Sin.: *Agrostis montevidensis* Spreng. ex Nees var. *submutica* Döll

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA). PRY(COA, GUA).

Agrostis nebulosa Boiss. & Reut.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI).

Agrostis nowodworskyi Röser & Tkach

Sin.: *Agrostis tehuelcha* Speg., *Chaetotropis imberbis* (Phil.) Björkman var. *bonariensis* Nicora, *Chaetotropis imberbis* (Phil.) Björkman var. *imberbis*, *Chaetotropis rioplatensis* (Herter) Björkman, *Nowodworskyia imberbis* Phil., *Polypogon elongatus* Kunth f. *minor* Hack., *Polypogon elongatus* Kunth var. *muticus* Hack., *Polypogon imberbis* (Phil.) Johow, *Polypogon imberbis* (Phil.) Johow f. *aristata* Skottsbo., *Polypogon imberbis* (Phil.) Pilg., comb. superfl., *Polypogon rioplatensis* Herter, *Polypogon rioplatensis*

Herter f. *elegans* Herter, *Polypogon rioplatensis* Herter f. *robusta* Herter

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, RNE, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, JFE). URY(DUR, MON, SJO).

Agrostis perennans (Walter) Tuck.

Sin.: *Agrostis aberrans* Steud., *Agrostis canina* L. subsp. *grandiflora* Hack., *Agrostis exarata* Trin. var. *angustifolia* Hack. ex Dusén, *Agrostis flavidula* Steud., *Agrostis kufuim* Speg., *Agrostis pulchella* Kunth, nom. superfl., *Agrostis tenuifolia* Curtis var. *fretensis* Hook. f., *Agrostis violacea* Phil., hom. illeg., *Cornucopiae perennans* Walter, *Vilfa elegans* Kunth

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG).

Agrostis philippiana Rúgolo & De Paula

Sin.: *Agrostis clausa* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Agrostis platensis Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE). BRA(RGS).

Agrostis reuteri Boiss.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Agrostis scabra Willd.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Agrostis serranoi Phil.

Sin.: *Agrostis delfini* Phil., *Agrostis fuegiana* Hack., *Agrostis oligoclada* Phil., *Agrostis vaginata* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Agrostis stolonifera L. var. **palustris** (Huds.) Farw.

Sin.: *Agrostis palustris* Huds.

Hierba. Introducida. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, DFE, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG). URY(CAS, MON).

Agrostis stolonifera L. var. **stolonifera**

Sin.: *Agrostis aristulata* Müll. Hal., *Agrostis caespitosa* Gaudich. ex Mirb., nom. nud., *Agrostis nemoralis* Phil., *Agrostis prostrata* Hook. f., *Sporobolus gaudichaudii* (Steud.) Albov

Hierba. Introducida. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, TDF). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA).

Agrostis tandilensis (Kuntze) Parodi

Sin.: *Agrostis hygrometrica* Nees var. *tandilensis* (Kuntze) L.B. Sm. & Wassh., *Agrostis kennedyana* Beetle, *Agrostis koelerioides* Desv. var. *pampeana* Parodi, *Bromidium hygrometricum* (Nees) Nees & Meyen var. *tandilense* Kuntze, *Bromidium ramboi* (Parodi) Rúgolo var. *pubescens* (Kämpf) Rúgolo, *Bromidium tandilense* (Kuntze) Rúgolo, *Deyeuxia hygrometrica* (Nees) Speg. var. *tandilense* (Kuntze) Speg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(ITA).

URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

Notas: Citada por Soreng et al. (2003) para Paraguay sin indicar material de referencia.

Agrostis tolucensis Kunth

Sin.: *Agrostis nana* (J. Presl) Kunth var. *aristata* Griseb.

Hierba. Nativa. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Agrostis trisetoides Steud.

Sin.: *Bromidium trisetoides* (Steud.) Rúgolo

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Agrostis uliginosa Phil.

Sin.: *Agrostis paucinodis* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Agrostis umbellata Colla

Sin.: *Agrostis canina* L. var. *umbellata* (Colla) Kuntze, *Agrostis chilensis* Trin., *Agrostis paradisiaca* Steud., *Agrostis patens* Trin., *Agrostis stricta* Trin., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Agrostis vidalii Phil.

Sin.: *Agrostis buchtienii* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LLA, AIS).

Agrostis vinealis Schreb.

Sin.: *Agrostis canina* L. var. *tenuifolia* (M. Bieb.) Boiss., *Agrostis tenuifolia* M. Bieb., hom. illeg.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU). CHL(COQ).

Aira L., nom. cons.

Aira caryophyllea L.

Sin.: *Aspris caryophyllea* (L.) Nash

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

Aira cupaniana Guss.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: URY(LAV, MAL, MON).

Aira elegantissima Schur

Sin.: *Aira capillaris* Host, hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, TUC). BRA(RGS). CHL(VAL, ARA). URY(CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, SJO).

Aira praecox L.

Sin.: *Aspris praecox* (L.) Nash

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS, SCR, TDF). CHL(VAL, LLA, AIS, MAG, JFE). URY(LAV, MON, SJO).

Alopecurus L.

Alopecurus aequalis Sobol.

Sin.: *Alopecurus aequalis* Sobol. f. *fluitans* Parodi, *Alopecurus aequalis* Sobol. f. *foliosus* Parodi, *Alopecurus aequalis* Sobol. f. *notacens* (Hack.) Parodi,

Alopecurus aequalis Sobol. f. *violaceus* (Hack.) Parodi, *Alopecurus aequalis* Sobol. var. *fluitans* (Parodi) Mariano, *Alopecurus aequalis* Sobol. var. *violaceus* (Hack.) Mariano, *Alopecurus aristulatus* Michx., *Alopecurus fulvus* Sm., *Alopecurus fulvus* Sm. f. *violaceus* Hack., *Alopecurus geniculatus* L. var. *aristulatus* (Michx.) Torr.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Alopecurus bonariensis Parodi & Thell.

Sin.: *Alopecurus antarcticus* Vahl var. *brachyatherus* Parodi, *Alopecurus magellanicus* Lam. var. *brachyatherus* (Parodi) Mariano

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI, LPA, SFE). URY(CAS).

Alopecurus geniculatus L. var. **geniculatus**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

Alopecurus geniculatus L. var. **patagonicus** Parodi

Hierba. Endémica. 300-600 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Alopecurus heleochloides Hack.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(COQ, MAG, RME).

Alopecurus hitchcockii Parodi

Hierba. Nativa. 3700-4000 m.

Países: ARG(JUJ).

Alopecurus lechleri Steud.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LSR, LLA).

Alopecurus magellanicus Lam. var. **bracteatus** (Phil.) Mariano

Sin.: *Alopecurus antarcticus* Vahl var. *bracteatus* (Phil.) Parodi, *Alopecurus bracteatus* Phil.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, LSR, LLA, AIS, MAG).

Alopecurus magellanicus Lam. var. **magellanicus**

Sin.: *Alopecurus alpinus* Sm. f. *antarctica* (Vahl) Hack., *Alopecurus alpinus* Sm., hom. illeg., *Alopecurus alpinus* Sm. var. *antarcticus* (Vahl) Macloskie, *Alopecurus alpinus* Sm. var. *aristatus* Hook. f., nom. nud., *Alopecurus antarcticus* Vahl, *Alopecurus triceps* Krause, *Alopecurus variegatus* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Alopecurus myosuroides Huds.

Sin.: *Alopecurus agrestis* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, RNE). CHL(MAG).

Alopecurus pratensis L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: ARG(NEU, RNE, TDF). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Amelichloa Arriaga & Barkworth

Amelichloa ambigua (Speg.) Arriaga & Barkworth

Sin.: *Jarava ambigua* (Speg.) Peñailillo, *Stipa ambigua* Speg., *Stipa dusenii* Hitchc.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, NEU, RNE, SLU, SCR).

Notas: Citada para Uruguay (Rosengurt et al., 1970) sin indicar localidad o material de referencia.

Amelichloa brachychaeta (Godr.)

Arriaga & Barkworth

Sin.: *Achnatherum brachychaetum* (Godr.)

Barkworth, *Jarava brachychaeta* (Godr.)

Peñailillo, *Nassella brachychaeta* (Godr.)

Barkworth, *Stipa brachychaeta* Godr.,

Stipa brachychaeta Godr. f. *minor* Speg.,

Stipa eminens Cav. f. *viridis* Kuntze, *Stipa*

lorentziana Griseb.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Notas: Citada para Uruguay (Soreng et al., 2003) sin indicar material de referencia.

Amelichloa brevipes (E. Desv.) Arriaga & Barkworth

Sin.: *Jarava brevipes* (E. Desv.) Peñailillo,

Stipa brevipes E. Desv., *Stipa hirtiflora*

Hack.

Hierba. Endémica. 200-2400 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, AIS, MAG, RME).

Amelichloa caudata (Trin.) Arriaga & Barkworth

Sin.: *Achnatherum caudatum* (Trin.)

S.W.L. Jacobs & J. Everett, *Jarava*

bertrandii (Phil.) Peñailillo, *Jarava caudata*

(Trin.) Peñailillo, *Stipa amphicarpa* Phil.,

Stipa bertrandii Phil., *Stipa brachychaeta*

Godr. f. *major* Speg., *Stipa caudata* Trin.,

Stipa litoralis Phil.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SFE).

CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME). URY(FLA, MON, SJO).

Ammophila Host

Ammophila arenaria (L.) Link

Sin.: *Ammophila arundinacea* Host, *Arundo arenaria* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, ARA, LLA, MAG).

Amphibromus Nees

Amphibromus quadridentulus (Döll)

Swallen

Sin.: *Avena montevidensis* Hack., *Avena*

quadridentula Döll, *Chascolytrum*

neobulbosum Funez, *Helictotrichon*

quadridentulum (Döll) Renvoize, *Uralespis*

quadridentata Döll

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).

Anatherostipa (Hack. ex Kuntze)

Peñailillo

Anatherostipa brevis (Torres) Peñailillo

Sin.: *Nicoraella brevis* Torres

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Anatherostipa hans-meyeri (Pilg.)

Peñailillo

Sin.: *Stipa hans-meyeri* Pilg.

Hierba. Nativa. 4000-4200 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Anatherum P. Beauv.

Anatherum arenarium (Hack.) Voronts. & E.A. Kellogg

Sin.: *Anatherum virginicum* (Desv. ex Ham.) Desv. var. *arenarium* (Hack.) Roberty, *Andropogon arenarius* Hack., *Andropogon arenarius* Hack. f. *subcompletus* Hack. ex Lindm.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC).

Anatherum barretoii (Norrman & Quarín) Voronts. & E.A. Kellogg

Sin.: *Andropogon barretoii* Norrmann & Quarín

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Anatherum bicornis (L.) P. Beauv.

Sin.: *Andropogon bicornis* L., *Andropogon bicornis* L. var. *absconditus* Hack., *Andropogon bicornis* L. var. *burchellii* Hack., *Andropogon bicornis* L. var. *gracillimus* Hack., *Andropogon bicornis* L. var. *virginicoides* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

Anatherum glaucophyllum (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Voronts. & E.A. Kellogg

Sin.: *Andropogon glaucophyllus* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MON, ROC).

Anatherum glaziovii (Hack.) Voronts. & E.A. Kellogg

Sin.: *Andropogon glaziovii* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON, COA, MIE, SPE).

Anatherum laterale (Nees) Voronts. & E.A. Kellogg

Sin.: *Andropogon brevis* Trin., *Andropogon herzogii* Hack., *Andropogon incanus* Hack., *Andropogon incanus* Hack. var. *lateralis* (Nees) Hack., *Andropogon incanus* Hack. var. *ramosissimus* Hack., *Andropogon incanus* Hack. var. *subtilior* Hack., *Andropogon incanus* Hack. var. *trichocoleus* Hack., *Andropogon lateralis* Nees, *Andropogon lateralis* Nees var. *incanus* (Hack.) Henrard, *Andropogon lateralis* Nees var. *ramosissimus* (Hack.) Henrard, *Andropogon lateralis* Nees var. *trichocoleus* (Hack.) Henrard, *Andropogon subtilior* (Hack.) Norrmann

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, CLA, LAV, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Anatherum leucostachyum (Kunth) Voronts. & E.A. Kellogg

Sin.: *Anatherum domingense* Roem. & Schult., *Andropogon domingense* (Roem. & Schult.) Steud., *Andropogon leucostachyus* Kunth

- Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PAR(AMA, CAU, CON, COA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Anatherum lindmannii (Hack.) Voronts. & E.A. Kellogg

Sin.: *Andropogon lindmannii* Hack.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(CAS, ROC).

Anatherum macrothrix (Trin.) Voronts. & E.A. Kellogg

Sin.: *Andropogon macrothrix* Trin., *Andropogon ternatus* (Spreng.) Nees subsp. *macrothrix* (Trin.) Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(CLA, RIV, TAC).

Anatherum selloanum (Hack.) Voronts. & E.A. Kellogg

Sin.: *Andropogon leucostachyus* Kunth subsp. *selloanus* Hack., *Andropogon selloanus* (Hack.) Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CON, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).

Andropogon L., nom. cons.

Andropogon coloratus Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA).

Andropogon exaratus Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(CEN, COA, GUA).

Andropogon gayanus Kunth

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Andropogon hypogynus Hack.

Sin.: *Andropogon hypogynus* Hack. var. *anatherus* Hack., *Andropogon hypogynus* Hack. var. *conjugens* Hack., *Hypogynium campestre* Nees

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR). PRY(ITA).

Andropogon ternatus (Spreng.) Nees

Sin.: *Andropogon ternatus* (Spreng.) Nees subsp. *genuinus* Hack., nom. inval., *Saccharum ternatum* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SLU). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA). URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Andropogon virgatus Desv. ex Ham.
Sin.: *Andropogon spathiflorus* (Nees) Kunth, *Hypogynium spathiflorum* Nees, *Hypogynium virgatum* (Desv. ex Ham.) Dandy
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN). URY(RIV).

Anthaenantia P. Beauv.

Anthaenantia lanata (Kunth) Benth.
Sin.: *Anthaenantia lanata* (Kunth) Benth. var. *mollis* (Nees) Arechav., *Leptocoryphium lanatum* (Kunth) Nees, *Leptocoryphium lanatum* (Kunth) Nees var. *molle* (Nees) Döll, *Leptocoryphium molle* Nees, *Milium juncooides* Speg., *Milium lanatum* (Kunth) Roem. & Schult., *Paspalum dentatosulcatum* Arechav., *Paspalum lanatum* Kunth
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TYT).

Anthaenantiopsis Mez ex Pilg.

Anthaenantiopsis fiebrigii Parodi
Sin.: *Anthaenantiopsis fiebrigii* Mez, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(AMA).

Anthaenantiopsis perforata (Nees) Parodi
Sin.: *Panicum perforatum* Nees
Hierba. Nativa. 200-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON).

Anthaenantiopsis rojasiana Parodi
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, GUA).

Anthaenantiopsis trachystachya (Nees) Pilg.
Sin.: *Panicum trachystachyum* Nees
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(AMA, CAU).

Anthoxanthum L.

Anthoxanthum juncifolium (Hack.) Veldkamp
Sin.: *Hierochloe juncifolia* (Hack.) Parodi, *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *juncifolia* Hack.
Hierba. Endémica. 0-1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Anthoxanthum moorei (De Paula) N. Villalobos & Finot
Sin.: *Hierochloe moorei* De Paula
Hierba. Endémica.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Anthoxanthum odoratum L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE). URY(CAS, MON).

Anthoxanthum pusillum (Hack. ex Dusén) Veldkamp

Sin.: *Hierochloe pusilla* Hack. ex Dusén
Hierba. Endémica. 100-900 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Anthoxanthum redolens (Vahl) P. Royen var. **guncckelii** (Parodi) N. Villalobos & Finot

Sin.: *Anthoxanthum guncckelii* (Parodi) Veldkamp, *Hierochloe guncckelii* Parodi, *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *guncckelii* (Parodi) Lema, Sahuquillo & Pimentel
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Anthoxanthum redolens (Vahl) P. Royen var. **redolens**

Sin.: *Avena redolens* (Vahl) Pers., *Disarrenum antarcticum* Labill., *Hierochloe antarctica* (Labill.) R. Br., *Hierochloe arenaria* Steud., *Hierochloe magellanica* (Desr.) Hook. f., *Hierochloe magellanica* Hook. f., nom. nud., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *magellanica* (Hook. f.) Macloskie, *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *major* Speg., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *micrantha* Parodi, *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *typica* Parodi, nom. inval., *Hierochloe sorianoii* De Paula, *Holcus redolens* Vahl, *Melica magellanica* Desr., *Savastana antarctica* (Labill.) Speg.
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, BIO, LSR, LLA, AIS, MAG).

Anthoxanthum spicatum (Parodi) Veldkamp
Sin.: *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *spicata* (Parodi) Lema,

Hierochloe spicata Parodi, *Sahuquillo* & Pimentel

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: CHL(ARA, MAG).

Anthoxanthum utriculatum (Ruiz & Pav.) Y. Schouten & Veldkamp var. **altissimum** (Steud.) N. Villalobos & Finot
Sin.: *Anthoxanthum altissimum* (Steud.) Veldkamp, *Hierochloe altissima* Steud., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *altissima* (Steud.) Lema, *Sahuquillo* & Pimentel

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Anthoxanthum utriculatum (Ruiz & Pav.) Y. Schouten & Veldkamp var. **utriculatum**

Sin.: *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *utriculata* (Ruiz & Pav.) Lema, *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth, *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *minor* Desv., *Sahuquillo* & Pimentel, *Torresia utriculata* Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Apera Adans.

Apera interrupta (L.) P. Beauv.

Sin.: *Agrostis interrupta* L.

Hierba. Introducida. 900-1700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(ARA, RME).

Apoclada McClure

Apoclada simplex McClure & L.B. Sm.

Sin.: *Apoclada diversa* McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aristida L.

Aristida achalensis Mez

Sin.: *Aristida achalensis* Mez var. *elongata* Henrard, *Aristida achalensis* Mez var. *tucumana* (Henrard) Henrard, *Aristida decipiens* Henrard, *Aristida mandoniana* Henrard, *Aristida tucumana* Henrard

Hierba. Nativa. 900-3300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Aristida adscensionis L.

Sin.: *Aristida adscensionis* L. f. *modestina* Hack., nom. nud., *Aristida adscensionis* L. var. *brevisetata* Hack., *Aristida adscensionis* L. var. *bromoides* (Kunth) Henrard, *Aristida adscensionis* L. var. *condensata* (Hack.) Henrard, *Aristida adscensionis* L. var. *humilis* (Kunth) Kuntze, *Aristida adscensionis* L. var. *modesta* Hack., *Aristida adscensionis* L. var. *normalis* Kuntze, nom. inval., *Aristida adscensionis* L. var. *scabriflora* Hack., *Aristida bromoides* Kunth, *Aristida coerulescens* Desf., *Aristida dispersa* Trin. & Rupr., *Aristida dispersa* Trin. & Rupr. var. *nana* Trin. & Rupr., *Aristida festucoides* Steud. & Hochst. ex Steud., nom. nud., *Aristida flabellata* Caro, *Aristida flabellata* Caro var. *glabriflora* Caro, *Aristida humilis* Kunth, *Aristida interrupta* Cav., *Aristida nana* Steud., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APY, BOQ).

Aristida antoniana Steud. ex Döll

Sin.: *Aristida amplexifolia* Caro & E.A. Sánchez, *Aristida enodis* Hack.

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Aristida asplundii Henrard var. **asplundii**

Hierba. Nativa. 2400-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Aristida asplundii Henrard var. **pauciflora** Sulekic

Hierba. Endémica. 2400-3100 m.

Países: ARG(SAL).

Aristida brasiliensis Longhi-Wagner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aristida circinalis Lindm.

Sin.: *Aristida acuminata* Hack., *Aristida aristiglumis* Caro, *Aristida leptochaeta* Hack., *Aristida misionum* Mez, *Aristida rosacea* Mez, *Aristida succedanea* Henrard

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Aristida condylifolia Caro

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS). PRY(PAI).

Aristida constricta Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Notas: Citada para Paraguay (Longhi-Wagner, 1998, 1999) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Aristida echinulata Roseng. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(ART, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Aristida ekmaniana HenrardSin.: *Aristida trinii* Henrard

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Aristida filifolia (Arechav.) HerterSin.: *Aristida pallens* Cav. f. *filifolia* Arechav., *Aristida pallens* Cav. f. *rubelliana* Arechav., *Aristida pallens* Cav. var. *patula* Trin. & Rupr., *Aristida rubelliana* (Arechav.) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TYT).

Aristida flaccida Trin. & Rupr.Sin.: *Aristida flaccida* Trin. & Rupr. var. *uniglumis* Döll

Hierba. Nativa. 1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TYT).

Aristida friesii Hack. ex Henrard

Hierba. Nativa. 2900-3400 m.

Países: ARG(SAL).

Aristida hackelii Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(LAV, RNO, SJO, SOR).

Aristida hassleri Hack.Sin.: *Aristida longiramea* J. Presl var. *boliviana* Henrard

Hierba. Nativa.

Países: BRA(RGS). PRY(AMA, COA).

Aristida jubata (Arechav.) HerterSin.: *Aristida pallens* Cav. f. *jubata* Arechav., *Aristida pallens* Cav. var. *major*Döll, nom. superfl., *Aristida pallens* Cav. var. *tragopogon* Trin. & Rupr., *Aristida tragopogon* (Trin. & Rupr.) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, MIE, PAI). URY(ART, CLA, MAL, RIV, TAC).

Aristida laevis (Nees) KunthSin.: *Aristida adscensionis* L. var. *argentina* Hack., *Aristida altissima* Arechav., *Aristida complanata* Trin., *Aristida helleriana* M. Marchi, *Aristida laevis* (Nees) Kunth var. *argentina* (Hack.) Henrard, *Aristida subinterrupta* Arechav., *Aristida subinterrupta* Arechav. var. *argentina* (Hack.) Henrard, *Chaetaria laevis* Nees, *Mujica-Sallés* & R.L. Barbieri

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, JUJ, SAL, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, COL, CLA, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).

Aristida laxa Cav. var. **longiramea** (J. Presl) HenrardSin.: *Aristida longiramea* J. Presl

Hierba. Nativa. 1300-1600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Aristida macrantha Hack.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(AMA).

Aristida macrophylla Hack.Sin.: *Aristida endomelas* Mez, *Aristida hassleri* Hack. var. *aculeolata* Hack., *Aristida kleinii* L.B. Sm., *Aristida subarticulata* Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Aristida megapotamica Spreng. var. **brevipes**

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, PAI).

Aristida megapotamica Spreng. var. **longipes** Henrard

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CON).

Aristida megapotamica Spreng. var. **megapotamica**Sin.: *Aristida implexa* Trin., *Aristida paraguayensis* Lindm., *Aristida sellowii* Mez

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(RIV, TAC).

Aristida mendocina Phil.Sin.: *Aristida cordobensis* Hack., *Aristida inversa* Hack., *Aristida inversa* Hack. f. *macrantha* Parodi, *Aristida mendocina* Phil. var. *macrantha* (Parodi) Henrard

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

Aristida minutiflora Caro var. **glabriflora** Caro

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Aristida minutiflora Caro var. **minutiflora**

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, MEN, SLU, SDE).

Aristida multiramea Hack.Sin.: *Aristida adscensionis* L. var. *laevis* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Aristida murina Cav.

Sin.: *Aristida pallens* Cav. var. *murina* (Cav.) Trin. & Rupr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

Aristida nicorae Sulekic

Hierba. Endémica. 800-1800 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Aristida oligospira (Hack.) Henrard

Sin.: *Aristida riparia* Trin. var. *oligospira* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). PRY(AMA).

Aristida pallens Cav.

Sin.: *Aristida glaberrima* Steud., *Aristida niederleinii* Mez, *Aristida pallens* Cav. var. *geminata* Caro, *Aristida pallens* Cav. var. *genuina* Trin. & Rupr., nom. inval., *Aristida pallens* Cav. var. *intermedia* Trin. & Rupr., *Aristida pallens* Cav. var. *macrochaeta* Hack., *Chaetaria pallens* (Cav.) P. Beauv.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, RNE, SLU, SFE). BRA(PAR, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). URY(ART, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, SJO).

Aristida parodii Henrard

Hierba. Nativa. 500-1800 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Aristida pedroensis Henrard

Hierba. Endémica. 600 m.

Países: ARG(JUU).

Aristida pubescens Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 3000-3600 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Aristida recurvata Kunth

Sin.: *Aristida neesiana* Trin. & Rupr., *Aristida riedeliana* Trin. & Rupr., *Chaetaria recurvata* (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 100-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aristida riograndensis Severo & Boldrini

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS). BRA(RGS).

Aristida riparia Trin.

Sin.: *Aristida implexa* Trin. var. *aequa* Trin. & Rupr., *Aristida planifolia* Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Aristida sayapensis Caro

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SLU).

Aristida spegazzinii Arechav.

Sin.: *Aristida pampeana* Speg., *Aristida spegazzinii* Arechav. f. *colorata* Hack., nom. nud., *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *abbreviata* Hack., *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *genuina* Hack., nom. inval., *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *pallescens* Hack.

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA). URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Aristida subulata Henrard

Hierba. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, RNE, SLU, TUC).

Aristida teretifolia Arechav.

Sin.: *Aristida arechavaletae* Henrard, *Aristida chaseana* Herter, *Aristida intermedia* Arechav., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(ART, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Notas: Citada para Paraguay (Longhi-Wagner, 1998, 1999) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Aristida trachyantha Henrard

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE).

Aristida uruguayensis Henrard var. *laevis* Caro

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI). BRA(RGS). URY(RNO, SAO, SOR, TAC).

Aristida uruguayensis Henrard var. *uruguayensis*

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SDE). BRA(RGS). URY(ART, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Aristida valida Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Notas: Citada para Paraguay (Longhi-Wagner, 1998) sin indicar localidad o ejemplar de referencia.

Aristida venustula Arechav. var. *scabrifolia* Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA).

Aristida venustula Arechav. var. *venustula*

Sin.: *Aristida pallens* Cav. f. *breviaristata* Hack., *Aristida pallens* Cav. var. *tenuifolia*

Nees ex Trin. & Rupr., *Chaetaria pallens* (Cav.) P. Beauv. var. *tenuifolia* Nees

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(CAU, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Aristida venustula Arechav. var. **venustuloides** (Caro) Longhi-Wagner

Sin.: *Aristida venustuloides* Caro

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).

Aristida vexativa Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SFE).

Aristida victoriana Sulekic

Hierba. Endémica. 2900-3500 m.

Países: ARG(SAL).

Arrhenatherum P. Beauv.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. **bulbosum** (Willd.) Spenn.

Sin.: *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl subsp. *bulbosus* (Willd.) Schübl. & G. Martens, *Avena bulbosa* Willd.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(NEU, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. **elatius**

Sin.: *Arrhenatherum avenaceum* (Scop.) P. Beauv., *Avena elatior* L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF). BRA(RGS, SCA).

CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(RNO).

Arthropogon Nees

Arthropogon villosus Nees

Hierba. Nativa. 400-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Arthropogon xerachne Ekman

Hierba. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Arundinella Raddi

Arundinella berteroniana (Schult.)

Hitchc. & Chase

Sin.: *Trichochloa berteroniana* Schult.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(ERI, FOR, SAL). BRA(PAR).

Arundinella hispida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze

Sin.: *Andropogon hispidus* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Arundinella brasiliensis* Raddi

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, PAY, RNO, RIV).

Arundo L.

Arundo donax L.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS,

SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, IPA).

Athroostachys Benth.

Athroostachys capitata (Hook.) Benth.

Sin.: *Merostachys capitata* Hook.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Aulonemia Goudot

Aulonemia amplissima (Nees) McClure

Sin.: *Arundinaria amplissima* Nees

Hierba subleñosa. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Aulonemia aristulata (Döll) McClure

Sin.: *Arundinaria aristulata* Döll, *Sieglingia aristulata* (Döll) Kuntze

Hierba subleñosa. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aulonemia cincta P.L. Viana & Filg.

Liana. Endémica. 700-800 m.

Países: BRA(PAR).

Aulonemia lanciflora McClure & L.B. Sm.

Sin.: *Chusquea effusa* Renvoize, *Colantheia lanciflora* (McClure & L.B. Sm.) McClure

Hierba subleñosa. Nativa. 800-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Austrostipa S.W.L. Jacobs & J. Everett

Austrostipa plumigera (Hughes) S.W.L. Jacobs & J. Everett

Sin.: *Stipa gracilis* (Speg.) Speg., nom. illeg., *Stipa plumigera* Hughes

Hierba. Introducida.
Países: ARG(SAL).

Austrostipa scabra (Lindl.) S.W.L.
Jacobs & J. Everett
Sin.: *Stipa scabra* Lindl.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(IPA).

Avena L.

Avena barbata Pott ex Link
Sin.: *Avena hirsuta* (Roth) Mathieu, hom. illeg., *Avena hirsuta* Moench, *Avena strigosa* Schreb. subsp. *barbata* (Pott ex Link) Thell.
Hierba. Introducida. 0-2300 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE, TUC). BRA(RGS). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(CAS, FLA, LAV, MON, SJO, SOR).

Avena byzantina K. Koch var. *biaristata* (Hack. ex Trab.) Parodi
Sin.: *Avena sativa* L. var. *biaristata* Hack. ex Trab.
Hierba. Introducida. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, ERI, LPA, NEU, RNE, SJU, SLU, TDF).
Notas: Citada para Brasil y Uruguay (Nicora 2009: 118) sin indicar localidad ni ejemplar de referencia.

Avena byzantina K. Koch var. *byzantina*
Sin.: *Avena sterilis* L. subsp. *byzantina* (K. Koch) Thell.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, TDF). URY(MON).

Avena byzantina K. Koch var. *hypomelanathera* (Thell.) Parodi

Sin.: *Avena sterilis* L. f. *hypomelanathera* Thell.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Avena fatua L.
Sin.: *Avena fatua* L. var. *glabrata* Peterm., *Avena fatua* L. var. *intermedia* (T. Lestib.) Lej. & Courtois, *Avena fatua* L. var. *pilosissima* (Gray) Malzev, *Avena fatua* L. var. *vilis* (Wallr.) Hausskn., *Avena intermedia* T. Lestib., *Avena ludoviciana* Durieu var. *glabrescens* Durieu ex Gren. & Godr., *Avena vilis* Wallr.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, IPA). URY(COL, MAL, MON, SOR).

Avena sativa L. var. *chinensis* Döll
Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR).

Avena sativa L. var. *macrathera* (Thell.) Parodi
Sin.: *Avena fatua* L. f. *macrathera* Thell.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(NEU, RNE).

Avena sativa L. var. *montana* Alef.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, SDE, SLU).

Avena sativa L. var. *pilosa* (Koeler) Tab.Morais
Sin.: *Avena fatua* L. var. *transiens* Hausskn.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, DFE, LPA, RNE).

Avena sativa L. var. *sativa*
Sin.: *Avena fatua* L. f. *glaberrima* Thell., *Avena fatua* L. subsp. *sativa* (L.) Thell.,

Avena sativa L. var. *glaberrima* (Thell.) Parodi
Hierba. Introducida. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, MAG).
Notas: Cultivada en Uruguay

Avena sativa L. var. *setulosa* (Thell.) Parodi
Sin.: *Avena fatua* L. f. *setulosa* Thell.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA).

Avena sativa L. var. *subuniflora* (Trab.) E. Morren
Sin.: *Avena fatua* L. var. *subuniflora* Trab.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Avena sterilis L. subsp. *ludoviciana* (Durieu) Nyman
Sin.: *Avena ludoviciana* Durieu, *Avena sterilis* L. var. *ludoviciana* (Durieu) Gillet & Magne
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, SFE, SLU). URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).

Avena sterilis L. subsp. *sterilis*
Sin.: *Avena algeriensis* Trab., *Avena ludoviciana* Durieu var. *psilathera* Thell., *Avena macrocarpa* Moench, *Avena sterilis* L. subsp. *macrocarpa* (Moench) Briq.
Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, SJU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(RME). URY(COL, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).

Avena strigosa Schreb.
Sin.: *Avena strigosa* Schreb. subsp. *glabrescens* Marquand, *Avena strigosa*

Schreb. var. *glabrescens* (Marquand) Thell.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, LLA).

Notas: Cultivada en Uruguay

Avenella M.J. Bluff ex Drejer

Avenella flexuosa (L.) Drejer

Sin.: *Aira flexuosa* L., *Aira flexuosa* L. var. *montana* Brongn., hom. illeg., *Aira versicolor* Roem. & Schult., *Aira vestita* Steud., *Avenella flexuosa* (L.) Parl., comb. illeg., *Deschampsia flexuosa* (L.) Nees, comb. illeg., *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin., *Deschampsia macloviana* Gand., *Deschampsia martinii* Phil., *Deschampsia philippii* Macloskie, *Deschampsia tenella* Phil., hom. illeg., *Deschampsia vestita* (Steud.) Hauman & Parodi, *Lerchenfeldia flexuosa* (L.) Schur, *Podionapus flexuosus* (L.) Dulac, *Salmasia flexuosa* (L.) Bubani

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

Axonopus P. Beauv.

Axonopus arcuatus (Mez) G.A. Black

Sin.: *Paspalum arcuatum* Mez

Hierba. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Axonopus argentinus Parodi

Sin.: *Axonopus argentinus* Parodi f. *hirsutus* Parodi, *Axonopus argentinus* Parodi subsp. *glabripes* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Axonopus argentinus* Parodi subsp. *pubiflorus* (Parodi) Roseng., *Axonopus argentinus* Parodi var. *glabriflorus* Parodi, *Axonopus argentinus*

Parodi var. *glabripes* Parodi, *Axonopus hagenbeckianus* (Kuntze) Parodi var. *pratensis* G.A. Black, *Axonopus paraguayensis* G.A. Black, *Axonopus ramboi* G.A. Black, *Axonopus suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi var. *pubiflorus* Parodi, B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CLA, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Axonopus aureus P. Beauv.

Hierba. Nativa. 100-2200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Axonopus brasiliensis (Spreng.) Kuhl.

Sin.: *Axonopus bijugus* (Steud.) A. Camus, *Axonopus dissitiflorus* (Trin.) Chase, *Eriochloa brasiliensis* Spreng., *Lappagopsis bijuga* Steud., *Paspalum brasiliense* (Spreng.) Hack., *Paspalum dissitiflorum* Trin.

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, SPE).

Axonopus capillaris (Lam.) Chase

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Axonopus chrysoblepharis (Lag.)

Chase

Sin.: *Cabrera chrysoblepharis* Lag.

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Axonopus comans (Trin. ex Döll) Kuhl.

Sin.: *Paspalum comans* Trin. ex Döll

Hierba. Nativa. 200-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, GUA).

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.

Sin.: *Agrostis compressa* (Sw.) Poir., hom. illeg., *Anastrophus compressus* Schltr. ex Döll, nom. inval., *Anastrophus platycaulis* (Poir.) Nash ex Small, *Axonopus araujo* Valls ex Longhi-Wagner, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *affinis* (Chase) Henderson, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *australis* G.A. Black, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *jesuiticus* Araujo, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *macropodius* (Steud.) G.A. Black, *Axonopus jesuiticus* (Araujo) Valls, *Digitaria platycaulis* (Poir.) Desv., *Milium compressum* Sw., *Paspalum compressum* (Sw.) Nees, comb. superfl., *Paspalum compressum* (Sw.) Raspail, *Paspalum depressum* Steud., *Paspalum filostachyum* A. Rich. ex Steud., *Paspalum furcatum* Flügge var. *parviflorum* Döll, *Paspalum macropodium* Steud., *Paspalum tristachyon* Lam., *Paspalum uniflorum* Salzm. ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CAS, LAV, MON, RIV, SAO, TAC, TYT).

Axonopus equitans Hitchc. & Chase

Sin.: *Axonopus oteroi* G.A. Black

Hierba. Nativa. 100-400 m.

Países: BRA(PAR).

Axonopus fastigiatus (Nees ex Trin.) Kuhl.

Sin.: *Paspalum fastigiatum* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhl.

Sin.: *Axonopus affinis* Chase, *Axonopus fissifolius* (Raddi) Chase, comb. superfl.,

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhl. var. *coronatus* G.A. Black, *Axonopus stragulus* Chase, *Paspalum compressum* (Sw.) Raspail var. *arenarium* Berton, *Paspalum fissifolium* Raddi

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Axonopus leptostachyus (Flüggé) Hitchc.

Sin.: *Axonopus paranaensis* Parodi, *Axonopus paranaensis* Parodi ex G.A. Black, hom. illeg., *Paspalum leptostachyum* Flüggé

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(ITA).

Axonopus marginatus (Trin.) Chase ex Hitchc.

Sin.: *Axonopus longecilius* (Hack.) Parodi, *Axonopus marginatus* (Trin.) Kuhl., comb. illeg., *Paspalum marginatum* Trin., *Paspalum marginatum* Trin. var. *longecilius* Hack.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Axonopus obtusifolius (Raddi) Chase

Sin.: *Anastrophus obtusifolius* (Raddi) Nash, *Axonopus chaseanus* Herter, nom. illeg., *Paspalum furcatum* Flüggé var. *grandiflorum* Döll, *Paspalum obtusifolium* Raddi

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Axonopus pellitus (Nees ex Trin.) Hitchc. & A. Chase

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Axonopus polystachyus G.A. Black

Sin.: *Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhl. var. *polystachyus* (G.A. Black) L.B. Sm. & Wassh.

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Axonopus pressus (Steud.) Parodi

Sin.: *Axonopus derbyanus* G.A. Black, *Paspalum pressum* Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 200-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, ITA, SPE).

Axonopus purpusii (Mez) Chase

Sin.: *Axonopus anomalus* Swallen, *Axonopus flexilis* (Mez) Henrard, *Paspalum flexile* Mez, *Paspalum platycaulon* Poir. var. *gracilius* Döll, *Paspalum platycaulon* Poir. var. *parviflorum* Döll, *Paspalum purpusii* Mez

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, COA). URY(CLA).

Axonopus rosengurtii G.A. Black

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, DFE). URY(COL, MON, PAY, SAO, SOR).

Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhl.

Sin.: *Panicum columbiense* Kuntze, *Paspalum giganteum* Kuntze, *Paspalum scoparium* Flüggé, *Paspalum tripinnatum* Mez

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Axonopus siccus (Nees) Kuhl.

Sin.: *Axonopus barbatus* (Nees) Kuhl., nom. inval., *Axonopus barbatus* Chase ex

Parodi, hom. illeg., *Axonopus barbiger* (Kunth) Hitchc., *Axonopus barbiger* (Kunth) Hitchc. var. *venturii* G.A. Black, *Axonopus malmei* G.A. Black, *Axonopus rojasii* G.A. Black, *Axonopus siccus* (Nees) Kuhl. var. *laxior* (Döll) G.A. Black, *Axonopus siccus* (Nees) Kuhl. var. *scaber* (Pilg.) G.A. Black, *Axonopus ulei* (Hack.) Dedecca, *Paspalum barbatum* Nees ex Trin., hom. illeg., *Paspalum barbatum* Nees ex Trin. var. *glabrum* Döll, *Paspalum barbatum* Nees ex Trin. var. *laxius* Döll, *Paspalum barbatum* Nees ex Trin. var. *scabrum* Pilg., *Paspalum barbigerum* Kunth, *Paspalum pellitum* Nees ex Trin., *Paspalum siccum* Nees, *Paspalum ulei* Hack.

Hierba. Nativa. 100-2000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, RIV, TAC).

Axonopus succulentus G.A. Black

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, PAI).

Axonopus suffultus (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi

Sin.: *Anthraenantia hagenbeckiana* (Kuntze) K. Schum., *Axonopus chloridiformis* Herter, *Axonopus hagenbeckianus* (Kuntze) Parodi, *Axonopus hagenbeckianus* (Kuntze) Parodi var. *iridaceus* (Mez) G.A. Black, *Axonopus iridaceus* (Mez) Herter, comb. superfl., *Axonopus iridaceus* (Mez) Hitchc. & Chase ex Rojas, *Axonopus pseudochloris* Herter, nom. nud., *Axonopus scoparius* (Flüggé) Kuhl. var. *suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.) Herter, *Axonopus suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.) Henrard, comb. superfl., *Panicum hagenbeckianum* Kuntze, *Panicum suffultum* (J.C. Mikan ex Trin.) Kuntze,

Paspalum iridaceum Mez, *Paspalum suffultum* J.C. Mikan ex Trin.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).

Axonopus uninodis (Hack.) G.A. Black

Sin.: *Axonopus kleinii* L.B. Sm. & Wassh., *Axonopus plumosus* (Hennard) Hennard, *Paspalum plumosum* Hennard, *Paspalum uninode* Hack.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(SCA). PRY(AMA, GUA).

Blepharidachne Hack.

Blepharidachne benthamiana (Hack. ex Kurtz) Hitchc.

Sin.: *Munroa benthamiana* Hack. ex Kurtz

Hierba. Endémica. 400-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

Blepharidachne hitchcockii Lahitte

Hierba. Endémica. 600-1000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

Boldrinia L.N. Silva

Boldrinia parodiana (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) L.N. Silva

Sin.: *Briza parodiana* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Chascolytrum parodianum* (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Matthei

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(LAV, MAL).

Bothriochloa Kuntze

Bothriochloa alta (Hitchc.) Hennard

Sin.: *Andropogon altus* Hitchc., *Bothriochloa alta* (Hitchc.) Cabrera, comb. superfl.

Hierba. Nativa. 0-2900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE).

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

Sin.: *Amphilophis barbinodis* (Lag.) Nash, *Andropogon barbinodis* Lag., *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *leucopogon* (Nees) Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *barbinodis* (Lag.) Hack., *Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Hennard, comb. superfl., *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck. var. *barbinodis* (DC.) Stuck.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR). PRY(APY). URY(COL).

Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T. Blake

Sin.: *Andropogon bladhii* Retz.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA).

Bothriochloa catharinensis E. Dalmolim & A. Zanin

Hierba. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Bothriochloa edwardsiana (Gould)

Parodi

Sin.: *Andropogon edwardsianus* Gould

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, SAL, SFE). URY(CAS, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

Bothriochloa eurylemma M. Marchi & Longhi-Wagner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SAL, TUC).

Bothriochloa exaristata (Nash) Hennard

Sin.: *Amphilophis exaristatus* D. L. Nash, *Andropogon exaristatus* (Nash) Hitchc., *Andropogon hassleri* Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *hassleri* (Hack.) Ekman, *Andropogon saccharoides* Sw. var. *submuticus* Vasey ex Hack., *Bothriochloa hassleri* (Hack.) Cabrera, comb. superfl., *Bothriochloa hassleri* (Hack.) Hennard

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Bothriochloa imperatoides (Hack.) Herter

Sin.: *Andropogon imperatoides* (Hack.) Lillo, *Andropogon saccharoides* Sw. var. *impratoides* Hack., *Bothriochloa springfieldii* (Gould) Parodi var. *australis* de Wet

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR). CHL(IPA).

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter

Sin.: *Andropogon laguriformis* Griseb., *Andropogon laguroides* DC., *Andropogon laguroides* Lag., nom. illeg., *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *laguroides* (DC.) Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *laguroides* (DC.) Hack., *Bothriochloa*

laguroides (DC.) Herter subsp. *laguroides*, *Bothriochloa laguroides* (DC.) Pilg., comb. superfl., *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *laguroides* (DC.) Beetle, *Deyeuxia megapotamica* Spreng., *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck. var. *laguroides* (DC.) Hack., *Sorghum saccharoides* (Sw.) Kuntze var. *laguroides* (DC.) Kuntze, *Trachypogon laguroides* (DC.) Nees
Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA). PRY(CEN, GUA). URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Bothriochloa longipaniculata (Gould) Allred & Gould
Sin.: *Andropogon saccharoides* Sw. var. *longipaniculatus* Gould, *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *longipaniculata* (Gould) Gould
Hierba. Nativa. 100-2300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SDE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, PHA).

Bothriochloa meridionalis M. Marchi & Longhi-Wagner
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Bothriochloa perforata (Trin. ex E. Fourn.) Herter
Sin.: *Amphilophis perforatus* (Trin. ex E. Fourn.) Nash, *Andropogon perforatus* Trin. ex E. Fourn., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *perforatus* (Trin. ex E. Fourn.) Hack. ex L. H. Dewey, *Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter var. *perforata* (Trin. ex E. Fourn.) Gould, *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck. var. *perforatus* (Trin. ex E. Fourn.) Stuck.
Hierba. Nativa. 600-2100 m.
Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SLU).

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. var. *parvispicula* (Hitchc.) Tovar
Sin.: *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *parvispiculus* Hitchc., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *parvispiculus* (Hitchc.) Standl., *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. subsp. *parvispicula* (Hitchc.) Davidse
Hierba. Nativa. 600-3900 m.
Países: ARG(SAL).

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. var. *saccharoides*
Sin.: *Amphilophis saccharoides* (Sw.) Nash, *Andropogon argenteus* DC., *Andropogon berteronianus* Steud., *Andropogon saccharoides* Sw., *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *typicus* Hack., nom. inval., *Dichanthium saccharoides* (Sw.) Roberty, *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck., *Sorghum saccharoides* (Sw.) Kuntze
Hierba. Nativa. 100-2600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, LPA, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA). PRY(COA). URY(ART, MAL, SOR).

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. subsp. *australis* Scriveri
Hemipífita. Endémica. 100-2600 m.
Países: ARG(COR). CHL(VAL).

Bothriochloa springfieldii (Gould) Parodi
Sin.: *Andropogon springfieldii* Gould
Hierba. Nativa. 200-2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Bothriochloa torreyana (Steud.) Scriveri & Anton

Sin.: *Amphilophis torreyanus* (Steud.) Nash, *Andropogon hassleri* Hack. var. *aristatus* Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *torreyanus* (Steud.) Hack., *Andropogon torreyanus* Steud., *Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter subsp. *torreyana* (Steud.) Allred & Gould, *Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter var. *torreyana* (Steud.) M. Marchi & Longhi-Wagner, *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *torreyana* (Steud.) Gould
Hierba. Nativa. 300-1900 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(MAL).

Bothriochloa velutina M. Marchi & Longhi-Wagner
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

***Bouteloua* Lag.**

Bouteloua aristidoides (Kunth) Griseb.
Sin.: *Bouteloua ciliata* Griseb., *Bouteloua gracilis* Vasey, hom. illeg., *Dinebra aristidoides* Kunth
Hierba. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY.

Bouteloua barbata Lag.
Sin.: *Chondrosum barbatum* (Lag.) Clayton
Hierba. Nativa. 400-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. var. *caespitosa* Gould & Kapadia
Sin.: *Atheropogon acuminatus* E. Fourn., *Bouteloua racemosa* Lag.
Hierba. Nativa. 400-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). URY(PAY).

Bouteloua media (E. Fourn.) Gould & Kapadia

Sin.: *Atheropogon medius* E. Fourn., *Bouteloua brasiliensis* Ekman

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: PRY(AMA). URY(PAY, SOR).

Bouteloua megapotamica (Spreng.) Kuntze

Sin.: *Bouteloua multiseta* (Nees) Griseb., *Bouteloua multiseta* (Nees) Griseb. var. *pallida* Hack., *Eutriana multiseta* Nees, *Pappophorum eutrianoides* Trin. ex Nees, *Pappophorum megapotamicum* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

Bouteloua simplex Lag.

Sin.: *Bouteloua brachyathera* Phil., *Bouteloua humilis* (Kunth) Hieron., *Bouteloua rahmeri* Phil., *Bouteloua simplex* Lag. var. *rahmeri* (Phil.) Henrard, *Bouteloua tenuis* (P. Beauv. ex Kunth) Griseb., *Bouteloua tenuis* (P. Beauv. ex Kunth) Griseb. var. *humilis* Griseb., *Chondrosum simplex* (Lag.) Kunth

Hierba. Nativa. 1000-4600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, VAL).

Brachypodium P. Beauv.

Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.

Sin.: *Bromus distachyos* L., *Trachynia distachya* (L.) Link

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, JFE). URY(ART, CAS, MON, TAC).

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.

Sin.: *Festuca sylvatica* Huds.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(DFE). URY(MON).

Briza L.

Briza itatiaiae Ekman

Sin.: *Chascolytrum itatiaiae* (Ekman) Essi, *Longhi-Wagner* & Souza-Chies

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: BRA(SCA).

Briza maxima L.

Hierba. Introducida. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME, JFE). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, SOR).

Briza media L.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

Briza minor L.

Sin.: *Briza virens* L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

Bromus L., nom. cons.

Bromus alonsae G. Leofanti & M.L. Echeverría

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI).

Bromus araucanus Phil.

Sin.: *Bromus alpestris* Steud., nom. nud., *Bromus araucanus* Phil. var. *obtusiflorus* (Hack.) J.A. Cámara, *Bromus obtusiflorus* Hack.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(ARA, LLA, MAG).

Bromus arvensis L.

Sin.: *Bromus erectus* Huds. var. *arvensis* (L.) Huds., *Forasaccus arvensis* (L.) Bubani, *Serrafalcus arvensis* (L.) Godr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Bromus auleticus Trin. ex Nees

Sin.: *Bromopsis auletica* (Trin. ex Nees) Herter, *Bromus erectus* Huds. var. *auleticus* (Trin. ex Nees) Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Bromus berterioanus Colla

Sin.: *Avena paupercula* Phil., *Bromus barbatooides* Beal, *Bromus bicuspidis* Nees ex Steud., *Bromus leyboldtii* Phil., *Bromus trinii* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *effusa* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *manicata* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *micranthera* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *pallidiflorus* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *stricta* E. Desv., *Danthonia pseudospicata* Müll. Hal., nom. superfl., *Trisetobromus hirtus* (Trin.) Nevski, *Trisetum barbatum* Steud., hom. illeg., *Trisetum hirtum* Trin., *Trisetum*

litorale Phil., *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *effusum* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *litorale* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *manicatum* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *micrantherum* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *pallidiflorum* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.) Louis-Marie var. *strictum* (E. Desv.) Louis-Marie

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME, JFE).

Bromus bonariensis Parodi & J.A. Cámara

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA, SFE).

Bromus brachyanthera Döll var. **brachyanthera**

Sin.: *Bromus uruguayensis* Arechav. var. *glabrescens* Arechav., *Bromus uruguayensis* Arechav. var. *robustior* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Bromus brachyanthera Döll var. **uruguayensis** (Arechav.) J.A. Cámara

Sin.: *Bromopsis uruguayensis* (Arechav.) Herter, *Bromus brachyanthera* Döll subsp. *uruguayensis* (Arechav.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Bromus uruguayensis* Arechav., *Bromus uruguayensis* Arechav. var. *genuinus* Arechav., nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, LAV, MAL, SAO, TAC).

Bromus catharticus Vahl var. **catharticus**

Sin.: *Bromus angustatus* Pilg., *Bromus brevistaratus* (Hook.) Thurb., hom. illeg., *Bromus brongniartii* Kunth, *Bromus haenkeanus* (J. Presl) Kunth, *Bromus preslii* Kunth, *Bromus strictus* Brongn., hom. illeg., *Bromus unioides* (Willd.) Raspail, hom. illeg., *Bromus unioides* Kunth, *Bromus unioides* Kunth f. *chasmogama* Hack., *Bromus unioides* Kunth f. *cleistogama* Hack., nom. inval., *Bromus unioides* Kunth f. subf. *achalensis* Hack., *Bromus unioides* Kunth var. *glaucescens* Nees, *Bromus unioides* Kunth var. *haenkeanus* (J. Presl) Shear, *Bromus unioides* Kunth var. *humilis* Speg., hom. illeg., *Bromus unioides* Kunth var. *micrantha* Speg., *Bromus unioides* Kunth var. *montanus* Hack., *Bromus unioides* Kunth var. *sanjuaninus* Hieron., *Bromus willdenowii* Kunth, *Bromus willdenowii* Kunth var. *haenkeanus* (J. Presl) Shear, *Ceratochloa brevistarata* Hook., *Ceratochloa cathartica* (Vahl) Henrard, comb. illeg., *Ceratochloa cathartica* (Vahl) Herter, *Ceratochloa haenkeana* J. Presl, *Ceratochloa haenkeana* J. Presl var. *patens* Nees, nom. nud., *Ceratochloa haenkeana* J. Presl var. *subspicata* Nees, nom. nud., *Ceratochloa secunda* J. Presl, *Ceratochloa unioides* (Willd.) P. Beauv., *Festuca unioides* Willd., *Forasaccus brevistaratus* (Hook.) Lunell, *Schedonorus unioides* (Kunth) Roem. & Schult., *Tragus unioides* (Willd.) Panz ex B.D. Jacks., nom. nud., *Zerna unioides* (Kunth) Lindm.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,

LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). PRY(CEN, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR).

Bromus catharticus Vahl var. **elatus** (E. Desv.) Planchuelo

Sin.: *Bromus catharticus* Vahl subsp. *stamineus* (E. Desv.) A.N. Massa, *Bromus cebadilla* Steud., *Bromus stamineus* E. Desv., *Bromus unioides* Kunth f. *elatus* (E. Desv.) Allen & Thell. ex Kloos, *Bromus unioides* Kunth var. *elata* E. Desv., *Bromus valdivianus* Phil., *Ceratochloa staminea* (E. Desv.) Stace, *Ceratochloa valdiviana* (Phil.) Holub

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Bromus catharticus Vahl var. **rupestris** (Speg.) Planchuelo & P.M. Peterson

Sin.: *Bromus brevis* Nees ex Steud., *Bromus brevis* Nees ex Steud. subsp. *festucarioides* Covas & Millot, *Bromus unioides* Kunth f. *brevis* (Nees ex Steud.) Kloos, *Bromus unioides* Kunth var. *brevis* (Nees ex Steud.) Hack., *Bromus unioides* Kunth var. *rupestris* Speg., *Ceratochloa brevis* Nees ex B.D. Jacks., nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TUC).

Bromus coloratus Steud.

Sin.: *Bromus coloratus* Steud. var. *vivipara* Speg., *Bromus hackellii* Macloskie, *Bromus patagonicus* Hack.,

hom. illeg., *Bromus patagonicus* Phil., *Bromus unioides* (Willd.) Raspail var. *coloratus* (Steud.) Pilg., *Ceratochloa colorata* (Steud.) Holub

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Bromus commutatus Schrad.

Sin.: *Serrafalcus commutatus* (Schrad.) Bab.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO, SOR).

Bromus erectus Huds.

Sin.: *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., *Bromus collinus* Phil., *Bromus dolichostachys* Phil.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, SAL, SFE). CHL(BIO, MAG).

Bromus flexuosus Planchuelo var. **famatinensis** Planchuelo

Hierba. Endémica. 3000-3400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI).

Bromus flexuosus Planchuelo var. **flexuosus**

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Bromus gunkelii Matthei

Hierba. Endémica. 3100-3800 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Bromus hordeaceus L.

Sin.: *Bromus megapotamicus* Spreng., *Bromus mollis* L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF).

BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Bromus inermis Leyss.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE). URY(COL, SOR).

Bromus japonicus Hoult.

Sin.: *Bromus japonicus* Thunb., nom. superfl., *Bromus patulus* Mert. & W.D.J. Koch, *Serrafalcus patulus* (Mert. & W.D.J. Koch) Parl.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, RNE).

Notas: Citada para Chile (Soreng et al., 2003) sin mencionar ejemplar de referencia

Bromus lanatus Kunth

Sin.: *Bromus oliganthus* Pilg., *Bromus pflanzii* Pilg., *Festuca mollis* Kunth, nom. illeg., *Schenodorus lanatus* (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 3000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR).

Bromus lanceolatus Roth

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(MAU). URY(MAL, PAY, RNO).

Bromus lithobius Trin.

Sin.: *Bromus andinus* Phil., *Bromus andinus* Phil. var. *scabrivalva* Speg., *Bromus chilensis* Trin., *Bromus fonkii* Phil., *Bromus scaber* Phil., *Bromus unioides* Kunth f. *humilis* (E. Desv.) Kloos, *Bromus unioides* Kunth var. *humilis* E. Desv., *Bromus unioides* Kunth var. *pubescens* Hack.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Bromus madritensis L.

Sin.: *Anisantha madritensis* (L.) Nevski, *Festuca madritensis* (L.) Desf.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, JUJ, NEU). CHL(COQ, VAL, MAU, ARA). URY(MAL).

Bromus mango E. Desv.

Sin.: *Bromus burkartii* Muñoz, *Ceratochloa mango* (E. Desv.) Holub

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, AIS, RME).

Bromus modestus Renvoize

Sin.: *Bromus frigidus* Ball, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 3300-4500 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

Bromus parodii Covas & Itria

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(LPA).

Bromus pellitus Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Bromus racemosus L.

Sin.: *Serrafalcus racemosus* (L.) Parl.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, DFE, NEU, SCR). CHL(LLA, MAG).

Notas: Citada para Uruguay (Soreng et al., 2003) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Bromus rigidus Roth

Sin.: *Anisantha rigida* (Roth) Hyl., *Bromus diandrus* Roth var. *rigidus* (Roth) F. Sales, *Bromus madritensis* L. var. *rigidus* (Roth) Bab. ex Syme, *Bromus maximus* Desf.,

Bromus villosus Forssk. var. *rigidus* (Roth) Asch. & Graebn.

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, LPA, MIS, NEU, RNE, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE).

Bromus rubens L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, MEN, NEU).

Bromus scoparius L.

Sin.: *Bromus scoparius* L. var. *villiglumis* Maire & Weiller

Hierba. Introducida. 0-1300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

Bromus secalinus L.

Sin.: *Avena secalina* (L.) Salisb., *Bromus mollis* L. var. *secalinus* (L.) Huds.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Bromus setifolius J. Presl var. **brevifolius** Nees

Sin.: *Bromus macranthos* Meyen ex E. Desv. var. *macranthus* E. Desv., nom. inval., *Bromus macranthos* Meyen, nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Bromus setifolius J. Presl var. **pictus** (Hook. f.) Skottsb.

Sin.: *Bromus macranthos* Meyen ex E. Desv. var. *minor* E. Desv., nom. superfl., *Bromus pictus* Hook. f., *Bromus setifolius* J. Presl var. *pictus* (Hook. f.) J.A. Cámara, comb. superfl.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SJU, SCR). CHL(VAL, MAG, RME).

Bromus setifolius J. Presl var. **setifolius**

Sin.: *Bromus macranthos* E. Desv. var. *setifolius* (J. Presl) E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, AIS, MAG, RME).

Bromus squarrosus L.

Hierba. Introducida. 2000 m.

Países: CHL(BIO, LLA, RME).

Bromus sterilis L.

Sin.: *Anisantha sterilis* (L.) Nevski

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, DFE, NEU, RNE, SFE). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Bromus tectorum L.

Sin.: *Anisantha tectorum* (L.) Nevski

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, ARA, LLA).

Notas: Citada para Uruguay (Rosengurt et al., 1970; Soreng et al., 2003) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Bromus tunicatus Phil.

Sin.: *Bromus culmineus* Phil., *Bromus unioloides* Kunth var. *hirsuta* Speg.

Hierba. Endémica. 1500-3600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Calotheca Desv.

Calotheca brizoides (Lam.) Desv.

Sin.: *Briza brizoides* (Lam.) Kuntze, *Briza elegans* (P. Beauv.) Döll, *Briza patula* Phil., *Briza tandilensis* Parodi, *Bromus brizoides* Lam., *Calotheca elegans* P. Beauv., *Chascolytrum brizoides* (Lam.) Essi, *Longhi-Wagner* & Souza-Chies

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA). URY(CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).

Cambajuva P.L. Viana, L.G.Clark & Filg.

Cambajuva ulei (Hack.) P.L. Viana, L.G.Clark & Filg.

Sin.: *Arundinaria ulei* Hack., *Aulonemia ulei* (Hack.) McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Endémica. 900-2000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Canastra Morrone, Zuloaga, Davidse & Filg.

Canastra aristella (Döll) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum aristellum* Döll

Hierba. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Catabrosa P. Beauv.

Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.

Sin.: *Aira aquatica* L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

x Catanellia L.J. Gillespie & Soreng

x Catanellia werdermannii (Pilg.) L.J. Gillespie & Soreng

Sin.: *Catabrosa latifolia* Phil., nom. nud., *Catabrosa werdermannii* (Pilg.) Nicora & Rúgolo, *Panicularia latifolia* (Phil.) Kuntze, *Phippsia werdermannii* Pilg., *Phippsia werdermannii* Pilg. f. *major* Pilg., *Phippsia werdermannii* Pilg. f. *minor* Pilg.

Hierba. Nativa. 1900-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Catapodium Link

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb.

Sin.: *Demazeria rigida* (L.) Tutin, *Glyceria rigida* (L.) Sm., *Poa rigida* L., *Scleropoa rigida* (L.) Griseb.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SLU, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, SOR).

Cenchrus L.

Cenchrus americanus (L.) Morrone

Sin.: *Panicum americanum* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cenchrus chilensis (E. Desv.) Morrone

Sin.: *Gymnotrix chilensis* E. Desv., *Pennisetum chilense* (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.E. Fr., *Pennisetum chilense* (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.E. Fr. var. *macrophyllum* Parodi, *Pennisetum chilense* Hack. ex Buchtien, nom. nud., *Pennisetum chilense* Hack. ex Buchtien, nom. nud. var. *planifolia* Hack., nom. nud.

Hierba. Nativa. 400-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME).

Cenchrus ciliaris L.

Sin.: *Pennisetum cenchroides* Rich. ex Pers., nom. illeg., *Pennisetum ciliare* (L.) Link

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CHO, GUA, NAS, PHA).

Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone

Sin.: *Kikuyuochloa clandestina* (Hochst. ex Chiov.) H. Scholz, *Pennisetum clandestinum* Hochst. ex Chiov., *Pennisetum longistylum* Hochst. ex A. Rich. var. *clandestinum* (Hochst. ex Chiov.) Chiov., hom. illeg., *Pennisetum longistylum* Hochst. ex A. Rich. var. *clandestinum* (Hochst. ex Chiov.) Leeke

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS). BRA(PAR, RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME, IPA). PRY(CEN). URY(MON).

Cenchrus echinatus L.

Sin.: *Cenchrus crinitus* Mez, *Cenchrus echinatus* Cav., nom. inval.

Hierba. Cosmopolita. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, MAU, LSR, LLA, IPA). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV, SAO).

Cenchrus latifolius (Spreng.) Morrone

Sin.: *Gymnotrix latifolia* (Spreng.) Schult., *Pennisetum latifolium* Spreng., *Pennisetum lechleri* Steud. ex Lechler, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, ITA). URY(CLA, MON, RIV, ROC, SAO).

Cenchrus longisetus M.C. Johnst.

Sin.: *Cenchrus villosus* (R. Br. ex Fresen.) Kuntze, hom. illeg., *Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen.

Hierba. Introducida. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(RME). URY(MON).

Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald

Sin.: *Cenchrus echinatus* L. f. *longispinus* Hack., *Cenchrus pauciflorus* Benth. var. *longispinus* (Hack.) Jansen & Wacht.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(ERI, LRI, SAL). BRA(RGS).

Cenchrus mutilatus Kuntze

Sin.: *Hymenachne montana* Griseb., *Panicum montanum* (Griseb.) B.D. Jacks. ex Lillo, nom. illeg., *Pennisetum montanum* (Griseb.) Hack., *Pennisetum mutilatum* (Kuntze) Leeke, *Pennisetum mutilatum* Hack. ex Kuntze, nom. inval.

Hierba. Nativa. 1500-2400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Cenchrus myosuroides Kunth

Sin.: *Cenchropsis myosuroides* (Kunth) Nash, *Cenchropsis myosuroides* (Kunth) Nash var. *longiseta* (Caro & E.A. Sánchez) J.K. Wipff & R.B. Shaw, *Cenchrus myosuroides* Kunth var. *longisetus* Caro & E.A. Sánchez, *Cenchrus scabridus* Arechav., *Pennisetum myosuroides* (Kunth) Spreng.

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,

MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(AYP, TAR, ATA, MAU). PRY(APY, COA, GUA, ÑEE, NAS, PAI). URY(COL, MON, PAY, RNO, SAO).

Cenchrus nervosus (Nees) Kuntze

Sin.: *Cenchrus nervosus* (Nees) Kuntze var. *ramosus* Kuntze, *Gymnotrix nervosa* Nees, *Pennisetum nervosum* (Nees) Trin.
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE). BRA(PAR). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, COA, ITA, PHA, SPE). URY(MON).

Cenchrus pilcomayensis (Mez) Morrone

Sin.: *Gymnotrix rigida* Griseb. var. *longiseta* Griseb., *Pennisetum frutescens* Leeke, *Pennisetum nervosum* (Nees) Trin. var. *laxiusculum* Hack., *Pennisetum pilcomayense* Mez, *Pennisetum rigidum* (Griseb.) Hack. var. *longisetum* Griseb. ex Hack.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Cenchrus polystachios (L.) Morrone

Sin.: *Panicum polystachion* L., *Pennisetum polystachion* (L.) Schult.

Hierba. Introducida. 1100-0 m.

Países: ARG(CAT, CHA). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone

Sin.: *Pennisetum purpureum* Schumach.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COR, COS, DFE, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, CEN, PAI). URY(ART).

Cenchrus rigidus (Griseb.) Morrone

Sin.: *Gymnotrix rigida* Griseb., *Pennisetum rigidum* (Griseb.) Hack.

Hierba. Endémica. 100-800 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone

Sin.: *Phalaris setacea* Forssk.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COR, COS, ERI, JUJ, MEN).

Cenchrus spinifex Cav.

Sin.: *Cenchrus incertus* M.A. Curtis, *Cenchrus muricatus* Phil., hom. illeg., *Cenchrus pauciflorus* Benth., *Cenchrus pauciflorus* Benth. var. *muricatus* Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, MAU). PRY(CEN). URY(CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Cenchrus tribuloides L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cenchrus tristachyus (Kunth) Kuntze

Sin.: *Gymnotrix tristachya* Kunth, *Pennisetum tristachyum* (Kunth) Spreng., *Pennisetum tristachyum* (Kunth) Spreng. subsp. *boliviense* Chase

Hierba. Nativa. 500-1900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Chascolytrum Desv.

Chascolytrum lamarckianum (Nees) Matthei

Sin.: *Briza fusca* (Parodi) Parodi, *Briza lamarckiana* Nees, *Briza lindmanii* Ekman, *Briza subaristata* Lam. var. *fusca* Parodi

Hierba. Endémica. 100-1200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Chascolytrum paleapiliferum (Parodi) Matthei

Sin.: *Briza paleapilifera* Parodi

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SLU).

Chascolytrum scabrum (Nees ex Steud.) Matthei

Sin.: *Briza scabra* (Nees ex Steud.) Ekman, *Chondrachyrum scabrum* Nees ex Steud.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Notas: Citada para Uruguay (Soreng et al., 2003) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Chascolytrum subaristatum (Lam.) Desv.

Sin.: *Briza berteroniana* Steud., *Briza erecta* Lam., *Briza macrostachya* (J. Presl) Steud., *Briza montevidensis* Trin. ex Steud., nom. nud., *Briza nutans* Lindl. ex Steud., *Briza poiformis* (Spreng.) Kuntze, *Briza reniformis* (J. Presl) Steud., *Briza rotundata* (Kunth) Steud., *Briza sellowii* Nees ex Steud., *Briza stricta* (Hook. & Arn.) Steud., *Briza subaristata* Lam., *Briza subaristata* Lam. var. *interrupta* (Hack. ex Stuck.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Briza triloba* Nees, *Briza triloba* Nees f. *pumila* Hack. ex Kneuck., *Briza triloba* Nees f. *violascens* Hack., *Briza triloba* Nees var. *grandiflora* Döll, *Briza triloba* Nees var. *interrupta* Hack., *Briza triloba* Nees var. *typica* Parodi, nom.

inval., *Briza violascens* Steud., *Bromus rotundatus* Kunth, *Calotheca dilatata* Link, *Calotheca macrostachya* J. Presl, *Calotheca microstachya* J. Presl, *Calotheca montevidensis* Spreng. ex Steud., nom. nud., *Calotheca poiformis* Spreng., *Calotheca reniformis* J. Presl, *Calotheca rotundata* (Kunth) Roem. & Schult., *Calotheca stricta* Hook. & Arn., *Calotheca triloba* (Nees) Kunth, *Chascolytrum coarctatum* Phil., *Chascolytrum erectum* (Lam.) Desv., *Chascolytrum nutans* Lindl. & Nees, *Chascolytrum rotundatum* (Kunth) Kunth, *Chascolytrum strictum* (Hook. & Arn.) E. Desv., *Chascolytrum trilobum* (Nees) E. Desv., *Festuca brizoides* Spreng., *Festuca commersonii* Spreng., nom. superfl., *Festuca erecta* (Lam.) Spreng. ex Kunth, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). PRY(CAU, CON, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Chloris Sw.

Chloris affinis Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica.

Países: ARG(TUC).

Chloris barbata Sw.

Sin.: *Andropogon barbatus* L., hom. illeg., *Chloris inflata* Link, *Chloris paraguayensis* Steud.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, FOR, MIS, SLU, SFE). PRY(PHA).

Chloris castilloniana Lillo & Parodi var. **castilloniana**

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

Chloris castilloniana Lillo & Parodi var. **pubescens** Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Nativa. 300-800 m.

Países: ARG(FOR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU). PRY(APY).

Chloris gayana Kunth

Sin.: *Chloris guaranitica* Parodi

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY).

Chloris halophila Parodi var. **halophila**

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).

Notas: Citada para Brasil y Paraguay (Molina & Rúgolo de Agrasar, 2004) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Chloris halophila Parodi var. **humilis** Chr. Müller

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).

Chloris orthonoton Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Chloris pycnothrix Trin.

Sin.: *Chloris beyrichiana* Kunth, *Chloris humilis* Kunth, *Chloris radiata* (L.) Sw. var. *beyrichiana* (Kunth) Hack., *Gymnopogon*

beyrichianus (Kunth) Parodi, *Gymnopogon haumanii* Parodi, *Gymnopogon radiatus* (L.) Parodi var. *beyrichianus* (Kunth) Parodi

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, COA, GUA, PAI).

Chloris radiata (L.) Sw.

Sin.: *Agrostis radiata* L., *Gymnopogon radiatus* (L.) Parodi

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Notas: Citada para Paraguay (Molina & Rúgolo de Agrasar, 2004) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Chloris sesquiflora Burkart

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS, ERI). PRY(APY).

Chloris truncata R. Br.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(COR, SFE).

Chloris virgata Sw.

Sin.: *Chloris compressa* DC., *Chloris elegans* Kunth

Hierba. Nativa. 200-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR). PRY(APY).

Chrysopogon Trin., nom. cons.

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty

Sin.: *Holcus zizanioides* (L.) Kuntze ex Stuck., *Phalaris zizanioides* L., *Vetiveria zizanioides* (L.) Nash

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COS, MIS). PRY(CEN, PAI).

Chusquea Kunth

Chusquea andina P. Germain & Phil.
Hierba. Endémica. 1800-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ARA).

Chusquea anelythra Nees

Sin.: *Dendragrostis anelythra* Munro, nom. nud.
Hierba subleñosa. Nativa. 700-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Chusquea anelytroides Rupr. ex Döll
Hierba subleñosa. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR).

Chusquea bambusoides (Raddi) Hack.
Sin.: *Chusquea bambusoides* (Raddi) Hack. var. *minor* McClure, *Chusquea gaudichaudii* Kunth, *Nastus brunneus* Desv., *Rettbergia bambusoides* Raddi
Hierba subleñosa. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chusquea capitata Nees

Sin.: *Rettbergia capitata* Döll, nom. inval.
Hierba subleñosa. Nativa. 600-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Chusquea capituliflora Trin.

Hierba subleñosa. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chusquea ciliata Phil.

Hierba subleñosa. Endémica.
Países: CHL(VAL, RME).

Chusquea culeou E. Desv.

Sin.: *Chusquea argentina* Parodi, *Chusquea breviglumis* Phil., *Chusquea culeou* E. Desv. f. *longiramea* Parodi
Hierba subleñosa. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Chusquea cumingii Nees

Hierba subleñosa. Endémica. 0-1600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Chusquea deficiens Parodi

Hierba subleñosa. Nativa. 1000-1800 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Chusquea egluma Guerreiro & Rúgolo

Hierba. Endémica. 2100-2200 m.
Países: ARG(SAL).

Chusquea fernandeziana Phil.

Hierba subleñosa. Endémica. 400-900 m.
Países: CHL(JFE).

Chusquea floribunda Guerreiro & Rúgolo

Hierba. Nativa. 2100-2200 m.
Países: ARG(SAL).

Chusquea gigantea Demoly

Hierba subleñosa. Endémica. 400-1300 m.
Países: CHL(ARA).

Chusquea gracilis McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chusquea hatschbachii L.G.Clark & A. Blong

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Chusquea ibiramae McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Chusquea juergensii Hack.

Sin.: *Chusquea swallenii* McClure & L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Nativa. 400-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, RIV, TYT).

Chusquea kleinii A.C. Mota, R.P. Oliveira & L.G.Clark

Sin.: *Chusquea capituliflora* Trin. var. *pubescens* McClure & L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Nativa. 500-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chusquea leptophylla Nees

Sin.: *Arthrostylidium leptophyllum* (Nees) Döll,
Hierba subleñosa. Nativa. 700-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chusquea lorentziana Griseb.

Hierba subleñosa. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Chusquea macrostachya Phil.

Hierba subleñosa. Endémica. 300-800 m.
Países: CHL(LSR, LLA, AIS).

Chusquea meyeriana Rupr. ex Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chusquea mimosa McClure & L.B. Sm. subsp. *australis* L.G. Clark

Hierba subleñosa. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Chusquea mimosa McClure & L.B. Sm. subsp. *mimosa*

Sin.: *Chusquea elegans* Renvoize,
Hierba subleñosa. Endémica. 200-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chusquea montana Phil. f. **montana**

Hierba subleñosa. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Chusquea montana Phil. f. **nigricans**

(Phil.) Matthei

Sin.: *Chusquea nigricans* Phil.

Hierba subleñosa. Endémica. 500-1000 m.

Países: CHL(ARA, LSR, LLA, AIS).

Chusquea nudiramea L.G. Clark

Hierba subleñosa. Endémica. 200 m.

Países: BRA(SCA).

Chusquea oligophylla Rupr.

Sin.: *Chusquea discolor* Hack., *Chusquea wettsteinii* Hack.

Hierba subleñosa. Nativa. 700-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chusquea oxylepis (Hack.) Ekman

Sin.: *Chusquea bambusoides* (Raddi) Hack. subsp. *oxylepis* Hack.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chusquea pinifolia (Nees) Nees

Sin.: *Arundinaria pinifolia* Nees, *Ludolphia pinifolia* (Nees) A. Dietr.

Hierba subleñosa. Nativa. 700-2300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chusquea quila Kunth

Sin.: *Arundo quila* Molina, *Arundo valdiviana* Molina, *Chusquea parviflora* Phil., *Chusquea parvifolia* Phil., *Chusquea pubescens* Steud., *Chusquea quila* Kunth var. *laxiflora* E. Desv., *Chusquea quila* Kunth var. *longipila* E.G. Camus, *Coliquea quila* (Molina) Steud. ex Bibra, comb. illeg., *Cortaderia quila* (Molina) Stapf, *Moorea quila* (Molina) Stapf, *Nastus*

productus (Pilg.) Holttum, *Oreiostrachys producta* Pilg.

Hierba subleñosa. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Chusquea ramosissima Lindm.

Sin.: *Chusquea affinis* Munro ex E.G. Camus, *Chusquea phacellophora* Pilg.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, MAL, RIV, TAC, TYT).

Chusquea sellowii Rupr.

Hierba subleñosa. Nativa. 1000-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chusquea tenella Nees

Sin.: *Chusquea tenella* Nees var. *latifolia* Dutra, *Chusquea uruguayensis* Arechav.

Hierba subleñosa. Nativa. 200-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, TAC, TYT).

Chusquea tenuiglumis Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(SCA).

Chusquea uliginosa Phil.

Sin.: *Chusquea tenuiflora* Phil.

Hierba subleñosa. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(BIO, LSR, LLA, AIS).

Chusquea urelytra Hack.

Hierba subleñosa. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chusquea valdiviensis E. Desv.

Sin.: *Chusquea intermedia* Steud., nom. nud., *Chusquea palenae* Phil.

Hierba subleñosa. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Chusquea windischii L.G. Clark

Hierba subleñosa. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

Cinnagrostis Griseb.**Cinnagrostis alba** (J. Presl) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **alba**

Sin.: *Calamagrostis alba* (J. Presl) Steud., *Calamagrostis armata* (Döll) Parodi, *Calamagrostis armata* (Döll) Parodi var. *subaristata* Parodi, *Calamagrostis armata* (Döll) Parodi var. *subcontracta* (Döll) Parodi, *Calamagrostis montevidensis* Nees var. *armata* Döll, *Calamagrostis montevidensis* Nees var. *subcontracta* Döll, *Deyeuxia alba* J. Presl subsp. *alba*, *Deyeuxia armata* (Döll) Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS). BRA(RGS, SCA). PRY(SPE). URY(CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Cinnagrostis alba (J. Presl) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **breviaristata** (Rúgolo) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá Sin.: *Deyeuxia alba* J. Presl subsp. *breviaristata* Rúgolo

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR). BRA(RGS). URY(MAL).

Cinnagrostis alba (J. Presl) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **tricholemma** (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barb

Sin.: *Calamagrostis alba* (J. Presl) Steud. subsp. *tricholemma* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Deyeuxia alba* J. Presl subsp. *tricholemma* (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Rúgolo

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(MAL, PAY, SJO).

Cinnagrostis breviaristata (Wedd.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis breviaristata* (Wedd.) Pilg., *Calamagrostis variegata* (Phil.) Kuntze, hom. illeg., *Deyeuxia breviaristata* Wedd., *Deyeuxia mutica* Wedd., *Deyeuxia variegata* Phil.

Hierba. Nativa. 3300-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, RME).

Cinnagrostis brevifolia (J. Presl) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **brevifolia**
Sin.: *Calamagrostis brevifolia* (J. Presl) Steud., *Deyeuxia brevifolia* J. Presl var. *brevifolia*

Hierba. Nativa. 3000-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Cinnagrostis brevifolia (J. Presl) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **expansa** (Rúgolo & Villav.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis brevifolia* (J. Presl) Steud. var. *expansa* (Rúgolo & Villav.) Soreng, *Deyeuxia brevifolia* J. Presl var. *expansa* Rúgolo & Villav.

Hierba. Nativa. 3200-3400 m.
Países: CHL(TAR).

Cinnagrostis cabreræ (Parodi) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **aristulata** (Rúgolo & Villav.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá

Sin.: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var. *aristulata* (Rúgolo & Villav.) Soreng, *Deyeuxia cabreræ* (Parodi) Parodi var. *aristulata* Rúgolo & Villav.

Hierba. Nativa. 3200-4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(ANT, ATA).

Cinnagrostis cabreræ (Parodi) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **cabreræ**
Sin.: *Calamagrostis cabreræ* Parodi, *Deyeuxia cabreræ* (Parodi) Parodi var. *cabreræ*

Hierba. Endémica. 3500-4200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(ANT).

Cinnagrostis cabreræ (Parodi) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **maxima** (Rúgolo) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var. *maxima* (Rúgolo) Soreng, *Deyeuxia cabreræ* (Parodi) Parodi var. *maxima* Rúgolo

Hierba. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Cinnagrostis cabreræ (Parodi) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **trichopoda** (Parodi ex Rúgolo) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var. *trichopoda* (Parodi ex Rúgolo) Soreng, *Deyeuxia cabreræ* (Parodi) Parodi var. *trichopoda* Parodi ex Rúgolo

Hierba. Nativa. 3700-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL). CHL(ANT, ATA).

Cinnagrostis calderillensis (Pilg.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis calderillensis* Pilg., *Deyeuxia calderillensis* (Pilg.) Rúgolo
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Cinnagrostis chrysophylla (Phil.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis chrysophylla* (Phil.) Govaerts, *Deyeuxia chrysophylla* Phil.

Hierba. Nativa. 3700-5300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA).

Cinnagrostis crispa (Rúgolo & Villav.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis crispa* (Rúgolo & Villav.) Govaerts, *Deyeuxia crispa* Rúgolo & Villav.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Cinnagrostis cryptolopha (Wedd.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis cryptolopha* (Wedd.) Hitchc., *Deyeuxia cryptolopha* Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Cinnagrostis curta (Wedd.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis curta* (Wedd.) Hitchc., comb. superfl., *Calamagrostis curta* (Wedd.) Pilg., *Deyeuxia curta* Wedd.
Hierba. Nativa. 4200-5000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Cinnagrostis curvula (Wedd.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis curvula* (Wedd.) Pilg., *Calamagrostis tenuifolia* (Phil.) R.E. Fr., hom. illeg., *Deyeuxia curvula* Wedd., *Deyeuxia tenuifolia* Phil.

Hierba. Nativa. 3300-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Cinnagrostis deserticola (Phil.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá

var. **breviaristata** (Rúgolo & Villav.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis deserticola* (Phil.) Phil. var. *breviaristata* (Rúgolo & Villav.) Soreng, *Deyeuxia deserticola* Phil. var. *breviaristata* Rúgolo & Villav.

Hierba. Nativa. 3400-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Cinnagrostis deserticola (Phil.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
var. **deserticola**

Sin.: *Agrostis canescens* Griseb., hom. illeg., *Calamagrostis deserticola* (Phil.) Phil., *Deyeuxia deserticola* Phil. var. *deserticola*, *Deyeuxia trisetoides* Phil.

Hierba. Nativa. 3600-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Cinnagrostis fiebrigii (Pilg.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis fiebrigii* Pilg., *Deyeuxia fiebrigii* (Pilg.) Rúgolo, *Deyeuxia nardifolia* (Griseb.) Phil. var. *elatior* Túrpe

Hierba. Nativa. 2600-4300 m.

Países: ARG(JUJ, TUC).

Cinnagrostis filifolia (Wedd.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis amoena* (Pilg.) Pilg., *Calamagrostis filifolia* (Wedd.) Pilg., hom. illeg., *Calamagrostis trichophylla* Pilg., *Deyeuxia amoena* Pilg., *Deyeuxia filifolia* Wedd.

Hierba. Nativa. 2700-5200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(ANT).

Cinnagrostis heterophylla (Wedd.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis heterophylla* (Wedd.) Pilg., *Deyeuxia heterophylla* Wedd.

Hierba. Nativa. 3000-4800 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL). CHL(AYP, TAR).

Cinnagrostis hieronymi (Hack.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis hieronymi* Hack., *Deyeuxia hieronymi* (Hack.) Túrpe

Hierba. Nativa. 1100-4500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Cinnagrostis lagurus (Wedd.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis cephalantha* Pilg., *Calamagrostis lagurus* (Wedd.) Pilg., hom. illeg., *Deyeuxia curta* Wedd. var. *longearistata* Túrpe, *Deyeuxia lagurus* Wedd.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cinnagrostis malamalensis (Hack.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis malamalensis* Hack., *Deyeuxia malamalensis* (Hack.) Parodi

Hierba. Nativa. 2700-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cinnagrostis micrathera (E. Desv.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Koeleria micrathera* (E. Desv.) Griseb., *Koeleria philippiana* E. Desv., nom. nud., *Leptophyllochloa micrathera* (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora, *Trisetum araeanthum* Phil., *Trisetum brachyatherum* Phil., *Trisetum depauperatum* Phil., *Trisetum laxiflorum* Phil., *Trisetum laxum* Phil., *Trisetum micratherrum* E. Desv., *Trisetum nemorosum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, JFE).

Cinnagrostis minima (Pilg.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis minima* (Pilg.) Tovar, *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *minima* Pilg., *Deyeuxia minima* (Pilg.) Rúgolo

Hierba. Nativa. 4000-4900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Cinnagrostis orbignyana (Wedd.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis nematophylla* (Wedd.) Pilg., *Calamagrostis orbignyana* (Wedd.) Pilg., *Deyeuxia nematophylla* Wedd., *Deyeuxia orbignyana* Wedd.

Hierba. Nativa. 1200-4300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Cinnagrostis patagonica (Speg.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis patagonica* (Speg.) Macloskie, *Deyeuxia patagonica* Speg.

Hierba. Endémica. 1500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(ARA).

Cinnagrostis polygama Griseb.
Sin.: *Calamagrostis lilloi* Hack., *Calamagrostis lilloi* Hack. f. *grandiflora* Hack., *Calamagrostis polygama* (Griseb.) Parodi, *Deyeuxia polygama* (Griseb.) Parodi

Hierba. Endémica. 1800-3200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cinnagrostis recta (Kunth) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis humboldtiana* Steud., *Calamagrostis recta* (Kunth) Trin. ex Steud., *Deyeuxia recta* Kunth, *Deyeuxia stricta* Kunth

Hierba. Nativa. 3800-4200 m.

Países: ARG(JUJ).

Cinnagrostis reitzii (Swallen) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá

Sin.: *Calamagrostis reitzii* Swallen,
Deyeuxia reitzii (Swallen) Rúgolo
Hierba. Endémica. 1900 m.
Países: BRA(SCA).

Cinnagrostis rigescens (J. Presl) P.M.
Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Agrostis bromidioides* Griseb.,
Agrostis rigescens J. Presl, *Bromidium*
hygrometricum (Nees) Nees & Meyen var.
rigescens (J. Presl) Kuntze, *Bromidium*
hygrometricum (Nees) Nees & Meyen var.
spectabilis (Nees & Meyen) Kuntze,
Bromidium rigescens (J. Presl) Nees &
Meyen, *Calamagrostis cajatambensis*
Pilg., *Calamagrostis rigescens* (J. Presl)
Scribn., *Deyeuxia imberbis* Wedd.,
Deyeuxia rigescens (J. Presl) Túrpe
Hierba. Nativa. 2400-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(AYP, TAR, ATA).

Cinnagrostis rigida (Kunth) P.M.
Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Agrostis antoniana* Griseb., *Arundo*
rigida (Kunth) Poir., *Calamagrostis*
antoniana (Griseb.) D.M. Moore, hom.
illeg., *Calamagrostis antoniana* (Griseb.)
Steud. ex Hitchc., *Calamagrostis*
antoniana Steud. ex Lechl., nom. nud.,
Calamagrostis gusindei Pilg. ex Skotts.,
Calamagrostis rigida (Kunth) Trin. ex
Steud., *Deyeuxia antoniana* (Griseb.)
Parodi, *Deyeuxia gracilis* Wedd.,
Deyeuxia gusindei (Pilg. ex Skotts.)
Parodi, *Deyeuxia rigida* Kunth, *Deyeuxia*
sulcata Wedd.
Hierba. Nativa. 3400-5000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SCR, TDF).
CHL(AYP, TAR, ANT, AIS, MAG).

Cinnagrostis rosea (Griseb.) P.M.
Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Agrostis rosea* Griseb.,
Calamagrostis rosea (Griseb.) Hack.,
Calamagrostis rosea (Griseb.) Hack. f.

typica Hack., nom. inval., *Calamagrostis*
rosea (Griseb.) Hack. var. *viridula* Hack.,
Deyeuxia colorata Beetle, *Deyeuxia rosea*
(Griseb.) Túrpe, comb. superfl.
Hierba. Nativa. 1700-4400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
SAL, TUC).

Cinnagrostis rupestris (Trin.) P.M.
Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis beyrichiana* Nees ex
Döll, *Calamagrostis longearistata* (Wedd.)
Hack. ex Sodiro, *Calamagrostis*
longearistata (Wedd.) Hack. ex Sodiro f.
minor Kämpf, *Calamagrostis longearistata*
(Wedd.) Hack. ex Sodiro var. *pilosa*
Kämpf, *Calamagrostis montevidensis*
Nees var. *linearis* Hack., *Calamagrostis*
rupestris Trin., *Deyeuxia beyrichiana*
(Nees ex Döll) Sodiro, *Deyeuxia*
heterophylla Wedd. var. *elatio* Wedd.,
Deyeuxia longearistata Wedd., *Deyeuxia*
rupestris (Trin.) Rúgolo f. *pilosa* (Kämpf)
Rúgolo, *Deyeuxia rupestris* (Trin.) Rúgolo
var. *minor* (Kämpf) Rúgolo, *Deyeuxia*
rupestris (Trin.) Rúgolo var. *rupestris*
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY(CAS, MON, RIV, ROC, TAC,
TYT).

Cinnagrostis sclerantha (Hack.) P.M.
Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis sclerantha* Hack.,
Calamagrostis spiciformis Hack.,
Deyeuxia sclerantha (Hack.) Rúgolo,
Deyeuxia spiciformis (Hack.) Túrpe
Hierba. Nativa. 2500-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Notas: Citada para Chile (Marticorena &
Quezada, 1985) sin indicar localidad o
material de referencia.

Cinnagrostis setiflora (Wedd.) P.M.
Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá

Sin.: *Calamagrostis setiflora* (Wedd.) Pilg.,
Deyeuxia setiflora Wedd.
Hierba. Nativa. 3600-5000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Cinnagrostis spicigera (J. Presl) P.M.
Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
var. **cephalotes** (Wedd.) P.M. Peterson,
Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis spicigera* (J. Presl)
Steud. var. *cephalotes* (Wedd.) Soreng,
Deyeuxia cephalotes Wedd., *Deyeuxia*
spicigera J. Presl var. *cephalotes* (Wedd.)
Rúgolo & Villav.
Hierba. Nativa. 3700-4700 m.
Países: ARG(LRI). CHL(TAR).

Cinnagrostis spicigera (J. Presl) P.M.
Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
var. **spicigera**
Sin.: *Calamagrostis spicigera* (J. Presl)
Steud., *Deyeuxia obtusata* Wedd.,
Deyeuxia spicigera J. Presl var. *spicigera*,
Deyeuxia subsimilis Wedd.
Hierba. Nativa. 3600-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC). CHL(AYP).

Cinnagrostis tarmensis (Pilg.) P.M.
Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
var. **macrochaeta** (Hack. ex R.E. Fr.)
P.M. Peterson, Soreng, Romasch. &
Barberá
Sin.: *Calamagrostis rosea* (Griseb.) Hack.
var. *macrochaeta* Hack. ex R.E. Fr.,
Calamagrostis tarijensis Pilg.,
Calamagrostis tarmensis Pilg. var.
macrochaeta (Hack.) Soreng, *Deyeuxia*
tarmensis (Pilg.) Sodiro var. *macrochaeta*
(Hack.) Rúgolo, *Deyeuxia tarmensis*
(Pilg.) Sodiro var. *tarijensis* (Pilg.) Villav.
Hierba. Nativa. 2400-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Cinnagrostis trichodonta (Wedd.) P.M.
Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá

var. **hirsuta** (Rúgolo & Villav.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
 Sin.: *Deyeuxia trichodonta* Wedd. var. *hirsuta* Rúgolo
 Hierba. Endémica. 3100-3300 m.
 Países: ARG(SAL).

Cinnagrostis trichodonta (Wedd.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
 var. **trichodonta**
 Sin.: *Calamagrostis trichodonta* (Wedd.) Soreng, *Deyeuxia trichodonta* Wedd. var. *trichodonta*
 Hierba. Nativa. 2600-4300 m.
 Países: ARG(JUU, LRI, SAL).

Cinnagrostis velutina (Nees & Meyen) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **nardifolia** (Griseb.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
 Sin.: *Agrostis nardifolia* Griseb., *Calamagrostis nardifolia* (Griseb.) Hack., *Deyeuxia nardifolia* (Griseb.) Phil., *Deyeuxia scabriuscula* Wedd., *Deyeuxia velutina* Nees & Meyen var. *nardifolia* (Griseb.) Rúgolo
 Hierba. Nativa. 3800-4700 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cinnagrostis velutina (Nees & Meyen) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **velutina**
 Sin.: *Calamagrostis chilensis* (Desv.) R.E. Fr., *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Hauman, hom. illeg., *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Steud., *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Steud. var. *breviculmis* Hauman, *Deyeuxia agrostidea* Phil., *Deyeuxia chilensis* E. Desv., *Deyeuxia velutina* Nees & Meyen var. *velutina*
 Hierba. Nativa. 2300-4900 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, LLA, RME).

Cinnagrostis vicunarum (Wedd.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
 Sin.: *Calamagrostis pentapogonodes* Kuntze, *Calamagrostis pulvinata* Hack., *Calamagrostis spiciformis* Hack. var. *acutiflora* Hack. ex Buchtien, nom. nud., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *abscondita* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *elator* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *humilior* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *setulosa* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *tenuior* Pilg., *Deyeuxia pulvinata* (Hack.) Türpe, *Deyeuxia vicunarum* Wedd., *Deyeuxia vicunarum* Wedd. var. *major* Wedd., nom. nud., *Deyeuxia vicunarum* Wedd. var. *tenuifolia* Wedd.
 Hierba. Nativa. 3200-4900 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Cinnagrostis violacea (Wedd.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **puberula** (Rúgolo & Villav.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
 Sin.: *Calamagrostis violacea* (Wedd.) Hitchc. var. *puberula* (Rúgolo & Villav.) Soreng, *Deyeuxia violacea* Wedd. var. *puberula* Rúgolo & Villav., *Deyeuxia violacea* Wedd. var. *puberula* Wedd., nom. nud.
 Hierba. Nativa. 3200-5000 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Cinnagrostis violacea (Wedd.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **violacea**
 Sin.: *Calamagrostis violacea* (Wedd.) Hitchc., *Deyeuxia violacea* Wedd. var. *violacea*
 Hierba. Nativa. 4000-4900 m.
 Países: ARG(JUU, SAL).

Cinnagrostis viridiflavescens (Poir.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **montevidensis** (Nees) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
 Sin.: *Calamagrostis montevidensis* Nees, *Calamagrostis viridiflavescens* (Poir.) Steud. var. *montevidensis* (Nees) Kämpf, *Deyeuxia flavescens* Clarion ex Spreng., nom. illeg., *Deyeuxia splendens* Brongn., *Deyeuxia viridiflavescens* (Poir.) Kunth var. *montevidensis* (Nees) Cabrera & Rúgolo, *Trisetum preslei* (Kunth) E. Desv.
 Hierba. Nativa. 0-2300 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, LSR). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Cinnagrostis viridiflavescens (Poir.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **viridiflavescens**
 Sin.: *Arundo viridiflavescens* Poir., *Calamagrostis montevidensis* Nees var. *ampliflora* Döll, *Calamagrostis viridiflavescens* (Poir.) Steud., *Deyeuxia viridiflavescens* (Poir.) Kunth var. *viridiflavescens*, *Donax viridiflavescens* (Poir.) Roem. & Schult.
 Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, LSR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, MIE, PAI). URY(COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, ROC, TAC).

Cinnagrostis viridis (Phil.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
 Sin.: *Calamagrostis nemoralis* Kuntze, hom. illeg., *Calamagrostis nemoralis* Phil.,

Calamagrostis viridis (Phil.) Soreng,
Deyeuxia viridis Phil.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, MAG).

Cnidochloa Zuloaga

Cnidochloa longipedicellata (Swallen)
Zuloaga

Sin.: *Panicum longipedicellatum* Swallen
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Coix L.

Coix lacryma-jobi L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(AMA).
Notas: Citada para Uruguay (Rosengurt et al., 1970) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Colanthesia McClure & E.W. Smith

Colanthesia cingulata (McClure & L.B. Sm.) McClure

Sin.: *Aulonemia cingulata* McClure & L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Colanthesia intermedia (McClure & L.B. Sm.) McClure

Sin.: *Aulonemia intermedia* McClure & L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Colanthesia rhizantha (Hack.) McClure
Sin.: *Arundinaria rhizantha* Hack.

Hierba subleñosa. Endémica. 100-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Coleataenia Griseb.

Coleataenia prionitis (Nees) Soreng

Sin.: *Coleataenia gynerioides* Griseb.,
Panicum gynerioides (Griseb.) Pilg.,
Panicum prionitis Nees, *Panicum prionitis* Nees subsp. *gynerioides* (Griseb.)
Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Panicum prionitis* Nees var. *pallidum* Kuntze,
Panicum prionitis Nees var. *varium* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS).
PRY(APA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, FLA, TAC).

Condilorachia P.M. Peterson,
Romasch. & Soreng

Condilorachia bulbosa (Hitchc.) P.M. Peterson, Romasch. & Soreng

Sin.: *Helictotrichon bulbosum* (Hitchc.)
Parodi, *Trisetum bulbosum* Hitchc.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI). CHL(BIO).

Condilorachia juergensii (Hack.) P.M. Peterson, Romasch. & Soreng

Sin.: *Deschampsia juergensii* (Hack.)
Valencia, *Trisetum juergensii* Hack.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cortaderia Stapf, nom. cons.

Cortaderia araucana Stapf

Sin.: *Cortaderia araucana* Stapf var.
fuenzalidae Acevedo, *Cortaderia*

araucana Stapf var. *skottsbergii* Acevedo,
Cortaderia argentea (Nees) Stapf,
Cortaderia dioica (Spreng.) Speg.,
Cortaderia longicauda Hack., *Cortaderia quila* (Nees & Meyen) Stapf var.
patagonica Speg., *Moorea araucana* (Stapf) Stapf

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Cortaderia egmontiana (Roem. & Schult.) M. Lyle ex Connor

Sin.: *Ampelodesmos australis* Brongn. ex
Duperrey, *Arundo egmontiana* Roem. &
Schult., *Arundo pilosa* d'Urv.,
Calamagrostis patula Steud.,
Calamagrostis scirpiformis Phil.,
Cortaderia minima Conert, *Cortaderia pilosa* (d'Urv.) Hack., *Cortaderia pilosa* (d'Urv.) Hack. var. *minima* (Conert)
Nicora, *Gynerium nanum* Phil., *Gynerium pilosum* (d'Urv.) Macloskie, *Phragmites egmontianus* (Roem. & Schult.) Trin. ex Steud., *Poa phragmites* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Cortaderia hieronymi (Kuntze) N.P. Barker & H.P. Linder

Sin.: *Danthonia hieronymi* (Kuntze) Hack.,
Danthonia hieronymi (Kuntze) Hack. var.
pyramidata Pilg. ex Rojas, nom. nud.,
Danthonia hieronymi (Kuntze) Hack. var.
ticta Pilg. ex Rojas, nom. nud.,
Lamprothyrsus hieronymi (Kuntze) Pilg.,
Lamprothyrsus hieronymi (Kuntze) Pilg.
var. *juyuyensis* Pilg., *Lamprothyrsus hieronymi* (Kuntze) Pilg. var. *nervosus* Pilg., *Lamprothyrsus hieronymi* (Kuntze) Pilg. var. *pyramidatus* Pilg.,
Lamprothyrsus hieronymi (Kuntze) Pilg.
var. *tinctus* Pilg., *Lamprothyrsus venturii*

Conert, *Triraphis hieronymi* Kuntze, *Triraphis hieronymi* Kuntze var. *jujuyensis* Kuntze

Hierba. Nativa. 700-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. subsp. **jubata** (Lemoine) Testoni & Villamil

Sin.: *Cortaderia jubata* (Lemoine) Stapf, *Gynerium jubatum* Lemoine

Hierba. Nativa. 1000-3700 m.

Países: ARG(SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. subsp. **selloana**

Sin.: *Arundo dioica* Spreng., hom. illeg., *Arundo selloana* Schult. & Schult. f., *Cortaderia dioica* (Spreng.) Speg., *Gynerium argenteum* Nees

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, IPA). URY(CAS, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR).

Cortaderia speciosa (Nees & Meyen) Stapf

Sin.: *Cortaderia atacamensis* (Phil.) Pilg., *Cortaderia rudiuscula* Stapf, *Gynerium argenteum* Nees var. *parviflorum* E. Desv., *Gynerium argenteum* Nees var. *strictum* E. Desv., *Gynerium atacamense* Phil., *Gynerium quila* (Molina) Nees & Meyen, *Gynerium rudiusculum* (Stapf) Kuntze ex Stuck., *Gynerium speciosum* Nees & Meyen

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT,

ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME, IPA).

Cortaderia vaginata Swallen

Hierba. Endémica. 2000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Corynephorus P. Beauv., nom. cons.

Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.

Sin.: *Aira divaricata* Pourr.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: CHL(BIO).

Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reut.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Cottea Kunth

Cottea pappophoroides Kunth

Hierba. Nativa. 900-2300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Ctenium Panz, nom. cons.

Ctenium brachystachyum (Nees) Kunth

Sin.: *Campulosus brachystachyus* Nees

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Ctenium brevispicatum J.G. Sm.

Sin.: *Ctenium trinii* Ekman

Hierba. Nativa. 1100-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Ctenium cirrosus (Nees) Kunth

Sin.: *Campulosus cirrosus* Nees

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Ctenium polystachyum Balansa

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Cymbopogon Spreng.

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

Sin.: *Andropogon citratus* DC.

Hierba. Introducida. 0-2700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR).

Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cynodon Rich., nom. cons.

Cynodon affinis Caro & E.A. Sánchez

Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *affinis* (Caro & E.A. Sánchez) Romero Zarco

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, BIO, RME). URY(SJO).

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **biflorus** Merino

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, ERI, JUJ, SDE, TUC). BRA(RGS).

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **dactylon**

Sin.: *Capriola dactylon* (L.) Kuntze, *Cynodon aristiglumis* Caro & E.A. Sánchez, *Cynodon aristulatus* Caro & E.A. Sánchez, *Cynodon erectus* J. Presl, *Cynodon pascuus* Nees, *Panicum dactylon* L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, IPA). PRY(COA, GUA). URY(MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR).

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **longiglumis** Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, LPA, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(ITA). URY(MAL, MON, SAO).

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **pilosus** Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Citada para Paraguay (Peterson et al., 2001) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Cynodon distichloides Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CAS, MAL, MON).

Cynodon hirsutissimus (Litard. & Maire) Caro & E.A. Sánchez

Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *hirsutissimus* (Litard. & Maire) Maire, *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *subvar. hirsutissima* Litard. & Maire

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, SFE). URY(MON).

Cynodon incompletus Nees var. **hirsutus** (Stent) de Wet & J.R. Harlan
Sin.: *Cynodon hirsutus* Stent, *Cynodon hirsutus* Stent var. *sesquiflorus* Parodi

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, SLU, SFE, SDE, TUC).

Cynodon laeviglumis Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(LPA).

Cynodon maritimus Kunth var. **breviglumis** Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Cynodon maritimus Kunth var. **grandispiculus** Caro & E.A. Sánchez

Sin.: *Cynodon grandispiculus* Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LRI, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, MON, SJO).

Cynodon maritimus Kunth var. **maritimus**

Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *maritimus* (Kunth) Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY.

Notas: Citada para Chile y Paraguay (Peterson et al., 2001) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Cynodon mucronatus Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Cynodon nitidus Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Cynodon nlemfuensis Vanderyst

Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *sarmentosus* Parodi, *Cynodon parodii* Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TUC). BRA(PAR, RGS).

Cynodon pedicellatus Caro

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MON).

Cynodon plectostachyus (K. Schum.) Pilg.

Sin.: *Leptochloa plectostachya* K. Schum.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APY).

Cynosurus L.

Cynosurus cristatus L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, MEN, NEU, RNE, SLU, TDF). CHL(VAL, BIO, AIS, MAG).

Cynosurus echinatus L.

Hierba. Introducida. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME, JFE). URY(COL, MAL, MON, SJO, SOR).

Dactylis L.

Dactylis glomerata L.

Sin.: *Bromus glomeratus* (L.) Scop., *Festuca glomerata* (L.) All.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(MON).

Notas: Citada para Paraguay (Soreng et al., 2003) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Dactyloctenium Willd.

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

Sin.: *Cynosurus aegyptius* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(PHA). URY(MON).

Danthonia DC., nom. cons.

Danthonia annableae P.M. Peterson & Rúgolo

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Danthonia araucana Phil.

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Danthonia californica Bol. var. **americana** (Scribn.) Hitchc.

Sin.: *Danthonia americana* Scribn., *Danthonia grandiflora* Phil., nom. illeg.

Hierba. Introducida. 100-500 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Danthonia chilensis E. Desv. var. **aureofulva** (E. Desv.) Baeza

Sin.: *Danthonia aureofulva* E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Danthonia chilensis E. Desv. var. **chilensis**

Sin.: *Avena ariguensis* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, JFE).

Danthonia chilensis E. Desv. var. **glabriflora** Nicora

Sin.: *Danthonia calva* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Danthonia cirrata Hack. & Arechav.

Sin.: *Danthonia tandilensis* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, RNE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Danthonia decumbens (L.) DC.

Sin.: *Festuca decumbens* L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(LLA).

Danthonia malacantha (Steud.) Pilg.

Sin.: *Danthonia collina* Phil., *Danthonia octoflora* Phil., *Danthonia oresigena* Phil., *Trisetum malacanthum* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, JFE).

Danthonia melanathera (Hack.) G. Bernardello

Sin.: *Danthonia cirrata* Hack. & Arechav. var. *melanathera* Hack.

Hierba. Endémica. 1200 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Danthonia montevidensis Hack. & Arechav.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COR). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Danthonia rhizomata Swallen

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, ROC, TYT).

Danthonia rugoloana Sulekic

Hierba. Endémica. 3200-3300 m.

Países: ARG(SAL).

Danthonia secundiflora J. Presl subsp. **charruana** (Swallen) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Sin.: *Danthonia charruana* Swallen, *Danthonia dusenii* Ekman var. *charruana* (Swallen) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). URY(FLO, RIV, ROC).

Danthonia secundiflora J. Presl subsp. **mattheii** Baeza

Hierba. Nativa. 1300-2400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Danthonia secundiflora J. Presl subsp. **secundiflora**

Sin.: *Danthonia dusenii* Ekman, *Danthonia filifolia* F.T. Hubb., *Danthonia montana* Döll, *Danthonia quinquenervata* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-3400 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TYT).

Deschampsia P. Beauv.

Deschampsia airiformis (Steud.) Benth. & Hook. f.

Sin.: *Agrostis desvauxii* Phil.,
Deschampsia airiformis (Steud.) Parodi,
comb. superfl., *Trisetum airiforme* Steud.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Deschampsia antarctica E. Desv.

Sin.: *Aira antarctica* Hook. f., hom. illeg.,
Airidium elegantulum Steud.,
Deschampsia elegantula (Steud.) Parodi,
Deschampsia fuegina Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR,
TDF). CHL(MAU, ARA, MAG, RME).

Deschampsia berteriana (Kunth) Trin.

Sin.: *Deschampsia berteriana* (Kunth)
Trin. var. *parvispicula* Parodi,
Deschampsia desvauxii Pilg.,
Monandraira berteriana (Kunth) E. Desv.,
Trisetum berterianum Kunth

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, LLA, MAG, RME).

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.
var. **caespitosa**

Sin.: *Aira caespitosa* L., *Deschampsia*
andina Phil.

Hierba. Nativa. 0-4200 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SJU, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA,
LLA, AIS, MAG, RME).

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.
var. **pulchra** (Nees & Meyen) Nicora

Sin.: *Aira pulchra* (Nees & Meyen) Steud.,
Deschampsia pulchra Nees & Meyen,
Deyeuxia grata Phil.

Hierba. Endémica. 1600-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU).
CHL(LBO, MAU, BIO).

Deschampsia chrysantha (J. Presl)
Saarela var. **chrysantha**

Sin.: *Calamagrostis chrysantha* (J. Presl)
Steud., *Calamagrostis mutica* Steud. ex
Lechl., nom. nud., *Calamagrostis nitida*
Hack., *Deyeuxia chrysantha* J. Presl var.
chrysantha, *Deyeuxia leiopoda* Wedd.,
Stylagrostis chrysantha (J. Presl) Mez

Hierba. Nativa. 3500-5000 m.

Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR,
ANT, COQ).

Deschampsia chrysantha (J. Presl)

Saarela var. **phalaroides** (Wedd.) Saarela
Sin.: *Calamagrostis chrysantha* (J. Presl)
Steud. var. *phalaroides* (Wedd.) Soreng,
Deyeuxia chrysantha J. Presl var.
phalaroides (Wedd.) Villav., *Deyeuxia*
phalaroides Wedd.

Hierba. Nativa. 4100-5000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP,
TAR, ANT).

Deschampsia chrysostachya (E. Desv.)
P.M. Peterson, Soreng, Romasch. &
Barberá

Sin.: *Calamagrostis chrysostachya* (E.
Desv.) Kuntze, *Calamagrostis*
chrysostachya (E. Desv.) V.N. Vassil.,
comb. superfl., *Deyeuxia chrysostachya*
E. Desv.

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(JUU, MEN, SAL, SJU).
CHL(ANT, COQ, VAL, RME).

Deschampsia cordillerarum Hauman

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,
RME).

Deschampsia danthonioides (Trin.)

Munro ex Benth.

Sin.: *Aira danthonioides* Trin.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: CHL(COQ, LBO).

Deschampsia elongata (Hook.) Munro

Sin.: *Aira aciphylla* Franch., *Aira aciphylla*
Franch. var. *pumila* Franch., *Aira elongata*
Hook., *Deschampsia aciphylla* (Franch.)
Speg.

Hierba. Nativa. 500-2800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).
CHL(COQ, ARA, AIS, MAG, RME).

Deschampsia eminens (J. Presl) Saarela

var. **discreta** (Rúgolo & Villav.) P.M.
Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá
Sin.: *Calamagrostis eminens* (J. Presl)
Steud. var. *discreta* (Rúgolo & Villav.)
Soreng, *Deyeuxia eminens* J. Presl var.
discreta Rúgolo & Villav., *Deyeuxia*
leiopoda Wedd. var. *discreta* Wedd., nom.
nud.

Hierba. Nativa. 3900-4500 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Deschampsia eminens (J. Presl) Saarela
var. **eminens**

Sin.: *Agrostis eminens* (J. Presl) Griseb.,
Calamagrostis eminens (J. Presl) Steud.,
Calamagrostis eminens (J. Presl) Steud.
var. *sordida* Kuntze, *Calamagrostis*
eminens (J. Presl) Steud. var. *tunariensis*
Kuntze, *Calamagrostis robusta* (Phil.)
Phil., hom. illeg., *Deyeuxia arundinacea*
Phil., *Deyeuxia eminens* J. Presl var.
eminens, *Deyeuxia robusta* Phil.

Hierba. Nativa. 2900-4800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR,
ANT, ATA, COQ).

Deschampsia eminens (J. Presl) Saarela
var. **fulva** (Griseb.) Saarela

Sin.: *Agrostis fulva* Griseb., *Calamagrostis*
eminens (J. Presl) Steud. f. *brevipila*
Hack. ex Stuck., *Calamagrostis eminens*
(J. Presl) Steud. var. *fulva* (Griseb.)
Soreng, *Calamagrostis eminens* (J. Presl)
Steud. var. *grisebachiana* Kuntze,
Calamagrostis fulva (Griseb.) Kuntze,

Calamagrostis grata Phil., *Deyeuxia eminens* J. Presl f. *brevipila* (Hack.) Türpe, *Deyeuxia eminens* J. Presl var. *fulva* (Griseb.) Rúgolo, *Deyeuxia fulva* (Griseb.) Parodi, *Deyeuxia laxiflora* Phil.

Hierba. Endémica. 3200-4200 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Deschampsia eminens (J. Presl) Saarela var. **inclusa** (Rúgolo) Saarela

Sin.: *Deyeuxia eminens* J. Presl var. *inclusa* Rúgolo

Hierba. Endémica. 3200-4600 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL, SJU).

Deschampsia gayana (Steud.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **gayana**

Sin.: *Aira gayana* Steud., *Calamagrostis erythrostachya* (E. Desv.) Hack., *Calamagrostis gayana* (Steud.) Soreng, *Calamagrostis stipitata* Hitchc., *Deyeuxia erythrostachya* E. Desv. var. *erythrostachya*, *Stylagrostis erythrostachya* (E. Desv.) Mez

Hierba. Endémica. 500-4100 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Deschampsia gayana (Steud.) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **neuquenensis** (Rúgolo) P.M.

Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá Sin.: *Calamagrostis gayana* (Steud.) Soreng var. *neuquenensis* (Rúgolo) Soreng, *Deyeuxia erythrostachya* E. Desv. var. *neuquenensis* Rúgolo

Hierba. Endémica. 1700-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, LLA, MAG, RME).

Deschampsia hackelii (Lillo) Saarela

Sin.: *Calamagrostis hackelii* Lillo, *Deyeuxia hackelii* (Lillo) Parodi

Hierba. Nativa. 3800-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Deschampsia kingii (Hook. f.) E. Desv.

Sin.: *Aira elatior* Steud., *Aira grandiflora* Nees ex Steud., hom. illeg., *Aira kingii* Hook. f., *Deschampsia grandiflora* Macloskie, hom. illeg., *Deschampsia kingii* (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg., *Trisetum dozei* Franch.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

Deschampsia laxa Phil.

Sin.: *Calamagrostis hirthii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(LLA, AIS, MAG).

Deschampsia looseriana Parodi var. **looseriana**

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Deschampsia looseriana Parodi var. **triandra** Parodi

Hierba. Endémica. 500 m.

Países: CHL(RME).

Deschampsia mendocina Parodi

Hierba. Endémica. 1600-1800 m.

Países: ARG(MEN).

Deschampsia micrantha Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Deschampsia monandra Parodi

Sin.: *Deschampsia glauca* (E. Desv.) Parodi, hom. illeg., *Monandraira glauca* E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, ARA, RME).

Deschampsia parvula (Hook. f.) E. Desv.

Sin.: *Aira parvula* Hook. f., *Deschampsia parvula* (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg., *Trisetum parvulum* (Hook. f.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Deschampsia patula (Phil.) Pilg. ex Skottsb.

Sin.: *Deschampsia elegantula* (Steud.) Parodi var. *patula* (Phil.) Parodi, *Monandraira patula* Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG, RME).

Deschampsia setacea (Huds.) Hack.

Sin.: *Aira montana* L. var. *setacea* (Huds.) Huds., *Aira setacea* Huds., *Aristavena setacea* (Huds.) F. Albers & Butzin

Hierba. Introducida. 3400-3600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Deschampsia venustula Parodi

Hierba. Endémica. 900-3400 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, MAG, RME).

Deyeuxia Clarion ex P. Beauv.

Deyeuxia diemii Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis diemii* (Rúgolo) Soreng

Hierba. Endémica. 1200-2000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU).

Deyeuxia pooides (Steud.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis ameghinoi* (Speg.) Hauman, *Calamagrostis fuegiana* Speg., *Calamagrostis hookeri* (Syme) Druce, *Calamagrostis magellanica* Phil., *Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) Gaertn., comb. superfl., *Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) Gaertn. var. *pooides* (Steud.) Hack., *Calamagrostis poaeoides* Steud., *Calamagrostis stricta* (Timm) Koeler, *Deyeuxia ameghinoi* Speg., *Deyeuxia hookeri* (Syme) Druce, *Deyeuxia neglecta* (Ehrh.) Kunth, comb. superfl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Deyeuxia suka (Speg.) Parodi

Sin.: *Calamagrostis suka* Speg.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Dichanthelium (Hitchc. & Chase) Gould

Dichanthelium hebotes (Trin.) Zuloaga

Sin.: *Panicum hebotes* Trin., *Panicum subtiliracemosum* Renvoize, *Panicum subtipaniculatum* Renvoize, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dichanthelium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **cordatum** (Zuloaga & Morrone) Zuloaga

Sin.: *Panicum sabulorum* Lam. var. *cordatum* Zuloaga & Morrone

Hierba. Endémica. 300-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Dichanthelium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **polycladum** (Ekman) Zuloaga

Sin.: *Panicum deltae* Parodi ex Burkart, *Panicum demissum* Trin., *Panicum pencanum* Phil., *Panicum polycladum* Ekman, *Panicum ramosissimum* Trin., *Panicum sabulorum* Lam. var. *polycladum* (Ekman) R.A. Palacios

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO). PRY(CAU, CAA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Dichanthelium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **sabulorum**

Sin.: *Panicum acutatum* Steud., *Panicum fultum* Hack., *Panicum latiglume* Döll, *Panicum latiglume* Döll var. *decalvatum* Döll, *Panicum sabulorum* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). PRY(COA, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).

Dichanthelium sciurotoides (Zuloaga & Morrone) Davidse

Sin.: *Panicum sciurotoides* Zuloaga & Morrone

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Dichanthelium stigmatosum (Trin.) Zuloaga

Sin.: *Panicum stigmatosum* Trin.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dichanthelium superatum (Hack.) Zuloaga

Sin.: *Panicum superatum* Hack.

Hierba. Nativa. 700-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dichanthelium surrectum (Chase ex Zuloaga & Morrone) Zuloaga

Sin.: *Panicum missionum* Mez, hom. illeg., *Panicum surrectum* Chase ex Zuloaga & Morrone

Hierba. Nativa. 500-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

Dichanthium Willemet

Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf

Sin.: *Andropogon annulatus* Forssk.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(SFE).

Dichanthium aristatum (Poir.) C.E. Hubb.

Sin.: *Andropogon aristatus* Poir.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(PHA).

Dichelachne Endl.

Dichelachne micrantha (Cav.) Domin

Sin.: *Stipa micrantha* Cav.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(IPA).

Digitaria Haller, nom. cons.

Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi var. **aequiglumis**

Sin.: *Digitaria campestris* Henrard, *Digitaria chillanensis* Phil. ex Henrard, nom. nud., *Panicum aequiglume* Hack. & Arechav., *Panicum debile* Desf. var. *aequiglume* (Hack. & Arechav.) Hack., *Panicum debile* Phil., nom. illeg., *Panicum ramosum* Arechav., hom. illeg., *Panicum*

tridactylum Phil., *Syntherisma aequiglume* (Hack. & Arechav.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). PRY(APA, CEN, ITA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).

Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.)

Parodi var. **laetevirens** (Mez) Henrard

Sin.: *Digitaria laetevirens* Mez, *Digitaria lanuginosa* (Nees) Henrard, *Paspalum lanuginosum* Nees

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(PHA). URY(CAS, CLA, MON, ROC, SJO).

Digitaria balansae Henrard

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.

Sin.: *Panicum bicornis* (Lam.) Kunth, *Panicum glaucescens* Nees, hom. illeg., *Paspalum bicornis* Lam.

Hierba. Introducida. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, PHA). URY(MON).

Digitaria californica (Benth.) Henrard var. **californica**

Sin.: *Eriachne rigida* Phil., *Panicum californicum* Benth., *Panicum friesii* Hack. ex R.E. Fr., *Trichachne californica* (Benth.) Chase

Hierba. Nativa. 0-2900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,

RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY). URY(MON, SAO, SOR).

Digitaria californica (Benth.) Henrard var. **villosissima** Henrard

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CHO, COA, NAS).

Digitaria catamarcensis Rúgolo

Sin.: *Trichachne catamarcensis* (Rúgolo) Wipff & R.B. Shaw

Hierba. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(CAT).

Digitaria chacoensis (Parodi) Henrard

Sin.: *Digitaria phaeothrix* (Trin.) Parodi var. *chacoensis* Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA).

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

Sin.: *Digitaria abortiva* Reeder, *Digitaria adscendens* (Kunth) Henrard, *Digitaria marginata* Link, *Digitaria tarapacana* Phil., *Panicum adscendens* Kunth, *Panicum ciliare* Retz., *Panicum sanguinale* L. var. *ciliare* (Retz.) Vasey

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, IPA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SOR, TAC).

Digitaria connivens (Trin.) Henrard var. **connivens**

Sin.: *Panicum connivens* Trin.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Digitaria connivens (Trin.) Henrard var. **pilosa** Canto-Dorow & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard

Sin.: *Digitaria bonplandii* Henrard, *Digitaria gerdesii* (Hack.) Parodi, *Digitaria mattogrossensis* (Pilg.) Henrard, *Panicum adustum* Nees var. *mattogrossense* Pilg., *Panicum corynotrichum* Hack., *Panicum gerdesii* Hack., *Panicum gerdesii* Hack. f. *pleostachyum* Hack.

Hierba. Nativa. 800-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, COA, PAI).

Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi

Sin.: *Digitaria lanuginosa* (Nees) Henrard var. *cuyabensis* (Trin.) Henrard, *Panicum cuyabense* Trin., *Syntherisma cuyabense* (Trin.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SDE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CLA, RIV, SAO).

Digitaria enodis (Hack. ex Arechav.) Parodi

Sin.: *Paspalum enode* Hack. ex Arechav.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Digitaria eriantha Steud.

Sin.: *Digitaria decumbens* Stent, *Digitaria eriantha* Steud. subsp. *pentzii* (Stent) Kok, *Digitaria pentzii* Stent

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, JUJ, LPA, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, MIE, PAI, PHA).

Digitaria eriostachya Mez

Sin.: *Digitaria fallens* Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, RIV, TAC).

Digitaria fiebrigii (Hack.) A. Camus

Sin.: *Panicum fiebrigii* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CON, PAI).

Digitaria filiformis (L.) Koeler

Sin.: *Panicum filiforme* L., *Paspalum filiforme* (L.) Flüggé, hom. illeg., *Syntherisma filiforme* (L.) Nash

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APA, AMA).

Digitaria fuscescens (J. Presl) Henrard

Sin.: *Paspalum fuscescens* J. Presl

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA).

Digitaria horizontalis Willd.

Sin.: *Panicum horizontale* (Willd.) G. Mey., *Panicum sanguinale* L. var. *horizontale* (Willd.) Schweinf., *Paspalum oxyanthum* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PHA, SPE).

Digitaria insularis (L.) Fedde

Sin.: *Acicarpa sacchariflora* Raddi, nom. illeg., *Andropogon insularis* L., *Digitaria insularis* (L.) Mez ex Ekman, comb. superfl., *Milium villosum* Sw., nom. superfl., *Panicum insulare* (L.) G. Mey., *Panicum insulare* (L.) G.L.Mey. var. *typicum* Hack., nom. inval., *Panicum*

lanatum Rottb., nom. superfl., *Panicum leucophaeum* Kunth, *Syntherisma insulare* (L.) Millsp., *Trichachne insularis* (L.) Nees, *Tricholaena insularis* (L.) Griseb., *Valota insularis* (L.) Chase

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

Digitaria ischaemum (Schreb.) Mull.

Sin.: *Panicum ischaemum* Schreb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). CHL(BIO, LLA).

Digitaria laxa (Rchb.) Parodi

Sin.: *Panicum recalvum* (Nees) Kunth, *Reimaria laxa* Rchb., *Trichachne recalva* Nees, *Valota laxa* (Rchb.) Hitchc. & Chase

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(CEN, CON, ÑEE, PHA).

Digitaria lehmanniana Henrard var. **dasyantha** Rúgolo

Sin.: *Digitaria nervalis* Henrard

Hierba. Nativa. 1000-1700 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Digitaria leiantha (Hack.) Parodi

Sin.: *Digitaria adusta* (Nees) Griseb. var. *leiantha* (Hack.) Parodi, *Panicum adustum* Nees var. *leianthum* Hack., *Syntherisma leianthum* (Hack.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). PRY(AMA, CON, PAI, PHA).

Digitaria longiflora (Retz.) Pers.

Sin.: *Paspalum longiflorum* Retz.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Digitaria myriostachya (Hack.) Henrard

Sin.: *Panicum myriostachyum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Digitaria nuda Schumacher

Sin.: *Panicum sanguinale* L. var. *digitatum* (Sw.) Hack. ex Urb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, SPE).

Digitaria paraguayensis Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(COA, PAI).

Digitaria phaeothrix (Trin.) Parodi var. **adusta** (Nees) Rúgolo

Sin.: *Digitaria adusta* (Nees) Griseb., *Digitaria adusta* (Nees) Griseb. var. *leucotricha* (Hack.) Parodi, *Digitaria leiantha* (Hack.) Parodi var. *leucotricha* (Hack.) Henrard, *Panicum adustum* Nees, *Panicum adustum* Nees var. *leucotrichum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(AMA, CON, COA, ITA, PAI, SPE). URY(RNO, RIV).

Digitaria phaeothrix (Trin.) Parodi var. **hackelii** (Arechav.) Henrard

Sin.: *Anthraenantia hackelii* Arechav., *Digitaria adusta* (Nees) Griseb. var. *hackelii* (Arechav.) Henrard, *Digitaria arechavaletae* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Panicum hackelii* (Arechav.) Arechav., *Syntherisma hackelii* (Hack.) Chase

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR). BRA(RGS, SCA). URY(FLA, RIV, TAC).

Digitaria phaeothrix (Trin.) Parodi var. **phaeotrix**

Sin.: *Panicum adustum* Nees var. *phaeothrix* (Trin.) Hack., *Panicum ferrugineum* (Nees) Kunth, hom. illeg., *Panicum phaeothrix* Trin., *Trichachne ferruginea* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLA, LAV, ROC, SOR).

Digitaria phaeothrix (Trin.) Parodi var. **saltensis** (Henrard) Rúgolo

Sin.: *Digitaria saltensis* Henrard

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). URY(ART, MON, PAY, SAO).

Digitaria purpurea Swallen

Sin.: *Digitaria dusenii* Chase ex Renvoize

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Digitaria queenslandica Henrard

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Digitaria sacchariflora (Nees) Henrard

Sin.: *Leptocoryphium penicilligerum* Speg., *Panicum insulare* (L.) G.L.Mey. var. *sacchariflorum* (Nees) Hack., *Panicum penicilligerum* (Speg.) Hack., *Panicum sacchariflorum* (Nees) Steud., *Trichachne penicilligera* (Speg.) Parodi, *Trichachne sacchariflora* Nees, *Valota penicilligera* (Speg.) Chase ex Parodi

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CEN, GUA, MIE, SPE). URY(ART, TAC).

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Sin.: *Digitaria plebeia* Phil., *Panicum sanguinale* L., *Panicum sanguinale* L. var. *vulgare* (Schrud.) Döll

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). PRY(APY, APA). URY(CAS, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).

Digitaria sellowii (Müll. Hal.) Henrard

Sin.: *Trichachne sellowii* Müll. Hal.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Digitaria setigera Roth

Hierba. Introducida.

Países: CHL(IPA).

Digitaria similis Beetle ex Gould

Sin.: *Trichachne affinis* Swallen

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON, COA, ÑEE).

Digitaria singularis Mez

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(COA).

Digitaria swalleniana Henrard

Sin.: *Trichachne sericea* Swallen

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, PHA). URY(CAS, COL, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

Digitaria ternata (A. Rich.) Stapf

Sin.: *Cynodon ternatus* A. Rich., *Digitaria argyrostachya* (Steud.) Fernald, *Digitaria argyrostachya* (Steud.) Fernald var. *hirticulmis* Henrard, *Panicum argyrostachyum* Steud., *Paspalum*

ternatum (A. Rich.) Hook. f., *Syntherisma ternatum* (A. Rich.) Newbold

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS).

Digitaria violascens Link

Sin.: *Panicum violascens* (Link) Kunth, *Paspalum chinense* Nees, *Paspalum filiculme* Nees ex Miq., *Paspalum minutiflorum* Steud., hom. illeg., *Syntherisma chinense* (Nees) Hitchc., *Syntherisma violascens* (Link) Nash

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, IPA). PRY(COA).

Dinebra Jacq.

Dinebra panicea (Retz.) P.M. Peterson & N.W. Snow subsp. **brachiata** (Steud.) P.M. Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Eleusine filiformis* Pers., *Festuca filiformis* Lam., hom. illeg., *Leptochloa brachiata* Steud., *Leptochloa filiformis* (Pers.) P. Beauv., *Leptochloa panicea* (Retz.) Ohwi subsp. *brachiata* (Steud.) N.W. Snow

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(CEN).

Dinebra scabra (Nees) P.M. Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Diplachne scabra* (Nees) Nicora, *Leptochloa scabra* Nees

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, FOR). PRY(APY, CEN, PHA).

Diplachne P. Beauv.

Diplachne fusca (L.) P. Beauv. subsp. **muelleri** (Benth.) P.M. Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Diplachne muelleri* Benth., *Diplachne reptatrix* (L.) Druce, *Festuca reptatrix* L., *Leptochloa fusca* (L.) Kunth subsp. *muelleri* (Benth.) N.W. Snow

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(DFE).

Diplachne fusca (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. subsp. **fusca**

Sin.: *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Stapf, hom. illeg., *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Stuck., hom. illeg., *Diplachne malabarica* (L.) Merr., *Festuca fusca* L., *Leptochloa fusca* (L.) Kunth subsp. *fusca*, *Leptochloa malabarica* (L.) Veldkamp, *Ottochloa malabarica* (L.) Dandy, *Poa malabarica* L., *Uralepis fusca* (L.) Steud.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LRI, MIS, RNE, SJU). PRY(APY).

Diplachne fusca (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. subsp. **fascicularis** (Lam.) P.M. Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Cynodon fascicularis* (Lam.) Raspail, *Diplachne fascicularis* (Lam.) P. Beauv., *Diplachne procumbens* (Mühlenb.) Nash, hom. illeg., *Diplachne procumbens* Arechav., *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi var. *procumbens* (Arechav.) Parodi, *Festuca aquatica* Bosc ex Roem. & Schult., nom. inval., *Festuca fascicularis* Lam., *Festuca polystachya* Michx., *Leptochloa fascicularis* (Lam.) A. Gray, *Leptochloa fusca* (L.) Kunth subsp. *fascicularis* (Lam.) N.W. Snow, *Leptochloa polystachya* (Michx.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, SAL, SLU). BRA(RGS). PRY(BOQ, CHO).

Notas: Citado para Chile (Peterson et al., 2001) sin indicar localidad o material de referencia.

Diplachne fusca (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. subsp. **uninervia** (J. Presl) P.M. Peterson & N. Snow

Sin.: *Atropis carinata* Griseb., *Diplachne carinata* (Griseb.) Hack., *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. var. *macrotricha* Hack., *Diplachne procumbens* Arechav., *Diplachne tarapacana* Phil., *Diplachne uninervia* (J. Presl) Hitchc., comb. superfl., *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi, *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi f. *abbreviata* Parodi, *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi var. *procumbens* (Arechav.) Parodi, *Eragrostis uninervia* (J. Presl) Steud., *Leptochloa fusca* (L.) Kunth subsp. *uninervia* (J. Presl) N.W. Snow, *Leptochloa uninervia* (J. Presl) Hitchc. & Chase, *Megastachya uninervia* J. Presl, *Poa uninervia* (J. Presl) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, NAS, PAI, PHA). URY(ART).

Disakisperma Steud.

Disakisperma dubium (Kunth) P.M. Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Chloris dubia* Kunth, *Diplachne dubia* (Kunth) Scribn., *Diplachne mendocina* (Phil.) Kurtz, *Eragrostis mendocina* (Phil.) Jedwabn., *Festuca obtusiflora* Willd. ex Spreng., *Ipnum mendocinum* Phil., *Leptochloa dubia* (Kunth) Nees, *Leptochloa dubia* (Kunth) Nees subsp. *patens* (J. Presl) Steibel & Covas, *Rabdochloa dubia* (Kunth) Kuntze ex Stuck., *Schismus patens* J. Presl

Hierba. Nativa. 100-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Distichlis Raf.

Distichlis acerosa (Griseb.) H.L. Bell & Columbus

Sin.: *Halochloa acerosa* Griseb., *Monanthochloe acerosa* (Griseb.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU, SDE).

Distichlis australis (Speg.) Villamil

Sin.: *Monanthochloe australis* Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Distichlis humilis Phil.

Sin.: *Distichlis misera* Phil., *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *humilis* (Phil.) Kuntze

Hierba. Nativa. 2300-4300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Distichlis laxiflora Hack.

Sin.: *Distichlis scoparia* (Kunth) Arechav. f. *laxiflora* (Hack.) Beetle

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, SAL, SLU, SFE).

Distichlis scoparia (Kunth) Arechav. var. **erinacea** (Beetle) Nicora

Sin.: *Distichlis scoparia* (Kunth) Arechav. f. *erinacea* Beetle

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR).

Distichlis scoparia (Kunth) Arechav. var. **scoparia**

Sin.: *Poa scoparia* Nees ex Kunth, *Uniola scoparia* (Nees ex Kunth) Steud.

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).

Distichlis spicata (L.) Greene var. **spicata**

Sin.: *Distichlis deserticola* Phil., *Distichlis hirsuta* Phil., *Distichlis hirta* Phil., *Distichlis marginata* Phil., *Distichlis maritima* Raf., *Distichlis mendocina* Phil., *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *andina* Beetle, *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *mendocina* (Phil.) Hack., *Distichlis thalassica* (Kunth) E. Desv., *Megastachya thalassica* (Kunth) Roem. & Schult., *Poa thalassica* Kunth, *Uniola spicata* L.

Hierba. Nativa. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO).

Distichlis spicata (L.) Greene var. **stricta** (Torr.) Scribn.

Sin.: *Distichlis araucana* Phil., *Distichlis prostrata* (Kunth) E. Desv., *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *stricta* (Torr.) Beetle, hom. illeg., *Distichlis stricta* (Torr.) Rydb., *Distichlis tenuifolia* Phil., *Distichlis viridis* Phil., *Poa prostrata* Kunth, *Uniola stricta* Torr.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SCR, SFE). CHL(ANT).

Echinochloa P. Beauv., nom. cons.

Echinochloa chacoensis Michael ex Renvoize

Hierba. Nativa. 400-500 m.

Países: ARG(JUU, SFE).

Echinochloa colona (L.) Link

Sin.: *Echinochloa colona* (L.) Link f. *zonalis* (Guss.) Wiegand, *Oplismenus colonus* (L.) Kunth, *Oplismenus muticus* Phil., *Panicum colonum* L., *Panicum colonum* L. f. *maculatum* Arechav.

Hierba. Introducida. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PHA). URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SOR).

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. **crus-galli**

Sin.: *Panicum crus-galli* L.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). PRY(CEN, COA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLA, MON, RIV, ROC, SAO, SOR).

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. **frumentacea** (Link) W. Wight

Sin.: *Echinochloa frumentacea* Link

Hierba. Introducida.

Países: BRA(RGS).

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. **mitis** (Pursh) Peterm.

Sin.: *Panicum crus-galli* L. var. *mite* Pursh

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(MON).

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. **zelayensis** (Kunth) Hitchc.

Sin.: *Oplismenus zelayensis* Kunth

Hierba. Introducida. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, JUJ, SAL). BRA(RGS). CHL(MAU).

Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schult.

Sin.: *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. var. *crus-pavonis* (Kunth) Hitchc., *Oplismenus crus-pavonis* Kunth, *Panicum crus-galli* L. var. *sabulicola* (Nees) Trin.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APY, APA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Echinochloa helodes (Hack.) Parodi

Sin.: *Panicum helodes* (Hack.) Hauman, *Panicum spectabile* Nees ex Trin. var. *gracile* Kuntze ex Hicken, nom. nud., *Panicum spectabile* Nees ex Trin. var. *helodes* Hack., *Pseudechinolaena helodes* (Hack.) Herter

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, CAS, COL, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).

Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch

Sin.: *Panicum crus-galli* L. var. *grandiflorum* Döll, *Panicum oryzoides* Ard.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
PRY(COA).

Echinochloa polystachya (Kunth)
Hitchc. var. **polystachya**

Sin.: *Oplismenus polystachyus* Kunth

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(PHA). URY(COL, MON).

Echinochloa polystachya (Kunth)
Hitchc. var. **spectabilis** (Nees) Mart.
Crov.

Sin.: *Echinochloa spectabilis* (Nees ex Trin.) Link, *Panicum spectabile* Nees ex Trin., *Pseudechinolaena spectabilis* (Nees ex Trin.) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, SCA).
PRY(CEN, ÑEE, PHA). URY(CAS, MON).

Ehrharta Thunb., nom. cons.

Ehrharta longiflora Sm.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(VAL).

Ehrharta stipoides Labill.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(IPA).

Ehrharta villosa Schult. & Schult. f.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Eleusine Gaertn.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Sin.: *Cynosurus indicus* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(AMA, CAA, CEN, GUA). URY(MON, PAY, RNO, TAC).

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.

Sin.: *Cynosurus tristachyos* Lam., *Eleusine indica* (L.) Gaertn. var. *condensata* Döll, *Eleusine oligostachya* Link, *Eleusine tristachya* (Lam.) Kunth, comb. superfl.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). PRY(CEN, MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Elionurus Humb. & Bonpl. ex Willd., nom. cons.

Elionurus ciliaris Kunth

Sin.: *Elionurus tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *ciliaris* (Kunth) Hack.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: PRY(PHA).

Elionurus lividus Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CAN, CEN, COA, SPE).

Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze

Sin.: *Anatherum megapotamicum* Spreng., *Andropogon adustus* Trin., *Andropogon candidus* Trin., *Andropogon dubius* Kunth, nom. superfl., *Andropogon latiflorus* Nees, *Andropogon megapotamicus* Spreng., *Andropogon*

rostratus (Nees) Trin., *Elionurus adustus* (Trin.) Ekman, *Elionurus adustus* (Trin.) Ekman var. *calvescens* (Hack.) Hicken, *Elionurus candidus* (Trin.) Hack., *Elionurus candidus* (Trin.) Hack. var. *bisetosus* Hack. & Lindm., *Elionurus candidus* (Trin.) Hack. var. *latiflorus* (Nees) Roberty, *Elionurus latiflorus* (Nees) Hack., *Elionurus latiflorus* (Nees) Hack. var. *adustus* (Trin.) Hack., *Elionurus latiflorus* (Nees) Hack. var. *calvescens* Hack., *Elionurus latiflorus* (Nees) Hack. var. *gracilescens* Hack., *Elionurus latiflorus* (Nees) Hack. var. *pectinatus* Hack., *Elionurus megapotamicus* (Spreng.) Herter, *Elionurus muticus* (Spreng.) Kuntze var. *calvescens* (Hack.) Hack. ex Kuntze, *Elionurus muticus* (Spreng.) Kuntze var. *gracilescens* (Hack.) Hack. ex Kuntze, *Elionurus planifolius* Renvoize, *Elionurus rostratus* Nees, *Elionurus viridulus* Hack., *Lycurus muticus* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, PHA). URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR).

Elionurus tripsacoides Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Andropogon tripsacoides* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Steud., *Elionurus tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *brevidentatus* Hack., *Elionurus tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *subcandidus* Kuntze

Hierba. Nativa. 400-2800 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(AMA).

Elymus L., nom. cons.

Elymus angulatus J. Presl

Sin.: *Agropyron breviaristatum* Hitchc., *Elymus agropyroides* J. Presl, *Elymus agropyroides* J. Presl var. *brevimucronatus* Hauman, *Elymus albowianus* Kurtz, *Elymus andinus* Poepp. ex Trin., *Elymus antarcticus* Hook. f., *Elymus antarcticus* Hook. f. var. *fulvescens* Kurtz, *Elymus asper* Nees, *Elymus breviaristatus* (Hitchc.) A. Löve, nom. illeg., *Elymus chonoticus* Phil., *Elymus chubutensis* Speg., *Elymus corralensis* Phil., *Elymus gayanus* E. Desv., *Elymus gracilis* Phil., *Elymus hitchcockii* Davidse, *Elymus latiglumis* Phil., *Elymus leptostachyus* Speg., *Elymus muticus* Phil., *Elymus oreophilus* Phil., *Elymus palenae* Phil., *Elymus paposanus* Phil., *Elymus pratensis* Phil., *Elymus rigescens* Poepp. ex Trin., *Elymus uniflorus* Phil., *Elymus vaginatus* Phil., *Elymus valdiviae* Steud., nom. inval., *Elytrigia breviaristata* (Hitchc.) Covas ex J. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia breviaristata* (Hitchc.) Covas, nom. illeg., *Hordeum valdiviae* (Steud.) Schenck, comb. illeg.

Hierba. Nativa. 0-4400 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Elymus x lineariglumis Seberg & G. Petersen

Sin.: *Agropyron elymoides* Hack., *Cockaynea elymoides* (Hack.) Zotov

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MEN, TDF).

Elymus magellanicus (E. Desv.) A. Löve

Sin.: *Agropyron antarcticum* Parodi, *Agropyron araucanum* (Parodi) Nicora, *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult. var. *araucanum* Parodi, *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult. var. *ruizianum* Parodi, *Agropyron fuegianum*

(Speg.) Kurtz, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz f. *submutica* Kurtz, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *brachyatherum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *chaetophorum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *patagonicum* (Speg.) Hauman & Vanderv., *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *patagonicum* (Speg.) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *polystachyum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Macloskie, comb. illeg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *festucoides* (Speg.) Hauman & Vanderv., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *glabrivalva* (Speg.) Macloskie, comb. illeg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *glabrivalva* (Speg.) Hauman & Vanderv., comb. superfl., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *glabrivalva* (Speg.) Macloskie & Dusén, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *lasiopodum* (Speg.) Hauman & Vanderv., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *lasiopodum* (Speg.) Macloskie, comb. illeg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *pubiflorum* (Steud.) Speg. ex Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *secundum* (J. Presl) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi, *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi var. *australe* Parodi, *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi var. *festucoides* (Speg.) Parodi, *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi var. *macrochaetum* (Parodi) Nicora, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *aristatum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *fragile* Parodi, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var.

megastachyum P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *microstachyum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *tridentatum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *trifidum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) Parodi, comb. superfl., *Agropyron remotiflorum* Parodi, *Agropyron remotiflorum* Parodi var. *macrochaetum* Parodi, *Agropyron secundum* J. Presl, *Elymus araucanus* (Parodi) A. Löve, *Elymus fuegianus* (Speg.) A. Löve, *Elymus glaucescens* Seberg, *Elymus notius* A. Löve, *Elymus remotiflorus* (Parodi) A. Löve, *Elytrigia antarctica* (Parodi) Covas, comb. illeg., *Elytrigia araucana* (Parodi) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia fuegiana* (Speg.) Covas, comb. illeg., *Elytrigia fuegiana* (Speg.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia magellanica* (Desv.) Covas, comb. illeg., *Elytrigia patagonica* (Parodi) Covas, comb. illeg., *Elytrigia patagonica* (Speg.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia pubiflora* (Steud.) Tzvelev, *Triticum fuegianum* Speg., *Triticum fuegianum* Speg. var. *patagonicum* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *festucoides* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *glabrivalva* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *lasiopoda* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *patagonicum* (Speg.) De Wild., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *pubiflorum* (Steud.) Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *secundum* (J. Presl) Speg., *Triticum pubiflorum* Steud., *Triticum repens* L. var. *magellanicum* E. Desv., *Triticum secundum* (J. Presl) Kunth

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, SJU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

Elymus mendocinus (Parodi) A. Löve
Sin.: *Agropyron mendocinum* Parodi, *Elytrigia mendocina* (Parodi) Covas, comb. illeg., *Elytrigia mendocina* (Parodi) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Leymus mendocinus* (Parodi) Dubcovs., *Schlatter* & Echaide

Hierba. Endémica. 1600-2700 m.
Países: ARG(MEN).

Elymus patagonicus Speg.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).
CHL(AIS, MAG).

Elymus scabrifolius (Döll) J.H. Hunz.

Sin.: *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult. var. *platense* Parodi, *Agropyron condensatum* J. Presl, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *condensatum* (J. Presl) Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *condensatum* (J. Presl) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var. *scabrifolium* (Doll) Arechav., *Agropyron scabrifolium* (Döll) Parodi, *Elymus brevistaratus* (Hitchc.) A. Löve subsp. *scabrifolius* (Döll) A. Löve, *Elymus parodii* Seberg & G. Petersen, *Elytrigia scabrifolia* (Döll) Covas, comb. illeg., *Elytrigia scabrifolia* (Döll) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Triticum condensatum* (J. Presl) Kunth, *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *condensatum* (J. Presl) Speg., *Triticum repens* L. var. *scabrifolium* Döll

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, NEU, RNE, SFE, TUC).
URY(CAS, COL, MON, PAY, SJO, SOR).

Elymus scabriglumis (Hack.) A. Löve

Sin.: *Agropyron agroelymoides* (Hicken) J.H. Hunz., *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var. *scabriglume* Hack., *Agropyron scabriglume* (Hack.) Parodi, *Agropyron*

tilcarensis J.H. Hunz., *Elymus antarcticus* Hook. f. f. *agroelymoides* Hicken, *Elymus tilcarensis* (J.H. Hunz.) A. Löve, *Elytrigia scabriglumis* (Hack.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia scabriglumis* (Parodi) Covas, comb. illeg., *Elytrigia tilcarensis* (J.H. Hunz.) Covas, comb. illeg., *Elytrigia tilcarensis* (J.H. Hunz.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, TUC).
CHL(ANT, LLA, AIS, MAG).

Elytrigia Desv.

Elytrigia repens (L.) Nevski

Sin.: *Agropyron repens* (L.) P. Beauv., *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var. *maritimum* (Koch & Ziz) Hack., *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var. *vulgare* Doll, *Agropyron subulatum* (Scherb. ex Schweigg. & Körte) Herter, nom. illeg., *Elymus repens* (L.) Gould, *Triticum repens* L., *Triticum repens* L. var. *subulatum* Nees

Hierba. Introducida. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF).
CHL(ARA, LSR, LLA, MAG, RME).

Enneapogon Desv. ex P. Beauv.

Enneapogon desvauxii P. Beauv.

Sin.: *Enneapogon desvauxii* P. Beauv. ex Desv., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 900-3400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Eragrostis Wolf

Eragrostis acutiglumis Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI).
BRA(RGS).
URY(ART, DUR, FLO, FLA, PAY, RNO, SOR, TAC).

Eragrostis airoides Nees

Sin.: *Agrosticula brasiliensis* (Raddi) Herter, *Aira brasiliensis* Raddi, *Airopsis millegrana* Griseb., *Eragrostis triflora* Ekman, *Poa airoides* (Nees) Kunth, hom. illeg., *Sporobolus brasiliensis* (Raddi) Hack.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CEN, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).
URY(ART, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees

Sin.: *Eragrostis ciliaris* (L.) R. Br. var. *patens* Chapm. ex Beal, *Eragrostis plumosa* (Retz.) Link, *Eragrostis tenella* (L.) Roem. & Schult., *Poa amabilis* L., *Poa tenella* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).
PRY(CEN, COA, SPE).

Eragrostis andicola R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 2000-3700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Eragrostis articulata (Schrank) Nees

Sin.: *Eragrostis articulata* (Schrank) Nees var. *eglandulosa* Nicora, *Eragrostis articulata* (Schrank) Nees var. *glabrescens* Henrard, *Eragrostis articulata* (Schrank) Nees var. *pauciflora* Döll, *Eragrostis glareosa* Trin., *Eragrostis neesii* Trin. var. *laxa* Jedwabn., *Eragrostis*

pilosissima Link, *Eragrostis villosa* Salzm. ex Steud., *Poa articulata* Schrank

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, COA, GUA, SPE).

Eragrostis atrovirens (Desf.) Steud.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(IPA).

Eragrostis attenuata Hitchc.

Sin.: *Sporobolus scaber* Phil.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult.

Sin.: *Eragrostis bahiensis* Schrad. ex Schult. f. *riparia* Burkart, *Eragrostis bahiensis* Schrad. ex Schult. var. *contracta* Döll, *Eragrostis bahiensis* Schrad. ex Schult. var. *laxiuscula* Döll, *Eragrostis blepharophylla* Jedwabn., *Eragrostis expansa* Link, *Eragrostis firma* Trin., *Eragrostis macra* Jedwabn., *Eragrostis microstachya* (Link) Link, *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *bahiensis* (Schrad. ex Schult.) Kuntze, *Eragrostis psammodes* Trin., *Eragrostis psammodes* Trin. var. *microstachya* (Link) Döll, *Poa expansa* (Link) Kunth, *Poa microstachya* Link, *Poa psammodes* (Trin.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Eragrostis barrelieri Daveau

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC). URY(CAS, MAL, MON).

Eragrostis cataclasta Nicora

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Notas: Citada para Paraguay (Boechat & Longhi-Wagner, 2001) sin indicar material de referencia.

Eragrostis chiquitaniensis Killeen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch.

Sin.: *Briza eragrostis* L., *Eragrostis argentina* Jedwabn., *Eragrostis cilianensis* (All.) F.T. Hubb., hom. illeg., *Eragrostis major* Host, *Eragrostis megastachya* (Koeler) Link, *Eragrostis megastachya* (Koeler) Link f. *nana* Lorentz & Niederl., *Eragrostis megastachya* (Koeler) Link var. *cilianensis* (All.) Asch. & Graebn., *Eragrostis multiflora* Trin. var. *cilianensis* (All.) Maire, *Erosion cilianense* (All.) Lunell, *Poa cilianensis* All., *Poa megastachya* Koeler

Hierba. Introducida. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY). URY(CLA, COL, MON, PAY, RNO, SAO).

Eragrostis ciliaris (L.) R. Br.

Sin.: *Cynodon ciliaris* (L.) Raspail, *Eragrostis ciliaris* (L.) Nees, comb. illeg., *Macroblepharus contractus* Phil., *Megastachya ciliaris* (L.) P. Beauv., *Poa ciliaris* L.

Hierba. Introducida. 0-1600 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

Sin.: *Eragrostis chloromelas* Steud., *Eragrostis filiformis* (Thunb.) Nees, nom. illeg., *Poa curvula* Schrad.

Hierba. Introducida. 0-2900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, MAG). URY(COL, FLA, SOR, TAC).

Eragrostis hackelii Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA).

Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.

Sin.: *Eragrostis reptans* (Michx.) Nees var. *pygmaea* Döll, *Erosion hypnoides* (Lam.) Lunell, *Megastachya gounii* E. Fourn., *Megastachya hypnoides* (Lam.) P. Beauv., *Neeragrostis hypnoides* (Lam.) Bush, *Poa carinata* Poir., *Poa hypnoides* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PHA). URY(ART, CAS, PAY, ROC, SAO, SOR, TAC).

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.

Sin.: *Airopsis jubata* Griseb., *Diandrochloa glomerata* (Walter) Burkart, *Diandrochloa japonica* (Thunb.) A.N. Henry, *Eragrostis elegans* Nees, *Eragrostis glomerata* (Walter) L.H. Dewey, *Eragrostis interrupta* (Lam.) Döll, *Eragrostis tenella* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. var. *japonica* (Thunb.) Roem. & Schult., *Megastachya glomerata* (Walter) Schult., *Poa glomerata* Walter, *Poa japonica* Thunb., *Roshevitzia japonica* (Thunb.) Tzvelev

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, APA, CON, ÑEE, SPE). URY(ART, PAY, RNO, SAO).

Eragrostis kuschelii Skottsbo.

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(IDE).

Eragrostis lehmanniana Nees

Hierba. Introducida. 500-800 m.

Países: ARG(MEN).

Eragrostis leucosticta Nees ex Döll

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU).

Eragrostis lugens Nees

Sin.: *Eragrostis flaccida* Lindm., *Eragrostis lugens* Nees f. *pallida* Hack., *Eragrostis lugens* Nees subsp. *flaccida* (Lindm.) Hack., *Eragrostis lugens* Nees var. *glabrata* Döll, *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *lugens* (Nees) Griseb., *Poa lugens* (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Eragrostis macrothyrsa Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA). PRY(AMA, CEN, CON).

Eragrostis maypurensis (Kunth) Steud.

Sin.: *Eragrostis acuminata* Döll, *Eragrostis amoena* C. Presl, *Eragrostis lindeniana* Steud., *Eragrostis maypurensis* (Kunth) Steud. var. *densiuscula* Pilg., *Eragrostis*

maypurensis (Kunth) Steud. var. *meratiana* (Kunth) Pilg., *Eragrostis meratiana* (Kunth) Steud., *Eragrostis panamensis* C. Presl, *Megastachya maypurensis* (Kunth) Roem. & Schult., *Megastachya swainsoni* Raddi, *Poa maypurensis* Kunth, *Poa racemosa* Vahl, *Poa squarrosa* Salzm. ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY.

Notas: Citada para Paraguay (Nicora, 1998b) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. **mexicana**

Sin.: *Eragrostis neomexicana* Vasey ex L.H. Dewey, *Eragrostis nigricans* (Kunth) Steud. var. *punensis* Nicora, *Poa chilensis* Moris, hom. illeg., *Poa mexicana* Hornem.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT). URY(FLA, MON, RNO, SJO, TYT).

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. **virescens** (J. Presl) S.D. Koch & Sánchez Vega

Sin.: *Eragrostis cordobensis* Jedwabn., *Eragrostis leptantha* Trin., *Eragrostis rahmeri* Phil., *Eragrostis scabra* Phil., *Eragrostis virescens* J. Presl, *Poa leptantha* (Trin.) Kunth, *Poa virescens* (J. Presl) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). PRY(APY, CAU, CEN, ÑEE). URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SOR).

Eragrostis minor Host

Sin.: *Eragrostis eragrostis* (L.) P. Beauv., nom. inval., *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *minor* (Host) Kuntze, *Eragrostis poaeoides* P. Beauv. ex Roem. & Schult., nom. superfl., *Eragrostis poaeoides* P. Beauv., nom. nud., *Eragrostis poiformis* Link, nom. illeg., *Poa eragrostis* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI). BRA(SCA). URY(MON).

Eragrostis neesii Trin. var. **expansiflora** Nicora

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, MIS, SFE). PRY(GUA).

Eragrostis neesii Trin. var. **lindmanii** (Hack.) Ekman

Sin.: *Eragrostis lindmanii* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, MIE, PAI). URY(CLA, COL, FLA, PAY, RIV, SAO).

Eragrostis neesii Trin. var. **neesii**

Sin.: *Poa neesii* (Trin.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud.

Sin.: *Eragrostis nigricans* (Kunth) Steud. var. *tristis* (Jedwabn.) Pilg., *Eragrostis subatra* Jedwabn., *Eragrostis tristis* Jedwabn., *Megastachya nigricans* (Kunth) Roem. & Schult., *Poa nigricans* Kunth

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Eragrostis orthoclada Hack.

Sin.: *Eragrostis longipila* Hack., *Eragrostis villamontana* Jedwabn.

Hierba. Nativa. 300-1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PAI, PHA).

Eragrostis paniciformis (A. Braun) Steud.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eragrostis pastoensis (Kunth) Trin.

Sin.: *Eragrostis buchtienii* Hack., *Eragrostis montufari* (Kunth) Steud., *Eragrostis virescens* J. Presl f. *major* Hack., *Eragrostis virescens* J. Presl var. *trichophylla* (Benth.) Hack., *Megastachya montufari* (Kunth) Roem. & Schult., *Megastachya pastoensis* (Kunth) Roem. & Schult., *Poa montufari* Kunth, *Poa pastoensis* Kunth

Hierba. Nativa. 1400-3600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(PAI).

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees var. **miserrima** (E. Fourn.) Reeder

Sin.: *Eragrostis purshii* Schrad. ex A. Gray var. *miserrima* E. Fourn., *Eragrostis tephrosanthos* Schult.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, DFE, ERI).

Notas: Citada para Uruguay (Peterson et al., 2001) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees var. **pectinacea**

Sin.: *Eragrostis diffusa* Buckley, *Eragrostis pectinacea* (Michx.) Steud., hom. illeg., *Poa pectinacea* Michx.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, LPA). URY(CAS).

Notas: Citada para Paraguay (Peterson et al., 2001) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Eragrostis perennis Döll

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). URY(PAY, RIV).

Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin.

Sin.: *Eragrostis deserticola* Phil., *Poa peruviana* Jacq.

Hierba. Nativa. 300-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, IDE).

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.

Sin.: *Eragrostis damiensiana* (Bonnet) Thell., *Eragrostis damiensiana* (Bonnet) Thell. var. *condensata* (Hack.) Thell., *Eragrostis gracilis* Schrad., *Eragrostis multicaulis* Steud., *Eragrostis peregrina* Wiegand, *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. subsp. *damiensiana* (Bonnet) Thell., *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *condensata* Hack., *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *damiensiana* Bonnet, *Eragrostis verticillata* (Cav.) P. Beauv., *Poa pilosa* L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, MAU, BIO, MAG, RME). PRY(APA, COA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Eragrostis plana Nees

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

Eragrostis polytricha Nees

Sin.: *Eragrostis floridana* Hitchc., *Eragrostis fragilis* Swallen, *Eragrostis lugens* Nees var. *villosa* Döll, *Eragrostis polytricha* Nees var. *glabrior* Döll, *Eragrostis polytricha* Nees var. *hirsutior* Döll, *Eragrostis trichocolea* Hack. & Arechav. var. *floridana* (Hitchc.) Withersp., *Poa conceptionis* Steud., *Poa polytricha* (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). PRY(AMA, CAN, CON, MIE, PAI). URY(CLA, FLA, LAV, MAL, RNO, RIV, SJO, TAC, TYT).

Eragrostis purpurascens (Spreng.) Schult.

Sin.: *Eragrostis megapotamica* (Spreng.) Schult., *Poa purpurascens* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CON). URY(ART, CAS, CLA, MAL, MON, RIV, ROC, TAC).

Eragrostis pycnantha (Phil.) Parodi ex Nicora

Sin.: *Poa pycnantha* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ATA).

Eragrostis retinens Hack. & Arechav.

Sin.: *Eragrostis retinens* Hack. & Arechav. var. *pergamensis* Parodi

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SFE, SLU). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR, TAC).

Eragrostis rojasii Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU).

Eragrostis rufescens Schult.

Sin.: *Eragrostis acicularis* Trin., *Eragrostis affinis* Salzm. ex Steud., *Eragrostis cuspidata* (Schult.) Link, *Eragrostis multipes* S. Moore, *Eragrostis polyneura* Jedwabn.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Eragrostis seminuda Trin.

Sin.: *Eragrostis barbiglumis* Jedwabn., *Eragrostis seminuda* Trin. var. *hirta* Döll, *Eragrostis seminuda* Trin. var. *pilosissima* Döll, *Poa seminuda* (Trin.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(MIE).

Eragrostis solida Nees

Sin.: *Eragrostis eucampta* Pilg., *Eragrostis mattogrossensis* Pilg., *Eragrostis mattogrossensis* Pilg. f. *glabrescens* Pilg., *Eragrostis rufescens* Schult. var. *spiciramea* Döll, *Eragrostis solida* Nees var. *mattogrossensis* (Pilg.) Pilg., *Poa solida* (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Eragrostis spicata Vasey

Sin.: *Sporobolus tenuispica* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, ERI, FOR, SAL, SFE). PRY(APY).

Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter

Sin.: *Eragrostis abyssinica* (Jacq.) Link, *Poa tef* Zuccagni

Hierba. Introducida. 1200-1300 m.

Países: ARG(MEN, SLU).

Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.

Sin.: *Poa tenuifolia* A. Rich.

Hierba. Introducida. 0-3500 m.

Países: ARG(COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).

Eragrostis triangularis Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA, AMA, CAU).

Eragrostis trichocolea Hack. & Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ITA). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

Eragrostis weberbaueri Pilg.

Hierba. Nativa. 2300-3700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Erianthecium Parodi

Erianthecium bulbosum Parodi

Sin.: *Chascolytrum bulbosum* (Parodi) Essi, *Longhi-Wagner* & Souza-Chies

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, ROC).

Eriochloa Kunth

Eriochloa acuminata (J. Presl) Kunth

Sin.: *Eriochloa gracilis* (E. Fourn.) Hitchc., *Helopus gracilis* E. Fourn., *Piptatherum acuminatum* J. Presl

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR).

Eriochloa distachya Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Eriochloa grandiflora (Trin.) Benth.

Sin.: *Helopus grandiflorus* Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CON).

Eriochloa montevidensis Griseb.

Sin.: *Eriochloa montevidensis* Griseb. f. *subcolorata* Hack., *Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Ham. var. *montevidensis* (Griseb.) Herter, *Helopus annulatus* (Flüggé) Nees var. *montevidensis* Döll, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, CEN, PHA). URY.

Eriochloa nana Arriaga

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(COS, FOR).

Eriochloa polystachya Kunth

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eriochloa pseudoacrotricha (Stapf ex Thell.) J.M. Black

Sin.: *Eriochloa ramosa* (Retz.) Kuntze var. *pseudoacrotricha* Stapf ex Thell.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHA, LRI, SAL, SLU).

Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham.

Sin.: *Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Ham. f. *intermedia* Parodi, *Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Ham. var. *parodii* Herter, *Milium punctatum* L.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART).

Eriochloa tridentata (Trin.) Kuhl.Sin.: *Paspalum tridentatum* Trin.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, SFE, SDE).

Eriochrysis P. Beauv.**Eriochrysis cayennensis** P. Beauv.Sin.: *Eriochrysis glabrifolia* Swallen, *Saccharum cayennense* (P. Beauv.) Benth.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN). URY(DUR, RIV, TAC).

Eriochrysis filiformis (Hack.) Filg.Sin.: *Andropogon filiforme* Hack. ex A. Camus, nom. illeg., *Saccharum filiforme* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

Eriochrysis holcoides (Nees) Kuhl.Sin.: *Anatherum holcoides* Nees, *Saccharum holcoides* (Nees) Hack., *Saccharum holcoides* (Nees) Hack. var. *brevipilum* Hack., *Saccharum holcoides* (Nees) Hack. var. *penicillare* Hack.

Hierba. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA).

Eriochrysis laxa Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada para Paraguay (Filgueiras & Lerina 2001; Welker et al. 2012) sin indicar material de referencia.

Eriochrysis villosa Swallen

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Erioneuron D. L. Nash**Erioneuron avenaceum** (Kunth) Tateoka var. **kurtzianum** (Parodi) AntonSin.: *Dasyochloa kurtziana* (Parodi) Caro, *Tridens avenaceus* (Kunth) Hitchc. var. *kurtziana* Parodi

Hierba. Endémica. 1000-1800 m.

Países: ARG(LPA, SAL, SJU).

Erioneuron avenaceum (Kunth) Tateoka var. **longiglume** (Parodi) AntonSin.: *Dasyochloa longiglumis* (Parodi) Caro, *Dasyochloa longiglumis* (Parodi) Caro var. *cabrerae* Caro, *Erioneuron avenaceum* (Kunth) Tateoka var. *cabrerae* (Caro) E.A. Sánchez, *Tridens avenacea* (Kunth) Hitchc. var. *longiglumis* Parodi

Hierba. Endémica. 1800-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, TUC).

Erioneuron avenaceum (Kunth) Tateoka var. **pygmaeum** (Hack.) AntonSin.: *Dasyochloa pygmaea* (Hack.) Caro, *Tridens avenaceus* (Kunth) Hitchc. var. *pygmaea* (Hack.) Parodi, *Triodia avenacea* Kunth var. *pygmaea* Hack.

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Erioneuron pilosum (Buckley) Nash var. **longiaristatum** (Kurtz) AntonSin.: *Dasyochloa argentina* (Kuntze) Caro, *Dasyochloa argentina* (Kuntze) Caro var. *aristiglumis* Caro, *Dasyochloa argentina* (Kuntze) Caro var. *parodiana* (E.A. Sánchez) Caro, *Erioneuron pilosum* (Buckley) Nash var. *argentinum* (Kuntze) Nicora, *Erioneuron pilosum* (Buckley) Nash var. *aristiglumis* (Caro) E.A. Sánchez, *Erioneuron pilosum* (Buckley) Nash var. *parodianum* E.A. Sánchez, *Sieglingia argentina* Kuntze, *Tridens pilosus* (Buckley) Hitchc. var. *argentina* (Kuntze) Parodi, *Triodia argentina*(Kuntze) K. Schum., *Triodia avenacea* Kunth var. *longearistata* Kurtz

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SDE, SJU, SLU).

Erioneuron pilosum (Buckley) Nash var. **mendocinum** (Parodi) NicoraSin.: *Tridens pilosus* (Buckley) Hitchc. var. *mendocina* Parodi

Hierba. Endémica.

Países: ARG(LPA, MEN).

Eustachys Desv.**Eustachys brevipila** (Roseng. & Izag.) Caro & E.A. SánchezSin.: *Chloris brevipila* Roseng. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(FLA, MAL, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

Eustachys calvescens (Hack.) Caro & E.A. SánchezSin.: *Chloris calvescens* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CON, COA, PAI, SPE). URY(CLA, RIV, TAC).

Eustachys distichophylla (Lag.) NeesSin.: *Chloris confertifolia* Trin., *Chloris distichophylla* Lag., *Chloris distichophylla* Lag. var. *acuminata* (Trin.) Hack., *Chloris distichophylla* Lag. var. *argentina* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI.). URY(PAY).

Eustachys paranensis A.M. Molina

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Eustachys paspaloides (Vahl) Lanza &Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack

Sin.: *Chloris bahiensis* Steud., *Chloris bahiensis* Steud. f. *glabrescens* Hack., *Chloris capensis* (Houtt.) Thell. var. *bahiensis* (Steud.) Parodi, *Chloris capensis* (Houtt.) Thell. var. *glabrescens* (Hack.) Parodi, *Chloris caribaea* Spreng., *Chloris glabrescens* (Hack.) Roseng. & Izag., *Eustachys bahiensis* (Steud.) Herter, *Eustachys bahiensis* (Steud.) Herter var. *robusta* A.M. Molina, *Eustachys caribaea* (Spreng.) Herter, *Eustachys glabrescens* (Hack.) Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAU, PAI, SPE). URY(CAS, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Eustachys retusa (Lag.) Kunth

Sin.: *Chloris argentina* (Hack.) Lillo & Parodi, *Chloris retusa* Lag., *Eustachys argentina* (Hack.) Herter, hom. illeg., *Eustachys argentinensis* (Hack.) Herter

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ITA). URY(CLA, COL, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, TAC).

Eustachys swalleniana A.M. Molina

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). URY(CLA).

Eustachys uliginosa (Hack.) Herter

Sin.: *Chloris dusenii* Ekman, *Chloris swartziana* Döll, *Chloris uliginosa* Hack.

Hierba. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA, PAI). URY(CLA, FLO, SAO, SJO, TYT).

Festuca L.**Festuca acanthophylla** E. Desv. var. **acanthophylla**

Sin.: *Festuca acanthophylla* E. Desv. f. *vivipara* St.-Yves, nom. nud., *Festuca acuta* Phil., *Festuca barrazae* Muñoz, *Festuca berteroniana* Steud., *Festuca coiron* Steud., *Festuca desvauxii* Phil., *Festuca desvauxii* Phil. var. *ampla* St.-Yves, *Festuca neuquenensis* St.-Yves, nom. nud., *Festuca neuquenensis* St.-Yves var. *parodiana* St.-Yves, *Festuca robusta* Phil., hom. illeg., *Festuca thamarum* Phil., *Festuca tunicata* E. Desv.

Hierba. Nativa. 900-3600 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, SJU, SLU, TDF). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Festuca acanthophylla E. Desv. var. **scabriuscula** (Phil.) J.C. Ospina, Aliscioni & S.S. Denham

Sin.: *Festuca asperata* Phil., *Festuca cabreræ* Parodi, *Festuca morenensis* Matthei, *Festuca neuquenensis* St.-Yves var. *aspera* St.-Yves, *Festuca pascua* Phil., *Festuca robusta* Phil. var. *scabriuscula* (Phil.) St.-Yves, *Festuca scabriuscula* Phil., *Festuca steudelii* Phil.

Hierba. Endémica. 700-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ANT, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Festuca antucensis (Trin.) Steud.

Sin.: *Festuca eriolepis* E. Desv., *Festuca eriolepis* E. Desv. var. *nana* Hieron., *Vulpia antucensis* Trin., *Vulpia australis*

(Nees ex Steud.) C.H. Blom var. *nana* (Hieron.) Parodi, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom f. *glabrata* C.H. Blom, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom f. *nana* (Hieron.) C.H. Blom, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) Henrard, comb. superfl.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Festuca argentina (Speg.) Parodi

Sin.: *Festuca cavillieri* St.-Yves, *Poa argentina* Speg.

Hierba. Endémica. 200-700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).

Festuca argentinensis (St.-Yves) Túrpe

Sin.: *Festuca scirpifolia* (J. Presl) Kunth var. *argentinensis* St.-Yves

Hierba. Nativa. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Festuca arundinacea Schreb.

Sin.: *Bromus arundinaceus* (Schreb.) Roth, *Festuca elatior* L., *Festuca elatior* L. subsp. *arundinacea* (Schreb.) Hack., *Festuca elatior* L. var. *arundinacea* (Schreb.) Roth, *Lolium arundinaceum* (Schreb.) Darbysh., *Schedonorus arundinaceus* (Schreb.) Dumort.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, NEU, RNE, SLU, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU, BIO, LLA, MAG, RME, JFE). URY(MON).

Festuca australis Nees ex Steud.

Sin.: *Vulpia australis* (Nees ex Steud.) C.H. Blom

Hierba. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, RNE, SLU). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LSR, LLA, AIS, MAG, RME). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Festuca bromoides L.

Sin.: *Bromus dertonensis* All., *Festuca dertonensis* (All.) Asch. & Graebn., *Festuca geniculata* Willd. var. *monandra* Döll, *Festuca sciuroides* Roth, *Vulpia bromoides* (L.) Gray, *Vulpia dertonensis* (All.) Gola, *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *bromoides* (L.) Parl., *Vulpia sciuroides* (Roth) C.C. Gmel.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

Festuca chrysophylla Phil.

Sin.: *Festuca deserticola* Phil. var. *chrysophylla* (Phil.) St.-Yves, *Festuca deserticola* Phil. var. *juncea* St.-Yves, *Festuca eriostoma* Hack., *Festuca juncea* Phil., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 3500-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

Festuca cirrosa (Speg.) Parodi

Sin.: *Festuca erecta* d'Urv. var. *cirrosa* Speg., *Festuca longidiurna* Parodi

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(CHU, TDF). CHL(MAG).

Festuca contracta Kirk

Sin.: *Festuca erecta* d'Urv., hom. illeg., *Festuca paludicola* Roiv.

Hierba. Nativa. 200-1100 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Festuca dissitiflora Steud. ex Griseb.

Sin.: *Festuca castilloniana* Türpe, *Festuca circinata* Griseb., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. subsp. *eudissitiflora* St.-Yves, nom. inval., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. subsp. *loricata* (Griseb.) St.-Yves, *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *euloricatea* St.-Yves, nom. inval., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *loricata* Griseb., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *villipalea* St.-Yves, *Festuca erecta* d'Urv. var. *aristulata* Griseb., *Festuca loricata* (Griseb.) Pilg., *Festuca villipalea* (St.-Yves) E.B. Alexeev

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Festuca distichovaginata Pilg.

Sin.: *Festuca distichovaginata* Pilg. f. *angustiflora* St.-Yves

Hierba. Nativa. 3900-4800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Festuca dolichathera Röser & Tkach

Sin.: *Megalachne dantonii* Penneck. & Gl. Rojas

Hierba. Endémica. 1200-1300 m.

Países: CHL(VAL).

Festuca dolichophylla J. Presl

Sin.: *Diplachne scirpifolia* J. Presl, *Festuca laeteviridis* Pilg. var. *lasiorrhachis* (Pilg.) St.-Yves, *Festuca lasiorrhachis* Pilg., *Festuca scirpifolia* (J. Presl) Kunth

Hierba. Nativa. 3900-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Festuca fiebrigii Pilg.

Hierba. Nativa. 2200-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Festuca fimbriata Nees

Sin.: *Festuca ampliflora* Döll

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, ITA, MIE). URY(CLA, MON, TAC).

Festuca floribunda (Pilg.) P.M. Peterson, Soreng & Romasch.

Sin.: *Bromus mandonius* Henrard, *Dielsiochloa floribunda* (Pilg.) Pilg., *Trisetum floribundum* Pilg.

Hierba. Nativa. 4200-5000 m.

Países: ARG(JUJ, LRI). CHL(AYP, TAR, ANT).

Festuca giraldoi J.C. Ospina & P.I. Picca

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(COR).

Festuca gracillima Hook. f. var. **glacialis**

Rúgolo & Nicora

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Festuca gracillima Hook. f. var. **gracillima**

Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. var. *brevifolia* Speg., *Festuca gracillima* Hook. f. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(BIO, AIS, MAG).

Festuca hieronymi Hack.

Sin.: *Festuca erecta* d'Urv. var. *mutica* Griseb., *Festuca hieronymi* Hack. f. *panicula expansa* Hack., nom. inval., *Festuca hieronymi* Hack. f. *subvar. expansa* St.-Yves, *Festuca hieronymi* Hack. var. *expansa* (St.-Yves) Türpe

Hierba. Nativa. 400-3600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Festuca humilior Nees & Meyen

Sin.: *Festuca buchtienii* Hack., *Festuca haenkei* Kunth var. *humilior* (Nees & Meyen) St.-Yves, *Festuca proxima* R.E. Fr., *Festuca scirpifolia* (J. Presl) Kunth subsp. *buchtienii* (Hack.) St.-Yves
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SJU).

Festuca hypsophila Phil.

Sin.: *Festuca deserticola* Phil. var. *hypsophila* (Phil.) St.-Yves
Hierba. Nativa. 3200-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Festuca juncifolia St.-Amans

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(MAG).

Festuca kurtziana St.-Yves

Hierba. Endémica. 600-3000 m.
Países: ARG(CAT, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Festuca lilloi Hack.

Sin.: *Festuca lilloi* Hack. var. *breviaristata* Túrpe, *Festuca setifolia* Steud. ex Griseb. var. *lilloi* (Hack.) St.-Yves, *Festuca tucumanica* E.B. Alexeev
Hierba. Nativa. 1800-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Festuca linigluma J.C. Ospina, Sylvester & M. Sylvester

Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Festuca magellanica Lam.

Sin.: *Festuca hystricola* (Hack.) E.B. Alexeev, *Festuca ovina* L. subsp. *hystricola* Hack., *Festuca ovina* L. var. *antarctica* Hack., *Festuca ovina* L. var. *magellanica* (Lam.) Hack., *Festuca ovina*

L. var. *wilczekii* St.-Yves, *Festuca rubra* L. subsp. *corcovadensis* St.-Yves

Hierba. Endémica. 0-3900 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Festuca magensiana Potztal

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(MAG).

Festuca masafuerana (Skottsb. & Pilg. ex Pilg) Röser & Tkach

Sin.: *Bromus masafueranus* Skottsb. & Pilg. ex Pilg., *Megalachne masafuerana* (Skottsb. & Pilg. ex Pilg.) Matthei, *Megalachne masafuerana* (Skottsb. & Pilg.) H. Scholz, comb. superfl.
Hierba. Endémica. 300-1100 m.
Países: CHL(JFE).

Festuca masatierrae Röser & Tkach

Sin.: *Podophorus bromoides* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Festuca megalura Nutt.

Sin.: *Festuca commutata* Steud., hom. illeg., *Vulpia megalura* (Nutt.) Rydb., *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. f. *megalura* (Nutt.) Stace & R.Cotton, *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *hirsuta* Hack., *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *megalura* (Nutt.) Auquier
Hierba. Introducida. 0-3800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). URY(CLA, COL, CLA, FLO, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

Festuca monticola Phil.

Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. var. *monticola* (Phil.) St.-Yves, *Festuca*

subandina Phil., *Poa monticola* Phil., nom. nud.

Hierba. Endémica. 1000-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG).

Festuca muralis Kunth

Sin.: *Festuca myuros* L. var. *muralis* Kunth ex Speg., *Vulpia muralis* (Kunth) Henrard, comb. superfl., *Vulpia muralis* (Kunth) Nees
Hierba. Introducida. 0-1900 m.
Países: ARG(BAI). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, RME, JFE).

Festuca myuros L.

Sin.: *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. f. *myuros*, *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *myuros*
Hierba. Introducida. 0-3400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO).

Festuca nardifolia Griseb.

Sin.: *Festuca calchaquiensis* Hack., *Festuca nardifolia* Griseb. var. *calchaquiensis* (Hack.) St.-Yves, *Festuca nardifolia* Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval.
Hierba. Endémica. 3200-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Festuca nemoralis Túrpe

Hierba. Nativa. 1700-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Festuca octoflora Walter

Sin.: *Vulpia antofagastensis* Parodi, *Vulpia octoflora* (Walter) Rydb.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU, SCR). CHL(ANT, COQ).

Notas: Citada para Uruguay (Soreng et al., 2003) sin indicar localidad o material de referencia.

Festuca orthophylla Pilg.

Sin.: *Festuca orthophylla* Pilg. var. *boliviana* Pilg., *Festuca orthophylla* Pilg. var. *eristoma* (Hack.) St.-Yves, *Festuca orthophylla* Pilg. var. *glabrescens* Pilg.

Hierba. Nativa. 3000-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT, COQ, MAU).

Festuca ovina L. subsp. **tenuifolia** (Sibth.) Celak.

Sin.: *Festuca filiformis* Pourr., *Festuca ovina* L. var. *tenuifolia* (Sibth.) Sm., *Festuca tenuifolia* Sibth.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Festuca pallescens (St.-Yves) Parodi

Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. f. *scabra* St.-Yves, *Festuca gracillima* Hook. f. var. *patagonica* Speg., *Festuca gracillima* Hook. f. var. *ramosa* St.-Yves, *Festuca magniflora* E.B. Alexeev, *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi var. *foliosa* Parodi, *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi var. *grandiflora* Parodi, *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi var. *scabra* (St.-Yves) Parodi

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Festuca pampeana Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI).

Festuca panda Swallen

Hierba. Endémica. 2900-3400 m.

Países: CHL(AYP, TAR, COQ, VAL).

Festuca parodiana (St.-Yves ex Parodi) Nicora

Sin.: *Festuca subulata* Trin. var. *parodiana* St.-Yves ex Parodi

Hierba. Nativa. 2000-2900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SJU, TUC).

Festuca parodii St.-Yves

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Festuca purpurascens Banks & Sol. ex Hook. f.

Sin.: *Festuca davilae* Phil., *Festuca dumetorum* Phil., hom. illeg., *Festuca glaucophylla* Phil., *Festuca insularis* Steud., *Festuca laxiflora* Phil., hom. illeg., *Festuca lechleriana* Steud., *Festuca platyphylla* Steud., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. f. *aristata* St.-Yves, *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. f. *scabrisucula* St.-Yves, *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. var. *submutica* E. Desv., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. var. *aristata* E. Desv., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval., *Festuca serranoi* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Festuca pyrogea Speg.

Sin.: *Festuca ovina* L. var. *pyrogea* (Speg.) Hack., *Festuca pyrogea* Speg. var. *elata* Parodi

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

Festuca rigescens (J. Presl) Kunth

Sin.: *Diplachne rigescens* J. Presl, *Festuca deserticola* Phil., *Festuca deserticola* Phil. var. *paupera* (Phil.) St.-

Yves, *Festuca oligantha* Phil. ex St.-Yves, *Festuca paupera* Phil., *Festuca petersonii* Renvoize, *Festuca saltana* St.-Yves

Hierba. Nativa. 2900-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Festuca robinsoniana (C. Peña) Röser & Tkach

Sin.: *Megalachne robinsoniana* C. Peña

Hierba. Endémica. 300-400 m.

Países: CHL(JFE).

Festuca roigii Dubcovsky & Rúgolo

Hierba. Endémica. 1500-2800 m.

Países: ARG(MEN).

Festuca rubra L.

Sin.: *Festuca ovina* L. subsp. *rubra* (L.) Hook. f., *Festuca ovina* L. var. *rubra* (L.) Sm.

Hierba. Introducida. 0-3300 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, TDF). CHL(COQ, VAL, AIS, MAG, RME).

Festuca simpliciuscula (Hack.) E.B. Alexeev

Sin.: *Festuca rubra* L. var. *simpliciuscula* Hack.

Hierba. Endémica. 800-2300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).

Festuca subantarctica Parodi

Sin.: *Festuca commersonii* Franch., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Festuca superba Parodi ex Türpe

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(JUJ).

Festuca tectoria St.-Yves

Hierba. Nativa. 3300-4000 m.

Países: CHL(TAR).

Festuca ulochaeta Nees ex Steud.

Sin.: *Festuca leptothrix* Trin. ex Döll,
Festuca leptothrix Trin. ex Steud., nom.
nud.

Hierba. Nativa. 400-1800 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Festuca uninodis Hack.

Sin.: *Festuca binodis* (Hack. Ex St.-Yves)
Lillo, *Festuca stuckertii* St.-Yves, *Festuca*
uninodis Hack. f. *binodis* Hack. ex St.-
Yves

Hierba. Endémica. 3600-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Festuca ventanica Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI).

Festuca weberbaueri Pilg.

Hierba. Nativa. 2000-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
NEU, SAL, SJU).

Festuca werdermannii St.-Yves

Hierba. Endémica. 2800-4200 m.

Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ANT,
ATA, COQ).

Festuca yalaensis Joch.Müll. & Catalán

Hierba. Endémica. 2200 m.

Países: ARG(JUU).

Gastridium P. Beauv.

Gastridium phleoides (Nees & Meyen)
C.E. Hubb.

Sin.: *Lachnagrostis phleoides* Nees &
Meyen

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: ARG(CHU). CHL(ATA, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,
RME, JFE, IPA).

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz
& Thell.

Sin.: *Agrostis ventricosa* Gouan,
Gastridium lendigerum (L.) Desv.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(JFE, IPA).

Gaudinia P. Beauv.

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.

Sin.: *Avena fragilis* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(MAL).

Glyceria R. Br., nom. cons.

Glyceria fluitans (L.) R. Br.

Sin.: *Festuca fluitans* L.

Hierba. Introducida. 0-1700 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR,
LLA, MAG).

Glyceria multiflora Steud.

Sin.: *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. var.
stricta Desv.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE,
ERI, NEU, RNE, SCR, SFE). BRA(RGS,
SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR,
LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON, ROC).

Glyceria saltensis Sulekic & Rúgolo

Hierba. Endémica. 2900-3100 m.

Países: ARG(SAL).

Gouinia E. Fourm. ex Benth. & Hook. f.

Gouinia brasiliensis (S. Moore) Swallen

Sin.: *Pogochloa brasiliensis* S. Moore

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, JUJ, SAL).

Notas: Citada para Paraguay (Peterson
et al., 2001) sin indicar material de
referencia.

Gouinia latifolia (Griseb.) Vasey

Sin.: *Diplachne latifolia* (Griseb.) Hack.,
Sieglingia latifolia (Griseb.) Kuntze,
Tricuspis latifolia Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU,
SFE, SDE, TUC). PRY(CAN, CON, PAI).

Notas: Citada para Brasil (Peterson et
al., 2001; Nicora, 2009e) sin indicar
distribución ni material de referencia.

Gouinia paraguayensis (Kuntze) Parodi
var. **paraguayensis**

Sin.: *Arundinaria paraguayensis* Kuntze,
Sieglingia paraguayensis Kuntze, *Triodia*
paraguayensis (Kuntze) Hack.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI,
FOR, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,
TUC). PRY(APY).

Gouinia paraguayensis (Kuntze) Parodi
var. **tortuosa** (Swallen) Túrpe

Sin.: *Gouinia tortuosa* Swallen

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, LRI,
SAL, SJU, SDE). PRY(APY).

Graphephorum Desv.

Graphephorum ambiguum (Rúgolo &
Nicora) Barberá & Quintanar

Sin.: *Trisetum ambiguum* Rúgolo & Nicora

Hierba. Endémica. 300-900 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Graphephorum cernuum (Trin.) Röser &
Tkach

Sin.: *Avena cernua* (Trin.) Kunth, *Avena*
leptostachya Hook. f., *Hainardia cylindrica*

(Willd.) Greuter, *Trisetum cernuum* Trin.,
Trisetum fraudulentum Steud.

Hierba. Nativa. 100-1600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).
CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Graphephorum longiglume (Hack.)

Barberá & Quintanar

Sin.: *Deschampsia andicola* (Louis-Marie)

Valencia, *Trisetum andicola* Louis-Marie,
Trisetum longiglume Hack. var.
longiglume

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
CHL(RME).

Graphephorum mendocinense

(Hauman) Barberá & Quintanar

Sin.: *Koeleria grisebachii* Domin var.
mendocinensis Hauman, *Koeleria*
mendocinensis (Hauman) C.E.Calderón &
Nicora

Hierba. Endémica. 500-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR).

Guadua Kunth

Guadua angustifolia Kunth

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Guadua chacoensis (Rojas) Londoño &
P.M. Peterson

Sin.: *Bambusa chacoensis* Rojas Acosta,
Guadua angustifolia Kunth subsp.
chacoensis (Rojas) S.M. Young & Judd

Hierba subleñosa. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAA, CEN, GUA, SPE). URY(ART).

Notas: Bajo cultivo en las provincias de
Buenos Aires y Tucumán (Argentina).

Guadua paniculata Munro

Sin.: *Bambusa munroi* Hack., *Bambusa*
paniculata (Munro) Hack.

Hierba subleñosa. Nativa.

Países: BRA(RGS, SCA).

Guadua paraguayana Döll

Sin.: *Bambusa paraguayana* (Döll) Bertoni

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA).

Guadua tagoara (Nees) Kunth

Sin.: *Arundarbor distorta* (Nees) Kuntze,
Bambusa barbata Trin., *Bambusa distorta*
Nees, *Bambusa spinosissima* Hack.,
Guadua distorta (Nees) Rupr., *Guadua*
glaziovii (Hack.) E.G. Camus, *Guadua*
spinosissima (Hack.) E.G. Camus

Hierba subleñosa. Nativa. 200-400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr.

Sin.: *Arundarbor trinii* (Nees) Kuntze,
Bambusa riograndensis Dutra, *Bambusa*
tacuara Arechav., *Bambusa tomentosa*
(Hack. & Lindm.) McClure, *Bambusa trinii*
Nees, *Chusquea heterophylla* Griseb.,
hom. illeg., *Guadua ribbentropii* Herter,
Guadua riograndensis (Dutra) Herter,
Guadua tomentosa Hack. & Lindm.,
Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr. var.
scabra Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, SAO,
TAC).

Guadua variegata Lizarazu

Hierba. Endémica. 400-600 m.

Países: ARG(MIS).

Gymnopogon P. Beauv.

Gymnopogon burchellii (Munro ex Döll)
Ekman

Sin.: *Gymnopogon muticus* Hack., nom.
nud., *Leptochloa burchellii* Munro ex Döll

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada para Paraguay y Uruguay
(Peterson et al., 2001) sin indicar material
de referencia.

Gymnopogon glaber Caro

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SLU,
TUC).

Gymnopogon grandiflorus Roseng.,
B.R. Arrill. & Izag.

Sin.: *Gymnopogon brevisetus* (Hack.) J.P.
Sm., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.)
Kuntze var. *brevisetus* Hack.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA,
SFE). BRA(RGS, SCA). URY(FLA, MAL).

Gymnopogon legrandii Roseng., B.R.
Arrill. & Izag.

Sin.: *Gymnopogon biflorus* Pilg. var.
ciliatillemma Burkart, *Gymnopogon*
swallenii J.P. Smith

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS).
BRA(RGS, SCA). PRY(ÑEE). URY(CAS).

Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze

Sin.: *Gymnopogon biflorus* Pilg.,
Gymnopogon filiformis Griseb.,
Gymnopogon laevis Nees, *Gymnopogon*
laevis Nees var. *pluriflorus* Döll,
Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze
var. *pluriflorus* (Döll) Parodi, comb.
superfl., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.)
Kuntze var. *pluriflorus* (Döll) Rojas, comb.
superfl., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.)
Kuntze var. *pluriflorus* (Döll) Stuck.,
Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze

var. *typicum* Parodi, nom. inval., *Muhlenbergia spicata* (Spreng.) Kunth, *Polypogon spicatus* Spreng., *Trichochloa spicata* (Spreng.) Schult.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA). URY(DUR, MON).

Gymnopogon toldensis Sulekic & Rúgolo

Hierba. Endémica. 1600 m.

Países: ARG(SAL).

Gynerium P. Beauv.

Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv.

Sin.: *Arundo festucacea* Willd., *Arundo rugii* Molina, *Arundo sagittata* (Aubl.) Pers., *Saccharum sagittatum* Aubl.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). CHL(TAR). PRY(APA, CEN, COA, ITA).

Hackelochloa Kuntze

Hackelochloa granularis (L.) Kuntze

Sin.: *Cenchrus granularis* L., *Mnesithea granularis* (L.) de Koning & Sosef, *Rottboellia granularis* (L.) Roberty

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(SAL). PRY(AMA, CON, PAI).

Helictotrichon Besser

Helictotrichon scabrivalve (Trin.) G.C. Tucker

Sin.: *Amphibromus scabrivalvis* (Trin.) Swallen, *Amphibromus scabrivalvis* (Trin.)

Swallen var. *indigestus* Nicora; *Avena sabrivalvis* Trin.

Hierba. Nativa

Países: ARG(BAI, COR, ERI).

Hemarthria R. Br.

Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E. Hubb.

Sin.: *Manisuris altissima* (Poir.) Hitchc., *Rottboellia altissima* Poir., *Rottboellia compressa* L. f. var. *fasciculata*

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Heteropogon Pers.

Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.

Sin.: *Andropogon contortus* L., *Andropogon secundus* Willd. ex Griseb., nom. nud., *Holcus contortus* (L.) Kuntze ex Stuck.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC). PRY(CON, PHA).

Heteropogon melanocarpus (Elliot) Benth.

Sin.: *Andropogon melanocarpus* Elliott

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

Hildaea C. Silva & R.P. Oliveira

Hildaea nemorosa (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira

Sin.: *Echinolaena nemorosa* (Sw.) Kunth, *Ichnanthus nemorosus* (Sw.) Döll, *Ichnanthus venturii* K.E. Rogers, *Panicum nemorosum* Sw.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). PRY(APA).

Hildaea pallens (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira var. **major** (Nees) C. Silva & R.P. Oliveira

Sin.: *Ichnanthus pallens* (Sw.) Munro ex Benth. var. *major* (Nees) Stieber, *Ichnanthus swallenii* K.E. Rogers, *Panicum pallens* Sw. var. *majus* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hildaea pallens (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira var. **pallens**

Sin.: *Ichnanthus pallens* (Sw.) Munro ex Benth. var. *pallens*, *Ichnanthus parodii* K.E. Rogers, *Panicum hemignostum* Steud., *Panicum pallens* Sw.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(RIV, TAC).

Hildaea ruprechtii (Döll) C. Silva & R.P. Oliveira

Sin.: *Ichnanthus exilis* K.E. Rogers, *Ichnanthus ramosissimus* K.E. Rogers, *Ichnanthus ruprechtii* Döll

Hierba. Nativa. 100-2100 m.

Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hildaea tenuis (J. Presl & C. Presl) C. Silva & R.P. Oliveira

Sin.: *Ichnanthus parodii* K.E. Rogers var. *villosissimus* K.E. Rogers, *Ichnanthus*

tenuis (J. Presl) Hitchc. & Chase,
Oplismenus tenuis J. Presl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI).

Holcus L., nom. cons.

Holcus lanatus L.

Sin.: *Avena lanata* (L.) Koeler, *Ginannia lanata* (L.) F.T. Hubb., *Ginannia pubescens* Bubani

Hierba. Introducida. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON, SAO, SJO, SOR).

Homolepis Chase

Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr.

Sin.: *Panicum glutinosum* Sw.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(TYT).

Homolepis villaricensis (Mez) Zuloaga & Soderstr.

Sin.: *Panicum villaricense* Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Hordeum L.

Hordeum brachyatherum Phil.

Sin.: *Critesion brachyatherum* (Phil.) A.

Löve

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, MAU, MAG).

Hordeum chilense Roem. & Schult.

Sin.: *Critesion chilense* (Roem. & Schult.)

A. Löve, *Hordeum chilense* Brongn., hom.

illeg., *Hordeum chilense* Brongn. var.

pseudosecalinum Hauman, nom. illeg.,

Hordeum chilense Roem. & Schult. var.

pilosum Nevski, *Hordeum cylindricum*

Steud., hom. illeg., *Hordeum*

depauperatum Steud., *Hordeum pratense*

Huds. var. *brongniartii* Macloskie, nom.

illeg., *Hordeum pratense* Huds. var.

chilense (Brongn.) Macloskie, *Hordeum*

secalinum Schreb. var. *chilense* (Brongn.)

Desv.

Hierba. Endémica. 0-4200 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR).

CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO,

MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG,

RME, JFE).

Hordeum comosum J. Presl

Sin.: *Critesion comosum* (J. Presl) A.

Löve, *Hordeum andinum* Trin., *Hordeum*

comosum J. Presl var. *bifidum* Parodi ex

Nicora, *Hordeum comosum* J. Presl var.

flavescens E. Desv., *Hordeum comosum*

J. Presl var. *humilis* E. Desv., *Hordeum*

comosum J. Presl var. *rigidum* E. Desv.,

Hordeum divergens Nees & Meyen ex

Steud., nom. nud., *Hordeum jubatum* L. f.

flavidum Kuntze, *Hordeum jubatum* L. f.

versicolor Kuntze

Hierba. Nativa. 0-4300 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU,

RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(AYP, TAR,

ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,

ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Hordeum cordobense Bothmer, N.

Jacobsen & Nicora

Sin.: *Critesion cordobense* (Bothmer,

Hordeum compressum Griseb. f.

tenuispicatum (Hack. & Stuck.) Hack. &

Stuck., N. Jacobsen & Nicora) A. Löve

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,

LPA, SFE, SJU, SLU, TUC).

Hordeum erectifolium Bothmer, N.

Jacobsen & R.B. Jørg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Hordeum euclaston Steud.

Sin.: *Critesion pusillum* (Nutt.) A. Löve

subsp. *euclaston* (Steud.) A. Löve,

Hordeum euclaston Steud. var. *puberulum*

Parodi & Nicora, *Hordeum euclaston*

Steud. var. *pubescens* Nevski, *Hordeum*

fragile Godr., hom. illeg., *Hordeum*

pusillum Nutt. subsp. *euclaston* (Steud.)

Covas, *Hordeum pusillum* Nutt. var.

euclaston (Steud.) Hauman, *Hordeum*

subfastigiatum Döll

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,

DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SCR, SFE,

TUC). BRA(RGS). URY(MAL, MON).

Hordeum flexuosum Nees ex Steud.

Sin.: *Critesion flexuosum* (Nees ex Steud.)

Á. Löve, *Hordeum bonariense* Parodi &

Nicora, *Hordeum pusillum* Nutt. subsp.

flexuosum (Nees ex Steud.) Covas

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS,

DFE, ERI, LPA, MEN, SCR). URY.

Hordeum fuegianum Bothmer, N.

Jacobsen & R.B. Jørg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Hordeum jubatum L.

Sin.: *Hordeum jubatum* L. var. *pampeanum* Hauman, *Hordeum pampeanum* (Hauman) Herter

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SFE, TDF). CHL(MAG).

Hordeum lechleri (Steud.) Schenck

Sin.: *Critesion lechleri* (Steud.) A. Löve, *Elymus lechleri* Steud., *Hordeum incognitum* Parodi & Nicora, nom. nud., *Hordeum jubatum* L. f. *violaceum* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Hordeum marinum Huds. subsp. **gussoneanum** (Parl.) Thell.

Sin.: *Hordeum bertereanum* E. Desv. var. *pumila* E. Desv., *Hordeum gussoneanum* Parl., *Hordeum utriculatum* Bertero

Hierba. Introducida. 0-1600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Hordeum marinum Huds. subsp. **marinum**

Hierba. Introducida. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Hordeum murinum L. subsp. **glaucum** (Steud.) Tzvelev

Sin.: *Critesion glaucum* (Steud.) A. Löve, *Hordeum glaucum* Steud., *Hordeum stebbinsii* Covas

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF).

Hordeum murinum L. subsp. **leporinum** (Link) Arcang.

Sin.: *Hordeum ambiguum* Döll, *Hordeum leporinum* Link, *Hordeum murinum* L. subsp. *leporinum* (Link) Asch. & Graebn., comb. superfl., *Hordeum murinum* L. var. *chilense* Brongn., *Hordeum murinum* L. var. *leporinum* (Link) K. Rich., *Hordeum murinum* L. var. *velutinum* Speg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO). URY(MAL).

Hordeum murinum L. subsp. **murinum**

Hierba. Introducida. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA).

Hordeum muticum J. Presl

Sin.: *Hordeum andicola* Griseb., *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *muticum* (J. Presl) Hauman, *Hordeum muticum* J. Presl var. *andicola* (Griseb.) Thell., *Hordeum secalinum* Schreb. var. *andicola* (Griseb.) Hauman, *Hordeum secalinum* Schreb. var. *parviflorum* Hack.

Hierba. Nativa. 400-4100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, LSR, LLA).

Hordeum parodii Covas

Sin.: *Critesion parodii* (Covas) A. Löve, *Hordeum parodii* Covas var. *araucanum* Parodi & Nicora

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp. **magellanicum** (Parodi & Nicora)

Bothmer, Giles & N. Jacobsen

Sin.: *Critesion magellanicum* (Parodi & Nicora) A. Löve, *Hordeum chilense* Roem.

& Schult. var. *magellanicum* Parodi & Nicora

Hierba. Endémica. 100-700 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ATA, AIS, MAG, RME).

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp. **mustersii** (Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen

Sin.: *Critesion mustersii* (Nicora) A. Löve, *Hordeum mustersii* Nicora

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(SCR).

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp. **patagonicum**

Sin.: *Hordeum maritimum* (Huds.) Stokes var. *patagonicum* Hauman

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, SCR).

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp. **santacrucense** (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen

Sin.: *Critesion santacrucense* (Parodi & Nicora) A. Löve, *Hordeum santacrucense* Parodi & Nicora

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp. **setifolium** (Parodi & Nicora)

Bothmer, Giles & N. Jacobsen

Sin.: *Critesion setifolium* (Parodi & Nicora) A. Löve, *Hordeum setifolium* Parodi & Nicora

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(SCR).

Hordeum procerum Nevski

Sin.: *Critesion procerum* (Nevski) A. Löve, *Hordeum hexaploidum* Covas

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU, TDF).

Notas: Citada para Chile y Uruguay (Soreng et al., 2003) y Uruguay (Baden & Bothmer, 1994) sin indicar localidad o material de referencia.

Hordeum pubiflorum Hook. f. subsp. **halophilum** (Griseb.) Baden & Bothmer
Sin.: *Critesion pubiflorum* (Hook. f.) A. Löve subsp. *halophilum* (Griseb.) A. Löve, *Hordeum halophilum* Griseb., *Hordeum halophilum* Griseb. subsp. *breviaristatum* (Parodi ex Nicora) Baden, *Hordeum jubatum* L. f. *viride* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-4200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, LBO, BIO, AIS, MAG).

Hordeum pubiflorum Hook. f. subsp. **pubiflorum**

Sin.: *Critesion pubiflorum* (Hook. f.) A. Löve, *Hordeum comosum* J. Presl var. *pubiflorum* (Hook. f.) Thell., *Hordeum jubatum* L. var. *pilosulum* Franch., *Hordeum secalinum* Schreb. var. *pubiflorum* (Hook. f.) Hauman

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, MAG, RME).

Hordeum pusillum Nutt.

Sin.: *Critesion pusillum* (Nutt.) A. Löve, *Hordeum pusillum* Nutt. var. *typicum* Hauman, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SFE).

Hordeum stenostachys Godr.

Sin.: *Hordeum chilense* Brongn. f. *elongatum* Hauman, *Hordeum chilense* Brongn. f. *longiaristatum* Hauman, *Hordeum chilense* Brongn. var. *compressum* (Griseb.) Hauman, *Hordeum compressum* Griseb., *Hordeum*

compressum Griseb. var. *superatum* Hack., *Hordeum compressum* Griseb. var. *tenuispicatum* Hack., *Hordeum muticum* J. Presl var. *compressum* (Griseb.) Thell., *Hordeum muticum* J. Presl var. *superatum* (Hack.) Thell., *Hordeum secalinum* Schreb. var. *scabriusculum* Kuntze, *Hordeum secalinum* Schreb. var. *puberulum* Kuntze, *Hordeum stenostachys* Godr. var. *superatum* (Hack.) Thell. ex Stuck., *Hordeum stenostachys* Godr. var. *tenuispicatum* (Hack. & Stuck.) Stuck., comb. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(FLA, LAV).

Notas: Citada para Paraguay (Soreng et al., 2003) sin indicar material de referencia.

Hordeum tetraploideum Covas

Sin.: *Critesion tetraploideum* (Covas) A. Löve

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LLA, AIS).

Hordeum vulgare L. var. **trifurcatum** (Schltdl.) Alef.

Sin.: *Hordeum coeleste* Viborg ex Kunth var. *trifurcatum* Schltdl.

Hierba. Introducida. 4000 m.

Países: ARG(JUJ).

Hordeum vulgare L. var. **vulgare**

Sin.: *Hordeum distichon* L., *Hordeum vulgare* L. subsp. *distichum* (L.) Thell.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, BIO, ARA, RME). URY.

Hymenachne P. Beauv.

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees

Sin.: *Agrostis monostachya* Poir., *Panicum amplexicaule* Rudge

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE). URY(MON).

Hymenachne bresolinii (L.B. Sm. & Wassh.) Zuloaga

Sin.: *Panicum bresolini* L.B. Sm. & Wassh.

Hierba. Endémica. 200-800 m.

Países: BRA(SCA).

Hymenachne condensata (Bertol.) A. Chase

Sin.: *Panicum condensatum* Bertol.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase

Sin.: *Panicum donacifolium* Raddi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, CON, GUA, PHA, SPE).

Hymenachne grumosa (Nees) Zuloaga

Sin.: *Panicum grumosum* Nees, *Panicum knuthii* Herter, *Panicum pycnanthum* Steud., *Panicum rivulare* Trin. var. *grumosum* (Nees) Hack., *Panicum schroederi* Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA). URY(CAS, COL, RNO, ROC, SJO, TAC).

Hymenachne leptachne (Döll) Zuloaga & Scataglini
Sin.: *Panicum leptachne* Döll
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hymenachne pernambucensis (Spreng.) Zuloaga
Sin.: *Agrostis pernambucensis* Spreng., *Panicum excelsum* Nees, *Panicum pernambucense* (Spreng.) Mez ex Pilg., *Panicum rivulare* Trin., *Panicum urticans* L.B. Sm. & Wassh.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART).

Hyparrhenia Andersson ex E. Fourn.

Hyparrhenia bracteata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Stapf
Sin.: *Andropogon bracteatus* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Hierba. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf
Sin.: *Andropogon hirtus* L.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS).

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf
Sin.: *Trachypogon rufus* Nees
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, PHA, SPE).

Ichnanthus P. Beauv.

Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Döll
Sin.: *Panicum bambusiflorum* Trin.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Ichnanthus inconstans (Trin. ex Nees) Döll
Sin.: *Ichnanthus pubescens* Swallen, *Ichnanthus reclinator* Swallen, *Ichnanthus subinclusus* Swallen, *Panicum inconstans* Trin. ex Nees
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, PAI, SPE).

Ichnanthus leiocarpus (Spreng.) Kunth
Sin.: *Ichnanthus fastigiatus* Brongn., *Panicum leiocarpon* Spreng.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ichnanthus nemoralis (Schrader.) Hitchc. & Chase
Sin.: *Panicum nemorale* Schrad.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ichnanthus tarijanius K.E. Rogers
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Imperata Cirillo

Imperata brasiliensis Trin.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(COA). URY(SJO).

Imperata condensata Steud.
Sin.: *Imperata arundinacea* (L.) Cyr. var. *condensata* (Steud.) Hack., *Imperata arundinacea* (L.) Cyr. var. *condensata* (Steud.) Macloskie, comb. superfl.,

Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. var. *condensata* (Steud.) Hack.
Hierba. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, SJU, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Imperata contracta (Kunth) Hitchc.
Sin.: *Imperata caudata* (G.L. Mey.) Trin., *Imperata contracta* (Kunth) Kuhlm., comb. superfl., *Imperata exaltata* (Roxb.) Brongn. var. *caudata* (G.L. Mey.) Hack., *Saccharum caudatum* G. Mey., *Saccharum contractum* Kunth, *Saccharum cylindricum* (L.) Lam. var. *contractum* (Kunth) Roberty
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, PAI).

Imperata minutiflora Hack.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Imperata parodii Acevedo
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ARA).

Imperata tenuis Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Ischaemum L.

Ischaemum minus J. Presl
Sin.: *Ischaemum urvilleanum* Kunth ex Brongn., *Paspalum axicillium* Steud.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, ROC).

Ischaemum rugosum Salisb.
Hierba. Introducida.

Países: BRA(SCA).

Janochloa Zuloaga & Delfini

Janochloa antidotale (Retz.) Zuloaga & Delfini

Sin.: *Panicum antidotale* Retz.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(JUU). BRA(RGS).

Jarava Ruiz & Pav.

Jarava academica (Hicken) Peñailillo

Sin.: *Stipa academica* Hicken, *Stipa brachychaeta* Godr. var. *minor* Speg., nom. nud., *Stipa cordobensis* Mez, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(COR).

Jarava annua (Mez) Peñailillo

Sin.: *Stipa annua* Mez

Hierba. Nativa. 100-3700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Jarava breviseta (Caro & E.A. Sánchez) Peñailillo

Sin.: *Stipa breviseta* Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 3500 m.

Países: ARG(SAL).

Jarava castellanosi (F.A. Roig) Peñailillo

Sin.: *Stipa castellanosi* F.A. Roig

Hierba. Endémica. 1900-3900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU, TUC).

Jarava durifolia (Parodi ex Torres) Peñailillo

Sin.: *Stipa durifolia* Parodi ex Torres

Hierba. Endémica. 2500-3600 m.

Países: ARG(JUU, SJU, TUC).

Jarava filifolia (Nees) Ciald.

Sin.: *Jarava megapotamica* (Spreng.)

Peñailillo, comb. illeg., *Stipa filifolia* Nees

Hierba. Endémica. 0-3200 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA).

URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SJO, SOR).

Jarava hypsophila (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa hypsophila* Speg.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU, SLU).

Jarava hystricina (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa hystricina* Speg.

Hierba. Endémica. 3500-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

Jarava ichu (Ruiz & Pav.) Kunth var. **pungens** (Nees & Meyen) Ciald.

Sin.: *Jarava pungens* (Nees & Meyen)

Matthei, *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *pungens* (Nees & Meyen) Kuntze,

Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth var. *pungens* (Nees & Meyen) Pilg., comb. superfl., *Stipa pungens* Nees & Meyen

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Jarava ichu Ruiz & Pav. var. **ichu**

Sin.: *Jarava eriostachya* (Kunth) Peñailillo, *Jarava usitata* Pers., nom. superfl., *Stipa eriostachya* Kunth, *Stipa gynerioides* Phil., *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth, *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth f. *interrupta* Hack., *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *gynerioides* (Phil.) Hack., *Stipa jarava* P. Beauv., nom. superfl.

Hierba. Nativa. 0-4200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Jarava illimanica (Hack.) F. Rojas

Sin.: *Stipa illimanica* Hack.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(SAL).

Jarava juncoides (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa flexibarbata* Mez, *Stipa juncoides* Speg., *Stipa megapotamica*

Spreng. ex Trin. var. *juncoides* (Speg.)

Speg., *Stipa megapotamica* Spreng. ex Trin. var. *typica* Speg., nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE, SLU). URY(MAL, MON).

Jarava leptostachya (Griseb.) F. Rojas

Sin.: *Stipa andina* F.A. Roig, *Stipa capilliseta* Hitchc., *Stipa leptostachya* Griseb., *Stipa leptostachya* Griseb. var. *capilliseta* (Hitchc.) Parodi

Hierba. Nativa. 1200-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Jarava media (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa media* (Speg.) Caro, *Stipa plumosa* Trin. var. *media* Speg.

Hierba. Endémica. 2000-3900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Jarava plumosa (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett

Sin.: *Achnatherum papposum* (Nees) Barkworth, comb. illeg., *Arundo plumosa* (Spreng.) Schult., *Calamagrostis plumosa* Spreng., *Stipa delilei* Steud., *Stipa mollissima* Carbone & Chiapella, *Stipa papposa* Delile, hom. illeg., *Stipa papposa* Nees f. *major* Speg., *Stipa papposa* Nees f. *minor* Speg., *Stipa papposa* Nees, nom. illeg., *Stipa tenuiflora* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL,

LBO, MAU, BIO, ARA, RME). URY(ART, CAS, LAV, MAL, MON, RIV, SJO).

Jarava plumosula (Nees ex Steud.) F. Rojas

Sin.: *Stipa plumosa* Trin., *Stipa plumosa* Trin. var. *gracilis* Speg., *Stipa plumosa* Trin. var. *micrura* Speg., *Stipa plumosula* Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Jarava polyclada (Hack.) Peñailillo

Sin.: *Stipa polyclada* Hack.

Hierba. Nativa. 600-1900 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).

Jarava pseudoichu (Caro) F. Rojas

Sin.: *Stipa pseudoichu* Caro

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SLU, TUC).

Jarava pungionata (Caro & E.A. Sánchez) Matthei

Sin.: *Stipa pungionata* Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 3700-4200 m.

Países: ARG(CAT, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Jarava scabrifolia (Torres) Peñailillo

Sin.: *Jarava matthei* F. Rojas, *Stipa scabrifolia* Torres

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT).

Jarava scirpea (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa axilliflora* Parodi, nom. nud., *Stipa scirpea* Speg.

Hierba. Endémica. 2600-3300 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

Jarava subaristata (Matthei) Matthei

Sin.: *Stipa leptostachya* Griseb. var. *subaristata* Matthei, *Stipa subaristata* (Matthei) Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 1800-4100 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Jarava tortuosa (E. Desv.) Peñailillo

Sin.: *Stipa tortuosa* E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Koeleria Pers.

Koeleria barbinodis (Trin.) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson var. **barbinodis**

Sin.: *Trisetum barbinode* Trin. var. *barbinode*, *Trisetum barbinode* Trin. var. *hirtiflorum* (Hack.) Louis-Marie, *Trisetum hirtiflorum* Hack.

Hierba. Endémica. 500-3500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Koeleria barbinodis (Trin.) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson var. **sclerophylla** (Hack.) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson

Sin.: *Trisetum barbinode* Trin. var. *sclerophyllum* (Hack.) Finot, *Trisetum sclerophyllum* Hack.

Hierba. Endémica. 1700-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Koeleria barrosii Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson

Sin.: *Trisetum pyramidatum* Louis-Marie ex Finot

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(RNE). CHL(AIS, MAG).

Koeleria calderonii A.M. Molina

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Koeleria fueguina C.E. Calderón ex Nicora

Sin.: *Trisetum tolucense* Kunth var. *tomentosum* E. Desv., *Trisetum tomentosum* (E. Desv.) Nicora

Hierba. Endémica. 200-1600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, AIS, MAG).

Koeleria inaequaliglumis A.M. Molina

Hierba. Endémica. 1600-2400 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Koeleria johnstonii (Louis-Maire) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson subsp. **johnstonii**

Sin.: *Trisetum johnstonii* (Louis-Marie) Finot subsp. *johnstonii*, *Trisetum oreophilum* Louis-Marie var. *johnstonii* Louis-Marie

Hierba. Endémica. 2900-4600 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Koeleria johnstonii (Louis-Maire) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson subsp. **mattheii** (Finot) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson

Sin.: *Trisetum johnstonii* (Louis-Marie) Finot subsp. *mattheii* (Finot) Finot, *Trisetum mattheii* Finot

Hierba. Endémica. 4000-4100 m.

Países: CHL(TAR).

Koeleria kurtzii Hack. ex Kurtz

Sin.: *Koeleria argentina* Domin, *Koeleria bergii* Hieron. var. *fallacina* Domin, *Koeleria grisebachii* Domin var. *catamarcensis* Domin, *Koeleria grisebachii* Domin var. *riojensis* Domin, *Koeleria grisebachii* Domin var. *typica* Domin, nom. inval., *Koeleria hieronymi* Domin, *Koeleria kurtzii* Hack. ex Kurtz var. *mollis* Hack., *Koeleria lilloi* Hack., *Koeleria*

niederleinii Domin, *Koeleria niederleinii* Domin var. *mutica* Domin, *Koeleria niederleinii* Domin var. *pseudobergii* Domin, *Koeleria pseudocristata* Domin var. *andicola* Domin, *Trisetum kurtzii* (Hack.) Zotov, *Trisetum subaristatum* E. Desv.

Hierba. Nativa. 500-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, MAU, MAG, RME).

Koeleria nancaguensis (Finot) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson
Sin.: *Trisetum nancaguense* Finot

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Koeleria permollis Nees ex Steud.

Sin.: *Koeleria bergii* Hieron., *Koeleria bergii* Hieron. var. *aristulata* Domin, *Koeleria bergii* Hieron. var. *minor* Domin, *Koeleria bergii* Hieron. var. *typica* Domin, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-3900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF). URY(SOR).

Koeleria praeandina A.M. Molina

Hierba. Endémica.

Países: ARG(MEN, SJU).

Koeleria preslii (Kunth) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson

Sin.: *Avena pilosa* J. Presl, hom. illeg., *Avena preslei* Kunth, *Deschampsia lasiantha* Phil., *Trisetum buchtienii* Hack., *Trisetum lasiolepis* E. Desv., *Trisetum preslei* (Kunth) E. Desv. var. *buchtienii* (Hack.) Louis-Marie, *Trisetum preslei* (Kunth) E. Desv. var. *lasianthum* (Phil.) Louis-Marie

Hierba. Endémica. 1800-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Koeleria spicata (L.) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson subsp. ***cumingii*** (Nees ex Steud.) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson

Sin.: *Koeleria cumingii* Nees ex Steud., *Trisetum cumingii* (Nees ex Steud.) Parodi ex Nicora, *Trisetum cumingii* (Nees) Parodi ex Nicora var. *santacrucense* Nicora, *Trisetum malacophyllum* Phil., hom. illeg., *Trisetum mollifolium* Louis-Marie, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp. *cumingii* (Nees ex Steud.) Finot, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *cumingii* (Nees ex Steud.) Finot

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, LLA, MAG, RME).

Koeleria spicata (L.) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson subsp. ***dianthema*** (Louis-Maire) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson
Sin.: *Trisetum biflorum* Phil., hom. illeg., *Trisetum dianthemum* (Louis-Marie) Finot, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp. *dianthemum* (Louis-Marie) Finot, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *dianthemum* Louis-Marie

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHU). CHL(LLA).

Koeleria spicata (L.) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson subsp. ***phleoides*** (D'Urv.) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson

Sin.: *Avena phleoides* d'Urv., *Trisetum hirsutum* Phil., hom. illeg., *Trisetum phleoides* (d'Urv.) Kunth, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp. *phleoides* (d'Urv.) Hultén, hom. illeg., *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp. *phleoides* (d'Urv.) Macloskie, *Trisetum spicatum* (L.)

K. Richt. var. *hirsutum* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv. var. *phleoides* (d'Urv.) Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Koeleria spicata (L.) Barberá, Quintanar, Soreng & P.M. Peterson subsp. ***spicata***
Sin.: *Aira spicata* L., *Aira subspicata* L., nom. illeg., *Avena airoides* Koeler, *Koeleria spicata* Rchb. ex Willk. & Lange, nom. inval., *Koeleria subspicata* (L.) Rchb., *Trisetum andinum* Phil., hom. illeg., *Trisetum fuegianum* Gand., *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp. *bolivianum* Hultén, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp. *spicatum*, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *fuegianum* (Hack.) Louis-Marie, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *spicatum*, *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv., nom. superfl., *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv. var. *breviglume* Hack., *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv. var. *fuegianum* Hack., *Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv. var. *glabrifolium* Hack. ex Macloskie

Hierba. Nativa. 0-4700 m.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Koeleria ventanica A.M. Molina

Hierba. Endémica. 400-1100 m.

Países: ARG(BAI).

Koeleria vurilochensis C.E. Calderón ex Nicora var. ***patagonica*** (Domin) A.M. Molina

Sin.: *Koeleria bergii* Hieron. var. *patagonica* Domin

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Koeleria vurilochensis C.E. Calderón ex Nicora var. ***vurilochensis***

Hierba. Endémica. 200-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Lagurus L.

Lagurus ovatus L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG). URY(MON).

Lamarckia Moench, nom. cons.

Lamarckia aurea (L.) Moench

Sin.: *Cynosurus aureus* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN, SFE). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Lasiacis (Griseb.) Hitchc.

Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. var. austroamericana Davidse

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, GUA, PAI, PHA).

Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase

Sin.: *Lasiacis guaranitica* (Speg.) Parodi, *Lasiacis patentiflora* Hitchc. & Chase, *Lasiacis sorghoidea* (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase var. *patentiflora* (Hitchc. & Chase) Davidse, *Panicum guaranicum* Speg., *Panicum sorghoideum* Desv. ex Ham.

Hierba subleñosa. Nativa. 400 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Leersia Sw., nom. et typ. cons.

Leersia hexandra Sw.

Sin.: *Asprella hexandra* (Sw.) P. Beauv., *Asprella mexicana* (Kunth) Roem. & Schult., *Homalocenchrus gouinii* (E. Fourn.) Kuntze, *Homalocenchrus hexandrus* (Sw.) Kuntze, *Leersia contracta* Nees, *Leersia gouinii* E. Fourn., *Leersia hexandra* Sw. subsp. *grandiflora* (Döll) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Oryza hexandra* (Sw.) Döll, *Oryza hexandra* (Sw.) Döll var. *grandiflora* Döll, *Oryza mexicana* (Kunth) Döll

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, PHA). URY(DUR, ROC).

Leersia ligularis Trin. var. grandiflora (Döll) Pyrah

Sin.: *Homalocenchrus grandiflorus* (Döll) Hitchc., *Leersia debilis* Balansa & Poitr., *Leersia distichophylla* Balansa & Poitr., *Leersia grandiflora* (Döll) Prodoehl, *Oryza monandra* (Sw.) Döll var. *grandiflora* Döll

Hierba. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(MON).

Leersia virginica Willd.

Sin.: *Asprella virginica* (Willd.) P. Beauv., *Homalocenchrus virginicus* (Willd.) Britton, *Leersia virginica* Willd. var. *brasiliensis* Ekman

Hierba. Nativa. 800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leptochloa P. Beauv.

Leptochloa chloridiformis (Hack. ex Stuck.) Parodi

Sin.: *Baldomiria chloridiformis* (Hack. ex Stuck.) Herter, *Diplachne chloridiformis* Hack. ex Stuck.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, CON, PHA). URY(RNO).

Leptochloa crinita (Lag.) P.M. Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Chloris crinita* Lag., *Chloris mendocina* Phil., *Chloropsis blanchardiana* (E. Fourn. ex Scribn.) Kuntze, *Chloropsis crinita* (Lag.) Kuntze, *Chloropsis mendocina* (Phil.) Kuntze, *Trichloris blanchardiana* E. Fourn. ex Scribn., *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi, *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi var. *triflora* Parodi, *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi var. *typica* Parodi, nom. inval., *Trichloris mendocina* (Phil.) Kurtz, *Trichloris mendocina* (Phil.) Kurtz ex Seckt, hom. illeg., *Trichloris mendocina* (Phil.) Kurtz f. *blanchardiana* (E. Fourn. ex Scribn.) Kurtz

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ). URY(RNO).

Notas: Citada para Chile (Peterson et al., 2001) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Leptochloa pluriflora (E. Fourn.) P.M. Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Chloris pluriflora* (E. Fourn.) Clayton, *Chloropsis pluriflora* (E. Fourn.) Kuntze, *Trichloris lilloi* Parodi, *Trichloris pluriflora* E. Fourn. f. *macra* Hack., *Trichloris pluriflora* E. Fourn. f. *pluriflora*

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Leptochloa virgata (L.) P. Beauv.

Sin.: *Cynodon domingense* (Jacq.) Raspail, *Cynodon virgatus* (L.) Raspail, *Cynosurus dominguensis* Jacq., *Cynosurus virgatus* L., *Diplachne domingensis* (Jacq.) Chapm., *Eleusine barbata* Desv., *Eleusine domingensis* (Jacq.) Pers., *Eleusine unioides* Willd. ex Steud., nom. inval., *Eleusine virgata* (L.) Pers., *Festuca domingensis* (Jacq.) Lam., *Festuca virgata* (L.) Lam., *Leptochloa barbata* (Desv.) Parodi ex Nicora, *Leptochloa domingensis* (Jacq.) Trin., *Leptochloa mutica* Steud., *Leptochloa procera* Nees, *Leptochloa virgata* (Jacq.) Chapm. var. *domingensis* (Jacq.) Link ex Griseb., *Leptochloa virgata* (L.) P. Beauv. var. *mutica* (Steud.) Döll, *Leptochloa virgata* (L.) P. Beauv. var. *puberula* Hack., *Leptostachys domingensis* (Jacq.) G. Mey., *Rabdochloa domingensis* (Jacq.) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, NAS, PAI, PHA, SPE).

Lepturus R. Br.

Lepturus repens (G. Forst.) R. Br.

Sin.: *Rottboellia repens* G. Forst.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(IPA).

Leymus Hochst.

Leymus arenarius (L.) Hochst.

Sin.: *Elymus arenarius* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL, MAG).

Leymus erianthus (Phil.) Dubcovsky

Sin.: *Cryptochloris spathacea* Speg., nom. nud., *Elymus barbatus* Kurtz, nom. nud., *Elymus erianthus* Phil., *Elymus erianthus* Phil. var. *aristatus* Hicken, *Elymus erianthus* Phil. var. *spiegazzinii* Kurtz ex Hauman, *Elymus spiegazzinii* Kurtz, nom. nud., *Eremium erianthum* (Phil.) Seberg & Linde-Laursen

Hierba. Endémica. 1800-3400 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL).

Lithachne P. Beauv.

Lithachne pauciflora (Sw.) P. Beauv.

Sin.: *Lithachne axillaris* (Lam.) P. Beauv., *Olyra axillaris* Lam., *Olyra pauciflora* Sw.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(GUA).

Lolium L.

Lolium multiflorum Lam.

Sin.: *Lolium italicum* A. Braun, *Lolium multiflorum* Lam. var. *italicum* (A. Braun) R.Beck, *Lolium multiflorum* Lam. var. *muticum* DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME, JFE). PRY(CEN). URY(MAL).

Lolium perenne L.

Sin.: *Lolium brasilianum* Nees, *Lolium perenne* L. var. *brasilianum* (Nees) Kuntze

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(MON).

Lolium remotum Schrank

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Lolium rigidum Gaudin subsp.

lepturoides Sennen & Mauricio

Sin.: *Lolium loliaceum* (Bory & Chaub.) Hand.-Mazz., *Lolium subulatum* Vis., *Rottboellia loliacea* Bory & Chaub.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, RNE).

Lolium rigidum Gaudin subsp. **rigidum**

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, RNE, SFE). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME).

Lolium temulentum L.

Sin.: *Craepalia temulenta* (L.) Schrank, *Festuca temulenta* (L.) Columbus & J.P. Sm., *Lolium arvense* With., *Lolium temulentum* L. f. *arvense* (With.) Junge, *Lolium temulentum* L. var. *leptochaeton* A. Braun

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(MON).

Lombardochloa Roseng. & B.R. Arrill.

Lombardochloa rufa (J. Presl) Roseng. & B.R. Arrill. var. **rufa**

Sin.: *Briza glomerata* Arechav., *Briza glomerata* Kuntze, hom. illeg., *Briza rufa* (J. Presl) Steud., *Chascolytrum rufum* J. Presl var. *rufum*, *Poidium rufum* (J. Presl) Matthei

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLO, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TYT).

Notas: La especie fue citada para Paraguay por Essi et al. (2017: 507) sin indicar material de referencia.

Lombardochloa rufa (J. Presl) Roseng. & B.R. Arrill. var. **sparsepilosa** (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Sin.: *Briza rufa* (J. Presl) Steud. var. *sparsipilosa* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Chascolytrum rufum* J. Presl var. *sparsipilosum* (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Hierba. Endémica. 200-1000 m.

Países: ARG(COR). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lorenzochloa Reeder & C. Reeder

Lorenzochloa bomanii (Hauman) Romasch.

Sin.: *Anatherostipa bomanii* (Hauman) Peñailillo, *Nicoraella bomanii* (Hauman) Torres, *Stipa bomanii* Hauman

Hierba. Nativa. 3200-4600 m.

Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Lorenzochloa henrardiana (Parodi) Romasch.

Sin.: *Anatherostipa henrardiana* (Parodi) Peñailillo, *Nicoraella henrardiana* (Parodi) Torres, *Stipa henrardiana* Parodi

Hierba. Endémica. 4500-5000 m.
Países: ARG(JUU).

Lorenzochloa mucronata (Griseb.) Romasch.

Sin.: *Anatherostipa mucronata* (Griseb.) F. Rojas, *Anatherostipa saltensis* (Kuntze) Peñailillo, *Nicoraella mucronata* (Griseb.) Torres, *Oryzopsis mucronata* (Griseb.) Parodi, *Piptochaetium mucronatum* Griseb., *Stipa saltensis* Kuntze

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA).

Lorenzochloa obtusa (Nees & Meyen) Romasch.

Sin.: *Anatherostipa obtusa* (Nees & Meyen) Peñailillo, *Nicoraella obtusa* (Nees & Meyen) Torres, *Piptatherum obtusum* Nees & Meyen, *Stipa boliviensis* Hack., *Stipa jujuyensis* Speg., *Stipa obtusa* (Nees & Meyen) Hitchc.

Hierba. Nativa. 3600-4100 m.

Países: ARG(JUU).

Lorenzochloa rigidiseta (Pilg.) Romasch.

Sin.: *Anatherostipa rigidiseta* (Pilg.) Peñailillo, *Nicoraella rigidiseta* (Pilg.) Torres, *Oryzopsis rigidiseta* Pilg., *Stipa rigidiseta* (Pilg.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 3800-4200 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Lorenzochloa venusta (Phil.) Romasch.

Sin.: *Anatherostipa venusta* (Phil.) Peñailillo, *Nicoraella venusta* (Phil.) Torres, *Stipa venusta* Phil.

Hierba. Endémica. 3900-4100 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Loudetia Hochst. ex Steud., nom. cons.

Loudetia flammida (Trin.) C.E. Hubb.
Sin.: *Arundinella flammida* Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Loudetiopsis Conert

Loudetiopsis chrysothrix (Nees) Conert
Sin.: *Tristachya chrysothrix* Nees, *Tristachya chrysothrix* Nees f. *pallida* Hack.

Hierba. Nativa. 200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

Louisiella C.E. Hubb. & J. Léonard

Louisiella elephantipes (Nees ex Trin.) Zuloaga

Sin.: *Digitaria megapotamica* Mez, *Panicum elephantipes* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, PHA).

Luziola Juss.

Luziola bahiensis (Steud.) Hitchc.

Sin.: *Caryochloa bahiensis* Steud., *Luziola contracta* Hack., *Luziola longivalvula* Döll, nom. superfl., *Luziola pusilla* S. Moore, *Luziola striata* Balansa & Poitr.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Luziola brasiliensis (Trin.) Swallen

Sin.: *Caryochloa brasiliensis* Trin., *Luziola micrantha* (Schrad. ex Kunth) Benth.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Luziola fragilis Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Luziola gracillima Prodoehl

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). PRY(PHA).

Luziola peruviana Juss. ex J.F. Gmel.

Sin.: *Juncodes peruvianum* (Desv.)

Kuntze, *Luziola leiocarpa* Lindm., *Luziola mexicana* Kunth, *Milium natans* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, PAI, PHA, SPE). URY(FLA, PAY, RNO, ROC, SOR, TAC, TYT).

Luziola spruceana Benth. ex Döll

Sin.: *Luziola spiciformis* Andersson ex Balansa & Poit.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CEN, PHA).

Luziola subintegra Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). PRY(CEN, PHA).

Megalachne Steud.

Megalachne berteroniana Steud.

Sin.: *Bromus fernandezianus* (Phil.)

Skottsb., *Bromus megalachne* Pilg., *Pantathera avenacea* Phil. ex Hemsl., nom. nud., *Pantathera fernandeziana* Phil.

Hierba. Endémica. 100-700 m.

Países: CHL(JFE).

Megathyrsus (Pilg.) B.K. Simon &

S.W.L. Jacobs

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.

Simon & S.W.L. Jacobs var. **maximus**

Sin.: *Panicum maximum* Jacq., *Urochloa maxima* (Jacq.) R.D. Webster

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.

Simon & S.W.L. Jacobs var. **pubiglumis**

(K. Schum.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs

Sin.: *Panicum maximum* Jacq. var. *pubiglume* K. Schum., *Panicum maximum* Jacq. var. *trichoglume* Robyns, *Urochloa maxima* (Jacq.) R.D. Webster var.

trichoglumis (Robyns) R.D. Webster

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, FOR, MIS). BRA(RGS). CHL(IPA).

Melica L., nom. cons.

Melica animarum Mujica-Sallés & M. Marchi

Hierba. Endémica. 400-500 m.

Países: URY(MAL).

Melica argentata E. Desv.

Sin.: *Melica ampla* Phil., *Melica argentata*

E. Desv. var. *breviglumis* Papp, *Melica glabra* Steud., *Melica nitida* Phil., *Melica tortuosa* Phil., *Melica violacea* Cav. var. *argentata* Papp

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Melica argyrea Hack.

Sin.: *Melica argyrea* Hack. f. *pilosa* (Papp)

Hempel, *Melica argyrea* Hack. var. *pilosa* Papp, *Melica papilionacea* L. var. *laxiflora* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SJU, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(CLA, COL, MON, PAY, RNO, SOR).

Melica arzivencoi Valls & Barcellos

Hierba. Nativa. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Melica bonariensis Parodi

Sin.: *Melica papilionacea* L. var. *violacea* Hieron.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, LPA, RNE, SLU).

Melica brasiliana Ard.

Sin.: *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam., *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. f. *pallida* Papp, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. f. *violacea* Hack. ex Papp, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. subsp. *cymbaria* Ekman, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *mucronata* Papp, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *tandilensis* Kuntze, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *typica* Papp, nom. inval., *Melica brasiliana* Ard. f. *tandilensis* (Kuntze) Hempel, *Melica brasiliana* Ard. var. *aurantiaca* (Desr. ex Lam.) Hempel, *Melica mucronata* (Papp) Herter, *Melica papilionacea* L., *Melica tandilensis* (Kuntze) Herter

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

Melica brevicoronata Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(FLO, FLA, LAV, MAL, SJO, TYT).

Melica cepacea (Phil.) Scribn.

Sin.: *Bromelica cepacea* (Phil.) Nicora, *Festuca cepacea* Phil.

Hierba. Endémica. 1000-3500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, ARA, RME).

Melica chilensis J. Presl

Sin.: *Melica adhaerens* Hack., *Melica andina* Hauman, *Melica andina* Hauman var. *laxissima* Papp, *Melica andina* Hauman var. *trinervis* Papp, *Melica pilgeriana* Papp, *Melica popoviciana* Papp

Hierba. Nativa. 2500-3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Melica commersonii Nees ex Steud.

Sin.: *Melica commutata* Steud., *Melica violacea* Cav. var. *commersonii* (Nees ex Steud.) Papp, *Melica violacea* Cav. var. *commutata* (Steud.) Papp, *Melica violacea* Cav. var. *pallida* E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-1900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

Melica decipiens Caro

Sin.: *Melica violacea* Cav. f. *mucronata* Papp, *Melica violacea* Cav. var. *glabrior* Papp

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Melica eremophila Torres

Sin.: *Melica monantha* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, COL, LAV, MAL, MON, RIV, TAC, TYT).

Melica glabrescens (Torres) Torres

Sin.: *Melica violacea* Cav. var. *glabrescens* Torres

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, RNE).

Melica hyalina Döll

Sin.: *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *montevidensis* Papp, *Melica brasiliana* Ard. f. *truncata* (Papp) Hempel, *Melica hyalina* Döll f. *violacea* Papp, nom. nud., *Melica hyalina* Döll var. *truncata* Papp, *Melica montevidensis* (Papp) Herter, *Melica papilionacea* L. var. *hyalina* (Döll) Hack. ex Kneuck.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TAC).

Melica lilloi Bech.

Sin.: *Melica decumbens* Papp, *Melica laxiflora* Cav. f. *macrior* Hack., nom. nud.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Melica longiflora Steud.

Sin.: *Melica berteriana* Phil., *Melica berteriana* Phil. f. *violacea* Papp, *Melica berteriana* Phil. var. *exaltata* (Phil.) Papp, *Melica berteriana* Phil. var. *pilosula* Papp, *Melica berteriana* Phil. var. *puberula* Papp, *Melica berteriana* Phil. var. *typica* Papp, nom. inval., *Melica exaltata* Phil., *Melica flava* Nees, *Melica flava* Nees ex Steud. var. *violacea* Papp, *Melica hirta* Phil., *Melica laxiflora* Cav. f. *hirta* (Phil.) W. Hempel, *Melica laxiflora* Cav. var. *glabra* Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *hirsuta* E. Desv., *Melica laxiflora* Cav. var. *longiflora* (Steud.) Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *pilosula* Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *typica* Papp, nom. inval., *Melica laxiflora* E. Desv. ex M. Muñoz, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Melica macra Nees

Sin.: *Melica macra* Nees var. *pilosa* Papp

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Melica mollis Phil.

Hierba. Endémica. 300-400 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Melica parodiana Torres

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(CAS, LAV, MAL, RIV).

Melica patagonica Parodi

Sin.: *Melica stuckertii* Hack. var. *tenuis* Papp

Hierba. Endémica. 800-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Melica paulsenii Phil.

Sin.: *Melica litoralis* Phil. var. *paulsenii* (Phil.) Papp, *Melica litoralis* Phil. var. *werdermannii* Papp

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Melica poecilantha E. Desv.

Sin.: *Melica poecilantha* E. Desv. var. *umbrosa* E. Desv.

Hierba. Endémica. 500-1200 m.

Países: CHL(COQ).

Melica rigida Cav.

Sin.: *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *rigida* (Cav.) Papp

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Melica riograndensis Longhi-Wagner & Valls

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Melica sarmentosa Nees var. **monticola** Torres
Hierba. Endémica. 800-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Melica sarmentosa Nees var. **pilosula** Döll
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).
BRA(RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA).
Notas: Citada para Uruguay (Longhi-Wagner, 1987; Mujica Sallés, 1996; Soreng et al., 2003) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Melica sarmentosa Nees var. **sarmentosa**
Sin.: *Melica sarmentosa* Nees var. *glabrior* Döll
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, PAI). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Melica serrana Mujica-Sallés & M. Marchi
Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: URY(MAL).

Melica spartinoides L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Melica stuckertii Hack.
Sin.: *Melica cordobensis* Hack., *Melica stuckertii* Hack. var. *cordobensis* (Hack.) Hack.
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE).

Melica tenuis Hack. ex Arechav.
Sin.: *Melica hunzikeri* Nicora
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, ITA). URY(LAV, MAL, MON, PAY, SJO).

Melica violacea Cav.
Sin.: *Melica alata* Nees., *Melica alata* Nees var. *filiculmis* (Desv.) Papp, *Melica alata* Nees var. *mollis* Papp, *Melica filiculmis* Desv., *Melica laxiflora* Cav., *Melica valdiviana* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Melinis P. Beauv.

Melinis minutiflora P. Beauv.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(PAI).

Melinis repens (Willd.) Zizka
Sin.: *Rhynchelytrum repens* (Willd.) C.E. Hubb., *Rhynchelytrum roseum* (Nees) Stapf & C.E. Hubb., *Saccharum repens* Willd., *Tricholaena repens* (Willd.) Hitchc.
Hierba. Introducida. 0-1300 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(SAO).

Merostachys Spreng.

Merostachys caucaiana Send.
Hierba subleñosa. Nativa. 100-900 m.
Países: BRA(RGS).

Merostachys ciliata McClure & L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Merostachys clausenii Munro
Sin.: *Merostachys burchellii* Munro
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, GUA).

Merostachys glauca McClure & L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Endémica. 200-700 m.
Países: BRA(SCA).

Merostachys kleinii Send.
Hierba subleñosa. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Merostachys multiramea Hack.
Sin.: *Merostachys anomala* Dutra
Hierba subleñosa. Nativa. 400-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Merostachys neesii Rupr.l
Hierba subleñosa. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Merostachys petiolata Döll
Hierba subleñosa. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Merostachys pilifera Send.
Hierba subleñosa. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Merostachys pluriflora Munro ex E.G. Camus
Sin.: *Bambusa pubescens* Döll, hom. illeg., *Brasilocalamus pubescens* Nakai
Hierba subleñosa. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

Merostachys skvortzovii Send.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Merostachys speciosa Spreng.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Merostachys ternata Nees

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Merostachys vestita McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(SCA).

Mesosetum Steud.

Mesosetum agropyroides Mez

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Mesosetum chaseae Lucas

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Mesosetum comatum Swallen

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(MIS).

Mesosetum exaratum (Trin.) Chase

Sin.: *Panicum exaratum* Trin.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Mesosetum ferrugineum (Trin.) Chase

Sin.: *Panicum ferrugineum* Trin.

Hierba. Nativa. 1200 m.

Países: BRA(PAR).

Microbriza Parodi ex Nicora & Rúgolo

Microbriza poimorpha (J. Presl) Parodi ex Nicora & Rúgolo

Sin.: *Briza hackelii* (Lindm.) Ekman, *Briza hackelii* (Lindm.) Ekman f. *pseudisachne*

Ekman, *Briza poomorpha* (J. Presl)

Henrard, *Chascolytrum poomorphum* (J. Presl)

Essi, *Isachne hackelii* Lindm.,

Isachne poomorpha (J. Presl) Mez ex

Ekman, nom. inval., *Longhi-Wagner* &

Souza-Chies, *Panicum poomorphum* J. Presl,

Poidium poomorphum (J. Presl)

Matthei

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

URY(CLA, COL, LAV, MAL, MON, ROC,

SJO, SOR, TAC, TYT).

Microchloa R. Br.

Microchloa indica (L. f.) P. Beauv.

Sin.: *Microchloa indica* (L. f.) Kuntze,

comb. superfl., *Microchloa indica* (L. f.) P.

Beauv. var. *tenuis* Hack. & Stuck.,

Microchloa setacea (Roxb.) R. Br., *Nardus*

indica L. f.

Hierba. Nativa. 2300-2400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,

ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE,

TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP,

TAR). PRY(PAI). URY(ART, LAV, PAY,

RNO).

Microchloa kunthii Desv.

Hierba. Nativa. 200-3200 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR).

Miscanthus Andersson

Miscanthus sinensis Andersson

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CHL(MAU). URY(MON).

Mnesithea Kunth

Mnesithea aurita (Steud.) de Koning & Sosef

Sin.: *Coelorachis aurita* (Steud.) A.

Camus, *Manisuris aurita* (Steud.) Hitchc.

& Chase, comb. superfl., *Manisuris aurita*

(Steud.) Kuntze, *Rottboellia aurita* Steud.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

PRY(PAI).

Mnesithea balansae (Hack.) de Koning & Sosef

Sin.: *Coelorachis balansae* (Hack.) A.

Camus, *Coelorachis balansae* (Hack.)

Henrard, comb. superfl., *Manisuris*

balansae (Hack.) Parodi, *Rottboellia*

balansae Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,

MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, COA, GUA,

ITA, MIE, PAI, SPE).

Mnesithea parodiana (Henrard) de Koning & Sosef

Sin.: *Coelorachis parodiana* Henrard,

Rottboellia parodiana (Henrard) Burkart

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, FOR, LRI, SLU,

SDE). PRY(APY).

Mnesithea selloana (Hack.) de Koning & Sosef

Sin.: *Coelorachis selloana* (Hack.) A.

Camus, *Coelorachis selloana* (Hack.)

Henrard, comb. superfl., *Manisuris*

selloana (Hack.) Kuntze, *Rottboellia*

selloana Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,

ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA).

PRY(GUA, ÑEE). URY(FLA, MAL).

Mnesithea subgibbosa (Winkl. ex Hack.) de Koning & Sosef

Sin.: *Rhytachne subgibbosa* (Winkl. ex Hack.) Clayton, *Rottboellia loricata* Trin. subsp. *glaberrima* Hack., *Rottboellia loricata* Trin. subsp. *subgibbosa* Winkl. ex Hack.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, ITA).

Moorochloa Veldkamp

Moorochloa eruciformis (Sm.) Veldkamp

Sin.: *Brachiaria eruciformis* (Sm.) Griseb., *Echinochloa eruciformis* (Sm.) Rchb., *Panicum eruciforme* Sm., *Urochloa eruciformis* (Sm.) C. Nelson & Fern.Casas

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(ERI).

Morronea Zuloaga & Scataglini

Morronea trichidiachnis (Döll) Zuloaga & Scataglini

Sin.: *Panicum trichidiachne* Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

Muhlenbergia Schreb.

Muhlenbergia alopecuroides (Griseb.) P.M. Peterson & Columbus

Sin.: *Lycurus alopecuroides* Griseb., *Lycurus phleoides* Kunth var. *glaucifolius* Beal, *Lycurus setosus* (Nutt.) C.Reeder, *Pleopogon setosum* Nutt.

Hierba. Nativa. 2000-3700 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Muhlenbergia arenicola Buckley

Sin.: *Podosemum arenicola* (Buckley)

Bush

Hierba. Nativa. 1000-1800 m.

Países: ARG(CAT, LPA).

Muhlenbergia asperifolia (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi

Sin.: *Agrostis distichophylla* Phil., hom. illeg., *Agrostis eremophila* Speg., *Muhlenbergia asperifolia* (Nees & Meyen ex Trin.) Matthei, comb. superfl., *Sporobolus asperifolius* (Nees & Meyen ex Trin.) Nees, *Sporobolus copiapinus* Phil., *Sporobolus deserticola* Phil., *Sporobolus distichophyllus* Phil., *Sporobolus sarmentosus* Griseb., *Vilfa asperifolia* Nees & Meyen ex Trin.

Hierba. Nativa. 100-4700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, LLA, RME).

Muhlenbergia atacamensis Parodi

Sin.: *Chaboissaea atacamensis* (Parodi) P.M. Peterson & Annable, *Muhlenbergia atacamensis* Parodi var. *brachyanthera* Parodi

Hierba. Nativa. 2900-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Muhlenbergia bryophilus (Döll) P.M.

Peterson

Sin.: *Aegopogon argentinus* Mez, *Aegopogon bryophilus* Döll, *Aegopogon fiebrigii* Mez, *Aegopogon geminiflorus* Kunth var. *muticus* Pilg.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Muhlenbergia ciliata (Kunth) Trin.

Sin.: *Muhlenbergia ciliata* (Kunth) Kunth, comb. superfl., *Podosemum ciliatum* Kunth, *Polypogon ciliatus* (Kunth) Spreng.,

Trichochloa ciliata (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Muhlenbergia coerulea (Griseb.) Mez

Sin.: *Epicampes coerulea* Griseb., *Epicampes coerulea* Griseb. var. *submutica* Hack., *Epicampes kunthiana* Griseb., *Epicampes phleoides* (Kunth) Griseb.

Hierba. Nativa. 2400-4900 m.

Países: ARG(COR, SAL, TUC).

Muhlenbergia coerulea (Griseb.) (Mez x **M. rigida** (Kunth) Kunth

Sin.: *Muhlenbergia breviaristata* (Hack.) Parodi, *Muhlenbergia phragmitoides* Griseb. var. *breviaristata* Hack.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(LRI, SAL, TUC).

Muhlenbergia diversiglumis Trin.

Hierba. Nativa. 600-2500 m.

Países: ARG(JUJ).

Muhlenbergia fastigiata (J. Presl)

Henrard

Sin.: *Sporobolus fastigiatus* J. Presl

Hierba. Nativa. 3300-4300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR).

Muhlenbergia ligularis (Hack.) Hitchc.

Sin.: *Muhlenbergia minuscula* H. Scholz, *Sporobolus ligularis* Hack.

Hierba. Nativa. 1000-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Muhlenbergia paniculata (Nutt.)

Columbus

Sin.: *Lepturus paniculatus* Nutt., *Rottboellia paniculata* (Nutt.) Spreng., *Schedonnardus paniculatus* (Nutt.)

Branner & Coville, *Schedonnardus texanus* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, SLU, SFE).

Muhlenbergia peruviana (P. Beauv.) Steud.

Sin.: *Agrostis peruviana* (P. Beauv.) Spreng., *Clomena peruviana* P. Beauv., *Muhlenbergia clomena* Kunth, nom. superfl., *Muhlenbergia herzogiana* Henrard, *Muhlenbergia nana* Benth., *Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. f. *versicolor* Kuntze, *Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. f. *viridis* Kuntze, *Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. var. *elator* Kuntze, *Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. var. *subcaespitosa* Kuntze

Hierba. Nativa. 2000-4600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, MAU).

Muhlenbergia phalaroides (Kunth) P.M. Peterson

Sin.: *Lycurus phalaroides* Kunth, *Lycurus phleoides* Kunth var. *brevifolius* Scribn. ex Beal, *Muhlenbergia lycuroides* Vasey ex Beal

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL, TUC).

Muhlenbergia ramulosa (Kunth) Swallen

Sin.: *Agrostis ramulosa* (Kunth) Roem. & Schult., *Sporobolus ramulosus* (Kunth) Kunth, *Vilfa ramulosa* Kunth

Hierba. Nativa.

Países: ARG(TUC).

Muhlenbergia rigida (Kunth) Kunth

Sin.: *Agrostis quitensis* Spreng., *Muhlenbergia elegans* (Kunth) Trin., *Muhlenbergia elegans* (Kunth) Trin. var. *atroviolacea* Kuntze, *Muhlenbergia*

elegans (Kunth) Trin. var. *subviridis* Kuntze, *Muhlenbergia phragmitoides* Griseb., *Muhlenbergia rigida* (Kunth) Trin., nom. inval., *Podosemum rigidum* Kunth, *Trichochloa elegans* (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 1700-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Muhlenbergia schreberi J.F. Gmel.

Sin.: *Muhlenbergia diffusa* Schreb., hom. illeg., *Muhlenbergia diffusa* Willd.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(MON).

Muhlenbergia tenuifolia (Kunth) Kunth

Sin.: *Arundo quitensis* (Kunth) Poir., comb. illeg., *Arundo tenuifolia* (Kunth) Poir., *Calamagrostis quitensis* Kunth, *Calamagrostis tenuifolia* Kunth, *Muhlenbergia quitensis* (Kunth) Hitchc., *Podosemum tenuifolium* (Kunth) Nees ex Nees & Schauer

Hierba. Nativa. 1200-2500 m.

Países: ARG(SAL).

Muhlenbergia torreyi (Kunth) Hitchc. ex Bush

Sin.: *Agrostis caespitosa* Torr., hom. illeg., *Agrostis torreyi* Kunth, *Muhlenbergia gracillima* Torr., *Muhlenbergia nardifolia* Griseb., *Podosemum gracillimum* (Torr.) Bush

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, MEN, SAL, SLU, TUC).

Munroa Torr.

Munroa andina Phil.

Sin.: *Hemimunroa andina* (Phil.) Parodi, *Hemimunroa andina* (Phil.) Parodi var.

breviseta (Hack.) Parodi, *Munroa andina* Phil. var. *breviseta* Hack., *Munroa multiflora* Phil.

Hierba. Nativa. 2600-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT).

Munroa argentina Griseb.

Hierba. Nativa. 1100-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT).

Munroa decumbens Phil.

Hierba. Nativa. 2500-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Munroa mendocina Phil.

Hierba. Endémica. 700-3300 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Nassella (Trin.) E. Desv.

Nassella airoides (Ekman) Barkworth

Sin.: *Stipa airoides* Ekman

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA).

Nassella arcaensis (Speg.) Torres

Sin.: *Stipa arcaensis* Speg., *Stipa paniculata* Hitchc.

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Nassella arcuata (R.E. Fr.) Torres

Sin.: *Nassella curviseta* (Hitchc.) Barkworth, *Stipa arcuata* R.E. Fr., *Stipa curviseta* Hitchc.

Hierba. Nativa. 400-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Nassella arechavaletae (Speg.) Barkworth

Sin.: *Stipa arechavaletae* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(MAL, MON, RIV, SAO).

Nassella argentinensis (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa argentinensis* Speg., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *virescens* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, SFE).

Notas: Citada para Paraguay (Barkworth & Torres, 2001) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Nassella asplundii Hitchc.

Hierba. Nativa. 3600-4000 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Nassella barbinodis (Phil.) M. Muñoz, Ciald. & Morrone

Sin.: *Stipa barbinodis* Phil.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Nassella brachychaetoides (Speg.) Barkworth

Sin.: *Stipa brachychaetoides* Speg.

Hierba. Endémica. 0-3100 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Nassella brachyglumis (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa brachyglumis* F.A. Roig

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Nassella brachyphylla (Hitchc.) Barkworth

Sin.: *Stipa brachyphylla* Hitchc.

Hierba. Nativa. 3500-4500 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Nassella brasiliensis (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo

Sin.: *Stipa brasiliensis* A. Zanin & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Nassella burkartii (Torres) Barkworth & Torres

Sin.: *Stipa burkartii* Torres

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI).

Notas: Citada para Uruguay (Barkworth & Torres, 2001; Soreng et al., 2003) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Nassella cabreræ Torres

Hierba. Nativa. 2700-3900 m.

Países: ARG(JUU, TUC).

Nassella caespitosa Griseb.

Sin.: *Oryzopsis caespitosa* (Griseb.) Ball, *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg., *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *subtypica* Speg., *Stipa linearifolia* E. Fourn., *Stipa plagiostephana* Speg., *Stipa violacea* Hitchc.

Hierba. Nativa. 2600-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT).

Nassella carettei (Hauman) Torres

Sin.: *Stipa carettei* Hauman

Hierba. Endémica. 1200-2100 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Nassella catamarcensis Torres

Hierba. Endémica. 1600-2000 m.

Países: ARG(CAT).

Nassella charruana (Arechav.) Barkworth

Sin.: *Stipa charruana* Arechav., *Stipa longicylindrica* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLO, MAL, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).

Nassella chilensis (Trin.) E. Desv.

Sin.: *Nassella floribunda* Phil., *Nassella landbeckii* Phil., *Nassella landbeckii* Phil. var. *eremophila* Phil., *Nassella laxiflora* Phil., *Nassella major* (Trin. & Rupr.) E. Desv., *Nassella obscura* F. Phil., *Nassella planifolia* Phil., *Nassella ramosa* E. Desv., *Nassella sadae* Phil., *Piptatherum lindleyanum* Nees, *Piptatherum ramosum* Nees, *Urachne chilensis* Trin., *Urachne major* Trin. & Rupr., *Urachne ramosa* Steud., nom. superfl.

Hierba. Endémica. 2700-5000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Nassella coquimbensis (Matthei) Peñailillo

Sin.: *Stipa coquimbensis* Matthei

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(COQ).

Nassella cordobensis (Speg.) Barkworth

Sin.: *Stipa cordobensis* Speg., *Stipa cordobensis* Speg. var. *tuberculata* F.A. Roig, *Stipa papillosa* (Hack.) Hitchc., *Stipa tenuis* Phil. var. *papillosa* Hack.

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE).

Nassella crassiflora (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth

Sin.: *Stipa crassiflora* Roseng. & B.R. Arrill.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(MAL).

Nassella curamalalensis (Speg.) Barkworth

Sin.: *Stipa curamalalensis* Speg., *Stipa tenuissima* Trin. var. *curamalalensis* (Speg.) Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA). URY(SOR).

Nassella depauperata (Pilg.) Barkworth
Sin.: *Nassella depauperata* (Pilg.) Barkworth var. *glabrata* (Pilg.) Torres, *Stipa depauperata* Pilg., *Stipa depauperata* Pilg. var. *glabrata* Pilg., *Stipa depauperata* Pilg. var. *humilis* Pilg., *Stipa leptothera* Speg. var. *atroviolacea* Hack., *Stipa pumila* Mez
Hierba. Nativa. 3200-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

Nassella duriuscula (Phil.) Barkworth
Sin.: *Stipa duriuscula* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Nassella elata (Speg.) Torres
Sin.: *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *elata* Speg.
Hierba. Nativa. 2200-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(ATA).

Nassella entrerriensis (Burkart) Peñailillo
Sin.: *Stipa entrerriensis* Burkart
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(CAS).

Nassella fabrisii Torres
Hierba. Endémica. 1300-2000 m.
Países: ARG(COR, TUC).

Nassella famatinensis Torres
Hierba. Endémica. 300-3500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Nassella filiculmis (Delile) Barkworth
Sin.: *Stipa ceresiensis* Kuntze, *Stipa filiculmis* Delile, *Stipa filiculmis* Delile var. *major* Speg., *Stipa filiculmis* Delile var. *minor* Speg., *Stipa leucogluma* Steud., *Stipa trichocaulos* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE, SLU, SFE).

BRA(RGS, SCA). CHL(LBO, BIO, ARA, LSR, LLA). URY(FLA, LAV, MAL, PAY, SOR, TYT).

Nassella formicarum (Delile) Barkworth
Sin.: *Stipa formicarum* Delile
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE). URY(SOR).

Nassella gibba (Phil.) M. Muñoz
Sin.: *Nassella exserta* Phil. var. *asperata* Parodi, *Piptochaetium gibbum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Nassella gigantea (Steud.) M. Muñoz
Sin.: *Nassella aemulans* F. Phil., nom. nud., *Nassella exserta* Phil., *Nassella fuscescens* Phil., *Nassella melanocarpa* Phil., *Nassella pugae* Phil., *Urachne aemulans* Steud. ex Lechler, nom. nud., *Urachne gigantea* Steud., *Urachne melanocarpa* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Nassella glabripoda Torres var. **glabripoda**
Hierba. Endémica. 2600-4500 m.
Países: ARG(JUU, LRI, SJU).

Nassella glabripoda Torres var. **planifolia** Torres
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUU, LRI).

Nassella hirtifolia (Hitchc.) Barkworth
Sin.: *Stipa hirtifolia* Hitchc.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Nassella holwayi (Hitchc.) Barkworth
Sin.: *Stipa holwayi* Hitchc.
Hierba. Nativa. 3500-4200 m.
Países: ARG(JUU).

Nassella hunzikeri (Caro) Barkworth
Sin.: *Stipa hunzikeri* Caro
Hierba. Endémica. 900-1500 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Nassella hyalina (Nees) Barkworth
Sin.: *Stipa hyalina* Nees
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(CAS, FLO, FLA, MON, PAY, SOR).

Notas: Citada para Paraguay (Soreng et al., 2003) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Nassella inconspicua (J. Presl) Barkworth
Sin.: *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *lilloi* Hack., *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *subelata* Speg., *Stipa inconspicua* J. Presl
Hierba. Nativa. 1600-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Nassella juergensii (Hack.) Barkworth
Sin.: *Stipa juergensii* Hack.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS, SCA). URY(FLO, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TYT).

Nassella juncea Phil.
Sin.: *Nassella chilensis* (Trin.) E. Desv. var. *juncea* (Phil.) M. Muñoz
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, ARA, LSR, LLA, RME).

Nassella lachnophylla (Trin.) Barkworth
Sin.: *Stipa cumingiana* Trin., *Stipa cumingiana* Trin. var. *lachnophylla* (Trin.) Trin. & Rupr., *Stipa hirta* Phil., *Stipa lachnophylla* Trin., *Stipa laxa* E. Desv., *Stipa leiocarpa* Nees ex Steud.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME, JFE).

Nassella laevis (Phil.) Barkworth
Sin.: *Nassella longearistata* Phil., *Piptochaetium collinum* Phil., *Piptochaetium laevis* Phil., *Stipa breviculmis* Hitchc., *Stipa collina* Phil., *Stipa laevis* (Phil.) Speg., *Stipa lahittei* Parodi

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

Nassella leptocoronata (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth

Sin.: *Stipa leptocoronata* Roseng. & B.R. Arrill.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(ART, COL, SAO).

Nassella leptothera (Speg.) Torres

Sin.: *Stipa leptothera* Speg.

Hierba. Nativa. 2600-3800 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Nassella longicoronata (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth

Sin.: *Stipa longicoronata* Roseng. & B.R. Arrill.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(ART).

Nassella longiglumis (Phil.) Barkworth

Sin.: *Nassella clarazii* (Ball) Barkworth, *Stipa clarazii* Ball, *Stipa clarazii* Ball var. *bulbosa* Speg., *Stipa clarazii* Ball var.

typica Speg., nom. inval., *Stipa longiglumis* Phil., *Stipa quadrifaria* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, RNE, SAL, SLU, SDE, TUC). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO). URY(MON).

Nassella macrathera (Phil.) Barkworth

Sin.: *Stipa macrathera* Phil., *Stipa rudolphii* Speg., nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LSR, RME, JFE).

Nassella macrotricha (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa macrotricha* F.A. Roig

Hierba. Endémica. 1400-1500 m.

Países: ARG(SJU).

Nassella manicata (E. Desv.) Barkworth

Sin.: *Stipa manicata* E. Desv.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Nassella megapotamia (Spreng. ex Trin.) Barkworth

Sin.: *Stipa latifolia* Hack. ex Arechav., hom. illeg., *Stipa latissimifolia* Kuntze, *Stipa manicata* E. Desv. var. *latifolia* Speg., *Stipa manicata* E. Desv. var. *media* Speg., *Stipa megapotamia* Spreng. ex Trin., *Stipa megapotamica* Trin. & Rupr., nom. inval., *Stipa quinquenervis* Hack.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, FLO, LAV, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).

Nassella melanosperma (J. Presl) Barkworth

Sin.: *Nassella bonariensis* (Henrard & Parodi) Barkworth, *Stipa bonariensis* Henrard & Parodi, *Stipa melanosperma* J.

Presl, *Stipa melanosperma* J. Presl var. *erythrina* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, MIE). URY(FLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).

Nassella mexicana (Hitchc.) Pohl

Sin.: *Stipa mexicana* Hitchc.

Hierba. Nativa. 2500-3300 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

Nassella meyeniana (Trin. & Rupr.) Parodi

Sin.: *Nassella corniculata* Hack., *Piptochaetium laeve* (Nees) Pilg., *Stipa laevis* (Trin. & Rupr.) Parodi, comb. superfl., *Urachne laevis* Trin. & Rupr., *Urachne meyeniana* Trin. & Rupr.

Hierba. Nativa. 2600-5000 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL). CHL(AYP, TAR).

Nassella meyeri Torres

Hierba. Endémica. 2400-3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Nassella mucronata (Kunth) Pohl

Sin.: *Stipa mucronata* Kunth, *Stipa setigera* J. Presl

Hierba. Nativa. 2100-2500 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Nassella nardoides (Phil.) Barkworth

Sin.: *Danthonia nardoides* Phil., *Stipa calchaquía* Speg., *Stipa nardoides* (Phil.) Hack. ex Hitchc.

Hierba. Nativa. 3000-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth

Sin.: *Nassella ligularis* (Griseb.) Barkworth & Torres, *Stipa contracta* Phil., *Stipa eminens* Nees, hom. illeg., *Stipa fernandeziana* Phil., hom. illeg., *Stipa hispidula* Phil., *Stipa ligularis* (Griseb.) Speg., *Stipa longiflora* Steud., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. f. *contorta* Hack., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. f. *depauperata* Hack., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *chilensis* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *fernandeziana* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *formicarioides* Burkart, *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *glabrata* Arechav., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *gracilior* Burkart, *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *hirsuta* Arechav., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *hispidula* (Speg.) Hack., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *ligularis* Griseb., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *longiaristata* Arechav., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *sublaevis* (Speg.) Speg., comb. superfl., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *sublaevis* (Speg.) Speg. ex Caro, *Stipa setigera* J. Presl f. *pallida* Speg., *Stipa setigera* J. Presl f. *purpurascens* Speg., *Stipa setigera* J. Presl f. *versicolor* Speg., *Stipa setigera* J. Presl var. *glabrata* (Arechav.) Speg., *Stipa setigera* J. Presl var. *hispidula* Speg., *Stipa setigera* J. Presl var. *longiaristata* (Arechav.) Roseng., *Stipa skottsbergii* Pilg., *Stipa sublaevis* Speg., *Stipa trachysperma* Phil., *Urachne longiflora* Steud., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). PRY(COA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Nassella nidulans (Mez) Barkworth

Sin.: *Stipa nidulans* Mez

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Nassella niduloides (Caro) Barkworth

Sin.: *Stipa niduloides* Caro

Hierba. Endémica. 1800-3100 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU).

Nassella novari Torres

Hierba. Endémica. 2000-3900 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Nassella nubicola (Speg.) Torres

Sin.: *Stipa nubicola* Speg.

Hierba. Nativa. 2800-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Nassella nutans (Hack.) Barkworth

Sin.: *Stipa nutans* Hack.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

Nassella pampagrandensis (Speg.)

Barkworth

Sin.: *Stipa pampagrandensis* Speg.

Hierba. Nativa. 1300-3100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Nassella pampeana (Speg.) Barkworth

Sin.: *Stipa pampeana* Speg.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SCR).

Nassella paramilloensis (Speg.) Torres

Sin.: *Stipa gilliesii* Hitchc., *Stipa paramilloensis* Speg., *Stipa perrigida* Speg.

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Nassella parodii (Matthei) Barkworth

Sin.: *Stipa parodii* Matthei

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(LBO, BIO).

Nassella parva Torres

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Nassella pauciciliata (Roseng. & Izag.) Barkworth

Sin.: *Stipa megapotaamia* Spreng. ex Trin. var. *pauciciliata* Roseng. & Izag., *Stipa pauciciliata* (Roseng. & Izag.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(MAL, ROC).

Nassella pfisteri (Matthei) Barkworth

Sin.: *Stipa pfisteri* Matthei

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(COQ, MAU, BIO).

Nassella philippii (Steud.) Barkworth

Sin.: *Stipa bavioensis* Speg., *Stipa bavioensis* Speg. var. *minor* Speg., *Stipa lenta* Hitchc., *Stipa philippii* Steud.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA). URY(CLA, MAL, RIV, SOR).

Nassella planaltina (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo

Sin.: *Stipa planaltina* A. Zanin & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nassella poeppigiana (Trin. & Rupr.) Barkworth

Sin.: *Nassella amethystina* (Steud.) Barkworth, *Stipa amethystina* Steud., *Stipa araucana* Phil., *Stipa curicoana* Phil., *Stipa julietii* Phil., *Stipa latifolia* Hack. ex Arechav. var. *grandiflora* Hack., *Stipa manicata* E. Desv. var. *typica* Speg., nom. inval., *Stipa megapotaamia* Spreng. ex

Trin. var. *latiflora* Roseng. & Izag., *Stipa montana* Phil., *Stipa poeppigiana* Trin. & Rupr., *Stipa poeppigiana* Trin. & Rupr. var. *pubescens* F.A. Roig, *Stipa pratensis* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, NEU, RNE, SLU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA). URY(MAL).

Nassella pseudopampagrandensis (Caro) Barkworth

Sin.: *Stipa pseudopampagrandensis* Caro

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(COR, SAL, SLU, TUC).

Nassella psittacorum (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa psittacorum* Speg.

Hierba. Endémica. 1500-1700 m.

Países: ARG(MEN).

Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) E.

Desv. var. *humilior* (Hack.) Torres

Sin.: *Nassella flaccidula* Hack. var. *humilior* Hack.

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.

Países: ARG(JUU).

Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) E.

Desv. var. *levipoda* Torres

Hierba. Endémica. 3000-3600 m.

Países: ARG(JUU).

Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) E.

Desv. var. *pubiflora*

Sin.: *Calamagrostis anomala* Steud. ex Lechler, nom. nud., *Nassella deltoidea* Hack., *Nassella flaccidula* Hack., *Stipa airoides* Mez, hom. illeg., *Stipa meziana* Hicken, *Stipa pflanzii* Mez, *Stipa pubiflora* (Trin. & Rupr.) M. Muñoz, *Stipa tiraquensis* Kuntze, *Urachne pubiflora* Trin. & Rupr.

Hierba. Nativa. 2200-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, COQ).

Nassella punensis Torres

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Nassella pungens E. Desv.

Sin.: *Nassella humilis* Phil., *Nassella johnstonii* Parodi

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, LBO, RME).

Nassella quinqueciliata (Roseng. & Izag.) Barkworth & Torres

Sin.: *Stipa nutans* Hack. var. *quinqueciliata* Roseng. & Izag., *Stipa quinqueciliata* (Roseng. & Izag.) A. Zanin & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(MAL).

Nassella ragonesei Torres

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(CAT).

Nassella rhizomata (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo

Sin.: *Stipa rhizomata* A. Zanin & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nassella rosengurtii (Chase) Barkworth

Sin.: *Stipa rosengurtii* Chase

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(MON, SAO, SOR).

Nassella rupestris (Phil.) Torres

Sin.: *Nassella dasycarpa* (Hitchc.) Torres, *Stipa dasycarpa* Hitchc., *Stipa rupestris* Phil.

Hierba. Nativa. 3200-4600 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Nassella sanluisensis (Speg.) Barkworth

Sin.: *Stipa debilis* Mez, *Stipa debilis* Mez var. *papillosa* Caro, *Stipa sanluisensis* Speg., *Stipa sanluisensis* Speg. var. *longispicula* Caro

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SDE).

Nassella sellowiana (Nees ex Trin. & Rupr.) Peñailillo

Sin.: *Stipa eminens* Cav. var. *sellowiana* (Nees ex Trin. & Rupr.) Kuntze, *Stipa molfinoi* Speg., *Stipa sellowiana* Nees ex Trin. & Rupr.

Hierba. Nativa. 200-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Nassella spegazzinii (Arechav.) Barkworth

Sin.: *Stipa spegazzinii* Arechav., *Stipa uruguaycola* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). URY(RNO).

Nassella stuckertii (Hack.) Barkworth

Sin.: *Stipa stuckertii* Hack.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(COR).

Nassella subnitida (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth

Sin.: *Jarava subnitida* (Roseng. & B.R. Arrill.) Peñailillo, *Stipa subnitida* Roseng. & B.R. Arrill.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(PAY, SAO).

Nassella tenuiculmis (Hack.) Peñailillo

Sin.: *Stipa tenuiculmis* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, LPA, RNE). BRA(RGS, SCA). URY(TYT).

Nassella tenuis (Phil.) Barkworth

Sin.: *Stipa argentina* Speg., *Stipa neesiana* Kuntze, hom. illeg., *Stipa puelches* Speg., *Stipa tenuis* Phil., *Stipa tenuis* Phil. var. *argentina* (Speg.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT, BIO, ARA, MAG).

Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth

Sin.: *Stipa geniculata* Phil., *Stipa mendocina* Phil., *Stipa oreophila* Speg., *Stipa tenuissima* Trin., *Stipa tenuissima* Trin. f. *colorata* F.A. Roig, *Stipa tenuissima* Trin. f. *nana* Parodi, *Stipa tenuissima* Trin. var. *oreophila* (Speg.) Speg., *Stipa tenuissima* Trin. var. *planicola* Speg.

Hierba. Nativa. 0-2900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC).

Nassella torquata (Speg.) Barkworth

Sin.: *Stipa torquata* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(PAY, SAO).

Nassella trichotoma (Nees) Hack. ex Arechav.

Sin.: *Agrostis trichotoma* (Nees) Nees ex Trin., *Oryzopsis trichotoma* (Nees) Druce, *Piptochaetium trichotomum* (Nees) Griseb., *Stipa macrathera* Speg., hom. illeg., *Stipa trichotoma* Nees, *Urachne macranthera* Nees ex Steud., *Urachne trichotoma* (Nees) Trin.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(MON, SJO, SOR).

Nassella tucumana (Parodi) Torres

Sin.: *Stipa tucumana* Parodi

Hierba. Nativa. 900-2500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Nassella uspallatensis (Speg.) Torres

Sin.: *Stipa uspallatensis* Speg.

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Nassella vallsii (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo

Sin.: *Stipa vallsii* A. Zanin & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Nassella ventanica (Cabrera & Torres) Barkworth

Sin.: *Stipa ventanica* Cabrera & Torres

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI).

Nassella yaviensis Torres

Hierba. Endémica. 3400-3500 m.

Países: ARG(JUU).

Notas: Probablemente habite en Bolivia

Neobouteloua Gould

Neobouteloua lophostachya (Griseb.)

Gould

Sin.: *Bouteloua lophostachya* Griseb., *Bouteloua nana* Griseb.

Hierba. Endémica. 400-900 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Notas: Citada para Chile (Peterson et al., 2001) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Neobouteloua pauciracemosa M.G.

López & Biurrun

Hierba. Endémica.

Países: ARG(LRI, SLU).

Nicoraepoa Soreng & L.J. Gillespie

Nicoraepoa andina (Trin.) Soreng & L.J. Gillespie var. **andina**

Sin.: *Deschampsia latifolia* Phil., hom. illeg., *Poa acrochaeta* Hack., *Poa andina* Trin., *Poa aristata* Phil., *Poa straminea* Steud., nom. nud.

Hierba. Endémica. 300-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Nicoraepoa andina (Trin.) Soreng & L.J. Gillespie subsp. **chontica** (Phil.) Finot, Soreng & Giussani

Sin.: *Nicoraepoa chontica* (Phil.) Soreng & L.J. Gillespie, *Poa berningeri* Pilg., *Poa borchersii* Phil., *Poa chontica* Phil., *Poa chubutensis* Speg., *Poa latifolia* Phil., hom. illeg., *Poa robusta* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Nicoraepoa erinacea (Speg.) Soreng & L.J. Gillespie

Sin.: *Poa erinacea* Speg.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CHU).

Nicoraepoa pugionifolia (Speg.) Soreng & L.J. Gillespie

Sin.: *Poa acutissima* Pilg., *Poa pugionifolia* Speg.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Nicoraepoa robusta (Steud.) Soreng & L.J. Gillespie

Sin.: *Festuca arenaria* Lam., hom. illeg., *Poa arenicola* St.-Yves, *Poa robusta* Steud.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Nicoraepoa stepparia (Nicora) SorengSin.: *Poa stepparia* Nicora

Hierba. Endémica. 900-1200 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Nicoraepoa subenervis (Hack.) Soreng& L.J. Gillespie subsp. **spegazziniana** (Nicora) Soreng & L.J. GillespieSin.: *Poa spegazziniana* Parodi, nom. nud., *Poa subenervis* Hack. var. *spegazziniana* Nicora

Hierba. Endémica. 2600-3400 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(LBO, RME).

Nicoraepoa subenervis (Hack.) Soreng & L.J. Gillespie subsp. **subenervis**Sin.: *Poa subenervis* Hack.

Hierba. Endémica. 700-3200 m.

Países: ARG(MEN, SCR, SJU). CHL(MAG, RME).

Ocellochloa Zuloaga & Morrone**Ocellochloa rudis** (Nees) Zuloaga & MorroneSin.: *Panicum albospiculatum* Swallen, *Panicum apricum* Swallen, *Panicum kleinii* Swallen, *Panicum rude* Nees, *Panicum secundum* Trin., *Panicum semitectum* Swallen, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 400-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocellochloa stolonifera (Poir.) Zuloaga & MorroneSin.: *Panicum frondescens* G. Mey., *Panicum stoloniferum* Poir.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Oedochloa C. Silva & R.P. Oliveira**Oedochloa minarum** (Nees) C. Silva & R.P. OliveiraSin.: *Echinolaena minarum* (Nees) Pilg., *Ichnanthus lilloi* Hack., *Ichnanthus minarum* (Nees) Döll, *Oplismenus minarum* Nees

Hierba. Nativa. 500-2600 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR).

Oedochloa procurrens (Nees ex Trin.) C. Silva & R.P. OliveiraSin.: *Echinolaena procurrens* (Nees ex Trin.) Kunth, *Ichnanthus procurrens* (Nees ex Trin.) Stieber, *Panicum procurrens* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, PAI).

Olyra L.**Olyra ciliatifolia** Raddi

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, PAI).

Olyra fasciculata Trin.Sin.: *Olyra heliconia* Lindm.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Olyra glaberrima RaddiSin.: *Olyra corcovadensis* Warwa, *Olyra obliqua* Desv., *Olyra semiovata* Trin., *Olyra semiovata* Trin. var. *pubescens* Hack., *Olyra semiovata* Trin. var. *pubiflora* Hack.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Olyra humilis NeesSin.: *Olyra glaberrima* Raddi var. *humilis* (Nees) Mez, *Olyra humilis* Nees var. *angustifolia* Döll, *Olyra humilis* Nees var. *latifolia* Döll, *Olyra semiovata* Trin. var. *humilis* (Nees) Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA).

Olyra latifolia L.Sin.: *Olyra arundinacea* Kunth, *Olyra brevifolia* Schumach., *Olyra cordifolia* Kunth, *Olyra latifolia* L. var. *arundinacea* (Kunth) Griseb., *Olyra latifolia* L. var. *glabriuscula* Döll, nom. superfl., *Olyra latifolia* L. var. *pubescens* (Raddi) Döll, *Olyra latifolia* L. var. *vestita* Henrard, *Olyra media* Desv., *Olyra paniculata* Sw., *Olyra pubescens* Raddi, *Olyra scabra* Nees

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN).

Oncorachis Morrone & Zuloaga**Oncorachis macrantha** (Trin.) Morrone & ZuloagaSin.: *Panicum macranthum* Trin., *Streptostachys macrantha* (Trin.) Zuloaga & Soderstr.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(AMA).

Oplismenopsis Parodi**Oplismenopsis najada** (Hack. & Arechav.) ParodiSin.: *Echinochloa najada* (Hack. & Arechav.) Parodi, *Panicum amadyadum*

Arechav. ex Hicken, nom. nud., *Panicum najadum* Hack. & Arechav.

Hierba palustre. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(COL).

Oplismenus P. Beauv., nom. cons.

Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv.
Sin.: *Panicum burmannii* Retz.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. subsp. **hirtellus**

Sin.: *Oplismenus loliaceus* (Lam.) P. Beauv., *Orthopogon loliaceus* (Lam.) Spreng., *Panicum hirtellum* L., *Panicum loliaceum* Lam., *Panicum setarium* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ROC).

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. subsp. **setarius** (Lam.) Mez ex Ekman

Sin.: *Oplismenus setarius* (Lam.) Roem. & Schult., *Orthopogon setarius* (Lam.) Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(MAL).

Ortachne Nees

Ortachne breviseta Hitchc.

Sin.: *Stipa breviseta* (Hitchc.) Martic. & Quezada, hom. illeg., *Stipa yatesensis* Martic. & Quezada

Hierba. Nativa. 1000-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LSR, LLA).

Ortachne rariflora (Hook. f.) Hughes
Sin.: *Muhlenbergia rariflora* Hook. f., *Ortachne retorta* Nees, *Stipa rariflora* (Hook. f.) Benth., *Stipa retorta* (Nees) Mez, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(RNE, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Orthoclada P. Beauv.

Orthoclada laxa (Rich.) P. Beauv.
Sin.: *Aira laxa* Rich., *Orthoclada rariflora* (Lam.) P. Beauv., *Orthoclada rariflora* (Lam.) P. Beauv. var. *lanceolata* Döll, *Orthoclada rariflora* (Lam.) P. Beauv. var. *sesquiteria* Döll, *Panicum rariflorum* Lam., *Poa rariflora* (Lam.) Roem. & Schult., *Poa subumbellata* Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Oryza L.

Oryza latifolia Desv.
Sin.: *Oryza alta* Swallen, *Oryza latifolia* Desv. var. *grandispiculis* A. Chev., *Oryza sativa* L. var. *latifolia* (Desv.) Döll
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, BOQ, CON, COA, ÑEE, PHA).

Oryza rufipogon Griff.

Sin.: *Oryza paraguayensis* Wedd. ex E. Fourn., *Oryza sativa* L. var. *paraguayensis* Parodi, hom. illeg., *Oryza sativa* L. var. *savannae* Körn., *Oryza sativa* L. var. *sundensis* Körn.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MIS). PRY.

Oryza sativa L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Osvaldoa J.R. Grande

Osvaldoa valida (Mez) J.R. Grande
Sin.: *Panicum validum* Mez
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(PAY).

Otachyrium Nees

Otachyrium versicolor (Döll) Henrard
Sin.: *Otachyrium truncatum* Pilg., *Panicum truncatum* Nees, hom. illeg., *Panicum versicolor* Döll
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Panicum L.

Panicum aquaticum Poir.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Panicum bergii Arechav. var. **bergii**
Sin.: *Panicum bergii* Arechav. f. *convolutum* R.A. Palacios, *Panicum burkartii* Zuloaga, *Panicum pilcomayense* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APY, BOQ, CEN, CON, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, FLO, MAL, PAY, ROC, SJO, SOR, TAC).

Panicum bergii Arechav. var. **pilosissimum** Zuloaga

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA).

Panicum campestre Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 500-1400 m.
Países: BRA(PAR).

Panicum capillare L.

Sin.: *Chasea capillaris* (L.) Nieuwl., *Leptoloma capillaris* (L.) Smyth, *Milium capillare* (L.) Moench, hom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, NEU, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(MON).

Panicum cayennense Lam.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Panicum cervicatum Chase

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(SCA). PRY(AMA).

Panicum chaseae Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(MAL, RIV, SAO, SOR, TAC).

Panicum chloroleucum Griseb.

Sin.: *Panicum urvilleanum* Kunth var. *chloroleucum* (Griseb.) Kuntze
Hierba. Endémica. 1800-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Panicum dichotomiflorum Michx.

Sin.: *Panicum aquaticum* Poir. var. *chloroticum* (Nees ex Trin.) R.C. Foster, *Panicum chloroticum* Nees ex Trin., *Panicum proliferum* Lam. var. *chloroticum* (Nees ex Trin.) Hack., *Panicum proliferum* Lam. var. *xanthochlorum* Hack. ex Berton, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, RNE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, RME). PRY(APY, APA, AMA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, MON, PAY, SAO).

Panicum exiguum Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Panicum glabripes Döll

Sin.: *Panicum glabripes* Döll subsp. *subjunceum* (Ekman) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Panicum subjunceum* Ekman
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(PAY, RNO, RIV).

Panicum gounii E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

Panicum hirsutum Sw.

Sin.: *Panicum chacoense* Parodi
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA).

Panicum longissimum (Mez) Henrard

Sin.: *Sacciolepis longissima* Mez
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: PRY(PAI).

Panicum magnispicula Zuloaga, Morrone & Valls

Hierba. Endémica. 1200 m.
Países: BRA(SCA).

Panicum miliaceum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(BIO). URY(CLA, COL, MON).

Panicum millegrana Poir.

Sin.: *Panicum rugulosum* Trin., *Panicum rugulosum* Trin. f. *effusum* Hack., *Panicum rugulosum* Trin. var. *subvelutinum* Döll, *Panicum subglobosum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Panicum olyroides Kunth var. **hirsutum** Henrard

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA). URY(RIV).

Panicum olyroides Kunth var. **olyroides**

Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, GUA, MIE, PAI).

Panicum pedersenii Zuloaga

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA).

Panicum peladoense Henrard

Sin.: *Panicum bergii* Arechav. var. *leiophyllum* Hack. & Lindm.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, GUA, PAI). URY(RIV, TAC).

Panicum quadriglume (Döll) Hitchc.

Sin.: *Panicum cayennense* Lam. var. *quadriglume* Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI).

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.

Sin.: *Monachne racemosa* P. Beauv., *Panicum montevidense* Spreng. ex Döll, *Panicum reptans* (Lam.) Kunth, comb. superfl., *Saccharum reptans* Lam., *Thalasium montevidense* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA). URY(COL, MON, ROC, SJO).

Panicum repens L.

Sin.: *Panicum nitidum* Hack. & Arechav., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Panicum rudgei Roem. & Schult.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Panicum sellowii Nees

Sin.: *Panicum rugulosum* Trin. var. *condensatum* Hack.

Hierba. Nativa. 100-1600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, SPE). URY(TYT).

Panicum stramineum Hitchc. & Chase

Sin.: *Panicum caatingense* Renvoize, *Panicum capillare* L. var. *stramineum* (Hitchc. & Chase) Gould, *Panicum hirticaule* J. Presl var. *stramineum* (Hitchc. & Chase) Beetle

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL). BRA(SCA). PRY(APY, CON, COA, PHA).

Panicum trichanthum Nees

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

Panicum trichoides Sw.

Hierba. Nativa. 900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Panicum tricholaenoides Steud. var. **flavomarginatum** (Mez) Zuloaga

Sin.: *Panicum flavomarginatum* Mez

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, CAA, CEN, PAI, PHA).

Panicum tricholaenoides Steud. var. **tricholaenoides**

Sin.: *Panicum bambusoides* Speg. ex Arechav., hom. illeg., *Panicum junceum* Nees, hom. illeg., *Panicum junceum* Nees var. *strictius* Döll, *Panicum junceum* Nees var. *subnutans* Döll, *Panicum pilgeri* Herter, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, PHA, SPE). URY(ART, DUR, PAY, SAO).

Panicum urvilleanum Kunth

Sin.: *Monachne urvilleana* (Kunth) Herter, *Panicum patagonicum* Hieron., *Panicum reversipilum* Steud., *Panicum urvilleanum* Kunth f. *subpilosum* Kuntze, *Panicum urvilleanum* Kunth var. *versicolor* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL,

SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(LBO, BIO, ARA, LSR, LLA).

Pappophorum Schreb.

Pappophorum caespitosum R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

Pappophorum hassleri Hack.

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Pappophorum krapovickasii Roseng.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). PRY(APY).

Pappophorum macrospermum Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(RNO, RIV).

Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze

Sin.: *Pappophorum alopecuroideum* Vahl, *Pappophorum alopecuroideum* Vahl var. *glabrum* Döll, *Pappophorum alopecuroideum* Vahl var. *pilosiusculum* Döll, *Pappophorum elongatum* Spreng., *Pappophorum laguroideum* Schrad. ex Schult., *Pappophorum macrostachyum* Schrad. ex Schult., *Pappophorum saccharoides* Griseb., *Saccharum pappiferum* Lam.

Hierba. Nativa. 1600-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CEN, PHA). URY(MON).

Pappophorum philippianum Parodi

Sin.: *Pappophorum mucronulatum* Nees f. *intermedium* Hack., *Pappophorum mucronulatum* Nees var. *subsimplex* Hack., *Pappophorum mucronulatum* Nees var. *vaginatum* (Phil.) Hack., *Pappophorum vaginatum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 2800-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Pappophorum vaginatum Buckley

Sin.: *Pappophorum mucronulatum* Nees f. *elator* Stuck., *Pappophorum subbulbosum* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CON). URY(MON, PAY).

Pappostipa (Speg.) Romasch., P.M. Peterson & Soreng**Pappostipa ameghinoides** (Speg.) Romasch.

Sin.: *Jarava ameghinoides* (Speg.) Peñailillo, *Jarava ameghinoides* (Speg.) Peñailillo var. *digona* (Parodi) Peñailillo, *Pappostipa ameghinoides* (Speg.) Romasch. var. *digona* (Parodi) Romasch., *Stipa ameghinoides* Speg., *Stipa ameghinoides* Speg. var. *digona* Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).

Pappostipa arenicola (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Jarava arenicola* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa arenicola* F.A. Roig

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(SCR).

Pappostipa atacamensis (Parodi) Romasch.

Sin.: *Jarava atacamensis* (Parodi) Peñailillo, *Stipa atacamensis* Parodi

Hierba. Endémica. 3600-4300 m.

Países: ARG(CAT). CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

Pappostipa barrancaensis (F.A. Roig) Romasch.

Sin.: *Jarava barrancaensis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Nassella barrancaensis* (F.A. Roig) Barkworth, *Pappostipa barrancaensis* (F.A. Roig) Romasch., nom. inval., *Stipa barrancaensis* F.A. Roig

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Pappostipa braun-blauquetii (F.A. Roig) Romasch.

Sin.: *Jarava braun-blauquetii* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa braun-blauquetii* F.A. Roig

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(MEN).

Pappostipa choconensis (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa choconensis* F.A. Roig

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU).

Pappostipa chrysophylla (E. Desv.) Romasch. var. **chrysophylla**

Sin.: *Jarava ameghinoides* (Speg.) Peñailillo var. *precordillerana* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo f. *minuta* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo f. *modica* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo var. *cordillerarum* (Parodi) Peñailillo, *Pappostipa ameghinoides* (Speg.) Romasch. var. *precordillerana* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa chrysophylla* (E. Desv.) Romasch. f. *minuta* (F.A. Roig) Romasch.,

Pappostipa chrysophylla (E. Desv.) Romasch. f. *modica* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa chrysophylla* (E. Desv.) Romasch. var. *cordillerarum* (Parodi) Romasch., *Stipa ameghinoides* Speg. var. *precordillerana* F.A. Roig, *Stipa chrysophylla* E. Desv., *Stipa chrysophylla* E. Desv. f. *minuta* F.A. Roig, *Stipa chrysophylla* E. Desv. f. *modica* F.A. Roig, *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *cordillerarum* Parodi, *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *major* E. Desv., *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *minor* Desv., *Stipa humilis* Cav. f. *chrysophylla* (Desv.) Kuntze, *Stipa kurtzii* Mez, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. subsp. *chrysophylla* (E. Desv.) Dusén, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *andina* Hauman, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *gymnostachya* Hauman

Hierba. Endémica. 500-4300 m.

Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME).

Pappostipa chrysophylla (E. Desv.) Romasch. var. **crispula** (Kuntze) Romasch.

Sin.: *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo var. *crispula* (Kuntze) Peñailillo, *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *crispula* (Kuntze) Parodi, *Stipa humilis* Cav. f. *crispula* Kuntze

Hierba. Endémica. 1500-1800 m.

Países: ARG(MEN).

Pappostipa chubutensis (Speg.) Romasch.

Sin.: *Jarava chubutensis* (Speg.) Peñailillo, *Jarava chubutensis* (Speg.) Peñailillo var. *hirsutissima* (F.A. Roig) Peñailillo, *Pappostipa chubutensis* (Speg.) Romasch. var. *hirsutissima* (F.A. Roig) Romasch., *Stipa chubutensis* Speg., *Stipa chubutensis* Speg. var. *hirsutissima* F.A. Roig, *Stipa dasycnemis* Speg.

Hierba. Endémica. 0-2800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU, SCR).

Pappostipa colloncurensis (F.A. Roig) Ciald.
Sin.: *Stipa colloncurensis* F.A. Roig
Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU).

Pappostipa frigida (Phil.) Romasch. var. **frigida**
Sin.: *Jarava frigida* (Phil.) F. Rojas, *Stipa brevifolia* Phil., *Stipa frigida* Phil.
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU, RME).

Pappostipa frigida (Phil.) Romasch. var. **longifolia** (F.A. Roig) Ciald.
Sin.: *Stipa frigida* Phil. var. *longifolia* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.
Países: ARG(LRI).

Pappostipa frigida (Phil.) Romasch. var. **parvispicula** (Parodi) Romasch.
Sin.: *Jarava frigida* (Phil.) F. Rojas var. *parvispicula* (Parodi) Peñailillo, *Stipa frigida* Phil. var. *parvispicula* Parodi
Hierba. Endémica. 3000-4100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Pappostipa hieronymusii (Pilg.)
Sin.: *Jarava hieronymusii* (Phil.) Peñailillo, *Stipa hieronymusii* Pilg.
Hierba. Endémica. 2900-4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU).

Pappostipa humilis (Cav.) Romasch. var. **decrescens** (Kuntze) Romasch.
Sin.: *Jarava humilis* (Cav.) Peñailillo var. *decrescens* (Kuntze) Peñailillo, *Stipa humilis* Cav. var. *decrescens* Kuntze
Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Pappostipa humilis (Cav.) Romasch. var. **humilis**
Sin.: *Jarava humilis* (Cav.) Peñailillo, *Stipa humilis* Cav., *Stipa humilis* Cav. f. *major* Speg., *Stipa humilis* Cav. var. *intermedia* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1900 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Pappostipa humilis (Cav.) Romasch. var. **ruiziana** (Parodi) Romasch.
Sin.: *Jarava humilis* (Cav.) Peñailillo var. *ruiziana* (Parodi) Peñailillo, *Stipa humilis* Cav. var. *ruiziana* Parodi
Hierba. Endémica. 2000-3200 m.
Países: ARG(LPA, MEN, SJU).

Pappostipa ibarii (Phil.) Romasch. f. **ibarii**
Sin.: *Jarava ibarii* (Phil.) Peñailillo, *Jarava ibarii* (Phil.) Peñailillo var. *anomala* (Parodi) Peñailillo, *Pappostipa ibarii* (Phil.) Romasch. var. *anomala* (Parodi) Romasch., *Stipa ibarii* Phil., *Stipa ibarii* Phil. var. *anomala* Parodi
Hierba. Endémica. 100-900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(MAG).

Pappostipa ibarii (Phil.) Romasch. f. **pallescens** (Parodi) Romasch.
Sin.: *Jarava ibarii* (Phil.) Peñailillo f. *pallescens* (Parodi) Peñailillo, *Stipa ibarii* Phil. f. *pallescens* Parodi
Hierba. Endémica. 2600-2800 m.
Países: ARG(MEN).

Pappostipa jucunda (F.A. Roig) Ciald.
Sin.: *Stipa jucunda* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 2800-3000 m.
Países: ARG(MEN).

Pappostipa kieslingii (F.A. Roig) Ciald.
Sin.: *Stipa kieslingii* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 1700-2100 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Pappostipa maeviae (F.A. Roig) Romasch.
Sin.: *Jarava maeviae* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa maeviae* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 2900-3000 m.
Países: ARG(NEU).

Pappostipa malalhuensis (F.A. Roig) Romasch.
Sin.: *Jarava malalhuensis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa malalhuensis* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN).

Pappostipa mapuche (F.A. Roig) Ciald.
Sin.: *Stipa mapuche* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 800 m.
Países: ARG(NEU).

Pappostipa marqueziana (F.A. Roig) Ciald.
Sin.: *Stipa marqueziana* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(SJU).

Pappostipa nana (Speg.) Romasch.
Sin.: *Jarava nana* (Speg.) Peñailillo, *Stipa nana* Speg.
Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: ARG(SCR). CHL(AIS).

Pappostipa neaei (Ness ex Steud.) Giussani & S. Sede
Sin.: *Jarava neaei* (Nees ex Steud.) Peñailillo, *Stipa bella* Phil., *Stipa neaei* Nees ex Steud., *Stipa neaei* Nees ex Steud. var. *altoandina* F.A. Roig, *Stipa pulchella* Munro ex Ball, nom. nud.
Hierba. Endémica. 1000-3800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, MAU, AIS, RME).

Pappostipa nicorae (F.A. Roig) Romasch.

Sin.: *Jarava nicorae* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa nicorae* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 3300-3700 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU).

Pappostipa parodiana (F.A. Roig) Romasch.

Sin.: *Jarava parodiana* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa parodiana* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 500-1600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Pappostipa pogonathera (E. Desv.) Giussani & S. Sede

Sin.: *Jarava pogonathera* (E. Desv.) Peñailillo, *Stipa buchtienii* Hack., *Stipa pogonathera* E. Desv., *Stipa uspallatensis* Hack., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 600-3700 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Pappostipa psylantha (Speg.) Giussani & S. Sede

Sin.: *Jarava psylantha* (Speg.) Peñailillo, *Jarava subplumosa* (Hicken ex F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa argentea* Hitchc., *Stipa dasyantha* Speg., *Stipa psylantha* Speg., *Stipa subplumosa* Hicken ex F.A. Roig
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Pappostipa ruiz-lealii (F.A. Roig) Romasch.

Sin.: *Jarava ruiz-lealii* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa ruiz-lealii* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 2800-3700 m.
Países: ARG(CAT, MEN).

Pappostipa semperiana (F.A. Roig) Romasch.

Sin.: *Jarava semperiana* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa semperiana* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 500-2800 m.
Países: ARG(LPA, MEN, SJU).

Pappostipa soriano (Parodi) Romasch.

Sin.: *Jarava soriano* (Parodi) Peñailillo, *Stipa soriano* Parodi
Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Pappostipa speciosa (Trin. & Rupr.) Romasch.

Sin.: *Achnatherum speciosum* (Trin. & Rupr.) Barkworth, *Jarava patagonica* (Speg.) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo f. *abscondita* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo f. *horrida* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *atuelensis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *breviglumis* (Parodi) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *ciliata* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *major* (Speg.) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *manqueclensis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *media* (Torres) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *parva* (F.A. Roig) Peñailillo, *Pappostipa major* (Speg.) Romasch., *Pappostipa patagonica* (Speg.) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. f. *abscondita* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. f. *horrida* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *atuelensis* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *breviglumis*

(Parodi) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *ciliata* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *manqueclensis* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *media* (Torres) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *parva* (F.A. Roig) Romasch., *Stipa diastrophica* F.A. Roig, *Stipa humilis* Cav. f. *minor* Speg., *Stipa humilis* Cav. var. *speciosa* (Trin. & Rupr.) Kuntze, *Stipa patagonica* Speg., *Stipa speciosa* Trin. & Rupr., *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *abscondita* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *atuelensis* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *horrida* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *major* Speg., *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *minor* Speg., *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *atuelensis* (F.A. Roig) F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *breviglumis* Parodi, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *ciliata* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *gualilanensis* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *major* (Speg.) Parodi, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *manqueclensis* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *media* Torres, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *parva* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *punae* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *rhomalea* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *uncinata* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *vizcacharum* F.A. Roig, *Stipa tehuelches* Speg.

Hierba. Nativa. 0-4200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Pappostipa vaginata (Phil.) Romasch.

Sin.: *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas f.

contracta (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas f. *immersa* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas f. *laevis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas f. *rigida* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas var. *argyroidea* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas var. *dilatata* (F.A. Roig) Peñailillo, *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. f. *contracta* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. f. *immersa* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. f. *laevis* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. var. *argyroidea* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. var. *dilatata* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Pilg.) f. *rigida* (F.A. Roig) Romasch., *Stipa cacheutensis* Speg., *Stipa cacheutensis* Speg. var. *exserta* F.A. Roig, *Stipa formosa* Phil., *Stipa vaginata* Phil., *Stipa vaginata* Phil. f. *contracta* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. f. *immersa* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. f. *laevis* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. f. *rigida* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *argyroidea* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *dilatata* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *flexilifolia* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *linealis* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *serrana* F.A. Roig

Hierba. Nativa. 1100-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Pappostipa vatroensis (F.A. Roig) Romasch.

Sin.: *Jarava vatroensis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa vatroensis* F.A. Roig

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Pappostipa zulmae (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa zulmae* F.A. Roig

Hierba. Endémica. 400-500 m.

Países: ARG(LPA, NEU).

Parapholis C.E. Hubb.

Parapholis cylindrica (Willd.) Romero Zarco

Sin.: *Lepturus cylindricus* (Willd.) Trin., *Lolium cylindricum* (Willd.) Asch. & Graebn., *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. & Durieu, *Rottboellia cylindrica* Willd.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO). URY(MON).

Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb.

Sin.: *Aegilops incurva* L., *Pholiurus incurvus* (L.) Schinz & Thell.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, SLU, SCR, SFE). CHL(COQ, VAL, BIO, RME). URY(MON, SJO).

Parapholis strigosa (Dumort.) C.E. Hubb.

Sin.: *Lepturus strigosus* Dumort.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Parodiophyllochloa Zuloaga & Morrone

Parodiophyllochloa cordovensis (E. Fourn.) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Dichanthelium cordovense* (E. Fourn.) Davidse, *Panicum cordovense* E. Fourn., *Panicum dusenii* Hack.

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA).

Parodiophyllochloa missiona (Ekman)

Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum gracilipes* Hack., *Panicum gracilipes* Hack. var. *pubiflorum* Hack., *Panicum missionum* Ekman, *Panicum unilineatum* Mez

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, ITA). URY(MAL, TAC).

Parodiophyllochloa ovulifera (Trin.)

Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum enneaneurum* Griseb., *Panicum ovuliferum* Trin., *Panicum ovuliferum* Trin. var. *intermedium* L.B. Sm. & Wassh.

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, LAV, MAL, ROC, TAC).

Parodiophyllochloa pantricha (Hack.)

Zuloaga & Morrone

Sin.: *Dichanthelium pantrichum* (Hack.) Davidse, *Panicum pantrichum* Hack., *Panicum protractum* Mez, *Panicum warmingii* Mez

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, ÑEE).

Parodiophyllochloa rhizogona (Hack.)

Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum rhizogonum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum L.

Paspalum acuminatum Raddi

Sin.: *Paspalum serratum* Hitchc. & Chase

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, ITA).

Paspalum alnum Chase

Sin.: *Paspalum hexastachyum* Parodi, *Paspalum ovale* Nees ex Steud. var. *apiculatum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, PAY).

Paspalum ammodes Trin.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

Paspalum approximatum Döll

Sin.: *Paspalum parinervium* Mez
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Paspalum arenarium Schrad.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum arundinellum Mez

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). PRY(APA, APY, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Paspalum atratum Swallen

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: PRY(AMA, CON, SPE).

Paspalum bertonii Hack.

Sin.: *Paspalum niederleinii* Mez, *Paspalum potamophilum* Renvoize
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAN, ITA, MIE).

Paspalum buckleyanum Vasey

Sin.: *Paspalum alcalinum* Mez
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE). PRY(APY, PHA).

Paspalum candidum (Humb. & Bonpl. ex Flüggé) Kunth

Sin.: *Paspalum depauperatum* J. Presl, *Paspalum lineispatha* Mez, *Paspalum scabrum* Scribn., *Paspalum vinosum* Mez, *Reimaria candida* Humb. & Bonpl. ex Flüggé
Hierba. Nativa. 1000-4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(VAL).

Paspalum carinatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé

Hierba. Nativa. 800-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paspalum ceresia (Kuntze) Chase

Sin.: *Ceresia elegans* Pers., *Ceresia membranacea* (Lam.) P. Beauv., *Panicum ceresia* Kuntze, *Paspalum elegans* (Pers.) Roem. & Schult., comb. illeg., *Paspalum membranaceum* Lam., hom. illeg., *Paspalum membranaceum* Lam. var. *aequiglume* Döll
Hierba. Nativa. 400-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Notas: Cita dudosa para el Paraguay (Denham et al., 2002)

Paspalum chacoense Parodi

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, BOQ, CON, GUA).

Paspalum chaseanum Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY).

Paspalum chilense Catanzaro & G.H. Rua

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Paspalum cinerascens (Döll) A.G. Burm. & C.N. Bastos

Sin.: *Panicum cinerascens* Döll, *Thrasya cinerascens* (Döll) Judz.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

Paspalum commune Lillo

Sin.: *Paspalum collinum* Chase, *Paspalum virgatum* L. f. *oligostachyum* Hack., nom. nud.
Hierba. Nativa. 800-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).

Paspalum compressifolium Swallen

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, MIE).

Paspalum conduplicatum Canto-Dorow, Valls & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum conjugatum P.J. Bergius

Sin.: *Paspalum renggeri* Steud.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Paspalum conspersum Schrad.

Sin.: *Paspalum virgatum* L. var. *conspersum* (Schrad.) Döll
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, COA, ÑEE, PHA).

Paspalum corcovadense Raddi
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum cordatum Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Paspalum crispatum Hack.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(AMA).

Paspalum crispulum Swallen
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Paspalum cromyorrhizon Trin. ex Döll
Sin.: *Paspalum notatum* Flüggé var. *cromyorrhizon* (Trin. ex Döll) Herter, *Paspalum notatum* Flüggé var. *erriorrhizon* Griseb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CLA, DUR, MON, RNO, SAO, SOR).

Paspalum dasyleurum Kunze ex E. Desv.
Sin.: *Paspalum cumingii* Nees ex Steud., *Paspalum pachyrrhizum* Steud., *Paspalum paradisiacum* Steud.
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(NEU, SLU). CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE).

Paspalum dasytrichum Dusén ex Swallen
Sin.: *Paspalum dasytrichum* Dusén ex Swallen var. *glabrum* L.B. Sm. & Wassh.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paspalum decumbens Sw.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paspalum dedecae Quarín
Sin.: *Paspalum doellii* Chase ex Dedecca, nom. inval., *Paspalum doellii* Chase ex Filg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, GUA).

Paspalum densum Poir.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Paspalum denticulatum Trin.
Sin.: *Paspalum hieronymi* Hack., *Paspalum jujuyense* Zuloaga, *Paspalum lividum* Trin. ex Schltld., *Paspalum proliferum* Arechav.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CHO, PHA). URY(CAS, COL, MON, PAY, SAO, SOR).

Paspalum dilatatum Poir. var. **chiru**
Millet ex Speranza & G.H. Rua
Hierba. Endémica.
Países: URY(PAY).

Paspalum dilatatum Poir. var. **dilatatum**
Sin.: *Digitaria dilatata* (Poir.) Coste, *Panicum platense* (Spreng.) Kuntze, *Paspalum dilatatum* Poir. f. *paucispica* Hack., nom. nud., *Paspalum dilatatum* Poir. var. *sacchariferum* Arechav., *Paspalum eriophorum* Schult., *Paspalum lanatum* Spreng., hom. illeg., *Paspalum ovatum* Nees ex Trin., *Paspalum ovatum* Nees ex Trin. var. *grandiflorum* Nees, *Paspalum ovatum* Nees, hom. illeg., *Paspalum pedunculare* J. Presl, *Paspalum platense* Spreng., *Paspalum selloi* Spreng. ex Nees, nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS,

SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME, IPA). PRY(PAI). URY(ART, COL, MAL, MON).
Notas: Subespecie introducida en Chile

Paspalum dilatatum Poir. var. **uruguaiense** I.L. Barreto ex Valls & G.H. Rua
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV).

Paspalum distichum L.
Sin.: *Anastrophus paspalodes* (Michx.) Nash, *Paspalum chepica* Steud., *Paspalum distichum* L. var. *digitaria* (Poir.) Hack., *Paspalum fernandezianum* Colla, *Paspalum paspalodes* (Michx.) Scribn.
Hierba. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, JFE). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, COA, ITA, PHA). URY(MON).

Paspalum durifolium Mez
Sin.: *Paspalum devincenzii* Parodi
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(TAC).

Paspalum ekmanianum Henrard
Hierba. Nativa. 400-2200 m.
Países: ARG(JUJ).

Paspalum ellipticum Döll
Sin.: *Paspalum ciliocinctum* Mez, *Paspalum proximum* Mez
Hierba. Nativa. 100-1300 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Paspalum equitans Mez

Sin.: *Paspalum fasciculatum* Willd. ex Flügge var. *paraguayense* Hack., *Paspalum pruinosum* Hack., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CON, GUA, MIE, SPE). URY(CAS).

Paspalum erianthoides Lindm.

Sin.: *Paspalum dusenii* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, GUA, PAI).

Paspalum erianthum Nees ex Trin.

Sin.: *Paspalum album* Swallen

Hierba. Nativa. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON). URY(ART, MON, PAY).

Paspalum eucomum Nees ex Trin.

Sin.: *Paspalum eucomum* Nees, hom. illeg., *Paspalum splendens* Hack.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Paspalum exaltatum J. Presl

Sin.: *Paspalum arechavaletae* Hack. ex Arechav.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, COA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).

Paspalum falcatum Nees

Sin.: *Paspalum falcatum* Nees subsp. *microcarpum* Ekman, *Paspalum leucotrichum* Steud.

Hierba. Nativa. 1100-1300 m.

Países: ARG(CHA, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, ITA). URY(TAC).

Paspalum fasciculatum Willd. ex Flügge

Sin.: *Paspalum delochei* Steud., *Paspalum oriziformis* Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, ÑEE, PHA). URY(MON).

Paspalum filifolium Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 900-1900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Paspalum flaccidum Nees

Sin.: *Paspalum vescum* Swallen

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CON).

Paspalum flavescens (Roseng., B.R.

Arrill. & Izag.) Speranza & G.H. Rua

Sin.: *Paspalum dilatatum* Poir. subsp. *flavescens* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

Paspalum flavum J. Presl

Sin.: *Paspalum cristatum* Trin.

Hierba. Nativa.

Países: CHL.

Notas: Coleccionada en Chile sin localidad precisa

Paspalum foliiforme S.S. Denham

Sin.: *Panicum petrosum* Trin., *Thrasya petrosa* (Trin.) Chase

Hierba. Nativa. 200 m.

Países: PRY(AMA, PHA).

Paspalum forsterianum Flügge

Hierba. Endémica.

Países: CHL(IPA).

Paspalum gardnerianum Nees

Sin.: *Paspalum gardnerianum* Nees var. *oligostachyum* Döll

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Paspalum glabrinode (Hack.) Morrone & Zuloaga

Sin.: *Brachiaria glabrinodis* (Hack.)

Henrard, *Panicum glabrinode* Hack.,

Paspalum concavum Renvoise

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR). PRY(ITA).

Paspalum glaucescens Hack.

Sin.: *Paspalum caperatum* Swallen,

Paspalum pannuceum Swallen, *Paspalum*

paranaense Swallen, *Paspalum viale*

Swallen, *Paspalum yaguaronense*

Henrard

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, SJO).

Paspalum graciellae Sulekic

Hierba. Endémica. 1500-1600 m.

Países: ARG(SAL).

Paspalum guenoarum Arechav. var. **guenoarum**

Sin.: *Paspalum guenoarum* Arechav. var.

vestitum Henrard, *Paspalum kempffii*

Killeen, *Paspalum plicatulum* Michx.

subsp. *guenoarum* (Arechav.) Roseng.,

B.R. Arrill. & Izag., *Paspalum plicatulum*

Michx. var. *robustum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(TAC).

Paspalum guenoarum Arechav. var. **rojasii** (Hack.) Parodi ex Burkart
Sin.: *Paspalum indutum* Swallen, hom. illeg., *Paspalum rhodopedum* L.B. Sm. & Wasm., *Paspalum rojasii* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN).

Paspalum guttatum Trin.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Paspalum haumanii Parodi

Sin.: *Paspalum haumanii* Parodi var. *genuinum* Parodi, nom. inval., *Paspalum haumanii* Parodi var. *macranthum* Parodi, *Paspalum haumanii* Parodi var. *pilosum* Parodi, *Paspalum multiflorum* Döll, *Paspalum multiflorum* Döll f. *abreviatum* Hack. ex Stuck.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, SPE). URY(FLA, SOR).

Paspalum humboldtianum Flügge

Sin.: *Panicum humboldtianum* (Flügge) Kuntze, *Paspalum ciliatum* Kunth, hom. illeg., *Paspalum humboldtianum* Flügge var. *stuckertii* (Hack.) Hack., *Paspalum stuckertii* Hack.

Hierba. Nativa. 1600-2300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Paspalum hyalinum Nees ex Trin.

Sin.: *Paspalum abstrusum* Trin.

Hierba. Nativa. 200-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Paspalum inaequivalve Raddi

Sin.: *Panicum inaequivalve* (Raddi) Kuntze, *Paspalum glabriflorum* (Hack.) Herter, *Paspalum inaequivalve* Raddi var. *glabriflorum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA). URY(PAY).

Paspalum indecorum Mez

Sin.: *Paspalum stramineum* Ekman, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(GUA). URY(SAO).

Paspalum intermedium Munro ex Morong & Britton

Sin.: *Paspalum densum* Poir. var. *eliptico-oblongum* Hack., *Paspalum intermedium* Munro ex Morong & Britton var. *goyense* Burkart

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

Paspalum ionanthum Chase

Sin.: *Paspalum guaraniticum* Parodi, *Paspalum guaraniticum* Parodi var. *crovettoi* Burkart, *Paspalum ionanthum* Chase subsp. *guaraniticum* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, MIE, PAI). URY(RIV, ROC, TAC).

Paspalum jesuiticum Parodi

Sin.: *Paspalum perspicinervium* Renvoize

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum juergensii Hack.

Sin.: *Paspalum agnesiae* L.B. Sm. & Wasm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TYT).

Paspalum lachneum Nees ex Steud.

Sin.: *Anthaenantiopsis racemosa* Renvoize, *Paspalum obscurum* Nees ex Steud., *Paspalum verrucosum* Hack.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Paspalum laurentii R.C. Oliveira & Valls

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Paspalum leptum Schult.

Sin.: *Paspalum arenicolum* Herter, hom. illeg., *Paspalum nicorae* Parodi, *Paspalum plicatulum* Michx. var. *arenarium* Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, GUA, MIE, SPE). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).

Paspalum lilloi Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, COA).

Paspalum limbatum Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(AMA, GUA, SPE).

Paspalum lineare Trin.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

Paspalum macranthecium ParodiSin.: *Eriochloa castanea* Hack.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: PRY(AMA).

Paspalum maculosum Trin.Sin.: *Paspalum eburneum* Henrard,*Paspalum maculosum* Trin. var. *multinode*

Barreto

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(MON, RIV, TAC).

Paspalum malacophyllum Trin.Sin.: *Anachyris paspaloides* Nees,*Panicum malacophyllum* (Trin.) Kuntze,hom. illeg., *Panicum malacophyllum*(Trin.) Kuntze var. *cordobense* Kuntze,*Panicum malacophyllum* (Trin.) Kuntzevar. *elongatum* (Griseb.) Kuntze,*Paspalum boliviense* Chase, *Paspalum**elongatum* Griseb., *Paspalum**malacophyllum* Trin. f. *parviflorum* Hack.,*Paspalum malacophyllum* Trin. var.*genuinum* Döll, nom. inval., *Paspalum**malacophyllum* Trin. var. *longipilum* Hack.,*Paspalum quadrifarium* Lam. var.*elongatum* (Griseb.) Hack.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CHO, CON, COA, GUA, NAS, PAI, SPE).

Paspalum mandiocanum Trin. var. **mandiocanum**Sin.: *Paspalum mandiocanum* Trin. var. *ellipticum* Döll, nom. superfl.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA). URY(MAL).

Paspalum mandiocanum Trin. var. **subaequiglume** Barreto

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Paspalum maritimum Trin.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum millegrana Schrad. ex Schult.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum minus E. Fourn.Sin.: *Paspalum barretoi* Canto-Dorow, Valls & Longhi-Wagner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA, LSR, LLA). PRY(CEN, COA, PAI). URY(CAS, MON).

Paspalum modestum Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI, PHA). URY(CLA, RIV).

Paspalum multicaule Poir.

Hierba. Nativa.

Países: PRY(AMA).

Paspalum notatum Flüggé var. **notatum**Sin.: *Paspalum notatum* Flüggé var. *latiflorum* Döll, *Paspalum notatum* Flüggé var. *typicum* Parodi, nom. inval., *Paspalum saltense* Arechav., *Paspalum uruguayense* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,

BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(MAL, MON).

Paspalum notatum Flüggé var. **saurae** ParodiSin.: *Paspalum saurae* (Parodi) Parodi

Hierba. Nativa. 1500-1700 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LRI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). CHL(IPA). PRY(CAA, CEN, COA, ITA, MIE). URY(MON).

Paspalum nutans Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Paspalum orbiculare G. Forst.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(IPA).

Paspalum orbiculatum Poir.Sin.: *Paspalum pusillum* Vent. ex Flüggé

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(CAA, CEN, COA, ITA, PAI).

Paspalum ovale Nees ex Steud.Sin.: *Paspalum ambustum* Swallen, *Paspalum epile* Parodi, hom. illeg., *Paspalum parodianum* Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(GUA, ITA, MIE, PAI).

Paspalum palustre Mez

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(CEN, PHA).

Paspalum paniculatum L.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, RIV).

Paspalum pauciciliatum (Parodi) Herter
Sin.: *Paspalum dilatatum* Poir. var. *pauciciliatum* Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, GUA, MIE, PAI). URY(ART, SAO).

Paspalum paucifolium Swallen

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(AMA, CEN, CON, GUA, PAI). URY(ART).

Paspalum pectinatum Nees ex Trin.

Sin.: *Anastrophus pectinatus* (Nees ex Trin.) Schldl. ex B.D. Jacks., *Paspalum pectinatum* Nees, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 400-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, PAI).

Paspalum pilosum Lam.

Sin.: *Panicum monostachyum* Kunth

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Paspalum planum Hack.

Sin.: *Paspalum oryzoides* Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

Paspalum plenum Chase

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

Paspalum plicatum Michx.

Sin.: *Panicum plicatum* (Michx.) Kuntze, *Paspalum lenticulare* Kunth f. *intumescens* (Döll) Killeen, *Paspalum*

montevidense Spreng., *Paspalum plicatum* Michx. subsp. *montevidense* (Spreng.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Paspalum plicatum* Michx. var. *genuinum* Parodi, nom. inval., *Paspalum plicatum* Michx. var. *glabrum* Arechav., *Paspalum plicatum* Michx. var. *intumescens* Döll, *Paspalum plicatum* Michx. var. *longipilum* Hack., *Paspalum plicatum* Michx. var. *villosissimum* Pilg., *Paspalum ramosum* Swallen

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MAL, MON, TAC).

Paspalum plurinerve Quarín, Valls & V.C. Rosso

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Paspalum polyphyllum Nees ex Trin.

Sin.: *Paspalum bicilium* Mez, *Paspalum macroblepharum* Hack., *Paspalum polyphyllum* Nees, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, PAY, RIV, TAC).

Paspalum procurrens Quarín

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(SAL).

Paspalum pumilum Nees

Sin.: *Paspalum nitidum* Swallen

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA). URY(CAS, MAL, MON).

Paspalum pygmaeum Hack.

Sin.: *Paspalum lorentzianum* Mez, *Paspalum pygmaeum* Hack. var. *genuinum* Hack., nom. inval.

Hierba. Nativa. 2600-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Paspalum quadrifarium Lam.

Sin.: *Paspalum ferrugineum* Trin., *Paspalum quadrifarium* Lam. var. *ferrugineum* (Trin.) Herter, *Paspalum quadrifarium* Lam. var. *majus* Döll

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, COA, ITA, MIE). URY(ART, MAL, MON, SJO).

Paspalum quarinii Morrone & Zuloaga

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

Paspalum ramboi Barreto

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum rawitscheri (Parodi) A. Chase ex G.H. Rua & Valls

Sin.: *Panicum juergensii* Hack., *Thrasyopsis juergensii* (Hack.) Soderstr. & A.G. Burm., *Thrasyopsis rawitscheri* Parodi

Hierba. Endémica. 600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum redondense Swallen

Hierba. Endémica. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Paspalum regnellii Mez

Sin.: *Paspalum mandiocanum* Trin. var. *stenocarpum* Döll, *Paspalum regnellii* Mez ex Ekman, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI).

Paspalum remotum J. Remy

Sin.: *Paspalum scrobiculatum* L. var. *pubigluma* Hicken

Hierba. Nativa. 1100-2100 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Paspalum repandum (Nees) G.H. Rua & Valls

Sin.: *Panicum repandum* Nees, *Thrasyopsis repanda* (Nees) Parodi

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Paspalum repens Bergius

Sin.: *Cymatochloa repens* (Bergius) Schldtl.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, PAI, PHA). URY(COL, SJO).

Paspalum rufum Nees

Sin.: *Panicum ostenii* Herter, *Paspalum giganteum* Arechav., hom. illeg., *Paspalum hassleri* Hack.

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(FLA, PAY, SOR).

Paspalum scrobiculatum L.

Sin.: *Paspalum boscianum* Flüggé, *Paspalum commutatum* Nees

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Paspalum simplex Morong

Sin.: *Paspalum malacophyllum* Trin. var. *linearifolium* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CEN, CHO, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(RIV).

Paspalum stagnophilum Morrone & Zuloaga

Sin.: *Agrostis brasiliensis* Spreng., *Reimaria actua* Flüggé, *Reimarochloa acuta* (Flüggé) Hitchc., *Reimarochloa brasiliensis* (Spreng.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). PRY(APY, CEN, CON, SPE).

Paspalum stellatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé

Sin.: *Paspalum stellatum* Humb. & Bonpl. ex Flüggé f. *hirsutum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, SAO).

Paspalum telmatum Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Paspalum torrense I.L. Barreto ex Valls & V.C. Rosso

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum umbrosum Trin.

Sin.: *Paspalum densiflorum* Döll, *Paspalum paniculatum* L. subsp. *umbrosum* (Trin.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.,

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Notas: Citada para Uruguay (Rosengurt et al., 1970) sin mencionar localidad o material de referencia.

Paspalum unispicatum (Scribn. & Merr.) Nash

Sin.: *Panicum unispicatum* Scribn. & Merr.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, BOQ, CON, GUA, PHA). URY(PAY).

Paspalum urvillei Steud.

Sin.: *Paspalum larranagae* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV, SAO).

Notas: Especie introducida en Chile

Paspalum usteri Hack.

Sin.: *Paspalum inaequiglume* Parodi, *Paspalum usteri* Hack. var. *villosum* Kuhl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). PRY(GUA, SPE).

Paspalum vacarianum Valls & V.C. Rosso

Hierba. Endémica. 900-1100 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Paspalum vaginatum Sw.

Sin.: *Paspalum distichum* L. var. *vaginatum* (Sw.) Griseb., *Paspalum gayanum* Desv.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). PRY(CEN, COA). URY(MON, SJO, SOR).

Notas: Especie introducida en Chile.

Paspalum virgatum L.

Sin.: *Paspalum wettsteinii* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, PHA).

Paspalum volcanense Zuloaga, Morrone & S.S. Denham

Hierba. Nativa. 2100-2300 m.

Países: ARG(JUU).

Paspalum wettsteinii Hack.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum wrightii Hitchc. & Chase

Sin.: *Paspalum hydrophilum* Henrard, *Paspalum plicatulum* Michx. var. *multinode* Hack., *Paspalum virgatum* L. var. *subplicatum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). PRY(APY, ÑEE, PHA).

Notas: Citada para Uruguay (Rosengurt et al., 1970) sin indicar localidad o material de referencia.

Phalaris L., nom. cons.

Phalaris amethystina Trin.

Sin.: *Phalaris berteroniana* Steud., *Phalaris colchaguensis* Phil., *Phalaris robinsoniana* Nees

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE).

Phalaris angusta Nees ex Trin.

Sin.: *Phalaris angusta* Nees ex Trin. f. *macra* Hack., *Phalaris chilensis* J. Presl, *Phalaris intermedia* Bosc ex Poir. var. *angusta* (Nees ex Trin.) Chapm., *Phalaris intermedia* Bosc ex Poir. var. *angustata* Beal, *Phalaris laxa* Spreng. ex Steud, nom. inval., *Phalaris ludoviciana* Torr. ex Trin., nom. inval., *Phalaris segetalis* Steud. ex Lechler, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, JFE). PRY(GUA, ITA, PHA). URY(MAL).

Phalaris aquatica L.

Sin.: *Phalaris aquatica* L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart, *Phalaris stenoptera* Hack., *Phalaris tuberosa* L., *Phalaris tuberosa* L. var. *stenoptera* (Hack.) Hitchc.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). URY(MON).

Phalaris arundinacea L.

Sin.: *Baldingera arundinacea* (L.) Dumort.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(ARA, LLA, MAG). URY(MON).

Phalaris canariensis L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME). URY(MON).

Phalaris caroliniana Walter

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(VAL).

Phalaris coerulescens Desf.

Sin.: *Phalaris bulbosa* Cav., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). CHL(BIO). URY(COL).

Phalaris minor Retz.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE). CHL(COQ, BIO).

Phalaris paradoxa L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, OS, ERI, SFE). CHL(LBO). URY(MON).

Phalaris platensis Henrard ex Wacht.

Sin.: *Phalaris arechavaletae* Herter, nom. superfl., *Phalaris intermedia* Bosc ex Poir. f. *platensis* Arechav., *Phalaris intermedia* Bosc ex Poir. var. *platensis* (Arechav.) Speg., *Phalaris platensis* (Arechav.) Parodi ex Valencia, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS). URY(MAL).

Pharus P. Browne

Pharus lappulaceus Aubl.

Sin.: *Pharus angustifolius* (Nees) Döll, *Pharus brasiliensis* Raddi, *Pharus brasiliensis* Raddi var. *angustifolius* Nees, *Pharus glaber* Kunth, *Pharus glaber* Kunth var. *pubescens* Döll, *Pharus lancifolius* Desv. ex Ham., *Pharus micranthus* Schrad. ex Nees

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, ÑEE, PAI). URY(ART, ROC).

Pharus latifolius L.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pharus parvifolius Nash

Hierba. Nativa

Países: BRA(RGS).

Phippsia (Trin.) R. Br.

Phippsia wilczekii Hack.

Hierba. Endémica. 3100-3200 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Phleum L.

Phleum alpinum L.

Sin.: *Phleum commutatum* Gaudin

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Phleum pratense L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME).

Notas: Cultivada en Uruguay

Phragmites Adans.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Sin.: *Arundo australis* Cav., *Arundo occidentalis* Sieber ex Schult., *Arundo phragmites* L., *Phragmites chilensis* Steud., nom. nud., *Phragmites communis* Trin., *Phragmites communis* Trin. var. *flavescens* Custer, *Phragmites communis* Trin. var. *genuinus* Stuck., nom. inval., *Phragmites dioicus* Hack. ex Conert, hom.

illeg., *Phragmites fissifolius* Steud., *Phragmites hispanicus* Nees, *Phragmites maximus* (Forssk.) Chiov., *Phragmites phragmites* (L.) H. Karst., nom. inval., *Phragmites phragmites* (L.) Speg., nom. inval.

Hierba. Cosmopolita. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(SJO).

Phyllostachys Siebold & Zucc.

Phyllostachys aurea Carriere ex Riviere & C. Riviere

Hierba subleñosa. Introducida.

Países: ARG(COR).

Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc.

Hierba subleñosa. Introducida.

Países: ARG(COR).

Piptatherum P. Beauv.

Piptatherum miliaceum (L.) Coss.

Sin.: *Agrostis miliacea* L., *Oryzopsis miliacea* (L.) Benth. & Hook. ex Asch. & Schweinf.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, DFE, LPA). CHL(VAL, MAG, RME).

Piptochaetium J. Presl, nom. cons.

Piptochaetium alpinum L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 1000-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptochaetium angolense Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Piptochaetium bicolor (Vahl) E. Desv.

Sin.: *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg., *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg. var. *minor* Speg., *Piptochaetium bicolor* (Vahl) E. Desv. var. *minor* (Speg.) Parodi, *Piptochaetium bicolor* (Vahl) E. Desv. var. *typicum* Parodi, nom. inval., *Stipa bicolor* Vahl, *Stipa intermedia* Trin. & Rupr., *Stipa megalantha* Steud., *Urachne grandiflora* Steud. & Hochst. ex Steud., nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, SJO).

Piptochaetium brachyspermum (Speg.) Parodi

Sin.: *Oryzopsis napostaensis* Speg. var. *brachysperma* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Piptochaetium burkartianum Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Piptochaetium cabreræ Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Piptochaetium calvescens Parodi

Hierba. Endémica. 600 m.

Países: ARG(BAI). URY(MON).

Piptochaetium confusum Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI). URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

Piptochaetium cucullatum Roseng. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: URY(PAY, SAO).

Piptochaetium depressum (Steud.) C. Peña

Sin.: *Oryzopsis verrucosa* (Phil.) Speg., *Piptochaetium granulatum* Phil., *Piptochaetium humile* Phil., *Piptochaetium moelleri* Phil., *Piptochaetium verrucosum* Phil., *Urachne depressa* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Piptochaetium fuscum (Nees ex Steud.) Barkworth, Ciald. & Gandhi

Sin.: *Piptochaetium macrocarpum* Phil., *Piptochaetium pallidum* Phil. ex Griseb., *Piptochaetium purpuratum* Phil., *Piptochaetium setosum* (Trin.) Arechav., *Stipa pallida* (Phil. ex Griseb.) Kuntze, *Urachne fusca* Nees ex Steud.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Piptochaetium hackelii (Arechav.) Parodi

Sin.: *Oryzopsis hackelii* (Arechav.) Speg., *Piptochaetium hackelii* (Arechav.) Herter, comb. superfl., *Stipa hackelii* Arechav., *Stipa tandilensis* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA). URY(MAL, MON).

Piptochaetium hirtum Phil.

Sin.: *Piptochaetium brevifolium* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL, RME).

Piptochaetium indutum Parodi

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Piptochaetium jubatum Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(CAS, MON, RIV).

Piptochaetium lasianthum Griseb.

Sin.: *Oryzopsis lasiantha* (Griseb.) Speg., *Piptochaetium erianthum* Balansa

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, RNO, SAO, SOR, TAC, TYT).

Piptochaetium lejopodum (Speg.)

Henrard

Sin.: *Oryzopsis lejopoda* Speg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(LAV, MAL).

Piptochaetium medium (Speg.) Torres

Sin.: *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg. var. *media* Speg.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS, SLU). BRA(RGS). URY(FLA).

Piptochaetium montevidense (Spreng.)

Parodi

Sin.: *Caryochloa montevidensis* Spreng., *Caryochloa montevidensis* Spreng. var. *brasiliensis* (Trin. & Rupr.) Döll ex Ekman, *Oryzopsis montevidensis* (Spreng.) Hauman, *Oryzopsis montevidensis* (Spreng.) Speg., comb. superfl., *Oryzopsis montevidensis* (Spreng.) Speg. f. *brasiliensis* Speg., *Oryzopsis montevidensis* (Spreng.) Speg. f. *trachycarpa* Speg., *Oryzopsis montevidensis* (Spreng.) Speg. f. *typica* Speg., nom. inval., *Oryzopsis tuberculata* (E. Desv.) Speg., *Piptochaetium montevidense* (Spreng.) Herter, comb. superfl., *Piptochaetium tuberculatum* Desv., *Stipa panicoides* Nees, nom. illeg., *Urachne panicoides* Trin., *Urachne*

panicoides Trin. var. *brasiliensis* Trin. & Rupr.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). PRY(CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Piptochaetium napostaense (Speg.) Hack.

Sin.: *Oryzopsis napostaensis* Speg., *Oryzopsis napostaensis* Speg. var. *brachyphylla* Speg., *Oryzopsis napostaensis* Speg. var. *macrophylla* Speg., *Stipa capillifolia* Hack., *Stipa hypogona* Hack.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SLU, TUC).

Piptochaetium palustre Mujica-Sallés & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 1600 m.

Países: BRA(SCA).

Piptochaetium panicoides (Lam.) E. Desv.

Sin.: *Oryzopsis lejocarpa* Speg., *Oryzopsis lejocarpa* Speg. var. *major* Speg., *Oryzopsis ovata* (Trin.) Speg., *Oryzopsis panicoides* (Lam.) Speg., *Oryzopsis setacea* A. Rich., nom. superfl., *Oryzopsis setifolia* (J. Presl) Henrard, *Piptatherum elegans* P. Beauv., nom. nud., *Piptatherum panicoides* Gibert, nom. nud., *Piptochaetium lejocarpum* (Speg.) Hack., *Piptochaetium lejocarpum* (Speg.) Hack. f. *subpapillosum* Hack., *Piptochaetium panicoides* (Lam.) E. Desv. f. *subpapillosum* (Hack.) Parodi, *Piptochaetium panicoides* (Lam.) E. Desv. var. *subpapillosum* (Hack.) Petetin,

Piptochaetium setifolium J. Presl,
Piptochaetium subnudum Phil., *Stipa*
lineolata Mez, *Stipa panicoides* Lam.,
Stipa setifolia (J. Presl) Kunth, *Urachne*
simplex Trin. var. *peruviana* Trin. & Rupr.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, NEU, SAL, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(CAS, COL, MAL, MON, RNO, SJO).

***Piptochaetium ruprechtianum* E. Desv.**

Sin.: *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg. var. *major* Speg., *Oryzopsis ruprechtiana* (E. Desv.) Speg., *Stipa bicolor* Vahl var. *major* Speg., *Stipa ruprechtiana* (E. Desv.) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, MIS, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, DUR, LAV, MAL, MON, RIV, SOR).

***Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.)**

Hack. ex Arechav. var. ***echinulatum*** Parodi

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, LPA, SLU). BRA(RGS). URY(SAO).

***Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.)**

Hack. ex Arechav. var. ***stipoides***

Sin.: *Oryzopsis grisebachii* Speg., *Oryzopsis stipoides* (Trin. & Rupr.) Speg., *Piptatherum stipoides* Gibert, nom. nud., *Piptochaetium chaetophorum* Griseb., *Piptochaetium cuspidatum* Phil., *Piptochaetium grisebachii* (Speg.) Herter, *Piptochaetium ovatum* (Trin.) Desv. f. *atratum* Hack., *Piptochaetium ovatum* (Trin.) Desv. var. *chaetophorum* (Griseb.) Hack., *Piptochaetium ovatum* (Trin.) Desv. var. *purpurascens* Hack., *Piptochaetium pallidum* Phil. ex Griseb., *Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *chaetophorum* (Griseb.) Parodi, *Piptochaetium stipoides* (Trin. &

Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *genuinum* Parodi, nom. inval., *Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *parviflorum* Parodi, *Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *purpurascens* (Hack.) Parodi, *Piptochaetium stipoides* (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav. var. *verruculosum* (Mez) Parodi, *Piptochaetium verruculosum* (Mez) Henrard, *Piptochaetium verruculosum* (Mez) Herter, comb. superfl., *Stipa verruculosa* Mez

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

***Piptochaetium uruguense* Griseb.**

Sin.: *Oryzopsis uruguayensis* (Griseb.) Speg., *Piptochaetium uruguense* Griseb. var. *genuinum* Parodi, nom. inval., *Piptochaetium uruguense* Griseb. var. *microcarpum* Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(GUA, MIE). URY(CLA, FLO, FLA, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).

***Poa* L.**

***Poa acinaciphylla* E. Desv.**

Sin.: *Poa villaroelii* Phil.

Hierba. Endémica. 2500-3700 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

***Poa aequigluma* Tovar**

Hierba. Nativa. 2800-3000 m.

Países: ARG(SAL).

Poa alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. *alopecurus

Sin.: *Arundo alopecurus* Gaudich. ex Mirb., *Arundo antarctica* d'Urv., *Calamagrostis macloviana* Steud., *Festuca alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.) Brongn., nom. superfl., *Festuca antarctica* (d'Urv.) Kunth, hom. illeg., *Festuca arundo* Hook. f., *Poa antarctica* (d'Urv.) Pilg., comb. illeg., *Poa antarctica* (d'Urv.) Raspail, *Poa antarctica* (d'Urv.) St.-Yves, comb. superfl., *Poa flabellata* (Lam.) Raspail var. *alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.) Raspail, *Poa flabellata* (Lam.) Raspail var. *antarctica* (d'Urv.) Raspail, *Poa magellanica* Phil. ex Speg., *Poa rigidifolia* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

***Poa alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.)**

Kunth subsp. ***fuegiana*** (Hook. f.) D.M. Moore & Dogg.

Sin.: *Aira superbiens* Steud., *Deyeuxia vivipara* Phil., *Festuca fuegiana* Hook. f., *Festuca fuegiana* Hook. f. var. *vivipara* Hook., nom. inval., *Festuca pogonantha* Franch., *Poa commersonii* Franch., *Poa fuegiana* (Hook. f.) Hack., *Poa fuegiana* (Hook. f.) Hack. var. *involucrata* Hack., *Poa pogonantha* (Franch.) Parodi, *Poa superbiens* (Steud.) Hauman & Parodi

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

***Poa alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.)**

Kunth subsp. ***shuka*** (Speg.) Giussani & Soreng

Sin.: *Festuca shuka* Speg., *Poa shuka* (Speg.) Parodi

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Poa annua L.

Sin.: *Festuca tenuiculmis* Tovar, *Poa aestivalis* J. Presl, *Poa algida* Trin., *Poa annua* L. var. *eriolepis* E. Desv., *Poa meyenii* Nees & Meyen

Hierba. Introducida. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Poa arctica R. Br.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Poa arechavaletae Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(MON).

Poa atropidiformis Hack. var. atropidiformis

Sin.: *Dissanthelium atropidiforme* (Hack.) Soreng

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Poa amplivaginata (Tovar) Refulio

Sin.: *Dissanthelium amplivaginatum* Tovar, *Dissanthelium atropidiforme* (Hack.) Soreng var. *patagonicum* (Parodi) Soreng, *Dissanthelium patagonicum* Parodi, *Poa atropidiformis* Hack. var. *patagonica* (Parodi) Nicora

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Poa bergii Hieron.

Sin.: *Poa barrosiana* Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, RNE).

Poa bonariensis (Lam.) Kunth

Sin.: *Festuca bonariensis* Lam., *Poa montevidensis* Arechav., *Poa pallens* Poir., *Schedonorus bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, NEU, SFE). BRA(RGS). URY(MAL, MON, ROC).

Poa bradei Pilg.

Hierba. Nativa. 2200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Poa bulbosa L. subsp. vivipara (Koeler) Arcang.

Sin.: *Paneion bulbosum* (L.) Lunell var. *viviparum* (Koeler) Lunell, *Poa bulbosa* L. f. *vivipara* (Koeler) Maire, *Poa bulbosa* L. var. *vivipara* Koeler

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Poa cabreriana Anton & Ariza

Sin.: *Poa serotina* Ehrh. var. *purpurea* Griseb.

Hierba. Endémica. 3000-5000 m.

Países: ARG(CAT, SAL).

Poa calchaquiensis Hack.

Sin.: *Poa buchtienii* Hack., *Poa buchtienii* Hack. var. *subacuminata* Hack.

Hierba. Nativa. 1000-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Poa chamaeclinis Pilg.

Hierba. Nativa. 3800-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ).

Poa compressa L.

Sin.: *Paneion compressum* (L.) Lunell

Hierba. Introducida. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(MAG).

Poa cumingii Trin.

Sin.: *Distichlis ammobia* Phil., *Distichlis volckmannii* Phil., *Poa conformis* Nees ex Steud., *Poa curva* Nees ex Steud., *Poa phalaroides* Nees ex Steud., *Poa stachyodes* Phil.

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Poa darwiniana Parodi

Sin.: *Poa antarctica* (Hook. f.) Stapf, comb. superfl., *Sieglingia antarctica* (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg., *Triodia antarctica* Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Poa denudata Steud.

Sin.: *Koeleria rigidula* Steud., *Poa araucana* Phil., *Poa chiloensis* Phil., *Poa eligulata* Hack., *Poa fonkii* Phil., *Poa gayana* E. Desv., *Poa nahuelhuapiensis* Nicora, *Poa vaginiflora* Steud., *Trisetum rigidulum* (Steud.) Domin

Hierba. Endémica. 0-2800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Poa dolichophylla Hack.

Sin.: *Poa calamagrostioidea* Hack., nom. nud., *Poa pilcomayensis* Hack. var. *calamagrostioidea* Hack.

Hierba. Endémica. 800-2300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Poa durifolia Giussani, Nicora & F.A. Roig

Sin.: *Poa ligularis* Nees ex Steud. var. *stricta* Nicora & F.A. Roig

Hierba. Endémica. 1200-2800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR).

Poa flabellata (Lam.) Raspail

Sin.: *Dactylis caespitosa* G. Forst., *Festuca antarctica* Spreng., *Festuca flabellata* Lam., *Festuca urvilleana* Steud., *Parodiocloa flabellata* (Lam.) C.E. Hubb., *Poa caespitosa* (G. Forst.) Hook. ex Speg., *Poa controversa* Steud., *Poa controversa* Steud. var. *minor* Steud., *Poa flabellata* (Lam.) Hook. f., comb. superfl., *Poa forsteri* Steud., nom. superfl., *Sesleria americana* Nees ex Steud.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Poa glaberrima Tovar

Hierba. Nativa. 4100-4200 m.

Países: ARG(JUU).

Poa glauca Vahl

Sin.: *Poa ayseniensis* Hack.

Hierba. Introducida. 300-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR). CHL(AIS, MAG).

Poa grisebachii R.E. Fr.

Sin.: *Poa superata* Hack.

Hierba. Endémica. 3000-4500 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Poa gymnantha Pilg.

Sin.: *Poa ovata* Tovar, *Poa pseudoaeuigluma* Tovar

Hierba. Nativa. 3900-5000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Poa hachadoensis Nicora

Hierba. Endémica. 1200-1500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Poa hieronymi Hack.

Hierba. Endémica. 1200-3300 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL, TUC).

Poa holciformis J. Presl

Sin.: *Festuca elliotii* Hack., *Koeleria poaeoides* Nees ex Steud., *Poa chilensis* Trin., *Poa chilensis* Trin. var. *oligoclada* Phil., *Poa chilensis* Trin. var. *robustior* Phil.

Hierba. Endémica. 1200-3800 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Poa hubbardiana Parodi

Hierba. Endémica. 1400-2100 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Poa huecu Parodi

Sin.: *Poa indigesta* Parodi

Hierba. Endémica. 1000-3900 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).

Poa humillima Pilg.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC). CHL(AYP, ANT).

Poa infirma Kunth

Hierba. Introducida. 0-3800 m.

Países: ARG(COR, SAL, TUC). CHL(VAL, RME).

Poa iridifolia Hauman

Sin.: *Poa lanigera* Nees var. *tandilensis* Hack.

Hierba. Endémica. 100-900 m.

Países: ARG(BAI).

Poa kurtzii R.E. Fr.

Sin.: *Poa asperiflora* Hack., *Poa munozensis* Hack., *Poa pflanzii* Pilg.

Hierba. Nativa. 3200-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Poa laetevirens R.E. Fr.

Sin.: *Poa atacamensis* Parodi, *Poa nana* Phil., hom. illeg., *Puccinellia atacamensis* (Parodi) Soreng

Hierba. Nativa. 3500-4800 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Poa lanigera Nees

Sin.: *Poa lanigera* Nees var. *vaginata* Döll, *Poa vaginata* (Döll) Herter

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU). URY(DUR, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, TYT).

Poa lanuginosa Poir. var. *lanuginosa*

Sin.: *Festuca lanata* Spreng., *Poa bergii* Hieron. var. *chubutensis* Speg., *Poa lepida* Nees ex Steud., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG). URY(COL, MAL, MON).

Poa lanuginosa Poir. var. *neuquina* (Nicora) Giussani & Soreng

Sin.: *Poa patagonica* Phil. var. *neuquina* Nicora

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(BIO, RME).

Poa lanuginosa Poir. var. *patagonica* (Phil.) Giussani & Soreng

Sin.: *Poa alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. *prichardii* (Rendle) Giussani & Soreng, *Poa boecheri* Parodi, *Poa magellanica* Phil. ex Macloskie, nom.

nud., *Poa patagonica* Phil., *Poa prichardii* Rendle
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Poa lepidula (Nees & Meyen) Soreng & L.J. Gillespie
Sin.: *Anthochloa lepida* Nees & Meyen, *Anthochloa lepidula* Nees & Meyen, *Anthochloa rupestris* J. Remy
Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
Países: ARG(JUU, LRI, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Poa ligularis Nees ex Steud. var. **ligularis**
Sin.: *Poa denudata* Steud. var. *minor* Ball, nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-3600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU). CHL(BIO, AIS).

Poa ligularis Nees ex Steud. var. **resinulosa** (Nees ex Steud.) Fernández Pepi & Giussani
Sin.: *Poa decolorata* Pilg., *Poa resinulosa* Nees ex Steud.
Hierba. Endémica. 200-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU). CHL(RME).

Poa lilloi Hack.
Sin.: *Poa jujuyensis* (Parodi ex Nicora) Giussani, *Poa parviceps* Hack. var. *jujuyensis* Parodi ex Nicora, Soreng & Anton
Hierba. Nativa. 3200-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Poa macusaniensis (E.H.L. Krause) Refulio
Sin.: *Dissanthelium macusaniense* (E.H.L. Krause) R.C. Foster & L.B. Sm.,

Dissanthelium minimum Pilg., *Graminastrum macusaniense* E.H.L. Krause
Hierba. Nativa. 4100-4600 m.
Países: ARG(SAL). CHL(AYP, TAR).

Poa marticorenae Soreng, Giussani & Finot
Sin.: *Poa hachadoensis* Nicora var. *pilosa* Nicora
Hierba. Endémica. 2500-2700 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(LBO).

Poa mendocina Nicora & F.A. Roig
Hierba. Endémica. 3000-3400 m.
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Poa myriantha Hack.
Hierba. Nativa. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUU, TUC).

Poa nemoralis L.
Sin.: *Agrostis alba* L.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, COR, NEU, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Poa nubensis Giussani, Fernández Pepi & Morrone
Hierba. Endémica. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUU, LRI, SAL, TUC).

Poa palustris L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(RNE). CHL(VAL, MAG, RME).

Poa paposana Phil.
Sin.: *Poa dialystostachya* Phil.
Hierba. Endémica. 300-900 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Poa pearsonii Reeder
Hierba. Nativa. 3500-4600 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR).

Poa pedersenii Nicora
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU).

Poa perligulata Pilg.
Sin.: *Catabrosa burkartii* Hitchc.
Hierba. Nativa. 4200-5400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Poa pfisteri Soreng
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(BIO).

Poa pilcomayensis Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SDE). PRY(APA, APY, CAA, ITA, PHA). URY(MON, TAC).

Poa planifolia Kuntze
Sin.: *Colpodium planifolium* (Kuntze) K. Schum., *Poa acutifolia* Hauman, *Poa chilensis* Trin. var. *planifolia* (Kuntze) Hauman
Hierba. Endémica. 2600-3300 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, RME).

Poa plicata Hack.
Sin.: *Poa glomerifera* Hack.
Hierba. Endémica. 3300-4300 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Poa pratensis L. subsp. **alpigena** (Lindm.) Hiitonen
Sin.: *Poa alpigena* Lindm., *Poa oligeria* Steud.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(MAG).

Poa pratensis L. subsp. **angustifolia** (L.) Lej.
Sin.: *Poa angustifolia* L., *Poa pratensis* L. var. *angustifolia* (L.) Gaudin
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, DFE, NEU, RNE).

Poa pratensis L. subsp. **pratensis**

Sin.: *Poa boliviensis* Hack., *Poa ianthoides* Roiv., *Poa magensiana* Potztal

Hierba. Introducida. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(MON).

Poa ragonesei Nicora

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Poa reitzii Swallen

Hierba. Endémica. 1000-1800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Poa scaberula Hook. f.

Sin.: *Festuca angustata* Griseb., *Poa anfamensis* Negritto & Anton, *Poa angustata* (Griseb.) Parodi, *Poa dactyliformis* Steud., *Poa micranthera* Hack., nom. nud.

Hierba. Nativa. 1100-2200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, LLA, AIS, MAG).

Poa scaberula Hook. f. subsp. **parviceps**

(Hack.) Finot, Giussani & Soreng

Sin.: *Poa parviceps* Hack., *Poa scaberula*

Hook. f. f. nudiflora Hauman

Hierba. Endémica. 3500-4400 m.

Países: ARG(COR, MEN, TUC). CHL(ANT, ATA).

Poa schizantha Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Poa secunda J. Presl subsp. **juncifolia**

(Scribn.) Soreng

Sin.: *Poa ampla* Merr., *Poa juncifolia* Scribn.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, MAG).

Poa secunda J. Presl subsp. **secunda**

Sin.: *Festuca patagonica* Phil., *Festuca spaniantha* Phil., *Poa fallens* Pilg., *Poa fulvescens* Trin., *Poa gracillima* Vasey

Hierba. Nativa. 300-2700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, AIS, MAG, RME).

Poa sellowii Nees

Hierba. Endémica. 700-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(MON).

Poa serpaiana Refulio

Sin.: *Dissanthelium peruvianum* (Nees & Meyen) Pilg., *Phalaridium peruvianum* Nees & Meyen

Hierba. Nativa. 1700-4200 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR).

Poa spiciformis (Steud.) Hauman &

Parodi var. **ibari** (Phil.) Giussani

Sin.: *Poa dusenii* Hack., *Poa ibari* Phil., *Poa rigidifolia* Steud. var. *ibari* (Phil.) Giussani

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Poa spiciformis (Steud.) Hauman &

Parodi var. **spiciformis**

Sin.: *Aira spiciformis* Steud., *Koeleria sterilis* Steud., *Poa poecila* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LBO, AIS, MAG, RME).

Poa stenantha Trin.

Sin.: *Poa chorizantha* E. Desv.

Hierba. Introducida. 0-2200 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).

CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, AIS, MAG, RME).

Poa stuckertii (Hack.) Parodi

Sin.: *Poa lanigera* Nees var. *stuckertii* Hack.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Poa tristigmatica E. Desv.

Sin.: *Deyeuxia vulcanica* Phil., *Poa boelckeii* Nicora, *Poa julietii* Phil., *Poa obvallata* Steud., *Poa pachypogon* Nees, *Poa subaristata* Phil.

Hierba. Endémica. 200-2600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Poa trivialis L.

Sin.: *Poa ariguensis* Steud., *Poa maullinica* Phil., *Poa modesta* Phil., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL, TDF). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO, LSR, LLA, MAG, RME).

Notas: Citada para Uruguay (Soreng et al., 2003) sin indicar localidad o material de referencia.

Poa tucumana Parodi

Hierba. Endémica. 3100-3500 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Poa umbrosa Trin.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Notas: Citada para Paraguay y Uruguay (Soreng et al., 2003) sin indicar material de referencia.

Poa uruguayensis Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(MON).

Poa yaganica Speg.

Sin.: *Poa breviculmis* Pilg., *Poa chrysantha* Lindm., *Poa limicola* Pilg., *Poa trachyantha* Hack.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Podagrostis (Griseb.) Scribn. & Merr.

Podagrostis sesquiflora (E. Desv.)

Parodi ex Nicora

Sin.: *Agrostis sesquiflora* E. Desv., *Briza sesquiflora* (Desv.) Pilg., *Deyeuxia sesquiflora* (E. Desv.) Benth. & Hook. f. ex W.D. Jacks.

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(MEN, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Poidium Nees

Poidium ambiguum (Hack.) Matthei

Sin.: *Briza ambigua* Hack., *Chascolytrum ambiguum* (Hack.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Poidium brachychaetum (Ekman) Matthei

Sin.: *Briza brachychaete* Ekman, *Chascolytrum brachychaetum* (Ekman) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies, *Microbriza brachychaete* (Ekman) Parodi ex Nicora & Rúgolo

Hierba. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Poidium brasiliensis Nees

Sin.: *Briza brasiliensis* (Nees) Ekman, *Chascolytrum brasiliense* (Nees) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies, *Poa poidium* Döll

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Poidium calotheca (Trin.) Matthei

Sin.: *Briza calotheca* (Trin.) Hack., *Briza neesii* Döll, *Briza poa* Nees ex Steud., *Briza scabra* Nees ex Steud., nom. nud., *Chascolytrum calotheca* (Trin.) Essi, *Eragrostis calotheca* Trin., *Eragrostis crassa* Jedwabn., Longhi-Wagner & Souza-Chies, *Poa calotheca* (Trin.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(FLA, MON, RIV, SJO, TAC).

Poidium itatiaiae (Ekman) Nicora & Rúgolo

Sin.: *Briza itatiaiae* Ekman

- Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Poidium juergensii (Hack.) Matthei var. **angustilemma** (Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner) L.N. Silva

Sin.: *Chascolytrum juergensii* (Hack.) Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner, Souza-Chies & Longhi-Wagner var. *angustilemma* Essi

Hierba. Nativa.

Países: BRA(RGS, SCA).

Poidium juergensii (Hack.) Matthei var. **juergensii**

Sin.: *Briza juergensii* Hack., *Chascolytrum juergensii* (Hack.) Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner var. *juergensii*

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Poidium latifolium (Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner) L.N. Silva

Sin.: *Chascolytrum latifolium* Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 800-1600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Poidium serranum (L.N. Silva) L.N. Silva

Sin.: *Chascolytrum serranum* L.N. Silva

Hierba. Endémica. 1000-1100 m.

Países: BRA(RGS).

Poidium uniola (Nees) Matthei

Sin.: *Briza flava* Desv., *Briza spicigera* (J. Presl) Steud., *Briza uniola* (Nees) Nees ex Steud., *Briza uniola* (Nees) Nees ex Steud. var. *modestior* Döll, *Briza uniola* (Nees) Nees ex Steud. var. *robustior* Döll, *Chascolytrum spicigerum* J. Presl, *Chascolytrum uniola* (Nees) Essi, *Eragrostis uniola* Nees, Longhi-Wagner & Souza-Chies, *Poa anomala* Kunth

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TYT).

Polypogon Desf.

Polypogon australis Brongn.

Sin.: *Polypogon adscensionis* Trin., *Polypogon chonoticus* Hook. f., *Polypogon crinitus* Trin., hom. illeg., *Polypogon elongatus* Kunth var. *patagonica* Speg., *Polypogon interruptus* Kunth var. *crinitus* (Trin.) Hack., *Polypogon radicans* Steud.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME, JFE).

Polypogon avenaceus (J.F. Gmel.) P.M. Peterson, Soreng & Romasch.

Sin.: *Agrostis avenacea* J.F. Gmel., *Agrostis filiformis* (G. Forst.) Spreng.,

comb. illeg., *Agrostis lasiantha* Phil., *Agrostis leonii* Parodi, *Avena filiformis* G. Forst., *Lachnagrostis filiformis* (G. Forst.) Trin.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SFE).
CHL(VAL, MAU, LLA, IPA).

Polypogon cachinalensis Phil.

Hierba. Endémica. 2600-3000 m.

Países: CHL(ANT, COQ).

Polypogon elongatus Kunth var. **longearistatus** (Nicora) Finot

Sin.: *Chaetotropis elongata* (Kunth) Björkman var. *longearistata* Nicora

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI).

Notas: Finot (2013), cita esta especie para el Uruguay, sin indicar ejemplar de referencia

Polypogon elongatus Kunth var. **strictus** E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ARA, LSR, LLA, RME).

Polypogon exasperatus (Trin.) Renvoize var. **exasperatus**

Sin.: *Agrostis asperigluma* Steud., *Agrostis exasperata* Trin., *Agrostis exasperata* Trin. var. *viridis* Kuntze, nom. nud., *Agrostis hackelii* R.E. Fr., *Agrostis hackelii* R.E. Fr. f. *viridiflora* Hack., *Agrostis haenkeana* Hitchc., *Agrostis mucronata* J. Presl, *Agrostis patagonica* Phil., *Agrostis santacruzensis* Speg., *Agrostis speeiana* Mez, *Chaetotropis araucana* Phil., *Chaetotropis asperigluma* (Steud.) Nicora, *Chaetotropis exasperata* (Trin.) Björkman, *Chaetotropis hackelii* (R.E. Fr.) Björkman, *Polypogon hackelii* (R.E. Fr.) Renvoize, *Vilfa acutiglumia* Steud. ex Lechler, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, NEU, RNE, SCR, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Polypogon exasperatus (Trin.) Renvoize var. **kuntzei** (Mez) Finot

Sin.: *Agrostis exasperata* Trin. var. *purpurascens* Kuntze, *Agrostis kuntzei* Mez

Hierba. Endémica. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, MEN, NEU, SJU, SCR). CHL(ATA, COQ, BIO, RME).

Polypogon interruptus Kunth

Sin.: *Alopecurus interruptus* (Kunth) Poir., *Polypogon brachyatherus* Phil., *Polypogon brevistaratus* Phil., *Polypogon interruptus* Kunth var. *brevistaratus* E. Desv., *Polypogon interruptus* Kunth var. *longearistata* E. Desv., *Polypogon littoralis* Sm. var. *interruptus* (Kunth) Kuntze, *Polypogon microstachys* Phil., *Polypogon purpurascens* Phil., *Polypogon tarapacanus* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3900 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Polypogon linearis Trin.

Sin.: *Polypogon longiflorus* Nees ex Steud., *Polypogon longiflorus* Nees ex Steud., nom. nud., *Polypogon longiflorus* Nees ex Trin.

Hierba. Endémica. 0-3900 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, RME).

Polypogon magellanicus (Lam.) Finot

Sin.: *Agrostis antarctica* Hook. f., *Agrostis araucana* Phil., *Agrostis chonotica* Phil., *Agrostis cognata* Steud., *Agrostis macrathera* Phil., *Agrostis magellanica*

Lam., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook. f.) Franch., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook. f.) Pilg., comb. illeg., *Agrostis magellanica* Lam. var. *cognata* (Steud.) Macloskie & Dusén, *Agrostis multiculmis* Hook. f., *Agrostis rinihuensis* Phil., *Vilfa magellanica* (Lam.) P. Beauv.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Polypogon maritimus Willd.

Sin.: *Alopecurus maritimus* (Willd.) Poir., *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. var. *maritimus* (Willd.) Coss. & Durand, *Santia maritima* (Willd.) Fiori

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO). URY(MON, SJO).

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Sin.: *Agrostis alopecuroides* Lam., *Alopecurus aristatus* Huds. var. *monspeliensis* (L.) Huds., *Alopecurus monspeliensis* L., *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. f. *argentinus* Hack., *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. f. *nana* Stuck., *Santia monspeliensis* (L.) Parl.

Hierba. Introducida. 0-3100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME, JFE). PRY(CEN). URY(ROC).

Polypogon parvulus Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Sin.: *Chaetotropis parvula* (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Nicora

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SFE). URY(TAC).

Polypogon viridis (Gouan) Breistr.

Sin.: *Agrostis semiverticillata* (Forssk.) C. Chr., *Agrostis verticillata* Vill., *Agrostis viridis* Gouan, *Phalaris semiverticillata* Forssk., *Polypogon semiverticillatus* (Forssk.) Hyl.

Hierba. Introducida. 0-3400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, RME). URY(MON).

Pseudechinolaena Stapf

Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf

Sin.: *Echinolaena polystachya* Kunth, *Lappago oplismenoides* Speg., *Oplismenus oplismenoides* (Speg.) Speg.

Hierba. Cosmopolita. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI). URY(CLA, RIV, TAC).

Puccinellia Parl., nom. cons.

Puccinellia argentinensis (Hack.) Parodi

Sin.: *Atropis argentinensis* Hack.

Hierba. Endémica. 2200-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ATA).

Puccinellia biflora (Steud.) Parodi

Sin.: *Atropis biflora* (Steud.) St.-Yves & A. Camus, *Festuca biflora* Steud., *Glyceria leptostachya* Speg., *Panicularia leptostachya* (Speg.) Macloskie, *Puccinellia biflora* (Steud.) A. Camus, comb. illeg.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Puccinellia frigida (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Catabrosa frigida* Phil., *Poa eremophila* Phil., *Poa hypsophila* Phil., *Poa oresigena* Phil., *Poa pumila* Phil., *Poa taltalensis* Pilg., *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Nicora, *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Parodi ex Spinosa, comb. illeg., *Puccinellia oresigena* (Phil.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 2300-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Puccinellia glaucescens (Phil.) Parodi

Sin.: *Atropis osteniana* Pilg., *Catabrosa glaucescens* Phil., *Glyceria glaucescens* (Phil.) Benth., *Panicularia glaucescens* (Phil.) Kuntze, *Puccinellia glaucescens* (Phil.) Parodi var. *osteniana* (Pilg.) Parodi, *Puccinellia johnstonii* Muñoz, *Puccinellia osteniana* (Pilg.) Herter

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF). CHL(COQ, VAL, BIO, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON).

Puccinellia magellanica (Hook. f.) Parodi

Sin.: *Atropis laxa* Pilg., *Atropis magellanica* (Hook. f.) Desv., *Catabrosa magellanica* Hook. f., *Glyceria antarctica* Speg., *Glyceria fuegiana* Speg., *Glyceria magellanica* (Hook. f.) Benth., *Panicularia antarctica* (Speg.) Macloskie, *Panicularia fuegiana* (Speg.) Macloskie, *Panicularia magellanica* (Hook. f.) Kuntze, *Panicularia magellanica* (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg., *Puccinellia antarctica* (Speg.) Parodi, *Puccinellia laxa* (Pilg.) Parodi

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

Puccinellia mendozina (Hack.) Parodi

Sin.: *Atropis argentinensis* Hack. f. *mendozina* Hack., *Atropis convoluta*

Griseb. var. *mendozina* Hack., *Puccinellia blomii* Jansen

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, SAL, SJU, SCR).

Puccinellia parvula Hitchc.

Hierba. Nativa. 3500-4400 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Puccinellia preslii (Hack.) Ponert

Sin.: *Aira tenuifolia* (J. Presl) Steud., *Atropis preslii* Hack., *Atropis tenuifolia* (J. Presl) Hauman, hom. illeg., *Atropis tenuifolia* (J. Presl) Speg., hom. illeg., *Catabrosa tenuifolia* J. Presl, *Glyceria tenuifolia* (J. Presl) Steud., *Panicularia tenuifolia* (J. Presl) Kuntze, *Puccinellia parodii* Nied., nom. superfl., *Puccinellia tenuifolia* (J. Presl) Parodi, comb. illeg.

Hierba. Endémica. 500-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, SCR, SJU). CHL(ATA, COQ).

Puccinellia pusilla (Hack.) Parodi

Sin.: *Atropis parviflora* Hack. ex Dusén, *Atropis preslii* Hack. subsp. *breviculmis* Hack., *Atropis preslii* Hack. subsp. *pusilla* Hack., *Puccinellia parviflora* (Hack. ex Dusén) Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Puccinellia skottsbergii (Pilg.) Parodi

Sin.: *Atropis skottsbergii* Pilg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Quixiume C.D. Tyrrell, L.G. Clark, P.L. Viana & Santos-Gonç.

Quixiume radiata (Rupr.) C.D. Tyrrell, L.G. Clark, P.L. Viana & Santos-Gonç.

Sin.: *Arundinaria radiata* Rupr., *Aulonemia fimbriatifolia* L.G. Clark, *Aulonemia radiata* (Rupr.) McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Nativa. 900-1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Raddiella Swallen

Raddiella esenbeckii (Steud.) C.E.

Calderón & Soderstr.

Sin.: *Panicum esenbeckii* Steud.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Reitzia Swallen

Reitzia smithii Swallen

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Relchela Steud.

Relchela panicoides Steud.

Sin.: *Agrostis asperula* Phil., *Agrostis corralensis* Phil., *Agrostis limonias* Phil., *Panicum oligistachyum* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Rhipidocladum McClure

Rhipidocladum neumannii Sulekic,

Rúgolo & L.G. Clark

Hierba subleñosa. Nativa. 400-1800 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Rhipidocladum parviflorum (Trin.)

McClure

Sin.: *Arundinaria parviflora* Trin.

Hierba leñosa. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Rhipidocladum racemiflorum (Steud.)

McClure

Sin.: *Arthrostylidium racemiflorum* Steud.,
Arundinaria racemiflora (Steud.) Hack.,
Merostachys racemiflora (Steud.) E.
Fourn.

Hierba subleñosa. Nativa. 500-1200 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Rhombolytrum Link

Rhombolytrum koelerioides (Trin.) L.N.

Silva

Sin.: *Chascolytrum koelerioides* (Trin.)
Essi, *Gymnachne jaffuelii* Parodi,
Gymnachne koelerioides (Trin.) Parodi,
Longhi-Wagner & Souza-Chies, *Poa koelerioides* Trin., *Poa philippii* Steud.,
Poa tenuiculmis Steud., *Rhombolytrum berterioanum* E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LSR, LLA).

Rhombolytrum monandrum (Hack.)

Nicora & Rúgolo

Sin.: *Briza bidentata* Roseng., B.R. Arrill.
& Izag., *Chascolytrum bidentatum*
(Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Essi,
Longhi-Wagner & Souza-Chies, *Eragrostis monandra* Hack.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(RIV, TYT).

Rhombolytrum rhomboideum Link

Sin.: *Chascolytrum rhomboideum* (Link)
Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies, *Poa tumidula* Steud., *Rhombolytrum quinquenervium* Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Rhynchoryza Baill.

Rhynchoryza subulata (Nees) Baill.

Sin.: *Oryza subulata* Nees

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, MIE,
PAI). URY(RIV).

Rhytachne Desv.

Rhytachne rottboellioides Desv. ex
Ham.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Rosengurtia L.N. Silva

Rosengurtia monandra (Hack.) L.N.
Silva

Sin.: *Briza lilloi* Parodi, *Briza mandoniana*
(Griseb.) Henrard, *Briza mandoniana*
(Griseb.) Henrard var. *herzogiana*
Henrard, *Briza mandoniana* (Griseb.)
Henrard var. *tuberculata* Henrard, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard var.
vallegrandensis Henrard, *Briza monandra*
(Hack.) Pilg., *Briza stricta* (Hook. & Arn.)
Steud. var. *mandoniana* (Griseb.)
Hauman, *Calotheca stricta* Hook. & Arn.
var. *mandoniana* Griseb., *Chascolytrum monandrum* (Hack.) Essi, Longhi-Wagner
& Souza-Chies, *Poa monandra* Hack.,
Poidium monandrum (Hack.) Matthei

Hierba. Nativa. 1000-1800 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Rostraria Trin.

Rostraria cristata (L.) Tzvelev

Sin.: *Festuca cristata* L., *Festuca phleoides* Vill., nom. superfl., *Koeleria campestris* Phil., *Koeleria cristata* (L.) Bertol., *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers., comb. superfl., *Lophochloa cristata* (L.) Hyl., *Lophochloa phleoides* (Vill.) Rchb., comb. superfl., *Trisetum minutiflorum* Phil.
Hierba. Introducida. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, SJU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME, IPA). URY(MAL).

Rostraria trachyantha (Phil.) Tzvelev

Sin.: *Koeleria trachyantha* Phil., *Parodiochloa trachyantha* (Phil.) A.M. Molina, *Raimundochloa trachyantha* (Phil.) A.M. Molina

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Rottboellia L. f., nom. cons.

Rottboellia cochinchinensis (Lour.)

Clayton
Sin.: *Rottboellia exaltata* L. f., nom. inval., *Stegosia cochinchinensis* Lour.
Hierba. Introducida. 600 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, SCA).

Rugoloo Zuloaga

Rugoloo hylaeica (Mez) Zuloaga

Sin.: *Panicum doellii* Mez, *Panicum hylaeicum* Mez, *Panicum laxum* Sw. var. *amplissimum* Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PHA). URY(ART, SAO, SJO).

Rugoloo pilosa (Sw.) Zuloaga

Sin.: *Panicum pilosum* Sw.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI).

Rugoloo polygonata (Schr.) Zuloaga

Sin.: *Panicum boliviense* Hack., *Panicum pilosum* Sw. var. *polygonatum* (Schr.) Döll, *Panicum polygonatum* Schr., *Panicum potamium* Trin., *Panicum subpetiolatum* Hack. ex Bertoni, nom. nud., *Setaria polygonata* (Schr.) Kunth
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Rytidosperma Steud.

Rytidosperma lechleri Steud.

Sin.: *Danthonia glabra* Phil., *Notodanthonia lechleri* (Steud.) Veldkamp, *Rytidosperma glabrum* (Phil.) Nicora
Hierba. Endémica. 800-3300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME).

Rytidosperma paschale (Pilg.) Baeza

Sin.: *Danthonia paschalis* Pilg.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(IPA).

Rytidosperma pictum (Nees & Meyen)

Nicora var. **bimucronata** Nicora
Sin.: *Notodanthonia picta* (Nees & Meyen) Veldkamp var. *bimucronata* (Nicora) Veldkamp
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, AIS).

Rytidosperma pictum (Nees & Meyen)
Nicora var. **pictum**

Sin.: *Danthonia picta* Nees & Meyen, *Notodanthonia picta* (Nees & Meyen) Veldkamp

Hierba. Endémica. 900-3100 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Rytidosperma quirihuense Baeza

Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(VAL, BIO).

Rytidosperma soriano Nicora

Sin.: *Notodanthonia soriano* (Nicora) Veldkamp
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, RNE).

Rytidosperma violaceum (E. Desv.)

Nicora
Sin.: *Danthonia violacea* E. Desv., *Notodanthonia violacea* (E. Desv.) Veldkamp
Hierba. Endémica. 900-2700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Rytidosperma virescens (E. Desv.)

Nicora var. **parvispiculum** Nicora
Sin.: *Notodanthonia virescens* (E. Desv.) Veldkamp var. *parvispicula* (Nicora) Veldkamp
Hierba. Endémica. 800-1200 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).

Rytidosperma virescens (E. Desv.)

Nicora var. **virescens**
Sin.: *Danthonia andina* Phil., *Danthonia picta* Nees & Meyen var. *patagonica* Speg., *Danthonia virescens* E. Desv., *Danthonia werdermanni* Pilg., *Notodanthonia virescens* (E. Desv.) Veldkamp, *Notodanthonia virescens* (E. Desv.) Veldkamp var. *patagonica* (Speg.) Veldkamp, *Rytidosperma virescens* (E.

Desv.) *Nicora* var. *patagonica* (Speg.)
Nicora

Hierba. Endémica. 0-3400 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Saccharum L., nom. cons.

Saccharum angustifolium (Nees) Trin.

Sin.: *Erianthus angustifolius* Nees, *Erianthus biaristatus* (Hack.) Swallen, *Erianthus divaricatus* (L.) Hitchc. var. *angustifolius* (Nees) Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. subsp. *angustifolius* (Nees) Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. subsp. *biaristatus* (Hack.) Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. var. *biaristatus* Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. var. *neesii* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(DUR, MAL, MON, RIV, TAC).

Saccharum asperum (Nees) Steud.

Sin.: *Erianthus asper* Nees, *Erianthus asper* Nees var. *brasiliensis* (Trin.) Hack., *Erianthus asper* Nees var. *typicus* Hack., nom. inval., *Erianthus brasiliensis* (Trin.) Anders, *Saccharum brasiliense* Trin.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE). URY(RIV).

Saccharum balansae (Hack.) Roberty

Sin.: *Erianthus balansae* Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU).

Saccharum giganteum (Walter) Pers.

Sin.: *Anthoxanthum giganteum* Walter, *Erianthus giganteus* (Walter) C.E. Hubb., comb. illeg., *Erianthus giganteus* (Walter) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

Saccharum intermedium Welker & Peichoto

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, ROC).

Saccharum trinii (Hack.) Renvoize

Sin.: *Erianthus clandestinus* Swallen, nom. inval., *Erianthus glabrinodes* (Hack.) Swallen, *Erianthus purpureus* Swallen, *Erianthus saccharoides* Michx. var. *trinii* Hack., *Erianthus trinii* (Hack.) Hack., *Saccharum villosum* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA). URY(RIV, SJO).

Sacciolepis D. L. Nash

Sacciolepis indica (L.) Chase

Sin.: *Aira indica* L.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Sacciolepis myuros (Lag.) Chase

Sin.: *Panicum myuros* Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, COA, PAI).

Sacciolepis vilvroides (Trin.) Chase

Sin.: *Hymenachne campestris* Nees, *Panicum vilvroides* Trin., *Panicum vilvroides* Trin. var. *campestre* (Nees) Döll, *Sacciolepis campestris* (Nees) Parodi ex Burkart, comb. superfl., *Sacciolepis campestris* (Nees) Parodi ex Nicora

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, PAI). URY.

Schedonorus P. Beauv.

Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv.

Sin.: *Festuca elatior* L. subsp. *pratensis* (Huds.) Hack., *Festuca pratensis* Huds.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, MEN, RNE, SLU, TDF).

Schismus P. Beauv.

Schismus arabicus Nees

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(COQ, VAL).

Schismus barbatus (L.) Thell.

Sin.: *Festuca barbata* L.

Hierba. Introducida. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Schizachyrium Nees

Schizachyrium angustispiculatum

Peichoto & Welker

Hierba. Nativa. 800-1200 m.

Países: PRY(AMA).

Schizachyrium bimucronatum Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Büse

Sin.: *Andropogon brevifolius* Sw., *Andropogon floridus* Trin., *Pollinia brevifolia* (Sw.) Spreng., *Sorghum brevifolium* (Sw.) Kuntze

Hierba. Nativa. 1500-1600 m. Países: ARG(SAL).	Hierba. Endémica. 1500-1900 m. Países: ARG(SAL).	Sin.: <i>Andropogon plumiger</i> Ekman Hierba. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC).
Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees Sin.: <i>Andropogon condensatus</i> Kunth, <i>Andropogon condensatus</i> Kunth subsp. <i>corymbosus</i> Hack., <i>Andropogon condensatus</i> Kunth var. <i>genuinus</i> Hack., nom. inval., <i>Andropogon Ihotskyi</i> Steud., <i>Cymbopogon condensatus</i> (Kunth) Spreng., <i>Schizachyrium mucronatum</i> Roseng., B.R. Arrill. & Izag., <i>Sorghum condensatum</i> (Kunth) Kuntze Hierba. Nativa. 0-1500 m. Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, GUA, PAI, PHA). URY(MAL, RIV, TAC).	Schizachyrium lactiflorum (Hack.) Herter Sin.: <i>Andropogon condensatus</i> Kunth var. subvar. <i>lactiflorus</i> Hack., <i>Sorghum condensatum</i> (Kunth) Kuntze var. <i>lactiflorum</i> (Hack.) Hack. ex Kuntze Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).	Schizachyrium salzmannii (Steud.) Nash var. salzmannii Sin.: <i>Rottboellia salzmannii</i> Trin. ex Steud. Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, GUA).
Schizachyrium glaziovii Peichoto Hierba. Nativa. 0-2100 m. Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CLA, RIV, ROC, SAO, TAC).	Schizachyrium microstachyum (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. Sin.: <i>Andropogon condensatus</i> Kunth var. <i>paniculatus</i> (Kunth) Hack., <i>Andropogon microstachyus</i> Desv. ex Ham., <i>Andropogon paniculatus</i> Kunth, hom. illeg., <i>Andropogon paniculatus</i> Lam. var. <i>elongatus</i> (Hack.) Hack., <i>Andropogon scoparius</i> J. Presl, hom. illeg., <i>Schizachyrium microstachyum</i> (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. subsp. <i>elongatum</i> (Hack.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., <i>Schizachyrium neoscoparium</i> Herter, <i>Schizachyrium paniculatum</i> (Kunth) Herter Hierba. Nativa. 0-1800 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).	Schizachyrium salzmannii (Trin. ex Steud.) Nash var. aristatum (Hack.) Peichoto Sin.: <i>Andropogon imberbis</i> Hack., hom. illeg., <i>Andropogon salzmannii</i> (Trin. ex Steud.) Hack. var. <i>aristatus</i> Hack., <i>Schizachyrium imberbe</i> (Hack.) A. Camus Hierba. Nativa. 0-1500 m. Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, LRI, MIS, SLU, SDE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, PAY, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Schizachyrium gracilipes (Hack.) A. Camus Sin.: <i>Andropogon gracilipes</i> Hack. Hierba. Nativa. 0-900 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA, MIE). URY(RIV, TAC).	Schizachyrium paucispiculatum Sulekic & Peichoto Hierba. Nativa. 2500-3500 m. Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).	Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston Sin.: <i>Andropogon caespitosus</i> Phil., <i>Andropogon hirtiflorus</i> (Nees) Kunth, <i>Andropogon hirtiflorus</i> (Nees) Kunth var. <i>genuinus</i> Hack., nom. inval., <i>Andropogon hirtiflorus</i> (Nees) Kunth var. <i>semiberbis</i> (Nees) Stapf, <i>Andropogon luxurians</i> Ekman, <i>Andropogon riedelii</i> Trin., <i>Andropogon riedelii</i> Trin. var. <i>genuinus</i> Hack., nom. inval., <i>Andropogon schottii</i> Rupr. ex Hack., <i>Andropogon semiberbis</i> (Nees) Kunth, <i>Andropogon semiberbis</i> (Nees) Kunth var. <i>incertus</i> Hack., B.R. Arrill. & Izag., <i>Rottboellia sanguinea</i> Retz., <i>Schizachyrium biciliatum</i> Roseng., <i>Schizachyrium hirtiflorum</i> Nees,
Schizachyrium hatschbachii Peichoto subsp. hatschbachii Hierba. Nativa. 0-2100 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).	Schizachyrium plumigerum (Ekman) Parodi	1121

Schizachyrium riedelii (Trin.) A. Camus,
Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston
 var. *hirtiflorum* (Nees) S.L. Hatch,
Schizachyrium semiberbe Nees, *Sorghum*
hirtiflorum (Nees) Kuntze, *Sorghum riedelii*
 (Trin.) Kuntze, *Sorghum semiberbe*
 (Nees) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS,
 SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
 CHL(VAL, BIO, RME). PRY(APA, APY,
 AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI).
 URY(LAV, MAL, PAY, TAC, TYT).

Schizachyrium scabriflorum (Rupr. ex
 Hack.) A. Camus

Sin.: *Andropogon scabriflorus* Rupr. ex
 Hack., *Schizachyrium condensatum*
 (Kunth) Nees var. *scabriflorum* (Rupr. ex
 Hack.) Roberty, *Sorghum scabriflorus*
 (Rupr. ex Hack.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
 PRY(AMA, CEN, MIE, PAI).

Schizachyrium spicatum (Spreng.)
 Herter

Sin.: *Andropogon condensatus* Kunth
 subsp. *elongatus* (Hack.) Hack.,
Andropogon consanguineus Kunth,
Andropogon consanguineus Kunth var.
genuinus Hack., nom. inval., *Andropogon*
consanguineus Kunth var. *humilior* Hack.,
Deyeuxia spicata Spreng., *Schizachyrium*
intermedium Nees, *Schizachyrium*
spicatum (Spreng.) Herter var.
breviarticulatum Roseng., B.R. Arrill. &
 Izag., *Sorghum condensatum* (Kunth)
 Kuntze var. *intermedium* (Nees) Kuntze,
Sorghum consanguineum (Kunth) Kuntze

Hierba. Nativa. 700-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
 ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE,
 SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO).
 PRY(APY, AMA, BOQ, GUA). URY(ART,

CLA, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY,
 RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Schizachyrium tenerum Nees var.

hirtiglume (Henrard) Peichoto

Sin.: *Andropogon tener* (Nees) Kunth var.
hirtiglumis Henrard

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL).
 BRA(SCA).

Schizachyrium tenerum Nees var.
tenerum

Sin.: *Andropogon campestris* Kunth, hom.
 illeg., *Andropogon leptophyllus* Trin., nom.
 superfl., *Andropogon neesii* Trin.,
Andropogon tener (Nees) Kunth,
Andropogon tener (Nees) Kunth var.
filiformis (Nees) Hack., *Andropogon tener*
 (Nees) Kunth var. *genuinus* Hack., nom.
 inval., *Andropogon tener* (Nees) Kunth
 var. *neesii* (Trin.) Hack., *Andropogon*
tener (Nees) Kunth var. *pilosus* Hack.,
Schizachyrium filiforme Nees,
Schizachyrium tenerum Nees var. *filiforme*
 (Nees) Roberty, *Sorghum tenerum* (Nees)
 Kuntze

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, JUJ,
 MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(CAU, CEN, GUA, PAI). URY(ART,
 CLA, LAV, PAY, RIV, TAC).

Sclerochloa P. Beauv.

Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.

Sin.: *Cynosurus durus* L., *Eleusine dura*
 (L.) Lam., *Festuca dura* (L.) Vill., *Poa dura*
 (L.) Scop.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Scleropogon Phil.

Scleropogon brevifolius Phil.

Hierba. Nativa. 1600-4100 m.

Países: ARG(CAT, MEN, SAL, SJU).

Setaria P. Beauv., nom. cons.

Setaria alonsoi Pensiero & Anton

Sin.: *Setaria onurus* (Willd. ex Trin.)
 Griseb. f. *grandiflora* Hack.

Hierba. Endémica. 500-700 m.

Países: ARG(COR, LRI).

Setaria cordobensis R.A.W. Herrm.

Sin.: *Panicum platycaule* Hack. & Stuck.,
 nom. nud., *Setaria platycaulis* Stuck. &
 Hack.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ,
 LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Setaria fiebrigii R.A.W. Herrm.

Sin.: *Setaria onurus* (Willd.) Griseb. f.
ramulosa Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, DFE,
 ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CEN,
 CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI,
 PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, DUR,
 FLO, FLA, PAY, SAO, SOR).

Setaria geminata (Forssk.) Veldkamp

Sin.: *Echinochloa geminata* (Forssk.)
 Roberty, *Panicum paludivagum* Hitchc. &
 Chase, *Paspalidium geminatum* (Forssk.)
 Stapf, *Paspalidium geminatum* (Forssk.)
 Stapf var. *paludivagum* (Hitchc. & Chase)
 Gould, *Paspalidium paludivagum* (Hitchc.
 & Chase) Henrard, comb. superfl.,
Paspalidium paludivagum (Hitchc. &
 Chase) Parodi, *Paspalidium pilgeri* Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
 ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY,
 AMA, CON, PAI, PHA). URY(MON, ROC).

Setaria globulifera (Steud.) Griseb.

Sin.: *Panicum globuliferum* Steud., *Setaria berroi* Hack., *Setaria dura* R.A.W. Herm., *Setaria paucifolia* (Morong) Lindm. var. *planifolia* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CEN, ITA, ÑEE, PHA, SPE). URY(CLA, DUR, RNO, SOR).

Setaria hassleri Hack.

Sin.: *Setaria hassleri* R.A.W. Herm., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Setaria hunzikeri Anton

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, PAI, PHA).

Setaria italica (L.) P. Beauv.

Sin.: *Chaetochloa italica* (L.) Scribn., *Chamaeraphis italica* (L.) Kuntze, *Ixophorus italicus* (L.) Nash, *Panicum italicum* L., *Pennisetum italicum* (L.) R. Br.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, FOR, LPA, MEN, MIS, SFE, SLU). BRA(RGS).

Setaria lachnea (Nees) Kunth

Sin.: *Chaetochloa argentina* (R.A.W. Herm.) Hitchc., *Panicum lachneum* Nees, *Setaria argentina* R.A.W. Herm., *Setaria leiantha* Hack., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *leianthina* Hack., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *microstachya* Hack.

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(COL).

Setaria leucopila (Scribn. & Merr.) K. Schum.

Sin.: *Chaetochloa leucopila* Scribn. & Merr., *Setaria commutata* Hack.

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU).

Setaria macrostachya Kunth

Sin.: *Chaetochloa macrostachya* (Kunth) Scribn. & Merr., *Chamaeraphis macrostachya* (Kunth) Kuntze ex Stuck., *Chamaeraphis setosa* (Sw.) Kuntze var. *macrostachya* (Kunth) Kuntze, *Panicum macrostachyum* (Kunth) Nees, *Setaria inopinata* Toolin

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, GUA, NAS, PHA).

Setaria magna Griseb.

Sin.: *Chaetochloa magna* (Griseb.) Scribn., *Chamaeraphis magna* (Griseb.) Beal

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). BRA(RGS).

Setaria megaphylla (Steud.) T. Durand & Schinz

Sin.: *Panicum megaphyllum* Steud., Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

Setaria mendocina Phil.

Sin.: *Setaria kuntzeana* R.A.W. Herm., *Setaria villiglumis* Hicken

Hierba. Endémica. 0-3100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

Setaria nicorae Pensiero

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SAL, SDE, SFE). PRY(APY, BOQ, CEN, NAS, PHA).

Setaria oblongata (Griseb.) Parodi

Sin.: *Chaetochloa oblongata* (Griseb.) Hitchc., *Panicum liloi* Hack., *Panicum oblongatum* Griseb., *Setaria leiocarpa* R.A.W. Herm., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. var. *interrupta* Stuck.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Setaria palmifolia (J. Koenig) Stapf

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR). CHL(IPA).

Setaria pampeana Parodi ex Nicora

Sin.: *Setaria caudata* (Lam.) Roem. & Schult. f. *ramosa* Hack., *Setaria hassleri* Hack. var. *aequalis* Hack.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(SAO).

Setaria paraguayensis Pensiero

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

Setaria parodii Nicora

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(CLA, FLO, FLA).

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelén var. **brachytricha** Pensiero

Sin.: *Panicum brachytrichum* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Setaria brachytricha* (Steud. ex Lechl.) Mez, comb. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen var. **parviflora**

Sin.: *Cenchrus parviflorus* Poir., *Panicum dasyurum* Willd. ex Nees, *Panicum flavum* Nees, *Panicum geniculatum* Poir., *Panicum imberbe* Poir., *Panicum imberbe* Poir. var. *dasyurum* (Willd. ex Nees) Döll, *Panicum imberbe* Poir. var. *latifolium* Döll, *Panicum penicillatum* Willd. ex Nees, hom. illeg., *Panicum tejucense* Nees, *Setaria discolor* Hack., *Setaria flava* (Nees) Kunth, *Setaria geniculata* P. Beauv., *Setaria geniculata* P. Beauv. var. *pauciseta* E. Desv., *Setaria glauca* (L.) P. Beauv. var. *imberbis* (Poir.) Griseb., *Setaria glauca* (L.) P. Beauv. var. *penicillata* (Willd. ex Nees) Griseb., *Setaria gracilis* Kunth, *Setaria gracilis* Kunth f. *breviglumis* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *breviseta* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *brevispica* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *flaviseta* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *longiseta* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *megalantha* Stuck., *Setaria gracilis* Kunth f. *purpurascens* (Kunth) Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *radicans* Hack., *Setaria gracilis* Kunth var. *glauco-caesia* Arechav., *Setaria gracilis* Kunth var. *purpurascens* (Kunth) Arechav., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *brevispica* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *flaviseta* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *longiseta* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *radicans* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *setislongioribus* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *uberius* Hack.,

nom. nud., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. var. *genuina* Hack., nom. inval., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. var. *gracilis* (Kunth) Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. var. *purpurascens* (Kunth) Hack., *Setaria penicillata* (Willd. ex Nees) J. Presl, *Setaria purpurascens* Kunth, *Setaria tejucensis* (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA). URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen var. **pilosissima** (Hack.) Pensiero

Sin.: *Setaria barretoi* Boldrini, *Setaria gracilis* Kunth var. *pilosissima* Hack.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

Setaria paucifolia (Morong) Lindm.

Sin.: *Chamaeraphis paucifolia* Morong, *Setaria glaziovii* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Setaria pflanzii Pensiero

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, PHA).

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.

Sin.: *Panicum imberbe* Poir. var. *pumilum* (Poir.) Nees, *Panicum pumilum* Poir.,

Setaria glauca (L.) P. Beauv. var. *pumila* (Poir.) Asch. & Graebn.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SFE). CHL(TAR, ATA, VAL, MAU, BIO, RME). PRY(APY, BOQ).

Setaria rosengurtii Nicora var. **rosengurtii**

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(MAL, MON).

Setaria rosengurtii Nicora var. **uruguayensis** Pensiero

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(ART, MON, RIV, SAO).

Setaria scabrifolia (Nees) Kunth

Sin.: *Panicum scabrifolium* Nees

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Setaria scandens Schrad. ex Schult.

Sin.: *Chaetochloa scandens* (Schrad.) Scribn., *Panicum scandens* (Schrad.) Trin., *Panicum scandens* (Schrad.) Trin. var. *grandiflorum* Döll, *Panicum scandens* (Schrad.) Trin. var. *longiseta* Döll, *Panicum scandens* (Schrad.) Trin. var. *vulgare* Döll, *Setaria scandens* Schrad. ex Schult. var. *sphacelata* Hack., *Setaria trinii* Kunth

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, GUA).

Setaria setosa (Sw.) P. Beauv.

Sin.: *Panicum setosum* Sw., *Setaria caudata* (Lam.) Roem. & Schult., *Setaria rariflora* J.C. Mikan ex Trin., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *typica* Stuchlik, nom. inval., *Setaria setosa* (Sw.) P.

Beauv. var. *aestiva* Hack. ex Bertoni, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb. var. **anceps** (Stapf) Veldkamp

Hierba. Introducida.

Países: PRY(APA, AMA, ITA).

Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb. var. **sericea** (Stapf) Clayton

Sin.: *Setaria anceps* Stapf var. *sericea* Stapf

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, ITA). URY(FLA, SOR).

Setaria stolonifera Boldrini

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SFE). BRA(RGS).

Setaria sulcata Raddi

Sin.: *Agrostis flabellata* Salzm. ex Steud., nom. nud., *Chaetochloa poiretiana* (Schult.) Hitchc., *Panicum elongatum* Poir., hom. illeg., *Panicum poiretianum* Schult., *Setaria poiretiana* (Schult.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Setaria tenax (A. Rich.) Desv.

Sin.: *Panicum tenax* A. Rich., *Setaria sphaerocarpa* (Salzm.) C.E. Hubb.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CEN, CON, COA, PAI).

Setaria vaginata Spreng. var. **bonariensis** Nicora

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(MAL).

Setaria vaginata Spreng. var. **tandilensis** Nicora

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(BAI).

Setaria vaginata Spreng. var. **vaginata**

Sin.: *Panicum onurus* Willd. ex Trin., *Panicum utriculatum* Steud., *Setaria caespitosa* Hack. & Arechav., *Setaria onurus* (Willd. ex Trin.) Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PAI). URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SOR).

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

Sin.: *Chaetochloa verticillata* (L.) Scribn., *Chamaeraphis verticillata* (L.) Porter, *Ixophorus verticillatum* (L.) Nash, *Panicum adhaerans* Forssk., *Panicum verticillatum* L., *Panicum verticillatum* L. var. *parviflorum* Döll, *Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov., *Setaria depauperata* Phil., *Setaria leiantha* Hack. f. *subhirsuta* Hack., *Setaria pratensis* Phil.

Hierba. Introducida. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, RME). PRY(CEN). URY(MON, PAY).

Setaria verticilliformis Dumort.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN).

Setaria viridis (L.) P. Beauv.

Sin.: *Chaetochloa viridis* (L.) Scribn., *Chamaeraphis viridis* (L.) Millsp., *Ixophorus viridis* (L.) Nash, *Panicum viride* L., *Pennisetum viride* (L.) R. Br., *Setaria*

italica (L.) P. Beauv. subsp. *viridis* (L.) Thell.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SFE). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, VAL, BIO, RME, JFE). URY(SOR).

Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. var. **reversipila** (R.A.W. Herrm.) Pensiero

Sin.: *Setaria reversipila* R.A.W. Herrm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. var. **vulpiseta**

Sin.: *Chaetochloa vulpiseta* (Lam.) Hitchc. & Chase, *Chamaeraphis composita* (Kunth) Kuntze, *Chamaeraphis setosa* (Sw.) Kuntze var. *vulpiseta* (Lam.) Kuntze, *Panicum macrourum* Trin., *Panicum vulpisetum* Lam., *Setaria lancifolia* R.A.W. Herrm., *Setaria liebmanii* E. Fourn. f. *trichorhachis* Hack., *Setaria polystachya* Schrad. ex Schult.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Sorghastrum D. L. Nash

Sorghastrum balansae (Hack.) Dávila

Sin.: *Andropogon balansae* (Hack.) Hack., *Sorghum balansae* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, MIE).

Sorghastrum contractum (Hack.) Kuhl. & A. Kuhn

Sin.: *Sorghum nutans* subsp. *contractum* Hack.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Sorghastrum minarum (Nees) Hitchc.

Sin.: *Andropogon minarum* (Nees) Kunth, *Chrysopogon minarum* (Nees) Benth., *Chrysopogon stipoides* Trin., nom. superfl., *Sorghum minarum* (Nees) Hack., *Trachypogon minarum* Nees

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA).

Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi

Sin.: *Andropogon nutans* L. var. *albescens* (Hack.) Hack., *Andropogon nutans* L. var. *pellitus* (Hack.) Hack., *Andropogon pellitus* (Hack.) Herter, *Andropogon saccharoides* Sw. var. *polytrichus* Griseb., *Sorghastrum albescens* (Hack.) A.I.P. Flores, *Sorghastrum flexuosum* Swallen, *Sorghastrum nutans* (L.) Nash subsp. *albescens* (Hack.) Burkart, *Sorghastrum nutans* (L.) Nash subsp. *pellitum* (Hack.) Burkart, *Sorghastrum pilgeri* Herter, *Sorghum nutans* (L.) A. Gray subsp. *albescens* Hack., *Sorghum nutans* (L.) A. Gray subsp. *pellitum* Hack.

Hierba. Nativa. 1600-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(ART, FLA, MAL, ROC, SOR).

Sorghastrum scaberrimum (Nees) Herter

Sin.: *Andropogon nutans* L. var. *scaberrimus* (Nees) Hack., *Andropogon scaberrimus* (Nees) Kunth, *Sorghum nutans* (L.) A. Gray subsp. *scaberrimum* (Nees) Hack., *Trachypogon scaberrimum* Nees

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sorghastrum setosum (Griseb.) Hitchc.

Sin.: *Andropogon agrostoides* Speg., *Andropogon francavillanus* E. Fourn., *Andropogon nutans* L. var. *agrostoides* (Speg.) Hack., *Andropogon nutans* L. var. *submuticus* (Hack.) Hack., *Andropogon setosus* Griseb., *Sorghastrum agrostoides* (Speg.) Hitchc., *Sorghastrum francavillanum* (E. Fourn.) Hitchc., *Sorghastrum parviflorum* (Desv.) Hitchc. & Chase, *Sorghastrum stipoides* (Kunth) Nash subsp. *agrostoides* (Speg.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Sorghum nutans* (L.) A. Gray var. *submuticum* Hack., *Sorghum parviflorum* Desv. ex Ham., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, GUA). URY(RIV, TAC).

Sorghastrum stipoides (Kunth) Nash

Sin.: *Andropogon humboldtianum* Steud., nom. superfl., *Andropogon nutans* L. var. *burchellii* Hack., *Andropogon nutans* L. var. *stipoides* (Kunth) Hack., *Andropogon rufidulus* Steud., *Andropogon stipoides* Kunth, *Sorghum nutans* (L.) A. Gray var. *stipoides* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(DUR, TAC).

Sorghastrum viride Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, GUA, MIE, SPE). URY(RIV).

Sorghum Moench

Sorghum alnum Parodi

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COR). PRY(AMA).

Sorghum bicolor (L.) Moench

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).

Sorghum halepense (L.) Pers. var. **halepense**

Sin.: *Andropogon halepensis* (L.) Brot., *Andropogon sorghum* (L.) Brot. var. *halepensis* (L.) Hack., *Holcus halepensis* L., *Sorghum halepense* (L.) Pers. var. *genuinum* Hack., nom. inval.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, MAG, RME, IPA). PRY(CEN). URY(MON).

Sorghum halepense (L.) Pers. var. **muticum** (Hack.) Hayek

Sin.: *Sorghum halepense* (L.) Pers. f. *muticum* (Hack.) C.E. Hubb., *Sorghum halepense* (L.) Pers. var. *muticum* (Hack.) Parodi, comb. superfl.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, LPA, MIS, NEU, SJU).

Sporobolus R. Br.

Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth var. **aeneus**

Sin.: *Sporobolus acuminatus* (Trin.) Hack., *Sporobolus acuminatus* (Trin.) Hack. var. *longispiculis* Boechat & Longhi-Wagner, *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth f. *parviflora* Parodi, *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth var. *barbicollis* Hack., *Sporobolus eximius* (Nees ex Trin.) Ekman var. *latifolius* Boechat & Longhi-Wagner, *Sporobolus sprengelii* Kunth, *Vilfa acuminata* Trin., *Vilfa aenea* Trin., *Vilfa aenea* Trin. var. *angustifolia* Döll,

Vilfa aenea Trin. var. *latifolia* Döll, *Vilfa elatior* Nees

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, COA, SPE).

Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth var. **angustifolia** (Döll) S.S. Denham & Aliscioni

Sin.: *Sporobolus adustus* (Trin.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth f. *parviflora* Parodi, *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth var. *subbulbosum* (Arechav.) Parodi, *Sporobolus camporum* Swallen, *Sporobolus subbulbosum* Arechav., *Vilfa adusta* Trin., *Vilfa aenea* Trin. var. *angustifolia* Döll

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PAI). URY(DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, SJO, TAC).

Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth var. **eximius** (Nees ex Trin.) S.S. Denham & Aliscioni

Sin.: *Sporobolus eximius* (Nees ex Trin.) Ekman, *Sporobolus nudiramus* Boechat & Longhi-Wagner, *Vilfa eximia* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

Sporobolus alterniflorus (Loisel.) P.M. Peterson & Saarela

Sin.: *Dactylis fasciculata* Lam., *Spartina alterniflora* Loisel., *Spartina brasiliensis* Raddi, *Spartina dissitiflora* Steud., *Spartina fasciculata* (Lam.) P. Beauv., *Spartina maritima* (Curtis) Fernald var. *alterniflora* (Loisel.) St.-Yves, *Spartina maritima* (Curtis) Fernald var. *brasiliensis* (Raddi) St.-Yves, *Trachynotia alterniflora* (Loisel.) DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Sporobolus ciliatus J. Presl

Sin.: *Sporobolus rupestris* Kunth, *Vilfa ciliata* (J. Presl) Trin., comb. illeg., *Vilfa ciliata* (J. Presl) Trin. var. *grandiflora* Döll, *Vilfa ciliata* (J. Presl) Trin. var. *parviflora* Döll

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Sporobolus coarctatus (Trin.) P.M. Peterson & Saarela

Sin.: *Solenachne ciliata* (Brongn.) Herter, *Solenachne phalaroides* Steud., *Spartina ciliata* Brongn., *Spartina ciliata* Kunth, nom. nud., *Spartina coarctata* Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

Sporobolus cryptandrus (Torr.) A. Gray

Sin.: *Agrostis cryptandra* Torr., *Sporobolus cryptandrus* (Torr.) A. Gray var. *typicus* (Torr.) E.K. Jones & Fassett, nom. inval., *Sporobolus subinclusus* Phil., *Sporobolus subinclusus* Phil. f. *panicula* expansa Stuck., nom. inval., *Sporobolus subinclusus* Phil. var. *expansus* Parodi, *Vilfa cryptandra* (Torr.) Torr. ex Trin.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SFE).

Sporobolus cubensis Hitchc.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Sporobolus densiflorus (Brongn.) P.M. Peterson & Saarela

Sin.: *Chauvinia chilensis* Steud., *Spartina densiflora* Brongn., *Spartina juncea* Willd. var. *laxiflora* St.-Yves, *Spartina juncea* Willd. var. *montevidensis* (Arechav.) St.-Yves, *Spartina montevidensis* Arechav.,

Spartina patagonica Speg., *Sporobolus montevidensis* (Arechav.) P.M. Peterson & Saarela

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, LPA, RNE, SLU, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA). URY(MON).

Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. **andinus** Renvoize

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. **indicus**

Sin.: *Agrostis indica* L., *Axonopus poiretii* Roem. & Schult., *Sporobolus berterioanus* (Trin.) Hitchc. & Chase, *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. var. *exilis* (Trin.) T. Koyama, *Sporobolus minor* Trin. ex Kunth, *Sporobolus poiretii* (Roem. & Schult.) Hitchc., *Vilfa berterioana* Trin., *Vilfa exilis* Trin., *Vilfa indica* (L.) Trin. ex Steud., *Vilfa rupestris* Trin.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, IPA). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, COL, MAL, MON, RNO, ROC).

Sporobolus linearifolius Nicora

Sin.: *Sporobolus exilis* Renvoize, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 800-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sporobolus × longispicus (Hauman & Parodi ex St.-Yves) P.M. Peterson & Saarela

Sin.: *Spartina longispica* Hauman & Parodi ex St.-Yves

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA). URY(CAS, MAL).

Sporobolus maximus Hauman

Hierba. Endémica. 1800-2500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Sporobolus mendocinus E. Méndez

Hierba. Endémica. 1300-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Sporobolus metallicolus Longhi-Wagner & Boechat

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Sporobolus monandrus Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART).

Sporobolus multinodis Hack.

Sin.: *Sporobolus multinodis* Hack. var. *exasperatum* Hack.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(RGS). URY(RIV).

Sporobolus phleoides Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Sporobolus platensis Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(FLA, SAO).

Sporobolus pseudairoides Parodi

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY.

Sporobolus pyramidalis P. Beauv.

Sin.: *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. var. *pyramidalis* (P. Beauv.) Veldkamp, *Vilfa jacquemontii* (Kunth) Trin.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc.

Sin.: *Agrostis pyramidata* Lam., *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth, *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth f. *purpurascens* Hack., *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth var. *tuberculatus* (Hack.) Hack., *Sporobolus tuberculatus* Hack., *Vilfa arguta* Nees

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY). URY(CAS, MON).

Sporobolus rigens (Trin.) E. Desv. var. **atacamensis** (Parodi) Asteg.

Sin.: *Sporobolus rigens* (Trin.) E. Desv. f. *atacamensis* Parodi

Hierba. Endémica. 3500-3800 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Sporobolus rigens (Trin.) E. Desv. var. **expansa** E. Méndez

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

Sporobolus rigens (Trin.) E. Desv. var. **rigens**

Sin.: *Diachyrium arundinaceum* Griseb., *Diachyrium rigens* (Trin.) Mez, *Epicampes arundinacea* (Griseb.) Hack., *Epicampes rigens* (Trin.) Phil., hom. illeg., *Sporobolus arundinaceus* (Griseb.) Kuntze, *Vilfa rigens* Trin.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).

Sporobolus spartinus (Trin.) P.M. Peterson & Saarela

Sin.: *Spartina argentinensis* Parodi, *Spartina densiflora* Brongn. var. *obtusata* Hack., *Spartina spartinae* (Trin.) Merr. ex Hitchc., *Spartina spartinae* (Trin.) Merr., nom. inval., *Vilfa spartinae* Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, SFE). PRY(APY, BOQ).

Sporobolus virginicus (L.) Kunth

Sin.: *Agrostis littoralis* Lam., *Agrostis virginica* L., *Vilfa luxurians* Steud. ex Lechl., *Vilfa virginica* (L.) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR).

Stapfochloa H. Scholz

Stapfochloa berroi (Arechav.) P.M. Peterson

Sin.: *Chloris accumbens* Hack. ex Arechav., nom. nud., *Chloris berroi* Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, SFE). URY(MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Stapfochloa canterae (Arechav.) P.M. Peterson

Sin.: *Chloris canterae* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS,

CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Stapfochloa ciliata (Sw.) P.M. Peterson
Sin.: *Chloris brachyathera* (Hack. ex Parodi) Herter, *Chloris ciliata* Sw., *Chloris ciliata* Sw. f. *brevisetata* Hack., *Chloris ciliata* Sw. f. *reptans* A.M. Molina & Rúgolo, *Chloris ciliata* Sw. var. *brachyathera* Hack. ex Parodi, *Chloris ciliata* Sw. var. *brachyathera* Hack. in Kurtz, nom. nud., *Chloris ciliata* Sw. var. *texana* Vasey

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).

Stapfochloa elata (Desv.) P.M. Peterson
Sin.: *Andropogon barbatus* L., *Andropogon polydactylon* L., nom. illeg., *Chloris barbata* (L.) Nash, hom. illeg., *Chloris dandyana* C.D. Adams, *Chloris elata* Desv., *Chloris polydactyla* (L.) Sw., *Chloris polydactyla* (L.) Sw. f. *pauciradiata* Kurtz

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, FLA, RNO, SAO).

Stapfochloa grandiflora (Roseng. & Izag.) Wipff & Shaw
Sin.: *Chloris canterae* Arechav. var. *grandiflora* (Roseng. & Izag.) Anderson, *Chloris grandiflora* Roseng. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(ART,

CLA, COL, FLO, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Stapfochloa parodiana (Roseng. & Izag.) Wipff & Shaw

Sin.: *Chloris boliviensis* Renvoize, *Chloris parodiana* Roseng. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(CEN, CON, PAI).

Stapfochloa parvispicula (Caro & E.A. Sánchez) P.M. Peterson

Sin.: *Chloris parvispicula* Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SDE, TUC). PRY(APY).

Steinchisma Raf.

Steinchisma decipiens (Nees ex Trin.) W.V. Br.

Sin.: *Panicum decipiens* Nees ex Trin., *Panicum decipiens* Nees ex Trin. var. *parviflorum* Döll, *Panicum decipiens* Nees, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(LAV, MAL, ROC, TAC).

Steinchisma hians (Elliott) Nash

Sin.: *Panicum hians* Elliott, *Panicum megapoticum* Spreng., *Panicum milioides* Nees ex Trin., *Panicum milioides* Nees ex Trin. var. *filifolium* R.A. Palacios

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

URY(ART, CLA, DUR, FLA, MAL, SJO, SOR, TAC).

Steinchisma laxa (Sw.) Zuloaga

Sin.: *Panicum laxum* Sw., *Panicum laxum* Sw. f. *minor* Hack., nom. nud., *Panicum laxum* Sw. var. *pubescens* Döll, *Panicum laxum* Sw. var. *vestitum* L.B. Sm. & Wassh.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(SJO).

Steinchisma spathellosum (Döll) Renvoize

Sin.: *Panicum schenckii* Hack., *Panicum spathellosum* Döll, *Panicum turfosum* Mez

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, PAI).

Stenotaphrum Trin.

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze

Sin.: *Ischaemum secundatum* Walter, *Stenotaphrum americanum* Schrank, *Stenotaphrum dimidiatum* (L.) Brongn. var. *americanum* (Schrank) Hack., *Stenotaphrum glabrum* Trin.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, BIO, LSR, LLA). PRY(CEN). URY(ROC).

Stephostachys Zuloaga & Morrone

Stephostachys mertensii (Roth) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum megiston* Schult., *Panicum megiston* Schult. f. *pauciflora* Hack., *Panicum mertensii* Roth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Streptochaeta Schrad.**Streptochaeta spicata** Schrad. ex Nees

Sin.: *Lepideilema lanciflorum* Trin.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, GUA).

Taeniatherum Nevski**Taeniatherum caput-medusae** (L.) Nevski

Sin.: *Elymus caput-medusae* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

Taquara I.L.C. Oliveira & R.P. Oliveira**Taquara micrantha** (Kunth) I.L.C. Oliveira & R.P. Oliveira

Sin.: *Olyra micrantha* Kunth, *Olyra micrantha* Kunth var. *decalvata* Döll, *Olyra micrantha* Kunth var. *dioecia* Döll, *Olyra micrantha* Kunth var. *lanceolata* Döll, *Olyra micrantha* Kunth var. *subvelutina* Döll, *Olyra urvillei* Steud., *Olyra ventricosa* Nees, *Parodiolyra micrantha* (Kunth) Davidse & Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, PAI).

Themeda Forssk.**Themeda quadrivalvis** (L.) Kuntze

Sin.: *Andropogon nutans* L., hom. illeg., *Andropogon quadrivalvis* L., *Anthistiria ciliata* L. f., nom. nud.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SFE). BRA(RGS). PRY(SPE).

Thinopyrum A. Löve**Thinopyrum ponticum** (Podp.)

Barkworth & D.R.Dewey

Sin.: *Agropyron elongatum* (Host) P. Beauv., *Elymus ponticus* (Podp.) N. Snow, *Elytrigia elongata* (Host) Nevski, *Elytrigia pontica* (Podp.) Holub, *Lophopyrum elongatum* (Host) A. Löve, *Lophopyrum ponticum* (Podp.) A. Löve, *Thinopyrum elongatum* (Host) D.R.Dewey, *Thinopyrum ponticum* (Podp.) Z.W. Liu & R.R.-C. Wang, nom. superfl., *Triticum elongatum* Host, *Triticum ponticum* Podp.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, LPA, NEU, SLU, TDF).

Trachypogon Nees**Trachypogon macroglossus** Trin.

Sin.: *Trachypogon filifolius* (Hack.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze

Sin.: *Andropogon montufarii* Kunth, *Stipa spicata* L. f., *Trachypogon canescens* Nees, *Trachypogon densus* Swallen, *Trachypogon mollis* Nees, *Trachypogon montufarii* (Kunth) Nees var. *mollis* (Nees) Burkart, comb. superfl., *Trachypogon montufarii* (Kunth) Nees, *Trachypogon*

montufarii (Kunth) Nees var. *mollis* (Nees) Andersson, *Trachypogon plumosus* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Nees, *Trachypogon polymorphus* Hack. var. *montufarii* (Kunth) Hack., *Trachypogon rigidifolius* Swallen

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA). URY(MAL).

Tragus Haller**Tragus andicola** Zapater & Sulekic

Hierba. Endémica. 1900-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Tragus australianus Blake

Hierba. Introducida. 0-1100 m.

Países: ARG(FOR, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU). PRY(APY).

Tragus berteronianus Schult.

Sin.: *Lappago aliena* Spreng.

Hierba. Introducida. 200-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Tragus racemosus (L.) All.

Sin.: *Cenchrus racemosus* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Trichanthecium Zuloaga & Morrone**Trichanthecium caaguazuense**

(Henrard) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum caaguazuense* Henrard

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CAU).

Trichanthecium cyanescens (Nees ex Trin.) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum cyanescens* Nees ex Trin., *Panicum vinnulum* Swallen

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Trichanthecium parvifolium (Lam.) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum parvifolium* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Trichanthecium pseudisachne (Mez) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum pseudisachne* Mez

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Trichanthecium schwackeanum (Mez) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum helobium* Mez ex Henrard, *Panicum schwackeanum* Mez

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, MON).

Trichanthecium wettsteinii (Hack.) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum wettsteinii* Hack.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Trichoneura Andersson

Trichoneura weberbaueri Pilg.

Hierba. Nativa. 2900-3200 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Tridens Roem. & Schult.

Tridens brasiliensis (Nees ex Steud.) Parodi

Sin.: *Triodia brasiliensis* (Nees ex Steud.) Lindm., *Triodia figueirae* Arechav., *Uralepis brasiliensis* Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(FLA, SAO, TAC).

Tridens hackelii (Arechav.) Parodi

Sin.: *Triodia hackelii* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(ART).

Notas: Citada para Paraguay (Peterson et al., 2001) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Tridens nicorae Anton

Sin.: *Antonella nicorae* (Anton) Caro

Hierba. Endémica.

Países: ARG(COR, SLU).

Tridens riograndensis Acedo & Llamas

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Tripogon Roem. & Schult.

Tripogon ekmanii Nicora & Rúgolo

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA). URY(TYT).

Tripogon nicorae Rúgolo & A.S.Vega

Hierba. Nativa. 2900-3600 m.

Países: ARG(CAT, LRI). CHL(TAR).

Tripogonella P.M. Peterson & Romasch.

Tripogonella spicata (Nees) P.M. Peterson & Romasch.

Sin.: *Bromus spicatus* Nees, *Diplachne spicata* (Nees) Döll, *Sieglingia spicata* (Nees) Kuntze ex Stuck., *Triplasis setacea* Griseb., *Tripogon spicatus* (Nees) Ekman

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, ITA, PAI, SPE). URY(ART, FLO, LAV, MAL, MON, RNO, SAO, SJO, TAC).

Tripsacum L.

Tripsacum australe H.C. Cutler & E.S. Anderson

Hierba. Nativa. 200 m.

Países: PRY(AMA).

Trisetum Pers., nom. cons.

Trisetum caudulatum Trin.

Sin.: *Koeleria caudulata* (Trin.) Griseb., *Koeleria grisebachii* Domin, nom. superfl., *Koeleria lechleri* Steud., *Trisetum caudulatum* Trin. var. *correae* Nicora, *Trisetum chiloense* Phil., *Trisetum chromostachyum* Desv., *Trisetum heterogamum* Steud., *Trisetum heteronymum* Steud., *Trisetum lechleri* (Steud.) Nicora, *Trisetum malacophyllum* Steud., *Trisetum monticola* Phil., *Trisetum ochrostachyum* Phil., *Trisetum splendidulum* Steud., *Trisetum variabile* E. Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *chiloense* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum variabile* E. Desv. var. *flavescens* E.

Desv., *Trisetum variable* E. Desv. var. *vidali* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum variable* E. Desv. var. *virescens* E. Desv., *Trisetum vidali* Phil.

Hierba. Endémica. 1100-3500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Sin.: *Avena flavescens* L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAG).

Trisetum longiglume Hack. var.
glabratum Nicora

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU).

Tristachya Nees

Tristachya leiostachya Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Urochloa P. Beauv.

Urochloa adspersa (Trin.) R.D. Webster
Sin.: *Brachiaria adspersa* (Trin.) Parodi,
Brachiaria echinulata (Mez) Parodi,
Panicum adpersum Trin., *Panicum*
adpersum Trin. var. *exile* Lindm.,
Panicum adpersum Trin. var. *neesii*
Lindm., *Panicum echinulatum* Mez,
Panicum echinulatum Mez var. *boliviense*
Henrard

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR).
PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, COA,
MIE, PAI, PHA).

Urochloa arrecta (Hack. ex T. Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga

Sin.: *Brachiaria arrecta* (Hack. ex T. Durand & Schinz) Stent, *Panicum arrectum* Hack. ex T. Durand & Schinz

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(RGS, SCA).

Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.)

R.D. Webster

Sin.: *Brachiaria brizantha* (Hochst. ex A. Rich.) Stapf, *Panicum brizanthum* Hochst. ex A. Rich.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,
AMA, BOQ).

Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster

Sin.: *Brachiaria decumbens* Stapf

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, SPE).

Urochloa dictyoneura (Fig. & De Not.)

Veldkamp

Sin.: *Brachiaria dictyoneura* (Fig. & De Not.) Stapf

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(SCA). PRY(AMA).

Urochloa fusca (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin

Sin.: *Brachiaria fasciculata* (Sw.) Parodi,
Brachiaria fasciculata (Sw.) S.T. Blake,
comb. superfl., *Panicum fasciculatum* Sw.,
Panicum fuscum Sw., *Urochloa*
fasciculata (Sw.) R.D. Webster

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

Urochloa humidicola (Rendle) Morrone & Zuloaga

Sin.: *Brachiaria humidicola* (Rendle) Schweick., *Panicum humidicolum* Rendle

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Urochloa lorentziana (Mez) Morrone & Zuloaga

Sin.: *Brachiaria lorentziana* (Mez) Parodi,
Panicum lorentzianum Mez, *Panicum*
velutinosum Nees f. *violascens* Stuck.,
Panicum velutinosum Nees f. *viride* Stuck.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy

Sin.: *Panicum mosambicense* Hack.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SDE).

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen

Sin.: *Brachiaria mutica* (Forssk.) Stapf,
Brachiaria purpurascens (Raddi) Henrard,
Panicum barbinode Trin., *Panicum*
equinum Salzm. ex Steud., *Panicum*
muticum Forssk., *Panicum paraguayense*
Steud. ex Döll, nom. inval., *Panicum*
purpurascens Raddi

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA).

Urochloa panicoides P. Beauv.

Hierba. Introducida. 300-700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, SAL, SFE, SDE, TUC).

Urochloa plantaginea (Link) R.D. Webster

Sin.: *Brachiaria plantaginea* (Link) Hitchc.,
Panicum plantagineum Link

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, SPE). URY(ART, RNO, RIV).

Urochloa platyphylla (Munro ex C. Wright) R.D. Webster

Sin.: *Brachiaria extensa* Chase, *Brachiaria platyphylla* (Munro ex C. Wright) Nash, *Panicum platyphyllum* Munro ex C. Wright, *Paspalum platyphyllum* Griseb., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN, ÑEE, PAI). URY(ART).

Urochloa paucispicata (Morong) Morrone & Zuloaga

Sin.: *Acroceras paucispicata* (Morong) Henrard, *Brachiaria paucispicata* (Morong) Clayton, *Panicum paucispicatum* Morong

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, PHA).

Urochloa ruziizensis (R. Germ. & Evrard) Crins

Sin.: *Brachiaria ruziizensis* R. Germ. & Evrard, *Urochloa ruziizensis* (R. Germ. & Evrard) Morrone & Zuloaga, comb. superfl.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vahlodea Fr.

Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fr. ex Hartmann

Sin.: *Aira atropurpurea* Wahlenb., *Aira atropurpurea* Wahlenb. var. *magellanica* (Hook. f.) Skottsbo., *Aira magellanica* Hook. f., *Avena atropurpurea* (Wahlenb.) Link, *Deschampsia atropurpurea* (Wahlenb.) Scheele, *Deschampsia brachyphylla* Phil., *Holcus atropurpureus* (Wahlenb.) Wahlenb., *Vahlodea atropurpurea* (Wahlenb.) Fr. ex Hartmann subsp. *magellanica* (Hook. f.) Hyl.

Hierba. Nativa. 400-2300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG, RME).

Vianaea C.D. Tyrrell, L.G. Clark, Santos-Gonç. & Afonso

Vianaea effusa (Hack.) C.D. Tyrrell, L.G. Clark, Santos-Gonç. & Afonso

Sin.: *Arthrostylidium effusum* (Hack.) McClure, *Arundinaria effusa* Hack., *Aulonemia effusa* (Hack.) McClure

Hierba subleñosa. Nativa. 1300 m.

Países: BRA(PAR).

Willkommia Hack.

Willkommia texana Hitchc.

Sin.: *Craspedorhachis texana* (Hitchc.) Pilg. var. *stolonifera* (Parodi) Pilg., *Willbleibia stolonifera* (Parodi) Herter, *Willkommia texana* Hitchc. var. *stolonifera* Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(RNO, RIV).

Zizaniopsis Döll & Asch.

Zizaniopsis bonariensis (Balansa & Poitr.) Speg.

Sin.: *Zizania bonariensis* Balansa & Poitr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MON, ROC, SJO).

Zizaniopsis longhi-wagnerae E.

Dalmolim, A. Zanin & R. Trevis.

Hierba. Endémica. 1000-1200 m.

Países: BRA(SCA).

Zizaniopsis microstachya (Nees ex Trin.) Döll & Asch.

Sin.: *Zizania microstachya* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zizaniopsis villanensis Quarín

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, SFE).

PODOSTEMACEAE

Apinagia Tul.

Apinagia guairaensis Fiebrig

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Apinagia richardiana (Tul.) Royen

Sin.: *Ligea richardiana* Poit. ex Tul.

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Apinagia riedelii (Bong.) Tul.

Sin.: *Apinagia fucoide* (Mart. & Zucc.) Tul., *Apinagia yguazuensis* Chodat & Vischer, *Lacis fucoide* Mart. & Zucc., *Lacis riedelii* Bong., *Neolacis riedelii* (Bong.) Wedd.

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Blandowia Willd.

Países: BRA(SCA).

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON).
URY(SAO, SOR).**Blandowia striata** Willd.Sin.: *Apinagia striata* Griseb., *Apinagia willdenowii* (Tul.) Tul., *Dicraea willdenowii* Tul.Hierba acuática. Endémica.
Países: CHL.**Castelnavia** Tul. & Wedd.**Castelnavia princeps** Tul. & Wedd.
emend. Warm.Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).**Heterotristicha** Tobler**Heterotristicha schroederi** ToblerHierba acuática. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(RNO).**Marathrum** Bonpl.**Marathrum azarensis** TurHierba acuática. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).
PRY(ITA).**Mourera** Aubl.**Mourera aspera** (Bong.) Tul.Sin.: *Lacis aspera* Bong., *Mourera penicillata* HickenHierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
Notas: Es probable que *M. aspera* se halle presente en Paraguay.**Mourera weddelliana** Tul.

Hierba acuática. Nativa.

Podostemum Michx.**Podostemum comatum** HickenSin.: *Podostemum dimorphum* P. Royen,
Podostemum undulatum P. Royen,
Podostemum undulatum P. Royen var.
angustifolium P. Royen

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON,
GUA). URY(RNO, SAO).**Podostemum distichum** (Cham.) Wedd.Sin.: *Lacis disticha* Cham., *Podostemum aguirensense* Chodat & Vischer,
Podostemum atrichum Chodat & Vischer,
Podostemum chamissonis Trin., nom.
superfl., *Podostemum glaziovianum*
Warm., *Podostemum schenckii* Warm.,
Podostemum warmingii Chodat & Vischer

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CON,
COA, PAI). URY(RNO, SAO, SOR).**Podostemum irgangii** C.T. Philbrick & Novelo

Hierba acuática. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Podostemum muelleri Warm.Sin.: *Podostemum dentatum* P. Royen,
Podostemum galvone Warm.,
Podostemum uruguayense Warm.

Hierba acuática. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(SAO).**Podostemum rutifolium** Warm.Sin.: *Podostemum ostenianum* Warm.
Hierba acuática. Nativa. 0-900 m.**Podostemum scaturiginum** (Mart.) C.T. Philbrick & NoveloSin.: *Crenias scaturiginum* (Mart.) C.D.K.
Cook & Rutish., *Crenias scopulorum*
Spreng., nom. illeg., *Mniopsis*
scaturiginum Mart.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Podostemum weddellianum (Tul.) C.T. Philbrick & NoveloSin.: *Crenias weddelliana* (Tul.) C.D.K.
Cook & Rutish., *Mniopsis weddelliana* Tul.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Tristicha Thouars, nom. cons.**Tristicha trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng.Sin.: *Dufourea hypnoides* A. St.-Hil.,
Dufourea trifaria Bory ex Willd., *Tristicha*
hypnoides (A. St.-Hil.) Spreng.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
CON, ITA). URY(RNO, SAO).**Wettsteiniola** Suess.**Wettsteiniola apipensis** Tur

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Notas: Es probable su presencia en el
Paraguay (Tur, 1999).**Wettsteiniola pinnata** Suess.

Hierba acuática. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(PAR).

Notas: Es probable su presencia en el Paraguay (Tur, 1999).

POLEMONIACEAE

Cobaea Cav.

Cobaea scandens Cav.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Collomia Nutt.

Collomia biflora (Ruiz & Pav.) Brand

Sin.: *Collomia biflora* (Ruiz & Pav.) Brand
var. *lateritia* (Don) Brand, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn., *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *coccinea* (Lehm. ex Lindl.) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *lateritia* (Don) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *soehrensi* (Phil.) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *stenosiphon* (Kunze) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *unidentata* (Bertero ex Colla) Wherry, *Collomia coccinea* Lehm. ex Lindl., *Collomia lateritia* Don, *Collomia linearis* Nutt. f. *lateritia* (Don) Wherry, *Collomia linearis* Nutt. f. *stenosiphon* (Kunze) Wherry, *Collomia soehrensi* Phil., *Collomia stenosiphon* Kunze, *Gilia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Phlox biflora* Ruiz & Pav., *Phlox unidentata* Bertero ex Colla, *Polemonium biflorum* (Ruiz & Pav.) Kuntze

Hierba. Nativa. 200-1300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Collomia grandiflora Douglas ex Lindl.

Sin.: *Gilia grandiflora* (Douglas ex Lindl.) A. Gray, *Navarretia grandiflora* (Douglas ex Lindl.) Kuntze

Hierba. Introducida. 800.

Países: ARG(RNE).

Dayia J.M. Porter

Dayia glutinosa (Phil.) J.M. Porter

Sin.: *Bryantiella glutinosa* (Phil.) J.M. Porter, *Gilia glabrata* Phil., *Gilia glutinosa* Phil., *Gilia ramosissima* Phil., *Gilia ramosissima* Phil. var. *glabrata* Reiche

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Gilia Ruiz & Pav.

Gilia castellanosii (J.M. Porter) V.E. Grant

Grant

Sin.: *Giliastrum castellanosii* J.M. Porter

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(CAT).

Gilia crassifolia Benth.

Sin.: *Gilia andicola* Phil., *Gilia crassifolia* Benth. var. *andicola* (Phil.) Brand, *Gilia intermedia* Phil., *Gilia lanigera* Phil., *Gilia patagonica* Speg., *Navarretia crassifolia* (Benth.) Kuntze, *Polemonium crassifolium* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Gilia foetida Gillies ex Benth.

Sin.: *Giliastrum foetidum* (Gillies ex Benth.) J.M. Porter

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, MEN, SAL, SJU).

Gilia laciniata Ruiz & Pav.

Sin.: *Gilia alpina* (Wedd.) Brand, *Gilia erecta* Hieron., *Gilia laciniata* Ruiz & Pav. var. *alpina* Wedd., *Gilia laciniata* Ruiz & Pav. var. *erecta* (Hieron.) Brand

Hierba. Nativa. 0-4300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME, JFE). URY(COL).

Gilia valdiviensis Griseb.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, LLA, RME, JFE).

Notas: Introducida en la isla Más Afuera (Archipiélago Juan Fernández).

Ipomopsis Michx.

Ipomopsis gossypifera (Gillies ex Benth.) V.E. Grant

Sin.: *Gilia douglasii* Gillies ex Benth., *Gilia gossypifera* Gillies ex Benth., *Gilia involucrata* Phil.

Hierba. Nativa. 2400-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA).

Leptosiphon Benth.

Leptosiphon pusillus (Benth.) J.M. Porter & L.A. Johnson

Sin.: *Gilia pusilla* Benth., *Linanthus pusillus* (Benth.) Greene

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Microsteris Greene

Microsteris gracilis (Hook.) Greene

Sin.: *Collomia chubutensis* Speg., *Collomia eritrichoides* Griseb., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth. var. *congesta* Wedd., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth. var. *minuartioides* Franch., *Collomia micrantha* Kellogg, *Gilia gracilis* Hook., *Gilia gracilis* Hook. var. *congesta* (Wedd.) Borsini, *Gilia gracilis* Hook. var. *eritrichoides* (Griseb.) Brand, *Gilia gracilis* Hook. var. *micrantha* (Kellogg) Brand, *Gilia gracilis* Hook. var. *minuartioides* (Franch.) Borsini, comb. illeg., *Gilia gracilis* Phil., hom. illeg., *Gilia micrantha* (Kellogg) A. Nelson, *Microsteris micrantha* (Kellogg) Greene, *Navarretia gracilis* (Hook.) Kuntze, *Phlox gracilis* (Hook.) Greene, *Polemonium morenonis* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-4100 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Navarretia Ruiz & Pav.**Navarretia involucreta** Ruiz & Pav.

Sin.: *Aegochloa eryngioides* (Trevir.) Benth., *Collomia navarretia* G. Don, *Gilia berteroi* DC., *Gilia eryngoides* Trevir., *Gilia mucronata* Lehm., *Gilia navarettia* Steud., *Navarretia pusilla* Schrad.

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG, RME).

Polemonium L.**Polemonium micranthum** Benth.

Sin.: *Gilia arcuata* Hieron., *Gilia diffusa* Phil., *Gilia gayana* Wedd., *Gilia johowi* F. Meigen, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *arcuata* (Hieron.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *diffusa* (Phil.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *gayana* (Wedd.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *johowi* (F. Meigen) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *typica* Wherry, nom. inval., *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *violascens* (Speg. ex Brand) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. var. *violascens* Brand, *Polemoniella micrantha* (Benth.) A. Heller, *Polemonium antarcticum* Griseb., *Polemonium antarcticum* Griseb. f. *violascens* Speg. ex Brand, *Polemonium gayanum* (Wedd.) Brand, *Polemonium gayanum* (Wedd.) Brand var. *violascens* (Speg.) Brand

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, AIS, MAG, RME).

POLYGALACEAE**Acanthocladus** Klotzsch

Acanthocladus brasiliensis (A. St.-Hil. & Moq.) Klotzsch ex Hassk.

Sin.: *Mundia brasiliensis* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala klotzschii* Chodat

Arbolito. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Acanthocladus dichromus (Steud.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Acanthocladus albicans* A.W. Benn., *Polygala albicans* (A.W. Benn.) Grondona, *Polygala albicans* (A.W. Benn.) Grondona var. *carazaensis* Glaz. ex Marques, *Polygala albicans* (A.W. Benn.) Grondona var. *silvae* Marques, *Polygala bennetti* Chodat, nom. superfl., *Polygala bicolor* Vell., hom. illeg., *Polygala dichroma* Steud.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

Asemeia Raf.

Asemeia acuminata (Willd.) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott

Sin.: *Polygala acuminata* Willd., *Polygala fimbriata* A.W. Benn.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Asemeia extraaxillaris (Chodat) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott

Sin.: *Polygala extraaxillaris* Chodat, *Polygala extraaxillaris* Chodat f. *humilis* Hicken, *Polygala extraaxillaris* Chodat var. *concepcionis* Chodat, *Polygala extraaxillaris* Chodat var. *elata* Chodat, nom. nud., *Polygala fallax* Chodat f. *angustifolia* Chodat, *Polygala fallax* Chodat, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Asemeia hebeclada (DC.) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott

Sin.: *Polygala hebeclada* DC.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

Asemeia hirsuta (A. St.-Hil. & Moq.)
J.F.B. Pastore & J.R. Abbott
Sin.: *Polygala hirsuta* A. St.-Hil. & Moq.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).

Asemeia rhodoptera (A.W. Benn.) J.F.B.
Pastore & J.R. Abbott
Sin.: *Polygala rhodoptera* Mart. ex A.W.
Benn.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Asemeia tobatensis (Chodat) J.F.B.
Pastore & J.R. Abbott
Sin.: *Polygala tobatensis* Chodat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Asemeia violacea (Aubl.) J.F.B. Pastore
& J.R. Abbott
Sin.: *Polygala violacea* Aubl.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Bredemeyera Willd.

Bredemeyera brevifolia (Benth.) A.W.
Benn.
Sin.: *Catocoma brevifolia* Benth.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Bredemeyera floribunda Willd.
Sin.: *Bredemeyera floribunda* Willd. f.
elliptica Chodat
Arbusto o árbol. Nativa. 200-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).

Bredemeyera laurifolia (A. St.-Hil.)
Klotzsch ex A.W. Benn.

Sin.: *Comesperma laurifolium* A. St.-Hil.
Arbusto o liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Caamembeca J.F.B. Pastore

Caamembeca insignis (Klotzsch ex
Chodat) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala insignis* Chodat
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Caamembeca oxyphylla (DC.) J.F.B.
Pastore
Sin.: *Polygala oxyphylla* DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Caamembeca salicifolia (Poir.) J.F.B.
Pastore
Sin.: *Caamembeca laureola* (A. St.-Hil. &
Moq.) J.F.B. Pastore, *Polygala laureola* A.
St.-Hil. & Moq., *Polygala salicifolia* Poir.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

Hualania Phil.

Hualania colletioides Phil.
Sin.: *Bredemeyera colletioides* (Phil.)
Chodat
Arbusto. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, TUC).

Monnina Ruiz & Pav.

Monnina cardiocarpa A. St.-Hil. & Moq.
Sin.: *Pteromonnia cardiocarpa* (A. St.-
Hil.) B. Eriksen
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA).

Monnina cuneata A. St.-Hil. & Moq.
Sin.: *Monnina emarginata* A. St.-Hil. &
Moq., *Monnina hilairiana* Hassk., *Monnina*
intermedia Arechav., *Monnina retusa* C.
Presl, *Pteromonnia retusa* (C. Presl) B.
Eriksen
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(MAL, MON, RIV, TAC).

Monnina dictyocarpa Griseb.
Sin.: *Monnina argentina* I.M. Johnst.,
Monnina wilczekiana Chodat,
Pteromonnia dictyocarpa (Griseb.) B.
Eriksen
Hierba. Endémica. 0-3400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR).

Monnina itapoanensis Vianna &
Marques
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Monnina linearifolia Ruiz & Pav.
Sin.: *Pteromonnia linearifolia* (Ruiz &
Pav.) B. Eriksen
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Monnina lorenziana Chodat
Sin.: *Pteromonnia lorenziana* (Chodat) B.
Eriksen
Hierba. Endémica. 800-2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Monnina macbridei Chodat
Hierba. Nativa. 2800-2900 m.
Países: CHL(AYP).

Monnina oblongifolia Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(RIV).

Monnina philippiana ChodatSin.: *Monnina pterocarpa* Ruiz & Pav. var. *angustifolia* (DC.) Hook. & Arn., *Pteromonnina philippiana* (Chodat) B. Eriksen

Hierba. Endémica. 100-1600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Notas: Cita dudosa para la Flora Argentina

Monnina pumila FerreyraSin.: *Monnina humahuaguensis* Grondona

Hierba. Nativa. 3000.

Países: ARG(JUJ).

Monnina ramosissima Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(TAC).

Monnina resedoides A. St.-Hil.Sin.: *Monnina resedoides* A. St.-Hil. var. *crispata* Hook. ex A.W. Benn., *Pteromonnina resedoides* (A. St.-Hil.) B. Eriksen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(ITA). URY(RNO).

Monnina richardiana A. St.-Hil.Sin.: *Monnina cordata* A. St.-Hil., *Monnina richardiana* A. St.-Hil. var. *angustior* A. St.-Hil., *Monnina tristaniana* A. St.-Hil. subsp. *richardiana* (A. St.-Hil.) Marques, *Pteromonnina richardiana* (A. St.-Hil.) B. Eriksen

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Monnina rusbyi ChodatSin.: *Pteromonnina rusbyi* (Chodat) B. Eriksen

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Monnina stenophylla A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Monnina tristaniana A. St.-Hil.Sin.: *Monnina mucronata* Arechav., *Monnina richardiana* A. St.-Hil. var. *angustifolia* Chodat, *Monnina tristaniana* A. St.-Hil. var. *robusta* Chodat, *Pteromonnina tristaniana* (A. St.-Hil.) B. Eriksen

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, ITA, PAI, SPE). URY(CLA).

Monnina virescens Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY.

Monnina wrightii A. GraySin.: *Monnina brachystachya* Griseb., *Monnina eriocarpa* Chodat, *Monnina macrostachya* Ruiz & Pav. var. *stenophylla* Kuntze, *Pteromonnina wrightii* (A. Gray) B. Eriksen

Hierba. Nativa. 1300-2800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). URY(TAC).

Monrosia Grondona**Monrosia pterolopha** (Chodat) GrondonaSin.: *Polygala pterolopha* Chodat

Hierba. Endémica. 2300-3800 m.

Países: ARG(CAT, LRI).

Monrosia sanjuanensis A. Martínez & J.F.B. Pastore

Hierba. Endémica. 3000-3300 m.

Países: ARG(SJU).

Notas: B1ab(iii) + D2

Rhamphopetalum J.F.B. Pastore & M. Mota**Rhamphopetalum microphyllum**

(Griseb.) J.F.B. Pastore & M. Mota

Sin.: *Acanthocladus microphylla* Griseb., *Bredemeyera fruticulosa* Kassau, *Bredemeyera microphylla* (Griseb.) Hieron. var. *adpressa* Norverto & R.L. Pérez-Mor., *Bredemeyera microphylla* (Griseb.) Hieron. var. *microphylla*, *Hualania microphylla* (Griseb.) Hieron., *Polygala chodatiana* A.W. Benn., *Polygala spinescens* Gillies ex Hook. & Arn. var. *aspalathoides* Ball

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, TUC).

Securidaca L.**Securidaca diversifolia** (L.) S.F. BlakeSin.: *Polygala diversifolia* L.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Securidaca lanceolata A. St.-Hil.Sin.: *Securidaca sellowiana* Klotzsch ex A.W. Benn.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, PAI, SPE).

Securidaca macrocarpa A.W. Benn.

Arbusto o liana. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Securidaca ovalifolia A. St.-Hil. & Moq.
Sin.: *Securidaca fallax* Chodat,
Securidaca ovalifolia A. St.-Hil. f.
microphylla Chodat

Arbusto. Nativa. 200-300 m.

Países: PRY(AMA, CON, COA, GUA, PAI).

Notas: Cita dudosa para la Flora Argentina

Securidaca rivinifolia A. St.-Hil. & Moq.

Arbusto. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Senega Spach

Senega adenophylla (A. St.-Hil. & Moq.)
J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala adenophylla* A. St.-Hil. & Moq. var. *adenophylla*, *Polygala adenophylla* A. St.-Hil. & Moq. var. *obovata* A.W. Benn., *Polygala leptolopha* Chodat, *Polygala leptolopha* Chodat var. *stricta* Chodat, *Polygala paraguayensis* A.W. Benn.

Hierba subleñosa. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, COA, GUA, SPE). URY(PAY, RIV).

Senega altomontana (Lüdtke, Boldrini & Miotto) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala altomontana* Lüdtke, Boldrini & Miotto

Subarbusto. Endémica. 900-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senega aphylla (A.W. Benn.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala aphylla* A.W. Benn.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLA, LAV, RNO, RIV, TAC).

Senega appendiculata (Vell.) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott

Sin.: *Polygala alopecurus* Chodat, *Polygala appendiculata* Vell., *Polygala decidua* S.F. Blake, *Polygala leptocaulis* Torr. & A. Gray, *Polygala modesta* Miq., *Polygala paludosa* A. St.-Hil. & Moq. f. *albiflora* Chodat, *Polygala paludosa* A. St.-Hil. & Moq. var. *angustocarpa* Chodat, *Polygala paludosa* A. St.-Hil. & Moq. var. *exappendiculata* Chodat, *Polygala paludosa* A. St.-Hil. & Moq. var. *glochidiata* Chodat, *Polygala paludosa* A. St.-Hil. & Moq. var. *longispicata* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala paludosa* A. St.-Hil. & Moq. var. *subsessiliflora* Chodat, *Polygala pringlei* S. Watson

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO, TAC).

Senega argentinensis (Chodat) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala argentinensis* Chodat, *Polygala cisandina* Chodat

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Senega aspalatha (L.) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala aspalatha* L., *Polygala aspalatha* L. var. *comosa* Chodat, *Polygala coridifolia* C. Presl, *Polygala cyparissias* A. St.-Hil. & Moq. var. *laxifolia* Chodat, *Polygala grondonae* Zuloaga & Morrone, *Polygala neaei* DC., *Polygala polycephala* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala preslii* D. Dietr., *Polygala reflexa* Grondona, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SLU, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, SPE). URY(CAS, MON, TAC).

Senega australis (A.W. Benn.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala australis* A.W. Benn., *Polygala pamparum* Speg.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Senega boliviensis (A.W. Benn.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala alfredi* Chodat, *Polygala boliviensis* A.W. Benn., *Polygala mathusiana* Chodat, *Polygala stenocarpa* S.F. Blake, *Polygala subsecunda* S.F. Blake, *Polygala weberbaueri* Chodat

Hierba. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Senega bonariensis (Grondona) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala bonariensis* Grondona

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(CLA, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Senega brasiliensis (L.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala brasiliensis* L., *Polygala brasiliensis* L. var. *confertifolia* Chodat, *Polygala brasiliensis* L. var. *cordata* A.W. Benn., *Polygala dunaliana* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala dunaliana* A. St.-Hil. & Moq. var. *alba* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala guimaraensii* Brade

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, MIE). URY(CLA, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).

Senega campestris (Gardner) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala campestris* Gardner

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, TAC).

Senega cneorum (A. St.-Hil. & Moq.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala cneorum* A. St.-Hil. & Moq.,

Polygala pseudostricta Chodat

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Senega corralitae (Tombesi & R. Kiesling) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala corralitae* Tombesi & R. Kiesling

Hierba. Endémica. 3000-3300 m.

Países: ARG(SJU).

Senega cyparissias (A. St.-Hil. & Moq.) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala corisoides* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala cyparissias* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala cyparissias* A. St.-Hil. & Moq. var. *corisoides* (A. St.-Hil. & Moq.) Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MON, ROC).

Senega darwiniana (A.W. Benn.) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Acanthocladus tehuelchum* Speg., *Polygala darwiniana* A.W. Benn., *Polygala tehuelchum* (Speg.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Senega densiracemosa (Lüdtke & Miotto) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala densiracemosa* Lüdtke & Miotto

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Senega desiderata (Speg.) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala desiderata* Speg., *Polygala oedipus* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Senega duarteana (A. St.-Hil. & Moq.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala chacoensis* Chodat, *Polygala duarteana* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala duarteana* A. St.-Hil. & Moq. var. *chacoensis* (Chodat) Chodat, *Polygala monodonta* Chodat, *Polygala pseudolaurifolia* Chodat, *Polygala pseudolaurifolia* Chodat var. *pilcomayensis* Chodat, *Polygala villa-rica* Chodat, *Polygala villa-rica* Chodat var. *foliosa* Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(CLA, CLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

Senega equisetoides (A. St.-Hil. & Moq.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala equisetoides* A. St.-Hil. & Moq.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Senega glaziovii (Chodat) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala glaziovii* Chodat

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senega glochidiata (Kunth) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala glochidiata* Kunth, *Polygala glochidiata* Kunth var. *oxyrhynchos* (Chodat) Marques

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Senega gnidioides (Willd.) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Acanthocladus moyanoi* Speg., *Polygala eutaxioides* Turcz., *Polygala gnidioides* Willd., *Polygala gnidioides* Willd. var. *pratensis* (Phil.) Reiche, *Polygala kurtzii* A.W. Benn., *Polygala moyanoi* (Speg.) Speg., *Polygala pratensis* Phil., *Polygala thesioides* Willd.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS).

Senega gracilis (Kunth) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala chuitii* Chodat, *Polygala gracilis* Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Senega guaranitica (Chodat) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala guaranitica* Chodat, *Polygala rojasii* Chodat

Hierba. Endémica. 100-700 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, CEN, CON).

Senega hieronymi (Chodat) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala hieronymi* Chodat

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Senega hygrophila (Kunth) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala hygrophila* Kunth, *Polygala weddelliana* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CAA, CAN, ÑEE).

Senega jujuyensis (Grondona) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez
Sin.: *Polygala jujuyensis* Grondona, *Polygala neaei* DC. var. *pearcei* A.W. Benn.
Hierba. Endémica. 2600-2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Senega kurtzii Agust.Martinez & J.F.B. Pastore
Hierba. Endémica. 1800-3000 m.
Países: ARG(MEN).

Senega lancifolia (A. St.-Hil. & Moq.) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala acutifolia* Steud., hom. illeg., *Polygala lancifolia* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala michelii* Chodat, *Polygala multicaulis* Vell., nom. illeg., *Polygala virgata* Vell., hom. illeg.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Senega laxiflora (Grondona) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala linoides* Poir. var. *laxiflora* Grondona
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Senega leucantha (A.W. Benn.) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala graebiana* Chodat, *Polygala leucantha* A.W. Benn., *Polygala rubioides* Chodat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, COA, PAI).

Senega linoides (Poir.) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala foliosa* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala linoides* Poir. var. *ambigua*

Beauverd & Felipp., *Polygala linoides* Poir. var. *linoides*, *Polygala marplatensis* Grondona, *Polygala tristis* Chodat var. *apensis* Chodat
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, MIE, PAI, PHA). URY(CAS, COL, CLA, FLA, MON, ROC, SJO).

Senega longicaulis (Kunth) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala brachistachyos* Poir., *Polygala capitata* Sessé & Moç., *Polygala diversifolia* Miq., hom. illeg., *Polygala gomphrenoides* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala longicaulis* Kunth, *Polygala longicaulis* Kunth f. *minutiflora* Chodat, *Polygala longicaulis* Kunth var. *flavicomma* Chodat, *Polygala longicaulis* Kunth var. *major* Chodat, *Polygala stelleria* DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Senega lycopodioides (Chodat) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala dusenii* Norlind, *Polygala lycopodioides* Chodat
Hierba subleñosa. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Senega mendocina (Phil.) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez
Sin.: *Polygala chloroneura* Griseb., *Polygala chloroneura* Griseb. var. *glabrescens* Chodat, *Polygala cordobensis* A.W. Benn., *Polygala mendocina* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Senega minima (Pohl ex A.W. Benn) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala minima* Pohl ex A.W. Benn., *Polygala minima* Pohl ex A.W. Benn. var. *oxyrhyngchos* (Chodat) Marques, *Polygala oxyrhyngchos* Chodat
Hierba. Nativa.
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(CAU, ITA, PAI, SPE).

Senega molluginifolia (A. St.-Hil. & Moq.) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala areguensis* A.W. Benn., *Polygala areguensis* A.W. Benn. f. *minor* Chodat, *Polygala galioides* Poir. var. *molluginifolia* (A. St.-Hil. & Moq.) A.W. Benn., *Polygala molluginifolia* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala molluginifolia* A. St.-Hil. & Moq. f. *albiflora* Kuntze, *Polygala molluginifolia* A. St.-Hil. & Moq. f. *rosea* Kuntze, *Polygala orthiocarpa* Chodat, *Polygala verticillata* L. var. *molluginifolia* (A. St.-Hil. & Moq.) Arechav.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, MON, RIV, SAO, TAC, TYT).

Senega monosperma (A.W. Benn.) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala monosperma* A.W. Benn., *Polygala pseudosericea* Chodat
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, PAI).

Senega moquiniana (A. St.-Hil. & Moq.) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala moquiniana* A. St.-Hil. & Moq.
Subarbusto. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senega nevadensis (Agust.Martinez & J.F.B. Pastore) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala nevadensis* Agust.Martinez & J.F.B. Pastore

Subarbusto. Endémica. 1800-2400 m.

Países: ARG(MEN).

Senega obovata (A. St.-Hil. & Moq.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala albicoma* Arechav., *Polygala obovata* A. St.-Hil. & Moq.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(SAO).

Senega paniculata (L.) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott

Sin.: *Polygala caripensis* Turcz., *Polygala humilis* Vell., *Polygala paniculata* L., *Polygala paniculata* L. var. *brasiliensis* DC., *Polygala paniculata* L. var. *carlotina* E.H.L. Krause, *Polygala paniculata* L. var. *normalis* Kuntze, nom. superfl., *Polygala paniculata* L. var. *verticillata* Chodat, *Polygala ramosissima* Cav., *Polygala tenella* Willd.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Senega patagonica (Phil.) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala patagonica* Phil.

Hierba subleñosa. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Senega payuniensis (Agust.Martinez & J.F.B. Pastore) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala payuniensis* Agust.Martinez & J.F.B. Pastore

Subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Senega persistens (A.W. Benn.) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Hjert.* & Rahn, *Polygala oreophila* Speg., *Polygala paradoxa* Chodat, *Polygala persistens* A.W. Benn., *Polygala williamsii* Böcher

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Senega philippiana (Chodat) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala gnidioides* Willd. var. *pubescenti-pilosa* Hook. & Arn., *Polygala grisea* A.W. Benn., *Polygala philippiana* Chodat

Hierba. Endémica.

Países: ARG(MEN).

Senega poaya (Mart.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala angulata* DC. var. *angustifolia* A.W. Benn., *Polygala poaya* Mart.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-400 m.

Países: PRY(AMA).

Senega pulchella (A. St.-Hil. & Moq.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala pulchella* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala pulchella* A. St.-Hil. & Moq. f. *major* Chodat, *Polygala pulchella* A. St.-Hil. & Moq. var. *latifolia* Chodat, *Polygala pulchella* A. St.-Hil. & Moq. var. *robusta* Grondona, *Polygala stricta* Arechav., hom. illeg., *Senega robusta* (Grondona) J.F.B. Pastore

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, CLA, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC).

Senega pumila (Norlind) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala pumila* Norlind

Hierba. Nativa. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senega punctata (A.W. Benn.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala hassleriana* Chodat, *Polygala punctata* A.W. Benn., *Polygala wittrockiana* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(CLA).

Senega resedoides (A. St.-Hil. & Moq.) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala resedoides* A. St.-Hil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS). URY(FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO).

Senega riograndensis (Lüdtke & Miotto) J.F.B. Pastore

Sin.: *Polygala riograndensis* Lüdtke & Miotto

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS).

Senega rosei (Hicken) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala rosei* Hicken

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MEN, RNE).

Senega sabuletorum (Skotts.) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala sabuletorum* Skotts.

Hierba. Endémica. 200-300 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Senega salasiana (Gay) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez

Sin.: *Polygala andicola* Phil., *Polygala hickeniana* Grondona, *Polygala oxyantha* Phil., *Polygala salasiana* Gay, *Polygala salasiana* Gay var. *obtusifolia* Chodat

Hierba. Endémica. 1300-3300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Senega santacruzensis (Grondona) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez
Sin.: *Polygala santacruzensis* Grondona
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Senega selaginoides (A.W. Benn.) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala selaginoides* A.W. Benn., *Polygala tristis* Chodat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, ITA, SPE).

Senega sellowiana (A. St.-Hil. & Moq.) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala hatschbachii* Brade, *Polygala sabulosa* A.W. Benn., *Polygala sellowiana* A. St.-Hil. & Moq.
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senega solieri (Gay) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez
Sin.: *Polygala solieri* Gay
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: CHL(ATA).

Senega spinescens (Gillies ex Hook. & Arn.) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez
Sin.: *Polygala spinescens* Gillies ex Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 1500-3100 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, SJU).

Senega stenophylla (A. Gray) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez
Sin.: *Polygala acutiappendiculata* Chodat, *Polygala bicarunculata* Chodat, *Polygala stenophylla* A. Gray, *Polygala stenophylla* A. Gray var. *oxycarpa* Chodat
Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

Senega subandina (Phil.) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez
Sin.: *Polygala gayi* A.W. Benn., *Polygala gnidioides* Willd. var. *glabra* Hook. & Arn., *Polygala neaei* DC. f. *glabra* Griseb., *Polygala parvula* Phil., *Polygala stricta* Gay, hom. illeg., *Polygala stricta* Gay, hom. illeg. var. *parvula* (Phil.) Reiche, *Polygala subandina* Phil.
Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Senega subverticillata (Chodat) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala subverticillata* Chodat
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senega telephium (Chodat) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala adenophylla* A. St.-Hil. & Moq. var. *parvifolia* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala telephium* Chodat, *Polygala telephium* Chodat var. *gracilis* Chodat, *Polygala telephium* Chodat var. *robusta* Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAN, COA).

Senega tenuis (DC.) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala amambayensis* Chodat, *Polygala tenuis* DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, PAI).

Senega tenuissima (Chodat) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala tenuissima* Chodat
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senega timoutoides (Chodat) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala hygrophiloides* S. Moore, *Polygala timoutoides* Chodat, *Polygala timoutoides* Chodat f. *minor* Chodat, *Polygala timoutou* Aubl. var. *nana* A.W. Benn.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

Senega ventanensis (Grondona) J.F.B. Pastore & Agust.Martinez
Sin.: *Polygala ventanensis* Grondona
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

POLYGONACEAE

Antigonon Endl.

Antigonon leptopus Hook. & Arn.
Enredadera. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(SAL). PRY(CEN, COA).

Chorizanthe R. Br. ex Benth.

Chorizanthe commissuralis J. Remy
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Chorizanthe dasyantha Phil.
Sin.: *Chorizanthe fasciculata* Phil., *Chorizanthe illapelina* Phil., *Chorizanthe rosea* Phil.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Chorizantho flavescent Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Chorizantho frankenioides J. Remy
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ).

Chorizantho gajardoi Teillier & Macaya
Hierba. Endémica. 1900.
Países: CHL(COQ).

Chorizantho glabrescent Benth.
Sin.: *Chorizantho humilis* Phil.,
Chorizantho parviflora Phil., *Chorizantho*
pauciflora Phil., *Chorizantho tenuis* Phil.,
Chorizantho vaginata Benth. var. *arida* J.
Remy
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chorizantho kingii Phil.
Sin.: *Chorizantho deserticola* Phil.,
Chorizantho intricata Phil., *Chorizantho*
tenuis Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Chorizantho limariensis Teillier &
Macaya
Subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(COQ).

Chorizantho macraei Benth.
Sin.: *Chorizantho macraei* Benth. var.
humilis Benth.
Subarbusto. Endémica. 600-1300 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chorizantho mieresii Teillier & Macaya
Subarbusto. Endémica. 100.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chorizantho navasiae Teillier & Macaya
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(COQ).

Chorizantho novoana Teillier & Macaya
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Chorizantho paniculata Benth.
Sin.: *Chorizantho densa* Phil., *Chorizantho*
ramosissima Benth., *Trigonocarpus*
secundiflorus Bertero ex Steud.
Subarbusto. Endémica. 1000-2100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Chorizantho peduncularis Benth.
Subarbusto. Endémica. 900-1300 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Chorizantho rosasii Teillier & Macaya
Hierba. Endémica. 1700-2600 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chorizantho umbellata Phil.
Subarbusto. Endémica. 500-2500 m.
Países: CHL(COQ).

Chorizantho vaginata Benth.
Sin.: *Chorizantho vaginata* Benth. var.
maritima J. Remy
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU).

Chorizantho virgata Benth.
Sin.: *Chorizantho virgata* Benth. var.
tomentosa Benth.
Subarbusto. Endémica. 200-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Chorizantho viridis Phil.
Subarbusto. Endémica. 800-1100 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Coccoloba P. Browne

Coccoloba arborescent (Vell.) R.A.
Howard
Sin.: *Polygonum arborescent* Vell.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Coccoloba argentinensis Speg.
Sin.: *Coccoloba praecox* Herter, hom.
illeg.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ,
MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA).
PRY(APY, PAI). URY(SAO).

Coccoloba cordata Cham.
Sin.: *Coccoloba candolleana* Meisn.,
Coccoloba cordata Cham. var. *praecox*
Hassl., *Coccoloba tiliacea* Lillo, hom. illeg.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,
JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, CAN, CEN, CON, ITA, ÑEE,
PAI, PHA).

Coccoloba cujabensis Wedd.
Sin.: *Coccoloba longiochreata* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(APY).

Coccoloba glaziovii Lindau
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Coccoloba guaranitica Hassl.
Sin.: *Coccoloba guaranitica* Hassl. var.
opaca Hassl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA).

Coccoloba paraguariensis Lindau
Sin.: *Coccoloba correntina* Rojas Acosta,
Coccoloba microphylla Morong,
Coccoloba morongii Hassl.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR).
PRY(APY, CEN, COA, ITA, PAI, PHA).

Notas: Citado para Brasil (Brandbyge &
Cialdella, 2001) sin mencionar localidad o
material de referencia.

Coccoloba persicaria Wedd.

Arbusto o arbolito. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Coccoloba spinescens Morong

Sin.: *Coccoloba chacoensis* Standl., *Coccoloba paraguariensis* Lindau f. *intermedia* Hassl., *Coccoloba paraguariensis* Lindau f. *ovatifolia* Herzog, *Coccoloba paraguariensis* Lindau var. *grandifolia* Hassl., *Coccoloba paraguariensis* Lindau var. *spinescens* (Morong) Hassl., *Coccoloba sarmentosa* S. Moore

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Coccoloba tiliacea Lindau

Sin.: *Coccoloba peltata* Griseb., hom. illeg.

Árbol. Nativa. 300-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Coccoloba warmingii Meisn.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eriogonum Michx.

Eriogonum divaricatum Hook.

Sin.: *Eriogonum ameghinoi* Speg., *Sanmartinia ameghinoi* (Speg.) M. Buchinger

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Fallopia Adans.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(LLA, AIS).

Fallopia sachalinensis (F. Schmidt)

Ronse Decr.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(LLA).

Koenigia L.

Koenigia islandica L.

Sin.: *Koenigia fuegiana* Dusén

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Lastarriaea J. Remy

Lastarriaea chilensis J. Remy

Sin.: *Chorizanthe chilensis* (J. Remy) Goodman, *Chorizanthe lastarriaea* Parry, nom. illeg., *Lastarriaea linearis* Phil. ex Parry, *Lastarriaea stricta* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Muehlenbeckia Meisn., nom. cons.

Muehlenbeckia fruticulosa (Walp.)

Standl.

Sin.: *Polygonum fruticosum* Walp.

Arbusto. Nativa. 3400-3500 m.

Países: CHL(AYP).

Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M.

Johnst. var. **fascicularis** (Meisn.) Brandbyge

Sin.: *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *brachybotrys* Meisn., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *fascicularis* Meisn.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M.

Johnst. var. **hastulata**

Sin.: *Calacinum chilense* (Meisn.) J.F. Macbr., *Karkinetron undulatum* Raf., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *brachybotrys* Meisn., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *injucunda* (Lindl.) Meisn., *Polygonum hastulatum* (Sm.) Kuntze, *Polygonum injucunda* Lindl., *Rumex hatulatus* Sm.

Arbusto. Endémica. 0-2700 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M.

Johnst. var. **rotundata** (Phil.) Brandbyge

Sin.: *Muehlenbeckia rotundata* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(BIO, AIS, MAG).

Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega)

Meisn.

Sin.: *Calacinum sagittifolium* (Ortega) J.F. Macbr., *Coccoloba sagittifolia* Ortega, *Karkinetron hastatum* Raf., *Polygonum sagittifolium* (Ortega) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PHA, SPE). URY(CAS, FLA, SJO).

Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth)

Meisn.

Sin.: *Muehlenbeckia tamnifolia* (Kunth) Meisn. var. *hartwegii* Meisn., *Muehlenbeckia tamnifolia* (Kunth) Meisn. var. *humboldtii* Meisn., *Polygonum tamnifolium* Kunth, *Polygonum tamnifolium* Kunth var. *xerocarpum* Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Oxytheca Nutt.

Oxytheca dendroidea Nutt. subsp. **chilensis** (J. Remy) Ertter

Sin.: *Brisegnoa chilensis* J. Remy, *Oxytheca apiculata* Miers ex Benth., nom. nud., *Oxytheca dendroidea* Nutt. var. *tonsiflora* I.M. Johnst., *Oxytheca spiculata* Miers

Hierba. Endémica. 2100-3500 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Persicaria Mill.

Persicaria humboldtiana Funez & Hassemer

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

Persicaria sylvestris Funez & Hassemer

Hierba. Nativa. 200-1100 m.

Países: BRA(SCA).

Polygonum L., nom. cons.

Polygonum acuminatum Kunth

Sin.: *Persicaria acuminata* (Kunth) M. Gómez, *Polygonum acuminatum* Kunth var. *glabrescens* Meisn., *Polygonum acuminatum* Kunth var. *humboldtii* Meisn., *Polygonum acuminatum* Kunth var. *microstemom* Mart. ex Meisn., *Polygonum acuminatum* Kunth var. *setigerum* (Wedd.) Meisn., *Polygonum acuminatum* Kunth var. *subcordatum* Meisn., *Polygonum acuminatum* Kunth var. *weddellii* Meisn., *Polygonum alfredi* Pilg., *Polygonum bettfreundianum* Lindau, *Polygonum*

floribundum Wedd., *Polygonum setigerum* Wedd.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, IPA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(LAV, ROC).

Polygonum amphibium L.

Sin.: *Persicaria amphibia* (L.) Delarbre

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, RNE).

Polygonum arenarium Waldst. & Kit.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(RNE).

Polygonum aviculare L.

Sin.: *Polygonum arenastrum* Boreau, *Polygonum berteroi* Phil., *Polygonum caballeroi* Phil., *Polygonum striatum* K. Koch, *Polygonum uruguense* H. Gross

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(PHA). URY(CAS, SJO).

Polygonum bowenkampii Phil.

Hierba. Endémica. 2000-2900 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Polygonum brasiliense K. Koch

Sin.: *Polygonum aviculare* L. var. *montevicense* Cham. & Schltld., *Polygonum camporum* Meisn., *Polygonum camporum* Meisn. var. *australe* Meisn., *Polygonum camporum* Meisn. var. *boreale* Meisn., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(RGS). URY(SJO).

Polygonum campanulatum Hook. f.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(LLA, AIS).

Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don

Sin.: *Persicaria capitata* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COR). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(RME).

Polygonum convolvulus L.

Sin.: *Bilderdykia convolvulus* (L.) Dumort., *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löve, *Tiniaria convolvulus* (L.) Webb & Moq.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SDE, SFE, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME). PRY(COA, GUA, ITA).

Polygonum delfini Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LLA, AIS, MAG).

Polygonum diospyrifolium Cham. & Schltld.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Polygonum ferrugineum Wedd.

Sin.: *Persicaria ferruginea* (Wedd.) Soják, *Polygonum gummiifera* Wedd., *Polygonum spectabile* Mart. ex Meisn., *Polygonum spectabile* Mart. ex Meisn. var. *minor* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Polygonum glabrum Willd.

Sin.: *Persicaria glabra* (Willd.) M. Gómez, *Polygonum densiflorum* Meisn., *Polygonum portoricense* Bertero ex Small
Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LRI, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(CAS, COL, MON, RNO, ROC, SJO, TYT).

Polygonum hispidum Kunth

Sin.: *Persicaria hispida* (Kunth) M. Gómez
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, COA, ÑEE, PHA).

Polygonum hydropiper L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(MAU, BIO, LLA).

Polygonum hydropiperoides Michx. var. **hydropiperoides**

Sin.: *Persicaria hydropiperoides* (Michx.) Small, *Persicaria persicarioides* (Kunth) Small, *Polygonum hydropiperoides* Michx. var. *persicarioides* (Kunth) Stanford, *Polygonum persicarioides* Kunth, *Polygonum rivulare* Phil., hom. illeg., *Polygonum virgatum* Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME, JFE). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL, PAY, ROC).

Polygonum hydropiperoides Michx. var. **setaceum** (Baldwin ex Elliott) Gleason

Sin.: *Persicaria setacea* (Baldwin) Small, *Polygonum hydropiperoides* Michx. var. *virgatum* (Cham. & Schltdl.) Meisn., *Polygonum setaceum* Baldwin ex Elliott
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA).

Polygonum lapathifolium L.

Sin.: *Persicaria lanigera* (R. Br.) Soják, *Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre, *Persicaria lapathifolia* (L.) S.F. Gray var. *lanigera* (R. Br.) Chantar. & P. Tubtimtong, *Polygonum araucanum* Phil., *Polygonum ferrugineum* Wedd. var. *patagonicum* (Speg.) Macloskie, *Polygonum glandulosum* R. Br., *Polygonum glareosum* Phil., *Polygonum lanigerum* R. Br., *Polygonum lapathifolium* L. var. *lanigerum* (R. Br.) Moore & Betche, *Polygonum persicaria* L. var. *vernicosum* Cham. & Schltdl., *Polygonum spectabile* Mart. ex Meisn. var. *patagonica* Speg., *Polygonum utriculatum* J. Remy, *Polygonum valdivianum* Phil.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU). CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). PRY(CON, PHA). URY(CAS).

Polygonum maritimum L.

Sin.: *Polygonum chilense* K. Koch, *Polygonum maritimum* L. var. *chilense* (K. Koch) Skottsb., *Polygonum sanguinaria* J. Remy

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF).

CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Polygonum meisnerianum Cham. & Schltdl.

Sin.: *Persicaria meisneriana* (Cham. & Schltdl.) M. Gómez, *Persicaria meisneriana* (Cham. & Schltdl.) M. Gómez var. *beyrichiana* (Cham. & Schltdl.) C. C. Freeman, *Polygonum beyrichianum* Cham. & Schltdl., *Polygonum chamissoeanum* Wedd., *Polygonum meisnerianum* Cham. & Schltdl. var. *beyrichianum* (Cham. & Schltdl.) Meisn., *Polygonum meisnerianum* Cham. & Schltdl. var. *setosum* Chodat, *Polygonum multangulare* Hook. & Arn., *Tracaulon beyrichianum* (Cham. & Schltdl.) Small, *Tracaulon meisnerianum* (Cham. & Schltdl.) Greene

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, PAY, SJO).

Polygonum minus Huds.

Sin.: *Persicaria minor* (Huds.) Opiz

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MEN, MIS, RNE, SFE).

Polygonum orientale L.

Sin.: *Persicaria orientalis* (L.) Spach, *Polygonum cordobense* Lindau
Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, MEN). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA, RME). URY(MON).

Polygonum paraguayense Wedd.

Sin.: *Persicaria paraguayensis* (Wedd.) S.T. Kim & Donoghue

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

Polygonum persicaria L.

Sin.: *Persicaria maculosa* Gray

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Polygonum punctatum Elliott

Sin.: *Persicaria punctata* (Elliott) Small, *Polygonum acre* Kunth, hom. illeg., *Polygonum epilobioides* Wedd., *Polygonum hydropiperoides* Pursh, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, NEU, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, ROC, SJO, TAC).

Polygonum rubricaulle Cham.

Sin.: *Tracaulon rubricaulle* (Cham.) Greene, *Truellum rubricaulle* (Cham.) Soják

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

Polygonum stelligerum Cham.

Sin.: *Persicaria stelligera* (Cham.) Galasso, *Polygonum acanthophyllum* Lindau, *Polygonum bonaerense* Speg., *Tracaulon stelligerum* (Cham.) Greene, *Truellum stelligerum* (Cham.) Soják

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, MIE, PHA, SPE). URY(SJO).

Polygonum stypticum Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, TUC). URY(RNO).

Notas: Citada para Chile y Brasil (Cialdella, 1989, 1997) sin mencionar ejemplar de herbario.

Rumex L.

Rumex acetosa L., nom. cons.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(MAG).

Rumex acetosella L.

Sin.: *Acetosa angiocarpa* (Murb.) Holub, *Rumex acetosella* L. subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb., *Rumex angiocarpus* Murb.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, JUJ, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(DUR).

Rumex aquaticiformis Rchb. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(AIS).

Rumex argentinus Rech. f.

Sin.: *Rumex hasslerianus* Rech. f., *Rumex polyklonos* Rech. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MEN, SFE). PRY(CEN). URY(CAS, CLA, MAL, MON, SJO, SOR).

Rumex brasiliensis Link

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA).

Notas: Cita dudosa para Paraguay (cfr. Cialdella 2001a: 78)

Rumex conglomeratus Murray var. **borreri** Trimen

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(ERI).

Rumex conglomeratus Murray var. **vulgaris** Wallr.

Sin.: *Rumex foliosus* Rchb. f.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME, JFE). URY(CLA, MAL, MON, PAY, RNO, SOR).

Rumex crispissimus Kuntze

Sin.: *Rumex crispissimus* Kuntze var. *unigibbus* Hauman, *Rumex decumbens* Dusén

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, MAG).

Rumex crispus L.

Hierba. Introducida. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).

Rumex cristatus DC.

Hierba. Introducida. 400.

Países: CHL(LLA, RME).

Rumex cuneifolius Campd.

Sin.: *Rumex montevidensis* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, SFE, SLU). BRA(RGS). CHL(ATA, VAL, BIO, ARA, LLA, AIS, RME). URY(MON, ROC).

Rumex darwinianus Rech. f.

Sin.: *Rumex magellanicus* Campd. var. *donatii* Rech. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR). CHL(LLA).

Rumex longifolius DC.

Hierba. Introducida. 0-400 m.

Países: ARG(TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Rumex lorentzianus Lindau

Hierba. Endémica. 600-2800 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Rumex magellanicus Campd.

Sin.: *Rumex erosus* Phil., *Rumex hippiatricus* J. Remy, *Rumex magellanicus* Campd. var. *dusenii* Rech. f., *Rumex magellanicus* Griseb., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 1000-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ, VAL, BIO, AIS, MAG).

Rumex maricola J. Remy

Sin.: *Rumex arenarius* Poepp. ex Endl., *Rumex cuneifolius* Campd. var. *maricola* (J. Remy) Rech. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Rumex maritimus L.

Sin.: *Rumex fueginus* Phil., *Rumex maritimus* L. subsp. *fueginus* (Phil.) Hultén, *Rumex maritimus* L. var. *fueginus* (Phil.) Dusén

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, MAG, RME).

Rumex obovatus Danser

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). PRY(CEN, GUA, PHA).

Rumex obtusifolius L.

Sin.: *Rumex obtusifolius* L. subsp. *agrestis* (Fr.) Danser, *Rumex obtusifolius* L. var. *agrestis* Fr.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Rumex paraguayensis D. Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, SFE, TUC). PRY(APY, CEN, COA, PHA).

Rumex patagonicus Rchb. f.

Sin.: *Rumex chiloensis* Rchb. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ARA, LLA, AIS).

Rumex polycarpus Rech. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(ERI).

Rumex pulcher L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, RNE, SDE, SFE, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE). PRY(APA, CEN, COA, MIE). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SAO).

Rumex romassa J. Remy

Sin.: *Rumex asplundii* Rech. f.

Hierba. Endémica. 1000-3500 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SAL). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Rumex sellowianus Rech. f.

Hierba. Endémica. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

Rumex spinosus L.

Sin.: *Emex spinosa* (L.) Campd.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, SFE). CHL(COQ). URY(MON, PAY, SJO).

Rumex uruguayensis Rech. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(FLA).

Ruprechtia C.A. Mey.

Ruprechtia apetala Wedd.

Sin.: *Magonia apetala* (Wedd.) Kuntze, *Magonia corylifolia* (Griseb.) Kuntze, *Magonia excelsa* (Griseb.) Kuntze, *Magonia mollis* (Wedd.) Kuntze, *Ruprechtia boliviensis* Herzog, *Ruprechtia corylifolia* Griseb., *Ruprechtia excelsa* Griseb., *Ruprechtia mollis* Wedd., *Triplaris corylifolia* (Griseb.) Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 100-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). PRY(APY).

Ruprechtia brachysepala Meisn.

Sin.: *Magonia brachysepala* (Meisn.) Kuntze

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). PRY(CEN, COA, PAI).

Ruprechtia exploraticis Sandwith

Arbusto o árbol. Nativa. 100-200 m.

Países: PRY(APY, CON).

Ruprechtia laxiflora Meisn.

Sin.: *Enneatypus nordenskjöldii* Herzog, *Enneatypus nordenskjöldii* Herzog f. *glaberrimus* Herzog, *Magonia laxiflora*

(Meisn.) Kuntze, *Magonia polystachya* (Griseb.) Kuntze, *Magonia viraru* (Griseb.) Kuntze, *Ruprechtia polystachya* Griseb., *Ruprechtia viraru* Griseb., *Triplaris polystachya* (Griseb.) Kuntze

Árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, DUR, PAY, RIV, SAO, SOR).

Ruprechtia paranensis Pendry

Arbusto o árbol. Endémica. 500-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ruprechtia salicifolia (Cham. & Schltdl.) C.A.Mey.

Sin.: *Magonia salicifolia* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, *Triplaris salicifolia* Cham. & Schltdl.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, DUR, PAY, SAO, SOR, TAC).

Salta ADR. SÁNCHEZ

Salta triflora (Griseb.) ADR. SÁNCHEZ

Sin.: *Magonia triflora* (Griseb.) Kuntze, *Ruprechtia triflora* Griseb., *Ruprechtia triflora* Griseb. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Triplaris triflora* (Griseb.) Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 200-1500 m.

Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CHO, CON, NAS, PHA).

Triplaris Loefl. ex L.

Triplaris americana L.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Triplaris gardneriana Wedd.

Sin.: *Triplaris guaranitica* Chodat

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA, CEN, CON, ITA, PAI, PHA, SPE).

PONTEDERIACEAE

Heteranthera Ruiz & Pav., nom. cons.

Heteranthera catharinensis C.N. Horn & M. Pell.

Hierba acuática. Endémica. 500-600 m.

Países: BRA(SCA).

Heteranthera limosa (Sw.) Willd.

Sin.: *Heteranthera alismoides* Humb. ex Link, *Heteranthera limosa* (Sw.) Willd. f. *albiflora* Benke, *Leptanthus ovalis* Michx., *Lunania uniflora* Raf., nom. illeg., *Phrynium limosum* (Sw.) Kuntze, *Pontederia limosa* Sw., *Pontederia triandra* Banks ex Mart., *Schollera limosa* (Sw.) Raf., *Triexastima uniflora* Raf.

Hierba acuática. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PHA).

Heteranthera multiflora (Griseb.) Horn

Sin.: *Heteranthera reniformis* Ruiz & Pav. var. *multiflora* Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PHA).

Heteranthera pumila M. Pell. & C.N. Horn

Hierba acuática. Endémica. 700-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.

Sin.: *Buchosia aquatica* Vell., *Heterandra reniformis* P. Beauv., *Heteranthera acuta* Willd., *Heteranthera virginica* (Pers.) Steud., *Leptanthus peruviana* Pers., *Leptanthus reniformis* (P. Beauv.) Michx., *Leptanthus virginica* Pers., *Phrynium reniformis* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Phrynium reniformis* (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *acuta* (Willd.) Kuntze, *Schollera reniformis* (Ruiz & Pav.) Kuntze

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV).

Heteranthera zosterifolia Mart.

Sin.: *Heteranthera osteniana* Herter, *Schollera zosterifolia* (Mart.) Kuntze

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, PAI). URY(LAV, RIV).

Pontederia L.

Pontederia azurea Sw.

Sin.: *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth, *Piaropus azureus* (Sw.) Raf., *Pontederia aquatica* Vell.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TAC, TYT).

Pontederia cordata L. var. *cordata*

Sin.: *Narukila cordata* (L.) Nieuwl., *Pontederia angustifolia* Pursh, *Pontederia*

cordata L. f. *brasiliensis* Solms, *Pontederia cordata* L. var. *angustifolia* (Pursh) Torr., *Pontederia cordata* L. var. *lanceolata* Griseb., *Pontederia cordata* L. var. *lancifolia* (Muhl.) Torr., *Pontederia lanceolata* Nutt., *Pontederia lanceolata* Nutt. f. *brasiliensis* (Solms) Fernald, *Pontederia lancifolia* Muhl., *Pontederia nymphaeifolia* Kunth, *Pontederia rotundifolia* L. f. var. *nymphaeifolia* (Kunth) Solms, *Unisema cordata* (L.) Farw., *Unisema media* Raf.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, RNO, ROC, TAC).

Pontederia crassipes Mart.

Sin.: *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms, *Eichhornia speciosa* Kunth, *Heteranthera formosa* Miq., *Piaropus mesomelas* Raf., nom. illeg.

Hierba acuática. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, BIO). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON, ROC, TYT).

Pontederia gigantea D.J. Souza

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Pontederia meyeri (A.G. Schulz) M. Pell. & C.N. Horn

Sin.: *Eichhornia meyeri* A.G. Schulz

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, SAL). PRY(APY, CHO, NAS, PHA).

Pontederia ovalis Mart. ex Schult. & Schult. f.

Sin.: *Pontederia cordata* L. var. *ovalis* (Mart.) Solms, *Pontederia lanceolata* Nutt. f. *ovalis* (C. Mart.) A. Cast., *Pontederia lanceolata* Nutt. var. *vichadensis* F.J. Herm.

Hierba palustre. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN). URY(CAS, ROC).

Pontederia rotundifolia L. f.

Sin.: *Pontederia cordifolia* Mart., *Pontederia eriantha* Miq., *Pontederia renniformis* Larrañaga, *Reussia graziae* Machado, *Reussia rotundifolia* (L. f.) A. Cast.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, ROC).

Pontederia subovata (Seub.) Lowden

Sin.: *Eichhornia subovata* Seub., *Reussia subovata* (Seub.) Solms

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

PORTULACACEAE

Amphipetalum Bacigalupo

Amphipetalum **paraguayense**

Bacigalupo

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(APY).

Portulaca L.

Portulaca amilis Speg.

Sin.: *Portulaca amilis* Speg. var. *rosengurtii* D. Legrand, *Portulaca catharinae* Poelln., *Portulaca glazioviana* D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. var. *paraguayensis* Hauman & Irigoyen, nom. nud., *Portulaca pilosa* L. var. *paraguayensis* Kuntze, *Portulaca rubricaulis* J.F. Macbr., nom. illeg., *Portulaca schenckii* Poelln., *Portulaca striata* Poelln.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CEN, CON, SPE). URY(ART).

Portulaca argentinensis Speg.

Hierba. Endémica. 500.

Países: ARG(SAL).

Portulaca chacoana D. Legrand

Sin.: *Portulaca fluvialis* D. Legrand var. *argentinensis* D. Legrand

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, PHA).

Portulaca confertifolia Hauman var. **confertifolia**

Sin.: *Portulaca gilliesii* Speg., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).

Portulaca confertifolia Hauman var. **cordobensis** D. Legrand

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Portulaca cryptopetala Speg.

Sin.: *Portulaca cryptopetala* Speg. f. *phenopetala* Speg., *Portulaca cryptopetala* Speg. var. *diversifolia* (Poelln.) D. Legrand, *Portulaca cryptopetala* Speg. var. *legrandii* (Poelln.) D. Legrand, *Portulaca diversifolia* D.

Legrand, nom. illeg., *Portulaca diversifolia* Poelln. var. *legrandii* (Poelln.) D. Legrand, *Portulaca legrandii* Poelln.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, DUR, FLO, MON, PAY, ROC, SAO, TYT).

Portulaca echinosperma Hauman

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Portulaca elongata Rusby var. **elongata**

Sin.: *Portulaca amboensis* J.F. Macbr., *Portulaca pedicellata* D. Legrand var. *cochabambensis* D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. f. *maxima* Kuntze

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL).

Portulaca elongata Rusby var. **pedicellata** (D. Legrand) D. Legrand

Sin.: *Portulaca amboensis* J.F. Macbr. var. *pedicellata* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca pedicellata* D. Legrand

Hierba. Nativa. 2000.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL).

Portulaca eruca Hauman

Hierba. Endémica. 100-2000 m.

Países: ARG(COR, SDE, SLU). PRY(APY).

Portulaca fulgens Griseb.

Sin.: *Portulaca pilosa* L. var. *fulgens* (Griseb.) Kuntze

Hierba. Endémica. 2500-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Notas: Posiblemente en San Juan, Argentina

Portulaca gilliesii Hook.

Sin.: *Portulaca gilliesii* Hook. var. *chacoensis* D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. var. *eriophora* (Casar.) Hauman, *Portulaca tinctoria* Larrañaga

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SLU, TUC). PRY(APY, CEN). URY(RNO).

Portulaca grandiflora Hook.

Sin.: *Portulaca fluvialis* D. Legrand, *Portulaca fluvialis* D. Legrand var. *depressa* D. Legrand, *Portulaca fluvialis* D. Legrand var. *tacuarembensis* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. f. *depressa* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. f. *granulata* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. subsp. *cisplatina* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. subsp. *ruizii* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. var. *cisplatina* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. var. *depressa* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. var. *immerso-stellulata* (Poelln.) D. Legrand, *Portulaca immerso-stellulata* Poelln., *Portulaca immerso-stellulata* Poelln. var. *galanderi* Poelln., *Portulaca immerso-stellulata* Poelln. var. *uruguayensis* Poelln., *Portulaca multistaminata* Poelln., *Portulaca pilgeri* Poelln., *Portulaca pilosa* L. subsp. *cisplatina* D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. var. *cisplatina* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. var. *osteniana* D. Legrand, *Portulaca ripicola* Poelln., *Portulaca rupicola* Poelln.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, MIE, PHA). URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC, TYT).

Portulaca hatschbachii D. Legrand

Sin.: *Portulaca diegoi* Mattos

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Portulaca meyeri D. Legrand var. **meyeri**

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Portulaca meyeri D. Legrand var. **rodrigo** D. Legrand

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Portulaca mucronata Link var. **mucronata**

Sin.: *Portulaca mucronata* Link var. *alba* Mattos

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citado para Argentina, Paraguay y Uruguay por Coelho & Giulietti (2010) sin indicar material de referencia.

Portulaca mucronata Link var. **paraguariensis** D. Legrand

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(COA, PAI).

Portulaca mucronulata D. Legrand var. **mucronulata**

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR).

Portulaca mucronulata D. Legrand var. **robusta** D. Legrand

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SFE).

Portulaca obtusa Poelln.

Sin.: *Portulaca obtusa* Poelln. var. *hauthalii* Poelln.

Hierba. Endémica. 500-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Portulaca obtusifolia D. Legrand var. **obtusifolia**
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR).

Portulaca obtusifolia D. Legrand var. **rubrisperma** D. Legrand
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Portulaca oleracea L.
Sin.: *Portulaca cryptopetala* Speg. var. *poellnitziana* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca marginata* Kunth, *Portulaca neglecta* Mack. & Bush, *Portulaca oleracea* L. var. *granulato-stellulata* Poelln., *Portulaca oleracea* L. var. *macrantha* Speg., *Portulaca oleracea* L. var. *micrantha* Speg., *Portulaca oleracea* L. var. *parvifolia* (Haw.) Griseb., *Portulaca oleracea* L. var. *silvestris* (Montandon) Thell., *Portulaca poellnitziana* D. Legrand, *Portulaca retusa* Engelm.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(APY, PHA). URY(CLA, MON, SOR).

Portulaca papulifera D. Legrand
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). URY(ART, RIV, TAC).

Portulaca papulosa Schltld.
Sin.: *Portulaca depauperata* Poelln., *Portulaca hirsutissima* Cambess., *Portulaca platensis* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC).

Portulaca perennis R.E. Fr.
Sin.: *Portulaca andicola* Poelln., *Portulaca arequipaensis* Poelln., *Portulaca peruviana* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

Portulaca philippii I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 500-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Portulaca ragonesei D. Legrand
Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: ARG(COR).

Portulaca rotundifolia R.E. Fr.
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Portulaca stellulato-tuberculata Poelln.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CEN).

Portulaca thellusonii Lindl.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Portulaca tingoensis J.F. Macbr. var. **andina** (D. Legrand) D. Legrand
Sin.: *Portulaca andina* D. Legrand
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Portulaca tingoensis J.F. Macbr. var. **tingoensis**
Sin.: *Portulaca andina* D. Legrand var. *bonetei* D. Legrand
Hierba. Nativa. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Portulaca umbraticola Kunth
Sin.: *Portulaca coronata* Small, *Portulaca denudata* Poelln., *Portulaca lanceolata* Engelm., *Portulaca plano-operculata* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PHA).

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton L.

Potamogeton crispus L.
Hierba acuática. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(BAI).

Potamogeton ferrugineus Hagstr.
Sin.: *Potamogeton apicalis* Hagstr., *Potamogeton illinoensis* Morong var. *ventanicolus* (Hicken) Horn ex Tur, *Potamogeton lucens* L. var. *ventanicolus* Hicken, *Potamogeton spoliatus* Hagstr.
Hierba acuática. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, RNE, SCR, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AIS). URY(COL, FLA, ROC).

Potamogeton gayi A. Benn.
Sin.: *Potamogeton burkartii* Horn ex Tur
Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA). PRY(CEN, MIE). URY(DUR, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).

Potamogeton illinoensis Morong
Sin.: *Potamogeton dunicola* Tur, *Potamogeton pedersenii* Tur
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, ARA, LLA, MAG). PRY(CON). URY(ROC).

Potamogeton linguatus Hagstr.
Sin.: *Potamogeton badiovirens* Hagstr., *Potamogeton montanus* C. Presl

Hierba acuática. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Potamogeton montevidensis A. Benn.
Hierba acuática. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(COR, COS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY. URY(SJO).

Potamogeton polygonus Cham. & Schldl.
Sin.: *Potamogeton pseudopolygonus* Hagstr.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(DUR, FLA, SAO).

Potamogeton pusillus L.
Sin.: *Potamogeton aschersonii* A. Benn., *Potamogeton berterianus* Phil., *Potamogeton pusillus* L. var. *argentinus* A. Benn., *Potamogeton pusillus* L. var. *longepedunculatus* Hicken, *Potamogeton tenuifolius* F. Phil., *Potamogeton uruguayensis* A. Benn. & Graebn.
Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). PRY(CEN). URY(FLO, MON, ROC).

Potamogeton spirilliformis Hagstr.
Sin.: *Potamogeton reniacoensis* Sparre
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS). CHL(VAL). URY(ROC).

Potamogeton ulei K. Schum.
Hierba acuática. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stuckenia Börner

Stuckenia filiformis (Pers.) Boehm. subsp. *alpina* (Blytt) R.R. Haynes, Les & M. Král
Sin.: *Potamogeton aulacophyllum* K. Schum., *Potamogeton juncifolius* A. Kern. ex C. Fritsch, *Potamogeton marinus* L. f. *alpinus* Blytt, *Potamogeton strictus* Phil., *Potamogeton strictus* Phil. var. *magellanicus* Hagstr.

Hierba acuática. Nativa. 200-4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, BIO, MAG).

Stuckenia pectinata (L.) Börner
Sin.: *Coleogeton pectinatus* (L.) Les & R.R. Haynes, *Potamogeton diffusus* (Hagstr.) Herter, *Potamogeton pectinatus* L., *Potamogeton pectinatus* L. var. *diffusus* Hagstr.
Hierba acuática. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, COR, JUJ, MEN, NEU, RNE). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

Stuckenia striata (Ruiz & Pav.) Holub
Sin.: *Coleogeton striatus* (Ruiz & Pav.) Les & R.R. Haynes, *Potamogeton australis* F. Phil., *Potamogeton dissimilis* A. Benn., *Potamogeton pectinatus* L. var. *striatus* (Ruiz & Pav.) Hagstr., *Potamogeton pectinatus* L. var. *ungulatus* Hagstr., *Potamogeton striatus* Ruiz & Pav.
Hierba acuática. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(VAL, LLA, RME). PRY(PHA). URY(MON).

Zannichellia L.

Zannichellia palustris L.
Hierba acuática. Nativa. 0-4400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME). URY(ROC).

PRIMULACEAE

Anagallis L.

Anagallis pumila Sw.
Sin.: *Anagallis pumila* Sw. var. *longepedunculata* (Chodat & Hassl.) Knuth, *Centunculus pentandrus* R. Br., *Centunculus pentandrus* R. Br. f. *longepedunculatus* Chodat & Hassl., *Centunculus pentandrus* R. Br. var. *stellatus* Chodat & Hassl., *Centunculus pumilus* (Sw.) Kuntze, *Centunculus pumilus* (Sw.) Kuntze var. *pentandrus* Kuntze, *Micropyxis pumila* (Sw.) Duby
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN, CEN, PAI, SPE).
Notas: Excluida de la Flora Argentina por Zanotti, Fl. Vasc. Argent. 19[2]: 427. 2021

Androsace L.

Androsace salasii Kurtz
Sin.: *Androsace pusilla* (Dusén) Lourteig, *Collomia pusilla* Dusén
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Ardisia Sw., nom. cons.

Ardisia guianensis (Aubl.) Mez
Sin.: *lcacorea guianensis* Aubl.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Clavija Ruiz & Pav.

Clavija nutans (Vell.) B. Ståhl
Sin.: *Clavija boliviensis* Mez, *Clavija hassleri* Mez, *Clavija integrifolia* Mart. & Miq., *Zacintha nutans* Vell.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

Cybianthus Mart.

Cybianthus brasiliensis (Mez) G. Agostini
Sin.: *Conomorpha peruviana* A. DC. var. *brasiliensis* Mez
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cybianthus peruvianus (A. DC.) Miq.
Sin.: *Conomorpha peruviana* A. DC.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lysimachia L.

Lysimachia abscondita R. Trevis., Funez & Hassemer
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lysimachia amoena (Sol. ex Gaertn.) Hassemer, Funez & R. Trevis.
Sin.: *Anagallis alternifolia* Cav. f. *laxa* R. Knuth, *Anagallis alternifolia* Cav. var. *alternifolia*, *Anagallis alternifolia* Cav. var. *angustifolia* Phil., *Anagallis alternifolia*

Cav. var. *densifolia* Hook. f., *Anagallis alternifolia* Cav. var. *genuina* (Cav.) R. Knuth, *Anagallis alternifolia* Cav. var. *minor* R. Knuth, *Anagallis alternifolia* Cav. var. *parvula* Phil., *Anagallis alternifolia* Cav. var. *repens* (d'Urv.) Knuth, *Anagallis alternifolia* Cav. var. *tenelliformis* R. Knuth, *Anagallis amplexicaulis* Larrañaga, *Anagallis myrtifolia* Kostel., *Euparea amoena* Sol. ex Gaertn., *Euparea chilensis* Baudo, *Euparea linarina* Baudo, *Euparea parvula* Baudo, *Jirasekia alternifolia* (Cav.) Rchb. ex Steud., *Lysimachia buxifolia* Feuillée ex Molina, *Lysimachia marginata* Macloskie, *Lysimachia myrtifolia* Feuillée ex Molina, *Lysimachia pumila* Poepp. ex Pax & Knuth, *Lysimachia repens* d'Urv., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb.

Sin.: *Anagallis amoena* Heldr., *Anagallis arvensis* L., *Anagallis arvensis* L. f. *coerulea* (Schreb.) Arechav., *Anagallis arvensis* L. subsp. *caerulea* Hartm., *Anagallis arvensis* L. subsp. *latifolia* (L.) Arcang., *Anagallis arvensis* L. subsp. *phoenicea* Vollm., *Anagallis arvensis* L. var. *coerulea* (Schreb.) Gren. & Godr., *Anagallis arvensis* L. var. *latifolia* (L.) Lange, *Anagallis arvensis* L. var. *phoenicea* (Scop.) Gren. & Godr., *Anagallis caerulea* Schreb., *Anagallis caerulea* Tourn. ex Lam., *Anagallis latifolia* L., *Anagallis phoenicea* Scop.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR,

ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE, IPA). URY(ART, COL, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO).

Notas: Jiménez-López et al. 2022 (Bot. J. Linn. Soc. 20: 15) afirman que las plantas con flores azules de *L. arvensis* corresponden a *L. loeflingii* F.J. Jiménez-López & M. Talavera, nom. nov. para *Anagallis latifolia* L.

Lysimachia barbata (P. Taylor) U. Manns & Anderb.

Sin.: *Anagallis pumila* Sw. var. *barbata* P. Taylor
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Lysimachia campestris Funez, Hassemer & R. Trevis.

Hierba. Endémica. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lysimachia catharinensis R. Trevis., Funez & Hassemer
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Lysimachia filiformis (Cham. & Schltdl.) U. Manns & Anderb.

Sin.: *Anagallis filiformis* Cham. & Schltdl., *Anagallis tenella* L. var. *ascendens* A. St.-Hil. & Girard, *Anagallis tenella* L. var. *filiformis* (Cham. & Schltdl.) A. St.-Hil. & Girard, *Anagallis uruguayensis* Arechav.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, MON).

Lysimachia minima (L.) U. Manns & Anderb.

Sin.: *Anagallis minima* (L.) E.H.L. Krause, *Anagallis ovalis* Ruiz & Pav., *Anagallis pumila* Sw. var. *ovalis* (Ruiz & Pav.) R. Knuth, *Centunculus erectus* Phil., *Centunculus minimus* L., *Centunculus pumilus* (Sw.) Kuntze var. *ovalis* (Ruiz &

Pav.) Kuntze, *Lysimachia ovalis* (Ruiz & Pav.) U. Manns & Anderb., *Micropyxis ovalis* (Ruiz & Pav.) Phil., *Micropyxis pumila* (Sw.) Duby var. *ovalis* (Ruiz & Pav.) Duby

Hierba. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). PRY(CEN, COA, PAI). URY(FLO, MAL, MON).

Lysimachia parvula Funez, Hassemer & R. Trevis.

Hemiepífita. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lysimachia sertulata Baudo

Sin.: *Lysimachia chilensis* (Griseb.) Knuth, *Lysimachia febrifuga* Poepp. ex Klatt, nom. nud., *Lysimachia mellico* Kuntze ex Klatt, nom. nud., *Lysimachia mellico* Poepp. ex Pax & Knuth, nom. nud., *Lysimachia umbellata* Phil., *Theopyxis chilensis* Griseb.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Lysimachia tenella L.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Lysimachia verna (A. St.-Hil.) U. Manns & Anderb.

Sin.: *Asterolinon serpyllifolium* (Poir.) Ball, *Asterolinon trinum* Baudo, *Lysimachia serpyllifolia* Poir., *Pelletiera serpyllifolia* (Poir.) Kuntze, comb. superfl., *Pelletiera serpyllifolia* (Poir.) Webb & Berthel., *Pelletiera verna* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MIS, RNE). CHL(VAL, LBO, BIO, LLA, RME). URY(CAS, MON, SJO).

Myrsine L.

Myrsine altomontana M.F. Freitas & Kin.-Gouv.

Arbusto. Nativa. 800-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrsine balansae (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea balansae* Mez

Árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI).

Myrsine congesta (Schwacke ex Mez) Pipoly

Sin.: *Rapanea congesta* Schwacke ex Mez

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br.

Sin.: *Caballeria ferruginea* Ruiz & Pav., *Manglilla ferruginea* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult., *Myrsine ferruginea* (Ruiz & Pav.) Spreng., *Myrsine paulensis* A. DC., *Rapanea coriacea* (Sw.) Mez, *Rapanea ferruginea* (Ruiz & Pav.) Mez, *Rapanea paulensis* (A. DC.) Mez, *Samara coriacea* Sw.

Árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI). URY(LAV, MAL, RIV, ROC, TYT).

Myrsine gardneriana A. DC.

Sin.: *Rapanea gardneriana* (A. DC.) Mez

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

Sin.: *Rapanea guianensis* Aubl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, PAI). URY(ROC).

Myrsine hermogenesii (Jung-Mend. & Bernacci) M.F. Freitas & Kin.-Gouv.

Sin.: *Rapanea hermogenesii* Jung-Mend. & Bernacci

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrsine laetevirens (Mez) Arechav.

Sin.: *Myrsine floribunda* R. Br., *Rapanea laetevirens* Mez

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(CAS, COL, MAL, PAY, ROC, SJO, TAC).

Myrsine lancifolia Mart.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrsine ligustrina (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea ligustrina* Mez

Árbol. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Myrsine lineata (Mez) Imkhan.

Sin.: *Rapanea lineata* Mez

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrsine loefgrenii (Mez) Imkhan.

Sin.: *Myrsine loefgrenii* (Mez) Otegui, comb. illeg., *Rapanea loefgrenii* Mez, *Rapanea quaternata* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, SPE).

Myrsine lorentziana (Mez) Arechav.

Sin.: *Myrsine floribunda* Griseb., nom. illeg., *Myrsine parvula* (Mez) Otegui, *Rapanea lorentziana* Mez, *Rapanea megapotamica* Mez, *Rapanea parvula* Mez

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, MIE, PAI, SPE). URY(SAO, TAC, TYT).

Myrsine matensis (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea matensis* Mez, *Rapanea perforata* Mez, *Rapanea perforata* Mez var. *rigida* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Myrsine monticola Mez

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Myrsine parvifolia A. DC.

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

Myrsine rubra M.F. Freitas & Kin.-Gouv.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrsine squarrosa M.F. Freitas & Kin.-Gouv.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrsine umbellata Mart.

Sin.: *Rapanea umbellata* (Mart.) Mez

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, COA, PAI). URY(MON, ROC).

Myrsine venosa A. DC.

Sin.: *Rapanea venosa* (A. DC.) Mez

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrsine wettsteinii (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea wettsteinii* Mez

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Primula L.

Primula comberi W.W. Sm.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA).

Primula magellanica Lehm.

Sin.: *Primula decipiens* Duby, *Primula farinosa* L. subsp. *magellanica* (Lehm.) W.W. Sm. & Forrest, *Primula farinosa* L. var. *decipiens* (Duby) DC., *Primula farinosa* L. var. *magellanica* (Lehm.) Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Primula malacoides Franch.

Hierba. Introducida. 1500.

Países: ARG(JUU, SAL).

Samolus L.

Samolus latifolius Duby

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Samolus repens (J.R. Forst. & G. Forst.) Pers.

Sin.: *Samolus littoralis* R. Br., *Scheffieldia repens* J.R. Forst. & G. Forst.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: CHL(BIO).

Samolus spathulatus (Cav.) Duby

Sin.: *Androsace spathulata* Cav., *Primula pistiifolia* Griseb., *Steirostemon spathulatus* (Cav.) Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Samolus subnudicaulis A. St.-Hil. & Girard

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(COR, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(MAL).

Samolus valerandi L.

Sin.: *Samolus bracteolosus* Phil., *Samolus parviflorus* Raf., *Samolus valerandi* L. var. *floribundus* (Kunth) Knuth

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL). PRY(CEN, SPE). URY(COL, MAL, MON).

Stylogyne A. DC.

Stylogyne pauciflora Mez

Sin.: *Ardisia catharinensis* Mez, *Icacorea catharinensis* (Mez) Lundell, *Stylogyne dusenii* Ricketson & Pipoly

Arbusto. Nativa. 800-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

PROTEACEAE

Embothrium J.R. Forst. & G. Forst.

Embothrium coccineum J.R. Forst. & G. Forst.

Sin.: *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. f. *lanceolatum* (Ruiz & Pav.) R.L. Pérez-Mor., *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *cavanillesii* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *lanceolatum* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *oblanceolatum* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *obovatum* Kuntze, *Embothrium gilliesii* Meisn., *Embothrium lanceolatum* Ruiz & Pav., *Embothrium valdivianum* Gand.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Euplassa Salisb. ex Knight

Euplassa cantareirae Sleumer

Árbol. Nativa. 900-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Euplassa hoehnei Sleumer

Árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Euplassa lanata Giuffrè & Caddah

Árbol. Endémica. 600-700 m.

Países: BRA(PAR).

Euplassa nebularis Rambo & Sleumer

Árbol. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gevuina Molina

Gevuina avellana Molina

Sin.: *Quadria avellana* (Molina) Gaertn., *Quadria heterophylla* Ruiz & Pav.

Árbol. Endémica. 100-700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Lomatia R. Br., nom. cons.

Lomatia dentata (Ruiz & Pav.) R. Br.

Sin.: *Embothrium dentatum* Ruiz & Pav., *Embothrium pinol* Dombey ex Meisn., nom. nud., *Embothrium sylvaticum* Poepp. ex Meisn., nom. nud., *Lomatia dentata* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *acutifolia* Meisn., *Lomatia dentata* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *obtusifolia* Meisn., *Lomatia sylvatica* Poepp., nom. nud., *Tricondylus dentatus* (Ruiz & Pav.) Kuntze

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Lomatia ferruginea (Cav.) R. Br.

Sin.: *Embothrium ferrugineum* Cav., *Lomatia pinnatifida* Hort ex Thornton, nom. nud., *Tricondylus ferrugineus* (Cav.) Salisb.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Lomatia hirsuta (Lam.) Diels subsp. **obliqua** (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.

Sin.: *Embothrium alnifolium* Poepp. ex Meisn., nom. nud., *Embothrium obliquum* Ruiz & Pav., *Embothrium rurale* Dombey ex Meisn., nom. nud., *Lomatia alnifolia* Poepp. ex Meisn., *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br., *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *alnifolia* Meisn., *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *subintegrifolia* Meisn., *Lomatia opaca* Klotzsch ex Meisn., nom. nud., *Tricondylus obliquus* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Tricondylus obliquus* (Ruiz &

Pav.) Kuntze var. *alnifolius* (Meisn.) Macloskie

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Orites R. Br.

Orites myrtoideus (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. f. ex Engl.

Sin.: *Embothrium myrtifolium* Poepp. ex Meisn., nom. nud., *Lomatia alpina* Phil., nom. nud., *Lomatia chilensis* Gay, *Roupala myrtoidea* Poepp. & Endl., *Tricondylus chilensis* (Gay) Kuntze

Arbusto. Endémica. 700-1500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Roupala Aubl.

Roupala asplenoides Sleumer

Arbusto o arbolito. Nativa. 800-1700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Roupala consimilis Mez

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Roupala meisneri Sleumer

Árbol. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA).

Roupala montana Aubl. var. **brasiliensis** (Klotzsch) K.S. Edwards

Sin.: *Roupala adiantifolia* Klotzsch, *Roupala brasiliensis* Klotzsch, *Roupala brasiliensis* Klotzsch var. *laevigata* Meisn., *Roupala brasiliensis* Klotzsch var. *velutina* (Klotzsch) Meisn., *Roupala cataractarum* Sleumer, *Roupala montana* Aubl. var.

tomentosa (Pohl) Sleumer, *Roupala pohl* Meisn., *Roupala pohl* Meisn. var. *dimorphophylla* Meisn., *Roupala tomentosa* Pohl, *Roupala tomentosa* Pohl var. *dentata* Meisn., *Roupala tomentosa* Pohl var. *integrifolia* Meisn., *Roupala velutina* Klotzsch

Árbol. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Roupala montana Aubl. var. **montana**

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Roupala montana Aubl. var. **paraensis**

(Sleumer) K.S. Edwards

Sin.: *Roupala rhombifolia* Mart. ex Meisn. var. *paraensis* Sleumer

Arbusto o árbol. Nativa. 100-2300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Roupala pallida K. Schum.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

QUIINACEAE

Quiina Aubl.

Quiina glaziovii Engl.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

QUILLAJACEAE

Quillaja Molina

Quillaja lancifolia D. Don

Sin.: *Fontenellea brasiliensis* A. St.-Hil. & Tul., *Quillaja brasiliensis* (A. St.-Hil. & Tul.) Mart., *Quillaja lanceolata* D. Dietr.

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, ROC, TAC).

Quillaja saponaria Molina

Sin.: *Quillaja molinae* DC., *Quillaja poeppigii* Walp., *Smegmadermos emarginatus* Ruiz & Pav., *Smegmaria emarginata* (Ruiz & Pav.) Willd.

Árbol. Nativa. 800-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

RANUNCULACEAE

Anemonastrum Holub

Anemonastrum antucense (Poepp.)

Mosyakin & de Lange

Sin.: *Anemone antucensis* Poepp., *Anemonidium antucense* (Poepp.) Starod.

Hierba. Endémica. 100-1800 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG).

Anemone L., nom. cons.

Anemone decapetala Ard. var. **decapetala**

Sin.: *Anemone chilensis* Spreng. ex Eichler, nom. nud., *Anemone chilensis* Spreng. ex Pritz., nom. nud., *Anemone decapetala* Ard. f. *gigantea* Arechav., *Anemone decapetala* Ard. f. *majorina* Arechav., *Anemone decapetala* Ard. f. *petiolulata* Arechav., *Anemone decapetala* Ard. f. *primaria* Eichler, *Anemone decapetala* Ard. var. *grandifolia* Eichler,

Anemone decapetala Ard. var. *trilobata* (Juss.) Lorentz, *Anemone polypetala* Larrañaga, *Anemone sphenophylla* Poepp., *Anemone stenophylla* Poepp., *Anemone trilobata* Juss.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, MIS, NEU, RNE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE). URY(MON, SOR).

Anemone hepaticifolia Hook.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(LSR, LLA).

Notas: Citada para Argentina (Ruiz, 2001d) sin mencionar ejemplar de referencia

Anemone moorei Espinosa

Subarbusto. Endémica. 500.

Países: CHL(MAU).

Anemone multifida Poir.

Sin.: *Anemone commersoniana* Richardson ex Spreng., *Anemone lanigera* Gay, *Anemone multifida* Poir. var. *commersoniana* (Richardson ex Spreng.) Ulbr., *Anemone multifida* Poir. var. *grandiflora* Rendle, *Anemone multifida* Poir. var. *hudsoniana* DC., *Anemone multifida* Poir. var. *lanigera* (Gay) Ulbr., *Anemone multifida* Poir. var. *magellanica* DC., *Anemone multifida* Poir. var. *uniflora* DC.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Anemone rigida Gay

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Anemone sellowii Pritz.

Hierba. Nativa. 1000-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anemone triternata Vahl

Sin.: *Anemone cicutifolia* I.M. Johnst., *Anemone decapetala* Ard. var. *foliolosa* Eichler, *Anemone decapetala* Ard. var. *triloba* Juss., *Anemone decapetala* Ard. var. *triternata* (Vahl) Kuntze, *Anemone fumariaefolia* Juss.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG). URY(MON, SJO).

Notas: Citada para Paraguay (Pontioli, 1967c) sin indicar localidad o material de referencia.

Aquilegia L.

Aquilegia vulgaris L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Barneoudia Gay

Barneoudia balliana Britton

Sin.: *Anemone balliana* (Britton) Hoot, *Knowltonia balliana* (Britton) Christenh. & Byng

Hierba. Endémica. 3000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(COQ, RME).

Barneoudia chilensis Gay

Sin.: *Anemone barneoudia* Kuntze, *Anemone chilensis* (Gay) Kurtz, *Anemone chilensis* (Gay) Reiche, comb. illeg., *Anemone domeykoana* (Leyb.) F. Meigen, *Anemone gayana* R. Wagner, *Barneoudia cyanoleuca* Leyb., *Barneoudia*

domeykoana Leyb., *Knowltonia chilensis* (Gay) Christenh. & Byng

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Barneoudia major Phil. var. **major**

Sin.: *Anemone major* (Phil.) F. Meigen, *Anemone major* (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Barneoudia chilensis* Gay var. *major* (Phil.) Kurtz, *Knowltonia major* (Phil.) Christenh. & Byng

Hierba. Endémica. 1000-4000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Barneoudia major Phil. var. **patagonica**

(Skotts.) Lourteig

Sin.: *Barneoudia chilensis* Gay var. *patagonica* Skotts.

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Callianthemoides Tamura

Callianthemoides semiverticillata (Phil.)

Tamura

Sin.: *Anemone myriophylla* Speg., *Callianthemum semiverticillatum* (Phil.) Phil., *Ranunculus pseudosemiverticillatus* Espinosa & C. Rudolph, *Ranunculus semiverticillatus* Phil.

Hierba. Endémica. 100-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LLA).

Caltha L.

Caltha appendiculata Pers.

Sin.: *Caltha appendiculata* Pers. var. *chilensis* Huth, *Caltha holophylla* Leyb., *Caltha limbata* Schltdl., *Caltha paradoxa* Sol. ex T.F. Forst., *Psychrophila*

appendiculata (Pers.) Bercht. & J. Presl, *Psychrophila appendiculata* (Pers.) Gay, *Psychrophila holophylla* Leyb.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Caltha dionaeifolia Hook. f.

Sin.: *Psychrophila dionaeifolia* (Hook. f.) Gay

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Caltha sagittata Cav.

Sin.: *Caltha alata* A.W. Hill, *Caltha andicola* (Gay) Walp., *Caltha deranco* Steud., *Caltha involuta* A.W. Hill, *Caltha multicapsularis* Sol. ex T.F. Forst., *Caltha sagittata* Cav. f. *latifolia* Speg., *Caltha sagittata* Cav. var. *latifolia* Huth, *Psychrophila andicola* Gay, *Psychrophila sagittata* (Cav.) Bercht. & J. Presl

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Ceratocephala Moench

Ceratocephala falcata (L.) Cramer

Sin.: *Ceratocephala falcata* (L.) Pers., *Ceratocephala spicata* Moench, *Ranunculus falcatus* L.

Hierba. Introducida. 500-2000 m.

Países: ARG(MEN).

Clematis L.

Clematis affinis A. St.-Hil.

Sin.: *Clematis dioica* L. var. *australis* Eichler, *Clematis dioica* L. var. *fluminensis*

(Vell.) Kuntze, *Clematis discolor* Gardner, *Clematis fluminensis* Vell., *Clematis perulata* Kuntze, *Clematis uruguayensis* Arechav.

Liana. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, GUA, SPE). URY(MAL).

Clematis bonariensis Juss. ex DC.

Sin.: *Clematis dioica* L. var. *eichleriana* Kuntze, nom. inval., *Clematis maldonadensis* Larrañaga

Liana. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA). PRY(APA, COA, ITA, MIE, PAI). URY(RIV, TYT).

Notas: Introducida en Chile

Clematis brasiliana DC.

Sin.: *Clematis acapulcensis* Hook. & Arn. var. *puberula* W.T. Wang, *Clematis brasiliana* DC. var. *glabra* A. St.-Hil., *Clematis brasiliana* DC. var. *minor* A. St.-Hil., *Clematis caripensis* Kunth, *Clematis dioica* L. subsp. *brasiliana* (DC.) Kuntze, *Clematis dioica* L. var. *brasiliana* (DC.) Eichler, *Clematis integra* Vell.

Liana. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

Clematis campestris A. St.-Hil.

Sin.: *Clematis bangii* Rusby, *Clematis campestris* A. St.-Hil. var. *malacophylla* W.T. Wang, *Clematis campestris* A. St.-Hil. var. *mendocina* (Phil.) Hauman & Irigoyen, *Clematis denticulata* Vell., *Clematis denticulata* Vell. var. *ulbrichiana* (Pilg.) Lourteig, *Clematis dioica* L. var. *angustissima* Kuntze, *Clematis dioica* L. var. *campestris* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Clematis dioica* L. var. *denticulata* (Vell.) Kuntze, *Clematis dioica* L. var. *hilarii* (Spreng.) Kuntze, *Clematis dioica* L. var.

mendocina (Phil.) Kuntze, *Clematis hilarii* Spreng., *Clematis hilarii* Spreng. var. *guaranitica* A. St.-Hil. & Tul., *Clematis hilarii* Spreng. var. *montevidensis* (Spreng.) Speg., *Clematis hilarii* Spreng. var. *triloba* (A. St.-Hil.) Speg., *Clematis mendocina* Phil., *Clematis montevidensis* Spreng. var. *denticulata* (Vell.) Bacigalupo, *Clematis montevidensis* Spreng. var. *montevidensis*, *Clematis triloba* A. St.-Hil., hom. illeg., *Clematis triloba* A. St.-Hil. var. *guaranitica* A. St.-Hil., *Clematis virginiana* L. var. *campestris* (A. St.-Hil.) Macloskie

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, CHO, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(FLA, MON, SAO).

Notas: Introducida en Chile

Clematis haenkeana C. Presl

Sin.: *Clematis dioica* L. subsp. *sericea* (DC.) Kuntze, *Clematis dioica* L. var. *typica* Kuntze, nom. inval., *Clematis sericea* Kunth ex DC., *Clematis thalictroides* Steud., *Clematis virginiana* L. subsp. *sericea* (DC.) Voss

Liana. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Clematis serrana Piovesani, P.P.A. Ferreira & G. Seger

Liana. Endémica. 1000-1800 m.

Países: BRA(SCA).

Delphinium L.

Delphinium ajacis L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COR).

Halerpestes Greene

Halerpestes cymbalaria (Pursh) Greene
Sin.: *Cyrtorhyncha cymbalaria* (Pursh) Britton, *Halerpestes tridentata* (Kunth ex DC.) Greene, *Oxygraphis cymbalaria* (Pursh) Prantl, *Ranunculus cymbalaria* Pursh, *Ranunculus cymbalaria* Pursh var. *americanus* DC., *Ranunculus hemignostus* Steud., *Ranunculus maritimus* Phil., *Ranunculus microcarpus* C. Presl, *Ranunculus microcarpus* J. Presl var. *maritima* Phil., *Ranunculus minutus* Gay, *Ranunculus minutus* Gay var. *microphylla* Phil. ex Reiche, *Ranunculus pozoaefolius* Gay, *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC. var. *major* DC., *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC. var. *minor* DC., *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC. var. *tridentatus*

Hierba. Nativa. 0-4500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, MAG, RME).

Halerpestes exilis (Phil.) Tamura

Sin.: *Ranunculus cymbalaria* Pursh f. *exilis* (Phil.) Lourteig, *Ranunculus cymbalaria* Pursh var. *exilis* (Phil.) R.E. Fr., *Ranunculus exilis* Phil., *Ranunculus minutiusculus* Ulbr., *Ranunculus minutus* Gay var. *exilis* (Phil.) Reiche

Hierba. Nativa. 2000-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Halerpestes uniflora (Phil. ex Reiche) Emadzade, Lehnbeach, P. Lockh. & Hörandl

Sin.: *Ranunculus bovei* Speg., *Ranunculus bovei* Speg. var. *potamogetonoides* Speg., *Ranunculus potamogetonoides* (Speg.) Speg.,

Ranunculus pseudocaltha Chodat & Wilczek, *Ranunculus pseudocaltha* Chodat & Wilczek f. *minor* Chodat & Wilczek, *Ranunculus uniflorus* Phil. ex Reiche

Hierba. Endémica. 0-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, MEN, NEU, SAL, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, MAU, AIS, MAG).

Hamadryas Comm. ex Juss.

Hamadryas argentea Hook. f.

Sin.: *Hamadryas tomentosa* Hook. f., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Hamadryas delfinii Phil. ex Reiche

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, SJU, TDF). CHL(MAG).

Hamadryas kingii Hook. f.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Hamadryas magellanica Lam. f. **magellanica**

Sin.: *Hamadryas magellanica* Lam. var. *tomentosa* (DC.) Hook. f., *Hamadryas tomentosa* DC.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Hamadryas magellanica Lam. f. **paniculata** (Hook. f.) Lourteig

Sin.: *Hamadryas paniculata* Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Hamadryas sempervivoides Sprague

Hierba. Endémica. 700-1300 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Myosurus L.

Myosurus apetalus Gay

Sin.: *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook. f., *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook. f. var. *apetalus* (Gay) Huth, *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook. f. var. *brachypoda* Speg., *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook. f. var. *gracilis* Speg., *Myosurus gracilis* (Speg.) Macloskie

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, MAG, RME).

Myosurus patagonicus Speg.

Sin.: *Ranunculus tehuelchicus* Christenh. & Byng

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, NEU, SCR, TDF). CHL(BIO, MAG, RME).

Ranunculus L.

Ranunculus acaulis Banks & Sol. ex DC.

Sin.: *Ranunculus litoralis* Phil., *Ranunculus litoralis* Schltld. ex Lechl., nom. nud., *Ranunculus skottsbergii* Gand., *Ranunculus stenopetalus* Hook.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Ranunculus acris L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(TDF).

Ranunculus apiifolius Pers.

Sin.: *Aphanostemma apiifolium* (Pers.) A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,

ARA, LLA). PRY(CEN). URY(CAS, MON, ROC).

Ranunculus aquatilis L.

Hierba acuática. Introducida. 0-4500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, BIO, ARA, LLA, MAG).

Ranunculus arvensis L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

Ranunculus bitermatus Sm.

Sin.: *Ranunculus commersonii* DC. ex Poir., *Ranunculus crassipes* Hook. f., *Ranunculus exiguus* d'Urv., *Ranunculus flaccidus* Banks & Sol. ex Hook. f., *Ranunculus montteanus* Phil., *Ranunculus montteanus* Phil. var. *obtusilobus* Phil. ex Reiche

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Ranunculus bonariensis Poir. var. **bonariensis**

Sin.: *Casalea ascendens* A. St.-Hil., *Casalea ficarifolia* A. St.-Hil., *Casalea ficarifolia* A. St.-Hil. var. *minor* A. St.-Hil., *Ranunculus adscendens* Chodat & Hassl., *Ranunculus adscendens* Chodat & Hassl. var. *paraguariensis* Chodat, *Ranunculus cordifolius* Spreng., *Ranunculus montevidensis* Arechav., *Ranunculus ovalifolius* Arechav., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, FLA, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR).

Ranunculus bonariensis Poir. var. **januarii** Urb.

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Ranunculus bonariensis Poir. var. **phyteumifolius** (A. St.-Hil.) Hicken ex Lourteig

Sin.: *Casalea phyteumaefolia* A. St.-Hil., *Casalea phyteumaefolia* A. St.-Hil. var. *bonariensis* A. St.-Hil., *Ranunculus bonariensis* Poir. f. *anomala* Hassl., nom. nud., *Ranunculus bonariensis* Poir. subsp. *phyteumifolius* (A. St.-Hil.) Molero, *Ranunculus phyteumaefolius* (A. St.-Hil.) Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SJU). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA).

Ranunculus bonariensis Poir. var. **trisepalus** (Gillies ex Hook. & Arn.) Lourteig

Sin.: *Ranunculus berteronianus* Steud., nom. nud., *Ranunculus bonariensis* Poir. subsp. *trisepalus* (Gillies ex Hook. & Arn.) Molero, *Ranunculus humilis* Hook., *Ranunculus humilis* Hook. & Arn., *Ranunculus obtusatus* Poepp., *Ranunculus trisepalus* Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME). URY(CAS).

Ranunculus caprarum Skottsbo.

Hierba. Endémica. 1200.

Países: CHL(JFE).

Ranunculus catharinensis Lourteig

Hierba. Endémica. 600-900 m.

Países: BRA(SCA).

Ranunculus chilensis DC.

Sin.: *Ranunculus berteronianus* Phil., *Ranunculus chilensis* DC. var. *gayi* Phil. ex Reiche, *Ranunculus chilensis* DC. var.

lasius Phil. ex Reiche, *Ranunculus elatus* Steud., *Ranunculus protractus* Steud., *Ranunculus sericans* Steud., *Ranunculus valdivianus* Phil. ex Reiche

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: ARG(RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Ranunculus filamentosus Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4600 m.

Países: ARG(SAL).

Ranunculus flagelliformis Sm.

Sin.: *Casalea flagelliformis* (Sm.) A. St.-Hil., *Casalea flagelliformis* (Sm.) A. St.-Hil. var. *lutescenes* A. St.-Hil., *Casalea hederacea* Mart. ex Eichler, *Ranunculus implicatus* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). PRY(CEN, COA, PAI). URY(CAS, COL, MAL, MON, RIV, ROC, SOR).

Ranunculus fuegianus Speg.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.

Países: ARG(SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, AIS, MAG).

Ranunculus grisebachii C.A. Zanotti

Sin.: *Ranunculus sarmentosus* Griseb., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, TUC).

Ranunculus hillii Lourteig

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Ranunculus hydrophilus Gaudich.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Ranunculus lancipetalus Griseb.

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Ranunculus maclovianus d'Urv.

Sin.: *Ranunculus colliguensis* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(LLA, MAG).

Ranunculus muricatus L.

Sin.: *Ranunculus muricatus* L. var. *tucumanicus* DC., *Ranunculus orbicularis* Steud., *Ranunculus repens* L. var. *florepleno* DC.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MEN, MIS, RNE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE). PRY(CEN). URY(CAS, MON).

Ranunculus parviflorus L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA).

Ranunculus peduncularis Sm. var. **erodiifolius** (Gay) Reiche

Sin.: *Ranunculus andinus* Phil., *Ranunculus erodiifolius* Gay

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Ranunculus peduncularis Sm. var. **peduncularis**

Sin.: *Ranunculus alboffii* Macloskie, *Ranunculus gilliesii* Steud., *Ranunculus glandulifer* Poepp., *Ranunculus patagonicus* Poepp., *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *alboffiana* Speg., *Ranunculus peduncularis* Sm. var.

chillanensis Phil. ex Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *glabrata* Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *glandulifer* (Poepp.) Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *longavinus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *minor* Wedd., *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *patagonicus* (Poepp.) Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *polypetalus* (Gillies ex Hook. & Arn.) Macloskie, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *saffordi* Phil. ex Reiche, *Ranunculus polypetalus* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Ranunculus talquinus* Phil. ex Reiche

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Ranunculus platensis Spreng.

Sin.: *Casalea sessiliflora* A. St.-Hil., *Ranunculus hilarii* Hieron., *Ranunculus sessiliflorus* (A. St.-Hil.) Spreng., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, RNE, SLU, SFE, TUC). URY(ART, DUR, FLO, MON, SAO).

Notas: Citada para Brasil (Lourteig, 1951) sin indicar localidad o ejemplar de referencia

Ranunculus praemorsus Kunth ex DC.

Sin.: *Ranunculus argemonifolius* Griseb., *Ranunculus pseudophilonotis* Griseb.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Ranunculus pseudotrullifolius Skottsb.

Sin.: *Ranunculus caespitosus* Dusén, hom. illeg., *Ranunculus dusenii* Lourteig, *Ranunculus trullifolius* Dusén, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

Ranunculus psychrophilus Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Ranunculus repens L. var. **repens**

Sin.: *Ranunculus lucidus* Poir., *Ranunculus repens* L. var. *erectus* DC., *Ranunculus repens* L. var. *glabratus* DC., nom. superfl., *Ranunculus repens* L. var. *lucidus* (Poir.) Speg., *Ranunculus repens* L. var. *pleniflorus* Fernald, *Ranunculus repens* L. var. *villosus* Lamotte

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Ranunculus saxifragifolius Steud.

Sin.: *Casalea chilensis* A. St.-Hil., *Hydrocotyle pauciflora* Phil., *Ranunculus aysenensis* Gand., *Ranunculus minutiflorus* Bertero ex Phil., *Ranunculus minutiflorus* Bertero ex Phil. var. *miser* (Phil.) Reiche, *Ranunculus miser* Phil., *Ranunculus savatieri* Franch.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Ranunculus sceleratus L.

Sin.: *Hecatonía scelerata* (L.) Forreau

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Ranunculus sericocephalus Hook. f.

Sin.: *Ranunculus fueginus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus phillipianus* De Wild., *Ranunculus sericocephalus* Hook. f. var. major Albov

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Ranunculus spagazzinii Lourteig

Sin.: *Ranunculus oligocarpus* Speg., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, AIS, MAG).

Ranunculus trichophyllus Chaix

Sin.: *Ranunculus curvirostris* Freyn, *Ranunculus oblitus* Wiegelm Desfayes & A.A. Bobrov

Hierba acuática. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(MAU, ARA, LRI, LLA, MAG).

Ranunculus trullifolius Hook. f.

Sin.: *Ranunculus monanthos* Phil., *Ranunculus monanthos* Phil. var. *chiloensis* Phil. ex Reiche

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, ARA, LLA, AIS, MAG).

Ranunculus uniflorus Phil. ex Reiche f. **bolivianus** (Phil.) Lourteig

Sin.: *Ranunculus arequipensis* Ulbr., *Ranunculus bolivianus* Phil.

Hierba. Nativa.

Países: CHL(TAR, ANT).

Thalictrum L., nom. cons.

Thalictrum decipiens Boivin

Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Thalictrum venturii Boivin

Sin.: *Thalictrum inuncans* Boivin

Subarbusto. Nativa. 1000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

RESEDACEAE

Reseda L.

Reseda decursiva Forssk.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(VAL).

Reseda lutea L.

Arbusto. Introducida.

Países: CHL(BIO).

Reseda luteola L.

Sin.: *Luteola tinctoria* Webb & Berthel.,

Reseda salicifolia Gray, nom. superfl.,

Reseda tinctoria Salisb., nom. superfl.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, NEU, SCR).
CHL(VAL, BIO).

Reseda odorata L.

Hierba. Introducida. 200-300 m.

Países: CHL(ATA).

Reseda phyteuma L.

Hierba. Introducida. 0-1100 m.

Países: CHL(ATA, BIO).

RESTIONACEAE

Apodasmia B.G. Briggs & L.A.S. Johnson

Apodasmia chilensis (Gay) B.G. Briggs & L.A.S. Johnson

Sin.: *Calopsis chilensis* (Gay) Steud.,

Leptocarpus chilensis (Gay) Mast.,

Schoenodum chilense Gay

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Gaimardia Gaudich.

Gaimardia australis Gaudich.

Sin.: *Gaimardia pusilla* Gaudich.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

RHAMNACEAE

Colletia Comm. ex Juss., nom. cons.

Colletia hystrix Clos

Sin.: *Colletia aciculata* Miers, *Colletia armata* Miers, *Colletia armata* Miers f. *subglabra* Sealy, *Colletia armata* Miers var. *insularis* Miers, *Colletia brevispina* Phil., *Colletia cataphracta* Miers, *Colletia dumosa* Miers, *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *dumosa* (Miers) Suess., *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *puberula* Speg., *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *veprecula* (Miers) Suess., *Colletia hystrix* Clos var. *brevispina* (Phil.) Reiche, *Colletia hystrix* Clos var. *brevispina* (Phil.) Reiche, *Colletia pungens* Miers, *Colletia spinosa* Lam., *Colletia spinosa* Lam. var. *armata* (Miers) Reiche, *Colletia spinosa* Lam. var. *cataphracta* (Miers) Reiche, *Colletia spinosa* Lam. var. *pungens* (Miers) Reiche, *Colletia spinosa* Lam. var. *tomentosa* Phil., *Colletia spinosa* Lam. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Colletia spinosa* Lam. var. *veprecula* (Miers) Reiche, *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. var. *valdiviana* (Phil.) Escal., *Colletia tomentosa* Phil., *Colletia valdiviana* Phil., *Colletia veprecula* Miers

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Colletia paradoxa (Spreng.) Escal.

Sin.: *Colletia bictonensis* Lindl., *Colletia cruciata* Gillies & Hook., *Colletia exserta* Klotzsch ex Reissek, *Colletia insidiosa* Reissek, *Condalia paradoxa* Spreng.

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLA, MAL, MON, ROC).

Colletia spartioides Bertero ex Colla

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(JFE).

Colletia spinosissima J.F. Gmel.

Sin.: *Colletia assimilis* N.E. Br., *Colletia atrox* Miers, *Colletia ferox* Gillies & Hook., *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *infausta* (N.E. Br.) Suess., *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *intricata* (Miers) Reiche, *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *invicta* (Miers) Reiche, *Colletia horrida* Willd., *Colletia infausta* N.E. Br., *Colletia intricata* Miers, *Colletia invicta* Miers, *Colletia kunthiana* Miers, *Colletia polyacantha* Humb. & Bonpl., *Colletia spinosa* Lam., *Colletia spinosa* Lam. var. *assimilis* (N.E. Br.) Suess., *Colletia spinosa* Lam. var. *miersii* Suess., *Colletia spinosa* Lam. var. *trifurcata* (N.E. Br.) Suess., *Colletia tenuicola* Miers, *Colletia trifurcata* N.E. Br., *Colletia weddelliana* Miers

Arbusto. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). URY(COL).

Colletia ulicina Gillies & Hook.

Sin.: *Colletia valenzuela* Bertero ex Steud., nom. nud.

Arbusto. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Colubrina Brongn.

Colubrina glandulosa Perkins var. **reitzii** (M.C. Johnst.) M.C. Johnst.

Sin.: *Colubrina rufa* Reissek, *Colubrina rufa* Reissek var. *reitzii* M.C. Johnst.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, SPE).

Colubrina retusa (Pittier) R.S. Cowan var. **latifolia** (Reissek) M.C. Johnst.

Sin.: *Colubrina retusa* (Pittier) R.S. Cowan subsp. *latifolia* (Reissek) Borhidi, *Colubrina vellozii* R.S. Cowan var. *latifolia* (Reissek) M.C. Johnst., *Colubrina vellozii* R.S. Cowan var. *paranaensis* M.C. Johnst., *Cormonema spinosum* (Vell.) Reissek var. *latifolium* Reissek

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAN, ITA, MIE, PAI).

Condalia Cav.

Condalia buxifolia Reissek

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(CLA, LAV, MON, RIV, SJO).

Condalia megacarpa A. Cast.

Arbusto. Endémica. 1100-1300 m.

Países: ARG(NEU).

Condalia microphylla Cav.

Sin.: *Condalia lineata* A. Gray, *Condalia lineata* A. Gray f. *erythrocarpa* Speg., *Condalia lineata* A. Gray f. *melanocarpa* Speg., *Condalia lineata* A. Gray f. *xanthocarpa* Speg., *Condalia microphylla* Cav. var. *lineata* (A. Gray) Chodat & Wilczek, *Ziziphus mirtoides* Ortega, nom. illeg.

Arbusto. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Condalia montana A. Cast.

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU).

Notas: De probable origen híbrido entre *Condalia buxifolia* Reissek y *Condalia microphylla* Cav.

Crumenaria Mart.

Crumenaria erecta Reissek

Sin.: *Crumenaria choretroides* Mart. ex Reissek, *Crumenaria choretroides* Mart. ex Reissek var. *hirtella* Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek, *Crumenaria polygaloides* Reissek f. *lancifolia* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *glabrescens* Hassl., nom. illeg., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *lancifolia* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

Crumenaria lilloi Suess.

Sin.: *Crumenaria polygaloides* Reissek f. *glabrata* Chodat & Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek subsp. *paraguariensis* Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *aurea* Chodat & Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *discolor* Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *foliosa* Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, SPE).

Discaria Hook.

Discaria americana Gillies & Hook.

Sin.: *Colletia longispina* Hook. & Arn., *Colletia longispina* Hook. & Arn. var. *foliosa* Hook. & Arn., *Discaria exilis* (Miers) Herter, *Discaria febrifuga* Mart., *Discaria gracilentia* (Miers) Herter, *Discaria longispina* (Hook. & Arn.) Miers, *Discaria longispina* (Hook. & Arn.) Miers var. *foliosa* Griseb., *Discaria lycioides* Mart., *Discaria lycioides* Mart. var. *exilis* Miers, *Discaria spiculata* Miers, *Discaria spiculata* Miers var. *gracilentia* Miers

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MEN, RNE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(LAV, MAL, MON, RIV, TAC).

Discaria articulata (Phil.) Miers

Sin.: *Colletia articulata* Phil., *Discaria articulata* (Phil.) Kuntze, comb. superfl., *Retanilla articulata* (Phil.) Miers

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Discaria chacaye (G. Don) Tortosa

Sin.: *Colletia chacaye* G. Don, *Colletia crenata* Clos, *Colletia discolor* Hook., *Colletia dumosa* Phil., *Colletia montana* Phil., *Colletia nivalis* Phil., *Colletia serratifolia* Vent. var. *foliosa* Hook. & Arn., *Discaria cognata* (Miers) Reiche, *Discaria cognata* (Miers) Speg., comb. illeg., *Discaria crenata* (Clos) Regel, *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *discolor* (Hook.) Suess., *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *dumosa* (Phil.) Suess., *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *integrifolia* (Speg.) Suess., *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *magellanica* (Miers) Suess., *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *montana* (Phil.) Suess., *Discaria discolor* (Hook.) Reiche, comb. illeg., *Discaria discolor* (Hook.) Speg., comb. illeg., *Discaria discolor* (Hook.) Weberb., *Discaria dumosa* (Phil.)

Reiche, *Discaria foliosa* (Hook. & Arn.)
 Reiche, *Discaria foliosa* (Hook. & Arn.)
 Speg., comb. illeg., *Discaria integrifolia*
 Speg., *Discaria magellanica* (Miers)
 Reiche, *Discaria montana* (Phil.) Reiche,
Discaria serratifolia (Vent.) Mart. var.
discolor (Hook.) Escal., *Discaria*
serratifolia (Vent.) Mart. var. *inermis*
 Escal., *Notophaena cognata* Miers,
Notophaena discolor (Hook.) Miers,
Notophaena foliosa (Hook. & Arn.) Miers,
Notophaena magellanica Miers

Arbusto o árbol. Endémica. 0-2300 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
 TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
 LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Gouania Jacq.

Gouania corylifolia Raddi

Liana. Nativa.
 Países: BRA(RGS).

Gouania latifolia Reissek

Sin.: *Gouania chrysophylla* Reissek,
Gouania mollis Reissek

Liana o epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU,
 CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE,
 PAI, SPE).

Gouania lupuloides (L.) Urb.

Sin.: *Banisteria lupuloides* L., *Gouania*
domingensis L., *Gouania virgata* Reissek,
Rhamnus domingensis Jacq.

Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). PRY(APA).

Gouania polygama (Jacq.) Urb.

Sin.: *Gouania blanchetiana* Miq., *Gouania*
tomentosa Jacq., *Gouania ursinicarpa*
 Rusby, *Lupulus lupuloides* (L.) Kuntze var.
tomentosus (Jacq.) Kuntze, *Rhamnus*
polygama Jacq.

Liana o epífita. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
 BRA(PAR). PRY(APY).

Gouania ulmifolia Hook. & Arn.

Sin.: *Gouania urticifolia* Reissek, *Lupulus*
lupuloides (L.) Kuntze var. *ulmifolius*
 (Hook. & Arn.) Kuntze

Liana o epífita. Nativa. 0-600 m.
 Países: ARG(COS, ERI, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA,
 GUA, SPE). URY(ART, RNO).

Hovenia Thunb.

Hovenia dulcis Thunb.

Árbol. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA,
 GUA, PAI).

Kentrothamnus Suess. & Overkott

Kentrothamnus weddellianus (Miers) M.C. Johnst.

Sin.: *Colletia foliosa* Rusby, *Colletia*
foliosa Rusby var. *microphylla* Kuntze,
Discaria weddelliana (Miers) Escal.,
Kentrothamnus foliosus (Rusby) Suess.,
Kentrothamnus penninervius Suess. &
 Overkott, *Trevoa weddelliana* Miers
 Arbusto. Nativa. 2500-3800 m.
 Países: ARG(JUJ).

Ochetophila Poepp. ex Endl.

Ochetophila nana (Clos) J. Kellerm., Medán & Aagesen

Sin.: *Colletia nana* Clos, *Colletia*
stipellacea Phil., *Discaria nana* (Clos)
 Benth. & Hook. ex Weberb., *Discaria nana*
 (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb. var.

inermis Kuntze, *Discaria nana* (Clos)
 Benth. & Hook. ex Weberb. var. *prostrata*
 Hicken, nom. inval., *Discaria nana* (Clos)
 Benth. & Hook. ex Weberb. var. *spinosa*
 Kuntze, *Discaria prostrata* (Miers) Reiche,
 nom. illeg., *Discaria prostrata* (Miers)
 Reiche var. *inermis* Chodat & Wilczek,
 nom. nud., *Discaria prostrata* (Miers)
 Reiche var. *nana* (Clos) Suess., nom.
 illeg., *Ochetophila parvifolia* Miers,
Ochetophila prostrata Miers, nom. superfl.

Arbusto. Endémica. 1000-3800 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
 SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
 BIO, ARA, RME).

Ochetophila trinervis (Gillies ex Hook. & Arn.) Poepp. ex Endl.

Sin.: *Ceanothus divergens* Poepp. ex
 Endl., nom. nud., *Ceanothus riparius*
 Poepp. ex Endl., nom. nud., *Chacaya*
trinervis (Gillies ex Hook. & Arn.) Escal.,
Colletia doniana Clos, *Colletia inermis*
 Clos ex Miers, nom. inval., *Discaria*
doniana (Clos) Weberb., *Discaria trinervis*
 (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche,
Ochetophila divergens (Poepp. ex Endl.)
 Steud., nom. inval., *Ochetophila*
hookeriana Reissek ex Clos, nom.
 superfl., *Ochetophila riparia* (Poepp. ex
 Endl.) Steud., nom. inval., *Rhamnus*
linearis Clos, *Sageretia divergens* (Poepp.
 ex Endl.) Steud., nom. inval., *Sageretia*
riparia (Poepp. ex Endl.) Steud., nom.
 inval., *Sageretia trinervis* Gillies ex Hook.
 & Arn.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-3500 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
 SCR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
 MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Retanilla (DC.) Brongn.

Retanilla ephedra (Vent.) Brongn.

Sin.: *Colletia ephedra* Vent., *Colletia obcordata* Vent., *Retanilla crassa* Phil., *Retanilla ephedra* (Vent.) Brongn. var. *crassa* (Phil.) Reiche, *Retanilla moelleri* Phil., *Retanilla obcordata* (Vent.) Brongn.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Retanilla patagonica (Speg.) Tortosa

Sin.: *Trevoa patagonica* Speg.

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Retanilla stricta Hook. & Arn.

Sin.: *Retanilla affinis* Clos, *Trevoa frutilla* Steud., nom. nud.

Arbusto. Endémica. 200-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.

Sin.: *Colletia trebu* Bertero ex Colla ap. Savi, *Trevoa trinervia* Gillies & Hook., *Trevoa trinervis* Miers, nom. illeg., *Trevoa trinervis* Miers, nom. nud.

Arbusto. Endémica. 0-1700 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Rhamnidium Reissek**Rhamnidium elaeocarpum** Reissek

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Rhamnidium glabrum Reissek

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

Rhamnidium hasslerianum Chodat

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(APA, CAU, SPE).

Rhamnidium riograndense Figueira

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: BRA(RGS).

Rhamnus L.**Rhamnus cathartica** L.

Arbolito. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, ERI).

Rhamnus diffusus Clos

Sin.: *Colletia maytenioides* Griseb., *Sciadophila maytenoides* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR).

Rhamnus sphaerosperma Sw. var. **pubescens** (Reissek) M.C. Johnst.

Sin.: *Ceanothus pubescens* Ruiz & Pav., *Frangula boliviana* (Rusby) Grubov, *Frangula chrysophylla* Reissek, *Frangula citrifolia* (Rusby) Grubov, *Frangula nervosa* Grubov, *Frangula peruviana* Grubov, *Frangula polymorpha* Reissek, *Frangula polymorpha* Reissek var. *latifolia* Chodat, *Frangula polymorpha* Reissek var. *pubescens* Reissek, *Frangula polymorpha* Reissek var. *tomentosa* Reissek, *Frangula pubescens* (Ruiz & Pav.) Grubov, *Rhamnus boliviana* Rusby, *Rhamnus chrysophylla* (Reissek) Weberb., *Rhamnus citrifolia* Rusby, *Rhamnus jelskii* Szyszyl., *Rhamnus polymorpha* (Reissek) Weberb., *Rhamnus polymorpha* (Reissek) Weberb. var. *glabra* (Reissek) Dusén, *Rhamnus pubescens* (Ruiz & Pav.) Triana & Planch. non Poir., *Rhamnus pubescens* (Ruiz & Pav.) Triana & Planch. non Poir. var. *chrysophylla* (Reissek) Kuntze, *Rhamnus pubescens*

(Ruiz & Pav.) Triana & Planch. non Poir. var. *glabrescens* Kuntze, *Rhamnus pubescens* (Ruiz & Pav.) Triana & Planch. non Poir. var. *grandifolia* Perkins, *Rhamnus sectipetala* Mart. ex Reissek, nom. nud.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, ITA).

Sageretia Brongn.**Sageretia elegans** (Kunth) Brongn.

Sin.: *Gouania lehmanii* Hieron., *Rhamnus elegans* Kunth, *Sageretia lehmanii* (Hieron.) Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Sarcomphalus P. Browne**Sarcomphalus joazeiro** (Mart.) Hauenschild

Sin.: *Ziziphus cotinifolia* Reissek, *Ziziphus gardneri* Reissek, *Ziziphus guaranitica* Malme, *Ziziphus joazeiro* Mart., *Ziziphus pseudojoazeiro* Mansf.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, SPE).

Sarcomphalus mistol (Griseb.) Hauenschild

Sin.: *Ziziphus mistol* Griseb., *Ziziphus oblongifolius* S. Moore, *Ziziphus weberbaueri* Pilg.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU,

SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CHO, CON, NAS, PHA).

Scutia Brongn.

Scutia arenicola (Casar.) Reissek

Sin.: *Adolia arenicola* (Casar.) Kuntze, *Rhamnus arenicola* Casar.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Scutia buxifolia Reissek

Sin.: *Adolia buxifolia* (Reissek) Kuntze, *Rhamnus coronula* Larrañaga, *Scutia buxifolia* Reissek var. *acutifolia* Reissek, *Scutia buxifolia* Reissek var. *obtusifolia* Reissek, *Scutia fiebrigii* Perkins

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Trevoa Miers

Trevoa quinquenervia Gillies & Hook.

Sin.: *Colletia tralhuén* Bertero ex Colla ap. Savi, *Talguenea costata* Hook. & Arn., nom. illeg., *Talguenea costata* Miers, *Talguenea mollis* Miers, nom. illeg., *Talguenea quinquenervia* (Gillies & Hook.) I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-2200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

RHIZOPHORACEAE

Rhizophora L.

Rhizophora mangle L.

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

ROSACEAE

Acaena Mutis ex L.

Acaena alpina Poepp. ex Walp.

Sin.: *Acaena digitata* Phil., *Acaena digitata* Phil. var. *latifoliolata* Bitter, *Acaena digitata* Phil. var. *subpinnata* Bitter

Hierba. Endémica. 2200-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Acaena antarctica Hook. f.

Sin.: *Acaena antarctica* Hook. f. var. *argutidentata* Bitter, *Acaena microcephala* Schltdl., *Acaena pearcei* Phil., *Acaena pearcei* Phil. var. *glabrinervis* Bitter, *Acaena pumila* Phil., hom. illeg., *Acaena tenuifolia* Bitter

Hierba. Endémica. 1000-1600 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Acaena argentea Ruiz & Pav.

Sin.: *Acaena argentea* Ruiz & Pav. f. *epargyrea* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. f. *nigricans* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. f. *viridis* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *breviscapa* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *coriacea* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *grandiceps* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *interrupte-pinnata* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *lanigera* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *longifolia* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *subcalvescens* Bitter, *Ancistrum argenteum* (Ruiz & Pav.) Kunth

Hierba. Endémica. 700-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, JFE).

Acaena caespitosa Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Acaena chamaegeron* Bitter, *Acaena chubutensis* Bitter, *Acaena pulvinata* Kuntze, *Acaena tomentosa* Bitter

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Acaena confertissima Bitter

Sin.: *Acaena confertissima* Bitter var. *breviscapa* Bitter, *Acaena confertissima* Bitter var. *intermedia* Bitter, *Acaena confertissima* Bitter var. *majuscula* Bitter

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Acaena eupatoria Cham. & Schltdl.

Sin.: *Acaena eupatoria* Cham. & Schltdl. var. *glomerulans* Bitter, *Acaena eupatoria* Cham. & Schltdl. var. *simplex* Bitter, *Acaena montevidensis* Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MON, SOR, TAC).

Acaena fuscescens Bitter

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acaena integerrima Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Acaena adenocarpa* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *basiinermis* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *microphylla* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *pedicellata* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *tridentata* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *undiquearmata* Bitter, *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn. var. *erectifolia* Bitter, *Acaena*

integerrima Gillies ex Hook. & Arn. var. *latifrons* Bitter, *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn. var. *subpilosicupula* Bitter
Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

***Acaena leptacantha* Phil.**

Sin.: *Acaena capitata* Phil., *Acaena leptacantha* Phil. subsp. *connectens* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *conferta* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *longissima* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *negeri* (E. Duse) Bitter, *Acaena macrocephala* Poepp. var. *negeri* E. Duse
Hierba. Endémica. 1000-1700 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

***Acaena lucida* (Aiton) Vahl**

Sin.: *Acaena lucida* (Aiton) Vahl var. *abbreviata* Bitter, *Acaena lucida* (Aiton) Vahl var. *glabratula* Bitter, *Acaena lucida* (Aiton) Vahl var. *villosula* Bitter, *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg., *Acaena lucida* Vahl var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Acaena parvifolia* Phil., *Ancistrum lucidum* Aiton, *Ancistrum lucidum* Lam., nom. illeg., *Poterium lucidum* (Aiton) Salisb.

Hierba. Endémica. 700-1100 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

***Acaena macrocephala* Poepp.**

Sin.: *Acaena lucida* (Aiton) Vahl var. *intermedia* Bitter, *Acaena macrocephala* Poepp. var. *caput-medusae* Bitter, nom. inval., *Acaena nivalis* Phil., *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *macrocephala* (Poepp.) Kuntze

Hierba. Endémica. 900-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR).

***Acaena magellanica* (Lam.) Vahl**

Sin.: *Acaena acroglochin* Bitter, *Acaena acutifida* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl subsp. *georgiae-australis* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl subsp. *glabriscapa* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl var. *luxurians* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl var. *macrochaeta* Franch., *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl var. *semperpilosa* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl var. *utrinqueglabrescens* Bitter, *Acaena affinis* Hook. f., *Acaena alboffii* Macloskie, *Acaena brachyglochin* Bitter, *Acaena cadilla* Hook. f., *Acaena canescens* Phil., *Acaena chamaecaena* Bitter, *Acaena closiana* Gay, *Acaena colchaguensis* Bitter, *Acaena compacta* Hauman, *Acaena coxi* Phil., *Acaena depauperata* Bitter, *Acaena exaltata* Bitter, *Acaena floribunda* Bitter, *Acaena glandulifera* Bitter, *Acaena glaucella* Bitter, *Acaena grandistipula* Bitter, *Acaena grossifolia* Bitter, *Acaena hirsuta* Phil., *Acaena hirta* Citerne, *Acaena humilis* Bitter, *Acaena ischnostemon* Bitter, *Acaena krausei* Phil., *Acaena krausei* Phil. var. *glabratula* Bitter, *Acaena krausei* Phil. var. *hirsuta* (Phil.) Reiche, *Acaena krausei* Phil. var. *massonandra* Bitter, *Acaena krausei* Phil. var. *meionandra* Bitter, *Acaena krausei* Phil. var. *pilosior* Bitter, *Acaena laevigata* Aiton, *Acaena laevigata* Aiton var. *venulosa* (Griseb.) Reiche, *Acaena longiaristata* H. Ross, *Acaena longistigma* Bitter, *Acaena longistipula* Bitter, *Acaena macrophytes* Bitter, *Acaena macropoda* Bitter, *Acaena macrostemon* Hook. f., *Acaena macrostemon* Hook. f. subsp. *closiana* (Gay) Bitter, *Acaena macrostemon* Hook. f. subsp. *latisepala* Bitter, *Acaena macrostemon* Hook. f. subsp. *longiaristata* (H. Ross) Bitter, *Acaena macrostemon* Hook. f. var. *basipilosa* Bitter, *Acaena magellanica*

(Lam.) Vahl subsp. *grandiscapa* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *laevigata* (Aiton) Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *pygmaea* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *subtuspilosa* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *venulosa* (Griseb.) Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl var. *glabrescens* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl var. *pubescens* Bitter, *Acaena neglecta* Bitter, *Acaena nudicaulis* Albov, *Acaena obtusiloba* Bitter, *Acaena oligodonta* Bitter, *Acaena oligoglochin* Bitter, *Acaena oligomera* Skottsb., *Acaena petiolulata* Phil., *Acaena philippii* Gand., *Acaena plioglochin* Bitter, *Acaena rubescens* Bitter, *Acaena sericascens* Bitter, *Acaena sericascens* Bitter var. *sexjuga* Bitter, *Acaena sericascens* Bitter var. *tenuibracteolata* Bitter, *Acaena subflaccida* Bitter, *Acaena subtusvillosula* Bitter, *Acaena tomentella* Bitter, *Acaena transitoria* Bitter, *Acaena venulosa* Griseb., *Ancistrum magellanicum* Lam., *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *glabrescens* Wedd.

Hierba. Nativa. 100-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

***Acaena masafuerana* Bitter**

Hierba. Endémica. 1000-1100 m.

Países: CHL(JFE).

***Acaena myriophylla* Lindl.**

Sin.: *Acaena hieronymi* Kuntze, *Acaena hieronymi* Kuntze var. *elegantula* Bitter, *Acaena hieronymi* Kuntze var. *robusta* Bitter

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS).

Acaena ovalifolia Ruiz & Pav.

Sin.: *Acaena elegans* Gay, *Acaena micranthera* Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. subsp. *elegans* (Gay) Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. var. *chubutensis* Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. var. *elegans* (Gay) Reiche, *Acaena tenuipila* Bitter

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Acaena patagonica A. Martic.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG, RME).

Acaena pinnatifida Ruiz & Pav.

Sin.: *Acaena arthrotricha* Bitter, *Acaena calcitrapa* Phil., *Acaena euacantha* Phil., *Acaena leptophylla* Phil., *Acaena longifolia* Phil., *Acaena multifida* Hook. f., *Acaena multifida* Hook. f. subsp. *alaticonnata* Bitter, *Acaena multifida* Hook. f. subsp. *intercedens* Bitter, *Acaena multifida* Hook. f. subsp. *multiglomerulans* Bitter, *Acaena multifida* Hook. f. subsp. *quinquefida* Bitter, *Acaena multifida* Hook. f. var. *glaberrima* Speg., *Acaena multifida* Hook. f. var. *utrinquepilosa* Bitter, *Acaena oligacantha* Phil., *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *heterotricha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *hypoleuca* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *liocarpa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *longifolia* (Phil.) Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *nudiscapa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *oligacantha* (Phil.) Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp.

placantha Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *aconcaguensis* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *calcitrapa* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *depauperata* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *euacantha* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *eucantha* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *glabrata* Speg., *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *intermedia* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *leptophylla* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *longifolia* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *macrura* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *oligacantha* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *parvifrons* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *uspatensis* Bitter

Hierba. Endémica. 1300-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Acaena platyacantha Speg.

Sin.: *Acaena platyacantha* Speg. var. *brachyacantha* Bitter, *Acaena platyacantha* Speg. var. *parvifolia* Speg., *Acaena platyacantha* Speg. var. *trigonacantha* Bitter, *Acaena rahuensis* Kalela

Hierba. Endémica. 900-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

Acaena poeppigiana Gay

Sin.: *Acaena pseudopoeppigiana* Kalela, *Acaena skottsbergii* Bitter

Hierba. Endémica. 2400-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, MAG, RME).

Acaena pumila Vahl

Sin.: *Acaena glaberrima* Phil., *Acaena pumila* Vahl var. *acrocoma* Bitter, *Acaena pumila* Vahl var. *glaberrima* (Phil.) Bitter, *Ancistrum pumilum* (Vahl) Poir.

Hierba. Endémica. 900-1100 m.

Países: ARG(TDF). CHL(LSR, LLA, AIS, MAG).

Acaena sericea J. Jacq.

Sin.: *Acaena cuneata* Hook. & Arn., *Acaena fuegina* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, LBO, MAG, RME).

Acaena splendens Hook. & Arn.

Sin.: *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *brachyphylla* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *brevisericea* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *gracilis* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *macrophylla* Bitter

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Acaena stricta Griseb.

Sin.: *Acaena anserinella* Bitter, *Acaena anserinella* Bitter var. *elatissima* Bitter, *Acaena anserinella* Bitter var. *stuckertii* Bitter, *Acaena polycarpa* Griseb., *Acaena polycarpa* Griseb. subsp. *lilloi* Bitter, *Acaena polycarpa* Griseb. var. *brevifilamentosa* Bitter, *Acaena polycarpa* Griseb. var. *longifilamentosa* Bitter, *Acaena stricta* Griseb. var. *latifoliolata* Bitter, *Acaena stricta* Griseb. var. *valdepilosa* Bitter

Hierba. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Acaena tenera Albov

Sin.: *Acaena antarctica* Hook. f. var. *laxiuscula* Bitter

Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Acaena trifida Ruiz & Pav. var. **glabrescens** Regel & Körn.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, RME).

Acaena trifida Ruiz & Pav. var. **trifida**

Sin.: *Acaena quinquefida* Phil., *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *argentella* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *brachyphylla* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *mollissima* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *nanodes* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *plurifoliolata* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *quinquefida* (Phil.) Reiche, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *robusta* Bitter
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Agrimonia L.

Agrimonia hirsuta Bong.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Agrimonia parviflora Aiton

Sin.: *Agrimonia eupatoria* L. var. *parviflora* (Aiton) Hook., *Eupatorium parviflorum* (Aiton) Nieuwl.
Hierba. Introducida. 1000-2500 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Agrimonia villosa Cham. & Schldl.

Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Alchemilla L.

Alchemilla arvensis (L.) Scop.

Sin.: *Alchemilla aphanes* Leers, *Aphanes arvensis* L., *Percepiar arvensis* (L.) Moench, *Potentilla arvensis* (L.) Christenh. & Väre

Hierba. Introducida. 1000-1700 m.
Países: ARG(CHU, MIS, NEU, RNE). BRA(SCA). CHL(ANT, COQ, LBO, ARA, LLA, RME).

Alchemilla bipinnatifida L.M. Perry

Sin.: *Lachemilla bipinnatifida* (L.M. Perry) Rothm.
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(TUC).

Alchemilla grisebachiana L.M. Perry

Sin.: *Alchemilla pedicellata* Rothm., *Lachemilla grisebachiana* (L.M. Perry) Rothm., *Lachemilla pedicellata* (Rothm.) Rothm.
Hierba. Endémica. 3500-4000 m.
Países: ARG(COR, SAL, TUC).

Alchemilla parodii I.M. Johnst.

Sin.: *Aphanes parodii* (I.M. Johnst.) Rothm.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, LPA, MIS, SLU, SCR, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(RNO, ROC, SJO, TAC).

Alchemilla pinnata Ruiz & Pav.

Sin.: *Alchemilla alata* Steud., *Alchemilla asplenifolia* Rothm., *Alchemilla calchaquina* Lillo, *Alchemilla pinnata* J. Remy, *Alchemilla pinnata* Ruiz & Pav. f. *robusta* Rothm., *Alchemilla pinnata* Ruiz & Pav. f. *rosulata* Pilg. ex Rothm., *Alchemilla pinnata* Ruiz & Pav. var. *minima* Wedd., *Aphanes alata* Steud., *Aphanes pinnata* (Ruiz & Pav.) Pers., *Lachemilla asplenifolia* (Rothm.) Rothm., *Lachemilla pinnata* (Ruiz & Pav.) Rothm., *Zygalthemilla pinnata* (Ruiz & Pav.) Rydb.

Hierba. Nativa. 3600-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Amelanchier Medik.

Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem.

Sin.: *Aronia alnifolia* Nutt.
Arbusto. Introducida. 900-1000 m.
Países: ARG(NEU).

Aphanes L.

Aphanes berteriana Rothm. f. **berteriana**

Hierba. Endémica. 200-900 m.
Países: CHL(LBO).

Aphanes berteriana Rothm. f. **vegeta** Rothm.

Hierba. Endémica. 200-900 m.
Países: CHL(LBO).

Aphanes looseri (Rothm.) Rothm.

Sin.: *Alchemilla looseri* Rothm.
Hierba. Endémica. 500-700 m.
Países: CHL(RME).

Aphanes neglecta (Rothm.) Rothm.

Sin.: *Alchemilla neglecta* Rothm.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Argentina Hill

Argentina anserina (L.) Rydb.

Sin.: *Argentina vulgaris* Lam., *Dactylophyllum anserina* (L.) Spenn., *Dasiphora anserina* (L.) Raf., *Fragaria anserina* (L.) Crantz, *Potentilla anserina*

L., *Potentilla argentina* Huds., *Tormentilla anserina* (L.) Stokes

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Cotoneaster Medik.

Cotoneaster franchetii Bois

Sin.: *Pyrus franchetii* (Bois) M.F. Fay & Christenh.

Arbusto. Introducida.

Países: ARG(COR, NEU, RNE). CHL(VAL).

Cotoneaster glaucophyllus Franch.

Sin.: *Pyrus glaucophylla* (Franch.) M.F. Fay & Christenh.

Arbusto. Introducida. 900-1600 m.

Países: ARG(COR).

Cotoneaster horizontalis Decne.

Sin.: *Pyrus horizontalis* (Decne.) M.F. Fay & Christenh.

Arbusto. Introducida. 1400-1600 m.

Países: ARG(COR).

Cotoneaster pannosus Franch.

Sin.: *Pyrus pannosa* (Franch.) M.F. Fay & Christenh.

Arbusto. Introducida. 1600-1700 m.

Países: ARG(COR).

Crataegus L.

Crataegus monogyna Jacq.

Árbol. Introducida.

Países: ARG(BAI, COR, NEU, RNE).

Cydonia Daubenton & P. Daubenton

Cydonia oblonga Mill.

Arbusto o árbol. Introducida.

Países: ARG(COR, NEU, RNE).

Duchesnea Sm.

Duchesnea indica (Andrews) Teschem f. **albocaput** Naruh.

Hierba. Introducida. 1000.

Países: ARG(TUC).

Fragaria L.

Fragaria chiloensis (L.) Mill.

Sin.: *Fragaria chilensis* Ehrh., *Fragaria chilensis* Ehrh. var. *tincta* Ser., *Fragaria chilensis* Molina, *Fragaria chiloensis* (L.) Duchesne, nom. inval., *Fragaria chiloensis* (L.) Mill. f. *patagonica* Staudt, *Fragaria chiloensis* (L.) Mill. var. *tincta* (Duchesne) Ser., *Fragaria tincta* Duchesne, *Fragaria vesca* L. var. *chiloensis* L., *Potentilla chiloensis* (L.) Mabb.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Fragaria vesca L.

Sin.: *Potentilla vesca* (L.) Scop.

Hierba. Introducida. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, NEU, RNE, SLU, TDF, TUC). BRA(SCA).

Geum L.

Geum andicola (Phil.) Reiche

Sin.: *Parageum andicola* (Phil.) M. Kral, *Sierversia andicola* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Geum boliviense Focke

Sin.: *Geum riojense* F. Bolle

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, ERI, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). URY(PAY).

Geum brevicarpellatum F. Bolle

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(COR).

Geum involucratum Juss. ex Pers.

Sin.: *Geum parviflorum* Comm. ex Sm., *Oncostylus involucratus* (Pers.) F. Bolle

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LLA, AIS, MAG).

Geum lechlerianum Schltdl.

Sin.: *Oncostylus lechlerianus* (Schltdl.) F. Bolle

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ARA, LLA).

Geum magellanicum Comm. ex Pers.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Geum quellyon Sweet

Sin.: *Geum chilense* Lindl. var. *grandiflorum* Lindl., *Geum chilense* Balb. ex Ser., *Geum coccineum* Lindl., hom. illeg., *Geum coccineum* Ser., hom. illeg., *Geum coccineum* Sibth. & Sm., *Geum grandiflorum* Steud., *Geum magellanicum* Hook. f., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Kageneckia Ruiz & Pav.

Kageneckia angustifolia D. DonSin.: *Kageneckia lanceolata* Ruiz & Pav.var. *angustifolia* (D. Don) Kuntze

Árbol. Endémica. 0-3200 m.

Países: ARG(COR, SLU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav.Sin.: *Kageneckia amygdalifolia* C. Presl,*Kageneckia glutinosa* Kunth, *Osteomeles pentlandiana* Decne.

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Kageneckia oblonga Ruiz & Pav.Sin.: *Kageneckia crataegifolia* Lindl.,*Kageneckia crataegoides* D. Don,*Kageneckia ovata* Colla, *Lydaea lyday* Molina

Árbol. Endémica. 300-600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Lachemilla (Kocke) Rydb.**Lachemilla diplophylla** (Diels) Rothm.Sin.: *Alchemilla diplophylla* Diels

Hierba. Nativa. 3900-4500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Lachemilla sandiensis (Pilg.) Rothm.Sin.: *Alchemilla sandiensis* Pilg.

Hierba. Nativa. 4500-4700 m.

Países: CHL(AYP).

Malus Mill.**Malus domestica** Borkh.Sin.: *Pyrus malus* L.

Arbusto. Introducida.

Países: ARG(CHU, COR, LPA, NEU, RNE).

Malus sylvestris (L.) Mill.Sin.: *Pyrus malus* L. var. *sylvestris* L.,*Pyrus pomum* M.F. Fay & Christenh.

Árbol. Introducida. 1000-1500 m.

Países: ARG(NEU).

Margyracaena Bitter**Margyracaena skottsbergii** Bitter

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: CHL(JFE).

Margyricarpus Ruiz & Pav.**Margyricarpus digynus** (Bitter) SkottsbergSin.: *Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav.var. *digynus* Bitter

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.

Países: CHL(JFE).

Margyricarpus lanatus Funez

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

Margyricarpus microcarpus Funez

Hierba. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Margyricarpus pinnatus (Lam.) KuntzeSin.: *Ancistrum barbatum* Lam.,*Empetrum pinnatum* Lam., *Margyricarpus**imberbis* C. Presl, *Margyricarpus laevis*Willd., *Margyricarpus patagonicus* Speg.,*Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav.,*Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav. var.*patagonicus* (Speg.) Speg., *Margyricarpus**setosus* Ruiz & Pav. var. *paucifoliolatus*

Bitter

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR,

RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). URY(MAL, ROC).

Polylepis Ruiz & Pav.**Polylepis australis** BitterSin.: *Polylepis australis* Bitter var. *bijuga*Bitter, nom. illeg., *Polylepis australis* Bittervar. *crenulata* Bitter, *Polylepis australis*Bitter var. *fuscotomentella* (Kuntze) Bitter,*Polylepis australis* Bitter var. *glabra*(Kuntze) Bitter, *Polylepis australis* Bittervar. *glabrescens* (Kuntze) Bitter, *Polylepis**australis* Bitter var. *latifoliolata* Bitter,*Polylepis australis* Bitter var. *oblanceolata*Bitter, nom. illeg., *Polylepis australis* Bittervar. *subcalva* Bitter, *Polylepis australis*Bitter var. *tucumanica* Bitter, *Polylepis**racemosa* Ruiz & Pav. var. *albotomentella*Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav.var. *fuscotomentella* Kuntze, *Polylepis**racemosa* Ruiz & Pav. var. *glabra* Kuntze,*Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var.*glabrescens* Kuntze, *Polylepis racemosa*Ruiz & Pav. var. *pubescens* Kuntze,*Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var.*pubinervia* Kuntze

Árbol. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,

SLU, TUC).

Polylepis crista-galli BitterSin.: *Polylepis crista-galli* Bitter var.*longiracemosa* Bitter

Árbol. Nativa.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Polylepis hieronymi Pilg.Sin.: *Polylepis hieronymi* Pilg. var.*dolicholopha* Bitter, *Polylepis hieronymi*Pilg. var. *saltensis* Bitter, *Polylepis**hypoleuca* (Wedd.) Bitter, *Polylepis**racemosa* Ruiz & Pav. var. *hypoleuca*

Wedd.

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Polylepis rugulosa Bitter

Sin.: *Polylepis tenuiruga* Bitter
Árbol. Nativa. 3000-4000 m.
Países: CHL(AYP).

Polylepis tarapacana Phil.

Sin.: *Polylepis tarapacana* Phil. var. *brevifilamentosa* Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *multisquama* Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *pynolopha* Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *sajamensis* Bitter
Árbol. Nativa. 3900-4700 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Polylepis tomentella Wedd.

Sin.: *Polylepis tomentella* Wedd. subsp. *dentatolata* Bitter, *Polylepis tomentella* Wedd. subsp. *pentaphylla* Bitter, *Polylepis tomentella* Wedd. subsp. *tetragona* Bitter, *Polylepis tomentella* Wedd. var. *pilosior* Bitter
Arbusto o árbol. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Potentilla L.

Potentilla anglica Laichard.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(LLA).

Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf

Sin.: *Duchesnea indica* (Andrews) Teschem f. *indica*, *Fragaria indica* Andrews
Hierba. Introducida. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MON).

Potentilla norvegica L.

Sin.: *Fragaria norvegica* (L.) Crantz, *Pentaphyllum norvegicum* (L.) Gaertn., *Potentilla dichotoma* Moench, *Potentilla monspeliensis* L. var. *norvegica* (L.) Farw., *Potentilla tucumanensis* A. Castagnaro & M. Arias, *Tridophyllum norvegicum* (L.) Greene
Hierba. Endémica. 300-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SLU, TUC).

Potentilla recta L.

Sin.: *Fragaria recta* (L.) Crantz, *Pentaphyllum rectum* (L.) Lunell, *Potentilla hirta* L. subsp. *recta* (L.) Briq., *Potentilla hirta* L. var. *recta* (L.) Ser., *Tormentilla recta* (L.) Wahlenb.
Hierba. Introducida. 500-800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Potentilla reptans L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(RME).

Prunus L.

Prunus armeniaca L.

Sin.: *Amygdalus armeniaca* (L.) Dumort., *Armeniaca armeniaca* (L.) Huth, *Armeniaca vulgaris* Lam., *Prunus armeniaca* L. subsp. *vulgaris* Dippel, *Prunus tiliifolia* Salisb.
Árbol. Introducida. 100-200 m.
Países: ARG(COR, LPA).

Prunus avium (L.) L.

Sin.: *Cerasus avium* (L.) Moench, *Prunus cerasus* L. var. *avium* L.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE).

Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) D. Dietr.

Sin.: *Cerasus brasiliensis* Cham. & Schltdl., *Lauro-cerasus brasiliensis* (Cham. & Schltdl.) M. Roem., *Prunus brasiliensis* (Cham. & Schltdl.) D. Dietr. var. *gardneri* Koehne, *Prunus chamissoana* Koehne, *Prunus sphaerocarpa* Hook. f., *Prunus sphaerocarpa* Hook. f. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Prunus sphaerocarpa* Hook. f. f. *subcoriacea* Chodat & Hassl., *Prunus subcoriacea* (Chodat & Hassl.) Koehne

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, ITA). URY(RIV, TAC, TYT).

Prunus brittoniana Rusby

Sin.: *Lauro-cerasus brittoniana* (Rusby) C.K. Schneid., *Prunus tucumanensis* Lillo
Árbol. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Prunus cerasus L.

Sin.: *Cerasus cerasus* (L.) Eaton & Wright, *Druparia cerasus* (L.) Clairv., *Prunus avium* (L.) L. subsp. *cerasus* (L.) Rouy & E. G. Camus
Árbol. Introducida.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(JFE).

Prunus domestica L.

Sin.: *Prunus communis* Huds. subsp. *domestica* (L.) Syme, *Prunus communis* Huds. var. *domestica* (L.) Huds., *Prunus sativa* Rouy & E.G. Camus subsp. *domestica* (L.) Rouy & E. G. Camus, *Prunus spinosa* L. var. *domestica* (L.) H. Groves & J. Groves
Árbol. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, RNE).

Prunus instititia L.

Arbolito. Introducida. 700-800 m.
Países: ARG(COR).

Prunus laurocerasus L.

Sin.: *Cerasus laurocerasus* (L.) Dum.
Cours., *Lauro-cerasus officinalis* M.
Roem., *Padus laurocerasus* (L.) Mill.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Prunus ligustrina Koehne

Árbol. Endémica. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAA, PAI).

Prunus mahaleb L.

Sin.: *Cerasus mahaleb* (L.) Mill., *Mahaleb vulgaris* Takht., *Padellus mahaleb* (L.)
Vassilcz., *Padus mahaleb* (L.) Borkh.
Arbusto. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, NEU, RNE, SLU).

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

Sin.: *Celastrus myrtifolia* L., *Prunus sellowii* Koehne
Arbolito o árbol. Nativa. 100-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prunus oleifolia Koehne

Sin.: *Prunus douglasii* Basualdo & Zardini
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON, PAI).

Prunus omissa Koehne

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA, PAI).

Prunus padus L.

Sin.: *Cerasus padus* (L.) Delarbre,
Druparia padus (L.) Clairv., *Padus avium*
Mill., *Prunus racemosa* Lam., nom.
superfl.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Prunus persica (L.) Batsch

Sin.: *Amygdalus communis* L. var. *persica*
(L.) Risso, *Amygdalus persica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch var. *apocarpa* Burkart
Arbusto o árbol. Introducida. 1000-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, TUC).

Prunus ravenii Zardini & Basualdo

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, CAU, MIE, PAI, SPE).

Prunus reflexa (Gardner) Walp.

Sin.: *Cerasus reflexa* Gardner
Árbol. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Prunus ulei Koehne

Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pyracantha M. Roem.**Pyracantha angustifolia** (Franch.) C.K. Schneid.

Sin.: *Cotoneaster angustifolius* Franch.
Arbusto o arbolito. Introducida. 1500-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, SAL, SLU, TUC).

Pyracantha coccinea M. Roem.

Arbusto. Introducida.
Países: ARG(BAI, SLU).

Pyracantha crenulata (D. Don) M. Roem.

Sin.: *Cotoneaster crenulatus* (D. Don) K. Koch, *Crataegus crenulata* (D. Don) Roxb., *Crataegus pyracantha* (L.) Medik. var. *crenulata* (D. Don) Loudon, *Mespilus crenulata* D. Don, *Photinia fortuneana* Maxim., *Pyracantha atalantioides* (Hance)

Stapf, *Pyracantha fortuneana* (Maxim.)
H.L. Li, *Sportella atalantioides* Hance
Arbusto. Introducida. 600-1300 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, NEU, RNE, SAL, SLU).

Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder

Sin.: *Cotoneaster koidzumii* Hayata
Arbusto. Introducida.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, RNE).

Rhaphiolepis Lindl.**Rhaphiolepis bibas** (Lour.) Galasso & Banfi

Sin.: *Crataegus bibas* Lour., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Mespilus japonica* Thunb., *Pyrus bibas* (Lour.) M.F. Fay & Christenh., *Rhaphiolepis loquata* B.B. Liu & J. Wen
Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Rosa L.**Rosa canina** L.

Sin.: *Crepinia canina* (L.) Gand., *Rosa communis* Rouy
Arbusto. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, LLA, RME).

Rosa rubiginosa L.

Sin.: *Chabertia rubiginosa* (L.) Gand., *Rosa eglanteria* L., nom. ambig.
Arbusto. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Rosa sicula Tratt.

Arbusto. Introducida.
Países: ARG(CHU, MEN).

Rubus L.

Rubus boliviensis Focke

Subarbusto. Nativa.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(RGS).

Rubus brasiliensis Mart.

Sin.: *Rubus bogotensis* Kunth var. *brasiliensis* (Mart.) Kuntze, *Rubus brasiliensis* Mart. var. *organensis* (Gardner) Hook. f., *Rubus organensis* Gardner

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Keller & Tressens (2008: 176) la citan para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia.

Rubus caesius L.

Sin.: *Rubus fruticosus* L. subsp. *caesius* (L.) Syme, *Rubus fruticosus* L. var. *caesius* (L.) Fiori, *Rubus polymorphus* K.F.Schimp. & Spann. var. *caesius* (L.) Spann., *Selnorition caesius* (L.) Raf. ex B.D. Jacks.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).

Rubus constrictus P.J. Müll. & Lefèvre

Arbusto. Introducida. 0-1200 m.
Países: CHL(COQ, BIO, ARA, LSR, LLA).

Rubus erythroclados Mart.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Especie excluida de la Flora Argentina

Rubus fruticosus L.

Arbusto. Introducida.
Países: ARG(BAI, ERI).

Rubus geoides Sm.

Sin.: *Dalibarda geoides* (Sm.) Pers., *Rubus antarcticus* Kuntze, nom. superfl.
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Rubus hassleri Chodat

Sin.: *Rubus urticifolius* Poir. var. *hassleri* (Chod.) Focke
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(MIS). PRY(APA).

Rubus imperialis Cham. & Schltdl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
Notas: Citada para Uruguay (Reitz, 1996) sin indicar localidad o material de referencia.

Rubus nitidus Weihe & Nees

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, JUJ).

Rubus niveus Thunb.

Arbusto. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Rubus paraguariensis (Chodat & Hassl.)

Basualdo & Zardini
Sin.: *Rubus hassleri* Chodat var. *paraguariensis* Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAA, SPE).

Rubus phoenicolasius Maxim.

Arbusto. Introducida. 1200-1300 m.
Países: ARG(COR).

Rubus praecox Bertol.

Arbusto. Introducida.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE).

Rubus radicans Cav.

Hierba. Introducida. 900-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Rubus rosifolius Sm. var. **coronarius** Sims

Arbusto. Introducida. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rubus rosifolius Sm. var. **rosifolius**

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Rubus sellowii Cham. & Schltdl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, ITA).

Rubus ulmifolius Schott

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU). BRA(PAR, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(LAV).

Rubus urticifolius Poir.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, PAI).

Sanguisorba L.

Sanguisorba minor Scop.

Sin.: *Pimpinella sanguisorba* (L.) Gaertn., *Poterium minus* (Scop.) Gray, *Poterium sanguisorba* L., *Sanguisorba sanguisorba* (L.) Britton

Hierba. Introducida. 0-1800 m.
Países: ARG(COR, LPA, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Sorbus L.

Sorbus aucuparia L.

Sin.: *Pyrus aucuparia* (L.) Gaertn.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Spiraea L.

Spiraea cantoniensis Lour.

Arbolito. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Spiraea douglasii Hook.

Sin.: *Drimopogon douglasii* (Hook.) B.D. Jacks.
Arbusto. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Tetraglochin Poepp.

Tetraglochin alata (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. **alata**

Sin.: *Margyricarpus alatus* Gillies ex Hook. & Arn., *Margyricarpus ameghinoi* Speg., *Margyricarpus microphylla* (Phil.) Speg., *Margyricarpus strictus* (Poepp.) J.F. Macbr., *Tetraglochin alata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *ameghinoi* (Speg.) Ciald. & Pometti, *Tetraglochin alata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *patagonica* Grondona, *Tetraglochin ameghinoi* (Speg.) Speg., *Tetraglochin microphylla* Phil., *Tetraglochin stricta* Poepp.
Arbusto. Nativa. 100-3100 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Tetraglochin andina Ciald.

Arbusto. Endémica. 1700-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Tetraglochin caespitosa Phil.

Sin.: *Margyricarpus acanthocarpa* Speg., *Margyricarpus caespitosum* (Phil.) I.M. Johnston., *Margyricarpus microphylla* Niederl., hom. illeg., *Margyricarpus niederleinii* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. f. *dasycarpa* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. f. *lasiocarpa* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. f. *leiocarpa* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. f. *macropoda* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. var. *typica* Speg., nom. inval.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 400-2100 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Tetraglochin clarazii (Ball) J.M. Acosta & P. Moroni

Sin.: *Margyricarpus clarazii* Ball
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU).

Tetraglochin cristata (Britton) Rothm.

Sin.: *Margyricarpus cristatus* Britton, *Margyricarpus paucijugatus* I.M. Johnston., *Tetraglochin paucijugata* (I.M. Johnston.) Rothm., *Tetraglochin tragacantha* Rothm.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 2000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Tetraglochin inermis (I.M. Johnston.) Rothm.

Sin.: *Margyricarpus inermis* I.M. Johnston.
Arbusto. Nativa. 3000-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

RUBIACEAE

Alibertia A. Rich. ex DC.

Alibertia edulis (Rich.) A. Rich.

Sin.: *Borojoa lanceolata* (Cham.) Cuatrec., *Genipa edulis* Rich., *Thieleodoxa lanceolata* Cham.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON, PHA).

Alibertia latifolia (Benth.) K. Schum.

Sin.: *Cordia latifolia* Benth.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(PAR). PRY(CEN, CON, COA, MIE, PAI).

Alseis Schott

Alseis floribunda Schott

Sin.: *Alseis floribunda* Schott var. *burchelliana* K. Schum., *Alseis floribunda* Schott var. *selloana* K. Schum., *Alseis floribunda* Schott var. *tomentosa* K. Schum.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Amaioua Aubl.

Amaioua guianensis Aubl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Amaioua intermedia Mart.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bathysa C. Presl

Bathysa australis (A. St.-Hil.) K. Schum.

Sin.: *Bathysa meridionalis* L.B. Sm. & Downs, *Elaeagia glomiflora* Standl., *Exostema australe* A. St.-Hil., *Voigtia australis* Klotzsch

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Borreria G. Mey.

Borreria alata (Aubl.) DC.

Sin.: *Spermacoce alata* Aubl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Borreria argentea Cham.

Sin.: *Spermacoce argentea* (Cham.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU).

Borreria brachystemonoides Cham. & Schltdl.

Sin.: *Spermacoce brachystemonoides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, CON, ITA, ÑEE). URY(RIV, TAC).

Borreria brownii (Rusby) Standl.

Sin.: *Borreria staurochlamys* R.E. Fr., *Borreria vegeta* Standl. & Steyer., *Spermacoce brownii* Rusby, *Spermacoce vegeta* (Standl. & Steyer.) C.D. Adams

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Borreria cupularis DC.

Sin.: *Spermacoce cupularis* (DC.) Kuntze, *Spermacoce pusilla* Pohl

Subarbusto. Nativa. 100-900 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APY, AMA, CAN, GUA).

Borreria dasycephala (Cham. & Schltdl.)

Bacigalupo & E.L. Cabral

Sin.: *Borreria advena* Fisch. & C.A. Mey., *Diodia dasycephala* Cham. & Schltdl., *Spermacoce dasycephala* (Cham. & Schltdl.) P.G. Delprete

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLA, MON, RIV, ROC).

Borreria kelleri L.M. Miguel & E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 100-300 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, AMA, CON, SPE).

Borreria krapocarmeniana E.L. Cabral & L. Miguel

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(CAN, GUA, ITA, SPE).

Borreria latifolia (Aubl.) K. Schum.

Sin.: *Borreria fockeana* Miq., *Borreria latifolia* (Aubl.) K. Schum. f. *fockeana* (Miq.) Steyer., *Borreria latifolia* (Aubl.) K. Schum. f. *scabrida* (DC.) Steyer., *Borreria latifolia* (Aubl.) K. Schum. f. *sideritis* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Borreria platyphylla* DC., *Borreria scabrida* DC., *Borreria sideritis* Cham. & Schltdl., *Spermacoce latifolia* Aubl.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Borreria loretiana E.L. Cabral

Sin.: *Spermacoce loretiana* (E.L. Cabral)

Govaerts

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Borreria marticrovettiana E.L. Cabral

Sin.: *Spermacoce marticrovettiana* (E.L. Cabral) Govaerts

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(CAU, CAN, CON, SPE).

Borreria multibracteata E.L. Cabral & Bacigalupo

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Borreria nelidae E.L. Cabral

Sin.: *Spermacoce nelidae* (E.L. Cabral)

Govaerts

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS).

Borreria ocymifolia (Willd. ex Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L. Cabral

Sin.: *Diodia ocymifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) Bremek., *Hemidiodia ocymifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum., *Spermacoce ocymifolia* Willd. ex Roem. & Schult.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Borreria orientalis E.L. Cabral, R. Salas & L. Miguel

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, ITA, PAI).

Borreria orinocensis (Willd.) L.M.

Miguel, Sobrado & E.L. Cabral

Sin.: *Borreria capitata* (Ruiz & Pav.) DC. var. *tenella* Steyer., *Borreria tenella* (Kunth) Cham. & Schltdl., *Borreria tenella*

(Kunth) Cham. & Schltdl. var. *genuina* K. Schum., *Spermacoce orinocensis* Willd., *Spermacoce suaveolens* (G. Mey.) Kuntze var. *tenella* Kuntze, *Spermacoce tenella* Kunth, *Tardavel tenella* Standl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, RIV, TYT).

Borreria paranaensis E.L. Cabral & Bacigalupo

Sin.: *Spermacoce paranaensis* (E.L. Cabral & Bacigalupo) P.G. Delprete

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Borreria poaya (A. St.-Hil.) DC.

Sin.: *Borreria asclepiadea* DC., *Borreria balansae* Standl., *Borreria flavescens* DC., *Borreria nervosa* DC., *Borreria poaya* (A. St.-Hil.) DC. var. *genuina* K. Schum., *Borreria poaya* (A. St.-Hil.) DC. var. *suffruticosa* K. Schum., *Borreria pratensis* DC., *Chlorophytum nervosum* Pohl ex DC., *Chlorophytum pratense* Pohl ex DC., *Spermacoce balansae* (Standl.) Govaerts, *Spermacoce flavescens* Pohl ex DC., *Spermacoce poaya* A. St.-Hil., *Spermacoce poaya* A. St.-Hil. var. *pubescens* A. St.-Hil.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, PAI, SPE).

Borreria pulchristipula (Bremek.) Bacigalupo & E.L. Cabral

Sin.: *Diodia macrophylla* K. Schum. var. *angustifolia* Chodat, *Diodia pulchristipula* Bremek., *Spermacoce pulchristipula* (Bremek.) P.G. Delprete

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CEN, COA, PAI, SPE).

Borreria remota (Lam.) Bacigalupo & E.L. Cabral

Sin.: *Spermacoce remota* Lam.

Subarbusto. Nativa. 1500-1800 m.

Países: ARG(TUC). PRY(CAA).

Notas: Citada por Cabral et al. (Acta Bot. Brasil. 25: 265. 2011) para Paraguay sin indicar localidad o material de referencia.

Borreria rubrostipulata DC.

Sin.: *Borreria quadrifaria* E.L. Cabral, *Spermacoce fasciculata* Pohl ex DC., *Spermacoce quadrifaria* (E.L. Cabral) Govaerts, *Spermacoce rubrostipulata* Pohl ex DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Borreria runkii K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Borreria schumannii (Standl. ex Bacigalupo) E.L. Cabral & Sobrado

Sin.: *Borreria flavovirens* Bacigalupo & E.L. Cabral, nom. illeg., *Diodia gymnocephala* (DC.) K. Schum., *Diodia schumannii* Standl. ex Bacigalupo, *Spermacoce schumannii* (Standl. ex Bacigalupo) P.G. Delprete

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Borreria spinosa Cham. & Schltdl. ex DC.

Sin.: *Borreria densiflora* DC., *Borreria densiflora* DC. var. *perennis* Standl., *Borreria densiflora* DC. var. *pilosa* Bacigalupo, *Borreria spinosa* Cham. & Schltdl., nom. nud., *Spermacoce*

densiflora (DC.) Alain, *Spermacoce spinosa* L., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, PHA).

Borreria suaveolens G. Mey.

Sin.: *Spermacoce suaveolens* (G. Mey.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Borreria sulcata (Bacigalupo) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria verticillata* (L.) G. Mey. var. *sulcata* Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI). BRA(PAR).

Borreria tenera DC.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Borreria verticillata (L.) G. Mey.

Sin.: *Bigelowia verticillata* (L.) Spreng., *Borreria minima* DC., *Spermacoce verticillata* L., *Tardavel verticillata* (L.) Hiern

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, ÑEE). URY(ART, CLA, COL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Borreria warmingii K. Schum.

Sin.: *Spermacoce warmingii* (K. Schum.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Calycophyllum DC.

Calycophyllum multiflorum Griseb.

Sin.: *Calycophyllum spruceanum* Benth. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Calycophyllum spruceanum* Benth. var. *multiflorum* (Griseb.) Chodat & Hassl., *Pisonia combretifolia* Morong & Britton
Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Carapichea Aubl.

Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson

Sin.: *Callicocca ipecacuanha* Brot.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cephalanthus L.

Cephalanthus glabratus (Spreng.) K. Schum.

Sin.: *Buddleja glabrata* Spreng., *Cephalanthus sarandi* Cham. & Schltdl., nom. illeg., *Cephalanthus tinctorius* Rojas Acosta, nom. nud.

Árbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Chiococca P. Browne

Chiococca alba (L.) C.L. Hitchc.

Sin.: *Chiococca anguifuga* Mart., *Chiococca brachiata* Ruiz & Pav., *Chiococca densifolia* Mart., *Chiococca racemosa* L., *Lonicera alba* L.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(ROC).

Chomelia Jacq.

Chomelia brasiliana A. Rich.

Sin.: *Anisomeris brasiliana* (A. Rich.) Standl., *Anisomeris catharinae* L.B. Sm. & Downs, *Caruelina brasiliana* (A. Rich.) Kuntze, *Chomelia catharinae* (L.B. Sm. & Downs) Steyerem.

Árbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI).

Chomelia obtusa Cham. & Schltdl.

Sin.: *Anisomeris obtusa* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Anisomeris obtusa* (Cham. & Schltdl.) K. Schum. var. *brevifolia* Chodat & Hassl., *Anisomeris obtusa* (Cham. & Schltdl.) K. Schum. var. *inermis* Chodat & Hassl., *Chomelia obtusa* Cham. & Schltdl. var. *pubescens* Hassl.

Árbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA).

Chomelia parviflora (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Sin.: *Anisomeris parviflora* (Müll. Arg.) Standl., *Malanea parviflora* Müll. Arg.

Árbusto. Endémica. 400.

Países: BRA(PAR).

Chomelia pedunculosa Benth.

Sin.: *Anisomeris pedunculosa* (Benth.) Standl.

Árbusto. Nativa. 300-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chomelia pohliana Müll. Arg.

Sin.: *Anisomeris pohliana* (Müll. Arg.) Chodat & Hassl.

Árbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(AMA).

Coccocypselum P. Browne

Coccocypselum capitatum (Graham) C.B. Costa & Mamede

Sin.: *Aeginetia capitata* Graham, *Coccocypselum campanuliflorum* (Hook.) Cham. & Schltdl., *Hedyotis campanuliflora* Hook. f., *Lipostoma capitatum* (Graham) D. Don

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Coccocypselum condalia Pers.

Sin.: *Coccocypselum umbellatum* Poir., *Condalia repens* Ruiz & Pav., *Oldenlandia cordata* Vell.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Coccocypselum cordifolium Nees & Mart.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Coccocypselum geophiloides Wawra

Sin.: *Coccocypselum krauseanum* Standl., *Coccocypselum sessiliflorum* Standl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Coccocypselum glabrifolium Standl.

Árbusto. Nativa. 700.

Países: BRA(PAR, SCA).

Coccocypselum hasslerianum Chodat

Sin.: *Coccocypselum cordatum* K. Krause
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA).

Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Coccocypselum canescens* Willd. ex Roem. & Schult., *Condalia lanceolata* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI).

Coccocypselum lyman-smithii Standl.

Sin.: *Coccocypselum pumilio* Standl.

Hierba. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Coccocypselum monanthos L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Coccocypselum uniflorum* Hassl., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 100-500 m.

Países: PRY(AMA).

Coccocypselum pulchellum Cham.

Sin.: *Coccocypselum reitzii* L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica. 300-1700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Coffea L.

Coffea arabica L.

Arbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Coprosma J.R. Forst. & G. Forst.

Coprosma arnottiana (Walp.) Heads

Sin.: *Coprosma calycina* A. Gray, *Hedyotis repens* Clos, *Leptostigma*

arnottianum Walp., *Nertera arnottiana* (Walp.) B.L. Rob., *Oldenlandia uniflora* Ruiz & Pav. var. *repens* (Clos) Reiche, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Coprosma granadensis (Mutis ex L.f.)

Heads

Sin.: *Cunina sanfuentesii* Clos, *Gomozia granadensis* Mutis ex L.f., *Nertera depressa* Banks & Sol. ex Gaertn., *Nertera granadensis* (Mutis ex L. f.) Druce

Hierba. Nativa. 500-3500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, JFE).

Coprosma oliveri Fosberg

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Coprosma pyrifolia (Hook. & Arn.) Skottsb.

Sin.: *Psychotria pyrifolia* Hook. & Arn.

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Cordia A. Rich. ex DC.

Cordia concolor (Cham.) Kuntze

Sin.: *Alibertia concolor* (Cham.) K. Schum., *Alibertia hassleriana* Chodat, *Alibertia stricta* Zahlbr., *Alibertia vaccinioides* K. Schum., *Gardeniola concolor* Cham.

Arbolito o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAN, COA, PAI).

Cordia humilis (K. Schum.) Kuntze

Sin.: *Alibertia humilis* K. Schum.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Cordia myrsiifolia (K. Schum.) C.H. Perss. & Delprete

Sin.: *Alibertia myrsiifolia* K. Schum.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cordia sessilis (Vell.) Kuntze

Sin.: *Alibertia sessilis* (Vell.) K. Schum., *Gardenia sessilis* Vell.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, SPE).

Coussarea Aubl.

Coussarea contracta (Walp.) Benth. & Hook. ex Müll. Arg.

Sin.: *Coussarea contracta* (Walp.) Benth. & Hook. ex Müll. Arg. var. *panicularis* Müll. Arg., *Coussarea virens* Müll. Arg., *Faramea contracta* Walp., *Faramea fiebrigii* Krause

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, PAI, SPE).

Coussarea platyphylla Müll. Arg.

Sin.: *Coussarea paraguariensis* Chodat & Hassl., *Coussarea platyphylla* Müll. Arg. var. *longiflora* Chodat & Hassl., *Coussarea platyphylla* Müll. Arg. var. *vestita* Chodat & Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

Coutarea Aubl.

Coutarea alba Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: ARG(JUU, SAL).

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.

Sin.: *Coutarea hexandra* (Jacq.) K. Schum. f. *albiflora* Chodat & Hassl., *Coutarea hexandra* (Jacq.) K. Schum. f. *grandiflora* Chodat & Hassl., *Coutarea hexandra* (Jacq.) K. Schum. f. *pubescens* (Pohl) Steyer., *Coutarea hexandra* (Jacq.) K. Schum. f. *roseiflora* Chodat & Hassl., *Coutarea hexandra* (Jacq.) K. Schum. var. *calycina* Chodat & Hassl., *Coutarea hexandra* (Jacq.) K. Schum. var. *fluminensis* K. Schum., *Coutarea hexandra* (Jacq.) K. Schum. var. *pubescens* K. Schum., *Coutarea pubescens* Pohl, *Coutarea speciosa* Aubl., nom. illeg., *Portlandia hexandra* Jacq.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

Cruckshanksia Hook. & Arn.

Cruckshanksia hymenodon Hook. & Arn.

Sin.: *Cruckshanksia bustillosii* Phil., *Cruckshanksia hymenodon* Hook. & Arn. var. *bustillosii* (Phil.) Ricardi & Quezada, *Rotheria lanceolata* Meyen

Hierba. Endémica. 1000-3500 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Cruckshanksia lithiophila Ricardi

Hierba. Endémica. 3000-3600 m.

Países: CHL(ATA).

Cruckshanksia macrantha Phil.

Sin.: *Oreopolus macranthus* (Phil.) Ricardi

Hierba. Endémica. 1500-3700 m.

Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL).

Cruckshanksia montiana Clos

Sin.: *Cruckshanksia capitata* Phil.,

Cruckshanksia densifolia Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Cruckshanksia palmae Clos

Sin.: *Oreopolus palmae* (Clos) Ricardi

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Cruckshanksia pumila Clos

Sin.: *Cruckshanksia chrysantha* Phil.,

Cruckshanksia darapskyana Phil.,

Cruckshanksia geisseana Phil.,

Cruckshanksia tripartita Phil.

Hierba. Endémica. 800-2300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cruckshanksia verticillata Phil.

Sin.: *Cruckshanksia capitata* Phil. var. *paradoxa* (Phil.) Reiche, *Cruckshanksia paradoxa* Phil.

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Declieuxia Kunth

Declieuxia cordigera Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult. f. var. *angustifolia* Müll. Arg.

Sin.: *Declieuxia cordigera* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult. f. var. *longifolia* Müll. Arg., *Declieuxia polygaloides* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult. f., *Declieuxia polygaloides* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult. f. var. *angustifolia* Müll. Arg., *Declieuxia polygaloides* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult. f. var. *aristolochia* Müll. Arg., *Declieuxia polygaloides* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult. f. var. *latifolia*

Müll. Arg., *Declieuxia sclerophylla* Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Declieuxia dusenii Standl.

Subarbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze

Sin.: *Houstonia fruticosa* Willd. ex Roem. & Schult.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Declieuxia lysimachioides Zucc. ex Schult. & Schult. f.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Deppea Schltdl. & Cham.

Deppea blumenaviensis (K. Schum.) Lorence

Sin.: *Schenckia blumenaviensis* K. Schum., *Schenckia blumenaviensis* K. Schum. var. *macrocarpa* Standl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Diodia Gronov. ex L.

Diodia kuntzei K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, SPE).

Diodia saponariifolia (Cham. & Schltdl.) K. Schum.

Sin.: *Borreria saponariifolia* Cham. & Schltl., *Diodia saponarioides* C. Presl

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA).

Emmeorrhiza Pohl ex Endl.

Emmeorrhiza umbellata (Spreng.) K. Schum.

Sin.: *Borreria umbellata* Spreng., *Endlicheria umbellata* (Spreng.) K. Schum.

Subarbusto apoyante. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Eumachia DC.

Eumachia astrellantha (Wernham) Delprete & J.H. Kirkbr.

Sin.: *Psychotria astrellantha* Wernham

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eumachia cephalantha (Müll. Arg.)

Delprete & J.H. Kirkbr.

Sin.: *Mapouria cephalantha* Müll. Arg., *Margaritopsis cephalantha* (Müll. Arg.) C.M. Taylor, *Psychotria cephalantha* (Müll. Arg.) Standl.

Arbusto. Nativa. 200-300 m.

Países: PRY(AMA).

Eumachia chaenotricha (DC.) C.M. Taylor & Razafim.

Sin.: *Mapouria aemulans* Müll. Arg., *Mapouria chaenotricha* (DC.) Müll. Arg., *Mapouria mandiocana* Chodat & Hassl., *Margaritopsis chaenotricha* (DC.) C.M. Taylor, *Psychotria aemulans* (Müll. Arg.) Standl., *Psychotria chaenotricha* DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Eumachia cymuligera (Müll. Arg.) C.M. Taylor & Razafim.

Sin.: *Mapouria cymuligera* Müll. Arg., *Mapouria xanthophylloides* Müll. Arg., *Margaritopsis cymuligera* (Müll. Arg.) C.M. Taylor, *Psychotria birotula* L.B. Sm. & Downs, *Psychotria xanthophylloides* (Müll. Arg.) Standl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Citada para Paraguay (Taylor, 2005) sin indicar localidad o material de referencia.

Eumachia hassleriana (Chodat) C.M. Taylor & Razafim.

Sin.: *Mapouria hassleriana* (Chodat) Hassl., *Margaritopsis hassleriana* (Chodat) C.M. Taylor, *Rudgea hassleriana* Chodat

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CON, SPE).

Faramea Aubl.

Faramea calyciflora A. Rich.

Sin.: *Faramea colorata* (Hook. f.) Benth., *Faramea macrocalyx* Müll. Arg., *Homaclados coloratus* Hook. f.

Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Faramea hassleriana Chodat

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Faramea hyacinthina Mart.

Sin.: *Faramea cyanea* Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, PAI).

Faramea martiana Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Faramea montevidensis (Cham. & Schltl.) DC.

Sin.: *Tetramerium montevidense* Cham. & Schltl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Faramea multiflora A. Rich. ex DC.

Sin.: *Faramea multiflora* A. Rich. ex DC. var. *salicifolia* (C. Presl) Steyer., *Faramea salicifolia* C. Presl

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Faramea oligantha Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 500-1300 m.

Países: BRA(SCA).

Faramea porophylla (Vell.) Müll. Arg.

Sin.: *Psychotria porophylla* Vell.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, PAI).

Faramea stipulacea (Cham. & Schltl.) DC.

Sin.: *Tetramerium stipulaceum* Cham. & Schltl.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Galianthe Griseb.

Galianthe angustifolia (Cham. & Schltl.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria angustifolia* Cham. & Schltl.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Galianthe aurelii E.L. Cabral
Subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).

Galianthe bisepala E.L. Cabral
Subarbusto. Nativa. 1200-1300 m.
Países: ARG(SAL).

Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo
Sin.: *Diodia anthospermoides* Cham. & Schltdl., *Diodia brasiliensis* Spreng., *Diodia brasiliensis* Spreng. var. *microphylla* (Cham. & Schltdl.) Standl., *Diodia polymorpha* Cham. & Schltdl., *Diodia polymorpha* Cham. & Schltdl. var. *macrophylla* Cham. & Schltdl., *Diodia polymorpha* Cham. & Schltdl. var. *microphylla* Cham. & Schltdl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA, ÑEE). URY(RNO).

Galianthe canindeyuensis E.L. Cabral
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Galianthe centranthoides (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria centranthoides* Cham. & Schltdl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltdl. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltdl. f. *glabrior* Chodat & Hassl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltdl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltdl. f. *pubescens* Chodat & Hassl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltdl. var. *angustifolia* Cham. & Schltdl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltdl. var. *latifolia* Cham. & Schltdl., *Borreria pohliana* DC., *Galianthe clidemioides* Griseb., *Spermacoce centranthoides*

(Cham. & Schltdl.) Kuntze, *Spermacoce clidemioides* (Griseb.) Niederl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, COL, FLA, LAV, MAL, RIV).

Galianthe chodatiana (Standl.) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria chodatiana* Standl., *Borreria thalictroides* K. Schum. var. *latifolia* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Galianthe cymosa (Cham.) E.L. Cabral & Bacigalupo
Sin.: *Diodia cymosa* Cham.
Subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Galianthe cyperoides (Chodat & Hassl.) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria cyperoides* Chodat & Hassl., *Borreria leiophylla* K. Schum. var. *expansa* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, SPE).

Galianthe dichasia (Sucre & C.G. Costa) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria dichasia* Sucre & C.G. Costa, *Diodia cymosa* Cham. var. *aculeolata* Hassl., *Spermacoce dichasia* (Sucre & C.G. Costa) Govaerts
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, SPE). URY(RIV).

Galianthe elegans E.L. Cabral
Subarbusto. Endémica. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Galianthe equisetoides (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria equisetoides* Cham. & Schltdl., *Spermacoce equisetoides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

Galianthe eupatorioides (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria eupatorioides* Cham. & Schltdl., *Spermacoce eupatorioides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CHO, CON, GUA, ITA, MIE, NAS). URY(ROC).

Galianthe fastigiata Griseb.
Sin.: *Borreria fastigiata* (Griseb.) K. Schum., *Borreria leiophylla* K. Schum., *Borreria verbenoides* Cham. & Schltdl., *Spermacoce fastigiata* (Griseb.) Kuntze, *Spermacoce fastigiata* (Griseb.) Niederl., *Spermacoce leiophylla* (K. Schum.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, COA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA, CLA, FLA, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).

Galianthe gertii E.L. Cabral
Subarbusto. Endémica. 1000-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Galianthe guaranitica (Chodat & Hassl.) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria guaranitica* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Nativa. 100-700 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Galianthe hassleriana (Chodat) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria hassleriana* Chodat, *Borreria hassleriana* Chodat f. *angustifolia* Chodat, *Borreria hassleriana* Chodat f. *latifolia* Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(CAN, SPE).

Galianthe hispidula (A. Rich. ex DC.) E.L. Cabral & Bacigalupo

Sin.: *Diodia hispidula* A. Rich. ex DC., *Diodia paradoxa* Cham.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Galianthe krausei (Suess.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria corymbosa* (Ruiz & Pav.) DC. f. *microphylla* Chodat & Hassl., *Borreria krausei* Suess., *Borreria saxicola* K. Krause, nom. illeg.

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: PRY(CAN, COA, PAI).

Galianthe latistipula E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Galianthe laxa (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral subsp. **laxa**

Sin.: *Borreria cristata* S. Moore, *Borreria laxa* Cham. & Schltdl., *Borreria mitreoloides* Standl., *Galianthe cristata* (S. Moore) E.L. Cabral, *Spermacoce laxa* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA). URY(COL, CLA, MON, SJO, SOR).

Galianthe laxa (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral subsp. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria laxa* Cham. & Schltdl. var. *vestita* L.B. Sm. & Downs, *Borreria paraguariensis* Chodat & Hassl., *Borreria*

paraguariensis Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat, *Borreria paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *puberula* Chodat, *Galianthe paraguariensis* (Chodat & Hassl.) E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 100-300 m.

Países: PRY(APY, AMA, CEN, COA, PAI, PHA).

Galianthe linearifolia E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA).

Galianthe longifolia (Standl.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria thalictroides* K. Schum. var. *longifolia* Standl.

Subarbusto. Nativa. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

Galianthe montesii E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA).

Galianthe palustris (Cham. & Schltdl.)

Cabaña Fader & E.L. Cabral

Sin.: *Borreria gymnocephala* DC., *Borreria palustris* (Cham. & Schltdl.) Bacigalupo & E.L. Cabral, *Diodia alata* Nees & Mart., *Diodia palustris* Cham. & Schltdl., *Spermacoce palustris* (Cham. & Schltdl.) P.G. Delprete

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Galianthe parvula E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 300-1200 m.

Países: PRY(AMA, SPE).

Galianthe pseudopeciolata E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 200-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU).

Galianthe reitzii E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.

Países: BRA(SCA).

Galianthe riograndensis J. Florentin & E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Galianthe thalictroides (K. Schum.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria thalictroides* K. Schum., *Borreria verbenoides* Cham. & Schltdl. var. *thalictroides* (K. Schum.) Porto & Miotto, *Spermacoce thalictroides* (K. Schum.) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 100-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU). URY.

Galianthe valerianoides (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria luteovirens* Standl., *Borreria valerianoides* Cham. & Schltdl., *Spermacoce valerianoides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA). URY(RIV).

Galianthe verbenoides (Cham. & Schltdl.) Griseb.

Sin.: *Borreria verbenoides* Cham. & Schltdl., *Spermacoce verbenoides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, comb. superfl., *Spermacoce verbenoides* (Cham. & Schltdl.) Niederl.

Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Galium L.

Galium antarcticum Hook. f.

Sin.: *Galium debile* Banks & Sol.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU, SCR, TDF).
CHL(AIS, MAG).

Galium aparine L.

Sin.: *Galium aparine* L. subsp. *spurium* (L.) Dusén, *Galium aparine* L. var. *microphyllum* Clos, *Galium aparine* L. var. *pseudoaparine* (Griseb.) Speg., *Galium aparine* L. var. *spurium* L., *Galium australe* Reiche, *Galium chilense* Hook. f., *Galium chonoense* Clos, *Galium pseudoaparine* Griseb., *Galium spurium* L.

Hierba. Introducida. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, MON).

Galium atherodes Spreng.

Sin.: *Galium ericoides* Lam. var. *atherodes* (Spreng.) Cham. & Schltdl., *Relbunium atherodes* (Spreng.) K. Schum., *Rubia uruguayensis* Arechav.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, GUA, PAI). URY(RIV).

Galium bigeminum Griseb.

Sin.: *Relbunium bigeminum* (Griseb.) K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Galium comberi Dempster

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(NEU).

Galium corymbosum Ruiz & Pav.

Sin.: *Galium ciliatum* Ruiz & Pav. var. *weddellianum* Kuntze, *Galium hirsutum*

Ruiz & Pav., *Galium leucocarpum* DC., nom. superfl., *Relbunium ciliatum* (Ruiz & Pav.) Hemsl., *Relbunium corymbosum* (Ruiz & Pav.) K. Schum., *Relbunium croceum* (Ruiz & Pav.) K. Schum. subsp. *involutum* (Kunth) Ehrend., *Relbunium hirsutum* K. Schum., *Rubia corymbosa* (Ruiz & Pav.) DC.

Hierba. Nativa. 2000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

Galium cotinoides Cham. & Schltdl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Galium diffusoramosum Dempster & Ehrend.

Sin.: *Galium diffusum* Clos

Hierba. Endémica. 100-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, MAU).

Galium diphyllum (K. Schum.) Dempster

Sin.: *Relbunium diphyllum* K. Schum.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Galium divaricatum Pourr. ex Lam.

Sin.: *Galium aridicola* Briq., *Galium tenellum* Clos

Hierba. Introducida.

Notas: Dempster (1982) señala que Gay lo habría encontrado en algún lugar de Chile

Galium equisetoides (Cham. & Schltdl.) Standl.

Sin.: *Relbunium equisetoides* (Cham. & Schltdl.) Ehrend., *Rubia equisetoides* Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA, GUA, SPE). URY.

Galium ericoides Lam.

Sin.: *Galium ericoides* Lam. var. *intermedium* Cham. & Schltdl., *Relbunium ericoides* (Lam.) K. Schum.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SOR).

Galium eriocarpum Bartl. ex DC.

Sin.: *Galium brevifolium* Phil., *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *leiocarpum* Kuntze, *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *normale* Kuntze, *Galium philippii* Briq.

Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Galium flossdorfii Hicken

Sin.: *Galium plumosum* Rusby subsp. *flossdorfii* (Hicken) Dempster

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Galium fuegianum Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

Galium gilliesii Hook. & Arn. subsp. **gilliesii**

Sin.: *Galium lanatum* Kuntze

Hierba. Endémica. 2300-4000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Galium gracilicaule Bacigalupo & Ehrend.

Hierba. Endémica. 3200-4800 m.

Países: ARG(JUJ, TUC).

Galium hatschbachii Dempster

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Galium hirtum Lam.

Sin.: *Galium reflexum* Pohl ex DC.,
Relbunium hirtum (Lam.) K. Schum.,
Relbunium malmei Standl.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI).
 BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLO,
 LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SOR, TYT).

Galium humile Cham. & Schltdl.

Sin.: *Relbunium humile* (Cham. & Schltdl.)
 K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, COA,
 ITA, MIE, PAI). URY(SJO).

Galium humilioides (M.L. Porto & Ehrend.) K. De Toni & Mariath

Sin.: *Relbunium humilioides* M.L. Porto &
 Ehrend.

Hierba. Endémica. 800-1700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. subsp. **hypocarpium**

Sin.: *Galium hypocarpium* (L.) Endl. ex
 Griseb. subsp. *alluviale* (Ehrend.)
 Dempster, *Galium ovale* Ruiz & Pav.,
Galium relbun (Cham. & Schltdl.) Clos,
Relbunium croceum (Ruiz & Pav.) K.
 Schum., *Relbunium hypocarpium* (L.)
 Hemsl., *Relbunium hypocarpium* (L.)
 Hemsl. subsp. *alluviale* Ehrend.,
Relbunium hypocarpium (L.) Hemsl.
 subsp. *fluminense* (Vell.) Ehrend.,
Relbunium hypocarpium (L.) Hemsl.
 subsp. *grandifolium* Ehrend., *Relbunium*
hypocarpium (L.) Hemsl. subsp. *nitidum*
 (Kunth) Ehrend., *Relbunium hypocarpium*
 (L.) Hemsl. var. *relbun* (Cham. & Schltdl.)
 K. Schum., *Relbunium ovale* (Ruiz & Pav.)
 K. Schum., *Relbunium relbun* (Cham. &
 Schltdl.) Herter, *Relbunium wettsteinii*
 Zahlbr., *Rubia ovale* (Ruiz & Pav.) DC.,

Rubia relbun Cham. & Schltdl., *Valantia*
hypocarpia L.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
 COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, RNE,
 SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
 CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
 ARA, LSR, LLA, AIS, RME). PRY(APA,
 CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).
 URY(ART, CLA, MAL, MON, RIV, ROC,
 TYT).

Galium inconspicuum Phil.

Sin.: *Galium hypnoides* Clos var.
inconspicuum (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU,
 BIO, ARA).

Galium latoramosum Clos

Sin.: *Galium chapi* Wedd., *Galium*
ephedroides (Cham. & Schltdl.) Kuntze,
Galium intricatum Endl., hom. illeg.,
Galium tetragonum Griseb., *Rubia*
ephedroides Cham. & Schltdl., *Rubia*
intricata Hook. & Arn., *Rubia tetragona*
 (Griseb.) K. Schum.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
 JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC).
 BRA(RGS, SCA). PRY(APA, GUA).
 URY(CAS, COL, DUR, FLA, LAV, MAL,
 MON, RNO, SJO, SOR).

Galium leptum Phil.

Hierba. Endémica. 1800.

Países: CHL(COQ, RME).

Galium liloi Hicken

Hierba. Endémica. 300-1800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE,
 TUC).

Galium longipedunculatum (Mariath & Ehrend.) K. De Toni & Mariath

Sin.: *Relbunium longipedunculatum*
 Mariath & Ehrend.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Galium magellanicum Hook. f.

Sin.: *Galium chonoense* Hook. f., *Galium*
chonoense Hook. f. var. *valdivianum*
 (Phil.) Reiche, *Galium forsteri* Phil.,
Galium nigricans Clos, *Galium*
valdivianum Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
 CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,
 AIS, MAG).

Galium masafueranum Skottsb.

Hierba. Endémica. 1100-1400 m.

Países: CHL(JFE).

Galium megapotamicum Spreng.

Sin.: *Galium camporum* Pohl ex DC.,
Relbunium megapotamicum (Spreng.)
 Ehrend., *Relbunium megapotamicum*
 (Spreng.) Ehrend. subsp. *camporum*
 Ehrend.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, COS, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
 CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI,
 SPE). URY(MON).

Galium mollugo L.

Sin.: *Rubia mollugo* (L.) Baill.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, NEU).
 URY(RIV).

Galium muelleri (K. Schum.) Dempster

Sin.: *Relbunium muelleri* K. Schum.

Hierba. Endémica. Sin datos.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Galium murale (L.) All.

Sin.: *Sherardia muralis* L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Galium nigroramosum (Ehrend.) Dempster

Sin.: *Relbunium nigroramosum* Ehrend.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, ITA, SPE). URY(DUR).

Galium noxium (A. St.-Hil.) Dempster subsp. **noxium**

Sin.: *Galium noxium* (A. St.-Hil.) Dempster subsp. *valantioides* (Cham. & Schltdl.) Dempster, *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl. f. *denticulata* Chodat & Hassl., *Relbunium noxium* (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *pilcomayense* Hassl., *Relbunium valantioides* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Rubia noxia* A. St.-Hil., *Rubia valantioides* Cham. & Schltdl.

Hierba o enredadera. Nativa. 600-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO).

Galium ostenianum (Standl.) Dempster

Sin.: *Relbunium ostenianum* Standl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(CLA, TYT).

Galium ovalleanum Phil.

Subarbusto. Endémica. 1100-2600 m.

Países: CHL(COQ).

Galium palustre L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, MEN, RNE).

Galium parisiense L.

Hierba. Introducida. Sin datos.

Países: CHL(RME).

Galium philippianum Dempster

Sin.: *Galium dasycarpon* Kunze ex Walp, nom. nud.

Subarbusto. Endémica. 1200-2200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Galium ramboi Dempster

Hierba. Endémica. Sin datos.

Países: BRA(SCA).

Galium richardianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp.

Sin.: *Galium chaetophorum* Griseb., *Galium chaetophorum* Griseb. var. *prostratum* Kuntze, *Galium chaetophorum* Griseb. var. *strictum* Kuntze, *Galium ciliatum* Ruiz & Pav. var. *pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Galium ciliatum* Ruiz & Pav. var. *richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Galium haenkeanum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp., *Galium patagonicum* Kuntze, *Galium pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp., *Galium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. subsp. *haenkeanum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Dempster, *Galium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. subsp. *pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Dempster, *Relbunium chaetophorum* (Griseb.) K. Schum., *Relbunium equinocarpum* Hassl., *Relbunium patagonicum* (Kuntze) K. Schum., *Relbunium pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) K. Schum., *Relbunium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken, *Relbunium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken subsp. *patagonicum* (Kuntze) Ehrend., *Relbunium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken subsp. *pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Ehrend., *Rubia haenkeana* Gillies ex Hook. & Arn., *Rubia pusilla*

Gillies ex Hook. & Arn., *Rubia richardiana* Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, ÑEE). URY(COL, MON, SJO).

Galium rubidiflorum Dempster

Hierba. Endémica. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

Galium saxatile L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(TDF).

Galium sellowianum (Cham.) Walp.

Sin.: *Relbunium selleanum* K. Schum., *Rubia sellowiana* Cham.

Hierba. Nativa. 1000-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Galium smithreitzii Dempster

Sin.: *Relbunium catarinense* Ehrend.

Hierba. Endémica. 1600.

Países: BRA(SCA).

Galium suffruticosum Hook. & Arn.

Sin.: *Galium andinum* Phil., *Galium araucanum* Phil., *Galium chilense* (Feuillée ex Molina) Clos, *Galium peteroanum* Phil., *Galium suffruticosum* Hook. & Arn. var. *araucanum* (Phil.) Reiche, *Rubia chilensis* Feuillée ex Molina, *Rubia margaritifera* Reiche

Subarbusto. Endémica. 0-2700 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Galium telanthos Phil.

Sin.: *Galium gilliesii* Hook. & Arn. subsp. *telanthos* (Phil.) Dempster, *Galium trichocarpum* DC. var. *telanthos* (Phil.) Reiche, *Galium volckmanni* Phil.

Hierba. Endémica. 2300-3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
CHL(COQ, LBO, MAU, RME).

Galium trichocarpum DC.

Sin.: *Galium chamissonis* Hook. & Arn.,
Galium eriocarpum Bartl. ex DC. var.
trichocarpum (DC.) Wedd. ex Hauman,
Galium lasiocarpum Phil., *Galium laxum*
Phil., *Galium scandens* Phil.

Hierba. Endémica. 400-2200 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
RME).

Galium tricornutum Dandy

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHA). CHL(BIO).

Galium uruguayense Bacigalupo var.
echinulatum Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). URY(MAL, TAC).

Galium uruguayense Bacigalupo var.
uruguayense

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS).
URY(LAV, MAL, TAC).

Galium verum L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(RNE).

Galium vile (Cham. & Schltdl.) Dempster
Sin.: *Relbunium vile* (Cham. & Schltdl.) K.
Schum., *Relbunium vile* K. Schum. var.
tenuior K. Schum., *Rubia vilis* Cham. &
Schltdl.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA,
COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY,
ROC, SOR).

Galium werdermannii Standl.

Sin.: *Galium closianum* Briq., *Galium*
hypnoides Clos

Hierba. Endémica. 1100.
Países: CHL(BIO, ARA).

Genipa L.

Genipa americana L.

Sin.: *Genipa americana* L. f. *grandifolia*
Chodat & Hassl., *Genipa americana* L. f.
jorgensenii Steyerem., *Genipa americana*
L. f. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Genipa*
americana L. var. *caruto* (Kunth) K.
Schum., *Genipa caruto* Kunth

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS).
BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAN,
CEN, CON, PAI, PHA).

Geophila D. Don

Geophila macropoda (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Cephaelis violaefolia* Kunth,
Coccocypselum macropodum (Ruiz &
Pav.) Britton, *Geophila herbacea* (L.) K.
Schum. var. *violaefolia* (Kunth) Chodat &
Hassl., *Geophila violaefolia* (Kunth) DC.,
Psychotria macropoda Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAN, CEN, PAI).

Geophila repens (L.) I.M. Johnst.

Sin.: *Carinta herbacea* (Jacq.) W. Wight,
Carinta repens (L.) L.B. Sm. & Downs,
Cephaelis herbacea (Jacq.) Kurz,
Geocardia herbacea (Jacq.) Standl.,
Geocardia repens (L.) Baker f., *Geophila*
herbacea K. Schum., *Mapouria herbacea*
(Jacq.) Müll. Arg., *Psychotria herbacea*
Jacq., *Psychotria repens* (L.) L.,
Psychotrophum herbaceum (Jacq.)

Crantz, *Rondeletia repens* L., *Uragoga*
herbacea (Jacq.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA,
CAN, ITA).

Guettarda L.

Guettarda pohliana Müll. Arg.

Sin.: *Matthiola pohliana* Kuntze
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Guettarda uruguayensis Cham. & Schltdl.

Sin.: *Matthiola uruguayensis* (Cham. &
Schltdl.) Kuntze
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, APY, CAA, GUA, ITA, MIE,
ÑEE, PAI, PHA). URY(PAY, RIV, ROC,
SAO, SJO, TAC, TYT).

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.

Árbol. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA,
CAN, CON).

Hamelia Jacq.

Hamelia patens Jacq.

Sin.: *Duhamelia patens* (Jacq.) Pers.,
Hamelia coccinea Sw., *Hamelia erecta*
Jacq., *Hamelia patens* Jacq. var. *erecta*
(Jacq.) DC.
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
AMA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ÑEE,
PAI, SPE).

Heterophyllaea Hook. f.

Heterophyllaea pustulata Hook. f.

Sin.: *Heterophyllaea fiebrigii* (K. Krause) Standl., *Heterophyllaea lanceolata* Griseb., *Hindsia fiebrigii* K. Krause
Arbusto. Nativa. 1700-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Hexasepalum Bartl. ex DC.

Hexasepalum apiculatum (Willd.) P.G.

Delprete & J.H. Kirkbr.
Sin.: *Diodella apiculata* (Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L. Cabral, comb. superfl., *Diodella apiculata* (Roem. & Schult.) P.G. Delprete, *Diodia apiculata* (Roem. & Schult.) K. Schum., *Diodia conferta* DC., *Diodia latiflora* DC., *Diodia rigida* (Roem. & Schult.) Cham. & Schltdl., *Diodia setigera* DC., *Spermacoce apiculata* Roem. & Schult.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, AMA, CAU).

Hexasepalum radulum (Willd.) P.G.

Delprete & J.H. Kirkbr.
Sin.: *Diodella radula* (Roem. & Schult.) P.G. Delprete, *Diodia radula* (Roem. & Schult.) Cham. & Schltdl., *Spermacoce radula* Willd.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hexasepalum teres (Walter) J.H. Kirkbr.

Sin.: *Diodella teres* (Walter) Small, *Diodia teres* Walter, *Spermacoce diodina* Michx.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CON).

Hillia Jacq.

Hillia illustris (Vell.) K. Schum.

Sin.: *Saldanha illustris* Vell.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hillia parasitica Jacq.

Sin.: *Cosmibuena acuminata* Ruiz & Pav., *Hillia brasiliensis* Cham. & Schltdl., *Hillia killippi* Standl., *Hillia maguire* Steyer., *Hillia parasitica* Jacq. var. *nobilis* (Vell.) Steyer., *Hillia weberbaueri* Standl., *Posoqueria montana* Mart., *Saldanha nobilis* Vell.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hindsia Benth. ex Lindl.

Hindsia longiflora (Cham.) Benth.

Sin.: *Rondeletia longiflora* Cham.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hindsia ramosissima Gardner

Sin.: *Hindsia breviflora* K. Schum.
Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hoffmannia Sw.

Hoffmannia australis Lillo

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Hoffmannia peckii K. Schum.

Sin.: *Hoffmannia dusenii* Standl., *Hoffmannia peckii* K. Schum. var. *selloana* K. Schum.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Ixora L.

Ixora gardneriana Benth.

Sin.: *Ixora heterodoxa* Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Ixora venulosa Benth.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, CAA, CAN).

Machaonia Bonpl.

Machaonia acuminata Humb. & Bonpl.

Sin.: *Machaonia brasiliensis* (Hoffmanns. ex Humb.) Cham. & Schltdl. var. *vestita* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CEN, PHA).

Machaonia brasiliensis (Hoffmanns. ex Humb.) Cham. & Schltdl.

Sin.: *Cinchona brasiliensis* Hoffmanns. ex Humb., *Machaonia spinosa* Cham. & Schltdl.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, ITA, ÑEE, PAI, PHA).

Malanea Aubl.

Malanea evenosa Müll. Arg.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Malanea forsteronioides Müll. Arg.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Manettia L., nom. cons.

Manettia chrysoderma Sprague

Sin.: *Manettia cordifolia* Mart. var. *chrysoderma* (Sprague) I.C. Chung
Liana. Nativa. 400-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Manettia congestoides Wernham

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Manettia cordifolia Mart.

Sin.: *Lygistum ignitum* (Vell.) Kuntze var. *micans* (Poepp.) B.L. Rob., *Lygistum micans* (Poepp.) Rusby, *Manettia asperula* Benth., *Manettia attenuata* Ness & Mart., *Manettia boliviana* Wernham, *Manettia cordifolia* Mart. f. *boliviana* (Wernham) I.C. Chung, *Manettia cordifolia* Mart. f. *incana* (K. Schum.) I.C. Chung, *Manettia cordifolia* Mart. var. *attenuata* (Nees & Mart.) Wernham, *Manettia cordifolia* Mart. var. *filiformis* Wernham, *Manettia cordifolia* Mart. var. *glabra* (Cham. & Schltdl.) Standl., *Manettia cordifolia* Mart. var. *glabra* (Cham. & Schltdl.) Wernham, *Manettia glabra* Cham. & Schltdl., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum. var. *cordifolia* (Mart.) K. Schum., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum. var. *glabra* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum. var. *incana* K. Schum., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum. var. *micans* (Poepp.) K. Schum., *Manettia leianthiflora* Griseb., *Manettia micans* Poepp., *Manettia sublanata* Wernham
Liana. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

Manettia glaziovii Wernham

Liana. Nativa. 500-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Manettia gracilis Cham. & Schltdl.

Sin.: *Manettia burchellii* Wernham, *Manettia gracilis* Cham. & Schltdl. var. *glabra* Benth.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Manettia jorgensenii Standl.

Subarbusto. Endémica. 1500-2600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth.

Sin.: *Guagnebina luteo-rubra* Vell., *Manettia bradei* Standl., *Manettia filicaulis* Wawra
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN).

Manettia paraguariensis Chodat

Sin.: *Manettia luteo-rubra* (Vell.) Benth. var. *paraguariensis* (Chodat) I.C. Chung, *Manettia quinquenervia* Sprague, *Manettia samuelssoniana* Standl.
Enredadera o liana. Nativa.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Manettia paranensis Standl.

Sin.: *Manettia cordifolia* Mart. var. *paranensis* (Standl.) I.C. Chung
Liana. Endémica. 1000-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Manettia pubescens Cham. & Schltdl.

Sin.: *Manihot pubescens* Pohl var. *villosa* (Cham. & Schltdl.) K. Schum.
Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Manettia rojasiana Chodat & Hassl.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CON, GUA, SPE).

Manettia tweedieana K. Schum.

Sin.: *Lygistum tweedeanum* (K. Schum.) Kuntze, *Manettia angustifolia* Wernham, *Manettia cordifolia* Mart. var. *hassleriana* (Chodat) I.C. Chung, *Manettia hassleriana* Chodat
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Manettia verticillata Wernham

Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mitracarpus Zucc. ex Schult. & Schult. f.

Mitracarpus bacigalupoae E.L. Cabral, W.A. Medina & E.B. Souza
Subarbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: PRY(CAU, CAN, SPE).

Mitracarpus brasiliensis M.L. Porto & J.L. Waechter
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mitracarpus brevis K. Schum. & R.E. Fr.
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU).

Mitracarpus frigidus (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum.
Sin.: *Spermacoce frigida* Willd. ex Roem. & Schult.
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CAN).

Mitracarpus hasslerianus Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, CAU, CEN, COA, PAI).

Mitracarpus hirtus (L.) DC.

Sin.: *Mitracarpus diffusus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Cham. & Schltdl. ex DC., *Mitracarpus scaber* Zucc., *Mitracarpus verticillatus* (Schumach. & Thonn.) Vatke, *Mitracarpus villosus* (Sw.) DC., *Spermacoce diffusa* Willd. ex Roem. & Schult., *Spermacoce hirta* L., *Spermacoce villosa* Sw., *Staurospermum verticillatum* Schumach. & Thonn.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, PAI). URY(PAY, RNO).

Mitracarpus megapotamicus (Spreng.) Kuntze

Sin.: *Mitracarpium cuspidatum* DC., *Mitracarpus felipponei* Beauverd, *Mitracarpus megapotamicus* (Spreng.) Standl., comb. superfl., *Mitracarpus peladilla* Griseb., *Mitracarpus sellowianum* Cham. & Schltdl., *Mitracarpus sellowianus* Cham. & Schltdl. f. *tenellus* Chodat, *Mitracarpus sellowianus* Cham. & Schltdl. var. *latifolius* Chodat, *Spermacoce megapotamica* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, GUA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

Mitracarpus schininianus E.L. Cabral, W.A. Medina & E.B. Souza

Subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, SPE).

Oldenlandia L.

Oldenlandia brachypetala (Phil.) E.L. Cabral & Bacigalupo

Sin.: *Hedyotis brachypetala* Phil., *Hedyotis minuta* Phil. ex Benth. & Hook., nom. nud. Hierba. Endémica.

Países: CHL(AIS).

Oldenlandia corymbosa L.

Sin.: *Gerontogea corymbosa* (L.) Cham. & Schltdl., *Hedyotis biflora* (L.) Lam. var. *corymbosa* (L.) Kurz., *Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN).

Oldenlandia dusenii Standl.

Sin.: *Hedyotis dusenii* (Standl.) L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oldenlandia salzmännii (DC.) Benth. & Hook.

Sin.: *Anotis salzmännii* DC., *Hedyotis chiloensis* Phil., *Hedyotis inconspicua* F. Phil. ex Phil., *Hedyotis muscosa* A. St.-Hil., *Hedyotis perpusilla* Hook. & Arn., *Hedyotis pilosa* Poepp., *Hedyotis salzmännii* (DC.) Steud., *Hedyotis thesiifolia* A. St.-Hil., *Hedyotis uniflora* DC., *Oldenlandia inconspicua* (F. Phil. ex Phil.) Reiche, *Oldenlandia thesiifolia* (A. St.-Hil.) K. Schum., *Oldenlandia uniflora* L. var. *pilosa* (Poepp.) Reiche, *Oldenlandia uniflora* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, ERI, MIS, NEU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, JFE). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CLA, COL, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Oreopolus Schltdl.

Oreopolus glacialis (Poepp.) Ricardi

Sin.: *Cruckshanksia glacialis* Poepp., *Cruckshanksia patagonica* (Speg.) Macloskie, *Oreocaryon nivalis* Kuntze ex K. Schum., *Oreopolus citrinus* Schltdl., *Oreopolus glacialis* (Poepp.) Ricardi var. *pilosus* Ricardi, *Oreopolus patagonicus* Speg.

Hierba. Endémica. 300-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Paederia L., nom. cons.

Paederia brasiliensis (Hook. f.) Puff

Sin.: *Lygodisodea brasiliensis* Hook. f., *Lygodisodea foetida* Ruiz & Pav., *Manettia diffusa* Britton, *Paederia diffusa* (Britton) Standl., *Paederia macropoda* Lillo, nom. nud., *Paederia olens* K. Schum., *Paederiopsis diffusa* (Britton) Rusby, *Poederiopsis diffusa* (Britton) Rusby

Enredadera. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). PRY(AMA).

Palicourea Aubl.

Palicourea argentinensis (Bacigalupo) C.M. Taylor

Sin.: *Psychotria argentinensis* Bacigalupo

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Palicourea australis C.M. Taylor

Arbusto. Endémica. 300-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Palicourea brevicollis (Müll. Arg.) C.M. Taylor

Sin.: *Psychotria brevicollis* Müll. Arg., *Psychotria regnellii* Müll. Arg., *Uragoga*

brachythere Kuntze, *Uragoga regnellii* (Müll. Arg.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).

Palicourea crocea (Sw.) Roem. & Schult.

Sin.: *Palicourea paraensis* (Müll. Arg.) Standl., *Palicourea platypodina* (Müll. Arg.) Standl., *Palicourea subulata* Huber, *Psychotria crocea* Sw., *Psychotria paraensis* Müll. Arg., *Psychotria platypodina* Müll. Arg., *Uragoga paraensis* (Müll. Arg.) Kuntze

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Palicourea croceoides Desv. ex Ham.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Palicourea deflexa (DC.) Borhidi

Sin.: *Psychotria deflexa* DC.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Palicourea jungiana C.M. Taylor

Sin.: *Psychotria longipes* Müll. Arg.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Palicourea macrobotrys (Ruiz & Pav.)

Roem. & Schult.

Sin.: *Palicourea lasioneura* Krause, *Psychotria macrobotrys* Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Palicourea malaneoides (Müll. Arg.)

C.M. Taylor

Sin.: *Psychotria malaneoides* Müll. Arg.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Palicourea mamillaris (Müll. Arg.) C.M.

Taylor

Sin.: *Palicourea myriantha* Standl., *Psychotria mamillaris* Müll. Arg., *Psychotria myriantha* Müll. Arg., *Uragoga mamillaris* (Müll. Arg.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN).

Palicourea marcgravii A. St.-Hil.

Sin.: *Psychotria marcgravii* (A. St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Palicourea racemosa (Aubl.) G.

Nicholson

Sin.: *Nonatelia racemosa* Aubl.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Palicourea rigida Kunth

Sin.: *Palicourea rigida* Kunth var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Psychotria noxia* A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Palicourea roseocalycina Torres-Leite

Sin.: *Psychotria dusenii* Standl.

Arbusto. Nativa. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Palicourea sessilis (Vell.) C.M. Taylor

Sin.: *Coffea sessilis* Vell., *Psychotria hancorniaefolia* Benth. var. *velutipes* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & Downs, *Psychotria vellosiana* Benth., *Psychotria velutipes*

Müll. Arg., *Uragoga velutipes* (Müll. Arg.) Kuntze

Hierba, subarbusto o arbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, PAI).

Palicourea tenerior (Cham.) Delprete & J.H. Kirkbr.

Sin.: *Palicourea hassleriana* Chodat, *Patabea tenerior* Cham., *Psychotria hassleriana* (Chodat) Standl., *Psychotria tenerior* (Cham.) Müll. Arg.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, PAI).

Palicourea tristis (H.J.P. Winkl.) C.M. Taylor

Sin.: *Psychotria tipuanensis* Standl., *Psychotria tristis* H.J.P. Winkl.

Arbusto. Nativa. 1700-1800 m.

Países: ARG(SAL).

Pentodon Hochst.

Pentodon pentandrus (Schumach.) Vatke

Sin.: *Hedyotis pentandra* Schumach.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pogonopus Klotzsch

Pogonopus tubulosus (A. Rich. ex DC.) K. Schum.

Sin.: *Calycophyllum tubulosum* A. Rich. ex DC., *Chrysoxylon febrifugum* Wedd., *Chrysoxylon tubulosum* (A. Rich.) Kuntze, *Howardia febrifuga* Wedd., *Macrocnemum tubulosum* A. Rich. ex DC., *Pogonopus febrifugus* (Wedd.) Hook. f., *Pogonopus*

febrifugus (Wedd.) Hook. f. var.
macrosema Hutch.
Arbusto. Nativa. 500-2800 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Posoqueria Aubl.

Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult.
Sin.: *Solena latifolia* Rudge
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Psychotria L.

Psychotria anceps Kunth
Sin.: *Mapouria corymbifera* Müll. Arg.,
Psychotria paracatuensis Standl.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, COA, PAI).

Psychotria brachyceras Müll. Arg.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Psychotria brachypoda (Müll. Arg.) Britton
Sin.: *Mapouria brachypoda* Müll. Arg.,
Palicourea brachypoda (Müll. Arg.) L.B. Sm. & Downs, *Psychotria umbellata* Vell.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria capillacea (Müll. Arg.) Standl.
Sin.: *Mapouria capillacea* Müll. Arg.,
Psychotria paraguariensis Chodat & Hassl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Psychotria capitata Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(COA).

Psychotria carthagenensis Jacq.
Sin.: *Mapouria catharinensis* Müll. Arg.,
Psychotria foveolata Ruiz & Pav.,
Uragoga catharinensis (Müll. Arg.) Kuntze,
Uragoga foveolata (Ruiz & Pav.) Kuntze,
Uragoga foveolata (Ruiz & Pav.) M. Gómez
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(CLA, COL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TYT).

Psychotria formosa Cham. & Schltdl.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Psychotria fractistipula L.B. Sm., R.M. Klein & P.G. Delprete
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria gracilentia Müll. Arg.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Psychotria hastisepala Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll. Arg.
Sin.: *Cephaelis hoffmannseggiana* Willd. ex Roem. & Schult., *Psychotria barbiflora* DC.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN).

Psychotria laciniata Vell.
Sin.: *Psychotria kleinii* L.B. Sm. & Downs,
Psychotria stenocalyx Müll. Arg.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl.
Sin.: *Psychotria leiocarpa* Cham. & Schltdl. var. *intermedia* Müll. Arg.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Psychotria nemorosa Gardner
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria nitidula Cham. & Schltdl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, COA, PAI, SPE).

Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra
Sin.: *Cephaelis nuda* Cham. & Schltdl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Psychotria pedunculosa Rich.
Sin.: *Psychotria mapouriioides* DC.
Arbolito o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria pubigera Schltdl.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria stachyoides Benth.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria subspathulata (Müll. Arg.) C.M. Taylor
Sin.: *Mapouria subspathulata* Müll. Arg.
Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Psychotria suterella Müll. Arg.

Sin.: *Psychotria estrellana* Müll. Arg., *Suteria parviflora* Gardner, *Uragoga estrellana* (Müll. Arg.) Kuntze

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Randia L.

Randia brevityba Judkevich & R.M. Salas

Sin.: *Basanacantha spinosa* (Jacq.) K. Schum. var. *macrocalyx* Chodat & Hassl., *Basanacantha spinosa* (Jacq.) K. Schum. var. *parviflora* Chodat & Hassl.

Arbolito o árbol. Endémica. 100-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CAN, CON).

Randia claesii R.M. Salas

Arbusto. Nativa.

Países: ARG(CHA, FOR). PRY(AMA, CON, COA, PHA, SPE).

Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC.

Sin.: *Gardenia ferox* Cham. & Schltdl., *Solena ferox* (Cham. & Schltdl.) D. Dietr.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).

Randia heteromera Judkevich & R.M. Salas

Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). PRY(AMA, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Randia micracantha (Lillo) Bacigalupo

Sin.: *Basanacantha micracantha* Lillo, *Basanacantha trispinosa* Rojas Acosta, nom. nud., *Randia micracantha* (Lillo) Bacigalupo var. *glabra* Bacigalupo

Arbusto. Nativa. 600-2300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Richardia L.

Richardia brasiliensis Gomes

Sin.: *Richardia emetica* (Mart.) Schult. f., *Richardia rosea* (A. St.-Hil.) Schult., *Richardia rosea* (A. St.-Hil.) Schult. f. *albiflora* Kuntze, *Richardia rosea* (A. St.-Hil.) Schult. f. *lilacina* Kuntze, *Richardsonia brasiliensis* (B.A. Gomes) Hayne, *Richardsonia brasiliensis* (B.A. Gomes) Hayne var. *dubia* Beauverd & Felipp., *Richardsonia emetica* Mart., *Richardsonia rosea* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(MON, ROC).

Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud.

Sin.: *Richardia divergens* (Pohl ex DC.) Steud., *Richardia lateralis* (Pohl ex DC.) Steud., *Richardia sparsa* (Pohl ex DC.) Steud., *Richardsonia divergens* Pohl ex DC., *Richardsonia grandiflora* Cham. & Schltdl., *Richardsonia lateralis* Pohl ex DC., *Richardsonia sparsa* Pohl ex DC., *Spermacoe divergens* Pohl ex DC., *Spermacoe litoralis* Pohl ex DC.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CON, GUA, ITA, MIE, PAI).

Notas: Citada para Uruguay (Bacigalupo, 1968; Lewis & Oliver, 1974, Delprete & al., 2005) sin indicar localidad o material de referencia.

Richardia humistrata (Cham. & Schltdl.) Steud.

Sin.: *Richardsonia humistrata* Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SAO, SJO, SOR).

Richardia pedicellata (K. Schum.) Kuntze

Sin.: *Richardia acutifolia* (Krause) Standl. ex Hoehne, *Richardia pedicellata* (K. Schum.) Standl., *Richardsonia acutifolia* Krause, *Richardsonia pedicellata* K. Schum.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(GUA, SPE).

Richardia scabra L. var. **chacoensis** E.L. Cabral & Bacigalupo

Subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY).

Richardia schumannii W.H. Lewis & R.L. Oliv.

Hierba. Nativa. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Richardia stellaris (Cham. & Schltdl.) Steud.

Sin.: *Richardia astroites* (K. Schum.) Kuntze, *Richardsonia astroites* K. Schum., *Richardsonia stellaris* Cham. & Schltdl., *Richardsonia stellaris* Cham. & Schltdl. f. *linearifolia* Chodat & Hassl., *Richardsonia stellaris* Cham. & Schltdl. f. *robusta* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PAI).

URY(CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, SAO).

Rosenbergiodendron Fagel.

Rosenbergiodendron longiflorum (Ruiz & Pav.) Fagel.

Sin.: *Basanacantha macrocarpa* Rusby, *Gardenia longiflora* Ruiz & Pav., *Randia formosa* (Jacq.) K. Schum. var. *longiflora* (Ruiz & Pav.) K. Schum., *Randia ruiziana* DC., *Randia speciosa* DC., *Randia williamsii* Standl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR).

Rubia L.

Rubia tinctorum L.

Sin.: *Galium rubia* E.H.L. Krause

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Rudgea Salisb.

Rudgea coriacea (Spreng.) K. Schum.

Sin.: *Mussaenda coriacea* Spreng., *Rudgea villiflora* K. Schum. ex Standl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rudgea coronata (Vell.) Müll. Arg.

Sin.: *Psychotria coronata* Vell.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

Rudgea gardenioides (Cham.) Müll. Arg.

Sin.: *Coffea gardenioides* Cham.

Arbolito o árbol. Nativa. 1000-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rudgea jasminoides (Cham.) Müll. Arg. subsp. **corniculata** (Benth.) Zappi

Sin.: *Rudgea corniculata* Benth.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rudgea jasminoides (Cham.) Müll. Arg. subsp. **jasminoides**

Sin.: *Coffea jasminoides* Cham., *Coffea major* Cham., *Rudgea gaudichaudii* Müll. Arg., *Rudgea major* (Cham.) Müll. Arg., *Rudgea myrsinifolia* Benth.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

Rudgea nivosa André

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Rudgea parquiioides (Cham.) Müll. Arg. subsp. **caprifolium** (Zahlbr.) Zappi

Sin.: *Glomeria jasminiflora* Linden & André ex André, *Rudgea caprifolium* Zahlbr.

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Rudgea parquiioides (Cham.) Müll. Arg. subsp. **hirsutissima** Zappi

Arbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rudgea parquiioides (Cham.) Müll. Arg. subsp. **parquiioides**

Sin.: *Coffea parquiioides* Cham., *Rudgea littoralis* L.B. Sm. & Downs, *Rudgea parquiioides* (Cham.) Müll. Arg. var. *longiflora* Hassl., *Uragoga parquiioides* (Cham.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, ITA).

Rudgea recurva Müll. Arg.

Sin.: *Lockhartia ludibunda* Rchb. f., *Rudgea catharinae* Standl.

Arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Sabicea Aubl.

Sabicea villosa Roem. & Schult.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Schwendenera K. Schum.

Schwendenera tetrapyxis K. Schum.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Scleromitron (Wight & Arn.) Meisn.

Scleromitron lancifolium (Schumach.) Y.D. Zhou

Sin.: *Oldenlandia lancifolia* (Schumach.) DC.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Sherardia L.

Sherardia arvensis L.

Sin.: *Galium sherardia* E.H.L. Krause, *Hexodontocarpus arvensis* (L.) Dulac, *Sherardia arvensis* L. f. *argentina* Hicken

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, NEU, RNE, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE). URY(CAS, MON).

Simira Aubl.

Simira corumbensis (Standl.) Steyererm.

Sin.: *Sickingia corumbensis* Standl.

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Simira paraguayensis (Standl.) Steyerm.
Sin.: *Sickingia paraguayensis* Standl.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Simira sampaioana (Standl.) Steyerm.
Sin.: *Sickingia sampaioana* Standl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APY).

Sipanea Aubl.

Sipanea hispida Benth. ex Wernham
Sin.: *Sipanea hispida* Benth. ex Wernham
var. *major* (Hassl.) Steyerm., *Sipanea*
pratensis Aubl. var. *major* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Spermacoce L.

Spermacoce affinis (DC.) R.M. Salas
Sin.: *Borreria affinis* DC., *Borreria*
assurgens (K. Schum.) Hassl. var.
longisepala Hassl., *Borreria assurgens*
(Ruiz & Pav.) Griseb., *Borreria chacoensis*
Hassl., *Borreria chacoensis* Hassl. var.
glabrata Hassl., *Borreria diffusa* DC.,
Borreria eryngioides Cham. & Schltdl. var.
affinis (DC.) K. Schum., *Borreria*
eryngioides Cham. & Schltdl. var. *latifolia*
Hassl., *Borreria lagurus* S. Moore,
Borreria parviflora G. Mey. var. *scabra*
Griseb., *Spermacoce affinis* Pohl ex DC.,
Spermacoce chacoensis (Hassl.)
Govaerts, *Spermacoce hassleri* E.L.
Cabral & J. Florentin, nom. superfl.,
Spermacoce lagurus (S. Moore) Govaerts,
Spermacoce neodiffusa Govaerts

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,
BOQ, CAA, CEN, GUA, PHA). URY(MAL).

Spermacoce capitata Ruiz & Pav.
Sin.: *Borreria capitata* (Ruiz & Pav.) DC.,
Spermacoce elongata Pohl
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN).

Spermacoce confusa Rendle
Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).
BRA(SCA).

Spermacoce eryngioides (Cham. &
Schltdl.) Kuntze
Sin.: *Bigelovia eryngioides* (Cham. &
Schltdl.) Hook. & Arn., *Borreria*
eryngioides Cham. & Schltdl. var.
eryngioides

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE,
SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, CHO, CON,
GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(FLA).

Spermacoce multiflora (DC.) P.G.
Delprete
Sin.: *Borreria multiflora* (DC.) Bacigalupo
& E.L. Cabral, *Diodia multiflora* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Spermacoce ostenii (Standl.) E.L. Cabral
& J. Florentin
Sin.: *Borreria eryngioides* Cham. &
Schltdl. var. *ostenii* (Standl.) E.L. Cabral &
Bacigalupo, *Borreria ostenii* Standl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-
1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Spermacoce ovalifolia (M. Martens &
Galeotti) Hemsl.

Sin.: *Borreria ovalifolia* M. Martens &
Galeotti
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Spermacoce prostrata Aubl.
Sin.: *Borreria ocymoides* (Burm. f.) DC. f.
tenuis Chodat & Hassl., *Borreria*
ocymoides (Burm. f.) DC. var. *minima*
Chodat & Hassl., *Borreria prostrata* (Aubl.)
Miq., *Spermacoce cephalophora* Rusby
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAN, CHO,
CON, COA, MIE, PAI, PHA). URY(RNO).

Spermacoce riparia Cham. & Schltdl.
Sin.: *Spermacoce glabra* Michx. f. *latifolia*
Chodat & Hassl., *Spermacoceodes*
glabrum (Michx.) Kuntze var. *rectum*
Bacigalupo
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, ÑEE,
PAI, PHA). URY(FLA, ROC).

Spermacoce viridiflora (Chodat &
Hassl.) Govaerts
Sin.: *Borreria viridiflora* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CON, PAI).

Sphinctanthus Benth.

Sphinctanthus hasslerianus Chodat
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON).

Staelia Cham. & Schltdl.

Staelia juarezii E.L. Cabral & Salas
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(FOR).

Staelia nelidae Salas & E.L. Cabral
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Staelia thymoides Cham. & Schltdl.
Sin.: *Staelia filifolia* Chodat & Hassl., nom. illeg., *Staelia hassleri* Standl., *Staelia uruguaya* Arechav.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, COA, PAI). URY(ART).

Staelia virgata (Link ex Roem. & Schult.) K. Schum.
Sin.: *Borreria exigua* S. Moore, *Borreria finitima* S. Moore, *Mitracarpus virgatus* (Link ex Roem. & Schult.) Cham. & Schltdl., *Spermacoce exigua* (S. Moore) Govaerts, *Spermacoce virgata* Link ex Roem. & Schult., *Staelia caespitosa* Griseb., *Staelia virgata* (Link ex Roem. & Schult.) K. Schum. var. *correntina* E.L. Cabral & Salas
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Tocoyena Aubl.

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K. Schum.
Sin.: *Gardenia formosa* Cham. & Schltdl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K. Schum.

Sin.: *Gardenia sellowiana* Cham. & Schltdl.
Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

RUPPIACEAE

Ruppia L.

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande
Sin.: *Buccaferrea cirrhosa* Petagna, *Ruppia maritima* L. subsp. *spiralis* (L. ex Dumort.) Syme, *Ruppia spiralis* L. ex Dumort.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, LPA, SLU).

Ruppia filifolia (Phil.) Skottsb.
Sin.: *Potamogeton filifolius* Phil., *Ruppia andina* Phil., *Ruppia obtusa* Hagstr., *Ruppia obtusa* Hagstr. var. *repens* Hagstr.
Hierba acuática. Nativa. 0-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, NEU, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, MAG).

Ruppia maritima L. var. **longipes** Hagstr.
Sin.: *Ruppia maritima* L. f. *aculeata* Hagstr., *Ruppia maritima* L. f. *pectinata* (Rydb.) Hagstr., *Ruppia pectinata* Rydb.
Hierba acuática. Nativa.
Países: ARG(COR).

Ruppia maritima L. var. **maritima**
Sin.: *Ruppia maritima* L. subsp. *rostellata* (Koch ex Rchb.) Asch. & Graebn., *Ruppia maritima* L. var. *rostrata* C. Agardh, *Ruppia rostellata* Koch ex Rchb.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, SJU, SDE). BRA(PAR,

RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, ARA). PRY(APY).

RUTACEAE

Balfourodendron Corr. Mélo ex Oliv.

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.
Sin.: *Balfourodendron ebumeum* Corr. Mélo ex Oliv., nom. superfl., *Esenbeckia riedeliana* Engl., *Helietta multiflora* Engl.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, ITA, PAI, SPE).

Citrus L.

Citrus x aurantium L.
Árbol. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS, SAL, TUC). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, PAI).

Citrus reticulata Blanco, nom. cons.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(DFE, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Citrus x taitensis Risso
Sin.: *Citrus x aurantium* L. var. *otaitensis* Risso & Poit.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(MIS).

Citrus trifoliata L.
Sin.: *Bilacus trifoliata* (L.) Kuntze, *Poncirus trifoliata* (L.) Raf., *Pseudaegle trifoliata* (L.) Makino
Arbusto o árbol. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, COR).

Conchocarpus J.C. Mikan

Conchocarpus pentandrus (A. St.-Hil.)

Kallunki & Pirani

Sin.: *Galilea pentandra* A. St.-Hil.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Conchocarpus rubrus (A. St.-Hil.)

Bruniera & Groppo

Sin.: *Almeidea rubra* A. St.-Hil.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Dryades Groppo, Kallunki & Pirani

Dryades gaudichaudiana (A. St.-Hil.)

Groppo, Kallunki & Pirani

Sin.: *Conchocarpus gaudichaudianus* (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani, *Galipea gaudichaudiana* A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Esenbeckia Kunth

Esenbeckia densiflora (Chodat & Hassl.)

Hassl.

Sin.: *Esenbeckia febrifuga* (A. St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. var. *densiflora* Chodat & Hassl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI).

Esenbeckia febrifuga (A. St.-Hil.) A.

Juss. ex Mart.

Sin.: *Colythrum febrifugum* (A. St.-Hil.) Schott, *Esenbeckia febrifuga* (A. St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. var. *fruticosa* Hassl.,

Esenbeckia gracilis (K. Schum.) R.S. Cowan, *Euodia febrifuga* A. St.-Hil., *Metrodorea gracilis* K. Schum.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Esenbeckia grandiflora Mart.

Sin.: *Colythrum grandiflorum* (Mart.) Steud., *Esenbeckia grandiflora* Mart. var. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Polembryum jussieui* Schott

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, PAI).

Esenbeckia hieronymi Engl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Esenbeckia leiocarpa Engl.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Helietta Tul.

Helietta apiculata Benth.

Sin.: *Esenbeckia cuspidata* Engl., *Helietta cuspidata* (Engl.) Chodat, *Helietta cuspidata* Engl. f. *gracilis* Chodat & Hassl., *Helietta cuspidata* Engl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Helietta cuspidata* Engl. f. *subobtusa* Chodat & Hassl., *Helietta longifoliata* Britton, nom. superfl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Helietta puberula R.E. Fr.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Metrodorea A. St.-Hil.

Metrodorea nigra A. St.-Hil.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Pilocarpus Vahl

Pilocarpus pauciflorus A. St.-Hil.

Sin.: *Pilocarpus breviracemosus* R.S. Cowan

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pilocarpus pennatifolius Lem.

Sin.: *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *brasiliensis* Hassl., nom. illeg., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *gracilis* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *intermedius* Hassl., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *latifoliolatus* Hassl., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *paraguariensis* Hassl., nom. superfl., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. var. *genuinus* Hassl., nom. inval., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. var. *selloanus* (Engl.) Hassl., *Pilocarpus selloanus* Engl. f. *brevipedicellata* Chodat & Hassl., *Pilocarpus selloanus* Engl. var. *gracilis* Chodat & Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Pilocarpus spicatus A. St.-Hil.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Pitavia Molina

Pitavia punctata (Ruiz & Pav.) Molina
Sin.: *Galvezia punctata* Ruiz & Pav.
Árbol. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Raulinoa R.S. Cowan

Raulinoa echinata R.S. Cowan
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Ruta L.

Ruta chalepensis L.
Sin.: *Ruta graveolens* L. var. *chalepensis* (L.) Weston
Arbusto. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).

Zanthoxylum L.

Zanthoxylum armatum DC.
Arbusto. Introducida. 700.
Países: ARG(COR).

Zanthoxylum caribaeum Lam. subsp. **rugosum** (A. St.-Hil. & Tul.) Reynel
Sin.: *Fagara caribaea* (Lam.) Krug & Urb., *Fagara chiloperone* (Mart. ex Engl.) Engl. ex Chodat & Hassl. var. *angustifolia* (Engl.) Chodat & Hassl., *Fagara rugosa* (A. St.-Hil. & Tul.) Engl., *Zanthoxylum caribaeum* Lam., *Zanthoxylum chiloperone* Mart. ex Engl., *Zanthoxylum chiloperone* Mart. ex Engl. var. *angustifolium* Engl., *Zanthoxylum rugosum* A. St.-Hil. & Tul.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,

CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & Arn.
Sin.: *Fagara coco* (Gillies ex Hook. f. & Arn.) Engl., *Zanthoxylum stipitatum* Engl.
Árbol. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). PRY(PAI).

Zanthoxylum externum (Skottsb.) Stuessy
Sin.: *Fagara externa* Skottsb.
Árbol. Endémica.
Países: CHL(JFE).

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. subsp. **culantrillo** (Kunth) Reynel
Sin.: *Fagara culantrillo* (Kunth) Schult. & Schult. f., *Fagara hyemalis* (A. St.-Hil.) Engl., *Fagara nigrescens* R.E. Fr., *Zanthoxylum culantrillo* Kunth, *Zanthoxylum hyemale* A. St.-Hil., *Zanthoxylum praecox* A. St.-Hil.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. subsp. **fagara**
Sin.: *Fagara pterota* L., *Fagara pterota* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Pterota fagara* (L.) Crantz, *Schinus fagara* L., *Zanthoxylum pterota* (L.) Kunth, *Zanthoxylum pterota* (L.) Kunth var. *guaraniticum* (Chodat & Hassl.) P.G. Waterman
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA,

COL, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Zanthoxylum kleinii (R.S. Cowan) P.G. Waterman
Sin.: *Fagara kleinii* R.S. Cowan
Arbusto o árbol. Nativa. 100-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zanthoxylum mayu Bertero ex Colla
Sin.: *Fagara mayu* (Bertero ex Colla) Engl.
Árbol. Endémica.
Países: CHL(JFE).

Zanthoxylum monogynum A. St.-Hil.
Sin.: *Fagara monogyna* (A. St.-Hil.) Engl., *Zanthoxylum arenarium* Engl.
Arbolito o árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Zanthoxylum petiolare A. St.-Hil. & Tul.
Sin.: *Fagara hieronymi* Engl., *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl., *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. var. *angustifoliola* Lillo, *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl. var. *paraguariensis* (Chodat & Hassl.) Escal., *Fagara niederleinii* Engl., *Fagara paraguariensis* Chodat & Hassl., *Fagara paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Fagara paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *fruticosa* Chodat & Hassl., *Fagara paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. var. *niederleinii* (Engl.) Nájera, *Zanthoxylum naranjillo* Griseb., *Zanthoxylum naranjillo* Griseb. var. *angustifolium* (Lillo) P.G. Waterman, *Zanthoxylum paraguariensis* (Chodat & Hassl.) Standl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

Sin.: *Fagara astrigera* R.S. Cowan, *Fagara coco* (Gillies) Engl. var. *formosana* Lillo, *Fagara regnelliana* (Engl.) Chodat & Hassl., *Fagara regnelliana* (Engl.) Chodat & Hassl. var. *calvata* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. f. *paucijuga* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. var. *intermedia* R.S. Cowan & L.B. Sm., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. var. *peltophora* (Turcz.) Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. var. *petiolulata* (Engl.) Engl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. var. *surparanaensis* Nájera, *Fagara sorbifolia* (A. St.-Hil.) Engl., *Pohlana langsdorfii* Nees & Mart., *Zanthoxylum acutifolium* Engl. var. *petiolulatum* Engl., *Zanthoxylum astrigerum* (R.S. Cowan) P.G. Waterman, *Zanthoxylum langsdorffii* (Nees & Mart.) A. St.-Hil., *Zanthoxylum obscurum* Engl., *Zanthoxylum peltophorum* Turcz., *Zanthoxylum regnellianum* Engl., *Zanthoxylum rhoifolium* Lam. var. *formosanum* (Lillo) P.G. Waterman, *Zanthoxylum rhoifolium* Lam. var. *peltophorum* (Turcz.) Engl., *Zanthoxylum rhoifolium* Lam. var. *petiolulatum* Engl., *Zanthoxylum rhoifolium* Lam. var. *surparanaense* (Nájera) P.G. Waterman, *Zanthoxylum sorbifolium* A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, ROC, SJO, TAC).

Zanthoxylum riedelianum Engl.

Sin.: *Fagara cuiabensis* (Engl.) Engl., *Fagara riedeliana* (Engl.) Engl., *Fagara riedeliana* (Engl.) Engl. var. *pubescens* Chodat & Hassl., *Zanthoxylum cuiabense* Engl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Zanthoxylum rigidum Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **hasslerianum** (Chodat) Reynel

Sin.: *Fagara hassleriana* Chodat, *Fagara hassleriana* Chodat var. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Fagara rigidifolia* Herzog, *Zanthoxylum hasslerianum* (Chodat) Pirani, *Zanthoxylum rigidifolium* (Herzog) P.G. Waterman

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(APY, AMA, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Zanthoxylum tingoassuiba A. St.-Hil.

Sin.: *Fagara tingoassuiba* (A. St.-Hil.) Hoehne

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

SABIACEAE**Meliosma** Blume**Meliosma sellowii** Urb.

Sin.: *Meliosma sinuata* Urb.

Árbol. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

SALICACEAE**Abatia** Ruiz & Pav.**Abatia angeliana** M.H. Alford

Sin.: *Aphaerema spicata* Miers

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Abatia stellata Lillo

Arbusto. Nativa. 1300-2300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Azara Ruiz & Pav.**Azara alpina** Poepp. & Endl.

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Azara celastrina D. Don

Sin.: *Azara lilen* Bertero, nom. nud., *Azara sparsiflora* Steud., nom. nud.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Azara dentata Ruiz & Pav.

Sin.: *Azara celastrina* D. Don var. *tomentosa* (Steud.) Reiche, *Azara tomentosa* Bertero ex Steud.

Arbolito. Endémica. 500-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Azara integrifolia Ruiz & Pav.

Sin.: *Azara berteroniana* Steud., *Azara browneae* F. Phil., *Azara hirtella* Miq., *Azara integrifolia* Ruiz & Pav. var. *browneae* (F. Phil.) Reiche, *Azara integrifolia* Ruiz & Pav. var. *pyncnophylla* (Phil.) Reiche, *Azara intermedia* Gay, *Azara lechleriana* Steud., *Azara pyncnophylla* Phil.

Arbusto. Endémica. 200-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Azara lanceolata Hook. f.

Sin.: *Azara brumalis* Gand., *Azara chilensis* Hook. f., *Azara lanceolata* Hook. f. var. *chilensis* (Hook. f.) Reiche, *Azara serrata* Ruiz & Pav. var. *chilensis* (Hook. f.) Reiche

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Azara microphylla Hook. f.

Sin.: *Azara borealis* F. Phil., *Azara valdiviae* Lechl. ex Steud., *Myrtophyllum chilense* Turcz.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Azara petiolaris (D. Don) I.M. Johnst.

Sin.: *Azara gilliesii* Hook. & Arn., *Quillaja petiolaris* D. Don

Árbol. Endémica. 600-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Azara salicifolia Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE).

Azara serrata Ruiz & Pav. var. **fernandeziana** (Gay) Reiche

Sin.: *Azara fernandeziana* Gay

Arbusto o arbolito. Endémica. 300-400 m.

Países: CHL(JFE).

Azara serrata Ruiz & Pav. var. **serrata**

Sin.: *Azara bergii* F. Phil., *Azara dubia* Steud., *Azara subandina* Phil., *Azara umbellata* Phil.

Arbusto o arbolito. Endémica. 200-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Azara uruguayensis (Speg.) Sleumer

Sin.: *Arechavaletaia uruguayensis* Speg.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Banara Aubl.

Banara arguta Briq.

Sin.: *Banara guianensis* Aubl. var. *argentina* Lillo

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

Banara brasiliensis (Schott) Benth.

Sin.: *Ascara brasiliensis* Schott

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Banara parviflora (A. Gray) Benth.

Sin.: *Kuhlia parviflora* A. Gray

Arbolito o árbol. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Probablemente en Paraguay

Banara tomentosa Clos

Sin.: *Banara bernardinensis* Briq., *Banara flavovirens* Briq., *Banara hassleri* Briq., *Banara macrophylla* Briq.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, RIV).

Banara umbraticola Arechav.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SFE). URY(ART, TAC).

Casearia Jacq.

Casearia aculeata Jacq.

Sin.: *Casearia boliviana* Briq., *Casearia hassleri* Briq.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON, SPE).

Casearia americana (L.) T. Samar. & M.H. Alford

Sin.: *Laetia americana* L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CON, PHA).

Casearia arborea (Rich.) Urb.

Sin.: *Samyda arborea* Rich.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Casearia catharinensis Sleumer

Arbolito o árbol. Endémica. 300-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Casearia decandra Jacq.

Sin.: *Casearia floribunda* Briq., *Casearia parvifolia* Willd., nom. illeg., *Casearia parvifolia* Willd. var. *paraguariensis* Briq., *Casearia reflexa* Sleumer

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CLA, RIV).

Casearia gossypiosperma Briq.

Sin.: *Gossypiospermum paraguariense* Rehder

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR).
PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, PAI). URY(SAO).

Casearia hirsuta Sw.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Casearia lasiophylla Eichler

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Casearia mariquitensis Kunth

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR).

Casearia obliqua Spreng.

Sin.: *Casearia inaequilatera* Cambess.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Casearia paranaensis Sleumer

Árbol. Endémica. 1000.

Países: BRA(PAR).

Casearia pauciflora Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Casearia sylvestris Sw. var. *lingua*
(Cambess.) Eichler

Sin.: *Casearia lingua* Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(ERI). BRA(PAR).

Casearia sylvestris Sw. var. *syvestris*

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA,
SPE). URY(ART, CLA, PAY, RIV, ROC,
SAO, TYT).

Populus L.

Populus alba L.

Árbol. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(COR, RNE, SFE).

Populus deltoides W. Bartram ex
Marshall

Sin.: *Populus angulata* Aiton

Árbol. Introducida. 400-1300 m.

Países: ARG(COR).

Populus nigra L.

Árbol. Introducida.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE).
CHL(BIO).

Prockia P. Browne ex L.

Prockia crucis P. Browne ex L.

Sin.: *Prockia crucis* P. Browne ex L. var.
septemnervia (Spreng.) Sleumer, *Prockia*
glabra Briq., *Prockia grandiflora* Herzog,
Prockia hassleri Briq., *Prockia*
septemnervia Spreng.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(ART).

Salix L., nom. cons.

Salix alba L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, MEN).
CHL(BIO, LSR).

Salix babylonica L.

Árbol. Introducida. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COR, MEN).
CHL(COQ, BIO, ARA, RME, JFE).

Salix caprea L.

Arbusto. Introducida. 1000-1500 m.

Países: ARG(RNE). CHL(BIO).

Salix fragilis L.

Árbol. Introducida. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI,
JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE). URY(CAS).

Salix humboldtiana Willd. var.
humboldtiana

Sin.: *Salix chilensis* Molina var. *crispa*
Stuck. ex Seckt, *Salix magellanica* Lam.

Árbol. Nativa. 0-3900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,
MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE, SDE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP,
TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME). PRY(CEN, ÑEE, PAI,
SPE). URY(CAS, DUR, FLA, MAL, MON,
PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Salix humboldtiana Willd. var. *martiana*
(Leyb.) Andersson

Sin.: *Salix martiana* Leyb.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR,
SCA). PRY(CEN, COA, PAI). URY.

Salix viminalis L.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, NEU, RNE).
CHL(LBO, BIO, ARA, LSR, AIS, MAG,
RME).

Xylosma G. Forst., nom. cons.

Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler

Sin.: *Hisingera ciliatifolia* Clos, *Myroxylon*
ciliatifolium (Clos) Kuntze, *Xylosma pou-*
orfilae Herter, nom. nud.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA).

Xylosma glaberrima Sleumer
Sin.: *Hisingera salzmännii* Clos
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Xylosma longipetiolata Legname
Árbol. Nativa. 1500-1700 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Xylosma prockia (Turcz.) Turcz.
Sin.: *Hisingera lucens* Clos, *Hisingera prockia* Turcz., *Hisingera salzmännii* Clos, *Myroxylon salzmännii* (Clos) Kuntze
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).
Notas: Citado para Paraguay por Sleumer (1980: 170), no en Soloaga & al., (2000)

Xylosma pubescens Griseb.
Sin.: *Myroxylon pubescens* (Griseb.) Warb., hom. illeg.
Arbusto o árbol. Nativa. 400-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).

Xylosma schroederi Sleumer ex Herter
Sin.: *Xylosma herteri* Sleumer ex Herter
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV, SJO, TAC, TYT).

Xylosma tweediana (Clos) Eichler
Sin.: *Hisingera tweediana* Clos, *Myroxylon grayi* Warb., *Myroxylon tweedianum* (Clos) Kuntze, *Myroxylon warburgii* Briq., *Xylosma sleumeri* Herter, nom. nud., *Xylosma venosa* N.E. Br. var. *populneum* Sleumer ex Lombardo, *Xylosma warburgii* (Briq.) Briq.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Xylosma venosa N.E. Br.
Sin.: *Xylosma balansae* Briq., *Xylosma paraguayensis* Briq.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, RIV, TYT).

SANTALACEAE

Acanthosyris (Eichler) Griseb.

Acanthosyris falcata Griseb.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). PRY(APA, APY, CEN, COA, PHA).

Acanthosyris spinescens (Mart. & Eichler) Griseb.
Sin.: *Acanthosyris platensis* Speg., *Osyris spinescens* Mart. & Eichler
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, SAO, SJO).

Antidaphne Poepp. & Endl.

Antidaphne punctulata (Clos) Kuijt
Sin.: *Eremolepis punctulata* (Clos) Griseb., *Eremolepis verrucosa* Griseb., *Lepidoceras punctulatum* Clos
Arbusto parásito. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Eubracion Hook. f.

Eubracion ambiguum (Hook. & Arn.) Engl.
Sin.: *Eubracion ambiguum* (Hook. & Arn.) Engl. var. *jamaicense* Krug & Urb., *Eubracion andalgalense* Abbiatti, *Eubracion arnottii* Hook. f., *Eubracion brasiliense* Eichler, *Viscum ambiguum* Hook. & Arn.
Arbusto parásito. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, FLA, MON, SAO, SJO, SOR).

Jodina Hook. & Arn. ex Meisn.

Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek subsp. **delasotae** Arana & Luna
Sin.: *Ilex cuneifolia* L. var. *bonariensis* DC., *Jodina bonariensis* (DC.) Kuntze
Árbol. Endémica.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLO, LAV, MAL).

Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek subsp. **rhombifolia**
Sin.: *Celastrus jodina* Steud., nom. nud., *Celastrus rhombifolius* Hook. & Arn., *Jodina ruscifolia* Hook. & Arn., nom. nud.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY. URY(CAS, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SAO, TYT).

Lepidoceras Hook. f.

Lepidoceras chilense (Molina) Kuijt
Sin.: *Lepidoceras dombeyi* Hook. f., *Lepidoceras kingii* Hook. f., *Lepidoceras squamifer* Clos, *Myrtobium microphyllum* Miq., *Viscum chilense* Molina

Arbusto parásito. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Myoschilos Ruiz & Pav.

Myoschilos oblongum Ruiz & Pav.

Sin.: *Myoschilos angusta* Phil., *Myoschilos oblongum* Ruiz & Pav. var. *angusta* (Phil.) Macloskie

Arbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Nanodea Banks ex Gaertn.

Nanodea muscosa Banks ex Gaertn.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Phoradendron Nutt.

Phoradendron argentinum Urb.

Sin.: *Phoradendron meliae* Trel., *Phoradendron pruinatum* Urb., *Phoradendron rubrum* (L.) Griseb. f. *latior* Chodat & Hassl.

Arbusto parásito. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, PHA). URY(RNO).

Phoradendron bathoryctum Eichler

Sin.: *Phoradendron balansae* Trel., *Phoradendron balansae* Trel. f. *hassleri* Trel., *Phoradendron balansae* Trel. f. *morongii* Trel., *Phoradendron hieronymi* Trel., *Phoradendron lindemaniae* Kuijt, *Phoradendron pachyneuron* Kuijt, *Phoradendron paraguari* Kuijt, *Phoradendron ulophyllum* Eichler

Arbusto parásito. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Phoradendron berterioanum (DC.) Griseb.

Sin.: *Viscum berterioanum* DC.
Arbusto parásito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Phoradendron burkartii Rizzini & Ulibarri

Arbusto parásito. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV).

Phoradendron chrysocladon A. Gray

Arbusto parásito. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phoradendron coriaceum Mart. ex Eichler

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Phoradendron craspedophyllum Eichler

Arbusto parásito. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler

Sin.: *Viscum crassifolium* Pohl ex DC.
Arbusto parásito. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

Phoradendron dipterum Eichler

Sin.: *Phoradendron casimiranum* Trel., *Phoradendron glaziouvi* Urb., *Phoradendron hypericifolium* Trel., *Phoradendron multifoveolatum* Eichler, *Phoradendron tetrapterum* Krug & Urb.

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, PAI).

Phoradendron ensifolium (Pohl ex DC.) Eichler

Sin.: *Phoradendron falcifrons* (Hook. & Arn.) Eichler, *Phoradendron interruptum* (DC.) B.D. Jacks., *Phoradendron linearifolium* Eichler, *Phoradendron subfalcatum* Abbiatti, *Viscum ensifolium* Pohl ex DC., *Viscum falcifrons* Hook. & Arn., *Viscum interruptum* DC.

Arbusto parásito. Nativa. 500-1100 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, GUA, PAI). URY(LAV, RIV, TAC).

Phoradendron habrostachyum Eichler

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(APA).

Phoradendron hexastichum (DC.) Griseb.

Sin.: *Viscum hexastichum* DC.
Arbusto parásito. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Phoradendron holoxanthum Eichler

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Phoradendron inaequidentatum Rusby

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Phoradendron mucronatum (DC.) Krug & Urb.

Sin.: *Phoradendron emarginatum* Eichler, *Phoradendron obovatifolium* Morong, *Viscum mucronatum* DC.

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, PAI, PHA, SPE).

Phoradendron obtusissimum (Miq.) Eichler

Sin.: *Phoradendron acinacifolium* Mart. ex Eichler, *Phoradendron acinacifolium* Mart. ex Eichler f. *microcarpum* Kuntze, *Phoradendron craspedophylloides* Trel., *Phoradendron reductum* Trel., *Viscum obtusissimum* Miq.

Arbusto parásito. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CHO, COA, GUA, PAI, PHA). URY(RNO).

Phoradendron pellucidulum Eichler

Arbusto parásito. Nativa. 0-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN).

Phoradendron perrottetii (DC.) Eichler

Sin.: *Viscum perrottetii* DC.

Arbusto parásito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU). BRA(PAR, SCA).

Phoradendron piperoides (Kunth) Trel.

Sin.: *Loranthus piperoides* Kunth, *Phoradendron latifolium* (Sw.) Griseb., *Viscum latifolium* Sw.

Arbusto parásito. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb.

Sin.: *Loranthus quadrangularis* Kunth, *Phoradendron affine* (Pohl ex DC.) Engl. &

Krause, *Phoradendron liga* (Gillies ex Hook. & Arn.) Eichler, *Phoradendron martianum* Trel., *Viscum affine* Pohl ex DC., *Viscum liga* Gillies ex Hook. & Arn.

Arbusto parásito. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, CHO, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Phoradendron rusbyi Britton

Hierba parásita. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(JUU).

Phoradendron tucumanensis Urb.

Arbusto parásito. Nativa. 500-1700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Phoradendron undulatum (Pohl ex DC.) Eichler

Sin.: *Phoradendron hamatifolium* Rizzini, *Viscum undulatum* Pohl ex DC.

Arbusto parásito. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Santalum L.

Santalum fernandezianum F. Phil.

Árbol. Endémica.

Países: CHL(JFE).

Notas: Especie extinta.

Thesium L.

Thesium aphyllum Mart. ex A.DC.

Sin.: *Thesium brasiliensis* A.DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

SAPINDACEAE

Acer L.

Acer negundo L.

Sin.: *Rulac negundo* (L.) Hitchc.

Árbol. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC).

Acer pseudoplatanus L.

Árbol. Introducida. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR).

Allophylus L.

Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl.

Sin.: *Allophylus edulis* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. var. *gracilis* Radlk., *Allophylus edulis* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. var. *rosae* F.A. Barkley & Villa, *Allophylus pauciflorus* Radlk. var. *rojasii* F.A. Barkley & Villa, *Schmidelia edulis* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess., *Urvillea seriana* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(DUR, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk.

Sin.: *Allophylus guaraniticus* (A. St.-Hil.) Radlk. var. *pilosus* F.A. Barkley & Villa, *Schmidelia guaranitica* A. St.-Hil.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

CAA, CAN, CEN, GUA, ITA). URY(ART, RIV, ROC).

Allophylus pauciflorus Radlk.

Sin.: *Allophylus pauciflorus* Radlk. var. *lilloi* F.A. Barkley & Villa, *Allophylus pauciflorus* Radlk. var. *schreiteri* F.A. Barkley & Villa

Arbusto o arbolito. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(CON).

Allophylus petiolulatus Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Allophylus puberulus (Cambess.) Radlk.

Sin.: *Schmidelia puberula* Cambess.
Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR).

Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk.

Sin.: *Schmidelia semidentata* Miq.
Árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Allophylus strictus Radlk.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Athyana (Griseb.) Radlk.

Athyana weinmanniifolia (Griseb.) Radlk.

Sin.: *Athyana weinmanniifolia* (Griseb.) Radlk. f. *membranacea* Radlk., *Athyana weinmanniifolia* (Griseb.) Radlk. f. *tomentella* Radlk., *Thouinia weinmanniifolia* Griseb.
Árbol. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, CON).

Averrhoidium paraguayense Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Bridgesia Bertero ex Cambess.

Bridgesia incisifolia Bertero ex Cambess.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Cardiospermum L.

Cardiospermum corindum L.

Sin.: *Cardiospermum corindum* L. f. *angustisectum* (Griseb.) Radlk., *Cardiospermum corindum* L. f. *elongatum* Radlk., *Cardiospermum corindum* L. f. *loxense* (Kunth) Radlk., *Cardiospermum corindum* L. f. *parviflorum* (Cambess.) Radlk., *Cardiospermum corindum* L. f. *subglabratum* Radlk., *Cardiospermum corindum* L. f. *villosum* Radlk., *Cardiospermum corindum* L. var. *angustisectum* (Griseb.) F.A. Barkley, *Cardiospermum corindum* L. var. *elongatum* (Radlk.) F.A. Barkley, *Cardiospermum corindum* L. var. *loxense* (Kunth) F.A. Barkley, *Cardiospermum corindum* L. var. *parviflorum* (Cambess.) Ferrucci, *Cardiospermum corindum* L. var. *subglabratum* (Radlk.) F.A. Barkley, *Cardiospermum halicacabum* L. var. *angustisectum* Griseb., *Cardiospermum loxense* Kunth, *Cardiospermum parviflorum* Cambess.

Liana. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, PHA).

Cardiospermum grandiflorum Sw.

Sin.: *Cardiospermum duarteanum* Cambess., *Cardiospermum velutinum* Hook. & Arn.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, SOR).

Cardiospermum halicacabum L. var. **halicacabum**

Sin.: *Corindum halicacabum* (L.) Medik.

Liana. Cosmopolita. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PHA). URY(CAS, CLA, SJO, SOR).

Cardiospermum halicacabum L. var. **microcarpum** (Kunth) Blume

Sin.: *Cardiospermum microcarpum* Kunth

Liana. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, SAO, SOR).

Cupania L.

Cupania oblongifolia Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cupania tenuivalvis Radlk.

Arbolito. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cupania vernalis Cambess.

Sin.: *Cupania uraguensis* Hook. & Arn.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Averrhoidium Baill.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Diatenopteryx Radlk.

Diatenopteryx sorbifolia Radlk.

Sin.: *Thouinia ornifolia* Griseb.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Dilodendron Radlk.

Dilodendron bipinnatum Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CON).

Diplokeleba N.E. Br.

Diplokeleba floribunda N.E. Br.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Dodonaea Mill.

Dodonaea viscosa Jacq.

Sin.: *Dodonaea arborea* Herter, *Dodonaea burmanniana* DC., *Dodonaea jamaicensis* DC., *Dodonaea viscosa* Jacq. f. *burmanniana* (DC.) Radlk., *Dodonaea viscosa* Jacq. subsp. *angustifolia* (L. f.) J.G. West, *Dodonaea viscosa* Jacq. subsp. *burmanniana* (DC.) J.G. West,

Dodonaea viscosa Jacq. var. *angustifolia* (L. f.) Benth.

Arbusto o arbolito. Cosmopolita. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, IPA). URY(CAS, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, TYT).

Guindilia Gillies ex Hook. & Arn.

Guindilia cristata (Radlk.) Hunz.

Sin.: *Valenzuelia cristata* Radlk., *Valenzuelia cristata* Radlk. var. *irregularis* Burkart

Arbusto. Endémica. 1200-2500 m.

Países: ARG(CAT, SJU).

Guindilia dissecta (Covas & Burkart) Hunz.

Sin.: *Valenzuelia dissecta* Covas & Burkart

Arbusto. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(MEN).

Guindilia trinervis Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Valenzuelia trinervis* Bertero ex Cambess.

Arbusto. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Koelreuteria Laxm.

Koelreuteria elegans (Seem.) A.C. Sm. subsp. **formosana** (Hayata) F.G. Mey.

Sin.: *Koelreuteria formosana* Hayata

Árbol. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, SAL, SFE, SDE).

Llagunoa Ruiz & Pav.

Llagunoa glandulosa (Hook. & Arn.) G. Don

Sin.: *Amirola glandulosa* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Magonia A. St.-Hil.

Magonia pubescens A. St.-Hil.

Sin.: *Magonia glabrata* A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CON).

Matayba Aubl.

Matayba cristae Reitz

Arbusto o árbol. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Matayba elaeagnoides Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, RIV).

Matayba guianensis Aubl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Matayba intermedia Radlk.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Matayba juglandifolia (Cambess.) Radlk.

Sin.: *Sapindus juglandifolius* Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Matayba marginata Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 700-900 m.

Países: BRA(PAR).

Matayba obovata R. Coelho, V.C. Souza & Ferrucci

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Melicoccus P. Browne

Melicoccus lepidopetalus Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).
PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Paullinia L.

Paullinia carpopodea Cambess.

Sin.: *Paullinia affinis* Cambess., *Paullinia multiflora* Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Paullinia coriacea Casar.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Paullinia cristata Radlk.

Liana. Nativa. 100-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paullinia elegans Cambess.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, SAO, SOR).

Paullinia meliifolia Juss.

Sin.: *Paullinia meliifolia* Juss. f. *subglabra* Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, ITA).

Paullinia micrantha Cambess.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Paullinia pinnata L.

Sin.: *Paullinia angusta* N.E. Br.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE).
BRA(PAR). PRY(APY, APA, CAN, CEN, CON, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Paullinia revoluta Radlk.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Paullinia rhomboidea Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Paullinia seminuda Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Paullinia spicata Benth.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

Paullinia trigonia Vell.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paullinia uloptera Radlk.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Sapindus L.

Sapindus saponaria L.

Sin.: *Sapindus divaricatus* Cambess.,
Sapindus inaequalis DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR). CHL(AYP, IPA). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Serjania Mill.

Serjania acoma Radlk.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Serjania altissima (Poepp.) Radlk.

Sin.: *Cardiospermum altissimum* Poepp.,
Serjania descolei F.A. Barkley, *Serjania glutinosa* Radlk.,
Serjania glutinosa Radlk. f. *multisetata* Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).

Serjania ampelopsis Planch. & Linden

Sin.: *Serjania areolata* Radlk.

Liana. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(SAL).

Serjania caracasana (Jacq.) Willd.

Sin.: *Paullinia caracasana* Jacq., *Serjania caracasana* (Jacq.) Willd. f. *nitidula* Radlk., *Serjania caracasana* (Jacq.) Willd. f. *puberula* Radlk., *Serjania nitidula* Benth., *Serjania platyptera* (Radlk.) F.A. Barkley

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CHO, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Serjania cissooides Radlk.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Serjania clematidifolia Cambess.

Liana. Nativa. 500-1000 m.

- Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Serjania communis** Cambess. var. **communis**
Sin.: *Serjania communis* Cambess. var. *mollis* Radlk., *Serjania communis* Cambess. var. *pilosula* Radlk., *Serjania hirsuta* Cambess., *Serjania stenopterygia* Radlk.
Liana. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Serjania communis** Cambess. var. **glabra** Radlk.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Serjania confertiflora** Radlk.
Sin.: *Serjania confertiflora* Radlk. f. *glabriuscula* Radlk., nom. superfl., *Serjania confertiflora* Radlk. f. *subincana* Radlk., *Serjania confertiflora* Radlk. var. *dasycephala* Radlk.
Liana. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY, CON).
- Serjania decemstriata** Radlk.
Enredadera. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).
- Serjania erecta** Radlk.
Sin.: *Paullinia grandiflora* Cambess.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).
- Serjania eriocarpa** Radlk.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CON).
- Serjania ferruginea** (Lindl.) Mabb.
Sin.: *Serjania cuspidata* Cambess., *Urvillea ferruginea* Lindl.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Serjania foveata** Griseb.
Sin.: *Serjania meridionalis* Cambess. var. *borsiniae* F.A. Barkley, *Serjania meridionalis* Cambess. var. *foveata* (Griseb.) Griseb.
Arbusto o liana. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Serjania fuscifolia** Radlk.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
- Serjania glabrata** Kunth
Sin.: *Paullinia brachystachya* Griseb., *Serjania fulta* Griseb., *Serjania glabrata* Kunth f. *mollior* Radlk.
Liana. Nativa. 300-1700 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
- Serjania gracilis** Radlk.
Liana. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Serjania hatschbachii** Ferrucci
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Serjania hebecarpa** Benth.
Sin.: *Serjania hebecarpa* Benth. f. *amblycephala* Radlk., *Serjania hebecarpa* Benth. f. *oxycephala* Radlk., nom. superfl., *Serjania hebecarpa* Benth. f. *platycephala* Radlk.
Liana. Nativa. 300-800 m.
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, DUR, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).
- Serjania herteri** Ferrucci
Sin.: *Paullinia australis* A. St.-Hil., *Serjania australis* (A. St.-Hil.) Herter, nom. illeg.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(ART, SAO).
- Serjania incana** Radlk.
Sin.: *Houssayanthus fiebrigii* (F.A. Barkley) Hunz., *Houssayanthus incanus* (Radlk.) Ferrucci, *Serjania glabriuscula* (Radlk.) F.A. Barkley, *Serjania humifusa* Radlk., *Serjania incana* Radlk. f. *glabriuscula* Radlk., *Urvillea fiebrigii* F.A. Barkley
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).
- Serjania laruotheana** Cambess.
Liana. Nativa. 100-400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, GUA, PAI, SPE).
- Serjania leptocarpa** Radlk.
Liana. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).
- Serjania lethalis** A. St.-Hil.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Notas: Citada para Paraguay (Barkley, 1957) sobre la base de material mal identificado.
- Serjania longistipula** Radlk.
Sin.: *Serjania araquei* F.A. Barkley
Liana. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Serjania mansiana** Mart.
Liana. Nativa. 600-800 m.
Países: BRA(PAR).

Serjania marginata Casar.

Sin.: *Serjania marginata* Casar. f. *isopterygia* Radlk., *Serjania marginata* Casar. f. *pluridentata* Radlk.

Liana. Nativa. 400-1200 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Serjania meridionalis Cambess.

Sin.: *Serjania meridionalis* Cambess. var. *cuezzoi* F.A. Barkley, *Serjania meridionalis* Cambess. var. *odonellii* F.A. Barkley

Arbusto o liana. Nativa. 100-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, COL, SAO, SOR).

Serjania minutiflora Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

Serjania monogyna Hoffmanns. ex Schltdl.

Sin.: *Houssayanthus monogynus* (Hoffmanns. ex Schltdl.) Ferrucci, *Houssayanthus sparrei* (F.A. Barkley) Ferrucci, *Paullinia monogyna* (Hoffmanns. ex Schltdl.) Radlk., *Paullinia monogyna* (Hoffmanns. ex Schltdl.) Radlk. f. *major* Radlk., nom. superfl., *Paullinia monogyna* (Hoffmanns. ex Schltdl.) Radlk. f. *minor* Radlk., *Urvillea sparrei* F.A. Barkley

Liana. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(FOR). PRY(CEN, MIE, ÑEE, PAI).

Serjania multiflora Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Serjania neei Acev.-Rodr.

Enredadera. Nativa. 200-400 m.

Países: PRY(APY).

Serjania orbicularis Radlk.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Serjania paranensis Ferrucci & Acev.-Rodr.

Liana. Nativa. 600-800 m.

Países: BRA(PAR).

Serjania perulacea Radlk. var. **chacoensis** Coulleri & Ferrucci

Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, PHA).

Serjania perulacea Radlk. var. **krapovickasii** Coulleri & Ferrucci

Sin.: *Serjania meyeri* F.A. Barkley

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Serjania piscatoria Radlk.

Liana. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR).

Serjania punctulata Radlk.

Liana. Endémica. 600-800 m.

Países: BRA(PAR).

Serjania reticulata Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).

Serjania sufferruginea Radlk.

Liana. Nativa. 1000-2200 m.

Países: ARG(SAL).

Serjania tripleuria Ferrucci

Liana. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Serjania tristis Radlk.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, PAI).

Serjania unidentata Acev.-Rodr.

Liana. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Talisia Aubl.**Talisia angustifolia** Radlk.

Sin.: *Talisia humilis* Mattos, *Talisia pygmaea* Radlk.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CON, SPE).

Talisia esculenta (Cambess.) Radlk.

Sin.: *Sapindus esculentus* Cambess.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON, SPE).

Thinouia Triana & Planch.**Thinouia compressa** Radlk.

Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(GUA, SPE).

Thinouia mucronata Radlk.

Sin.: *Thinouia repanda* Radlk.

Liana. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Thinouia paraguayensis (Britton) Radlk.

Sin.: *Thinouia sepium* S. Moore, *Thouinia paraguayensis* Britton

Liana. Nativa. 0-400 m.

Países: PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Thinouia scandens (Cambess.) Triana & Planch.

Sin.: *Thouinia scandens* Cambess.

Liana. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Thinouia ternata Radlk.

Liana. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Thinouia ventricosa Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Toulicia Aubl.

Toulicia tomentosa Radlk.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Urvillea Kunth

Urvillea chacoensis Hunz.

Sin.: *Cardiospermum pterocarpum* Radlk.

var. *balegnoi* F.A. Barkley, *Urvillea uniloba*

Radlk. f. *dissecta* Radlk., *Urvillea uniloba*

Radlk. f. *incana* Radlk., *Urvillea uniloba*

Radlk. var. *incana* (Radlk.) F.A. Barkley

Liana. Nativa. 200-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, CEN, PHA).

Urvillea filipes Radlk.

Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(APY, AMA, CON, PHA).

Urvillea glabra Cambess.

Liana. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Urvillea laevis Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, PAI).

Urvillea pterocarpa (Radlk.) Acev.-Rodr. & Ferrucci

Sin.: *Cardiospermum pterocarpum* Radlk.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Urvillea triphylla Radlk.

Liana. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Urvillea ulmacea Kunth

Sin.: *Serjania lanceolata* Cambess.,

Urvillea berteriana DC., *Urvillea ulmacea*

Kunth f. *berteriana* (DC.) Radlk., *Urvillea*

ulmacea Kunth var. *berteriana* (DC.) F.A.

Barkley

Liana. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Urvillea uniloba Radlk.

Sin.: *Urvillea euryptera* Griseb., *Urvillea*

uniloba Radlk. var. *debilis* F.A. Barkley

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, ITA, PAI). URY(ART, COL, PAY, SAO, SJO, TAC, TYT).

SAPOTACEAE

Chloroluma Baill.

Chloroluma gonocarpa (Mart. & Eichler) Baill. ex Aubrév.

Sin.: *Chrysophyllum gonocarpum* (Mart. & Eichler) Engl., *Chrysophyllum*

lucumifolium Griseb., *Chrysophyllum*

lucumifolium Griseb. f. *obtusatum* Chodat

& Hassl., *Chrysophyllum nemoralis* Rojas

Acosta, nom. nud., *Martiusella gonocarpa*

(Mart. & Eichler) Pierre, *Pouteria boliviana*

(Rusby) Baehni, *Sapota gonocarpa* Mart.

& Eichler, *Sideroxylon bolivianum* Rusby,

Sideroxylon reticulatum Britton

Árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV, ROC, TAC, TYT).

Chloroluma viridis (Mart. & Eichler) Aubrév.

Sin.: *Chrysophyllum viride* Mart. & Eichler

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chrysophyllum L.

Chrysophyllum flexuosum Mart.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Chrysophyllum inornatum Mart.

Sin.: *Chrysophyllum dusenii* Cronquist

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. subsp. **marginatum**

Sin.: *Chrysophyllum ebenaceum* Mart.,

Chrysophyllum ebenaceum Mart. var.

longifolium Miq., *Chrysophyllum*

grisebachii (Hieron.) Mez, *Chrysophyllum*

martianum A. DC., *Chrysophyllum*

maytenoides Mart., *Chrysophyllum*

maytenoides Mart. var. *myrtifolium* (Mart.)

Miq., *Chrysophyllum maytenoides* Mart.

var. *tenue* Kuntze, *Chrysophyllum*

myrtifolium Mart., *Cynodendron marginatum* (Hook. & Arn.) Baehni, *Micropholis paraguayensis* Dubard, *Myrsine grisebachii* Hieron., *Myrsine marginata* Hook. & Arn., *Myrsine marginata* Hook. & Arn. var. *arborea* Griseb., *Sideroxylon myrtifolium* (Mart.) Speg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RNO, SAO).

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. subsp. **tomentosum** (Miq.) T.D. Penn.

Sin.: *Chrysophyllum ebenaceum* Mart. var. *tomentosum* Miq., *Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk. var. *tomentosum* (Miq.) Cronquist

Arbusto o arbolito. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

Chrysophyllum paranaense T.D. Penn.

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR).

Diploon Cronquist

Diploon cuspidatum (Hoehne) Cronquist

Sin.: *Chrysophyllum cuspidatum* Hoehne

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ecclinusa Mart.

Ecclinusa ramiflora Mart.

Sin.: *Chrysophyllum ramiflorum* (Mart.) A. DC., *Passaveria obovata* Mart. & Eichler, nom. superfl.

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR).

Gayella Pierre

Gayella valparadisaea (Molina) Pierre

Sin.: *Gayella splendens* (A. DC.) Aubrév.,

Lucuma splendens A. DC., *Lucuma*

valparadisaea Molina, *Pouteria splendens*

(A. DC.) Kuntze, *Vitellaria valparadisaea*

(Molina) Radlk. ex Dubard

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Labatia Sw.

Labatia gardneriana (A. DC.) Alves-Araújo

Sin.: *Labatia ciliolata* Engl., *Labatia ostenii*

Hassl., *Labatia sapota-anguai* Rojas

Acosta, *Lucuma gardneriana* A. DC.,

Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk.,

Pouteria suavis Hemsl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,

MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APY, CON, COA, ÑEE, PAI).

URY(PAY, RIV, SAO).

Labatia salicifolia (Spreng.) Mart.

Sin.: *Guapeba neriifolia* (Hook. & Arn.)

Pierre, *Lucuma neriifolia* Hook. & Arn.,

Lucuma sellowii A. DC., *Pouteria neriifolia*

(Hook. & Arn.) Radlk., *Pouteria salicifolia*

(Spreng.) Radlk., *Pouteria salicifolia*

(Spreng.) Radlk. var. *neriifolia* (Hook. &

Arn.) Monach. & Moldenke, *Pouteria*

salicifolia (Spreng.) Radlk. var. *typica*

Baehni, nom. inval., *Pouteria schenckii*

Engl., *Pouteria sellowii* (A. DC.) Engl.,

Rousseia salicifolia Spreng.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, PAI). URY(CAS, COL, CLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TYT).

Lucuma Molina

Lucuma biferia Molina

Sin.: *Achras lucuma* Ruiz & Pav., *Lucuma*

obovata Kunth, *Lucuma turbinata* Molina,

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze,

Richardella lucuma (Ruiz & Pav.) Aubrév.

Árbol. Nativa.

Países: CHL(ATA, COQ).

Lucuma venosa (Mart.) Mart. & Miq.

Sin.: *Achras venosa* Mart., *Pouteria*

venosa (Mart.) Baehni, *Radlkoferella*

venosa (Mart.) Pierre, *Vitellaria venosa*

(Mart.) Radlk.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Manilkara Adans.

Manilkara salzmännii (A. DC.) H.J. Lam

Sin.: *Mimusops salzmännii* A. DC.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard

Sin.: *Mimusops subsericea* Mart.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Peteniodendron Lundell

Peteniodendron durlandii (Standl.)

Lundell

Sin.: *Lucuma durlandii* Standl.,

Paralabatia durlandii (Standl.) Aubrév.,

Pouteria durlandii (Standl.) Baehni

Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pouteria Aubl.

Pouteria beaurepairei (Glaz. & Raunk.) Baehni
Sin.: *Labatia beaurepairei* (Glaz. & Raunk.) Engl., *Lucuma beaurepairei* Glaz. & Raunk., *Pseudolabatia beaurepairei* (Glaz. & Raunk.) Aubrév.

Arbolito. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pouteria bullata (S. Moore) Baehni

Sin.: *Lucuma bullata* S. Moore
Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.

Sin.: *Achras caimito* Ruiz & Pav., *Guapeba laurifolia* Gomes, *Lucuma laurifolia* (Gomes) A. DC.
Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pouteria fragrans (Pierre) Dubard

Sin.: *Guapeba fragrans* Pierre, *Labatia odorata* Rojas Acosta, *Pseudolabatia fragrans* (Pierre) Aubrév.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(COA, PAI).

Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni

Sin.: *Chrysophyllum gardneri* Mart. & Miq., *Lucuma paraguariensis* Chodat & Hassl., *Lucuma paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *fruticosa* Chodat & Hassl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk.

Sin.: *Guapeba glomerata* (Miq.) Pierre, *Labatia glomerata* (Miq.) Radlk., *Lucuma glomerata* Miq., *Neolabatia glomerata* (Miq.) Aubrév., *Richardella glomerata* (Miq.) Baehni

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Pouteria guianensis Aubl.

Árbol. Nativa. 200-400 m.
Países: BRA(PAR).

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

Sin.: *Labatia ramiflora* Mart., *Lucuma ramiflora* (Mart.) A. DC., *Paralabatia ramiflora* (Mart.) Aubrév.

Árbol. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Pouteria torta (Mart.) Radlk.

Sin.: *Guapeba torta* (Mart.) Pierre, *Labatia torta* Mart., *Lucuma torta* (Mart.) A. DC.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Pradosia Liais

Pradosia brevipes (Pierre) T.D. Penn.

Sin.: *Chrysophyllum pumilum* Chodat & Hassl., *Chrysophyllum pumilum* Chodat & Hassl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Ecclinusa brevipes* Pierre, *Ecclinusa pumila* (Chodat & Hassl.) Cronquist
Hierba. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

Pradosia lactescens (Vell.) Radlk.

Sin.: *Chrysophyllum bumelioides* Mart., *Pometia lactescens* Vell.
Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Sideroxylon L.

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn.

Sin.: *Bumelia excelsa* A. DC., *Bumelia obtusifolia* Roem. & Schult., *Bumelia obtusifolia* Roem. & Schult. var. *excelsa* (A. DC.) Miq., *Bumelia obtusifolia* Roem. & Schult. subsp. *excelsa* (A. DC.) Cronquist, *Bumelia rhamnoides* Casar., *Bumelia sartorum* Mart., *Lyciodes obtusifolium* (Roem. & Schult.) Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, MIE, PAI, PHA). URY(ART, ROC).

SAXIFRAGACEAE

Chrysosplenium L.

Chrysosplenium macranthum Hook.

Sin.: *Chrysosplenium elevatum* Banks & Sol. ex Hook. f.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Chrysosplenium valdivicum Hook.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ARA, LSR, LLA).

Hieronymusia Engl.

Hieronymusia alchemilloides (Griseb.) Engl.

Sin.: *Saxifraga alchemilloides* Griseb., *Suksdorfia alchemilloides* (Griseb.) Engl.

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Saxifraga L.

Saxifraga bicuspidata Hook. f.

Sin.: *Saxifraga bifida* Engl., *Saxifragella bicuspidata* (Hook. f.) Engl.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

Saxifraga magellanica Poir.

Sin.: *Muscaria magellanica* (Poir.) Haw., *Saxifraga adenodes* Poepp. ex Sternb., *Saxifraga andicola* D. Don, *Saxifraga andicola* Kunth, hom. illeg., *Saxifraga cespitosa* L. var. *andicola* (Kunth) Wedd., *Saxifraga cespitosa* L. var. *magellanica* (Poir.) Wedd., *Saxifraga cespitosa* L. var. *pavonii* (D. Don) Speg., *Saxifraga cespitosa* Wedd., nom. illeg., *Saxifraga chilensis* Gay ex sched., *Saxifraga chilensis* Poepp. ex Engl., *Saxifraga cordillerana* C. Presl, *Saxifraga cordillerana* C. Presl var. *breviscapa* (Hook. f.) Macloskie, *Saxifraga cordillerana* C. Presl var. *magellanica* (Poir.) Reiche, *Saxifraga exarata* Vill. var. *breviscapa* Hook. f., *Saxifraga exarata* Vill. var. *integrifolia* Hook. f., *Saxifraga exarata* Vill. var. *laxa* Hook. f., *Saxifraga lemusii* Leyb., *Saxifraga magellanica* Poir. subsp. *peruviana* (Sternb.) Engl. & Irmsch., *Saxifraga magellanica* Poir. var. *peruviana* (Sternb.) J.F. Macbr., *Saxifraga pavonii* D. Don, *Saxifraga peruviana* Sternb., *Saxifraga trigyna* J. Remy, *Saxifraga trigyna* J. Remy var. *azorelloides* Speg.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

Saxifraga umbrosa L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(MAG).

Saxifragodes D.M. Moore

Saxifragodes albowiana (Kurtz ex Albov) D.M. Moore

Sin.: *Saxifraga albowiana* Kurtz ex Albov, *Saxifragella albowiana* (Kurtz ex Albov) Engl.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

SCHLEGELIACEAE

Schlegelia Miq.

Schlegelia parviflora (Oerst.) Monach.

Sin.: *Dermatocalyx parviflorus* Oerst.

Liana. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

SCHOEPFIACEAE

Arjona Cav.

Arjona chubutensis Dusén

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Arjona longifolia Phil.

Sin.: *Arjona linearis* Miers

Hierba. Endémica. 700-3200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, RNE, SJU).

Arjona megapotamica Malme

Sin.: *Arjona brasiliensis* K. Schum., *Arjona schumanniana* Pilg.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Arjona pusilla Hook. f.

Sin.: *Arjona ameghinoi* Speg., *Arjona glaberrima* Pilg., *Arjona minima* Hieron.

Hierba. Endémica. 100-4200 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Arjona ruscifolia Poepp. ex Walp.

Sin.: *Arjona andina* Phil., *Arjona patagonica* Hombr., *Arjona rigida* Miers, *Arjona tuberosa* Cav. var. *patagonica* (Hombr.) DC.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, ARA, MAG).

Arjona tuberosa Cav. var. **tandilensis** (Kuntze) G. Dawson

Sin.: *Arjona patagonica* Hombr. var. *tandilensis* (Kuntze) Speg., *Arjona tandilensis* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-2400 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE). URY(MON).

Arjona tuberosa Cav. var. **tuberosa**

Sin.: *Arjona apressa* Phil., *Arjona pungens* Phil., *Arjona tuberosa* Cav. var. *lanata* Macloskie, *Quinchamalium patagonica* Spreng., nom. superfl.

Hierba. Endémica. 0-2400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, ARA, AIS, MAG).

Quinchamalium Molina

Quinchamalium chilense Molina

Sin.: *Bryodes minutissima* Phil.,
Quinchamalium andinum Phil.,
Quinchamalium araucanum F. Meigen,
Quinchamalium berterianum Phil.,
Quinchamalium bracteosum Phil.,
Quinchamalium breviflorum C. Presl,
Quinchamalium brevistaminatum Pilg.,
Quinchamalium carnosum Phil.,
Quinchamalium chilense Molina var.
gracile (Brongn.) Speg., *Quinchamalium*
chilense Molina var. *majus* (Brongn.)
Speg., *Quinchamalium chilense* Molina
var. *parviflorum* (Phil.) L.E. Navas, hom.
illeg., *Quinchamalium chilense* Molina var.
parviflorum A. DC., *Quinchamalium*
chilense Molina var. *patagonicum* (Berg)
Speg., comb. illeg., *Quinchamalium*
chilense Molina var. *procumbens* (Ruiz &
Pav.) Kuntze, *Quinchamalium chilense*
Molina var. *robustior* Hook. & Arn.,
Quinchamalium elegans C. Presl,
Quinchamalium elongatum Pilg.,
Quinchamalium ericoides Brongn. ex Gay,
Quinchamalium excrescens Phil.,
Quinchamalium fruticulosum Steud. ex
Miers, *Quinchamalium gracile* Brongn.,
Quinchamalium hoppii Pilg.,
Quinchamalium linarioides Phil.,
Quinchamalium linifolium Meyen ex Walp.,
Quinchamalium linifolium Miers, hom.
illeg., *Quinchamalium litorale* Phil.,
Quinchamalium lomae Pilg.,
Quinchamalium majus Brongn.,
Quinchamalium majus Brongn. var.
spagazzinii Macloskie, *Quinchamalium*
minutum Phil., *Quinchamalium parviflorum*
Phil., *Quinchamalium patagonicum* F. Phil.
ex Berg, hom. illeg., *Quinchamalium*
pratense Phil., *Quinchamalium*
procumbens Ruiz & Pav., *Quinchamalium*
purpureum Phil., *Quinchamalium*
raimondii Pilg., *Quinchamalium rugosum*
Phil., *Quinchamalium stuebelii* Hieron.,
Quinchamalium tarapacanum Phil.,
Quinchamalium thesioides Phil.,

Quinchamalium thesioides Phil. var.
flaccidum Phil.

Hierba. Nativa. 0-3800 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU,
RNE, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR,
LLA, AIS, RME).

Schoepfia Schreb.

Schoepfia brasiliensis A. DC.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Schoepfia lucida Pulle

Arbusto. Introducida. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

SCROPHULARIACEAE

Alonsoa Ruiz & Pav.

Alonsoa honoraria Grau

Subarbusto. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(COQ).

Alonsoa meridionalis (L. f.) Kuntze

Sin.: *Alonsoa urticifolia* Steud.,
Scrophularia meridionalis L. f.
Hierba. Nativa.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Buddleja L.

Buddleja araucana Phil.

Sin.: *Buddleja globosa* Hope var.
araucana (Phil.) Reiche, *Buddleja nappii*
Lorentz
Arbusto. Endémica. 300-1600 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(ATA, COQ, VAL, BIO).

Buddleja aromatica J. Remy

Sin.: *Buddleja andina* Britton ex Rusby,
Buddleja monocephala Kraenzl., *Buddleja*
tiraquimensis Kuntze
Arbusto. Nativa. 2900-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Buddleja bordignonii G.P. Coelho &
Miotto

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Buddleja brachiata Cham. & Schltdl.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CON).

Buddleja cestriflora Cham.

Arbusto. Endémica. 800-1400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Buddleja cordobensis Griseb.

Sin.: *Buddleja intermedia* Lorentz
Arbusto. Endémica. 700-1500 m.
Países: ARG(COR, LRI, SJU, SLU).

Buddleja cuneata Cham.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Buddleja davidii Franch.

Arbusto. Introducida. 200-400 m.
Países: ARG(CHU). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Buddleja diffusa Ruiz & Pav.

Sin.: *Buddleja coriacea* Rusby
Arbusto. Nativa. 1000-2900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Buddleja elegans Cham. & Schltdl.
subsp. **angustata** (Benth.) E.M. Norman
Sin.: *Buddleja angustata* Benth., *Buddleja*
cambara Arechav., *Buddleja fiebrigiana*

Kraenzl., *Buddleja grisea* Kraenzl., *Buddleja malmei* Kraenzl., *Buddleja vetula* Cham. & Schltdl. var. *angustata* (Benth.) Chodat, *Buddleja vetula* Cham. & Schltdl. var. *major* Schmidt

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Buddleja elegans Cham. & Schltdl. subsp. **elegans**

Sin.: *Buddleja campestris* (Vell.) Walp., *Buddleja glaziovii* Taub., *Buddleja reitzii* E.M. Norman & L.B. Sm., *Buddleja vetula* Cham. & Schltdl., *Romana campestris* Vell.

Arbusto. Nativa. 700-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Buddleja globosa Hope

Sin.: *Buddleja capitata* Jacq., *Buddleja connata* Ruiz & Pav., *Buddleja globifera* Duhamel

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Buddleja grandiflora Cham. & Schltdl.

Sin.: *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Buddleja paludicola* Kraenzl., *Buddleja sancti-leopoldi* Kraenzl.

Arbusto. Nativa. 400-1400 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

Buddleja hatschbachii E.M. Norman & L.B. Sm.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Buddleja hieronymi R.E. Fr.

Sin.: *Buddleja misera* Kraenzl.

Arbusto. Nativa. 2500-3900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Buddleja iresinoides (Griseb.) Hosseus

Sin.: *Buddleja microcephala* Rusby, *Buddleja pendula* R.E. Fr., *Buddleja pendula* R.E. Fr. var. *concolor* L.B. Sm., *Buddleja similis* R.E. Fr., *Lippia iresinoides* Griseb.

Arbusto. Nativa. 300-1600 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). URY(RIV).

Buddleja kleinii E.M. Norman & L.B. Sm.

Arbusto. Endémica. 900-1700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Buddleja madagascariensis Lam.

Arbusto. Introducida.

Países: BRA(RGS, SCA).

Buddleja mendozensis Benth.

Sin.: *Buddleja kurtzii* Kraenzl., *Buddleja lucae* Niederl., *Buddleja mendozensis* Benth. var. *tenuifolia* (Griseb.) Hieron., *Buddleja tenuifolia* Griseb.

Arbusto. Nativa. 600-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Notas: Su presencia en Chile es dudosa

Buddleja misionum Kraenzl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(GUA, ITA).

Buddleja oblonga Benth.

Arbusto. Nativa. 1000-2200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Buddleja ramboi L.B. Sm.

Arbusto. Endémica. 200-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl.

Sin.: *Buddleja alata* Larrañaga, hom. illeg., *Buddleja albotomentosa* R.E. Fr., *Buddleja australis* Vell., *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng., *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. subsp. *stachyoides* (Cham. & Schltdl.) E.M. Norman, *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. var. *glazioviana* Gilg, *Buddleja neemda* Link, hom. illeg., *Buddleja otophylla* Hassk.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, RNO, SOR).

Buddleja suaveolens Kunth & Bouché

Sin.: *Buddleja gayana* Benth.

Arbusto. Endémica. 500-2900 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Buddleja thyrsoides Lam. subsp. **angusticarpa** E.M. Norman & L.B. Sm.

Sin.: *Buddleja angusticarpa* (E.M. Norman & L.B. Sm.) G.P. Coelho & Miotto

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, MIE). URY(ART, CLA, COL, CLA, LAV, MAL, PAY, RIV, SJO).

Buddleja thyrsoides Lam. subsp. **thyrsoides**

Sin.: *Buddleja chloroleuca* Kraenzl., *Buddleja salicifolia* Vahl

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, MON, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Buddleja tubiflora Benth.

Sin.: *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var. *foliosa* Chodat & Hassl., *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var. *paraguayensis* (Chodat) Chodat & Hassl., *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var. *tubiflora* (Benth.) Chodat & Hassl., *Buddleja paraguayensis* Chodat
Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, SDE). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Buddleja tucumanensis Griseb.

Sin.: *Buddleja bangii* Kraenzl., *Buddleja canescens* Rusby, *Buddleja cochabambensis* Rusby, *Buddleja hypoleuca* Kraenzl., *Buddleja ignea* Kraenzl., *Buddleja inconspicua* Kraenzl., *Buddleja tucumanensis* Griseb. var. *serrata* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-3300 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Capraria L.

Capraria biflora L.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL). PRY(APY).

Myoporum Sol. ex G. Forst.

Myoporum laetum Sol. ex G. Forst.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). CHL(COQ, VAL, MAU). URY(ROC).

Scrophularia L.

Scrophularia auriculata L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: CHL(MAU, ARA, RME).

Scrophularia peregrina L.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbascum L.

Verbascum blattaria L.

Hierba. Introducida. 200-500 m.
Países: ARG(BAI).

Verbascum densiflorum Bertol.

Sin.: *Verbascum thapsiforme* Schrad.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(ARA).

Verbascum thapsus L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

Verbascum virgatum Stokes

Sin.: *Verbascum blattarioides* Lam.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(CAA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

SIMAROUBACEAE

Ailanthus Desf.

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Sin.: *Ailanthus glandulosa* Desf., *Pongelium glandulosum* (Desf.) Pierre, *Toxicodendron altissimum* Mill.
Árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, SAL, SFE, TUC). CHL(BIO, RME, JFE). URY(MON).

Castela Turpin

Castela coccinea Griseb.

Sin.: *Ximenia americana* L. var. *pubens* Griseb.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, CHO, CON, GUA, ITA, ÑEE, NAS, PHA).

Castela tweedii Planch.

Sin.: *Castela alaternifolia* Planch., *Castela tweedii* Planch. var. *dentata* Engl., *Castela tweedii* Planch. var. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Castela tweedii* Planch. var. *typica* Cronquist, nom. illeg.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(PAY).

Homalolepis Turcz.

Homalolepis glabra (Engl.) Devecchi & Pirani

Sin.: *Aruba glabra* (Engl.) Kuntze, *Quassia glabra* (Engl.) Noot., *Simaba glabra* Engl., *Simaba glabra* Engl. subsp. *trijuga* Hassl., *Simaba glabra* Engl. var. *emarginata* Hassl., *Simaba glabra* Engl. var. *inaequilatera* Hassl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAA, CON).

Homalolepis praecox (Hassl.) Devecchi & Pirani

Sin.: *Quassia praecox* (Hassl.) Noot., *Simaba praecox* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAU, CAN).

Homalolepis trichilioides (A. St.-Hil.) Devecchi & Pirani

Sin.: *Quassia trichilioides* (A. St.-Hil.) D. Dietr., *Simaba trichilioides* A. St.-Hil., *Zwingera trichilioides* (A. St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Picrasma Blume

Picrasma crenata (Vell.) Engl.

Sin.: *Aeschiron crenata* Vell., *Picraena palo-amargo* (Speg.) Speg., *Picraena vellozii* Engl., nom. superfl., *Picramnia crenata* (Vell.) Hassl., *Picrasma palo-amargo* Speg., *Picrasma vellozii* Planch., nom. superfl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

SIPARUNACEAE

Siparuna Aubl.

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC.

Sin.: *Citrosma bifida* Poepp. & Endl.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Siparuna guianensis Aubl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

SMILACACEAE

Smilax L.

Smilax assumptionis A. DC.

Liana. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PHA, SPE).

Smilax campestris Griseb.

Sin.: *Smilax campestris* Griseb. var. *marginulata* (Mart. ex Griseb.) A. DC., *Smilax campestris* Griseb. var. *rubiginosa* (Griseb.) A. DC., *Smilax marginulata* Mart. ex Griseb., *Smilax montana* Griseb., *Smilax rubiginosa* Griseb., *Smilax scalaris* Griseb., *Smilax viminea* Griseb.

Liana. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(COL, FLO, FLA, MAL, RNO, ROC, SAO, SJO).

Smilax cognata Kunth

Sin.: *Smilax montevidensis* Hort ex Steud., nom. nud.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, GUA, ITA, ÑEE).

Smilax elastica Griseb.

Sin.: *Smilax brasiliensis* Spreng. var. *impresso-venosa* Mattos, *Smilax elastica* Griseb. var. *aculeata* A. DC., *Smilax ficifolia* Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Smilax fluminensis Steud.

Sin.: *Smilax china* Vell., hom. illeg., *Smilax syringoides* Griseb., *Smilax syringoides* Griseb. var. *multiflora* Griseb.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, SPE).

Smilax goyazana A. DC.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Smilax lappacea Willd.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Smilax larvata Griseb.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Smilax pilcomayensis Guagl. & Gattuso

Liana. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). PRY(APY, CEN, CON, SPE).

Smilax polyantha Griseb.

Sin.: *Smilax macropoda* A. DC., *Smilax medicinalis* S. Moore

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Smilax quinquenervia Vell.

Sin.: *Smilax procera* Griseb., *Smilax tijucensis* A. DC., *Smilax tijucensis* A. DC. var. *gardneriana* A. DC., *Smilax tijucensis* A. DC. var. *pohlana* A. DC.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Smilax rufescens Griseb.

Sin.: *Smilax corcovadensis* Kunth, *Smilax havanensis* Jacq. var. *dentata* (Humb. & Bonpl.) A. DC., *Smilax nitida* Griseb.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Smilax staminea Griseb.
Sin.: *Smilax robusta* Griseb.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Smilax stenophylla A. DC.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

SOLANACEAE

Athenaea Sendtn., nom. cons.

Athenaea brasiliana Hunz.
Sin.: *Aureliana brasiliana* (Hunz.) Barboza & Hunz.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Athenaea fasciculata (Vell.) I.M.C. Rodrigues & Stehmann
Sin.: *Aureliana fasciculata* (Vell.) Sendtn.
var. *fasciculata*, *Aureliana fasciculata* (Vell.) Sendtn. var. *longifolia* (Sendtn.) Hunz. & Barboza, *Aureliana fasciculata* (Vell.) Sendtn. var. *tomentella* (Sendtn.) Barboza & Hunz., *Aureliana glomuliflora* Sendtn. var. *longifolium* Sendtn., *Aureliana lucida* (Moric.) Sendtn., *Aureliana lucida* (Moric.) Sendtn. var. *tomentellum* Sendtn., *Bassovia crassiflora* Dunal, *Bassovia fasciculata* (Vell.) Dunal, *Bassovia lucida* (Moric.) Sendtn. var. *pilosulum* Dunal, *Capsicum crassiflorum* (Dunal) Kuntze, *Capsicum fasciculatum* (Vell.) Kuntze, *Capsicum lucidum* (Moric.) Kuntze, *Solanum fasciculatum* Vell., *Solanum lucidum* Moric.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, PAI, SPE).

Athenaea picta (Mart.) Sendtn.
Sin.: *Aureliana picta* (Mart.) I.M.C. Rodrigues & Stehmann, *Witheringia picta* Mart.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Athenaea tomentosa (Sendtn.) I.M.C. Rodrigues & Stehmann
Sin.: *Aureliana tomentosa* Sendtn., *Bassovia tomentosa* (Sendtn.) Dunal, *Capsicum tomentosum* (Sendtn.) Kuntze
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Athenaea wettsteiniana (Witasek) I.M.C. Rodrigues & Stehmann
Sin.: *Aureliana wettsteiniana* (Witasek) Hunz. & Barboza, *Bassovia wettsteiniana* Witasek
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Benthamiella Speg.

Benthamiella azurella (Skotts.) A.Soriano
Sin.: *Saccardophyton azurella* Skotts.
Subarbusto. Endémica. 500-1200 m.
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(MAG).

Benthamiella azorelloides Speg.
Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU).

Benthamiella chubutensis A. Soriano
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU).

Benthamiella graminifolia Skotts.
Subarbusto. Endémica. 0-3100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Benthamiella lanata A. Soriano
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAG).

Benthamiella longifolia Speg.
Sin.: *Benthamiella acutifolia* Speg.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Benthamiella nordenskioldii Dusén ex N.E. Br.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Benthamiella patagonica Speg.
Sin.: *Benthamiella abietina* Skotts., *Benthamiella aurea* Skotts., *Benthamiella intermedia* Skotts., *Benthamiella montana* Dusén
Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Benthamiella pycnophylloides Speg.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Benthamiella skottsbergii A. Soriano
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Benthamiella sorianoii S.C. Arroyo
Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(SCR).

Benthamiella spegazziniana A. Soriano
Sin.: *Saccardophyton pycnophylloides* Speg.
Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(SCR).

Bouchetia Dunal

Bouchetia anomala (Miers) Britton & Rusby
Sin.: *Bouchetia anomala* (Miers) Britton & Rusby subsp. *staticifolia* (Sendtn.) Loes.,

Bouchetia anomala (Miers) Loes., comb. illeg., *Nicotiana staticifolia* (Sendtn.) Kuntze, *Nierembergia anomala* Miers, *Nierembergia staticifolia* Sendtn., *Salpiglossis anomala* (Miers) D'Arcy

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(ÑEE). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, SAO, TAC).

Brugmansia Pers.

Brugmansia americana L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Sweet

Sin.: *Datura suaveolens* Humb. & Bonpl. ex Willd.

Arbusto o arbolito. Introducida. 100-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA).

Brunfelsia L.

Brunfelsia australis Benth.

Sin.: *Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth. var. *australis* (Benth.) J.A. Schmidt, *Brunfelsia paraguayensis* Chodat, *Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don f. *intermedia* Hassl., *Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don f. *obovatifolia* Hassl., *Brunfelsia uniflora* Benth. f. *typica* Hassl., nom. inval., *Franciscea australis* (Benth.) Miers, *Franciscea hopeana* Hook.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,

CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY.

Brunfelsia brasiliensis (Spreng.) L.B. Sm. & Downs subsp. **brasiliensis**

Sin.: *Brunfelsia acuminata* (Pohl) Benth., *Brunfelsia brasiliensis* (Spreng.) L.B. Sm. & Downs var. *acuminata* (Pohl) L.B. Sm. & Downs, *Franciscea acuminata* Pohl, *Gerardia brasiliensis* Spreng.

Arbusto. Nativa. 300-700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Brunfelsia brasiliensis (Spreng.) L.B. Sm. & Downs subsp. **macrocalyx** (Dusén) Plowman

Sin.: *Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth. var. *macrocalyx* Dusén

Arbusto. Nativa. 500-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Brunfelsia cuneifolia J.A. Schmidt

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth.

Sin.: *Brunfelsia calycina* Benth., *Brunfelsia pauciflora* (Cham. & Schltdl.) Benth. var. *calycina* J.A. Schmidt, *Franciscea calycina* (Benth.) Miers, *Franciscea pauciflora* Cham. & Schltdl.

Arbusto. Nativa. 0-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Brunfelsia pilosa Plowman

Arbusto. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Brunfelsia plowmaniana N. Filipowicz & M. Nee

Arbusto. Nativa. 1500-3200 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don

Sin.: *Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth., *Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth. var. *pubescens* Benth., *Brunfelsia mutabilis* (H.Jacq.) Vilm., *Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don var. *pubescens* (Benth.) R.E.D.Baker & N.W.Simmonds, *Franciscea mutabilis* H.Jacq., *Franciscea uniflora* Pohl

Arbusto. Nativa. 1500-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA, ÑEE, PAI, SPE).

Calibrachoa Cerv.

Calibrachoa atropurpurea Stehmann & Semir

Arbusto. Endémica. 200-500 m.

Países: BRA(RGS).

Calibrachoa caesia (Sendtn.) Wijsman

Sin.: *Petunia caesia* Sendtn., *Petunia kleinii* L.B. Sm. & Downs

Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(PAI).

Calibrachoa cordifolia Stehmann & Aguilar

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Calibrachoa dusenii (R.E. Fr.) Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia dusenii* R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Calibrachoa eglandulata Stehmann & Semir

Arbusto. Endémica. 1200

Países: BRA(SCA).

Calibrachoa ericifolia (R.E. Fr.) Wijsman

Sin.: *Petunia ericifolia* R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Calibrachoa excellens (R.E. Fr.)
Wijsman

Sin.: *Calibrachoa hassleriana* (R.E. Fr.)
Wijsman, *Petunia excellens* R.E. Fr.,
Petunia hassleriana R.E. Fr., *Petunia*
variabilis R.E. Fr.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1300
m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(TAC).

Calibrachoa felipponei (Sandwith)
Stehmann

Sin.: *Petunia felipponei* Sandwith

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: URY(MON).

Calibrachoa heterophylla (Sendtn.)
Wijsman

Sin.: *Fabiana heterophylla* (Sendtn.)
Dunal, *Petunia heterophylla* Sendtn.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Notas: Excluida de la Flora Argentina
(Greppi & Stehmann, 2013)

Calibrachoa humilis (R.E. Fr.) Stehmann
& Semir

Sin.: *Petunia humilis* R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS).
URY(SAO).

Calibrachoa irgangiana Stehmann

Arbusto. Endémica. 100-300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Calibrachoa linoides (Sendtn.) Wijsman
subsp. **furcata** Greppi & Stehmann

Subarbusto. Endémica. 400-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA).

Calibrachoa linoides (Sendtn.) Wijsman
subsp. **linoides**

Sin.: *Calibrachoa macrodactylon* (L.B. Sm.
& Downs) Wijsman, *Petunia linoides*
Sendtn., *Petunia macrodactylon* L.B. Sm.
& Downs

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).
PRY(PAI).

Calibrachoa longistyla Stehmann &
Greppi

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(COS).

Calibrachoa micrantha (R.E. Fr.)
Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia micrantha* R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Calibrachoa missionica Stehmann &
Semir

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(ITA).

Calibrachoa ovalifolia (Miers) Stehmann
& Semir

Sin.: *Calibrachoa calycina* (Sendtn.)
Wijsman, *Petunia calycina* Sendtn.,
Petunia helianthemoides Sendtn., *Petunia*
ovalifolia Miers

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500
m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
URY(ART, CLA, RIV, TYT).

Calibrachoa paranensis (Dusén)
Wijsman

Sin.: *Calibrachoa rupestris* (Dusén)
Wijsman, *Petunia paranensis* Dusén,
Petunia rupestris Dusén

Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy
Sin.: *Calibrachoa parviflora* (Juss.)
Wijsman, comb. superfl., *Calibrachoa*
procumbens Cerv., *Leptophragma*
montevicensis (Spreng.) Dunal,
Leptophragma prostrata (Hook. & Arn.)
Benth., *Lindernia montevidensis* Spreng.,
Nicotiana parviflora (Juss.) Lehm.,
Nierembergia viscidula Kunth, *Petunia*
parviflora Juss., *Petunia parviflora* Juss.
var. *glabriuscula* Dunal, *Petunia parviflora*
Juss. var. *villosa* Dunal, *Petunia viscidula*
(Kunth) Miers, *Salpiglossis prostrata*
Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,
MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU,
SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA).
CHL(VAL). PRY(COA). URY(ART, CAS,
CLA, COL, MAL, MON, PAY, SAO).

Calibrachoa pubescens (Spreng.)
Stehmann

Sin.: *Nierembergia graveolens* Dunal,
hom. illeg., *Nierembergia pubescens*
Spreng., *Petunia pubescens* (Spreng.)
R.E. Fr., *Petunia serpyllifolia* Sendtn.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS). URY(MON).

Calibrachoa pygmaea (R.E. Fr.) Wijsman
Sin.: *Petunia pygmaea* R.E. Fr.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). URY(ART, CAS, DUR, FLO,
FLA, MON, SAO, SOR, TAC).

Calibrachoa scabridula (C.V. Morton)
Stehmann

Sin.: *Petunia scabridula* C.V. Morton

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: URY(CAS).

Calibrachoa sellowiana (Sendtn.)
Wijsman

Sin.: *Fabiana sellowiana* (Sendtn.) Dunal, *Petunia alpicola* L.B. Sm. & Downs, *Petunia sellowiana* Sendtn.

Subarbusto. Endémica. 500-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Calibrachoa sendtneriana (R.E. Fr.) Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia sendtneriana* R.E. Fr.
Subarbusto. Endémica. 1400-1900 m.
Países: BRA(SCA).

Calibrachoa serrulata (L.B. Sm. & Downs) Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia serrulata* L.B. Sm. & Downs
Subarbusto. Endémica. 1400-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Calibrachoa spathulata (L.B. Sm. & Downs) Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia spathulata* L.B. Sm. & Downs
Subarbusto. Endémica. 1000-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Calibrachoa synanthera Stehmann & G. Mäder

Arbusto. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(RGS).

Calibrachoa thymifolia (A. St.-Hil.) Stehmann & Semir

Sin.: *Calibrachoa linearis* (Hook.) Wijsman, *Fabiana thymifolia* A. St.-Hil., *Nierembergia intermedia* Graham, *Petunia intermedia* (Graham) G. Don, *Petunia linearis* (Hook.) Paxton, *Petunia thymifolia* (A. St.-Hil.) Sendtn., *Petunia thymifolia* (A. St.-Hil.) Sendtn. f. *gracilis* R.E. Fr., *Salpiglossis linearis* Hook.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(ITA). URY(ART, COL, PAY, SAO, SJO).

Capsicum L.

Capsicum baccatum L. var. **baccatum**

Sin.: *Capsicum annuum* L. var. *microcarpum* (Cav.) Voss, *Capsicum microcarpum* Cav., *Capsicum microcarpum* Cav. var. *glabrescens* Hassl., *Capsicum microcarpum* Cav. var. *tomentosum* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(RIV).

Capsicum baccatum L. var. **praetermissum** (Heiser & P.G. Sm.) Hunz.

Sin.: *Capsicum praetermissum* Heiser & P.G. Sm.
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(GUA, PAI).

Capsicum baccatum L. var. **pendulum** (Willd.) Eshbaugh

Sin.: *Capsicum pendulum* Willd.
Arbusto. Nativa.
Países: PRY(COA, GUA, PAI).

Capsicum chacoense Hunz.

Sin.: *Capsicum chacoense* Hunz. var. *tomentosum* Hunz.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CON, ÑEE, PHA).

Capsicum chinense Jacq.

Arbusto. Introducida.
Países: BRA(RGS, SCA).

Capsicum eximium Hunz.

Arbusto. Nativa. 1000-2900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Capsicum flexuosum Sendtn.

Sin.: *Capsicum schottianum* Sendtn. var. *flexuosum* (Sendtn.) Hunz.
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI, SPE).

Capsicum frutescens L.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).

Capsicum recurvatum Witassek

Arbusto. Nativa. 100-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cestrum L.

Cestrum auriculatum L'Hér.

Arbusto. Nativa. 1800
Países: CHL(TAR).

Cestrum axillare Vell.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cestrum bracteatum Link & Otto

Sin.: *Cestrum amictum* Schltdl., *Cestrum amictum* Schltdl. var. *parviflorum* (Sendtn.) Dunal, *Cestrum bracteatum* Link & Otto var. *amictum* (Schltdl.) Sendtn., *Cestrum bracteatum* Link & Otto var. *parviflorum* Sendtn.
Arbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cestrum cordatum Schott ex Sendtn.

Arbusto. Nativa.
Países: PRY(COA).

Cestrum corymbosum Schltdl. var. **corymbosum**

Sin.: *Cestrum corymbosum* Schltdl. var. *hirsutum* Francey

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, PAY, RNO, SJO, TAC, TYT).

Cestrum euanthes Schltdl.

Sin.: *Cestrum sellowianum* Sendtn.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(CAS, SJO).

Cestrum guaraniticum Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(CON, PAI, PHA).

Cestrum hassleri Francey

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Cestrum intermedium Sendtn.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Cestrum kunthii Francey

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Cestrum laevigatum Schltdl.

Sin.: *Cestrum laevigatum* Schltdl. var. *evolutum* Schltdl., *Cestrum laevigatum* Schltdl. var. *paraguayense* Francey, *Cestrum laevigatum* Schltdl. var. *pauperculum* Francey

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAA, GUA, ÑEE, SPE).

Cestrum lorentzianum Griseb.

Sin.: *Cestrum pubens* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1700 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Cestrum mariquitense Kunth

Sin.: *Cestrum laevigatum* Schltdl. f. *flaviflora* Chodat & Hassl., *Cestrum mariquitense* Kunth var. *latifolium* Standl. & C.V. Morton, *Cestrum paraguayense* Hassl. ex Francey, nom. nud., *Cestrum sendtnerianum* Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, SPE).

Cestrum parqui L'Hér.

Sin.: *Cestrum campestre* Griseb., *Cestrum parqui* L'Hér. f. *heterophyllum* Kuntze, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *glabriusculum* Kuntze, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *longiflorum* Francey, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *oranense* Scolnik, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *poepigii* Dunal, *Cestrum virgatum* Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME, IDE, JFE). PRY(COA, PHA). URY(ROC, TAC).

Cestrum reflexum Sendtn.

Sin.: *Cestrum floribundum* Britton, *Cestrum reflexum* Sendtn. var. *densiflorum* Francey

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL).

Cestrum schlechtendalii G. Don

Sin.: *Cestrum coriaceum* Miers

Arbustiforme. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Cestrum strictum Schott ex Sendtn.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cestrum strigilatum Ruiz & Pav.

Sin.: *Cestrum calycinum* Kunth, *Cestrum calycinum* Kunth var. *tenuiflorum* Francey, *Cestrum calycinum* Willd. ex Roem. & Schult., hom. illeg., *Cestrum strigilatum* Ruiz & Pav. var. *calycinum* Kuntze, *Cestrum strigilatum* Ruiz & Pav. var. *laxiflorum* Kuntze, *Cestrum viridiflorum* Hook.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(RIV, TAC).

Cestrum tubulosum Sendtn.

Sin.: *Cestrum rojasianum* Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Cestrum velutinum Hiern

Sin.: *Cestrum albotomentosum* Dammer ex Francey

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). PRY(AMA).

Combera Sandwith

Combera minima (Phil.) Sandwith

Sin.: *Nicotiana minima* Phil., *Petunia minima* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 1800

Países: CHL(LLA).

Combera paradoxa Sandwith

Hierba. Endémica. 1800-3200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, AIS).

Datura L.**Datura ferox L.**

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, LLA, RME). PRY(ÑEE). URY(CAS, COL, FLA, MON, SJO).

Datura innoxia Mill.

Sin.: *Datura guayaquilensis* Kunth

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(ANT, ATA). PRY(APY, CON, PAI). URY(ART).

Datura stramonium L.

Sin.: *Datura inermis* Juss., *Datura tarapacana* Phil., *Datura tatula* L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COS, NEU, SAL, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).

Dunalia Kunth, nom. cons.**Dunalia brachyacantha Miers**

Sin.: *Acnistus achalensis* Hieron. ex Seckt, nom. nud., *Dierbachia brachyacantha* (Miers) Kuntze, *Dierbachia lyciodes* (Miers) Kuntze f. *achalensis* Kuntze, hom. illeg., *Dierbachia senticosa* (Miers) Kuntze, *Dunalia achalensis* Dammer, *Dunalia hauthalii* Dammer, *Dunalia herzogii* Dammer, *Dunalia pflanzii* Dammer, *Dunalia senticosa* Miers

Arbusto o árbol. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Dunalia spinosa (Meyen) Dammer

Sin.: *Atropa spinosa* Meyen, *Dierbachia lyciodes* (Miers) Kuntze, *Dunalia lycioides* Miers, *Grabowskia meyeniana* (Nees) Walp.

Arbusto. Nativa. 3500

Países: CHL(AYP, TAR).

Dyssochroma Miers**Dyssochroma longipes (Sendtn.) Miers**

Sin.: *Markea longipes* (Sendtn.) Cuatrec., *Solandra longipes* Sendtn.

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dyssochroma viridiflorum (Sims) Miers

Sin.: *Solandra viridiflora* Sims

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eriolarynx (Hunz.) Hunz.**Eriolarynx australis (Griseb.) J.M.H. Shaw**

Sin.: *Acnistus australis* (Griseb.) Griseb., *Acnistus australis* (Griseb.) Griseb. var. *grandiflorus* Griseb., *Dierbachia australis* (Griseb.) Kuntze, *Dunalia australis* (Griseb.) Sleumer, *lochroma australe* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1000-3100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Eriolarynx iochromoides (Hunz.) Hunz.

Sin.: *Vassobia iochromoides* Hunz.

Arbusto o árbol. Endémica. 1500-0 m.

Países: ARG(CAT).

Eriolarynx lorentzii (Dammer) Hunz.

Sin.: *Acnistus lorentzii* Dammer, *Dunalia lorentzii* (Dammer) Sleumer, *Vassobia lorentzii* (Dammer) Hunz.

Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Exodeconus Raf.**Exodeconus flavus (I.M. Johnst.) Axelius & D'Arcy**

Sin.: *Cacabus flavus* I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: CHL(TAR).

Exodeconus integrifolius (Phil.) Axelius

Sin.: *Cacabus integrifolius* Phil.

Hierba. Endémica. 2300-4000 m.

Países: ARG(CAT). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Exodeconus pusillus (Bitter) Axelius

Sin.: *Cacabus pusillus* Bitter

Hierba. Nativa. 2500-3000 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Fabiana Ruiz & Pav.**Fabiana australis Alaria**

Sin.: *Nierembergia patagonica* Speg., *Petunia patagonica* (Speg.) Millán

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Fabiana bryoides Phil.

Arbusto. Nativa. 2900-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

CHL(AYP, ANT, ATA, COQ).

Fabiana densa J. Remy

Sin.: *Fabiana clarenii* Dammer

Arbusto. Nativa. 2700-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ATA).

Fabiana denudata Miers

Sin.: *Fabiana hieronymi* Niederl.

Arbusto. Endémica. 300-3700 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Fabiana foliosa (Speg.) S.C. Arroyo
Sin.: *Fabiana patagonica* Speg. var. *foliosa* Speg.
Subarbusto. Endémica. 0-2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Fabiana friesii Dammer
Arbusto. Endémica. 1400-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Fabiana imbricata Ruiz & Pav.
Sin.: *Fabiana araucana* Phil., *Fabiana biflora* J. Remy, *Fabiana imbricata* Ruiz & Pav. var. *biflora* (J. Remy) Reiche, *Fabiana lutescens* Phil.
Arbusto. Endémica. 2600-3200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Fabiana nana (Speg.) S.C. Arroyo
Sin.: *Fabiana patagonica* Speg. var. *nana* Speg.
Subarbusto. Endémica. 1500-1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Fabiana patagonica Speg.
Sin.: *Fabiana glandulosa* Dusén, *Fabiana kurtziana* Dammer, *Fabiana patagonica* Speg. var. *typica* Speg., nom. inval., *Fabiana peckii* Niederl. var. *patagonica* (Speg.) Hauman
Arbusto. Nativa. 200-4100 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TUC).

Fabiana peckii Niederl.
Sin.: *Fabiana patagonica* Speg. var. *brachyloba* Speg., *Fabiana patagonica* Speg. var. *gracilis* Speg.
Arbusto. Endémica. 200-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR).

Fabiana punensis S.C. Arroyo
Arbusto. Endémica. 2200-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Fabiana ramulosa (Wedd.) Hunz. & Barboza
Sin.: *Fabiana densa* J. Remy var. *ramulosa* Wedd., *Fabiana deserticola* Reiche
Arbusto. Nativa. 3200-4000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Fabiana squamata Phil.
Arbusto. Nativa. 3000-4400 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Fabiana stephanii Hunz. & Barboza
Arbusto. Nativa. 3000-3900 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Fabiana viscosa Hook. & Arn.
Sin.: *Fabiana barrosi* Phil., *Fabiana coridifolia* Dunal, *Fabiana ericoides* Dunal
Arbusto. Endémica. 100-2200 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

lochroma Benth., nom. cons.
lochroma arborescens (L.) J.M.H. Shaw
Sin.: *Acnistus arborescens* (L.) Schltdl., *Atropa arborescens* L., *Dunalia arborescens* (L.) Sleumer
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Jaborosa Juss.

Jaborosa ameghinii (Speg.) Macloskie & Dusén
Sin.: *Himeranthus ameghinii* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU).

Jaborosa bergii Hieron.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, RNE, SJU, SLU).

Jaborosa cabreræ Barboza
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT).

Jaborosa caulescens Gillies & Hook. var. **bipinnatifida** (Dunal) Reiche
Sin.: *Jaborosa bipinnatifida* (Dunal) Meigen, *Lonchostigma bipinnatifidum* (Dunal) Phil., *Lonchostigma caulescens* (Gillies & Hook.) Dunal var. *bipinnatifidum* Dunal, *Trechonaetes bipinnatifida* Phil.
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

Jaborosa caulescens Gillies & Hook. var. **caulescens**
Sin.: *Dorystigma caulescens* (Gillies & Hook.) Miers, *Lonchostigma caulescens* (Gillies & Hook.) Dunal
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Jaborosa chubutensis Barboza & Hunz.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU).

Jaborosa integrifolia Lam.
Sin.: *Jaborosa bonariensis* J.F. Gmel., nom. illeg., *Jaborosa integrifolia* Lam. var. *brasiliensis* Dunal
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA). URY(RNO).

Jaborosa kurtzii Hunz. & BarbozaSin.: *Jaborosa andina* Kurtz, nom. nud.

Hierba. Endémica. 500-1700 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Jaborosa laciniata (Miers) Hunz. & BarbozaSin.: *Trechonaetes bridgesii* Dunal, *Trechonaetes laciniata* Miers

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).**Jaborosa lanigera** (Phil.) Hunz. & BarbozaSin.: *Lonchestigma lanigerum* (Phil.) Cabrera, *Trechonaetes lanigera* Phil.

Hierba. Endémica. 3000-5000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

Jaborosa leucotricha (Speg.) Hunz.Sin.: *Jaborosa leptophylla* Speg., *Trechonaetes leucotricha* Speg.

Hierba. Endémica. 500-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, RNE, SJU, TUC).

Jaborosa magellanica (Griseb.) DusénSin.: *Himeranthus magellanicus* Griseb., *Jaborosa magellanica* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Jaborosa odonelliana Hunz.

Hierba. Endémica. 700-1000 m.

Países: ARG(SAL, SDE, TUC).

Jaborosa oxipetala Speg.

Hierba. Endémica. 1100-1800 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Jaborosa parviflora (Phil.) Hunz. & BarbozaSin.: *Jaborosa floccosa* Dammer, *Lonchestigma parviflorum* (Phil.) Cabrera,*Trechonaetes machucana* Phil.,*Trechonaetes parviflora* Phil.

Hierba. Nativa. 3700-4500 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Jaborosa pinnata Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Jaborosa reflexa Phil.Sin.: *Jaborosa araucana* Phil., *Jaborosa desiderata* Speg.

Hierba. Endémica. 200-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Jaborosa riojana Hunz. & Barboza

Hierba. Endémica. 3000-4300 m.

Países: ARG(CAT, LRI). CHL(ANT).

Jaborosa rotacea (Lillo) Hunz. & BarbozaSin.: *Trechonaetes rotacea* Lillo

Hierba. Nativa. 1500-3700 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Jaborosa runcinata Lam.Sin.: *Himeranthus erosus* Miers, *Himeranthus runcinatus* (Lam.) Endl., *Himeranthus runcinatus* (Lam.) Endl. var. *brevipes* Dunal, *Himeranthus runcinatus* (Lam.) Endl. var. *longipes* Dunal, *Himeranthus tridentatus* Miers, *Jaborosa sinuata* Larrañaga, nom. inval., *Jaborosa tridentata* (Miers) Hicken

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, SFE). URY(FLA, MAL, MON, SJO).

Jaborosa sativa (Miers) Hunz. & BarbozaSin.: *Trechonaetes floribunda* Phil., *Trechonaetes sativa* Miers

Hierba. Endémica. 300-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Jaborosa squarrosa (Miers) Hunz. & BarbozaSin.: *Dorystigma crispum* Miers, *Dorystigma squarrosus* Miers, *Jaborosa leiocalyx* Dammer, *Lonchestigma crispum* (Miers) Dunal, *Lonchestigma squarrosus* (Miers) Dunal

Hierba. Nativa. 3000-4700 m.

Países: ARG(JUU, LRI). CHL(AYP, TAR, ATA).

Jaborosa volkmannii (Phil.) ReicheSin.: *Dolichosiphon volkmanni* Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).

Latua Phil.**Latua pubiflora** (Griseb.) Baill.Sin.: *Latua venenosa* Phil., *Lycioplesium pubiflorum* Griseb.

Arbusto o arbolito. Endémica. 300-900 m.

Países: CHL(ARA, LLA).

Leptoglossis Benth.**Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.Sin.: *Cyclostigma tenue* Phil., *Leptoglossis schwenckoides* Benth. var. *linifolia* (Miers) Monach., *Leptoglossis schwenckoides* Benth. var. *tenuis* (Phil.) Monach., *Leptoglossis schwenckoides* Benth. var. *xerophytica* Monach., *Leptoglossis tenuis* (Phil.) B.D. Jacks., *Nierembergia linifolia* Miers, *Nierembergia linifolia* Miers var. *macrophylla* Dunal, *Nierembergia linifolia* Miers var. *parviflora* Dunal, *Salpiglossis linifolia* (Miers) Wettst., *Salpiglossis tenuis* (Phil.) Wettst., *Schwenckia tenuis* (Phil.) Griseb.

Hierba. Endémica. 300-1200 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Lycianthes (Dunal) Hassl., nom. cons.

Lycianthes asarifolia (Kunth & Bouché) Bitter

Sin.: *Solanum asarifolium* Kunth & Bouché, *Solanum chodatianum* Huber, *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. f. *chacoense* Hassl., *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. f. *decadantum* Hassl., *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. f. *lilaciniflora* Hassl., *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. var. *asarifolium* (Kunth & Bouché) Hassl., *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. var. *majus* Dunal

Hierba. Nativa. 500-1400 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, GUA).

Lycianthes fasciculata (Rusby) Bitter

Sin.: *Brachistus fasciculatus* Rusby, *Lycianthes saltensis* Bitter, *Solanum fasciculatum* (Rusby) Bitter, nom. illeg., *Solanum fundatum* C.V. Morton, *Solanum saltense* (Bitter) C.V. Morton, hom. illeg.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC).

Lycianthes lycioides (L.) Hassl.

Sin.: *Lycianthes lycioides* (L.) Hassl. subsp. *parvifolia* (Wedd.) Bitter, *Lycianthes lycioides* (L.) Hassl. var. *brachyphylla* Bitter, *Solanum lyciiforme* Dammer, *Solanum lycioides* L., *Solanum lycioides* L. var. *parvifolium* Wedd., *Solanum pseudolycioides* Rusby

Arbusto. Nativa. 2500-4000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC). PRY(APA).

Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter

Sin.: *Lycianthes australe* (C.V. Morton) Hunz. & Barboza, comb. illeg., *Lycianthes pseudolycioides* Bitter, *Solanum australe* C.V. Morton, *Solanum pauciflorum* Vahl, *Solanum pseudolycioides* Chodat & Hassl., hom. illeg., *Solanum urbanum* Morong var. *ovatifolium* Chodat

Arbusto. Nativa. 200-300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter

Sin.: *Solanum corniculatum* Hieron., *Solanum muticum* N.E. Br., *Solanum rantonnetii* Carrière, *Solanum urbanum* Morong, *Solanum urbanum* Morong var. *foliosum* Chodat, *Solanum urbanum* Morong var. *nervosum* Chodat, *Solanum urbanum* Morong var. *subtomentosum* Chodat, *Solanum urbanum* Morong var. *typicum* Chodat, nom. inval.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, DFE, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

Lycianthes repens (Spreng.) Bitter

Sin.: *Boldoa repens* Spreng.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

Lycium L.

Lycium ameghinoi Speg.

Sin.: *Grabowskia ameghinoi* (Speg.) Speg., *Grabowskia spegazzinii* Dusén, *Lycium durispina* Dusén

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR).

Lycium americanum Jacq.

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *paraguariense* Hassl., *Lycium confusum* R.E. Fr., *Lycium floribundum* Dunal var. *pruinatum* (Griseb.) A. Terracc., *Lycium pruinatum* Griseb., *Lycium subtridentatum* Dammer, *Lycium tweedianum* Griseb. var. *pruinatum* (Griseb.) Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

Lycium athium Bernardello

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SDE).

Lycium barbarum L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(SCR).

Lycium boerhaviaefolium L. f.

Sin.: *Citharexylum mendocinum* Phil., *Grabowskia boerhaviaefolia* (L. f.) Schltdl., *Grabowskia cuneifolia* Dunal, *Grabowskia duplicata* Arn., *Grabowskia duplicata* Arn. var. *balansae* Chodat, *Grabowskia duplicata* Arn. var. *grandiflora* Dammer, *Grabowskia glauca* (Phil.) I.M. Johnst., *Grabowskia lindleyi* Miers, *Grabowskia megalosperma* Speg., *Grabowskia obscura* Dunal, *Grabowskia obtusa* Arn., *Grabowskia schizocalyx* Dammer, *Grabowskia schlechtendalii* Sendtn., *Lycium glaucum* Phil.

Arbusto. Nativa. 300-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR, ANT). PRY(APY, CEN, CON, PHA). URY(PAY, RNO).

Lycium bridgesii (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello

Sin.: *Alona microphylla* Miers, *Phrodus breviflorus* Phil., *Phrodus bridgesii* Miers, *Phrodus microphyllus* (Miers) Miers, *Phrodus nodosus* Miers, *Phrodus pendulus* (Phil.) Phil., *Phrodus thymifolius* (Phil.) Phil.

Arbusto. Endémica. 500-2900 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

***Lycium cestroides* Schltdl.**

Sin.: *Acnistus cestroides* (Schltdl.) Miers, *Lycium cestroides* Schltdl. var. *normale* A. Terracc.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(MON, SJO).

***Lycium chanar* Phil.**

Sin.: *Lycium crassispina* Phil., *Lycium decipiens* Dammer

Arbusto. Nativa. 2000-4200 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *chilense

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *normale* Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *gelidum* (Wedd.) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *odonelli* F.A. Barkley, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *ovatum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *petiolatum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *tomentosulum* Phil., *Lycium fimbriatum* C.L. Hitchc., *Lycium gelidum* Wedd., *Lycium grevilleanum* Miers, *Lycium hunzikeri* F.A. Barkley, *Lycium lasiopetalum* Speg., *Lycium pulverulentum* Skottsb., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *chilense* (Bertero) Kuntze, *Lycium scoparium* Miers, *Lycium scoparium* Miers subsp. *normale* A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *affine* (Miers) A. Terracc., *Lycium*

scoparium Miers var. *divaricatum* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *grevilleanum* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *lineare* (Miers) A. Terracc.

Arbusto. Endémica. 0-4500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

***Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *comberi* (C.L. Hitchc.) Bernardello**

Sin.: *Lycium comberi* C.L. Hitchc.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

***Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *confertifolium* (Miers) F.A. Barkley**

Sin.: *Lycium melanopotamicum* Niederl., *Lycium patagonicum* Miers var. *melanopotamicum* (Niederl.) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *confertifolium* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *confertifolium* Miers

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(COQ, VAL, RME).

***Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *descolei* F.A. Barkley**

Sin.: *Lycium comberi* C.L. Hitchc. var. *donatii* F.A. Barkley, *Lycium patagonicum* Miers, *Lycium patagonicum* Miers var. *normale* A. Terracc., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *patagonicum* (Miers) Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, RNE, SCR). PRY(PHA).

***Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *filifolium* (Gillies ex Miers) Bernardello**

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *capillare* (Miers) A. Terracc., *Lycium filifolium* Gillies ex Miers

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SDE, SJU, SLU). CHL(ATA, COQ).

***Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *glaberrimum* Phil.**

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero f. *glaberrimum* (Phil.) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *gracile* (Meyen) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *glabriusculum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *gracile* (Meyen) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *peruviansense* F.A. Barkley, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rhadinum* (Phil.) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *venosum* (Phil.) Reiche, *Lycium gracile* Meyen, *Lycium rhadinum* Phil., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *gracile* (Meyen) Kuntze, *Lycium sessiliflorum* Phil., *Lycium sparrei* F.A. Barkley, *Lycium venosum* Phil.

Arbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ, VAL).

***Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *minutifolium* (Miers) F.A. Barkley**

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero f. *minutifolium* (Miers) A. Terracc., *Lycium filifolium* Gillies ex Miers var. *minutifolium* Miers, *Lycium microphyllum* Phil., hom. illeg., *Lycium minutifolium* Phil., *Lycium philippianum* Speg.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE). CHL(ATA, COQ).

***Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *vergarae* (Phil.) Bernardello**

Sin.: *Lycium vergarae* Phil.

Arbusto. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU). CHL(TAR, ATA, COQ).

Lycium ciliatum Schltld.

Sin.: *Lycium argentinum* Hieron., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *meyeri* F.A. Barkley, *Lycium ciliatum* Schltld. var. *cordobense* Kuntze, *Lycium ciliatum* Schltld. var. *heteromorphum* Kuntze, *Lycium ciliatum* Schltld. var. *saltense* Kuntze, *Lycium erosum* Miers, *Lycium floribundum* Dunal var. *ciliatum* (Schltld.) A. Terracc., *Lycium floribundum* Dunal var. *grisebachii* A. Terracc., *Lycium ignarum* Miers, *Lycium schickendantzii* F.A. Barkley, *Lycium scoparium* Miers var. *argentinum* (Hieron.) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *argentinum* (Hieron.) Griseb., *Salpichroa ciliata* (Schltld.) Miers, *Withania pulvinata* Dunal

Arbusto. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Notas: Citada para Brasil y Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia.

Lycium ciliatum x cestroides Hieron.

Sin.: *Lycium hitchcockii* F.A. Barkley

Arbusto. Endémica.

Países: ARG(COR).

Lycium ciliatum x elongatum Bernardello

Arbusto. Endémica.

Países: ARG(COR).

Lycium cuneatum Dammer

Sin.: *Lycium cuneatum* Dammer var. *rojasii* F.A. Barkley, *Lycium pruinatum* Griseb. var. *puberulum* Griseb.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE). PRY(APY, AMA, PHA).

Lycium cyathiforme C.L. Hitchc.

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Lycium deserti Phil.

Sin.: *Lycium breanum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc.

Arbusto. Nativa. 500-3200 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Lycium distichum Meyen

Sin.: *Grabowskia disticha* (Meyen) Nees ex Dunal

Arbusto. Nativa. 2000

Países: CHL(TAR).

Lycium elongatum Miers

Sin.: *Lycium confertum* Miers, *Lycium floribundum* Dunal var. *confertum* (Miers) A. Terracc., *Lycium floribundum* Dunal var. *elongatum* (Miers) A. Terracc.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU, TUC).

Lycium elongatum x cestroides Hieron.

Sin.: *Lycium hieronymi* F.A. Barkley

Arbusto. Endémica.

Países: ARG(CAT, COR).

Lycium fuscum Miers

Sin.: *Lycium elongatum* Miers var. *riojana* Hieron. ex Hauman, nom. nud., *Lycium gilliesianum* Miers var. *fuscum* (Miers) F.A. Barkley, *Lycium longiflorum* Phil. var. *riojana* Hieron. ex Hauman, nom. nud., *Lycium miersii* F.A. Barkley, *Lycium penduliflorum* I.M. Johnst., *Lycium scoparium* Miers var. *fuscum* (Miers) A. Terracc.

Arbusto. Endémica. 2000-3500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Lycium gilliesianum Miers

Sin.: *Lycium acanthocladium* Speg., *Lycium elongatum* Miers var. *longiflorum* (Phil.) Hauman, *Lycium floribundum* Dunal var. *gilliesianum* (Miers) A. Terracc., *Lycium gilliesianum* Miers var. *longitubum*

(Dammer) C.L. Hitchc., *Lycium gilliesianum* Miers var. *ruiz-lealii* F.A. Barkley, *Lycium longiflorum* Phil., *Lycium longitubum* Dammer, *Lycium patagonicum* Miers var. *longiflorum* (Phil.) A. Terracc., *Lycium rigidum* Gillies ex Miers, *Lycium wilkesii* Ball

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR).

Lycium glomeratum Sendtn.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CEN, PHA).

Lycium humile Phil.

Arbusto. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA, RME).

Lycium infaustum Miers

Sin.: *Lycium floribundum* Dunal var. *infaustum* (Miers) A. Terracc., *Lycium halophilum* Speg., hom. illeg., *Lycium tweedianum* Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Lycium leiostemum Wedd.

Sin.: *Lycium biesei* F.A. Barkley

Arbusto. Nativa. 1000

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Lycium minutifolium J. Remy

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *implexum* (Miers) A. Terracc., *Lycium horridum* Phil., *Lycium implexum* Miers

Arbusto. Endémica. 1000-3200 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Lycium morongii BrittonSin.: *Lycium morongii* Britton f. *parvifolium*C.L. Hitchc., *Lycium morongii* Britton var. *indutum* Hassl., *Lycium morongii* Britton var. *parvifolium* (C.L. Hitchc.) F.A. Barkley

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Lycium nodosum MiersSin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *heterophyllum* (Hassl.) Hassl., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *nodosum* (Miers) A. Terracc., *Lycium tweedianum* Griseb. var. *heterophyllum* Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, TUC). PRY(APY, PHA).

Lycium pubitubum C.L. Hitchc.Sin.: *Lycium minutifolium* J. Remy var. *major* Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SCR).

Lycium rachidocladum DunalSin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *rachidocladum* (Dunal) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rachidocladum* (Dunal) A. Terracc.

Arbusto. Endémica. 0-3500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Lycium repens Speg.Sin.: *Lycium odonellii* F.A. Barkley

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Lycium schreiteri F.A. Barkley

Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU, TUC).

Lycium stenophyllum J. RemySin.: *Lycium fragosum* Miers

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Lycium tenuispinosum Miers var. **calycinum** (Griseb.) BernardelloSin.: *Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc., *Lycium scoparium* Miers var. *calycinum* Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(LLA).

Lycium tenuispinosum Miers var. **friesii** (Dammer) C.L. Hitchc.Sin.: *Lycium friesii* Dammer, *Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc. var. *sleumeri* F.A. Barkley, *Lycium venturii* C.L. Hitchc.

Arbusto. Endémica. 300-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, TUC).

Lycium tenuispinosum Miers var. **tenuispinosum**Sin.: *Lycium chubutense* Dusén, *Lycium floribundum* Dunal, hom. illeg., *Lycium floribundum* Dunal var. *normale* A. Terracc., *Lycium floribundum* Dunal var. *tenuispinosum* (Miers) A. Terracc., *Lycium patagonicum* Miers var. *pubescens* (Miers) A. Terracc., *Lycium pubescens* Miers, *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *floribundum* (Dunal) Kuntze, *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *pubescens* (Miers) Kuntze, *Lycium spinulosum* Miers, *Lycium spinulosum* Miers var. *parvifolium* Gillies ex Miers

Arbusto. Endémica. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). PRY(APY).

Lycium vimineum MiersSin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *vimineum* (Miers) A. Terracc.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE). URY(DUR).

Melananthus Walp.**Melananthus multiflorus** Carvalho

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS).

Nicandra Adans., nom. cons.**Nicandra physalodes** (L.) Gaertn.Sin.: *Atropa physalodes* L.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, RME).

Nicotiana L.**Nicotiana acaulis** Speg.Sin.: *Petunia humifusa* Speg., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Nicotiana acuminata (Graham) Hook. var. **acuminata**Sin.: *Nicotiana copiapina* Phil., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *oligantha* (Phil.) Millán, *Nicotiana modesta* Phil., *Nicotiana oligantha* Phil., *Nicotiana usspallatensis* Phil., *Petunia acuminata* Graham

Hierba. Endémica. 100-3400 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Nicotiana acuminata (Graham) Hook. var. **compacta** Goodsp.

Hierba. Endémica. 2700-3500 m.

Países: CHL(COQ).

Nicotiana acuminata (Graham) Hook. var. **multiflora** (Phil.) Reiche

Sin.: *Nicotiana angustifolia* Ruiz & Pav., *Nicotiana heterophylla* Phil., *Nicotiana multiflora* Phil.

Hierba. Endémica. 100-3100 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

***Nicotiana alata* Link & Otto**

Sin.: *Nicotiana affinis* Hort ex Moore, *Nicotiana alata* Link & Otto var. *grandiflora* Comes, *Nicotiana persica* Lindl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA). URY(FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TYT).

***Nicotiana ameghinoi* Speg.**

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

***Nicotiana azambujae* L.B. Sm. & Downs**

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

***Nicotiana bonariensis* Lehm.**

Sin.: *Nicotiana angustifolia* Ruiz & Pav. var. *parviflora* Dunal, *Nicotiana bonariensis* Lehm. var. *spathulata* Sendtn., *Nicotiana flexuosa* Jeffrey, *Nicotiana tristis* Sm.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, MAL, RIV, ROC, SJO, SOR).

Nicotiana cordifolia* Phil. subsp. *cordifolia

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(JFE).

***Nicotiana cordifolia* Phil. subsp. *sanctaclarae* Danton**

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(JFE).

***Nicotiana corymbosa* J. Remy var. *australis* Goodsp.**

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SJU, SCR).

Nicotiana corymbosa* J. Remy var. *corymbosa

Sin.: *Nicotiana corymbosa* J. Remy var. *typica* Millán, nom. inval., *Nicotiana monticola* Dunal, *Nicotiana oulophylla* Dunal, *Nicotiana scapigera* Phil.

Hierba. Nativa. 700-3700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME).

***Nicotiana forgetiana* Hemsl.**

Hierba. Endémica. 700-1300 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

***Nicotiana glauca* Graham**

Sin.: *Acnistus virgatus* Griseb., *Nicotiana glauca* Graham f. *lateritia* Lillo, *Nicotiana glauca* Graham var. *angustifolia* Comes, *Nicotiana glauca* Graham var. *decurrens* Comes, *Nicotiana glauca* Graham var. *grandiflora* Comes, *Nicotiana glauca* Graham var. *typica* Millán, nom. inval., *Nicotidendron glauca* (Graham) Griseb., *Siphaulax glabra* Raf.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APY, BOQ, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, SAO, SOR).

***Nicotiana knightiana* Goodsp.**

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: CHL(COQ).

***Nicotiana langsdorfii* Weinm.**

Sin.: *Nicotiana ruralis* Vell.

Hierba. Nativa. 200-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

***Nicotiana linearis* Phil.**

Sin.: *Collomia patagonica* Speg., *Nicotiana alpina* Dunal var. *deserticola* Speg., *Nicotiana alpina* Dunal var. *patagonica* (Speg.) Speg., *Nicotiana corymbosa* J. Remy var. *deserticola* (Speg.) Speg.

Hierba. Nativa. 200-2100 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, MAU).

***Nicotiana longibracteata* Phil.**

Sin.: *Nicotiana frigida* Phil.

Hierba. Nativa. 3400-3700 m.

Países: ARG(CAT, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA).

***Nicotiana longiflora* Cav.**

Sin.: *Nicotiana acuta* Griseb., *Nicotiana acutiflora* A. St.-Hil., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *acutiflora* (A. St.-Hil.) Comes, *Nicotiana longiflora* Cav. var. *breviflora* Comes, nom. inval., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *grandifolia* Morong

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, PAI, PHA). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

***Nicotiana miersii* J. Remy var. *lychnoides* (J. Remy) Goodsp.**

Sin.: *Nicotiana floribunda* (Phil.) Reiche, *Nicotiana lychnoides* J. Remy, *Waddingtonia floribunda* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Nicotiana miersii J. Remy var. **miersii**

Sin.: *Nicotiana collae* Phil., *Nicotiana coquimbana* Phil., *Nicotiana parviflora* Phil., hom. illeg., *Petunia viscosa* Colla, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Nicotiana mutabilis Stehmann & Semir

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Nicotiana noctiflora Hook.

Sin.: *Dittostigma mendocinum* Phil., *Nicotiana cavanillesi* Dunal var. *noctiflora* (Hook.) Millán, *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *typica* Millán, nom. inval., *Nicotiana mendocina* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SDE, TUC).

Nicotiana otophora Griseb.

Sin.: *Lehmannia otophora* (Griseb.) Comes, *Nicotiana friesii* Dammer ex R.E. Fr.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-2100 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Nicotiana paa Mart. Crov.

Sin.: *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *albiflora* (Comes) Millán, *Nicotiana noctiflora* Hook. var. *albiflora* Comes

Hierba. Nativa. 100-1600 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). CHL(ATA).

Nicotiana pauciflora J. Remy

Sin.: *Nicotiana caudigera* Phil., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *pauciflora* (J. Remy) Comes

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Nicotiana petunioides (Griseb.) Millán

Sin.: *Fabiana petunioides* Griseb., *Nicotiana crispa* Phil., hom. illeg., *Nicotiana deserticola* Speg., *Nicotiana pampasana* Kuntze, *Nicotiana philippii* Millán

Hierba. Nativa. 3700-4600 m.

Países: ARG(CAT, CHA, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA).

Nicotiana plumbaginifolia Viv.

Sin.: *Nicotiana cavanillesi* Dunal

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHA, ERI, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY).

Nicotiana rupicola L. Santilli, C. de Schrevel, Lavandero & P. Dandois

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(COQ).

Nicotiana solanifolia Walp.

Sin.: *Nicotiana breviloba* Phil., *Nicotiana cardiophylla* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Nicotiana spegazzini Millán

Hierba. Endémica. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

Nicotiana sylvestris Speg. & Comes

Hierba. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Nicotiana tabacum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(JFE, IPA). PRY(PAI).

Nicotiana undulata Ruiz & Pav.

Sin.: *Nicotiana brachysolen* Phil., *Nicotiana chilensis* Millán, nom. inval.

Hierba. Nativa. 2700-4200 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Nierembergia Ruiz & Pav.**Nierembergia aristata** D. Don

Sin.: *Nierembergia angustifolia* Kunth var. *intermedia* Hassl., *Nierembergia aristata* D. Don var. *stricta* (Miers) Griseb., *Nierembergia prostrata* Millán, *Nierembergia stricta* Miers

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(SCA). PRY(PHA). URY(FLA).

Nierembergia browallioides Griseb.

Sin.: *Nierembergia graveolens* A. St.-Hil. var. *grandiflora* Kuntze, *Nierembergia parodii* Millán

Hierba. Nativa. 1500-3300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Nierembergia calycina Hook.

Sin.: *Siphonema longiflora* Raf., nom. inval.

Hierba. Endémica. 200-1200 m.

Países: ARG(ERI). URY(CAS, COL, FLO, SOR).

Nierembergia ericoides Miers

Hierba. Endémica. 200-900 m.

Países: ARG(BAI).

Notas: La presencia de esta especie en Uruguay es dudosa.

Nierembergia graveolens A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). URY(CLA, SOR).

Nierembergia hatschbachii A. Cocucci & Hunz.

Hierba. Endémica. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Nierembergia linariaefolia Graham var. **glabriuscula** (Dunal) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia aristata* D. Don var. *montana* Griseb., *Nierembergia hippomanica* Miers var. *densa* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *dubia* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *elata* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *glabriuscula* Dunal, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *montana* (Griseb.) Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *violacea* Millán, *Nierembergia montana* (Griseb.) Hieron.

Hierba. Endémica. 1200-2400 m.

Países: ARG(CAT, COR, SLU).

Nierembergia linariaefolia Graham var. **pampeana** (Millán) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia hippomanica* Miers var. *pampeana* Millán

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SLU).

Nierembergia linariaefolia Graham var. **pinifolioides** (Millán) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia hippomanica* Miers var. *crispa* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *pinifolioides* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *rubricaulis* Millán

Hierba. Endémica. 500-1200 m.

Países: ARG(COR, SLU, SDE).

Nierembergia linariifolia Graham var. **linariaefolia**

Sin.: *Nierembergia angustifolia* Kunth var. *filicaulis* (Lindl.) Hassl., *Nierembergia caerulea* Miers, *Nierembergia filicaulis* Lindl., *Nierembergia gracilis* Hook.,

Nierembergia gracilis Hook. var. *guaranitica* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *caerulea* (Miers) Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *mesopotamica* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *scabridopilosa* Dunal, nom. inval., *Nierembergia hippomanica* Miers var. *typica* Millán, nom. inval., *Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *glaberrima* Millán, *Siphonema filicaulis* (Lindl.) Raf., *Stimenes gracilis* (Hook.) Raf.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(ITA, PHA). URY(MON, PAY).

Nierembergia micrantha Cabrera

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV, TYT).

Nierembergia pinifolia Miers

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS). URY(ART, CLA, LAV, MAL).

Nierembergia pulchella Gillies ex Miers var. **longistyla** (Millán) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia longistyla* Millán

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Nierembergia pulchella Gillies ex Miers var. **macrocalyx** (Millán) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia famatinensis* Millán, *Nierembergia grandiflora* Millán, *Nierembergia macrocalyx* Millán, *Nierembergia pilosa* Millán, *Nierembergia vivacissima* Millán

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

Nierembergia pulchella Gillies ex Miers var. **pulchella**

Sin.: *Nierembergia andina* Millán, *Nierembergia boliviana* Millán, *Nierembergia canescens* Millán, *Nierembergia catamarcensis* Millán

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU).

Nierembergia repens Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LSR).

Nierembergia rigida Miers

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, LPA, LRI, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SLU, TUC).

Nierembergia riograndensis Hunz. & Cocucci

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Nierembergia rivularis Miers

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, SAL). URY(COL, SOR).

Nierembergia scoparia Sendtn.

Sin.: *Nierembergia angustifolia* Kunth f. *frutescens* (Durieu) Kuntze, *Nierembergia frutescens* Durieu, *Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *breviflora* Millán, *Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *longipedicelata* Millán

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, RIV, SJO, SOR, TAC).

Nierembergia tandilensis (Kuntze) Cabrera

Sin.: *Nierembergia ericoides* Miers var. *tandilensis* (Kuntze) Millán, *Nierembergia graveolens* A. St.-Hil. var. *tandilensis* Kuntze

Hierba. Endémica. 700-1900 m.

Países: ARG(BAI).

Nierembergia tucumanensis Millán

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Nierembergia veitchii Hook.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Nolana L. f.

Nolana acuminata (Miers) Miers ex Dunal

Sin.: *Nolana angustifolia* Phil., *Nolana lanceolata* (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana navarri* Phil., *Nolana rupestris* Phil., *Sorema acuminata* Miers, *Sorema lanceolata* Miers

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Nolana adansonii (Roem. & Schult.) I.M. Johnst.

Sin.: *Tula adansonii* Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: CHL(TAR).

Nolana albescens (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia albescens* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia albescens* Phil., *Dolia albescens* Phil. ex Wettst.

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Nolana aplocaryoides (Gaudich.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alona pusilla* Phil., *Bargemontia aplocaryoides* (Gaudich.) I.M. Johnst., *Leloutrea aplocaryoides* Gaudich., *Nolana sedifolia* Poepp. var. *aplocaryoides* (Gaudich.) Mesa

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Nolana arenicola I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: CHL(TAR).

Nolana baccata (Lindl.) Dunal

Sin.: *Alona baccata* Lindl., *Gubleria baccata* Gaudich., *Nolana alba* Phil., *Nolana carrera* Phil., *Nolana carrera* Phil. var. *leucantha* (Phil.) Reiche, *Nolana leucantha* Phil., *Nolana linearis* (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana stans* Phil., *Periloba stans* (Phil.) I.M. Johnst., *Sorema linearis* Miers

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Nolana balsamiflua (Gaudich.) Mesa

Sin.: *Alona balsamiflua* Gaudich.

Subarbusto. Endémica. 500

Países: CHL(ANT).

Nolana carnosa (Lindl.) Miers ex Dunal

Sin.: *Alona carnosa* Lindl., *Alona lepidophylla* (Phil.) Reiche, *Alona sedifolia* Phil., *Alona vernicosa* Phil., *Nolana rostrata* (Lindl.) Miers ex Dunal var. *carnosa* (Lindl.) Mesa, *Osteocarpus lepidophyllus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(TAR, ATA).

Nolana clivicola (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia clivicola* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana coelestis (Lindl.) Miers ex Dunal

Sin.: *Alona coelestis* Lindl., *Alona coelestis* Lindl. var. *ericifolia* (Miers) F.H. Brandt, *Alona ericifolia* Miers, *Alona floribunda* Phil., *Nolana ericifolia* (Miers) Miers ex Dunal

Subarbusto. Endémica. 100-800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Nolana crassulifolia Poepp.

Sin.: *Alibrexia philippii* A. Braun, *Alibrexia rupicola* Miers, *Alona micrantha* Phil., *Alona tomentosa* Lindl., *Bargemontia crassulifolia* (Poepp.) I.M. Johnst., *Bargemontia eremobia* (Phil.) I.M. Johnst., *Bargemontia micrantha* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia atacamensis* F.H. Brandt, *Dolia canescens* Phil., *Dolia crassifolia* Kuntze, *Dolia eremobia* Phil., *Dolia grandiflora* Phil., *Dolia micrantha* (Phil.) Reiche, *Dolia philippii* (Braun) F.H. Brandt, *Dolia rupicola* (Miers) Benth. & Hook. ex Wettst., *Dolia tomentosa* (Lindl.) Benth., *Nolana grossulifolia* Kunze ex Gay

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Nolana deflexa (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia deflexa* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana diana M.O. Dillon

Hierba. Endémica. 300-600 m.

Países: CHL(ANT).

Nolana diffusa I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT).

Nolana divaricata (Lindl.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alona rigida* Phil., *Alona xerophila* Phil., *Aplocarya divaricata* Lindl., *Bargemontia clavata* (Miers) I.M. Johnst., *Bargemontia divaricata* (Lindl.) I.M.

Johnst., *Dolia clavata* Miers, *Dolia clavata* Miers var. *puberula* (Phil.) Reiche, *Dolia divaricata* (Lindl.) Hook. & Arn. ex W. Brandt, *Dolia hirsutula* Phil., *Dolia puberula* Phil., *Nolana peruviana* (Gaudich.) I.M. Johnst. subsp. *divaricata* (Lindl.) Mesa, *Osteocarpus clavatus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-4100 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Nolana elegans (Phil.) Reiche
Sin.: *Sorema elegans* Phil.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, VAL).

Nolana filifolia (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.
Sin.: *Alona chastenayana* (Gaudich.) Gaudich. ex Wettst., *Alona filifolia* (Hook. & Arn.) I.M. Johnst., *Alona glandulosa* Lindl., *Convolvulus filifolius* Hook. & Arn., *Fabiana grandiflora* Dunal, *Ipomoea cruckshanskii* Choisy, *Nolana chastenayana* Gaudich., *Nolana glandulosa* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Osteocarpus foliolosus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Nolana foliosa (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Bargemontia foliosa* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia foliosa* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(TAR).

Nolana glauca (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Sin.: *Bargemontia glauca* I.M. Johnst., *Nolana peruviana* (Gaudich.) I.M. Johnst. var. *glauca* (I.M. Johnst.) Mesa
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Nolana gracillima (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Sin.: *Bargemontia gracillima* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Nolana incana (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Alibrexia incana* Phil., *Dolia incana* (Phil.) Benth. & Hook. ex F.H. Brandt, *Dolia incana* (Phil.) Wettst.
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana inconspicua (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Sin.: *Bargemontia inconspicua* I.M. Johnst.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Nolana intonsa I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 200-800 m.
Países: CHL(TAR).

Nolana jaffuelii I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Nolana lachimbensis M.O. Dillon & Luebert
Arbusto. Endémica. 500
Países: CHL(ANT).

Nolana leptophylla (Miers) I.M. Johnst.
Sin.: *Alona deserticola* Phil., *Alona dubia* Phil., *Bargemontia deserticola* (Phil.) I.M. Johnst., *Bargemontia leptophylla* (Miers) I.M. Johnst., *Dolia deserticola* (Phil.) W. Brandt, *Dolia leptophylla* Miers, *Velpeaulia alibrexiioides* Gaudich.
Hierba. Endémica. 0-4200 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Nolana linearifolia Phil.
Sin.: *Bargemontia linearifolia* (Phil.) I.M. Johnst., *Nolana decemloba* Herzog
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana lycioides I.M. Johnst.
Sin.: *Bargemontia confinis* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 200-2100 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Nolana mollis (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Alona mollis* Phil., *Bargemontia mollis* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia macrocalyx* Phil., *Nolana leptophylla* (Miers) I.M. Johnst. subsp. *mollis* (Phil.) Mesa
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana onoana M.O. Dillon & M. Nakaz.
Hierba. Endémica. 100-600 m.
Países: CHL(ANT).

Nolana paradoxa Lindl.
Sin.: *Nolana atriplicifolia* D. Don, *Nolana atriplicifolia* D. Don var. *cuneifolia* Dunal, *Nolana geminiflora* Phil., *Nolana grandiflora* Herzog, *Nolana grandiflora* Lehm. ex G. Don, *Nolana litoralis* (Miers) Dunal, *Nolana napiformis* Phil., *Nolana ochrocarpa* Phil. ex Wettst., *Nolana paradoxa* Lindl. subsp. *atriplicifolia* (D. Don) Mesa, *Nolana paradoxa* Lindl. var. *glaberrima* Dunal, *Nolana paradoxa* Lindl. var. *violacea* Van Houtte, *Nolana petiolata* (Phil.) Reiche, *Periloba paradoxa* (Lindl.) Raf., *Sorema atriplicifolia* (D. Don) Lindl., *Sorema litoralis* Miers, *Sorema paradoxa* (Lindl.) Lindl., *Sorema paradoxa* (Lindl.) Lindl. var. *atriplicifolia* (D. Don) Miers, *Sorema petiolata* Phil.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).

Nolana parviflora (Phil.) Phil.
Sin.: *Periloba parviflora* (Phil.) I.M. Johnst., *Sorema parviflora* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana patachensis J. Hepp & M.O. Dillon

Hierba. Endémica. 700-800 m.

Países: CHL(TAR).

Nolana patula (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon

Sin.: *Alona patula* Phil., *Nolana patula* (Phil.) Mesa, comb. illeg.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ATA).

Nolana peruviana (Gaudich.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia peruviana* Gaudich., *Dolia macrocalyx* Phil. ex Herzog

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Nolana philippiana M.O. Dillon & Luebert

Hierba. Endémica. 700-1600 m.

Países: CHL(ANT).

Nolana pterocarpa Phil. ex Wettst.

Sin.: *Nolana debilis* Phil., *Nolana pterosperma* Phil., *Nolana pulchella* Phil. ex Reiche, *Periloba pterosperma* (Phil.) I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(TAR, ATA).

Nolana ramosissima I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ANT).

Nolana reichei M.O. Dillon & Arancio

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(COQ).

Nolana rhombifolia Martic. & Quezada

Hierba. Endémica. 1800-1900 m.

Países: CHL(AYP).

Nolana rostrata (Lindl.) Miers ex Dunal

Sin.: *Alona fonckii* Phil., *Alona miersii* Phil., *Alona obtusa* Lindl., *Alona phyllicifolia* Phil., *Alona rostrata* Lindl., *Nolana lepidophylla* (Phil.) I.M. Johnst.,

Nolana obtusa (Lindl.) Miers ex Dunal, *Osteocarpus brevifolius* Phil., *Osteocarpus rostratus* (Lindl.) Phil., *Rayera teretifolia* Gaudich.

Subarbusto. Endémica. 500-4100 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Nolana rupicola Gaudich.

Sin.: *Alona longifolia* Lindl., *Nolana bracteosa* (Phil.) Reiche, *Nolana glutinosa* (Phil.) Reiche, *Nolana longifolia* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Nolana triquetra* Koch & Bouché, *Periloba longifolia* (Lindl.) I.M. Johnst., *Sorema bracteosa* Phil., *Sorema glutinosa* Phil., *Sorema longifolia* (Lindl.) Miers

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Nolana salsoloides (Lindl.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia salsoloides* (Lindl.) I.M. Johnst., *Dolia salsoloides* Lindl., *Osteocarpus spathulatus* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Nolana sedifolia Poepp.

Sin.: *Alibrexia brevifolia* Phil., *Bargemontia sedifolia* (Poepp.) I.M. Johnst., *Dolia brevifolia* (Phil.) Phil. ex Wettst., *Dolia vermiculata* Lindl., *Fabiana lanuginosa* Hook. & Arn., *Salsola glomerulata* Meyen

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Nolana sessiliflora Phil.

Sin.: *Nolana sessilifolia* Phil. ex I.M. Johnst., *Periloba sessiliflora* (Phil.) I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 2000-2100 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana sphaerophylla (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon

Sin.: *Alona flaccida* Phil., *Alona sphaerophylla* Phil., *Bargemontia flaccida* (Phil.) I.M. Johnst., *Bargemontia sphaerophylla* (Phil.) I.M. Johnst., *Nolana flaccida* (Phil.) I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana stenophylla I.M. Johnst.

Sin.: *Alona stenophylla* (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana tarapacana (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Dolia tarapacana* Phil.

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Nolana tocopillensis (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia tocopillensis* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(ANT).

Nolana villosa (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alibrexia villosa* Phil., *Bargemontia villosa* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia villosa* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémica. 0-1700 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana werdermannii I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 800

Países: CHL(ATA, COQ).

Pantacantha Speg.

Pantacantha ameghinoi Speg.

Arbusto. Endémica. 1700-2400 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Petunia Juss.

Petunia altiplana Ando & Hashim.
Hierba. Endémica. 700-1400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Petunia axillaris (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **axillaris**
Sin.: *Nicotiana axillaris* Lam., *Nicotiana axillaris* Lam. var. *nyctaginiflora* (Juss.) Kuntze, *Nicotiana axillaris* Lam. var. *propinqua* (Miers) Kuntze, *Nicotiana nyctaginiflora* (Juss.) Lehm., *Petunia nyctaginiflora* Juss., *Petunia propinqua* Miers, *Stimoryne axillaris* (Lam.) Wijsman
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, LPA). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR, TYT).

Petunia axillaris (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **parodii** (Steere) Cabrera
Sin.: *Petunia parodii* Steere, *Stimoryne axillaris* (Lam.) Wijsman subsp. *parodii* (Steere) Wijsman
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, COL, DUR, FLO, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

Petunia axillaris (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **subandina** Ando
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Petunia bajeensis Ando & Hashim.
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS).

Petunia bonjardinensis Ando & Hashim.
Hierba. Endémica. 900-1400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Petunia correntina Greppi & Stehmann
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(COS).

Petunia exserta Stehmann
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(RGS).

Petunia inflata R.E. Fr.
Sin.: *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. subsp. *inflata* (R.E. Fr.) Wijsman, *Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman subsp. *inflata* (R.E. Fr.) Wijsman
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ITA, ÑEE).

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **depauperata** (R.E. Fr.) Stehmann
Sin.: *Petunia dichotoma* Sendtn., *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. var. *depauperata* (R.E. Fr.) L.B. Sm. & Downs, *Petunia violacea* Lindl. subsp. *depauperata* R.E. Fr.
Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ROC).

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **integrifolia**
Sin.: *Nicotiana integrifolia* (Hook.) Kuntze, *Nierembergia punicea* Sendtn., *Petunia littoralis* L.B. Sm. & Downs, *Petunia phoenicea* D. Don ex Loudon, *Petunia riograndensis* Ando & Hashim., *Petunia violacea* Lindl., *Salpiglossis integrifolia* (Hook.) Wijsman
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, COA). URY(RNO, ROC).

Petunia interior Ando & Hashim.
Hierba. Endémica. 200-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Petunia occidentalis R.E. Fr.
Sin.: *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. subsp. *occidentalis* (R.E. Fr.) Wijsman, *Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman subsp. *occidentalis* (R.E. Fr.) Wijsman
Hierba. Nativa. 600-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Petunia reitzii L.B. Sm. & Downs
Sin.: *Stimoryne reitzii* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman
Hierba. Endémica. 1000
Países: BRA(SCA).

Petunia saxicola L.B. Sm. & Downs
Hierba. Endémica. 900
Países: BRA(SCA).

Petunia scheideana L.B. Sm. & Downs
Sin.: *Petunia guarapuavensis* Ando & Hashim., *Stimoryne scheideana* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman
Hierba. Endémica. 200-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Petunia secreta Stehmann & Semir
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(RGS).

Petunia toropiensis Stehmann & Larocca
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(RGS).

Physalis L.

Physalis angulata L.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, PHA, SPE). URY(RIV).

Physalis cordata Mill.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Physalis lagascae Roem. & Schult.Sin.: *Physalis parviflora* Lag., nom. illeg.,*Physalis rydbergii* Rusby

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(JUU).

Physalis nicandroides Schltldl.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: PRY(PAI).

Physalis peruviana L.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, RME, JFE).

Notas: Introducida en Brasil.

Physalis pruinosa L. var. **argentina** J.M.

Toledo & Barboza

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Physalis pubescens L. var. **hygrophila**

(Mart.) Dunal

Sin.: *Physalis hygrophila* Mart., *Physalis neesiana* Sendtn.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA).

Physalis pubescens L. var. **pubescens**

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAN, CEN, GUA, PHA). URY(ART, RNO, SAO, SOR, TYT).

Physalis subilsiana J.M. Toledo

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY, PHA).

Physalis victoriana J.M. Toledo

Hierba. Endémica. 800-900 m.

Países: ARG(JUU).

Physalis viscosa L.Sin.: *Physalis mendocina* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, RME, IPA). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, PHA, SPE). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR).

Reyesia Gay**Reyesia cactorum** (I.M. Johnst.) D'ArcySin.: *Salpiglossis cactorum* I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 2900-3500 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Reyesia chilensis GaySin.: *Pteroglossis laxa* Miers, *Reyesia laxa* (Miers) D'Arcy, *Salpiglossis brachysiphon* I.M. Johnst., *Salpiglossis chilensis* (Gay) Wettst.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Reyesia juniperoides (Werderm.) D'ArcySin.: *Salpiglossis juniperoides* Werderm.

Hierba. Endémica. 2500

Países: CHL(AYP, TAR).

Reyesia parviflora (Phil.) Hunz.Sin.: *Salpiglossis parviflora* Phil.

Hierba. Endémica. 2900-4100 m.

Países: ARG(MEN, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

Salpichroa Miers**Salpichroa organifolia** (Lam.) Baill.Sin.: *Atropa organifolia* (Lam.) Desf., *Atropa rhomboidea* Hook., *Jaborosa montevidensis* Casar., *Physalis organifolia* Lam., *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers, *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *divaricata* Miers, *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *pubescens* Miers, *Salpichroma rhomboidea* (Hook.) Miers var. *mollis* Dammer

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, BIO). PRY(AMA, CEN, ÑEE, PAI). URY(ROC).

Salpichroa ramosissima Miers

Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.

Países: ARG(JUU).

Salpichroa scandens Dammer

Arbusto. Nativa. 2000-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP).

Salpichroa tristis Miers var. **lehmanni** (Dammer) KeelSin.: *Salpichroma alata* Dammer, *Salpichroma foetida* Dammer, *Salpichroma lehmanni* Dammer

Arbolito. Nativa. 3500-4500 m.

Países: ARG(JUU). CHL(TAR).

Salpichroa tristis Miers var. **tristis**Sin.: *Salpichroa mandoniana* Wedd. var. *tucumanensis* Griseb., *Salpichroma mandoniana* Wedd.

Arbusto. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Salpiglossis Ruiz & Pav.

Salpiglossis sinuata Ruiz & Pav.

Sin.: *Salpiglossis atropurpurea* Graham, *Salpiglossis barclayana* Sweet, *Salpiglossis coccinea* Lindl., *Salpiglossis fulva* Courtois, *Salpiglossis picta* Sweet, *Salpiglossis purpurea* Miers, *Salpiglossis purpurea* Miers var. *atropurpurea* (Graham) Miers, *Salpiglossis straminea* Hook., *Salpiglossis straminea* Hook. var. *picta* (Sweet) Hook.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Salpiglossis spinescens Clos

Arbusto. Endémica. 700-2800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Schizanthus Ruiz & Pav.

Schizanthus alpestris Poepp.

Sin.: *Schizanthus alpestris* Poepp. var. *glandulifera* Phil., *Schizanthus angustifolius* Phil., *Schizanthus glanduliferus* Phil., *Schizanthus laciniosus* Phil.

Hierba. Endémica. 100-2800 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Schizanthus candidus Lindl.

Sin.: *Schizanthus albiflorus* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA).

Schizanthus carlomunozii V. Morales & M. Muñoz var. **carlomunozii**

Hierba. Endémica. 100-400 m.

Países: CHL(COQ).

Schizanthus carlomunozii V. Morales & M. Muñoz var. **dilutimaculatus** V. Morales & M. Muñoz

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Schizanthus coccineus (Phil.) J.M. Watson

Sin.: *Schizanthus grahami* Gillies ex Hook. var. *coccinea* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-2900 m.

Países: CHL(RME).

Schizanthus fallax I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 600-900 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Schizanthus grahamii Gillies ex Hook.

Sin.: *Schizanthus araucanus* Phil., *Schizanthus diazii* Phil., *Schizanthus gilliesii* Phil., *Schizanthus grahamii* Gillies ex Hook. var. *araucanus* (Phil.) Reiche, *Schizanthus incanus* Hort. ex C. Morr., *Schizanthus retusus* Hook.

Hierba. Endémica. 1200-2900 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Schizanthus hookeri Gillies ex Graham

Sin.: *Schizanthus calycosus* Phil., *Schizanthus hookeri* Gillies ex Graham var. *calycosus* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 1300-3100 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Schizanthus integrifolius Phil.

Hierba. Endémica. 800-2800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Schizanthus lacteus Phil.

Sin.: *Schizanthus sanromanii* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ANT).

Schizanthus laetus Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Schizanthus litoralis Phil. var. **humilis** (Lindl.) V. Morales & M. Muñoz

Sin.: *Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav. var. *humilis* Lindl., *Schizanthus tricolor* Grau & Gronbach

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(VAL).

Schizanthus litoralis Phil. var. **litoralis**

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(VAL).

Schizanthus nutantiflorus J. Chinga & Lavandero

Hierba. Endémica. 100-800 m.

Países: CHL(ANT).

Schizanthus parvulus Sudzuki

Hierba. Endémica. 300-900 m.

Países: CHL(COQ).

Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav.

Sin.: *Eutoca pedunculosa* Phil., *Schizanthus floribundus* Phil., *Schizanthus gayanus* Phil., *Schizanthus gracilis* Clos, *Schizanthus humilis* Phil., *Schizanthus latifolius* Phil., *Schizanthus lilacinus* Kunze, *Schizanthus pinnatifidus* Lindl.

Hierba. Endémica. 100-2000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Schizanthus porrigens Graham subsp. **borealis** V. Morales & M. Muñoz

Hierba. Endémica. 100-600 m.

Países: CHL(COQ).

Schizanthus porrigens Graham subsp. **porrigens**

Sin.: *Schizanthus heterophyllus* Phil., *Schizanthus tenuifolius* Phil., *Schizanthus tenuis* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Schizanthus splendens Sudzuki

Hierba. Endémica. 300-1800 m.

Países: CHL(COQ).

Schwenckia D. Royen ex L.**Schwenckia americana** D. Royen ex L.
var. **americana**

Sin.: *Schwenckia americana* D. Royen ex L. var. *hirta* (Klotzsch) Carvalho,
Schwenckia hirta Klotzsch

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, PAI, PHA).

Schwenckia americana L. var. **angustifolia** Schmidt

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Schwenckia breviseta Casar.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Schwenckia curviflora Benth.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL).

Schwenckia grandiflora Benth.

Sin.: *Schwenckia ulei* Dammer

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

Schwenckia juncoides Chodat

Hierba palustre. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Schwenckia volubilis Benth.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Sclerophylax Miers**Sclerophylax adnatifolia** Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1900-2400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Sclerophylax arnottii Miers

Sin.: *Sclerophylax gilliesii* Miers

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

Sclerophylax caducifructus Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, SAL, SJU).

Sclerophylax cocuccii Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

Sclerophylax cuyanus Di Fulvio

Hierba. Endémica. 700-1000 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Sclerophylax cynocrambe (Griseb.)

Griseb.

Sin.: *Sclerophylax cynocrambe* (Griseb.) Kuntze, comb. superfl., *Sterrhymenia cynocrambe* Griseb.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, LRI).

Sclerophylax difulvioi Del Vitto & Petenatti

Subarbusto. Endémica. 700-900 m.

Países: ARG(SLU).

Sclerophylax hunzikeri Di Fulvio

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, LRI).

Sclerophylax kurtzii Di Fulvio

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

Sclerophylax lorentzianus O. Hoffm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). URY(RNO).

Sclerophylax ruiz-lealii Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1000-2100 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Sclerophylax spinescens Miers

Sin.: *Tetragonia horrida* Britton

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, PHA).

Sclerophylax tenuicaulis Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1600-2600 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Sclerophylax trispermus Di Fulvio

Hierba. Endémica. 300-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

Sessea Ruiz & Pav.**Sessea regnellii** Taub.

Sin.: *Cestrum capsulare* Carvalho & Schnoor

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sessea vestioides (Schltdl.) Hunz.

Sin.: *Cestrum vestioides* Schltdl., *Sessea vischeri* Chodat, *Sesseopsis vestioides* (Schltdl.) Bitter, *Sesseopsis vischeri* (Chodat) Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(PAI). URY(SAO, TAC).

Solanum L.**Solanum abutiloides** (Griseb.) Bitter & Lillo

Sin.: *Cyphomandra abutiloides* Griseb., *Solanum hibiscifolium* Rusby

Arbusto o árbol. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Solanum acaule Bitter

Sin.: *Solanum acaule* Bitter f. *incuyo* Ochoa, *Solanum acaule* Bitter subsp. *punae* (Juz.) Hawkes & Hjert., *Solanum acaule* Bitter var. *caulescens* Bitter, *Solanum acaule* Bitter var. *checcae* Hawkes, *Solanum acaule* Bitter var. *punae* (Juz.) Hawkes, *Solanum acaule* Bitter var. *subexinterruptum* Bitter, *Solanum depexum* Juz., *Solanum depexum* Juz. var. *chorruense* Hawkes, *Solanum punae* Juz., *Solanum schreiteri* Bukasov, nom. nud., *Solanum uyunense* Cárdenas

Hierba. Nativa. 2000-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Solanum aculeatissimum Jacq.

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Solanum adscendens Sendtn.

Sin.: *Solanum amarantoides* Dunal var. *hirtellum* Douglas ex Lindl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CON).

Solanum adpersum Witassek

Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Solanum aenictum C.V. Morton

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(GUA, ITA).

Solanum affine Sendtn.

Sin.: *Solanum jatrophifolium* Dunal, *Solanum micans* Witassek, *Solanum*

spectabile Steud. var. *subhastatum* Sendtn.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum alatirameum Bitter

Arbusto. Endémica. 800-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum albidum Dunal

Sin.: *Solanum incanum* Ruiz & Pav., hom. illeg., *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg., *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. subsp. *carabayense* Bitter, *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. var. *dryophyllum* Bitter, *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. var. *tardecavescens* Bitter, *Solanum paniculatum* L. var. *chulumani* Dunal
Árbol. Nativa. 400-2500 m.
Países: ARG(SAL).

Solanum aligerum Schlttdl.

Sin.: *Solanum grossum* C.V. Morton, *Solanum paraneurotrichum* Bitter, nom. nud., *Solanum pterocladum* Van Heurck & Müll. Arg.
Arbusto o arbolito. Nativa. 1500-3300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum aloysiifolium Dunal

Sin.: *Solanum bermejense* Bitter, *Solanum collectaneum* C.V. Morton, *Solanum filiforme* Ruiz & Pav. var. *lanceolatum* Kuntze, *Solanum filiforme* Ruiz & Pav. var. *subdentatum* Kuntze, *Solanum lorentzii* Bitter, *Solanum lorentzii* Bitter var. *montigenum* C.V. Morton, *Solanum lorentzii* Bitter var. *tucumanicum* Bitter, *Solanum montigenum* (C.V. Morton) Cabrera, *Solanum oligodontum* Bitter, *Solanum polystrichostylum* Bitter var. *lorentzii* (Bitter) Edmonds
Hierba o arbusto. Nativa. 400-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SFE, TUC).

Solanum alphonsei Dunal

Sin.: *Solanum alphonsei* Dunal var. *taguataqua* Dunal, *Solanum germainii* Phil., *Solanum tenuicaule* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(LBO, MAU).
Notas: Según Knapp (2013), probablemente habite en la Argentina

Solanum alternatopinnatum Steud.

Sin.: *Solanum juciri* Mart. ex Sendtn., *Solanum juciri* Mart. ex Sendtn. f. *paraguariense* Hassl., *Solanum oleraceum* Vell., hom. illeg., *Solanum viridipes* Dunal, *Solanum viridipes* Dunal var. *intermedium* Hassl.
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA).

Solanum americanum Mill.

Sin.: *Solanum adventitium* Polg., *Solanum americanum* Mill. var. *nodiflorum* (Jacq.) Edmonds, *Solanum curtipes* Bitter, *Solanum nigrum* L. subsp. *aguaraquiya* Sendtn., *Solanum nigrum* L. var. *americanum* (Mill.) O.E. Schulz, *Solanum nigrum* L. var. *virginicum* L., *Solanum nodiflorum* Jacq., *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *acuminatum* Chodat, *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *petiolastrum* Dunal, *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *sapucayense* Chodat, *Solanum oleraceum* Dunal, *Solanum sciaphilum* Bitter, *Solanum tenellum* Bitter
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, RME). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, COA, GUA,

ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON, TAC).

Solanum amygdalifolium Steud.

Sin.: *Solanum angustifolium* Lam., hom. illeg., *Solanum angustifolium* Lam. var. *macrophyllum* Dunal, *Solanum brittonianum* Morong, *Solanum handelianum* Morong, *Solanum persicifolium* Mart., hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(COL, MON, TAC).

Notas: Introducida en Chile.

Solanum angustifidum Bitter

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).

Solanum annuum C.V. Morton

Sin.: *Solanum micrantherum* Cabrera

Hierba. Nativa. 2100-3300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Solanum anoacanthum Sendtn.

Arbusto. Nativa. 500-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Solanum apaense Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CON).

Solanum aparadense L.A. Mentz & M. Nee

Arbusto. Endémica. 800-1300 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Notas: Excluida de la Flora Argentina (Chiarini, 2013)

Solanum apiahense Witasek

Hierba. Nativa. 600-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum arenarium Sendtn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Solanum argenteum Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). CHL(JFE).

Notas: Introducido en las islas de Juan Fernández (Chile).

Solanum argentinum Bitter & Lillo

Sin.: *Solanum argentinum* Bitter & Lillo var. *chroniotrichum* Bitter, *Solanum chroniotrichum* (Bitter) C.V. Morton

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CEN, PHA).

Solanum aridum Morong

Sin.: *Solanum aridum* Morong var. *pusillum* Hassl., *Solanum conditum* C.V. Morton, *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *ovalifolium* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Solanum atropurpureum Schrank

Sin.: *Solanum atropurpureum* Schrank var. *aureimicans* Bitter, *Solanum atropurpureum* Schrank var. *diaphanadenium* Bitter, *Solanum atropurpureum* Schrank var. *ochrochlorum* Dunal, *Solanum vernicatum* Lindl.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(TAC).

Solanum berthaultii Hawkes

Sin.: *Solanum berthaultii* Hawkes f. *zudaniense* (Cárdenas) Correll, *Solanum litusinum* Ochoa, *Solanum tarijense* Hawkes, *Solanum tarijense* Hawkes var. *pojoense* (Cárdenas) Correll, *Solanum trigalense* Cárdenas, *Solanum vallegrandense* Cárdenas, *Solanum vallegrandense* Cárdenas var. *pojoense* Cárdenas, *Solanum x flavoviridens* Ochoa, *Solanum zudaniense* Cárdenas

Hierba. Nativa. 1200-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Solanum betaceum Cav.

Sin.: *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendtn., *Cyphomandra crassifolia* (Ortega) J.F. Macbr., hom. illeg., *Cyphomandra crassifolia* (Ortega) Kuntze, *Pionandra betacea* (Cav.) Miers, *Solanum crassifolium* Ortega, hom. illeg.

Árbol. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum bistellatum L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum boliviense Dunal

Sin.: *Solanum alticola* Bitter, *Solanum alticola* Bitter var. *xanthotrichum* Hawkes, *Solanum astleyi* Hawkes & Hjert., *Solanum boliviense* Dunal subsp. *astleyi* (Hawkes & Hjert.) D. M. Spooner, M. Ugarte & P. W. Scroch, *Solanum decurrentilobum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum ellipsifolium* Cárdenas & Hawkes, *Solanum megistacrolobum* Bitter, *Solanum megistacrolobum* Bitter f. *purpureum* Ochoa, *Solanum megistacrolobum* Bitter subsp. *toralapanum* (Cárdenas & Hawkes) R.B. Giannattasio & D.M. Spooner, *Solanum megistacrolobum* Bitter var. *toralapanum* (Cárdenas & Hawkes) Ochoa, *Solanum*

sanctae-rosae Hawkes, *Solanum tilcarensis* Hawkes, *Solanum toralapanum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum toralapanum* Cárdenas & Hawkes var. *subintegrifolium* Cárdenas & Hawkes, *Solanum ureyi* Cárdenas

Hierba. Nativa. 1600-4300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

***Solanum bonariense* L.**

Sin.: *Solanum arborescens* Moench, *Solanum astroites* Jacq., *Solanum fastigiatum* Willd., *Solanum saponaceum* Dunal var. *uruguense* Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(ITA). URY(CLA, MON, SOR).

***Solanum brachyantherum* Phil.**

Sin.: *Solanum geissei* Phil.

Hierba. Endémica. 100-800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, IDE).

***Solanum brevicaulis* Bitter**

Sin.: *Solanum alandiae* Cárdenas, *Solanum anomalocalyx* Hawkes, *Solanum anomalocalyx* Hawkes var. *brachystylum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum anomalocalyx* Hawkes var. *Ilallaguanianum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum anomalocalyx* Hawkes var. *murale* Cárdenas & Hawkes, *Solanum avilesii* Hawkes & Hjert., *Solanum boliviense* Dunal subsp. *virgultorum* Bitter, *Solanum brevimucronatum* Hawkes, *Solanum candelarianum* Cárdenas, hom. illeg., *Solanum colominense* Cárdenas, *Solanum famatinae* Bitter & Wittm., *Solanum gourlayi* Hawkes, *Solanum gourlayi* Hawkes subsp. *pachytrichum* (Hawkes) Hawkes & Hjert., *Solanum gourlayi* Hawkes subsp. *saltense* A.M. Clausen & K.A. Okada, *Solanum gourlayi* Hawkes subsp. *vidaurei* (Cárdenas)

Hawkes & Hjert., *Solanum hondelmannii* Hawkes & Hjert., *Solanum hoopesii* Hawkes & Okada, *Solanum incamayoense* K.A. Okada & A.M. Clausen, *Solanum lapazense* Hawkes, *Solanum leptophyes* Bitter, *Solanum leptophyes* Bitter f. *gourlayi* (Hawkes) Correll, *Solanum liriunianum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum mollepujroense* Cárdenas & Hawkes, *Solanum oplocense* Hawkes, *Solanum pachytrichum* Hawkes, *Solanum puberulo-fructum* Correll, *Solanum ruiz-zeballosii* Cárdenas, *Solanum setulosistylum* Bitter, *Solanum sleumeri* Correll, *Solanum sparsipilum* (Bitter) Juz. & Bukasov, *Solanum sparsipilum* (Bitter) Juz. & Bukasov var. *Ilallaguanianum* (Cárdenas & Hawkes) Correll, *Solanum spegazzinii* Bitter, *Solanum subandigenum* Hawkes var. *camarguense* Cárdenas, *Solanum sucrense* Hawkes, *Solanum torrecillasense* Cárdenas, *Solanum tuberosum* L. subsp. *sparsipilum* Bitter, *Solanum ugentii* Hawkes & Okada, *Solanum vidaurei* Cárdenas, *Solanum virgultorum* (Bitter) Cárdenas & Hawkes

Hierba. Nativa. 1500-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

***Solanum brevipedunculatum* Rusby**

Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

***Solanum bullatum* Vell.**

Sin.: *Solanum macropus* Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Solanum caavurana* Vell.**

Sin.: *Solanum caavurana* Vell. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Solanum caavurana* Vell. f. *pauciflora* Chodat, *Solanum megalocarpon* C.V. Morton

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

***Solanum caesium* Griseb.**

Sin.: *Solanum oranense* Bitter

Hierba. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

***Solanum calileguae* Cabrera**

Arbusto. Nativa. 1600-1900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

***Solanum campaniforme* Roem. & Schult.**

Sin.: *Solanum caeruleum* Vell., *Solanum dusenii* L.B. Sm. & Downs, *Solanum microrbitum* L.B. Sm. & Downs

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Solanum canoasense* L.B. Sm. & Downs**

Sin.: *Solanum cataractae* L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 1300-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Solanum capsicoides* All.**

Sin.: *Solanum arreventa* Vell., *Solanum ciliare* Willd., *Solanum ciliatum* Lam., *Solanum sinuatifolium* Vell., *Solanum sphaerocarpum* Moric.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE).

***Solanum cassioides* L.B. Sm. & Downs**

Arbusto o arbolito. Endémica. 300-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

***Solanum castaneum* Carvalho**

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR).

Solanum chacoense Bitter

Sin.: *Solanum arnezii* Cárdenas, *Solanum bitteri* Hassl., nom. superfl., *Solanum boergeri* Bukasov, *Solanum caipipendense* Cárdenas, *Solanum calvescens* Bitter, *Solanum chacoense* Bitter f. *caipipendense* (Cárdenas) Correll, *Solanum chacoense* Bitter f. *gibberulosum* (Juz. & Bukasov) Correll, *Solanum chacoense* Bitter f. *glabrescens* (Hassl.) Hassl., *Solanum chacoense* Bitter f. *plurijugum* Hassl., nom. nud., *Solanum chacoense* Bitter subsp. *muelleri* (Bitter) Hawkes, *Solanum chacoense* Bitter subsp. *subtilius* (Bitter) Hawkes, *Solanum chacoense* Bitter var. *angustisectum* (Hassl.) Hassl., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Hook. f., *Solanum cordobense* Bukasov, *Solanum cuevoanum* Cárdenas, *Solanum dolichostigma* Bukasov, nom. nud., *Solanum emmeae* Juz. & Bukasov, *Solanum garciae* Juz. & Bukasov, *Solanum gibberulosum* Juz. & Bukasov, *Solanum guaraniticum* Hassl. f. *glabrescens* Hassl., *Solanum guaraniticum* Hassl. f. *plurijugum* Hassl., *Solanum guaraniticum* Hassl., hom. illeg., *Solanum guaraniticum* Hassl. var. *angustisectum* Hassl., *Solanum horovitzii* Bukasov, *Solanum horovitzii* Bukasov var. *glabristylum* Hawkes, nom. nud., *Solanum horovitzii* Bukasov var. *multijugum* Hawkes, *Solanum jamesii* Torr. var. *grandifrons* Bitter, *Solanum jujuyense* Hawkes, *Solanum knappei* Juz. & Bukasov, *Solanum laplaticum* Bukasov, *Solanum limense* Correll, *Solanum muelleri* Bitter, *Solanum muelleri* Bitter f. *densipilosum* Correll, *Solanum parodii* Juz. & Bukasov, *Solanum premaglia* L. Planch., nom. nud., *Solanum saltense* Hawkes, *Solanum schickii* Juz. & Bukasov, *Solanum subtilius* Bitter, *Solanum tuberosum* L. subsp. *guaraniticum* Bertoni, *Solanum tuberosum*

L. subsp. *yanacochense* Ochoa, *Solanum tuberosum* L. var. *glabriusculum* Dunal, *Solanum yanacochense* (Ochoa) Gorbati. Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(SOR).

Solanum chamaesarachidium Bitter

Sin.: *Chamaesaracha boliviensis* Dammer Hierba. Nativa. 2100-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Solanum chenopodioides Lam.

Sin.: *Solanum aguaraquiya* Piso ex Sendtn., *Solanum chenopodifolium* Dunal, *Solanum gracile* Dunal, hom. illeg., *Solanum gracile* Dunal var. *microphyllum* Dunal, *Solanum gracilius* Herter, *Solanum isabellii* Dunal, *Solanum nigrum* L. var. *aguaraquiya* (Sendtn.) Reiche, *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *micropyllum* Hassl., *Solanum ottonis* Hyl., *Solanum pterocaulon* Dunal var. *aguaraquiya* (Piso ex Sendtn.) Dunal, *Solanum sublobatum* Willd. ex Roem. & Schult., *Solanum subspatulatum* Sendtn., *Solanum vile* Bitter

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PHA). URY(COL, FLA, MON, ROC, SJO).

Solanum chilense (Dunal) Reiche

Sin.: *Lycopersicon atacamense* Phil., *Lycopersicon bipinnatifidum* Phil., *Lycopersicon chilense* Dunal, *Lycopersicon puberulum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Solanum cinnamomeum Sendtn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Solanum cochabambense Bitter

Hierba o arbusto. Nativa.

Países: ARG(SAL).

Solanum commersonii Dunal ex Poir.

Sin.: *Solanum acroleucum* Bitter, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. f. *mechoguense* (Bukasov) Correll, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabratum* Hook., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pubescens* Sendtn., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *violaceum* Herter, nom. nud., *Solanum compactum* Bukasov, nom. nud., *Solanum debile* Dunal, *Solanum henryi* Bukasov & Lechn., *Solanum henryi* Bukasov & Lechn. f. *laticalix* Lechn., *Solanum henryi* Bukasov & Lechn. f. *pubescens* Lechn., *Solanum mechonguense* Bukasov, *Solanum mercedense* Bukasov, *Solanum ohronzii* Carrière, *Solanum rionegrinum* Lechn., *Solanum sorianum* Bukasov, *Solanum tenue* Sendtn., *Solanum tenue* Sendtn. var. *raphanifolium* Dunal

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Solanum compressum L.B. Sm. & Downs

Arbolito o árbol. Endémica. 400-1400 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).

Solanum comptum C.V. Morton

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(APY, APA, CEN).

Solanum concarense Hunz.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SLU).

Solanum concinnum Sendtn.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum confusum C.V. Morton

Sin.: *Cyphomandra adelpha* (C.V. Morton)

A. Child ex Bohs, *Solanum adelphum* C.V. Morton

Arbusto o arbolito. Nativa. 900-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum consimile C.V. Morton

Sin.: *Solanum ledesmense* Cabrera

Arbusto. Nativa. 400-2700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Solanum coquimbense J.R. Benn.

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Solanum corumbense S. Moore

Sin.: *Cyphomandra verruculosa* Hassl., *Solanum tumescens* S. Knapp, *Solanum verruculosum* (Hassl.) Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 300-400 m.

Países: ARG(SAL). PRY(CON).

Solanum corymbiflorum (Sendtn.) Bohs
subsp. **corymbiflorum**

Sin.: *Cyphomandra corymbiflora* Sendtn., *Cyphomandra kleinii* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra macrophylla* L.B. Sm. & Downs

Arbusto o árbol. Endémica. 200-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum corymbiflorum (Sendtn.) Bohs
subsp. **mortoniana** (L.B. Sm. & Downs)
Bohs

Sin.: *Cyphomandra corymbiflora* Sendtn.

subsp. *mortoniana* (L.B. Sm. & Downs)

Bohs, *Cyphomandra mortoniana* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra patrum* L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 900-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum crispum Ruiz & Pav.

Sin.: *Solanum angustifolium* Lam. var.

brevifolium Dunal, *Solanum berterioanum* (J. Rémy) Phil., hom. illeg., *Solanum*

concaum Lindl., *Solanum congestiflorum*

Dunal, *Solanum congestiflorum* Dunal var.

longifolium Dunal, *Solanum*

congestiflorum Dunal var. *pannosum*

(Phil.) Reiche, *Solanum congestiflorum*

Dunal var. *syringaefolium* (Kunth &

Bouché) Reiche, *Solanum crispum* Ruiz &

Pav. var. *elaeagnifolium* Dunal, *Solanum*

crispum Ruiz & Pav. var. *ligustrinum*

(Lodd.) Dunal, *Solanum gayanum* (J.

Remy) F. Phil., *Solanum izquierdii* Phil.,

Solanum landbeckii Phil., *Solanum*

ligustrinum Lodd., *Solanum pannosum*

Phil., *Solanum pugae* Phil., *Solanum*

pyrrhocarpum Phil., *Solanum sadae* Phil.,

Solanum syringaefolium Kunth & Bouché,

Solanum tagua Kuntze, *Solanum tomatillo*

(J. Remy) F. Phil., *Witheringia berterioana*

J. Remy, *Witheringia crispa* (Ruiz & Pav.)

J. Remy, *Witheringia gayana* J. Remy,

Witheringia tomatillo J. Remy

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ,

VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA,

AIS, RME, JFE).

Solanum cylindricum Vell.

Sin.: *Cyphomandra cylindrica* (Vell.)

Sendtn., *Cyphomandra elliptica* (Vell.)

Sendtn., *Cyphomandra subhastata* (L.B.

Sm. & Downs) A. Child ex Bohs,

Pionandra cylindrica (Vell.) Miers,

Pionandra elliptica (Vell.) Miers, *Solanum*

catanduvae L.B. Sm. & Downs, *Solanum*

ellipticum Vell., hom. illeg., *Solanum*

iraniense L.B. Sm. & Downs, *Solanum*

johannae Bitter, *Solanum subhastatum*

L.B. Sm. & Downs, hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 300-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA).

Solanum decompositiflorum Sendtn.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Solanum delicatulum L.B. Sm. & Downs

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(CAN, GUA).

Solanum delitescens C.V. Morton

Sin.: *Solanum delitescens* C.V. Morton

var. *amphidoxum* C.V. Morton

Arbusto o subarbusto. Endémica. 400-

2600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum didymum Dunal

Sin.: *Solanum didymum* Dunal var.

subglabrum Dunal, *Solanum didymum*

Dunal var. *tomentosum* Dunal, *Solanum*

gemellum Mart. ex Sendtn., *Solanum*

gemellum Mart. ex Sendtn. var.

racemiforme Witasek

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA).

Solanum diploconos (Mart.) Bohs

Sin.: *Cyphomandra diploconos* (Mart.)

Sendtn., *Cyphomandra fragans* (Hook.)

Sendtn., *Witheringia diploconos* Mart.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA).

Solanum echegarayi Hieron.

Sin.: *Solanum andicola* C.V. Morton,

Solanum juncalense Reiche, *Solanum*

juncalense Reiche subsp. *aconcaguae* Bitter, *Solanum riojense* Bitter

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

***Solanum elaeagnifolium* Cav.**

Sin.: *Solanum dealbatum* Lindl., *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *angustifolium* Kuntze, *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *argyrocroton* Griseb., *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *grandiflorum* Griseb., *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *leprosum* (Ortega) Dunal, *Solanum leprosum* Ortega, *Solanum saponaceum* Hook., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 200-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APY, CEN, PHA). URY(COL, MON, PAY, SOR).

***Solanum endoadenium* Bitter**

Sin.: *Solanum endoadenium* Bitter var. *robustius* Bitter, *Solanum incurvipilum* Bitter

Arbusto. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SDE, TUC).

***Solanum etuberosum* Lindl.**

Sin.: *Solanum bustillosii* Phil., *Solanum etuberosum* Lindl. var. *antucense* Bitter, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *bustillosii* (Phil.) Witasek, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *chillanense* Bitter, *Solanum kunzei* Phil., *Solanum looseri* Juz., *Solanum subandinum* F. Meigen, *Solanum tuberosum* L. var. *polemoniifolium* Hook. f.

Hierba. Endémica. 400-2500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

***Solanum euacanthum* Phil.**

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

***Solanum excisirhombeum* Bitter**

Sin.: *Solanum myriadenium* Bitter

Hierba. Nativa. 3500

Países: ARG(JUJ).

***Solanum fernandezianum* Phil.**

Sin.: *Solanum brevistylum* Wittm., nom. nud., *Solanum tuberosum* L. var. *fernandezianum* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 100-1700 m.

Países: CHL(JFE).

***Solanum fiebrigii* Bitter**

Sin.: *Solanum codonanthum* Bitter

Hierba o subarbusto. Nativa. 600-3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

***Solanum flaccidum* Vell.**

Sin.: *Solanum convolvulus* Sendtn., *Solanum flaccidum* Vell. var. *heterophyllum* Witasek

Enredadera. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, SPE).

***Solanum fragile* Wedd.**

Sin.: *Solanum grandidentatum* Phil., *Solanum tarapacatum* Phil.

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

***Solanum furcatum* Dunal**

Sin.: *Solanum andinum* Reiche, *Solanum arequipense* Bitter, *Solanum bridgesii* Phil. var. *bridgesii*, *Solanum bridgesii* Phil. var. *ocellatum* (Phil.) Witasek ex Reiche, *Solanum caudiculatum* Phil., *Solanum coxii* Phil., *Solanum crenato-dentatum* Dunal, *Solanum furcatum* Dunal var.

acutedentatum Nees, *Solanum furcatum* Dunal var. *obtusidentatum* Nees, *Solanum furcatum* Dunal var. *subintegerrimum* Nees, *Solanum masafueranum* Bitter & Skottsb., *Solanum muricatum* Bertero ex Dunal, nom. nud., *Solanum ocellatum* Phil., *Solanum rancaguense* Dunal, *Solanum rancaguinum* Phil., *Solanum robinsonianum* Bitter, *Solanum spretum* C.V. Morton, *Solanum subandinum* Phil., hom. illeg., *Solanum tredecimgranum* Bitter

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

***Solanum fusiforme* L.B. Sm. & Downs**

Sin.: *Cyphomandra fusiformis* (L.B. Sm. & Downs) A. Child ex Bohs

Arbusto. Nativa. 500-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

***Solanum gaudichaudii* Dunal**

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

***Solanum gertii* S. Knapp**

Arbusto o arbolito. Endémica. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

***Solanum gilioides* Rusby**

Sin.: *Solanum nicandricalyx* Cabrera

Hierba. Nativa. 3000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

***Solanum glandulosipilosum* Bitter**

Sin.: *Solanum adenochlamys* Bitter, *Solanum fabrisii* Cabrera

Hierba. Endémica. 600-1300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

***Solanum glaucophyllum* Desf.**

Sin.: *Solanum glaucescens* Baculé ex Dunal, nom. nud., *Solanum glaucum* Bertol., *Solanum glaucum* Dunal, hom. illeg., *Solanum glaucumfruticosum* Larrañaga, *Solanum malacoxylon* Sendtn., *Solanum malacoxylon* Sendtn. f. *albomarginatum* (Chodat) Hassl., *Solanum malacoxylon* Sendtn. f. *vulgare* Hassl., *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *albomarginatum* Chodat, *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *angustissimum* Kuntze, *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *genuinum* Hassl., *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *latifolium* Kuntze, *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *subvirescens* Hassl., *Solanum melanoxyton* Sendtn.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, COL, MON, ROC, SJO).

***Solanum gnaphalocarpon* Vell.**

Arbusto. Nativa. 700-1300 m.

Países: BRA(PAR).

***Solanum granulosoleprosum* Dunal**

Sin.: *Solanum verbascifolium* L. f. *eupulverulentum* Hassl., *Solanum verbascifolium* L. f. *granuloso-leprosum* (Dunal) Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ROC, SJO).

***Solanum guaraniticum* A. St.-Hil.**

Sin.: *Solanum bonariense* L. f. *intermedium* Hassl., *Solanum bonariense* L. f. *leptophyllum* Chodat, *Solanum bonariense* L. f. *lobatum* (Hassl.) Chodat,

Solanum bonariense L. f. *subintegrum* (Hassl.) Chodat, nom. illeg., *Solanum bonariense* L. f. *typicum* Hassl., nom. inval., *Solanum bonariense* L. var. *paraguariense* (Chodat) Chodat, *Solanum bonariense* L. var. *villaricense* (Morong) Chodat, *Solanum fastigiatum* Willd. var. *acicularium* Dunal, *Solanum paraguariense* Chodat, *Solanum villaricense* Morong, *Solanum villaricense* Morong f. *lobatum* Hassl., *Solanum villaricense* Morong f. *subintegrum* Hassl., *Solanum villaricense* Morong var. *paraguariense* (Chodat) Hassl., *Solanum villaricense* Morong var. *typicum*

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

***Solanum hasslerianum* Chodat**

Sin.: *Solanum balansae* Hassl., *Solanum balansae* Hassl. var. *lyratifidum* Hassl., *Solanum balansae* Hassl. var. *typicum* Hassl., nom. inval., *Solanum brownii* Chodat, hom. illeg., *Solanum hasslerianum* Chodat f. *euinerme* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat f. *oblongifolium* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat f. *quercifolium* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *ambiguum* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *aureomicans* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *horridum* Chodat & Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *subinerme* Hassl., *Solanum rizzinianum* Mattos

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI, PHA, SPE).

***Solanum hastatilobum* Bitter**

Sin.: *Solanum glaberrimum* C.V. Morton, *Solanum hastatilobum* Bitter subsp. *brachyphyllum* Bitter

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

***Solanum heleonastes* S. Knapp**

Arbusto o arbolito. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). PRY(CAA, ÑEE).

***Solanum herbabona* Reiche**

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ATA).

***Solanum hieronymi* Kuntze**

Sin.: *Solanum pocote* Hieron. ex Millán

Hierba. Nativa. 400-1800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY).

***Solanum hirtellum* (Spreng.) Hassl.**

Sin.: *Atropa hirtella* Spreng., *Solanum gracillimum* Sendtn., *Solanum hirtellum* (Spreng.) Hassl. var. *diminutum* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).

***Solanum hoehnei* C.V. Morton**

Sin.: *Solanum alatum* Dunal, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Solanum homalospermum* Chiarini**

Hierba. Endémica. 700-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, SAL).

***Solanum huayavillense* Del Vitto & Petenatti**

Sin.: *Solanum pachyantherum* Bitter, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 1200-2200 m.

Países: ARG(JUU, TUC).

Solanum hunzikeri Chiarini & Cantero

Hierba o arbusto. Nativa. 1800-4100 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Solanum incarcerationum Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 400

Países: BRA(PAR). PRY(CAN, CEN).

Solanum indivisum Witasek ex J.R.

Benn.

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(VAL).

Solanum infundibuliforme Phil.

Sin.: *Solanum glanduliferum* Hawkes, *Solanum infundibuliforme* Phil. var. *albiflorum* Ochoa, *Solanum infundibuliforme* Phil. var.

angustepinnatum Bitter, *Solanum microphyllum* Hawkes, hom. illeg., *Solanum pinnatifidum* Cárdenas, hom. illeg., *Solanum platypterum* Hawkes, *Solanum xerophyllum* Hawkes

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(TAR).

Solanum inodorum Vell.

Sin.: *Solanum decorticans* Sendtn., *Solanum laurinum* Dunal

Enredadera. Nativa. 800-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum julocrotonoides Hassl.

Arbusto. Nativa. 300-900 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA, AMA, CAU).

Solanum juvenale Thell.

Sin.: *Solanum meloncillo* Parodi

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY). URY(PAY, RNO).

Solanum kleinii L.B. Sm. & Downs

Arbusto o subarbusto. Nativa. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum kurtzianum Bitter & Wittm.

Sin.: *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glanduloso-pubescens* Hook. f., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pilosusculum* Hook. f., *Solanum improvidum* Brücher, *Solanum juanense* Wittm. ex Hawkes & Hjert., nom. nud., *Solanum macolae* Bukasov, *Solanum mendozianum* Bukasov, nom. nud., *Solanum ruiz-lealii* Brücher, *Solanum velascanum* Bitter & Wittm.

Hierba. Endémica. 700-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU).

Solanum lacerdae Dusén

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum laxum Spreng.

Sin.: *Solanum boerhaviifolium* Sendtn., *Solanum boerhaviifolium* Sendtn. var. *calvum* C.V. Morton, *Solanum jasminoides* Paxton, *Solanum jasminoides* Paxton var. *boerhaviifolium*, *Solanum jasminoides* Paxton var. *glaberrimum* Kuntze, *Solanum jasminoides* Paxton var. *pilosum* Kuntze, *Solanum jasminoides* Paxton var. *pubinerve* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, MEN, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(CAS, COL, FLA, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Solanum luridifuscens Bitter

Hierba o arbusto. Nativa. 800-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Solanum lycocarpum A. St.-Hil.

Sin.: *Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. f. *apaense* Chodat & Hassl., *Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. var. *macrocarpum* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, CON, SPE).

Solanum lycopersicoides Dunal

Arbusto. Nativa. 1500-3600 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Solanum maglia Schltld.

Sin.: *Solanum collinum* Dunal, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Hook. f., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* J. Remy, hom. illeg., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Walp., *Solanum maglia* Molina, nom. nud., *Solanum maglia* Schltld. var. *brevifrons* Bitter, *Solanum maglia* Schltld. var. *collinum* (Dunal) Bitter, *Solanum maglia* Schltld. var. *witasekianum* Bitter, *Solanum sabinii* (A. DC.) Berthault, *Solanum tuberosum* L. var. *maglia* (Schltld.) A. DC.

Hierba. Endémica. 700-1800 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

Solanum malmeanum Bitter

Sin.: *Solanum chacoense* Bitter f. *pilosulum* (Hassl.) Hassl., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. f. *malmeanum* (Bitter) Correll, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. subsp. *malmeanum* (Bitter) Hawkes & Hjert., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. subsp. *pseudostipulatum* Hassl., nom. nud., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pubescens* Chodat, hom. illeg., *Solanum guaraniticum* Hassl. f. *pilosulum* Hassl., *Solanum millanii*

Bukasov & Lechn., *Solanum pseudostipulatum* (Hassl.) Bukasov

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, ITA, PHA). URY(COL, MAL, MON, SAO, SJO).

Solanum marginatum L. f.

Arbusto. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(SJU). CHL(VAL, MAU, BIO, JFE).

Solanum marmoratum Barboza & S. Knapp

Hierba. Endémica. 200-1400 m.

Países: ARG(CAT, LPA, LRI, SJU, SLU).

Solanum matadori L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 800-1200 m.

Países: BRA(SCA).

Solanum maturecalvans Bitter

Sin.: *Solanum kieslingii* Cabrera

Arbusto o arbolito. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Solanum mauritanium Scop.

Sin.: *Solanum auriculatum* Aiton, *Solanum tabacifolium* Vell., *Solanum verbascifolium* L. var. *auriculatum* (Aiton) Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, PAY, RIV, ROC, SAO, TAC).

Solanum medians Bitter

Sin.: *Solanum tacnaense* Ochoa

Hierba. Nativa. 3100-3600 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Solanum megalochiton Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum melissarum Bohs

Sin.: *Cyphomandra divaricata* (Mart.)

Sendtn., *Cyphomandra divaricata* (Mart.)

Sendtn. var. *herbacea* Sendtn.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum microdontum Bitter

Sin.: *Solanum bijugum* Bitter, *Solanum*

cevallos-tovarii Cárdenas, *Solanum*

gigantophyllum Bitter, *Solanum*

higueranum Cárdenas, *Solanum*

microdontum Bitter subsp. *gigantophyllum*

(Bitter) Hawkes & Hjert., *Solanum*

microdontum Bitter var. *gigantophyllum*

(Bitter) Ochoa, *Solanum microdontum*

Bitter var. *metriophyllum* (Bitter) Ochoa,

Solanum microdontum Bitter var.

montepuncoense Ochoa, *Solanum*

simplicifolium Bitter, *Solanum*

simplicifolium Bitter subsp. *gigantophyllum*

(Bitter) Bitter, *Solanum simplicifolium*

Bitter subsp. *microdontum* (Bitter)

Hawkes, nom. inval., *Solanum*

simplicifolium Bitter var. *gigantophyllum*

(Bitter) Bitter, *Solanum simplicifolium*

Bitter var. *metriophyllum* Bitter, *Solanum*

simplicifolium Bitter var. *mollifrons* Bitter,

Solanum simplicifolium Bitter var.

trimerophyllum Bitter, *Solanum*

simplicifolium Bitter var. *variabile* Brücher

& H. Ross, *Solanum tafiense* Lillo ex

Hawkes & Hjert., nom. nud.

Hierba. Nativa. 1400-3900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,

TUC).

Solanum montanum L.

Sin.: *Solanum phyllanthum* Cav.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Solanum mortonii Hunz.

Arbusto. Endémica. 700-900 m.

Países: ARG(CAT).

Solanum multispinum N.E. Br.

Sin.: *Solanum multispinum* N.E. Br. var. *grandiflorum* Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SFE). PRY(APY, PHA).

Solanum neei Chiarini & L.A. Mentz

Arbusto. Endémica.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum neorossii Hawkes & Hjert.

Hierba. Endémica. 2500-3800 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Solanum nigrum L.

Hierba. Introducida. 0-3600 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Solanum nitidibaccatum Bitter

Sin.: *Solanum patagonicum* C.V. Morton,

Solanum physalifolium Rusby var.

nitidibaccatum (Bitter) Edmonds, *Solanum*

styleanum Dunal

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(MAG).

Solanum nitidum Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Solanum odoriferum Vell.

Sin.: *Solanum pachyantherum* Witasek

Enredadera. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum olympicum Hassl.

Sin.: *Solanum sparcistrigosum* Bitter

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).

Solanum opacum A. Braun & Bouché

Sin.: *Solanum forsteri* Seem., *Solanum insulae-paschalis* Bitter

Subarbusto. Nativa.

Países: CHL(VAL, IPA).

Solanum pabstii L.B. Sm. & Downs

Arbolito o árbol. Endémica. 600-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum palinacanthum Dunal

Sin.: *Solanum claviceps* Griseb., *Solanum palinacanthum* Dunal f. *velutinum* Chodat, *Solanum palinacanthum* Dunal var. *acutibulum* Dunal, *Solanum vexans* S. Moore

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Solanum palitans C.V. Morton

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Solanum palustre Schltdl.

Sin.: *Solanum brevidens* Phil., *Solanum brevidens* Phil. var. *glabrescens* (Dunal) Hawkes, *Solanum bridgesii* A. DC., hom. illeg., *Solanum caldasii* Dunal var. *glabrescens* (Walp.) A. DC., *Solanum palustre* Schltdl. var. *glabrescens* Walp., *Solanum pearcei* Phil., hom. illeg., *Solanum tuberosum* L. var. *brevidens* (Phil.) Reiche, *Solanum tuberosum* L. var. *pearcei* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA).

Solanum paniculatum L.

Sin.: *Solanum chloroleucum* Dunal, *Solanum jubeba* Vell., *Solanum macronema* Sendtn., *Solanum manoelii* Moric., *Solanum paniculatum* L. f. *canescens* Hassl., *Solanum paniculatum* L. f. *flavescens* Hassl., *Solanum paniculatum* L. f. *repandum* Hassl., *Solanum paniculatum* L. subsp. *pseudoauriculatum* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Solanum paniculatum* L. var. *ellipticum* Chodat, *Solanum paniculatum* L. var. *integrifolium* Dunal, *Solanum pseudoauriculatum* Chodat & Hassl., hom. illeg.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, ITA, MIE, SPE).

Solanum paposanum Phil.

Sin.: *Solanum aberrans* Phil., *Solanum crassipes* Phil., *Solanum crassipes* Phil. var. *aberrans* (Phil.) Bitter, *Solanum phyllanthum* Cav. var. *aberrans* (Phil.) Witasek ex Reiche, *Solanum phyllanthum* Cav. var. *crassipes* (Phil.) Witasek ex Reiche

Hierba. Endémica. 200-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Solanum paranense Dusén

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum paucidens Bitter

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum pedersenii Cabrera

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI).

Solanum pelagicum Bohs

Sin.: *Cyphomandra cornigera* Dunal, *Cyphomandra maritima* L.B. Sm. & Downs, *Pionandra cornigera* (Dunal) Miers

Hierba o arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Solanum pennellii Correll var. **elachistus** Martic. & Quezada

Arbusto. Endémica. 1500

Países: CHL(AYP, TAR).

Solanum pentlandii Dunal var. **pentlandii**

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: CHL(TAR).

Solanum pentlandii Dunal subsp. **interandinum** (Bitter) Edmonds

Sin.: *Solanum interandinum* Bitter

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Solanum peruvianum L.

Sin.: *Lycopersicon peruvianum* (L.) Mill.

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Solanum physalidicalyx Bitter

Sin.: *Solanum physalidicalyx* Bitter var. *integrescens* Bitter, *Solanum physalidicalyx* Bitter var. *plurilobulatum* Bitter

Hierba. Nativa.

Países: ARG(COR, SAL).

Solanum physalifolium Rusby

Sin.: *Solanum nitidibaccatum* Bitter var. *robusticalyx* Bitter

Hierba. Nativa. 300-2000 m.

Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, SJU, TUC).

Solanum pilcomayense Morong

Sin.: *Solanum basilobum* Bitter, *Solanum crenato-dentatum* Dunal, *Solanum deltaicum* Cabrera, *Solanum maioranthum* L.B. Sm. & Downs, *Solanum maracayuense* Bitter, *Solanum nigrum* L. f. *brevipetiolare* (Chodat) Chodat, *Solanum nigrum* L. f. *floribundum* Hassl., *Solanum nigrum* L. f. *longepedunculatum* Hassl., *Solanum nigrum* L. f. *longepetiolatum* Hassl., *Solanum nigrum* L. subsp. *chacoense* Hassl., *Solanum nigrum* L. subsp. *pilcomayense* (Morong) Hassl., *Solanum nigrum* L. var. *brevipetiolare* (Chodat) Hassl., *Solanum nigrum* L. var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Solanum nigrum* L. var. *pilcomayense* (Morong) Chodat, *Solanum nigrum* L. var. *subhastatum* Hassl., *Solanum pilcomayense* Morong var. *brevipetiolare* Chodat, *Solanum pilcomayense* Morong var. *vicinum* C.V. Morton, *Solanum pulchrilobum* Bitter, *Solanum pulchrilobum* Bitter var. *longepetiolatum* (Hassl.) Parodi, *Solanum pulchrilobum* Bitter var. *paucilobum* Bitter, *Solanum rojasii* Chodat, *Solanum syringoideum* Bitter, *Solanum syringoideum* Bitter subsp. *pilcomayense* (Morong) Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, PHA).

Solanum piluliferum Dunal

Sin.: *Solanum densiflorum* Sendtn., hom. illeg.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum pimpinellifolium L.

Sin.: *Lycopersicon pimpinellifolium* (L.) Mill., *Lycopersicon pissisi* Phil., *Solanum pissisi* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(ATA).

Solanum pinetorum (L.B. Sm. & Downs) Bohs

Sin.: *Cyphomandra angustifolia* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra hispida* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra pinetorum* L.B. Sm. & Downs

Arbusto o arbolito. Nativa. 700-2100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum pinnatum Cav.

Sin.: *Solanum albiflorum* Phil., *Solanum cavanillesii* Dunal, hom. illeg., *Solanum cavanillesii* Dunal var. *subintegrifolium* Dunal, *Solanum feuillei* Dunal, *Solanum gaudichaudiana* (J. Remy) Phil., *Solanum gaudichaudii* Dunal var. *viride* Dunal, *Solanum maritimum* Meyen ex Nees, *Solanum novemlobum* Dunal, *Solanum novemlobum* Dunal var. *pauciflorum* Dunal, *Solanum pinnatum* Cav. var. *subintegrifolium* (Dunal) Reiche, nom. inval., *Solanum pinnatum* Cav. var. *tomentosum* Reiche, *Solanum runcinatum* Ruiz & Pav., *Solanum septemlobum* Phil., hom. illeg., *Witheringia gaudichaudiana* J. Remy, *Witheringia pinnata* (Cav.) J. Remy

Hierba o arbusto. Endémica. 0-2300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE).

Solanum platense Dieckman

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(MAL, RIV, ROC, TYT).

Solanum platycypellon S. Knapp

Arbusto. Nativa. 1600-1700 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Solanum polyphyllum Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(TAR).

Solanum premnifolium (Miers) Bohs

Sin.: *Cyphomandra premnifolia* (Miers) Dunal, *Pionandra premnifolia* Miers

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR).

Solanum profusum C.V. Morton

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Solanum pseudocapsicum L.

Sin.: *Solanum capsicastrum* Link ex Schauer, *Solanum capsicastrum* Link ex Schauer var. *caaguazuense* Chodat, *Solanum diflorum* Vell., *Solanum diflorum* Vell. var. *angustifolium* Kuntze, *Solanum ipecacuanha* Chodat var. *calvescens* Chodat, *Solanum pavimenti* L.B. Sm. & Downs, *Solanum pseudocapsicum* L. f. *calvescens* (Chodat) Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. f. *pilosulum* Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. f. *pilosum* Kuntze, *Solanum pseudocapsicum* L. subsp. *diflorum* (Vell.) Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *ambiguum* Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *hygrophilum* (Schltdl.) Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *normale* Kuntze, *Solanum pseudocapsicum* L. var. *parvifolium* Kuntze, *Solanum pseudocapsicum* L. var. *sendtnerianum* Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *typicum* Hassl., nom. inval.

Subarbusto. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, BIO, RME, JFE). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PHA, SPE).

URY(CAS, FLA, LAV, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR).

Solanum pseudodaphnopsis L.A. Mentz & Stehmann

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum pseudoquina A. St.-Hil.

Sin.: *Cyphomandra flagrans* (Ten.) Walp., *Pionandra flagrans* (Ten.) Miers, *Solanum flagrans* Ten., *Solanum inaequale* Vell., *Solanum ramosissimum* Dunal, *Solanum undatifolium* Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA, SPE).

Solanum pygmaeum Cav.

Sin.: *Solanum deterrimum* C.V. Morton, *Solanum pygmaeum* Cav. var. *hastatum* Bontea ex Aellen, *Solanum pygmaeum* Cav. var. *suspensum* C.V. Morton

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, NEU, SLU, SFE, SDE).

Solanum radicans L. f.

Sin.: *Solanum ruderales* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia ruderalis* J. Remy

Subarbusto. Nativa. 500-2800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, LBO).

Solanum ramulosum Sendtn.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, GUA, PAI).

Solanum reductum C.V. Morton

Subarbusto. Endémica. 200-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Solanum reflexum Schrank

Subarbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum reineckii Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Solanum reitzii L.B. Sm. & Downs

Arbolito o árbol. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum remyanum Phil.

Sin.: *Solanum flexuosum* (J. Rémy) Phil., hom. illeg., *Witheringia flexuosa* J. Remy

Hierba. Endémica. 200-2200 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Solanum riparium Pers.

Sin.: *Solanum carnosipes* Rusby, *Solanum dichotomum* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Solanum verbascifolium* L. var. *caducum* Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, SAL, TUC).

Solanum robustum H.L. Wendl.

Sin.: *Solanum alatum* Seem. & J.A. Schmidt, hom. illeg., *Solanum conceptionis* Chodat & Hassl., *Solanum conceptionis* Chodat & Hassl. var. *robustius* Chodat, *Solanum conceptionis* Chodat & Hassl. var. *typicum* Chodat, nom. inval., *Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *decurrens* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *rupestre* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *typicum* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *conceptionis* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *decurrens* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *laxepilosum* Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Solanum rostratum Dunal

Hierba. Introducida.

Países: ARG(SLU).

Solanum rufescens Sendtn.

Sin.: *Solanum xiphocephalum* L.B. Sm. & Downs

Arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum salamancae Hunz. & Barboza

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Solanum salicifolium Phil.

Sin.: *Solanum crebrum* C.V. Morton ex L.B. Sm., *Solanum incisum* Griseb. var. *incisum*, *Solanum incisum* Griseb. var. *paucilobatum* C.V. Morton, *Solanum incisum* Griseb. var. *septatopilosum* C.V. Morton, *Solanum incisum* Griseb. var. *tenuisectum* (Kuntze) Bitter ex C.V. Morton, *Solanum ratum* C.V. Morton, *Solanum restrictum* C.V. Morton, *Solanum sericeum* Ruiz & Pav. var. *strigillosum* Griseb., *Solanum tenuisectum* Kuntze, *Solanum vervoortii* C.V. Morton

Arbusto. Endémica. 900-4100 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, COA, PHA). URY(LAV).

Solanum sanctae-catharinae Dunal

Sin.: *Solanum citrifolium* Willd. ex Roem. & Schult. f. *intermedium* Hassl., *Solanum citrifolium* Willd. ex Roem. & Schult. var. *ochandrum* (Dunal) Hassl., *Solanum citrifolium* Willd. ex Roem. & Schult. var. *typicum* Hassl., nom. inval., *Solanum ochrandrum* Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAN, COA, PAI). URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

Solanum sanfurgoi Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(MAU).

Solanum sarrachoides Sendtn.

Sin.: *Solanum atriplicifolium* Gillies ex Nees var. *minus* Gillies ex Nees, *Solanum sarachidium* Bitter, *Solanum sarrachoides* Sendtn. var. *sarachidium* (Bitter) C.V. Morton, *Solanum sidaefolium* Speg.

Hierba. Nativa. 200-2300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, ERI, FOR, MEN, NEU, SAL, SJU, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU). PRY(APY, PHA). URY(FLA, MAL, MON, SJO).

Solanum schlechtendalianum Walp.

Sin.: *Solanum geminifolium* Schldtl. & Cham., hom. illeg.

Arbusto. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL).

Solanum schwackeanum L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Solanum schwackei* Glaz.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum sciadostylis (Sendtn.) Bohs

Sin.: *Cyphomandra reitzii* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn., *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn. var. *hirsuta* Witasek, *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn. var. *ovato-lanceolata* Dunal, *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn. var. *trichocarpa* Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 200-1600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, GUA).

Solanum scuticum M. Nee

Sin.: *Solanum tabacifolium* Dunal, hom. illeg.

Arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Solanum seaforthianum Andrews

Liana. Introducida.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CEN, COA).

Solanum sellowianum Sendtn.

Sin.: *Solanum heliotropifolium* Dunal var. *sellowianum* (Sendtn.) Dunal

Arbusto. Nativa. 800

Países: BRA(PAR).

Solanum setosissimum Bitter ex L.A. Mentz & M. Nee

Arbusto. Endémica. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum sinuatiexcisum Bitter

Sin.: *Solanum deltoideum* Rusby, *Solanum hyosiamoides* Bitter

Hierba o arbusto. Nativa. 1500-3100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum sinuatirecurvum Bitter

Sin.: *Solanum metarsium* C.V. Morton, *Solanum pulchellum* Phil., hom. illeg., *Solanum sinuatirecurvum* Bitter subsp. *crispatellum* Bitter

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL). CHL(ANT).

Solanum sisymbriifolium Lam.

Sin.: *Solanum balbisii* Dunal, *Solanum balbisii* Dunal var. *bipinnata* Hook., *Solanum balbisii* Dunal var. *oligospermum* Sendtn., *Solanum balbisii* Dunal var. *purpureum* Hook., *Solanum bipinnatifidum* Larrañaga, *Solanum decurrens* Balb., *Solanum sisymbriifolium* Lam. f. *albiflorum* Kuntze, *Solanum sisymbriifolium* Lam. f. *lilacinum* Kuntze, *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *acutibum* purpureiflorum Dunal, *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *brevilobum* Dunal, *Solanum*

sisymbriifolium Lam. var. *heracleifolium* Sendtn., nom. inval., *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *macrocarpum* Kuntze, *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *oligospermum* (Sendtn.) Dunal, *Solanum subviscidum* Schrank

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, BIO). PRY(APY, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(COL, MON).

Solanum sitiens I.M. Johnst.

Sin.: *Solanum rickii* Correll

Arbusto. Endémica. 2500-3400 m.

Países: CHL(ANT).

Solanum stipulatum Vell.

Sin.: *Solanum rivulare* Mart. ex Sendtn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum stuckertii Bitter

Sin.: *Cyphomandra stuckertii* (Bitter) D'Arcy, *Solanum stuckertii* Bitter var. *angustifrons* Bitter, *Solanum stuckertii* Bitter var. *atrachostylum* Bitter, *Solanum stuckertii* Bitter var. *obrutum* C.V. Morton, *Solanum stuckertii* Bitter var. *pilosistylum* C.V. Morton, *Solanum stuckertii* Bitter var. *trichostylum* Bitter

Arbusto o arbolito. Nativa. 200-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

Solanum subsylvestre L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 500-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum swartzianum Roem. & Schult.

Sin.: *Solanum hatschbachii* Carvalho, *Solanum swartzianum* Roem. & Schult.

subsp. *chrysophyllum* (Dunal) Carvalho,
Solanum swartzianum Roem. & Schult.
var. *chrysophyllum* Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Solanum symmetricum* Rusby**

Sin.: *Solanum nudum* Dunal var.
pseudoindigoferum Hassl., *Solanum*
versabile C.V. Morton

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-1000 m.

Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA,
ITA, PAI).

***Solanum tenuispinum* Rusby**

Sin.: *Solanum chaetophorum* C.V. Morton
Subarbusto. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

***Solanum tiinae* Barboza & S. Knapp**

Hierba o subarbusto. Endémica. 2400-
4000 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

***Solanum toldense* Matesevach &
Barboza**

Arbusto. Nativa. 1700-1900 m.

Países: ARG(SAL).

***Solanum torvum* Sw.**

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

***Solanum trachytrichium* Bitter**

Arbusto o subarbusto. Endémica. 100-
600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAN, GUA, ITA).

***Solanum trichoneuron* Lillo**

Arbusto o arbolito. Nativa. 700-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

***Solanum triflorum* Nutt.**

Sin.: *Solanum calophyllum* Phil., *Solanum*
gaudichaudii Dunal var. *pyrethrifolium*
(Griseb.) Kuntze, *Solanum mendocinum*
Phil., *Solanum pyrethrifolium* Griseb.,
Solanum triflorum Nutt. var. *calophyllum*
(Phil.) Bitter, *Solanum triflorum* Nutt. var.
pyrethrifolium (Griseb.) Probst

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,
LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU,
TUC).

***Solanum trinominum* J.R. Benn.**

Sin.: *Solanum gaudichaudii* Dunal var.
canescens Dunal, *Solanum*
heterantherum Witasek ex Reiche, hom.
illeg., *Solanum tomentosum* (J. Remy) F.
Phil., *Witheringia tomentosa* J. Remy

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

***Solanum tripartitum* Dunal**

Sin.: *Solanum quadripartitum* Dunal

Hierba. Nativa. 2000-3900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

***Solanum tuberosum* L.**

Sin.: *Solanum andigenum* Juz. &
Bukasov, *Solanum aquinas* Bukasov,
nom. nud., *Solanum argentinicum* Lechn.,
Solanum chilense (A. DC.) Berthault,
Solanum chilotanum Hawkes, nom. nud.,
Solanum cultum (A. DC.) Berthault,
Solanum diemii Brücher, *Solanum fonckii*
Phil. ex Reiche, nom. nud., *Solanum*
leptostigma Juz. ex Bukasov, *Solanum*
maglia Schltdl. subsp. *meridionale* Bitter,
Solanum maglia Schltdl. var. *chubutense*
Bitter, *Solanum maglia* Schltdl. var.
guaytecarum Bitter, *Solanum molinae*
Juz., *Solanum oceanicum* Brücher,
Solanum ochoanum Lechn., *Solanum*
sanmartiniense Brücher, *Solanum*
tascalense Brücher, *Solanum tuberosum*
L. subsp. *andigenum* (Juz. & Bukasov)

Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var.
chiloense A.DC., *Solanum tuberosum* L.
var. *chubutense* (Bitter) Hawkes, *Solanum*
tuberosum L. var. *cultum* A. DC., *Solanum*
tuberosum L. var. *guaytecarum* (Bitter)
Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var.
vulgare Hook. f., *Solanum tuberosum* L.
var. *vulgare* Macloskie, hom. illeg.,
Solanum zykinii Lechn.

Hierba. Nativa. 500-3000 m.

Países: CHL(ANT, VAL, LBO, BIO,
ARA, LLA, AIS, RME).

Notas: Especie excluida de la Flora
Argentina (Clausen et al., 2013)

***Solanum tucumanense* Griseb.**

Sin.: *Solanum diflorum* Vell. var.
pulverulentum Chodat, *Solanum*
ipecacuanha Chodat, *Solanum*
ipecacuanha Chodat var. *obovata* Chodat

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC).

***Solanum turneroides* Chodat**

Sin.: *Solanum flavistrigosum* Bitter,
Solanum geniculatistrigosum Bitter,
Solanum gonatotrichum Bitter

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY,
AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).

***Solanum tweedianum* Hook.**

Sin.: *Solanum atriplicifolium* Gillies ex
Nees, *Solanum atriplicoides* Herter,
Solanum haarupii Bitter, *Solanum*
meizonanthum Bitter, *Solanum sidifolium*
Speg.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI,
JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU,
SLU, SDE, TUC). CHL(VAL). PRY(APY,
BOQ). URY(MON).

Solanum uncinellum Lindl.

Sin.: *Solanum ipomoea* Sendtn., *Solanum ipomoea* Sendtn. var. *ipomoeoides* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Solanum ipomoea* Sendtn. var. *macrostachyum* Hassl., *Solanum ipomoeoides* Chodat & Hassl., *Solanum pensile* Sendtn., *Witheringia pendula* Roem. & Schult.

Enredadera. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, APY, COA, PAI, PHA, SPE).

Solanum vaillantii Dunal

Sin.: *Solanum acerosum* Sendtn., *Solanum tejucense* Dunal

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum valdiviense Dunal

Sin.: *Solanum cyrtopodium* Dunal, *Solanum evonymoides* J. Remy, hom. illeg., *Solanum krauseanum* Phil., *Solanum poeppigianum* Dunal, nom. nud., *Solanum puberulum* Phil., *Solanum sembarto* Kuntze, *Solanum sembarto* Kuntze var. *pubescens* Kuntze, *Solanum sembarto* Kuntze var. *varians* Kuntze, *Solanum spiraeoides* Dunal, *Solanum subenervium* Dunal

Arbusto. Endémica. 100-2000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Solanum variabile Mart.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Solanum velleum Thunb.

Arbusto. Nativa. 200-800 m.

Países: BRA(SCA).

Solanum venturii Hawkes & Hjert.

Sin.: *Solanum simplicifolium* Bitter subsp. *venturii* Hawkes, nom. nud.

Hierba. Endémica. 1900-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Solanum vernei Bitter & Wittm.

Sin.: *Solanum ballsii* Hawkes, *Solanum vernei* Bitter & Wittm. subsp. *ballsii* (Hawkes) Hawkes & Hjert.

Hierba. Endémica. 2200-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum viarum Dunal

Sin.: *Solanum chloranthum* DC., hom. illeg., *Solanum viridiflorum* Schltdl.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(MON, RIV, TAC, TYT).

Solanum viscosissimum Sendtn.

Enredadera. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum wacketii Witasek

Sin.: *Solanum brusquense* L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum weddellii Phil.

Hierba o subarbusto. Endémica. 4000-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(TAR, ANT).

Solanum x aemulans Bitter & Wittm.

Sin.: *Solanum acaule* Bitter subsp. *aemulans* (Bitter & Wittm.) Hawkes & Hjert., *Solanum acaule* Bitter var. *aemulans* (Bitter & Wittm.) Correll, *Solanum x indunii* Okada & Clausen

Hierba. Endémica. 2600-4100 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Solanum x brucheri Correll

Sin.: *Solanum x viirsooi* K.A. Okada & A.M. Clausen

Hierba. Endémica. 3100-4000 m.

Países: ARG(JUJ).

Solanum x rechei Hawkes & Hjert.

Hierba. Endémica. 1200-4000 m.

Países: ARG(LRI).

Solanum zuloagae Cabrera

Arbusto o subarbusto. Nativa. 1100-1700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Vassobia Rusby

Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz.

Sin.: *Acnistus bormmulleri* Dammer, *Acnistus breviflorus* Sendtn., *Acnistus breviflorus* Sendtn. f. *glabratus* Hassl., *Acnistus breviflorus* Sendtn. f. *indutus* Hassl., *Acnistus breviflorus* Sendtn. var. *glabrata* Sendtn., *Acnistus breviflorus* Sendtn. var. *spinescens* Sendtn., *Acnistus galanderi* Dammer, *Acnistus glabratus* (Sendtn.) Dammer, *Acnistus hauthalii* Dammer, *Acnistus lycioides* Dammer, *Acnistus mollis* Dammer, *Acnistus parviflorus* Griseb., *Acnistus parviflorus* Griseb. var. *arborens* (Griseb.) Griseb., *Acnistus schunckii* Dammer, *Acnistus sellowii* Dammer, *Acnistus spinescens* (Sendtn.) Dammer, *Acnistus spinosus* Dammer, *Acnistus ulei* Dammer, *Bassovia pyrastrer* Dunal, *Bassovia pyrastrer* Dunal var. *glabriusculum* Dunal, *Bassovia spina-alba* (Dunal) Griseb., *Capsicum breviflorum* (Sendtn.) Hunz., *Capsicum glandulosum* Dunal, *Capsicum pyrastrer* (Dunal) Kuntze, *Dierbachia breviflora* (Sendtn.) Kuntze, *Dierbachia parviflora*

(Griseb.) Kuntze, *Dunalia breviflora* (Sendtn.) Sleumer, *Fregirardia spina-alba* Dunal, *lochroma arboreum* Griseb.

Árbol. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(PAY, SAO).

Vestia Willd.

Vestia foetida Hoffmanns.

Sin.: *Vestia lycioides* Willd.

Arbusto. Endémica. 200

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LSR).

SPHENOCLEACEAE

Sphenoclea Gaertn., nom. cons.

Sphenoclea zeylanica Gaertn.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(ERI, FOR, SAL). PRY(APY, CEN).

STYLIDIACEAE

Donatia J.R. Forst. & G. Forst., nom. cons.

Donatia fascicularis J.R. Forst. & G. Forst.

Sin.: *Donatia magellanica* Lam., *Polycarpon magellanicum* L. f.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).

Phyllachne J.R. Forst. & G. Forst.

Phyllachne uliginosa J.R. Forst. & G. Forst.

Sin.: *Forstera muscoides* Willd., *Forstera uliginosa* (J.R. Forst. & G. Forst.) Hombr. & Jacquinot

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

STYRACACEAE

Styrax L.

Styrax acuminatus Pohl

Sin.: *Strigilia acuminata* (Pohl) Miers, *Styrax acuminatus* Pohl var. *alutaceus* (Seub.) Perkins, *Styrax alutaceus* Seub.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN). URY(MON).

Styrax camporum Pohl

Sin.: *Strigilia camporum* (Pohl) Miers, *Strigilia chrysastera* (Pohl) Miers, *Strigilia gardneriana* (A. DC.) Miers, *Strigilia obliquinervia* (A. DC.) Miers, *Strigilia subcordata* (Moric.) Miers, *Styrax camporum* Pohl f. *aureovelutinus* Perkins, *Styrax camporum* Pohl f. *gardnerianus* (A. DC.) Perkins, *Styrax camporum* Pohl f. *lanceolatus* Perkins, *Styrax candollei* (A. DC.) Seub., *Styrax chrysasterus* Pohl, *Styrax chrysasterus* Pohl var. *sellowianus* A. DC., *Styrax floridus* Pohl var. *communis* A. DC., *Styrax gardnerianus* A. DC. var. *ovatifolius* Chodat & Hassl., *Styrax*

gardnerianus A. DC. var. *pallidior* Chodat & Hassl., *Styrax obliquinervius* A. DC., *Styrax subcordatus* Moric., *Styrax varians* Seub.

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, PAI, SPE).

Styrax ferrugineus Nees & Mart.

Sin.: *Strigilia ferruginea* (Nees & Mart.) Miers, *Strigilia florida* (Pohl) Miers, *Strigilia nervosa* (A. DC.) Miers, *Strigilia parvifolia* (Pohl) Miers, *Strigilia reticulata* (Mart.) Miers, *Styrax burchellii* Perkins var. *longifolius* Perkins, *Styrax ferrugineus* Nees & Mart. var. *grandifolius* Perkins, *Styrax floridus* Pohl, *Styrax nervosus* A. DC., *Styrax nervosus* A. DC. var. *elongatus* Seub., *Styrax parvifolius* Pohl, *Styrax reticulatus* Mart.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

Styrax glabratus Schott

Sin.: *Epigenia integerrima* Vell., *Strigilia glabrata* (Spreng.) Miers, *Strigilia laevis* Miers, *Strigilia leiophylla* (Miers) Miers, *Strigilia psilophylla* (A. DC.) Miers, *Styrax erymophyllus* Pohl, *Styrax lauraceus* Perkins, *Styrax leiophyllus* Miers, *Styrax psilophyllus* A. DC., *Styrax squamulosus* M.F. Silva

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Styrax latifolius Pohl

Sin.: *Strigilia alba* (Mart. ex Spreng.) Miers, *Strigilia latifolia* (Pohl) Miers, *Strigilia longiflora* (A. DC.) Miers, *Styrax albus* Mart. ex Spreng., *Styrax klotzschii* Seub., *Styrax latifolius* Pohl f. *klotzschii* (Seub.) Perkins, *Styrax latifolius* Pohl f. *longiflorus* (A. DC.) Perkins, *Styrax longiflorus* A. DC.

Árbol. Nativa. 100-700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Styrax leprosus Hook. & Arn.

Sin.: *Strigilia leprosa* (Hook. & Arn.) Miers, *Styrax leprosus* Hook. & Arn. f. *latifolia* Chodat & Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA). URY(CLA, MAL, RIV, TYT).

Styrax martii Seub.

Sin.: *Styrax martii* Seub. var. *microphyllus* Perkins

Arbusto o árbol. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Styrax pohlii A. DC.

Sin.: *Strigilia pohlii* (A. DC.) Miers, *Strigilia punctata* (A. DC.) Miers, *Styrax ambiguus* Seub. ex Chodat & Hassl., *Styrax bogotensis* Perkins, *Styrax discolor* M.F. Silva, *Styrax pachyphyllus* Pilg., *Styrax pohlii* A. DC. f. *calvescens* Perkins, *Styrax punctatus* A. DC., *Styrax tafelbergensis* Maguire

Árbol. Nativa. 200-800 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Styrax subargenteus Sleumer

Árbol. Nativa. 900-1800 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

SYMPLOCACEAE

Symplocos Jacq.

Symplocos bidana Aranha

Arbusto o árbol. Endémica. 900-1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Symplocos celastrinea Mart. ex Miq.

Sin.: *Barberina celastrinea* (Mart. ex Miq.)

Miers, *Barberina ramentacea* (Mart. ex Miq.) Miers, *Eugeniodes celastrineum* (Mart.) Kuntze, *Eugeniodes ramentacea* (Mart.) Kuntze, *Symplocos dusenii* Brand, *Symplocos ramentacea* Mart. ex Miq., *Symplocos variabilis* Mart. ex Miq. f. *parvifolia* Miq., *Symplocos verrucosa* Brand

Árbol. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, PAI, SPE).

Symplocos corymboclados Brand

Sin.: *Symplocos corymboclados* Brand var. *micromorpha* Sleumer, *Symplocos hatschbachii* A. Bidá, nom. nud.

Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 800-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Symplocos estrellensis Casar.

Sin.: *Barberina estrellensis* (Casar.) Miers, *Symplocos variabilis* Mart. ex Miq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Symplocos glandulosomarginata

Hoehne

Arbolito o árbol. Nativa. 400-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symplocos incrassata Aranha

Arbusto o arbolito. Endémica. 1300-1800 m.

Países: BRA(PAR).

Symplocos kleinii Aranha

Subarbusto. Endémica. 600-1400 m.

Países: BRA(PAR).

Symplocos laxiflora Benth.

Sin.: *Mongezia glabra* Vell.

Árbol. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Symplocos nitens (Pohl) Benth.

Sin.: *Stemmatosiphum nitens* Pohl, *Symplocos clausenii* A. DC., *Symplocos nitens* (Pohl) Benth. var. *clausenii* (A. DC.) Brand

Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 300-1700 m.

Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

Symplocos nitidiflora Brand

Arbolito o árbol. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Symplocos oblongifolia Casar.

Sin.: *Barberina lanceolata* Mart., *Symplocos cipoensis* A. Bidá, nom. nud., *Symplocos lanceolata* (Mart.) A. DC., *Symplocos lanceolata* (Mart.) A. DC. f. *cricophloea* Mart. ex Miq., *Symplocos lanceolata* (Mart.) A. DC. f. *integerrima* Mart. ex Miq.

Arbusto o arbolito. Nativa. 800-1500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, PHA, SPE).

Symplocos pentandra (Mattos) Occhini ex Aranha

Sin.: *Symplocos itatiaiae* Wawra var. *pentandra* Mattos, *Symplocos pentandra* (Mattos) Occhioni, comb. inval.

Arbusto o arbolito. Nativa. 800-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symplocos pubescens Klotzsch ex Benth.

Sin.: *Mongezia pilosa* Vell., *Symplocos martii* A. DC., *Symplocos pubescens* Klotzsch ex Benth. var. *humilis* Brand, *Symplocos pubescens* Klotzsch ex Benth. var. *pauciflora* Brand

Arbolito. Nativa. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Symplocos pustulosa Aranha

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Symplocos revoluta Casar.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Symplocos tenuifolia Brand

Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symplocos tetrandra Mart.Sin.: *Barberina tetrandra* (Mart.) Miers, *Eugeniodes tetrandrum* (Mart.) Kuntze, *Symplocos frondosa* Brand

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Symplocos trachycarpus BrandSin.: *Symplocos hirtella* Brand

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(AMA).

Symplocos uniflora (Pohl) Benth.Sin.: *Eugeniodes parviflora* (Benth.) Kuntze, *Eugeniodes uniflora* (Pohl) Kuntze, *Stemmatosiphum uniflorum* Pohl, *Symplocos catarinensis* Mattos, *Symplocos klotzschii* Brand, *Symplocos padus* Brand, *Symplocos parviflora* Benth., *Symplocos uniflora* (Pohl) Benth. var. *paleacea* Miq., *Symplocos uruguensis* Brand

Arbolito o árbol. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, SPE). URY(CLA, RIV, TAC).

TALINACEAE**Talinum** Adans., nom. cons.**Talinum fruticosum** (L.) Juss.Sin.: *Portulaca fruticosa* L., *Portulaca racemosa* L., *Portulaca triangularis* Jacq., *Talinum racemosum* (L.) Rohrb., *Talinum triangulare* (Jacq.) Willd.

Subarbusto. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, COA, PAI, PHA).

Talinum nocturnum Bacigalupo

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.Sin.: *Portulaca paniculata* Jacq., *Portulaca patens* L., *Talinum patens* (L.) Willd.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(RNO).

Talinum polygaloides Gillies ex Arn.Sin.: *Calandrinia chromantha* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 200-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, LRI, MEN, SAL, SFE, SJU, SLU). PRY(APY, COA, PHA).

Talinum porphyreum M. Mend. & J.R.I. Wood

Hierba. Nativa. 100-200 m.

Países: PRY(APY, AMA).

TAMARICACEAE**Tamarix** L.**Tamarix chinensis** Lour.Sin.: *Tamarix gallica* L. var. *chinensis* (Lour.) Ehrenb., *Tamarix juniperina* Bunge

Arbusto o árbol. Introducida.

Países: ARG(BAI, COR, NEU, RNE).

Tamarix gallica L.

Arbusto o árbol. Introducida.

Países: ARG(BAI, COR, JUJ, MEN).

Tamarix parviflora DC.

Arbusto o árbol. Introducida.

Países: ARG(BAI, COR).

Tamarix ramosissima Ledeb.Sin.: *Tamarix odessana* Bunge, *Tamarix pallasii* Desv. var. *ramosissima* (Ledeb.) Bunge, *Tamarix pentandra* Pall.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SCR, SDE, TUC).

TECOPHILAEACEAE**Conanthera** Ruiz & Pav.**Conanthera bifolia** Ruiz & Pav.Sin.: *Conanthera passeriflora* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *coelestis* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *immaculata* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *lilacina* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *melananthera* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *nocticolor* Ravenna, *Sisyrinchium illmu* Molina

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Conanthera campanulata Lindl.

Sin.: *Conanthera alba* Grau, *Conanthera sabulosa* Ravenna, *Conanthera simsii* Sweet, *Conanthera tenella* (Kunth) Ravenna, *Conanthera variegata* Fenzl ex Reichardt, *Cummingia campanulata* D. Don, *Cummingia tenella* D. Don
Hierba. Endémica. 0-3200 m.
Países: CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Conanthera parvula (Phil.) M. Muñoz

Sin.: *Conanthera johowii* Espinosa, *Conanthera minima* Grau, *Cummingia parvula* Phil.
Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

Conanthera trimaculata (D. Don) F. Meigen

Sin.: *Cummingia trimaculata* D. Don
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

Conanthera urceolata Ravenna

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA).

Tecophilaea Bertero ex Colla

Tecophilaea cyanocrocus Leyb.

Sin.: *Zephyra cyanocrocus* (Leyb.) Ravenna
Hierba. Endémica. 1800-2200 m.
Países: CHL(RME).

Tecophilaea violiflora Bertero ex Colla f. **polyantha** Skotts.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Tecophilaea violiflora Bertero ex Colla f. **violiflora**

Sin.: *Zephyra violiflora* (Bertero ex Colla) Ravenna

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Zephyra D. Don

Zephyra compacta C. Ehrh.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Zephyra elegans D. Don

Sin.: *Dicolus caerulescens* Phil., *Zephyra amoena* D. Don
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

TETRACHONDRA

Tetrachondra Petrie ex Oliv.

Tetrachondra patagonica Skotts.

Sin.: *Tetrachondra patagonica* Skotts. subsp. *fuegiana* D.M. Moore
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(MAG).

THEACEAE

Camellia L.

Camellia sinensis (L.) Kuntze

Sin.: *Thea sinensis* L.
Arbusto o árbol. Introducida. 100-500 m.
Países: ARG(COS, MIS).

Gordonia Ellis

Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng

Sin.: *Laplacea fruticosa* (Schrad.) Kobuski, *Laplacea semiserrata* Cambess., *Wikstroemia fruticosa* Schrad.
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

THYMELAEACEAE

Daphnopsis Mart.

Daphnopsis brasiliensis Mart.

Árbol. Nativa. 500-700 m.
Países: BRA(PAR).

Daphnopsis coriacea Taub.

Arbusto. Nativa. 700
Países: BRA(PAR, SCA).

Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling

Sin.: *Daphnopsis beta* Taub., *Daphnopsis longifolia* Taub., *Funifera fasciculata* Meisn.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Daphnopsis pseudosalix Domke

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Daphnopsis racemosa Griseb.

Sin.: *Daphnopsis leguizamonis* Griseb. ex Gilg, *Daphnopsis leguizamonis* Lorentz, nom. nud., *Daphnopsis longiracemosa* Gilg ex Domke, *Daphnopsis racemosa* Griseb. var. *leptostachys* Chodat, *Daphnopsis umbelluligera* Domke
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(CLA,

COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, TAC, TYT).

Daphnopsis sellowiana Taub.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Drapetes Lam.

Drapetes muscosus Lam.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Ovidia Meisn.

Ovidia andina (Poepp. & Endl.) Meisn.

Sin.: *Daphne andina* Poepp. & Endl., *Daphne tenera* Phil., *Ovidia tenera* (Phil.)

Macloskie

Arbusto. Endémica. 700-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Ovidia pillo-pillo (Gay) Meisn.

Sin.: *Daphne pillo-pillo* Gay, *Ovidia parviflora* Meisn.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

TRIGONIACEAE

Trigonia Aubl.

Trigonia boliviana Warm.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(SPE).

Trigonia nivea Cambess. var. **nivea**

Sin.: *Trigonia nivea* Cambess. f. *paniculata* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CON, SPE).

Trigonia nivea Cambess. var. **pubescens** (Cambess.) Lleras

Sin.: *Trigonia pubescens* Cambess.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Trigonia rotundifolia Lleras

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(SCA).

TRIURIDACEAE

Peltophyllum Gardner

Peltophyllum luteum Gardner

Sin.: *Hexuris gardneri* Miers, nom. illeg., *Triuris lutea* (Gardner) Benth. & Hook., *Triuris macella* Bertoni, *Triuris mycoides* Fiebrig

Saprófito. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CAA).

Sciaphila Blume

Sciaphila schwackeana Johow

Saprófito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

Triuris Miers

Triuris hyalina Miers

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum L.

Tropaeolum argentinum Buchenau

Sin.: *Trophaeum argentinum* (Buchenau) Kuntze

Hierba o enredadera. Endémica. 1000-2200 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Tropaeolum atropurpureum Sparre

Hierba. Endémica. 2300-2700 m.

Países: ARG(SAL).

Tropaeolum austropurpureum (J.M. Watson & A.R. Flores) J.M. Watson & A.R. Flores

Sin.: *Tropaeolum hookerianum* Barnéoud subsp. *austropurpureum* J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ).

Tropaeolum azureum Bertero ex Colla

Sin.: *Rixea azurea* (Colla) Morren, *Tropaeolum aureum* C.A. Muell., *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *angustilobum* Buchenau, *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *grandiflorum* Van Houtte, *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *oblongilobum* Buchenau, *Tropaeolum lepidum* Phil. ex Buchenau, *Tropaeolum lepidum* Phil. ex Buchenau var. *luteum* Reiche, *Tropaeolum luteum* (Reiche) Buchenau, *Tropaeolum reicheanum* Buchenau ex Reiche, *Tropaeolum violaefflorum* A. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

- Tropaeolum beuthii*** Klotzsch
Sin.: *Tropaeolum benthamii* Van Houtte, *Tropaeolum leptoceras* I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 300-1000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Tropaeolum brachyceras*** Hook. & Arn.
Sin.: *Chymocarpus brachyceras* (Hook. & Arn.) Heynh., *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *genuinum* Buchenau, *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *grandiflorum* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *sulphureum* Walp., *Tropaeolum chilense* Bertero ex Colla, *Tropaeolum minimum* Miers, *Tropaeolum tenellum* G. Don
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Tropaeolum capillare*** Buchenau
Hierba o enredadera. Nativa. 700-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Tropaeolum ciliatum*** Ruiz & Pav. subsp. ***ciliatum***
Hierba o enredadera. Endémica. 400-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).
- Tropaeolum ciliatum*** Ruiz & Pav. subsp. ***septentrionale*** Sparre
Sin.: *Tropaeolum venosum* Phil. ex Buchenau
Hierba o enredadera. Endémica. 400-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).
- Tropaeolum hookerianum*** Barnéoud subsp. ***hookerianum***
Sin.: *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *hookerianum* (Barnéoud) Buchenau
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ).
- Tropaeolum hookerianum*** Barnéoud subsp. ***pilosum*** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ).
- Tropaeolum incisum*** (Speg.) Sparre
Sin.: *Tropaeolum polyphyllum* Cav. f. *schizophyllum* H. Ross ex Neger, nom. nud., *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var. *incisum* Speg.
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).
- Tropaeolum jilesii*** Sparre
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: CHL(COQ, VAL).
- Tropaeolum kingii*** Phil.
Sin.: *Tropaeolum buchenau* Phil.
Hierba. Endémica. 900-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Tropaeolum leptophyllum*** G. Don subsp. ***gracile*** (Hook. & Arn.) Sparre
Sin.: *Tropaeolum gracile* (Hook. & Arn.) Sparre, *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var. *gracile* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-1900 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).
- Tropaeolum leptophyllum*** G. Don subsp. ***leptophyllum***
Sin.: *Tropaeolum bridgesii* Fielding & Gardner, nom. superfl., *Tropaeolum chilense* Bertero ex Colla var. *eximium* Steud., *Tropaeolum edule* Bridges, *Tropaeolum linearifolium* Steud., *Trophaeum bridgesii* Kuntze, nom. superfl., *Trophaeum edule* (Bridges) Kuntze, *Trophaeum leptophyllum* (G. Don) Kuntze, *Trophaeum linearifolium* (Steud.) Kuntze
Hierba. Endémica. 1000-2200 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Tropaeolum looseri*** Sparre
Hierba. Endémica. 800-2400 m.
Países: CHL(COQ).
- Tropaeolum majus*** L.
Sin.: *Cardamindum majus* (L.) Moench, *Tropaeolum elatum* Salisb., nom. superfl., *Tropaeolum quinquelobum* Bergius, *Trophaeum majus* (L.) Kuntze
Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, MEN, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, BIO, RME, JFE). URY(CAS, MON).
- Tropaeolum meyeri*** Sparre
Hierba o enredadera. Endémica. 700-1500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
- Tropaeolum myriophyllum*** (Poepp. & Endl.) Sparre
Sin.: *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var. *myriophyllum* Poepp. & Endl.
Hierba. Endémica. 400-3500 m.
Países: CHL(MAU, BIO).
- Tropaeolum nuptae-jucundae*** Sparre
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).
- Tropaeolum patagonicum*** Speg.
Sin.: *Tropheastrum patagonicum* (Speg.) Sparre
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
- Tropaeolum pentaphyllum*** Lam. subsp. ***megapetaloides*** Sparre
Hierba o enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tropaeolum pentaphyllum Lam. subsp. **pentaphyllum**

Sin.: *Chymocarpus pentaphyllus* (Lam.) D. Don, *Tropaeolum chymocarpus* Morong, *Tropaeolum quinatum* Hell., *Trophaeum pentaphyllum* (Lam.) Kuntze, *Trophaeum quinatum* (Hell.) Kuntze

Hierba o enredadera. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(COL, MAL, MON, ROC, SJO).

Tropaeolum polyphyllum Cav.

Sin.: *Chymocarpus polyphyllus* (Cav.) Heynh., *Tropaeolum floribundum* Turcz., *Tropaeolum nubigenum* Phil., *Tropaeolum paniculatum* Meyen, nom. nud., *Tropaeolum prostratum* Miers, nom. nud., *Trophaeum floribundum* (Turcz.) Kuntze, *Trophaeum polyphyllum* (Cav.) Kuntze

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Tropaeolum porifolium (Cav.) L. Andersson & S. Andersson

Sin.: *Magallana cavanillesii* Scala, nom. superfl., *Magallana porifolia* Cav.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(AIS).

Tropaeolum rhomboideum Lem.

Sin.: *Tropaeolum tenuirostre* Steud. var. *majus* Buchenau

Hierba. Endémica. 2000-2100 m.

Países: CHL(RME).

Tropaeolum sanctae-catharinae Sparre

Sin.: *Tropaeolum gaertnerianum* Regel

Hierba o enredadera. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Tropaeolum sessilifolium Poepp. & Endl.

Hierba. Endémica. 2200-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Tropaeolum slanisii Bulacio

Hierba. Endémica. 2000-2800 m.

Países: ARG(SAL).

Tropaeolum speciosum Poepp. & Endl.

Sin.: *Anisocentra cardiopetala* Turcz., *Chymocarpus speciosus* (Poepp. & Endl.) Walp., *Tropaeolum lechleri* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA, AIS).

Tropaeolum trialatum (Suess.) L. Andersson & S. Andersson

Sin.: *Magallana trialata* Suess.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE).

Tropaeolum tricolor Sweet

Sin.: *Chymocarpus tricolor* (Sweet) Heynh., *Tropaeolum coccineum* Miers, *Tropaeolum elegans* G. Don, *Tropaeolum incrassatum* Steud., *Tropaeolum jarrattii* Youell ex Paxton, *Tropaeolum subincrassatum* Steud., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *aurantiacum* Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *grandiflorum* Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *grandiflorum* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *jarrattii* (Paxton) Lem., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *majus* Marnock, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *pallenscens* Barnéoud, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *regelianum* Möhring ex Regel, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *schantzii* Regel, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *splendens* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *venustum* Paxton ex Otto, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *versicolor* Morren, *Tropaeolum violaceum* Steud.

Hierba. Endémica. 0-2800 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. subsp. **silvestre** Sparre

Sin.: *Tropaeolum buchenauianum* Hieron., *Tropaeolum hieronymii* Buchenau, nom. superfl., *Tropaeolum septemlobatum* Heilborn

Hierba. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ).

Tropaeolum warmingianum Rohrb. var. **glaziovii** (Buchenau) Sparre

Sin.: *Tropaeolum glaziovii* Buchenau

Hierba o enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Tropaeolum warmingianum Rohrb. var. **warmingianum**

Hierba o enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

Tropaeolum willinkii Sparre

Hierba o enredadera. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

TURNERACEAE**Oxossia** L. Rocha**Oxossia capitata** (Cambess.) L. Rocha

Sin.: *Turnera capitata* Cambess.

Arbusto. Nativa. 300-400 m.

Países: BRA(SCA).

Piriqueta Aubl.

Piriqueta cistoides (L.) Griseb.

Sin.: *Piriqueta cistoides* (L.) Griseb. var. *latifolia* Urb., *Piriqueta cistoides* (L.) Griseb. var. *micrantha* Urb., *Piriqueta villosa* Aubl., *Turnera cistoides* L., *Turnera helianthemoides* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess., *Turnera hirta* Willd. ex Schult.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CON, PHA, SPE).

Piriqueta grandifolia (Urb.) Arbo

Sin.: *Piriqueta duarteana* (Cambess.) Urb. var. *grandifolia* Urb.

Subarbusto. Nativa. 100-300 m.

Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY).

Piriqueta morongii Rolfe

Sin.: *Piriqueta australis* (Urb.) A.W. Hill, *Piriqueta australis* (Urb.) Arbo, hom. illeg., *Piriqueta viscosa* Griseb. subsp. *australis* Urb., *Piriqueta viscosa* Griseb. var. *australis* (Urb.) Urb.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Piriqueta nitida Urb.

Sin.: *Piriqueta leucantha* Urb., *Piriqueta leucantha* Urb. var. *brachyantha* Urb.

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, SPE).

Piriqueta ochroleuca Urb.

Hierba. Endémica. 200-300 m.

Países: PRY(COA, PAI).

Piriqueta pampeana T.N. Cabreira & Miotto

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Piriqueta racemosa (Jacq.) Sw.

Sin.: *Piriqueta ovata* (Bello) Urb., *Turnera hispidissima* Colla, *Turnera ovata* Bello, *Turnera racemosa* Jacq.

Hierba. Nativa. 100-200 m.

Países: PRY(CON).

Piriqueta rosea (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Urb.

Sin.: *Piriqueta rosea* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Urb. var. *occidentalis* Urb., *Piriqueta serrulata* Urb., *Turnera rosea* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(AMA, CON, SPE).

Piriqueta sidifolia (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Urb.

Sin.: *Piriqueta sidifolia* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Urb. var. *angustifolia* Urb., *Piriqueta sidifolia* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Urb. var. *genuina* Urb., *Piriqueta sidifolia* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Urb. var. *ignatii* Urb.

Hierba. Nativa. 500-600 m.

Países: BRA(RGS).

Piriqueta suborbicularis (A. St.-Hil. & Naudin) Arbo

Sin.: *Piriqueta alba* Mattos, *Piriqueta selloi* Urb., *Sida suborbicularis* A. St.-Hil. & Naudin, *Turnera selloi* (Urb.) Arechav.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CAU, GUA, ITA, PAI). URY(CLA).

Piriqueta subsessilis Urb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, CAN, SPE).

Piriqueta tamberlikii Urb.

Hierba o subarbusto. Nativa. 300

Países: PRY(AMA).

Piriqueta taubatensis (Urb.) Arbo

Sin.: *Piriqueta selloi* Urb. var. *hirsuta* Urb., *Piriqueta selloi* Urb. var. *taubatensis* Urb.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, MIE, PAI). URY(RIV).

Turnera L.

Turnera aurelii Arbo

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(FOR). PRY(CEN, COA, PHA).

Turnera blanchetiana Urb. var. **subspicata** Urb.

Arbusto. Nativa. 400-500 m.

Países: PRY(APY).

Turnera concinna Arbo

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CON, SPE).

Turnera dolichostigma Urb.

Sin.: *Turnera pumileoides* Urb.

Hierba. Nativa. 200-300 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Turnera fernandezii Arbo

Arbusto. Nativa. 100-300 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Turnera grandidentata (Urb.) Arbo

Sin.: *Turnera ulmifolia* L. var. *grandidentata* Urb.

Hierba. Endémica. 100-300 m.

Países: PRY(CAU, CEN, CON, COA, MIE, PAI, SPE).

Turnera grandiflora (Urb.) Arbo

Sin.: *Turnera ulmifolia* L. var. *grandiflora* Urb.

Hierba. Nativa. 100-400 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Turnera hassleriana Urb.

Sin.: *Turnera hassleriana* Urb. var. *lobulata* Urb.

Subarbusto. Nativa. 100-400 m.

Países: ARG(MIS, SAL). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Turnera hilaireana Urb.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Turnera krapovickasii Arbo

Subarbusto. Nativa. 200-700 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC). PRY(APY, PHA).

Turnera melochioides Cambess.

Subarbusto. Nativa. 200-300 m.

Países: PRY(AMA).

Turnera nervosa Urb.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU, CAA, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Turnera oblongifolia Cambess.

Sin.: *Turnera hilaireana* Urb. var. *lanceolata* (Cambess.) Urb., *Turnera hilaireana* Urb. var. *oblongifolia* (Cambess.) Urb., *Turnera hilaireana* Urb. var. *ovatifolia* Urb.

Hierba. Nativa. 600-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Turnera orientalis (Urb.) Arbo

Sin.: *Turnera ulmifolia* L. var. *orientalis* Urb.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAN, CON, ITA, MIE, ÑEE, PHA, SPE).

Turnera pumilea L.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(COS). PRY(APY, CEN, CHO, CON, COA, NAS, PHA).

Turnera serrata Vell. var. **brevifolia** Urb.

Subarbusto. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

Turnera sidoides L. subsp. **carnea** (Cambess.) Arbo

Sin.: *Turnera pinnatifida* Juss. ex Poir. var. *carnea* Cambess.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(GUA, ITA, MIE). URY(ART, CLA, CLA, FLO, FLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Turnera sidoides L. subsp. **holosericea** (Urb.) Arbo

Sin.: *Turnera holosericea* (Urb.) Herter, comb. illeg., *Turnera sidoides* L. var. *holosericea* Urb.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, FLA, PAY, RIV, TAC, TYT).

Turnera sidoides L. subsp. **integrifolia** (Griseb.) Arbo

Sin.: *Turnera grisebachiana* Urb. ex Herter, *Turnera setosa* Sm. var. *integrifolia* Griseb., *Turnera sidoides* L. var. *grisebachiana* Urb., nom. superfl.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(APA, MIE). URY(ART, DUR, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Turnera sidoides L. subsp. **pinnatifida** (Juss. ex Poir.) Arbo

Sin.: *Turnera pinnatifida* Juss. ex Poir., *Turnera pinnatifida* Juss. ex Poir. var. *angustiloba* DC., *Turnera pinnatifida* Juss. ex Poir. var. *lycopifolia* DC., *Turnera setosa* Sm., *Turnera setosa* Sm. var. *entrieriana* Griseb., *Turnera sidoides* L. var. *angustiloba* (DC.) Urb., *Turnera sidoides* L. var. *incisa* Urb., *Turnera sidoides* L. var. *lycopifolia* (DC.) Urb.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, CAS, COL, DUR, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Turnera sidoides L. subsp. **sidoides**

Sin.: *Turnera herteri* (Urb.) Herter, comb. illeg., *Turnera sidoides* L. var. *herteriana* Urb. ex Herter, *Turnera sidoides* L. var. *hispida* Urb., nom. superfl.

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(RGS). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, TAC).

Turnera subulata Sm.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Turnera weddelliana Urb. ex Rolfe

Sin.: *Turnera weddelliana* Urb. & Rolfe var. *brachyphylla* Urb.

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

TYPHACEAE

Typha Juss.

Typha angustifolia L.

Hierba. Cosmopolita. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, VAL, MAU, BIO, ARA, LSR).

Typha domingensis Pers.

Sin.: *Typha tenuifolia* Kunth

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, VAL, BIO, ARA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, COL, MON, ROC, SJO).

Typha latifolia L.

Hierba. Cosmopolita. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SJU, SFE). BRA(PAR, RGS). CHL(BIO). PRY(APA, AMA, CON, PHA).

Typha subulata Crespo & R.L. Pérez-Mor.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU). URY(MON, ROC).

ULMACEAE

Phyllostylon Capan. ex Benth. & Hook. f.

Phyllostylon rhamnoides (J. Poiss.) Taub.

Sin.: *Phyllostylon orthopterum* Hallier f., *Samaroceltis rhamnoides* J. Poiss.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Ulmus L.

Ulmus minor Mill.

Árbol. Introducida.

Países: CHL(RME).

Ulmus pumila L.

Árbol. Introducida.

Países: ARG(COR).

URTICACEAE

Boehmeria Jacq.

Boehmeria caudata Sw.

Sin.: *Boehmeria arborescens* Gardner, *Boehmeria arguta* Mart. ex Miq., *Boehmeria caudata* Sw. var. *arborescens* (Gardner) Wedd., *Procris caudata* (Sw.) Poir., *Ramium caudatum* (Sw.) Kuntze

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, MIE).

Boehmeria cylindrica (L.) Sw.

Sin.: *Urtica cylindrica* L.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, MON, SJO, SOR).

Boehmeria excelsa (Bertero ex Steud.) Wedd.

Sin.: *Procris excelsa* Bertero ex Steud., *Splitgerbera denudata* Gay

Árbol. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(JFE).

Boehmeria nivea (L.) Hook. f. & Arn.

Sin.: *Urtica nivea* L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(SCA). PRY(APA).

Boehmeria pavonii Wedd.

Sin.: *Boehmeria ramiflora* Jacq. var. *paraguariensis* Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Boehmeria ramiflora Jacq.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cecropia Loeffl.

Cecropia glaziovii Snethl.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cecropia pachystachya Trécul

Sin.: *Ambaiba adenopus* (Mart. ex Miq.) Kuntze, *Ambaiba cinerea* (Miq.) Kuntze, *Ambaiba lyratiloba* (Miq.) Kuntze, *Ambaiba pachystachya* (Trécul) Kuntze, *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq., *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq. var. *lyratiloba* (Miq.) Hassl., *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq. var. *macrophylla* Hassl., *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq. var. *vulgaris* Hassl., *Cecropia catarinensis* Cuatrec., *Cecropia cinerea* Miq., *Cecropia glauca* Rojas Acosta, *Cecropia lyratiloba* Miq.

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

Coussapoa Aubl.

Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini
Sin.: *Brosimum microcarpum* Schott,
Coussapoa fontanesiana Trécul,
Coussapoa schottii Miq., *Coussapoa schottii* Miq. var. *lanceolata* Miq.,
Coussapoa schottii Miq. var. *longifolia* Miq.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Laportea Gaudich.

Laportea aestuans (L.) Chew

Sin.: *Fleurya aestuans* (L.) Gaudich. ex Miq., *Urtica aestuans* L.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(TUC). BRA(PAR, SCA).

Myriocarpa Benth.

Myriocarpa longipes Liebm.

Árbol. Nativa.

Países: ARG(JUU).

Myriocarpa stipitata Benth.

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL).
BRA(PAR).

Parietaria L.

Parietaria debilis G. Forst.

Sin.: *Freirea debilis* (G. Forst.) Jarm.,
Freirea erecta Phil., *Freirea humifusa* Gay,
Parietaria debilis G. Forst. var. *diffusa* Wedd.,
Parietaria debilis G. Forst. var. *floridana* (Nutt.) Wedd.,
Parietaria debilis G. Forst. var. *gracilis* (Lowe) Wedd.,
Parietaria debilis G. Forst. var. *micrantha* (Ledeb.) Wedd.,
Parietaria fernandeziana (Steud.) L.E. Navas,
Parietaria floridana Nutt., *Parietaria*

gracilis Lowe, *Parietaria humifusa* (Gay) Blume,
Parietaria humifusa (Gay) Johow, nom. illeg.,
Parietaria micrantha Ledeb., *Parietaria pensylvanica* Muhl. ex Willd.
var. *floridana* (Nutt.) Wedd., *Urtica debilis* (G. Forst.) Endl.,
Urtica fernandeziana Steud., *Urtica parietariaefolia* Bertero ex Steud.

Hierba. Cosmopolita. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME, JFE).
PRY(APY, APA, CAA, PAI). URY(CAS, FLA, LAV, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR).

Parietaria feliciana Phil.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(IDE).

Parietaria judaica L.

Sin.: *Parietaria diffusa* Mert. & W.D.J. Koch,
Parietaria officinalis L. subsp. *judaica* (L.) Bég.,
Parietaria officinalis L. var. *judaica* (L.) Hochr.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, MIS, SFE).
CHL(VAL, RME). URY(MON).

Parietaria officinalis L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Phenax Wedd.

Phenax laevigatus Wedd.

Sin.: *Boehmeria hirta* Sw., *Phenax hirtus* (Sw.) Wedd.,
Phenax urticifolius Wedd.

Arbusto o árbol. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
BRA(RGS, SCA).

Phenax sonneratii (Poir.) Wedd.

Sin.: *Gesnouinia boehmerioides* Miq.,
Parietaria sonneratii Poir., *Phenax vulgaris* Wedd.,
Procris sonneratii (Poir.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAA).

Pilea Lindl.

Pilea acanthoides Cabral & Gaglioti

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

Pilea aparadensis P. Brack

Hierba. Endémica. 700-900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Pilea astrogramma Miq.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pilea cadieriei Gagnep. & Guillaumin

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pilea elegans Gay

Sin.: *Pilea elliptica* Hook. f. f. *gayana* Wedd.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LSR).

Pilea elliptica Hook. f.

Sin.: *Pilea chilensis* Wedd., *Pilea pedunculata* Blume,
Pilea uliginosa Phil.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(ARA, LSR, LLA, AIS).

Pilea flammula P. Brack

Hierba. Endémica. 900-1600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Pilea hilariana Wedd.

Hierba. Nativa.

- Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pilea hyalina** Fenzl
Sin.: *Adicea hyalina* (Fenzl) Kuntze, *Pilea hyalina* Fenzl var. *longipes* Miq.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR). CHL(LBO).
- Pilea hydra** P. Brack
Hierba. Endémica. 700-1100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Pilea jujuyensis** Sorarú
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Pilea microphylla** (L.) Liebm.
Sin.: *Dubruellia microphylla* (L.) Gaudich., *Parietaria microphylla* L., *Pilea muscosa* Lindl. var. *microphylla* (L.) Wedd., *Pilea trianthemoides* Lindl. var. *microphylla* (L.) Wedd., *Urtica microphylla* (L.) Sw.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pilea nummulariifolia** (Sw.) Wedd.
Sin.: *Urtica nummulariifolia* Sw.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Pilea pubescens** Liebm.
Sin.: *Pilea grossocrenata* Miq.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).
- Pilea rhizobola** Miq.
Hierba o arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Pilea tenebrosa** Cabral & Gaglioti
Hierba. Endémica. 300-600 m.
Países: BRA(SCA).
- Pourouma** Aubl.
Pourouma guianensis Aubl.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Pouzolzia** Gaudich.
Pouzolzia amambaiensis Friis & Wilmot-Dea
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(AMA).
- Soleirolia** Gaudich.
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy
Sin.: *Helxine soleirolii* Req., *Parietaria soleirolii* (Req.) Spreng.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(BAI). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LSR, RME).
- Urera** Gaudich.
Urera altissima Lillo
Arbusto. Nativa. 300-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Urera aurantiaca** Wedd.
Sin.: *Urera aurantiaca* Wedd. var. *scandens* (D. Parodi) Hassl., *Urera scandens* D. Parodi
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA).
- Urera baccifera** (L.) Gaudich. ex Wedd.
Sin.: *Urera baccifera* (L.) Gaudich. ex Wedd. var. *horrida* (Kunth) Wedd., *Urera horrida* (Kunth) Miq., *Urtica baccifera* L.,
- Urtica grandidentata* Liebm., *Urtica horrida* Kunth
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, CEN, ÑEE, PAI, SPE).
- Urera capitata** Wedd.
Árbol. Nativa.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Urera caracasana** (Jacq.) Gaudich. ex Griseb.
Sin.: *Urera jacquini* Wedd., *Urtica caracasana* Jacq.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, ÑEE, PAI).
- Urera nitida** (Vell.) P. Brack
Sin.: *Urera baccifera* (L.) Gaudich. ex Wedd. var. *angustifolia* Wedd., *Urera denticulata* Miq., *Urtica nitida* Vell.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Urera simplex** Wedd.
Árbol. Nativa.
Países: ARG(JUJ).
- Urtica** L.
Urtica berteriana Phil.
Sin.: *Urtica echinata* Benth. var. *berteriana* (Phil.) Wedd., *Urtica echinata* Benth. var. *lamifolia* Wedd.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Urtica circularis** (Hicken) Sorarú
Sin.: *Urtica chamaedryoides* Pursh var. *circularis* (Hicken) Hauman, *Urtica spathulata* Sm. var. *circularis* Hicken

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, SPE). URY(CLA, LAV, MAL, MON, SJO).

Urtica dioica L.

Arbusto. Introducida. 0-300 m.

Países: ARG(CAT, COR, MEN). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA, LLA).

Urtica echinata Benth.

Sin.: *Urtica andicola* Wedd., *Urtica echinata* Benth. var. *andicola* (Wedd.) J.R. Perkins, *Urtica echinata* Benth. var. *punctulata* Hauman

Hierba. Nativa. 3600-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Urtica flabellata Kunth

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.

Países: ARG(JUJ). CHL(AYP).

Urtica glomeruliflora Steud.

Sin.: *Boehmeria fernandeziana* Gay, *Urtica fernandeziana* (Gay) H. Ross ex Skotts., comb. illeg.

Hierba. Endémica. 200-1300 m.

Países: CHL(JFE).

Urtica gracilis Aiton subsp. **mollis** (Steud.) Weigend

Sin.: *Urtica buchtienii* H. Ross, *Urtica dioica* L. var. *diplotricha* (Phil.) Wedd., *Urtica dioica* L. var. *mollis* (Steud.) Wedd., *Urtica diplotricha* Phil., *Urtica mollis* Steud.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Urtica magellanica Poir.

Sin.: *Urtica bracteata* Steud., *Urtica chamaedryoides* Pursh f. *hygrophila* Hauman, *Urtica chamaedryoides* Pursh f. *xerophila* Hauman, *Urtica chamaedryoides* Pursh subsp. *microsperma* Hauman, *Urtica darwinii* Hook. f., *Urtica dioica* L. var. *steudelii* Wedd., *Urtica lilloi* (Hauman) Geltman, *Urtica magellanica* Poir. subsp. *bracteata* (Steud.) Geltman, *Urtica magellanica* Poir. subsp. *lilloi* Hauman, *Urtica magellanica* Poir. var. *bracteata* (Steud.) Wedd., *Urtica pseudodioica* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Urtica masafueriae Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Urtica spathulata Sm.

Sin.: *Urtica bonariensis* Pers. subsp. *crenatoserrata* H. Ross ex Bornm., *Urtica bonariensis* Pers. var. *parvifolia* H. Ross ex Bornm., *Urtica scalpe* Comm. ex Wedd., *Urtica urens* L. subsp. *bonariensis* Pers.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, LPA, SCR, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN). URY(CLA, FLO, MON, SJO).

Urtica trichantha (Wedd.) Acevedo & L.E. Navas

Sin.: *Urtica echinata* Benth. var. *trichantha* Wedd.

Hierba. Nativa. 3400-4500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Urtica urens L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, FLA, MON, RNO, SOR).

VELLOZIACEAE

Barbacenia Vand.

Barbacenia paranaensis L.B. Sm.

Sin.: *Ayllthonia paranaensis* (L.B. Sm.) N.L. Menezes

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Barbaceniopsis L.B. Sm.

Barbaceniopsis boliviensis (Baker) L.B. Sm.

Sin.: *Barbacenia boliviense* (Baker) Hauman, *Vellozia boliviense* Baker, *Xerophyta boliviense* (Baker) N.L. Menezes

Hierba. Nativa. 1400-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Barbaceniopsis castillonii (Hauman) Ibisch

Sin.: *Barbacenia castilloni* Hauman

Hierba. Nativa.

Países: ARG(TUC).

Barbaceniopsis humahuaquensis Noher

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(JUJ).

VERBENACEAE**Aloysia** Palau**Aloysia brasiliensis** Moldenke

Arbusto. Endémica. 700-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aloysia castellanosi MoldenkeSin.: *Aloysia castellanosi* Moldenke var. *magna* Moldenke, *Aloysia decorticans* Ravenna

Subarbusto. Endémica. 2500-2800 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

Aloysia catamarcensis Moldenke

Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE).

Aloysia chamaedryfolia Cham.Sin.: *Lippia chamaedryfolia* (Cham.) Steud.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV, TAC, TYT).

Aloysia citrodora PalauSin.: *Aloysia citrodora* Ortega ex Pers., hom. illeg., *Aloysia sleumeri* Moldenke, *Aloysia triphylla* (L'Hér.) Britton, hom. illeg., *Aloysia triphylla* (L'Hér.) Britton f. *serrulata* Moldenke, *Lippia citrodora* (Ortega ex Pers.) Kunth, comb. illeg., *Lippia triphylla* (L'Hér.) Kuntze, *Verbena citrodora* Cav., hom. illeg., *Verbena triphylla* L'Hér., *Zappania citrodora* Lam., hom. illeg.

Arbusto. Nativa. 500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA).

Aloysia cordata Siedo

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Aloysia crenata MoldenkeSin.: *Aloysia krapovickasii* Moldenke

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA).

Aloysia decipiens RavennaSin.: *Aloysia chacoensis* Moldenke var. *angustifolia* Tronc., *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *angustifolia* (Tronc.) Botta

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC).

Aloysia deserticola (Phil.) Lu-Irving & N. O'LearySin.: *Acantholippia deserticola* (Phil.) Moldenke, *Acantholippia punensis* Botta, nom. superfl., *Lippia deserticola* Phil., *Lippia microphylla* Phil., nom. illeg.

Arbusto. Nativa. 2300-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Aloysia dusenii MoldenkeSin.: *Aloysia ternifolia* Moldenke, *Aloysia ternifolia* Moldenke f. *oppositifolia* Moldenke

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aloysia fiebrigii (Hayek) MoldenkeSin.: *Aloysia arcuifolia* G.L. Nesom, *Lippia fiebrigii* Hayek

Arbusto. Nativa. 1900-3400 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. **gratissima**Sin.: *Aloysia chacoensis* Moldenke, *Aloysia famatinensis* Ravenna, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *chacoensis* (Moldenke) Botta, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *paraguariensis* (Briq.) Moldenke, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *revoluta* (Moldenke) Moldenke, *Aloysia ligustrina* (Lag.) Small var. *paraguariensis* (Briq.) Moldenke, *Aloysia lycioides* Cham., *Aloysia lycioides* Cham. var. *paraguariensis* (Briq.) Moldenke, *Aloysia lycioides* Cham. var. *revoluta* Moldenke, *Lippia gratissima* (Gillies & Hook.) L.D. Benson, *Lippia ligustrina* (Lag.) Kuntze var. *lasiodonta* Briq., *Lippia ligustrina* (Lag.) Kuntze var. *paraguariensis* Briq., *Lippia lycioides* (Cham.) Steud., *Verbena gratissima* Gillies & Hook. ex Hook.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(DUR, MAL, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).

Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. **sellowii** (Briq.) BottaSin.: *Aloysia pulchra* (Briq.) Moldenke, *Aloysia sellowii* (Briq.) Moldenke, *Aloysia uruguayensis* Moldenke, hom. illeg., *Lippia affinis* Briq., hom. illeg., *Lippia pulchra* Briq., *Lippia sellowii* Briq.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, RIV, TAC).

Aloysia hatschbachii Moldenke

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Aloysia oblanceolata Moldenke

Sin.: *Aloysia beckii* Moldenke, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.)

Tronc. var. *oblanceolata* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, COA, ITA).

Aloysia ovatifolia Moldenke

Sin.: *Xeroaloyisia ovatifolia* (Moldenke) Tronc.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Aloysia polygalifolia Cham.

Sin.: *Lippia polygalifolia* (Cham.) Steud.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke

Sin.: *Lippia polystachya* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, LRI, SAL, SJU, SDE). PRY(CEN, PHA).

Aloysia riojana (Hieron. ex Moldenke)

Lu-Irving & N. O'Leary

Sin.: *Acantholippia riojana* Moldenke

Arbusto. Endémica. 500-1800 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Aloysia salsoloides (Griseb.) Lu-Irving & N. O'Leary

Sin.: *Acantholippia hastulata* Griseb., *Acantholippia salsoloides* Griseb., *Lippia hastulata* (Griseb.) Hieron., *Lippia salsoloides* (Griseb.) Briq.

Arbusto. Nativa. 1000-3200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Aloysia salviifolia (Hook. & Arn.) Moldenke

Sin.: *Aloysia chilensis* (Schauer) Moldenke, *Lippia chilensis* Schauer, *Verbena salviifolia* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ).

Aloysia schulziana Moldenke

Sin.: *Aloysia casadensis* Hassl. ex Moldenke, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *schulziana* (Moldenke) Botta, *Aloysia lomaplatae* Ravenna, *Aloysia looseri* Moldenke, *Aloysia meyeri* Moldenke, *Lippia looseri* (Moldenke) Looser

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Aloysia scorodonioides (Kunth) Cham. var. *mathewsii* (Briq.) Moldenke

Sin.: *Aloysia scorodonioides* (Kunth) Cham. var. *lopez-palacii* Moldenke, *Lippia scorodonioides* Kunth var. *mathewsii* Briq.

Arbusto. Nativa. 900-2600 m.

Países: ARG(CHA, JUJ, LRI, SAL, SDE).

Aloysia scorodonioides (Kunth) Cham. var. *scorodonioides*

Sin.: *Aloysia boliviensis* Moldenke, *Aloysia scorodonioides* (Kunth) Cham. var. *detonsa* (Briq.) Moldenke, *Aloysia scorodonioides* (Kunth) Cham. var. *hypoleuca* (Briq.) Moldenke, *Lippia scorodonioides* Kunth, *Lippia scorodonioides* Kunth var. *detonsa* Briq., *Lippia scorodonioides* Kunth var. *hypoleuca* Briq.

Arbusto. Nativa. 200-2800 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Aloysia tarapacana (Botta) Lu-Irving & N. O'Leary

Sin.: *Acantholippia tarapacana* Botta

Arbusto. Endémica. 3000-3400 m.

Países: CHL(AYP).

Aloysia trifida (Gay) Lu-Irving & N. O'Leary

Sin.: *Acantholippia trifida* (Gay) Moldenke, *Acantholippia trifida* (Gay) Moldenke var. *reichei* Moldenke, *Aloysia fonckii* (Phil.) Moldenke, *Aloysia gracilis* (Phil.) Acevedo, comb. illeg., *Aloysia reichei* Moldenke, *Aloysia reichei* Moldenke var. *trilobata* Moldenke, *Lippia floribunda* Phil., hom. illeg., *Lippia fonckii* Phil., *Lippia gracilis* Phil., hom. illeg., *Lippia trifida* Gay, *Lippia trifida* Gay var. *gracilis* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(LRI, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. var. *platyphylla* (Briq.) Moldenke

Sin.: *Aloysia naviculata* Ravenna, *Aloysia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *elliptica* (Briq.) Moldenke, *Lippia virgata* (Ruiz & Pav.) Steud. var. *elliptica* Briq., *Lippia virgata* (Ruiz & Pav.) Steud. var. *platyphylla* Briq.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. var. *virgata*

Sin.: *Aloysia urticoides* Cham., *Aloysia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *argutedentata* Moldenke, *Aloysia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *laxa* (Chodat) Moldenke, *Lippia arborea* Rojas Acosta, *Lippia urticoides* (Cham.) Steud., *Lippia urticoides* (Cham.) Steud. var. *laxa* Chodat, *Lippia virgata* (Ruiz & Pav.) Steud. var. *laxa* (Chodat) Briq., *Priva virgata* (Ruiz & Pav.) Spreng., *Verbena*

virgata Ruiz & Pav., *Zappania virgata* (Ruiz & Pav.) Poir.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Bouchea Cham.

Bouchea boliviana (Kuntze) Moldenke

Sin.: *Valerianoides boliviana* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 200-1600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Bouchea fluminensis (Vell.) Moldenke var. **fluminensis**

Sin.: *Bouchea fluminensis* (Vell.) Moldenke f. *albiflora* Moldenke, *Bouchea fluminensis* (Vell.) Moldenke var. *pilosa* Moldenke, *Bouchea pseudogervao* (A. St.-Hil.) Cham., *Verbena fluminensis* Vell., *Verbena pseudogervao* A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

Casselia Nees & Mart.

Casselia chamaedryfolia Cham.

Sin.: *Casselia hassleri* Briq., *Casselia hymenocalyx* Briq., *Timotocia hassleri* (Briq.) Moldenke, *Timotocia hymenocalyx* (Briq.) Moldenke

Subarbusto. Nativa.

Países: PRY(AMA, CON).

Citharexylum L.

Citharexylum amabilis (Bocq.) Christenh. & Byng

Sin.: *Baillonia amabilis* Bocq., *Baillonia amabilis* Bocq. var. *heterophylla* Kuntze, *Baillonia amabilis* Bocq. var. *longifolia* Kuntze, *Baillonia amabilis* Bocq. var. *pubescens* Moldenke, *Citharexylum linearifolium* Moldenke, *Stachytarpheta amabilis* (Bocq.) Ravenna

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

Citharexylum andinum Moldenke

Sin.: *Citharexylum andinum* Moldenke var. *beckii* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ).

Citharexylum joergensenii (Lillo) Moldenke

Sin.: *Duranta joergensenii* Lillo

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke

Sin.: *Citharexylum barbinerve* Cham., *Ehretia montevidense* Spreng.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, MIE, PAI). URY(MAL, RIV, ROC, SOR, TAC, TYT).

Citharexylum myrianthum Cham.

Sin.: *Citharexylum glaziovii* Moldenke, *Citharexylum macranthum* Hayek, *Citharexylum myrianthum* Cham. var. *acuminatum* Briq., *Citharexylum myrianthum* Cham. var. *rigidum* Briq., *Citharexylum rigidum* (Briq.) Moldenke

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA, MIE, SPE).

Citharexylum solanaceum Cham.

Sin.: *Citharexylum solanaceum* Cham. var. *macrocalyx* Moldenke

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Diostea Miers

Diostea juncea (Gillies & Hook. ex Hook.) Miers

Sin.: *Baillonia juncea* Benth. & Hook. f., *Citharexylum germaini* Briq., *Diostea chamaedryfolia* Hort ex Hook. f., nom. illeg., *Diostea infuscata* Miers, *Diostea valdiviana* (Phil.) Miers, *Dipyrena dentata* Phil., *Dipyrena infuscata* (Miers) Ravenna, *Dipyrena juncea* (Gillies & Hook. ex Hook.) Ravenna, *Dipyrena spartioides* Ravenna, *Dipyrena valdiviana* Phil., *Lippia juncea* (Gillies & Hook. ex Hook.) Schauer, *Verbena juncea* Gillies & Hook. ex Hook.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, RME).

Dipyrena Hook.

Dipyrena glaberrima (Gillies & Hook. ex Hook.) Hook.

Sin.: *Wilsonia glaberrima* Gillies & Hook. ex Hook.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Duranta L.

Duranta erecta L. var. **erecta**

Sin.: *Duranta ellisia* Jacq., *Duranta plumieri* Jacq., *Duranta plumieri* Jacq. var. *strigillosa* Schauer, *Duranta repens* L.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Notas: Variedad excluida de la Flora Argentina (Múlgura, 2012)

Duranta erecta L. var. **grandiflora** (Moldenke) Caro

Sin.: *Duranta repens* L. var. *grandiflora* Moldenke

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Duranta serratifolia (Griseb.) Kuntze

Sin.: *Duranta lorentzii* Griseb., nom. illeg., *Duranta serratifolia* (Griseb.) Kuntze var. *punctata* Caro, *Myrtus serratifolia* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Duranta vestita Cham.

Sin.: *Duranta vestita* Cham. var. *glabrescens* Moldenke

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Glandularia J.F. Gmel.**Glandularia andalgalensis** (Moldenke)

P. Peralta

Sin.: *Verbena andalgalensis* Moldenke

Hierba. Endémica. 2700-2900 m.

Países: ARG(CAT).

Glandularia andina (Griseb.) P. Peralta

Sin.: *Glandularia santiaguensis* Covas & Schnack, *Verbena erinoides* L. var. *andina* Griseb., *Verbena santiaguensis* (Covas & Schnack) Moldenke

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(PHA).

Glandularia araucana (Phil.) Botta

Sin.: *Verbena araucana* Phil., *Verbena chilensis* Moldenke, *Verbena glabrata* Phil., nom. illeg.

Subarbusto. Endémica. 900-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Glandularia aristigera (S. Moore) Tronc.

Sin.: *Glandularia tenuisecta* (Briq.) Small, *Verbena aristigera* S. Moore, *Verbena tenuisecta* Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY.

Glandularia atacamensis (Reiche) J.M.

Watson & A. Hoffm.

Sin.: *Verbena atacamensis* Reiche, *Verbena trifida* Kunth var. *deserticola* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Glandularia aurantiaca (Speg.) Botta var. **aurantiaca**

Sin.: *Verbena aurantiaca* Speg., *Verbena aurantiaca* Speg. f. *rosea* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Glandularia aurantiaca (Speg.) Botta var. **glabra** (Hicken) P. Peralta

Sin.: *Glandularia aurantiaca* (Speg.) Botta var. *glaberrima* (Moldenke) Botta, *Verbena aurantiaca* Speg. var. *glaberrima* Moldenke, *Verbena flava* Gillies ex Hook. f. *abortiva* Hicken, *Verbena radicans*

Gillies & Hook. var. *glabra* Hicken, *Verbena radicata* Moldenke var. *glabra* (Hicken) Moldenke

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Glandularia balansae (Briq.) N. O'Leary

Sin.: *Verbena balansae* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, SPE).

Glandularia berteroi (Schauer) M. Muñoz

Sin.: *Glandularia reichei* (Acevedo) L.E. Navas, *Shuttleworthia berteroi* Meisn., *Verbena berteroi* Schauer, *Verbena berteroi* Schauer f. *albiflora* Moldenke, *Verbena reichei* Acevedo

Hierba. Endémica. 100-3400 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Glandularia cabreræ (Moldenke) Botta

Sin.: *Verbena cabreræ* Moldenke, *Verbena dissecta* Willd. ex Spreng. f. *alba* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SDE).

Glandularia catharinae (Moldenke) N.

O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Verbena catharinae* Moldenke

Hierba. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Glandularia cheitmaniana (Moldenke)

Botta & Poggio

Sin.: *Verbena cheitmaniana* Moldenke

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Glandularia corymbosa (Ruiz & Pav.) N.

O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Verbena corymbosa* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(LBO, BIO, ARA, LLA). URY(CAS).

Glandularia cunha (Vell.) G. Santos,
Thode & J.F.B. Pastore

Sin.: *Glandularia phlogiflora* (Cham.)
Schnack & Covas, *Verbena cunha* Vell.,
Verbena hasslerana Briq. var. *ovatifolia*
Moldenke, *Verbena hassleriana* Briq. var.
ovatifolia Moldenke, *Verbena*
megapotamica Spreng. var. *phlogiflora*
(Cham.) Kuntze, *Verbena phlogiflora*
Cham., *Verbena phlogiflora* Cham. f. *alba*
Moldenke, *Verbena phlogiflora* Cham. var.
vulgaris Schauer, nom. inval.

Hierba. Nativa. 200-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA,
ITA).

Glandularia dissecta (Willd. ex Spreng.)
Schnack & Covas

Sin.: *Verbena dissecta* Willd. ex Spreng.,
Verbena dissecta Willd. ex Spreng. f.
capitata Moldenke, *Verbena pulchella*
Sweet f. *latilobata* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS).
URY(COL, MON, SJO).

Glandularia dusenii (Moldenke) N.
O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Verbena dusenii* Moldenke

Hierba. Endémica. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

Glandularia flava (Gillies & Hook.)
Schnack & Covas

Sin.: *Glandularia glutinosa* (Kuntze) Covas
& Schnack, *Verbena flava* Gillies ex
Hook., *Verbena flava* Gillies ex Hook. var.
angustiloba Speg., *Verbena flava* Gillies
ex Hook. var. *latiloba* Speg., *Verbena*
glutinosa Kuntze

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI,
MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

Glandularia guaibensis P. Peralta &
Thode

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

Glandularia guaranitica Tronc.

Sin.: *Verbena guaranitica* (Tronc.)
Moldenke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR,
MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CAU,
CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

Glandularia gynobasis (Wedd.) N.
O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Verbena bella* Phil., *Verbena*
gynobasis Wedd., *Verbena gynobasis*
Wedd. var. *strigosa* Phil.

Hierba o subarbusto. Nativa. 1900-4000
m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Glandularia hasslerana (Briq.) Tronc.

Sin.: *Glandularia pulchra* (Moldenke)
Botta, *Verbena hasslerana* Briq., *Verbena*
pulchra Moldenke

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU,
GUA, MIE, PAI). URY(RIV).

Glandularia hatschbachii (Moldenke) N.
O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Verbena hatschbachii* Moldenke

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Glandularia herteri (Moldenke) Tronc.

Sin.: *Verbena herteri* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(ART,
RIV).

Glandularia humifusa (Cham.) Botta

Sin.: *Verbena humifusa* Cham., *Verbena*
reineckii Moldenke

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS).

Glandularia jordanensis (Moldenke) N.
O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Verbena campestris* Moldenke,
Verbena jordanensis Moldenke, *Verbena*
lobata Vell. var. *sessilis* Moldenke

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Glandularia kuntzeana (Moldenke)
Tronc.

Sin.: *Verbena kuntzeana* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA). PRY(APA, AMA,
COA, PAI, PHA).

Glandularia laciniata (L.) Schnack &
Covas

Sin.: *Erinus laciniatus* L., *Verbena*
erinoides Lam., *Verbena erinoides* Lam.
var. *sabini* D. Don, *Verbena erinoides*
Willd. ex Spreng., hom. illeg., *Verbena*
laciniata (L.) Briq., *Verbena laciniata* (L.)
Briq. var. *contracta* (Lindl.) Moldenke,
Verbena laciniata (L.) Briq. var. *sabini* (D.
Don) Moldenke, *Verbena multifida* Ruiz &
Pav., *Verbena multifida* Ruiz & Pav. var.
contracta Lindl., *Verbena odorata* Meyen,
Verbena trachea Phil.

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Glandularia landbeckii (Phil.) P. Peralta

Sin.: *Verbena landbeckii* Phil.

Hierba. Endémica. 300-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Glandularia lilloana (Moldenke) Botta

Sin.: *Verbena lilloana* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Glandularia lipozygioides (Walp.) L.E. Navas

Sin.: *Verbena lipozygioides* Walp., *Verbena lipozygioides* Walp. var. *minima* Walp.

Hierba. Endémica. 1200-1400 m.

Países: CHL(COQ, RME).

Glandularia lobata (Vell.) P. Peralta & Thode var. **glabrata** (Moldenke) P. Peralta & Thode

Sin.: *Verbena lobata* Vell. var. *glabrata* Moldenke

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Glandularia lobata (Vell.) P. Peralta & Thode var. **lobata**

Sin.: *Verbena buchnera* Vell., *Verbena corymbosa* Cham., hom. illeg., *Verbena lobata* Vell., *Verbena lobata* Vell. var. *hirsuta* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Glandularia macrosperma (Speg.) Tronc.

Sin.: *Glandularia sulphurea* (D. Don) Schnack & Covas var. *intermedia* (Kuntze) L.E. Navas, *Verbena macrosperma* Speg., *Verbena sulphurea* D. Don var. *intermedia* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL).

Glandularia marrubioides (Cham.) Tronc.

Sin.: *Verbena humifusa* Cham. var. *reticulata* Moldenke, *Verbena marrubioides* Cham.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Notas: Especie excluida para la Flora Argentina (Múlgura & O' Leary, 2012)

Glandularia megapotamica (Spreng.) Cabrera & G. Dawson

Sin.: *Verbena megapotamica* Spreng., *Verbena phlogiflora* Cham. var. *macilentata* Schauer

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(RNO, SAO).

Glandularia mendocina (Phil.) Covas & Schnack

Sin.: *Verbena mendocina* Phil.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

Glandularia microphylla (Kunth) Cabrera
Sin.: *Verbena microphylla* Kunth, *Verbena nivea* Moldenke, *Verbena nivea* Moldenke f. *rosea* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Glandularia multiglandulosa (Moldenke) P. Peralta

Sin.: *Verbena multiglandulosa* Moldenke

Hierba. Endémica. 1300

Países: CHL(COQ).

Glandularia nana (Moldenke) Tronc.

Sin.: *Verbena hassleriana* Briq. var. *glandulosa* Moldenke, *Verbena nana* Moldenke, *Verbena pulchra* Moldenke var. *paludicola* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA, PHA).

Glandularia paraguariensis (Moldenke) N. O'Leary

Sin.: *Verbena paraguariensis* Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Glandularia parodii Covas & Schnack

Sin.: *Verbena parodii* (Covas & Schnack) Moldenke

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU).

Glandularia peruviana (L.) Small

Sin.: *Erinus peruvianus* L., *Verbena chamaedryfolia* Juss., *Verbena chamaedryfolia* Juss. var. *melindres* (Gillies) Schauer, *Verbena chamaedryfolia* Juss. var. *melindroides* (Cham.) Schauer, *Verbena melindres* Gillies, *Verbena melindres* Larrañaga, *Verbena melindroides* Cham., *Verbena peruviana* (L.) Britton, *Verbena peruviana* (L.) Britton f. *rosea* Moldenke, *Verbena peruviana* (L.) Britton var. *grabiusscula* Kuntze, *Verbena sanguinea* Larrañaga

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAN, COA, PAI, PHA). URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

Glandularia platensis (Spreng.) Schnack & Covas

Sin.: *Verbena chamaedryfolia* Juss. f. *foliosa* Chodat, *Verbena chamaedryfolia* Juss. f. *strigosa* Chodat, *Verbena chamaedryfolia* Juss. var. *latiuscula* Briq., *Verbena platensis* Spreng., *Verbena platensis* Spreng. f. *violacea* Moldenke, *Verbena platensis* Spreng. var. *latiuscula* Briq., hom. illeg., *Verbena platensis* Spreng. var. *stenodes* Briq., *Verbena*

scordioides Cham., *Verbena teucrioides* Gillies & Hook.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SJU, TUC). BRA(RGS). PRY(COA). URY(COL, FLO, MAL, MON, PAY, SAO, SOR, TAC).

Glandularia porrigens (Phil.) J.M. Watson & A. Hoffm.

Sin.: *Verbena cumingii* Moldenke, *Verbena paulsenii* Phil., *Verbena porrigens* Phil.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Glandularia radicata (Moldenke) Tronc. ex Múlgura

Sin.: *Glandularia radicans* (Gillies ex Hook.) Schnack & Covas, comb. illeg., *Verbena radicans* Gillies & Hook., hom. illeg., *Verbena radicata* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

Glandularia rectiloba (Moldenke) P. Peralta & Thode

Sin.: *Verbena rectiloba* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(RGS).

Glandularia ribifolia (Walp.) P. Peralta

Sin.: *Verbena foetida* Phil., *Verbena longavina* Phil., *Verbena ribifolia* Walp., *Verbena ribifolia* Walp. f. *alba* Acevedo, *Verbena ribifolia* Walp. f. *longavina* (Phil.) Acevedo, *Verbena ribifolia* Walp. var. *foetida* (Phil.) Acevedo

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-2500 m.

Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Glandularia rupestris Thode & Bordignon

Hierba o subarbusto. Endémica. 700-800 m.

Países: BRA(RGS).

Glandularia scrobiculata (Griseb.) Tronc.

Sin.: *Glandularia moricolor* (Moldenke) Tronc., comb. illeg., *Verbena hunzikeri* Moldenke, *Verbena moricolor* Moldenke, *Verbena scrobiculata* Griseb.

Hierba. Nativa. 200-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS).

Glandularia selloi (Spreng.) Tronc.

Sin.: *Shuttleworthia selloi* (Spreng.) Walp., *Verbena selloi* Spreng.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, MON, PAY, ROC, SJO).

Glandularia sessilifolia Thode & Bordignon

Hierba o subarbusto. Endémica. 200-500 m.

Países: BRA(RGS).

Glandularia sessilis (Cham.) Tronc.

Sin.: *Glandularia tristachya* (Tronc. & Burkart) Schnack & Covas, *Verbena kuhlmannii* Moldenke, *Verbena morongii* Britton, *Verbena schulzii* Moldenke, *Verbena sessilis* (Cham.) Kuntze, *Verbena stellarioides* Cham. var. *sessilis* Cham., *Verbena tristachya* Tronc. & Burkart

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR). BRA(RGS). PRY(APY, CAA, CON, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, RNO).

Glandularia stellarioides (Cham.) Schnack & Covas

Sin.: *Verbena stellarioides* Cham., *Verbena stellarioides* Cham. var. *decurrens* Cham., nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, ITA).

Glandularia subincana Tronc.

Sin.: *Verbena subincana* (Tronc.) Shinnars

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). URY(ART, SAO, SOR).

Glandularia subpetiolata (N. O'Leary) P.H. Cardoso & Thode

Sin.: *Verbena subpetiolata* N. O'Leary

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Glandularia sulphurea (D. Don) Schnack & Covas var. **pedunculata** (Clos) L.E. Navas

Sin.: *Verbena sulphurea* D. Don f. *alba* Moldenke ex Skottsb., *Verbena sulphurea* D. Don var. *fuscobrunnea* Skottsb., *Verbena sulphurea* D. Don var. *pedunculata* Clos

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Glandularia sulphurea (D. Don) Schnack & Covas var. **sulphurea**

Sin.: *Shuttleworthia sulphurea* (D. Don) Meisn., *Uwarowia sulphurea* (D. Don) Meisn., *Verbena sulphurea* D. Don, *Verbena sulphurea* D. Don var. *longituba* Kuntze, *Verbena sulphurea* D. Don var. *scabra* Acevedo, *Verbena sulphurea* D. Don var. *taltalensis* Moldenke

Hierba. Endémica. 2600-3300 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, ARA, RME).

Glandularia tecticaulis (Tronc.) N. O'Leary
Sin.: *Verbena tecticaulis* Tronc.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Glandularia tenera (Spreng.) Cabrera
Sin.: *Glandularia pulchella* (Sweet) Tronc. var. *clavellata* Tronc., *Glandularia pulchella* (Sweet) Tronc. var. *gracilior* Tronc., *Glandularia pulchella* (Sweet) Tronc. var. *pulchella*, *Shuttleworthia pulchella* (Sweet) Meisn., *Verbena pulchella* Sweet, *Verbena pulchella* Sweet var. *clavellata* (Tronc.) Shinners, *Verbena pulchella* Sweet var. *gracilior* (Tronc.) Shinners, *Verbena santiaguensis* (Covas & Schnack) Moldenke f. *albiflora* Moldenke, *Verbena tenera* Spreng., *Verbena tenera* Spreng. f. *albiflora* (Kuntze) Moldenke, *Verbena tenera* Spreng. var. *albiflora* Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, ITA, PHA). URY(ART, PAY, ROC, SJO).

Glandularia thymoides (Cham.) N. O'Leary
Sin.: *Verbena thymoides* Cham., *Verbena thymoides* Cham. f. *albiflora* Moldenke
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MAL, RIV, TAC).

Glandularia tomophylla (Briq.) P. Peralta
Sin.: *Glandularia spectabilis* (Moldenke) Botta, *Verbena calliantha* Briq., *Verbena calliantha* Briq. var. *microsoma* Briq., *Verbena megapotamica* Spreng. var. *pinnatiloba* Kuntze, *Verbena pinnatiloba* (Kuntze) Moldenke, *Verbena ramboi* Moldenke, *Verbena spectabilis* Moldenke, *Verbena storeoclada* Briq., *Verbena tomophylla* Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, APY, CAU, CEN, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI).

Glandularia tweedieana (Niven ex Hook.) P. Peralta
Sin.: *Glandularia incisa* (Hook.) Tronc., *Glandularia tessmannii* (Moldenke) P. Peralta & Thode, *Verbena incisa* Hook., *Verbena megapotamica* Spreng. var. *truncatula* Briq., *Verbena megapotamica* Spreng. var. *tweediana* (Niven ex Hook.) Kuntze, *Verbena peruviana* (L.) Britton f. *alba* Moldenke, *Verbena tessmannii* Moldenke, *Verbena tweediana* Niven ex Hook., *Verbena tweedieana* Niven var. *arriana* Niven ex Maund
Hierba. Nativa. 100-2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(PAY, RNO, SAO).

Glandularia venturii (Moldenke) Botta
Sin.: *Glandularia glandulifera* (Moldenke) Ragonese, *Glandularia perakii* Covas & Schnack, *Verbena arenaria* Moldenke, *Verbena dissecta* Willd. ex Spreng. f. *glandulifera* (Osten ex Sanzin) Moldenke, *Verbena erinoides* Lam. var. *glandulifera* Osten ex Sanzin, *Verbena glandulifera* Moldenke, *Verbena perakii* (Covas & Schnack) Moldenke, *Verbena venturii* Moldenke
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Junellia Moldenke

Junellia aretioides (R.E. Fr.) Moldenke
Sin.: *Junellia pygmaea* (R.E. Fr.) Moldenke, *Verbena aretioides* R.E. Fr., *Verbena pygmaea* R.E. Fr.
Arbusto. Nativa. 2700-4400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR).

Junellia azorelloides (Speg.) Moldenke
Sin.: *Verbena azorelloides* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR).

Junellia ballsii (Moldenke) N. O'Leary & P. Peralta
Sin.: *Glandularia ballsii* (Moldenke) Botta, *Verbena ballsii* Moldenke
Hierba. Endémica. 3000-4300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Junellia bisulcata (Hayek) Moldenke var. **bisulcata**
Sin.: *Verbena bisulcata* Hayek
Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Junellia bisulcata (Hayek) Moldenke var. **campestris** (Griseb.) Botta
Sin.: *Junellia juniperina* (Lag.) Moldenke var. *campestris* (Griseb.) Moldenke, *Verbena juniperina* Lag. var. *campestris* Griseb.
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(COR, SDE, TUC).

Junellia bryoides (Phil.) Moldenke
Sin.: *Verbena bryoides* Phil.
Arbusto. Endémica. 3100-3900 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Junellia caespitosa (Gillies & Hook.) Moldenke
Sin.: *Junellia comberi* (Sandwith) Moldenke, *Verbena caespitosa* Gillies & Hook., *Verbena comberi* Sandwith

Arbusto. Endémica. 1400-3600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU).
CHL(ATA, COQ).

Junellia congesta (Tronc.) Moldenke

Sin.: *Verbena congesta* Tronc.

Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(NEU).

Junellia connatibracteata (Kuntze)
Moldenke

Sin.: *Junellia dolychothyrsa* (Sandwith)
Moldenke, *Verbena connatibracteata*
Kuntze, *Verbena connatibracteata* Kuntze
f. *glomerata* Monticelli, nom. inval.,
Verbena connatibracteata Kuntze f.
rosulata Monticelli, nom. inval., *Verbena*
dolichothyrsa Sandwith

Arbusto. Endémica. 100-1100 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,
NEU, RNE).

Junellia crithmifolia (Gillies & Hook. ex
Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Glandularia crithmifolia* (Gillies &
Hook. ex Hook.) Schnack & Covas,
Verbena crithmifolia Gillies & Hook. ex
Hook., *Verbena crithmifolia* Gillies & Hook.
ex Hook. var. *latiloba* Speg.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN,
NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(COQ).

Junellia digitata (Phil.) Moldenke var.
digitata

Sin.: *Junellia nubigena* (Speg.) Moldenke,
comb. illeg., *Junellia punctulata* Hieron. ex
Moldenke, *Junellia spegazzinii* Moldenke,
Junellia tridactyla (Phil.) Moldenke,
Verbena digitata Phil., *Verbena nubigena*
Speg., nom. illeg., *Verbena spegazzinii*
(Moldenke) Tronc., *Verbena tridactyla*
Phil., *Verbena triternata* Phil.

Arbusto. Endémica. 3500-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Junellia digitata (Phil.) Moldenke var.
integerrima (Botta) Botta

Sin.: *Verbena digitata* Phil. var.
integerrima Botta

Hierba. Endémica. 3200-4500 m.

Países: ARG(JUU). CHL(TAR, ANT).

Junellia erinacea (Gillies & Hook. ex
Hook.) Moldenke

Sin.: *Verbena erinacea* Gillies & Hook. ex
Hook.

Arbusto. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(LRI, MEN, RNE, SJU).

Junellia hookeriana (Covas & Schnack)
N. O'Leary & P. Peralta var.
catamarcensis (Moldenke) P. Peralta &
N. O'Leary

Sin.: *Verbena catamarcensis* Moldenke

Hierba. Endémica. 1000-1100 m.

Países: ARG(CAT).

Junellia hookeriana (Covas & Schnack)
N. O'Leary & P. Peralta var. **hookeriana**

Sin.: *Glandularia hookeriana* Covas &
Schnack, *Verbena crithmifolia* Gillies &
Hook. ex Hook. f. *minor* Gillies & Hook. ex
Hook., *Verbena hookeriana* (Covas &
Schnack) Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA,
LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU,
SLU).

Junellia juniperina (Lag.) Moldenke

Sin.: *Junellia juniperina* (Lag.) Moldenke
var. *grisea* (I.M. Johnst.) Moldenke,
Verbena juniperina Gillies & Hook. ex
Hook., hom. illeg., *Verbena juniperina*
Lag., *Verbena juniperina* Lag. var. *grisea*
I.M. Johnst.

Arbusto. Nativa. 1900-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, RME).

Junellia lavandulaefolia (Phil.) Moldenke
Sin.: *Junellia lavandulaefolia* (Phil.)
Moldenke var. *colchaguensis* (Phil.)
Moldenke, *Verbena colchaguensis* Phil.,
Verbena lavandulaefolia Phil., *Verbena*
lavandulaefolia Phil. var. *colchaguensis*
(Phil.) Reiche

Arbusto. Endémica. 2000-3200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
RME).

Junellia micrantha (Phil.) Múlgura

Sin.: *Junellia chubutensis* (Speg.)
Moldenke, *Junellia micrantha* (Phil.)
Moldenke, nom. inval., *Junellia*
serpyllifolia (Speg.) Moldenke, *Junellia*
wilczekii (Briq.) Moldenke, *Monopyrena*
serpyllifolia Speg., *Verbena chubutensis*
Speg., *Verbena micrantha* Phil., *Verbena*
ramulosa Phil., *Verbena serpyllifolia*
(Speg.) Speg., *Verbena wilczekii* Briq.

Arbusto. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SJU, SCR). CHL(LBO, RME).

Junellia minima (Meyen) Moldenke

Sin.: *Junellia minima* (Meyen) Moldenke
var. *strigosa* Moldenke, *Junellia*
straguloides Moldenke, *Verbena minima*
Meyen, *Verbena straguloides* (Moldenke)
Tronc., comb. illeg.

Arbusto. Nativa. 2800-4600 m.

Países: ARG(JUU, LRI, MEN, SJU,
TUC). CHL(AYP, TAR).

Junellia odonellii Moldenke

Sin.: *Verbena odonelli* (Moldenke) Tronc.,
comb. illeg.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR).
CHL(AIS, MAG).

Junellia origenes (Phil.) N. O'Leary & P.
Peralta

Sin.: *Glandularia origenes* (Phil.) Schnack
& Covas, *Verbena deserticola* Phil.,

Verbena origenes Phil., *Verbena origenes* Phil. var. *glabriflora* Moldenke, *Verbena origenes* Phil. var. *semperi* Moldenke, *Verbena palmata* Reiche

Hierba. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(COR, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Junellia pappigera (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Urbania egañioides* Phil., *Urbania pappigera* Phil.

Arbusto. Nativa. 3100-4800 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA).

Junellia patagonica (Speg.) Moldenke

Sin.: *Junellia coralloides* M. Sheader & A. Sheader, *Junellia morenonis* (Kuntze) J.M. Watson & A.R. Flores, *Verbena morenonis* Kuntze, *Verbena patagonica* Speg.

Arbusto. Endémica. 0-1900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Junellia pseudojuncea (Gay) Moldenke

Sin.: *Thryothamnus junciformis* Phil., *Verbena junciformis* (Phil.) Reiche, *Verbena pseudojuncea* Gay, *Verbena spathulata* Gillies & Hook. ex Hook. var. *pseudojuncea* (Gay) Reiche

Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Junellia selaginoides (Kunth ex Walp.)

Moldenke var. *illapelina* (Phil.) Botta

Sin.: *Junellia illapelina* (Phil.) Moldenke, *Verbena illapelina* Phil., *Verbena selaginoides* Kunth ex Walp. var. *illapelina* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémica. 600-1500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Junellia selaginoides (Kunth ex Walp.)

Moldenke var. *selaginoides*

Sin.: *Verbena alternifolia* Hort ex Schauer, *Verbena polycephala* Turcz., *Verbena selaginoides* Kunth ex Walp.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT, COQ).

Junellia seriphioides (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke

Sin.: *Junellia seriphioides* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *glabra* Moldenke, *Junellia seriphioides* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *tomentosa* Moldenke, *Verbena briquetii* J.F. Macbr., *Verbena echinata* Phil., *Verbena hystrix* Briq., hom. illeg., *Verbena seriphioides* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena seriphioides* Gillies & Hook. ex Hook. var. *glabra* Moldenke, *Verbena seriphioides* Gillies & Hook. ex Hook. var. *lanigera* Hieron., *Verbena seriphioides* Gillies & Hook. ex Hook. var. *tomentosa* Moldenke

Arbusto. Nativa. 1300-4200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Junellia silvestrii (Speg.) Moldenke

Sin.: *Verbena silvestrii* Speg.

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Junellia spathulata (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *glauca* (Gillies & Hook. ex Hook.) Botta

Sin.: *Diostea filifolia* Miers, *Junellia glauca* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke, *Junellia glauca* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *cisandina* (Niederl.) Moldenke, *Junellia spathulata* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *grandiflora* (Schauer) Botta, *Verbena glauca* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena glauca* Gillies & Hook. ex Hook. var. *cisandina* Niederl., *Verbena ochreate* Briq., *Verbena spathulata* Gillies & Hook. ex Hook. var. *grandiflora* Schauer

Arbusto. Endémica. 500-2700 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Junellia spathulata (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *spathulata*

Sin.: *Diostea stenophylla* Miers, *Lantana clarazii* Ball, *Verbena spathulata* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena spathulata* Gillies & Hook. ex Hook. var. *parviflora* Schauer

Arbusto. Endémica. 1900-2200 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Junellia spissa (Sandwith) Moldenke

Sin.: *Verbena spissa* Sandwith

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Junellia succulentifolia (Kuntze) Moldenke

Sin.: *Junellia scabridoglandulosa* (Turrill) Moldenke, *Verbena scabridoglandulosa* Turrill, *Verbena succulentifolia* Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE).

Junellia thymifolia (Lag.) Moldenke

Sin.: *Verbena thymifolia* Lag.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(MAG).

Junellia toninii (Kuntze) Moldenke var.

mulinoides (Speg.) Múlgura & P. Peralta

Sin.: *Junellia mulinoides* (Speg.) Moldenke, *Verbena mulinoides* Speg.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Junellia toninii (Kuntze) Moldenke var. **toninii**

Sin.: *Verbena toninii* Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Junellia tridactylites (Lag.) Moldenke
Sin.: *Junellia minutifolia* (Phil.) Moldenke, *Junellia rosulata* Moldenke f. *alba* Moldenke, *Junellia rosulata* Moldenke f. *rosulata*, *Junellia strutionum* (Speg.) Moldenke, *Verbena bonariensis* Rendle, hom. illeg., *Verbena microphylla* Phil., hom. illeg., *Verbena minutifolia* Phil., *Verbena patagonica* Moldenke, hom. illeg., *Verbena philippiana* Kuntze, nom. illeg., *Verbena prichardi* Rendle, *Verbena struthionum* Speg., *Verbena tridactylites* Lag.

Arbusto. Endémica. 2300-2400 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Junellia trifurcata (Phil.) Moldenke

Sin.: *Verbena trifurcata* Phil.

Subarbusto. Endémica. 2300-3400 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Junellia ulicina (Phil.) Moldenke

Sin.: *Junellia ameghinoi* (Speg.) Moldenke, *Junellia intricata* (Briq.) Moldenke, *Verbena ameghinoi* Speg., *Verbena intricata* Briq., *Verbena ulicina* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Junellia uniflora (Phil.) Moldenke

Sin.: *Junellia uniflora* (Phil.) Moldenke var. *grabiuscula* (Kuntze) Moldenke, *Lycium nanum* Phil., *Verbena uniflora* Phil., *Verbena uniflora* Phil. var. *grabiuscula* Kuntze

Arbusto. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Lampayo F. Phil. ex Murillo

Lampayo castellani Moldenke

Sin.: *Lampaya aratae* Molfino ex Domínguez, *Lampaya aratae* Molfino, nom. nud.

Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(JUU).

Lampayo hieronymi K. Schum. ex Moldenke

Sin.: *Lampayo schickendantzii* Moldenke ex J.H. Hunz., nom. nud.

Arbusto. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL). CHL(ANT).

Lampayo medicinalis F. Phil.

Arbusto. Endémica. 2000-4500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Lantana L., nom. cons.

Lantana achyranthifolia Desf.

Sin.: *Lantana bernardinensis* Briq., *Lantana cabreræ* Moldenke, *Lantana purpurea* Benth. & Hook. f., nom. illeg., *Lippia imbricata* Kuntze, *Lippia purpurea* J. Jacq., nom. illeg.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY, AMA, CON, COA, ITA, SPE).

Lantana balansae Briq.

Sin.: *Lantana balansae* Briq. f. *albiflora* Osten & Moldenke, *Lantana balansae* Briq. var. *peduncularis* Briq.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, LRI, MIS, SFE). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA). URY(LAV).

Lantana camara L.

Sin.: *Camara aculeata* (L.) Kuntze, *Lantana aculeata* L., *Lantana camara* L. f. *mista* (L.) Moldenke, *Lantana camara* L. var. *aculeata* (L.) Moldenke, *Lantana camara* L. var. *flava* (Medik.) Moldenke, *Lantana camara* L. var. *mista* (L.) L.H. Bailey, *Lantana camara* L. var. *nivea* (Vent.) L.H. Bailey, *Lantana flava* Medik., *Lantana foetida* Rusby, *Lantana hirsuta* M. Martens & Galeotti, *Lantana hirsuta* M. Martens & Galeotti subsp. *amazonica* R.W. Sanders, *Lantana horrida* Kunth subsp. *tiliifolia* (Cham.) R.W. Sanders, *Lantana minasensis* Moldenke var. *hispida* Moldenke, *Lantana mista* L., *Lantana nivea* Vent., *Lantana planaltensis* R.W. Sanders, *Lantana tiliifolia* Cham. f. *albiflora* Moldenke, *Lantana tiliifolia* Cham. f. *tiliifolia*, *Lantana triplinervia* Turcz. var. *hispida* (Moldenke) Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, IPA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(LAV).

Notas: Introducida en Chile.

Lantana canescens Kunth

Sin.: *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *cabreræ* Moldenke, *Lantana canescens* Kunth f. *grandifolia* Moldenke, *Lantana canescens* Kunth f. *parvifolia* Moldenke, *Lantana lamiifolia* Otto & D. Dietr., *Lantana venosa* (Rusby) D. Liesner & S. Hirth, *Lippia venosa* Rusby

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(APY).

Lantana entrerriensis Tronc.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

Lantana fucata Lindl.

Sin.: *Camara lilacina* (Desf.) Kuntze var. *parvifolia* Kuntze, *Lantana balansae* Briq. var. *hatschbachii* Moldenke, *Lantana czermakii* Briq., *Lantana fucata* Lindl. var. *albiflora* Moldenke, *Lantana fucata* Lindl. var. *longipes* Moldenke, *Lantana lilacina* Desf., *Lantana lilacina* Desf. var. *media* (Kuntze) Briq., *Lantana lilacina* Desf. var. *parvifolia* (Kuntze) Briq.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(PAY, RIV, TAC).

Lantana grisebachii Stuck. ex Seckt

Sin.: *Camara spicata* (Griseb.) Kuntze, *Lantana cordobensis* Moldenke, nom. superfl., *Lantana grisebachii* Stuck. ex Seckt var. *brachyrachis* Tronc., *Lantana spicata* (Griseb.) Benth. & Hook. ex Kuntze, *Tamonopsis spicata* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).

Lantana hypoleuca Briq.

Sin.: *Lantana mollis* Moldenke, nom. illeg., *Lantana velutinoides* Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON).

Lantana lundiana Schauer

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA, MIE, PAI).

Lantana magnibracteata Tronc.

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Lantana megapotamica (Spreng.) Tronc.

Sin.: *Lantana grisebachii* Stuck. ex Seckt var. *violacea* Tronc., *Lantana velutinoides* Moldenke var. *bruchii* Moldenke, *Lippia megapotamica* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, SJU, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ). URY(LAV, RIV, ROC, TAC, TYT).

Lantana micrantha Briq.

Sin.: *Lantana micrantha* Briq. f. *violacea* Moldenke, *Lantana micrantha* Briq. var. *armata* Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Lantana montevidensis (Spreng.) Briq.

Sin.: *Camara montevidensis* (Spreng.) Kuntze, *Camara sellowiana* (Link & Otto) Kuntze, *Lantana montevidensis* (Spreng.) Briq. f. *albiflora* Moldenke, *Lantana planifolia* (Cham.) Briq., *Lantana reineckii* Briq., *Lantana sellowiana* Link & Otto, *Lantana sellowiana* Link & Otto f. *planifolia* Cham., *Lippia montevidensis* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, MIE, ÑEE). URY(MAL, PAY, RNO, SJO, SOR).

Lantana ramboi (Moldenke) Salimena & Múlgura

Sin.: *Lippia ramboi* Moldenke, *Lippia ramboi* Moldenke var. *pilosa* Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Lantana tilcarensis Tronc.

Arbusto. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Lantana trifolia L. f. *hirsuta* Moldenke

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Lantana trifolia L. f. *trifolia*

Sin.: *Camara trifolia* (L.) Kuntze, *Lantana celtidifolia* Kunth, *Lantana fiebrigii* Hayek, *Lantana trifolia* L. f. *albiflora* Moldenke, *Lantana trifolia* L. var. *pluripedunculata* Moldenke, *Lantana trifolia* L. var. *vulgata* Briq., *Lantana undulata* Schrenk var. *saltensis* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Lantana undulata Schrank

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lantana velutina M. Martens & Galeotti

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY, PHA).

Lantana xenica Moldenke

Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE, TUC).

Lippia L.

Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson var. *alba*

Sin.: *Camara alba* (Mill.) Kuntze, *Lantana alba* Mill., *Lantana geminata* (Kunth) Spreng., *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson var. *globiflora* (L'Hér.) Moldenke, *Lippia citrata* Cham., *Lippia geminata* Kunth, *Lippia geminata* Kunth var. *microphylla* Griseb., *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze, *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze f. *lilacina* Kuntze, *Lippia globiflora*

(L'Hér.) Kuntze var. *geminata* (Kunth) Kuntze, *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze var. *normalis* Kuntze, *Lippia lantanoides* (Lam.) Herter, comb. illeg., *Lippia lantanoides* Herter, hom. illeg., *Lippia rondonensis* Moldenke, *Verbena globiflora* L'Hér., *Verbena lantanoides* (Lam.) Willd. ex Spreng., nom. superfl., *Zappania geminata* (Kunth) Gibert, *Zappania globiflora* (L'Hér.) Poir., *Zappania lantanoides* Lam., nom. superfl., *Zappania odorata* Pers., nom. superfl.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(MAL, RNO, SAO, SJO).

Lippia angustifolia Cham.

Sin.: *Lippia bothrioura* Briq., *Lippia scaposa* Briq., *Lippia scaposa* Briq. var. *melanocaulos* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Lippia arechavaletae Herter ex Moldenke
Sin.: *Lippia arechavaletae* Herter ex Moldenke var. *microphylla* Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, PAY, RNO, SAO, SOR).

Lippia aristata Schauer var. *aristata*

Sin.: *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *angustifolia* (Kuntze) Moldenke, *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *aristata*, *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *brachypoda* Briq., *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *genuina* Briq., *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *latiuscula* Briq., *Lantana aristata*

(Schauer) Briq. var. *longipedunculata* Moldenke, *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *pluripedunculata* (Kuntze) Moldenke, *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *subsessilis* Moldenke, *Lantana eitenorum* Moldenke, *Lippia aristata* Schauer f. *pluripedunculata* Kuntze, *Lippia aristata* Schauer var. *angustifolia* Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, PHA, SPE).

Lippia asperrima Cham.

Sin.: *Lantana ovata* Hayek, *Lippia asperrima* Cham. f. *angustifolia* Moldenke, *Lippia asperrima* Cham. var. *rotundata* Moldenke, *Lippia contermina* Briq. var. *contermina*, *Lippia contermina* Briq. var. *hirsuta* Moldenke, *Lippia phaeocephala* Briq., *Lippia turnerifolia* Cham. var. *camporum* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(CLA, FLA, RIV).

Lippia balansae Briq.

Sin.: *Lantana jorgensenii* Moldenke, *Lippia calliclada* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, SPE).

Lippia brasiliensis (Link) T. Silva

Sin.: *Lantana brasiliensis* Link, *Lantana brasiliensis* Link var. *septentrionalis* Moldenke, nom. superfl., *Lantana longifolia* Mart. ex Colla, *Lantana pernambucensis* Moldenke, *Lantana spicata* Vell.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).

Lippia campestris Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Lippia coarctata Tronc.

Sin.: *Lippia misionera* Deble & B.P. Moreira

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(ART, FLA, PAY, TAC).

Lippia coriacea Briq.

Sin.: *Lippia coriacea* Briq. f. *angustifolia* Briq., nom. inval., *Lippia coriacea* Briq. f. *latifolia* Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CEN, SPE).

Lippia crucifera B.P. Moreira & Deble

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Lippia ekmanii Moldenke

Sin.: *Lippia sclerophylla* Briq. var. *lorentzii* Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Lippia fragrans Turcz.

Sin.: *Buddleja geisseana* Phil., *Lippia geisseana* (Phil.) Soler.

Arbusto. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Lippia grandiflora Mart. & Schauer ex Schauer

Sin.: *Lantana chamaedrifolia* Cham., *Lantana hassleri* Briq., *Lippia pusilla* T. Silva & Salimena

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, COA, MIE).

Lippia grata Schauer

Sin.: *Lippia dumetorum* Herzog, *Lippia gracilis* Schauer, *Lippia hickenii* Tronc., *Lippia laxibracteata* Herzog

Arbusto. Nativa. 300-1600 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE). PRY(BOQ).

Lippia grisebachiana Moldenke

Sin.: *Lantana brachypoda* Hayek, *Lantana venturi* Moldenke, *Lippia brachypoda* (Hayek) Tronc., *Lippia lantanifolia* Griseb., hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Lippia hassleriana Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAA, CON).

Lippia hieraciifolia Cham.

Sin.: *Lippia alegrensis* Briq. ex Augusto, nom. nud., *Lippia intermedia* Cham., *Lippia intermedia* Cham. var. *parvifolia* Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA). URY(RIV).

Lippia hirta (Cham.) Schauer

Sin.: *Dipterocalyx glabrescens* Cham., *Dipterocalyx hirtus* Cham., *Lippia glabrescens* (Cham.) Meisn.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lippia junelliana (Moldenke) Tronc.

Sin.: *Lantana junelliana* Moldenke, *Lippia crenata* (Griseb.) Kuntze, comb. illeg., *Lippia lantanifolia* Griseb. var. *crenata* Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Lippia lasiocalycina Cham.

Sin.: *Lippia phryxocalyx* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Lippia lasiocalyx Herzog

Sin.: *Lippia trollii* Moldenke, *Lippia trollii* Moldenke var. *inermis* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Lippia lippioides (Cham.) Rusby

Sin.: *Camara lippioides* (Cham.) Kuntze, *Lantana chamissonis* (Schauer) Briq., comb. illeg., *Lantana chamissonis* Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks., nom. superfl., *Lippia chamissonis* D. Dietr., nom. superfl., *Riedelia lippioides* Cham.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Lippia longipedunculata Kuntze

Sin.: *Lippia aberrans* (Briq.) Tronc., *Lippia heterophylla* Briq., *Lippia heterophylla* Briq. var. *ciliatifolia* Briq., *Lippia tristis* Briq., *Lippia tristis* Briq. var. *aberrans* Briq., *Lippia tristis* Briq. var. *normalis* Briq., nom. inval.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, PAI, PHA, SPE).

Lippia lorentzii Moldenke

Sin.: *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson var. *lanceolata* (Griseb.) Múlgura, *Lippia chacensis* Moldenke, *Lippia geminata* Kunth var. *lanceolata* Griseb., *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze f. *incana* Kuntze, nom. inval., *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze var. *lanceolata* (Griseb.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, SAL). PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA).

Lippia lupulina Cham.

Sin.: *Lippia clausenii* Turcz., *Lippia francensis* Moldenke, *Lippia lupulina* Cham. f. *alba* Moldenke, *Lippia lupulina* Cham. var. *paraguariensis* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Lippia origanoides Kunth

Sin.: *Lippia affinis* Schauer, *Lippia candicans* Hayek, *Lippia microphylla* Cham., *Lippia obscura* Briq., *Lippia pendula* Briq., *Lippia polycephala* Briq., *Lippia polycephala* Briq. var. *aemilii* Briq., *Lippia rivalis* Moldenke, *Lippia salviifolia* Cham., *Lippia sidoides* Cham.

Arbusto. Nativa. 100-1800 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, CON, COA, PAI, SPE).

Lippia paraguariensis Briq.

Sin.: *Lippia bradeana* Moldenke var. *velutina* Moldenke, *Lippia lupulina* Cham. var. *albiflora* Tronc.

Arbusto. Nativa.

Países: ARG(MIS). PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).

Lippia paranensis (Moldenke) T. Silva & Salimena

Sin.: *Lantana paranensis* Moldenke

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Lippia procurrens (Schauer) T.R.S. Silva

Sin.: *Lantana procurrens* Schauer

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Lippia pumila Cham.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lippia recolletae Morong

Sin.: *Lippia pickelii* Moldenke, *Lippia recolletae* Morong var. *pickelii* (Moldenke) Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Lippia rodriguezii Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CAN).

Lippia salsa Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Lippia sandwichiana Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Lippia sclerophylla Briq.

Sin.: *Lippia sclerophylla* Briq. var. *crenato-dentata* Briq., *Lippia sclerophylla* Briq. var. *loretensis* Moldenke, *Lippia sclerophylla* Briq. var. *subintegra* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, ITA, SPE).

Lippia suffruticosa (Griseb.) Kuntze

Sin.: *Lippia geminata* Kunth var. *suffruticosa* Griseb.

Arbusto. Nativa. 700-2500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC). PRY(AMA, GUA, PHA).

Lippia tegulifera Briq.

Sin.: *Lippia tegulifera* Briq. var. *grisea* Briq., *Lippia tegulifera* Briq. var. *ovata* Briq., *Lippia tegulifera* Briq. var. *parvifolia* Briq., nom. inval., *Lippia tegulifera* Briq. var. *pedunculata* Briq.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

Lippia turbinata Griseb. f. **magnifolia**

Moldenke

Sin.: *Lippia fissicalyx* Tronc.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Lippia turbinata Griseb. f. **turbinata**

Sin.: *Lippia aprica* Phil., *Lippia disepala* Phil., *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze f. *glabriuscula* Kuntze, *Lippia turbinata* Griseb. f. *angustifolia* Osten ex Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA).

Lippia turnerifolia Cham. var. **polytricha**

(Briq.) Múlgura

Sin.: *Lippia polytricha* Briq., *Lippia turnerifolia* Cham. var. *angusta* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

Lippia turnerifolia Cham. var. **turnerifolia**

Sin.: *Lippia modesta* Briq., *Lippia morongii* Kuntze, *Lippia turnerifolia* Cham. var. *sessilifolia* Moldenke

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Lippia villafloredana Kuntze

Sin.: *Lippia asperrima* Cham. var. *longipedunculata* Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU, MIE, PAI). URY(CLA, PAY, SAO).

Mulguraea N. O'Leary & P. Peralta

Mulguraea arequipensis (Botta) N.

O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Dipyrena arequipensis* (Botta) Ravenna, *Junellia arequipense* (Botta) Botta, *Verbena arequipense* Botta

Arbusto. Nativa. 2200-4300 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Mulguraea asparagoides (Gillies &

Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia asparagoides* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke, *Junellia diversifolia* (Kuntze) Moldenke, *Verbena asparagoides* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena diversifolia* Kuntze

Arbusto. Endémica. 2000-2800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL).

Mulguraea aspera (Gillies & Hook. ex

Hook.) N. O'Leary & P. Peralta var. **aspera**

Sin.: *Junellia aspera* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke, *Junellia longidentata* Moldenke var. *glandulosa* Botta, *Junellia tripartita* Moldenke, *Verbena aspera* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena ourostachya* Briq.

Arbusto. Endémica. 200-2200 m.

Países: ARG(CAT, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(TAR).

Mulguraea aspera (Gillies & Hook. ex

Hook.) N. O'Leary & P. Peralta var. **longidentata** (Moldenke) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia aspera* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *longidentata* (Moldenke) Múlgura & P. Peralta, *Junellia*

longidentata Moldenke, *Verbena aspera* Gillies & Hook. ex Hook. var. *longidentata* (Moldenke) Botta

Arbusto. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Mulguraea cedroides (Sandwith) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia cedroides* (Sandwith) Moldenke, *Verbena cedroides* Sandwith

Arbusto. Endémica. 1200

Países: ARG(NEU, RNE).

Mulguraea cinerascens (Schauer) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Diostea cinerascens* (Schauer) Moldenke, *Dipyrena cinerascens* (Schauer) Ravenna, *Junellia cinerascens* (Schauer) Botta, *Verbena cinerascens* Schauer

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Mulguraea echegarayi (Hieron.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia echegarayi* (Hieron.) Moldenke, *Junellia echegarayi* (Hieron.) Moldenke var. *cordifolia* Moldenke, *Junellia echegarayi* (Hieron.) Moldenke var. *puberulenta* Moldenke, *Verbena echegarayi* Hieron.

Arbusto. Endémica. 1900-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Mulguraea hystrix (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia hystrix* (Phil.) Moldenke, *Verbena hystrix* Phil.

Arbusto. Endémica. 2600-3700 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA).

Mulguraea ligustrina (Lag.) N. O'Leary & P. Peralta var. *ligustrina*

Sin.: *Aloysia ligustrina* (Lag.) Small, *Junellia ligustrina* (Lag.) Moldenke, *Lippia*

ligustrina (Lag.) Britton, *Lippia ligustrina* (Lag.) Kuntze, comb. superfl., *Verbena ligustrina* Lag.

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).

Mulguraea ligustrina (Lag.) N. O'Leary & P. Peralta var. *lorentzii* (Niederl. ex Hieron.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia alatocarpa* (Tronc.) Moldenke, *Junellia chubutensis* Moldenke, hom. illeg., *Junellia ligustrina* (Lag.) Moldenke var. *lorentzii* (Niederl. ex Hieron.) Moldenke, *Junellia lorentzii* (Niederl. ex Hieron.) Moldenke, *Verbena alatocarpa* Tronc., *Verbena inconcinna* Briq., *Verbena lorentzii* Niederl. ex Hieron.

Arbusto. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Mulguraea scoparia (Gillies & Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Diostea scirpea* (Phil.) Miers, *Diostea scoparia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Miers, *Diostea scoparia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Miers var. *puberula* (Tronc.) Moldenke, *Dipyrena scoparia* (Hook.) Ravenna, *Junellia scoparia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Botta, *Junellia scoparia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Botta var. *puberula* (Tronc.) Botta, *Lippia aphylla* Phil., *Lippia scirpea* Phil., *Neosparton scirpeum* (Phil.) Ravenna, nom. inval., *Verbena scoparia* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena scoparia* Gillies & Hook. ex Hook. var. *aphylla* (Phil.) Acevedo, comb. illeg., *Verbena scoparia* Gillies & Hook. ex Hook. var. *puberula* Tronc., *Verbena scoparia* Tausch, hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Mulguraea tetragonocalyx (Tronc.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia tetragonocalyx* (Tronc.) Moldenke, *Verbena tetragonocalyx* Tronc.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Mulguraea tridens (Lag.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia tridens* (Lag.) Moldenke, *Verbena carroo* Speg., *Verbena tridens* Lag.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Neosparton Griseb.

Neosparton aphyllum (Gillies & Hook. ex Hook.) Kuntze

Sin.: *Diostea scoparia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Miers var. *subulata* Moldenke, *Verbena aphylla* Gillies & Hook. ex Hook.

Arbusto. Endémica. 0-2600 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

Neosparton ephedroides Griseb.

Sin.: *Lippia darwinii* (Benth. & Hook. f.) Speg., *Neosparton darwinii* Benth. & Hook. f., *Neosparton striatum* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, MEN, NEU, SAL, TUC).

Neosparton patagonicum Tronc.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Parodianthus Tronc.

Parodianthus capillaris Tronc.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COR).

Parodianthus ilicifolius (Moldenke) Tronc.
Sin.: *Casselia ilicifolia* Moldenke, *Timotocia ilicifolia* (Moldenke) Moldenke
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, LRI, SLU).

Petrea L.

Petrea volubilis L.

Sin.: *Petrea racemosa* Nees
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUU, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Phyla Lour.

Phyla betulifolia (Kunth) Greene

Sin.: *Lippia betulifolia* Kunth
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(APY, BOQ, CON, ÑEE).

Phyla nodiflora (L.) Greene var. **minor** (Gillies & Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Lippia caespitosa* Rusby, *Lippia canescens* Kunth, *Lippia filiformis* Schrad., *Lippia litoralis* Phil., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *minor* Gillies & Hook. ex Hook., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *pusilla* Briq., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *rosea* (D. Don) J.F. Macbr., hom. illeg., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *rosea* (D. Don) Munz, *Lippia subterranea* Rusby, *Lippia uncinuligera* Nees ex Walp., *Phyla caespitosa* (Rusby) Moldenke, *Phyla canescens* (Kunth) Greene, *Phyla nodiflora* (L.) Greene f. *copiapina* Acevedo, *Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *canescens* (Kunth) Moldenke, *Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *pusilla* (Briq.) Moldenke, *Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *rosea* (D. Don) Moldenke, *Phyla*

subterranea (Rusby) Moldenke, *Zappania canescens* Gilbert, *Zappania nodiflora* (L.) Lam. var. *rosea* D. Don
Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). PRY(APY, BOQ, ÑEE, NAS, PHA). URY(ART, LAV, MON, ROC, SJO).

Phyla nodiflora (L.) Greene var. **nodiflora**

Sin.: *Blairia nodiflora* (L.) Gaertn., *Lippia nodiflora* (L.) Michx., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *normalis* Kuntze, nom. inval., *Platonia nodiflora* (L.) Raf., *Verbena nodiflora* L., *Zappania nodiflora* (L.) Lam.
Hierba. Nativa.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(SCA). CHL(TAR, ATA). PRY(PHA). URY(ROC).

Phyla nodiflora (L.) Greene var. **reptans** (Kunth) Moldenke

Sin.: *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *reptans* (Kunth) Kuntze, *Lippia reptans* Kunth, *Phyla reptans* (Kunth) Greene, *Phyla strigulosa* (M. Martens & Galeotti) Moldenke, *Phyla strigulosa* (M. Martens & Galeotti) Moldenke var. *sericea* (Kuntze) Moldenke, *Verbena fruticosa* Mill.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE). BRA(RGS). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, PHA). URY(ROC).

Pitreaa Turcz.

Pitreaa cuneato-ovata (Cav.) Caro
Sin.: *Bouchea copiapensis* Gay, *Castelia cuneato-ovata* Cav., *Phelloderma cuneato-ovata* (Cav.) Miers, *Pitreaa chilensis* Turcz., *Priva cuneato-ovata* (Cav.) Rusby, *Priva laevis* Juss.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, CHU, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Priva Adans.

Priva boliviana Moldenke

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, SAL, SDE). PRY(APY, BOQ, PHA).

Recordia Moldenke

Recordia reitzii (Moldenke) Thode & N. O'Leary

Sin.: *Citharexylum reitzii* Moldenke, *Verbenoxylum reitzii* (Moldenke) Tronc.
Árbol. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Rhaphithamnus Miers

Rhaphithamnus spinosus (Juss.) Moldenke

Sin.: *Citharexylum cyanocarpum* Hook. & Arn., *Citharexylum ovatum* Turcz., *Duranta umbellata* Miers, *Duranta umbilicata* Miers, *Rhaphithamnus amoenus* Miers, *Rhaphithamnus buxifolius* Miers, *Rhaphithamnus cyanocarpum* (Hook. & Arn.) Miers, *Rhaphithamnus macranthus* Gand., *Rhaphithamnus parvifolius* Miers, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke f. *albiflorus* G. Kunkel, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.)

Moldenke f. *microphyllus* G. Kunkel, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke var. *inermis* G. Kunkel, *Volkameria spinosa* Juss., *Volkameria verticillata* Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, RME).

Rhaphithamnus venustus (Phil.) B.L. Rob.

Sin.: *Citharexylum venustum* Phil., *Rhaphithamnus longiflorus* Miers, *Rhaphithamnus serratifolius* Miers, *Rhaphithamnus venustus* (Phil.) Skotts., comb. superfl.

Árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(JFE).

Salimenaea N. O'Leary & P. Moroni

Salimenaea integrifolia (Griseb.) N. O'Leary & P. Moroni

Sin.: *Lippia boliviana* Rusby, *Lippia boliviana* Rusby var. *angusta* Moldenke, *Lippia boliviana* Rusby var. *integrifolia* Moldenke, *Lippia integrifolia* (Griseb.) Hieron., *Lippia integrifolia* (Griseb.) Hieron. var. *beckii* Moldenke, *Lippia turbinata* Griseb. var. *integrifolia* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Notas: Cita dudosa para Chile (Troncoso 1993: 49; Múlgura 2003: 32)

Stachytarpheta Vahl

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl

Sin.: *Stachytarpheta australis* Moldenke, *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl

f. *alba* Moldenke ex Tronc. & Botta, *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl f. *albiflora* Moldenke, *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl var. *candicans* Briq., *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl var. *virescens* Briq., *Stachytarpheta dichotoma* (Ruiz & Pav.) Vahl, *Stachytarpheta laevis* Moldenke, *Stachytarpheta maximiliani* Schauer var. *ciliaris* Moldenke, *Stachytarpheta maximiliani* Schauer var. *maximiliani*, *Stachytarpheta patens* Moldenke, *Stachytarpheta polyura* Schauer, *Verbena cayennensis* Rich., *Verbena dichotoma* Ruiz & Pav.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

Stachytarpheta fiebrigii Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CON).

Stachytarpheta gesnerioides Cham.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: PRY(AMA).

Stachytarpheta hassleri Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

Stachytarpheta indica (L.) Vahl

Sin.: *Stachytarpheta angustifolia* (Mill.) Vahl, *Stachytarpheta angustissima* Moldenke, *Stachytarpheta elatior* Schrad. ex Schult., *Verbena angustifolia* Mill., *Verbena indica* L.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Stachytarpheta paraguariensis Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA). PRY(APY).

Tamonea Aubl.

Tamonea curassavica (L.) Pers. var. **cardenasii** (Moldenke) N. O'Leary, P. Peralta & Múlgura

Sin.: *Ghinia cardenasii* Moldenke, *Tamonea cardenasii* (Moldenke) Tronc.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Troncsoa N. O'Leary & P. Moroni

Troncsoa seriphioides (A. Gray) N. O'Leary & P. Moroni

Sin.: *Acantholippia seriphioides* (A. Gray) Moldenke, *Lippia foliolosa* Phil., *Lippia seriphioides* A. Gray

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR).

Verbena L.

Verbena alata Otto ex Sweet

Sin.: *Verbena alata* Cham., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbena bonariensis L. var. **bonariensis**

Sin.: *Verbena bonariensis* L. f. *albiflora* Moldenke, *Verbena bonariensis* L. var. *brevibracteata* Kuntze, *Verbena elongata* Salisb., *Verbena incompta* P.W. Michael, *Verbena litoralis* Kunth var. *brasiliensis* (Vell.) Briq., nom. inval., *Verbena litoralis* Kunth var. *brevibracteata* (Kuntze) N. O'Leary, *Verbena trichotoma* Moench

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,

MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME). PRY(APA, APY, CAA, CEN, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL, FLA, MON).

Verbena bonariensis L. var. **conglomerata** Briq.

Sin.: *Verbena inamoena* Briq.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAA, GUA, SPE). URY(PAY, ROC, SAO, SJO).

Verbena caniuensis Moldenke

Hierba. Endémica. 800

Países: BRA(PAR).

Verbena cuneifolia Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: CHL(RME).

Verbena ephedroides Cham.

Sin.: *Verbena ephedroides* Cham. var. *entreriensis* Tronc.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE).

Verbena filicaulis Schauer

Sin.: *Verbena australis* Moldenke, *Verbena filicaulis* Schauer var. *australis* (Moldenke) Moldenke, *Verbena filicaulis* Schauer var. *pinnatisecta* (Schauer) Moldenke, *Verbena pinnatisecta* Schauer, *Verbena regnelliana* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbena gracilescens (Cham.) Herter var. **gracilescens**

Sin.: *Verbena officinalis* L. var. *gracilescens* Cham., *Verbena parvula* Hayek

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, CON, PAI, PHA). URY(ART, CLA, FLA, PAY, SJO, TAC).

Verbena gracilescens (Cham.) Herter var. **swiftiana** (Moldenke) N. O'Leary

Sin.: *Verbena swiftiana* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Verbena hirta Spreng. var. **gracilis** Dusén

Sin.: *Verbena reitzii* Moldenke var. *castrensis* Moldenke, *Verbena strigosa* Cham.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbena hirta Spreng. var. **hirta**

Sin.: *Verbena hirta* Spreng. var. *dusenii* Moldenke, *Verbena paranensis* Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbena hispida Ruiz & Pav. var. **hispida**

Sin.: *Verbena glandulosa* Moris, *Verbena intermedia* Gillies & Hook. ex Hook. var. *lanuginosa* Moldenke, *Verbena parvula* Hayek f. *albiflora* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, VAL, LBO, BIO, RME). PRY(APY).

Verbena hispida Ruiz & Pav. var. **obovata** (Moldenke) N. O'Leary

Sin.: *Verbena bangiana* Moldenke, *Verbena parvula* Hayek var. *obovata* Moldenke

Hierba. Nativa. 1500-3800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Verbena intercedens Briq.

Sin.: *Verbena bonariensis* L. var. *hispida* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS). PRY(GUA, PAI).

Verbena intermedia Gillies & Hook. ex Hook.

Sin.: *Verbena bonariensis* L. f. *gracilis*, *Verbena bonariensis* L. var. *longibracteata* Kuntze, *Verbena carollata* Briq., *Verbena chamissonis* Walp., nom. illeg., *Verbena gracilis* Cham., hom. illeg., *Verbena intermedia* Gillies & Hook. ex Hook. f. *albiflora* Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth var. *melanopotamica* Hauman, *Verbena tandilensis* Speg., *Verbena tenuis* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU). BRA(RGS, SCA). PRY(MIE). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, RNO, TAC).

Verbena lindbergii Moldenke

Sin.: *Verbena alata* Otto ex Sweet f. *alba* Moldenke, *Verbena malmii* Moldenke, *Verbena reitzii* Moldenke

Hierba. Nativa. 200-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbena litoralis Kunth var. **litoralis**

Sin.: *Verbena affinis* M. Martens & Galeotti, *Verbena approximata* Briq., *Verbena bonariensis* L. var. *litoralis* (Kunth) Gillies & Hook., *Verbena caracasana* Kunth, *Verbena cordobensis* Briq., *Verbena integrifolia* Sessé & Moç., *Verbena integrifolia* Sessé & Moç. f.

albiflora Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth f. *albiflora* (Moldenke) Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth f. *angustifolia* Chodat, *Verbena litoralis* Kunth var. *albiflora* Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth var. *caracasana* (Kunth) Briq., *Verbena litoralis* Kunth var. *glabrior* Benth., *Verbena litoralis* Kunth var. *leptostachya* Schauer, *Verbena litoralis* Kunth var. *pycnostachya* Schauer, nom. inval., *Verbena nudiflora* Nutt. ex Turcz.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(PAY, SAO).

Verbena litoralis Kunth var. **subglabrata** (Moldenke) N. O'Leary & Múlgura

Sin.: *Verbena brasiliensis* Vell., *Verbena brasiliensis* Vell. var. *subglabrata* Moldenke, *Verbena chacensis* Moldenke, *Verbena hansenii* Greene, *Verbena intermedia* Gillies & Hook. ex Hook. f. *glabrescens* Hauman, *Verbena litoralis* Kunth f. *congesta* (Moldenke) Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth var. *brasiliensis* (Vell.) Munir, *Verbena litoralis* Kunth var. *congesta* Moldenke, *Verbena paucifolia* Turcz., *Verbena quadrangularis* Vell.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbena montevidensis Spreng.

Sin.: *Verbena isabellei* Briq., *Verbena minutiflora* Briq. ex Moldenke, *Verbena minutiflora* Briq. ex Moldenke var. *peruviana* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, SAO).

Verbena officinalis L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LSR).

Verbena ovata Cham.

Sin.: *Verbena bonariensis* L. f. *robustior* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, ITA, PAI, SPE).

Verbena rigida Spreng.

Sin.: *Verbena bonariensis* L. f. *venosa* (Gillies & Hook.) Voss, *Verbena bonariensis* L. var. *rigida* (Spreng.) Kuntze, *Verbena bonariensis* L. var. *venosa* (Gillies & Hook.) Chodat, *Verbena doniana* Steud., *Verbena rigida* Spreng. f. *alba* (Trivetts) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. f. *lilacina* (Benary & Bodger ex G. Harrow) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. f. *obovata* Hayek, *Verbena rigida* Spreng. f. *paraguayensis* Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *alba* (Trivetts) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *glandulifera* Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *lilacina* (Benary & Bodger ex G. Harrow) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *obovata* (Hayek) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *reineckii* (Briq.) Moldenke, *Verbena rugosa* D. Don, hom. illeg., *Verbena scaberrima* Cham., *Verbena scabra* Marnock, *Verbena venosa* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena venosa* Gillies & Hook. ex Hook. var. *alba* Trivetts, *Verbena venosa* Gillies & Hook. ex Hook. var. *lilacina* Benary & Bodger ex

G. Harrow, *Verbena venosa* Gillies & Hook. ex Hook. var. *reineckii* Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, LAV, MAL, SJO, TAC).

Verbena sagittalis Cham.

Sin.: *Verbena lindmanii* Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

VIBURNACEAE

Sambucus L.

Sambucus australis Cham. & Schltdl.

Sin.: *Sambucus pentagynia* Larrañaga

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, GUA, ITA, PAI). URY(MON, ROC, TYT).

Sambucus nigra L. subsp. *nigra*

Arbusto o árbol. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, MAG).

Sambucus peruviana Kunth

Sin.: *Sambucus graveolens* Willd., *Sambucus nigra* L. subsp. *peruviana* (Kunth) R. Bolli

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Viburnum L.

Viburnum seemenii Graebn.

Sin.: *Viburnum glabratum* Kunth var. *sphaerocarpum* Griseb., *Viburnum seemenii* Graebn. f. *minus* Killip & A.C. Sm.

Arbusto o arbolito. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

VIOLACEAE

Anchietea A. St.-Hil.

Anchietea exalata Eichler

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anchietea pyrifolia (Mart.) G. Don

Sin.: *Anchietea parvifolia* Hallier f., *Anchietea roquefeuillana* (A. St.-Hil.) Spreng., *Anchietea salutaris* A. St.-Hil., *Noisettia pyrifolia* Mart., *Noisettia roquefeuillana* A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, GUA, ITA). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

Hybanthus Jacq., nom. cons.

Hybanthus melchiorianus Schulze-Menz

Subarbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: PRY(APY, PHA).

Hybanthus nanus (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Sin.: *Ionidium nanum* A. St.-Hil., *Solea nana* (A. St.-Hil.) Spreng.

Subarbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(MON, RNO, SOR).

Noisettia Kunth

Noisettia orchidiflora (Rudge) Ging.

Sin.: *Ionidiopsis fruticulosa* C. Presl, *Ionidium longifolium* (Poir.) Schult., *Ionidium orchidiflorum* (Rudge) Schult., *Noisettia galeopsifolia* A. St.-Hil., *Noisettia longifolia* (Poir.) Kunth, *Viola longifolia* Poir., *Viola lutea* Vell., *Viola orchidiflora* Rudge

Subarbusto. Nativa. 700-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pombalia Vand.

Pombalia atropurpurea (A. St.-Hil.)

Paula-Souza

Sin.: *Alsodeia regnellii* Walp., *Calceolaria atropurpurea* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Hybanthus atropurpureus* (A. St.-Hil.) Taub., *Ionidium atropurpureum* A. St.-Hil., *Solea atropurpurea* (A. St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE). BRA(PAR). PRY(CON).

Pombalia bicolor (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Sin.: *Calceolaria bicolor* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Hybanthus bicolor* (A. St.-Hil.) Baill., *Hybanthus bicolor* (A. St.-Hil.) Baill. var. *genuinus* (Chodat & Hassl.) Hassl., nom. illeg., *Ionidium bicolor* A. St.-Hil., *Ionidium bicolor* A. St.-Hil. var. *genuinum* Chodat & Hassl., nom. illeg., *Ionidium paraguariense* Chodat var. *balansae* Chodat, *Solea bicolor* (A. St.-Hil.) Spreng.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(CAU, GUA, MIE, PAI). URY(MON).

Pombalia bigibbosa (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Sin.: *Calceolaria bigibbosa* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Hybanthus bigibbosus* (A. St.-Hil.) Hassl., *Hybanthus bigibbosus* (A. St.-Hil.) Hassl. var. *paraguariensis* (Chodat) Hassl., *Ionidium bigibbosum* A. St.-Hil., *Ionidium bigibbosum* A. St.-Hil. var. *paraguariensis* Chodat, *Solea bigibbosa* (A. St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Pombalia brevicaulis (Mart.) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus brevicaulis* (Mart.) Baill., *Hybanthus scariosus* (A. St.-Hil.) Baill., *Hybanthus scariosus* (A. St.-Hil.) Baill. var. *brevicaulis* (Mart.) Hassl., *Ionidium brevicaule* Mart., *Ionidium scariosum* A. St.-Hil., *Solea scariosa* (A. St.-Hil.) Spreng.

Subarbusto. Nativa. 200-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Pombalia calceolaria (L.) Paula-Souza

Sin.: *Calceolaria hirsuta* Rusby, *Calceolaria ipecacuanha* (L.) Kuntze, *Calceolaria villosissima* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Hybanthus calceolaria* (L.) Oken, *Hybanthus calceolaria* (L.) Schulze-Menz, *Hybanthus indecorus* (A. St.-Hil.) Baill., *Hybanthus ipecacuanha* (L.) Baill., *Hybanthus villosissimus* (A. St.-Hil.) Taub., *Ionidium calceolarium* (L.) Vent., *Ionidium indecorum* A. St.-Hil., *Ionidium ipecacuanha* (L.) Vent., *Ionidium ipecacuanha* (L.) Vent. f. *grandiflora* Chodat & Hassl., nom. inval., *Ionidium itoubu* (Aubl.) Kunth, *Ionidium villosissimum* A. St.-Hil., *Pombalia ipecacuanha* Vand., *Pombalia itoubu* (Aubl.) Ging., *Solea calceolaria* (L.) Spreng., *Solea ipecacuanha* (L.) Spreng., *Solea itoubu* (Aubl.) Spreng., *Viola*

calceolaria L., *Viola ipecacuanha* L., *Viola itoubu* Aubl.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CON, SPE).

Pombalia chodatii (Hassl.) Paula-Souza
Sin.: *Hybanthus chodati* Hassl., *Hybanthus hasslerianus* (Chodat) Hassl., *Ionidium chodatii* Hassl., *Ionidium guaraniticum* Chodat & Hassl., hom. illeg., *Ionidium hasslerianum* Chodat, *Pombalia hassleriana* (Chodat) Paula-Souza

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI).

Pombalia communis (A. St.-Hil.) Paula-Souza
Sin.: *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub., *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. f. *circaeoides* (Chodat) Schulze-Menz, *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. f. *glabrifolius* (Chodat) Schulze-Menz, *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. var. *glabrifolius* (Chodat) Hassl., *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. var. *typicus* Hassl., nom. inval., *Hybanthus guaraniticus* (A. St.-Hil.) Baill., *Ionidium commune* A. St.-Hil., *Ionidium commune* A. St.-Hil. var. *circaeoides* Chodat, *Ionidium commune* A. St.-Hil. var. *glabrifolium* Chodat, *Ionidium commune* A. St.-Hil. var. *typicum* Chodat, nom. inval., *Ionidium guaraniticum* A. St.-Hil., *Ionidium sylvaticum* A. St.-Hil., *Solea commune* (A. St.-Hil.) Spreng., *Solea guaranitica* (A. St.-Hil.) Spreng., *Solea sylvatica* (A. St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CAN,

CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(SAO).

Pombalia glauca Paula-Souza
Sin.: *Hybanthus glaucus* Schulze-Menz, *Hybanthus oppositifolius* (L.) Taub. var. *glaucus* (Chodat) Hassl., *Ionidium glaucum* Chodat, hom. illeg., *Ionidium oppositifolium* (L.) Roem. & Schult. var. *glaucum* (Chodat) Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, SPE).

Pombalia graminifolia (Chodat) Paula-Souza
Sin.: *Hybanthus graminifolius* (Chodat) Schulze-Menz, *Hybanthus oppositifolius* (L.) Taub. var. *graminifolius* (Chodat) Hassl., *Ionidium graminifolium* Chodat, *Ionidium oppositifolium* (L.) Roem. & Schult. var. *graminifolium* (Chodat) Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(APY, AMA, BOQ, PAI, PHA).

Pombalia lanata (A. St.-Hil.) Paula-Souza
Sin.: *Hybanthus lanatus* (A. St.-Hil.) Baill., *Ionidium lanatum* A. St.-Hil., *Solea lanata* (A. St.-Hil.) Spreng.

Hierba. Nativa. 100-1300 m.

Países: ARG(MIS).

Pombalia leucopogon (Sparre) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus leucopogon* Sparre

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Pombalia longistyla (Schulze-Menz) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus longistylus* Schulze-Menz

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(COA, PHA).

Pombalia oppositifolia (L.) Paula-Souza
Sin.: *Calceolaria circaeoides* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Kuntze, *Calceolaria hieronymi* (Griseb.) Kuntze, *Hybanthus angustifolius* (Kunth) Standl., *Hybanthus circaeoides* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Baill., *Hybanthus hieronymi* (Griseb.) Hassl., *Hybanthus oppositifolius* (L.) Taub., *Hybanthus teucrifolius* (Turcz.) Hassl., *Hybanthus urticaefolius* (Mart.) Baill., *Ionidium angustifolium* Kunth, *Ionidium barzelonense* H. Karst., *Ionidium circaeoides* Humb. & Bonpl. ex Schult., *Ionidium glaziovii* Eichler ex Glaz., nom. nud., *Ionidium hieronymi* Griseb., *Ionidium oppositifolium* (L.) Roem. & Schult., *Ionidium teucrifolium* Turcz., *Ionidium urticifolium* Mart., *Ionidium viscidulum* Kunth, *Pombalia hieronymi* (Griseb.) Paula-Souza, *Solea circaeoides* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Spreng., *Solea oppositifolia* (L.) Spreng., *Solea urticaefolia* (Mart.) Spreng., *Solea viscidula* (Kunth) Spreng., *Viola oppositifolia* L.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, CEN, COA, PHA).

Pombalia paraguariensis (Chodat) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus bicolor* (A. St.-Hil.) Baill. var. *campestris* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Hybanthus paraguariensis* (Chodat) Schulze-Menz, *Ionidium bicolor* A. St.-Hil. var. *campestris* Chodat & Hassl., *Ionidium paraguariense* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(APA, CEN, PAI, SPE).

Pombalia parviflora (Mutis ex L.f.) Paula-Souza

Sin.: *Calceolaria bangii* Rusby, *Calceolaria parviflora* (Mutis ex L.f.)

Kuntze, *Hybanthus glutinosus* (Vent.) Taub., *Hybanthus maytencillo* Baill., *Hybanthus microphyllus* (Schult.) Baill., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. f. *membranaceus* Schulze-Menz, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *argentinensis* Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *bangii* (Rusby) Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *chamaedrifolius* (C. Presl) Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *glutinosus* (Vent.) Hassl., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *latifolius* (Eichler) Hassl., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *typicus* Hassl., nom. inval., *Ionidium chamaedrifolium* C. Presl, *Ionidium glutinosum* Vent., *Ionidium glutinosum* Vent. var. *angustifolium* Eichler, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *latifolium* Eichler, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *paraguayense* Chodat, *Ionidium microphyllum* Kunth, *Ionidium parviflorum* (Mutis ex L.f.) Vent., *Solea glutinosa* (Vent.) Spreng., *Solea parviflora* (Mutis ex L. f.) Spreng., *Viola glutinosa* (Vent.) Poir., *Viola microphylla* Willd. ex Roem & Schult., nom. nud., *Viola parviflora* Mutis ex L.f., *Viola parvifolia* Schult., *Viola parvifolia* Willd. ex Roem. & Schult., *Viola venezuelensis* Steyerem.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, BIO). PRY(APY, CEN, COA, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO).

Pombalia rivalis (Arechav.) Paula-Souza
Sin.: *Hybanthus rivalis* (Arechav.) Herter, *Ionidium rivale* Arechav.
Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: URY(RIV, TAC).

Pombalia serrata (Phil.) Paula-Souza
Sin.: *Acentra serrata* Phil., *Calceolaria lorentziana* (Eichler & Griseb.) Kuntze, *Calceolaria serrata* (Phil.) Kuntze, *Hybanthus lorentzianus* (Eichler ex Griseb.) Taub., *Hybanthus serratus* (Phil.) Hassl., *Hybanthus serratus* (Phil.) Hassl. f. *longifolius* Sparre, *Hybanthus serratus* (Phil.) Hassl. f. *lorentzianus* (Eichler ex Griseb.) Schulze-Menz, *Ionidium lorentzianum* Eichler ex Griseb.

Subarbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Pombalia velutina (Schulze-Menz) Paula-Souza
Sin.: *Hybanthus velutinus* Schulze-Menz
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CAA, CAN, ITA, PHA).

Notas: Según Paula-Souza et al. (Candollea 66: 373. 2011) su presencia en la Argentina, aunque muy probable, debe ser aún confirmada.

Schweiggeria Spreng.

Schweiggeria fruticosa Spreng.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Viola L.

Viola abbreviata J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 2600-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Viola acanthophylla Leyb. ex Reiche
Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Viola aizoon Reiche
Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA).

Viola angustifolia Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO, RME).

Viola anitae J.M. Watson
Hierba. Endémica. 2200-2300 m.
Países: ARG(NEU).

Viola araucaniae W. Becker
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ARA).

Viola argentina W. Becker
Hierba. Endémica. 3000-3200 m.
Países: ARG(LRI).

Viola arvensis Murray subsp. **andina** W. Becker
Hierba. Nativa.
Países: CHL(LLA).

Viola arvensis Murray subsp. **arvensis**
Sin.: *Viola tricolor* L. var. *arvensis* (Murray) Ging.
Hierba. Introducida. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Viola atropurpurea Leyb.
Hierba. Endémica. 2000-4300 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Viola aurantiaca Leyb.
Hierba. Endémica. 2600-3000 m.
Países: CHL(RME).

Viola aurata Phil.
Hierba. Endémica. 900-1100 m.

- Países: CHL(COQ).
- Viola auricolor** Skottsb.
Hierba. Endémica. 1000-1600 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).
- Viola auricula** Leyb.
Hierba. Endémica. 2200-2500 m.
Países: CHL(RME).
- Viola beati** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.
Países: ARG(CAT).
- Viola beckeriana** J.M. Watson & A.R. Flores
Subarbusto. Endémica. 2900-3000 m.
Países: ARG(MEN).
- Viola x blaxlandiae** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 2000-2100 m.
Países: ARG(NEU).
- Viola brachypetala** Gay
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).
- Viola bustillosia** Gay
Hierba. Endémica. 2100-2400 m.
Países: CHL(LBO).
- Viola calchaquiensis** W. Becker
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(TUC).
- Viola calderensis** W. Becker
Sin.: *Viola psammophila* Phil., *Viola pseudasterias* Reiche, *Viola pseudasterias* Reiche var. *psammophila* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).
- Viola capillaris** Pers. var. *araucana* (Phil.) Reiche
Sin.: *Viola dumetorum* Phil. var. *araucana* Phil.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA).
- Viola capillaris** Pers. var. *capillaris*
Sin.: *Viola stipularis* Cav.
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).
- Viola capillaris** Pers. var. *dumetorum* (Phil.) Reiche
Sin.: *Viola dumetorum* Phil.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(BIO).
- Viola cerasifolia** A. St.-Hil.
Sin.: *Viola balsaminoides* Gardner, *Viola conferta* A. St.-Hil., *Viola diffusa* Vell., *Viola tenuis* W. Becker, *Viola tenuis* W. Becker var. *geraldensis* W. Becker, *Viola uleana* W. Becker
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Viola chamaedrys** Leyb.
Hierba. Endémica. 1500-1900 m.
Países: CHL(VAL, RME).
- Viola columnaris** Skottsb.
Hierba. Endémica. 1400-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(AIS, MAG).
- Viola comberi** W. Becker
Hierba. Endémica. 2000-2100 m.
Países: ARG(NEU).
- Viola commersonii** DC. ex Ging.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).
- Viola congesta** Gillies ex Hook. & Arn.
Hierba. Nativa.
- Países: ARG(MEN). CHL(MAU, RME).
- Viola coronifera** W. Becker
Sin.: *Viola coronifera* W. Becker var. *minoriflora* W. Becker
Hierba. Endémica. 900-2800 m.
Países: ARG(NEU).
- Viola corralensis** Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(LSR).
- Viola cotyledon** Ging.
Hierba. Endémica. 900-3300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Viola curicoensis** W. Becker
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: CHL(MAU).
- Viola cyathiformis** W. Becker
Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: CHL(BIO).
- Viola dandoisiorum** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: CHL(ATA).
- Viola dasphylla** W. Becker
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(NEU).
- Viola decipiens** Reiche
Hierba. Endémica. 2700-3500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).
- Viola domeikoana** Gay
Hierba. Endémica. 3000-4200 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).
- Viola escarapela** J.M. Watson & A.R. Flores
Sin.: *Viola pulchella* Leyb. ex Reiche

- Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU).
- Viola escondidaensis** W. Becker
Hierba. Endémica. 1900-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
- Viola evae** Hieron. ex W. Becker
Sin.: *Viola evae* Hieron. ex W. Becker var. *flossdorfii* (Hicken) Nicola, *Viola flos-evae* Hieron., *Viola flos-evae* Hieron. var. *flossdorfii* Hicken
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).
- Viola exsul** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 4200-4300 m.
Países: ARG(SJU).
- Viola farkasiana** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 1400-2100 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO).
- Viola flavicans** Wedd.
Sin.: *Viola castillonii* (W. Becker) Xifreda & Sanso, *Viola exigua* W. Becker, *Viola exigua* W. Becker var. *castillonii* W. Becker
Hierba. Endémica. 2800-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Viola flos-idae** Hieron.
Sin.: *Viola flos-idae* Hieron. var. *pseudovolcanica* Hieron.
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(MEN, SAL, SJU, TUC).
- Viola fluehmannii** Phil.
Hierba. Nativa. 1700-1900 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA).
- Viola friderici** W. Becker
Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).
- Viola frigida** Phil.
Sin.: *Viola borchersii* Phil., *Viola frigida* Phil. var. *borchersii* (Phil.) Reiche, *Viola molfinoana* W. Becker
Hierba. Endémica. 3000-4100 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).
- Viola gelida** J.M. Watson, M.P. Cárdenas & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 4700-4900 m.
Países: CHL(ATA).
- Viola germainii** Sparre
Sin.: *Viola nivalis* Phil.
Hierba. Endémica. 3000
Países: CHL(RME).
- Viola glacialis** Poepp. & Endl.
Hierba. Endémica. 2500
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).
- Viola glechomoides** Leyb.
Hierba. Endémica. 2200-2800 m.
Países: CHL(RME).
- Viola godoyae** Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).
- Viola gracillima** A. St.-Hil.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Viola granulosa** Wedd.
Hierba. Nativa. 4000-4500 m.
Países: CHL(AYP).
- Viola hieronymi** W. Becker
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.
Países: ARG(JUU, LRI).
- Viola huesoensis** Martic.
Sin.: *Viola litoralis* Phil., nom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT).
- Viola huidobrii** Gay
Sin.: *Viola lechlerii* Griseb.
Hierba. Endémica. 100-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA).
- Viola imbricata** Menegoz & Celis-Diez
Hierba. Endémica. 2300-2700 m.
Países: CHL(MAU, BIO).
- Viola joergensenii** W. Becker
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT).
- Viola johnstonii** W. Becker
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT).
- Viola x josephii** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 3000-3100 m.
Países: ARG(TUC).
- Viola karlreicheana** Sanso, Seo & Xifreda
Sin.: *Viola bicolor* Reiche, hom. illeg.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).
- Viola lanifera** W. Becker
Hierba. Endémica. 3000-3200 m.
Países: CHL(COQ).
- Viola leyboldiana** Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL, MAU).
- Viola lilloana** W. Becker
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
- Viola llullaillacoensis** W. Becker
Hierba. Endémica. 4000-4200 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Viola lologensis (W. Becker) J.M. Watson
 Sin.: *Viola cotyledon* Ging. subsp. *lologensis* W. Becker
 Hierba. Endémica. 800-900 m.
 Países: ARG(NEU).
 Notas: Extinta (EX)

Viola maculata Cav. var. **maculata**
 Sin.: *Viola buchtienii* Gand., *Viola grandidentata* Kalela, *Viola macloviana* Gand., *Viola maculata* Cav. f. *chilensis* Weibel, *Viola maculata* Cav. f. *chillanensis* Sparre, *Viola maculata* Cav. f. *constitucionensis* Sparre, *Viola maculata* Cav. f. *grandidentata* (Kalela) Weibel, *Viola maculata* Cav. f. *munozii* Sparre, *Viola maculata* Cav. f. *typica* Weibel, nom. inval., *Viola maculata* Cav. f. *valdiviana* (Kalela) Weibel, *Viola maculata* Cav. var. *buchtienii* (Gand.) Weibel, *Viola maculata* Cav. var. *megaphylla* Ging., *Viola maculata* Cav. var. *pubescens* Reiche, *Viola pyrolifolia* Poir., *Viola valdiviana* Kalela
 Hierba. Endémica. 0-1800 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Viola maculata Cav. var. **microphyllus** (Poir.) DC. ex Ging.
 Sin.: *Viola buchtieniana* W. Becker, *Viola fimbriata* Steud., *Viola maculata* Cav. f. *fimbriata* (Steud.) Weibel, *Viola maculata* Cav. f. *septentrionalis* (Kalela) Weibel, *Viola maculata* Cav. subsp. *microphyllus* (Poir.) Weibel, *Viola microphyllus* Poir., *Viola microphyllus* Poir. f. *macropoda* Speg., *Viola microphyllus* Poir. f. *septentrionalis* Kalela
 Hierba. Endémica. 0-2000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Viola maculata Cav. var. **popetae** Sparre
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(LBO).

Viola magellanica G. Forst.
 Sin.: *Viola magniflora* Molina
 Hierba. Endémica. 0-700 m.
 Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

Viola marcelafferreyrae Nicola, J.M. Watson & A.R. Flores
 Hierba. Endémica. 2500-2600 m.
 Países: ARG(NEU).

Viola marcelorosasii J.M. Watson & A.R. Flores
 Hierba. Endémica. 1600-2300 m.
 Países: CHL(ATA).

Viola mesadensis W. Becker
 Hierba. Endémica. 3500
 Países: ARG(LRI).

Viola metajaponica Nakai
 Hierba. Introducida. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).

Viola micranthella Wedd.
 Hierba. Nativa. 2500-4700 m.
 Países: ARG(JUU, SAL).

Viola minutiflora Phil.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(BIO, ARA).

Viola montagnei Gay
 Sin.: *Viola canobarbata* Leyb., *Viola canobarbata* Leyb. var. *albiflora* W. Becker, *Viola flos-mariae* Hieron., *Viola flos-mariae* Hieron. var. *nivea* Hieron., *Viola flos-mariae* Hieron. var. *virescens* Hieron., *Viola montagnei* Gay var. *glandulosa* Phil.
 Hierba. Endémica. 2900-4200 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Viola muscoides Phil.
 Hierba. Endémica. 700
 Países: CHL(AIS).

Viola nassauvioides Phil.
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(RME).

Viola niederleinii W. Becker
 Hierba. Endémica.
 Países: ARG(LRI).

Viola nubigena Leyb.
 Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
 Países: CHL(RME).

Viola obituaría A.R. Flores & J.M. Watson
 Hierba. Endémica. 1700-1800 m.
 Países: CHL(BIO).

Viola odorata L.
 Hierba. Introducida. 0-2000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LPA, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, TUC). CHL(VAL, LBO, BIO).

Viola ovalleana Phil.
 Hierba. Endémica. 2600-2800 m.
 Países: CHL(COQ).

Viola pachysoma Sheader & J.M. Watson
 Sin.: *Viola caviahuensis* M. Sheader & A. Sheader, nom. illeg., *Viola copahuensis* M. Sheader & A. Sheader, nom. illeg.
 Hierba. Endémica. 2000-2100 m.
 Países: ARG(NEU).

Viola petraea W. Becker
 Sin.: *Viola petraea* W. Becker f. *albida* W. Becker

- Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU).
- Viola philippii** Leyb.
Sin.: *Viola microphylla* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).
- Viola philippii** Leyb. var. **arbuscula** (Phil.) Reiche
Sin.: *Viola arbuscula* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: CHL(RME).
- Viola polypoda** Turcz.
Hierba. Endémica. 0-3500 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).
- Viola portalesia** Gay var. **integerrima** (Phil.) Reiche
Sin.: *Viola integerrima* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU).
- Viola portalesia** Gay var. **portalesia**
Subarbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA).
- Viola portulacea** Leyb.
Hierba. Endémica. 2500-4500 m.
Países: CHL(LBO, RME).
Notas: Taxon dudoso para la Flora Argentina según Nicola (2017)
- Viola pulvinata** Reiche
Hierba. Endémica. 1900
Países: CHL(RME).
- Viola pusilla** Poepp.
Sin.: *Viola asterias* Hook. & Arn., *Viola asterias* Hook. & Arn. var. *genuina* Reiche, *Viola miersii* Bertero ex Steud., *Viola stellata* Miers
Hierba. Endémica. 0-2700 m.
- Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).
- Viola pygmaea** Juss. ex Poir.
Sin.: *Viola orbignyana* J. Rémy
Hierba. Nativa. 3000-4900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Viola regina** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 3000-3200 m.
Países: CHL(VAL).
- Viola reichei** Skottsb.
Sin.: *Viola maculata* Cav. subsp. *reichei* (Skottsb.) Weibel, *Viola reichei* Skottsb. f. *gunckellii* Sparre
Hierba. Endémica. 200-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG).
- Viola rhombifolia** Leyb.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).
- Viola rodriguezii** W. Becker
Sin.: *Viola munozensis* W. Becker
Hierba. Endémica. 3500-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Viola roigii** Rossow
Hierba. Endémica. 3000-3200 m.
Países: ARG(SJU).
- Viola rossowiana** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 1600-2800 m.
Países: ARG(NEU).
- Viola rosulata** Poepp. & Endl.
Hierba. Endémica. 2000-2200 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).
- Viola rubella** Cav.
Sin.: *Viola rubella* Cav. var. *angustifolia* Ging., *Viola rubella* Cav. var. *latifolia* Ging.
- Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).
- Viola rubromarginata** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 1200-1500 m.
Países: ARG(NEU).
- Viola rudolphii** Sparre
Hierba. Endémica. 1100
Países: CHL(LSR, LLA).
- Viola rugosa** Phil. ex W. Becker
Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU).
- Viola sacculus** Skottsb.
Sin.: *Viola auritella* W. Becker, *Viola patagonica* W. Becker, *Viola squamulosa* W. Becker
Hierba. Endémica. 1500-2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).
- Viola santiagoensis** W. Becker
Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).
- Viola sempervivum** Gay
Hierba. Endémica. 2800-3200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
Notas: Cita dudosa para la Flora Argentina según Nicola (2017)
- Viola singularis** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 4000
Países: ARG(CAT).
- Viola skottsbergiana** W. Becker
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).
- Viola spegazzinii** W. Becker
Hierba. Endémica. 3000-4100 m.
Países: ARG(SAL).

Viola subandina J.M. Watson

Sin.: *Viola pusilla* Hook. & Arn. ex Hook.,
hom. illeg.

Hierba. Endémica. 2000-2100 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Viola subdimidiata A. St.-Hil.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Viola taltalensis W. Becker var.**glaberrima** W. Becker

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT).

Viola taltalensis W. Becker var.**taltalensis**

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT).

Viola tectiflora W. Becker

Hierba. Endémica. 900-1800 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Viola toroensis Martic.

Sin.: *Viola chrysantha* Phil., nom. illeg.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Viola tricolor L.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN,
SAL, SCR, TUC). BRA(PAR). CHL(VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, RME).

Viola tridentata Sm.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF).
CHL(LLA, AIS, MAG).

Viola triflabellata W. Becker

Hierba. Endémica. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC).

Viola trochlearis J.M. Watson & A.R.

Flores

Hierba. Endémica. 1600-1700 m.

Países: ARG(NEU).

Viola truncata Meyen var. **glaberrima** W.

Becker

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Viola truncata Meyen var. **glandulifera**

W. Becker

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: CHL(MAU).

Notas: Taxon dudoso para la Flora
Argentina según Nicola (2017)

Viola truncata Meyen var. **truncata**

Hierba. Endémica. 300-2300 m.

Países: CHL(LBO, RME).

Viola tucumanensis W. Becker

Hierba. Endémica. 3200

Países: ARG(TUC).

Viola turritella J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Endémica. 2400-2900 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU).

Viola uniuissima J.M. Watson & A.R.

Flores

Sin.: *Viola unica* J.M. Watson & A.R.
Flores, nom. inval.

Hierba. Endémica. 4000-4500 m.

Países: CHL(TAR).

Viola vallenarensis W. Becker

Hierba. Endémica. 4000-4200 m.

Países: CHL(ATA).

Viola volcanica Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Viola pseudovulcanica* W. Becker

Hierba. Endémica. 1200-4000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU,
TUC). CHL(LBO, MAU, BIO).

Viola volcanica Gillies ex Hook. & Arn.

var. **chillanensis** (Phil.) Reiche

Sin.: *Viola chillanensis* Phil.

Hierba. Endémica. 1300-1400 m.

Países: CHL(BIO).

Viola volcanica Gillies ex Hook. & Arn.

var. **exilis** (Phil.) Reiche

Sin.: *Viola exilis* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Viola watsoniana A.R. Flores & Nicola

Hierba. Endémica. 3600-3700 m.

Países: ARG(JUJ).

Viola werdermannii W. Becker var.**glaberrima** W. Becker

Hierba. Endémica. 700

Países: CHL(TAR, ANT).

Viola werdermannii W. Becker var.**werdermannii**

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT).

Viola xanthopotamica J.M. Watson &

A.R. Flores

Hierba. Endémica. 1900-2800 m.

Países: ARG(LRI).

Viola yrameae J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Endémica. 1500-1800 m.

Países: ARG(NEU).

Viola x zwienenii J.M. Watson & A.R.

Flores

Hierba. Endémica. 1600-1700 m.

Países: ARG(MEN).

VITACEAE**Cissus** L.

Cissus campestris (Baker) Planch.

Sin.: *Vitis campestris* Baker

Arbusto o liana. Nativa. 100-1000 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Cissus duarteana Cambess.

Sin.: *Vitis duarteana* (Cambess.) Baker

Arbusto o liana. Nativa. 0-1500 m.

Países: PRY(AMA, CON, SPE).

Cissus erosa Rich.

Sin.: *Cissus erosa* Rich. var. *guaranitica*

(Chodat) Hassl., *Cissus guaranitica* Chodat

Liana. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Cissus gongylodes (Baker) Planch.

Sin.: *Vitis gongylodes* Baker

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cissus palmata Poir.

Sin.: *Cissus gibertii* (Baker) Planch.,

Cissus palmata Poir. var. *balansana*

Planch., *Cissus paraguayensis* Planch.,

Vitis bakeri Herter, *Vitis commersonii*

Baker, *Vitis gibertii* Baker, *Vitis palmata*

(Poir.) Baker

Liana. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR,

RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON,

ITA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(CAS,

FLA, MON).

Cissus paullinifolia Vell.

Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cissus spinosa Cambess.

Sin.: *Cissus hasslerianus* Chodat, *Vitis*

spinosa (Cambess.) Baker

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR).

PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PHA).

Cissus stipulata Vell.

Sin.: *Cissus macrocarpa* Dunaiski

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cissus subrhomboidea (Baker) Planch.

Sin.: *Cissus scabricaulis* (Baker) Planch.,

Vitis scabricaulis Baker, *Vitis*

subrhomboidea Baker

Liana. Nativa. 200-500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(AMA, CAN).

Cissus sulcicaulis (Baker) Planch.

Sin.: *Cissus gongylodes* (Baker) Planch. f.

alata Planch. ex Chodat & Hassl., *Vitis*

pterophora Baker, *Vitis sulcicaulis* Baker

Liana. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, CON,

COA, GUA, PAI, SPE).

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.

Jarvis

Sin.: *Cissus canescens* Lam., *Cissus*

compressicaulis Ruiz & Pav., *Cissus*

lamarckiana Schult. & Schult. f., *Cissus*

ovata Lam., *Cissus sicyoides* (L.) Miq. f.

lobata (Baker) Planch., *Cissus sicyoides*

L., *Cissus sicyoides* L. f. *apensis* Chodat

& Hassl., *Cissus sicyoides* L. f.

aristolochiifolia Planch., *Cissus sicyoides*

L. f. *balansae* Planch., *Cissus sicyoides* L.

f. *canescens* (Lam.) Planch., *Cissus*

sicyoides L. f. *compressicaulis* (Ruiz &

Pav.) Planch., *Cissus sicyoides* L. f.

foliolata Chodat & Hassl., *Cissus*

sicyoides L. f. *marmorata* Chodat &

Hassl., *Cissus sicyoides* L. f. *ovata* (Lam.)

Planch., *Cissus sicyoides* L. f.

paraguayensis Chodat & Hassl., *Cissus*

sicyoides L. f. *tamoides* (Cambess.)

Planch., *Cissus sicyoides* L. f. *umbrosa*

(Kunth) Planch., *Cissus sicyoides* L. var.

palmata Hassl., *Cissus smilacina* Kunth,

Cissus tamoides Cambess., *Cissus*

tucumana Suess., *Cissus umbrosa* Kunth,

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.

Jarvis subsp. *laciniata* (Baker) Lombardi,

Phoradendron verticillatum (L.) Druce,

Viscum verticillatum L., *Vitis sicyoides* (L.)

Baker, comb. superfl., *Vitis sicyoides* (L.)

Baker f. *laciniata* Baker, *Vitis sicyoides*

(L.) Baker f. *lobata* Baker, *Vitis sicyoides*

(L.) Baker var. *tamoides* (Cambess.)

Baker, *Vitis sicyoides* (L.) Miq., *Vitis*

sicyoides (L.) Miq. var. *ovata* (Lam.)

Baker, *Vitis sicyoides* (L.) Morales, comb.

superfl.

Liana. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,

SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CAN,

CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE,

ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE). URY(RIV,

SAO).

Notas: Su presencia en Chile es dudosa (Lombardi, 2000).

Clematicissus Planch.

Clematicissus pruinata (Weinm.) C.A.

Zanotti & A.M. Panizza

Sin.: *Cissus multiflora* Willd. ex Schult. &

Schult. f., *Cissus pruinata* Weinm., *Cissus*

quinquefolia Sol. ex Sims, hom. illeg.,

Cissus simsiana Roem. & Schult., *Cissus*

simsiana Schult. & Schult. f. var.

pubescens (Baker) Planch., *Clematicissus*

simsiana (Roem. & Schult.) Lombardi,

Hedera quinquefolia Vell., hom. illeg., *Vitis*

simsiana (Roem. & Schult.) Baker, *Vitis*

simsiana Baker var. *pubescens* Baker

Liana. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR,

SCA). PRY(CON).

Clematicissus striata (Ruiz & Pav.)

Lombardi

Sin.: *Adenopetalum palmatum* Turcz., *Cissampelos striata* Ruiz & Pav. var. *deficiens* (Hook. & Arn.) Reiche, *Cissus deficiens* Hook. & Arn., *Cissus striata* Ruiz & Pav. subsp. *striata*, *Cissus striata* Ruiz & Pav. var. *chilensis* Suess., nom. illeg., *Cissus striata* Ruiz & Pav. var. *deficiens* (Hook. & Arn.) Reiche, *Vitis striata* (Ruiz & Pav.) Baker

Liana. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Clematicissus striata (Ruiz & Pav.) Lombardi subsp. **argentina** (Suess.) Lombardi
Sin.: *Cissus bonariensis* Hook. & Arn., *Cissus lanceolata* Malme, *Cissus striata* Ruiz & Pav. subsp. *argentina* (Suess.) Lombardi, *Cissus striata* Ruiz & Pav. var. *argentina* Suess.

Liana. Nativa. 100-3100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA). URY(COL, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

Clematicissus tweediana (Baker) Lombardi

Sin.: *Ampelopsis tweediana* (Baker) Pamp., *Cissus pruinosa* Herzog, hom. illeg., *Cissus tweediana* (Baker) Planch., *Vitis tweediana* Baker

Liana. Nativa. 400-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(SPE).

Parthenocissus Planch.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Sin.: *Hedera quinquefolia* L.

Liana. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(DFE).

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.

Sin.: *Ampelopsis tricuspidata* Siebold & Zucc.

Liana. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE).

Vitis L.

Vitis labrusca L.

Liana. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI).

Vitis vinifera L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA, SJU). CHL(LBO, MAU, BIO, JFE).

VOCHYSIACEAE

Callisthene C. Mart.

Callisthene castellanosi H.F. Martins

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Callisthene hassleri Briq.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Callisthene inundata O.L. Bueno, A.D.

Nilson & R.G. Magalh.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Callisthene kuhlmannii H.F. Martins

Árbol. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Qualea Aubl.

Qualea cordata (Mart.) Spreng. var. **cordata**

Sin.: *Amphilochia cordata* Mart., *Qualea cordata* (Mart.) Spreng. f. *rupestris* Hassl.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Qualea cordata (Mart.) Spreng. var. **dichotoma** (Mart.) M. Lisboa & K. Yamam.

Sin.: *Amphilochia dichotoma* Mart.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Qualea cryptantha (Spreng.) Warm.

Sin.: *Agardhia cryptantha* Spreng.

Árbol. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Qualea glaziovii Warm.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Qualea grandiflora C. Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, CON).

Qualea multiflora C. Mart. subsp. **multiflora**

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Qualea multiflora C. Mart. subsp. **pubescens** (C. Mart.) Stafleu

Sin.: *Qualea multiflora* C. Mart. var. *pubescens* C. Mart., *Qualea pilosa* Warm.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Qualea parviflora C. Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON).

Vochysia Poir.

Vochysia bifalcata Warm.

Árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vochysia cinnamomea Pohl

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Vochysia magnifica Warm.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vochysia tucanorum C. Mart.

Sin.: *Cucullaria tucanorum* Spreng.
Árbol. Nativa. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CON, PHA, SPE).

WINTERACEAE

Drimys J.R. Forst. & G. Forst., nom. cons.

Drimys andina (Reiche) R. Rodr. & Quezada

Sin.: *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. f. *andina* (Reiche) Hauman, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *andina* Reiche, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *quinoensis* Kuntze
Arbusto o arbolito. Endémica. 800-1500 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LSR, LLA).

Drimys angustifolia Miers

Sin.: *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. f. *angustifolia* (Miers) Eichler
Arbusto o arbolito. Endémica. 800-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Drimys brasiliensis Miers subsp. **brasiliensis**

Sin.: *Drimys brasiliensis* Miers var. *campestris* (A. St.-Hil.) Miers, *Drimys granadensis* L. f. var. *campestris* A. St.-Hil.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Drimys brasiliensis Miers subsp. **sylvatica** (A. St.-Hil.) Ehrend. & Gottsb

Sin.: *Drimys brasiliensis* Miers var. *montana* (Miers) Hauman, *Drimys brasiliensis* Miers var. *sylvatica* (A. St.-Hil.) Miers, *Drimys granadensis* L. f. var. *axillaris* A. St.-Hil., *Drimys granadensis* L. f. var. *sylvatica* A. St.-Hil.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).
Notas: Cita dudosa para la Flora Argentina

Drimys confertifolia Phil.

Sin.: *Drimys fernandeziana* Steud., *Drimys fernandezianus* Miers, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *confertifolia* (Phil.) Johow, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *fernandeziana* (Steud.) Reiche
Árbol. Endémica. 100-1200 m.
Países: CHL(JFE).

Drimys winteri J.R. Forst. & G. Forst. var. **chilensis** (DC.) A. Gray

Sin.: *Drimys chilensis* DC., *Drimys chilensis* DC. var. *latifolia* Miers, *Drimys paniculata* Steud., *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. f. *chilensis* Eichler
Árbol. Endémica. 0-1700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

Drimys winteri J.R. Forst. & G. Forst. var. **winteri**

Sin.: *Drimys aromatica* Descourt. ex Baill., *Drimys polymorpha* Spach ex Baill.,

Drimys punctata Lam., *Drimys wintera* Thell., *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. f. *magellanica* Eichler, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *morenonis* Kuntze, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *punctata* (Lam.) DC., *Wintera aromatica* Murray, hom. illeg., *Winterania aromatica* Sol. ex Foth.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, ARA, LSR, LLA, AIS, MAG, RME).

XYRIDACEAE

Abolboda Bonpl.

Abolboda poarchon Seub.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Xyris L.

Xyris asperula Mart.

Sin.: *Xyris simulans* A. Nilsson var. *subtortula* Malme
Hierba. Nativa. 600-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Xyris capensis Thunb.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xyris cervii E.D. Lozano & Wand.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Xyris dissitifolia Kral & Wand.

Hierba. Endémica. 1500-1700 m.
Países: BRA(PAR).

Xyris dusenii Malme
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Xyris filifolia L.A. Nilsson
Hierba. Nativa. 1000
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xyris glandacea L.A. Nilsson
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Xyris guaranítica Malme
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Notas: Citada para Uruguay (Castellanos, 1945a; Smith & Downs, 1965) sin indicar localidad o material de referencia.

Xyris hatschbachii L.B. Sm. & Downs
Hierba. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Xyris hymenachne Mart.
Hierba. Nativa. 400-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xyris jupicai Rich.
Sin.: *Xyris jupicai* Rich. var. *brachylepis* Malme, *Xyris jupicai* Rich. var. *major* (Mart.) L.B. Sm. & Downs, *Xyris laxifolia* Mart. var. *minor* Mart., *Xyris macrocephala* Vahl var. *minor* (Mart.) L.A. Nilsson, *Xyris sellowiana* Kunth f. *humilis* Kunth
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RIV, ROC, TAC).

Xyris lacerata Pohl ex Seub.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Xyris laxifolia Mart.
Sin.: *Xyris laxifolia* Mart. var. *major* Mart.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CAS).

Xyris lucida Malme
Hierba. Nativa. 700-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Xyris macrocephala Vahl
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Xyris metallica Klotzsch & Seub.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Xyris neglecta L.A. Nilsson
Hierba. Nativa. 800-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Xyris piraquarae L.B. Sm. & Downs
Hierba. Endémica. 800-1800 m.
Países: BRA(PAR).

Xyris regnellii L.A. Nilsson
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, ITA, MIE). URY(RIV, TAC).

Xyris reitzii L.B. Sm. & Downs
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Xyris rigida Kunth
Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xyris rigidiformis Malme
Hierba. Nativa.
Países: PRY(CAU, CAN).

Xyris savanensis Miq.
Sin.: *Xyris savanensis* Miq. var. *glabrata* Seub., *Xyris tenella* Molfino
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Xyris schizachne Mart.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN).

Xyris serrana E.D. Lozano & Wand.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Xyris sororia Kunth
Hierba. Nativa. 1300
Países: BRA(PAR, SCA).

Xyris stenophylla L.A. Nilsson
Hierba. Nativa. 700-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xyris tenella Kunth
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN).

Xyris teres L.A. Nilsson
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xyris tortula Mart.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, PAI).

Xyris uninervis Malme
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Xyris vacillans Malme
Hierba. Nativa. 200-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

ZINGIBERACEAE

Hedychium J. König

Hedychium coronarium J. König
Hierba. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, GUA, SPE).

Renealmia L. f.

Renealmia chrysotricha Petersen
Sin.: *Renealmia petasites* Gagnep.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

ZOSTERACEAE

Zostera L.

Zostera chilensis (J. Kuo) S.W.L. Jacobs & D.H. Les
Sin.: *Heterozostera chilensis* J. Kuo
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

ZYGOPHYLLACEAE

Bulnesia Gay

Bulnesia chilensis Gay
Sin.: *Gonoptera chilensis* Turcz.
Arbusto. Endémica. 100-4000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Bulnesia foliosa Griseb.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC). PRY(APY).

Bulnesia retama (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb.
Sin.: *Bulnesia macrocarpa* Phil., *Zygophyllum retama* Gillies ex Hook. & Arn.
Arbusto. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE).

Bulnesia schickendantzii Hieron. ex Griseb.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Fagonia L.

Fagonia chilensis Hook. & Arn.
Sin.: *Fagonia aspera* Gay, *Fagonia chilensis* Hook. & Arn. var. *aspera* (Gay) I.M. Johnst., *Fagonia subaphylla* Phil.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Gonopterodendron (Griseb.) A.C. Godoy-Bürki

Gonopterodendron bonariense (Griseb.) A.C. Godoy-Bürki
Sin.: *Bulnesia bonariensis* Griseb.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA).

Gonopterodendron sarmientoi (Lorentz ex Griseb.) A.C. Godoy-Bürki
Sin.: *Bulnesia gancedoi* Rojas Acosta, *Bulnesia sarmientoi* Lorentz ex Griseb., *Plectrocarpa sarmientoi* (Lorentz ex Griseb.) Christenh. & Byng
Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL). PRY(APY, BOQ, PHA).

Kallstroemia Scop.

Kallstroemia tribuloides (Mart.) Steud.
Sin.: *Ehrenbergia tribuloides* Mart., *Tribulus brasiliensis* Spreng., nom. superfl.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, TUC). PRY(APY, PHA).

Kallstroemia tucumanensis Descole, O'Donnell & Lourteig
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA).

Larrea Cav.

Larrea ameghinoi Speg.
Sin.: *Covillea ameghinoi* (Speg.) Briq., *Larrea simulans* Sandwith
Arbusto. Endémica. 200-800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Larrea cuneifolia Cav.

Sin.: *Neoschroetera cuneifolia* (Cav.) Briq., *Schroeterella cuneifolia* (Cav.) Briq.
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Larrea divaricata Cav.

Sin.: *Larrea monticelli* Perrone & Caro, *Neoschroetera divaricata* (Cav.) Briq., *Schroeterella divaricata* (Cav.) Briq.
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA, VAL, BIO, RME).

Larrea nitida Cav.

Sin.: *Covillea nitida* (Cav.) Vail, *Larrea balsamica* (Molina) I.M. Johnst., *Mimosa balsamica* Molina
Arbusto. Endémica. 0-3400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Metharme Phil. ex Engl.

Metharme lanata Phil. ex Engl.

Sin.: *Metharme lanata* Phil.
Hierba. Endémica. 2100-2200 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Pintoa Gay

Pintoa chilensis Gay

Arbusto. Endémica. 200-1500 m.
Países: CHL(ATA).

Plectrocarpa Gillies ex Hook. & Arn.

Plectrocarpa rougesii Descole, O'Donell & Lourteig

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1400-2600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Plectrocarpa tetracantha Gillies ex Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 300-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU).

Porlieria Ruiz & Pav.

Porlieria chilensis I.M. Johnst.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig

Sin.: *Guaiaacum microphyllum* Baill., *Porlieria lorentzii* Engl., *Porlieria steinbachii* Standl.
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(COL).

Tribulus L.

Tribulus terrestris L.

Sin.: *Tribulus lanuginosus* L.
Hierba. Introducida. 0-3600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, RME). URY(CAS, FLA, MON).