

APÉNDICE 1.

CATÁLOGO DE LAS PLANTAS VASCULARES DEL CONO SUR (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

Julio 2019

LYCOPHYTA
Y MONILOPHYTA

ANEMIIACEAE

Anemia Sw., nom. cons.

Anemia australis (Mickel) M. Kessler & A.R. Sm.

Sin.: *Anemia tomentosa* (Savigny) Sw. var. *australis* Mickel

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Anemia ferruginea Kunth var.

ahenobarba (Christ) Mickel

Sin.: *Anemia ahenobarba* Christ

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Anemia ferruginea Kunth var.

ferruginea

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAA).

Anemia herzogii Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY).

Anemia imbricata Sturm

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Anemia lanata Mickel

Hierba rupícola. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Anemia mandiocana Raddi

Hierba rupícola o terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anemia myriophylla H. Christ

Sin.: *Hemianemia myriophylla* (Christ) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). PRY(CEN, COA, PAI).

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var.

phyllitidis

Sin.: *Anemia fraxinifolia* Raddi, *Anemia haenkei* C. Presl, *Anemia longifolia*

Raddi, *Anemia phyllitidis* (L.) Sw. var.

fraxinifolia (Raddi) Hassl., *Anemia*

phyllitidis (L.) Sw. var. *longifolia* (Raddi)

Hassl., *Anemidictyon phyllitidis* (L.) J.

Sm., *Osmunda phyllitidis* L.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, PAI). URY(ART, CLA).

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var.

tweedieana (Hook.) Hassl.

Sin.: *Anemia tweedieana* Hook.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SAL).

BRA(RGS). PRY(CAN). URY(RIV, TYT).

Anemia raddiana Link

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anemia simplicior (H. Christ) Mickel

Sin.: *Anemia alfredi-rohrii* Brade,

Anemia anthriscifolia Schrad. var.

simplicior H. Christ, *Hemianemia*

anthriscifolia (Schrad.) C. F. Reed var.

simplicior (H. Christ) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE).

BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA).

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var.

anthriscifolia (Schrad.) Mickel

Sin.: *Anemia anthriscifolia* Schrad.,

Anemia ferruginea Kunth var. *anthriscifolia*

(Schrad.) Kunze, *Hemianemia anthriscifolia*

(Schrad.) C. F. Reed

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU,

SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAA, CAN,

CEN, ÑEE).

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var.

tomentosa

Sin.: *Anemia anthriscifolia* Schrad. var.

rotundata Lindm., *Anemia cheilanthoides*

Kaulf., *Anemia deltoidea* (Cav.) Sw.,

Anemia fulva (Cav.) Sw., *Anemia villosa*

Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *deltoidea*

(Cav.) C. Presl, *Hemianemia anthriscifolia*

(Schrad.) C. F. Reed var. *rotundata*

(Lindm.) C.F. Reed, *Osmunda deltoidea*

Cav., *Osmunda fulva* Cav., *Osmunda*

tomentosa Savigny

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS,

ERI, JUJ, LRI, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU,

SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAN,

COA, PAI). URY(ART, CLA, LAV, MAL,

MON, RNO, ROC, SJO, TAC).

Anemia trichorrhiza Gardner ex

Hook. var. **paraguariensis** Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, GUA).

Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.

Hierba. Nativa. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anemia warmingii Prantl

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anemia wettsteinii H. Christ

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

ASPLENIACEAE

Asplenium L.

Asplenium abscissum Willd.

Sin.: *Asplenium firmum* Kunze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, SPE). URY(CLA, RIV, ROC, TAC, TYT).

Asplenium achalense Hieron.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

500-1000 m.

Países: ARG(COR, SAL, SLU, TUC).

Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium argentinum Hieron.

Hierba terrestre. Endémica. 1600-1800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC).

Asplenium auriculatum Sw.

Sin.: *Asplenium auricularium* Desv.,

hom. illeg., *Asplenium gibbosum*

Fée, *Asplenium pimpinellifolium* Fée,

Asplenium semicordatum Raddi

Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN).

Asplenium auritum Sw.

Sin.: *Asplenium auritum* Sw. var.

regognitum (Kunze) Griseb., *Asplenium*

auritum Sw. var. *rigidum* (Sw.) Hook.,

Asplenium rigidum Sw., *Asplenium sulcatum*

Lam. var. *regognitum* (Kunze) Hicken

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

0-1000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, SPE).

Asplenium balansae (Baker) L.

Sylvestre

Sin.: *Antigramma balansae* (Baker) L. Sylvestre & P.G. Windisch, *Phyllitis balansae* (Baker) C. Chr., *Scolopendrium balansae* Baker

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAN, COA, PAI).

Asplenium bradei Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Asplenium brasiliense Sw.

Sin.: *Antigramma ambigua* (Raddi) Tardieu, *Antigramma brasiliensis* (Sw.) T. Moore, *Antigramma oblongata* (Schrad.) C. Presl, *Antigramma repanda* (C. Presl) C. Presl, *Antigramma subsessilis* Fée, *Asplenium dubium* Gaudich., nom. illeg., *Phyllitis brasiliensis* (Sw.) Kuntze var. *decurrens* Sehnem, *Phyllitis brasiliensis* (Sw.) Kuntze, *Scolopendrium ambiguum* Raddi, *Scolopendrium brasiliense* (Sw.) Kunze, *Scolopendrium oblongatum* Schrad., *Scolopendrium repandum* C. Presl

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, GUA, PAI).

Asplenium campos-portoi Brade

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Asplenium castaneum Schldtl. & Cham.

Hierba. Nativa. 0-4700 m.

Países: ARG(MEN). BRA(Fuera del área del proyecto).

Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd.

Sin.: *Asplenium cirrhatum* Rich. ex Willd., *Asplenium radicans* L. var. *cirrhatum* (Rich. ex Willd.) Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Asplenium clausenii Hieron.

Sin.: *Asplenium bangii* Hieron., *Asplenium clausenii* Hiern f. *nigricans* Hiern, *Asplenium clausenii* Hieron. f. *angustifolium* Hieron., *Asplenium clausenii* Hieron. f. *latifolium* Hieron., *Asplenium fluminense* (Lindm.) Hieron., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *commune* Lindm., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *fluminense* Lindm., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *kunzeanum* (Kaulf.) C. Chr., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *lunulatum*, *Asplenium lunulatum* Sw. var. *majus* Mett.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, MIS, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(TAC).

Asplenium cristatum Lam.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Asplenium cuspidatum Lam.

Sin.: *Asplenium auritum* Sw. var. *bipinnatifidum* Kunze, *Asplenium auritum* Sw. var. *bipinnatisectum* Mett., *Asplenium auritum* Sw. var. *mexicanum* (M. Martens & Galeotti) Hieron., *Asplenium fragrans* Sw. var. *mexicanum* (M. Martens & Galeotti) Christ., *Asplenium lacerum* Schldtl. & Cham., *Asplenium mexicanum* M. Martens & Galeotti, *Asplenium pyramidatum* Liebm., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL, TUC).

Asplenium dareoides Desv.

Sin.: *Asplenium concisum* Desv., *Asplenium dareoides* Desv. var. *dentatum* G. Kunkel, *Asplenium magellanicum* Kaulf., *Asplenium philippi* Gand.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Asplenium depauperatum Fée

Sin.: *Asplenium gibertianum* Hook., *Asplenium inciso-alatum* T. Moore, nom. nud., *Asplenium micropteron* Baker, *Asplenium schiffneri* H. Christ, *Asplenium spinescens* Mett. ex Kuhn

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Asplenium drepanophyllum Kunze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(PAI, SPE).

Asplenium feei Kunze ex Fée

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Asplenium flabellulatum Kunze

Sin.: *Asplenium flabellulatum* Kunze var. *partitum* Klotzsch, *Asplenium paraguariense* Hieron., *Asplenium radicans* L. var. *partitum* (Klotzsch) Hieron.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

Asplenium formosum Willd.

Sin.: *Asplenium mexiae* Copel., *Asplenium nanum* Willd., *Asplenium subalatum* Hook. & Arn.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

Asplenium gastonis Fée

Sin.: *Asplenium auritum* Sw. var. *diversifolium* Rosenst., *Asplenium divergens* Mett. ex Baker

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CEN, GUA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC, TYT).

Asplenium gilliesii Hook.

Sin.: *Asplenium debile* Fée, *Asplenium gilliesianum* Hook. & Grev., nom. illeg.

Hierba saxícola. Endémica. 400-4200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP).

Asplenium harpeodes Kunze

Sin.: *Asplenium araucarietii* Sehnem, *Asplenium pendulum* Fée

Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium inaequilaterale Willd.Sin.: *Asplenium brachyotus* Kunze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, PAI). URY(TAC).

Asplenium incurvatum Fée

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium kunzeanum Klotzsch ex Rosenst.Sin.: *Asplenium pteropus* var. *radicans* Mett.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium laciniatum Schrad.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

Asplenium lilloanum de la Sota

Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 700-2500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Asplenium lorentzii Hieron.

Hierba terrestre o saxícola. Nativa.
0-3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Asplenium macrosorum Bertero ex Colla

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Asplenium martianum C. Chr.

Sin.: *Asplenium angustatum* Kunze var. *langsдорffii* Mart., *Asplenium langsдорffii* (Mart.) Sehnem
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium monanthes L.

Sin.: *Asplenium macrocarpum* Desv., *Asplenium menziesii* Hook. & Grev., *Asplenium monanthes* L., *Asplenium monanthes* Murray, hom. illeg.
Hierba terrestre o saxícola. Nativa.
1000-2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(MAL).

Asplenium mucronatum C. Presl

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, SPE).

Asplenium muellerianum Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Asplenium obtusatum G. Forst. var. **obtusatum**

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(IDE, IPA).

Asplenium obtusatum G. Forst. var. **sphenoides** (Kunze) C. Chr. ex Skottsbo.

Sin.: *Asplenium chondrophyllum* Bertero ex Colla, *Asplenium consimile* J. Remy, *Asplenium obliquum* G. Forst. var. *chondrophyllum* (Bertero ex Colla) Mett., *Asplenium obliquum* G. Forst. var. *sphenoides* (Kunze) Mett., *Asplenium sphenoides* Kunze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Asplenium oligophyllum Kaulf.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

Asplenium otites Link

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

Asplenium palmeri Maxon

Hierba terrestre o saxícola. Nativa.
400-1500 m.
Países: ARG(COR, LRI, SAL, TUC).

Asplenium papaverifolium (Kunze) Viane

Sin.: *Asplenium ciliatum* C. Presl ex Bertero, *Asplenium subglandulosum* (Hook. & Grev.) Salvo, Prada & Díaz subsp. *papaverifolium* (Kunze) Salvo, Prada & Díaz, *Gymnogramma chilensis* Brack., *Gymnogramma papaverifolia* Kunze, *Pleurosorus immersus* Fée, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *hirsuta* Villagran, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *nana* Villagran, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *papaverifolius*, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *spgazzinii* Hicken
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Asplenium patagonicum R. Rodr. & R. Guzmán

Sin.: *Asplenium longifolium* Phil. ex Gotschl., nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ARA, LRI, LLA, MAG).

Asplenium peruvianum Desv.

Sin.: *Asplenium fragile* C. Presl, *Asplenium fragile* C. Presl var. *lomense* Weath.
Hierba saxícola. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(ANT).

Asplenium polyodon G. Forst. var. **squamulosum** (C. Chr.) R. Rodr.

Sin.: *Asplenium adiantoides* (L.) C. Chr. var. *squamulosum* C. Chr.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(IPA).

Asplenium praemorsum Sw.

Sin.: *Asplenium nigricans* Kunze
Hierba epífita o epipétrica. Nativa.
800-1600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(SCA).

Asplenium pseudonitidum Raddi

Sin.: *Asplenium ovaescens* Fée
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium pteropus Kaulf.

Hierba epífita. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Asplenium pulchellum Raddi

Sin.: *Asplenium holmbergii* Hicken, *Asplenium serronii* Glaz. ex Fée
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Asplenium pumilum Sw.

Sin.: *Asplenium anthriscifolium* Jacq., *Asplenium pumilum* Sw. var. *anthriscifolium* (Jacq.) Wherry
Hierba terrestre. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Asplenium raddianum Gaudich.

Sin.: *Asplenium brasiliense* Raddi, hom. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium radicans L.

Sin.: *Asplenium alloopterum* Kunze ex Klotzsch, *Asplenium cyrtopterum* Kunze, *Asplenium radicans* Sw. var. *alloopterum* (Kunze ex Klotzsch) C. Chr., *Asplenium rhizophyllum* L., nom. illeg., *Asplenium rizophorum* L., nom. illeg., *Asplenium rizophorum* L., nom. illeg. var. *alloopterum* (Kunze ex Klotzsch) Baker
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium resiliens Kunze

Sin.: *Asplenium lealii* Alston, *Asplenium parvulum* M. Martens & Galeotti, hom. illeg., *Asplenium trichomanes* L. var. *anceps* (Sol.) Milde
Hierba terrestre o saxícola. Nativa.
0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(COL, RNO, SAO).

Asplenium scandicinum Kaulf.

Sin.: *Asplenium adiantoides* Raddi, hom. illeg., *Asplenium chaerophylloides* Fée
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplenium sellowianum C. Presl ex Hieron.

Sin.: *Asplenium lunulatum* Sw. var. *sellowiana* Hieron., *Asplenium lunulatum* Sw. var. *tenerrima* Hieron., *Asplenium sellowianum* C. Presl, nom. nud., *Asplenium ulbrichtii* Rosenst. var. *sellowianum* (Hieron.) Osten & Herter, *Asplenium*

ulbrichtii Rosenst. var. *tenerrimum* (Hieron.) Osten & Herter

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA). URY(ART, CLA, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Asplenium serra Langsd. & Fisch.

Sin.: *Asplenium progrediens* Fée, *Asplenium serra* Langsd. & Fisch. var. *woodwardioidea* (Gardner) Hieron., *Asplenium woodwardioideum* Gardner, *Chamaefilix serra* (Langsd. & Fisch.) Farw.
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 100-1700 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, TYT).

Asplenium serratum L.

Sin.: *Asplenium integrum* Fée, *Asplenium longifolium* Schrad., *Asplenium schomburgkianum* Klotzsch, *Asplenium serratum* L. var. *blanchetianum* Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN).

Asplenium squamosum L.

Sin.: *Asplenium jamesonii* Hook., *Asplenium tucumanense* Hieron.
Hierba terrestre. Nativa. 1100-1200 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC). BRA(SCA).

Asplenium stellatum Colla

Sin.: *Asplenium fernandezianum* Kunze, *Asplenium lunulatum* Sw. var. *stellatum* (Colla) C. Chr.
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(JFE).

Asplenium stuebelianum Hieron.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(FOR). BRA(PAR). PRY(APY, CAA).

Asplenium trilobum Cav.

Sin.: *Asplenium parvulum* Hook., *Asplenium trapezoides* Sw., *Asplenium trilobum* Cav. var. *trapezoides* (Sw.) G. Kunkel
Hierba terrestre o epífita. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Asplenium triphyllum C. Presl

Sin.: *Asplenium imbricatum* Hook. & Grev., *Asplenium rhomboideum* Brack., *Asplenium tenue* C. Presl, *Asplenium ternatum* C. Presl

Hierba saxícola. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

Asplenium ulbrichtii Rosenst.

Sin.: *Asplenium ulbrichtii* Rosenst.
var. *major* Rosenst., *Asplenium ulbrichtii* Rosenst. var. *serrato-dentatum* Rosenst.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN). URY(ART, CAS, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Asplenium uniseriale Raddi

Sin.: *Asplenium amabile* Liebm., *Asplenium ballivianii* Rosenst., *Asplenium radicans* L. var. *uniseriale* (Raddi) L.D. Gómez, *Asplenium radicans* L. var. *uniseriale* (Raddi) Lellinger, comb. superfl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA, PAI).

Asplenium wacketii Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Ceterach Willd.

Ceterach officinarum Willd.

Hierba terrestre. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, SFE).

Hymenasplenium Hayata

Hymenasplenium laetum (Sw.) L.

Regalado & Prada
Sin.: *Asplenium laetum* Sw.
Hierba terrestre. Nativa. 100-1400 m.
Países: ARG(MIS, SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(CAN, CON).

Hymenasplenium triquetrum (N.

Murak. & Moran) L. Regalado & Prada
Sin.: *Asplenium obtusifolium* L., *Asplenium triquetrum* N. Murak. & R.C. Moran
Hierba. Nativa. 100-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

Phyllitis Hill

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

Sin.: *Asplenium scolopendrium* L.,

Scolopendrium vulgare Sm.

Hierba terrestre o saxícola.
Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(TDF).

ATHYRIACEAE

Athyrium Roth

Athyrium dombeyi Desv.

Sin.: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
var. *dombeyi* (Desv.) Hieron.

Hierba terrestre. Nativa. 700-3200 m.
Países: ARG(BAI, COR, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA).

Deparia Hook. & Grev.

Deparia petersenii (Kunze) M.Kato

Sin.: *Asplenium petersenii* Kunze, *Athyriopsis petersenii* (Kunze) Ching, *Diplazium intercalatum* H. Christ, *Diplazium japonicum* (Thunb.) Bedd., *Diplazium petersenii* (Kuntze) H. Christ, *Lunathyrium petersenii* (Kunze) H. Ohba
Hierba rupícola. Introducida. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA).

Diplazium Sw.

Diplazium ambiguum Raddi

Sin.: *Athyrium ambiguum* (Raddi) Milde, *Asplenium radicans* Schkuhr var. *ambiguum* (Raddi) Baker, *Diplazium brasiliense* Rosenst., *Diplazium brasiliense* Rosenst. var. *grossedentata* Rosenst.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, COA, PAI).

Diplazium asplenioides (Kunze) C. Presl

Sin.: *Allantodia asplenioides* Kunze, *Diplazium ambiguum* Raddi var. *pubescens* Rosenst.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).

Diplazium brachycarpum Mynssen &

L. Sylvestre
Hierba. Nativa. 400-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Diplazium celtidifolium Kunze

Sin.: *Diplazium celtidifolium* Kunze var. *puberulum* Stolze

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA). PRY(CAN).

Diplazium cristatum (Desr.) Alston

Sin.: *Asplenium arboreum* Willd., *Asplenium shepherdii* Spreng., *Diplazium arboreum* (Willd.) C. Presl, *Diplazium shepherdii* (Spreng.) Link, *Meniscium cristatum* Desr.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Diplazium divergens Rosenst.

Hierba. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(JUJ).

Diplazium fuenzalidae Espinosa

Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: CHL(IPA).

Diplazium herbaceum Fée

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Diplazium hians Kunze ex Klotzsch

Hierba. Nativa. 200-400 m.
Países: PRY(CAN).

Diplazium leptocarpon Fée

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Diplazium lilloi (Hicken) R.M. Tryon & A. F. Tryon

Sin.: *Athyrium lilloi* (Hicken) Alston, *Athyrium lilloi* (Hicken) C.V. Morton, comb. superfl., *Dryopteris lilloi* (Hicken) Hicken, *Nephrodium lilloi* Hicken
Hierba terrestre. Nativa. 400-1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Diplazium lindbergii (Mett.) H. Christ

Sin.: *Asplenium lindbergii* Mett., *Diplazium blanchetii* (Willd.) C. Presl
Hierba terrestre. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Diplazium mattogrossense A. Samp.

Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Diplazium moccennianum (Sodiolo) C. Chr.

Sin.: *Asplenium moccennianum* Sodiolo
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Diplazium mutilum Kunze

Sin.: *Asplenium blanchetii* Mett. ex Kuhn, *Diplazium blanchetii* (Mett. ex Kuhn) C. Chr.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Diplazium plantaginifolium (L.) Urb.

Sin.: *Asplenium plantaginifolium* L., *Diplazium acuminatum* Raddi
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAN).

Diplazium riedelianum (Bong. ex Kuhn) Kuhn ex C. Chr.

Sin.: *Asplenium riedelianum* Bong. ex Kuhn, *Diplazium riedelianum* Kunze, hom. illeg.
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CAN).

Diplazium rostratum Fée

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Diplazium striatum (L.) C. Presl

Sin.: *Asplenium striatum* L.
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). URY(CLA, TAC).

Diplazium tamandarei Rosenst.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Diplazium turgidum Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Diplazium urticifolium H. Christ

Hierba terrestre. Nativa. 100-400 m.
Países: PRY(CAN).

BLECHNACEAE

Austroblechnum Gasper & V.A.O. Dittrich**Austroblechnum asperum** (Klotzsch)

Gasper & V.A.O. Dittrich
Sin.: *Blechnum asperum* (Klotzsch) J.W. Sturm, *Lomaria aspera* Klotzsch
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Austroblechnum corralense

(Espinosa) Gasper & V.A.O. Dittrich
Sin.: *Blechnum corralense* Espinosa
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(LRI, LLA).

Austroblechnum divergens (Kunze)

Gasper & V.A.O. Dittrich
Sin.: *Blechnum divergens* (Kunze) Mett., *Lomaria divergens* Kunze
Hierba. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Austroblechnum fernandezianum

(Looser) Gasper & V.A.O. Dittrich
Sin.: *Blechnum blechnoides* (Bory) Keyserl. var. *fernandezianum* Looser, *Blechnum mochaenum* G. Kunkel var. *fernandezianum* (Looser) de la Sota
Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 100-1100 m.
Países: CHL(JFE).

Austroblechnum lechleri (T. Moore)

Gasper & V.A.O. Dittrich
Sin.: *Blechnum mochaenum* G. Kunkel var. *mochaenum*, *Lomaria lechleri* T. Moore,
Hierba. Nativa. 500-1800 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, TUC). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Austroblechnum lehmannii (Hieron.)

Gasper & V.A.O. Dittrich
Sin.: *Blechnum lehmannii* Hieron., *Blechnum mexiae* Copel., *Struthiopteris mexiae* (Copel.) Ching
Hierba terrestre. Nativa. 100-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Austroblechnum microphyllum

(Goldm.) Gasper & V.A.O. Dittrich
Sin.: *Blechnum andicola* (Phil.) C. Chr., *Blechnum araucanum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm, *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm f. *germainii* (Hook.) Looser, *Blechnum germanii* (Hook.) H. Christ, *Blechnum microphyllum* (Goldm.) C.V. Morton, *Blechnum poeppigianum* J.W. Sturm, *Lomaria andicola* Phil., *Lomaria araucana* Phil., *Lomaria australis* Kunze, *Lomaria gayana* J. Remy, *Lomaria germainii* Hook., *Lomaria microphylla* Goldm.
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Austroblechnum organense (Brade)

Gasper & V.A.O. Dittrich
Sin.: *Blechnum organense* Brade
Hierba. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Austroblechnum penna-marina

(Poir.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum alpinum* (R. Br.) Mett., *Blechnum alpinum* Mett. var. *elongatum* Mett., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn subsp. *alpina* (R. Br.) T.C. Chambers & P.A. Farrant, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *boliviana* Rosenst. ex Looser, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) Looser, *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn f. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *uliginosa* (F. Phil.) C. Chr., *Blechnum uliginosum* (F. Phil.) C. Chr., *Lomaria alpina* (R. Br.) Spreng., *Lomaria antarctica* Carmich., *Lomaria penna-marina* (Poir.) Trevis, *Lomaria polypodioides* Desv. ex Gaudich., *Lomaria uliginosa* F. Phil., *Lomaria uliginosa* F. Phil. var. *magellanica* F. Phil., *Polypodium penna-marina* Poir., *Stegania alpina* R. Br., *Struthiopteris penna-marina* (Poir.) Maxon & C.V. Morton

Hierba. Cosmopolita. 0-4500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Austroblechnum squamipes (Hieron.)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum lanceolatum* (R. Br.) J.W. Sturm var. *squamipes* Hieron., *Blechnum mochaenum* G. Kunkel subsp. *squamipes* (Hieron.) Prada & Rolleri, *Blechnum mochaenum* G. Kunkel var. *squamipes* (Hieron.) de la Sota, *Blechnum squamipes* (Hieron.) M. Kessler & A.R. Sm.

Hierba. Nativa. 800-1800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA).

Blechnum L.**Blechnum arcuatum** J. Remy ex GaySin.: *Blechnum acuminatum* J.W.

Sturm, hom. illeg., *Blechnum bibreae* Mett., nom. nud.

Hierba. Endémica. 500-1300 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Blechnum asplenioides Sw.

Sin.: *Blechnum ceteracinum* Raddi, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var.

pallidum Rosenst., *Blechnum unilaterale* Sw., nom. superfl.

Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN, COA).

Blechnum auriculatum Cav.

Sin.: *Blechnum australe* L. subsp. *auriculatum* (Cav.) de la Sota, *Blechnum australe* L. f. *genuina* Hieron., nom. inval., *Blechnum australe* L. f. *mucronato-dentata* Rosenst., *Mesothema auriculatum* (Cav.) C. Presl

Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, MIS, RNE, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, RIV, SJO, TAC, TYT).

Blechnum austrobrasilianum de la SotaSin.: *Blechnum glandulosum* Kaulf.

ex Link subsp. *austrobrasilianum* (de la Sota) Prada & Rolleri, *Blechnum rosenstockii* de la Sota, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 200-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(LAV, TYT).

Blechnum blechnoides Keyserl.

Sin.: *Blechnum leyboldtianum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum lomarioides* Mett., hom. illeg., *Blechnum valdiviense* C. Chr., *Lomaria leyboldtiana* Phil., *Spicanta leyboldtiana* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Blechnum × caudatum Cav.

Hierba rupícola o terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Blechnum gracile Kaulf.

Sin.: *Blechnum diplotoxicum* Fée, *Blechnum subdimorphum* Copel.

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, PAI).

Blechnum hastatum Kaulf.

Sin.: *Blechnopteris hastata* (Kaulf.) Trevis., *Blechnum auriculatum* Cav. f. *parvula* (Phil.) C. Chr. & Skottsbo., *Blechnum auriculatum* Cav. f. *remotum* (C. Presl) C. Chr. & Skottsbo., *Blechnum*

auriculatum Cav. var. *hastatum* (Kaulf.)

Looser, *Blechnum auriculatum* Cav.

var. *parvulum* (Phil.) Looser, *Blechnum auriculatum* Cav. var. *trilobum* (C. Presl)

Osten & Herter, *Blechnum australe*L. f. *trilobum* (C. Presl) Rosenst.,*Blechnum australe* L. subsp. *hastatum*(Kaulf.) Prada & Rolleri, *Blechnum**australe* L. var. *hastata* (Kaulf.) Hieron.,*Blechnum australe* L. var. *triloba* (C.Presl) Hieron., *Blechnum brevifolium* G.Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkelf. *acuminatum* G. Kunkel, *Blechnum**brevifolium* G. Kunkel f. *imbricatum*G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G.Kunkel f. *nervosum* G. Kunkel, *Blechnum**brevifolium* G. Kunkel f. *semidecurrens*G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G.Kunkel subsp. *parvulum* (Phil.) G.Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkelvar. *valdiviense* G. Kunkel, *Blechnum**ciliatum* C. Presl, *Blechnum hastatum*Kaulf. f. *alternatum* G. Kunkel, *Blechnum**hastatum* Kaulf. f. *punctatum* (Looser)G. Kunkel, *Blechnum hastatum* Kaulf.var. *minor* Hook., *Blechnum hastatum*Kaulf. var. *trilobum* (C. Presl) G. Kunkel,*Blechnum parvulum* Phil., *Blechnum**remotum* C. Presl, *Blechnum trilobum*C. Presl, *Lomaria hastata* (Kaulf.)Kunze, *Lomaria pubescens* (Hook.)Kunze, *Lomaria triloba* (C. Presl) Fée,*Mesothema hastatum* (Kaulf.) C. Presl,*Mesothema remotum* (C. Presl) C. Presl,*Mesothema trilobum* (C. Presl) C. Presl,*Parablechnum ciliatum* (C. Presl) C.Presl, *Spicanta hastata* (Kaulf.) Kuntze,*Struthiopteris hastata* (Kaulf.) Trevis.,*Struthiopteris remota* (C. Presl) Trevis.,*Struthiopteris triloba* (C. Presl) Trevis.,*Taenitis sagittaefera* Bory

Hierba terrestre o saxícola. Endémica.

0-2500 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU,

RNE, SLU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO,

MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

Blechnum laevigatum Cav.Sin.: *Blechnum distans* C. Presl,*Blechnum distans* C. Presl var.*meridionale* (C. Presl) Rosenst., *Blechnum**glandulosum* Kaulf. ex Link var. *distans*(C. Presl) C. Chr., *Blechnum glandulosum*Kaulf. ex Link var. *meridionale*(Rosenst.) Sehnem, *Blechnum juergensii*Rosenst., *Blechnum occidentale* L. var.*distans* (C. Presl) Baker

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, SLU). BRA(PAR, RGS). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLO, MAL, RIV, SOR, TAC).

Blechnum lanceola Sw.

Sin.: *Blechnum integerrimum* Spreng., *Blechnum lanceola* Sw. f. *minus* Hassl., *Blechnum lanceola* Sw. var. *trifoliatum* (Kaulf.) Kuntze, *Blechnum lanceolatum* Raddi, *Blechnum minutulum* H. Christ, *Blechnum plantagineum* (C. Presl) Hook., *Blechnum trifoliatum* Kaulf., *Mesothema plantaginea* C. Presl, *Spicantha lanceola* (Sw.) Kuntze, *Struthiopteris lanceola* (Sw.) Trevis.

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(APA, CAN, COA, GUA).

Blechnum ludificans Herter

Hierba terrestre. Endémica. 100-200 m. Países: URY(DUR).

Blechnum malacothrix Maxon & C.V. Morton

Hierba. Nativa. 1700-1800 m. Países: ARG(SAL).

Blechnum mochaenum G. Kunkel var. **achalense** (Hieron.) de la Sota

Sin.: *Blechnum blechnoides* (Bory) Keyserl. var. *achalense* (Hieron.) Looser, *Blechnum lanceolatum* (R. Br.) J.W. Sturm var. *achalense* Hieron., *Blechnum mochaenum* G. Kunkel subsp. *achalense* (Hieron.) Prada & Rolleri

Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 500-800 m.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE).

Blechnum moritzianum (Klotzsch) T. Moore

Sin.: *Lomaria moritziana* Klotzsch
Hierba. Nativa. 1600-2000 m. Países: ARG(JUJ, SAL).

Blechnum occidentale L.

Sin.: *Blechnum appendiculatum* Willd., *Blechnum campyloides* (Kunze) J. Sm., *Blechnum cartilagineum* Schkuhr, *Blechnum caudatum* Cav., *Blechnum cognatum* C. Presl, *Blechnum flaccisquama* A. Rojas, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var. *elongatum* Kunze, *Blechnum glandulosum* Kaulf. ex Link var. *pallida* Rosenst., *Blechnum lomarioides* Sodiro,

Blechnum meridionale C. Presl, *Blechnum mucronatum* Fée, *Blechnum occidentale* L. var. *caudatum* (Cav.) Hook., *Blechnum occidentale* L. var. *lacerata* Rosenst., *Blechnum occidentale* L. var. *pubirhachis* Rosenst., *Blechnum scaberulum* Sodiro, *Blechnum suburbicum* Vell., *Lomaria campyloides* Kunze, *Mesothema campyloides* (Kunze) C. Presl

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Blechnum paschale (C. Chr.)

Christenh.

Sin.: *Doodia paschalis* C. Chr.

Hierba terrestre. Endémica. 0-100 m. Países: CHL(IPA).

Blechnum polyodioides Raddi

Sin.: *Asplenium blechnoides* Lag. ex Sw., *Blechnum angustifrons* Fée, *Blechnum blechnoides* (Lag. ex Sw.) C. Chr., comb. illeg., *Blechnum pohlianum* C. Presl, *Blechnum scabrum* Liebm., *Blechnum unilaterale* Sw. f. *maius* Sehnem

Hierba terrestre. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA).

Blechnum x leopoldense (Dutra)

V.A.O. Dittrich & Salino

Sin.: *Blechnum occidentale* L. var. *leopoldense* Dutra

Hierba. Endémica. 100-600 m.

Países: BRA(RGS).

Cranfillia Gasper & V.A.O. Dittrich

Cranfillia caudata (Baker) V.A.O. Dittrich & Gasper

Sin.: *Blechnum sprucei* C. Chr., *Cranfillia sprucei* (C. Chr.) Gasper & V.A.O. Dittrich, nom. superfl., *Lomaria caudata* Baker

Hierba. Nativa. 1400-2400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cranfillia longicauda (C. Chr.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum longicauda* C. Chr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Cranfillia mucronata (Fée) V.A.O.

Dittrich & Gasper

Sin.: *Blechnum sampaioanum* Brade, *Cranfillia sampaioana* (Brade) Gasper &

V.A.O. Dittrich, nom. superfl., *Lomaria mucronata* Fée

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). URY(CLA).

Lomaria Willd.

Lomaria spannagelii (Rosenst.)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum spannagelii* Rosenst., *Blechnum spannagelii* Rosenst. f. *pectinata* Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 400-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lomaridium C. Presl

Lomaridium plumieri (Desv.) C. Presl

Sin.: *Lomaria plumierii* Desv.

Hierba hemiepipífita. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(CLA).

Lomaridium schottii (Colla) Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnum schottii* (Colla) C. Chr., *Lomaria bella* Phil., *Lomaria fernandeziana* Phil., *Lomaria schottii* Colla

Hierba hemiepipífita. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(JFE).

Lomariocycas (J. Sm.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Lomariocycas cycadifolia (Colla)

Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum cycadifolium* (Colla) J.W. Sturm, *Blechnum lanuginosum* (Kunze) J.W. Sturm, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *cycadifolium* (Colla) C. Chr., *Lomaria cycadifolia* Colla, *Lomaria lanuginosa* Kunze, *Struthiopteris cycadifolia* (Colla) Ching

Arborescente. Endémica. 100-1200 m.

Países: CHL(JFE).

Lomariocycas magellanica (Mett.)

Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett., *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. f. *kochii* G. Kunkel, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *angustiseta* (Bory ex d'Urv.) C.V. Morton, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *bipinnatifidum* G. Kunkel, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *setigerum* (Gaudich.) C. Chr., *Blechnum tabulare* (Thunb.) Kuhn var. *setigerum* (Gaudich.) Capurro, *Lomaria*

magellanica Desv. var. *angustiseta* Bory ex d'Urv., *Lomaria magellanica* Desv., *Lomaria setigera* Gaudich.

Arbusto o subarbusto. Endémica.

0-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Lomariocycas obtusifolia (Ettingsh.)

Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum obtusifolium* Ettingsh.,

Lomaria obtusifolia C. Presl, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAN, PAI). URY(CAS, CLA, MAL, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Lomariocycas schomburgkii

(Klotzsch) Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum bradei* Markgr., *Blechnum exiguum* Dutra, *Blechnum imperiale* (Fée & Glaz.) H. Christ, *Blechnum schomburgkii* (Klotzsch) C. Chr., *Blechnum tabulare* (Thunb.) Kuhn var. *imperiale* (Fée & Glaz.) Luetzelb., *Lomaria imperialis* Fée & Glaz., *Lomaria schomburgkii* Klotzsch, *Struthiopteris imperialis* (Fée & Glaz.) Ching

Hierba. Nativa. 100-1800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, GUA).

Lomariocycas yungensis (Ramos

Giacosa) Gasper & A.R. Sm.

Sin.: *Blechnum yungense* Ramos Giacosa

Hierba. Nativa. 1600-1700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Neoblechnum Gasper & V.A.O.

Dittrich

Neoblechnum brasiliense (Desv.)

Gasper & V.A.O. Dittrich

Sin.: *Blechnopsis brasiliensis* (Desv.)

C. Presl, *Blechnum brasiliense* Desv.,

Blechnum brasiliense Desv. var.

angustifolium Sehnem, *Blechnum corcovadense* Raddi, *Blechnum fluminensis*

Vell., *Blechnum nigrosquamatum* Gilb.,

Blechnum nitidum C. Presl

Arborescente. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, SPE). URY(CLA, CLA, TAC, TYT).

Parablechnum C. Presl

Parablechnum chilense (Kaulf.)

Gasper & Salino

Sin.: *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett.,

Lomaria chilensis Kaulf.

Subarbusto. Endémica. 800-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

Parablechnum cordatum (Desv.)

Gasper & Salino

Sin.: *Blechnum arborescens* (Klotzsch & H. Karst.) Hieron., *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. f. *imbricatum* G. Kunkel,

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. var.

reedii (Phil.) Looser, *Blechnum cordatum*

(Desv.) Hieron., *Blechnum euraddianum*

Brade, nom. inval., *Blechnum gilliesii*

(Hook. & Grev.) Mett., *Blechnum*

macahense Brade, *Blechnum ornifolium*

(C. Presl) Ettingsh., *Blechnum peruvianum*

Hieron., *Blechnum raddianum* Rosenst.,

Blechnum raddianum Hieron., hom.

illeg., *Blechnum reedii* (Phil.) Espinosa,

Blechnum regnellianum (Kunze) C. Chr.,

Blechnum regnellianum (Kunze) C. Chr.

var. *elatus* Sehnem, *Blechnum simile*

Sehnem, *Lomaria arborescens* Klotzsch

& H. Karst., *Lomaria brasiliensis* Raddi,

hom. illeg., *Lomaria cordata* Desv.,

Lomaria gilliesii Hook. & Grev., *Lomaria*

ornifolia C. Presl, *Lomaria reedii* Phil.,

Lomaria regnelliana Kunze, *Lomaria*

serrulosa Desv., *Struthiopteris brasiliensis*

(Raddi) Maxon & C.V. Morton

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ,

MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR,

TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,

VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS,

MAG, RME, JFE). PRY(CAU, COA, SPE).

URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO, TAC).

Parablechnum usterianum (Christ)

Gasper & Salino

Sin.: *Blechnum usterianum* (Christ) C.

Chr., *Lomaria usteriana* Christ

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Salpichlaena J. Sm.

Salpichlaena papyrus G.G. Cárdenas,

Tuomisto & Lehtonen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J. Sm.

Sin.: *Blechnum scandens* Bory,

Blechnum volubilis Kaulf., *Salpichlaena*

scandens (Bory) C. Presl

Hierba. Nativa. 200-1900 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Telmatoblechnum Perrie, D.J.

Ohlsen & Brownsey

Telmatoblechnum serrulatum (Rich.)

Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey

Sin.: *Blechnopsis serrulata* (Rich.) C.

Presl, *Blechnum angustifolium* Willd.,

Blechnum angustum Schrad., *Blechnum*

calophyllum Langsd. & Fisch., *Blechnum*

mollucanum Desv., *Blechnum serrulatum*

Rich., *Blechnum serrulatum* Rich. var. *stierii*

(Rosenst.) Rosenst., *Blechnum stagninum*

Raddi, *Blechnum stierii* Rosenst., *Spicanta*

serrulata (Rich.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APA, CEN, COA, PAI, SPE).

CULCITACEAE

Culcita C. Presl

Culcita conifolia (Hook.) Maxon

Sin.: *Dicksonia conifolia* Hook.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CYATHEACEAE

Alsophila R. Br.

Alsophila capensis (L.f.) J. Sm. subsp.

capensis

Sin.: *Polypodium capense* L.f.

Arborescente. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Alsophila capensis (L. f.) J. Sm. subsp.

polypodioides (Sw.) D.S. Conant

Sin.: *Cyathea polypodioides* Sw.,

Hemitelia gardneriana C. Presl

Arborescente. Endémica. 900-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant

Sin.: *Cyathea cuspidata* Kunze, *Cyathea hassleriana* H. Christ var. *hassleriana*, *Cyathea hassleriana* H. Christ var. *rojasii* H. Christ, *Nephelea cuspidata* (Kunze) R.M. Tryon

Arborescente. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAA, CAN, COA).

Alsophila elata O.G. Martínez

Arbolito. Introducida. 1000-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Alsophila odonelliana (Alston) Lehnert

Sin.: *Cyathea odonelliana* Alston
Arborescente. Nativa. 900-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Alsophila setosa Kaulf.

Sin.: *Alsophila dorsalis* (Fée) H. Christ, *Alsophila setosa* Kaulf. var. *crenata* Rosenst., *Cyathea leucosticta* Fée, *Cyathea setosa* (Kaulf.) Domin, *Hemitelia beyrichiana* C. Presl, *Hemitelia setosa* (Kaulf.) Mett., *Hemitelia setosa* Kaulf. var. *crenata* Rosenst., *Lophosoria dorsalis* Fée, *Nephelea setosa* (Kaulf.) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, COA, PAI, SPE).

Alsophila sternbergii (Pohl ex Sternb.) D.S. Conant

Sin.: *Cyathea acanthomelas* Fée, *Cyathea rojasii* C. Chr., *Cyathea sternbergii* Pohl ex Sternb., *Nephelea sternbergii* (Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon, *Nephelea sternbergii* (Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon var. *acanthomelas* (Fée) Gastony, *Nephelea sternbergii* (Pohl ex Sternb.) R.M. Tryon f. *acanthomelas* (Fée) Brade
Arborescente. Nativa. 100-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAA, CAN, COA, PAI).

Cyathea Sm.**Cyathea atrovirens** (Langsd. & Fisch.) Domin

Sin.: *Alsophila atrovirens* (Langsd. & Fisch.) C. Presl, *Alsophila compta* (Mart.) Mart., *Alsophila dryopteroides* Domin var. *fallacina* Domin, *Alsophila hookeriana* Hook., *Alsophila kleinii* Sehnem, *Alsophila leptocladia* Fée, *Alsophila miquelii* Kunze ex Rosenst., *Alsophila proceroides* Rosenst., *Alsophila*

radens Kaulf., *Alsophila trichophlebia* Baker, *Alsophila verruculosa* Rosenst., *Cyathea compta* Mart., *Cyathea radens* (Kaulf.) Domin, *Polypodium atrovirens* Langsd. & Fisch., *Trichipteris atrovirens* (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon, *Trichipteris compta* (Mart.) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin

Sin.: *Alsophila campestrum* Sehnem, *Alsophila corcovadensis* (Raddi) C. Chr., *Alsophila elegans* Mart. var. *crenato-serrata* Sehnem, *Polypodium corcovadense* Raddi, *Trichipteris corcovadensis* (Raddi) Copel., *Trichipteris elegans* Fée
Arborescente. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyathea delgadii Pohl ex Sternb.

Sin.: *Cyathea feei* Glaz. ex Fée, *Cyathea hirtula* Mart., *Cyathea schanschin* Mart., *Cyathea vestita* Mart.
Arborescente. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA, PAI, SPE).

Cyathea dichromatolepis (Fée) Domin

Sin.: *Alsophila christiana* Sehnem, nom. nud., *Alsophila dichromatolepis* Fée, *Alsophila glaziovii* H. Christ, hom. illeg., *Alsophila serrae* Sehnem, *Trichipteris dichromatolepis* (Fée) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyathea feeana (C. Chr.) Domin

Sin.: *Alsophila elegans* Mart., *Alsophila feeana* C. Chr., *Alsophila glaziovii* Baker, hom. illeg., *Trichipteris feeana* (C. Chr.) Copel.
Arborescente. Nativa. 500-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyathea gardneri Hook.

Sin.: *Alsophila gardneri* Hook., *Cyathea gardneri* (Hook.) Lellinger, *Sphaeropteris gardneri* (Hook.) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Cyathea hirsuta C. Presl

Sin.: *Alsophila hirta* Kaulf., *Trichipteris armata* (Sw.) R.M. Tryon, p.p.
Arborescente. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyathea iheringii (Rosenst.) Domin

Sin.: *Alsophila iheringii* Rosenst.
Arborescente. Nativa. 100-1100 m.
Países: BRA(SCA).

Cyathea leucofolis Domin

Sin.: *Alsophila leucolepis* Mart., *Alsophila nigrescens* (Hook.) Sehnem, *Alsophila paleolata* Mart. var. *nigrescens* Hook., *Cyathea axillaris* (Fée) Lellinger, *Phegopteris axillaris* Fée, *Polypodium axillare* Raddi, *Trichipteris leucolepis* (Mart.) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyathea microdonta (Desv.) Domin

Sin.: *Polypodium microdonta* Desv.
Arborescente. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Cyathea miersii (Hook.) Domin

Sin.: *Alsophila acantha* Sehnem, *Alsophila decipiens* Fée, *Alsophila miersii* Hook.
Arborescente. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Cyathea myriotricha (Baker) R.C.

Moran & J. Prado
Sin.: *Polypodium myriotrichum* Baker
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cyathea phalerata Mart.

Sin.: *Alsophila phalerata* (Mart.) Mart., *Alsophila reitzii* Sehnem, *Alsophila virens* Sehnem, nom. nud., *Trichipteris phalerata* (Mart.) Barrington
Arborescente. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyathea poeppigii (Hook.) Domin

Sin.: *Alsophila impressa* Fée, *Alsophila plagiopteris* Mart., *Alsophila poeppigii* Hook., *Alsophila tijucensis* Fée, *Cyathea plagiopteris* (Mart.) Domin, *Sphaeropteris elongata* (Hook.) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(COA).

Cyathea praecineta (Kunze) Domin

Sin.: *Alsophila praecineta* Kunze
Arborescente. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyathea pungens (Willd.) Domin

Sin.: *Alsophila procera* (Willd.) Desv., *Alsophila pungens* (Willd.) C. Presl, *Polypodium procerum* Willd., *Polypodium pungens* Willd., *Trichipteris procera*

(Willd.) R.M. Tryon, *Trichipteris pungens*
(Willd.) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cyathea uleana (Samp.) Lehnert
Sin.: *Hemitelia uleana* Samp.
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Cyathea villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Alsophila cipoensis* Sehnem,
Alsophila rigidula Mart., *Alsophila villosa*
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Desv.,
Trichipteris villosa (Humb. & Bonpl. ex
Willd.) R.M. Tryon
Arborescente. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

CYSTOPTERIDACEAE

Cystopteris Bernh.

Cystopteris apiiformis Gand.
Sin.: *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
var. *apiiformis* (Gand.) C. Chr.
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SJU, SCR, TDF). CHL(AYP, COQ, VAL,
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG,
RME, JFE).

Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell
Sin.: *Asplenium diaphanum* (Bory)
Lojac., *Athyrium fumaroides* C.
Presl, *Cystopteris canariensis* C. Presl,
Cystopteris emarginulata C. Presl,
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp.
canariensis (C. Presl) H. Christ,
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp.
diaphana (Bory) Litard., *Cystopteris*
fumaroides (C. Presl) Kunze, *Polypodium*
diaphanum Bory
Hierba. Nativa.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, FOR,
JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS,
SCA). URY(CLA, RIV).

DENNSTAEDTIACEAE

Blotiella R. M. Tryon

Blotiella lindeniana (Hook.)
R.M. Tryon
Sin.: *Lonchitis lindeniana* Hook.

Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Dennstaedtia Bernh.

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore
Sin.: *Dennstaedtia decomposita* (H.
Christ) H. Christ, *Dennstaedtia rubiginosa*
(Kaulf.) T. Moore, *Dicksonia angustidens* C.
Presl, *Dicksonia apiifolia* Sw. var. *dissecta*
Desv. ex Kunze, *Dicksonia cicutaria* Sw.,
Dicksonia decomposita H. Christ, *Dicksonia*
rubiginosa Kaulf.
Hierba. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, COA).

Dennstaedtia cornuta (Kaulf.) Mett.
Sin.: *Dicksonia cornuta* Kaulf.
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Dennstaedtia dissecta (Sw.) T. Moore
Sin.: *Dicksonia dissecta* Sw., *Polypodium*
dissectum Sw., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 300-2600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Dennstaedtia glauca (Cav.) C. Chr.
ex Looser
Sin.: *Davallia glauca* Cav., *Dennstaedtia*
lambertiana (J. Remy) C. Chr., *Dicksonia*
lambertiana J. Remy
Hierba. Nativa. 300-3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron.
Sin.: *Dennstaedtia bradeorum* Rosenst.,
Dennstaedtia exaltata (Kunze) Hieron.,
comb. illeg., *Dennstaedtia gracilis* A.
Rojas & Tejero, *Dennstaedtia lagerheimii*
(Sodirol) C. Chr., *Dennstaedtia*
tamadareii Rosenst., *Dennstaedtia*
tenera (C. Presl) Mett., *Dennstaedtia*
tenera (C. Presl) Mett. var. *dentata*
Hieron., *Dicksonia altissima* Sm., nom.
superfl., *Dicksonia exaltata* Kunze, nom.
superfl., *Dicksonia globulifera* (Poir.)
Kuntze, *Dicksonia lagerheimii* Sodirol,
Dicksonia tenera C. Presl, *Polypodium*
globuliferum Poir.
Hierba. Nativa. 200-2300 m.
Países: ARG(CHA, COR, JUJ, MIS,
SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAA, CAN, COA). URY(CLA,
PAY, RIV, TAC).

Dennstaedtia obtusifolia (Willd.) T. Moore
Sin.: *Dennstaedtia erosa* (Kunze) T.
Moore, *Dicksonia erosa* Kunze, *Dicksonia*
obtusifolia Willd.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CEN, COA, MIE, PAI).

Histiopteris (J. Agardh) J. Sm.

Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.
Sin.: *Histiopteris incisa* (Thunb.)
J. Sm. var. *flavescens* (Colla) C. Chr.,
Litobrochia appendiculata (Kaulf.) J.
Remy, *Litobrochia incisa* (Thunb.) C.
Presl, *Litobrochia patens* (Kunze) J.
Remy, *Pteridium patens* Kunze, *Pteris*
flavescens Colla, *Pteris incisa* Thunb.,
Pteris vespertilionis Labill. var. *flavescens*
(Colla) J. Agardh
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(LLA, AIS, MAG, JFE).

Hypolepis Bernh.

Hypolepis acantha Schwartsb.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Hypolepis hostilis (Kunze) C. Presl
Sin.: *Cheilanthes hostilis* Kunze
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Hypolepis mitis Kuhn
Hierba. Nativa. 200-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypolepis poeppigii (Kunze) R. Rodr.
Sin.: *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
var. *pubescens* Phil., *Dryopteris sturmii*
(Phil.) C. Chr., *Hypolepis poeppigii*
(Kunze) Mett. ex Maxon, comb. illeg.,
Hypolepis rugosula (Labill.) J. Sm. var.
poeppigii (Kunze) C. Chr. & Skotts.,
nom. illeg., *Hypolepis rugosula* (Labill.)
J. Sm. var. *poeppigii* (Kunze) C. Chr.,
Phegopteris poeppigii (Kunze) Fée ex
J. Remy, *Phegopteris sturmii* Phil.,
Polypodium poeppigii Kunze
Hierba. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Hypolepis repens (L.) C. Presl

Sin.: *Cheilanthes repens* (L.) Kaulf.,
Lonchitis repens L.

Hierba. Nativa. 300-700 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CON).

Hypolepis rigescens (Kunze) T. Moore
var. **paranaensis** Schwartsb.

Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(PAR).

Hypolepis rigescens (Kunze) T. Moore
var. **rigescens**

Sin.: *Cheilanthes rigescens* Kunze,
Polypodium punctatum Thunb. f. *rigescens*
(Kunze) Baker
Hierba. Nativa. 400-2000 m.
Países: BRA(PAR).

Hypolepis rugosula (Labill.) J. Sm.
subsp. **poepigiana** (Mett.) Schwartsb.
& J. Prado

Sin.: *Hypolepis chilensis* Fée, nom. illeg.,
Hypolepis hauman-merckii Hicken, *Hypolepis*
poepigiana Mett., *Phegopteris poepigii*
(Kunze) Fée ex Gay var. *hirsuta* Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,
RNE). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS, MAG, JFE).

Hypolepis rugosula (Labill.) J. Sm.
subsp. **pradoana** Schwartsb.

Hierba. Nativa. 1200-2600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypolepis stolonifera Fée var.

delasotae Arana, A. Yañez &
Schwartsb.

Hierba. Endémica. 400-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Hypolepis stolonifera Fée var.
nebularis Schwartsb.

Hierba. Nativa. 1300-2400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hypolepis stolonifera Fée var.
stolonifera

Hierba. Nativa. 300-2300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Microlepia C. Presl**Microlepia speluncae** (L.) T. Moore

Sin.: *Polypodium speluncae* L.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(SCA). PRY(APA, CEN,
GUA, PAI).

Microlepia strigosa (Thunb.) C. Presl

Sin.: *Trichomanes strigosum* Thunb. ex
A. Murray

Hierba. Nativa. 100-300 m.
Países: CHL(IPA).

Paesia J. St.-Hil.**Paesia glandulosa** (Sw.) Kunth

Sin.: *Cheilanthes glandulifera* Fée,
Cheilanthes glandulosa Sw., *Pteridium*
amazonica H. Christ

Hierba. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pteridium Gled. ex Scop., nom.
cons.**Pteridium esculentum** (G. Forst.)

Cockayne var. **arachnoideum**

Sin.: *Aspidium brasilianum* C. Presl,
Cheilanthes aquilinaris Fée, *Cystopteris*
brasiliiana (C. Presl) C. Presl, *Filix-*
foemina aquilina (L.) Farwell var.
arachnoidea (Kaulf.) Farwell, *Hypolepis*
aquilinaris (Fée) Christ, *Hypolepis*
brasiliiana (C. Presl) Kuhn, *Pteridium*
aquilinum (L.) Kuhn f. *arachnoideum*
(Kaulf.) Hieron., *Pteridium aquilinum*
(L.) Kuhn subsp. *psittacinum* (C.
Presl) C. Chr., *Pteridium aquilinum*
(L.) Kuhn var. *arachnoideum* (Kaulf.)
Brade, *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
var. *umbrosum* H. Christ, nom. illeg.,
Pteridium arachnoideum (Kaulf.)
Maxon, *Pteridium caudatum* (L.) Maxon
subsp. *arachnoideum* (Kaulf.) Lellinger,
Pteridium psittacinum (C. Presl) Maxon,
Pteris aquilina L. var. *arachnoidea*
(Kaulf.) Eaton, *Pteris aquilina* L. var.
psittacina (C. Presl) Baker, *Pteris*
arachnoidea Kaulf., *Pteris esculenta* G.
Forst., *Pteris psittacina* C. Presl

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS,
ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN,
COA, PAI). URY(ART, CLA, FLO, LAV,
MAL, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Pteridium esculentum (G. Forst.)

Cockayne var. **gryphus** Schwartsb.

Hierba. Nativa. 3000-3500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL).

Pteridium esculentum (G. Forst.)

Cockayne var. **paedomorficum**
Schwartsb. & J. Prado

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, PAI). URY(ART).

DICKSONIACEAE

Dicksonia L'Hér.**Dicksonia berteriana** (Colla) Hook.

Sin.: *Balantium berterianum* Kunze,
Davallia berteriana Colla
Arborescente. Endémica. 200-700 m.
Países: CHL(JFE).

Dicksonia externa C. Chr. & Skottsb.

Sin.: *Dicksonia berteriana* (Colla)
Hook. var. *virgata* C. Chr. & Skottsb.
Arborescente. Endémica. 200-700 m.
Países: CHL(JFE).

Dicksonia sellowiana Hook.

Sin.: *Balantium karstenianum*
Klotzsch, *Balantium sellowianum* (Hook.)
C. Presl, *Dicksonia ghiesbreghtii* Maxon,
Dicksonia gigantea H. Karst., *Dicksonia*
karsteniana (Klotzsch) T. Moore,
Dicksonia lobulata Christ, *Dicksonia*
navarrensensis Christ, *Dicksonia spruceana*
Kuhn, *Dicksonia stuebelii* Hieron.
Arborescente. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA). URY(CLA, TAC, TYT).

Lophosoria C. Presl**Lophosoria quadripinnata** (J.F.

Gmel.) C. Chr.

Sin.: *Alsophila pruinata* (Sw.) Kaulf.
ex Kunze, comb. superfl., *Alsophila*
quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.,
Cyathea discolor Bory, *Lophosoria exisa*
Fée, *Lophosoria pruinata* (Sw.) C. Presl,
comb. superfl., *Lophosoria quadripinnata*
(J.F. Gmel.) C. Chr. f. *viridifolia* G.
Kunkel, *Polypodium cinereum* Cav.,
Polypodium glaucum Sw., hom. illeg.,
Polypodium pruinatum Sw., hom. illeg.,
Polypodium quadripinnatum J.F. Gmel.
Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Thyrsopteris Kunze**Thyrsopteris elegans** Kunze

Sin.: *Dicksonia elegans* (Kunze) Mett.,
Panicularia berterii Colla
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: CHL(JFE).

DIDYMOCHLAENACEAE**Didymochlaena** Desv.**Didymochlaena truncatula** (Sw.) Sm.

Sin.: *Adiantum lunulatum* Houtt.,
hom. illeg., *Aspidium truncatum* Sw.,
Didymochlaena lunulata Desv., nom.
superfl., *Didymochlaena sinuosa* Desv.,
Didymochlaena sinuosa Desv. var.
microtheca Fée
Hierba. Nativa. 200-1400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA).
URY(TAC).

DRYOPTERIDACEAE**Arachniodes** Blume**Arachniodes denticulata** (Sw.) Ching

Sin.: *Polypodium denticulatum* Sw.,
Polystichum denticulatum (Sw.) J. Sm.
Hierba. Nativa. 1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Bolbitis Schott**Bolbitis curupirae** (Lindm.) Ching ex C. Chr.

Sin.: *Acrostichum curupirae* Lindm.,
Acrostichum sculpturatum Lindm.,
Leptochilus curupirae (Lindm.) C. Chr.
Hierba terrestre. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Bolbitis serratifolia (Mert. ex Kaulf.) Schott

Sin.: *Acrostichum contaminoides*
(Christ) Lindm., *Acrostichum pervium*
Lindm., *Acrostichum serratifolium* Mert.
ex Kaulf., *Bolbitis crenata* (C. Presl) C.
Chr., *Gymnopteris contaminoides* Christ,
Heteroneuron serratifolium (Mert. ex
Kaulf.) Fée, *Leptochilus contaminoides*

(Christ) C. Chr., *Leptochilus crenatus* (C.
Presl) C. Chr., *Leptochilus serratifolius*
(Mert. ex Kaulf.) C. Chr., *Poecilopteris*
crenata C. Presl

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAN, COA, GUA).

Ctenitis (C. Chr.) C. Chr.**Ctenitis abyssi** (Sehnem) Salino & Morais

Sin.: *Dryopteris abyssi* Sehnem
Hierba rupícola. Endémica. 600-700 m.
Países: BRA(RGS).

Ctenitis ampla (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching

Sin.: *Aspidium nemophilum* Kunze, *Ctenitis*
nemophila (Kunze) Ching, *Dryopteris*
nemophila (Kunze) C. Chr., *Polypodium*
amplum Humb. & Bonpl. ex Willd.
Hierba terrestre. Nativa. 400-1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Ctenitis anniesii (Rosenst.) Copel.

Sin.: *Dryopteris anniesii* Rosenst.,
Dryopteris anniesii Rosenst. var. *ottonis*
Rosenst.
Hierba terrestre. Endémica. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ctenitis aspidioides (C. Presl) Ching

Sin.: *Polypodium aspidioides* C. Presl
Hierba terrestre. Endémica. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Ctenitis bigarellae Schwartsb., Labiak & Salino

Hierba rupícola. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Ctenitis deflexa (Kaulf.) Copel.

Sin.: *Dryopteris deflexa* (Kaulf.) C. Chr.,
Nephrodium vestitum Baker, *Polypodium*
deflexum Kaulf.
Hierba terrestre. Endémica. 900-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Ctenitis distans (Brack.) Ching var. **distans**

Sin.: *Aspidium ctenitis* Link, *Dryopteris*
ctenitis (Link) Kuntze, *Lastrea distans* Brack.
Hierba terrestre. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ctenitis distans (Brack.) Ching var. **isabellina** (Fée) R.S. Viveros & Salino

Sin.: *Aspidium isabellinum* Fée
Hierba terrestre. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Ctenitis eriocaulis (Fée) Alston

Sin.: *Aspidium eriocaulon* Fée
Hierba terrestre. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAA, CAN).

Ctenitis falciculata (Raddi) Ching

Sin.: *Aspidium falciculatum* Raddi
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Ctenitis fenestralis (C. Chr.) Copel.

Sin.: *Dryopteris fenestralis* C. Chr. var.
spannagelii Rosenst. ex C. Chr.
Hierba terrestre. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ctenitis flexuosa (Fée) Copel.

Sin.: *Aspidium flexuosum* Fée
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ctenitis glandulosa R.S. Viveros & Salino

Hierba terrestre. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Ctenitis laetevirens (Rosenst.) Salino & Morais

Sin.: *Dryopteris laetevirens* Rosenst.
Hierba terrestre. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).

Ctenitis nervata (Fée) R.S. Viveros & Salino

Sin.: *Aspidium nervatum* Fée,
Aspidium pedicellatum H. Christ, *Ctenitis*
pedicellata (H. Christ) Copel., *Dryopteris*
indecora Rosenst., *Dryopteris pedicellata*
(H. Christ) C. Chr.
Hierba terrestre. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ctenitis paranaensis (C. Chr.) Lellinger

Sin.: *Dryopteris falciculata* (Raddi)
Kuntze var. *paranaensis* C. Chr., *Dryopteris*
paranensis (C. Chr.) Sehnem
Hierba terrestre. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching var. **submarginalis**

Sin.: *Ctenitis submarginalis* (Langsd.
& Fisch.) Copel., comb. superfl.,
Dryopteris collina Christ, *Dryopteris*
soriloba Christ, *Dryopteris submarginalis*
(Langsd. & Fisch.) C. Chr., *Dryopteris*
sellowii Hieron., *Nephrodium caripense*
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hook.,
Nephrodium submarginale (Langsd.
& Fisch.) A. Braun, *Polypodium*
submarginale Langsd. & Fisch.

Hierba terrestre. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI).
URY(ART, CLA, RIV, ROC, SJO, SJO, TAC, TYT).

Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) C. Chr. var. **tenuifolia** (C. Presl) R.S. Viveros & Salino

Sin.: *Lastrea tenuifolia* C. Presl
Hierba terrestre. Nativa. 300-400 m.
Países: BRA(PAR).

Cyclodium C. Presl

Cyclodium meniscioides (Willd.) C. Presl

Sin.: *Aspidium confertum* Kaulf., *Aspidium meniscioides* Willd., *Cyclodium confertum* (Kaulf.) C. Presl, *Dryopteris meniscioides* (Willd.) Kuntze, *Dryopteris meniscioides* (Willd.) Kuntze var. *conferta* (Kaulf.) C.V. Morton, *Nephrodium confertum* (Kaulf.) J. Sm., *Nephrodium meniscioides* (Willd.) J. Sm., *Stigmatopteris meniscioides* (Willd.) K.U. Kramer

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(AMA, CAN, ITA).

Cyrtomium C. Presl

Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl

Sin.: *Aspidium falcatum* (L. f.) Sw., *Dryopteris falcata* (L. f.) Kuntze, *Phanerophlebia falcata* (L. f.) Copel., *Polypodium falcatum* L. f., *Polystichum falcatum* (L. f.) Diels

Hierba terrestre. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI).

Dryopteris Adans., nom. cons.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray

Sin.: *Dryopteris spinulosa* (O.F. Müll.) Watt subsp. *dilatata* (Hoffm.) C. Chr., *Polypodium dilatatum* Hoffm.

Hierba terrestre. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Sin.: *Aspidium filix-mas* (L.) Sw., *Dryopteris patagonica* Diem, *Filix filix-mas* (L.) Farw., *Lastrea filix-mas* (L.) C. Presl, *Nephrodium filix-mas* (L.) Rich., *Polypodium filix-mas* L., *Polystichum filix-mas* (L.) Roth

Hierba terrestre. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Dryopteris patula (Sw.) Underw.

Sin.: *Aspidium patulum* Sw., *Lastrea patula* (Sw.) T. Moore, *Nephrodium patulum* (Sw.) Baker

Hierba terrestre. Nativa. 400-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
BRA(RGS).

Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl.

Sin.: *Aspidium filix-mas* (L.) Sw. var. *parallelogrammum* (Kunze) Hillebr., *Aspidium paleaceum* Lag. ex Sw., *Aspidium parallelogrammum* Kunze, *Aspidium wallichianum* Spreng., *Dichasium parallelogrammum* (Kunze) Fée, *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott subsp. *paleacea* (Sw.) C. Chr., *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott subsp. *parallelogramma* (Kunze) Christ, *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott var. *parallelogramma* (Kunze) Christ, *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott var. *parallelogramma* (Kunze) Conz., comb. superfl., *Dryopteris paleacea* (Sw.) C. Chr., nom. illeg., *Dryopteris parallelogramma* (Kunze) Alston, *Lastrea filix-mas* (L.) C. Presl var. *parallelogramma* (Kunze) Bedd., *Lastrea paleacea* (Lag. ex Sw.) C. Chr., comb. illeg., *Nephrodium filix-mas* (L.) Rich. var. *paleaceum* (Sw.) Mett., *Nephrodium filix-mas* (L.) Rich. var. *parallelogrammum* (Kunze) Hook., *Nephrodium parallelogrammum* (Kunze) C. Hope
Hierba terrestre. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum Schott ex J. Sm., nom. cons.

Elaphoglossum acutum Brade

Hierba. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum alpestre (Gardner)

T. Moore
Hierba. Nativa. 1400-1700 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum balansae C. Chr.

Sin.: *Elaphoglossum altosianum* H. Christ
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, PAI).

Elaphoglossum beaurepairei (Fée) Brade

Sin.: *Acrostichum beaurepairei* Fée
Hierba. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum brevipes (Kunze) T. Moore

Sin.: *Acrostichum brevipes* Kunze
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum burchellii (Baker) C. Chr.

Sin.: *Acrostichum burchellii* Baker, *Acrostichum praelongum* Fée, *Acrostichum tenerum* Baker, hom. illeg., *Elaphoglossum burchellii* (Baker) C. Chr. var. *major* Rosenst., *Elaphoglossum dusenii* H. Christ, *Elaphoglossum praesiougum* (Fée) Brade
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAA, CAN).

Elaphoglossum chrysolepis (Fée) Alston

Sin.: *Acrostichum chrysolepis* Fée
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Elaphoglossum craspedariaforme (Fée) Brade ex Alston

Sin.: *Acrostichum craspedariaforme* Fée
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum crassinerve (Kunze) T. Moore

Sin.: *Acrostichum crassinerve* Kunze
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum crassipes (Hieron.) Diels

Sin.: *Acrostichum crassipes* Hieron.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 1000-3300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Elaphoglossum decoratum (Kunze) T. Moore

Sin.: *Acrostichum decoratum* Kunze
Hierba epífita, epipétrica o terrestre. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum didymoglossoides C. Chr.

Hierba. Nativa. 1200-2000 m.
Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum dutrae Brade

Hierba. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(RGS).

Elaphoglossum edwallii Rosenst.Sin.: *Elaphoglossum reitzii* Brade

Hierba. Nativa. 900-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum flaccidum (Fée) T. MooreSin.: *Acrostichum flaccidum* Fée

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum fonkii (Phil.) T. MooreSin.: *Acrostichum fonkii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(LRI, LLA).

Elaphoglossum gayanum (Fée) T. MooreSin.: *Acrostichum gayanum* Fée,*Acrostichum leptophyllum* Fée, hom.illeg., *Elaphoglossum unduaviense*Rosenst. var. *leptophylloides* Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS). URY(MAL).

Elaphoglossum gertii SehnemSin.: *Elaphoglossum hatschbachii*

Sehnem, nom. nud.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Elaphoglossum glaziovii (Fée) BradeSin.: *Acrostichum glaziovii* Fée

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

100-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum hassleri H. Christ

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN, COA).

Elaphoglossum horridulum (Kaulf.) J. Sm.Sin.: *Acrostichum raddianum* Hook. &Grev., *Acrostichum spathulinum* Raddi

Hierba. Nativa. 900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum hybridum (Bory) BrackSin.: *Acrostichum lindbergii* Mett.ex Kuhn, *Acrostichum hybridum* Bory,*Acrostichum hybridum* (Bory) Brack var.*minor* Baker, *Elaphoglossum lindbergii*

(Mett. ex Kuhn) Rosenst.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

1000-1700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum hymenodiastrium

(Fée) Brade

Sin.: *Acrostichum hymenodiastrium* Fée

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum iguapense BradeSin.: *Elaphoglossum acutifolium* Brade

& Rosenst., nom. illeg.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum itatiayensis Rosenst.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 100 m.

Países: BRA(SCA).

Elaphoglossum lagesianum Rosenst.

Hierba. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Elaphoglossum langsdorffii (Hook. &

Grev.) T. Moore

Sin.: *Acrostichum langsdorffii* Hook. & Grev.

Hierba rupícola o terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm.Sin.: *Acrostichum latifolium* Sw.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Elaphoglossum lindenii (Bory ex Fée)

T. Moore

Sin.: *Acrostichum lindenii* Bory ex Fée,*Acrostichum squamatum* Sw., hom. illeg.,*Acrostichum squamosum* Cav., *Elaphoglossum squamatum* (Sw.) T. Moore

Hierba. Nativa. 400 m.

Países: CHL(JFE).

Elaphoglossum lineare (Fée) T. MooreSin.: *Acrostichum lineare* Fée

Hierba. Nativa. 900-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum lingua (C. Presl) Brack.Sin.: *Acrostichum lingua* (C. Presl)Raddi, nom. illeg., *Acrostichum producens*Fée, *Olfersia lingua* C. Presl

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum lorentzii (Hieron.)

H. Christ

Sin.: *Acrostichum lorentzii* Hieron.

Hierba. Nativa. 1000-3200 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Elaphoglossum luridum (Fée) H. ChristSin.: *Acrostichum luridum* Fée,*Acrostichum schomburgkii* Fée,*Elaphoglossum schomburgkii* (Fée) T. Moore

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum macahense (Fée)

Rosenst.

Sin.: *Acrostichum macahense* Fée

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum macrophyllum (Mett.

ex Kuhn) Fée

Sin.: *Acrostichum macrophyllum* Mett.ex Kuhn, *Elaphoglossum macrophyllum*(Mett. ex Kuhn) Fée var. *schmalzii*(Rosenst.) Alston, *Elaphoglossum**schmalzii* Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum montanum Kieling-

Rubio & P.G. Windisch

Hierba. Endémica. 600-1400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Elaphoglossum nigrescens (Hook.) T.

Moore ex Diels

Sin.: *Acrostichum flaccidum* Fée var.*pallidum* Baker, *Acrostichum nigrescens*Hook., *Elaphoglossum wacketii* Rosenst.,*Elaphoglossum williamsii* Vareschi

Hierba epífita. Nativa. 100-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum ornatum (Mett. ex

Kuhn) H. Christ

Sin.: *Acrostichum ornatum* Mett. ex Kuhn

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum pachydermum (Fée)

T. Moore

Sin.: *Acrostichum pachydermum* Fée

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum papyraceum (Fée)

F.B. Matos & R.C. Moran

Sin.: *Acrostichum papyraceum* Fée

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum paulistanum

Rosenst.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum porteri Hicken

Sin.: *Elaphoglossum rudolphii* Espinosa
Hierba. Endémica. 600-900 m.
Países: CHL(LLA).

Elaphoglossum rubicundum (Pohl ex Ettingsh.) Alston

Sin.: *Acrostichum latifolium* Sw.
var. *rubicundum* (Pohl ex Ettingsh.)
Baker, *Acrostichum rubicundum* Pohl ex Ettingsh.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum schwackeanum Brade

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Elaphoglossum sellowianum

(Klotzsch ex Kuhn) T. Moore

Sin.: *Acrostichum brasiliense* Spreng. ex Kuhn, *Acrostichum sellowianum* Klotzsch ex Kuhn

Hierba epífita o epipétrica. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum skottsbergii Krajina

Hierba. Endémica. 400-500 m.
Países: CHL(IPA).

Elaphoglossum spathulatum (Bory)

T. Moore

Sin.: *Acrostichum jamesonii* Hook. & Grev., *Acrostichum piloselloides* C. Presl, *Acrostichum spathulatum* Bory, *Elaphoglossum jamesonii* (Hook. & Grev.) T. Moore, *Elaphoglossum piloselloides* (C. Presl) T. Moore, *Elaphoglossum spathulatum* (Bory) T. Moore var. *piloselloides* (C. Presl) C. Chr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TAC).

Elaphoglossum squamipes (Hook.)

T. Moore

Sin.: *Acrostichum squamipes* Hook.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 1000-1400 m.

Países: BRA(PAR).

Elaphoglossum strictum (Raddi) T.

Moore

Sin.: *Acrostichum strictum* Raddi, *Elaphoglossum strictum* (Raddi) T. Moore var. *discolor* Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum subarborescens

Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Elaphoglossum subcochleare H. Christ

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, COA, GUA, PAI).

Elaphoglossum tectum (Humb. &

Bonpl. ex Willd.) T. Moore

Sin.: *Acrostichum tectum* Humb. &

Bonpl. ex Willd.

Hierba. Nativa. 500-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Elaphoglossum ulei C. Chr.

Sin.: *Elaphoglossum spannagelii* Rosenst.

Hierba. Endémica. 900-1100 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Elaphoglossum vagans (Mett.) Hieron.

Sin.: *Acrostichum vagans* Mett.,

Acrostichum ovatum Fée, *Elaphoglossum bicolor* Rosenst., *Elaphoglossum schiffneri* C. Chr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elaphoglossum yungense de la Sota

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 800-1700 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Lastreopsis Ching**Lastreopsis amplissima** (C. Presl)

Tindale

Sin.: *Aspidium amplissimum* (C. Presl)

Mett., *Aspidium latissimum* Fée, *Aspidium macrum* Fée, *Ctenitis amplissima* (C.

Presl) Copel., *Dryopteris amplissima* (C.

Presl) Kuntze, *Dryopteris amplissima* (C. Presl) Kuntze var. *subeffusa* C. Chr.,

Nephrodium amplissimum (C. Presl)

Hook., *Polystichopsis amplissima* (C. Presl)

Abbiatti, *Polystichum amplissimum* C. Presl,

Rumohra amplissima (C. Presl) Ching

Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN).

Megalastrum Holttum**Megalastrum abundans** (Rosenst.)

A.R. Sm. & R.C. Moran

Sin.: *Dryopteris abundans* Rosenst., *Dryopteris martiana* Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Megalastrum adenopteris (C. Chr.)

A.R. Sm. & R.C. Moran

Sin.: *Ctenitis adenopteris* (C. Chr.)

Ching, *Dryopteris adenopteris* C. Chr.,

Dryopteris oreocharis Sehnem var.

canescens Sehnem, *Dryopteris villosa* (L.)

Kuntze var. *tomentosa* Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 700-2100 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

BRA(RGS, SCA).

Megalastrum albidum R.C. Moran, J.

Prado & Labiak

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAA).

Megalastrum brevipubens R.C.

Moran, J. Prado & Labiak

Hierba. Nativa. 200-300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, GUA).

Megalastrum ciliatum M. Kessler &

A.R. Sm.

Hierba. Nativa. 1600-1900 m.

Países: ARG(JUU).

Megalastrum connexum (Kaulf.) A.R.

Sm. & R.C. Moran

Sin.: *Ctenitis connexa* (Kaulf.) Copel.,

Dryopteris connexa (Kaulf.) C. Chr.,

Dryopteris late-adnata (H. Christ) C.

Chr., *Nephrodium connexum* (Kaulf.)

Hicken, *Phegopteris connexa* (Kaulf.)

Fée, *Phegopteris late-adnata* H. Christ,

Polypodium connexum Kaulf.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, PAI). URY(CLA, RIV, TAC).

Megalastrum crenulans (Fée) A.R.

Sm. & R.C. Moran

Sin.: *Aspidium crenulans* Fée, *Ctenitis*

crenulans (Fée) Ching, *Dryopteris*

crenulans (Fée) C. Chr. f. *glandulosa*

(Rosenst.) C. Chr., *Dryopteris crenulans*

(Fée) C. Chr., *Dryopteris villosa* (L.)

Kuntze var. *glandulosa* Rosenst.

Hierba. Nativa. 600-1800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN).

Megalastrum fugaceum R.C. Moran,

J. Prado & Sundue

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Megalastrum glabrius (C. Chr. &

Skotts.) Sundue, Rouhan & R.C. Moran

Sin.: *Ctenitis inaequalifolia* (Colla)

Ching var. *glabrior* (C. Chr. & Skottsb.) G. Kunkel, *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr. var. *glabrior* C. Chr. & Skottsb., *Megalastrum inaequalifolium* (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. *glabrius* (C. Chr. & Skottsb.) R. Rodr. Hierba terrestre. Endémica. 200-600 m. Países: CHL(JFE).

Megalastrum inaequale (Kaulf. ex Link) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis macrosora* (Fée) Ching, *Dryopteris macrosora* (Fée) C. Chr., *Polypodium inaequale* Kaulf. ex Link Hierba. Nativa. 100-2000 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Megalastrum inaequalifolium (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis inaequalifolia* (Colla) Ching, *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr., *Dryopteris skottsbergii* C. Chr., *Dryopteris villosa* (L.) Kuntze var. *berteroana* (Hook.) C. Chr., *Polypodium berteroanum* Hook., nom. illeg., *Polypodium inaequalifolium* Colla Hierba terrestre. Endémica. 200-600 m. Países: CHL(JFE).

Megalastrum masafueriae Sundue, Rouhan & R.C. Moran
Hierba. Endémica. 100 m. Países: CHL(JFE).

Megalastrum oreocharis (Sehnm) Salino & Ponce
Sin.: *Ctenitis oreocharis* (Sehnm) R.M. Bueno & R.M. Senna, *Dryopteris connexa* (Kaulf.) C. Chr. var. *minor* D. Legrand, *Dryopteris oreocharis* Sehnm Hierba terrestre. Endémica. 0-1200 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, TAC).

Megalastrum spectabile (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel, *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel var. *philippiana* (C. Chr.) R. Rodr., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) Macloskie & Dusén, *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr., comb. superfl., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr., comb. superfl., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr. var. *philippiana* C. Chr., *Megalastrum spectabile* (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. *philippianum* (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran, *Phegopteris spectabilis* (Kaulf.) Fée, *Phegopteris vestita* Phil., *Polypodium contractum*

Desv., *Polypodium spectabile* Kaulf., *Polypodium vestitum* (F. Phil.) Hook. Hierba terrestre. Endémica. 0-900 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Megalastrum substrigosum R.C. Moran, J. Prado & Labiak
Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(MIS).

Megalastrum umbrinum (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Dryopteris umbrina* C. Chr. Hierba. Nativa. 100-1200 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Megalastrum wacketii (Rosenst. ex C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenitis wacketii* (Rosenst. ex C. Chr.) Ching, *Dryopteris wacketii* Rosenst. ex C. Chr. Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR).

Mickelia R.C. Moran, Labiak & Sundue

Mickelia guianensis (Aubl.) R.C. Moran, Sundue & Labiak
Sin.: *Acrostichum guianense* (Aubl.) Baker, *Acrostichum raddianum* Kuntze, *Acrostichum scandens* Raddi, *Bolbitis guianensis* (Aubl.) K.U. Kramer ex Vareschi, *Leptochilus guianensis* (Aubl.) C. Chr., *Lomagamma guianensis* (Aubl.) Ching, *Polypodium guianense* Aubl. Hierba voluble. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Olfersia Raddi

Olfersia cervina (L.) Kunze
Sin.: *Osmunda cervina* L., *Osmunda corcovadensis* Raddi, *Polybotrya cervina* (L.) Kaulf., *Polybotrya cervina* (L.) Kaulf. f. *transitoria* Rosenst. Hierba. Nativa. 100-1100 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Parapolystichum (Keyserl.) Ching

Parapolystichum effusum (Sw.) Ching
Sin.: *Aspidium effusum* (Sw.) Griseb.,

Ctenitis effusa (Sw.) Copel., *Ctenitis effusa* (Sw.) Copel. var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Proctor, *Dryopteris effusa* (Sw.) Urb., *Dryopteris effusa* (Sw.) Urb. var. *tenuis* (Hicken) Hassl., *Lastreopsis effusa* (Sw.) Tindale subsp. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Tindale, *Lastreopsis effusa* (Sw.) Tindale subsp. *effusa*, *Lastreopsis effusa* (Sw.) Tindale var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Proctor, *Nephrodium effusum* (Sw.) Baker, *Nephrodium effusum* (Sw.) Baker var. *tenuis* Hicken, *Parapolystichum effusum* (Sw.) Abbiatti var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Abbiatti, *Phegopteris effusa* (Sw.) Fée, *Polypodium divergens* Willd. ex Schkuhr, *Polypodium effusum* Sw., *Polystichum effusum* (Sw.) Keyserl. Hierba terrestre. Nativa. 300-800 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, ITA, PAI, SPE).

Polybotrya Humb. & Bonpl. ex Willd.

Polybotrya cylindrica Kaulf.
Hierba hemiepífita. Endémica. 0-900 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polybotrya goyazensis Brade
Sin.: *Polybotrya macedoi* Brade Hierba hemiepífita. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Polystichum Roth, nom. cons.

Polystichum andinum Phil.
Hierba. Endémica. 0-4000 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Polystichum caudescens Dutra
Hierba. Nativa. 900-1000 m. Países: BRA(RGS).

Polystichum chilense (H. Christ) Diels
Sin.: *Aspidium aculeatum* (L.) Sw. var. *chilense* Christ, *Aspidium bridgesii* (Schott) J.W. Sturm, *Aspidium orbiculatum* Desv., *Aspidium paucispis* J.W. Sturm, *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *chilense* (H. Christ) C. Chr., *Polystichum bridgesii* Schott, *Polystichum chilense* (H. Christ) Diels var. *dusenii* (C. Chr.) Looser ex R. Rodr., *Polystichum*

multifidum (Mett.) T. Moore var. *dusenii* C. Chr., *Polystichum vestitum* (G. Forst.) C. Presl

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Polystichum laniceps Rosenst.

Hierba. Nativa. 1000 m.

Países: BRA(RGS).

Polystichum mohrioides (d'Urv.) C. Presl

Sin.: *Aspidium mohrioides* d'Urv., *Nephrodium mohrioides* (d'Urv.) Desv.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(TDF).

Polystichum montevidense

(Spreng.) Rosenst.

Sin.: *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron., hom. illeg., *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron. f. *imbricata* Hieron., *Phegopteris montevidensis* (Spreng.) Salomon, *Polypodium montevidense* Spreng., *Polystichum aculeatum* (L.) Roth var. *montevidense* (Spreng.) C. Chr., *Polystichum microsorium* Fée, *Polystichum montevidense* (Spreng.) Hieron., hom. illeg., *Polystichum platyphyllum* (Willd.) C. Presl var. *kurtziana* Hicken

Hierba. Nativa. 700-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, PAI). URY(MAL).

Polystichum multifidum (Mett.) T. Moore

Sin.: *Aspidium multifidum* Mett., *Aspidium pearcei* (Phil.) F. Phil., *Dryopteris metteniana* Kuntze, *Dicksonia andina* Phil., *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *autranii* Hicken, *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *pearcei* (Phil.) R. Rodr., *Polystichum pearcei* Phil., *Polystichum nahuelhuapiense* Diem

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Polystichum platylepis Fée

Sin.: *Polystichum aculeolatum* Fée, *Polystichum giganteum* Fée, *Polystichum longecuspis* Fée

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Polystichum platyphyllum (Willd.)

C. Presl

Sin.: *Aspidium platyphyllum* Willd., *Nephrodium platyphyllum* (Willd.) Desv., *Phegopteris platyphylla* (Willd.) Mett., *Polypodium platyphyllum* (Willd.) Hook., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *phegopteroidea* Baker, *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *platyphyllum* (Willd.) C. Chr., *Polystichum lanosum* Fée, *Polystichum opacum* Rosenst., *Polystichum polystichoides* Klotzsch

Hierba. Nativa. 200-2500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, SPE).

Polystichum plicatum (Poepp. ex

Kunze) Hicken ex Hosseus

Sin.: *Aspidium elegans* (J. Remy) J.W. Sturm, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *laxum* Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *rigidum* Kunze, *Polystichum elegans* J. Remy, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl f. *genuina* Hicken, nom. inval., *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *elegans* (J. Remy) C. Chr., *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *plicatum* (Poepp.) C. Chr., *Polystichum mohrioides* (d'Urv.) C. Presl f. *latifolia* Hicken, nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Polystichum pycnolepis (Kunze ex

Klotzsch) Hieron.

Sin.: *Aspidium montevidense* (Spreng.) Hieron. f. *squamulosa* Hieron., *Aspidium pycnolepis* Kunze ex Klotzsch, *Polystichum montevidense* (Spreng.) Rosenst. var. *squamulosa* (Hieron.) Hieron.

Hierba. Nativa. 1800-4000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Polystichum subintegerrimum

(Hook. & Arn.) R. Rodr.

Sin.: *Aspidium brongniartianum* (J. Remy) J.W. Sturm, *Aspidium subintegerrimum* Hook. & Arn., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *brongniartianum* (J. Remy & Fée) C. Chr., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *subintegerrimum* (Hook. & Arn.) C. Chr., *Polystichum brongniartianum* J. Remy

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Polystichum tetragonum Fée

Hierba. Endémica. 200 m.

Países: CHL(JFE).

Polystichum tijucense Fée

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS).

Rumohra Raddi

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching

Sin.: *Aspidium capense* Willd., hom. illeg., *Aspidium coriaceum* (Sw.) Sw., *Aspidium discolor* Langsd. & Fisch., *Aspidium ferrugineum* (Cav.) Sw., *Aspidium remotum* (Fée) Christ, nom. illeg., *Dryopteris adiantiformis* (G. Forst.) Kuntze, *Hypopeltis coriacea* (Sw.) Bory, *Lastrea adiantiformis* (G. Forst.) Vareschi, *Nephrodium duriusculum* C. Presl, *Polypodium adiantiforme* G. Forst., *Polystichum adiantiforme* (G. Forst.) J. Sm., *Polystichum coriaceum* Schott, *Polystichum coriaceum* Schott var. *acuminatum* Fée, *Polystichum coriaceum* Schott var. *callochlamys* Fée, *Polystichum coriaceum* Schott var. *platychlamys* Fée, *Polystichum discolor* (Langsd. & Fisch.) Brack, *Polystichum remotum* Fée, *Rumohra aspidioides* Raddi, *Tectaria calahuala* Cav., *Tectaria coriacea* (Sw.) Link, *Tectaria ferruginea* Cav.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG). URY(FLA, MAL, ROC).

Rumohra berteriana (Colla) R. Rodr.

Sin.: *Aspidium berterianum* Colla, *Aspidium flexum* Kunze, *Polystichum berterianum* (Colla) C. Chr.

Hierba terrestre. Endémica. 200-1200 m.

Países: CHL(JFE).

Rumohra quadrangularis (Fée) Brade

Sin.: *Polystichum quadrangulare* Fée, *Rumohra turficola* R.M. Senna

Hierba. Nativa. 2000-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stigmatopteris C. Chr.

Stigmatopteris bradei Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stigmatopteris brevinervis (Fée)

R.C. Moran

Sin.: *Phegopteris brevinervis* Fée

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stigmatopteris caudata (Raddi) C. Chr.Sin.: *Polypodium caudatum* Raddi

Hierba terrestre. Nativa. 100-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stigmatopteris heterocarpa (Fée)

Rosenst.

Sin.: *Phegopteris heterocarpa* Fée, *Polypodium carrii* Baker, *Stigmatopteris heterocarpa* (Fée) Rosenst. var. *basilaris* Rosenst.

Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stigmatopteris ulei (C. Chr.) Sehnem

Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(SCA).

EQUISETACEAE

Equisetum L.**Equisetum bogotense** KunthSin.: *Equisetum bogotense* Kunth var. *flagelliforme* Kunze, *Equisetum chilense* C. Presl ex Milde, *Equisetum flagelliferum* Kunze ex Milde, *Equisetum flagelliforme* Kunze, *Equisetum rinihuense* G. Kunkel, *Equisetum stipulaceum* Vaucher

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Equisetum giganteum L.Sin.: *Equisetum araucanum* Phil., *Equisetum bolivianum* Gand., *Equisetum brasiliense* Milde, *Equisetum giganteum* L. var. *caracasenum* (DC.) Milde, *Equisetum giganteum* L. var. *chilense* Milde, *Equisetum giganteum* L. var. *digitaliferum* Pastore, *Equisetum lechleri* Milde, nom. illeg., *Equisetum martii* Milde, *Equisetum philippi* Gand., *Equisetum poeppigianum* Mett., *Equisetum pyramidale* Goldm., *Equisetum ramosissimum* Humb. & Bonpl. ex Willd., hom. illeg., *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *affine* Milde, *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *dolosa*Milde, *Equisetum ramosissimum* Desf.var. *scaberium* Milde, *Equisetum scandens* J. Remy, *Equisetum schaffneri* Milde, *Equisetum tarapacanicum* Phil., *Equisetum xylochaetum* Mett., *Hippochaete gigantea* (L.) Holub

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, PHA). URY(ART, CAS, COL, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

GLEICHENIACEAE

Dicranopteris Bernh.**Dicranopteris discolor** (Schrad.) NakaiSin.: *Gleichenia discolor* (Schrad.)Sehnem, *Mertensia discolor* Schrad.

Hierba. Nativa. 900-1000 m.

Países: BRA(RGS).

Dicranopteris flexuosa (Schrad.)

Underw.

Sin.: *Dicranopteris rigida* (Kunze) Nakai, *Gleichenia flexuosa* (Schrad.) Mett., *Gleichenia rigida* (Kunze) J. Bommer & H. Christ, *Mertensia flexuosa* Schrad., *Mertensia rigida* Kunze

Hierba. Nativa. 100-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN).

Dicranopteris nervosa (Kaulf.) MaxonSin.: *Gleichenia gaenslyi* Rosenst., *Gleichenia nervosa* (Kaulf.) Spreng., *Mertensia latissima* Fée, *Mertensia neglecta* Sturm, *Mertensia nervosa* Kaulf., *Sticherus gaenslyi* (Rosenst.) Nakai

Hierba. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gleichenella Ching**Gleichenella pectinata** (Willd.) ChingSin.: *Dicranopteris pectinata* (Willd.) Underw., *Gleichenia pectinata* (Willd.) C. Presl, *Mertensia brasiliensis* Desv., *Mertensia emarginata* Raddi, *Mertensia glaucescens* Humb. & Bonpl. ex Willd.,*Mertensia pectinata* Willd.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(CLA).

Sticherus C. Presl**Sticherus bifidus** (Willd.) ChingSin.: *Dicranopteris bifida* (Willd.)Maxon, *Dicranopteris pubescens* (Willd.) Conz., *Gleichenia bifida* (Willd.) Spreng., *Gleichenia pubescens* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth, *Mertensia bifida* Willd., *Mertensia pubescens* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Sticherus pubescens* (Willd.) Nakai

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, PAI). URY(RIV).

Sticherus cryptocarpus (Hook.) ChingSin.: *Dicranopteris cryptocarpa* (Hook.)Looser, *Gleichenia cryptocarpa* Hook., *Mertensia cryptocarpa* (Hook.) J. Remy, *Sticherus cryptocarpus* (Hook.) Ching var. *looserianus* G. Kunkel

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).

CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Sticherus decurrens (Raddi) J. GonzalesSin.: *Gleichenia trifurcans* (Fée)C. Chr., *Mertensia decurrens* Raddi, *Mertensia trifurcans* Fée, *Sticherus trifurcans* (Fée) Ching

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sticherus ferrugineus (Desv.) J.

Gonzales

Sin.: *Mertensia ferruginea* Desv.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sticherus gracilis (Mart.) Copel.Sin.: *Gleichenia gracilis* (Mart.) T.Moore, *Mertensia gracilis* Mart.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Sticherus lanuginosus (Fée) NakaiSin.: *Gleichenia lanuginosa* Fée,*Gleichenia pennigera* (Mart.) Moore var. *lanuginosa* (Fée) T. Moore

Hierba. Nativa. 500-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAN).

Sticherus lepidotus (R. Rodr.) R. Rodr. & Ponce
Sin.: *Gleichenia lepidota* R. Rodr.
Hierba. Endémica. 500-1100 m.
Países: CHL(JFE).

Sticherus litoralis (F. Phil.) Nakai
Sin.: *Dicranopteris litoralis* (F. Phil.)
Looser, *Dicranopteris pedalis* (Kaulf.)
Looser var. *litoralis* (F. Phil.) Looser,
Gleichenia litoralis (F. Phil.) C. Chr.,
Mertensia litoralis Phil.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Sticherus nigropaleaceus (J.W. Sturm) J. Prado & Lellinger
Sin.: *Gleichenia bifida* (Willd.) Spreng.
var. *nigropaleacea* (J.W. Sturm) Rosenst.,
Mertensia nigropaleacea J.W. Sturm,
Sticherus longipinnatus (Hook.) Ching
var. *nigropaleaceus* (J.W. Sturm) Nakai
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sticherus paulistanus (Rosenst.) Copel.
Sin.: *Gleichenia paulistana* Rosenst.
Hierba. Nativa. 600-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sticherus pruinosis (Mart.) Ching
Sin.: *Dicranopteris pennigera* (Mart.)
Maxon, *Dicranopteris pruinosa* (Mart.)
Maxon, *Gleichenia angusta* (Klotzsch)
Sehnem, *Gleichenia longipes* (Fée) H.
Christ, *Gleichenia pennigera* (Mart.)
Moore, *Gleichenia pruinosa* (Mart.)
Mett., *Gleichenia revoluta* Kunth var.
angusta (Klotzsch ex Sturm) C. Chr.,
Mertensia angusta Klotzsch ex Sturm,
Mertensia longipes Fée, *Mertensia*
penniger Mart., *Mertensia pruinosa*
Mart., *Mertensia revoluta* (Kunth) Desv.,
Sticherus longipes (Fée) Copel., *Sticherus*
penniger (Mart.) Copel.
Hierba. Nativa. 100-2500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sticherus quadripartitus (Poir.) Ching
Sin.: *Dicranopteris quadripartita*
(Poir.) Looser, *Gleichenia acutifolia*
Hook., *Gleichenia bibraeae* Mett. ex Kuhn,
Gleichenia quadripartita (Poir.) T. Moore,
Mertensia acutifolia (Hook.) J. Remy,
Mertensia magellanica Desv., *Mertensia*
quadripartita (Poir.) Poir., *Polypodium*
quadripartitum Poir., *Sticherus bibraeae*
(Mett. ex Kuhn) Ching, *Sticherus*
quadripartitus (Poir.) Ching f. *bipartitus*
G. Kunkel, *Sticherus quadripartitus*

(Poir.) Ching f. *simplex* G. Kunkel
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai var.
gunkeliana (Looser) R. Rodr. & Ponce
Sin.: *Dicranopteris squamulosa*
(Desv.) Looser var. *gunkeliana* Looser,
Gleichenia squamulosa (Desv.) T. Moore
var. *gunkeliana* (Looser) Duek
Enredadera o liana. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ARA, LRI, LLA).

Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai
var. **squamulosus**
Sin.: *Dicranopteris oligocarpa* (F. Phil.)
Looser, *Dicranopteris pedalis* (Kaulf.)
Looser, *Gleichenia oligocarpa* (F. Phil.) C.
Chr., *Gleichenia pedalis* (Kaulf.) Spreng.,
Gleichenia squamulosa (Desv.) T. Moore,
Mertensia oligocarpa Phil., *Mertensia*
pedalis Kaulf., *Mertensia squamulosa*
Desv., *Sticherus oligocarpus* (F. Phil.)
Nakai, *Sticherus pedalis* (Kaulf.) Ching,
Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai var.
glaber (T. Moore) Nakai
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS, JFE).

HEMIDICTYACEAE

Hemidictyum C. Presl

Hemidictyum marginatum (L.) C.Presl
Sin.: *Asplenium marginatum* L., *Diplazium*
marginatum (L.) Diels, nom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

HYMENOPHYLLACEAE

Abrodictyum C. Presl

Abrodictyum rigidum (Sw.) Ebihara &
Dubuisson
Sin.: *Trichomanes bifidum* Vent.,
Trichomanes daucoides C. Presl,
Trichomanes dregel Bosch, *Trichomanes*
mandiocanum Raddi, *Trichomanes*
rigidum Sw.
Hierba. Nativa. 100-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN, PAI, SPE).

Crepidomanes (C. Presl) C. Presl

Crepidomanes pyxidiferum (L.)
Dubuisson & Ebihara var. **australe**
Ponce & Dubuisson
Sin.: *Trichomanes emarginatum* C.
Presl, hom. illeg.
Hierba saxícola. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Crepidomanes pyxidiferum (L.)
Dubuisson & Ebihara var. **pyxidiferum**
Sin.: *Polyphlebium pyxidiferum* (L.)
Ebihara & Dubuisson, *Trichomanes*
cavifolium Müll.Berol., *Trichomanes*
eximium Kunze ex J.W. Sturm, nom.
illeg., *Trichomanes pyxidiferum* L.,
Trichomanes pyxidiferum L. var.
elongatum Hook., *Vandenboschia*
pyxidifera (L.) Copel.
Hierba saxícola. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Didymoglossum Desv.

Didymoglossum angustifrons Fée
Sin.: *Trichomanes angustifrons* (Fée)
Wess.Boer
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(PAI).

Didymoglossum hymenoides

(Hedw.) Copel.
Sin.: *Didymoglossum sociale* Fée,
Trichomanes apodum Hook. & Grev.,
Trichomanes hymenoides Hedw. f.
pseudo-reptans Rosenst., *Trichomanes*
hymenoides Hedw., *Trichomanes*
muscoides Sw., *Trichomanes pabstianum*
C.A.Mull., *Trichomanes pseudo-reptans*
(Rosenst.) Sehnem, *Trichomanes sociale*
(Fée) Lindm.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA).
URY(TAC).

Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl

Sin.: *Trichomanes acrocarpon* Fée,
Trichomanes krausii Hook. & Grev.
Hierba saxícola. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(PAI).

Didymoglossum ovale E. Fourn.
Sin.: *Trichomanes fontanum* Lindm.
Hierba saxícola. Nativa. 200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Didymoglossum punctatum (Poir.) Desv.

Sin.: *Trichomanes punctatum* Poir.,
Trichomanes sphenoides Kunze var.
minor Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Didymoglossum pusillum (Sw.) Desv.

Sin.: *Trichomanes pusillum* Sw.
Hierba epífita o rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl

Sin.: *Trichomanes montanum* Hook.,
Trichomanes quercifolium Hook. & Grev.,
Trichomanes reptans Sw.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUU, MIS, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum Sm.**Hymenophyllum asperulum** Kunze

Sin.: *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm.
var. *asperulum* (Kunze) Diem & J.S. Licht.

Hierba epífita o terrestre. Endémica.
0-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Hymenophyllum asplenioides (Sw.) Sw.

Sin.: *Trichomanes asplenioides* Sw.,
Mecodium asplenioides (Sw.) Copel.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum caespitosum

Gaudich.

Sin.: *Hymenophyllum densifolium*
Phil. *Hymenophyllum dusenii* H. Christ,
Leptocionium caespitosum C. Presl,
Serpilopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr.
var. *caespitosa*, *Serpilopsis caespitosa*
(Gaudich.) C. Chr. var. *densifolia* (Phil.)
C. Chr., *Serpilopsis caespitosa* (Gaudich.)
C. Chr. var. *dusenii* (H. Christ) C. Chr.,
Serpilopsis caespitosa (Gaudich.) C.
Chr. var. *elongata* (Hook.) C. Chr.,
Serpilopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr.
var. *fernandeziana* C. Chr. & Skottsbb.,
Trichomanes caespitosum (Gaudich.)
Hook., *Trichomanes caespitosum*
(Gaudich.) Hook. var. *elongatum* Hook.

Hierba terrestre. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Hymenophyllum capurroi de la Sota

Hierba epífita. Nativa. 1200-1700 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Hymenophyllum caudiculatum Mart.

Sin.: *Hymenophyllum caudatum*
Bosch, *Hymenophyllum caudiculatum*
Mart. var. *caudatum* (Bosch) Hook. &
Baker, *Hymenophyllum caudiculatum*
Mart. var. *productum* (C. Presl) C.
Chr., *Hymenophyllum martii* Sturm,
Hymenophyllum patagonicum Gand.,
Hymenophyllum productum (C. Presl)
J. W. Sturm, hom. illeg., *Mecodium*
caudiculatum (Mart.) Copel., *Mecodium*
caudiculatum (Mart.) Copel. f. *nanum* G.
Kunkel, *Mecodium caudiculatum* (Mart.)
Copel. f. *productum* (C. Presl) G. Kunkel,
Sphaerocionium caudiculatum (Mart.) C.
Presl, *Sphaerocionium productum* C. Presl
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, AIS,
MAG, RME, JFE). PRY(PAI).

Hymenophyllum cordobense

(Hieron.) C. Larsen & Arana

Sin.: *Hymenophyllum peltatum* (Poir.)
Desv. var. *achalensis* (Hieron.) Capurro,
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm.
var. *cordobense* Hieron., *Hymenophyllum*
wilsoni Hook. var. *achalensis* Hieron.

Hierba epífita o terrestre. Nativa.
1200-3800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Hymenophyllum crispum Kunth

Sin.: *Hymenophyllum brasilianum* (Fée)
Rosenst., *Hymenophyllum constrictum* H.
Christ, *Hymenophyllum crispum* Kunth
var. *brasilianum* Fée, *Sphaerocionium*
crispum (Kunth) Klotzsch

Hierba saxícola. Nativa. 800-2300 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR,
RGS, SCA).

Hymenophyllum cruentum Cav.

Sin.: *Hymenoglossum cruentum*
(Cav.) C. Presl

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Hymenophyllum cuneatum Kunze
var. **cuneatum**

Sin.: *Hymenophyllum cumingii* C. Presl,
Mecodium cuneatum (Kunze) Copel.
Hierba epífita. Endémica. 400-1000 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA, AIS,
MAG, JFE).

Hymenophyllum cuneatum Kunze

var. **rarifforme** C. Chr. & Skottsbb.
Sin.: *Hymenophyllum cuneatum*

Kunze f. *imbricata* C. Chr. & Skottsbb.,
Hymenophyllum terminale Phil.
Mecodium cuneatum (Kunze) Copel. var.
rarifforme (C. Chr. & Skottsbb.) G. Kunkel
Hierba epífita. Endémica. 300-500 m.
Países: CHL(JFE).

Hymenophyllum darwinii Hook. f.
ex Bosch

Sin.: *Hymenophyllum abruptum*
Hook. var. *brevifrons* (Kunze)
Franch., *Hymenophyllum rarum* R.
Br. var. *darwinii* (Bosch) Neger,
Hymenophyllum skottsbergii C. Chr.
Hierba epífita o epipétrica.
Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Hymenophyllum delicatulum Sehnem

Hierba epífita. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum dentatum Cav.

Sin.: *Hymenophyllum bridgesii* Hook.,
Hymenophyllum trichocaulon Phil.,
Leptocionium dentatum (Cav.) Bosch,
Meringium dentatum (Cav.) Copel.,
Sphaerocionium bridgesii (Hook.) Klotzsch
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF).
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Hymenophyllum dicranotrichum (C.
Presl) Hook. ex Sadeb.

Sin.: *Hymenophyllum chiloense* Hook.,
Leptocionium dicranotrichum C. Presl,
Trichomanes spinulosum Phil.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Hymenophyllum elegans Spreng.

Sin.: *Sphaerocionium elegans*
(Spreng.) Copel.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hymenophyllum falklandicum Baker

Sin.: *Hymenophyllum caespitosum*
Christ, hom. illeg., *Hymenophyllum*
falklandicum Baker f. *andinum* Diem &
J.S. Licht., *Hymenophyllum falklandicum*
Baker var. *andinum* Diem & J.S. Licht.,
Hymenophyllum falklandicum Baker
var. *elongatum* Diem & J.S. Licht.,
Hymenophyllum glebarium C. Chr.
Hierba epífita o epipétrica. Endémica.
0-1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG, JFE).

Hymenophyllum ferrugineum Colla

Sin.: *Hymenophyllum berteroi* Hook., hom. illeg., *Hymenophyllum ferrugineum* Colla var. *donatii* Looser, *Hymenophyllum frankliniae* Colenso, *Hymenophyllum subtilissimum* Kunze, hom. illeg., *Sphaerocionium ferrugineum* (Colla) Copel., *Sphaerocionium ferrugineum* (Colla) Copel. var. *donatii* (Looser) G. Kunkel

Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Hymenophyllum filmenofilicum

Christenh. & Schwartsb.

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Hymenophyllum fragile (Hedw.)

C.V. Morton

Sin.: *Hymenophyllum raddianum* Müll. Berol., *Sphaerocionium fragile* (Hedw.) Pic.Serm., *Trichomanes fragile* Hedw.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum fuciforme Sw.

Sin.: *Hymenophyllum fucoides* Cav., hom. illeg., *Hymenophyllum semiteres* Colla, *Leptocionium fuciforme* (Sw.) C. Presl, *Mecodium fuciforme* (Sw.) Copel.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE).

Hymenophyllum fucooides (Sw.) Sw.

Sin.: *Trichomanes fucooides* Sw.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum glaziovii Baker

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.

Sin.: *Hymenophyllum ciliatum* (Sw.) Sw., *Hymenophyllum fragile* (Hedw.) C.V. Morton var. *venustum* (Desv.) C.V. Morton, *Sphaerocionium ciliatum* (Sw.) C. Presl, *Sphaerocionium hirsutum* (L.) C. Presl, *Trichomanes ciliatum* Sw., *Trichomanes hirsutum* L.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum krauseanum Phil.

Sin.: *Hymenophyllum dichotomum* Cav. var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *Hymenophyllum magellanicum* (Desv.)

Willd. ex Kunze var. *krauseanum* (Phil.)

C. Chr., *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. var. *krauseanum* (Phil.) Looser, *Meringium krauseanum* (F. Phil.) G. Kunkel

Hierba epífita o epipétrica. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Hymenophyllum magellanicum

(Desv.) Willd. ex Kunze

Sin.: *Didymoglossum magellanicum* Desv., *Hymenophyllum attenuatum* Hook., *Hymenophyllum bibraianum* J.W. Sturm, *Hymenophyllum seselifolium* C. Presl, *Leptocionium attenuatum* (Hook.) Bosch, *Leptocionium magellanicum* (Desv.) Bosch, *Leptocionium seselifolium* (C. Presl) Bosch, *Meringium magellanicum* (Desv.) Copel., *Ptychophyllum magellanicum* (Desv.) Klotzsch

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Hymenophyllum microcarpum Desv.

Sin.: *Mecodium microcarpum* (Desv.) Copel., *Sphaerocionium microcarpum* (Desv.) Copel.

Hierba epífita. Nativa. 800-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hymenophyllum myriocarpum Hook.

Hierba. Nativa. 900 m.

Países: BRA(PAR).

Hymenophyllum nahuelhuapiense

Diem & J.S. Licht.

Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 200-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).

CHL(LLA, AIS, MAG).

Hymenophyllum pectinatum Cav.

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-3600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv.

Sin.: *Hymenophyllum megachilum* C. Presl, *Hymenophyllum menziesii* C. Presl, *Hymenophyllum mettenii* Bosch, *Hymenophyllum meyeri* C. Presl, *Hymenophyllum nahuelhuapiense* Diem & J.S. Licht. f. *densipinnata* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum*

(Poir.) Desv. var. *elegans* Diem & J.S.

Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.)

Desv. var. *elongatum* Diem & J.S.

Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.)

Desv. var. *imbricatum* Diem & J.S.

Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.)

Desv. var. *minor* Diem & J.S. Licht.,

Hymenophyllum peltatum (Poir.) Desv.

var. *patagonicum* Diem & J.S. Licht.,

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. var.

wilsoni (Hook.) Sadeb., *Hymenophyllum*

unilaterale Bory ex Willd., nom.

illeg., *Hymenophyllum wilsonii* Hook.,

Trichomanes peltatum Poir.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

0-1400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,

TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,

MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Hymenophyllum plicatum Kaulf.

Sin.: *Hymenophyllum nigricans*

Colla, *Hymenophyllum plicatum* Kaulf.

var. *quadrifidum* (F. Phil.) Looser,

Hymenophyllum quadrifidum Phil.,

Hymenophyllum quadrivalve Phil. ex

Reiche, nom. nud., *Meringium plicatum*

(Kaulf.) Copel., *Ptychophyllum plicatum*

(Kaulf.) C. Presl

Hierba terrestre. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(NEU, RNE, TDF).

CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS,

MAG, RME, JFE).

Hymenophyllum plumosum Kaulf.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 1100 m.

Países: BRA(PAR).

Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.

Sin.: *Hymenophyllum clavatum* (Sw.)

Sw., *Hymenophyllum sturmii* Bosch,

Hymenophyllum viridissimum Fée,

Mecodium polyanthos (Sw.) Copel,

Trichomanes clavatum Sw., *Trichomanes*

polyanthos Sw.

Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR,

RGS, SCA).

Hymenophyllum pulchellum Schltldl.

& Cham.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum quetruhuense Diem

& J.S. Licht.

Sin.: *Hymenophyllum quetruhuense* Diem

& J.S. Licht. f. *nana* Diem & J.S. Licht.

Hierba. Endémica. 300-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Hymenophyllum rufum Fée

Sin.: *Hymenophyllum lineare* (Sw.) Sw.
var. *brasiliense* Rosenst., *Sphaerocionium rufum* (Fée) Copel.

Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum rugosum C. Chr. & Skottsbo.

Sin.: *Hymenophyllum rugosum* C. Chr. & Skottsbo. f. *lanceolatum* C. Chr. & Skottsbo.

Hierba. Endémica. 400-700 m.
Países: CHL(JFE).

Hymenophyllum secundum Hook. & Grev.

Sin.: *Hymenophyllum serra* C. Presl, *Meringium secundum* (Hook. & Grev.) Copel.

Hierba epífita o terrestre.
Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Hymenophyllum tortuosum Hook. & Grev.

Sin.: *Hymenophyllum skottsbergii* Gand., hom. illeg., *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *beckeri* (Krause ex Phil.) Espinosa, *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *bustillosii* Espinosa, *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *glomeratum* Diem & J.S. Licht., *Leptocionium tortuosum* (Hook. & Grev.) Bosch, *Meringium tortuosum* (Hook. & Grev.) Copel., *Myrmecostylum tortuosum* (Hook. & Grev.) C. Presl, *Trichomanes beckeri* Krause ex Phil.

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Hymenophyllum umbratile Diem & J.S. Licht.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LRI, LLA).

Hymenophyllum undulatum (Sw.) Sw.

Hierba. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(RGS).

Hymenophyllum venustum Desv.

Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hymenophyllum vestitum (C. Presl) Bosch

Sin.: *Hymenophyllum ulei* H. Christ & Giesenh., *Sphaerocionium vestitum* C. Presl
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polyphlebium Copel.**Polyphlebium angustatum** (Carmich.)

Ebihara & Dubuisson
Sin.: *Trichomanes angustatum* Carmich., *Trichomanes fulvum* Klotzsch, *Trichomanes tenerum* Spreng.

Vandenboschia angustata (Carmich.) Copel., *Vandenboschia tenera* (Spreng.) Copel.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, PAI). URY(CLA, TAC).

Polyphlebium capillaceum (L.)

Ebihara & Dubuisson
Sin.: *Trichomanes capillaceum* L.

Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Polyphlebium diaphanum (Kunth)

Ebihara & Dubuisson
Sin.: *Trichomanes diaphanum* Kunth,

Trichomanes tranninense Fée
Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Polyphlebium hymenophylloides

(Bosch) Ebihara & Dubuisson
Sin.: *Trichomanes hymenophylloides* Bosch

Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polyphlebium philippianum (J.W.

Sturm) Ebihara & Dubuisson
Sin.: *Trichomanes dichotomum* Phil,

Trichomanes philippianum J.W. Sturm, *Vandenboschia philippiana* (J.W. Sturm) Copel.

Hierba. Endémica. 500-700 m.
Países: CHL(JFE).

Trichomanes L.**Trichomanes anadromum** Rosenst.

Sin.: *Trichomanes sinuosum* Rich. ex Willd.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, TAC).

Trichomanes cristatum Kaulf.

Sin.: *Trichomanes sellowianum* C. Presl
Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA).

Trichomanes elegans Rich.

Sin.: *Davalliopsis elegans* (Rich.) Copel., *Trichomanes priurii* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Trichomanes exsectum Kunze

Sin.: *Polyphlebium exsectum* (Kunze) Ebihara & Dubuisson, *Vandenboschia exsecta* (Kunze) Copel.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(MAU, LRI, LLA, JFE).

Trichomanes ingae C. Chr. & Skottsbo.

Sin.: *Polyphlebium ingae* (C. Chr. & Skottsbo) Ebihara & Dubuisson, *Vandenboschia ingae* (C. Chr. & Skottsbo) Copel.

Hierba epífita o epipétrica. Endémica. 100-400 m.

Países: CHL(JFE).

Trichomanes lucens Sw.

Sin.: *Trichomanes auratum* Fée, *Trichomanes kaulfussii* Hook. & Grev.

Hierba epífita o terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Trichomanes mosenii Lindm.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA). PRY(COA).

Trichomanes pellucens Kunze

Hierba terrestre o epífita. Nativa. 400-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Trichomanes pilosum Raddi

Sin.: *Trichomanes langsdorffii* Bosch
Hierba saxícola. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, GUA, PAI). URY(TAC).

Trichomanes polyodioides L.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(TAC).

Trichomanes serratifolium Rosenst.

Hierba epífita o rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Vandenboschia Copel.**Vandenboschia collarata** (Bosch)

Ebihara & K. Iwats.
Sin.: *Trichomanes collaratum* Bosch
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel.

Sin.: *Trichomanes kunzeanum* Hook., *Trichomanes radicans* Sw., *Trichomanes radicans* Sw. var. *gigantea* Mett.,

Trichomanes repens Schott ex Sturm,
Trichomanes repens Schott ex Sturm var.
stipitatum Sturm, *Trichomanes venustum*
 H. Christ, nom. illeg.
 Hierba saxícola. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(CAN, COA, PAI).

Vandenboschia rupestris (Raddi)
 Ebihara & K. Iwats.
 Sin.: *Hymenophyllum rupestre* Raddi,
Trichomanes rupestre (Raddi) Bosch
 Hierba saxícola. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(AMA, PAI).

ISOETACEAE

Isoetes L.

Isoetes alcalophila Halloy
 Hierba. Endémica. 4200 m.
 Países: ARG(CAT, TUC).

Isoetes araucaniana Macluf & Hickey
 Hierba. Endémica. 800-1500 m.
 Países: CHL(BIO, ARA).

Isoetes brasiliensis H.P. Fuchs
 Hierba acuática. Endémica. 0-100 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Isoetes chubutiana Hickey, Macluf &
 W.C. Taylor
 Sin.: *Isoetes meyeri* H.P. Fuchs, nom. nud.,
Isoetes valdiviensis H.P. Fuchs, nom. nud.
 Hierba acuática. Endémica. 700-1300 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
 CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

Isoetes ekmanii U. Weber
 Hierba. Endémica. 300-500 m.
 Países: ARG(BAI, COS, MIS).

Isoetes escondidensis Halloy
 Hierba. Endémica. 4300-4400 m.
 Países: ARG(TUC).

Isoetes fusco-marginata H.P. Fuchs
 Hierba palustre. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(RGS).

Isoetes gardneriana Kunze ex Mett.
 Sin.: *Calamaria gardneriana* (Kunze ex
 Mett.) Kuntze
 Hierba palustre. Nativa.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera
 del área del proyecto).

Isoetes hieronymi U. Weber
 Sin.: *Isoetes argentina* A.A. Eaton ex
 Palmer, nom. nud.
 Hierba acuática. Endémica. 1000 m.
 Países: ARG(COR, RNE). CHL(COQ).

Isoetes maxima Hickey, Macluf &
 Link-Pérez
 Hierba acuática. Endémica. 900-1200 m.
 Países: BRA(RGS).

Isoetes mourabaptistae J.B.S. Pereira,
 P.G. Windisch, M.L. Lorscheitter & Labiak
 Hierba. Endémica. 900-1100 m.
 Países: BRA(RGS).

Isoetes naipiana P.G. Windisch, M.L.
 Lorscheitter & Nervo
 Hierba acuática. Endémica. 900-1000 m.
 Países: BRA(RGS).

Isoetes panamensis Maxon & C.V. Morton
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(APA, CAU).

Isoetes pedersenii H.P. Fuchs ex E. I.
 Meza Torres & Macluf
 Hierba. Endémica. 0-100 m.
 Países: ARG(COS).

Isoetes quiririensis J.B.S. Pereira & Labiak
 Hierba acuática. Endémica. 1000-1100 m.
 Países: BRA(SCA).

Isoetes ramboi Herter
 Hierba acuática. Endémica.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Isoetes savatieri Franch.
 Sin.: *Calamaria savatieri* (Franch.)
 Borsini, comb. illeg., *Calamaria savatieri*
 (Franch.) Kuntze, *Isoetes lechleri*
 Mett. var. *savatieri* (Franch.) L.D.
 Gómez, *Isoetes savatieri* Franch. subsp.
valdiviensis H.P. Fuchs, nom. nud.
 Hierba acuática. Endémica. 0-200 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).
 CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Isoetes sehnemii H.P. Fuchs
 Hierba acuática. Endémica. 400-500 m.
 Países: BRA(RGS).

Isoetes smithii H.P. Fuchs
 Hierba acuática. Endémica. 1000-1600 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Isoetes spannagellii H.P. Fuchs
 Hierba acuática. Endémica.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Isoetes weberi Herter
 Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS). URY(ROC).

LINDSAEACEAE

Lindsaea Dryand. ex Sm.

Lindsaea arcuata Kunze
 Sin.: *Lindsaea horizontalis* Hook.,
Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *arcuata*
 (Kunze) Rosenst., *Lindsaea trapeziformis*
 Dryand. var. *arcuata* (Kunze) Baker
 Hierba. Nativa. 500-1500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Lindsaea bifida (Kaulf.) Mett. ex Kuhn
 Sin.: *Davallia bifida* Kaulf., *Odontosoria*
bifida (Kaulf.) J. Sm., *Stenolobium*
bifidum (Kaulf.) Fée
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Lindsaea botrychioides A. St.-Hil.
 Sin.: *Lindsaea botrychioides* A. St.-Hil.
 var. *subpinnata* Rosenst.
 Hierba. Nativa. 0-1700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryand.
 subsp. **guianensis**
 Sin.: *Adiantum guianense* Aubl.
 Hierba terrestre. Nativa
 Países: BRA(PAR).

Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryand.
 subsp. **lanceastrum** K.U. Kramer
 Hierba terrestre o epífita. Nativa.
 0-700 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Lindsaea lancea (L.) Bedd.
 Sin.: *Adiantum lanceum* L.
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(CAA, CAN, COA, SPE).

Lindsaea ovoidea Fée
 Sin.: *Lindsaea christii* Rosenst.
 Hierba. Nativa. 200-1200 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Lindsaea portoricensis Desv.
 Hierba terrestre o saxícola. Nativa.
 100-300 m.
 Países: PRY(CAN).

Lindsaea quadrangularis Raddi
subsp. **quadrangularis**

Sin.: *Lindsaea lancea* (L.) Bedd. var. *quadrangularis* (Raddi) Rosenst.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Lindsaea quadrangularis Raddi
subsp. **terminalis** K.U. Kramer

Sin.: *Lindsaea quadrangularis* Raddi
var. *pallescens* Sehnem, *Lindsaea terminalis* (K.U. Kramer) A. Rojas
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA).

Lindsaea stricta (Sw.) Dryand.

Sin.: *Adiantum strictum* Sw., *Lindsaea guianensis* (Aubl.) Dryand. f. *stricta* (Sw.) Lindm., *Lindsaea brasiliensis* Desv., *Lindsaea stricta* (Sw.) Dryand. var. *microphylla* (C. Presl) Hassl.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

Lindsaea virescens Sw. var.**catharinae** (Hook.) Baker

Sin.: *Lindsaea catharinae* Hook., *Odontosoria virescens* (Sw.) Rosenst. var. *catharinae* (Hook.) Rosenst., *Stenoloma catharinae* (Hook.) Sehnem
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lindsaea virescens Sw. var. **virescens**

Sin.: *Stenoloma virescens* (Sw.) C. Chr.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

LOMARIOPSIDACEAE

Lomariopsis Fée**Lomariopsis marginata** (Schrad.) Kuhn

Sin.: *Acrostichum erythrodes* Kunze, *Lomaria fraxinifolia* Raddi, *Lomaria marginata* Schrad., *Lomariopsis elongata* Fée, *Lomariopsis erythrodes* (Kunze) Fée, *Lomariopsis lanceolata* Klotzsch ex Holttum, *Lomariopsis speciosa* Klotzsch ex Holttum, *Stenochlaena erythrodes* (Kunze) Underw., *Stenochlaena marginata* (Schrad.) C. Chr.
Hierba hemiepipífita. Nativa. 200-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

LYCOPODIACEAE

Austrolycopodium Holub**Austrolycopodium alboffii** (Rolleri)
Holub

Sin.: *Lycopodium alboffii* Rolleri, *Lycopodium clavatum* L. f. *nana* Albov, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *maius* Herter ex Nessel, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *nanum* (Albov) Looser, *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *pusillum* Herter ex Nessel, *Lycopodium nanum* Herter, *Lycopodium skottsbergii* Herter ex Roiv, nom. nud., *Lycopodium urani* Herter
Hierba. Endémica. 100-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Austrolycopodium confertum

(Willd.) Holub

Sin.: *Lycopodium barrosii* (Looser) Herter, *Lycopodium chonoticum* Phil., *Lycopodium confertum* Willd., *Lycopodium confertum* Willd. var. *barrosii* Looser
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Austrolycopodium erectum (Phil.) Holub

Sin.: *Austrolycopodium assurgens* (Fée) Holub, *Lycopodium assurgens* Fée, *Lycopodium assurgens* Fée var. *schwackei* Christ, *Lycopodium erectum* Phil., *Lycopodium fastigiatum* R. Br. var. *assurgens* (Fée) Nessel, *Lycopodium looseri* Herter, nom. superfl., *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *erectum* (Phil.) Looser, *Lycopodium schwackei* (Christ) Herter
Hierba. Nativa. 1200-2800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL). BRA(RGS, SCA). CHL(ARA, LRI, LLA, MAG).

Austrolycopodium magellanicum (P. Beauv.) Holub

Sin.: *Lepidotis magellanica* P. Beauv., *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Sw., *Lycopodium pichinchense* Hook., *Lycopodium spurium* Willd.
Hierba. Nativa. 300-1600 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Austrolycopodium paniculatum

(Desv. ex Poir.) Holub

Sin.: *Lycopodium dendromorphum* Kunze, nom. illeg., *Lycopodium paniculatum* Desv. ex Poir.

Hierba. Endémica. 700-900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE).

Diphasiastrum Holub**Diphasiastrum falcatum** B. Øllg. & P.G. Windisch

Hierba. Nativa. 1300-2400 m.
Países: BRA(PAR).

Diphasiastrum thyoides (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Holub

Sin.: *Lycopodium complanatum* L. var. *adpressifolium* Spring, *Lycopodium complanatum* L. var. *thyoides* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Christ, *Lycopodium complanatum* L. var. *tropicum* Spring, *Lycopodium complanatum* L. var. *validum* Weath., nom. illeg., *Lycopodium comptoniodes* Desv., *Lycopodium thyoides* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MAL).

Diphasium C. Presl ex Rothm.**Diphasium gayanum** (J. Rémy & Fée)
Holub

Sin.: *Lycopodium gayanum* J. Rémy & Fée, *Lycopodium scariosum* G. Forst. f. *skottsbergii* Herter ex Nessel, *Lycopodium scariosum* G. Forst. var. *gayanum* (J. Remy) Nessel, *Lycopodium skottsbergii* (Herter ex Nessel) Herter
Hierba. Endémica. 300-1300 m.
Países: ARG(SCR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE).

Diphasium jussiaei (Desv. ex Poir.)
Presl ex Rothm.

Sin.: *Lycopodium jussiaei* Desv. ex Poir.
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Huperzia Bernh.**Huperzia catharinae** (Christ) Holub

Sin.: *Lycopodium catharinae* Christ
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).

Huperzia fuegiana (Roiv.) Holub
Sin.: *Lycopodium fuegianum* Roiv.,
Urostachys fuegianus (Roiv.) Herter
Hierba terrestre o saxícola. Endémica.
0-500 m.
Países: ARG(CHU). CHL(AIS, MAG).

Huperzia pungentifolia (Silveira) B. Øllg.
Sin.: *Lycopodium ouopretanum* Christ,
Lycopodium pungentifolium Silveira,
Urostachys hennebergorum Nessel,
Urostachys pungentifolius (Silveira)
Nessel, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter
var. *pungentifolius* (Silveira) Nessel
Hierba terrestre o saxícola. Endémica.
1200-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Huperzia saururoides (Bory & d'Urv.
ex Baker) Rothm.
Sin.: *Lycopodium selago* L. var.
saururoides Bory & d'Urv. ex Baker,
Urostachys saururoides (Bory & d'Urv.
ex Baker) Herter ex Nessel, *Urostachys*
selago (L.) Herter var. *aschersonianus*
Herter ex Nessel, *Urostachys selago* (L.)
Herter var. *hessei* Nessel, nom. inval.
Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF).

Lycopodiella Holub

Lycopodiella duseniana (B. Øllg. &
P.G. Windisch) B. Øllg.
Sin.: *Lycopodiella alopecuroides* (L.)
Cranfill var. *duseniana* B. Øllg. & P.G.
Windisch
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lycopodiella geometra B. Øllg. &
P.G. Windisch
Sin.: *Lycopodium alopecuroides* L. var.
furcatum Fée, *Lycopodium alopecuroides*
L. var. *hoehneanum* Nessel, *Lycopodium*
alopecuroides L. var. *nettoanum* Baker
Hierba. Nativa. 500-1300 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAU, SPE). URY(RIV).

Lycopodiella longipes (Hook. &
Grev.) Holub
Sin.: *Lycopodiella alopecuroides* (L.)
Cranfill var. *integerrima* (Spring) B.
Øllg. & P.G. Windisch, comb. illeg.,
Lycopodium alopecuroides L. var.
longipes (Hook. & Grev.) Rosenst.,

Lycopodium alopecuroides L. f. *integrum*
Hassl., *Lycopodium alopecuroides* L.
f. *intermedium* Hassl., *Lycopodium*
alopecuroides L. var. *divaricatum*
Nessel, *Lycopodium alopecuroides* L.
var. *integerrimum* Spring, nom. illeg.,
Lycopodium longipes Hook. & Grev.
Hierba. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, CAN).
URY(MON).

Lycopodiella tupiana (B. Øllg. & P.G.
Windisch) B. Øllg.
Sin.: *Lycopodiella alopecuroides* (L.)
Cranfill var. *tupiana* B. Øllg. & P.G.
Windisch
Hierba. Nativa. 0-2300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CAS, COL, MAL, MON, RIV, ROC,
SJO, TAC).

Lycopodium L.

Lycopodium clavatum L.

Sin.: *Lepidotis clavata* (L.) P. Beauv.,
Lycopodium aristatum Humb. & Bonpl.
ex Willd., *Lycopodium aristatum* Humb.
& Bonpl. ex Willd. var. *desvauxianum*
Spring, *Lycopodium aristatum* Humb.
& Bonpl. ex Willd. var. *incurvum* Grev.
& Hook., *Lycopodium aristatum* Humb.
& Bonpl. ex Willd. var. *robustius* Grev.
& Hook., *Lycopodium clavatum* L.
var. *aristatum* (Humb. & Bonpl. ex
Willd.) Spring, *Lycopodium clavatum*
L. var. *equisetoides* Nessel, *Lycopodium*
clavatum L. var. *eristachys* (Fée) Nessel
& Hoehne, *Lycopodium clavatum* L.
var. *minarum* H. Christ, *Lycopodium*
clavatum L. var. *piliferum* (Raddi)
Nessel, *Lycopodium clavatum* L. var.
preslianum Spring, *Lycopodium clavatum*
L. var. *raddianum* Spring, *Lycopodium*
clavatum L. var. *robustius* (Grev. &
Hook.) Nakai, *Lycopodium clavatum*
L. var. *trichophyllum* (Desv.) Nessel &
Hoehne, *Lycopodium eristachys* Fée,
Lycopodium piliferum Raddi, *Lycopodium*
preslii Grev. & Hook., *Lycopodium serpens*
C. Presl, *Lycopodium trichiatum* Bory
var. *desvauxianum* Spring, *Lycopodium*
trichophyllum Desv.
Hierba. Nativa. 2600-3800 m.
Países: ARG(COR, JUJ, MIS,
SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(DUR, MAL).

Palhinhaea Vasc. & Franco

Palhinhaea camporum (B. Øllg. &
Windisch) Holub
Sin.: *Lycopodiella camporum* B. Øllg. &
P.G. Windisch
Hierba. Nativa. 400-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAU, CAN).

Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco
Sin.: *Lepidotis cernua* (L.) P. Beauv.,
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm.,
Lycopodium boryanum A. Rich.,
Lycopodium capillaceum (Spring) Willd.
ex Hieron., *Lycopodium cernuum* L.,
Lycopodium cernuum L. f. *sikkimense*
(Müll. Hal.) H.S. Kung, *Lycopodium*
cernuum L. var. *brevifolium* Hassl.,
Lycopodium cernuum L. var. *capillaceum*
Spring, *Lycopodium cernuum* L.
var. *panamense* Wercklé ex Nessel,
Lycopodium cernuum L. var. *sikkimense*
(Müll. Hal.) C.B. Clarke, *Lycopodium*
cernuum L. var. *watsonianum* Nessel,
Lycopodium cymosum L' Herm. ex
Hieron., *Lycopodium heeschii* Müll.
Berol., *Lycopodium hupeanum* Müll.
Berol., *Lycopodium marianum* Willd.,
Lycopodium moritzii Müll. Berol.,
Palhinhaea capillacea (Spring) Holub,
Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco
f. *sikkimensis* (Müll. Hal.) H.S. Kung,
Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco
var. *sikkimensis* (Müll. Hal.) Ching
Hierba. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN,
COA, GUA). URY(CAS, CLA, MAL,
RIV, TAC).

Phlegmariurus (Herter) Holub

Phlegmariurus acerosus (Sw.) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia acerosa* (Sw.) Holub,
Lycopodium acerosum Sw., *Urostachys*
acerosus (Sw.) Herter ex Nessel
Hierba. Nativa. 300-2600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Phlegmariurus badinianus (B. Øllg. &
P.G. Windisch) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia badiniana* B. Øllg. & P.G.
Windisch
Hierba. Endémica. 2300-2400 m.
Países: BRA(SCA).

Phlegmariurus biformis (Hook.) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia biformis* (Hook.) Holub,
Lycopodium biforme Hook., *Urostachys*
biformis (Hook.) Herter
Hierba. Nativa. 800-2400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phlegmariurus christii (Silveira) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia christii* (Silveira) Holub,
Lycopodium christii Silveira
Hierba. Nativa. 800-2500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Phlegmariurus comans (Nessel) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia comans* (Nessel) B. Øllg.
& P.G. Windisch, *Lycopodium comans* H.
Christ, *Urostachys comans* Nessel
Hierba. Nativa. 1500-1700 m.
Países: BRA(PAR).

Phlegmariurus flexibilis (Fée) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia flexibilis* (Fée)
B. Øllg., *Lycopodium flexibile* Fée,
Lycopodium linifolium L. var. *sanguineum*
Spring, *Lycopodium linifolium* L. var.
subaristatum Christ, *Urostachys linifolius*
(L.) Herter var. *flexibilis* (Fée) Nessel,
Urostachys linifolius (L.) Herter var.
sanguineus (Spring) Nessel
Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phlegmariurus fontinaloides
(Spring) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia fontinaloides* (Spring)
Trevis., *Lycopodium fontinaloides* Spring
var. *brasiliense* Spring, *Lycopodium*
fontinaloides Spring, *Lycopodium*
serpyllifolium Fée, *Urostachys*
fontinaloides (Spring) Nessel, *Urostachys*
fontinaloides (Spring) Nessel var.
serpyllifolius (Fée) Nessel & Hoehne,
Urostachys gehrtii Nessel, *Urostachys*
serpyllifolium (Fée) Herter
Hierba epífita. Endémica. 500-2400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Phlegmariurus friburgensis (Nessel)
B. Øllg.
Sin.: *Huperzia friburgensis* (Nessel)
B. Øllg. & P.G. Windisch, *Lycopodium*
friburgense (Nessel) Rolleri, *Urostachys*
friburgensis Nessel, *Urostachys reflexus*
(Lam.) Herter var. *friburgensis* (Nessel)
Nessel
Hierba terrestre o saxícola. Nativa.
500-2000 m.
Países: BRA(PAR).

Phlegmariurus heterocarpon (Fée)
B. Øllg.
Sin.: *Huperzia heterocarpon* (Fée)
Holub, *Huperzia longearistata* (Christ)
Holub, *Lycopodium heterocarpon* Fée,
Lycopodium longearistatum Christ,
Urostachys dichotomus (Jacq.) Herter
var. *spgazzini* (Nessel) Nessel,

Urostachys heterocarpon (Fée) Herter,
Urostachys heterocarpon (Fée) Herter var.
longearistatus (Christ) Nessel, *Urostachys*
longearistatus (Christ) Herter ex Nessel,
Urostachys portoanus Nessel, *Urostachys*
spgazzini Herter ex Nessel
Hierba epífita. Nativa. 500-1600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Phlegmariurus hexastichus (B. Øllg.
& P.G. Windisch) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia hexasticha* B. Øllg. &
P.G. Windisch
Hierba epífita. Endémica. 1000-2400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Phlegmariurus linifolius (L.) B. Øllg.
Sin.: *Lycopodium linifolium* L.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Phlegmariurus loefgrenianus
(Silveira) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia loefgreniana* (Silveira)
B. Øllg. & P.G. Windisch, *Lycopodium*
loefgrenianum Silveira, *Urostachys*
loefgrenianus (Silveira) Herter
Hierba epífita. Nativa. 1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Phlegmariurus mandiocanus (Raddi)
B. Øllg.
Sin.: *Huperzia mandiocana* (Raddi)
Trevis., *Lycopodium dichotomum* Grev.
& Hook., hom. illeg., *Lycopodium*
dichotomum Jacq. var. *mandiocanum* (Raddi)
Rosenst., *Lycopodium mandiocanum*
Raddi, *Lycopodium mandiocanum* Raddi
var. *brasiliense* Spring, *Lycopodium*
pithyoides Schltdl. & Cham., *Lycopodium*
pseudomandiocanum Herter, *Urostachys*
mandiocanus (Raddi) Herter, *Urostachys*
mandiocanus (Raddi) Nessel var. *brasiliensis*
(Spring) Herter ex Nessel & Hoehne,
Urostachys pseudomandicanus (Herzog)
Herter ex Nessel
Hierba epífita. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Phlegmariurus mollicomus (Spring)
B. Øllg.
Sin.: *Lycopodium mollicomum* Spring
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phlegmariurus phylicifolius (Desv.
ex Poir.) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia phylicifolia* (Desv. ex

Poir.) Holub, *Lycopodium congestifolium*
Spring, *Lycopodium nubigenum* Herzog,
Lycopodium phylicifolium Desv. ex Poir.,
Urostachys nubigenus (Herzog) Herter
ex Nessel, *Urostachys phylicifolius* (Poir.)
Herter ex Nessel
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Phlegmariurus quadrifariatus (Bory)
B. Øllg.
Sin.: *Huperzia aschersonii* (Herter)
Holub, *Huperzia quadrifariata* (Bory)
Rothm., *Lycopodium aschersonii* Herter,
Lycopodium fontinaloides Spring var.
coronata Fée, *Lycopodium quadrangulare*
Spring, *Lycopodium quadrifariatum* Bory,
Urostachys aschersonii (Herter) Nessel,
Urostachys fontinaloides (Spring) Nessel
var. *coronatus* (Fée) Nessel, *Urostachys*
quadrangularis (Spring) Nessel,
Urostachys quadrifariatus (Bory) Nessel
Hierba epífita. Nativa. 100-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phlegmariurus reflexus (Lam.) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia bifida* (Humb. & Bonpl.
ex Willd.) Holub, *Huperzia densifolia*
(Baker) Rolleri & Deferrari, *Huperzia*
mexiae (Copel.) Rolleri & Deferrari,
Huperzia reflexa (Lam.) Trevis., *Huperzia*
reflexa (Lam.) Trevis. var. *bifida* (Humb.
& Bonpl. ex Willd.) Trevis., *Huperzia*
reflexa (Lam.) Trevis. var. *minor* (Spring)
B. Øllg., *Lycopodium bifidum* Humb. &
Bonpl. ex Willd., *Lycopodium brutum*
Herter, *Lycopodium densifolium* (Baker)
Underw. & Lloyd, *Lycopodium mexiae*
Copel., *Lycopodium reflexum* Lam.,
Lycopodium reflexum Lam. var. *caesium*
Vareschi, *Lycopodium reflexum* Lam. var.
densifolium Baker, *Lycopodium reflexum*
Lam. var. *majus* Spring, *Lycopodium*
reflexum Lam. var. *minus* Spring,
Lycopodium reflexum Lam. var. *rupestre*
Hassl., *Lycopodium reversum* C. Presl,
Lycopodium stellae-polaris (Herter)
C.V. Morton, *Phlegmariurus reflexus*
(Lam.) B. Øllg. var. *minus* (Spring) B.
Øllg., *Plananthus reflexus* (Lam.) P.
Beauv., *Urostachys bifidus* (Humb. &
Bonpl. ex Willd.) Herter ex Nessel,
Urostachys brutus (Herter) Herter,
Urostachys densifolius (Baker) Herter,
Urostachys intermedius (Spring) Herter
var. *cipoanus* Nessel, *Urostachys jergii*
Nessel, *Urostachys parvifolius* Nessel &
Hoehne, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter,
Urostachys reflexus Lam. var. *brutus* (Herter)
Nessel, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter
var. *densifolius* (Baker) Herter ex Nessel &

Hoehne, *Urostachys reflexus* (Lam.) Herter
var. *minor* (Spring) Herter ex Nessel,
Urostachys reflexus Lam. var. *parvifolius*
(Nessel & Hoehne) Nessel, *Urostachys*
reversus (C. Presl) Herter, *Urostachys stellae-*
polaris Herter

Hierba. Nativa. 600-2300 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR,
RGS, SCA). URY(RIV).

Phlegmariurus saururus (Lam.) B. Øllg.
Sin.: *Huperzia andina* (Rosenst.)

Holub, *Huperzia axillaris* (Roxb.) Rothm.,
Huperzia sanctae-barbarae (Rolleri) Rolleri
& Deferrari, *Huperzia saururus* (Lam.)
Trevis., *Lycopodium andinum* Rosenst.,
Lycopodium axillare Roxb., *Lycopodium*
breve Herter, *Lycopodium elongatum* Lag.
ex Sw., *Lycopodium sanctae-barbarae*
Rolleri, *Lycopodium saururus* Lam.,
Plananthus saururus (Lam.) P. Beauv.,
Selago indica Dill., nom. inval., *Urostachys*
andinus (Rosenst.) Herter ex Nessel,
Urostachys axillaris (Roxb.) Herter ex
Nessel, *Urostachys brevis* (Herter) Herter
ex Nessel, *Urostachys elongatus* (Sw.)
Herter, *Urostachys saururus* (Lam.) Herter
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL,
SLU, TUC).

Phlegmariurus sellowianus (Herter)
B. Øllg.

Sin.: *Huperzia sellowiana* (Herter) B.
Øllg., *Lycopodium sellowianum* Herter
Hierba terrestre o epífita. Nativa.
200-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phlegmariurus silveirae (Nessel) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia silveirae* (Nessel)
B. Øllg. & P.G. Windisch, *Urostachys*
silveirae Nessel
Hierba epífita. Nativa. 800-2400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phlegmariurus sotae (Rolleri) B. Øllg.

Sin.: *Huperzia sotae* (Rolleri) Holub,
Lycopodium sotae Rolleri
Hierba epífita. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Phlegmariurus taxifolius (Sw.) A.

Löve & D. Löve
Sin.: *Huperzia passerinoides* (Kunth)
Trevis., *Huperzia passerinoides*
(Kunth) Trevis. var. *nitens* (Schltdl. &

Cham.) Trevis., *Huperzia rubiginosus*
Nessel, *Huperzia taxifolia* (Sw.)
Trevis., *Lycopodium herminieri* Spring,
Lycopodium nitens Schltdl. & Cham.,
Lycopodium passerinoides Kunth,
Lycopodium schwendeneri Herter,
Lycopodium taxifolium Sw., *Lycopodium*
taxifolium Sw. var. *passerinoides*
(Kunth) Baker, *Urostachys nitens*
(Schltdl. & Cham.) Herter, *Urostachys*
passerinoides Kunth var. *nitens* (Schltdl.
& Cham.) Herter ex Nessel, *Urostachys*
rubiginosus Herter ex Nessel, *Urostachys*
schwendeneri (Herter) Herter, *Urostachys*
schwendeneri (Herter) Herter var. *nitens*
(Schltdl. & Cham.) Herter ex Nessel,
Urostachys taxifolius (Sw.) Herter
Hierba epífita. Endémica. 800-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pseudolycopodiella Holub

Pseudolycopodiella carnosa (Silveira)
Holub

Sin.: *Lycopodium carnosum* Silveira,
Lycopodium carolinianum L. var.
paraguariense Hassl.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAU, SPE).

Pseudolycopodiella meridionalis

(Underw. & F.E. Lloyd) Holub
Sin.: *Lycopodiella caroliniana* (L.) Pic.
Serm. var. *meridionalis* (Underw. &
F.E. Lloyd) B. Øllg. & P.G. Windisch,
Lycopodium carolinianum L. var.
meridionalis (Underw. & F. E. Lloyd)
Nessel, *Lycopodium meridionale* Underw.
& F.E. Lloyd
Hierba perenne. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG (COS). BRA (PAR, RGS,
SCA). PRY(CAU, CAN). URY (CAS,
MON, RIV, TAC).

Pseudolycopodiella paradoxa

(Mart.) Holub
Sin.: *Lycopodiella caroliniana* (L.) Pic.
Serm. var. *paradoxa* (Mart.) B. Øllg. &
P.G. Windisch, *Lycopodium carolinianum*
L. var. *paradoxum* (Mart.) Christ,
Lycopodium carolinianum L. subsp.
paradoxum (Mart.) Hassl., *Lycopodium*
paradoxum Mart.
Hierba perenne. Nativa. 700-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY (CAU).

LYGODIACEAE

Lygodium Sw., nom. cons.

Lygodium venustum Sw.

Sin.: *Hydroglossum hastatum*
Willd., hom. illeg., *Hydroglossum*
hirsutum Willd., nom. illeg.,
Lygodium hastatum (Willd.) Desv.,
nom. illeg., *Lygodium mucronulatum*
Sturm, *Lygodium palmatilobum*
Sturm, *Lygodium pohlianum* C. Presl,
Lygodium polymorphum (Cav.) Kunth
f. *hirsuta* (Willd.) R. Knuth, *Lygodium*
polymorphum (Cav.) Kunth var. *hirsutum*
(Willd.) Farw., *Lygodium volubile* Sw. var.
hirsutum (Willd.) Bonap.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(RGS).
PRY(PAI).

Lygodium volubile Sw.

Sin.: *Hydroglossum volubile* (Sw.)
Willd., *Lygodium hirtum* Kaulf., *Lygodium*
micans Sturm, *Lygodium puberulum*
Sturm, *Lygodium volubile* Sw. var. *hirtum*
(Kaulf.) Farw.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, PAI).

MARATTIACEAE

Danaea Sm., nom. cons.

Danaea elliptica Sm.

Sin.: *Danaea geniculata* Raddi, *Danaea*
polymorpha Lepr. ex Baker
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: BRA(SCA).

Danaea moritziana C. Presl

Sin.: *Danaea excurrens* Rosenst., *Danaea*
moritziana C. Presl var. *brasiliensis* Rosenst.,
Danaea muelleriana Rosenst., *Danaea*
polymorpha Lepr. ex Baker
Hierba. Nativa. 0-2600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Danaea nodosa (L.) Sm.

Sin.: *Acrostichum nodosum* L., *Danaea*
cordata Fée, *Danaea sellowiana* C. Presl
Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN,
COA, GUA).

Eupodium J. Sm.

Eupodium kaulfussii (J. Sm.) J. Sm.

Sin.: *Eupodium kaulfussii* (Hook.) J. Sm. var. *acuminatum* Fée, *Eupodium kaulfussii* (Hook.) J. Sm. var. *macropteron* Fée, *Gymnotheca raddiana* (Schott) C. Presl, *Marattia kaulfussii* J. Sm., *Marattia raddiana* Schott
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Marattia Sw.

Marattia cicutifolia Kaulf.

Sin.: *Gymnotheca cicutifolia* (Kaulf.) C. Presl, *Gymnotheca obtusidens* C. Presl, *Gymnotheca podolepis* de Vriese, *Gymnotheca polyodon* C. Presl, *Gymnotheca verschaffeltiana* de Vriese & Harting, *Marattia fraxinea* Raddi, nom. illeg., *Marattia juerguensis* Rosenst., *Marattia obtusidens* (C. Presl) Sturm, *Marattia podolepis* (de Vriese) Sturm, *Marattia polyodon* (C. Presl) Sturm, *Marattia raddii* Desv., *Marattia raddii* Desv. var. *juergemsii* (Rosenst.) Rosenst., *Marattia verschaffeltiana* (de Vriese & Harting) Sturm in Mart.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

MARSILEACEAE

Marsilea L.

Marsilea ancylopoda A. Braun

Sin.: *Marsilea berteroi* A. Braun, *Marsilea concinna* Baker, *Marsilea ernestii* A. Braun, *Marsilea hickenii* Herter, *Marsilea mexicana* A. Braun, *Zaluzianskia ancylopoda* (A. Braun) Kuntze, *Zaluzianskia berteroi* (A. Braun) Kuntze, *Zaluzianskia concinna* (Baker) Kuntze, *Zaluzianskia ernestii* (A. Braun) Kuntze, *Zaluzianskia mexicana* (A. Braun) Kuntze
Hierba acuática. Nativa. 0-2400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, CHO, CON, ITA, ÑEE).

URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR, TAC).

Marsilea deflexa A. Braun

Sin.: *Zaluzianskia deflexa* (A. Braun) Kuntze
Hierba acuática. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, ITA, PHA).

Marsilea mollis B.L. Rob. & Fernald

Sin.: *Marsilea punae* de la Sota
Hierba acuática. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC). CHL(COQ, VAL).

Marsilea polycarpa Hook. & Grev.

Sin.: *Marsilea brasiliensis* Mart.
Hierba acuática. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Pilularia L.

Pilularia americana A. Braun

Sin.: *Calamistrum americanum* (A. Braun) Kuntze, comb. illeg., *Calamistrum mandonii* (A. Braun) Kuntze, comb. illeg., *Pilularia mandonii* A. Braun, *Pilularia valdiviana* Phil. ex Baker, nom. nud.
Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, NEU, RNE, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(CAS).

Regnellidium Lindm.

Regnellidium diphyllum Lindm.

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA). URY(CLA, PAY, ROC, TYT).

NEPHROLEPIDACEAE

Nephrolepis Schott

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

Sin.: *Aspidium acutum* Schkuhr, *Aspidium biserratum* Sw.
Hierba epífita. Nativa. 100-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nephrolepis brownii (Desv.)

Hovenkamp & Miyam.
Sin.: *Nephrodium brownii* Desv.

Hierba epífita o terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl

Sin.: *Aspidium cordifolium* (L.) Sw., *Aspidium tuberosum* Bory ex Willd., *Drynaria cordifolia* (L.) Fée, *Nephrodium cordifolium* (L.) Desv., *Nephrolepis auriculata* (L.) Trimen, *Nephrolepis cordifolia* (L.) C. Presl var. *tuberosa* (Bory ex Willd.) Baker, *Nephrolepis exaltata* (L.) Schott var. *tuberosa* (Bory ex Willd.) Kuntze
Nephrolepis tuberosa (Bory ex Willd.) C. Presl, *Polypodium auriculatum* L., *Polypodium cordifolium* L., nom. cons.
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

Nephrolepis exaltata (L.) Schott

Sin.: *Polypodium exaltatum* L.
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott

Sin.: *Aspidium pectinatum* Willd., *Nephrodium pectinatum* (Willd.) Link
Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nephrolepis pendula (Raddi) J. Sm.

Sin.: *Aspidium pendulum* Raddi
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug

Sin.: *Polypodium rivulare* Vahl
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 400-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

OLEANDRACEAE

Arthropteris J. Sm. ex Hook. f.

Arthropteris altescandens (Colla) J. Sm.

Sin.: *Nephrolepis altescandens* (Colla) Baker, *Polypodium altescandens* Colla, *Polypodium procurrens* Kunze
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(JFE).

Oleandra Cav.

Oleandra australis Schwartsb. & J. Prado
Hierba epífita. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(PAR).

OPHIOGLOSSACEAE**Botrychium** Sw.

Botrychium dusenii (Christ) Alston
Sin.: *Botrychium lunaria* (L.) Sw. var. *antarctica* Speg., *Botrychium lunaria* (L.) Sw. var. *dusenii* Christ, *Botrychium matricariaefolium* (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch subsp. *patagonicum* (Christ) R.T. Clausen
Botrychium ramosum (Roth) Asch. var. *patagonicum* Christ
Hierba. Endémica. 0-3200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

Botrypus Michx.

Botrypus virginianus (L.) Michx.
Sin.: *Botrychium cicutarium* (Savigny) Sw., *Botrychium virginianum* (L.) Sw., *Osmunda cicutaria* Savigny, *Osmunda virginiana* L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL). BRA(RGS, SCA). URY(RIV).

Cheiroglossa C. Presl

Cheiroglossa palmata (L.) C. Presl
Sin.: *Cheiroglossa austrobrasiliensis* Brade, *Ophioderma palmata* (L.) Nakai, *Ophioglossum palmatum* L.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Ophioglossum L.**Ophioglossum crotalophoroides**

Walter
Sin.: *Ophioglossum bulbosum* Michx., *Ophioglossum crotalophoroides* Walter var. *nanum* J.S. Licht. ex Osten, *Ophioglossum pusillum* Nutt., *Ophioglossum stipatum* Miers ex Colla, *Ophioglossum tuberosum* Hook. &

Arn., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *crotalophoroides* (Walter) D.C. Eaton
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CEN, COA). URY(ART, CAS, CLA, MON, SJO, TAC).

Ophioglossum fernandezianum C. Chr.

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(JFE).

Ophioglossum melipillense Gay

Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SLU, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Ophioglossum nudicaule L. f.

Sin.: *Ophioglossum ellipticum* Hook. & Grev., *Ophioglossum gomezianum* Welw. emend A. Br., *Ophioglossum macrorrhizum* Kunze, *Ophioglossum nudicaule* L. f. var. *macrorrhizum* (Kunze) R.T. Clausen, *Ophioglossum vulgatum* L. var. *nudicaule* (L. f.) D.C. Eaton., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *surinamense* Luerss.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CHO, COA, ITA, PHA). URY(MON).

Ophioglossum opacum Carmich.

Sin.: *Ophioglossum crotalophoroides* Walter var. *opacum* (Carmich.) J.S. Licht., *Ophioglossum crotalophoroides* Walter subsp. *robustum* R.T. Clausen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Ophioglossum reticulatum L.

Sin.: *Ophioglossum peruvianum* C. Presl, *Ophioglossum vulgatum* L. var. *reticulatum* (L.) Luerss.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(COA). URY(RIV).

Ophioglossum vulgatum L.

Sin.: *Ophioglossum nudicaule* L. f. var. *robustum* J.S. Licht., *Ophioglossum valdivianum* Phil., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *valdivianum* (F. Phil.) J.S. Licht.
Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LRI, LLA, AIS).

Sceptridium Lyon**Sceptridium australe** (R. Br.) Lyon

Sin.: *Botrychium australe* R. Br. subsp. *australe*
Hierba. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, SLU, TUC).

Sceptridium negerii (Christ) Holub

Sin.: *Botrychium australe* R. Br. subsp. *negerii* (H. Christ) R.T. Clausen, *Botrychium negerii* H. Christ
Hierba. Endémica. 700-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE).

Sceptridium schaffneri (Underw.) Lyon

Sin.: *Botrychium schaffneri* Underw.
Hierba. Nativa. 1500-2600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

OSMUNDACEAE**Osmunda** L.**Osmunda gracilis** Link

Hierba. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).

Osmunda spectabilis Willd.

Sin.: *Aphyllocalpa regalis* (L.) Lag., D. García & Clemente, *Osmunda palustris* Schrad., *Osmunda regalis* L. subsp. *palustris* (Schrad.) A. Löve & D. Löve, *Osmunda regalis* L. subsp. *spectabilis* (Willd.) Á. Löve & D. Löve, *Osmunda regalis* L. var. *brasiliensis* (Hook. & Grev.) Kunze, *Osmunda regalis* L. var. *palustris* (Schrad.) C. Chr., *Osmunda regalis* L. var. *spectabilis* (Willd.) A. Gray, *Osmunda spectabilis* Willd. subsp. *palustris* (Schrad.) A. Löve & D. Löve, *Osmunda spectabilis* Willd. var. *brasiliensis* Hook. & Grev.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, SPE). URY(CAS, CLA, LAV, MON, RNO, ROC).

Osmundastrum C. Presl**Osmundastrum cinnamomeum** (L.)

C. Presl
Sin.: *Anemia bipinnata* (L.) Sw.,

Osmunda bipinnata L., *Osmunda cinnamomea* L., *Osmunda cinnamomea* L. var. *imbricata* (Kunze) Milde, *Osmunda imbricata* Kunze

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, COA, SPE). URY(RIV).

PLAGIOGYRIACEAE

Plagiogyria (Kunze) Mett.

Plagiogyria fialhoi (Fée & Glaz.) Copel.

Sin.: *Lomaria fialhoi* Fée & Glaz.

Hierba rupícola o terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

POLYPODIACEAE

Adetogramma (A. Anderson) Kuntze

Adetogramma chrysolepis (Hook.)

T.E. Almeida

Sin.: *Lepicystis chrysolepis* (Hook.)

Diels, *Microgramma chrysolepis* (Hook.)

Crabbe, *Pleopeltis chrysolepis* (Hook.)

de la Sota, *Polypodium bangii* Baker,

Polypodium chrysolepis Hook.

Hierba epífita. Nativa. 1600-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Alansmia M. Kessler, Moguel, Sundue & Labiak

Alansmia reclinata (Brack.) Moguel & M. Kessler

Sin.: *Ctenopteris ciliaris* (Fée) Copel.,

Ctenopteris reclinata (Brack.) Copel,

Polypodium reclinatum Brack.

Terpsichore reclinata (Brack.) Labiak

Hierba epífita. Nativa. 500-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Campyloneurum C. Presl

Campyloneurum aglaolepis (Alston) de la Sota

Sin.: *Polypodium aglaolepis* Alston

Hierba epífita. Nativa. 1200-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA).

Campyloneurum angustifolium

(Sw.) Fée

Sin.: *Campyloneurum taeniosum*

(Willd.) Fée, *Cyrtophlebium angustifolium*

(Sw.) J. Sm., *Goniophlebium angustifolium*

(Sw.) Brack, *Marginaria angustifolia* (Sw.)

C. Presl, *Polypodium angustifolium* Sw.,

Polypodium taeniosum Willd.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(SCA).

Campyloneurum angustipaleatum

(Alston) M. Mey. ex Lellinger

Sin.: *Polypodium angustipaleatum* Alston

Hierba. Nativa. 800-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Campyloneurum atlanticum R.C.

Moran & Labiak

Hierba hemiepífita. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(GUA, PAI).

Campyloneurum austrobrasillianum

(Alston) de la Sota

Sin.: *Polypodium austrobrasillianum* Alston

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Campyloneurum crispum Fée

Sin.: *Campyloneurum acrocarpon* Fée

Hierba terrestre o epífita. Nativa.

0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Campyloneurum decurrens (Raddi)

C. Presl

Sin.: *Aspidium pentaphyllum* Willd.,

Cyrtophlebium decurrens (Raddi) J. Sm.,

Polypodium decurrens Raddi

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Campyloneurum fallax Fée

Sin.: *Polypodium longipetiolatum* Brade

Hierba epífita o rupícola. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Campyloneurum lorentzii (Hieron.)

Ching

Sin.: *Polypodium lorentzii* Hieron.

Hierba terrestre o epífita. Nativa.

0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL,

TUC). PRY(CAA).

Campyloneurum minus Fée

Sin.: *Campyloneurum herbaceum*

(Christ) Ching, *Polypodium herbaceum* Christ

Hierba epífita. Nativa. 100-1800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

PRY(COA, GUA, ITA, PAI).

Campyloneurum nitidum (Kaulf.)

C. Presl

Sin.: *Campyloneurum leuconeurum*

Fée, *Campyloneurum majus* (Hieron. ex

Hicken) Lellinger, *Polypodium nitidum*

Kaulf., *Polypodium phyllitidis* L. f. *major*

Hieron. ex Hicken, *Polypodium phyllitidis*

L. f. *minus* Hieron.

Hierba epífita. Nativa. 300-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ,

MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAA, CAN, GUA, ITA,

PAI). URY(CLA, TAC).

Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl

Sin.: *Polypodium repens* Aubl.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Campyloneurum rigidum J. Sm.

Sin.: *Polypodium rigidum* (J. Sm.) Lowe

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Campyloneurum tucumanense

(Hieron.) Ching

Sin.: *Polypodium tucumanense* Hieron.

Hierba terrestre. Endémica. 1000-

1800 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).

Ceradenia L.E. Bishop

Ceradenia albidula (Baker) L.E.

Bishop

Sin.: *Ctenopteris albidula* (Baker)

Copel., *Polypodium albidulum* Baker,

Polypodium subinaequale H. Christ

Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ceradenia maackii Labiak & J.B.S. Pereira

Hierba epífita. Endémica. 1500-1600 m.

Países: BRA(PAR).

Ceradenia spixiana (Mart. ex Mett.)

L.E. Bishop

Sin.: *Grammitis transiens* (Lindm.) F.

Seym., *Polypodium longipes* Fée, nom.

illeg., *Polypodium radicale* Moritz ex

Baker, *Polypodium spixianum* Mart. ex

Mett., *Polypodium transiens* Lindm.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cochlidium Kaulf.**Cochlidium punctatum** (Raddi)

L.E. Bishop

Sin.: *Cochlidium paucinervatum* (Fée)
C. Chr., *Grammitis paucinervata* Fée,
Grammitis punctata Raddi, *Monogramma*
rudolfii Rosenst., *Polypodium*
paucinervatum (Fée) C. Chr., *Polypodium*
punctatum (Raddi) Hook.
Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E. Bishop

Sin.: *Acrostichum serrulatum*
Sw., *Asplenium serrulatum* (Sw.)
Sw., *Grammitis serrulata* (Sw.) Sw.,
Gymnopteris serrulata (Sw.) Bernh.,
Polypodium duale Maxon, nom. superfl.,
Polypodium serrulatum (Sw.) Mett.,
comb. illeg., *Xiphopteris auyantepuiensis*
Vareschi, *Xiphopteris extensa* Fée,
Xiphopteris serrulata (Sw.) Kaulf.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Grammitis Sw.**Grammitis fluminensis** Fée

Sin.: *Grammitis marginella* (Sw.)
Sw. var. *castellensis* Brade, *Polypodium*
marginellum Bory ex Willd. var.
brasiliense Rosenst
Hierba epífita. Nativa. 1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lellingeria A.R. Sm. & R.C. Moran

Lellingeria apiculata (Kunze ex
Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenopteris apiculata* (Kunze
ex Klotzsch) Copel., *Grammitis*
apiculata (Kunze ex Klotzsch) F.
Seym., *Polypodium apiculatum* Kunze
ex Klotzsch, *Polypodium pecten* Fée,
Xiphopteris apiculata (Kunze ex
Klotzsch) Copel.
Hierba epífita. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Lellingeria brevistipes (Mett. ex
Kuhn) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenopteris brevistipes* (Mett. ex
Kuhn) Copel., *Polypodium brevistipes*
Mett. ex Kuhn, *Polypodium brevistipes*
Mett. ex Kuhn var. *sebastianopolitanum*
Baker, *Polypodium brevistipes* Mett. ex

Kuhn var. *subintegrum* Rosenst.
Hierba epífita. Nativa. 400-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lellingeria ciliolepis (C. Chr.) A.R. Sm.
Sin.: *Polypodium ciliolepis* C. Chr.
Hierba epífita. Nativa. 1600-3800 m.
Países: ARG(SAL).

Lellingeria depressa (C. Chr.) A.R.
Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Polypodium depressum* C. Chr.,
Polypodium immersum Fée
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lellingeria itatimensis (C. Chr.) A.R.
Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenopteris itatimensis* (C. Chr.)
Copel., *Polypodium itatimensis* C. Chr.,
Polypodium saxicola Rosenst.
Hierba epífita. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Lellingeria tamandarei (Rosenst.)
A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenopteris tamandarei* (Rosenst.)
Copel., *Polypodium tamandarei* Rosenst.
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.
Países: BRA(SCA).

Leucotrichum Labiak

Leucotrichum organense (Gardner)
Labiak
Sin.: *Grammitis organensis* Gardner,
Grammitis reitzii (Alston) Brade, *Lellingeria*
organensis (Gardner) A.R. Sm. & R.C.
Moran, *Polypodium organense* (Gardner)
Mett., *Xiphopteris organensis* (Gardner)
Copel., *Xiphopteris reitzii* Alston
Hierba epífita. Nativa. 400-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leucotrichum schenckii (Hieron.)
Labiak
Sin.: *Grammitis schenckii* (Hieron.)
Brade, *Polypodium schenckii* Hieron.,
Xiphopteris schenckii (Hieron.) Copel.
Hierba epífita. Nativa. 400-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Melpomene A.R. Sm. & R.C. Moran

Melpomene albicans Lehnert
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Melpomene melanosticta (Kunze)
A.R. Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Grammitis melanosticta* (Kunze)
F. Seym., *Polypodium calvum* Maxon,
Polypodium melanostictum Kunze
Hierba rupícola. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR).

Melpomene peruviana (Desv.) A.R.
Sm. & R.C. Moran
Sin.: *Ctenopteris peruviana* (Desv.) J.
Sm., *Grammitis peruviana* (Desv.) C.V.
Morton, *Polypodium peruvianum* Desv.,
Polypodium stipitatum Hook. & Grev.
Hierba terrestre o epífita. Nativa.
500-4200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL,
SLU, TUC). BRA(SCA).

Melpomene xiphopteroides (Liebm.)
A.R. Sm. & R.C. Moran var. **acrodonta**
(Fée) Lehnert
Sin.: *Polypodium acrodontium* Fée
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Microgramma C. Presl

Microgramma geminata (Schrad.)
A.F. Tryon & R.M. Tryon
Sin.: *Polypodium geminatum* Schrad.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa.
0-200 m.
Países: BRA(PAR).

Microgramma lindbergii (Mett.) de la Sota
Sin.: *Drynaria lindbergii* (Mett.) Fée,
Polypodium lindbergii Mett.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA,
AMA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Microgramma mortoniana de la Sota
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, MIS,
SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(PAI).
URY(CLA, COL).

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota
Sin.: *Polypodium percussum* Cav.
Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Microgramma persicariifolia
(Schrad.) C. Presl
Sin.: *Polypodium persicariifolium* Schrad.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA,
CAN, CON, SPE).

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota

Sin.: *Craspedaria grandis* Fée, *Pleopeltis squamulosa* (Kaulf.) C. Presl, *Polypodium squamulosum* Kaulf.

Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN). URY(ART, CLA, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Microgramma tecta (Kaulf.) Alston

Sin.: *Polypodium tectum* Kaulf.
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.

Sin.: *Anapeltis vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) J. Sm., *Craspedaria cordifolia* Fée, *Craspedaria vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Link, *Goniophlebium vacciniifolium* (Langsd. & Fisch.) J. Sm. ex Hook., *Lepicystis vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Diels, *Lopholepis vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) J. Sm., *Marginaria vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) C. Presl, *Niphobolus vacciniifolius* (Langsd. & Fisch.) Keyserl.
Polypodium vacciniifolium Langsd. & Fisch.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CAN, CON, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CLA, MAL, RIV, ROC, SAO, TAC).

Microsorium Link ex Copel.**Microsorium scolopendria** (Burm. f.) Copel.

Sin.: *Polypodium scolopendria* Burm. f.
Hierba. Nativa.
Países: CHL(IPA).

Moranopteris R.Y. Hirai & J. Prado**Moranopteris achilleifolia** (Kaulf.)

R.M. Tryon
Sin.: *Ctenopteris achilleifolia* (Kaulf.) J. Sm., *Grammitis achilleifolia* (Kaulf.) R.M. Tryon, *Micropolypodium achilleifolium* (Kaulf.) Labiak & F.B. Matos, *Polypodium achilleifolium* Kaulf., *Terpsichore achilleifolia* (Kaulf.) A.R. Sm.
Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Moranopteris gradata (Baker) R.Y.

Hirai & J. Prado
Sin.: *Ctenopteris gradata* (Baker) Copel., *Ctenopteris schwackei* (H. Christ) Copel., *Grammitis gradata* (Baker) R.M. Tryon & A.F. Tryon, *Micropolypodium gradatum* (Baker) Labiak & F.B. Matos, *Polypodium gradatum* Baker, *Polypodium schwackei* H. Christ, *Terpsichore gradata* (Baker) A.R. Sm.
Hierba epífita. Nativa. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Moranopteris setosa (Kaulf.) R.Y. Yirai & J. Prado

Sin.: *Grammitis setosa* (Kaulf.) Blume, *Micropolypodium setosum* (Kaulf.) A.R. Sm., *Polypodium micropteris* C. Chr., *Xiphopteris setosa* Kaulf.
Hierba rupícola. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Niphidium J. Sm.**Niphidium crassifolium** (L.) Lellinger

Sin.: *Anaxetum crassifolium* (L.) Schott, comb. illeg., *Dipteris crassifolia* (L.) J. Sm., *Drynaria crassifolia* (L.) J. Sm., *Pessopteris crassifolia* (L.) Underw. & Maxon, *Phymatodes crassifolia* (L.) C. Presl, *Phymatodes porrecta* C. Presl, *Pleopeltis crassifolia* (L.) T. Moore, *Pleuridium crassifolium* (L.) Fée, *Polypodium crassifolium* L., *Polypodium porrectum* Willd.
Hierba epífita. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA).

Niphidium rufosquamatum Lellinger

Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA).

Notogrammitis Parris**Notogrammitis angustifolia** (Jacq.) Parris

Sin.: *Asplenium angustifolium* Jacq., *Grammitis araucana* Phil., p.p., *Grammitis billardieri* Willd. f. *nana* (Brack.) de la Sota, *Grammitis billardieri* Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota, *Grammitis kerguelensis* Tardieu, *Grammitis magellanica* Desv., *Grammitis poeppigiana* (Mett.) Pic. Serm., *Polypodium australe* (R. Br.) Mett. f. *nanum* (Franch.) Macloskie,

Polypodium billardieri (Willd.) C. Chr. f. *nanum* (Brack.) Franch. ex Skottsbs., *Polypodium billardieri* C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr., *Polypodium gramineum* Poir., hom. illeg., *Polypodium magellanicum* (Desv.) Copel., *Polypodium magellanicum* (Desv.) J.W. Sturm, *Polypodium poeppigianum* Mett.
Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Notogrammitis crassior (Kirk) Parris

Sin.: *Grammitis armstrongii* Tindale, *Grammitis australis* R. Br. var. *nana* (Brack.) Franch., *Grammitis magellanica* Desv. f. *nana* (Brack.) de la Sota ex T.R. Dudley, *Grammitis nana* Brack., hom. illeg., *Polypodium australe* Fée var. *nanum* (Brack.) Macloskie, *Polypodium crassium* Kirk, *Polypodium nanum* (Brack.) J.W. Sturm
Hierba epífita. Cosmopolita. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU, SCR, TDF).

Notogrammitis patagonica (C. Chr.) Parris

Sin.: *Grammitis patagonica* (C. Chr.) Parris, *Grammitis repanda* Kunze ex Mett., *Polypodium patagonicum* C. Chr.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Pecluma M.G. Price**Pecluma barituensis** O.G. Martínez & de la Sota

Hierba epífita. Endémica. 900-1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Pecluma camptophyllaria (Fée) M.G. Price var. **lachnifera** (Hieron.) Lellinger

Sin.: *Polypodium camptophyllum* Fée var. *lachniferum* (Hieron.) A.M. Evans, *Polypodium lachniferum* Hieron.
Hierba epífita. Nativa. 0-400 m.
Países: PRY(CAN).

Pecluma chnoophora (Kunze) Salino & F. Costa Assis

Sin.: *Polypodium chnoophorum* Kunze
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Pecluma choquetangensis (Rosenst.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium choquetangense* Rosenst.
Hierba epífita. Nativa. 1600-2800 m.
Países: ARG(JUJ).

Pecluma filicula (Kaulf.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium elasticum* Rich.
var. *filicula* (Kaulf.) Baker, *Polypodium filiculum* Kaulf.

Hierba epífita. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAA, CAN, PAI). URY(MAL, ROC).

Pecluma oranensis (de la Sota) de la Sota

Sin.: *Polypodium oranense* de la Sota
Hierba epífita. Nativa. 1500-1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Pecluma paradiseae (Langsd. & Fisch.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium paradiseae* Langsd. & Fisch.
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium microsorum* Lindm.,
hom. illeg., *Polypodium pectinatiforme*
Lindm., *Polypodium pectinatiforme*
Lindm. var. *hirsutum* Rosenst.,
Polypodium pectinatum L. f. *typica*
Rosenst., nom. inval., *Polypodium*
pectinatum L. var. *truncatum* Rosenst.
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.G. Price

Sin.: *Ctenopteris plumula* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm., *Polypodium plumula* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Hierba epífita. Nativa. 600-800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).

Pecluma recurvata (Kaulf.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium extensum* Fée,
Polypodium paraguayense Baker,
Polypodium recurvatum Kaulf.,
Polypodium recurvatum Kaulf. var.
paraguayense (Baker) Hassl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(COA, GUA, PAI).

Pecluma robusta (Fée) M. Kessler & A.R. Sm.

Sin.: *Pecluma ptilodon* (Kunze) M.G. Price var. *robusta* (Fée) Lellinger,
Polypodium ptilodon Kunze var. *robustum*
(Fée) A.M. Evans, *Polypodium robustum* Fée
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, SPE).

Pecluma sicca (Lindm.) M.G. Price

Sin.: *Polypodium heteroclitum* Fée,
hom. illeg., *Polypodium siccum* Lindm.
Hierba epífita. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA).
URY(CLA, RIV).

Pecluma singeri (de la Sota) M.G. Price

Sin.: *Polypodium gregale* Sehnem,
Polypodium pectinatum L. var. *aurita*
Rosenst., *Polypodium singeri* de la Sota
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA).

Pecluma truncorum (Lindm.) M.G. Price

Sin.: *Ceradenia glaziovii* (Baker) Labiak,
Ctenopteris glaziovii (Baker) Copel.,
Ctenopteris truncorum (Lindm.) Copel.,
Polypodium bakeri Lindm., hom. illeg.,
Polypodium elasticum Bory ex Willd. var.
glaziovii Baker, *Polypodium glaziovii* Baker,
Polypodium truncorum Lindm.
Hierba epífita. Nativa. 200-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pecluma venturii (de la Sota) M.G. Price

Sin.: *Polypodium venturii* de la Sota
Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).
PRY(CAA, COA, PAI).

Phlebodium (R. Br.) J. Sm.**Phlebodium areolatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm.

Sin.: *Phlebodium aureum* (L.) J. Sm.
var. *areolatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Farw., *Phlebodium aureum* (L.) J. Sm. var. *areolatum* (Humb. & Bonpl.) de la Sota, comb. superfl., *Polypodium areolatum* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Hierba epífita. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

Phlebodium aureum (L.) J. Sm.

Sin.: *Chrysopteris aurea* (L.) Link,
Polypodium aureum L.
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(COS, JUJ). BRA(PAR).

Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm.

Sin.: *Polypodium decumanum* Willd.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAN, CON).

Pleopeltis Humb. & Bonpl. ex Willd.**Pleopeltis astrolepis** (Liebm.) E.

Fourn.
Sin.: *Polypodium astrolepis* Liebm.
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Pleopeltis bryopoda (Maxon) de la Sota

Sin.: *Polypodium bryopodum* Maxon
Hierba terrestre. Nativa. 2500-3900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Pleopeltis furcata (L.) A.R. Sm.

Sin.: *Pteris furcata* L.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota

Sin.: *Goniophlebium hirsutissimum* (Raddi) Brack., *Marginaria hirsutissima* (Raddi) Pic.Serm., *Polypodium hirsutissimum* Raddi, *Polypodium lepidopteris* (Langsd. & Fisch.) Kunze var. *rufulum* (C. Presl) Baker, *Polypodium raddi* Desv., nom. superfl., *Polypodium rufulum* C. Presl, *Polypodium vexillare* H. Christ

Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, SPE). URY(LAV, RIV).

Pleopeltis lepidopteris (Langsd. & Fisch.) de la Sota

Sin.: *Acrostichum lepidopteris* Langsd. & Fisch., *Polypodium lepidopteris* (Langsd. & Fisch.) Kunze
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(COA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC).

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.

Sin.: *Drynaria lanceolata* (L.) Fée,
Drynaria macrocarpa (Bory ex Willd.) Fée, *Grammitis araucana* Phil., p.p., *Grammitis robusta* Phil., *Lepicystis lanceolata* (L.) Diels, *Marginaria lanceolata* (L.) Herter, *Niphobolus*

lanceolatus (L.) Keyserl., *Phlebodium lanceolatum* (L.) J. Sm., *Pleopeltis lanceolata* (L.) C. Presl, hom. illeg., *Polypodium lanceolatum* L., *Polypodium lanceolatum* L. var. *araucanum* (F. Phil.) Looser, *Polypodium macrocarpum* Bory ex Willd., *Polypodium marginale* Bory ex Willd., nom. illeg.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(ANT, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE). URY(MAL).

Pleopeltis masafuerae (Phil.) de la Sota

Sin.: *Polypodium masafuerae* Phil.

Hierba terrestre o saxícola. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(JFE).

Pleopeltis minima (Bory) J. Prado & R.Y. Hirai

Sin.: *Goniophlebium incanum* J. Sm. var. *minus* Fée, *Marginaria dielsii* Herter, *Pleopeltis squalida* (Vell.) de la Sota, *Polypodium incanum* Sw. var. *squalidum* (Vell.) Baker, *Polypodium microlepis* Fée, *Marginaria minima* Bory, *Polypodium minimum* (Bory) Herter, comb. illeg., *Polypodium polypodioides* (L.) Watt var. *minimum* (Bory) Kuhlman & Kuhn, *Polypodium polypodioides* (L.) Watt var. *minus* (Fée) Weath., *Polypodium squalidum* Vell.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

Pleopeltis pinnatifida Gillies ex Hook. & Grev.

Sin.: *Marginaria argentina* (Maxon) Pic. Serm., *Pleopeltis argentina* (Maxon) de la Sota, *Polypodium argentinum* Maxon, *Polypodium ratibori* Copel., *Polypodium ruiz-leallii* de la Sota

Hierba epífita o epipéfrica. Endémica. 1500-3600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(AMA).

Pleopeltis pleopeltidis (Fée) de la Sota

Sin.: *Marginaria pleopeltidis* (Fée) Pic. Serm., *Polypodium pleopeltidis* Fée, *Polypodium typicum* Fée, nom. inval.

Hierba epífita. Nativa. 400-2000 m. Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi)

Alston

Sin.: *Drynaria raddiana* Fée, *Polypodium pleopeltifolium* Raddi

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, FLA, RIV, TAC).

Pleopeltis tweediana (Hook.) A.R. Sm.

Sin.: *Marginaria tweediana* (Hook.) Pic. Serm., *Polypodium macrocarpum* Bory ex Willd. var. *unguiculare* Griseb., *Polypodium platybasis* Baker, *Polypodium tweedianum* Hook.

Hierba epífita o epipéfrica. Nativa. 500-2400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Pleopeltis x cerro-altoensis Danton & Boudrie

Hierba epífita. Endémica. 300-400 m. Países: CHL(JFE).

Serpocaulon A.R. Sm.

Serpocaulon australe D. Sanín, J.C.

Ospina, I.O. Moura & Salino
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.

Sin.: *Goniophlebium catharinae* (Langsd. & Fisch.) J. Sm., *Polypodium catharinae* Langsd. & Fisch.

Hierba epífita. Nativa. 0-200 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA). URY(ROC).

Serpocaulon fraxinifolium (Jacq.) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium fraxinifolium* Jacq.
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Serpocaulon laetum (C. Presl) A.R. Sm. & Schwartsb.

Sin.: *Goniophlebium sehnemii* Pic. Serm., *Serpocaulon sehnemii* (Pic. Serm.) Labiak & J. Prado, nom. superfl.

Hierba epífita. Nativa. 600-1600 m. Países: BRA(PAR, RGS).

Serpocaulon lasiopus (Klotzsch) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium gilliesii* C. Chr., *Polypodium lasiopus* Klotzsch, *Polypodium pubescens* Hook. & Grev., nom. illeg., *Serpocaulon gilliesii* (C. Chr.) A.R. Sm.
Hierba. Nativa. 400-3000 m.
Países: ARG(BAI, COR, JUJ, SAL, SLU).

Serpocaulon latipes (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium laetum* Raddi, *Polypodium latipes* Langsd. & Fisch.
Hierba terrestre o epipéfrica. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, PAI, SPE). URY(ROC).

Serpocaulon latissimum (R.C. Moran & B. Øllg.) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium latissimum* R.C. Moran & B. Øllg.
Hierba terrestre. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Serpocaulon meniscifolium (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium meniscifolium* Langsd. & Fisch.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Serpocaulon polystichum (Link) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium polystichum* Link
Hierba. Nativa. 1400-1500 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).

Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm.

Sin.: *Polypodium brasiliense* Poir., *Polypodium neriifolium* Schkuhr, *Polypodium triseriale* Sw.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Serpocaulon vacillans (Link) A.R. Sm.

Sin.: *Goniophlebium vacillans* (Link) Fée, *Polypodium hasslerii* H. Christ, *Polypodium vacillans* Link
Hierba terrestre. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, SPE).

Stenogrammitis Labiak

Stenogrammitis wittigiana (Fée & Glaz. ex Fée) Labiak

Sin.: *Grammitis wittigiana* Fée & Glaz.
ex Fée, *Lellingeria wittigiana* (Fée & Glaz.
ex Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Synammia C. Presl

Synammia espinosae (Weath.) G.
Kunkel

Sin.: *Polypodium espinosae* Weath.
Hierba terrestre. Endémica. 200-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Synammia feuillei (Bertero) Copel.

Sin.: *Goniophlebium synammia* Fée ex
J. Remy, *Goniophlebium trilobum* (Cav.)
T. Moore, *Grammitis triloba* (Cav.) Desv.,
comb. illeg., *Mecosorus trilobus* (Cav.)
Klotzsch, *Polypodium feuillei* Bertero
f. *basispicum* Looser, *Polypodium*
feuillei Bertero f. *hastifolium* G. Kunkel,
Polypodium feuillei Bertero f. *simplex*
Looser, *Polypodium feuillei* Bertero f.
trilobum (Cav.) Looser, *Polypodium*
feuillei Bertero f. *unilaterale* G. Kunkel,
Polypodium feuillei Bertero var. *ibañezii*
Looser, *Polypodium feuillei* Bertero var.
minor G. Kunkel, *Polypodium feuillei*
Bertero, *Polypodium glaucescens* Bory,
Polypodium synammia (Fée ex J. Remy)
C. Chr., *Polypodium trilobum* Cav.,
hom. illeg., *Synammia feuillei* (Bertero)
Copel. f. *basispicum* (Looser) G. Kunkel,
Synammia feuillei (Bertero) Copel.
f. *hastifolia* (G. Kunkel) G. Kunkel,
Synammia feuillei (Bertero) Copel. f.
simplex (Looser) G. Kunkel, *Synammia*
feuillei (Bertero) Copel. f. *triloba* (Cav.)
G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero)
Copel. f. *unilaterale* (G. Kunkel) G.
Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero)
Copel. var. *ibañezii* (Looser) G. Kunkel,
Synammia feuillei (Bertero) Copel. var.
minor (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia*
skottsbergii G. Kunkel, *Synammia triloba*
(Cav.) C. Presl., comb. illeg.

Hierba epífita o epipétrica. Endémica.
0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, MAG).

Synammia intermedia (Colla) G.
Kunkel subsp. **intermedia**

Sin.: *Goniophlebium translucens*
(Kunze) Fée, *Polypodium californicum*
Fée, *Polypodium intermedium* Colla,
Polypodium intermedium Colla var.
basicompositum C. Chr. & Skottsbs.,
Polypodium intermedium Colla var.
fernandezianum, *Polypodium translucens*
Kunze, *Synammia intermedia* (Colla) G.

Kunkel subsp. *masatierrae* (C. Chr. &
Skottsbs.) G. Kunkel
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Synammia intermedia (Colla) G.
Kunkel subsp. **masafuerana** (C. Chr. &
Skottsbs.) G. Kunkel
Sin.: *Polypodium intermedium* Colla
subsp. *masafueranum* C. Chr. & Skottsbs.
Hierba epífita. Endémica. 200 m.
Países: CHL(JFE).

Terpsichore A.R. Sm.

Terpsichore chryseri (Copel.) A.R. Sm.

Sin.: *Ctenopteris chryseri* Copel.,
Grammitis chryseri (Copel.) Proctor,
Polypodium confluens Fée, *Polypodium*
repandum Fée
Hierba epífita. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Zygophlebia L.E. Bishop

Zygophlebia longipilosa (C. Chr.)
L.E. Bishop

Sin.: *Ctenopteris subcrassa* Copel.,
Grammitis subcrassa (Copel.) C.V.
Morton, *Polypodium longepilum* C. Chr.
Hierba epífita. Nativa. 700-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PSILOTACEAE

Psilotum Sw.

Psilotum nudum (L.) P. Beauv.

Sin.: *Lycopodium nudum* L., *Psilotum*
nudum (L.) Griseb., comb. superfl.,
Psilotum triquetrum Sw., nom. illeg.,
Psilotum triquetrum Sw. var. *gracile*
Hook. & Grev.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL).
BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,
CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).
URY(ROC).

PTERIDACEAE

Acrostichum L.

Acrostichum aureum L.
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Acrostichum danaeifolium Langsd.
& Fisch.

Sin.: *Acrostichum excelsum* Maxon,
Acrostichum leptophlebium Baker,
Acrostichum lomarioides (Jenman)
Jenman, *Chrysodium lomarioides*
Jenman var. *hastatum* Christ,
Chrysodium lomarioides Jenman
Hierba palustre. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

Adiantopsis Fée

Adiantopsis × australopedata

Hickey, M.S. Barker & Ponce
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).
PRY(AMA, COA, GUA).

Adiantopsis cheilanthoides R.M. Senna

Hierba terrestre. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(RGS).

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée

Sin.: *Cheilanthes brasiliensis* Raddi,
Cheilanthes chlorophylla Sw., *Cheilanthes*
glaberrima Fée, *Cheilanthes spectabilis* Kaulf.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA,
GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART,
CLA, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, RIV,
ROC, SAO, SOR, TAC).

Adiantopsis dichotoma (Sw.) T. Moore

Sin.: *Cheilanthes dichotoma* Sw.,
Cheilanthes flexuosissima Baker, *Pellaea*
dichotoma (Sw.) Prantl
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS). PRY(APA, CEN, ITA, PAI).
URY(MAL, RIV).

Adiantopsis occulta Sehnem

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adiantopsis orbignyana (Mett. ex

Kuhn) Ponce & Scataglioni
Sin.: *Cheilanthes orbignyana* Mett. ex Kuhn
Hierba. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL).
PRY(APY, PAI).

Adiantopsis perfasciculata Sehnem

Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Adiantopsis radiata (L.) Fée

Sin.: *Adiantum radiatum* L.,
Cheilanthes radiata (L.) J. Sm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,
CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Adiantopsis recurvata (Baker) Ponce & Scataglini

Sin.: *Cheilanthes recurvata* Baker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(PAI).

Adiantopsis regularis (Mett.) T. Moore

Sin.: *Cheilanthes regularis* Mett.
Hierba. Nativa. 0-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA).

Adiantopsis tweediana (Hook.) Link-Pérez & Hickey

Sin.: *Cheilanthes tweediana* Hook.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, LRI, MIS, SLU, SFE, SDE).
BRA(RGS). PRY(APY, CAU, CEN, COA,
ÑEE, PAI). URY(RNO).

Adiantum L.**Adiantum abscissum** Schrad.

Sin.: *Adiantum brasiliense* Raddi
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Adiantum camptorachis Sundue, J.

Prado & A.R. Sm.
Hierba. Nativa. 1700-3400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
TUC).

Adiantum capillus-veneris L.

Sin.: *Adiantum remyanum* Espinosa
Hierba. Introducida. 0-2100 m.
Países: BRA(RGS). CHL(TAR, ATA,
COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Adiantum chilense Kaulf. var. **chilense**

Sin.: *Adiantum aethiopicum* L.,
Adiantum aethiopicum L. var. *glabrum*
Kuntze, *Adiantum mochaenum* G. Kunkel
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU,
SLU, TDF). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG, RME, JFE).

Adiantum chilense Kaulf. var. **scabrum** (Kaulf.) Hicken

Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var.
scabrum (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum*
philippianum Espinosa, *Adiantum*
scabrum Kaulf. var. *philippianum*
(Espinosa) Looser, *Adiantum scabrum*
Kaulf. var. *scabrum*
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Adiantum curvatum Kaulf.

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Adiantum deflectens Mart.

Sin.: *Adiantum deflectens* Mart. var.
tremulum Kunze ex Hieron., *Adiantum*
dolabrifforme Hook., *Adiantum filiforme*
Gardner, *Adiantum flagellum* Fée,
Adiantum glareosum Lindm., *Adiantum*
subaristatum Fée
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).
PRY(AMA, COA, GUA, PAI, PHA).

Adiantum delicatulum Mart.

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, PAI).

Adiantum digitatum Hook.

Sin.: *Adiantum digitatum* C. Presl,
nom. nud., *Adiantum palmatum* T.
Moore, *Adiantum speciosum* Hook.
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, LAV,
MAL, RNO, RIV, SAO, TAC).

Adiantum diogoanum Glaz. ex Baker

Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Adiantum excisum Kunze

Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LLA, RME).

Adiantum gertrudis Espinosa

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Adiantum humile Kunze

Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Adiantum incertum Lindm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).
PRY(Desconocida).

Adiantum intermedium Sw.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Adiantum latifolium Lam.

Sin.: *Adiantum denticulatum* Sw.,
Adiantum fovearum Raddi
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR,
SCA). PRY(APY, APA, CAN, CEN, GUA).

Adiantum lorentzii Hieron.

Sin.: *Adiantum cuneatum* Langsd. &
Fisch. var. *veneris* Griseb.
Hierba. Nativa. 500-2900 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN,
COA, GUA, PAI, SPE).

Adiantum macrophyllum Sw.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Adiantum mathewsianum Hook.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, CON).

Adiantum obliquum Willd.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Adiantum orbignyanum Mett. ex Kuhn

Sin.: *Adiantum tenerum* Sw. var.
rhomboideum Griseb.
Hierba. Nativa. 1700-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Adiantum papillosum Handro

Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Adiantum pearcei Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Adiantum pectinatum Kunze ex Baker

Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR,
SCA). PRY(AMA).

Adiantum pentadactylon Langsd. & Fisch.

Sin.: *Adiantum trapeziforme* L. var.
pentadactyla (Langsd. & Fisch.) C. Chr.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adiantum peruvianum Klotzsch

Hierba. Nativa. 1500-1600 m.
Países: ARG(SAL).

Adiantum petiolatum Desv.

Sin.: *Adiantum kaulfussii* Kunze,
Adiantum lucidum (Cav.) Sw. var.
pinnatum E. Fourn., *Adiantum*
oblongatum Schrad.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(SCA). PRY(CAN).

Adiantum platyphyllum Sw.

Hierba. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Adiantum poiretii Wikstr. f. **bottini**

(Giudice & Nieto) Giudice

Sin.: *Adiantum thalictroides* Willd. ex
Schltdl. f. *bottini* Giúdice & Nieto

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN,
SLU, TUC).

Adiantum poiretii Wikstr. f. **poiretii**

Sin.: *Adiantum crenatum* Poir. f. *glabra*
Hieron., *Adiantum gratum* Fée, *Adiantum*
pellucidum M. Martens & Galeotti,
Adiantum poiretii Wikstr. f. *glabra*
(Hieron.) Hicken & Capurro, *Adiantum*
thalictroides Willd. ex Schltdl.

Hierba. Nativa. 400-3200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ,
LPA, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC).
BRA(RGS, SCA). PRY(PAI). URY(CAS,
CLA, FLA, LAV, MAL, PAY, TAC, TYT).

Adiantum pseudotinctum Hieron.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS,
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Adiantum pulverulentum L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(AMA).

Adiantum raddianum C. Presl

Sin.: *Adiantum aemulum* T. Moore,
Adiantum amabile T. Moore, hom. illeg.
Adiantum colpodes T. Moore, *Adiantum*
cuneatum Langsd. & Fisch., hom. illeg.,
Adiantum moorei Baker

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS,
ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
CAA, CAN, GUA, PAI). URY(ART, CAS,
CLA, DUR, FLA, MAL, PAY, SAO, TAC).

Adiantum serrato-dentatum Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Adiantum obtusum* Desv.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAN, CON, COA, PHA, SPE).

Adiantum sulphureum Kaulf. var. **majus** Hook.

Sin.: *Adiantum sulphureum* Kaulf. var.
cuneifolium Meigen

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Adiantum sulphureum Kaulf. var. **sulphureum**

Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var.
sulphureum (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum*
chilense Kaulf. var. *subsulphureum* (J.
Remy) Giúdice, *Adiantum chilense*
Kaulf. var. *sulphureum* (Hook.) Giudice,
comb. illeg., *Adiantum chilense* Kaulf.

var. *sulphureum* (Kaulf.) Kuntze ex
Hicken, *Adiantum poiretii* Wikstr.
var. *sulphureum* (Kaulf.) R.M. Tryon,
Adiantum subsulphureum J. Remy,
Adiantum sulphureum Kaulf. var. *minus*
Hook., *Adiantum sulphureum* Kaulf. var.
subsulphureum (J. Remy) Looser
Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Adiantum terminatum Miq.

Sin.: *Adiantum hirtum* Klotzsch

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Adiantum tetraphyllum Willd.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA,
AMA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Adiantum thalictroides Willd. ex Schltdl. var. **hirsutum** (Hook. & Grev.) de la Sota

Sin.: *Adiantum aethiopicum* L. var.
hirsutum (Hook. & Grev.) Kuntze,
Adiantum chilense Kaulf. var. *hirsutum*
Hook. & Grev., *Adiantum glanduliferum*
Link, *Adiantum pilosum* Fée, *Adiantum*
poiretii Wikstr. f. *hirsutum* (Hook. &
Grev.) Hicken, *Adiantum poiretii* Wikstr.
var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) R.M.
Tryon, *Adiantum pubescens* C. Presl,
Adiantum weatherbyanum Espinosa

Hierba. Nativa. 1700-3400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, RME).

SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, RME).

Adiantum windischii J. Prado

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CAN).

Anogramma Link**Anogramma lorentzii** (Hieron.) Diels

Sin.: *Gymnogramma lorentzii* Hieron.,
Gymnogramma regnelliana Lindm.,
Gymnogramma regnelliana Lindm. var.
megaspora Lindm.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHA, COR, ERI, JUJ).
BRA(RGS). PRY(CEN). URY(MON).

Argyrosma (J. Sm.) Windham**Argyrosma chilensis** (Fée & J. Remy) Windham

Sin.: *Cincinalis chilensis* Fée & J. Remy,

Notholaena chilensis (Fée & J. Remy) J.W.
Sturm, *Pellaea chilensis* (J. Remy) C. Chr.,
Pellaea chilensis Fée, nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Argyrosma flava (Hook.) M. Kessler & A. R. Sm.

Sin.: *Acrostichum flavens* Sw.,

Argyrosma nivea (Poir.) Windham
var. *flava* (Hook.) Ponce, *Gymnogramma*
flavens (Sw.) Kaulf., *Notholaena*
chrysophylla Klotzsch, *Notholaena flavens*
(Sw.) T. Moore, *Notholaena nivea* (Poir.)
Desv. var. *flava* Hook., *Pellaea flavens*
(Sw.) C. Chr., *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl
f. *flavens* (Sw.) Hieron.

Hierba. Nativa. 400-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI,
SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(SCA).

Argyrosma nivea (Poir.) Windham

Sin.: *Acrostichum albidulum* Sw.,
Cincinalis nivea (Poir.) Desv., *Cincinalis*
tarapacana Phil., *Gymnogramma nivea*
(Poir.) Mett., *Notholaena nivea* (Poir.)
Desv. var. *oblongata* Griseb., *Notholaena*
nivea (Poir.) Desv., *Pellaea nivea* (Poir.)
Prantl, *Pteris nivea* Poir.

Hierba. Nativa. 200-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA,
LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
BRA(SCA). CHL(AYP, TAR, ANT).

Argyrochosma tenera (Gillies ex Hook.) M. Kessler & A.R. Sm.

Sin.: *Argyrochosma nivea* (Poir.) Windham var. *tenera* (Gillies ex Hook.) Ponce, *Notholaena nivea* (Poir.) Desv. var. *tenera* (Gillies ex Hook.) Griseb., *Notholaena tenera* Gillies ex Hook., *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl f. *tenera* (Gillies ex Hook.) Hieron., *Pellaea tenera* (Hook.) Prantl
Hierba. Nativa. 200-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Astrolepis D.M. Benham & Windham

Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
Sin.: *Acrostichum sinuatum* Lag. ex Sw., *Cheilanthes sinuata* (Lag. ex Sw.) Domin, *Notholaena sinuata* (Lag. ex Sw.) Kaulf., *Gymnogramma sinuata* (Lag. ex Sw.) C. Presl
Hierba. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(TAR).

Ceratopteris Brongn.

Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron.
Sin.: *Ceratopteris lockhartii* (Hook. & Grev.) Kunze, *Ceratopteris parkeri* J. Sm., nom. superfl., *Parkeria lockhartii* Hook. & Grev., *Parkeria pteridoides* Hook.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA).

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
Sin.: *Acrostichum thalictroides* L., *Ceratopteris froesii* Brade, *Furcaria thalictroides* (L.) Desv.
Hierba acuática. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).

Cheilanthes Sw., nom. cons.

Cheilanthes arequipensis (Maxon) R.M. Tryon & A. F. Tryon
Sin.: *Notholaena arequipensis* Maxon
Hierba. Nativa. 2300-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR).

Cheilanthes buchtienii (Rosenst.) R.M. Tryon
Sin.: *Cheilanthes boliviana* C. Chr., *Cheilanthes buchtienii* (Rosenst.) R.M. Tryon var. *ventanensis* (Weath.) Capurro, *Notholaena buchtienii* Rosenst., *Notholaena buchtienii* Rosenst. var. *ventanaensis* Weath., *Notholaena fraseri* (Mett. ex Kuhn) Baker var. *robusta* Hieron.

Hierba. Nativa. 400-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Cheilanthes glauca (Cav.) Mett.
Sin.: *Acrostichum glaucum* Cav., *Allosorus hirsutus* C. Presl, *Cheilanthes chilensis* Fée, *Pellaea glauca* (Cav.) J. Sm., *Pellaea hirsuta* (C. Presl) Hook., *Pteris glauca* (Cav.) Cav. *Pteris microphylla* Bertero ex Colla, nom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Cheilanthes goyazensis (Taub.) Domin
Sin.: *Notholaena goyazensis* Taub.
Hierba rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR)

Cheilanthes hassleri (Weath.) Ponce
Sin.: *Notholaena hassleri* Weath.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Cheilanthes hieronymi Herter
Sin.: *Cheilanthes marginata* Kunth var. *gracilis* Hieron.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(BAI, CAT, LPA, MEN).
BRA(RGS). URY(LAV, RIV, SOR, TAC).

Cheilanthes hypoleuca (Kunze) Mett.
Sin.: *Cincinialis tomentosa* Desv., *Notholaena hypoleuca* Kunze, *Notholaena tomentosa* (Desv.) Desv., *Polypodium confluens* Colla, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE).
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Cheilanthes juergensii Rosenst.
Sin.: *Cheilanthes juergensii* Rosenst. var. *thellungii* (Herter) D. Legrand & Lombardo, *Cheilanthes thellungii* Herter
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV).

Cheilanthes micropteris Sw.
Sin.: *Notholaena micropteris* (Sw.) Keyserl.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PAI). URY(LAV, SOR, TAC, TYT).

Cheilanthes mollis (Kunze) C. Presl
Sin.: *Cheilanthes doradilla* (Colla) Domin, *Notholaena doradilla* Colla, *Notholaena mollis* Kunze
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, LLA, RME).

Cheilanthes obducta Mett. ex Kuhn
Sin.: *Notholaena balansae* Baker, *Notholaena herzogii* Rosenst., *Notholaena obducta* (Mett. ex Kuhn) Baker
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY).

Cheilanthes pilosa Goldm.
Sin.: *Allosorus marginatus* J. Sm. var. *brevilobus* Kuntze, *Cheilanthes andina* Hook., *Cheilanthes macleanii* Hook., *Cheilanthes valdiviana* Phil.
Hierba. Nativa. 800-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, MEN, SAL, SLU, TUC). CHL(TAR).

Cheilanthes poeppigiana Mett. ex Kuhn
Sin.: *Cheilanthes cartilaginea* Griseb., *Cheilanthes cartilaginea* Griseb. var. *platyloba* Griseb., *Pellaea pearcei* Baker
Hierba. Nativa. 2000-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cheilanthes pruinata Kaulf.
Sin.: *Cheilanthes fasciculata* Goldm., *Cheilanthes mathewsii* Kunze, *Notholaena mathewsii* (Kunze) Griseb.
Hierba. Nativa. 2000-4800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Cheilanthes sarmientoi Ponce
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, LPA, MEN, SAL, SJU).

Cheilanthes squamosa Gillies ex Hook. & Grev.
Sin.: *Notholaena gilliesii* Fée, nom. illeg., *Notholaena lilloi* (Hicken) Hicken, *Notholaena squamosa* (Gillies ex Hook. & Grev.) Lowe, *Pellaea lilloi* Hicken

Hierba. Nativa. 200-4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Cheilanthes volcanensis de la Sota

Hierba. Nativa. 2300-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Cryptogramma R. Br.

Cryptogramma fumariifolia (Phil. ex Baker) H. Christ

Sin.: *Allosorus crispus* Bernh. var. *chilensis* C. Chr., *Allosorus fumariaefolius* (Phil.) Kuntze, *Cryptogramma crispa* (L.) R. Br. var. *chilensis* (C. Chr.) Looser, *Pellaea fumariaefolia* Phil. ex Baker, *Pellaea fumariifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 900-2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Doryopteris J. Sm., nom. cons.

Doryopteris acutiloba (Prantl) Diels

Sin.: *Pellaea acutiloba* Prantl
Hierba. Nativa. 600-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Doryopteris adornata J.C. Yesilyurt

Hierba. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Doryopteris angustata Sehnem

Hierba. Endémica. 500-600 m.
Países: BRA(RGS).

Doryopteris arifolia Christ

Sin.: *Doryopteris majestosa* J.C. Yesilyurt

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, ITA).

Doryopteris collina (Raddi) J. Sm.

Sin.: *Doryopteris alcicornis* Diels var. *major* Christ, *Doryopteris euchlora* Klotzsch, *Pellaea collina* (Raddi) Prantl, *Pteris collina* Raddi, *Pteris pedata* L. var. *collina* (Raddi) Baker

Hierba. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(COA, GUA, PAI).

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn

Sin.: *Cheilanthes concolor* (Langsd. & Fisch.) R.M. Tryon & A. F. Tryon, *Pteris concolor* Langsd. & Fisch., *Pellaea concolor* (Langsd. & Fisch.) Baker

Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, DUR, FLA, RNO, SAO).

Doryopteris lorentzii (Hieron.) Diels

Sin.: *Doryopteris juergensii* Rosenst., *Doryopteris lorentzii* (Hieron.) Diels f. *interrupta* Rosenst., *Doryopteris pedata* (L.) Fée var. *lorentzii* (Hieron.) Hassl., *Pellaea lorentzii* Hieron.

Hierba. Nativa. 500-2400 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA). URY(ART, CLA, PAY, RNO).

Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr.

Sin.: *Doryopteris elegans* (Vell.) H. Christ, *Doryopteris palmata* (Willd.) J. Sm. var. *patula* (Fée) Hassl., *Doryopteris patula* (Fée) Fée, *Doryopteris raddiana* (C. Presl) Fée var. *patula* Fée, *Litobrochia nobilis* T. Moore, *Pteris elegans* Vell., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, ITA, PAI, SPE). URY(RIV).

Doryopteris ornithopus (Mett.) J. Sm.

Sin.: *Pteris ornithopus* Mett.
Hierba. Nativa. 700-1800 m.
Países: BRA(PAR).

Doryopteris paradoxa (Fée) Christ

Sin.: *Cassebeera paradoxa* Fée
Hierba rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Doryopteris pentagona Pic.Serm.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, ÑEE, PAI, SPE).

Doryopteris rediviva Fée

Sin.: *Doryopteris angularis* Fée, *Doryopteris varians* (Raddi) J. Sm. var. *rediviva* (Fée) Luetzelb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Doryopteris rivalis Sehnem

Hierba. Endémica. 300-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Doryopteris sagittifolia (Raddi) J. Sm.

Sin.: *Pteris sagittifolia* Raddi
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Doryopteris × scalaris Sehnem

Hierba rupícola. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Doryopteris stierii Rosenst.

Hierba. Endémica. 100-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Doryopteris triphylla (Lam.) Christ

Sin.: *Adiantum triphyllum* Lam., *Bakeropteris triphylla* (Lam.) Kuntze, nom. superfl., *Cassebeera pedatifida* Christ, *Cassebeera triphylla* (Lam.) Kaulf., *Doryopteris pedatifida* (Christ) Christ, *Doryopteris triphylla* (Lam.) Christ var. *pedatifida* (Christ) Hassl., *Pellaea triphylla* (Lam.) Prantl
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, COA, PAI). URY(MAL, MON).

Doryopteris varians (Raddi) J. Sm.

Sin.: *Pteris varians* Raddi
Hierba rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gaga Pryer, F.W. Li & Windham

Gaga marginata (Kunth) F.W. Li & Windham

Sin.: *Allosorus marginatus* (Kunth) J. G. Sm., *Cheilanthes marginata* Kunth, *Pellaea marginata* (Kunth) Baker
Hierba. Nativa. 1600-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Gastoniella Li Bing Zhang & Liang Zhang

Gastoniella chaerophylla (Desv.) Li Bing Zhang & Liang Zhang
Sin.: *Anogramma chaerophylla* (Desv.) Link, *Gymnogramma chaerophylla* Desv.,

Hemionitis chaerophylla (Desv.) Poir.,
Pityrogramma chaerophylla (Desv.)

Domin

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PAI). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, PAY, SJO, SJO).

Hecistopteris J. Sm.

Hecistopteris pumila (Spreng.) J. Sm.

Sin.: *Gymnogramma insignis* Mett.,
Gymnogramma pumila Spreng.,
Jamesonia insignis (Mett.) Christenh.
Hierba rupícola o terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hemionitis L.

Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi

Sin.: *Asplenium tomentosum* Lam.,
Gymnogramma tomentosa (Lam.) Desv.,
Gymnopteris tomentosa (Lam.) Underw.
Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, GUA, ÑEE, PAI).

Jamesonia Hook. & Grev.

Jamesonia osteniana (Dutra) Gastony

Sin.: *Anogramma osteniana* Dutra
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, SJO, TAC).

Lytoneuron (Klotzsch) Yesilyurt

Lytoneuron crenulans (Fée) Yesilyurt

Sin.: *Doryopteris crenulans* (Fée) H.
Christ, *Pellaea crenulans* Fée
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lytoneuron lomariaceum (Klotzsch)

Yesilyurt
Sin.: *Doryopteris lomariacea* Klotzsch,
Pellaea lomariacea (Kunze ex Klotzsch)
Hook., *Pellaea lomariacea* (Klotzsch)
Hook. var. *septembola* Hook.
Hierba. Nativa. 200-2500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, SPE). URY(RIV).

Myriopteris Fée

Myriopteris aurea (Poir.) Grusz & Windham

Sin.: *Acrostichum bonariense* Willd.,
Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor,
Cheilanthes ferruginea Willd. ex Link,
Notholaena aurea (Poir.) Desv.,
Notholaena bonariensis (Willd.) C. Chr.,
Notholaena ferruginea (Willd. ex Link) Hook.,
Notholaena rufa C. Presl,
Notholaena rufa C. Presl var. *major* C. Presl,
Notholaena rufa C. Presl var. *minor* C. Presl,
Pteris aurea Poir.

Hierba. Nativa. 600-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ANT).

Myriopteris microphylla (Sw.) Grusz & Windham

Sin.: *Adiantum microphyllum* Sw.,
Allosorus microphyllus (Sw.) Liebm.,
Cheilanthes elongata Willd. ex Kaulf.,
Cheilanthes heterotricha Andersson,
Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw.,
Cheilanthes moritziana Kunze,
Cheilanthes pubescens Kunth,
Notholaena microphylla (Sw.) Keyserl.

Hierba. Nativa. 1100 m.

Países: ARG(SAL).

Myriopteris myriophylla (Desv.) J. Sm.

Sin.: *Cheilanthes elegans* Desv.,
Cheilanthes laciniata Sodiro,
Cheilanthes myriophylla Desv.,
Cheilanthes myriophylla Desv. var. *elegans* (Desv.) Hicken,
Myriopteris elegans (Desv.) J. Sm.,
Myriopteris intermedia E. Fourn., hom. illeg.,
Notholaena myriophylla J. Sm.

Hierba. Nativa. 200-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(SCA). CHL(TAR).

Myriopteris notholaenoides (Desv.)

Grusz & Windham
Sin.: *Cheilanthes aspidioides* Fée,
Cheilanthes notholaenoides (Desv.) Maxon
ex Weath,
Pteris notholaenoides Desv.
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Notholaena R. Br., nom. cons.

Notholaena sulphurea (Cav.) J. Sm.

Sin.: *Aleuritopteris cretacea* (Liebm.) E. Fourn.,
Aleuritopteris sulphurea (Cav.) Fée,
Cheilanthes borsigniana Rchb. f. &

Warsz. ex W. Koch,
Cheilanthes cretacea (Liebm.) Mett.,
Cheilanthes lepida Phil.,
Cheilanthes sulphurea (Cav.) Mickel & Beitel,
Chrysochosma sulphurea (Cav.) Kümmerle,
Notholaena cretacea Liebm.,
Notholaena lepida (Phil.) Looser,
Notholaena sulphurea (Cav.) J. Sm. var. *flava* Kuhn,
Pteris sulphurea Cav.

Hierba. Nativa. 200-2500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SJU). CHL(ATA).

Pellaea Link, nom. cons.

Pellaea myrtillifolia Mett. ex Kuhn

Sin.: *Allosorus myrtifolius* (Mett. ex Kuhn) Kuntze
Hierba. Endémica. 100-2000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Pellaea ovata (Desv.) Weath

Sin.: *Allosorus flexuosus* (Kaulf. ex Schldtl. & Cham.) Kunze,
Pellaea flexuosa (Kaulf. ex Cham. & Schldtl.) Link,
Platyloma flexuosa (Kaulf. ex Schldtl. & Cham.) Sm.,
Pteris flexuosa Kaulf. ex Cham. & Schldtl.,
Pteris ovata Desv.

Hierba. Nativa. 800-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Pellaea sagittata (Cav.) Link

Sin.: *Pteris sagittata* Cav.
Hierba. Nativa. 2400-2600 m.
Países: ARG(SAL).

Pellaea ternifolia (Cav.) Link subsp. **ternifolia**

Sin.: *Allosorus ternifolius* (Cav.) Kunze
ex Klotzsch,
Cassebeera ternifolia (Cav.) Farw.,
Cheilanthes ternifolia (Cav.) T. Moore,
Notholaena ternifolia (Cav.) Keyserl.,
Platyloma ternifolia (Cav.) Sm.,
Pteris peruviana Poir.,
Pteris subverticillata Sw.,
Pteris ternifolia Cav.,
Pteris tryphylla Bertero
ex Colla, nom. nud.

Hierba. Nativa. 200-4500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA).

Pellaea ternifolia (Cav.) Link subsp. **weddelliana** (Fée) Arana

Sin.: *Cheilanthes weddelliana* (Fée) Moore,
Pellaea weddelliana Fée
Hierba. Nativa. 100-600 m.
Países: ARG(SAL).

Pityrogramma Link**Pityrogramma calomelanos** (L.) Link

var. **aureoflava** (Hook.) Weath. ex Bailey
Sin.: *Gymnogramma calomelanos* L. var. *aureoflava* Hook.

Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

var. **austroamericana** (Domin) Farw.
Sin.: *Pityrogramma austroamericana* Domin
Hierba. Nativa. 400-2800 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). PRY(CAN).

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

var. **calomelanos**

Sin.: *Acrostichum calomelanos* L., *Ceropteris calomelanos* (L.) Link, nom. superfl., *Gymnogramma calomelanos* (L.) Kaulf., *Gymnogramma calomelanos* (L.) Kaulf. var. *denudata* Harr.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RIV).

Pityrogramma ebenea (L.) Proctor

var. **aurata** (T. Moore) Lellinger

Sin.: *Gymnogramma tartarea* (Cav.) Desv. var. *aurata* T. Moore, *Pityrogramma tartarea* (Cav.) Maxon var. *aurata* (T. Moore) R.M. Tryon, *Pityrogramma presliana* Domin

Hierba. Introducida. 600-1000 m.
Países: ARG(COR). BRA(Fuera del área del proyecto).

Pityrogramma trifoliata (L.) R.M. Tryon

Sin.: *Acrostichum trifoliatum* L., *Ceropteris trifoliata* (L.) Kuhn ex Hieron., *Gymnogramma trifoliata* (L.) Desv., *Trismeria argentea* Fée, *Trismeria aurea* Fée, nom. nud., *Trismeria microphylla* Fée, *Trismeria trifoliata* (L.) Diels

Hierba. Nativa. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(PAY).

Polytaenium Desv.**Polytaenium cajenense** (Desv.)

Benedict

Sin.: *Antrophyum brasilianum* (Desv.)

C. Chr., *Antrophyum cajenense* (Desv.) Spreng., *Hemionitis brasiliana* Desv., *Hemionitis cajenensis* Desv., *Polytaenium brasilianum* (Desv.) Benedict

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Polytaenium citrifolium (L.)

Schuettp.

Sin.: *Acrostichum citrifolium* L., *Anetium citrifolium* (L.) Splitg.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

Polytaenium feei (W.Schaffn. ex Fée)

Maxon

Sin.: *Antrophyum feei* W.Schaffn. ex Fée
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Polytaenium lineatum (Sw.) Sm.

Sin.: *Antrophyum lineatum* (Sw.) Kaulf., *Hemionitis lineata* Sw., *Polytaenium lanceolatum* (Sw.) Desv., *Vittaria lanceolata* Sw.

Hierba. Nativa. 1000-1400 m.
Países: ARG(SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Pteris L.**Pteris altissima** Poir.

Sin.: *Pteris macroptera* Link, *Pteris sterilis* C. Presl
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Pteris angustata (Fée) C.V. Morton

Sin.: *Litobrochia angustata* Fée, *Pteris paulistana* Rosenst.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pteris berteroaana J. Agardh

Sin.: *Litobrochia berteroaana* (J. Agardh) Fée, *Pteris comans* G. Forst. var. *berteroaana*
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Pteris biaurita L.

Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Pteris brasiliensis Raddi

Sin.: *Litobrochia brasiliensis* (Raddi) C. Presl, *Pteris denticulata* Sw. var. *brasiliensis* (Raddi) Baker
Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN).

Pteris chilensis Desv.

Sin.: *Pteris fernandeziana* Phil., *Pteris tenera* Kaulf.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

Pteris cretica L.

Sin.: *Pycnodoria cretica* (L.) Small
Hierba. Introducida. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, SAL, TDF, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(GUA, ITA).

Pteris decurrens C. Presl

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pteris deflexa Link

Sin.: *Litobrochia polita* (Link) J. Sm., *Pteris gaudichaudii* J. Agardh, *Pteris kunzeana* J. Agardh var. *polita* (Link) J. Bommer, *Pteris polita* Link
Hierba. Nativa. 500-2700 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(MON, TYT).

Pteris denticulata Sw. var. **denticulata**

Sin.: *Litobrochia denticulata* (Sw.) C. Presl, *Litobrochia dissimilis* Fée, *Pteris dissimilis* (Fée) Christ
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Pteris denticulata Sw. var. **tristicula** (Raddi) J. Prado

Sin.: *Litobrochia tristicula* (Raddi) C. Presl, *Pteris tristicula* Raddi
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA).

Pteris exigua O.G. Martínez & J. Prado

Hierba. Endémica. 1200-1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Pteris famatinensis de la Sota

Hierba. Endémica. 2400-2600 m.
Países: ARG(LRI).

Pteris inermis (Rosenst.) de la Sota

Sin.: *Pteris muricata* Hook. var. *inermis* Rosenst.

Hierba. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Pteris lechleri Mett.

Sin.: *Litobrochia sericea* Fée, *Pteris sericea* (Fée) H. Christ

Hierba. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pteris leptophylla Sw.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pteris multifida Poir.

Sin.: *Pycnodoria multifida* (Poir.) Small

Hierba. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, DFE, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto).

URY(MON).

Pteris nipponica W.C. Shieh

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Pteris plumula Desv.

Sin.: *Pteris biaurita* L. subsp.

quadriaurita (Retz.) C. Chr., *Pteris*

edentula Kunze

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

BRA(RGS). PRY(AMA, CAN).

Pteris podophylla Sw.

Sin.: *Litobrochia podophylla* (Sw.) C.

Presl, *Pteris luederwaldtii* Rosenst.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: BRA(SCA).

Pteris propinqua J. Agardh

Sin.: *Pteris goeldii* H. Christ

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Pteris semiadnata Phil.

Sin.: *Pteris marattiifolia* Hook.

Hierba. Endémica. 500-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Pteris sotae O.G. Martínez

Hierba. Endémica. 900-1400 m.

Países: ARG(SAL).

Pteris splendens Kaulf.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(Desconocida).

Pteris tripartita Sw.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Pteris vittata L.

Sin.: *Pycnodoria vittata* (L.) Small

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).

BRA(PAR, SCA). URY(MON, PAY, SAO).

Radiovittaria (J.E. Benedict)

E.H. Crane

Radiovittaria stipitata (Kunze)

E.H. Crane

Sin.: *Vittaria stipitata* Kunze

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Trachypteris André ex H. Christ**Trachypteris pinnata** (Hook. f.) C. Chr.

Sin.: *Acrostichum aureonitens* Hook., *Hemionitis pinnata* Hook. f., *Neurocallis*

aureonitens (Hook.) T. Moore,

Trachypteris aureonitens (Hook.) André ex Christ

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Tryonia Schuettp., J. Prado &

A.T. Cochran

Tryonia arenitcola (Schwartzb.

& Labiak) Schuettp., J. Prado & A.T.

Cochran

Sin.: *Eriosorus arenitcola* Schwartzb.

& Labiak, *Jamesonia arenitcola*

(Schwartzb. & Labiak) Christenh.

Hierba. Nativa. 1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tryonia myriophylla (Sw.) Schuettp.,

J. Prado & A.T. Cochran

Sin.: *Eriosorus myriophyllus* (Sw.)

Copel., *Gymnogramma felipponei*

Herter, *Gymnogramma myriophylla* Sw.,

Jamesonia myriophylla (Sw.) Christenh.

Hierba saxícola. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(CLA).

Vittaria Sm.**Vittaria ensiformis** Sw.

Hierba epífita. Nativa.

Países: CHL(IPA).

Vittaria graminifolia Kaulf.

Sin.: *Vittaria filifolia* Fée, *Vittaria*

lineata (L.) Sm. var. *graminifolia* (Kaulf.)

Rosenst.

Hierba epífita. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, ROC).

Vittaria lineata (L.) Sm.

Sin.: *Pteris lineata* L.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, MIS, SAL).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, GUA, PAI, SPE).

Vittaria scabrida Klotzsch ex Fée

Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAU).

SACCOLOMATACEAE

Saccoloma Kaulf.**Saccoloma brasiliensis** (C. Presl) Mett.

Sin.: *Microlepia brasiliensis* C. Presl,

Orthiopteris brasiliensis (C. Presl) Sehnem

Subarborescente. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Saccoloma elegans Kaulf.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.

Sin.: *Davallia inaequalis* Kunze,

Orthiopteris inaequalis (Kunze) Copel.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

SALVINIACEAE

Azolla Lam.**Azolla cristata** Kaulf.

Sin.: *Azolla mexicana* C. Presl, hom.

illeg., *Azolla portoricensis* Spreng.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,

LPA, MEN, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN).

Azolla filiculoides Lam.

Sin.: *Azolla arbuscula* Desv., *Azolla bonariensis* Bertol., *Azolla caroliniana* Willd., *Azolla densa* Desv., *Azolla magellanica* Willd., nom. inval., *Azolla microphylla* Kaulf., *Azolla squamosa* Molina, nom. inval., *Salvinia azolla* Raddi, nom. inval.

Hierba acuática. Nativa. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). PRY(APA, APY, CEN, COA, ITA, ÑEE, PHA). URY(MAL, MON, ROC).

Salvinia Ség.**Salvinia auriculata** Aubl. var. **major**

C.V. Miranda & Schwartsb.

Sin.: *Salvinia hispida* Kunth

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY, BOQ, CHO, ÑEE). URY(ART, ROC).

Salvinia biloba Raddi

Hierba acuática. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, MON, RNO, SJO).

Salvinia herzogii de la Sota

Hierba acuática. Nativa.

Países: ARG(COS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvinia minima Baker

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, ÑEE). URY(CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, RNO, SAO, TYT).

Salvinia molesta D.S. Mitch.

Hierba acuática. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

SCHIZAEACEAE**Actinostachys** Wall. ex Hook.**Actinostachys pennula** (Sw.) Hook.

Sin.: *Schizaea trilateralis* Hook. & Grev., *Schizaea pennula* Sw.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(CAN).

Actinostachys subtrijuga (Mart.) C. Presl

Sin.: *Schizaea subtrijuga* Mart.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Schizaea Sm., nom. cons.**Schizaea elegans** (Vahl) Sw.

Sin.: *Acrostichum elegans* Vahl, *Schizaea attenuata* Beyr., *Schizaea flabellum* Mart.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Schizaea fistulosa Labill.

Sin.: *Microschizaea australis* (Gaudich.) C.F. Reed, *Microschizaea fistulosa* (Labill.) C.F. Reed, *Schizaea australis* Gaudich., *Schizaea chilensis* Phil., *Schizaea fistulosa* Labill. var. *australis* (Gaudich.) Hook. f., *Schizaea palmata* Hombr. & Jacq., *Schizaea valdiviana* Phil. ex Hook. & Baker, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Schizaea fluminensis Miers ex J.W. Sturm

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

SELAGINELLACEAE**Selaginella** P. Beauv., nom. cons.**Selaginella apoda** (L.) C. Morren

Sin.: *Lycopodium apodum* L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(BIO, LRI).

Selaginella contigua Baker

Sin.: *Selaginella callimorpha* Silveira,

Selaginella wettsteinii Hieron.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Selaginella convoluta (Arn.) Spring

Sin.: *Lycopodium convolutum* Arn.,

Lycopodium hygrometricum Mart.,

Lycopodium revolutum Hook. & Grev.,

Selaginella hygrometrica (Mart.) Spring

ex Mart., *Selaginella longispicata*

Underw. ex Millsp., *Selaginella*

orbignyana Spring ex Decne., nom. nud.

Hierba. Nativa. 200-1200 m.

Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA, PAI).

Selaginella decomposita Spring

Sin.: *Selaginella assurgens* Baker,

Selaginella fusca Silveira, *Selaginella*

subsegregata Baker

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Selaginella erectifolia Spring

Sin.: *Selaginella camptostachys* Fée,

Selaginella glaziouviana Hieron.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Selaginella flexuosa Spring

Sin.: *Selaginella bella* Fée, *Selaginella*

longicuspis Baker, *Selaginella*

macrorhyza Silveira

Hierba terrestre o epífita. Nativa.

0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun

Sin.: *Lycopodium kraussianum* Kunze,

Selaginella canescens Fée, *Selaginella*

hortensis Mett.

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Selaginella macrostachya (Spring) Spring

Sin.: *Selaginella ericoides* Fée,

Selaginella flexuosa Spring subsp.

macrostachya Spring, *Selaginella*

gardneri Spring, *Selaginella geminata*

Fée, *Selaginella henriqueana* Silveira,

Selaginella lindbergii Baker

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Selaginella marginata (Humb. &

Bonpl. ex Willd.) Spring

Sin.: *Lycopodium marginatum* Humb.

& Bonpl. ex Willd., *Selaginella breuensis*

Silveira, *Selaginella burchelli* Hieron.,

Selaginella caraçensis K.I. Goebel,

Selaginella chromatophylla Silveira,

Selaginella distorta (Spring) Spring,

Selaginella distorta (Spring) Spring var.

major Baker, *Selaginella distorta* (Spring)

Spring var. *minor* (Spring) Spring,

Selaginella excurrans Spring, *Selaginella*

herteri Hieron., *Selaginella marginata*

(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring var.

distorta Spring, *Selaginella marginata*

(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring var.

minor Spring, *Selaginella moseni* Hieron.,

Selaginella urbanii Hieron., *Selaginella wiewlewskii* Hieron. ex Rosenst., *Selaginella ypiranguensis* Hieron. ex Herter, *Selaginella ypiranguensis* Hieron. ex Herter var. *riograndensis* Herter

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA). URY(ART, LAV, MAL, MON, RIV, TAC).

Selaginella microphylla (Kunth) Spring
Sin.: *Lycopodium microphyllum* Kunth, *Selaginella jamesonii* Baker, *Selaginella thujifolia* Spring

Hierba. Nativa. 700-2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PAI). URY(LAV, TYT).

Selaginella muscosa Spring

Sin.: *Lycopodium albidulum* Sw. var. *majus* Hook. & Grev., *Lycopodium brasiliense* Raddi, *Lycopodium crassinervium* Desv., *Selaginella anocardia* A. Braun, *Selaginella apoda* (L.) Spring var. *tetragonostachya* Spring, *Selaginella beyrichii* A. Braun, *Selaginella brasiliensis* (Raddi) Lindm., *Selaginella brasiliensis* (Raddi) A. Braun var. *crassinervia* Hieron. ex Bonap., nom. nud., *Selaginella brevipes* Fée, hom. illeg., *Selaginella crassinervia* (Desv.) Spring, *Selaginella deltoides* A. Braun, *Selaginella feei* Hieron., *Selaginella niederleinii* Hieron., *Selaginella polysperma* Spring, *Selaginella trifurcata* Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, PAI). URY(MON, RNO).

Selaginella novae-hollandiae (Sw.) Spring

Sin.: *Lycopodium ciliatum* Willd., hom. illeg., *Lycopodium novae-hollandiae* Sw., *Selaginella ciliata* A. Braun, *Selaginella increscentifolia* Spring, *Selaginella tucumanensis* Hieron., *Selaginella warszewicziana* Klotzsch, nom. nud.
Hierba. Nativa. 400-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Selaginella pallescens (C. Presl) Spring

Sin.: *Lycopodium pallescens* C. Presl
Hierba terrestre. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

Selaginella parviarticulata Buck

Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

Selaginella peruviana (Milde) Hieron.

Sin.: *Bryodesma peruvianum* (Milde) Soják, *Selaginella peruviana* (Milde) Hieron. var. *dombeyana* Hieron., *Selaginella rupestris* (L.) Spring f. *peruviana* Milde, *Selaginella rupestris* (L.) Spring var. *peruviana* (Milde) Hieron.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

Selaginella producta Baker

Hierba terrestre o rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Selaginella sellowii Hieron.

Sin.: *Bryodesma sellowii* (Hieron.) Soják, *Selaginella amazonica* (Milde) Hieron., comb. illeg., *Selaginella arechavaletae* Hieron., *Selaginella mildei* Hieron., *Selaginella montevidensis* Hieron., *Selaginella rupestris* (L.) Spring f. *amazonica* Milde, *Selaginella rupestris* (L.) Spring f. *brasiliensis* Milde
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, COA, PHA). URY(COL, MAL, MON).

Selaginella suavis (Spring) Spring

Sin.: *Selaginella glaziovii* Fée, *Selaginella sulcata* (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. subsp. *suavis* Spring, Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.)

Spring ex Mart.
Sin.: *Lycopodium sulcatum* Desv. ex Poir., *Selaginella biauriculata* Hieron., *Selaginella caudorrhiza* Baker, *Selaginella lorentzii* Hieron., *Selaginella rubescens* Hieron., *Selaginella sulcata* (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. var. *biauriculata* Hieron. ex Bonap., *Selaginella sulcata* (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart. var. *cruenta* Mart.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, MIE).

Selaginella tenuissima Fée

Sin.: *Selaginella cunninghami* Baker, *Selaginella papagaiensis* Silveira
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Selaginella valida Alston

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Selaginella vogelii Spring

Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker

Sin.: *Lycopodium willdenowii* Desv. ex Poir.
Hierba terrestre. Introducida.
Países: BRA(SCA).

TECTARIACEAE

Tectaria Cav.

Tectaria buchtienii (Rosenst.) Maxon

Sin.: *Aspidium buchtienii* Rosenst.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tectaria incisa Cav.

Sin.: *Aspidium martinicense* Spreng., *Nephrodium andinum* Baker, *Tectaria andina* (Baker) C. Chr., *Tectaria martinicense* (Spreng.) Copel.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA).

Tectaria pilosa (Fée) R.C. Moran

Sin.: *Cardiochlaena pilosa* Fée
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

THELYPTERIDACEAE

Amauropelta Kunze

Amauropelta achalensis (Hieron.)

Salino & T.E. Almeida
Sin.: *Aspidium achalense* Hieron., *Aspidium siambonense* Hieron., *Dryopteris achalensis* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris siambonensis* (Hieron.) C. Chr., *Nephrodium achalense* (Hieron.) Hicken, *Nephrodium argentinum* (Hieron.) Hicken var. *major* Hicken, *Nephrodium siambonense* (Hieron.) Hicken, *Thelypteris achalensis* (Hieron.) Abbiatti, *Thelypteris siambonensis* (Hieron.) Abbiatti
Hierba terrestre. Nativa. 1300-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Amauropelta altitudinis (Ponce)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris altitudinis* Ponce
 Hierba terrestre. Endémica. 2000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU).

Amauropelta amambayensis (Christ)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris amambayensis* Christ,
Dryopteris diplazioides (Desv.) Proctor
 var. *amambayensis* (H. Christ) Rosenst.,
Dryopteris diplazioides (Desv.) Proctor
 var. *brevisora* Rosenst., *Dryopteris*
dutrae C. Chr. ex Dutra, *Lastrea dutrae*
 (C. Chr. ex Dutra) Brade, *Thelypteris*
amambayensis (Christ) Ponce, *Thelypteris*
brevisora (Rosenst.) Ponce, *Thelypteris*
dutrae (C. Chr. ex Dutra) Ponce

Hierba. Nativa. 100-400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA, PAI).

Amauropelta araucariensis (Ponce)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris araucariensis* Ponce
 Hierba terrestre. Nativa. 900-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Amauropelta argentina (Hieron.)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium argentinum* Hieron.,
Aspidium galanderi Hieron., *Aspidium*
lorentzii Hieron., *Dryopteris argentina*
 (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris argentina*
 (Hieron.) C. Chr. var. *lorentzii* (Hieron.)
 Osten & Herter, *Dryopteris galanderi*
 (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris lorentzii*
 (Hieron.) C. Chr., *Lastrea argentina*
 (Hieron.) Copel., *Lastrea galanderi*
 (Hieron.) Capurro, *Nephrodium*
argentinum (Hieron.) Hicken,
Nephrodium galanderi (Hieron.) Hicken,
Nephrodium lorentzii (Hieron.) Hicken,
Thelypteris argentina (Hieron.) Abbiatti,
Thelypteris galanderi (Hieron.) Abbiatti,
Thelypteris lorentzii (Hieron.) Abbiatti

Hierba terrestre. Nativa. 0-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI,
 MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).
 CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL,
 LBO, MAU, BIO). URY(DUR, RNO).

Amauropelta burkartii (Abbiatti)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris burkartii* Abbiatti
 Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).

Amauropelta cheilanthoides (Kunze)

A. Löve & D. Löve

Sin.: *Aspidium cheilanthoides* Kunze,
Dryopteris cheilanthoides (Kunze) C.
 Chr., *Lastrea cheilanthoides* (Kunze)
 T. Moore, *Thelypteris cheilanthoides*
 (Kunze) Proctor,

Hierba. Nativa. 700-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Amauropelta concinna (Willd.) Pic. Serm.

Sin.: *Aspidium concinnum* (Willd.)
 Mett., *Dryopteris concinna* (Willd.)
 Kuntze, *Dryopteris concinna* (Willd.)
 Kuntze var. *elongata* (E. Fourn.) C.
 Chr., *Phegopteris concinna* (Willd.)
 Fée, *Phegopteris elongata* E. Fourn.,
Polypodium concinnum Willd., *Thelypteris*
concinna (Willd.) Ching, *Thelypteris*
concinna (Willd.) Ching var. *elongata* (E.
 Fourn.) Reed

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(COA, PAI).

Amauropelta decurtata (Link) Salino

& T.E. Almeida

Sin.: *Asplenium decurtatum* Kunze,
 nom. nud., *Asplenium decurtatum* Link,
Athyrium decurtatum (Kunze) C. Presl,
 comb. illeg., *Athyrium decurtatum* (Link)
 Fée, *Athyrium decurtatum* (Link) Fée var.
platense Weath., *Thelypteris decurtata*
 (Link) de la Sota subsp. *decurtata*,
Thelypteris decurtata (Link) de la Sota
 subsp. *platensis* (Weath.) de la Sota

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS,
 SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU,
 COA). URY(CLA, ROC, TAC, TYT).

Amauropelta juergensii (Rosenst.)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris juergensii* (Rosenst.)
 C. Chr., *Dryopteris juergensii* (Rosenst.)
 C. Chr. var. *hirsutula* Rosenst., *Lastrea*
juergensii (Rosenst.) Copel., *Nephrodium*
juergensii Rosenst., *Thelypteris juergensii*
 (Rosenst.) C.F. Reed, *Thelypteris platensis*
 Abbiatti

Hierba terrestre. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA).

Amauropelta jujuyensis (de la Sota)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris jujuyensis* de la Sota
 Hierba. Endémica. 800-2300 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Amauropelta metteniana (Ching)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium palustre* Mez ex Fée,
 hom. illeg., *Dryopteris palustris* (Mett.
 ex Baker) Kuntze, *Dryopteris palustris*
 (Mett.) Kuntze var. *uruguayensis* D.
 Legrand, *Dryopteris tenerrima* (Fée)
 Rosenst. var. *pubescens* Sehnem,
Lastrea mettenii Copel., comb. superfl.,
Nephrodium palustre Mett. ex Baker,
Thelypteris metteniana Ching, *Thelypteris*
mettenii (Copel.) Abbiatti

Hierba. Nativa. 100-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

Amauropelta mosenii (C. Chr.) Salino

& T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris hassleri* H. Christ,
Dryopteris mosenii C. Chr., *Dryopteris*
rojasii H. Christ, *Lastrea mosenii* (C.
 Chr.) Copel., *Thelypteris mosenii* (C. Chr.)
 C.F. Reed,

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del
 proyecto). PRY(APA, AMA, CAU).

Amauropelta nubicola (de la Sota)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris nubicola* de la Sota
 Hierba. Nativa. 1700-2500 m.

Países: ARG(JUJ).

Amauropelta oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pic. Serm.

Sin.: *Aspidium oligocarpum* (Humb.
 & Bonpl. ex Willd.) Humb. & Bonpl.
 ex Kunth var. *crassistipitatum* Hieron.,
Dryopteris oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex
 Willd.) Kuntze var. *crassistipitata* (Hieron.)
 Hicken, *Dryopteris oligocarpa* (Humb. &
 Bonpl. ex Willd.) Kuntze, *Nephrodium*
oligocarpum (Humb. & Bonpl. ex Willd.)
 Desv. var. *crassistipitatum* (Hieron.)
 Hicken, *Polypodium oligocarpum* Humb.
 & Bonpl. ex Willd., *Thelypteris oligocarpa*
 (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching,
Thelypteris oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex
 Willd.) Ching var. *crassistipitata* (Hieron.)
 C.F. Reed

Hierba. Endémica. 800-2500 m.

Países: ARG(JUJ, TUC). BRA(Fuera
 del área del proyecto).

Amauropelta opposita (Vahl) Pic. Serm.

Sin.: *Dryopteris opposita* (Vahl)
 Urb., *Lastrea opposita* (Vahl) C. Presl,
Polypodium oppositum Vahl, *Thelypteris*
opposita (Vahl) Ching

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
 PRY(AMA, CAA).

Amauropelta pachyrhachis (Kunze ex Mett.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium helveolium* Fée, *Aspidium pachyrhachis* Kunze ex Mett., *Aspidium platyrhachis* Fée, *Dryopteris opposita* (Vahl) Urb. f. *major* Rosenst., *Dryopteris pachyrhachis* (Kunze ex Mett.) Kuntze, *Dryopteris riopardensis* Rosenst., *Lastrea pachyrhachis* (Kunze ex Mett.) T. Moore, *Lastrea riopardensis* (Rosenst.) Copel., *Thelypteris catamarcensis* de la Sota, *Thelypteris pachyrhachis* (Kunze ex Mett.) Ching

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN).

Amauropelta patula (Fée) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium glaziouvii* H. Christ, *Gymnogramma patula* Fée, *Thelypteris glaziouvii* (H. Christ) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 1000 m.

Países: BRA(PAR).

Amauropelta pleiophylla (Sehnem) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris pleiophylla* Sehnem, *Thelypteris pleiophylla* (Sehnem) Ponce

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Amauropelta podotricha (Sehnem) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris podotricha* Sehnem, *Thelypteris podotricha* (Sehnem) Ponce

Hierba. Endémica. 500-600 m.

Países: BRA(RGS).

Amauropelta ptarmica (Kunze ex Mett.) Pic.Serm.

Sin.: *Aspidium ptarmicum* Kunze ex Mett., *Dryopteris ptarmica* (Kunze ex Mett.) Kuntze, *Lastrea ptarmica* (Kunze ex Mett.) T. Moore, *Nephrodium ptarmicum* (Kunze ex Mett.) Baker, *Thelypteris ptarmica* (Kunze ex Mett.) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Amauropelta raddii (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris raddii* Rosenst., *Dryopteris retusa* (Sw.) C. Chr. f. *denticulata* Rosenst., *Dryopteris retusa* (Sw.) C. Chr. var. *austrobrasiliensis* Rosenst., *Polypodium pubescens* Raddi, *Thelypteris raddii* (Rosenst.) Ponce

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Amauropelta recumbens (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris recumbens* Rosenst., *Dryopteris recumbens* (Rosenst.) C.F. Reed var. *violacea* Rosenst., *Lastrea recumbens* (Rosenst.) Copel., *Thelypteris recumbens* (Rosenst.) C.F. Reed

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Amauropelta regnelliana (C. Chr.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris regnelliana* C. Chr., *Lastrea regnelliana* (C. Chr.) Brade, *Thelypteris regnelliana* (C. Chr.) Ponce

Hierba. Nativa. 600-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Amauropelta retusa (Sw.) Pic.Serm.

Sin.: *Dryopteris retusa* (Sw.) C. Chr., *Lastrea retusa* (Sw.) Copel., *Polypodium retusum* Sw., *Thelypteris retusa* (Sw.) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Amauropelta rivularioides (Fée)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium arechavaletae* Hieron., *Aspidium pseudomontanum* Hieron., *Aspidium rivularioides* Fée, *Dryopteris arechavaletae* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris pseudomontana* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris pseudothelypteris* (Rosenst.) C. Chr., *Dryopteris rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst., *Dryopteris rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *arechavaletae* (Hieron.) C. Chr., *Dryopteris rivularioides* (Fée) C. Chr. var. *crenata* (Rosenst.) Rosenst., *Dryopteris rivularioides* (Fée) C. Chr. ex Rosenst. var. *pseudothelypteris* (Rosenst.) Osten & Herter, *Dryopteris sinuata* Sehnem, *Lastrea rivularioides* (Fée) Copel. var. *arechavaletae* (Hieron.) Capurro, *Nephrodium pseudomontanum* (Hieron.) Rosenst., *Nephrodium pseudothelypteris* Rosenst., *Nephrodium pseudothelypteris* Rosenst. var. *crenata* Rosenst., *Thelypteris rivularioides* (Fée) Abbiatti, *Thelypteris rivularioides* (Fée) Abbiatti var. *arechavaletae* (Hieron.) Abbiatti, *Thelypteris rivularioides* (Fée) Abbiatti var. *pseudomontana* (Hieron.) Abbiatti

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, MIE, PAI). URY(RIV).

Amauropelta sanctae-catharinae (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris sanctae-catharinae* Rosenst., *Dryopteris scariosa* Rosenst., *Lastrea sanctae-catharinae* (Rosenst.) Brade, *Lastrea scariosa* (Rosenst.) Copel., *Thelypteris sanctae-catharinae* (Rosenst.) Ponce, *Thelypteris scariosa* (Rosenst.) C.F. Reed

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Amauropelta saxicola (Sw.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Ceterach aspidioides* Raddi, *Dryopteris ptarmica* (Kunze ex Mett.) Kuntze f. *asplenioides* (Sw.) C. Chr., *Gymnogramma asplenioides* Sw., *Polypodium saxicola* Sw., *Thelypteris ptarmica* (Kunze ex Mett.) C.F. Reed var. *asplenioides*

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Amauropelta stierii (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris stierii* (Rosenst.) C. Chr., *Gymnogramma stierii* Rosenst., *Lastrea stierii* (Rosenst.) Copel., *Thelypteris stierii* (Rosenst.) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI, JUJ, SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(CON). URY(PAY, RNO, RIV).

Amauropelta tenerrima (Fée) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Aspidium tenerrimum* Fée, *Aspidium elatior* Fée, *Dryopteris tenerrima* (Fée) Rosenst., *Lastrea tenerrima* (Fée) Copel., *Thelypteris tenerrima* (Fée) C.F. Reed

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Amauropelta vattuonei (Hicken) Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris vattuonei* Hicken, *Thelypteris vattuonei* (Hicken) Abbiatti

Hierba. Nativa. 400-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Christella H. Lév.

Christella conspersa (Schrad.) A. Löve & D. Löve

Sin.: *Aspidium conspersum* (Schrad.) Kunze, *Cyclosorus hickenii* Abbiatti, *Cyclosorus urens* (Rosenst.) Ching,

Dryopteris bangii C. Chr., *Dryopteris dentata* (Forssk.) C. Chr. var. *urens* (Rosenst.) Osten & Herter, *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze var. *decrescens* Rosenst., *Dryopteris urens* Rosenst., *Lastrea urens* (Rosenst.) Copel., *Nephrodium conspersum* Schrad., *Thelypteris bangii* (C. Chr.) R.M. Tryon, *Thelypteris conspersa* (Schrad.) A.R. Sm., *Thelypteris hickenii* (Abbiatti) C.F. Reed, *Thelypteris urens* (Rosenst.) C.F. Reed

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(MAL, RIV, ROC).

Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy

Sin.: *Aspidium molle* Sw., *Aspidium violascens* Link, *Cyclosorus dentatus* (Forssk.) Ching, *Cyclosorus dentatus* (Forssk.) Ching var. *violascens* (Link) Abbiatti, *Dryopteris dentata* (Forssk.) C. Chr., *Dryopteris mollis* (Sw.) Hieron., *Hemestheum molle* (Sw.) Gand., *Nephrodium dentatum* (Forssk.) Kümmerle, *Nephrodium molle* Jacq., *Nephrodium violascens* (Link) Fée, *Polypodium dentatum* Forssk., *Polypodium molle* Jacq., hom. illeg., *Polystichum molle* (Sw.) Gaudich., *Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P. St. John, *Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P. St. John var. *violascens* (Link) C.F. Reed

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI). URY(PAY, RIV, ROC).

Christella hispidula (Decne.) Holttum

Sin.: *Aspidium hispidulum* Decne., *Cyclosorus hispidulus* (Decne.) Ching, *Cyclosorus quadrangularis* (Fée) Tardieu, *Dryopteris hispidula* (Decne.) Kuntze, *Dryopteris mollis* (Sw.) Hieron. var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hassl., *Dryopteris parasitica* (L.) Kuntze var. *glabrindusiata* (Hieron.) Hicken, *Dryopteris parasitica* (L.) Kuntze var. *glanduligera* Rosenst., *Dryopteris quadrangularis* (Fée) Alston, *Nephrodium hispidulum* (Decne.) Baker, *Nephrodium parasiticum* (L.) Desv. var. *glabrindusiatum* (Hieron.) Hicken, *Nephrodium quadrangulare* Fée, *Thelypteris hispidula* (Decne.) C.F. Reed, *Thelypteris quadrangularis* (Fée) Schelpe,

Thelypteris quadrangularis (Fée) Schelpe var. *repens* A.R. Sm.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, PAI). URY(PAY, RNO).

Cyclosorus Link

Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Itô

Sin.: *Aspidium gongyloides* Schkuhr, *Aspidium pohlianum* C. Presl, *Aspidium unitum* Mett., *Cyclosorus gongyloides* (Schkuhr) Link, *Cyclosorus tottus* (Thunb.) Pic. Serm., *Dryopteris gongyloides* (Schkuhr) Kuntze, *Dryopteris interrupta* (Willd.) Ching, *Goniopteris macrocladia* Fée, *Nephrodium gongyloides* (Schkuhr) Schott, *Nephrodium unitum* (Mett.) R. Br., *Polypodium tottum* Thunb., *Pteris interrupta* Willd., *Thelypteris gongyloides* (Schkuhr) Small, *Thelypteris interrupta* (Willd.) K. Iwats., *Thelypteris totta* (Thunb.) Schelpe

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, IPA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(RNO).

Goniopteris C. Presl

Goniopteris biformata (Rosenst.)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Dryopteris biformata* Rosenst., *Thelypteris biformata* (Rosenst.) R.M. Tryon
Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(SAL).

Goniopteris burkartii C. Chr. ex

Abbiatti

Sin.: *Thelypteris abbiattii* C.F. Reed
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Goniopteris iguapensis (C. Chr.) Brade

Sin.: *Dryopteris iguapensis* C. Chr.,
Thelypteris iguapensis (C. Chr.) Salino
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Goniopteris paranaensis (Salino)

Salino & T.E. Almeida

Sin.: *Thelypteris paranaensis* Salino
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Goniopteris riograndensis (Lindm.)

Ching

Sin.: *Dryopteris riograndensis* (Lindm.)
C. Chr., *Polypodium riograndense* Lindm.,
Thelypteris riograndensis (Lindm.) C.F. Reed
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAA, COA, GUA,
PAI). URY(CLA, COL, MAL, TYT).

Goniopteris scabra (C. Presl) Brade

Sin.: *Aspidium caesarium* H. Christ,
Dryopteris pseudotetragona Urb. f. *major*
Rosenst., *Dryopteris pseudotetragona*
Urb. var. *foecunda* Rosenst., *Dryopteris*
pseudotetragona Urb. var. *gemmulifera*
Hieron. ex Rosenst., *Dryopteris scabra*
(C. Presl) C. Chr., *Dryopteris scabra*
(C. Presl) C. Chr. var. *caesariana* (H.
Christ) C. Chr., *Dryopteris scabra* (C.
Presl) C. Chr. var. *incompleta* (Lindm.)
C. Chr., *Lastrea scabra* (C. Presl) C.
Presl, *Nephrodium etchichury* Hicken,
Polypodium scabrum C. Presl, *Polypodium*
tetragonum Sw. var. *incompletum* Lindm.,
Thelypteris scabra (C. Presl) Lellingner
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
CAA, CAN, GUA, PAI).

Goniopteris tetragona (Sw.) C. Presl

Sin.: *Dryopteris tetragona* (Sw.) Urb.,
comb. illeg., *Nephrodium tetragonum*
(Sw.) Keyserl., comb. illeg., *Polypodium*
tetragonum Sw., *Thelypteris tetragona*
(Sw.) Small

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SAL).

Goniopteris tristis (Kunze) Brade

Sin.: *Polypodium triste* Kunze,
Thelypteris tristis (Kunze) R.M. Tryon
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(SAL).

Goniopteris vivipara (Raddi) Brade

Sin.: *Polypodium viviparum* Raddi,
Thelypteris vivipara (Raddi) C.F. Reed
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Macrothelypteris (H. Itô) Ching

Macrothelypteris torresiana

(Gaudich.) Ching

Sin.: *Lastrea torresiana* (Gaudich.) T.
Moore, *Polystichum torresianum* Gaudich.,
Thelypteris torresiana (Gaudich.) Alston

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(ART, RIV).

Meniscium Schreb.

Meniscium angustifolium Willd.
Sin.: *Dryopteris angustifolia* (Willd.) Urb., *Polypodium salicifolium* Vahl, hom. illeg., *Thelypteris angustifolia* (Willd.) Proctor
Hierba. Nativa. 100-400 m.
Países: PRY(AMA).

Meniscium longifolium Desv.
Sin.: *Dryopteris reticulata* (L.) Urb. var. *longifolia* (Desv.) Rosenst., *Thelypteris longifolia* (Desv.) R.M. Tryon
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Meniscium maxonianum (A.R. Sm.) R.S. Fern. & Salino
Sin.: *Dryopteris desvauuxii* Mett. f. *glandulosa* Maxon & C.V. Morton, *Thelypteris longifolia* (Desv.) R.M. Tryon f. *glandulosa* (Maxon & C.V. Morton) C.V. Morton, *Thelypteris maxoniana* A.R. Sm.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR).

Meniscium salzmännii Fée
Sin.: *Thelypteris salzmännii* (Fée) C.V. Morton
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(CAU, CAA, COA).

Meniscium serratum Cav.
Sin.: *Dryopteris reticulata* (L.) Urb. var. *serrata* (Cav.) Farw., *Dryopteris serrata* (Cav.) C. Chr., *Meniscium dentatum* C. Presl, *Meniscium palustre* Raddi, *Nephrodium serratum* (Cav.) Keyserl., comb. superfl., *Phegopteris serrata* (Cav.) Mett., *Thelypteris serrata* (Cav.) Alston
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

Steiopteris (C. Chr.) Pic.Serm.

Steiopteris decussata (L.) A.R. Sm. var. **brasiliensis** (C. Chr.) Salino & T.E. Almeida
Sin.: *Dryopteris brasiliensis* (C. Chr.) C.V. Morton, *Dryopteris decussata* (L.) Urb. var. *brasiliensis* C. Chr., *Thelypteris brasiliensis* (C. Chr.) C.V. Morton,

Thelypteris decussata (L.) Proctor var. *brasiliensis* (C. Chr.) A.R. Sm.
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Steiopteris gardneriana (Baker) Pic.Serm.
Sin.: *Dryopteris gardneriana* (Baker) Kuntze, *Dryopteris supralineata* Rosenst., *Nephrodium gardnerianum* Baker, *Thelypteris gardneriana* (Baker) C.F. Reed
Hierba. Nativa. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Steiopteris hatschbachii (A.R. Sm.) Salino & T.E. Almeida
Sin.: *Thelypteris hatschbachii* A.R. Sm.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Steiopteris leprieurii (Hook.) Pic. Serm.
Sin.: *Nephrodium leprieurii* Hook., *Thelypteris leprieurii* (Hook.) R.M. Tryon
Hierba. Nativa. 100-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

Thelypteris Schmidel, nom. cons.

Thelypteris berroi (C. Chr.) C.F. Reed
Sin.: *Cyclosorus berroi* (C. Chr.) Abbiatti, *Dryopteris berroi* C. Chr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(SCA). PRY(AMA, CON, PAI). URY(RIV).

Thelypteris browniana Ponce
Hierba terrestre. Nativa. 900-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Thelypteris confluens (Thunb.) C.V. Morton
Sin.: *Dryopteris cabreræ* Weath., *Lastrea cabreræ* (Weath.) Capurro, *Pteris confluens* Thunb., *Thelypteris cabreræ* (Weath.) Abbiatti
Hierba terrestre. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, CHA).

Thelypteris grandis A.R. Sm. var. **kunzeana** (Hook.) A.R. Sm.
Sin.: *Aspidium abruptum* Kunze, hom. illeg., *Dryopteris oligophylla* Maxon var. *kunzeana* (Hook.) C. Chr., *Lastrea abrupta* C. Presl, *Nephrodium kunzeanum* Hook., *Thelypteris invisã* (Sw.) Proctor var. *kunzeana* (Hook.) C.V. Morton

Hierba. Nativa. 400-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Thelypteris lugubris (Mett.) R.M. Tryon & A.F. Tryon
Sin.: *Aspidium lugubre* Mett.
Hierba. Nativa. 100-900 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, PAI, SPE).

Thelypteris patens (Sw.) Small var. **dissimilis** (Schrad.) A.R. Sm.
Sin.: *Aspidium nephrodioides* Fée, hom. illeg., *Nephrodium dissimile* Schrad.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

Thelypteris patens (Sw.) Small var. **patens**
Sin.: *Aspidium macrourum* Kaulf., *Aspidium patens* (Sw.) Sw., *Aspidium stipulare* Willd., *Christella patens* (Sw.) Holtum, *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze var. *scabriuscula* (C. Presl) C. Chr., *Dryopteris patens* (Sw.) Kuntze var. *stipulare* (Willd.) Bonap., *Dryopteris stipulare* (Willd.) Maxon ex Underw., *Lastrea patens* (Sw.) C. Presl, *Lastrea scabriuscula* C. Presl, *Nephrodium macrourum* (Kaulf.) Schott, *Nephrodium patens* (Sw.) Desv., *Nephrodium patens* (Sw.) Desv. var. *stipulare* (Willd.) Baker, *Nephrodium stipulare* (Willd.) Desv., *Polypodium patens* Sw., *Polystichum patens* (Sw.) Bernh., *Thelypteris patens* (Sw.) Small var. *scabriuscula* (C. Presl) A.R. Sm.
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(SPE).

Thelypteris rioverdensis (C. Chr.) Ponce
Sin.: *Dryopteris rioverdensis* C. Chr., *Lastrea rioverdensis* (C. Chr.) Brade
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR).

Thelypteris schizotis (Hook.) M. Kessler & A. R. Sm.
Sin.: *Nephrodium schizotis* Hook., *Thelypteris patens* (Sw.) Small var. *smithiana* Ponce
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(GUA, PAI).

WOODSIACEAE

Woodsia R. Br.

Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron.

Sin.: *Cheilanthes crenata* Kunze,
Dicksonia montevidensis Spreng.,
Physematium cumingianum Kunze,
Physematium incisum (Gillies ex Hook.
 & Grev.) Kunze, *Polypodium flabellatum*
 Klotzsch, *Woodsia crenata* (Kunze)
 Hieron. var. *pallidipes* Hieron., *Woodsia*
crenata (Kunze) Hieron., *Woodsia*
cumingiana (Kunze) Hook., *Woodsia*
incisa Gillies ex Hook. & Grev., *Woodsia*
jujuensis Copel., *Woodsia montevidensis*
 (Spreng.) Hieron. var. *fuscipes* Hieron.,
Woodsia peruviana Hook.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ,
 LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU,
 TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR).
 URY(CAS, CLA, LAV, MON, TYT).

GYMNOSPERMAE

ARAUCARIACEAE

Araucaria Juss.**Araucaria angustifolia** (Bertol.) Kuntze

Sin.: *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *alba* Reitz, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *caiova* Reitz & Klein *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *caiuva* Mattos, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze f. *catharinensis* Mattos, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *elegans* (Hort ex Carrière) Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *indehiscens* Mattos, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze f. *monoica* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *nigra* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *sancti-josephi* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *stricta* Reitz, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *semi-alba* Reitz & Klein, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze var. *vinacea* Mattos, *Araucaria bibbiana* Gordon, *Araucaria brasiliiana* A. Rich., *Araucaria brasiliiana* A. Rich. var. *elegans* (Hort ex Carrière) L.H. Bailey & Raffill, *Araucaria brasiliiana* A. Rich. var. *ridolfiana* (Pi. Savi) Gordon, *Araucaria brasiliensis* A. Rich. var. *gracilis* Hort ex Carrière, *Araucaria brasiliensis* Lamb. ex Loudon, hom. illeg., *Araucaria brasiliensis* Loudon var. *saviana* (Parl.) DC., *Araucaria dioica* (Vell.) Stellfeld, *Araucaria elegans* Hort ex Carrière, *Araucaria gracilis* Hort ex Carrière, *Araucaria lindleyana* Gordon, *Araucaria ridolfiana* Pi. Savi, *Araucaria saviana* Parl., *Columbea angustifolia* Bertol., *Columbea brasiliensis* (A. Rich.) Carrière, *Columbea brasiliensis* (A. Rich.) Carrière var. *ridolfiana* (Pi. Savi) Carrière, *Pinus dioica* Vell.

Árbol. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Araucaria araucana (Molina) K. Koch

Sin.: *Abies araucana* (Molina) Poir., *Araucaria chilensis* (Lam.) Mirb., nom. illeg., *Araucaria dombeyi* A. Rich., hom. illeg., *Araucaria imbricata* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Columbea imbricata* (Pav.) Carrière, *Columbea quadrifaria* Salisb., nom. superfl., *Dombeya chilensis* Lam., nom. illeg., *Pinus araucana* Molina

Árbol. Endémica. 600-1700 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

CUPRESSACEAE

Austrocedrus Florin & Boutelje**Austrocedrus chilensis** (D. Don) Pic.

Serm. & Bizzarri

Sin.: *Austrocedrus chilensis* (D. Don) Florin & Boutelje, comb. illeg., *Libocedrus chilensis* (D. Don) Endl., *Thuja andina* Poepp. & Endl., *Thuja chilensis* D. Don

Árbol. Endémica. 200-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Cupressus L.**Cupressus arizonica** Greene

Sin.: *Cupressus benthamii* Endl. var. *arizonica* (Greene) Mast., *Hesperocyparis arizonica* (Greene) Bartel

Árbol. Introducida.

Países: ARG(COR).

Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon

Sin.: *Callitropsis macrocarpa* (Hartw. ex Gordon) D.P. Little, *Hesperocyparis macrocarpa* (Hartw. ex Gordon) Bartel

Árbol. Introducida. 800-1300 m.

Países: ARG(COR).

Fitzroya Hook. f. ex Lindl.**Fitzroya cupressoides** (Molina) I.M. Johnst.

Sin.: *Fitzroya patagonica* Hook. f. ex Lindl., *Libocedrus cupressoides* (Molina) Kuntze, *Pinus cupressoides* Molina

Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(LRI, LLA).

Juniperus L.**Juniperus communis** L.

Arbusto. Introducida.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Pilgerodendron Florin**Pilgerodendron uviferum** (D. Don) Florin

Sin.: *Juniperus uvifera* D. Don,

Libocedrus tetragona (Hook.) Endl., *Libocedrus uvifera* (D. Don) Pilg., *Thuja tetragona* Hook.

Árbol. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

EPHEDRACEAE

Ephedra L.**Ephedra americana** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboldtii* Stapf, nom. illeg., *Ephedra breana* Phil., *Ephedra wraithiana* I.M. Johnst.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-4300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Ephedra boelckei F.A. Roig

Arbusto o arbolito. Endémica. 500-600 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Ephedra chilensis C. Presl

Sin.: *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *andina* (Poepp. ex C.A.Mey.) Stapf, *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *rupestris* (Benth.) Ball, *Ephedra andina* Poepp. ex C.A.Mey. f. *abbreviata* Stapf ex Skottsb., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A.Mey., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A.Mey. var. *humilis* (Wedd.) Parl., *Ephedra araucana* Phil., *Ephedra bracteata* Miers, *Ephedra chilense* Miers, hom. illeg., *Ephedra dumosa* Miers, *Ephedra frustillata* Miers, *Ephedra humilis* Wedd., *Ephedra monticola* Miers, *Ephedra nana* Dusén, *Ephedra patagonica* Phil., *Ephedra rupestris* Benth.

Arbusto. Endémica. 0-4200 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Ephedra gracilis Phil. ex Stapf

Sin.: *Ephedra gracilis* Phil.

Arbolito. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Ephedra multiflora Phil. ex Stapf
Sin.: *Ephedra multiflora* Phil.
Arbolito. Endémica. 2300-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT).

Ephedra ochreatea Miers
Sin.: *Ephedra ochreatea* Miers var.
striata Gillies ex Miers
Arbolito. Endémica. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU). CHL(AIS).

Ephedra triandra Tul. emend. J.H. Hunz.
Sin.: *Ephedra triandra* Tul., p.p., *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A.Mey., p.p.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Ephedra trifurcata Zoellner
Subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(VAL).

Ephedra tweediana Fisch. & C.A. Mey. emend. J.H. Hunz.
Sin.: *Ephedra scandens* Miers, *Ephedra triandra* Tul., p.p., *Ephedra tweediana* Fisch. & C.A.Mey., p.p.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, DFE, ERI, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(FLO, FLA, MAL, RNO, ROC, SJO).

PINACEAE

Pinus L.

Pinus caribaea Morelet
Árbol. Introducida.
Países: BRA (PAR, RGS, SCA).

Pinus clausa (Chapm. ex Engelm.) Sarg.
Sin.: *Pinus inops* var. *clausa* Chapm. ex Engelm.
Árbol. Introducida.
Países: BRA(PAR)

Pinus contorta Douglas ex Loudon
Árbol. Introducida. 500-600 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, AIS).

Pinus elliottii Engelm.
Árbol. Introducida. 900-1500 m.
Países: ARG(COR). BRA (PAR, RGS, SCA).

Pinus glabra Walter
Árbol. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Pinus halepensis Mill.
Árbol. Introducida. 800-900 m.
Países: ARG(COR).

Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl.
Árbol. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Pinus patula Schltdl. & Cham.
Árbol. Introducida. 1200-1400 m.
Países: ARG(COR).

Pinus pinaster Aiton
Árbol. Introducida.
Países: CHL(BIO).

Pinus ponderosa P. Lawson & C. Lawson
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Pinus pseudostrobus Lindl.
Árbol. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Pinus radiata D. Don
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

Pinus taeda L.
Árbol. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pseudotsuga Carrière

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Sin.: *Abies menziesii* Mirb.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

PODOCARPACEAE

Lepidothamnus Phil.

Lepidothamnus fonkii Phil.
Sin.: *Dacrydium fonkii* (Phil.) Ball, comb. superfl., *Dacrydium fonkii* (Phil.) Benth. & Hook.
Arbolito. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Podocarpus L'Hér. ex Pers., nom. cons.

Podocarpus brasiliensis Laubenf.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl.
Sin.: *Podocarpus angustifolius* Niederl., nom. nud.
Árbol. Nativa. 500-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Podocarpus nubigenus Lindl.
Árbol. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Podocarpus parlatorei Pilg.
Sin.: *Podocarpus angustifolius* Parl., hom. illeg.
Árbol. Nativa. 1200-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Podocarpus salignus D. Don
Sin.: *Podocarpus chilinus* Rich.
Árbol. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Podocarpus sellowii Klotzsch ex Endl. var. **angustifolia** Pilg.
Árbol. Nativa. 800 m.
Países: BRA(PAR).

Podocarpus sellowii Klotzsch ex Endl. var. **sellowii**
Árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prumnopitys Phil.

Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub.
Sin.: *Nageia andina* (Poepp.) Kuntze, *Podocarpus andinus* Poepp., *Podocarpus spicatus* Poepp., *Podocarpus valdiviana* J. Nelson, *Prumnopitys elegans* Phil., *Prumnopitys spicata* (Poepp. ex Endl.) Molloy & M. Muñoz, nom. illeg., *Stachycarpus andina* (Poepp.) Tiegh.
Árbol. Endémica. 500-1300 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

Saxegothaea Lindl., nom. cons.

Saxegothaea conspicua Lindl.
Árbol. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

ANGIOSPERMAE

ACANTHACEAE

Aphelandra R. Br.**Aphelandra chamissoniana** Nees

Sin.: *Aphelandra chamissoniana* Nees
var. *paranensis* Rizzini
Hierba o arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aphelandra hieronymi Griseb.

Sin.: *Odontophyllum hieronymi*
(Griseb.) Sreem.
Arbusto. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Aphelandra liboniana Linden ex Hook.

Sin.: *Aphelandra mirabilis* Rizzini
Arbusto. Endémica. 100-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aphelandra lilacina C. Ezcurra

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice

Sin.: *Geissomeria cincinnata* Nees,
Geissomeria dichroa Rizzini, *Geissomeria longiflora* Lindl.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Aphelandra ornata (Nees) T.

Anderson
Sin.: *Aphelandra ornata* (Nees) Lindau,
Aphelandra venosa Wassh. & L.B. Sm.,
Lagochilium ornatum (Nees) Nees,
Stenandrium venatum Nees
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aphelandra schottiana (Nees) Profice

Sin.: *Geissomeria schottiana* Nees
Arbusto. Nativa. 100-700 m.
Países: BRA(PAR).

Avicennia L.**Avicennia germinans** (L.) L.

Sin.: *Bontia germinans* L.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Avicennia schaueriana Stapf &

Leechm. ex Moldenke
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Barleria L.**Barleria repens** Nees

Arbusto. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Clistax Mart.**Clistax brasiliensis** Mart.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dicliptera Juss.**Dicliptera cabreræ** C. Ezcurra

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Dicliptera cochabambensis Lindau

Sin.: *Diapedium multicaule* Rusby
Hierba. Nativa. 1800-2400 m.
Países: ARG(SAL).

Dicliptera jujuyensis Lindau

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Dicliptera mucronifolia Nees

Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Dicliptera paposana Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Dicliptera scutellata Griseb.

Sin.: *Diapedium niederleinianum*
(Lindau) Kuntze, *Dicliptera niederleiniana* Lindau, *Diapedium scutellatum* (Griseb.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Dicliptera squarrosa Nees

Sin.: *Diapedium tweedianum* (Nees) Kuntze, *Dicliptera deltica* Bridar., *Dicliptera imminuta* Rizzini, *Dicliptera lutea* Bridar., *Dicliptera pohliana* Nees, *Dicliptera sericea* Nees, *Dicliptera suberecta* (André) Bremek., *Dicliptera tomentosa* Griseb., hom. illeg., *Dicliptera tweediana* Nees, *Dicliptera tweediana* Nees f. *chacoensis* Hassl., *Dicliptera tweediana* Nees var. *flaviflora* Stuck., *Jacobinia suberecta* André
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CHO, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL).

Dyschoriste Nees**Dyschoriste axillaris** Wassh. & J.R.I.

Wood
Hierba. Nativa. 2000-2600 m.
Países: ARG(SAL).

Dyschoriste humilis Lindau

Sin.: *Dyschoriste humilis* Lindau
f. *variegata* Stuck. ex Seckt, *Ruellia geminiflora* Kunth var. *humilis* Griseb., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(PAY).

Dyschoriste hygrophiloides (Nees)

Kuntze
Sin.: *Calophanes hygrophiloides* Nees
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS). URY(PAY, SAO).

Dyschoriste lavandulacea (Nees)

Kuntze
Sin.: *Calophanes lavandulaceus* Nees,
Dyschoriste niederleinii Lindau
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN).

Dyschoriste maranhonis (Nees)

Kuntze
Sin.: *Calophanes maranhonis* Nees
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Dyschoriste paraguariensis Kobuski

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).

Dyschoriste sagittata Kobuski

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Dyschoriste smithii Leonard

Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Dyschoriste trichanthera Kobuski

Sin.: *Dyschoriste ceciliae* Wassh. & J.R.I. Wood

Subarbusto. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, SPE).

Dyschoriste tweediana (Nees) Kuntze
Sin.: *Calophanes tweedianus* Nees
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Dyschoriste venturii Leonard
Subarbusto. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Elytraria Michx.

Elytraria imbricata (Vahl) Pers.
Sin.: *Elytraria apargiifolia* Nees, *Elytraria fasciculata* Kunth, *Elytraria frondosa* Kunth, *Elytraria ramosa* Kunth, *Elytraria scorpioides* Roem. & Schult., *Elytraria squamosa* (Jacq.) Lindau, *Elytraria tridentata* Vahl, *Justicia imbricata* Vahl, *Verbena squamosa* Jacq.
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Hygrophila R. Br.

Hygrophila costata Nees & T. Nees
Sin.: *Hygrophila atricheta* Bridar., *Hygrophila brasiliensis* (Spreng.) Lindau, *Hygrophila conferta* Nees var. *rubricaulis* Nees, *Hygrophila conferta* Nees, *Hygrophila guianensis* Nees, *Hygrophila helodes* Nees, *Hygrophila lacustris* Morong & Britton, hom. illeg., *Hygrophila latifolia* Nees, *Hygrophila longifolia* Nees, *Hygrophila pubescens* Nees, *Hygrophila verticillata* (Spreng.) Cabrera & G. Dawson, comb. superfl., *Hygrophila verticillata* (Spreng.) Herter, *Ruellia brasiliensis* Spreng., *Ruellia verticillata* Spreng.
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV).

Hypoestes Sol. ex R. Br.

Hypoestes phyllostachya Baker
Hierba. Int roducida. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Justicia L., nom. cons.

Justicia aequilabris (Nees) Lindau
Sin.: *Jacobinia aequilabris* (Nees) Lindau, *Jacobinia velutina* Lindau, *Justicia velutina* (Lindau) Lindau ex Hassl., *Orthotactus aequilabris* Nees
Subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Justicia axillaris (Nees) Lindau
Sin.: *Justicia campestris* (Nees) Lindau, *Rhytiglossa axillaris* Nees, *Rhytiglossa campestris* Nees
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, PAI). URY(CLA).

Justicia baenitzii (H. Winkl.) C. Ezcurra
Sin.: *Beloperone baenitzii* H. Winkl., *Beloperone viridissima* Rusby
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Justicia bradegeana Wassh. & L.B. Sm.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Justicia brasiliana Roth
Sin.: *Beloperone amherstiae* Nees var. *ciliaris* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *debilis* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *graciliflora* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *lanceolata* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *puberula* Hassl., *Beloperone amherstiae* Nees var. *pubescens* Hassl., *Beloperone amherstiae* Nees var. *villosula* Hassl., *Beloperone amherstiae* Nees, *Beloperone brasiliana* (Roth) Bremek., *Dianthera nodosa* (Hook.) Benth., *Jacobinia affinis* (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm., *Jacobinia festiva* Rizzini, *Justicia nodosa* Hook., *Sericographis affinis* Rizzini, *Sericographis cordifolia* Rizzini, *Sericographis squarrosa* Nees
Hierba o arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV, SAO).

Justicia bullata (Nees) Proffice
Sin.: *Beloperone bullata* Nees
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Justicia carnea Lindl.
Sin.: *Amphiscopia ciliata* (Nees) Nees, *Cyrtanthera magnifica* Nees var.

minor Nees, *Cyrtanthera magnifica* Nees, *Cyrtanthera pohliana* Nees var. *obtusior* Nees, *Cyrtanthera pohliana* Nees var. *velutina* Nees, *Cyrtanthera pohliana* Nees, *Ethesia carnea* (Lindl.) Raf., *Jacobinia carnea* (Lindl.) G. Nicholson, *Jacobinia magnifica* (Nees) Lindau, *Jacobinia magnifica* (Nees) Voss, *Jacobinia obtusior* (Nees) L.H. Bailey, *Jacobinia pohliana* (Nees) Lindau, *Jacobinia pohliana* (Nees) Voss, *Jacobinia velutina* (Nees) Voss, *Orthotactus ciliaris* Nees
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Justicia catharinensis Lindau
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Justicia chacoensis Wassh. & C. Ezcurra
Sin.: *Beloperone riparia* S. Moore
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Justicia comata (L.) Lam.
Sin.: *Dianthera comata* L., *Ecolium comatum* (L.) Kuntze, *Justicia humifusa* Sw., *Justicia parviflora* (Nees) Lindau, *Leptostachya comata* (L.) Nees, *Leptostachya martiana* Nees var. *hispida* Nees, *Leptostachya martiana* Nees var. *macrophylla* Nees, *Leptostachya martiana* Nees, *Leptostachya parviflora* Nees, *Psacadocalymma comatum* (L.) Bremek., *Rhytiglossa acuminata* Nees, *Stethoma comata* (L.) Britton, *Thalestris graminiformis* Rizzini
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RNO).

Justicia corumbensis (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra
Sin.: *Beloperone corumbensis* Lindau
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

Justicia cuspidulata (Nees) Wassh.
Sin.: *Justicia praetermissa* Wassh. & J.R.I. Wood, *Rhytiglossa cuspidulata* Nees
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, COA).

Justicia cydoniifolia (Nees) Lindau
Sin.: *Adhatoda cydoniifolia* Nees
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Justicia dumetorum Morong

Sin.: *Beloperone albomarginata* Lindau, *Beloperone kerri* N.E. Br., *Justicia albomarginata* (Lindau) V.A.W. Graham, *Justicia squalida* Wassh. & J.R.I. Wood
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PHA).

Justicia dusenii (Lindau) Wassh. & L.B. Sm.

Sin.: *Aphelandra dusenii* Lindau
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Justicia floribunda (C. Koch) Wassh.

Sin.: *Jacobinia pauciflora* (Nees) Lindau, *Justicia pauciflora* (Nees) Griseb., comb. illeg., *Justicia rizzinii* Wassh., *Libonia floribunda* C. Koch, *Sericographis pauciflora* Nees var. *speciosior* Nees, *Sericographis pauciflora* Nees

Arbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Justicia gilliesii (Nees) Benth.

Sin.: *Adhatoda gilliesii* Nees, *Ecolium gilliesii* (Nees) Kuntze, *Justicia echeagarayi* Hieron., *Poikilacanthus gilliesii* (Nees) Lindau
Subarbusto. Endémica. 300-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS).

Justicia glaziovii Lindau

Sin.: *Justicia velascana* Lindau, *Lophothecium paniculatum* Rizzini, *Rhytiglossa paniculata* Nees
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Justicia glutinosa (Bremek.) V.A.W. Graham

Sin.: *Justicia sarotheca* V.A.W. Graham, *Sarotheca elegans* Nees, *Sarotheca glutinosa* Bremek.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Justicia goudotii V.A.W. Graham

Sin.: *Chaetothylax boliviensis* Lindau, *Chaetothylax umbrosus* Nees, *Chaetothylax vestitus* Rizzini, *Justicia araucariensis* Profice
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(CAN, CEN, CON, GUA, PHA).

Justicia hassleri (Lindau) V.A.W. Graham

Sin.: *Beloperone hassleri* Lindau, *Chaetochlamys marginata* Lindau, *Justicia paraguayensis* V.A.W. Graham
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA, PAI).

Justicia hatschbachii (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm. var. **catharinensis** (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm.

Sin.: *Amphiscopia hatschbachii* Rizzini var. *catharinensis* Rizzini
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Justicia hatschbachii (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm. var. **hatschachii**

Sin.: *Amphiscopia hatschbachii* Rizzini
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Justicia hunzikeri Ariza

Arbusto. Endémica. 600-800 m.
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

Justicia jujuyensis C. Ezcurra

Sin.: *Justicia leonardii* De Marco & T. Ruíz, nom. illeg., *Justicia nemoralis* Lillo, nom. nud., *Justicia nemoralis* Lillo, nom. nud. var. *tomentosa* Lillo, nom. nud.
Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).

Justicia kleinii Wassh. & L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Justicia kuntzei Lindau

Sin.: *Lophothecium boliviense* Bremek.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Justicia laevilinguis (Nees) Lindau

Sin.: *Dianthera graminifolia* Rusby, *Dianthera laevilinguis* (Nees) Durand & B.D. Jacks., *Dianthera obtusifolia* (Nees) Griseb., *Dianthera paludosa* S. Moore, *Justicia anagallis* (Nees) Lindau, *Justicia ascendens* Bridar., *Justicia laevilinguis* (Nees) Lindau var. *longifolia* Nees, *Justicia obtusifolia* (Nees) Lindau var. *hirsuticaulis* Nees, *Justicia obtusifolia* (Nees) Lindau var. *longespicata* Hassl., *Justicia obtusifolia* (Nees) Lindau, *Justicia paludosa* (S. Moore) V.A.W. Graham, *Justicia repens* (Nees) Lindau, *Rhytiglossa anagallis* Nees, *Rhytiglossa laevilinguis* Nees var. *longifolia* Nees,

Rhytiglossa laevilinguis Nees, *Rhytiglossa obtusifolia* Nees var. *hirsuticaulis* Nees, *Rhytiglossa obtusifolia* Nees, *Rhytiglossa repens* Nees

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).

Justicia lilloana Ariza

Sin.: *Justicia platicarpa* Lillo, nom. nud.
Arbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Justicia lilloi (Lotti) C. Ezcurra

Sin.: *Chaetochlamys lilloi* Lotti, *Chaetochlamys tucumanensis* Lillo, nom. nud.
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY).

Justicia lythroides (Nees) V.A.W. Graham

Sin.: *Chaetothylax lythroides* (Nees) Benth. ex Jacks., *Heinzelia lythroides* Nees, *Heinzelia ovalis* Nees
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CON).

Justicia mandonii (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra

Sin.: *Beloperone mandonii* Lindau, *Justicia odonelli* De Marco & T. Ruíz, *Justicia tucumanensis* Lillo, nom. nud.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Justicia oblonga (Nees) Lindau

Sin.: *Rhytiglossa oblonga* Nees
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, GUA). URY(SJO).

Justicia oranensis De Marco & T. Ruíz

Sin.: *Justicia schreiteri* Lillo, nom. nud.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Justicia parabolica (Nees) Profice

Sin.: *Sericographis lineolata* Rizzini, *Jacobinia parabolica* (Nees) Lindau, *Sericographis parabolica* Nees
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Justicia pectoralis Jacq.

Sin.: *Rhytiglossa pectoralis* (Jacq.)
Nees, *Stethoma pectoralis* (Jacq.) Raf.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY).

Justicia phyllocalyx (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra

Sin.: *Poikilacanthus phyllocalyx* Lindau
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Justicia polygaloides (S. Moore) Lindau

Sin.: *Dianthera polygaloides* S. Moore,
Justicia lutensis Wassh. & J.R.I. Wood
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, GUA, PAI, PHA, SPE).

Justicia pygmaea Lindau

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Justicia ramulosa (Morong) C.

Ezcurra
Sin.: *Beloperone cochabambensis*
Rusby, *Beloperone pseudociliata*
Mildbraed, *Beloperone ramulosa* Morong,
Beloperone tetrameroides Lindau, *Justicia cochabambensis* (Rusby) A.L.A. Córtes,
Justicia pseudociliata (Mildbraed) V.A.W. Graham,
Justicia ramulosa (Morong) V.A.W. Graham, comb. illeg., *Justicia tetrameroides* (Lindau) V.A.W. Graham
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Justicia riojana Lindau

Arbusto. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Justicia rusby (Lindau) V.A.W. Graham

Sin.: *Beloperone matthewsii* Lindau,
Chaetochlamys rusbyi Lindau, *Justicia matthewsii* (Lindau) Rusby ex Dyer,
Ruellia lanceolata Morong
Subarbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Justicia saltensis T.Ruíz & De Marco

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC).
PRY(APY).

Justicia schenckiana Lindau

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Justicia squarrosa Griseb.

Sin.: *Beloperone ciliata* (Nees) Hook. f.,
Beloperone squarrosa (Griseb.) Lindau,
Dianthera ciliata Benth. & Hook. f., hom. illeg.,
Jacobinia ciliata Nees
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

Justicia tocantina (Nees) V.A.W.

Graham
Sin.: *Chaetothylax tocaninus* Nees
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Justicia tweediana (Nees) Griseb.

Sin.: *Adhatoda tweediana* Nees,
Adhatoda tweediana Nees var. *angustifolia* Nees,
Ecbolium lorentzianum (Lindau) Kuntze,
Ecbolium tweedianum (Nees) Kuntze,
Justicia campestris Griseb., hom. illeg.,
Justicia diamantina Lindau,
Justicia lorentziana Lindau,
Justicia tweediana (Nees) Benth., comb. illeg.,
Poikilacanthus tweedianus (Nees) Lindau,
Poikilacanthus tweedianus (Nees) Lindau var. *angustifolius* (Nees) Lindau
Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(MON, RNO).

Justicia xylosteoides Griseb.

Sin.: *Beloperone scorpioides* Nees,
Ecbolium xylosteoides (Griseb.) Kuntze,
Justicia scorpioides (Nees) Griseb., hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Justicia yhuensis Lindau

Sin.: *Justicia hylobates* Leonard
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CON, COA).

Lepidagathis Willd.**Lepidagathis alopecuroides** (Vahl) Griseb.

Sin.: *Ruellia alopecuroidea* Vahl
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Lepidagathis alvarezia (Nees)

Kameyama ex Wassh. & J.R.I. Wood
Sin.: *Lophostachys alvarezia* Nees,

Lophostachys conferta Rusby

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Lepidagathis diffusa (Nees) Lindau

Sin.: *Teliostachya diffusa* Nees
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lepidagathis meridionalis

Kameyama
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mendoncia Vell.**Mendoncia puberula** (Mart.) Nees

Sin.: *Mendozia puberula* Mart.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mendoncia velloziana (Mart.) Nees

Sin.: *Mendoncia coccinea* Vell.,
Mendoncia fulva Lindau,
Mendozia velloziana Mart.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, PHA).

Odontonema Nees**Odontonema cuspidatum** (Nees)

Kuntze
Sin.: *Thysacanthus cuspidatus* Nees
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: PRY(APA, CAN, PAI).

Oplonia Raf.**Oplonia jujuyensis** Wassh. & C.

Ezcurra
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Pachystachys Nees**Pachystachys azaleiflora** (Rusby)

A.L.A. Córtes
Sin.: *Schaueria azaleiflora* Rusby
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Pachystachys dubiosa (Lindau)

A.L.A. Côrtes

Sin.: *Odontonema dubiosum* Lindau,
Streblacanthus boliviensis Lindau,
Streblacanthus dubiosus (Lindau)

V.M.Baum

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL). PRY(APA, APY,
CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

Poikilacanthus Lindau**Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza

Sin.: *Adhatoda flexuosa* Nees, *Adhatoda umbrosa* Nees, *Beloperone spathulata* Nees, *Echobolium flexuosum* (Nees) Kuntze, *Echobolium umbrosum* (Nees) Kuntze, *Justicia flexuosa* (Nees) Wassh. & L.B. Sm., *Justicia spathulata* Nees & Mart., *Justicia umbrosa* (Nees) Lindau, hom. illeg., *Orthotactus glandulosus* Nees, *Poikilacanthus flexuosus* (Nees) Lindau

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI,
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI).
URY(SAO).

Pseuderanthemum Radlk.**Pseuderanthemum heterophyllum**

(Nees) Radlk.

Sin.: *Eranthemum heterophyllum* Nees
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).

Pseuderanthemum riedelianum

(Nees) Rizzini

Sin.: *Eranthemum riedelianum* Nees
Arbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ruellia L.**Ruellia angustiflora** (Nees) Lindau
ex Rambo

Sin.: *Ruellia sanguinea* Griseb. var.
flaviflorus Hassl., *Ruellia sanguinea*
Griseb. var. *glabrescens* Hassl., *Ruellia*
sanguinea Griseb. var. *tomentosula* Hassl.,
Stephanophysum angustiflorum Nees,
Stephanophysum quadrifarium Nees

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA,
ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RIV).

Ruellia bahiensis (Nees) Morong

Sin.: *Dipteracanthus bahiensis* Nees
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Ruellia brachysiphon (Nees) Hiern

Sin.: *Dipteracanthus brachysiphon* Nees
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS). PRY(APA, CAU, CAN).

Ruellia brevicaulis (Nees) Lindau

Sin.: *Dipteracanthus brevicaulis* Nees,
Dipteracanthus dissitifolius Nees var.
humilior Nees, *Ruellia dissitifolia* (Nees)
Hieron. var. *humilior* Nees
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,
CAN, COA, MIE).

Ruellia brevifolia (Pohl) C. Ezcurra

Sin.: *Cyrtaacanthus corymbosus* Nees,
nom. nud., *Echinacanthus dichotomus*
Kuntze, *Ruellia amoena* Nees, nom.
nud., *Ruellia graecizans* Baker, *Ruellia*
longifolia (Pohl) Griseb., *Ruellia serratithea*
Rusby, *Ruellia ventricosa* Kunth, nom.
illeg., *Stephanophysum brevifolium*
Pohl, *Stephanophysum longifolium* Pohl,
Stephanophysum macrandrum Bremek.,
Stephanophysum ventricosum (Kunth) Nees
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CAA, CAN, ÑEE, SPE).

Ruellia bulbifera Lindau

Sin.: *Dipteracanthus tuberosus* Nees,
Ruellia loefgrenii Lindau
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA,
CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE,
PAI, PHA, SPE).

Ruellia ciliatiflora Hook.

Sin.: *Arrhoxylum ciliatiflorum*
(Hook.) Nees, *Ruellia lorentziana* Griseb.,
Ruellia lorentziana Griseb. f. *parvifolia*
Hassl., *Ruellia lorentziana* Griseb. var.
paraguariensis Hassl.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).
PRY(APY, AMA, CAN, CON, PHA).

Ruellia dissitifolia (Nees) Hieron.

Sin.: *Dipteracanthus dissitifolius* Nees.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ruellia elegans Poir.

Sin.: *Arrhoxylum elegans* (Poir.)
Bremek., *Arrhoxylum formosum*
(Andr.) Nees, *Arrhoxylum silvaccola*
Nees var. *montanum* Nees
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ruellia epallocaulos Leonard ex C.

Ezcurra & Wassh.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA).

Ruellia erythropus (Nees) Lindau

Sin.: *Blechum mexicanum*
Oerst., *Blechum tweedii* Nees,
Pentstemonacanthus modestus Nees,
Ruellia mattogrossensis Lindau, *Ruellia*
pubiflora Griseb., *Ruellia tweedii* (Nees)
T. Anderson ex Morong & Britton,
Ruellia velascana Lindau, *Siphonacanthus*
erythropus Nees
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN,
CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA, SPE).

Ruellia filicalyx Lindau

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL).
PRY(APY).

Ruellia geminiflora Kunth

Sin.: *Copioglossa pilosa* Miers,
Dipteracanthus geminiflorus Nees var.
angustifolius Nees, *Dipteracanthus*
geminiflorus Nees var. *erectus* Nees,
Dipteracanthus geminiflorus Nees var.
hirsutior Nees, *Dipteracanthus geminiflorus*
Nees var. *procumbens* Nees, *Dipteracanthus*
geminiflorus Nees var. *subacaulis* Nees,
Dipteracanthus humilis Nees, *Dipteracanthus*
porrigens Nees, *Dipteracanthus vindex*
Nees, *Ruellia geminiflora* Kunth var.
hirsutior Nees, *Ruellia hirsuta* Vell., *Ruellia*
lindmaniana Fritsch
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA,
ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Ruellia hygrophila Mart.

Sin.: *Cryphiacanthus udus* Nees,
Lychniothyrsus hygrophilus (Mart.)
Bremek., *Ruellia hygrophila* Mart. var.
glabrescens Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

Ruellia hypericoides (Nees) Lindau
Sin.: *Dipteracanthus hypericoides* Nees
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(MIE). URY(ART).

Ruellia kleinii C. Ezcurra & Wassh.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Ruellia longipedunculata Lindau
Sin.: *Stephanophysum brookeae* Bremek.
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Ruellia macrosolen Lillo ex C. Ezcurra
Hierba. Nativa. 300-900 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, PHA).

Ruellia magniflora C. Ezcurra
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, MIE).

Ruellia morongii Britton
Sin.: *Cryphiacanthus acaulis* Nees
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, CON, PAI, SPE). URY(ART, PAY, SAO, TAC).

Ruellia multifolia (Nees) Lindau var. **multifolia**
Sin.: *Dipteracanthus multifolius* Nees, *Ruellia multifolia* (Nees) Lindau var. *hirsuta* Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Ruellia multifolia (Nees) Lindau var. **viscosissima** (Nees) C. Ezcurra
Sin.: *Dipteracanthus glanduloso-punctatus* Nees, *Dipteracanthus viscosissimus* Nees, *Ruellia glanduloso-punctata* (Nees) Lindau, *Ruellia multifolia* (Nees) Lindau f. *viscidula* Hassl., *Ruellia viscosissima* (Nees) Lindau

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, SPE).

Ruellia nobilis (S. Moore) Lindau
Sin.: *Salpingacanthus nobilis* S. Moore
Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

Ruellia reitzii Wassh. & L.B. Sm.
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Ruellia sanguinea Griseb.
Sin.: *Arrhostoxylum kuntzei* (Lindau) Bremek., *Ruellia kuntzei* Lindau
Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS).

Ruellia simplex C. Wright
Sin.: *Arrhostoxylum microphyllum* Nees, *Cryphiacanthus angustifolius* Nees, *Ruellia angustifolia* (Nees) Griseb. ex Lillo, hom. illeg., *Ruellia brittoniana* Leonard ex Fernald, *Ruellia coerulea* Morong, *Ruellia ignorantiae* Herter, *Ruellia malacosperma* Greenm., *Ruellia microphylla* (Nees) Lindau, *Ruellia spectabilis* Britton, hom. illeg., *Ruellia tweediana* Griseb. ex Fernald, *Ruellia tweediana* Griseb. var. *brevifolia* Hassl., *Ruellia tweediana* Griseb. var. *spectabilis* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, FLA, MON, RIV, TAC, TYT).

Ruellia solitaria Vell.
Sin.: *Dipteracanthus calvescens* Nees, *Dipteracanthus confinis* Nees, *Dipteracanthus schauerianus* Nees, *Ruellia calvescens* (Nees) Lindau, *Ruellia confinis* (Nees) Lindau
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Ruellia woolstonii C. Ezcurra
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAA, CAN, CON, SPE).

Schaueria Nees

Schaueria capitata Nees
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).

Schaueria paranaensis (Rizzini) A.L.A. Côrtes
Sin.: *Duvernoia paranaensis* Rizzini, *Justicia paranaensis* (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Staurogyne Wall.

Staurogyne alba Braz & Monteiro
Hierba. Endémica. 800-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Staurogyne eustachya Lindau
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Staurogyne mandioccana (Nees) Kuntze
Sin.: *Ebermaiera mandioccana* Nees, *Ebermaiera sanctae-catharinae* Ness
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Staurogyne sylvatica Lindau ex Braz & Monteiro
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Stenandrium Nees

Stenandrium affine S. Moore
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Stenandrium diphyllum Nees
Sin.: *Stenandrium breviflorum* Bridar., *Stenandrium diphyllum* Nees var. *longiscapum* Nees, *Stenandrium neesianum* Lindau
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Stenandrium dulce (Cav.) Nees
Sin.: *Gerardia dulcis* (Cav.) S.F. Blake, *Nierembergia prunellaefolia* Dunal,

Ruellia dulcis Cav., *Stenandrium diphyllum* Nees var. *exscapum* Nees, *Stenandrium parodii* Bridar., *Stenandrium platensis* B.R. Arrill. & Olano, *Stenandrium trinerve* Nees

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(SAO, TAC).

Stenandrium mandiocanum Nees

Sin.: *Stenandrium gracile* Rizzini, *Stenandrium spathulatum* S. Moore

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA).

Stenandrium pohlii Nees var.

breviscapum Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Stenandrium pohlii Nees var.

pusillum Nees

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Stenandrium tenellum Nees

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Thunbergia Retz.

Thunbergia alata Bojer ex Sims

Enredadera. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA).

Thunbergia fragans Roxb.

Enredadera. Introducida. 0-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Thunbergia grandiflora Roxb.

Enredadera. Introducida. 0-500 m.

Países: PRY(SPE).

Thyrsacanthus Moric.

Thyrsacanthus boliviensis (Nees) A.

Côrtes & Rapini

Sin.: *Anisacanthus boliviensis* (Nees)

Wassh., *Anisacanthus caduciflorus*

(Griseb.) Ariza, *Anisacanthus caducifolius*

(Griseb.) Lindau, *Anisacanthus malmei*

Lindau, *Anisacanthus ruber* Lindau, *Drejera*

boliviensis Nees, *Jacobinia caducifolia*

Griseb., *Schaueria caduciflora* Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, PAI).

Thyrsacanthus sulcatus (Nees) C.

Ezcurra & A.L.A. Côrtes

Sin.: *Carlowrightia sulcata* (Nees)

C. Ezcurra, *Dianthera sulcata* Griseb.,

Jacobinia sulcata Nees, *Siphonoglossa*

gentianifolia Lindau, *Siphonoglossa*

sulcata (Nees) Lindau

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,

ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE,

SDE, TUC). PRY(APA, APY, CHO, PHA).

ACERACEAE

Acer L.

Acer negundo L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA).

Acer pseudoplatanus L.

Árbol. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE).

ACHARIACEAE

Hydnocarpus Gaertn.

Hydnocarpus pentandrus (Buch.-

Ham.) Oken

Sin.: *Chilmoria pentandra* Buch.-Ham.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: PRY(CEN).

ACHATOCARPACEAE

Achatocarpus Triana

Achatocarpus balansae Schinz &

Autran

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CAU, GUA, ÑEE).

Achatocarpus brevipedicellatus H. Walter

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, PAI).

Achatocarpus hasslerianus Heimerl

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAU).

Achatocarpus microcarpus Schinz

& Autran

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CON, GUA, ÑEE).

Achatocarpus praecox Griseb. f.

obovatus (Schinz & Autran) Hauman

Sin.: *Achatocarpus obovatus* Schinz & Autran

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SAL,

SFE, TUC). PRY(CEN, COA).

Achatocarpus praecox Griseb. f.

spinulosus (Griseb.) Hauman

Sin.: *Achatocarpus spinulosus* Griseb.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(JUU, MIS, TUC).

Achatocarpus praecox Griseb. var.

bicornutus (Schinz & Autran) Botta

Sin.: *Achatocarpus bicornutus* Schinz & Autran

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SAL).

BRA(PAR, SCA). PRY(APY, GUA, PHA).

Achatocarpus praecox Griseb. var. **praecox**

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,

JUU, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).

PRY(APY, PAI).

AEXTOXICACEAE

Aextoxicon Ruiz & Pav.

Aextoxicon punctatum Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(COQ,

VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

AIZOACEAE

Aptenia N.E. Br.

Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes

Sin.: *Mesembryanthemum cordifolium* L. f.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, MEN, SFE).

Carpobrotus N.E. Br.**Carpobrotus chilensis** (Molina) N.E. Br.

Sin.: *Mesembryanthemum chilense* Molina
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, JFE).

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.

Sin.: *Mesembryanthemum edulis* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(SCA).
CHL(VAL, MAU, BIO, LRI). URY(CAS, MAL, MON, ROC).

Cypselea Turpin**Cypselea humifusa** Turpin

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Galenia L.**Galenia pubescens** (Eckl. & Zeyh.) Druce

Sin.: *Aizoon pubescens* Eckl. & Zeyh.
Hierba. Introducida. 400 m
Países: CHL(COQ, VAL).

Malephora N.E. Br.**Malephora purpurocrocea** (Haw.)

Schwantes
Hierba. Introducida.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Mesembryanthemum L.**Mesembryanthemum crystallinum** L.

Sin.: *Cryophytum crystallinum* (L.) N.E. Br.,
Gasoul crystallinum (L.) Rothm.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, IDE).

Mesembryanthemum nodiflorum L.

Sin.: *Cryophytum nodiflorum* (L.) L.
Bolus, *Gasoul nodiflorum* (L.) Rothm.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(ATA, COQ).

Sesuvium L.**Sesuvium portulacastrum** (L.) L.

Sin.: *Portulaca portulacastrum* L.,
Sesuvium sessile Pers., *Trianthema*

americana Gillies ex Arn.

Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
BRA(SCA). CHL(AYP). PRY(APY, PHA).
URY(MAL, MON).

Tetragonia L.**Tetragonia angustifolia** Barnéoud

Arbolito. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Tetragonia copiapina Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Tetragonia crystallina L'Hér.

Hierba. Nativa. 900 m
Países: CHL(TAR).

Tetragonia espinosae Muñoz

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Tetragonia macrocarpa Phil.

Sin.: *Tetragonia pusilla* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, IDE).

Tetragonia maritima Barnéoud

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Tetragonia microcarpa Phil.

Sin.: *Tetragonia kuntzei* Kuntze, *Tetragonia macrocarpa* Phil. var. *microcarpa* (Phil.)
Reiche, *Tetragonia tenella* I.M. Johnst.,
Tetragonia trigona Phil.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Tetragonia ovata Phil.

Sin.: *Tetragonia robusta* Phil.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Tetragonia pedunculata Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA).

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze

Sin.: *Demidovia tetragonoides* Pall.,
Tetragonia expansa Murray
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, FOR, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LRI, LLA, IDE, JFE, IPA). URY(ROC).

Trianthema L.**Trianthema argentina** Hunz. &

Cocucci
Hierba. Endémica. 400-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU).

Trianthema portulacastrum L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). CHL(IPA). PRY(APY).

ALISMATACEAE

Alisma L.**Alisma lanceolatum** With.

Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Alisma plantago-aquatica L.

Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(RNE). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Echinodorus Rich. ex Engelm.**Echinodorus berteroi** (Spreng.) Fassett

Sin.: *Alisma berteroi* Spreng.,
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett
subsp. *patagonicus* (Speg.) Rataj,
Echinodorus patagonicus Speg.
Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(RNE). PRY(PHA).

Echinodorus floribundus (Seub.) Seub.

Sin.: *Alisma floribundum* Seub.,
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli subsp. *aureus* (Fassett) R.R. Haynes & Holm-Niels.,
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *aureus* Fassett,
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *clausenii* (Seub.) Rataj,
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *floribundus* (Seub.) Micheli,
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli var. *longibracteatus* Rataj,
Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli var. *muricatus* (Griseb.) Micheli,
Echinodorus muricatus Griseb.,
Echinodorus muricatus Woodson & Schery, hom. illeg.,
Echinodorus pubescens (Mart.) Seub. var. *clausenii* Seub.,
Echinodorus punctatus Micheli

Hierba acuática. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,
CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA,
SPE). URY(RIV).

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltld.) Micheli

Sin.: *Alisma grandiflorum* Cham.
& Schltld., *Echinodorus argentinensis*
Rataj, *Echinodorus grandiflorus* (Cham.
& Schltld.) Micheli var. *ovatus* Micheli,
Echinodorus pellucidus Rataj
Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,
BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).
URY(ART, CAS, PAY, RNO, RIV, ROC,
SJO, TYT).

Echinodorus longipetalus Micheli

Hierba palustre. Nativa. 100-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área
del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU,
CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Echinodorus longiscapus Arechav.

Sin.: *Echinodorus aschersonianus*
Graebn. var. *mulliglandulosus* Rataj,
Echinodorus grandiflorus (Cham. &
Schltld.) Micheli var. *longiscapus*
(Arechav.) Hauman, *Echinodorus*
longiscapus Arechav. var. *minor*
(Buchenau) Tronc., *Echinodorus*
sellowianus Buchenau, *Echinodorus*
sellowianus Buchenau var. *major*
Buchenau, *Echinodorus sellowianus*
Buchenau var. *minor* Buchenau
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA).
URY(SOR, TAC).

Echinodorus macrophyllum (Kunth)
Micheli

Sin.: *Alisma macrophyllum* Kunth
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Echinodorus paniculatus Micheli
emend. Rataj

Sin.: *Echinodorus paniculatus* Micheli
emend. Rataj var. *brevifolia* Hauman,
Echinodorus paniculatus Micheli emend.
Rataj f. *latifolia* Chodat & Hassl.
Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).

BRA(PAR). PRY(APY, BOQ, CEN,
CON, PHA).

Echinodorus reptilis Lehtonen

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(MIE).

Echinodorus scaber Rataj

Sin.: *Echinodorus macrophyllum* (Kunth)
Micheli subsp. *scaber* (Rataj) R.R.
Haynes & Holm-Niels.
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COR, COS). BRA(PAR,
SCA). PRY(CON).

Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.

Sin.: *Alisma intermedia* Mart.,
Alisma subalatum Mart., *Echinodorus*
intermedius (Mart.) Griseb.
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN).

Echinodorus uruguayensis Arechav.

Sin.: *Echinodorus aschersonianus*
Graebn., *Echinodorus horemanii*
Rataj, *Echinodorus martii* Micheli var.
uruguayensis (Arechav.) Hauman,
Echinodorus osiris Rataj, *Echinodorus*
subulatus Niederl., hom. illeg.
Hierba palustre. Endémica. 100-2000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(LLA). PRY(APA, CEN).
URY(ART, FLO, PAY, SAO, SJO, SOR).

Helanthium (Benth. & Hook. f.)
Engelm. ex J.G. Sm.

Helanthium bolivianum (Rusby)
Lehtonen & Myllys

Sin.: *Alisma boliviana* Rusby, *Alisma*
ranunculoides L. var. *brasiliense* A. St.-
Hil., *Echinodorus angustifolius* Rataj,
Echinodorus australis Rataj, *Echinodorus*
austroamericanus Rataj, *Echinodorus*
bolivianus (Rusby) Holm-Niels.,
Echinodorus quadricostatus Fassett
var. *xinguensis* Rataj, *Echinodorus*
quadricostatus Fassett, *Echinodorus*
tenellus (Mart.) Buchenau var. *latifolius*
(Seub.) Fassett

Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN,
CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

Helanthium tenellum (Mart.) Britton

Sin.: *Alisma tenellum* Mart.,
Echinodorus tenellus (Mart.) Buchenau

Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAN, ITA,
PAI). URY(ROC).

Hydrocleys Rich.

Hydrocleys martii Seub.

Sin.: *Hydrocleys uruguayensis*
(Buchenau) Pedersen, *Ostenia*
uruguayensis Buchenau
Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(COS). BRA(SCA).
URY(DUR, ROC).

Hydrocleys mattogrossensis (Kunze)

Holm-Niels. & R.R. Haynes
Sin.: *Hydrocleys cryptopetala* R.E. Fr.,
Limnocharis mattogrossensis Kuntze
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY).

Hydrocleys modesta Pedersen

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área
del proyecto). PRY(ÑEE, PAI).

Hydrocleys nymphoides (Willd.)
Buchenau

Sin.: *Hydrocleys commersonii* Rich.,
Hydrocleys humboldtii (Rich.) Endl.,
nom. illeg., *Limnocharis commersonii*
(Rich.) Spreng., *Limnocharis*
nymphoides (Willd.) Micheli,
Stratioides nymphoides Willd.
Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA).
CHL(VAL). PRY(APY, AMA, CEN,
CHO, CON, COA, ÑEE, NAS, PHA).
URY(ROC).

Limnocharis Humb. & Bonpl.

Limnocharis flava (L.) Buchenau

Sin.: *Alisma flava* L.
Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, SAL). BRA(PAR).
PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, PHA).

Limnocharis laforestii Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS). BRA(Fuera del
área del proyecto). PRY(APY, AMA, PHA).

Sagittaria L.**Sagittaria guayanensis** Kunth

Sin.: *Alisma ancile* Mart. ex Steud., nom. nud., *Alisma echinocarpum* (Mart.) Seub., *Echinodorus guayanensis* (Kunth) Griseb., *Lophiocarpus guayanensis* (Kunth) Micheli f. *minor* Chodat, *Lophiocarpus guayanensis* (Kunth) Micheli, *Lophiocarpus seubertianus* (Mart.) Micheli, *Lophotocarpus guayanensis* (Kunth) J. G. Sm. var. *echinocarpus* (Mart.) Buchenau, *Lophotocarpus guayanensis* (Kunth) J. G. Sm. var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *Lophotocarpus guayanensis* (Kunth) J. G. Sm., *Lophotocarpus seubertianus* (Mart.) Buchenau, *Sagittaria bracteata* Willd. ex Kunth, nom. nud., *Sagittaria echinocarpa* Mart., *Sagittaria seubertiana* Mart.
 Hierba palustre. Nativa. 0-900 m.
 Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CON, COA).

Sagittaria montevidensis Cham.

& Schltdl. subsp. **chilensis** (Cham. & Schltdl.) Bogin

Sin.: *Sagittaria chilensis* Cham. & Schltdl.
 Hierba palustre. Endémica. 0-1500 m.
 Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. subsp. **montevidensis**

Sin.: *Sagittaria andina* Phil., *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltdl. f. *flaviflora* Chodat, *Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltdl. f. *normalis* Hauman, nom. inval., *Sagittaria multinervia* Larrañaga, *Sagittaria pugioniformis* L. f. *longipedicellata* Kuntze, *Sagittaria pugioniformis* L. var. *montevidensis* (Cham. & Schltdl.) Kuntze
 Hierba palustre. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, LRI, LLA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, GUA, ÑEE, PHA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Sagittaria rhombifolia Cham.

Sin.: *Sagittaria affinis* Seub., *Sagittaria amazonica* Huber, *Sagittaria lagoensis* Seub. & Warm., *Sagittaria pugioniformis* L. var. *affinis* (Seub.) Kuntze, *Sagittaria pugioniformis* L. f. *macrophylla* Chodat, *Sagittaria pugioniformis* L. var. *platyphylla* Micheli, *Sagittaria*

pugioniformis L. var. *rhombifolia* (Cham.) Kuntze, *Sagittaria rhomboidalis* Micheli
 Hierba palustre. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LRI, LLA). PRY(AMA, CAN, CEN, ÑEE).

ALSTROEMERIACEAE

Alstroemeria L.**Alstroemeria achirae** M. Muñoz & Brinck

Hierba. Endémica. 1500-1900 m.
 Países: CHL(MAU).

Alstroemeria albescens M.C. Assis

Hierba. Endémica. 100-200 m.
 Países: BRA(RGS).

Alstroemeria amabilis M.C. Assis

Hierba. Endémica. 1400-1500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Alstroemeria andina Phil. var. **andina**

Hierba. Endémica. 2900-3700 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria andina Phil. var.

venustula (Phil.) M. Muñoz
 Sin.: *Alstroemeria andina* Phil. subsp. *venustula* (Phil.) Ehr. Bayer, *Alstroemeria venustula* Phil.

Hierba. Endémica. 2300-3700 m.
 Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria angustifolia Herb. var. **angustifolia**

Sin.: *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *acuminata* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *conferta* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *intermedia* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *solliana* Herb.
 Hierba. Endémica. 0-1700 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Alstroemeria angustifolia Herb. var.

velutina (Ehr. Bayer) M. Muñoz
 Sin.: *Alstroemeria angustifolia* Herb. subsp. *velutina* Ehr. Bayer
 Hierba. Endémica. 500-2000 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Alstroemeria apertiflora Baker

Hierba. Nativa. 0-900 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, PAI).

Alstroemeria aurea Graham

Sin.: *Alstroemeria araucana* Phil., *Alstroemeria aurantiaca* D. Don, *Alstroemeria chiloensis* Phil., *Alstroemeria mutabilis* Kunze, *Alstroemeria stenopetala* Phil.

Hierba. Endémica. 200-1900 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Alstroemeria bakeri Pax

Hierba. Endémica. 1600-2400 m.
 Países: ARG(CAT).

Alstroemeria citrina Phil.

Hierba. Endémica.
 Países: CHL(COQ, VAL).

Alstroemeria crispata Phil.

Hierba. Endémica. 1100-3000 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Alstroemeria cummingiana Herb.

Sin.: *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *cummingiana* (Herb.) Ehr. Bayer
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL).

Alstroemeria cunha Vell.

Sin.: *Alstroemeria argentovittata* Lem., *Alstroemeria nemorosa* Gardner
 Hierba. Nativa. 1000-1700 m.
 Países: BRA(PAR).

Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp.

chrysantha Ehr. Bayer
 Hierba. Endémica. 0-400 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp.

diluta
 Hierba. Endémica. 300 M
 Países: CHL(LBO, MAU).

Alstroemeria exerens Meyen

Sin.: *Alstroemeria diazii* Phil., *Alstroemeria exserens* Meyen, *Alstroemeria pallens* Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2100 m.
 Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Alstroemeria garventae Ehr. Bayer

Hierba. Endémica. 1200-2000 m.
 Países: CHL(VAL, RME).

Alstroemeria graminea Phil.

Sin.: *Taltalia graminea* (Phil.) Ehr. Bayer
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(ANT, ATA).

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. **hookeri**

Sin.: *Alstroemeria hookeriana* Schult.,
Alstroemeria rosea Hook.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. **maculata** Ehr. Bayer

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(COQ).

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. **recumbens** (Herb.) Ehr. Bayer

Sin.: *Alstroemeria recumbens* Herb.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. **sansebastianana** Baeza & E. Ruiz

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(BIO).

Alstroemeria inodora Herb.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Alstroemeria isabellana Herb.

Sin.: *Alstroemeria butantanensis*
Hoehne, *Alstroemeria campaniflora*
Hand.-Mazz., *Alstroemeria chlorantha*
Ravenna, *Alstroemeria isabellana*
Herb. var. *longifolia* Seub. ex Schenk,
Alstroemeria regnelliana Kraenzl.,
Alstroemeria viridiflora Ravenna,
Bomarea stricta Pax
Hierba. Nativa. 0-2700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(PAI). URY(TYT).

Alstroemeria kingii Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ATA).

Alstroemeria leporina Ehr. Bayer & Grau

Sin.: *Alstroemeria hirtella* Phil.
Hierba. Endémica. 900-2000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria ligtu L. subsp. **ligtu**

Sin.: *Alstroemeria chilensis* Lem.,
Alstroemeria flava Phil., *Alstroemeria*
haemantha Ruiz & Pav., *Alstroemeria*
lothiana Utnet
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, RME, JFE).

Alstroemeria ligtu L. subsp. **simsii** (Spreng.) Ehr. Bayer

Sin.: *Alstroemeria aurea* Graham var.
valparadisiaca Herb., *Alstroemeria aurea*
Meyen, hom. illeg., *Alstroemeria ciliata*
Poepp., *Alstroemeria dentata* Klotzsch,
Alstroemeria haemantha Ruiz & Pav.
var. *pilosa* (Lindl.) Herb., *Alstroemeria*
haemantha Ruiz & Pav. var. *simsiana*
Herb., *Alstroemeria macraeana* Herb.,
Alstroemeria pulchella L. f. var. *pilosa*
Lindl., *Alstroemeria quillotensis* Herb.,
Alstroemeria simsii Spreng.
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Alstroemeria ligtu L. subsp. **splendens** M. Muñoz

Sin.: *Alstroemeria ligtu* L. subsp.
incarnata Ehr. Bayer, nom. illeg.
Hierba. Endémica. 1100-1400 m.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Alstroemeria lutea M. Muñoz

Hierba. Endémica.
Países: CHL(TAR).

Alstroemeria magnifica Herb. var. **sierrae** (Muñoz) M. Muñoz

Sin.: *Alstroemeria sierrae* Muñoz
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Alstroemeria magnifica Herb. var. **tofoensis** M. Muñoz

Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: CHL(COQ).

Alstroemeria magnifica Herb. subsp. **magenta** (Ehr. Bayer) M. Muñoz

Sin.: *Alstroemeria magenta* Ehr. Bayer
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Alstroemeria magnifica Herb. subsp. **magnifica**

Sin.: *Alstroemeria gayana* Phil.,
Alstroemeria magnifica Herb. subsp.
gayana (Phil.) Ehr. Bayer
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Alstroemeria malmeana Kraenzl.

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Alstroemeria marticorenae Negritto & Baeza

Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(VAL).

Alstroemeria mollensis M. Muñoz & Brinck

Hierba. Endémica. 2000-2200 m.
Países: CHL(COQ).

Alstroemeria monantha Ravenna

Sin.: *Alstroemeria aulica* Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Alstroemeria pallida Graham

Sin.: *Alstroemeria albiflora* C. Presl,
Alstroemeria ligtu L. var. *andina* Phil.,
Alstroemeria nivalis Phil., hom. illeg.,
Alstroemeria nubigera Phil., *Alstroemeria*
rosea Phil.
Hierba. Endémica. 1100-2800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Alstroemeria parvula Phil.

Hierba. Endémica. 2200-2600 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Alstroemeria patagonica Phil.

Sin.: *Alstroemeria nana* Rendle,
Alstroemeria patagonica Phil. f. *biflora*
Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(AIS, MAG).

Alstroemeria pelegrina L.

Sin.: *Alstroemeria amoena* Salisb.,
Alstroemeria gayana Phil. var. *humilis*
Phil., *Alstroemeria pelegrina* L. var.
albescens Herb.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Alstroemeria philippii Baker var. **albicans** M. Muñoz

Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(ATA).

Alstroemeria philippii Baker var. **philippii**

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria piperata A.R. Flores & J.M. Watson

Hierba. Endémica. 1200-1500 m.
Países: CHL(VAL).

Alstroemeria polyphylla Phil.

Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: CHL(ATA).

Alstroemeria presliana Herb. subsp. **australis** Ehr. Bayer
Hierba. Endémica. 200-1500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Alstroemeria presliana Herb. subsp. **presliana**
Sin.: *Alstroemeria chillanensis* Grau & Ehr. Bayer, *Alstroemeria epulauquensis* Ravenna
Hierba. Endémica. 1300-2300 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Alstroemeria pseudospathulata Ehr. Bayer
Sin.: *Alstroemeria crocea* Phil., hom. illeg., *Alstroemeria lacrima-solis* Ravenna, *Alstroemeria oxyphylla* Ravenna, nom. superfl.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU).

Alstroemeria psittacina Lehm.
Sin.: *Alstroemeria atrorubra* Ravenna, *Alstroemeria hassleriana* Baker, *Lilavia psittacina* (Lehm.) Raf.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAN, GUA). URY(CAS, MON).

Alstroemeria pulchra Sims subsp. **lavandulacea** Ehr. Bayer
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Alstroemeria pulchra Sims subsp. **pulchra**
Sin.: *Alstroemeria bicolor* Hook., *Alstroemeria flos-martinii* Ker Gawl., *Alstroemeria ligtu* L. var. *pulchra* (Sims) Baker, *Alstroemeria tricolor* Hook.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Alstroemeria pulchra Sims var. **maxima** Phil.
Sin.: *Alstroemeria magnifica* Herb. subsp. *maxima* (Phil.) Ehr. Bayer, *Alstroemeria spectabilis* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Alstroemeria pygmaea Herb.
Sin.: *Schickendantzia hieronymi* Pax, *Schickendantzia pygmaea* (Herb.) Spig.
Hierba. Nativa. 3000-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Alstroemeria revoluta Ruiz & Pav.
Sin.: *Alstroemeria herbertiana* Roem., *Alstroemeria inconspicua* Phil., *Alstroemeria reflexa* Roem.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Alstroemeria ribeirensis Ravenna
Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: BRA(PAR).

Alstroemeria schizanthoides Grau var. **alba** M. Muñoz
Sin.: *Alstroemeria modesta* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Alstroemeria schizanthoides Grau var. **schizanthoides**
Hierba. Endémica. 800-1900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria sellowiana Seub. ex Schenk
Hierba. Endémica. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Alstroemeria spathulata C. Presl
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Alstroemeria traudliae J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(COQ).

Alstroemeria umbellata Meyen
Sin.: *Alstroemeria sericantha* Schauer
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Alstroemeria versicolor Ruiz & Pav.
Sin.: *Alstroemeria meyeniana* Schauer, *Alstroemeria sotoana* Phil., *Alstroemeria tigrina* Phil., *Alstroemeria xanthina* Phil.
Hierba. Endémica. 200-2000 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Alstroemeria violacea Phil.
Sin.: *Alstroemeria paupercula* Phil., *Alstroemeria violacea* Knight & Perry, nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Alstroemeria werdermannii Ehr. Bayer var. **flavicans** M. Muñoz
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria werdermannii Ehr. Bayer var. **werdermannii**
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Alstroemeria zoellneri Ehr. Bayer
Hierba. Endémica. 1100-1800 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Bomarea Mirb.

Bomarea boliviensis Baker
Sin.: *Alstroemeria parviflora* Ravenna, *Bomarea venturii* Killip, nom. nud.
Hierba. Nativa. 1500-3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Bomarea dulcis (Hook.) Beauverd
Sin.: *Alstroemeria dulcis* Hook.
Hierba. Nativa. 2500-5200 m.
Países: CHL(AYP).

Bomarea edulis (Tussac) Herb.
Sin.: *Alstroemeria edulis* Tussac, *Alstroemeria edulis* Andrews, nom. illeg., *Alstroemeria edulis* Tussac var. *grandis* Herb., *Alstroemeria salsilloides* Mart. ex Roem. & Schult., *Bomarea macrophylla* Schenck ex Killip, nom. nud., *Bomarea macrophylla* Killip, nom. nud., *Bomarea spectabilis* Schenk
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Bomarea involucrosa (Herb.) Baker
Sin.: *Collania involucrosa* Herb.
Hierba. Nativa. 3500-3700 m.
Países: CHL(AYP).

Bomarea macrocephala Pax
Sin.: *Alstroemeria macrocephala* (Pax) Hunz., *Bomarea fiebrigiana* Kraenzl.
Hierba. Nativa. 1800-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Bomarea ovallei (Phil.) Ravenna
Sin.: *Alstroemeria ovallei* (Phil.) Hunz., *Leontochir ovallei* Phil. var. *luteus* M. Muñoz, *Leontochir ovallei* Phil.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA).

Bomarea salsilla (L.) Herb.
Sin.: *Alstroemeria oculata* Lodd., *Alstroemeria salsilla* L., *Bomarea oculata* (Lodd.) M. Roem.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Bomarea stans Kraenzl.

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(SAL).

Luzuriaga Ruiz & Pav., nom. cons.**Luzuriaga marginata** (Gaertn.) Benth.Sin.: *Callixene magellanicum* Raeusch., *Callixene marginata* (Gaertn.) Lam., *Enargea marginata* Gaertn.

Subarbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF).
CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).**Luzuriaga polyphylla** (Hook.) J.F. Macbr.Sin.: *Callixene polyphylla* Hook., *Enargea polyphylla* (Hook.) F. Muell., *Luzuriaga erecta* Kunth

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Luzuriaga radicans Ruiz & Pav.Sin.: *Callixene radicans* (Ruiz & Pav.) Macloskie, *Enargea radicans* (Ruiz & Pav.) F. Muell.

Subarbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

AMARANTHACEAE

Alternanthera Forssk.**Alternanthera albida** (Moq.) Griseb.Sin.: *Achyranthes seubertii* Standl., *Alternanthera albida* (Moq.) Griseb. f. *amentacea* Suess., *Alternanthera albida* (Moq.) Griseb. f. *globifera* Suess., *Alternanthera tomentella* Seub., *Telanthera albida* Moq.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, SDE, SLU, TUC). BRA(PAR).
PRY(APY).**Alternanthera altacruzensis** Suess.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ).

Alternanthera aquatica (D. Parodi)

Chodat

Sin.: *Achyranthes hassleriana* (Chodat) Standl., *Alternanthera hassleriana* Chodat, *Mogiphanes aquatica* D. Parodi

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA). BRA(PAR).

PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).

Alternanthera bettzickiana (Regel)

G. Nicholson

Sin.: *Telanthera bettzickiana* Regel

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntzevar. **brasiliana**Sin.: *Alternanthera dentata* (Moench) Scheygr., *Gomphrena brasiliana* L., *Gomphrena dentata* Moench, *Mogiphanes brasiliensis* L., *Philoxerus brasiliensis* (L.)R. Br., *Telanthera dentata* Moq.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APY, CEN).

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntzevar. **villosa** (Moq.) KuntzeSin.: *Achyranthes ramosissima* (Mart.)Standl., *Alternanthera brasiliana* (L.)Kuntze var. *moquinii* (Webb ex Moq.)Uline & W.L. Bray, *Alternanthera**brasiliana* (L.) Kuntze var. *strigosa*(Hassk.) Kuntze, *Alternanthera**moquinii* (Webb ex Moq.) Dusén,*Alternanthera ramosissima* (Mart.)Chodat, *Alternanthera ramosissima*(Mart.) Chodat var. *missionum*Pedersen, *Alternanthera ramosissima*(Mart.) Chodat var. *reptans* Pedersen,*Alternanthera strigosa* Hassk.,*Mogiphanes ramosissima* Mart.,*Mogiphanes villosa* Mart., *Mogiphanes**virgata* Schrad., *Telanthera brasiliana*(L.) Moq. f. *grisea* Chodat, *Telanthera**brasiliana* (L.) Moq. var. *villosa* Moq.,*Telanthera moquinii* Webb ex Moq.,*Telanthera ramosissima* (Mart.) Moq.,*Telanthera virgata* (Schrad.) Moq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, CAN, SPE).**Alternanthera cana** Suess.

Hierba o subarbusto. Endémica.

1000-2500 m.

Países: ARG(SJU).

Alternanthera caracasana KunthSin.: *Achyranthes peploides* (Willd. ex Roem. & Schult.) Britton, *Alternanthera**achyantha* (L.) R. Br. ex Sweet var.*dasyantha* Seub., *Alternanthera**achyantha* (L.) R. Br. ex Sweet var.*parvifolia* Moq., *Alternanthera parvifolia*(Moq.) Fawc. & Rendle, *Alternanthera**peploides* (Willd. ex Roem. & Schult.)Urb., *Celosia humifusa* Humb. & Bonpl.ex Schult., *Illecebrum peploides* Willd. exRoem. & Schult., *Telanthera caracasana*

(Kunth) Moq.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COR, JUJ, SAL, SFE).

Alternanthera cinerella Suess.

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Alternanthera collina Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SDE).

Alternanthera ficoidea (L.) Sm.Sin.: *Alternanthera polygonoides* (L.) R.Br. ex Griseb. var. *diffusa* (Moq.) Hicken,*Alternanthera tenella* Colla, *Bucholzia**ficoidea* (L.) Mart., *Gomphrena ficoidea* L.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(APY, AMA, CEN, PHA).

Alternanthera flavescens Kunth

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(SCA).

Alternanthera halimifolia (Lam.)

Standl. ex Pittier

Sin.: *Achyranthes halimifolia* Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr.var. **hirsuta** Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAN).

Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr.var. **hirtula**Sin.: *Achyranthes paraguayensis*Standl., *Alternanthera hirtula* (Mart.)R.E. Fr. var. *robusta* Chodat, nom.inval., *Alternanthera hirtula* (Mart.)R.E. Fr. var. *rosea* (Morong) Chodat,*Alternanthera rosea* (Morong) Uline &W.L. Bray, *Mogiphanes hirtula* Mart.,*Mogiphanes rosea* Morong & Britton,*Telanthera hirtula* (Mart.) Moq.,*Telanthera rosea* (Morong) Chodat, nom.inval., *Telanthera rosea* (Morong) Chodatvar. *cinnabarina* Chodat, *Telanthera rosea*(Morong) Chodat var. *typica* Chodat

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR,

RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN,

CEN, COA, ITA, MIE, PAI, PHA).

URY(Desconocida).

Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr. var. **nitens** Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Alternanthera inaccessa Pedersen
Arbusto. Endémica. 700 m.
Países: PRY(APY).

Alternanthera kurtzii Schinz ex Pedersen subsp. **kurtzii**
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, PAI, PHA). URY(ART, COL, PAY, RNO).

Alternanthera kurtzii Schinz ex Pedersen subsp. **sclerosperma** Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CEN).

Alternanthera lanceolata (Benth.) Schinz
Sin.: *Achyranthes lehmannii* (Hieron.) Standl., *Achyranthes mexicana* (Schltdl.) Standl., *Alternanthera lehmannii* Hieron., *Alternanthera mexicana* (Schltdl.) Hieron., hom. illeg., *Alternanthera mexicana* (Schltdl.) Hieron. var. *lehmannii* (Hieron.) Suess., *Alternanthera microcephala* (Moq.) Schinz, *Brandesia lanceolata* Benth., *Brandesia mexicana* Schltdl., *Telanthera lanceolata* (Benth.) Moq., *Telanthera microcephala* Moq.
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Alternanthera littoralis P. Beauv. ex Moq. var. **littoralis**
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Alternanthera littoralis P. Beauv. ex Moq. var. **maritima** (Mart.) Pedersen
Sin.: *Bucholzia maritima* Mart.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Alternanthera malmeana R.E. Fr. var. **malmeana**
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(CAU, CAA).

Alternanthera malmeana R.E. Fr. var. **straminea** (Chodat) Pedersen
Sin.: *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *atropurpurea* Chodat,

Telanthera rosea (Morong) Chodat var. *pallens* Chodat, *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *straminea* Chodat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, SPE).

Alternanthera maritima (Mart.) A. St.-Hil.
Sin.: *Bucholzia maritima* Mart.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Alternanthera martii R.E. Fr.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Alternanthera meyeriana (Regel & Körn.) Suess.
Sin.: *Alternanthera tucumana* Lillo, *Telanthera meyeriana* Regel & Körn.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Alternanthera micrantha R.E. Fr.
Sin.: *Alternanthera friesii* Schinz, *Alternanthera rufescens* Suess.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA).

Alternanthera microphylla R.E. Fr. var. **maior** Suess.
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Alternanthera microphylla R.E. Fr. var. **microphylla**
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Alternanthera nodifera (Moq.) Griseb.
Sin.: *Telanthera nodifera* Moq.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. f. **aberrans** Pedersen
Sin.: *Alternanthera ficoidea* (L.) Sm. f. *aberrans* Pedersen, nom. inval.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). URY(MON).

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. subsp. **chacoensis** (Morong ex Morong & Britton) Pedersen
Sin.: *Alternanthera chacoensis* Morong ex Morong & Britton, *Alternanthera ficoidea* (L.) Sm. subsp. *chacoensis*

(Morong ex Morong & Britton) Pedersen, *Alternanthera morongii* Uline, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *chacoensis* (Morong ex Morong & Britton) Pedersen, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *ovata* Chodat, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *robusta* Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. subsp. **paronychioides**
Sin.: *Achyranthes ficoidea* (L.) Lam., *Alternanthera polygonoides* (L.) R. Br. ex Griseb.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(CEN).

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen
Sin.: *Achyranthes pilosa* (Moq.) Standl., *Alternanthera boliviana* Rusby subsp. *amentacea* Suess., *Alternanthera felipponei* Beauverd, *Alternanthera ficoidea* (L.) Sm. subsp. *pilosa* (Moq.) Pedersen, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *amentacea* (Suess.) Suess., *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *pilosa* (Moq.) Suess., *Alternanthera pilosa* Moq.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, ITA). URY(DUR, MON, SAO, SJO).

Alternanthera pennelliana Pedersen
Sin.: *Telanthera geniculata* S. Moore
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. f. **angustifolia** Suess.
Sin.: *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *lancifolia* Chodat, *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *luxurians* Suess., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *linearifolia* Chodat
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**

Sin.: *Achyranthes paludosa* Bunbury, *Achyranthes philoxeroides* (Mart.) Standl., *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *acutifolia* (Mart.) Hicken, *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *obtusifolia* (Moq.) Hicken, *Bucholzia philoxeroides* Mart. var. *obtusifolia* Mart., *Bucholzia philoxeroides* Mart. var. *philoxeroides*, *Mogiphanes philoxeroides* D. Parodi, *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *denticulata* Seub., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *obtusifolia* (Mart.) Moq.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY). URY(MON).

Alternanthera piptantha Pedersen
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).**Alternanthera porrigens** (Jacq.) Kuntze
Sin.: *Alternanthera junciflora* (J. Remy) I.M. Johnst., *Achyranthes porrigens* Jacq.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, VAL).**Alternanthera praelonga** A. St.-Hil. var. **australis** Pedersen
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).**Alternanthera puberula** (Mart.) D. Dietr.
Sin.: *Achyranthes puberula* (Mart.) Standl., *Alternanthera adscendens* Suess., *Alternanthera subumbellata* Suess., *Brandesia puberula* Mart., *Pfaffia puberula* (Mart.) Spreng., *Telanthera puberula* (Mart.) Moq.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, APY).**Alternanthera pumila** O. Stützer
Sin.: *Alternanthera pumila* O. Stützer var. *coarctata* O. Stützer
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(COR).**Alternanthera pungens** Kunth
Sin.: *Achyranthes leiantha* (Seub.) Standl., *Achyranthes lorentzii* (Uline) Standl., *Achyranthes mucronata* Lam., nom. illeg., *Achyranthes radicans* Cav.,

nom. illeg., *Achyranthes repens* L., *Alternanthera achyrantha* (L.) R. Br. ex Sweet, nom. illeg., *Alternanthera achyrantha* (L.) R. Br. ex Sweet var. *leiantha* Seub., *Alternanthera echinata* Sm., *Alternanthera lorentzii* Uline, *Alternanthera pungens* Kunth var. *leiantha* (Seub.) Suess., *Alternanthera pungens* Kunth f. *pauciflora* Suess., *Alternanthera repens* (L.) Link, comb. superfl., *Celosia echinata* Willd. ex Schult., *Desmochaeta sordida* Bunbury, *Guilleminea procumbens* Rojas Acosta, *Illecebrum achyranthum* L., nom. illeg., *Illecebrum pungens* (Kunth) Spreng., *Paronychia achyrantha* (L.) Desf., *Pityranthus crassifolius* Mart., *Pupalia sordida* (Bunbury) Moq., *Telanthera pungens* (Kunth) Moq.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR). PRY(APA, APY, CEN, COA, GUA, PHA). URY(MON).

Alternanthera reineckii Briq.
Sin.: *Achyranthes reineckii* (Briq.) Standl., *Alternanthera pilosa* Moq. var. *microphylla* Chodat, *Alternanthera pilosa* Moq. f. *petiolata* Chodat
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, PAY, RIV, SAO, TYT).**Alternanthera rufa** (Mart.) D. Dietr.
Sin.: *Achyranthes rufa* (Mart.) Standl., *Brandesia rufa* Mart., *Pfaffia rufa* (Mart.) Spreng., *Telanthera rufa* (Mart.) Moq.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).**Alternanthera scandens** Herzog
Sin.: *Telanthera brasiliana* (L.) Moq. f. *capitata* Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(CAU, CAN).**Alternanthera serpens** Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, PHA).**Alternanthera sessilis** (L.) R. Br.
Sin.: *Alternanthera denticulata* R. Br., *Gomphrena sessilis* L., *Illecebrum sessilis* (L.) L.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY).**Alternanthera suessenguthii** Covas
Sin.: *Alternanthera australis* Covas, *Alternanthera lorentzii* Suess., hom. illeg., *Alternanthera negrensis* Suess.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR, RNE, SLU).**Amaranthus L.****Amaranthus albus** L.

Sin.: *Amaranthus graecizans* L. var. *pubescens* Uline & W.L. Bray
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, RNE, SLU). CHL(COQ, RME). URY(ART, DUR, MON, PAY, RNO, SAO).

Amaranthus asplundii Thell. var. **asplundii**

Sin.: *Amaranthus affinis* Thell., *Amaranthus buchtienianus* Thell.
Hierba. Nativa. 2400-3600 m.
Países: ARG(JUU, SJU). CHL(LLA).

Amaranthus asplundii Thell. var. **australis** Hunz.

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Amaranthus blitoides S. Watson
Hierba. Introducida. 2900-3000 m.
Países: ARG(LPA, RNE, TUC).**Amaranthus blitum** L. var. **blitum**
Sin.: *Amaranthus ascendens* Loisel., *Amaranthus blitum* L. var. *polygonoides* Moq., *Amaranthus lividus* L. var. *ascendens* (Loisel.) Thell., *Amaranthus lividus* L. subsp. *polygonoides* (Moq.) Probst, *Amaranthus lividus* L. var. *polygonoides* (Moq.) Thell., *Euxolus viridis* (L.) Moq. var. *ascendens* (Loisel.) Moq.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, MIE, PAI). URY(SJO).**Amaranthus blitum** L. var. **emarginatus** (Moq. ex Uline & W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedro
Sin.: *Amaranthus emarginatus* Moq. ex Uline & W.L. Bray
Hierba. Introducida.
Países: CHL (ANT, TAR).**Amaranthus bouchonii** Thell.
Sin.: *Amaranthus hybridus* L. subsp. *bouchonii* (Thell.) O. Bolòs & Vigo
Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU).

Amaranthus cardenasianus Hunz.
Hierba. Nativa. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Amaranthus caudatus L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(TUC). BRA(PAR, SCA).

Amaranthus celosioides Kunth
Sin.: *Amaranthus hybridus* L. var.
pergaminiensis Covas
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, SAL).

Amaranthus crispus (Lesp. & Thénau) A. Terracc.
Sin.: *Amaranthus cristulatus* Speg.,
Euxolus crispus Lesp. & Thénau
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SLU). URY(MON).

Amaranthus deflexus L.
Sin.: *Amarantellus argentinus* Speg.,
Euxolus deflexus (L.) Raf.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, IDE, JFE). URY(MON).

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(DFE).

Amaranthus emarginatus Moq. ex Uline & W.L. Bray
Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(ANT).

Amaranthus hunzikeri Bayón
Hierba. Endémica. 3200-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).

Amaranthus hybridus L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.
Sin.: *Amaranthus cruentus* L.,
Amaranthus flavus L., *Amaranthus paniculatus* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). CHL(MAU, BIO, RME). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, GUA, PAI).

Amaranthus hybridus L. subsp. **hybridus**
Sin.: *Amaranthus chlorostachys* Willd., *Amaranthus hybridus* L. var. *hypochondriacus* (L.) Rob., *Amaranthus*

hybridus L. var. *quitensis* (Kunth) Covas, *Amaranthus hypochondriacus* L. var. *hypochondriacus*, *Amaranthus quitensis* Kunth, *Amaranthus quitensis* Kunth var. *stuckertianus* Thell.

Hierba. Introducida. 0-2400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(APA, APY, AMA, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON).

Amaranthus kloosianus Hunz.
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Amaranthus lividus L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS). PRY(COA).

Amaranthus lombardoi Hunz.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(CAS, SJO).

Amaranthus looseri Suess.
Hierba. Endémica. 500 M
Países: CHL(VAL, RME).

Amaranthus mantegazzianus Pass.
Hierba. Endémica. 1600-1800 m.
Países: ARG(TUC).

Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron.
Sin.: *Euxolus muricatus* Moq.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, PHA). URY(MON).

Amaranthus palmeri S. Watson
Hierba. Introducida.
Países: ARG(COR, LPA, SLU).

Amaranthus pedersenianus Bayón & C. Peláez
Hierba. Endémica. 2800-3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Amaranthus persimilis Hunz.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU).

Amaranthus peruvianus (Schauer) Standl.
Sin.: *Mengea peruviana* Schauer
Hierba. Nativa. 3500-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Amaranthus powellii S. Watson
Sin.: *Amaranthus hypochondriacus* L. var. *powellii* (S. Watson) Pedersen
Hierba. Nativa.
Países: ARG(SAL, SJU).

Amaranthus retroflexus L.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, SFE). BRA(PAR, RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APY). URY(SOR).

Amaranthus rosengurttii Hunz.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(ART, FLO, FLA, LAV, RIV).

Amaranthus spinosus L.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, LPA, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, CON).

Amaranthus standleyanus Parodi ex Covas
Sin.: *Amaranthus parodii* Standl., hom. illeg., *Amaranthus vulgatissimus* Speg. f. *chacoensis* Thell.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA). URY(MON).

Amaranthus viridis L.
Sin.: *Amaranthus gracilis* Desf. ex Poir., *Chenopodium caudatum* Jacq., *Euxolus caudatus* (Jacq.) Moq., *Euxolus viridis* (L.) Moq.
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, ARA). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Amaranthus vulgatissimus Speg.
Sin.: *Amaranthus ataco* Thell., *Amaranthus spicatus* (Thell.) Seckt, comb. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, SFE, SJU). URY(PAY).

Blutaparon Raf.**Blutaparon portulacoides** (A. St.-Hil.)Mears var. **commersonii** (A. St.-Hil.) MearsSin.: *Iresine portulacoides* (A. St.-Hil.) Moq.var. *commersonii* (A. St.-Hil.) Moq., *Philoxerus**portulacoides* A. St.-Hil. var. *commersonii* A.St.-Hil., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq.var. *carcosa* Moq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA).

URY(MON).

Blutaparon portulacoides (A. St.-Hil.)Mears var. **portulacoides**Sin.: *Iresine portulacoides* (A. St.-Hil.)Moq., *Philoxerus portulacoides* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Blutaparon vermiculare (L.) MearsSin.: *Gomphrena vermicularis* L.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Celosia L.**Celosia argentea** L. f. **argentea**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN).

Celosia argentea L. f. **crystata** (L.) SchinzSin.: *Celosia argentea* L. var. *crystata* (L.)Kuntze, *Celosia cristata* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(SCA). PRY(AMA, CAN, CEN).

Celosia corymbifera Didr.Sin.: *Celosia cymosa* Seub.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Celosia grandifolia Moq.Sin.: *Celosia brasiliensis* Moq.

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chamissoa Kunth, nom. cons.**Chamissoa acuminata** Mart.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, SPE).

Chamissoa altissima (Jacq.) KunthSin.: *Achyranthes altissima* Jacq.,*Celosia major* Griseb., *Chamissoa**altissima* (Jacq.) Kunth var. *laxiflora*Moq., *Chamissoa macrocarpa* Kunth,*Chamissoa maximiliani* Moq. var.*pubescens* Chodat, nom. nud.

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART).

Chamissoa maximiliani Moq.Sin.: *Chamissoa acuminata* Mart.var. *maximiliani* (Mart.) Sohmer,*Chamissoa celosioides* Griseb., *Chamissoa maximiliani* Moq. f. *celosioides* (Griseb.)Suess., *Chamissoa maximiliani* Mart.,

nom. nud.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).

BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, GUA, PAI).

Cyathula Blume**Cyathula prostrata** (L.) BlumeSin.: *Achyranthes prostrata* L.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Froelichia Moench**Froelichia chacoensis** Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY, BOQ, COA, PHA).

Froelichia paraguayensis Chodat

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: PRY(AMA, CEN, CON, PAI).

Froelichia procera (Seub.) PedersenSin.: *Froelichia lanata* (Kunth) Moq.f. *albiflora* Chodat & Hassl., *Froelichia**lanata* (Kunth) Moq. var. *laciniata*,*Froelichia lanata* (Kunth) Moq. var.*paraguayensis* Chodat, *Froelichia lanata*(Kunth) Moq. f. *roseiflora* Chodat &Hassl., *Froelichia lanata* (Kunth) Moq.var. *procera* Seub.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Froelichia tomentosa (Mart.) Moq.Sin.: *Froelichia tomentosa* (Mart.)Moq. var. *angustialata* Suess., *Oplotheca**tomentosa* Mart.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(APY). URY(RNO).

Gomphrena L.**Gomphrena arborescens** L. f.Sin.: *Bragantia vandelli* Roem. &Schult., *Gomphrena arborescens* L. f. f.*pulcherrima* Hassl., *Gomphrena officinalis*Mart., *Xeraea arborescens* (L. f.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAN).

Gomphrena boliviana Moq. f. **boliviana**Sin.: *Alternanthera boliviana* Rusby,*Gomphrena acrotepala* Suess., *Gomphrena**globosa* L. var. *albiflora* Moq., *Xeraea**boliviana* (Moq.) Kuntze

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). PRY(APY).

Gomphrena boliviana Moq. f.**leiantha** Pedersen

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Gomphrena boliviana Moq. f.**robusta** (Hicken) PedersenSin.: *Gomphrena lanceolata* R.E. Fr.,*Iresine heliotropifolia* (Griseb.) Hicken f.*robusta* Hicken

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).

Gomphrena celosioides Mart. f.**aureiflora** (Chodat & Hassl.) PedersenSin.: *Gomphrena celosioides* Mart. f.*parvifolia* Stuchlik, *Gomphrena celosioides*Mart. f. *suberecta* Stuchlik, *Gomphrena**celosioides* Mart. var. *aureiflora* Stuchlik,*Gomphrena decumbens* Jacq. f. *aureiflora*Chodat & Hassl., *Gomphrena decumbens*Jacq. var. *aureiflora* (Chodat & Hassl.)Stuchlik, *Gomphrena hygrophila* Mart. f.*luteiflora* Herzog

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).

PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Gomphrena celosioides Mart. f.**roseiflora** (Chodat & Hassl.) PedersenSin.: *Gomphrena decumbens* Jacq. f.

roseiflora Chodat & Hassl., *Gomphrena decumbens* Jacq. var. *roseiflora* (Chodat & Hassl.) Stuchlik, *Gomphrena hygrophila* Mart. f. *subecristata* Herzog

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, APY, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Gomphrena celosioides Mart. var. **celosioides**

Sin.: *Gomphrena celosioides* Mart. f. *grandifolia* Stuchlik, *Gomphrena decumbens* Jacq. var. *albiflora* (Chodat & Hassl.) Stuchlik, *Gomphrena decumbens* Jacq. f. *albiflora* Chodat & Hassl., *Gomphrena decumbens* Jacq. var. *genuina* Stuchlik, nom. inval., *Gomphrena perennis* L. f. *ramosissima* Stuchlik, *Xeraea celosioides* (Mart.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(TAC).

Gomphrena celosioides Mart. var. **hygrophila** (Mart.) Pedersen

Sin.: *Gomphrena hygrophila* Mart.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: PRY(APY, AMA, CEN, CON, PAI).

Gomphrena cladotrichoides Suess.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(SJU).

Gomphrena colosacana Hunz. & Subils var. **andersonii** Subils & Hunz.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SLU).

Gomphrena colosacana Hunz. & Subils var. **colosacana**

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(LRI).

Gomphrena discolor R.E. Fr.

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: PRY(APY).

Gomphrena elegans Mart. var.

claussenoides Suess.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(TUC). PRY(APY).

Gomphrena elegans Mart. var. **elegans**

Sin.: *Gomphrena elegans* Mart. f.

nigro-virida Stuchlik, *Gomphrena elegans* Mart. var. *genuina* Stuchlik, nom. inval., *Gomphrena hilariana* Moq., *Gomphrena viridifolia* Suess., p.p., *Xeraea elegans* (Mart.) Kuntze, *Xeraea hilariana* (Moq.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC, TYT).

Gomphrena elegans Mart. var. **mesopotamica** Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI).

Gomphrena elegans Mart. var.

orientalis Pedersen

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS). URY(ART, SAO).

Gomphrena ferruginea Pedersen var. **adusta** Pedersen

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.

Países: ARG(JUJ).

Gomphrena ferruginea Pedersen var. **ferruginea**

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gomphrena ferruginea Pedersen var. **rustica** Pedersen

Sin.: *Gomphrena decumbens* Jacq. f. *ovata* Stuchlik, nom. nud.

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gomphrena globosa L.

Sin.: *Xeraea globosa* (L.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAN, CEN).

Gomphrena graminea Moq.

Sin.: *Xeraea graminea* (Moq.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, COA, ITA, MIE, PAI). URY(RIV).

Gomphrena guaranitica Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, PAI).

Gomphrena haenkeana Mart.

Sin.: *Gomphrena ligulata* Griseb.,

Gomphrena pulchella Mart. var. *haenkeana* (Mart.) Suess., *Gomphrena pulchella* Mart. var. *ligulata* (Griseb.) Suess., *Gomphrena pulchella* Mart. f. *linearifolia* Stuchlik, *Gomphrena pulchella* Mart. f. *nana* Suess., *Gomphrena pulchella* Mart. f. *simplex* Stuchlik, nom. superfl., *Xeraea haenkeana* (Mart.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SLU, TUC). PRY(APY).

Gomphrena holosericea (Mart.) Moq.

Sin.: *Hebanthe holosericea* Mart.,

Xeraea holosericea (Mart.) Kuntze

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Gomphrena macrocephala A. St.-Hil.

Sin.: *Gomphrena arborescens* L. f.

f. *intermedia* Stuchlik, *Gomphrena macrocephala* A. St.-Hil. var. *pulcherrima*

Chodat, *Gomphrena pulcherrima*

(Chodat) Chodat & Hassl., *Xeraea macrocephala* (A. St.-Hil.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, SPE).

Gomphrena mandonii R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 2600-3600 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Gomphrena martiana Gillies ex Moq. f. **austrina** Pedersen

Sin.: *Iresine chenopodioides* Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, MEN, SDE, SLU, TUC). PRY(APY).

Gomphrena martiana Gillies ex Moq. var. **glutinosa** (R.E. Fr.) Pedersen

Sin.: *Gomphrena glutinosa* R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Gomphrena martiana Gillies ex Moq. var. **martiana**

Sin.: *Gomphrena argentina* Seub.,

Gomphrena martiana Gillies ex Moq. var. *microcephala* Suess., *Guilleminea martiana* (Gillies ex Moq.) Hook. f.,

Iresine heliotropifolia (Griseb.) Hicken,

Philoxerus heliotropifolius Griseb.,

Xeraea argentina (Seub.) Kuntze, *Xeraea martiana* (Gillies ex Moq.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). PRY(APY).

Gomphrena mendocina (Phil.) R.E.
Fr. subsp. **australis** Pedersen
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(NEU).

Gomphrena mendocina (Phil.) R.E.
Fr. subsp. **mendocina**

Sin.: *Chnoanthus mendocinus* Phil.,
Chnoanthus ovatus Phil., *Gomphrena*
ovata (Phil.) R.E. Fr., *Gomphrena*
tomentosa (Griseb.) R.E. Fr. var. *cana*
Suess., *Iresine tomentosa* (Griseb.)
Chodat & Wilczek
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, RNE, SJU).

Gomphrena meyeniana Walp. var.
caulescens E. Holz.
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUU).

Gomphrena meyeniana Walp. var.
conwayi (Rusby) Suess.
Sin.: *Gomphrena conwayi* Rusby
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gomphrena meyeniana Walp. var.
flaccida Pedersen
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Gomphrena meyeniana Walp. var.
meyeniana
Sin.: *Gomphrena acaulis* J. Remy,
Gomphrena meyeniana Walp. var. *acaulis*
(J. Rémy) Suess., *Gomphrena meyeniana*
Walp. var. *albiflora* Stuchlik, *Gomphrena*
meyeniana Walp. var. *aureiflora* Stuchlik,
Gomphrena meyeniana Walp. var. *citrina*
Suess., *Gomphrena meyeniana* Walp.
var. *genuina* Stuchlik, *Xeraea acaulis* (J.
Remy) Kuntze
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Gomphrena meyeniana Walp. var.
tucumanensis Pedersen
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Gomphrena meyeniana Walp. f.
levitepala Pedersen
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Gomphrena pallida (Suess.) Pedersen
f. **calva** Pedersen
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Gomphrena pallida (Suess.) Pedersen
var. **diffusa** Pedersen
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUU).

Gomphrena pallida (Suess.) Pedersen
subsp. **munda** Pedersen
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUU).

Gomphrena pallida (Suess.) Pedersen
subsp. **pallida**
Sin.: *Gomphrena decumbens* Jacq.
var. *boliviana* Stuchlik, *Gomphrena*
oligocephala J. Remy var. *pallida* Suess.
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Gomphrena paraguayensis Chodat
subsp. **chacoensis** Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Gomphrena paraguayensis Chodat
subsp. **paraguayensis**
Sin.: *Gomphrena elegans* Mart. var.
gracilior Chodat & Hassl., *Gomphrena*
elegans Mart. var. *microcephala* (Suess.)
E. Holz., *Gomphrena elegans* Mart. f.
microcephala Suess., *Gomphrena elegans*
Mart. var. *paraguayensis* (Chodat) E.
Holz.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU,
CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI,
PHA, SPE).

Gomphrena paranensis R.E. Fr.
subsp. **paraguariensis** Pedersen
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(AMA, CEN, MIE, PAI).

Gomphrena paranensis R.E. Fr.
subsp. **paranensis**
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Gomphrena perennis L.
Sin.: *Gomphrena perennis* L. subsp.
genuina Stuchlik, nom. inval.,
Gomphrena perennis L. f. *grandifolia*
Stuchlik, *Gomphrena perennis* L.
f. *parvifolia* Stuchlik, *Gomphrena*
perennis L. var. *silenooides* (Chodat)
E. Holz., *Gomphrena perennis* L.
var. *suffruticosa* (Griseb.) R.E. Fr.,
Gomphrena perennis L. var. *valdecristata*
Suess., *Gomphrena perennis* L. f. *villosa*
(Mart.) Stuchlik, *Gomphrena silenooides*
Chodat, *Gomphrena suffruticosa* Griseb.,

Gomphrena villosa Mart., *Xeraea perennis*
(L.) Kuntze, *Xeraea villosa* (Mart.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CON,
ÑEE, PAI, PHA). URY(ROC).

Gomphrena phaeotricha Pedersen
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gomphrena platycephala R.E. Fr.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ,
SAL, SDE, TUC).

Gomphrena pohlii Moq. var. **hasslerii**
(Chodat) Pedersen
Sin.: *Gomphrena hasslerii* Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN, CON,
GUA, SPE).

Gomphrena pohlii Moq. var. **pohlii**
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Gomphrena pulchella Mart. subsp.
albisericea (E. Holz.) Pedersen
Sin.: *Gomphrena pulchella* Mart. var.
albisericea E. Holz.
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-2900 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI,
MEN, SDE, SJU, SLU). PRY(APY, PHA).

Gomphrena pulchella Mart. subsp.
pulchella
Sin.: *Gomphrena pulchella* Mart. f.
grandifolia Stuchlik, *Gomphrena pulchella*
Mart. f. *linearifolia* Stuchlik, *Gomphrena*
pulchella Mart. var. *ecristata* Chodat,
Xeraea pulchella (Mart.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI,
FOR, LPA, SAL, SDE, SFE, SLU). BRA(RGS).
PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, COA,
MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, MON,
PAY, RNO, RIV, SAO, SOR).

Gomphrena pulchella Mart. subsp.
rosea (Griseb.) Pedersen
Sin.: *Gomphrena perennis* L. var. *rosea*
(Griseb.) Stuchlik, *Gomphrena rosea* Griseb.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Gomphrena pulchella Mart. var. **bonariensis** Pedersen

Hierba. Endémica.
Países: ARG(COR, SLU).

Gomphrena pumila Gillies ex Moq.

Sin.: *Gomphrena paramillensis* Suess.,
Gomphrena pygmaea Suess., *Xeraea pumila* (Gillies ex Moq.) Kuntze
Hierba. Endémica.
Países: ARG(MEN, RNE, SJU).

Gomphrena radiata Pedersen

Hierba. Endémica. 2600-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gomphrena regeliana Seub.

Sin.: *Gomphrena pulchella* Mart. f.
grandifolia Stuchlik, *Gomphrena regeliana*
Seub. f. *albiflora* R.E. Fr., *Gomphrena regeliana*
Seub. f. *grandiflora* Chodat, *Xeraea regeliana* (Seub.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).

Gomphrena riparia Pedersen

Hierba o subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Gomphrena schlechtendaliana Mart.

Sin.: *Xeraea schlechtendaliana* (Mart.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Gomphrena sellowiana Mart.

Sin.: *Gomphrena schinziana* Stuchlik,
Gomphrena selloi Mart., *Xeraea sellowiana* (Mart.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Gomphrena tomentosa (Griseb.) R.E.

Fr. var. **monticola** Pedersen
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Gomphrena tomentosa (Griseb.) R.E.

Fr. var. **ruiz-lealii** Subils & Hunz.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(COR, LPA, MEN, SJU, SLU).

Gomphrena tomentosa (Griseb.) R.E.

Fr. var. **tomentosa**
Sin.: *Gomphrena demissa* Mart. var.
incana Moq., *Gossypianthus tomentosus*
Griseb., *Guilleminea tomentosa* (Griseb.)
Hosseus
Hierba. Endémica. 400-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,

MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).
PRY(APY).

Gomphrena triceps Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(TAC).

Gomphrena umbellata J. Remy

Sin.: *Gomphrena pearcei* Oliv., *Xeraea pearcei* (Oliv.) Kuntze, *Xeraea umbellata* (J. Remy) Kuntze
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(TAR).

Gomphrena uruguayensis Suess.

Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: URY(SAO).

Gomphrena vaga Mart.

Sin.: *Gomphrena gnaphiotricha* Griseb.,
Xeraea vaga (Mart.) Kuntze
Subarbusto. Nativa.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).

Gomphrena virgata Mart.

Sin.: *Xeraea virgata* (Mart.) Kuntze
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Gomphrena vitellina Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Guilleminea Kunth**Guilleminea chacoensis** Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

Guilleminea densa (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq.

Sin.: *Brayulinea australis* (Griseb.) Schinz,
Brayulinea densa (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Small, *Gossypianthus australis* Griseb., *Guilleminea australis* (Griseb.) Hook. f., *Guilleminea densa* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq. var. *alsinaefolia* Moq., *Guilleminea illecebrum* Spreng., *Guilleminea illecebroides* Kunth, *Illecebrum densum* Willd. ex Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, DFE, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC).
PRY(APY).

Guilleminea elongata Mears

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(DUR, SAO, TAC).

Guilleminea fragilis Pedersen

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Guilleminea gracilis R.E. Fr.

Sin.: *Brayulinea gracilis* (R.E. Fr.) Schinz, *Guilleminea densa* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq. var. *gracilis* (R.E. Fr.) Mears
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Guilleminea hirsuta Pedersen

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL). PRY(APY).

Hebanthe Mart.**Hebanthe eriantha** (Poir.) Pedersen

Sin.: *Gomphrena erianthos* (Poir.) Moq., *Gomphrena paniculata* (Mart.) Moq., *Hebanthe paniculata* Mart., *Iresine erianthos* Poir., *Iresine paniculata* (Mart.) Spreng., hom. illeg., *Pfaffia laurifolia* Chodat, *Pfaffia paniculata* (Mart.) Kuntze, *Pfaffia paraguayensis* Chodat var. *laurifolia* Chodat, nom. nud., *Pfaffia paraguayensis* Chodat, *Pfaffia reticulata* (Seub.) Kuntze var. *strigulosa* Suess.
Liana. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, GUA, ITA, SPE).

Hebanthe occidentalis (R.E. Fr.)

Borsch & Pedersen var. **bangii** (R.E. Fr.) Borsch & Pedersen
Sin.: *Pfaffia bangii* R.E. Fr.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(SPE).

Hebanthe occidentalis (R.E. Fr.)

Borsch & Pedersen var. **occidentalis**
Sin.: *Pfaffia brachiata* Chodat, *Pfaffia brachiata* Chodat var. *grandiflora* O. Stützer, *Pfaffia occidentalis* R.E. Fr., *Pfaffia occidentalis* R.E. Fr. var. *densiflora* R.E. Fr.
Liana. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL, TUC).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(AMA, CAU, CON, SPE).

Hebanthe pulverulenta Mart.

Sin.: *Gomphrena pulverulenta* (Mart.) Moq. var. *rufescens* Moq., *Pfaffia pulverulenta* (Mart.) Kuntze, *Pfaffia pulverulenta* (Mart.) Kuntze var. *macrodonata* O. Stützer, *Pfaffia*

pulverulenta (Mart.) Kuntze var.
rufescens (Moq.) O. Stützer
Liana. Nativa. 200-3000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hebanthe spicata Mart.
Arbusto. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(RGS, PAR).

Herbstia Sohmer

Herbstia brasiliana (Moq.) Sohmer
Sin.: *Banalia brasiliana* Moq.,
Chamissoa brasiliana (Moq.) R.E. Fr.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA).

Iresine P. Browne

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex
Willd. var. **diffusa**
Sin.: *Celosia paniculata* L., *Iresine*
celosia L., nom. illeg., *Iresine celosia* L.
var. *diffusa* (Humb. & Bonpl.) Suess.,
Iresine celosoides L., nom. illeg., *Iresine*
celosoides L. var. *polymorpha* (Mart.)
Griseb., *Iresine paniculata* (L.) Kuntze,
hom. illeg., *Iresine polymorpha* Mart.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS,
SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,
AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA,
SPE). URY(CAS, COL, LAV, MAL).

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex
Willd. var. **macrophylla** (Griseb.)
Pedersen
Sin.: *Iresine celosoides* L. var.
macrophylla Griseb., *Iresine celosia* L. var.
nicotianoides Suess.
Subarbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Pedersenian Holub

Pedersenian hassleriana (Chodat)
Pedersen
Sin.: *Iresine hassleriana* Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, COA).

Pedersenian macrophylla (R.E. Fr.)
Pedersen

Sin.: *Iresine guaranitica* Chodat, *Iresine*
hassleriana Chodat var. *macrophylla*
(R.E. Fr.) Suess., *Iresine macrophylla* R.E.
Fr., *Trommsdorffia macrophylla* (R.E. Fr.)
Pedersen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, PHA).

Pfaffia Mart.

Pfaffia denudata (Moq.) Kuntze
Sin.: *Gomphrena denudata* Moq.
Hierba o arbusto. Nativa. 1000-1400 m.
Países: BRA(PAR).

Pfaffia fruticulosa Suess. var. **diffusa**
Pedersen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON, SPE).

Pfaffia fruticulosa Suess. var.
fruticulosa
Subarbusto. Endémica.
Países: PRY(APY).

Pfaffia glabrata Mart.
Sin.: *Gomphrena glabrata* (Mart.)
Moq., *Gomphrena glabrata* (Mart.)
Moq. var. *angustifolia* Seub., *Gomphrena*
glabrata (Mart.) Moq. var. *latifolia* Seub.,
Pfaffia glabrata Mart. var. *angustifolia*
(Seub.) O. Stützer, *Pfaffia glabrata* Mart.
var. *latifolia* (Seub.) O. Stützer
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR,
SCA). PRY(AMA, CEN).

Pfaffia gleasonii Suess.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, GUA, PAI).

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen
Sin.: *Alternanthera glauca* (Mart.)
Hosseus, *Gomphrena dunaliana* Moq.,
Gomphrena glauca (Mart.) Moq.,
Gomphrena luzulaeflora (Mart.) Moq.,
Gomphrena stenophylla Spreng., *Iresine*
glomerata Spreng., *Iresine luzuliflora*
(Mart.) Griseb., *Mogiphanes dunaliana*
(Moq.) Griseb., *Mogiphanes glauca*
(Mart.) Griseb., *Pfaffia divergens* O.
Stützer, *Pfaffia dunaliana* (Moq.) Schinz,
Pfaffia glabrescens Suess., *Pfaffia glauca*
(Mart.) Spreng., *Pfaffia iresinoides*
(Kunth) Spreng. var. *angustifolia* O.
Stützer, *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D.
Dietr. f. *gracilis* O. Stützer, *Pfaffia*
luzuliflora (Mart.) D. Dietr. f. *virgata*
O. Stützer, *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D.

Dietr. subsp. *squarrosa* O. Stützer, *Pfaffia*
luzuliflora (Mart.) D. Dietr. var. *elliptica*
O. Stützer, *Pfaffia luzuliflora* (Mart.)
D. Dietr. var. *microcephala* O. Stützer
ex Suess., *Pfaffia luzuliflora* (Mart.) D.
Dietr. var. *paniculata* O. Stützer, *Pfaffia*
luzuliflora (Mart.) D. Dietr., *Pfaffia*
stenophylla (Spreng.) Stuchlik, *Pfaffia*
stenophylla (Spreng.) Stuchlik var.
albiramea Chodat, nom. nud., *Pfaffia*
stenophylla (Spreng.) Stuchlik var.
basiliginosa Chodat, *Sertuenera glauca*
Mart., *Sertuenera luzulaeflora* Mart.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,
BOQ, CAA, CAN, CEN, CON, COA,
GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(SJO).

Pfaffia gnaphaloides (L. f.) Mart.
Sin.: *Celosia gnaphaloides* L. f.,
Gomphrena gnaphaloides (L. f.) Vahl
ex Roem. & Schult. var. *floccosa* Seub.,
Gomphrena gnaphaloides (L. f.) Vahl ex
Roem. & Schult. var. *planifolia* Seub.,
Gomphrena gnaphaloides (L. f.) Vahl ex
Roem. & Schult., *Gomphrena lanata*
Poir. var. *latifolia* Seub., *Gomphrena*
lanata Poir. var. *oblongifolia* Moq.,
Gomphrena lanata Poir. var. *parvifolia*
Moq., *Gomphrena lanata* Poir.,
Gomphrena perennis L. var. *brunnea*
Stuchlik, *Gomphrena phagnaloides*
Griseb., *Gomphrena poiretiana* Roem. &
Schult., *Oplotheca poiretiana* (Schult.)
Mart., *Pfaffia gnaphaloides* (L. f.) Mart.
f. *subferruginea* O. Stützer, *Pfaffia*
gnaphaloides (L. f.) Mart. var. *floccosa*
(Seub.) O. Stützer, *Pfaffia gnaphaloides*
(L. f.) Mart. var. *planifolia* (Seub.) O.
Stützer, *Pfaffia lanata* (Poir.) Gibert
f. *parvifolia* (Moq.) O. Stützer, *Pfaffia*
lanata (Poir.) Gibert var. *discolor* Suess.,
Pfaffia lanata (Poir.) Gibert var. *latifolia*
(Seub.) O. Stützer, *Pfaffia lanata* (Poir.)
Gibert var. *oblongifolia* (Moq.) O.
Stützer, *Pfaffia lanata* (Poir.) Gibert
var. *peteriana* Kuntze, *Pfaffia lanata*
(Poir.) Gibert, *Pfaffia poiretiana* (Schult.)
Stuchlik, *Pfaffia tenuis* N.E. Br., *Pfaffia*
tomentosa Mart., *Xeraea phagnaloides*
(Griseb.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU,
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAU, ÑEE). URY(ART, LAV,
MAL, MON, SJO, TAC).

Pfaffia helichrysoides (Mart.) Kuntze
Sin.: *Gomphrena helichrysoides* Mart.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAU, GUA).

Pfaffia jubata Mart.
Sin.: *Gomphrena jubata* (Mart.) Moq.
Hierba. Nativa. 500-1700 m.
Países: BRA(PAR).

Pfaffia ninae Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(ART).

Pfaffia nudicaulis Suess.
Hierba. Endémica. 400-700 m.
Países: PRY(AMA).

Pfaffia tuberosa (Spreng.) Hicken f.
rubella Pedersen
Hierba. Endémica.
Países: ARG(COS, ERI). URY(ART, SAO).

Pfaffia tuberosa (Spreng.) Hicken f.
tuberosa
Sin.: *Gomphrena sericea* Spreng.,
Gomphrena tuberosa Spreng., *Gomphrena tuberosa* Spreng. var. *glabrescens* (Mart.) Moq., *Gomphrena tuberosa* Spreng. var. *sericea* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Seub., *Gomphrena tuberosa* Spreng. var. *vestita* (Mart.) Moq., *Pfaffia sericea* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Mart., *Pfaffia sericea* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Mart. f. *glabrescens* (Mart.) O. Stützer, *Pfaffia sericea* Mart. var. *paraguariensis* Chodat, *Pfaffia sericea* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Mart. f. *vestita* (Mart.) O. Stützer
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MAL, TAC).

Pseudoplantago Suess.

Pseudoplantago friesii Suess.
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Quaternella Pedersen

Quaternella glabratooides (Suess.) Pedersen
Sin.: *Gomphrena glabratooides* (Suess.) J.C. Siqueira, *Pfaffia glabratooides* Suess.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). CHL(VAL, MAU, JFE). PRY(APY).

AMARYLLIDACEAE

Agapanthus L'Hér., nom. cons.

Agapanthus umbellatus L'Hér.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(BAI).

Allium L.

Allium ampeloprasum L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, CAT, ERI, LRI).

Allium cepa L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, SAL).

Allium commutatum Guss.
Sin.: *Allium ampeloprasum* L. var. *commutatum* (Guss.) Fiori
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, CAT).

Allium porrum L.
Sin.: *Allium ampeloprasum* L. var. *porrum* (L.) Gay
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Allium schoenoprasum L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Allium triquetrum L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Allium vineale L. var. **compactum** (Thuill.) Coss. & Germ.
Sin.: *Allium compactum* Thuill.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). CHL(ARA).

Allium vineale L. var. **vineale**
Hierba. Introducida.
Países: CHL(ARA).

Amaryllis L.

Amaryllis belladonna L.
Sin.: *Amaryllis paranaensis* Traub, *Hippeastrum paranaense* (Traub) Meerow

Beauverdia Herter

Beauverdia dialystemon (Guagl.) Sassone & Guagl.
Sin.: *Ipheion dialystemon* Guagl., *Nothoscordum bonariense* (Pers.) Beauverd var. *flavum* Kuntze, *Nothoscordum dialystemon* (Guagl.) Crosa
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(FLA, MON).

Beauverdia hirtella (Kunth) Herter subsp. **hirtella**
Sin.: *Beauverdia subsessilis* (Beauverd) Herter, *Brodiaea hirtella* (Kunth) Baker, *Ipheion hirtellum* (Kunth) Traub, *Ipheion subsessile* (Beauverd) Traub, *Milla hirtella* (Kunth) Baker, *Nothoscordum canescens* Beauverd, *Nothoscordum hirtellum* (Kunth) Herter, *Nothoscordum subsessile* Beauverd, *Tristagma hirtellum* (Kunth) Traub, *Triteleia hirtella* Kunth
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(LAV, MAL, MON, RIV, ROC).

Beauverdia hirtella (Kunth) Herter subsp. **lorentzii** (Herter) Sassone & Guagl.
Sin.: *Beauverdia lorentzii* Herter, *Ipheion lorentzii* (Herter) Traub, *Nothoscordum felipponei* Beauverd subsp. *lorentzii* (Herter) Ravenna, *Nothoscordum hirtellum* (Kunth) Herter subsp. *lorentzii* (Herter) Ravenna, *Nothoscordum lorentzii* (Herter) Ravenna, *Tristagma lorentzii* (Herter) Traub
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Beauverdia sellowiana (Kunth) Herter
Sin.: *Beauverdia felipponei* (Beauverd) Herter, *Brodiaea felipponei* (Beauverd) Herter, *Brodiaea sellowiana* (Kunth) Baker, *Ipheion felipponei* (Beauverd) Traub, *Ipheion sellowianum* (Kunth) Traub, *Milla sellowiana* (Kunth) Baker, *Nothoscordum felipponei* Beauverd, *Tristagma felipponei* (Beauverd) Traub, *Tristagma sellowianum* (Kunth) Traub, *Triteleia sellowiana* Kunth
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(FLA, LAV, MAL, MON, SJO, SJO).

Beauverdia vittata (Griseb.) Herter
Sin.: *Beauverdia lloydiflora* (Beauverd) Herter, *Brodiaea vittata* (Griseb.) Baker,

Ipeion lloydiflorum (Beauverd) Traub,
Ipeion vittatum (Griseb.) Traub, *Milla violacea* (Kunth) Baker, *Milla vittata* Griseb., *Nothoscordum lloydiflorum* Beauverd, *Nothoscordum uniflorum* Baker, *Nothoscordum vittatum* (Griseb.) Ravenna, *Tristagma lloydiflorum* (Beauverd) Traub, *Tristagma vittatum* (Griseb.) Traub
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, MON, RNO, TAC).

Brunsvigia Heist.

Brunsvigia rosea (Lam.) Hannibal
Sin.: *Amaryllis rosea* Lam.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Chlidanthus Herb.

Chlidanthus marginatus (R.E. Fr.) Ravenna
Sin.: *Amaryllis marginata* (R.E. Fr.) Traub & Uphof, *Castellanoa marginata* (R.E. Fr.) Traub, *Hippeastrum marginatum* R.E. Fr., *Sanmartina marginata* (R.E. Fr.) Traub
Hierba. Endémica. 3600 m
Países: ARG(JUJ).

Chlidanthus yaviensis (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Castellanoa yaviensis* Ravenna
Hierba. Endémica. 3300 m
Países: ARG(JUJ).

Clinanthus Herb.

Clinanthus humilis (Herb.) Meerow
Sin.: *Clitanthes humilis* Herb., *Crocopsis fulgens* Pax, *Stenomesson acaule* Kraenzl., *Stenomesson humile* (Herb.) Baker, *Zephyranthes pseudocolchicum* Kraenzl.
Hierba. Nativa. 3000-4200 m.
Países: ARG(JUJ, TUC). CHL(TAR).

Crinum L.

Crinum americanum L.
Sin.: *Crinum erubescens* Aiton, *Crinum salsum* Ravenna
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PAI).

Eithea Ravenna

Eithea blumenavia (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Ravenna
Sin.: *Amaryllis blumenavia* (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Traub & Uphof, *Amaryllis iguapensis* (R. Wagner) Traub & Uphof, *Griffinia blumenavia* K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière, *Hippeastrum blumenavia* (K. Koch & C.D. Bouché ex Carrière) Sealy, *Hippeastrum iguapense* R. Wagner
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Famatina Ravenna

Famatina cisandina Ravenna
Hierba. Endémica. 1800-2200 m.
Países: CHL(MAU, RME).

Famatina maulensis Ravenna
Sin.: *Miltinea maulensis* (Ravenna) Ravenna
Hierba. Endémica. 1500 m
Países: CHL(MAU).

Gethyum Phil.

Gethyum atropurpureum Phil.
Sin.: *Solaria atropurpurea* (Phil.) Ravenna, *Solaria major* Reiche
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Gethyum cuspidatum (Harv. ex Baker) M. Muñoz
Sin.: *Ancrumia cuspidata* Harv. ex Baker, *Solaria cuspidata* (Harv. ex Baker) Ravenna
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Gilliesia Lindl.

Gilliesia dimera Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Gilliesia graminea Lindl.
Sin.: *Gilliesia curicana* Ravenna, *Gilliesia gaudichaudiana* Kunth
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Gilliesia isopetala Ravenna
Hierba. Endémica. 1000-1700 m.
Países: CHL(LBO).

Gilliesia montana Poepp. & Endl.
Sin.: *Gilliesia monophylla* Reiche, *Gilliesia nahuelbutae* Ravenna, *Miersia scalae* Gunckel
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Habranthus Herb.

Habranthus amambaicus Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Habranthus andalgalensis Ravenna
Sin.: *Habranthus guachipensis* Ravenna, *Habranthus ischihualastus* Ravenna
Hierba. Endémica. 500-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, SJU).

Habranthus auratus Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(PHA).

Habranthus brachyandrus (Baker) Sealy
Sin.: *Hippeastrum brachyandrum* Baker, *Zephyranthes porphyrospila* E. Holmb.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).

Habranthus caaguazuensis Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CON).

Habranthus caeruleus (Griseb.) Traub
Sin.: *Amaryllis caerulea* Griseb., *Zephyranthes caerulea* (Griseb.) Baker
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MAL, RNO, ROC, SAO, SOR).

Habranthus calderensis Ravenna
Hierba. Endémica. 1200-1400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Habranthus chacoensis Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA). PRY(PHA).

Habranthus concinnus Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Habranthus correntinus Roitman, A. Castillo & M.R. Barrios
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS).

Habranthus gracilifolius Herb.

Sin.: *Amaryllis gracilis* Spreng., *Hippeastrum gracilifolium* (Herb.) Baker, *Zephyranthes gracilifolia* (Herb.) G. Nicholson var. *bijou* E. Holmb., *Zephyranthes gracilifolia* (Herb.) G. Nicholson var. *bulula* E. Holmb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, SFE).
BRA(RGS). URY(MAL, RIV).

Habranthus jamesonii (Baker)

Ravenna
Sin.: *Amaryllis jamesonii* (Baker) Traub & Uphof, *Habranthus melanopotamicus* (Speg.) Fabris, *Hippeastrum jamesonii* Baker, *Rhodophiala jamesonii* (Baker) Traub & Uphof, *Zephyranthes melanopotamica* Speg.
Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU).

Habranthus leonensis Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Habranthus martinezii Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SAL).

Habranthus matacus Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR).

Habranthus mendocensis (Baker) Sealy

Sin.: *Habranthus reedii* Traub, nom. illeg., *Zephyranthes mendocensis* Baker
Hierba. Endémica.
Países: ARG(MEN).

Habranthus neumannii Roitman A.

Castillo & Maza
Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: ARG(JUJ).

Habranthus pedunculatus Herb.

Sin.: *Habranthus concordiae* Ravenna, *Habranthus holmbergii* (Hieron.) Traub, *Habranthus juncifolius* Traub & W. Hayw., *Habranthus paxii* Traub, *Habranthus teretifolius* (C.H. Wright) Traub & Moldenke, *Hippeastrum holmbergii* Hicken, *Hippeastrum pedunculatum* (Herb.) E. Holmb., *Hippeastrum teretifolium* C.H. Wright, *Hippeastrum tubispathum* Pax, hom. illeg., *Hippeastrum tubispathum* Pax var. *grandiflorum* Hicken, *Habranthus unifolius* (Arechav.) Traub, *Zephyranthes*

unifolia Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(GUA, MIE). URY(ART, MON, RIV).

Habranthus philadelphicus Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Habranthus pictus Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: ARG(CAT).

Habranthus riojanus Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: ARG(LRI).

Habranthus robustus Herb. ex Sweet

Sin.: *Amaryllis berterii* Spreng., *Habranthus cardenasianus* Traub & I.S. Nelson, *Habranthus cordobensis* Ravenna, *Habranthus crassibulbus* Ravenna, *Habranthus maasii* Ravenna, *Habranthus magnoi* Ravenna, *Habranthus niveus* Ravenna, *Habranthus oltanus* Ravenna, *Habranthus oranensis* Ravenna, *Habranthus quilmesianus* Ravenna, *Habranthus spectabilis* Ravenna, *Habranthus steyermarkii* Ravenna, *Zephyranthes mesochloa* Herb. ex Lindl. f. *rosea* Kuntze, *Zephyranthes robusta* (Herb. ex Sweet) Baker, *Zephyranthes tauberti* Harms
Hierba. Nativa. 600-1300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Habranthus ruber Ravenna

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).

Habranthus ruizlealii Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: ARG(LRI).

Habranthus salinarum Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Habranthus sanavirone Roitman, A.

Castillo, G. Tourn & Uria
Hierba. Endémica. 700-900 m.
Países: ARG(COR).

Habranthus schulzianus Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SFE).

Habranthus tubispathus (L'Hér.) Traub

Sin.: *Amaryllis andersonii* (Herb. ex Lindl.) Griseb., *Amaryllis tubispatha*

(L'Hér.), *Habranthus andersonii* Herb. ex Lindl., *Habranthus andersonii* Herb. ex Lindl. var. *texanus* Herb., *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub f. *bicolor* (Ravenna) Traub, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub subsp. *macranthus* Ravenna, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub f. *roseus* (Ravenna) Traub, *Habranthus tubispathus* (L'Hér.) Traub subsp. *variabilis* Ravenna, *Habranthus variabilis* (Ravenna) Ravenna, *Habranthus variabilis* (Ravenna) Ravenna var. *bicolor* Ravenna, *Habranthus variabilis* (Ravenna) Ravenna var. *roseus* Ravenna, *Hippeastrum tubispathum* (L'Hér.) Baker, *Zephyranthes andersonii* (Herb. ex Lindl.) Baker, *Zephyranthes commersoniana* Herb.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). CHL(BIO). PRY(COA, PHA). URY(CAS, CLA, LAV, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).

Habranthus venturianus Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SDE).

Habranthus versicolor Herb.

Sin.: *Amaryllis versicolor* (Herb.) Spreng., *Habranthus barrosianus* Hunz. & Di Fulvio, *Habranthus longipes* (Baker) Sealy, *Hippeastrum versicolor* (Herb.) Baker, *Zephyranthes longipes* Baker, *Zephyranthes pluricolor* Herter, nom. illeg., *Zephyranthes versicolor* (Herb.) Baker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). PRY(APY). URY(LAV, MAL, MON, SAO, SOR, TYT).

Hieronymiella Pax**Hieronymiella aurea** Ravenna

Sin.: *Hieronymiella tintinensis* Hunz.
Hierba. Endémica. 2000-3200 m.
Países: ARG(SAL).

Hieronymiella cachiensis Ravenna

Hierba. Endémica. 3000 m.
Países: ARG(SAL).

Hieronymiella caletensis Ravenna

Hierba. Endémica. 2000-2800 m.
Países: ARG(JUJ).

Hieronymiella clidanthoides Pax

Hierba. Endémica. 500-2200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Hieronymiella marginata (Pax) Hunz.

Sin.: *Androstephanos tarijensis* Fern.
Casas & R. Lara, *Eustephia argentina*
Pax, *Eustephia latifolia* (R.E. Fr.) Traub,
Eustephia marginata Pax, *Eustephia*
pamiana Stapf, *Eustephiopsis latifolia* R.E.
Fr., *Eustephiopsis marginata* (Pax) R.E.
Fr. subsp. *latifolia* (R.E. Fr.) Ravenna,
Eustephiopsis marginata (Pax) R.E. Fr.,
Hieronymiella angacoana Ravenna,
Hieronymiella argentina (Pax) Hunz. & S.C.
Arroyo, *Hieronymiella ferruginea* Ravenna,
Hieronymiella latifolia (R.E. Fr.) Di Fulvio
& Hunz., *Hieronymiella marginata* (Pax)
Hunz. var. *latifolia* (R.E. Fr.) Hunz.,
Hieronymiella pamiana (Stapf) Hunz.,
Hieronymiella tarijensis (Fern. Casas & R.
Lara) Fern. Casas
Hierba. Nativa. 1500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Hieronymiella speciosa (R.E. Fr.) Hunz.

Sin.: *Eustephia speciosa* (R.E. Fr.)
Traub, *Eustephiopsis speciosa* R.E. Fr.,
Hieronymiella vittata Ravenna
Hierba. Endémica. 2600-3900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Hippeastrum Herb., nom. cons.**Hippeastrum aglaiae** (A. Cast.) Hunz.
& Cocucci

Sin.: *Amaryllis aglaiae* A. Cast.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hippeastrum angustifolium Pax

Sin.: *Amaryllis angustifolia* (Pax) Traub
& Uphof, *Amaryllis canterai* (Arechav.)
Traub & Uphof, *Hippeastrum canterai*
Arechav., *Sprekelia spectabilis* Hoehne
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(PAI). URY(RIV, TAC).

Hippeastrum argentinum (Pax) Hunz.

Sin.: *Amaryllis argentina* (Pax)
Ravenna, *Amaryllis candida* (Stapf)
Traub & Uphof, nom. illeg., *Amaryllis*
immaculata Traub & Moldenke,
Amaryllis tucumana (E. Holmb.)
Traub & Uphof, *Crinum argentinum*
Pax, *Hippeastrum candidum* Stapf,
Hippeastrum tucumanum E. Holmb.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, TUC).

Hippeastrum aulicum (Ker Gawl.) Herb.

Sin.: *Amaryllis aulica* Ker Gawl.,
Amaryllis aulica Ker Gawl. var.

platypetala Lindl., *Amaryllis heuseriana*
(H. Karst.) Ravenna, *Aulica platypetala*
(Lindl.) Raf., *Hippeastrum heuserianum*
H. Karst.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hippeastrum blossfeldiae (Traub &
L.J. Doran) Van Scheepen

Sin.: *Amaryllis blossfeldiae* Traub &
L.J. Doran
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hippeastrum breviflorum Herb.

Sin.: *Amaryllis breviflora* (Herb.) Traub
& Uphof
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Hippeastrum calyptratum (Ker
Gawl.) Herb.

Sin.: *Amaryllis calyptrata* Ker Gawl.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Hippeastrum cybister (Herb.) Benth.
ex Baker

Sin.: *Lepidopharynx deflexa* Rusby,
Sprekelia cybister Herb.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Hippeastrum glaucescens (Mart.) Herb.

Sin.: *Amaryllis aviflora* Ravenna,
Amaryllis curitibana Ravenna, *Amaryllis*
glaucescens Mart., *Amaryllis hemographes*
Ravenna, *Amaryllis iguazuana*
Ravenna, *Amaryllis illustris* Vell.M
Amaryllis rubropicta Ravenna, *Amaryllis*
teyucuarensis Ravenna, *Hippeastrum*
aviflorum (Ravenna) Dutilh,
Hippeastrum curitibanum (Ravenna)
Dutilh, *Hippeastrum hemographes*
(Ravenna) Dutilh, *Hippeastrum*
iguazuuanum (Ravenna) J. Castillo,
comb. illeg., *Hippeastrum iguazuuanum*
(Ravenna) T.R. Dudley & M. Williams,
Hippeastrum illustre (Vell.) Dutilh,
Hippeastrum rubropictum (Ravenna)
Meerow, *Hippeastrum teyucuarensis*
(Ravenna) Scheepen
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hippeastrum marumbiense

(Ravenna) Van Scheepen
Sin.: *Amaryllis marumbiensis* Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Hippeastrum morelianum Lem.

Sin.: *Amaryllis moreliana* (Lem.) Traub
Hierba. Endémica. 900-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Hippeastrum multiflorum H.

Büneker, K. Soares & L.C. Assis
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Hippeastrum papilio (Ravenna) Van
Scheepen

Sin.: *Amaryllis papilio* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Hippeastrum parodii Hunz. & Cocucci

Sin.: *Amaryllis parodii* (Hunz. &
Cocucci) Traub
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ,
SAL, SDE, SLU).

Hippeastrum psittacinum (Ker
Gawl.) Herb.

Sin.: *Amaryllis psittacina* Ker Gawl.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze

Sin.: *Amaryllis punicea* Lam.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hippeastrum ramboi R. Bastian & H.
Büneker

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Hippeastrum reginae (L.) Herb.

Sin.: *Amaryllis reginae* L.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Hippeastrum reticulatum (L'Hér.) Herb.

Sin.: *Amaryllis reticulata* L'Hér.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Hippeastrum santacatarina (Traub)
Dutilh

Sin.: *Amaryllis santacatarina* Traub
Hierba. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hippeastrum striatum (Lam.) H. E.
Moore

Sin.: *Amaryllis arboricola* Ravenna,
Amaryllis argilagae Traub, *Amaryllis*
flammigera (E. Holmb.) Traub &

Uphof, *Amaryllis gertiana* Ravenna, *Amaryllis petiolata* (Pax) Traub & Uphof, *Amaryllis rutila* Ker Gawl., *Amaryllis striata* Lam., *Hippeastrum arboricola* (Ravenna) Meerow, *Hippeastrum arboricolum* (Ravenna) J. Castillo, comb. illeg., *Hippeastrum argilagae* (Traub) Dutilh, *Hippeastrum bulbulosum* Herb. var. *rutilum* (Ker Gawl.) Herb., *Hippeastrum flammigerum* E. Holmb., *Hippeastrum gertianum* (Ravenna) Dutilh, *Hippeastrum petiolatum* Pax, *Hippeastrum rutilum* (Ker Gawl.) Herb.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(COL, MON, RNO, SJO, SOR).

Hippeastrum verdianum H. Büneker & R. Bastian
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb.
Sin.: *Amaryllis guarapuvica* Ravenna, *Amaryllis harrisonii* Lindl., *Amaryllis lineata* Colla, *Amaryllis vittata* L'Hér. subsp. *guarapuavae* Ravenna, *Amaryllis vittata* L'Hér. var. *tweediana* (Herb.) Traub, *Amaryllis vittata* L'Hér., *Hippeastrum ambiguum* Herb. var. *tweedianum* Herb., *Hippeastrum ambiguum* Herb., *Hippeastrum arechavaletae* Baker, *Hippeastrum guarapuavicum* (Ravenna) Van Scheepen, *Hippeastrum harrisonii* (Lindl.) Hook. f.
Hierba. Nativa. 1000 m
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, GUA).

Ipheion Raf.

Ipheion recurvifolium (C.H. Wright) Traub
Sin.: *Brodiaea recurvifolia* C.H. Wright, *Brodiaea sessiliflora* (Baker) Baker, *Tristagma recurvifolium* (C.H. Wright) Traub
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, MON, SJO).

Ipheion setaceum (Baker) Traub
Sin.: *Milla setacea* Baker, *Nothoscordum setaceum* (Baker) Ravenna, *Tristagma setaceum* (Baker) Traub
Hierba. Endémica.
Países: ARG(TUC).

Ipheion tweedeanum (Baker) Traub
Sin.: *Brodiaea tweediana* (Baker)

Hicken, *Brodiaea uniflora* (Lindl.) Engl. var. *tweediana* (Baker) Baker, *Milla tweediana* (Baker) Griseb., *Milla uniflora* (Lindl.) Graham ex Jameson var. *tweediana* Baker, *Tristagma tweediana* (Baker) Traub
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). URY(RNO).

Ipheion uniflorum (Graham) Raf.
Sin.: *Beauverdia uniflora* (Lindl.) Herter, *Brodiaea uniflora* (Lindl.) Engl., *Hookera uniflora* (Lindl.) Kuntze, *Leucocoryne uniflora* (Lindl.) Greene, *Milla bonariensis* Gillies ex Baker, *Milla uniflora* Graham. *Tristagma peregrinans* Ravenna, *Tristagma uniflorum* (Lindl.) Traub, *Triteleia uniflora* Lindl.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, SLU). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO).

Latace Phil.

Latace andina (Poepp.) Sassone f. **andina**
Sin.: *Allium poeppigii* Kunth, *Latace volkmanni* Phil., *Leucocoryne volkmanni* (Phil.) Engl. ex Traub, comb. superfl., *Leucocoryne volkmanni* (Phil.) Engl., *Nothoscordum andinum* (Poepp.) Fuentes, *Nothoscordum brevispathum* Phil., *Nothoscordum poeppigii* Fuentes, *Nothoscordum sellowianum* Kunth var. *brevispathum* (Phil.) Fuentes, *Nothoscordum strictum* Gay, *Ornithogalum andinum* Poepp., *Zoellnerallium andinum* (Poepp.) Crosa
Hierba. Endémica. 1500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, LBO, LLA, RME).

Latace andina (Poepp.) Sassone f. **lutea** (Ravenna) Sassone
Sin.: *Nothoscordum andinum* (Poepp.) Fuentes f. *luteum* Ravenna
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, RME).

Latace serenense (Ravenna) Sassone
Sin.: *Nothoscordum serenense* Ravenna
Hierba. Endémica. 300-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Leucocoryne Lindl.

Leucocoryne alliacea Miers ex Lindl.
Sin.: *Leucocoryne angustipetala* Gay, *Leucocoryne reflexa* Grau

Hierba. Endémica. 900-2200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Leucocoryne angosturae Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).

Leucocoryne appendiculata Phil.
Hierba. Endémica. 400-800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Leucocoryne arrayanensis Ravenna
Hierba. Endémica. 1700-2500 m.
Países: CHL(RME).

Leucocoryne candida Ravenna
Hierba. Endémica. 700-800 m.
Países: CHL(LBO).

Leucocoryne codehuensis Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO).

Leucocoryne conconensis Ravenna
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(VAL).

Leucocoryne conferta Zoellner
Hierba. Endémica. 200-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

Leucocoryne connivens Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Leucocoryne conostyla Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Leucocoryne coquimbensis F. Phil. var. **alba** Zoellner
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Leucocoryne coquimbensis F. Phil. var. **coquimbensis**
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL).

Leucocoryne coronata Ravenna
Sin.: *Chrysocoryne incrassata* (Phil.) Zoellner, *Leucocoryne incrassata* Phil., *Leucocoryne narcissoides* Phil., *Pabellonia incrassata* (Phil.) Quezada & Martic., *Stemmatium narcissoides* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT, ATA).

Leucocoryne curacavina Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).

Leucocoryne dimorphopetala (Gay)

Ravenna
Sin.: *Leucocoryne gayii* Baker,
Tristagma dimorphopetala Gay
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ).

Leucocoryne editiana Ravenna

Hierba. Endémica. 2200 m.
Países: CHL(COQ).

Leucocoryne foetida Phil.

Sin.: *Leucocoryne odorata* Lindl.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL, MAU).

Leucocoryne fragrantissima Ravenna

Hierba. Endémica. 1500 m.
Países: CHL(RME).

Leucocoryne fuscostriata Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Leucocoryne gilliesioides (Phil.)

Ravenna
Sin.: *Erinna gilliesioides* Phil.
Hierba. Endémica. 1400-1600 m.
Países: CHL(RME).

Leucocoryne inclinata Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: CHL(COQ).

Leucocoryne ixiooides (Hook.) Lindl.

Sin.: *Brodiaea ixiooides* Hook.,
Leucocoryne pauciflora Phil.
Hierba. Endémica. 800-1100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Leucocoryne leucogyna Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Leucocoryne lilacea Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL).

Leucocoryne lituencensis Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO).

Leucocoryne lurida Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Leucocoryne macropetala Phil.

Sin.: *Chrysocoryne oxypetala* (Phil.)
Zoellner, *Leucocoryne oxypetala* Phil.,
Pabellonia oxypetala (Phil.) Quezada &
Martic.

Hierba. Endémica. 800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Leucocoryne maulensis Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Leucocoryne modesta Ravenna

Hierba. Endémica. 1300 m.
Países: CHL(VAL).

Leucocoryne mollensis Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Leucocoryne montana Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Leucocoryne pachystyla Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Leucocoryne porphyrea Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1500 m.
Países: CHL(COQ).

Leucocoryne praealta Ravenna

Hierba. Endémica. 1000-1200 m.
Países: CHL(VAL).

Leucocoryne purpurea Gay

Sin.: *Leucocoryne ixiooides* (Hook.)
Lindl. var. *purpurea* (Gay) Baker
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Leucocoryne quilimarina Ravenna

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(COQ).

Leucocoryne roblesiana Ravenna

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.
Países: CHL(VAL).

Leucocoryne rungensis Ravenna

Hierba. Endémica. 900-1100 m.
Países: CHL(RME).

Leucocoryne simulans Ravenna

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.
Países: CHL(COQ).

Leucocoryne subulata Ravenna

Hierba. Endémica. 2000 m
Países: CHL(RME).

Leucocoryne taguataguensis

Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO).

Leucocoryne talinensis L. Mansur &

M. Cisternas
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(COQ).

Leucocoryne tricornis Ravenna

Hierba. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(RME).

Leucocoryne unguifera Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO).

Leucocoryne valparadisea Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Leucocoryne violacescens Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Leucocoryne vittata Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL).

Leucojum L.**Leucojum vernum** L.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(JFE).

Miersia Lindl.**Miersia chilensis** Lindl.

Sin.: *Miersia chilensis* Lindl. var. *bicolor*
M. Muñoz, *Miersia myodes* Bertero,
Miersia major Kunth, *Miersia minor*
Kunth, *Miersia rusbyi* Britton
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
ARA, RME).

Miersia cornuta Phil.

Hierba. Endémica. 700-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Miersia leporina Ravenna

Hierba. Endémica. 800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Miersia tenuiseta Ravenna

Sin.: *Miersia tenuiseta* Ravenna f.
castanea Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Myostemma Salisb.**Myostemma advena** (Ker Gawl.)

Ravenna

Sin.: *Amaryllis advena* Ker Gawl.,
Amaryllis valparadisiaca Steud.,
Chlidanthus cumingii C. Presl, *Habenaria*
miniatus D. Don ex Sweet, *Habranthus*
hesperius Herb., *Habranthus pallidus*
Lodd., *Hippeastrum advenum* (Ker
Gawl.) Herb., *Hippeastrum hesperidius*
Herb. var. *pallidum* Herb., *Hippeastrum*
pallidum (Herb.) Pax, *Rhodophiala advena*
(Ker Gawl.) Traub

Hierba. Endémica. 1400 m.

Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).

Myostemma ananuca (Phil.) J.M.

Watson & A.R. Flores

Sin.: *Amaryllis ananuca* (Phil.) Traub
& Moldenke, *Hippeastrum ananuca* Phil.,
Rhodophiala ananuca (Phil.) Traub

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Myostemma araucana (Phil.) Ravenna

Sin.: *Amaryllis araucana* (Phil.) Traub
& Uphof, *Hippeastrum araucanum* Phil.,
Rhodophiala araucana (Phil.) Traub

Hierba. Endémica. 900-1500 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA).

Myostemma bagnoldii (Herb.) J.M.

Watson & A.R. Flores

Sin.: *Amaryllis bagnoldii* (Herb.) D.
Dietr., *Habranthus bagnoldii* Herb.,
Hippeastrum bagnoldii (Herb.) Baker,
Hippeastrum bagnoldii (Herb.) Baker
var. *minor* Speg., *Rhodophiala bagnoldii*
(Herb.) Traub

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Myostemma berteroaana (Phil.)

Ravenna

Sin.: *Amaryllis berteroaana* (Phil.) Traub &
Moldenke, *Habranthus berteroaanus* Phil.,
Hippeastrum berteroaanum (Phil.) Baker,
Rhodophiala berteroaana (Phil.) Traub

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO).

Myostemma maculata (L'Hér.)

Ravenna

Sin.: *Amaryllis maculata* L'Hér.,
Rhodophiala maculata (L'Hér.) Ravenna

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(ARA).

Myostemma monantha Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO, MAU).

Myostemma montana (Phil.) Ravenna

Sin.: *Amaryllis montana* (Phil.) Traub
& Uphof, *Habranthus montanus* Phil.,
Hippeastrum montanum (Phil.) Baker,
Rhodophiala montana (Phil.) Traub

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU, ARA).

Myostemma phycelloides (Herb.)

Ravenna

Sin.: *Amaryllis phycelloides* (Herb.)
Steud., *Habranthus phycelloides* Herb.,
Hippeastrum phycelloides (Herb.) Baker,
Phycella phycelloides (Herb.) Traub,
Rhodophiala phycelloides (Herb.) Hunz.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, MAU, RME).

Myostemma tilttilensis (Traub &

Moldenke) Ravenna

Sin.: *Amaryllis tilttilensis* Traub &
Moldenke, *Amaryllis laeta* (Phil.)
Traub & Uphof, *Hippeastrum laetum*
Phil., *Rhodophiala tilttilensis* (Traub &
Moldenke) Traub

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL, RME).

Nothoscordum Kunth**Nothoscordum achalense** Ravenna

Hierba. Endémica. 1000-1800 m.

Países: ARG(COR).

Nothoscordum albitractum Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: ARG(JUU).

Nothoscordum altillanense Ravenna

& Biurrun

Hierba. Endémica. 1600-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Nothoscordum andicola Kunth

Sin.: *Allium andicola* (Kunth) Regel,
Allium bivalve (L.) Kuntze var. *andicola*
(Kunth) Kuntze

Hierba. Nativa. 3000-4100 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Nothoscordum aparadense Ravenna

Hierba. Endémica. 1500 m.

Países: BRA(SCA).

Nothoscordum arenarium HerterSin.: *Nothoscordum andalgense*

Ravenna, nom. nud.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL). URY(COL, MON, RNO, SJO).

Nothoscordum auratum Ravenna

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: URY(MON).

Nothoscordum balaenense Ravenna

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: URY(MAL).

Nothoscordum basalticum Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Nothoscordum bivalve (L.) Brittonvar. **bivalve**

Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze, *Allium*
bivalve (L.) Kuntze var. *striatum* (Jacq.)
Kuntze, *Allium bivalve* (L.) Kuntze
var. *sellowianum* (Kunth) Kuntze,
Allium ornithogaloides Walter, *Allium*
striatum Jacq., *Geboscon bivalve* (L.)
House, *Nothoscordum sellowianum*
Kunth, *Nothoscordum striatum* (Jacq.)
Kunth, *Oligosma bivalve* (L.) Salisb.,
Ornithogalum bivalve L.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, NEU). URY(LAV, MON).

Nothoscordum bivalve (L.) Brittonvar. **nanum** (Griseb.) Guagl.Sin.: *Allium striatellum* Lindl. var.*nanum* Griseb.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI).

Nothoscordum boliviense Ravenna

Hierba. Nativa. 2300-3500 m.

Países: ARG(JUU, TUC).

Nothoscordum bonariense (Pers.)

Beauverd

Sin.: *Gagea bonariensis* (Pers.) Roem.
& Schult., *Nothoscordum poiretii* Kunth,
Nothoscordum spathaceum (Poir.)
Parodi, *Ornithogalum bonariense* Pers.,
Ornithogalum spathaceum Poir., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, ROC, SOR).

Nothoscordum calderense Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: ARG(SAL).

- Nothoscordum cambarense** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Nothoscordum capivarinum** Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum castilloi** T.M. Howard
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum catharinense**
Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Nothoscordum clevelandicum**
Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum collinum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum conostylum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).
- Nothoscordum correntinum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum curvipes** Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum dynamiandrum**
Ravenna
Hierba. Nativa. 2900-3800 m.
Países: ARG(JUJ).
- Nothoscordum entrerianum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(ERI).
- Nothoscordum exile** Ravenna
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum famatinense** Ravenna
Hierba. Nativa. 2800-4000 m.
Países: ARG(LRI).
- Nothoscordum flavescens** Kunth
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).
- Nothoscordum gaudichaudianum** Kunth
Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *gaudichaudianum* (Kunth) Kuntze, *Nothoscordum beauverdianum* Herter, nom. nud., *Nothoscordum grossibulbum* Beauverd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(LAV, MAL, MON, ROC).
- Nothoscordum gibbatum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).
- Nothoscordum glareosum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **gracile**
Sin.: *Allium bivalve* (L.) Kuntze var. *fragrans* (Vent.) Kuntze, *Allium fragrans* Vent., *Allium fragrans* Vent. var. *nepalense* Lindl., *Allium gracile* Dryand. ex Aiton, *Geboscon fragrans* (Vent.) House, *Hesperocles fragrans* (Vent.) Salisb., *Maligia gracilis* (Dryand. ex Aiton) Raf., *Nothoscordum fragrans* (Vent.) Kunth, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, RNE, SJU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(ITA). URY(MAL, MON, SJO).
- Nothoscordum gracile** (Dryand. ex Aiton) Stearn var. **macrostemon** (Kunth) Guagl.
Sin.: *Milla macrostemon* (Kunth) Baker, *Milla macrostemon* (Kunth) Baker var. *gracilis* (Dryand. ex Aiton) Baker, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *macrostemon* (Kunth) Beauverd, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson subsp. *nocturnum* Ravenna, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *uruguayense* Beauverd, *Nothoscordum macrostemon* Kunth, *Sowerbaea americana* Spreng. ex Baker
Hierba. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA). URY(FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TYT).
- Nothoscordum gracilipes** Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum gramineum** (Sims) Beauverd var. **gramineum**
Sin.: *Allium striatellum* Lindl., *Nothoscordum striatellum* (Lindl.) Kunth, *Ornithogalum gramineum* Sims
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MAL).
- Nothoscordum gramineum** (Sims) Beauverd var. **philippianum** (Koch & Bouché) Beauverd
Sin.: *Nothoscordum philippianum* Koch & Bouché
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).
- Nothoscordum ibiramense** Ravenna
Hierba. Endémica. 100 m.
Países: BRA(SCA).
- Nothoscordum inundatum** Ravenna
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(COR, COS).
- Nothoscordum ipacarainum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).
- Nothoscordum itatiense** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum izaguirreae** Crosa
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(LAV).
- Nothoscordum leptogynum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum luteomajus** Ravenna
Hierba. Endémica. 1500 m.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum macrantherum** (Kuntze) Beauverd
Sin.: *Allium macrantherum* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, PAI).
- Nothoscordum mahui** Traub
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(RME).
- Nothoscordum marchesii** Crosa
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ROC).

- Nothoscordum moconense** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS).
- Nothoscordum modestum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(Desconocida).
- Nothoscordum montevidense**
Beauverd subsp. **latitepalum** (Guagl.)
Ravenna
Sin.: *Nothoscordum montevidense*
Beauverd var. *latitepalum* Guagl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA). URY(FLA).
- Nothoscordum montevidense**
Beauverd subsp. **minarum** (Beauverd)
Ravenna
Sin.: *Nothoscordum minarum* Beauverd,
Nothoscordum montevidense Beauverd
var. *minarum* (Beauverd) Guagl.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI).
BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, TAC).
- Nothoscordum montevidense**
Beauverd subsp. **montevidense**
Sin.: *Allium bonariense* Griseb., *Allium bonariense* Griseb. var. *flavum* Kuntze, *Milla aurea* (Lindl.) Baker, *Nothoscordum aureum* (Lindl.) I.M. Johnst. & Parodi, *Triteleia aurea* Lindl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(COL, LAV, MAL, MON, RIV, SJO, SOR).
- Nothoscordum muscorum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum nidulans** Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).
- Nothoscordum nublense** Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).
- Nothoscordum nudicaule** (Lehm.) Guagl.
Sin.: *Allium euosmon* Link & Otto, *Allium nudicaule* Lehm., *Nothoscordum cyanum* Ravenna, *Nothoscordum euosmum* (Link & Otto) Kunth, *Nothoscordum inodorum* (Sol. ex Aiton) W.A. Nicholson var. *euosmum* (Link & Otto) Beauverd
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, MEN, RNE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(LAV, MAL, RIV, SJO).
- Nothoscordum nudum** Beauverd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). URY(LAV, MAL).
- Nothoscordum nutans** Ravenna
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum ostenii** Beauverd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(PAY).
- Nothoscordum pachyrhizum**
Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CLA).
- Nothoscordum paradoxum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(DUR).
- Nothoscordum patricium** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum pedersenii** Ravenna
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(COS).
- Nothoscordum planifolium** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(LAV).
- Nothoscordum portoalegrense**
Ravenna
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum punillense** Ravenna
Hierba. Endémica. 1200 m.
Países: ARG(CAT, COR, SJU, SLU).
- Nothoscordum rigidiscapum**
Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(LAV).
- Nothoscordum saltense** Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Nothoscordum scabridulum**
Beauverd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(LAV).
- Nothoscordum sengesianum**
Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum stenandrum** Ravenna
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum subtile** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(PAY).
- Nothoscordum tafiense** Ravenna
Hierba. Endémica. 2900-3100 m.
Países: ARG(TUC).
- Nothoscordum tarijanum** Ravenna
Hierba. Nativa. 2200-2800 m.
Países: ARG(JUJ).
- Nothoscordum tenuifolium** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).
- Nothoscordum tibaginum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Nothoscordum tricostatum** Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: ARG(JUJ).
- Nothoscordum uruguaiantum**
Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Nothoscordum velazcoense** Ravenna
Hierba. Endémica. 2400-3500 m.
Países: ARG(LRI).
- Nothoscordum yalaense** Ravenna
Hierba. Endémica. 2700-2900 m.
Países: ARG(JUJ).
- Nothoscordum yatainum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS).
- Phycella** Lindl.
- Phycella angustifolia** Phil.
Sin.: *Amaryllis philippiana* Traub & Uphof, *Hippeastrum angustifolium* (Phil.) Phil., comb. illeg.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL, RME).
- Phycella australis** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Phycella cyrtanthoides (Sims) Lindl.

Sin.: *Amaryllis cyrtanthoides* Sims, *Amaryllis demissa* Steud., *Amaryllis ignea* Lindl., *Hippeastrum igneum* (Lindl.) Muñoz, *Phycella magnifica* Herb.

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Phycella gayana (Kuntze) Traub

Sin.: *Amaryllis gayana* (Kuntze) Traub & Uphof, *Hippeastrum gayanum* Kuntze
Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Phycella herbertiana Lindl.

Sin.: *Amaryllis gladioloides* (Hieron.) Traub & Uphof, *Amaryllis herbertiana* (Lindl.) Traub & Uphof, *Bathya andina* (Phil.) Ravenna, *Famatina andina* (Phil.) Ravenna, *Famatina herbertiana* (Lindl.) Ravenna, *Famatina saxatilis* Ravenna, *Habranthus gladioloides* Hieron., *Hippeastrum andinum* (Phil.) Phil., *Hippeastrum gladioloides* (Hieron.) Pax, *Hippeastrum herbertianum* (Lindl.) Baker, *Phycella graciliflora* Herb., *Rhodophiala andina* Phil., *Rhodophiala gladioloides* (Hieron.) Traub, *Rhodophiala herbertiana* (Lindl.) Hunz.

Hierba. Endémica. 1200-2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Phycella scarlatina Ravenna

Hierba. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Placea Miers**Placea amoena** Phil.

Hierba. Endémica. 800-2000 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Placea arzae Phil.

Sin.: *Placea germainii* Phil. subsp. *arzae* (Phil.) Ravenna
Hierba. Endémica. 300-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Placea davidii Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).

Placea lutea Phil.

Sin.: *Placea germainii* Phil. subsp. *lutea* (Phil.) Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Placea ornata Miers ex Lindl.

Sin.: *Placea germainii* Phil., *Placea grandiflora* Lem.

Hierba. Endémica. 900-1700 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Pyrolirion Herb.**Pyrolirion tubiflorum** (L'Hér.) M. Roem.

Sin.: *Amaryllis flammea* Ruiz & Pav., *Amaryllis tubiflora* L'Hér., *Pyrolirion flammeum* (Ruiz & Pav.) Herb., *Zephyranthes flammea* (Ruiz & Pav.) Baker

Hierba. Introducida.
Países: CHL(TAR).

Rhodolirium Phil.**Rhodolirium andicola** (Poepp.)

Ravenna
Sin.: *Amaryllis andicola* Poepp., *Amaryllis purpurata* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus andicola* (Poepp.) Herb., *Hippeastrum andicola* (Poepp.) Baker, *Hippeastrum purpuratum* Phil., *Rhodophiala andicola* (Poepp.) Traub, *Rhodophiala purpurata* (Phil.) Traub, *Zephyranthes andicola* (Poepp.) Baker
Hierba. Endémica. 1200-1800 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Rhodolirium chilense (L'Hér.)

Ravenna
Sin.: *Amaryllis chilensis* L'Hér., *Habranthus chilensis* (L'Hér.) Herb., *Hippeastrum chilense* (L'Hér.) Baker, *Rhodophiala chilensis* (L'Hér.) Traub
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(BIO).

Rhodolirium fulgens (Hook. f.)

Ravenna
Sin.: *Amaryllis fulgens* (Hook. f.) Traub & Uphof, *Habranthus fulgens* Hook. f., *Hippeastrum fulgens* (Hook. f.) Phil., *Rhodophiala fulgens* (Hook. f.) Traub
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Rhodolirium laetum (Phil.) Ravenna

Sin.: *Amaryllis uniflora* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum uniflorum* (Phil.) Baker, *Rhodophiala laeta* Phil., *Rhodophiala uniflora* Phil.
Hierba. Endémica. 1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Rhodolirium montanum Phil.

Sin.: *Amaryllis popetana* (Phil.) Traub & Uphof, *Amaryllis rhodolirion* (Baker) Traub & Uphof, *Hippeastrum popetanum* Phil., *Hippeastrum rhodolirion* (Phil.) Baker, *Rhodolirium andinum* Phil., *Rhodophiala popetana* (Phil.) Traub, *Rhodophiala rhodolirion* (Baker) Traub
Hierba. Endémica. 2000-2700 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Rhodophiala C. Presl**Rhodophiala bakeri** (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis bakeri* (Phil.) Traub & Uphof, *Amaryllis backeri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Habranthus bakeri* Phil., *Hippeastrum bakeri* (Phil.) Traub & Uphof
Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU, ARA).

Rhodophiala bifida (Herb.) Traub

Sin.: *Amaryllis bifida* (Herb.) Spreng. var. *pulchra* (Herb.) Traub & Moldenke, *Amaryllis bifida* (Herb.) Spreng. var. *spathacea* (Herb.) Traub & Moldenke, *Amaryllis bifida* (Herb.) Spreng., *Amaryllis bonariensis* (Kuntze) Traub & Uphof, *Amaryllis granatiflora* (E. Holmb.) Traub & Uphof, *Amaryllis platensis* (E. Holmb.) Traub & Uphof, *Amaryllis pulchra* (Herb.) Traub & Uphof, *Habranthus angustus* Herb., *Habranthus bifidus* Herb., *Habranthus pulcher* Herb., *Habranthus spathaceus* Herb., *Hippeastrum bifidum* (Herb.) Baker, *Hippeastrum bonariense* Kuntze, *Hippeastrum granatiflorum* E. Holmb., *Hippeastrum platense* E. Holmb. var. *angustum* (Schult.) E. Holmb., *Hippeastrum platense* E. Holmb., *Hippeastrum pulchrum* (Herb.) E. Holmb., *Myostemma bifida* (Herb.) Ravenna, *Phycella bonariensis* (Kuntze) Traub, *Phycella granatiflora* (E. Holmb.) Traub, Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub subsp. *aemantha* Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub subsp. *granatiflora* (E. Holmb.) Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub subsp. *purpurea* Ravenna, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub var. *pulchra* (Herb.) Traub, *Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub var. *spathacea* (Herb.) Traub
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(ITA). URY(CAS, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SOR, TAC).

Rhodophiala biflora Phil.

Sin.: *Amaryllis biflora* (Phil.) Traub & Moldenke

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LLA).

Rhodophiala colona (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis colona* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum colonum* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ARA).

Rhodophiala consobrina (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis consobrina* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum consobrinum* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Rhodophiala flava (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis flava* (Phil.) Traub & Uphof, *Amaryllis solisii* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus flavus* Phil., *Hippeastrum solisii* Phil.

Hierba. Endémica. 2000 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

Rhodophiala lineata (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis lineata* (Phil.) Traub & Uphof, hom. illeg., *Habranthus lineatus* Phil., *Hippeastrum lineatum* (Phil.) Baker

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Rhodophiala mendocina (Phil.)

Ravenna

Sin.: *Amaryllis elwesii* (C.H. Wright) Traub & Uphof, *Habranthus bagnoldianus* Herb. var. *gilliesianus* Herb., *Habranthus mendocinus* Phil., *Hippeastrum elwesii* C.H. Wright, *Myostemma elwesii* (C.H. Wright)

Ravenna, *Myostemma gilliesiana* (Herb.) Ravenna, *Rhodophiala elwesii* (C.H. Wright) Traub

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

Rhodophiala moelleri (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis moelleri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Hippeastrum moelleri* Phil.

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: CHL(ARA).

Rhodophiala pratensis (Poepp.) Traub

Sin.: *Amaryllis atacamensis* Traub & Uphof, *Amaryllis pratensis* Poepp., *Habranthus pratensis* (Poepp.) Herb., *Habranthus speciosus* Herb., *Hippeastrum pratense* (Poepp.) Baker, *Myostemma*

pratensis (Poepp.) Ravenna, *Placea pratensis* F. Phil., nom. nud., *Rhodolirium speciosum* (Herb.) Ravenna, *Rhodophiala speciosa* (Herb.) Baker, *Rhodophiala volckmannii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, MAU, BIO, LLA).

Rhodophiala rosea (Sweet) Traub

Sin.: *Amaryllis barlowii* Traub & Moldenke, *Amaryllis rosea* (Sweet) Traub & Uphof, *Habranthus roseus* Sweet, *Hippeastrum roseum* (Sweet) Baker, *Zephyranthes purpurea* Phil.

Hierba. Endémica. 300-1800 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Rhodophiala splendens (Renjifo) Traub

Sin.: *Amaryllis splendens* (Renjifo) Traub & Moldenke, *Habranthus splendens* Renjifo, *Hippeastrum splendens* (Renjifo) Renjifo ex Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU).

Rhodophiala tenuiflora (Phil.) Traub

Sin.: *Amaryllis tenuiflora* (Phil.) Traub & Moldenke, *Hippeastrum tenuiflorum* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Schickendantziella Speg.**Schickendantziella trichosepala**

(Speg.) Speg.

Sin.: *Schickendantzia trichosepala* Speg.

Hierba. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Solaria Phil.**Solaria curacavina** Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Solaria miersioides Phil.

Sin.: *Solaria attenuata* Ravenna, *Solaria brevicolita* Ravenna

Hierba. Endémica. 900-2300 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, RME).

Speea Loes.**Speea humilis** (Phil.) Loes. ex E.H.L. Krause

Sin.: *Geanthus humilis* Phil., *Speea triloba* Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Traubia Moldenke**Traubia modesta** (Phil.) Ravenna

Sin.: *Amaryllis modesta* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum modestum* (Phil.) Baker, *Lapiedra chilensis* F. Phil., *Rhodophiala modesta* Phil., *Traubia chilensis* (F. Phil.) Moldenke

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

Tristagma Poepp.**Tristagma ameghinoi** (Speg.) Speg.

Sin.: *Brodiaea ameghinoi* Speg.

Hierba. Endémica. 0-3300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(MAU, AIS, MAG).

Tristagma anemophilum Ravenna

Hierba. Endémica. 2200 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Tristagma berteroi (Kunth) S.C.

Arroyo & Sassone

Sin.: *Brodiaea gaudichaudiana* (Kunth) Fuentes, *Tristagma berteroi* Phil., nom. nud., *Triteleia berteroi* Kunth, *Triteleia gaudichaudiana* Kunth

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(VAL).

Tristagma bivalve (Hook. ex Lindl.) Traub

Sin.: *Milla brevipes* (Kunze) Baker, *Milla porrifolia* (Poepp.) Baker, *Tristagma brevipes* (Kunze) Traub, *Triteleia bivalvis* Lindl., *Triteleia brevipes* Kunze

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Tristagma circinatum (Sandwith) Traub

Sin.: *Brodiaea circinata* Sandwith, *Tristagma sociale* Ravenna

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO).

Tristagma gracile (Phil.) Traub

Sin.: *Brodiaea philippiana* Baker, *Ipheion gracile* (Phil.) Traub, *Triteleia gracilis* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Tristagma graminifolium (Phil.)

Ravenna

Sin.: *Garaventia graminifolia* (Phil.)Looser, *Nothoscordum graminifolium* (Phil.)Traub, *Steinmannia graminifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 600-700 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Tristagma nivale Poepp. f. **australe**

(Neger ex Dusén) Ravenna

Sin.: *Tristagma australis* Neger exDusén, *Tristagma inflatum* Rendle,*Tristagma pulchella* Speg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Tristagma nivale Poepp. f. **nivale**Sin.: *Milla nivalis* (Poepp.) Baker,*Tristagma chubutense* Gand., *Tristagma**eremophyllum* Speg., *T Tristagma**fragrans* Ravenna, *Tristagma nivale*Poepp. var. *angustifolia* Neger, *Tristagma philippii* Gand.

Hierba. Endémica. 300-3200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, MAG, RME).

Tristagma patagonicum (Baker) TraubSin.: *Brodiaea patagonica* (Baker) Baker,*Brodiaea patagonica* Speg., hom. illeg.,*Brodiaea spegazzinii* Macloskie, *Brodiaea**viridior* Killip, *Ipheion spegazzinii* (Macloskie)Traub, *Ipheion viridius* (Killip) Traub, *Milla**patagonica* Baker, *Tristagma atreucoense*Ravenna, *Tristagma malalhuense* Ravenna,*Tristagma nahuelhuapinum* Ravenna,*Tristagma spegazzinii* (Macloskie) Traub,*Tristagma viridior* (Killip) Traub., *Triteleia**patagonica* (Speg.) Speg. var. *angustiloba*Speg., *Triteleia patagonica* Speg.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LLA, AIS).

Tristagma poeppigianum (Gay) TraubSin.: *Milla poeppigiana* (Gay) Baker,*Triteleia poeppigiana* Gay

Hierba. Endémica. 2400 m.

Países: CHL(RME).

Tristagma porrifolium (Poepp.) TraubSin.: *Brodiaea porrifolia* F. Meigen,*Triteleia porrifolia* Poepp.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(VAL, BIO).

Tristagma sessile (Phil.) TraubSin.: *Brodiaea sessilis* (Phil.) F. Meigen,*Ipheion sessile* (Phil.) Traub, *Milla**sessiliflora* Baker, *Triteleia sessilis* Phil.

Hierba. Endémica. 1900-2100 m.

Países: CHL(MAU, RME).

Tristagma staminosum Ravenna

Hierba. Endémica. 1800 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

Tristagma violaceum (Kunth) TraubSin.: *Brodiaea violacea* (Kunth) Baker,*Ipheion violaceum* (Kunth) Traub,*Triteleia violacea* Kunth

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(BIO).

Zephyranthes Herb., nom. cons.**Zephyranthes americana**

(Hoffmanns.) Ravenna

Sin.: *Haylockia americana*(Hoffmanns.) Herter, *Haylockia**americana* (Hoffmanns.) Traub, comb.superfl., *Haylockia pusilla* Herb.,*Haylockia pusilla* Herb. var. *rubella* Herb.,*Sternbergia americana* Hoffmanns.,*Zephyranthes pusilla* (Herb.) D. Dietr.,*Zephyranthes pusilla* Herb. var. *aurea*Herter, *Zephyranthes pusilla* Herb. var.*cremea* Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, MAL,

MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Zephyranthes amoena Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Zephyranthes andina (R.E. Fr.) TraubSin.: *Haylockia andina* R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Zephyranthes brasiliensis (Traub) TraubSin.: *Cooperia brasiliensis* Traub

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Zephyranthes candida (Herb. ex

Lindl.) Herb.

Sin.: *Amaryllis candida* Herb. ex Lindl.,*Amaryllis nivea* Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MON, SAO, SJO, SOR).

Zephyranthes capivarina Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Zephyranthes carinata Herb.Sin.: *Amaryllis carinata* (Herb.)Spreng., *Zephyranthes grandiflora* Lindl., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS, TUC).

BRA(Fuera del área del proyecto).

Zephyranthes comunelloi R. Bastian

& H. Büneker

Hierba. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Zephyranthes diluta Ravenna

Hierba. Endémica. 700-2700 m.

Países: ARG(SJU).

Zephyranthes filifolia Herb. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 200-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SFE).

Zephyranthes flavissima RavennaSin.: *Zephyranthes fluvialis* Ravenna

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA).

Zephyranthes gratissima Ravenna

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Zephyranthes lagesiana Ravenna

Hierba. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(SCA).

Zephyranthes longistyla Pax

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(COR, SDE, SLU).

Zephyranthes mesochloa Herb. ex Lindl.Sin.: *Amaryllis entreriana* O. Hoffm.,*Amaryllis hassleriana* Chodat & Lendn., *Amaryllis mesochloa* (Herb. ex Lindl.)Steud., *Habranthus jujuyensis* (E.Holmb.) Traub, *Zephyranthes acuminata*Herb., *Zephyranthes bakeriana* Morong,*Zephyranthes entreriana* (O. Hoffm.)Pax, *Zephyranthes flavescens* Herb.,*Zephyranthes hassleriana* (Chodat& Lendn.) Traub, *Zephyranthes**jujuyensis* E. Holmb. var. *volcanica* E.Holmb., *Zephyranthes jujuyensis* E.Holmb., *Zephyranthes kurtzii* Hunz.& Cocucci, *Zephyranthes mesochloa*Herb. ex Lindl. var. *entreriana* (O.Hoffm.) Pax, *Zephyranthes modesta*Ravenna, *Zephyranthes oxypetala*Speg., *Zephyranthes stenopetala* Baker,*Zephyranthes timida* E. Holmb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI,

FOR, JUJ, LRI, MIS, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, COA, SPE). URY(ART, RIV).

Zephyranthes microstigma Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Zephyranthes minima Herb.
Sin.: *Amaryllis minima* (Herb.) Griseb.,
Zephyranthes hieronymi Pax, *Zephyranthes minima* Herb. subsp. *hexandra* Ravenna,
Zephyranthes rositae Herter
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). URY(ART, CAS, DUR, FLA, MON, PAY, SJO).

Zephyranthes paranensis Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Zephyranthes seubertii E.P. Hume
Sin.: *Amaryllis parvula* Seub.,
Zephyranthes parvula (Seub.) Herter,
Zephyranthes stellaris Ravenna
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(PAI). URY(SAO).

Zephyranthes tucumanensis Hunz.
Hierba. Endémica. 300-2000 m.
Países: ARG(TUC).

Zephyranthes uruguaiánica Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

ANACAMPSEROTACEAE

Anacampseros L., nom. cons.

Anacampseros kurtzii Bacigalupo
Hierba. Nativa. 1900-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Anacampseros vulcanensis Añon
Sin.: *Grahamia vulcanensis* (Añon)
G.D. Rowley, *Xenia vulcanensis* (Añón)
Gerbaulet
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Grahamia Gillies ex Hook. & Arn.

Grahamia bracteata Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 200-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, NEU, SDE, SJU, SLU, TUC).

ANACARDIACEAE

Anacardium L.

Anacardium humile A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Astronium Jacq.

Astronium fraxinifolium Schott var. **fraxinifolium**
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, COA).

Astronium fraxinifolium Schott var. **glabrum** Engl.
Sin.: *Astronium fraxinifolium* Schott f. *glaberrimum* Mattick, *Astronium fraxinifolium* Schott f. *subglabrum* Mattick
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA).

Astronium gracile Engl. var. **acuminatum** (Chodat & Hassl.) F.A. Barkley
Sin.: *Astronium gracile* Engl. f. *acuminatum* Chodat & Hassl.
Árbol. Endémica. 200-300 m.
Países: PRY(APA, CEN, COA, PAI).

Astronium gracile Engl. var. **gracile**
Sin.: *Astronium gracile* Engl. f. *serratum* Mattick
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CON, COA, GUA, PAI).

Astronium graveolens Jacq.
Árbol. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN, CEN, PAI, SPE).

Haplorhus Engl.

Haplorhus peruviana Engl.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Lithraea Miers
Lithraea brasiliensis Marchand
Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, TAC, TYT).

Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn.
Sin.: *Laurus caustica* Molina, *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. var. *pilosa* Engl., *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. f. *pilosa* (Engl.) Cabrera
Árbol. Endémica. 0-2800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Lithraea molleoides (Vell.) Engl.
Sin.: *Lithraea gilliesii* Griseb., *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. var. *lorentziana* Hieron. ex Lillo, *Lithraea ternifolia* (Hook.) F.A. Barkley, *Schinus brasiliensis* Marchand ex Cabrera, p.p., *Schinus molleoides* Vell., *Schinus ternifolius* Hook.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, DUR, FLA, LAV, MON, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).

Loxopterygium Hook. f.

Loxopterygium grisebachii Hieron. & Lorentz ex Griseb.
Árbol. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Mangifera L.

Mangifera indica L.
Árbol. Introducida. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Mauria Kunth

Mauria thaumatophylla Loes.
Arbolito o árbol. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Myracrodruon Allemão

Myracrodruon balansae (Engl.) Santin
Sin.: *Astronium balansae* Engl.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA).

Myracrodruon urundeuva Allemão

Sin.: *Astronium candollei* Engl.,
Astronium juglandifolium Griseb.,
Astronium urundeuva (Allemão) Engl.
 var. *candollei* (Engl.) Hassl. ex Mattick,
Astronium urundeuva (Allemão) Engl.
 var. *urundeuva*

Árbol. Nativa. 200-1000 m.
 Países: ARG(CHA, JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CHO, CON, COA, PAI, PHA, SPE).

Schinopsis Engl.**Schinopsis balansae** Engl.

Sin.: *Quebrachia morongii* Britton,
Schinopsis balansae Engl. var. *pendula*
 Tortorelli

Árbol. Nativa. 0-200 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SDE, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, APA, CON, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Schinopsis boqueronensis V. Moggi &

L.J. Oakley
 Árbol. Nativa. 100-900 m.
 Países: PRY(PHA).

Schinopsis brasiliensis Engl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Schinopsis cornuta Loes.

Árbol. Nativa. 200-500 m.
 Países: PRY(APY).

Schinopsis glabra (Engl.) F.A. Barkley & T. Mey.

Sin.: *Schinopsis brasiliensis* Engl. var. *glabra* Engl.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Schinopsis heterophylla Ragonese & J. Castillo

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, FOR, SDE). PRY(APY).

Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl.

Sin.: *Loxopterygium lorentzii* Griseb.,
Quebrachia lorentzii (Griseb.) Griseb.,
Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. var. *marginata* (Engl.) Cabrera, *Schinopsis marginata* Engl.

Árbol. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, COR,

FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC).
 PRY(APY, BOQ, CHO, NAS, PHA).

Schinus L.**Schinus areira** L.

Sin.: *Schinus molle* L. var. *areira* (L.) DC.
 Árbol. Nativa. 0-3500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC).
 BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APA, AMA, CEN, ITA). URY(MON, PAY, SJO, TAC, TYT).

Schinus bumelioides I.M. Johnst.

Arbolito o árbol. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Schinus engleri F.A. Barkley var. **engleri**

Sin.: *Schinus apparicianus* Barroso
 Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 URY(LAV, RIV, ROC, TAC).

Schinus engleri F.A. Barkley var.

uruguayensis F.A. Barkley
 Arbusto o arbolito. Endémica. 0-200 m.
 Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Schinus fasciculatus (Griseb.) I.M.

Johnst.
 Sin.: *Duvaua fasciculata* Griseb., *Duvaua praecox* Griseb. var. *glomerata* Griseb.,
Schinus huynghan Molina var. *heterophylla*
 Kuntze, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera
 f. *fasciculatus* (Griseb.) Cabrera, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *heterophyllus*
 (Kuntze) Cabrera

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1100 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS).
 PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PHA).

Schinus ferox Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA). URY(CLA).

Schinus gracilipes I.M. Johnst.

Sin.: *Schinus gracilipes* I.M. Johnst.
 var. *pilosus* F.A. Barkley
 Arbusto o árbol. Endémica. 500-2500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Schinus johnstonii F.A. Barkley

Sin.: *Schinus dependens* Ortega f. *arenicola* Hauman, *Schinus fasciculatus* (Griseb.) I.M. Johnst. var. *arenicola* (Hauman) F.A. Barkley, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *arenicola* (Hauman) Cabrera, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *australis* Cabrera, p.p.
 Arbusto. Endémica. 0-2600 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SDE).

Schinus kauselii F.A. Barkley

Arbusto. Endémica. 1400-1800 m.
 Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl.

Sin.: *Duvaua latifolia* Gillies ex Lindl.,
Duvaua molle Bertero ex Marchand,
Duvaua velutina Turcz., *Litrea molle* Gay,
Schinus chilensis Marchand var. *glabra*
 Marchand, *Schinus chilensis* Marchand,
Schinus dependens Ortega var. *latifolia*
 Marchand, *Schinus latifolius* (Gillies
 ex Lindl.) Engl. var. *tomentosus* Fenzl,
Schinus velutinus (Turcz.) I.M. Johnst.
 Árbol. Endémica. 0-1500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Schinus lentiscifolius Marchand

Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, SPE). URY(CLA, LAV, MON, RIV, SOR, TAC, TYT).

Schinus longifolius (Lindl.) Speg. var. **longifolius**

Sin.: *Duvaua longifolia* Lindl.
 Arbusto o árbol. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, ITA).
 URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Schinus longifolius (Lindl.) Speg. var. **paraguariensis** (Hassl.) F.A. Barkley

Sin.: *Schinus dependens* Ortega
 var. *paraguariensis* Hassl., *Schinus paraguariensis* (Hassl.) F.A. Barkley
 Árbol. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(ERI). PRY(AMA).
 URY(ART, RIV, SAO).

Schinus marchandii F.A. Barkley

Sin.: *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera
 f. *chubutensis* Cabrera, *Schinus polygamus*
 (Cav.) Cabrera f. *australis* Cabrera, p.p.
 Arbusto. Endémica. 0-900 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
 CHL(AIS).

Schinus meyeri F.A. Barkley

Arbusto o arbolito. Nativa. 1600-1800 m.
Países: ARG(SAL).

Schinus molle L. var. **molle**

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, ATA). PRY(CAU, GUA, ITA, MIE). URY(ART, CLA, LAV, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Schinus molle L. var. **rusbyi** F.A.

Barkley
Árbol. Nativa. 2000-3000 m.
Países: CHL(TAR).

Schinus montanus (Phil.) Engl.

Sin.: *Lithraea montana* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Schinus myrtifolius (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Cybianthus myrtifolius* Griseb.,
Moya ferox Griseb.
Arbusto o arbolito. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Schinus odonellii F.A. Barkley

Sin.: *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var.
patagonica Phil., *Schinus polygamus* (Cav.)
Cabrera f. *patagonicus* (Phil.) Cabrera
Arbusto. Endémica. 500-2600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(MAG).

Schinus patagonicus (Phil.) I.M.

Johnst. ex Cabrera var. **crenuloides**
(F.A. Barkley) F.A. Barkley
Sin.: *Schinus montanus* (Phil.) Engl.
var. *crenuloides* F.A. Barkley
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Schinus patagonicus (Phil.) I.M.

Johnst. ex Cabrera var. **patagonicus**
Sin.: *Duvaua patagonica* Phil., *Lithraea*
montana Phil. var. *patagonica* Phil.,
Litrea patagonica Phil., *Schinus crenatus*
Engl., *Schinus montana* (Phil.) Engl. var.
patagonica Reiche
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Schinus pearcei Engl.

Árbol. Nativa. 1400-1500 m.
Países: CHL(ATA).

Schinus piliferus I.M. Johnst. var.

boliviensis (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Sin.: *Schinus fasciculatus* (Griseb.) I.M.
Johnst. var. *boliviensis* F.A. Barkley
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SDE, TUC).

Schinus piliferus I.M. Johnst. var.

cabrerae (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Sin.: *Schinus cabrerae* F.A. Barkley
Arbolito. Nativa. 200-700 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Schinus piliferus I.M. Johnst. var.

piliferus
Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SDE, SLU, TUC).

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera

Sin.: *Amyris polygama* Cav., *Duvaua*
crenata Phil., *Duvaua dependens* (Ortega)
DC. var. *obovata* Arechav., *Duvaua*
dependens (Ortega) DC. var. *ovata* Arechav.,
Duvaua dependens (Ortega) DC. var.
parviflora Arechav., *Duvaua ovata* Lindl.,
Lithraea crenata Phil., *Litrea crenata* Phil.,
Schinus dependens Ortega subsp. *crenata*
(Phil.) Reiche, *Schinus dependens* Ortega
var. *brevifolia* Fenzl ex Engl., *Schinus*
dependens Ortega var. *crenata* Arechav.,
Schinus dependens Ortega var. *crenatus*
Engl., *Schinus dependens* Ortega var. *obovata*
Engl., *Schinus dependens* Ortega var. *ovata*
Marchand, *Schinus dependens* Ortega var.
parviflora Marchand, *Schinus polygamus*
(Cav.) Cabrera f. *crenatus* (Phil.) Cabrera,
Schinus polygamus (Cav.) Cabrera f. *ovatus*
(Lindl.) Cabrera, *Schinus polygamus* (Cav.)
Cabrera f. *parviflorus* (Marchand) Cabrera,
Schinus polygamus (Cav.) Cabrera var.
chilensis F.A. Barkley, *Schinus polygamus*
(Cav.) Cabrera var. *parviflorus* (Marchand)
F.A. Barkley
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-3200 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Schinus praecox (Griseb.) Speg.

Sin.: *Duvaua praecox* Griseb., *Duvaua*
praecox Griseb. var. *montana* Griseb.
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(COR, LPA, SLU).

Schinus ramboi F.A. Barkley

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Schinus roigii Ruiz Leal & Cabrera

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Schinus sinuatus (Griseb.) Engl.

Sin.: *Duvaua praecox* Griseb. var.
hyemalis Griseb., *Duvaua sinuata* Griseb.
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE).

Schinus spinosus Engl.

Arbusto o arbolito. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Schinus terebinthifolius Raddi var.

acutifolius Engl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(CAA, COA, PAI).

Schinus terebinthifolius Raddi var.

pohlianus Engl.
Sin.: *Lithraea chichita* (Speg.) Rojas
Acosta, *Schinus chichita* Speg.
Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN,
CEN, GUA, ITA, MIE, SPE).

Schinus terebinthifolius Raddi var.

rhoifolius (Mart.) Engl.
Sin.: *Schinus rhoifolius* Mart.
Arbolito. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Schinus terebinthifolius Raddi var.

terebinthifolius
Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAA, CAN).

Schinus venturii F.A. Barkley

Arbolito. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Schinus weinmannifolius Engl. var.

dubius F.A. Barkley
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(COA, GUA, PAI). URY(CLA, DUR,
MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

Schinus weinmannifolius Endl. var.

hassleri (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Sin.: *Schinus molle* L. var. *hassleri* F.A.
Barkley, *Schinus weinmannifolius* Engl.
var. *angustifolius* F.A. Barkley, p.p.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAA, CAN,
CON, SPE).

Schinus weinmannifolius Engl. var. **riedelianus** Engl.

Sin.: *Schinus weinmannifolius*
Engl. var. *angustifolius* F.A. Barkley, p.p., *Schinus weinmannifolius* Engl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Schinus weinmannifolius* Engl. f. *intermedius* Chodat & Hassl., *Schinus weinmannifolius* Engl. f. *paucijuga* Chodat & Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(MAL, MON, PAY, SOR).

Schinus weinmannifolius Engl. var. **weinmannifolius**

Sin.: *Schinus chebataroffii* Herter, *Schinus lentescifolius* Chebat., nom. nud.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, MAL, MON, PAY, SOR).

Tapirira Aubl.**Tapirira guianensis** Aubl.

Árbol. Nativa. 200-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

ANNONACEAE

Annona L.**Annona cacans** Warm.

Sin.: *Annona amambayensis* Hassl. ex R.E. Fr., *Annona cacans* Warm. var. *glabriuscula* R.E. Fr.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAN).

Annona calophylla R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Annona campestris R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, PAI, SPE).

Annona coriacea C. Mart.

Sin.: *Annona coriacea* Mart. var. *cuneata* R.E. Fr.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, SPE).

Annona cornifolia A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 100-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Annona crassiflora Mart.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Annona crotonifolia C. Mart.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Annona dioica A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Annona dolabripetala Raddi

Sin.: *Rollinia laurifolia* Schltld., *Rollinia laurifolia* Schltld. var. *longipes* R.E. Fr., *Rollinia laurifolia* Schltld. var. *divergens* R.E. Fr., *Rollinia laurifolia* Schltld. var. *erecta* R.E. Fr., *Rollinia laurifolia* Schltld. var. *reflexa* R.E. Fr.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Annona emarginata (Schltld.) H.

Rainer
Sin.: *Rollinia emarginata* Schltld. var. *longipetala* (R.E. Fr.) R.E. Fr., *Rollinia emarginata* Schltld., *Rollinia glaucescens* Sond., *Rollinia hassleriana* R.E. Fr. var. *vestita* R.E. Fr., *Rollinia hassleriana* R.E. Fr., *Rollinia longipetala* R.E. Fr., *Rollinia sonderiana* Walp.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

Annona glabra L.

Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Annona glaucophylla R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Annona maritima (Záchia) H. Rainer

Sin.: *Rollinia maritima* Záchia
Arbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(ROC).

Annona montana Macfad.

Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Annona mucosa Jacq.

Sin.: *Rollinia mucosa* (Jacq.) Baill.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Annona neosalicifolia H. Rainer

Sin.: *Rollinia intermedia* R.E. Fr., *Rollinia longifolia* A. St.-Hil. var. *paraguariensis* Chodat, *Rollinia salicifolia* Schltld.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Annona neosericea H. Rainer

Sin.: *Rollinia dolabripetala* (Raddi) R.E. Fr. var. *sericea* R.E. Fr., *Rollinia sericea* (R.E. Fr.) R.E. Fr., *Rollinia sericea* (R.E. Fr.) R.E. Fr. var. *longisepala* R.E. Fr.
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Annona nutans (R.E. Fr.) R.E. Fr.

Sin.: *Annona spinescens* Mart. var. *nutans* R.E. Fr.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, MIE, NAS, PAI, PHA, SPE).

Annona paraguayensis R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Annona rugulosa (Schltld.) H. Rainer

Sin.: *Rollinia glaziovii* R.E. Fr., *Rollinia occidentalis* R.E. Fr., *Rollinia rugulosa* Schltld., *Rollinia rugulosa* Schltld. subsp. *australis* R.E. Fr.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Annona sylvatica A. St.-Hil.

Sin.: *Annona fagifolia* A. St.-Hil. & Tul., *Rollinia fagifolia* A. St.-Hil., *Rollinia sylvatica* (A. St.-Hil.) Mart.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Duguetia A. St.-Hil.

Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.)
Benth. & Hook. f.

Sin.: *Annona furfuracea* A. St.-Hil.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,
CAN, CON, PHA, SPE).

Duguetia lanceolata A. St.-Hil.
Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Duguetia phaeoclados (C. Mart.)
Maas & H. Rainer
Sin.: *Aberemoa laevis* R.E. Fr., *Annona
phaeoclados* C. Mart.
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CON).

Guatteria Ruiz & Pav., nom. cons.

Guatteria australis A. St.-Hil.
Sin.: *Guatteria dusenii* R.E. Fr. var.
subglabra R.E. Fr., *Guatteria dusenii* R.E.
Fr., *Guatteria neglecta* R.E. Fr., *Guatteria
parvifolia* R.E. Fr., *Guatteria polycarpa*
R.E. Fr., *Guatteria salicifolia* R.E. Fr. var.
erosa R.E. Fr.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Porcelia Ruiz & Pav.

Porcelia macrocarpa (Warm.) R.E. Fr.
Sin.: *Uvaria macrocarpa* Warm.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Unonopsis R.E. Fr.

Unonopsis guatterioides (A. DC.)
R.E. Fr.
Sin.: *Uvaria guatterioides* A. DC.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Xylopia L.

Xylopia aromatica (Lam.) C. Mart.
Sin.: *Uvaria aromatica* Lam., *Xylopia
grandiflora* A. St.-Hil.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,
CON, PHA, SPE).

Xylopia brasiliensis Spreng.
Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).

Xylopia langsdorfiana A. St.-Hil. & Tul.
Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR).

Xylopia sericea A. St.-Hil.
Sin.: Árbol o arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

APIACEAE

Ammi L.

Ammi majus L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS,
DFE, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS,
NEU, RNE, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, SCA). CHL(LRI, LLA, RME).
URY(MON).

Ammi visnaga (L.) Lam.
Sin.: *Daucus visnaga* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
LPA, MEN, SAL, SJU, SFE, SDE).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, ARA, RME, JFE).
URY(MON).

Ammoselinum Torr. & A. Gray

Ammoselinum rosenfurtii Mathias &
Constance
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(ART,
CLA, FLA, PAY, RNO, SAO, SOR).

Anethum L.

Anethum graveolens L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS,
SCA). CHL(JFE).

Anthriscus Pers.

Anthriscus caucalis M. Bieb.
Hierba. Introducida. 0-1900 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Sin.: *Chaerophyllum sylvestre* L.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(MAG).

Apium L., nom. cons.

Apium chilense Hook. & Arn.
Sin.: *Apium flexuosum* Phil., *Ligusticum
dumetorum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, VAL, LBO,
MAU, JFE).

Apium commersonii DC.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, SCR).
URY(MON, SJO).

Apium fernandezianum Johow
Hierba. Endémica.
Países: CHL(JFE).

Apium graveolens L.
Hierba. Introducida. 0-3000 m.
Países: ARG(LPA, SJU, SLU).
BRA(SCA). CHL(ANT, LRI, LLA, JFE).
PRY(CEN).

Apium nodiflorum (L.) Lag.
Sin.: *Apium nodiflorum* (L.) Lag. var.
vulgare (F.W. Schultz) H. Wolff, nom.
inval., *Sium nodiflorum* L.
Hierba. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, NEU). CHL(ATA,
COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Apium panul (Bertero ex DC.) Reiche
Sin.: *Apium andinum* Phil., *Apium
angustilobum* (Phil.) Reiche, *Apium
apioides* (Phil.) Reiche, *Apium humile*
(Phil.) Reiche, *Apium panul* (Bertero ex
DC.) Reiche var. *araucanum* (Phil.) Reiche,
Apium peucedanooides (C. Presl ex DC.)
Reiche var. *tenuifolium* (C. Presl ex DC.)
H. Wolff, *Apium peucedanooides* (C. Presl
ex DC.) Reiche, *Apium philippii* H. Wolff,
Carum pansil (Bertero ex DC.) Griseb.,
Ligusticum angustilobum Phil., *Ligusticum
apioides* Phil., *Ligusticum cahuilense*
Phil. ex sched., *Ligusticum humile* Phil.,
Ligusticum landbeckii Phil., *Ligusticum
nemorosum* Phil., *Ligusticum pansil* Bertero
ex DC., *Ligusticum peucedanooides* C. Presl
ex DC., *Pimpinella andina* Phil., *Pimpinella
araucana* Phil., *Pimpinella macrophylla*
Phil., *Pimpinella molleri* Phil., *Pimpinella
navarri* Phil., *Pimpinella peteroana* Phil.,
Pimpinella vidali Phil.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU, TUC).
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LLA, RME).

Apium pimpinellifolium (Phil.) Reiche
Sin.: *Ligusticum pimpinellifolium* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO).

Apium prostratum Vent.
Sin.: *Apium australe* Thouars var.
latisectum H. Wolff, *Apium australe*
Thouars, *Apium dunicola* Pontioli,
Apium maclovianum Gand., *Wydleria*
humilis Phil.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, SCR,
TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR,
ANT, ATA, COQ, BIO, LRI, LLA, AIS,
MAG, RME, JFE, IPA). URY(ROC).

Apium sellowianum H. Wolff
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS,
ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, SFE, SJU).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).
URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON,
PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Asteriscium Cham. & Schltld.

Asteriscium aemocarpon Clos
Sin.: *Asteriscium ramosissimum*
Phil., *Asteriscium haemocarpon* Clos
var. *chlorocarpum* Phil., *Asteriscium*
verrucosum Meyen
Hierba. Endémica. 2100-3500 m.
Países: CHL(COQ, LBO, RME).

Asteriscium argentinum Chodat &
Wilczek
Sin.: *Asteriscium crambe* H. Wolff
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, SLU).

Asteriscium chilense Cham. & Schltld.
Sin.: *Asteriscium chilense* Cham. &
Schltld. var. *haenkei* DC., *Asteriscium*
poeppigii DC., *Asteriscium pozoides* Clos,
Eryngium tricuspidatum Dombey
Hierba. Endémica. 100-2500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Asteriscium closii (Kuntze) Mathias &
Constance
Sin.: *Asteriscium pungens* Drude,
Bustillosia chilensis Clos var. *setacea*

Phil., *Bustillosia chilensis* Clos, *Dipterygia*
closii Kuntze
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Asteriscium famatinense Hieron. &
H. Wolff
Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Asteriscium fimbriatum Speg.
Hierba. Endémica. 200-900 m.
Países: ARG(LPA, NEU, RNE, SCR).

Asteriscium glaucum Hieron. & H. Wolff
Hierba. Endémica. 600-2900 m.
Países: ARG(JUU, LRI, MEN, SAL,
SJU, SLU).

Asteriscium novarae Constance &
Charpin
Hierba. Endémica. 2900-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Asteriscium vidali Phil.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ATA).

Austropeucedanum Mathias & Constance

Austropeucedanum oreopansil
(Griseb.) Mathias & Constance
Sin.: *Peucedanum oreopansil* Griseb.
Hierba. Endémica. 1000-3200 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Azorella Lam.

Azorella acaulis (Cav.) Drude
Sin.: *Huanaca acaulis* Cav., *Huanaca*
bergii Hieron., *Huanaca cavanillesii*
DC., nom. illeg., *Huanaca geraniifolia*
DC., *Lechleria palmata* Phil., *Oenanthe*
huanaca Spreng., nom. illeg., *Spananthe*
huanaca Lag.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(AIS, MAG).

Azorella albobaginata (Gillies &
Hook.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
var. **albobaginata**
Sin.: *Azorellopsis trisecta* H. Wolff,
Mulinum albobaginatatum Gillies & Hook. var.
albobaginatatum, *Mulinum cryptanthum* Clos
var. *pulvinaris* Chodat & Wilcz.
Hierba. Endémica. 1500-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
CHL(MAU, RME).

Azorella albobaginata (Gillies &
Hook.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
var. **pauciflorum** (Reiche) G.M.
Plunkett & A.N. Nicolas
Sin.: *Mulinum albobaginatatum* Gillies
& Hook. var. *pauciflorum* (Reiche) J.C.
Zech, *Mulinum pauciflorum* Reiche,
Mulinum reichei H. Wolff, nom. inval.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Azorella ameghinoi Speg.
Sin.: *Azorella transverse-striata*
Hauman
Hierba. Endémica. 200-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(AIS, MAG).

Azorella andina (Phil.) Drude
Sin.: *Azorella ranunculus* d'Urv. var.
trilobata Dusén ex Macloskie, *Azorella*
trilobata Dusén, *Huanaca andina* (Phil.)
Phil., *Schizeilema trilobata* (Dusén)
Domin, *Trisciadium andinum* Phil.
Hierba. Endémica. 600-2800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(BIO, ARA, MAG).

Azorella atacamensis G.M. Plunkett
& A.N. Nicolas
Sin.: *Mulinum crassifolium* Phil.
Subarbusto. Endémica. 3700-4500 m.
Países: ARG(SAL). CHL(TAR, ANT, ATA).

Azorella biloba (Schltld.) Wedd.
Sin.: *Azorella lehmannii* Hieron.,
Azorella biloba (Schltld.) Wedd. var.
strigosa Wedd., *Fragosa biloba* Schltld.
Hierba o subarbusto. Nativa. 2500-5000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
CHL(ANT).

Azorella boelckeii (Mathias & Constance)
G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
Sin.: *Huanaca boelckeii* Mathias &
Constance
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA, AIS).

Azorella burkartii (Mathias & Constance)
G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
Sin.: *Huanaca burkartii* Mathias &
Constance
Hierba. Endémica. 800-2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR).
CHL(ARA, MAG).

Azorella compacta Phil.

Sin.: *Azorella columnaris* H. Wolff, *Azorella prismatoclada* Domin, *Azorella yareta* Hauman, *Laretia compacta* (Phil.) Reiche
Hierba o arbusto. Nativa. 3500-5200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Azorella concolor Rendle

Sin.: *Mulinum lycopodiopsis* Speg., *Mulinum valentini* Speg.
Hierba o subarbusto. Endémica. 300-1400 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Azorella crassipes Phil.

Hierba o arbusto. Endémica. 1700-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO).

Azorella cryptantha (Clos) Reiche

Sin.: *Mulinum cryptanthum* Clos, *Mulinum integrifolium* Hieron.
Hierba o subarbusto. Endémica.
2500-4300 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ATA, COQ).

Azorella diapiensoides A. Gray

Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUU).

Azorella diversifolia Clos

Sin.: *Azorella diversifolia* Clos var. *antillanca* J.C. Zech, *Azorella incisa* (Griseb.) Wedd., *Pozoa incisa* Griseb.
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Azorella echegarayi (Hieron.) G.M.

Plunkett & A.N. Nicolas
Sin.: *Mulinum echegarayi* Hieron.
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Azorella echinus (DC.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas

Sin.: *Mulinum echinus* DC.
Subarbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU).

Azorella filamentosa Lam.

Sin.: *Azorella chamitis* Pers., *Chamitis integrifolia* Gaertn.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Azorella fuegiana Speg.

Sin.: *Azorella dusenii* H. Wolff, *Azorella mesetae* Skottsbo.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Azorella hallei (Skottsbo.) G.M.

Plunkett & A.N. Nicolas
Sin.: *Mulinum hallei* Skottsbo.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Azorella lycopodioides Gaudich.

Sin.: *Azorella clandestina* Phil., *Azorella laevigata* Phil., *Azorella lycopodioides* Gaudich. var. *chilensis* Gay, *Azorella lycopodioides* Gaudich. var. *compacta* Phil., *Azorella nervosa* Phil., *Azorella vaginata* Phil.
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Azorella madreporica Clos

Sin.: *Azorella bolacina* Clos, *Azorella muscoides* Phil., *Azorella obtusiloba* Phil., *Azorella piligera* Phil.
Hierba o subarbusto. Endémica.
1800-3600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

Azorella microphylla (Cav.) G.M.

Plunkett & A.N. Nicolas
Sin.: *Azorella morenonis* (Kuntze) Macloskie, *Diplaspis morenonis* (Kuntze) K. Schum., *Huanaca morenonis* Kuntze, *Mulinum microphyllum* (Cav.) Pers., *Mulinum morenonis* (Kuntze) Speg., *Selinum microphyllum* Cav.
Hierba. Endémica. 800-1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Azorella monantha Clos

Sin.: *Apleura nucamentacea* Phil., *Azorella apoda* A. Gray, *Azorella bryoides* Phil., *Azorella caespitosa* Vahl, *Azorella glacialis* Phil., *Azorella hookeriana* Clos, *Azorella nucamentacea* (Phil.) Hauman, *Azorella sessiliflora* Phil.
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Azorella monteroi S. Martínez & Constance

Hierba. Endémica. 1800 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Azorella nivalis Phil.

Sin.: *Mulinum leptacanthum* Phil., *Mulinum patagonicum* Speg.
Subarbusto. Endémica. 1400-260 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA).

Azorella patagonica Speg.

Sin.: *Azorella patagonica* Speg. var. *compacta* Speg., *Azorella plantaginea* Speg.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Azorella prolifera (Cav.) G.M.

Plunkett & A.N. Nicolas
Sin.: *Mulinum chillanense* Phil., *Mulinum gandogeri* M. Hiroe, *Mulinum hirsutum* Phil., *Mulinum laxum* Phil., *Mulinum leoninum* Lorentz, *Mulinum ovalleanum* Phil., *Mulinum patagonicum* Gand., hom. illeg., *Mulinum proliferum* (Cav.) Pers., *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *chillanense* (Phil.) Reiche, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *laxum* (Phil.) Reiche, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *leoninum* (Lorentz) Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *longeinvolucratum* Hicken, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *proliferum* (Cav.) Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *quinquepartitum* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *trispinescens* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers., *Selinum proliferum* Cav., *Selinum spinosum* Cav.
Arbusto. Nativa. 0-150 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Azorella ranunculus d'Urv.

Sin.: *Pozoa ranunculus* (d'Urv.) Hook. f., *Schizeilema ranunculus* (d'Urv.) Domin
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Azorella ruizii G.M. Plunkett & A.N. Nicolas

Sin.: *Laretia acaulis* (Cav.) Gillies & Hook., *Selinum acaule* Cav.
Hierba o subarbusto. Endémica.
2000-3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, RME).

Azorella selago Hook. f.

Sin.: *Azorella antipoda* Gand., *Azorella maquariensis* Orchard, *Azorella selago*

Hook. f. var. *compacta* Albov, *Azorella selago* Hook. f. var. *pulvinaris* Albov
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Azorella spinosa (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Azorella pectinata* Phil.,
Fragosa spinosa Ruiz & Pav., *Mulinum clandestinum* Phil., *Mulinum cuneatum*
Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LLA, RME).

Azorella trifoliolata Clos

Sin.: *Azorella depauperata* Phil., *Azorella gayana* Phil., *Azorella pinnatiloba* Gand.

Hierba. Endémica. 500-3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers.

Sin.: *Azorella albida* Phil., *Azorella cespitosa* Cav., nom. illeg., *Azorella crassifolia* Pers., *Azorella gilliesii* (Hook.)
Hook. & Arn., *Azorella rahmeri* Phil.,
Azorella utriculata Griseb., *Bolax gilliesii*
Hook., *Chamitis tricuspidata* Gaertn.,
Chamitis trifurcata Gaertn.

Hierba o subarbusto. Endémica.
0-3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, SJU, TDF). CHL(ATA, LBO, MAU,
BIO, ARA, AIS, MAG).

Azorella ulicina (Gillies & Hook.) G.M.
Plunkett & A.N. Nicolas

Sin.: *Mulinum axilliflorum* Griseb.,
Mulinum spinosum (Cav.) Pers. f. *minus*
Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers.
var. *minus* (Kuntze) J.C. Zech, *Mulinum spinosum*
(Cav.) Pers. var. *triacanthum*
(Griseb.) Kuntze, *Mulinum triacanthum*
Griseb. var. *multiflorum* Hieron.,
Mulinum triacanthum Griseb., *Mulinum ulicinum*
Gillies & Hook., *Mulinum ulicinum*
Gillies & Hook. var. *multiflorum*
(Hieron.) J.C. Zech

Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
SAL, SJU, TUC). CHL(ANT).

Bolax Comm. ex Juss.

Bolax caespitosa Hombr. & Jacquinot
ex Decne

Sin.: *Azorella bovei* Speg., *Azorella gummifera* (Lam.) Poir., *Bolax bovei*

(Speg.) Dusén

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS,
MAG).

Bolax gummifera (Lam.) Spreng.

Sin.: *Azorella glebaria* (Comm. ex
Gaudich.) A. Gray, *Bolax columnifera*
Gand., *Bolax complicatus* Spreng., *Bolax*
glebaria Comm. ex Gaudich., *Hydrocotyle*
gummifera Lam.

Hierba o subarbusto. Endémica.
0-3500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Bowlesia Ruiz & Pav.

Bowlesia flabilis J.F. Macbr.

Hierba. Nativa. 2200-3900 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

Bowlesia hieronymusii H. Wolff

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Bowlesia incana Ruiz & Pav.

Sin.: *Bowlesia geraniifolia* Cham. &
Schltdl., *Bowlesia incana* Ruiz & Pav. f.
tenera (Spreng.) Urb., *Bowlesia nodiflora*
DC., *Bowlesia rotundifolia* Phil., *Bowlesia*
tenera Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU,
RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(CEN,
PAI). URY(CAS, COL, MON, SJO, SOR).

Bowlesia lobata Ruiz & Pav.

Sin.: *Bowlesia acutangula* Benth.,
Bowlesia acutiloba H. Wolff, *Drusa*
acutangula (Benth.) Drude
Hierba. Nativa. 1300-4600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SLU, TUC). CHL(TAR).

Bowlesia macrophysa Zoellner

Hierba. Endémica. 2900 m
Países: CHL(COQ).

Bowlesia paposana I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Bowlesia platanifolia H. Wolff

Hierba. Nativa. 600-2600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Bowlesia ruiz-lealii Mathias &
Constance

Hierba. Endémica. 1700-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Bowlesia sodiroana H. Wolff

Hierba. Nativa. 200-500 m.
Países: CHL(COQ).

Bowlesia tropaeolifolia Gillies & Hook.

Sin.: *Bowlesia cirrosa* Phil., *Bowlesia flexilis* Meyen, *Bowlesia pulchella* Wedd.,
Bowlesia tropaeolifolia Gillies & Hook.
var. *cirrosa* (Phil.) Reiche, *Bowlesia*
tropaeolifolia Gillies & Hook. var. *gayana*
Domin, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies &
Hook. var. *heterophylla* Speg., *Bowlesia*
tropaeolifolia Gillies & Hook. var.
patagonica Speg.

Hierba. Nativa. 100-4500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN,
NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Bowlesia uncinata Colla

Sin.: *Bowlesia axilliflora* Phil., *Bowlesia dumetorum* Phil., *Bowlesia macrosperma*
H. Wolff, *Bowlesia reichei* Phil., *Bowlesia*
tripartita (Hook. & Arn.) Clos var.
axilliflora (Phil.) Reiche, *Bowlesia*
tripartita (Hook. & Arn.) Clos var.
dumetorum (Phil.) Reiche, *Bowlesia*
tripartita (Hook. & Arn.) Clos var.
reichei (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita*
(Hook. & Arn.) Clos var. *triloba* Reiche,
Bowlesia tripartita (Hook. & Arn.) Clos,
Bowlesia tropaeolifolia Gillies & Hook.
var. *tripartita* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 700-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Bowlesia venturii Mathias &
Constance

Hierba. Endémica. 3200-3800 m.
Países: ARG(TUC).

Bupleurum L.

Bupleurum tenuissimum L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

Caucalis L.

Caucalis platycarpus L.

Sin.: *Caucalis daucoides* L., nom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Centella L.**Centella asiatica** (L.) Urb.

Sin.: *Centella biflora* Nannf., *Centella hirtella* Nannf., *Centella triflora* (Ruiz & Pav.) Nannf., *Hydrocotyle asiatica* L., *Hydrocotyle triflora* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(AMA, PAD). URY(CAS, CLA, COL, MON, ROC, TYT).

Chaerophyllum L., nom. cons.**Chaerophyllum andicola** (Kunth) K.F. Chung

Sin.: *Myrrhis andicola* Kunth, *Oreomyrrhis andicola* (Kunth) Hook. f. var. *tomentosa* Wedd., nom. illeg., *Oreomyrrhis andicola* (Kunth) Hook. f., *Oreomyrrhis daucooides* Urb.

Hierba. Nativa. 1700-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Chaerophyllum daucooides (d'Urv.)

K.F. Chung

Sin.: *Azorella daucooides* d'Urv., *Oreomyrrhis hookeri* Mathias & Constance

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Conium L.**Conium maculatum** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(MON).

Coriandrum L.**Coriandrum sativum** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, LPA, MIS, SAL, SJU, SCR, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(LLA, JFE). PRY(PAD).

Cyclosporum Lag.**Cyclosporum laciniatum** (DC.)

Constance

Sin.: *Apium biternatum* (Phil.)

Reiche, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. f.

deserticum H. Wolff, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *gracile* (Clos) Reiche, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *hispidulum* H. Wolff, *Helosciadium biternatum* Phil., *Helosciadium deserticum* Phil., *Helosciadium gracile* Clos, *Helosciadium laciniatum* DC., *Helosciadium laciniatum* DC. var. *humile* Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME).

Cyclosporum leptophyllum

(Pers.) Sprague var. **latisectum** (Urb.) Constance

Sin.: *Apium ammi* (L.) Urb. var.

latisectum Urb., *Apium ammi* (L.) Urb.

f. *latisectum* (Urb.) H. Wolff, *Apium*

leptophyllum (Pers.) F. Muell. var.

latisectum (Urb.) Mathias & Constance

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyclosporum leptophyllum (Pers.)

Sprague var. **leptophyllum**

Sin.: *Apium ammi* (L.) Urb. f.

filamentosum (Kuntze) H. Wolff, *Apium*

ammi (L.) Urb. f. *nanum* Kuntze, *Apium*

ammi (L.) Urb. f. *pedunculata* Chodat,

Apium ammi (L.) Urb. var. *filamentosum*

Kuntze, *Apium ammi* (L.) Urb. var.

genuinum H. Wolff, *Apium ammi* (L.)

Urb. var. *leptophyllum* (Pers.) Kuntze,

Apium ammi (L.) Urb., *Apium laciniatum*

(DC.) Urb. f. *elatus* (Hook. & Arn.)

H. Wolff, *Apium leptophyllum* (Pers.)

F. Muell., *Apium ranunculifolium* (DC.)

Reiche, comb. illeg., *Helosciadium*

laciniatum DC. var. *elatus* Hook. &

Arn., *Helosciadium leptophyllum* (Pers.)

DC., *Helosciadium ranunculifolium* DC.,

Pimpinella leptophylla Pers.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,

COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,

MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,

TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA,

COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,

RME, JFE, IPA). PRY(APA, APY, BOQ,

ÑEE, SPE). URY(ROC).

Cyclosporum leptophyllum (Pers.)

Sprague var. **multisectum** (Mathias & Constance) Constance

Sin.: *Apium leptophyllum* (Pers.) F.

Muell. var. *multisectum* Mathias &

Constance

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Cyclosporum uruguayense

(Mathias & Constance) Constance

Sin.: *Apium uruguayense* Mathias & Constance

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: URY(SJO).

Daucus L.**Daucus carota** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, NEU, RNE, SLU). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, IPA). URY(MON).

Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Schult.

Sin.: *Daucus australis* Poepp. ex DC., *Daucus toriloides* DC.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LPA, NEU, RNE, SAL, TDF). CHL(ANT, COQ, VAL, MAU, LLA, AIS, MAG, JFE).

Daucus pusillus Michx.

Sin.: *Daucus hispidifolius* Clos, *Daucus montevidensis* Link ex Spreng., *Daucus scaber* Larrañaga

Hierba. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE, SDE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, RME). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SAO, SJO, SOR, TAC).

Diposis DC.**Diposis bulbocastanum** DC.

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Diposis patagonica Skottsbl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Diposis saniculaefolia (Lam.) DC.

Sin.: *Hydrocotyle saniculaefolia* Lam.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: URY(CAS, DUR, MAL, MON, SOR).

Domeykoa Phil.**Domeykoa andina** Saldivia & Faúndez

Hierba. Endémica. 2600-3100 m.

Países: CHL(TAR).

Domeykoa oppositifolia Phil.

Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Domeykoa perennis I.M. Johnst.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Eremocharis Phil.**Eremocharis confinis** I.M. Johnst.

Subarbusto. Nativa. 3100-3200 m.
Países: CHL(TAR).

Eremocharis fruticosa Phil.

Sin.: *Dipterygia philippiana* Kuntze,
Eremocharis flexuosa Phil.
Hierba o arbusto. Endémica. 100-1800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Eryngium L.**Eryngium agavifolium** Griseb.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR, SDE, SLU).

Eryngium aloifolium Mart. ex Urb.

Hierba. Nativa. 900 m
Países: BRA(PAR, SCA).

Eryngium anomalum Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 100 m
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Eryngium balansae H. Wolff

Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(RGS).
PRY(APA, CAU, GUA, PAI, SPE).

Eryngium bupleuroides Hook. & Arn.

Arbusto o árbol. Endémica. 400-900 m.
Países: CHL(JFE).

Eryngium cabreræ Pontiroli

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, SFE).

Eryngium canaliculatum Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eryngium cardosii Clos

Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(BIO).

Eryngium chamissonis Urb.

Sin.: *Eryngium pandanifolium* Cham. &
Schltdl. var. *chamissonis* (Urb.) Mathias

& Constance

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(MIE). URY(ROC).

Eryngium chubutense Neger ex Dusén

Sin.: *Eryngium kurtzii* Hicken
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, ERI, LPA, RNE, SFE, TUC).

Eryngium ciliatum Cham. & Schltdl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).
PRY(SPE). URY(ART, RIV, TAC).

Eryngium coquimbantum Phil. ex Urb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Eryngium corallinum Mathias &

Constance
Hierba. Endémica. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eryngium coronatum Hook. & Arn.

Sin.: *Eryngium coronopifolium* Decne.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SDE, SFE,
TUC). PRY(APY, CEN, PHA).

Eryngium crassifolium A. Padín &

C.I. Calviño
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA).

Eryngium depressum Hook. & Arn.

Sin.: *Eryngium arvense* Phil.
Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LLA, RME).

Eryngium divaricatum Hook. & Arn.

Sin.: *Eryngium flaccidum* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN).
URY(RNO).

Eryngium dorae C. Norman

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). URY(RNO, RIV).

Eryngium dusenii H. Wolff

Hierba. Endémica. 500-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eryngium ebracteatum Lam.

Sin.: *Eryngium ebracteatum* Lam. var.
poteriodes (Griseb.) Urb., *Eryngium*
poteriodes Griseb.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS,
RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ,
CAA, CAN, ÑEE, PHA). URY(MON).

Eryngium eburneum Decne.

Sin.: *Eryngium bracteosum* Griseb.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAU, CAN, COA, ÑEE).
URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, RNO,
SJO, SOR, TAC).

Eryngium echinatum Urb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART,
CAS, COL, FLO, FLA, MAL, MON, RNO,
ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Eryngium ekmanii H. Wolff

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CAA, PAI).

Eryngium elegans Cham. & Schltdl.

Sin.: *Eryngium elegans* Cham. &
Schltdl. var. *genuinum* Urb., nom. inval.,
Eryngium elegans Cham. & Schltdl. var.
macrocephalum Urb., *Eryngium elegans*
Cham. & Schltdl. var. *microcephalum*
Urb., *Eryngium elegans* Cham. & Schltdl.
var. *uncinatum* (Cham. & Schltdl.) Urb.,
Eryngium uncinatum Cham. & Schltdl.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL,
SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, COA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).
URY(CAS, CLA, COL, MAL, RIV, ROC,
SAO, SJO, SOR, TAC).

Eryngium eriophorum Cham. & Schltdl.

Sin.: *Eryngium eriophorum* Cham. &
Schltdl. var. *setosum* H. Wolff, *Eryngium*
eriophorum Cham. & Schltdl. var.
typicum H. Wolff, nom. inval., *Eryngium*
eriophorum Cham. & Schltdl. f. *vegetius*
Cham. & Schltdl.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). URY(RIV, TAC).

Eryngium eurycephalum Malme

Sin.: Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eryngium falcifolium Irgang

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Eryngium fernandezianum Skottsbo.

Arbusto. Endémica. 300-500 m.
Países: CHL(JFE).

Eryngium floribundum Cham. & Schltld.

Sin.: *Eryngium floribundum* Cham. & Schltld. var. *angustifolium* Urb., *Eryngium floribundum* Cham. & Schltld. var. *pycnocephalum* Urb., *Eryngium floribundum* Cham. & Schltld. var. *serroides* Urb.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE).

Eryngium foetidum L.

Hierba. Endémica. 300-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eryngium glossophyllum H. Wolff

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Eryngium horridum Malme

Sin.: *Eryngium schwackeanum* Urb.
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SDE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA, ÑEE, PAI). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, SJO, SOR).

Eryngium humifusum Clos

Sin.: *Eryngium pratense* Phil., *Eryngium pratense* Phil. var. *depressum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Eryngium inaccessum Skottsbo.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(JFE).

Eryngium incantatum Lucena,

Novara & A.R. Cuzzo (h)
Hierba. Endémica. 3000-3200 m.
Países: ARG(SAL).

Eryngium irgangii D.B. Lucas

Hierba. Endémica. 900-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Eryngium junceum Cham. & Schltld.

Sin.: *Eryngium erosum* Urb., *Eryngium junceum* Cham. & Schltld. subsp. *erosum* (Urb.) H. Wolff, *Eryngium junceum* Cham. & Schltld. subsp. *setigerum* Urb.
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eryngium juncifolium (Urb.) Mathias & Constance

Sin.: *Eryngium junceum* Cham. & Schltld. subsp. *lineare* Urb., *Eryngium junceum* Cham. & Schltld. subsp. *juncifolium* Urb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA).

Eryngium koehneanum Urb.

Hierba. Nativa. 800-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eryngium lorentzii H. Wolff

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(TUC).

Eryngium luzulaefolium Cham. & Schltld.

Sin.: *Eryngium hassleri* H. Wolff, *Eryngium nudum* Gillies & Hook.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU). URY(PAY, SAO, SOR).

Eryngium macracanthum Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA).

Eryngium megapotamicum Malme

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SJO).

Eryngium mesopotamicum Pedersen

Sin.: *Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltld. var. *lasseauxii* (Decne.) Mathias & Constance
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, RIV, SJO, SJO).

Eryngium nudicaule Lam.

Sin.: *Eryngium bellidifolium* Decne., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *bellidifolium* (Decne.) Urb., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *ctenodes* Griseb., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *peruvianum* Urb., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *pinnatifidum* Urb.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LRI, MIS, SFE, SLU). BRA(RGS, SCA). PRY(CEN, PAI). URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Eryngium ombrophilum Dusén & H. Wolff

Hierba. Endémica. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Eryngium pandanifolium Cham. & Schltld.

Sin.: *Eryngium decaisneanum* Urb., *Eryngium oligodon* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ÑEE). URY(CAS, COL, MAL, MON).

Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroché

Sin.: *Eryngium paniculatum* Cav. & Dombey ex F. Delaroché var. *chilense* DC., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Eryngium paraguariense Urb.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). PRY(CAN).

Eryngium plantaginifolium H. Wolff

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU).

Eryngium pohlianum Urb.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eryngium polyrhizum Clos

Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(BIO).

Eryngium pristis Cham. & Schltld.

Sin.: *Eryngium pristis* Cham. & Schltld. var. *abbreviatum* H. Wolff, *Eryngium pristis* Cham. & Schltld. var. *mitigatum* Malme
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAA). URY(CLA, TYT).

Eryngium pseudojunceum Clos

Sin.: *Eryngium crantzoides* Griseb., *Eryngium fistulosum* Phil., *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *crantzoides*

(Griseb.) Phil., *Eryngium pseudojunceum*
Clos var. *fistulosum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, BIO,
ARA, LRI, LLA).

Eryngium pulchellum Phil.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Eryngium ramboanum Mathias &
Constance
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Eryngium raulinii Mathias &
Constance
Hierba. Endémica. 1000 m
Países: BRA(SCA).

Eryngium regnellii Malme
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY(LAV, MAL, MON, RNO).

Eryngium rochei Constance
Hierba. Endémica. 600 m
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Eryngium rojasii H. Wolff
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: PRY(AMA).

Eryngium rostratum Cav.
Sin.: *Eryngium rostratum* Cav. var.
diversifolium
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

Eryngium sanguisorba Cham. &
Schltdl.
Sin.: *Eryngium sanguisorba* Cham. &
Schltdl. var. *rosulatum* Urb.
Hierba. Nativa. 800-1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU,
CAA, CAN, CEN, ITA, MIE, SPE).
URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, PAY,
ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Eryngium sarcophyllum Hook. & Arn.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Eryngium scirpinum Cham. & Schltdl.
Hierba. Nativa. 100-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eryngium sellowii H. Wolff
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eryngium serra Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium platyphyllum* Decne.,
Eryngium serratum (St.-Hil.) Lag.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(RGS,
SCA). PRY(CEN). URY(CAS, FLA, MAL,
SJO, SOR).

Eryngium smithii Mathias &
Constance
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Eryngium stenophyllum Urb. var.
corymbosum Urb.
Hierba. Endémica. 900 m
Países: BRA(PAR).

Eryngium stenophyllum Urb. Var.
stenophyllum
Sin.: *Eryngium paniculatum* Cav.
& Dombey ex F. Delaroche var.
angustifolia-longifolia Cham. & Schltdl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, ITA).
URY(ART, RIV).

Eryngium subinerme (H. Wolff)
Mathias & Constance
Sin.: *Eryngium aquaticum* L. var.
subinerme H. Wolff
Hierba. Nativa. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eryngium urbanianum H. Wolff
Sin.: *Eryngium reitzii* Mathias &
Constance
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Eryngium zosterifolium H. Wolff
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Foeniculum Mill.

Foeniculum vulgare Mill.
Sin.: *Anethum foeniculum* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU,
RNE, SAL, SDE, SFE, SJU). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA,
RME, JFE). PRY(APY). URY(CAS, CLA,
MAL, MON).

Gymnophyton Clos

Gymnophyton flexuosum Clos
Sin.: *Asteriscium flexuosum* Drude,
Dipterygia flexuosa Kuntze, *Dipterygia*
kingii Kuntze, *Gymnophyton kingii* Phil.,
Gymnophyton robustum Clos var. *kingii* Reiche
Arbusto. Endémica. 800-2600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Gymnophyton foliosum Phil.
Sin.: *Dipterygia foliosa* Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Gymnophyton isatidicarpum (C.
Presl ex DC.) Mathias & Constance
Sin.: *Asteriscium isatidicarpum*
Hook. & Arn., *Asteriscium spinescens*
Drude, *Dipterygia isatidicarpa* C. Presl
ex DC., *Dipterygia spinescens* Kuntze,
Gymnophyton spinescens Phil., *Mulinum*
isatidicarpum C. Presl ex DC.
Arbusto. Endémica. 800-3500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Gymnophyton polycephalum (Gillies
& Hook.) Clos
Sin.: *Asteriscium anethoides* Turcz.,
Asteriscium polycephalum Gillies &
Hook., *Asteriscium polycephalum* Hieron.
ex H. Wolff, hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 1200-3200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJO).

Gymnophyton robustum Clos
Sin.: *Asteriscium robustum* Baill.
Arbusto. Endémica. 400-2500 m.
Países: CHL(TAR, ATA, COQ).

Gymnophyton spinosissimum Phil.
Sin.: *Asteriscium spinosissimum* Drude,
Dipterygia spinosissima Kuntze
Arbusto. Endémica. 2800-4500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Heracleum L.

Heracleum mantegazzianum
Sommier & Levier
Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Homalocarpus Hook. & Arn.

Homalocarpus bowlesioides Hook. & Arn.
Sin.: *Bowlesia cana* Phil., *Bowlesia elata*
Clos, *Bowlesia elegans* Clos

Hierba. Endémica. 900-1900 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Homalocarpus dichotomus (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance

Sin.: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *albo-squamata* Phil., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *chrysocarpa* Phil., *Bowlesia multiradiata* Colla

Hierba. Endémica. 400-3000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Homalocarpus digitatus (Phil.)

Mathias & Constance

Sin.: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *digitata* (Phil.) Domin, *Bowlesia digitata* Phil.

Hierba. Endémica. 800-1100 m.

Países: CHL(ATA).

Homalocarpus dissectus Mathias & Constance

Hierba. Endémica. 100-1400 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Homalocarpus integerrimus (Turcz.) Mathias & Constance

Sin.: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *integerrima* Domin, *Bowlesia integerrima* Turcz.

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, LBO).

Homalocarpus nigripetalus (Clos) Mathias & Constance

Sin.: *Bowlesia nigripetala* Clos

Hierba. Endémica. 200-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Levisticum Hill

Levisticum officinale W.D.J. Koch

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(LLA, MAG).

Lilaeopsis Greene

Lilaeopsis attenuata (Hook. & Arn.) Fernald

Sin.: *Crantzia attenuata* Hook. & Arn., *Lilaeopsis carolinensis* J.M. Coult. & Rose var. *attenuata* (Hook. & Arn.) A.W. Hill

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, LPA). URY(CLA, COL, FLA, MON, SOR).

Lilaeopsis brasiliensis (Glaz.) Affolter

Sin.: *Crantzia brasiliensis* Glaz., *Lilaeopsis carolinensis* J.M. Coult. & Rose var. *minor* A.W. Hill, *Lilaeopsis minor* (A.W. Hill) Pérez-Mor.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA). URY(MON, RIV, SJO, TAC).

Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose

Sin.: *Crantzia carolinensis* (J.M. Coult. & Rose) Chodat

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MEN, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI). URY(COL, MON, SJO).

Lilaeopsis macloviana (Gand.) A.W. Hill

Sin.: *Crantzia lineata* (Michx.) Nutt. var. *subulata* Wedd., nom. illeg., *Crantzia macloviana* Gand., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill f. *subulata* (Wedd.) Pérez-Mor., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill var. *microcarpa* Pérez-Mor., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill var. *multivittata* A.W. Hill, *Lilaeopsis andina* A.W. Hill, *Lilaeopsis exigua* Pérez-Mor., *Lilaeopsis hillii* Pérez-Mor., *Lilaeopsis lineata* Green, *Lilaeopsis patagonica* Pérez-Mor., *Lilaeopsis sinuata* A.W. Hill

Hierba. Nativa. 0-4700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Lilaeopsis tenuis A.W. Hill

Hierba. Endémica. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Notiosciadium Speg.

Notiosciadium pampicola Speg.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(BAI). URY(CAS, CLA, FLA, SAO, SJO, SOR, TYT).

Oenanthe L.

Oenanthe crocata L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI).

Oenanthe globulosa L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI). URY(MON).

Oligocladus Chodat & Wilczek

Oligocladus patagonicus (Speg.)

Pérez-Mor.

Sin.: *Oligocladus andinus* Chodat & Wilczek, *Sanicula patagonica* Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Osmorhiza Raf.

Osmorhiza chilensis Hook. & Arn.

Sin.: *Osmorhiza berteroi* DC., *Osmorhiza berteroi* DC. var. *gracilior*

Phil., *Schudia chilensis* Molina ex Clos

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Osmorhiza depauperata Phil.

Sin.: *Osmorhiza obtusa* (J.M. Coult. & Rose) Fernald, *Washingtonia obtusa* J.M. Coult. & Rose

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, MAG).

Osmorhiza glabrata Phil.

Sin.: *Elleimataenia renjifoana* (Phil.) Koso-Poliansky, *Myrrhis renjifoana* Phil., *Uraspermum glabratum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Osmorhiza mexicana Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Pastinaca L.

Pastinaca sativa L.

Sin.: *Anethum pastinaca* Wibel

Hierba. Introducida. 500-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME). URY(CAS, MON).

Petroselinum Hill

Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill

Sin.: *Apium crispum* Mill., *Ligusticum fernandezianum* Phil. ex Urb.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COS, LPA, SCR). BRA(SCA). CHL(VAL, JFE).

Pimpinella L.**Pimpinella anisum L.**

Sin.: *Seseli gilliesii* Hook. & Arn.
Hierba. Introducida. 400-1500 m.
Países: ARG(COR, MEN). BRA(SCA).

Pozoa Lag.**Pozoa coriacea Lag.**

Sin.: *Azorella coriacea* (Lag.) Kuntze,
Azorella hydrocotylifolia (Bridges)
Macloskie, *Pozoa denticulata* Meyen,
Pozoa hydrocotylifolia Bridges
Hierba. Endémica. 1000-4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, RME).

Pozoa volcanica Mathias & Constance

Sin.: *Azorella volcanica* (Mathias &
Constance) M. Hiroe
Hierba. Endémica. 1200-2400 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA).

Sanicula L.**Sanicula crassicaulis** Poepp. ex DC.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, RME, JFE).

Sanicula graveolens Poepp. ex DC.

Sin.: *Sanicula macrorrhiza* Bertero ex
Colla, *Sanicula macrorrhiza* Bertero ex
Colla var. *andina* Meigen
Hierba. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, AIS, RME).

Scandix L.**Scandix pecten-veneris L.**

Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(ERI). CHL(LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Seseli L.**Seseli libanotis** (L.) W.D.J. Koch

Sin.: *Ligusticum divaricatilobum* Clos,
Seseli pencanum Phil.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(BIO).

Sium L.**Sium latifolium L.**

Hierba. Introducida. 100-1300 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Spermolepis Raf.**Spermolepis castellanosi** Pérez-Mor.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,
MEN, NEU, RNE, SLU).

Tordylium L.**Tordylium maximum L.**

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SFE).

Torilis Adans.**Torilis arvensis** (Huds.) Link

Sin.: *Caucalis arvensis* Huds.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(MAU, BIO). URY(CLA,
LAV, RIV).

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

Sin.: *Tordylium nodosum* L.
Hierba. Introducida. 0-1900 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, SFE).
BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, RME, JFE). URY(CAS,
CLA, FLO, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).

APOCYNACEAE**Allamanda L.****Allamanda cathartica L.**

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Allamanda schottii Pohl

Sin.: *Allamanda neriifolia* Hook.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Araujia Brot.**Araujia angustifolia** (Hook. & Arn.) Steud.

Sin.: *Lagenia angustifolia* (Hook.
& Arn.) E. Fourn., *Physianthus*

angustifolius Hook. & Arn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, SDE, SFE). BRA(RGS). URY(ART,
PAY, SAO, SOR).

Araujia brachystephana (Griseb.)

Fontella & Goyder
Sin.: *Morrenia brachystephana* Griseb.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, SAL, SLU, SFE, SDE,
TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, NAS,
PHA). URY(PAY).

Araujia hassleriana (Malme) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia hassleriana* Malme
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON).

Araujia herzogii (Schltr.) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia herzogii* Schltr.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(SAL).

Araujia megapotamica (Spreng.) G. Don

Sin.: *Araujia fusca* Griseb., *Araujia
fusca* Griseb. var. *pallidiflora* Griseb.,
Lagenia megapotamica (Spreng.) E.
Fourn., *Physianthus megapotamicus*
Spreng.
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(PAI). URY(MON, PAY,
ROC, SAO).

Araujia odorata (Hook. & Arn.)

Fontella & Goyder
Sin.: *Cynanchum odoratum* Hook. & Arn.,
Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,
SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS).
PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, COA, ITA,
ÑEE, NAS, PAI, PHA). URY(COL, SJO).

Araujia plumosa Schltldl.

Enredadera. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
SAL, TUC). BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CEN,
COA, GUA, PAI).

Araujia scalae (Hicken) Fontella & Goyder

Sin.: *Hickenia scalae* (Hicken) Lillo,
Morrenia scalae (Hicken) Goyder,
Oxypetalum scalae Hicken
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE).

Araujia sericifera Brot.

Sin.: *Araujia albens* Decne., *Araujia hortorum* E. Fourn., *Araujia sericifera* Brot. var. *hortorum* (E. Fourn.) Malme, *Physianthus albens* Hook., hom. illeg. *Physianthus albens* Mart.

Enredadera. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APA, GUA, ITA). URY(CAS, CLA, FLO, MON, RIV, SAO).

Araujia stuckertiana (Kurtz ex Heger)

Fontella & Goyder subsp. **grandiflora** (Malme) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia grandiflora* Malme, *Morrenia stuckertiana* (Kurtz ex Heger) Malme subsp. *grandiflora* (Malme) Goyder

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, TUC).

Araujia stuckertiana (Kurtz ex Heger) Fontella & Goyder subsp. **stuckertiana**

Sin.: *Choristigma stuckertianum* Kurtz ex Heger, *Morrenia stuckertiana* (Kurtz ex Heger) Malme

Enredadera. Endémica. 100-1000 m.

Países: ARG(COR, SFE).

Araujia variegata (Griseb.) Fontella & Goyder

Sin.: *Morrenia connectens* Malme var. *hunzikeri* T. Mey., *Morrenia connectens* Malme, *Morrenia variegata* (Griseb.) T. Mey. var. *hunzikeri* (T. Mey.) T. Mey., *Morrenia variegata* (Griseb.) T. Mey., *Oxypetalum variegatum* Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

Asclepias L.**Asclepias aequicornu** E. Fourn.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, CEN).

Asclepias barjoniaefolia E. Fourn.

Sin.: *Asclepias kuntzei* Schltdl.

Hierba. Nativa. 1400-2600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Asclepias boliviensis E. Fourn.

Sin.: *Asclepias weddellii* E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Asclepias bracteolata E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Asclepias candida Vell.

Sin.: *Asclepias marginata* Decne.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, COA, PAI, SPE). URY(RIV).

Asclepias curassavica L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, IPA). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Asclepias fruticosa L.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SJU). URY(CAS, MON, SOR, TYT).

Asclepias langsdorfii E. Fourn.

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Asclepias mellodora A. St.-Hil.

Sin.: *Asclepias campestris* Decne. var. *angustifolia* Kuntze, *Asclepias campestris* Decne. var. *schlechteri* Kuntze, *Asclepias campestris* Decne., *Asclepias curupi* E. Fourn., *Asclepias jangadensis* S. Moore, *Asclepias marginata* Decne. var. *bodenbenderi* Kuntze, *Asclepias mellodora* A. St.-Hil. var. *bodenbenderi* (Kuntze) Bollwinkel, *Asclepias mellodora* A. St.-Hil. var. *minor* A. St.-Hil., *Asclepias mellodora* A. St.-Hil. var. *multinervis* (E. Fourn.) Bollwinkel, *Asclepias multinervis* E. Fourn., *Asclepias nervosa* Decne., *Asclepias papillosa* Silveira, *Asclepias umbellata* Vell.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Asclepias pilgeriana Schltr.

Sin.: *Asclepias flava* (Kuntze)Lillo,

Asclepias campestris Decne. var. *flava* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Asclepias selloana E. Fourn.

Hierba. Endémica. 500 m

Países: BRA(PAR).

Aspidosperma Mart. & Zucc.**Aspidosperma australe** Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma australe* Müll. Arg. var. *estrellense* Hassl., *Aspidosperma australe* Müll. Arg. var. *longipetiolatum* Hassl., nom. nud., *Aspidosperma missionum* Speg., *Aspidosperma occidentale* Malme

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

Aspidosperma camporum Müll. Arg.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aspidosperma cuspa (Kunth) S.F. Blake

Sin.: *Aspidosperma sellowii* Müll. Arg. var. *collinum* Hassl., *Conoria cuspa* Kunth

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma cylindrocarpon* Müll. Arg. var. *longepetiolatum* Hassl., *Aspidosperma cylindrocarpon* Müll. Arg. var. *macrophyllum* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CON).

Aspidosperma macrocarpon C. Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON).

Aspidosperma nobile Müll. Arg.

Sin.: Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Aspidosperma parvifolium A. DC.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma dugandii* Standl., *Aspidosperma peroba* Allemão ex Saldanha, *Aspidosperma polyneuron* Müll. Arg. var. *longifolium* Hassl.,

Aspidosperma venosum Müll. Arg.,
Thyroma polyneura (Müll. Arg.) Miers
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Aspidosperma pyricollum Müll. Arg.
Sin.: *Aspidosperma olivaceum* Müll. Arg.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON).

Aspidosperma pyrifulium C. Mart.
Sin.: *Aspidosperma guaraniticum*
Malme, *Aspidosperma australe* Müll. Arg.
var. *erythroxyllum* Hassl., nom. nud.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, AMA, CON, PHA).

Aspidosperma quebracho-blanco
Schltdl.

Sin.: *Aspidosperma crotalorum*
Speg., *Aspidosperma quebracho-*
blanco Schltdl. f. *malmeana* Markgr.,
Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. f.
schlechtendaliana Markgr., *Aspidosperma*
quebracho-blanco Schltdl. f. *spgaziana*
Markgr., *Aspidosperma quebracho-*
colorado Schltdl. var. *pendula* Speg.,
Aspidosperma quebrachoideum Rojas
Acosta, *Macaglia quebracho* Kuntze,
nom. superfl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE,
SJU, SLU, TUC). PRY(APY, CEN, CON,
ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, PAY, RNO,
RIV, SAO, SJO).

Aspidosperma ramiflorum Müll. Arg.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aspidosperma riedelii Müll. Arg.
Sin.: *Aspidosperma reductum* (Hassl.)
Woodson, *Aspidosperma riedelii* Müll.
Arg. f. *microphyllum* Hassl., *Aspidosperma*
riedelii Müll. Arg. subsp. *reductum* Hassl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, CEN, CON).

Aspidosperma subincanum A.DC.
Sin.: *Aspidosperma chodatii* Markgr.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Aspidosperma tomentosum C. Mart.
Sin.: *Aspidosperma quirandy* Hassl.
var. *angustifolium* Hassl. *Aspidosperma*

quirandy Hassl. var. *campestre* Hassl.,
Aspidosperma quirandy Hassl. var. *silvaticum*
Hassl., *Aspidosperma rojasii* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,
CAN, CON).

Aspidosperma triternatum Rojas
Acosta
Sin.: *Aspidosperma chakensis* Speg.,
Aspidosperma horko-kebracho Speg.,
Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. subsp.
brevifolium Hassl., *Aspidosperma quebracho-*
blanco Schltdl. var. *ellipticum* Markgr.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
SAL, SFE). PRY(APY, CON, PHA).

Austrochthamalia Morillo &
Fontella

Austrochthamalia major (E. Fourn.)
Morillo & Fontella

Sin.: *Chthamalia major* E. Fourn.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CAU).

Austrochthamalia teyucuaensis
H.A. Keller

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Barjonia Decne.

Barjonia erecta (Vell.) K. Schum.
Sin.: *Apocynum erectum* Vell., *Barjonia*
obtusifolia E. Fourn., *Barjonia racemosa*
Decne., *Barjonia warmingii* E. Fourn.
Subarbusto. Nativa. 300-1400 m.
Países: BRA(PAR).

Blepharodon Decne.

Blepharodon angustifolius Malme
Enredadera. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(COA).

Blepharodon ampliflorum E. Fourn.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Blepharodon bicuspidatum E. Fourn.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Blepharodon lineare (Decne.) Decne.

Sin.: *Blepharodon ampliflorum* E. Fourn.,
Matelea linearis Decne., *Nephradenia linearis*
(Decne.) Benth. ex E. Fourn.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, PAI, SPE).

Blepharodon pictum (Vahl) W.D.
Stevens

Sin.: *Blepharodon nitidum* (Vell.)
J.F. Macbr. *Cynanchum nitidum* Vell.,
Cynanchum pictum Vahl
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,
CON, COA, PAI, SPE).

Blepharodon reflexum Malme

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(SPE).

Brargentina Morillo & H.A. Keller

Brargentina bornmuelleri (Schltr. ex
Malme) Morillo & H.A. Keller
Sin.: *Gyrostelma bornmuelleri* Schltr. ex
Malme, *Rojasia bornmuelleri* (Schltr. ex
Malme) Fontella, S. Cáceres & R. Santos
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS). PRY(MIE).

Calotropis R. Br.

Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton
Sin.: *Asclepias procera* Aiton
Arbusto o arbolito. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY).

Catharanthus G. Don

Catharanthus roseus (L.) G. Don
Sin.: *Ammocallis rosea* (L.) Small, *Lochnera*
rosea (L.) Rchb. ex Endl., *Vinca rosea* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY, CEN,
PAI). URY(SAO).

Condylocarpon Desf.

Condylocarpon isthmicum (Vell.) A.DC.
Sin.: *Condylocarpon rauwolfiae* (A. DC.)
Müll. Arg., *Condylocarpon rauwolfiae* (A.

DC.) Müll. Arg. var. *acuminulata* Müll. Arg., *Condylocarpon rauwolfiae* (A. DC.) Müll. Arg. var. *tomentosa* Müll. Arg., *Echites isthmicus* Vell.

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN). URY(ART, SAO).

Cristobalia Morillo, S.A. Cáceres & H.A. Keller

Cristobalia bella Morillo, H.A. Keller & S.A. Cáceres

Subarbusto. Endémica. 200-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Cristobalia hirsutissima (Schltr.)

Morillo, S.A. Cáceres & H.A. Keller
Sin.: *Gonolobus hirsutissimus* Schltr., *Gonolobus lilloanus* T. Mey., *Matelea hirsutissima* (Schltr.) Goyder, *Matelea lilloana* (T. Mey.) Pontiroli
Subarbusto. Nativa. 1700-2700 m.
Países: ARG(SAL).

Cynanchum L.

Cynanchum montevidense Spreng.

Sin.: *Asclepias cordata* Vell., *Asclepias foetida* Cav., *Cynanchum foetidum* (Cav.) Kunth, *Cynanchum tamifolium* Hook. & Arn., *Roulinia acuta* Decne., *Roulinia blanda* Decne., *Roulinia convolvulacea* Decne., *Roulinia cordata* (Vell.) J.F. Macbr., *Roulinia fluminensis* Decne., *Roulinia mannii* Rusby, *Roulinia modesta* Decne., *Roulinia montevidensis* (Spreng.) Malme, *Roulinia riedelii* E. Fourn., *Roulinia selloana* E. Fourn., *Roulinia tamifolia* (Hook. & Arn.) Decne., *Roulinia versicolor* Lem., *Telminostelma foetidum* (Cav.) Fontella & E.A. Schwarz, *Vincetoxicum montevidense* (Spreng.) Kuntze

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CEN, CON, COA, PHA, SPE). URY(MON, SJO).

Cynanchum rioparanense Sundell

Enredadera. Nativa
Países: BRA(PAR)

Cynanchum roulinioides (E.

Fourn.) Rapini
Sin.: *Telminostelma roulinioides* E. Fourn.

Enredadera. Nativa. 300 m
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Diplolepis R. Br.

Diplolepis australis (Malme) Hechem & C. Ezcurra

Sin.: *Metastelma australe* Malme, *Tweedia odonellii* T. Mey., *Tweedia australis* (Malme) C. Ezcurra
Hierba o subarbusto. Endémica. 300-1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Diplolepis biflora (Phil.) Hechem & C. Ezcurra

Sin.: *Cynoctonum biflorum* Phil., *Cynanchum nummulariifolium* Hook. & Arn. var. *biflorum* (Phil.) Reiche, *Diplolepis nummulariifolia* (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. *biflora* (Phil.) Hechem & C. Ezcurra
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL, BIO, ARA, RME).

Diplolepis boerhaviifolia (Hook. & Arn.) Liede & Rapini

Sin.: *Cynanchum boerhaviifolium* Hook. & Arn., *Cynoctonum boerhaviifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Oxypetalum parvifolium* Phil., hom. illeg., *Schizostemma kingii* Phil.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Diplolepis bulligera (Speg.) Hechem & C. Ezcurra

Sin.: *Cynanchum bulligerum* (Speg.) Macloskie & Dusén, *Vincetoxicum bulligerum* Speg.
Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: ARG(CHU).

Diplolepis descolei (T. Mey.) Liede & Rapini

Sin.: *Cynanchum descolei* T. Mey.
Enredadera. Endémica. 300-800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Diplolepis diemii (T. Mey.) Hechem & C. Ezcurra

Sin.: *Cynanchum diemii* T. Mey.
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Diplolepis geminiflora (Decne.) Liede & Rapini

Sin.: *Astephanus geminiflorus* Decne.
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Diplolepis hieronymi (Lorentz) Liede & Rapini

Sin.: *Astephanus fallax* (Hicken) T. Mey., *Astephanus hieronymi* (Lorentz) Malme, *Cynanchum fallax* Hicken, *Cynanchum hieronymi* (Lorentz) Hicken, *Grisebachiella hieronymi* Lorentz
Arbusto. Endémica. 600-1800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(MAU).

Diplolepis menziesii Schult. f.

Enredadera. Endémica. 300-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Diplolepis mucronata (Decne.)

Hechem & C. Ezcurra
Sin.: *Cynanchum chilense* (Phil.) Malme, *Cynoctonum mucronatum* Decne., *Cynanchum mucronatum* (Decne.) Reiche, comb. illeg., *Holostemma chilense* Phil., *Vincetoxicum mucronatum* (Decne.) Kuntze
Enredadera. Endémica. 800-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

Diplolepis myrtifolia (Hook. & Arn.)

Hechem & C. Ezcurra
Sin.: *Cynanchum myrtifolium* Hook. & Arn., *Cynoctonum myrtifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Cynoctonum nemorosum* Phil., *Vincetoxicum nemorosum* (Phil.) Kuntze
Enredadera. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ARA, LRI, LLA).

Diplolepis nummulariifolia (Hook. & Arn.) Liede & Rapini

Sin.: *Cynanchum andinum* Liede, *Cynanchum nanellum* P.T. Li, *Cynanchum nanissimum* Liede, nom. illeg., *Cynanchum nanum* Skottsbl., hom. illeg., *Cynanchum nummulariifolium* Hook. & Arn., *Cynanchum patagonicum* (Phil.) Malme, *Cynanchum undulatum* (Decne.) K. Schum., *Cynoctonum nummulariifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Cynoctonum patagonicum* Phil., *Cynoctonum undulatum* Decne., *Vincetoxicum nummularifolium* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Vincetoxicum patagonicum* (Phil.) Kuntze, *Vincetoxicum undulatum* (Decne.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 700-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Diplolepis pachyphylla (Decne.)

Hechem & C. Ezcurra
Sin.: *Cynanchum acutifolium* (Phil.)

Reiche, *Cynanchum chilense* (Decne.)
Malme, *Cynanchum lancifolium* Hook. &
Arn., hom. illeg., *Cynanchum pachyphyllum*
(Decne.) K. Schum., *Cynoctonum*
acutifolium Phil., *Cynoctonum chilense*
Decne., *Cynoctonum pachyphyllum* Decne.,
Vincetoxicum chilense (Decne.) Kuntze,
Vincetoxicum pachyphyllum (Decne.) Kuntze
Enredadera. Endémica. 100-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Diplolepis viridis (Phil.) Hechem &
C. Ezcurra
Sin.: *Cynanchum atacamense* Liede,
Cynanchum deserticola A.R. Flores & J.M.
Watson, *Cynanchum viride* (Phil.) Reiche,
nom. illeg., *Cynoctonum viride* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Ditassa R. Br.

Ditassa burchellii Hook. & Arn.
Sin.: *Cynanchum bonariense* (Decne.)
T. Mey., *Ditassa anomala* Mart., *Ditassa*
bonariensis Decne.
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CON, PAI).

Ditassa edmundoi Fontella & C.
Valente
Enredadera. Endémica. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Ditassa hispida (Vell.) Fontella
Sin.: *Asclepias hispida* Vell., *Ditassa*
paranensis Malme, *Ditassa rufescens* Decne.
Enredadera. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Ditassa megapotamica (Spreng.) Malme
Sin.: *Ditassa oxypetala* Decne.,
Oxypetalum megapotamicum Spreng.
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY(SJO, SOR).

Ditassa obcordata Mart.
Sin.: *Ditassa niruri* Decne.
Enredadera. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Ditassa racemosa Britton
Enredadera. Nativa. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Ditassa tomentosa (Decne.) Fontella
Sin.: *Metastelma tomentosum* Decne.
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR).

Elytropus Müll. Arg.

Elytropus chilensis (A. DC.) Müll. Arg.
Sin.: *Echites chilensis* A. DC., *Echites*
heterophyllus Miq., *Echites pubescens*
Hook. & Arn., hom. illeg., *Echites*
ptarmicus Poepp.
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(RNE). CHL(LBO, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Fischeria DC.

Fischeria stellata (Vell.) E. Fourn.
Sin.: *Cynanchum stellatum* Vell.,
Fischeria martiana Decne.
Enredadera o liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, ITA).

Forsteronia G. Mey.

Forsteronia australis Müll. Arg.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Forsteronia correntina C. Ezcurra &
Tressens
Liana. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Forsteronia glabrescens Müll. Arg.
Sin.: *Thyrsanthus glabrescens* (Müll.
Arg.) Miers
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).
URY(ART, SAO).

Forsteronia leptocarpa (Hook. &
Arn.) A. DC.
Sin.: *Parsonia leptocarpa* Hook. &
Arn., *Thyrsanthus leptocarpus* (Hook. &
Arn.) Griseb.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Forsteronia pubescens A. DC.
Sin.: *Thyrsanthus leptocarpus* (Hook.
& Arn.) Griseb. var. *pubescens* (A. DC.)

Griseb., *Thyrsanthus placidus* Miers,
Thyrsanthus pubescens (A. DC.) Miers
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAN,
CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Forsteronia refracta Müll. Arg.
Sin.: *Forsteronia floribunda* Müll. Arg.,
hom. illeg., *Forsteronia lagoensis* Müll.
Arg., *Thyrsanthus myrianthus* Miers
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, PAI).

Forsteronia rufa Müll. Arg.
Sin.: *Forsteronia rufa* Müll. Arg. var.
subglabra Malme, *Thyrsanthus rufus*
(Müll. Arg.) Miers
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Forsteronia thyrsoides (Vell.)
Müll. Arg. var. **glabriuscula** (A. DC.)
Woodson
Sin.: *Forsteronia multinervia* A. DC.
var. *glabriuscula* A. DC.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll.
Arg. var. **thyrsoides**
Sin.: *Echites thyrsoides* Vell.,
Forsteronia multinervia A. DC.,
Thyrsanthus multinervius (A. DC.) Miers
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, PAI).

Forsteronia velloziana (A. DC.)
Woodson
Sin.: *Echites velloziana* A. DC.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Funastrum E. Fourn.

Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.
Sin.: *Cynanchum clausum* (Jacq.) Jacq.,
Funastrum bonariense (Hook. & Arn.)
Schltdl., *Funastrum riparium* (Decne.)
Schltr., *Philibertia bonariensis* (Hook. &
Arn.) Malme, *Philibertia riparia* (Decne.)
Malme, *Sarcostemma bonariense* Hook. &
Arn., *Sarcostemma clausum* (Jacq.) Roem. &
Schult., *Sarcostemma riparium* Decne.
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE).

BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA). URY(ART).

Funastrum flavum (Decne.) Malme
Sin.: *Ceramanthus flavus* (Decne.)
Malme, *Cystostemma umbellatum* E.
Fourn., *Funastrum longifolium* (Arechav.)
Schltr., *Philibertia longifolia* Arechav.,
Philibertia stellaris Griseb., *Sarcostemma
flavum* Decne.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE).
BRA(RGS). URY(CAS, CLA, MON, SJO).

Funastrum gracile (Decne.) Schltr.
Sin.: *Amphistelma exsertum* Griseb.,
Ceramanthus gracilis (Decne.) Malme,
Philibertia exserta (Griseb.) Schltr.,
Sarcostemma carpophylloides Morong,
Sarcostemma gracile Decne.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR,
FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC).
PRY(APY).

Gomphocarpus R. Br.

Gomphocarpus physocarpus E. Mey.
Subarbusto. Introducida. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gonolobus Michx.

Gonolobus parviflorus Decne.
Sin.: *Exolobus selloanus* E. Fourn.,
Gonolobus selloanus (E. Fourn.)

Bacigalupo
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CEN, COA). URY(ART, PAY, SAO).

Gonolobus rostratus (Vahl) Roem. &
Schult.

Sin.: *Cynanchum rostratum* Vahl,
Cynanchum rotatum Vell., *Exolobus
patens* (Decne.) E. Fourn. var.
paraguayensis Malme, *Exolobus patens*
(Decne.) E. Fourn., *Exolobus rotatus*
(Vell.) E. Fourn., *Gonolobus patens*
Decne., *Gonolobus rotatus* (Vell.) Decne.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CEN, COA, SPE).

Hancornia Gomes

Hancornia speciosa Gomes
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,
CON, SPE).

Hemipogon Decne.

Hemipogon acerosus Decne.
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(AMA).

Hemipogon setaceus Decne.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Ibatia Decne.

Ibatia boliviensis (Schltr.) Morillo
Sin.: *Gonolobus boliviensis* (Schltr.)
T. Mey., *Matelea boliviensis* (Schltr.)
Goyder, *Pseudibatia boliviensis* Schltr.
Enredadera. Nativa. 2500-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Ibatia schreiteri (T. Mey.) Morillo
Sin.: *Gonolobus schreiteri* T. Mey.,
Matelea schreiteri (T. Mey.) Pontiroli
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ibatia venturii (Malme) Morillo
Sin.: *Gonolobus venturii* Malme
Endémica. 1400-1500 m.
Países: ARG(TUC).

Jobinia E. Fourn.

Jobinia connivens (Hook. & Arn.) Malme
Sin.: *Cynanchum connivens* Hook.
& Arn., *Jobinia hernandifolia* (Decne.)
E. Fourn., *Metastelma hernandifolium*
Decne., *Roulinia connivens* (Hook. &
Arn.) Decne.
Enredadera. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(TYT).

Jobinia fontellana Liede & Meve
Sin.: *Orthosia hatschbachii* Fontella & Goes
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Jobinia glossostemma (Lillo ex T.
Mey.) Liede & Meve
Sin.: *Cynanchum glossostemma* Lillo,

nom. nud., *Cynanchum glossostemma*
Lillo ex T. Mey.
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Jobinia hatschbachii Fontella & E.A.
Schwarz
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Jobinia latipes (Decne.) Liede & Meve
Sin.: *Cyathostelma latipes* (Decne.)
E. Fourn., *Metastelma latipes* Decne.,
Orthosia latipes (Decne.) Malme
Enredadera. Nativa. 400 m
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Jobinia lindbergii E. Fourn.
Sin.: *Cyathostelma furcatum* E. Fourn.,
Jobinia furcata (E. Fourn.) Fontella
Liana. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Jobinia paranaensis Fontella & C.
Valente
Enredadera. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Jobinia samuelssonii (Malme) Liede
& Meve
Sin.: *Cynanchum samuelssonii* Malme
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Jobinia trifurcata (Griseb.) Liede & Meve
Sin.: *Cynanchum argentinense* Liede,
Cynanchum trifurcatum (Griseb.) Lillo,
nom. illeg., *Metastelma trifurcatum*
Griseb.
Enredadera. Nativa. 1500-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SJU,
SLU, TUC).

Macropharynx Rusby

Macropharynx macrocalyx (Müll.
Arg.) J.F.Morales, M.E. Endress & Liede
Sin.: *Echites macrocalyx* Müll. Arg.,
Peltastes macrocalyx (Müll. Arg.)
Woodson, *Peltastes stemmadeniiflorus*
Woodson
Liana. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Macropharynx meyeri (C. Ezcurra)
Xifreda
Sin.: *Temnadenia meyeri* C. Ezcurra
Liana. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Macropharynx peltata (Vell.) J.F.

Morales, M.E. Endress & Liede

Sin.: *Echites peltatus* Vell., *Peltastes malvaeflorus* Woodson, *Peltastes peltatus* (Vell.) Woodson

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, ITA).

Macroscepis Kunth**Macroscepis aurea** E. Fourn.

Liana. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA).

Macroscepis dutrae (Malme) Morillo

Sin.: *Gonolobus dutrae* Malme

Liana. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Macroscepis hatschbachii Morillo

Liana. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Macroscepis magnifica Malme

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(APA).

Macroscepis selloana E. Fourn.

Liana. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Malouetia DC.**Malouetia cestroides** (Nees) Müll. Arg.

Sin.: *Tabernaemontana cestroides* Nees

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Mandevilla Lindl.**Mandevilla angustifolia** (Malme)

Woodson

Sin.: *Dipladenia angustifolia* Malme,

Mandevilla minor Woodson

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, CON, PAI, PHA).

Mandevilla atrovioleacea (Stadelm.)

Woodson

Sin.: *Echites atrovioleacea* Stadelm.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mandevilla brachyloba (Müll. Arg.) K.

Schum.

Sin.: *Amblyanthera brachyloba* Müll. Arg.,

Echites brachylobus (Müll. Arg.) Miers

Enredadera. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.)

Woodson

Sin.: *Dipladenia saponariae* A. DC.,

Dipladenia xanthostoma (Stadelm.)

Müll. Arg., *Echites coccineus* Hook. &

Arn., *Echites xanthostoma* Stadelm.,

Rhodocalyx ovatus Miers, nom. superfl.,

Rhodocalyx tweedianus Miers, nom.

superfl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA). URY(RIV, ROC, TAC).

Mandevilla emarginata (Vell.) C. Ezcurra

Sin.: *Echites emarginatus* Vell., *Echites*

erectus Vell., hom. illeg., *Laseguea*

acutifolia A. DC., *Laseguea erecta* (Vell.)

Müll. Arg. var. *acutifolia* (A. DC.) Müll.

Arg., *Laseguea erecta* (Vell.) Müll. Arg.

var. *glabra* (A. DC.) Müll. Arg., *Laseguea*

erecta (Vell.) Müll. Arg. var. *scabrinervia*

Müll. Arg., *Laseguea erecta* Müll. Arg.,

Laseguea glabra A. DC., *Mandevilla erecta*

(Vell.) Woodson, comb. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA). URY(CLA, RIV).

Mandevilla funiformis (Vell.) K. Schum.

Sin.: *Echites funiformis* Vell.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mandevilla grata Woodson

Enredadera. Endémica. 200-500 m.

Países: ARG(TUC).

Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum.

Sin.: *Echites hirsuta* Rich.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Mandevilla illustris (Vell.) Woodson

Sin.: *Echites illustris* Vell.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA).

Mandevilla immaculata Woodson

Enredadera. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.)

Woodson

Sin.: *Amblyanthera bridgesii* Müll.

Arg., *Echites laxus* Ruiz & Pav., *Echites*

suaveolens (Lindl.) A. DC., *Mandevilla*

bridgesii (Müll. Arg.) Woodson,

Mandevilla suaveolens Lindl.

Enredadera o liana. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Mandevilla longiflora (Desf.) Pichon

Sin.: *Echites guaraniticus* A. St.-Hil.,

Echites longiflorus Desf., *Macrosiphonia*

longiflora (Desf.) Müll. Arg.,

Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll.

Arg. var. *guaranitica* (A. St.-Hil.) Malme

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA,

MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Mandevilla pentlandiana (A. DC.)

Woodson

Sin.: *Echites bracteatus* (Hook. & Arn.)

Griseb., *Echites tweediana* Hieron., nom.

superfl., *Laseguea bracteata* (Hook.

& Arn.) K. Schum., *Laseguea hookeri*

Müll. Arg., nom. superfl., *Laseguea*

pentlandiana A. DC., *Parsonia bracteata*

Hook. & Arn.

Enredadera o liana. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI,

SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA).

Mandevilla petraea (A. St.-Hil.)

Pichon

Sin.: *Echites grandiflorus* Hook. &

Arn., hom. illeg. var. *minor* Hook. &

Arn., *Echites petreus* A. St.-Hil., *Echites*

pinifolia A. St.-Hil., *Macrosiphonia*

balansae Chodat, *Macrosiphonia petraea*

(A. St.-Hil.) K. Schum. var. *minor*

(Hook.) Woodson, *Macrosiphonia petraea*

(A. St.-Hil.) K. Schum. var. *pinifolia* (A.

St.-Hil.) Woodson, *Macrosiphonia petraea*

(A. St.-Hil.) K. Schum., *Macrosiphonia*

pinifolia (A. St.-Hil.) Malme, hom. illeg.,

Macrosiphonia pinifolia (A. St.-Hil.)

Miers f. *glabrata* Chodat & Vischer,

Macrosiphonia pinifolia (A. St.-Hil.)

Miers f. *setosa* Chodat & Vischer,

Macrosiphonia pinifolia (A. St.-Hil.)

Miers, *Macrosiphonia verticillata* Müll.

Arg., *Macrosiphonia verticillata* Müll. Arg.

var. *intermedia* Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,

ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE,

SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Mandevilla pohliana (Stadelm.)

A.H. Gentry

Sin.: *Dipladenia gentianooides* A. DC. var. *velutina* (Mart. ex Stadelm.) Müll. Arg., *Dipladenia gentianooides* A. DC., *Dipladenia velutina* (Mart. ex Stadelm.) A. DC., *Echites pohlianus* Stadelm., *Echites velutina* Mart. ex Stadelm., hom. illeg., *Mandevilla pohliana* (Stadelm.) A.H. Gentry var. *velutina* (Stadelm.) A.H. Gentry, *Mandevilla velutina* (Mart. ex Stadelm.) Woodson, comb. illeg., *Mandevilla velutina* (Mart. ex Stadelm.) Woodson, comb. illeg. var. *glabra* (Müll. Arg.) Woodson

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(FOR, JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).

Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex

Roem. & Schult.) K. Schum.

Sin.: *Echites scabra* Hoffmanns. ex Roem. & Schult.

Liana. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mandevilla sellowii (Müll. Arg.)

Woodson

Sin.: *Dipladenia sellowii* Müll. Arg.

Enredadera. Nativa. 300-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mandevilla spigeliiflora (Stadelm.)

Woodson

Sin.: *Echites spigeliiflora* Stadelm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Mandevilla undulata (C. Ezcurra) A.O.

Simões, Kin.-Gouv. & M.E. Endress

Sin.: *Macrosiphonia undulata* C.

Ezcurra

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).

Mandevilla urophylla (Hook. f.)

Woodson

Sin.: *Dipladenia urophylla* Hook. f.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mandevilla velame (A. St.-Hil.) Pichon

Sin.: *Echites velame* A. St.-Hil.,

Macrosiphonia velame (A. St.-Hil.) Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Mandevilla virescens (A. St.-Hil.)

Pichon

Sin.: *Echites virescens* A. St.-Hil.,

Macrosiphonia virescens (A. St.-Hil.)

Müll. Arg., *Macrosiphonia virescens*

(A. St.-Hil.) Müll. Arg. var. *missionum*

Chodat

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

PRY(AMA).

Mandevilla widgrenii C. Ezcurra

Sin.: *Dipladenia linearis* Müll.

Arg., *Mandevilla linearis* (Müll. Arg.)

Woodson, hom. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN).

Marsdenia R. Br., nom. cons.

Marsdenia castillonii Lillo ex T. Mey.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, FOR, LRI, SAL, TUC). PRY(APY).

Marsdenia guaranitica Malme

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Marsdenia paraguayensis Morillo

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Marsdenia tressensiae S.A. Cáceres &

Morillo

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Matelea Aubl.

Matelea australis (Malme) Pontiroli

Sin.: *Gonolobus australis* (Malme)

Herter, *Pseudibatia australis* Malme

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS).

PRY(CAU). URY(LAV, RNO, TAC).

Matelea balansae Morillo & Fontella

Enredadera. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CAU).

Matelea calchaquina C. Ezcurra &

Belgrano

Subarbusto. Endémica.

Países: ARG(SAL).

Matelea denticulata (Vahl) Fontella &

E.A. Schwarz

Sin.: *Cynanchum denticulatum* Vahl,

Cynanchum viride Vell., *Gonolobus*

denticulatus (Vahl) W.D. Stevens,

Gonolobus obtusiflorus Decne., *Gonolobus*

stelliflorus E. Fourn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Matelea dusenii Morillo

Enredadera. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Matelea fiebrigii (Schltr.) Goyder

Sin.: *Gonolobus argentinensis* T. Mey.,

Gonolobus argentinensis T. Mey. var.

macrophyllus T. Mey., *Gonolobus fiebrigii*

Schltr., *Matelea argentinensis* (T. Mey.)

Pontiroli

Enredadera. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Matelea foetida (Griseb.) C. Ezcurra &

Belgrano

Sin.: *Gonolobus lanatus* Griseb.,

Gonolobus foetidus Griseb., *Pseudibatia*

foetida (Griseb.) Malme

Subarbusto. Nativa.

Países: ARG(CAT, COR, LRI).

Matelea friesii (Malme) Goyder

Sin.: *Gonolobus friesii* (Malme) T. Mey.,

Pseudibatia friesii Malme

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL, TUC). PRY(PHA).

Matelea glaziovii (E. Fourn.) Morillo

Sin.: *Phaeostemma glaziovii* E. Fourn.

Enredadera. Nativa. 400-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Matelea hatschbachii (Fontella & C.

Valente) Morillo

Sin.: *Gonolobus hatschbachii* Fontella &

C. Valente

Enredadera. Endémica. 100-500 m.

Países: BRA(PAR).

Matelea hirta (Malme) Goyder

Sin.: *Gonolobus hirtus* Griseb. var.

longipedunculatus T. Mey., *Gonolobus*

hirtus Griseb., hom. illeg., *Matelea*

chacoensis Goyder, nom. superfl.,

Pseudibatia hirta Malme

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(SAL, SDE, TUC).

Matelea hispida (Hook. & Arn.)

Bacigalupo

Sin.: *Gonolobus hispidus* Hook. & Arn.,
Pseudibatia lanata (Griseb.) Malme,
Pseudibatia stuckertii Malme
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, SFE, SLU, TUC).

Matelea orthosoides (E. Fourn.)

Fontella

Sin.: *Gonolobus orthosoides* E. Fourn.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Matelea pyrrhotricha (Decne.)

Fontella

Sin.: *Gonolobus pyrrhotricha* Decne.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Matelea reitzii Fontella

Enredadera. Endémica. 900 m
Países: BRA(SCA).

Mesechites Müll. Arg.

Mesechites mansoana (A. DC.)

Woodson

Sin.: *Echites mansoana* A. DC.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CEN).

Mesechites trifidus (Jacq.) Müll. Arg.

Sin.: *Echites trifidus* Jacq., *Echites
sanctae-crucis* S. Moore, *Echites trifidus*
Jacq. var. *sanctae-crucis* (S. Moore)
Malme, *Mesechites sanctae-crucis* (S.
Moore) Woodson
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
SAL, SFE). BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, CEN,
CON, COA, PAI, PHA, SPE).

Metalepis Griseb.

Metalepis cubensis (A. Rich.) Griseb.

Sin.: *Cynanchum ekmanii* (Malme)
Sundell, nom. illeg., *Cynanchum
caudiculatum* Rapini, *Gonolobus cubensis*
A. Rich., *Roulinia ekmanii* Malme,
Telminostelma ekmanii (Malme) Fontella
& E.A. Schwarz
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Metastelma R. Br.

Metastelma microgynostegia

Pontiroli

Enredadera. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ).

Metastelma oranensis Lillo ex T. Mey.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Metastelma parviflorum (Sw.) Schult.

Sin.: *Cynanchum parviflorum* Sw.,
Metastelma tubatum Griseb.
Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SLU,
SDE, TUC). PRY(APY).

Minaria T.U.P. Konno & Rapini

Minaria acerosa (Mart.) T.U.P. Konno

& Rapini

Sin.: *Ditassa acerosa* Mart., *Ditassa
ericoides* Decne.
Subarbusto. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Morrenia Lindl.

Morrenia intermedia T. Mey.

Enredadera. Endémica. 1000 m
Países: ARG(SLU).

Morrenia stormiana (Morong) Malme

Sin.: *Araujia stormiana* Morong,
Morrenia incana S. Moore, *Morrenia
schulziana* T. Mey.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SFE).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, CON, PHA).

Nautonia Decne.

Nautonia nummularia Decne.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, SPE).

Orthosia Decne.

Orthosia congesta Decne.

Sin.: *Orthosia congesta* Decne. var.
brachystephana Malme
Enredadera. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA).

Orthosia dusenii (Malme) Fontella

Sin.: *Metastelma dusenii* Malme
Enredadera. Endémica. 1200-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Orthosia guilleminiana (Decne.)

Liede & Meve

Sin.: *Cynanchum trilobulatum* Lillo,
Vincetoxicum guilleminianum Decne.
Enredadera. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Orthosia loandensis Fontella & C.

Valente

Enredadera. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(PAR).

Orthosia multiflora E. Fourn.

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve

Sin.: *Amphistelma aphyllum* (Vell.)
E. Fourn., *Amphistelma melantherum*
(Decne.) E. Fourn., *Amphistelma scoparia*
(Nutt.) Small, *Amphistelma tomentosum*
E. Fourn., *Cynanchum aphyllum* Vell.,
Cynanchum floridum Vell., *Cynanchum
melantherum* (Decne.) T. Mey., *Cynanchum
scoparium* Nutt., *Cynanchum subulatum*
Vell., *Cynoctonum scoparium* (Nutt.)
Chapm., *Metastelma aphyllum* (Vell.)
Decne., *Metastelma melantherum* (Decne.)
K. Schum., *Metastelma scoparium* (Nutt.)
Vail, *Orthosia aphylla* (Vell.) Malme,
Orthosia melanthera (Decne.) Malme,
Orthosia tomentosa (E. Fourn.) Malme,
Tassadia subulata (Vell.) Fontella & E.A.
Schwarz var. *florida* (Vell.) Fontella &
E.A. Schwarz, *Tassadia subulata* (Vell.)
Fontella & E.A. Schwarz var. *tomentosa*
(E. Fourn.) Fontella, *Tassadia subulata*
(Vell.) Fontella & E.A. Schwarz,
Vincetoxicum aphyllum (Vell.) Kuntze,
Vincetoxicum melantherum Decne.,
Vincetoxicum scoparium (Nutt.) A.W.
Wood, *Vincetoxicum tomentosum* (E.
Fourn.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Orthosia urceolata E. Fourn.

Sin.: *Cynanchum congestum* Vell.,
Cynanchum urceolatum (E. Fourn.) K.
Schum., *Orthosia decaisnei* E. Fourn.,
Vincetoxicum congestum (Vell.) Kuntze,
Vincetoxicum urceolatum (E. Fourn.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 200-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Orthosia virgata (Poir.) E. Fourn.

Sin.: *Astephanus streptocarpus* E. Fourn., *Cynanchum diffusum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Ionidium diffusum* Gillies ex Hook. & Arn., *Metastelma diffusum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Decne., *Metastelma virgatum* (Poir.) Decne., *Periploca virgata* Poir. Enredadera. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, GUA, PAI). URY(LAV, ROC).

Oxypetalum R. Br.**Oxypetalum acerosum** Malme

Hierba. Endémica. 100-500 m. Países: PRY(CAU).

Oxypetalum aequaliflorum E. Fourn.

Sin.: *Gothofreda aequaliflora* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum stenophyllum* Malme Hierba. Nativa. 100-600 m. Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CON).

Oxypetalum alpinum (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **pallidum** (Hoehne) Fontella & E.A. Schwarz

Sin.: *Oxypetalum umbellatum* Gardner var. *pallidum* Hoehne Enredadera. Nativa. 0-200 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxypetalum appendiculatum Mart.

Sin.: *Gothofreda appendiculata* (Mart.) Kuntze, *Gothofreda siliculae* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum siliculae* E. Fourn. Enredadera. Nativa. 0-1800 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, SPE).

Oxypetalum arenicola Hauman ex Lillo

Hierba. Endémica. 0-200 m. Países: ARG(BAI).

Oxypetalum argentinum Malme

Sin.: *Ditassa campestris* Griseb. Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS).

Oxypetalum arnottianum H. Buek

Sin.: *Gothofreda arnottiana* (H. Buek) Kuntze, *Gothofreda microstemma* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum capitatum* Hook. & Arn., nom. illeg., *Oxypetalum clavatum* Malme, *Oxypetalum*

microstemma E. Fourn.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, SPE). URY(MON).

Oxypetalum aurantiacum Malme ex Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m. Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU). URY(Desconocida).

Oxypetalum balansae Malme

Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Oxypetalum banskii Schult.

Sin.: *Asclepias communis* Vell., *Gothofreda banskii* (Roem. & Schult.) Kuntze, *Oxypetalum maritimum* Hook. & Arn. Enredadera. Nativa. 0-1800 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxypetalum barberoanum T. Mey.

Enredadera. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY).

Oxypetalum brachystemma Malme

Sin.: *Corollonema boliviense* Schltr., *Oxypetalum albiflorum* Schltr. Enredadera. Nativa. 500-2000 m. Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Oxypetalum brachystephanum

(Malme) Malme Sin.: *Oxypetalum arnottianum* H. Buek var. *brachystephanum* Malme Hierba o subarbusto. Endémica. 100-500 m. Países: PRY(CAN, CON, COA).

Oxypetalum burchellii (E. Fourn.)

Malme Sin.: *Calostigma burchellii* E. Fourn., *Oxypetalum burchellii* (E. Fourn.) Malme, *Oxypetalum insigne* (Decne.) Malme var. *burchellii* (E. Fourn.) Fontella Enredadera. Nativa. 400-1200 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum capitatum Mart. subsp. **angustum** Malme

Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum capitatum Mart. subsp. **capitatum**

Sin.: *Gothofreda capitata* (Mart.) Kuntze Hierba. Nativa. 0-1200 m. Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, PAI). URY(FLA).

Oxypetalum capitatum Mart. subsp. **mirabile** (Malme) Fontella & Farinaccio

Sin.: *Gothofreda proboscidea* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum hasslerianum* Chodat var. *mirabile* Malme, *Oxypetalum hasslerianum* Chodat, *Oxypetalum proboscideum* E. Fourn. Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, GUA, PAI, SPE).

Oxypetalum ceratostemma Malme

Hierba. Endémica. 100-500 m. Países: PRY(CAU).

Oxypetalum charrua T. Mey.

Hierba. Endémica. 200-900 m. Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Oxypetalum chodatianum Malme

Sin.: *Oxypetalum paranense* Malme Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN).

Oxypetalum coalitum E. Fourn.

Hierba. Endémica. 800-1000 m. Países: BRA(RGS).

Oxypetalum coccineum Griseb.

Sin.: *Amblyopetalum coccineum* (Griseb.) Malme Hierba. Endémica. 0-1500 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS).

Oxypetalum coeruleum (D. Don) Decne.

Sin.: *Amblyopetalum coeruleum* (D. Don) Malme, *Tweedia coerulea* D. Don, *Tweedia versicolor* Hook. Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

Oxypetalum commersonianum

(Decne.) Fontella & E.A. Schwarz Sin.: *Melinia atropurpurea* Malme, *Melinia commersoniana* Decne., *Oxypetalum atropurpureum* (Malme) T. Mey. Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(FLA).

Oxypetalum confusum Malme

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxypetalum cordifolium (Vent.)

Schltr. subsp. **pedicellatum** (Decne.) Fontella & Goyder
Sin.: *Gothofreda pedicellata* (Decne.) Kuntze, *Oxypetalum pedicellatum* Decne.
Enredadera. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum corymbosum (Malme)

Liede & Meve
Sin.: *Melinia iberae* J.L. Fontana, *Melinia corymbosa* (Malme) Fontella & Farinaccio, *Widgrenia corymbosa* Malme
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA).

Oxypetalum crispum Wight ex

Hook. & Arn.
Sin.: *Gothofreda crispa* (Wight ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda integriloba* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda oblongifolia* Morong, *Oxypetalum integrilobum* E. Fourn., *Oxypetalum kuntzei* Schltr., *Oxypetalum oblongifolium* (Morong) Lillo, *Oxypetalum pratense* Griseb., *Oxypetalum spegazzinii* Hauman ex Lillo, *Oxypetalum suaveolens* Speg., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(COL).

Oxypetalum dusenii Malme

Hierba o subarbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum erectum Mart.

Sin.: *Asclepias arvensis* Vell., *Asclepias multicaulis* Vell., *Oxypetalum campestre* Decne., *Oxypetalum erectum* Mart. subsp. *campestre* (Decne.) Hoehne
Hierba. Nativa. 1300-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxypetalum erianthum Decne.

Sin.: *Gothofreda eriantha* (Decne.) Kuntze, *Oxypetalum aureum* Chodat
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Oxypetalum fiebrigii (Malme) Goyder & Rapini

Sin.: *Schistogyne fiebrigii* Malme
Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Oxypetalum filamentosum Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA, ITA).

Oxypetalum foliosum Mart.

Hierba. Nativa. 1100-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum fontellae S.A. Cáceres

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Oxypetalum glabrescens Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU).

Oxypetalum glabrum (Decne.) Malme

Sin.: *Calostigma glabrum* Decne., *Oxypetalum glabrum* (Decne.) Malme, *Oxypetalum insigne* (Decne.) Malme var. *glabrum* (Decne.) Fontella & E.A. Schwarz, *Oxypetalum nitidum* Malme
Enredadera. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Oxypetalum globosum C. Ezcurra & C.M. Martín

Hierba. Endémica. 2500-2800 m.
Países: ARG(SAL).

Oxypetalum gracile T. Mey.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Oxypetalum hilarianum E. Fourn.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxypetalum hoehnei Malme

Sin.: *Calostigma dusenii* Hoehne
Enredadera. Nativa. 900-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum humile (Morong) Hassl.

Sin.: *Ditassa humilis* Morong, *Gothofreda paraguayensis* (Schltr.) Kuntze, *Oxypetalum paraguayense* Schltr.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, MIE, PAI).

Oxypetalum incanum E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CAU, CAN).

Oxypetalum insigne (Decne.) Malme

var. **bresolinii** Fontella
Enredadera. Endémica. 1000 m
Países: BRA(SCA).

Oxypetalum insigne (Decne.) Malme var. **insigne**

Sin.: *Calostigma insigne* Decne., *Oxypetalum rariflorum* Malme
Enredadera. Nativa. 0-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxypetalum joergensenii T. Mey.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Oxypetalum karstenianum Goyder & Rapini

Sin.: *Schistogyne decaisneana* H. Karst.
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS).

Oxypetalum kleinii Fontella & Marquete

Enredadera. Endémica. 800-1300 m.
Países: BRA(SCA).

Oxypetalum lineare Decne.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Oxypetalum longipedunculatum

(Malme) Goyder & Rapini
Sin.: *Schistogyne longipedunculata* Malme
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Oxypetalum lynchianum T. Mey.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS).

Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.

Sin.: *Oxypetalum macrolepis* (Hook. & Arn.) Decne. var. *pilosum* Malme, *Tweedia macrolepis* Hook. & Arn.
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, MIE, SPE). URY(CAS, ROC, TYT).

Oxypetalum malmei Hoehne

Sin.: *Oxypetalum subcapitatum* Malme, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum marchesii C. Ezcurra & A. González

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MAL, TYT).

Oxypetalum marginatum Malme

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN, SPE).

Oxypetalum marianae H.A. Keller & Funez

Subarbusto. Endémica. 1000-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Oxypetalum martii E. Fourn. var. **martii**

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Oxypetalum martii E. Fourn. var.

nanum (Malme) Fontella & S.A. Cáceres
Sin.: *Oxypetalum nanum* Malme
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU).

Oxypetalum microphyllum Hook. & Arn.

Sin.: *Oxypetalum multicaule* E. Fourn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). URY(ART, COL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Oxypetalum molle Hook. & Arn.

Sin.: *Gothofreda mollis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda nigrescens* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda suaveolens* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum henschenii* Malme, *Oxypetalum hirsutulium* K. Schum., *Oxypetalum nigrescens* E. Fourn., *Oxypetalum oliganthum* Malme, *Oxypetalum suaveolens* E. Fourn.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Oxypetalum morilloanum Fontella

Hierba. Endémica. 900 m
Países: BRA(SCA).

Oxypetalum muticum E. Fourn.

Sin.: *Oxypetalum curtiflorum* Malme, *Oxypetalum curtiflorum* Malme var. *indutum* Malme

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAU).

Oxypetalum nigricans (Decne.) Liede & Meve

Sin.: *Rhysostelma nigricans* Decne.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(LAV, MON).

Oxypetalum oblanceolatum

Farinaccio & Mello-Silva
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Oxypetalum obtusifolium Malme

Enredadera. Endémica. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum ophiuroideum Malme

Hierba. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(CAN).

Oxypetalum ostenii Malme

Enredadera. Endémica. 200-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Oxypetalum pachyglossum Decne.

Sin.: *Cystostemma glandulosum* Silveira, *Gothofreda coriacea* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda densiflora* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda luschnathii* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda pachyglossa* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda paludosa* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda selloana* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum coriaceum* Decne., *Oxypetalum densiflorum* Decne., *Oxypetalum luschnathii* E. Fourn., *Oxypetalum paludosum* Decne., *Oxypetalum selloanum* E. Fourn.
Enredadera. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum pachygynum Decne.

Sin.: *Oxypetalum vestitum* Malme
Enredadera. Nativa. 100-1300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, COA, SPE).

Oxypetalum pannosum Decne. var.

macranthum Hoehne
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Oxypetalum pannosum Decne. var. **pannosum**

Sin.: *Gothofreda pannosa* (Decne.) Kuntze, *Oxypetalum uruguayense* Arechav.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA). URY(MON, RIV, TAC).

Oxypetalum parviflorum (Decne.)

Decne. var. **kuhlmannii** Hoehne
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(SCA). PRY(APA).

Oxypetalum parviflorum (Decne.)

Decne. var. **parviflorum**
Sin.: *Schizostemma parviflorum* Decne.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON). URY(CLA, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

Oxypetalum pubescens (Malme)

Goyder & Rapini
Sin.: *Schistogyne pubescens* Malme
Enredadera. Endémica. 200-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Oxypetalum radinsii H.A. Keller

Subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: ARG(MIS).

Oxypetalum reflexum Malme

Hierba. Nativa. 200-700 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Oxypetalum reitzii Fontella & Marquete

Enredadera. Endémica. 800 m
Países: BRA(SCA).

Oxypetalum rojasianum Malme

Hierba. Endémica. 200-700 m.
Países: PRY(AMA).

Oxypetalum schulzii Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR). URY(ART, MON, RNO).

Oxypetalum solanoides Hook. & Arn.

Sin.: *Gothofreda solanoides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum tenuiflorum* Griseb., *Schizostemma longifolium* Decne., *Tweedia floribunda* Decne.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(Desconocida). URY(CAS, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).

Oxypetalum stipatum Malme

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA).

Oxypetalum subcapitatum Malme
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA). PRY(CAN).

Oxypetalum sublanatum Malme
Enredadera. Nativa. 200-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxypetalum suboppositum Malme
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

Oxypetalum sylvestre (Hook. & Arn.)
Goyder & Rapini
Sin.: *Schistogyne berroi* Arechav.,
Schistogyne sylvestris Hook. & Arn.,
Schistogyne sylvestris Hook. & Arn. var.
chacoensis Malme
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS,
SFE). BRA(RGS). URY(SAO).

Oxypetalum teyucuaense Farinaccio
& H.A. Keller
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(MIS).

Oxypetalum tomentosum Wight
ex Hook. & Arn. var. **parvifolium** (E.
Fourn.) Fontella & E.A. Schwarz
Sin.: *Gothofreda parvifolia* (E. Fourn.)
Kuntze, *Oxypetalum parvifolium* E. Fourn.
Enredadera. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxypetalum tomentosum Wight ex
Hook. & Arn. var. **tomentosum**
Sin.: *Gothofreda mucronata* (E. Fourn.)
Kuntze, *Gothofreda tomentosa* (Hook. &
Arn.) Kuntze, *Oxypetalum mucronatum*
E. Fourn.
Enredadera. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MAL,
MON, ROC).

Oxypetalum tubatum Malme
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxypetalum tucumanense (T. Mey.)
Goyder & Rapini
Sin.: *Schistogyne tucumanensis* T. Mey.
Enredadera. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUU, TUC).

Oxypetalum warmingii (E. Fourn.)
Fontella & Marquete
Sin.: *Bustelina warmingii* E. Fourn.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Oxypetalum wightianum Hook. & Arn.
Sin.: *Gothofreda wightiana* (Hook. &
Arn.) Kuntze, *Gothofreda guilleminiana*
(Decne.) Kuntze, *Gothofreda squamulata*
(E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum*
guilleminianum Decne., *Oxypetalum*
squamulatum E. Fourn.
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAU, CAN).

Peplonia Decne.

Peplonia adnata (E. Fourn.) U.C.S.
Silva & Rapini
Sin.: *Ditassa adnata* E. Fourn.,
Macroditassa adnata (E. Fourn.) Malme
Subarbusto apoyante. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Peplonia axillaris (Vell.) Fontella &
Rapini
Sin.: *Asclepias axillaris* Vell.,
Gonioanthea acuminata (Decne.) Malme,
Gonioanthea axillaris (Vell.) Fontella
& E.A. Schwarz, *Gonioanthea odorata*
(Decne.) Malme, *Metastelma acuminata*
Decne., *Metastelma odorata* Decne.
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peplonia hatschbachii (Fontella & De
Lamare) Fontella & Rapini
Sin.: *Gonioanthea hatschbachii*
Fontella & De Lamare
Enredadera. Nativa. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Petalostelma E. Fourn.

Petalostelma robertii (S. Moore)
Liede & Meve
Sin.: *Cynanchum robertii* (S. Moore)
Malme, *Metastelma robertii* (S. Moore)
Malme, *Vincetoxicum robertii* S. Moore
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, SAL). BRA(Fuera
del área del proyecto). PRY(APY).

Petalostelma sarcostemma (Lillo)
Liede & Meve
Sin.: *Cynanchum sarcostemma* Lillo
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Phaeostemma E. Fourn.

Phaeostemma hatschbachii Morillo
Liana. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Phaeostemma kelleri Morillo
Liana. Nativa. 400-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área
del proyecto).

Philibertia Kunth

Philibertia affinis (Griseb.) Goyder
Sin.: *Mitostigma affine* Griseb.
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL).

Philibertia barbata (Malme) Goyder
Sin.: *Mitostigma barbatum* Malme
Enredadera. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Philibertia bicornuta (Griseb.) Goyder
Sin.: *Aphanostelma bicornutum* (Griseb.)
Malme, *Melinia bicornuta* Griseb.
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Philibertia boliviana (Baill.) Goyder
Sin.: *Amblystigma pilosum* Malme,
Amblystigma pilosum Malme var.
catamarcense T. Mey., *Amblystigma*
pilosum Malme var. *laticaudiculatum* T.
Mey., *Podandra boliviana* Baill., *Podandra*
pilosa (Malme) Morillo
Enredadera. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Philibertia boliviensis (Schltr.) Goyder
Sin.: *Mitostigma boliviense* Schltr.
Enredadera. Nativa. 1300-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Philibertia campanulata (Lindl.) Nichols
Sin.: *Philibertia hypoleuca* Schltr.,
Philibertia speciosa Malme, *Philibertia*
splendens Lillo, *Sarcostemma*
campanulatum Lindl.
Enredadera. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(JUU, TUC).

Philibertia candolleana (Hook. &
Arn.) Goyder
Sin.: *Aphanostelma candolleianum* (Hook.
& Arn.) Malme, *Astephanus cordifolius*
Phil., *Astephanus fruticosus* Spag.,
Brachylepis candolleana Hook. & Arn.,
Melinia candolleana (Hook. & Arn.) Decne.,
Mitostigma cordifolium (Phil.) E. Fourn.
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI,
MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TUC).
CHL(RME).

Philibertia castillonii (Lillo) Goyder

Sin.: *Amblystigma castillonii* Lillo,
Mitostigma castillonii (Lillo ex T. Mey.) T. Mey.
Enredadera. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUU).

Philibertia cionophora (Griseb.)

Goyder
Sin.: *Amblystigma cionophorum*
(Griseb.) E. Fourn., *Mitostigma*
cionophorum Griseb., *Podandra*
cionophora (Griseb.) Morillo
Enredadera. Endémica. 700-1300 m.
Países: ARG(JUU, TUC).

Philibertia coalita (Lillo) Goyder

Sin.: *Mitostigma caudatum* Malme,
Mitostigma coalitum Lillo, *Mitostigma*
lilloi T. Mey.
Enredadera. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Philibertia discolor (Schltr.) Goyder

Sin.: *Melinia discolor* Schltr.
Enredadera. Nativa. 2600-2800 m.
Países: ARG(SAL).

Philibertia gilliesii Hook. & Arn.

Sin.: *Amblystigma pedunculare* Benth.,
Oxystema gilliesii (Hook. & Arn.) K.
Schum., *Oxystema violacea* (Phil.) K.
Schum., *Philibertia canescens* Decne.,
nom. nud., *Philibertia gilliesii* Hook. &
Arn. var. *albida* Stuck. ex Seckt, nom.
nud., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn.
var. *gracilis* (Don) T. Mey., *Philibertia*
gilliesii Hook. & Arn. var. *grandiflora*
(Hook.) T. Mey., *Philibertia gilliesii* Hook.
& Arn. var. *mirabilis* T. Mey., *Philibertia*
gilliesii Hook. & Arn. var. *parvicoronata*
T. Mey., *Philibertia gilliesii* Hook. &
Arn. var. *pubescens* Speg., *Philibertia*
gilliesii Hook. & Arn. var. *vestita* Malme,
Philibertia gracilis D. Don, *Philibertia*
grandiflora Hook. f. *albida* Malme,
Philibertia grandiflora Hook., *Philibertia*
incana (Decne.) Malme, *Philibertia*
schreiteri T. Mey., *Philibertia violacea*
(Phil.) Schltr., *Sarcostemma donianum*
Decne., *Sarcostemma gilliesii* (Hook. &
Arn.) Decne., *Sarcostemma grandiflorum*
(Hook.) Decne., *Sarcostemma incanum*
Decne., *Zosima violacea* Phil.
Enredadera. Nativa. 0-3200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN,
RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Philibertia latiflora (Griseb.) Goyder

Sin.: *Mitostigma latiflorum* Griseb.

Enredadera. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Philibertia longistyla Goyder

Sin.: *Mitostigma grandiflorum* Schltr.
Enredadera. Nativa. 1300-1600 m.
Países: ARG(SAL).

Philibertia lysimachioides (Wedd.)

T. Mey.
Sin.: *Lugonia lysimachioides* Wedd.,
Sarcostemma lysimachioides (Wedd.)
R.W. Holm
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Philibertia micrantha (Malme)

Goyder
Sin.: *Aphanostelma micranthum*
(Malme) T. Mey., *Lugonia micrantha*
Malme, *Melinia micrantha* (Malme)
Krapov. & S.A. Cáceres
Subarbusto. Endémica. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Philibertia mitophora (Griseb.)

Goyder
Sin.: *Astephanus mitophorus* Griseb.,
Mitostigma mitophorum (Griseb.) T.
Mey., *Mitostigma rhyngophorum* Griseb.
Enredadera. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(TUC).

Philibertia multiflora (T. Mey.)

Goyder
Sin.: *Astephanus multiflorus* T. Mey.
Enredadera. Nativa. 2300-2500 m.
Países: ARG(SAL).

Philibertia nivea (Griseb.) Goyder

Sin.: *Oxypetalum niveum* Griseb.,
Mitostigma niveum (Griseb.) Griseb.
Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Philibertia parviflora (Malme)

Goyder
Sin.: *Aphanostelma parviflorum*
(Malme) Malme, *Melinia campanulata*
Schltr., *Melinia parviflora* (Malme)
Krapov. & S.A. Cáceres, *Mitostigma*
parviflorum Malme
Subarbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Philibertia picta Schltr.

Sin.: *Oxystema vaileae* Rusby,
Philibertia albiflora Lillo ex T. Mey.,
Philibertia vailliae (Rusby) Liede,
Sarcostemma vailliae (Rusby) R.W. Holm

Enredadera. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Philibertia solanoides Kunth

Sin.: *Blepharodon rahmeri* Phil.,
Philibertia rahmeri (Phil.) Malme
Hierba o arbusto. Nativa. 2000-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Philibertia speciosa (Malme) Goyder

Sin.: *Mitostigma speciosum* Malme
Enredadera. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Philibertia stipitata Lillo

Sin.: *Sarcostemma stipitatum* (Lillo)
R.W. Holm
Enredadera. Nativa. 1100-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Philibertia suberecta Goyder

Sin.: *Mitostigma fiebrigii* Schltr.
Subarbusto. Nativa. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUU, TUC).

Philibertia subnivea (Malme) Goyder

Sin.: *Mitostigma subniveum* Malme
Enredadera. Endémica.
Países: ARG(SAL).

Philibertia tomentosa (Decne.)

Goyder
Sin.: *Mitostigma tomentosum* Decne.
Enredadera. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SDE, SLU, TUC).

Philibertia tubata (Malme) Goyder

Sin.: *Aphanostelma tubatum* (Malme)
Malme, *Melinia tubata* (Malme) Krapov.
& S.A. Cáceres, *Mitostigma tubatum*
Malme
Subarbusto. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Philibertia tucumanensis (T. Mey.)

Goyder
Sin.: *Mitostigma tucumanense* T. Mey.
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(TUC).

Philibertia volcanensis (T. Mey.)

Goyder
Sin.: *Aphanostelma volcanense* T. Mey.,
Melinia volcanensis (T. Mey.) Krapov. &
S.A. Cáceres
Subarbusto. Endémica. 1800-2000 m.
Países: ARG(JUU).

Plumeria L.**Plumeria rubra L.**

Arbolito. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

Prestonia R. Br., nom. cons.**Prestonia calycina Müll. Arg.**

Sin.: *Prestonia hirsuta* Müll. Arg., hom. illeg.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APY, CAU, GUA, ITA, PAI, SPE).

Prestonia coalita (Vell.) Woodson

Sin.: *Echites coalitus* Vell., *Echites vauthieri* A. DC.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Prestonia cyaniphylla (Rusby)

Woodson
Sin.: *Echites cyaniphyllus* Rusby,
Prestonia hassleri Woodson
Enredadera o liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Prestonia dusenii (Malme) Woodson

Sin.: *Echites dusenii* Malme
Enredadera. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Prestonia erecta (Malme) J.F. Morales

Sin.: *Rhodocalyx erectus* Malme,
Rhodocalyx rotundifolius Müll. Arg.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Prestonia lagoensis (Müll. Arg.)

Woodson
Sin.: *Haemadictyon lagoense* Müll. Arg.,
Haemadictyon lindmanii Malme,
Prestonia lindmanii (Malme) Hoehne
Enredadera. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APY, AMA, CAN, CON, PAI, SPE).
URY(MON).

Prestonia quinquangularis (Jacq.)

Spreng.
Sin.: *Echites quinquangularis* Jacq.,
Haemadictyon acutifolium Müll. Arg.,
Prestonia acutifolia (Müll. Arg.) K. Schum.,
Temnadenia quinquangularis (Jacq.) Miers

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, MIS, SAL).
BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, PAI, PHA, SPE).

Prestonia tomentosa R. Br.

Sin.: *Prestonia lanata* Müll. Arg.,
Prestonia lutescens Müll. Arg., *Prestonia sericocalyx* Malme
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Rauvolfia L.**Rauvolfia ligustrina Willd.**

Sin.: *Rauvolfia divergens* Markgr.,
Rauvolfia mollis S. Moore
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, BOQ, CON).

Rauvolfia schuelii Speg.

Sin.: *Rauvolfia boliviana* Markgr.
Arbusto o árbol. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Rauvolfia sellowii Müll. Arg.

Sin.: *Aspidosperma pseudoquina* Hassl.,
Aspidosperma spegazzinii Molino ex T. Mey.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAA).

Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.

Sin.: *Rauvolfia elliptica* Malme
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(AMA, CAN, SPE).

Rhabdadenia Müll. Arg.**Rhabdadenia madida (Vell.) Miers**

Sin.: *Echites madidus* Vell.,
Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.,
Rhabdadenia pohlii Müll. Arg. var. *latifolia* Müll. Arg.,
Rhabdadenia pohlii Müll. Arg. var. *suberecta* Müll. Arg.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(COL).

Rhabdadenia ragonesei Woodson

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL,

SFE). BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Rhodocalyx Müll. Arg.**Rhodocalyx riedelii (Müll. Arg.)**

J.F. Morales, M.E. Endress & Liede
Sin.: *Haemadictyon riedelii* Müll. Arg.,
Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.,
Temnadenia riedelii (Müll. Arg.) Miers
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS).
PRY(APA, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Rojasia Malme**Rojasia gracilis (Morong) Malme**

Sin.: *Gothofreda gracilis* Morong
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, PHA).

Ruehssia H. Karst.**Ruehssia altissima (Jacq.) F. Esp.**

Santo & Rapini
Sin.: *Asclepias altissima* Jacq.,
Cynanchum altissimum (Jacq.) Jacq.,
Gonolobus altissimus (Jacq.) Schult.,
Marsdenia altissima (Jacq.) Dugand subsp. *altissima*,
Marsdenia altissima (Jacq.) Dugand subsp. *faucinuda* Dugand,
Marsdenia burchellii E. Fourn., *Marsdenia caulantha* S. Moore,
Marsdenia imthurnii Hemsl., *Marsdenia mollissima* E. Fourn.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(AMA, CON).

Ruehssia brasiliensis (Decne.) F. Esp.

Santo & Rapini
Sin.: *Marsdenia brasiliensis* Decne.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(Desconocida).

Ruehssia hatschbachii (Morillo) F.

Santo & Rapini
Sin.: *Marsdenia hatschbachii* Morillo
Enredadera. Endémica. 1000-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Ruehssia hilariana (E. Fourn.) F. Esp.

Santo & Rapini
Sin.: *Marsdenia hilariana* E. Fourn.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Ruehssia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) H. Karst.

Sin.: *Asclepias macrophylla* Humb. & Bonpl. ex Schult., *Marsdenia macrophylla* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E. Fourn. Enredadera. Nativa. 0-1500 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, GUA, SPE).

Ruehssia malmeana (W. Rothe) F. Esp. Santo & Rapini

Sin.: *Marsdenia malmeana* W. Rothe Enredadera. Nativa. Países: BRA(PAR).

Ruehssia montana (Malme) F. Esp. Santo & Rapini

Sin.: *Marsdenia montana* Malme Enredadera o liana. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). URY(TAC).

Ruehssia ulei (Schltr. & W. Rothe) F. Esp. Santo & Rapini

Sin.: *Marsdenia ulei* Schltr. & W. Rothe Liana. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Schistogyne Hook. & Arn.

Schistogyne mosenii (Malme) T. Mey.

Sin.: *Calostigma mosenii* Malme, *Oxypetalum mosenii* (Malme) Malme Enredadera. Nativa. 0-1700 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Schubertia Mart., nom. cons.

Schubertia grandiflora Mart.

Sin.: *Araujia grandiflora* (Mart.) Morong Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Schubertia schreiteri Descole & T. Mey.

Enredadera o liana. Nativa. 500-1000 m. Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(PAI).

Secondatia A. DC.

Secondatia densiflora A. DC.

Sin.: *Secondatia densiflora* A. DC. var. *paraguariensis* Hassl. Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Skytanthus Meyen

Skytanthus acutus Meyen

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-800 m. Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Tabernaemontana L.

Tabernaemontana catharinensis A. DC.

Sin.: *Peschiera australis* (Müll. Arg.) Miers var. *hilariana* (Müll. Arg.) L. Allorge, *Peschiera australis* (Müll. Arg.) Miers, *Peschiera catharinensis* (A. DC.) Miers, *Peschiera hilariana* (Müll. Arg.) Miers, *Tabernaemontana australis* Müll. Arg., *Tabernaemontana hilariana* Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, RNO, SAO).

Tassadia Decne.

Tassadia berteriana (Spreng.) W.D. Stevens

Sin.: *Metastelma berterianum* (Spreng.) Decne., *Oxypetalum berterianum* Spreng. Enredadera. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR). PRY(APY, CEN, SPE).

Tassadia obovata Decne.

Sin.: *Tassadia floribunda* E. Fourn., *Tassadia neovidensis* E. Fourn., *Tassadia poeppigiana* Decne., *Tassadia selleana* E. Fourn., *Tassadia turriiformis* E. Fourn. Enredadera. Nativa. 0-1200 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Temnadenia Miers

Temnadenia odorifera (Vell.) J.F. Morales

Sin.: *Echites odorifera* Vell., *Echites stellaris* Lindl., *Temnadenia stellaris* (Lindl.) Miers Liana. Nativa. 0-900 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Temnadenia violacea (Vell.) Miers

Sin.: *Echites violacea* Vell. Liana. Nativa. 500-1500 m. Países: BRA(PAR).

Thevetia L., nom. cons.

Thevetia bicornuta Müll. Arg.

Sin.: *Cascabela bicornuta* (Müll. Arg.) Lippold, comb. illeg., *Thevetia paraguayensis* Britton Hierba palustre. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, ÑEE, PHA, SPE).

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

Sin.: *Cerbera peruviana* Pers., *Cascabela peruviana* (Pers.) Raf. Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(AMA, CEN, COA).

Topea H.A. Keller

Topea micrantha (H.A. Keller) H.A. Keller

Sin.: *Aenigma micranthum* H.A. Keller, Lilloa 54(1): 64. 2017. Enredadera. Endémica. 200-400 m. Países: ARG(MIS).

Topea patens (H.A. Keller) H.A. Keller

Sin.: *Aenigma patens* H.A. Keller Enredadera. Endémica. 100-500 m. Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

Tressensia H.A. Keller

Tressensia viridis H.A. Keller & S. Cáceres Enredadera. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(COS).

Tweedia Hook. & Arn.

Tweedia andina (Phil.) G.H. Rua

Sin.: *Oxypetalum andinum* Phil., *Oxypetalum hookeri* Decne., *Oxypetalum mölleri* Phil., *Tweedia hookeri* (Decne.) Malme Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m. Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Tweedia aucaensis G.H. Rua

Hierba. Endémica. 1000-3000 m. Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

Tweedia birostrata (Hook. & Arn.)
Hook. & Arn.

Sin.: *Cynanchum birostratum* Hook. & Arn., *Gonolobus obliquifolius* Colla, *Gonolobus voquicillo* Colla, *Gothofreda birostrata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda brevipes* (Phil.) Kuntze, *Gothofreda confertiflora* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda obliquifolia* (Colla) Kuntze, *Oxypetalum angustifolium* Phil., *Oxypetalum brevipes* Phil., *Oxypetalum confertiflorum* Decne., *Oxypetalum saxatile* Decne., *Tweedia brevipes* (Phil.) Malme, *Tweedia confertiflora* (Decne.) Malme, *Tweedia obliquifolia* (Colla) Malme
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Tweedia brunonis Hook. & Arn.

Sin.: *Gothofreda brunonis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum brunonis* (Hook. & Arn.) Decne., *Turrigera halophila* Griseb., *Turrigera inconspicua* Decne.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY).

Tweedia echegarayi (Hieron.) Malme

Sin.: *Oxypetalum echegarayi* Hieron., *Oxypetalum kingii* S. Moore
Hierba o subarbusto. Endémica.
2000-2500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Tweedia stipitata G.H. Rua & Liede

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Vallesia Ruiz & Pav.

Vallesia glabra (Cav.) Link

Sin.: *Rauvolfia glabra* Cav., *Vallesia cymbifolia* Ortega, *Vallesia dichotoma* Ruiz & Pav.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC). PRY(APY, PHA).

Vinca L.

Vinca major L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL). BRA(SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(MON, SOR).

APODANTHACEAE

Pilostyles Guill.

Pilostyles berteroi Guill.

Sin.: *Apodanthes berteroi* (Guill.) Gardner
Parásita. Nativa. 0-2700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN, NEU, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME).

Pilostyles blanchetii (Gardner) R. Br.

Sin.: *Apodanthes blanchetii* Gardner, *Apodanthes calliandrae* Gardner, *Pilostyles calliandrae* (Gardner) R. Br., *Pilostyles stawiarskii* Vattimo-Gil, *Pilostyles ulei* Solms
Parásita. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, SCA). URY(ART, SAO).

APONOGETONACEAE

Aponogeton L. f.

Aponogeton distachyos L. f.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(LLA).

AQUIFOLIACEAE

Ilex L.

Ilex affinis Gardner

Arbusto o árbol. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, SPE).

Ilex argentina Lillo

Sin.: *Ilex herzogii* Loes.
Árbol. Nativa. 900-2300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes.

Sin.: *Ilex brasiliensis* (Spreng.) Loes. f. *balansae* Loes., *Ilex brasiliensis* (Spreng.) Loes. f. *typica* Loes., nom. inval., *Rhamnus brasiliensis* Spreng.
Arbusto o árbol. Nativa. 100-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, MIE, SPE).

Ilex brevicuspis Reissek

Sin.: *Ilex caaguazuensis* Loes.
Árbol. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, ITA).

Ilex chamaedryfolia Reissek

Sin.: *Ilex chamaedryfolia* Reissek var. *mugiensis* Loes., *Ilex chamaedryfolia* Reissek var. *typica* Loes., nom. inval.
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ilex dumosa Reissek var. **dumosa**

Sin.: *Ilex amara* (Vell.) Loes. f. *microphylla* Reissek, *Ilex dumosa* Reissek var. *gomezii* Loes., *Ilex dumosa* Reissek var. *montevideensis* Loes., *Ilex dumosa* Reissek var. *mosenii* Loes.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, COA, MIE, SPE). URY(MON).

Ilex dumosa Reissek var. **guaranina** Loes.

Sin.: *Ilex dumosa* Reissek f. *angustifolia* Chodat & Hassl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Ilex integerrima (Vell.) Reissek

Sin.: *Ilex integerrima* (Vell.) Reissek var. *ebenaceae* (Reissek) Loes., *Ilex integerrima* (Vell.) Reissek var. *schenckiana* Loes., *Ilex integerrima* (Vell.) Reissek var. *typica* Loes., nom. inval.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ilex microdonta Reissek

Árbol. Endémica. 100-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. var. **paraguariensis**

Sin.: *Ilex curitibensis* Miers var. *gardneriana* Miers, *Ilex curitibensis* Miers, *Ilex domestica* Reissek var. *glabra* Reissek, *Ilex mate* A. St.-Hil., nom. superfl., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *confusa* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *dasyprionata* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *domestica* (Reissek) Loes., *Ilex paraguariensis* A.

St.-Hil. f. *glabra* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *latifolia* Chodat, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *parvifolia* Chodat, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *sorbilis* (Reissek) Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. var. *genuina* Loes., nom. inval., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. var. *ulei* Loes., *Ilex paraguayensis* A. St.-Hil. var. *dentata* Miers, *Ilex paraguayensis* A. St.-Hil. var. *idonea* Miers, *Ilex paraguayensis* A. St.-Hil. var. *usitata* Miers, *Ilex sorbilis* Reissek, *Ilex theezans* Bonpl. ex Miers
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1100 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, SPE). URY(MAL, TAC, TYT).

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. var. ***vestita*** (Reissek) Loes.

Sin.: *Ilex domestica* Reissek var. *pubescens* Reissek, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *puberula* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *pubescens* (Reissek) Loes., *Ilex vestita* Reissek
 Árbol. Nativa. 500-1200 m.
 Países: BRA(PAR).

Ilex pseudobuxus Reissek

Sin.: *Ilex peduncularis* Reissek
 Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1400 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ilex taubertiana Loes.

Sin.: *Ilex kleinii* Edwin
 Arbusto o arbolito. Nativa. 800-1800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ilex theezans Mart. ex Reissek

Sin.: *Ilex gigantea* Bonpl. ex Miers, *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *acrodonta* (Reissek) Loes., *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *fertilis* (Reissek) Loes., *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *typica* Loes., nom. inval.
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

ARACEAE

Alocasia (Schott) G. Don

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don
 Sin.: *Arum macrorrhizon* L.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: PRY(ITA).

Anthurium Schott

Anthurium acutum N.E. Br.
 Hierba. Nativa. 300-1100 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium comtum Schott

Hierba epífita. Nativa. -1200 m.
 Países: BRA(PAR).

Anthurium coriaceum G. Don

Sin.: *Anthurium glaucescens* Kunth, *Anthurium lacerdae* Reitz, *Anthurium rubiflorum* Engl., *Anthurium subcaulescens* (Vell.) Stellfeld, *Pothos coriacea* Graham, *Pothos glaucus* Schott ex Kunth, *Pothos subcaulescens* Vell.
 Hierba rupícola. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium gaudichaudianum Kunth

Sin.: *Anthurium chamissonis* Schott, *Anthurium gaudichaudianum* Kunth var. *chamissonis* (Schott) Engl., *Anthurium gaudichaudianum* Kunth var. *cuneifolium* Engl., *Anthurium gaudichaudianum* Kunth var. *libonianum* (Linden & Regel) Engl., *Anthurium libonianum* Linden & Regel
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium hatschbachii E. G. Gonç.

Hierba. Endémica. 800-1100 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium loefgrenii Engl.

Sin.: *Anthurium itanhaense* Engl.
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium mareense Krause

Hierba. Endémica. 1000-1700 m.
 Países: BRA(PAR).

Anthurium maximiliani Schott

Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Anthurium paraguayense Engl.

Sin.: *Anthurium rodrigoii* A. D. Hawkes
 Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don

Sin.: *Anthurium caudatum* Kunth, *Anthurium quinquevulnerum* Schott ex Engl., *Anthurium smilaciforme* C. Koch,

Anthurium undatum Schott, *Dracontium pentaphyllum* Aubl., *Pothos undatus* Hort ex Kunth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium pilonense Reitz

Hierba. Endémica. 300 m
 Países: BRA(SCA).

Anthurium plowmanii Croat

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, SPE).

Anthurium scandens (Aubl.) Engl.

Sin.: *Anthurium scandens* (Aubl.) Engl. var. *violaceum* (Sw.) Engl., *Anthurium violaceum* (Sw.) Schott, *Dracontium scandens* Aubl., *Pothos violaceus* Sw.
 Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anthurium sellowianum Kunth

Sin.: *Anthurium crassipes* Engl., *Anthurium longilaminatum* Engl., *Anthurium viride* C. Koch & Bouché
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Anthurium sinuatum Benth. ex Schott

Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Anthurium urvilleanum Schott

Sin.: *Anthurium beyrichianum* Kunth, *Anthurium harrisii* (Graham) Endl. var. *beyrichianum* (Kunth) Engl.
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Arum L.

Arum italicum Miller

Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, LPA). URY(CAS, MON).

Asterostigma Fisch. & C.A. Mey.

Asterostigma reticulatum E. G. Gonç.
 Hierba. Endémica. 700-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Asterostigma tweedianum Schott

Sin.: *Staurostigma tweedianum* C. Koch
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Caladium Vent.**Caladium bicolor** (Aiton) Vent.

Sin.: *Arum bicolor* Aiton
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(GUA).

Colocasia Schott, nom. cons.**Colocasia esculenta** (L.) Schott

Sin.: *Arum colocasia* L., *Arum esculentum* L.,
Caladium esculentum (L.) Vent.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, TUC).
BRA(SCA). CHL(IPA). PRY(AMA, CEN).
URY(ART, CLA).

Dieffenbachia Schott**Dieffenbachia aglaonematifolia** Engl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(COA, GUA).

Dracontium L.**Dracontium margaretae** Bogner

Hierba. Nativa. 200-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY).

Gorgonidium Schott**Gorgonidium bulbostylum** Bogner &

E. G. Gonç.
Hierba. Nativa. 1700-2300 m.
Países: ARG(CAT).

Gorgonidium vermicidum (Speg.)

Bogner & Nicolson
Sin.: *Asterostigma fabrisii* Crisci,
Asterostigma lorentzianum Endl.,
Asterostigma vermicida[um] (Speg.)
Hauman & Vanderveken, *Staurostigma*
vermicidum Speg.
Hierba. Nativa. 600-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, MIS,
SAL, TUC).

Heteropsis Kunth**Heteropsis oblongifolia** Kunth

Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR).

Heteropsis rigidifolia Engl.

Arbusto. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heteropsis salicifolia Kunth

Hemiepífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Landoltia Les & D.J. Crawford**Landoltia punctata** (G. Mey.) Les &

D.J. Crawford
Sin.: *Lemna punctata* G. Mey.,
Spirodela punctata (G. Mey.) C.H.
Thomps.
Hierba acuática. Introducida. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA). CHL(MAG).

Lemna L., nom. cons.**Lemna aequinoctialis** Welw.

Sin.: *Lemna angolensis* Hegelm., *Lemna*
paucicostata Hegelm., *Lemna trinervis* Small
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, CHU, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL,
SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(SCA).
PRY(APY, CAU, ITA, ÑEE, PHA, SPE).

Lemna disperma Hegelm.

Hierba acuática. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(SFE).

Lemna gibba L.

Sin.: *Lemna parodiana* Giardelli
Hierba acuática. Cosmopolita. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,
MEN, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU,
SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR, ANT,
COQ, VAL, LBO, BIO, LLA, RME).
PRY(APY, PHA). URY(CAS, MON, TYT).

Lemna minuta Kunth

Sin.: *Lemna minima* Kunth, nom. nud.,
Lemna minima Phil. ex Hegelm., hom.
illeg., *Lemna minuscula* Herter, nom.
superfl., *Lemna valdiviana* Phil. var.
abbreviata Hegelm., *Lemna valdiviana*
Phil. var. *minima* Hegelm.

Hierba acuática. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE,
SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(AYB, TAR, ANT, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
PRY(APY, CEN, COA, PAI). URY(CAS, FLA,
MON, ROC, SJO, TYT).

Lemna valdiviana Phil.

Sin.: *Lemna cyclostoma* C.H. Thomps.,
hom. illeg., *Lemna valdiviana* Phil. var.
pellucida Hegelm., *Lemna valdiviana*
Phil. var. *platyclados* Hegelm., *Lemna*
valdiviana Phil. var. *robusta* Hegelm.
Hierba acuática. Nativa. 0-2700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS,
NEU, SAL, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(TAR, VAL, MAU, ARA,
LLA, RME). PRY(CEN). URY(CAS,
MON, ROC, SJO, TYT).

Mangonia Schott**Mangonia tweediana** Schott

Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART).

Mangonia uruguayana (Hicken) Bogner

Sin.: *Felipponia uruguayana* Hicken,
Felipponiella uruguayana (Hicken) Herter
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA).

Monstera Adans.**Monstera adansonii** Schott subsp.

adansonii
Hemiepífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Monstera adansonii Schott subsp.

klotzschiana (Schott) Mayo & I.M.
Andrade
Sin.: *Monstera adansonii* Schott var.
klotzschiana (Schott) Madison, *Monstera*
klotzschiana Schott, *Monstera modesta*
Schott, *Monstera pertusa* (L.) de Vriese
var. *klotzschiana* (Schott) Engl., *Monstera*
pertusa (L.) de Vriese var. *modesta*
(Schott) Engl.

Hemiepífita. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Monstera praetermissa E.G. Gonç. &

Temponi
Hemiepífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron Schott, nom. cons.**Philodendron appendiculatum**

Nadruz & Mayo
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Philodendron camposportoanum

G.M. Barroso

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Philodendron cordatum (Vell.) KunthSin.: *Arum cordatum* Vell.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron crassinervium Lindl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron curvilobum Schott

Hierba hemiepífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Philodendron eximium Schott

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Philodendron hastatum K. Koch & Sellow

Hierba hemiepífita. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Philodendron hederaceum (Jacq.)

Schott

Sin.: *Arum hederaceum* Jacq.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Philodendron imbe (Schott) SchottSin.: *Calostigma imbe* Schott

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Philodendron loefgrenii Engl.

Hierba. Nativa. 300-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron martianum Engl.Sin.: *Philodendron cannifolium* Mart., *Caladium crassifolium* Hort

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron meridionale Buturi & Sakur.

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron missionum (Hauman)

Hauman

Sin.: *Philodendron ochrostemon* Schott var. *uleanum* Engl., *Philodendron sonderianum* Schott var. *missionum*

Hauman

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Philodendron obliquifolium Engl.

Arbusto. Nativa. 300 m

Países: BRA(PAR).

Philodendron propinquum Schott

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Philodendron renauxii Reitz

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Philodendron rheophyticum Buturi & Temponi

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Philodendron roseopetiolatum

Nadruz & Mayo

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pistia L.**Pistia stratiotes** L.Sin.: *Pistia occidentalis* Blume, *Pistia stratiotes* L. var. *linguiformis* (Blume) Engl., *Pistia stratiotes* L. var. *obcordata* (Schleid.) Engl.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, MON).

Spathanthem Schott**Spathanthem orbignyanum** Schott

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Spathicarpa Hook.**Spathicarpa hastifolia** Hook.Sin.: *Aroopsis palustris* Rojas Acosta, *Spathicarpa bridgessi* Schott, *Spathicarpa tweedieana* Schott

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(ART).

Spathicarpa lanceolata Engl.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, COA, GUA).

Spirodela Schleid.**Spirodela intermedia** W. KochSin.: *Lemna biperforata* W. Koch, *Lemna polyrrhiza* L. var. *maxima* Griseb., *Spirodela biperforata* W. Koch

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, NEU, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY, CEN, CHO, COA, ÑEE, PHA). URY(CAS, MON, ROC, SJO).

Synandropadix Engl.**Synandropadix vermitoxicum**

(Griseb.) Engl.

Sin.: *Asterostigma vermitoxicum* Griseb., *Lilloa puki* Speg., *Staurostigma vermitoxicum* (Griseb.) Engl.

Hierba. Nativa. 400-1700 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, CEN, PHA).

Syngonium Schott**Syngonium angustatum** Schott

Hierba. Introducida.

Países: BRA(SCA).

Syngonium podophyllum Schott

Hierba. Introducida.

Países: BRA(SCA).

Taccarum Brongn. ex Schott**Taccarum peregrinum** (Schott) Endl.Sin.: *Endera conophalloidea* Regel, *Lysistigma peregrinum* Schott, *Taccarum cylindricum* Arcang., *Taccarum dubium* Bertoni, *Taccarum josephinae* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var. *elatum* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var. *latilobum* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var. *multilobum* Bertoni, *Taccarum variabile* Bertoni var. *primum* Bertoni, Hierba. Nativa.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Taccarum weddellianum Brongn.

Sin.: *Taccarum hasslerianum* Chodat
 Hierba. Nativa. 0-60 0 m.
 Países: BRA(Fuera del área del
 proyecto). PRY(APA, AMA, CAN, CON).

Thaumatococcus Schott**Thaumatococcus bipinnatifidum**

(Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo
 Sin.: *Philodendron bipinnatifidum*
 Schott ex Endl., *Philodendron pygmaeum*
 Chodat & Vischer, *Philodendron selloum*
 C. Koch, *Sphinctrostigma bipinnatifidum*
 Schott, nom. illeg.

Hierba epífita. Nativa. 0-100 0 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,
 CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

Thaumatococcus corcovadense

(Kunth) Sakur., Calazans & Mayo
 Sin.: *Philodendron corcovadense* Kunth,
Philodendron melanorrhizum Reitz
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Thaumatococcus petraeum (Chodat & Vischer) Sakur., Calazans & Mayo

Sin.: *Philodendron petraeum* Chodat,
Philodendron petraeum Chodat
 var. *triangulare* Chodat & Vischer,
Philodendron petraeum Chodat var.
valenzuelae Chodat & Vischer
 Hierba. Endémica. 0-200 m.
 Países: PRY(COA).

Thaumatococcus tweedeanum

(Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo
 Sin.: *Philodendron dubium* Chodat,
Philodendron tweedeanum Schott
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI).
 BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU,
 CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).
 URY(COL, MON, RNO).

Thaumatococcus undulatum (Engl.)

Sakur., Calazans & Mayo
 Sin.: *Philodendron eichleri* Engl.,
Philodendron petraeum Chodat
 var. *tobatiense* Chodat & Vischer,
Philodendron undulatum Engl.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, ERI, MIS).
 BRA(Fuera del área del proyecto).
 PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA,
 PAI, SPE).

Typhonium Schott**Typhonium roxburghii** Schott

Hierba. Introducida.
 Países: BRA(SCA).

Urospatha Schott**Urospatha sagittifolia** (Rudge) Schott

Sin.: *Pothos sagittifolia* Rudge
 Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Wolffia Horkel ex Schleid., nom. cons.**Wolffia brasiliensis** Wedd.

Sin.: *Wolffia papulifera* C.H. Thomps.,
Wolffia punctata Griseb.
 Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
 ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE).
 BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO).
 PRY(APY, APA). URY(MON).

Wolffia columbiana H. Karst.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI,
 LRI, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(RGS).
 PRY(APY). URY(CAS, MON, TYT).

Wolffiella (Hegelm.) Hegelm.**Wolffiella lingulata** (Hegelm.)

Hegelm.
 Sin.: *Wolffia lingulata* Hegelm.
 Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
 FOR, SFE). BRA(Fuera del área del
 proyecto). PRY(APY, CEN, COA).
 URY(MON).

Wolffiella oblonga (Phil.) Hegelm.

Sin.: *Lemna oblonga* Phil., *Wolffia*
lingulata Hegelm. var. *minor* Hegelm.,
Wolffia oblonga (Phil.) Hegelm.
 Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS,
 FOR, JUJ, LPA, RNE, SAL, SFE, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU,
 RME). PRY(APY, CEN, COA). URY(CAS,
 FLA, MON, ROC, SJO, TYT).

Xanthosoma Schott**Xanthosoma sagittifolium** (L.) Schott

Sin.: *Arum sagittifolium* L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Xanthosoma striatipes (Kunth & Bouché) Madison

Sin.: *Acontias striatipes* (Kunth & Bouché) Schott, *Caladium angustifolium* Engl., *Caladium heterotypicum* S. Moore, *Caladium striatipes* (Kunth & Bouché) Schott, *Cyrtospadix striatipes* (Kunth & Bouché) C. Koch, *Philodendron striatipes* Kunth & Bouché
 Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(Fuera del área del
 proyecto). PRY(APA, CAU, CAA, CAN,
 CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Xanthosoma syngoniifolia Rusby

Hierba. Nativa. 500 m
 Países: ARG(SAL).

Xanthosoma taioba E.G. Gonç.

Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Xanthosoma violaceum Schott

Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: BRA(SCA). PRY(APA).

Zantedeschia Spreng., nom. cons.**Zantedeschia aethiopica** (L.) Spreng.

Sin.: *Calla aethiopica* L.
 Hierba. Introducida. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, SAL). BRA(PAR,
 RGS). CHL(VAL, LLA, RME, JFE).
 URY(MON).

ARALIACEAE**Aralia L.****Aralia soratensis** Marchal

Sin.: *Pentapanax angelicifolius* Griseb.
 Árbol. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
 MIS, SAL, TUC).

Aralia warmingiana (Marchal) J. Wen

Sin.: *Coemansia warmingiana* Marchal,
Coudenbergia warmingiana (Marchal)
 Marchal, *Pentapanax warmingianus*
 (Marchal) Harms
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
 SAL, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APA,
 AMA, CAN, COA, SPE).

Dendropanax Decne. & Planch.**Dendropanax affinis** (Marchal)

Gamerro & Zuloaga

Sin.: *Gilibertia affinis* Marchal

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, COA, SPE).

Dendropanax australis Fiaschi &

Jung-Mendaçolli

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.Sin.: *Gilibertia cuneata* (DC.) Marchal, *Hedera cuneata* DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Dendropanax monogynum (Vell.) Seem.Sin.: *Aralia monogynia* Vell., *Gilibertia monogyna* (Vell.) Marchal

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hedera L.**Hedera helix** L.

Hierba, subarbusto o enredadera. Introducida.

Países: ARG(BAI, SAL). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Hydrocotyle L.**Hydrocotyle bonariensis** Lam.Sin.: *Hydrocotyle multiflora* Ruiz & Pav., *Hydrocotyle umbellata* L. var. *bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, BIO). PRY(CAN, ITA, ÑEE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

Hydrocotyle bowlesioides Mathias & Constance

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CEN, GUA, PAI).

Hydrocotyle callicephalo Cham.Sin.: *Hydrocotyle callicephalo* Cham. & Schltld. var. *hirtella* Urb., *Hydrocotyle callicephalo* Cham. & Schltld. var. *villosa* Urb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA).

Hydrocotyle chamaemorus Cham. & Schltld.Sin.: *Hydrocotyle araucana* Phil., *Hydrocotyle araucana* Phil. var. *patagonica* Speg., *Hydrocotyle chamaemorus* Cham. & Schltld. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Hydrocotyle carrerae* Phil., *Hydrocotyle rahmeri* Phil., *Hydrocotyle skottsbergii* Gand., *Hydrocotyle valdiviana* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Hydrocotyle cryptocarpa Speg.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI). CHL(COQ, LBO, BIO, ARA). URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO).

Hydrocotyle exigua (Urb.) MalmeSin.: *Hydrocotyle hirsuta* Sw. var. *exigua* Urb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(MAL, SAO, TYT).

Hydrocotyle filipes MathiasSin.: *Hydrocotyle bonplandii* A. Rich. var. *filipes* (Griseb.) Pérez-Mor., *Hydrocotyle poeppigii* DC. var. *filipes* Griseb.

Hierba. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Hydrocotyle indecora DC.Sin.: *Hydrocotyle bonplandii* A. Rich. var. *chilensis* DC., nom. superfl., *Hydrocotyle marchantioides* Clos

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Hydrocotyle itatiaensis Brade

Hierba. Nativa. 1500-2200 m.

Países: BRA(SCA).

Hydrocotyle langsdorfii DC.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltld.Sin.: *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltld. var. *minuta* (Pohl) Urb., *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltld. var. *truncatiloba* Urb., nom. superfl., *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltld. var. *obtusiloba* Urb., nom. superfl., *Hydrocotyle minuta* Pohl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, ÑEE). URY(ART, COL, MON, SAO, TAC).

Hydrocotyle macrophylla Pohl ex DC.

Hierba. Nativa. 100-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hydrocotyle modesta Cham. & Schltld.Sin.: *Hydrocotyle modesta* Cham. & Schltld. var. *repens* Clos

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MON, PAY, SAO).

Hydrocotyle poeppigii DC.Sin.: *Hydrocotyle lechleri* Phil., *Hydrocotyle uliginosa* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Hydrocotyle pusilla A. Rich.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, MIE). URY(LAV, MON, RIV, TAC).

Hydrocotyle ranunculoides L. f.Sin.: *Hydrocotyle batrachioides* DC., *Hydrocotyle natans* Cirillo, *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. var. *brasiliensis* Urb., *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. var. *incisocrenata* Urb., *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. var. *lobata* Urb.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CAA, ÑEE, PHA). URY(COL, MON, SOR).

Hydrocotyle stella DC.Sin.: *Hydrocotyle quinqueloba* Ruiz & Pav. var. *quadrata* Urb., *Hydrocotyle*

quinqueloba Ruiz & Pav. var. *stella* Urb.
Hierba. Nativa. 100-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hydrocotyle umbellata L.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR). CHL(TAR, VAL,
BIO). PRY(APY, CAA, CEN).

Hydrocotyle verticillata Thunb.
Sin.: *Hydrocotyle verticillata* Thunb.
var. *pluriradiata* Urb., *Hydrocotyle*
volckmanni Phil.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS,
ERI, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(LBO, MAU, BIO, RME). PRY(COA).
URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC).

Oreopanax Decne. & Planch.

Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. &
Planch.
Sin.: *Aralia capitata* Jacq.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oreopanax fulvum Marchal
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oreopanax kuntzei Harms
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Raukagua Seem.

Raukagua laetevirens (Gay) Frodin
Sin.: *Aralia laetevirens* Gay, *Aralia*
paniculata Phil., *Cheirodendron*
laetevirens (Gay) Seem., *Pseudopanax*
laetevirens (Gay) Baill., *Pseudopanax*
laetevirens (Gay) Franch., *Pseudopanax*
racemiflorum (Miq.) Ball, *Sciodaphyllum*
racemiflorum Miq.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Raukagua valdiviensis (Gay) Frodin
Sin.: *Aralia valdiviensis* Gay, *Pseudopanax*
valdiviensis (Gay) Seem. ex Harms
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Schefflera J.R. Forst. & G. Forst.

Schefflera angustissima (Marchal)
Frodin
Sin.: *Didymopanax angustissimum* Marchal
Árbol. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Schefflera calva (Cham.) Frodin & Fiaschi
Sin.: *Didymopanax pachycarpus*
Marchal
Árbol. Nativa. 500-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA).

Schefflera morototoni (Aubl.)
Maguire, Steyererm. & Frodin
Sin.: *Didymopanax morototoni* (Aubl.)
Decne. & Planch., *Panax morototoni* Aubl.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, CAN).

Schefflera vinosa (Cham. & Schltdl.)
Frodin & Fiaschi
Sin.: *Panax vinosus* Cham. & Schltdl.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Tetrapanax (K. Koch) K. Koch

Tetrapanax papyrifer (Hook.) K. Koch
Sin.: *Aralia papyrifera* Hook.
Arbusto. Introducida.
Países: BRA(SCA).

ARECACEAE

Acrocomia Mart.

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Sin.: *Acrocomia chunta* Covas &
Ragonese, *Acrocomia totai* Mart., *Cocos*
aculeata Jacq.
Palmera. Nativa. 100-200 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL).
BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Acrocomia emensis (Toledo) Lorenzi
Sin.: *Acanthococos emensis* Toledo
Palmera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Acrocomia hassleri (Barb. Rodr.) W.J. Hahn
Sin.: *Acanthococos hassleri* Barb. Rodr.

Palmera. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Allagoptera Nees

Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze
Sin.: *Cocos arenaria* Gomes
Palmera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze
Sin.: *Allagoptera campestris*
(Mart.) Kuntze var. *orbigny* Drude,
Diplothemium campestre Mart.,
Diplothemium campestre Mart.
var. *genuinum* Drude, nom. inval.,
Diplothemium campestre Mart. var.
glaziovii Dammer
Palmera acaule. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAN, COA, SPE).

Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze
Sin.: *Allagoptera anisitsii* (Barb. Rodr.)
H. E. Moore, *Allagoptera hassleriana*
(Barb. Rodr.) H. E. Moore, *Diplothemium*
anisitsii Barb. Rodr., *Diplothemium*
hasslerianum Barb. Rodr., *Diplothemium*
jangadensis S. Moore, *Diplothemium*
leucocalyx Drude
Palmera acaule. Nativa. 100-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, PAI).

Astrocaryum G. Mey., nom. cons.

Astrocaryum aculeatissimum
(Schott) Burret
Sin.: *Astrocaryum ayri* Mart.,
Toxophoenix aculeatissima Schott
Palmera. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Attalea Kunth

Attalea anisitsiana (Barb. Rodr.) Zona
Sin.: *Attalea parviflora* Barb. Rodr.,
Scheelea anisitsiana Barb. Rodr., *Scheelea*
parviflora (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.,
Scheelea quadrisperma Barb. Rodr.,
Scheelea quadrisulcata Barb. Rodr.
Palmera. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CON).

Attalea dubia (Mart.) Burret
Sin.: *Attalea indaya* Drude, *Orbignya*
dubia Mart.

Palmera. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Attalea geraensis Barb. Rodr.

Sin.: *Attalea guaranitica* Barb. Rodr.
Palmera. Nativa. 300 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, COA).

Bactris Jacq. ex Scop.

Bactris gasipaes Kunth

Sin.: *Bactris insignis* (Mart.) Baill.,
Guilielma insignis Mart.
Palmera. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

Bactris glaucescens Drude

Sin.: *Bactris anisitsii* Barb. Rodr.
Palmera. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON, SPE).

Bactris hatschbachii Noblick

Palmera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Bactris setosa Mart.

Sin.: *Bactris lindmanniana* Drude ex Lindm.
Palmera. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bactris vulgaris Barb. Rodr.

Palmera. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).

Butia (Becc.) Becc.

Butia campicola (Barb. Rodr.) Noblick

Sin.: *Cocos campicola* Barb. Rodr.,
Syagrus campicola (Barb. Rodr.) Becc.
Palmera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, COA, SPE).

Butia capitata (Mart.) Becc.

Sin.: *Butia bonnettii* Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *elegantissima* (Chabaud) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *erythrospatha* (Chabaud) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *lilaceiflora* (Chabaud) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *nehrlingiana* (Abbott ex Nehrl.) L.H. Bailey, *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *strictior* L.H. Bailey, *Butia capitata* (Mart.) Becc. var.

subglobosa Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *virescens* Becc., *Butia leiospatha* (Barb. Rodr.) Becc., *Butia nehrlingiana* (Abbott ex Nehrl.) L.H. Bailey, *Cocos capitata* Mart., *Cocos elegantissima* Chabaud, *Cocos erythrospatha* Chabaud, *Cocos leiospatha* Barb. Rodr., *Cocos lilaceiflora* Chabaud, *Cocos nehrlingiana* Abbott ex Nehrl., *Syagrus capitata* (Mart.) Glassman

Palmera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(MON, ROC).

Butia catarinensis Noblick & Lorenzi

Palmera. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Butia eriospatha (Mart. ex Drude)

Becc.
Sin.: *Butia eriospatha* (Mart. ex Drude)
Becc. subsp. *punctata* Bomhard, *Cocos eriospatha* Mart. ex Drude, *Syagrus eriospatha* (Mart. ex Drude) Glassman
Palmera. Endémica. 700-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Butia exilata Deble & Marchiori

Palmera. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Butia exospadix Noblick

Palmera. Nativa. 200-600 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CON).

Butia lallemantii Deble & Marchiori

Palmera acaule. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Butia leptospatha (Burret) Noblick

Sin.: *Syagrus leptospatha* Burret
Palmera. Nativa. 300-500 m.
Países: PRY(AMA).

Butia marmorii Noblick

Palmera. Endémica. 200-400 m.
Países: ARG(MIS). PRY(APA).

Butia microspadix Burret

Sin.: *Syagrus hatschbachii* Glassman
Palmera. Endémica. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Butia noblickii Deble, Marchiori, F.S.

Alves & A.S. Oliveira
Palmera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick

Sin.: *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *odorata* (Barb. Rodr.) Becc., *Butia capitata* (Mart.) Becc. var. *pulposa* (Barb. Rodr.) Becc., *Butia pulposa* (Barb. Rodr.) Nehrl., *Cocos odorata* Barb. Rodr., *Cocos pulposa* Barb. Rodr.
Palmera. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(TYT).

Butia paraguayensis (Barb. Rodr.)

L.H. Bailey
Sin.: *Butia amadelpa* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia arenicola* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia dyerana* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia pungens* Becc., *Butia wildemaniana* (Barb. Rodr.) Burret, *Butia yatay* (Mart.) Becc. subsp. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Xifreda & Sanso, *Butia yatay* (Mart.) Becc. var. *paraguayensis* (Barb. Rodr.) Becc., *Cocos amadelpa* Barb. Rodr., *Cocos arenicola* Barb. Rodr., *Cocos dyerana* Barb. Rodr., *Cocos paraguayensis* Barb. Rodr., *Cocos wildemaniana* Barb. Rodr., *Syagrus amadelpa* (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren, *Syagrus arenicola* (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren, *Syagrus dyerana* (Barb. Rodr.) Becc., *Syagrus paraguayensis* (Barb. Rodr.) Glassman, *Syagrus wildemaniana* (Barb. Rodr.) Frambach ex Dahlgren
Palmera. Nativa. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, SPE). URY(ART, RIV).

Butia poni Burret

Sin.: *Cocos poni* Hauman, nom. inval.
Palmera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Butia pubispatha Noblick & Lorenzi

Palmera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Butia witeckii K. Soares & S. Longhi

Palmera. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Butia yatay (Mart.) Becc.

Sin.: *Butia missionera* Deble & Marchiori, *Butia quaraimana* Deble & Marchiori, *Cocos yatay* Mart., *Syagrus yatay* (Mart.) Glassman
Palmera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(PAY, RNO).

Copernicia Mart. ex Endl.**Copernicia alba** Morong

Sin.: *Copernicia australis* Becc., *Copernicia australis* Becc. var. *alba* (Morong) Bertoni ex Hauman, *Copernicia australis* Becc. var. *nigra* (Morong) Bertoni, *Copernicia cerifera* Mart., p.p., *Copernicia chacoana* Rojas Acosta, nom. superfl., *Copernicia nigra* Morong ex Becc., nom. nud., *Copernicia ramulosa* Burret, *Copernicia rubra* Morong, *Coryphomia tectorum* Rojas Acosta

Palmera. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Euterpe Mart., nom. cons.**Euterpe edulis** Mart.

Sin.: *Euterpe egusquiza* Bertoni, nom. nud., *Euterpe edulis* Mart. var. *clausa* Mattos

Palmera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Geonoma Willd.**Geonoma elegans** Mart.

Palmera. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Geonoma gamiova Barb. Rodr.

Palmera. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Geonoma pohliana Mart. subsp. **pohliana**

Sin.: *Geonoma meridionalis* Lorenzi

Palmera. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Geonoma pohliana Mart. subsp. **weddelliana** (H. Wendl. ex Drude) Henderson

Sin.: *Geonoma schottiana* Mart. var. *palustris* Warm. ex Drude, *Geonoma warmingii* Hawkes

Palmera. Nativa. 200-1700 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAN).

Geonoma schottiana Mart.

Sin.: *Geonoma hoehnei* Burret, *Geonoma schottiana* Mart. var. *angustifolia* Drude, *Geonoma schottiana* Mart. var. *latifolia* Drude

Palmera. Nativa. 0-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Juania Drude**Juania australis** (Mart.) Drude ex Hook. f.

Sin.: *Ceroxylon australe* Mart., *Morenia chonta* Phil., *Nunnezharia chonta* (Phil.)

Kuntze

Palmera. Endémica. 200-800 m.

Países: CHL(JFE).

Jubaea Kunth**Jubaea chilensis** (Molina) Baill.

Sin.: *Cocos chilensis* (Molina) Kunth, *Jubaea spectabilis* Kunth, *Micrococos chilensis* (Molina) Phil., *Molinaea micrococos* Bertero, *Palma chilensis* Molina

Palmera. Endémica. 300 m

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Phoenix L.**Phoenix canariensis** Chabaud

Palmera. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA, SDE).

Syagrus Mart.**Syagrus campylospatha** (Barb. Rodr.) Becc.

Sin.: *Cocos acaulis* Drude subsp. *glauca* Drude ex Lindm., *Cocos apaensis* Barb. Rodr., *Cocos campylospatha* Barb. Rodr., *Cocos hassleriana* Barb. Rodr., *Syagrus apaensis* (Barb. Rodr.) Becc., *Syagrus hassleriana* (Barb. Rodr.) Becc.

Palmera. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, CON, COA, PAI).

Syagrus cerqueirana Noblick &

Lorenzi

Palmera. Nativa. 0-800 m.

Países: PRY(AMA).

Syagrus flexuosa (Mart.) Beccari

Sin.: *Cocos flexuosa* Mart.

Palmera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Syagrus hoehnei Burret

Sin.: *Lytocaryum hoehnei* (Burret) Toledo

Palmera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Syagrus lilliputiana (Barb. Rodr.) Becc.

Sin.: *Cocos lilliputiana* Barb. Rodr.

Palmera. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, SPE).

Syagrus loefgrenii Glassman

Sin.: *Syagrus rachidii* Glassman

Palmera. Nativa. 300-900 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON).

Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Sin.: *Cocos oleracea* Mart., *Cocos picrophylla* Barb. Rodr. ex Becc., *Syagrus gomesii* Glassman

Palmera. Nativa. 400-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

Sin.: *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc., *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc. var. *australe* (Mart.) Becc., *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc.

var. *genuinum* Becc., nom. inval., *Cocos acrocomoides* Drude, *Cocos arechavaletana* Barb. Rodr., *Cocos australis* Mart., *Cocos datil* Drude & Griseb., *Cocos geriba* Barb. Rodr., *Cocos martiana* Drude, *Cocos plumosa* Hook. f., *Cocos romanzoffiana* Cham., *Cocos romanzoffiana* Cham. var. *macropindo* Becc., *Cocos sapida* Barb. Rodr.

Palmera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE, SJU, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(MAL, MON, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Trachycarpus H. Wendl.**Trachycarpus fortunei** (Hook.) H. Wendl.

Sin.: *Chamaerops fortunei* Hook.

Palmera. Introducida.

Países: ARG(BAI, TUC).

Trithrinax Mart.**Trithrinax brasiliensis** Mart. var.

acanthocoma (Drude) Mattos

Sin.: *Trithrinax acanthocoma* Drude

Palmera. Endémica. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Trithrinax brasiliensis Mart. var. **brasiliensis**

Sin.: *Trithrinax brasiliensis* (Mart.) Mart. Palmera. Endémica. 400-1100 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb.

Sin.: *Chamaethrinax hookeriana* H. Wendl. & Pfister, *Copernicia campestris* Burmeist. Palmera. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(PAY, RNO, SJO, SJO).

Trithrinax schizophylla Drude var. **biflabellata** (Barb. Rodr.) An. Cano & F.W. Stauffer

Sin.: *Trithrinax biflabellata* Barb. Rodr. Palmera. Endémica. 100-200 m. Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APA, PHA).

Trithrinax schizophylla Drude var. **schizophylla**

Sin.: *Diodosperma burity* H. Wendl. Palmera. Nativa. 200-1400 m. Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, PHA).

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia Tourn. ex L.**Aristolochia angustifolia** Cham.

Sin.: *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *longifolia* Cham., *Aristolochia longifolia* (Cham.) Hauman, *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *guaranitica* Ahumada, *Howardia longifolia* (Cham.) Klotzsch, *Aristolochia brevifolia* (Cham.) Hauman, *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *brevifolia* Cham., *Aristolochia viperina* (Chodat) Chodat & Hassl., *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *viperina* Chodat & Hassl., *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *australis* Ahumada Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE). URY(RNO, SJO, SJO).

Aristolochia arcuata Mast.

Liana. Nativa. Países: BRA(PAR).

Aristolochia argentina Griseb.

Sin.: *Aristolochia parviflora* Griseb., *Aristolochia schreiteri* Ahumada, *Aristolochia glaberrima* Hassl. Enredadera. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(AMA).

Aristolochia barbata Jacq. subsp. **benedicti** Malme

Hierba. Nativa. 200-700 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Aristolochia bridgesii (Klotzsch) Duch.

Sin.: *Howardia bridgesii* Klotzsch Hierba. Endémica. 900-1300 m. Países: CHL(ATA, COQ, LBO, MAU, RME).

Aristolochia burelae Herzog

Sin.: *Aristolochia peltibractea* Hoehne Enredadera. Nativa. 300-1200 m. Países: ARG(SAL). PRY(APY).

Aristolochia castellanosi Ahumada

Sin.: *Aristolochia burkartii* Ahumada Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(COS, MIS). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Aristolochia ceresensis Kuntze

Sin.: *Aristolochia albertiana* Ahumada, *Aristolochia ceresensis* Kuntze var. *joergensenii* (Hauman) Hoehne, *Aristolochia joergensenii* Hauman, *Aristolochia schulzii* Ahumada Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CAT, CHA, FOR, MIS, SFE, SDE). PRY(BOQ, PHA).

Aristolochia chamissonis (Klotzsch) Duch.

Sin.: *Howardia chamissonis* Klotzsch Enredadera. Nativa. Países: BRA(PAR).

Aristolochia chilensis Bridges ex Lindl.

Sin.: *Aristolochia setigera* Klotzsch Hierba. Endémica. 0-1500 m. Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Aristolochia curviflora Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(COS). BRA(RGS).

Aristolochia elegans Mast.

Sin.: *Aristolochia elegans* Mast. var. *hassleriana* (Chodat) Hassl., *Aristolochia hassleriana* Chodat Enredadera. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Aristolochia esperanzae Kuntze

Sin.: *Aristolochia boliviensis* Kuntze, *Aristolochia esperanzae* Kuntze var. *longilabra* Ahumada, *Aristolochia esperanzae* Kuntze var. *major* Hassl. Enredadera. Nativa. 0-900 m. Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CON, PAI, PHA).

Aristolochia fimbriata Cham.

Sin.: *Aristolochia ciliosa* Benth., *Aristolochia ciliata* Hook. f., *Howardia fimbriata* (Cham.) Klotzsch Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, PAY, SAO, SOR, TAC).

Aristolochia gibertii Hook.

Sin.: *Aristolochia cobra* Chodat, *Aristolochia gibertii* Hook. var. *cobra* (Chodat) Chodat, *Aristolochia ipemi* D. Parodi, *Aristolochia warmingii* Mast. var. *angustilaba* Hauman Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Aristolochia gigantea Mart. & Zucc.

Hierba. Nativa. Países: BRA(PAR).

Aristolochia holostylis F. González

Sin.: *Aristolochia reniformis* (Duch.) F. González, hom. illeg., *Duchartrella reniformis* (Duch.) F. González, *Holostylis reniformis* Duch., *Holostylis reniformis* Duch. f. *minor* Chodat & Hassl. Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Aristolochia labiata Willd.

Sin.: *Aristolochia brasiliensis* Mart. & Zucc., *Aristolochia brasiliensis* Mart. & Zucc. var. *macrophylla* Duch. Enredadera. Nativa. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aristolochia lindneri A. Berger

Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(APY).

Aristolochia lingua Malme

Sin.: *Aristolochia ceresensis* Kuntze var. *acuminata* Hoehne, *Aristolochia ceresensis* Kuntze var. *lingua* (Malme) Hoehne, *Aristolochia lingua* Malme var. *acuminata* (Hoehne) Ahumada, comb. inval.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Aristolochia malmeana Hoehne

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Aristolochia melanoglossa Speg.

Sin.: *Aristolochia oranensis* Ahumada
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Aristolochia melastoma Silva Manso ex Duch.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Aristolochia odoratissima L.

Sin.: *Aristolochia aurantiaca* Duch., *Aristolochia glaziovii* Mast., *Aristolochia hassleriana* Chodat var. *guaranitica* Chodat, *Aristolochia hassleriana* L. var. *glaziovii* (Mast.) Hassl., *Aristolochia martiniana* Standl., *Aristolochia moschata* Wedd. ex Duch., *Aristolochia odoratissima* L. f. *brasiliensis* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. f. *paraguariensis* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *genuina* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *grandiflora* Duch., *Aristolochia odoratissima* L. var. *guaranitica* (Chodat) Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *hastata* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *pandurata* (Jacq.) Hoehne, *Aristolochia pandurata* Jacq. var. *warscewiczii* Duch., *Aristolochia pandurata* Jacq., *Aristolochia rimbachii* O.C. Schmidt, *Howardia pandurata* (Jacq.) Klotzsch, *Howardia warscewiczii* Klotzsch ex Duch, nom. inval.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, SPE).

Aristolochia paulistana Hoehne

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aristolochia pearcei Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Aristolochia prostrata Duch.

Sin.: *Aristolochia cardenasii* Standl., *Aristolochia trollii* O.C. Schmidt
Hierba. Nativa. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Aristolochia ridicula N.E. Br.

Enredadera. Nativa. 200-800 m.
Países: PRY(AMA).

Aristolochia robertii Ahumada

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Aristolochia rojasiana (Chodat &

Hassl.) Hosseus
Sin.: *Euglypha rojasiana* Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, COA, PHA).

Aristolochia sessilifolia (Klotzsch) Duch.

Sin.: *Aristolochia brevifolia* (Cham.) Hauman var. *subcordata* Hauman, *Aristolochia emarginata* (Klotzsch) Duch., *Aristolochia sessilifolia* (Klotzsch) Duch. var. *uruguayensis* Hauman, *Howardia emarginata* Klotzsch, *Howardia sessilifolia* Klotzsch
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU). URY(ART, TAC).

Aristolochia stomachoidis Hoehne

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Aristolochia stuckertii Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). URY(ART, RNO, SAO, SOR).

Aristolochia triangularis Cham.

Sin.: *Aristolochia antihysterica* Mart. ex Duch., *Aristolochia paraguariensis* D. Parodi, *Aristolochia salpinx* Mast., *Aristolochia sellowiana* (Klotzsch) Duch., *Aristolochia triangularis* Cham. f. *minor* Chodat, *Aristolochia triangularis* Cham. var. *salpinx* (Mast.) Hauman, *Howardia sellowiana* Klotzsch, *Howardia triangularis* (Cham.) Klotzsch
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE). URY(PAY, SOR).

Aristolochia trilobata L.

Sin.: *Aristolochia appendiculata* Vell., *Aristolochia caudata* Booth ex Lindl., *Aristolochia caudata* D. Parodi, hom. illeg., *Aristolochia macroura* Gomes var. *subtrifida* Duch., *Aristolochia macroura* Gomes, *Aristolochia trifida* Lam., *Aristolochia trilobata* Lindl., hom. illeg., *Howardia macroura* (Gomes) Klotzsch, *Howardia trifida* (Lam.) Klotzsch, *Howardia trilobata* (L.) Klotzsch
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAN, PHA). URY(MON, ROC).

Aristolochia warmingii Mast.

Hierba. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Aristolochia wendeliana Hoehne

Hierba voluble. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Lactoris Phil.**Lactoris fernandeziana** Phil.

Arbusto. Endémica. 500 m
Países: CHL(JFE).

Prosopanche de Bary**Prosopanche americana** (R. Br.) Baill.

Sin.: *Hydnora americana* R. Br., *Prosopanche burmeisteri* de Bary, *Prosopanche costaricensis* L.D. Gómez & Gómez-Laur.
Hierba parásita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE). PRY(PHA).

Prosopanche bonacinai Speg.

Sin.: *Prosopanche bertonensis* Bertoni, *burmeisteri* de Bary var. *minor* Speg. ex Bettfr., *Prosopanche clavata* Chodat, *Prosopanche mazzuchii* Speg., *Prosopanche minor* (Speg. ex Bettfr.) Chodat, *Prosopanche*
Hierba parásita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APA).

ASPARAGACEAE

Agave L.

Agave americana L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COR, LPA).

Anthericum L.

Anthericum argentinense

(Hauman) Guagl.

Sin.: *Anthericum ciliatum* (Kunth)
Spreng. var. *argentinense* Hauman
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Anthericum eccremorrhizum Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa.
Países: ARG(SAL).

Anthericum hickenianum Poelln.

Sin.: *Anthericum parviflorum* Hicken,
hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Anthericum volcanense Ravenna

Hierba. Endémica. 2500-2800 m.
Países: ARG(JUJ).

Asparagus L.

Asparagus aethiopicus L.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Asparagus asparagoides (L.) Wight

Sin.: *Medeola asparagoides* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA). URY(CAS, MAL).

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop

Sin.: *Asparagopsis densiflora* Kunth,
Asparagus sprengeri Regel
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, SFE, TUC).
URY(MON).

Asparagus officinalis L. var. **altilis** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI,
LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SJU,
SLU, TUC). URY(CAS).

Asparagus scoparius Lowe

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(LPA).

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop

Sin.: *Asparagopsis setacea* Kunth,
Asparagus plumosus Baker
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, LPA,
SFE). BRA(SCA).

Beschorneria Kunth

Beschorneria yuccoides K. Koch

Hierba. Introducida. 800-900 m.
Países: ARG(COR).

Clara Kunth

Clara gracilis R.C. Lopes & Andreata

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Clara ophiopogonoides Kunth

Sin.: *Herreria ophiopogonoides* (Kunth)
Niederl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).
PRY(MIE). URY(CAS, FLA, RIV, TAC).

Clara stricta (L.B. Sm.) R.C. Lopes & Andreata

Sin.: *Herreria stricta* L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Cordyline Comm. ex R. Br., nom. cons.

Cordyline sellowiana Kunth

Hierba. Introducida. 200-300 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Cordyline terminalis (L.) Kunth

Arbusto. Introducida.
Países: CHL(IPA).

Echeandia Ortega

Echeandia ciliata (Kunth) Cruden

Sin.: *Anthericum humboldtii* Hemsl.,
Anthericum peruvianum Willd. ex Kunth,
nom. nud., *Anthericum sprengelii* Rusby,
Phalangium ciliatum Kunth
Hierba. Nativa. 2200-2600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Hagenbachia Nees & Mart.

Hagenbachia hassleriana (Baker) Cruden

Sin.: *Chlorophytum hasslerianum* Baker
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(CAN).

Hagenbachia matogrossensis

(Poelln.) Ravenna
Sin.: *Anthericum brasiliense* Baker,
Anthericum matogrossense Poelln.,
Hagenbachia angusta Ravenna
Hierba. Nativa. 400-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Herreria Ruiz & Pav.

Herreria bonplandii Lecomte

Sin.: *Dioscorea tuberosa* Rojas Acosta,
nom. illeg., *Herreria linearifolia* Dammer,
nom. nud., *Herreria montevidensis* Klotzsch
ex Griseb. var. *bonplandii* (Lecomte) L.B.
Sm., *Herreria tuberosa* (Rojas Acosta) Rojas
Acosta, nom. superfl.
Enredadera. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, ÑEE).

Herreria montevidensis Klotzsch ex Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS,
SAL, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,
APA, SPE). URY(COL, MON, RNO).

Herreria stellata Ruiz & Pav.

Sin.: *Herreria verticillata* Molina
Enredadera. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(MAU, BIO, LLA).

Ophiopogon Ker Gawl.

Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker Gawl.

Sin.: *Convallaria japonica* L. f.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(COR).

Oziroo Raf.

Oziroo acaulis (Baker) Speta

Sin.: *Allium sessile* R.E. Fr., *Fortunatia
acaulis* (Baker) Guagl. & S.C. Arroyo,
Oziroo acaulis (Baker) Ravenna, comb.
superfl., *Fortunatia sessilis* (R.E. Fr.)
Ravenna, *Nothoscordum sessile* (R.E.
Fr.) Beauverd, *Oziroo sessilis* (R.E. Fr.)

Ravenna, *Scilla acualis* Baker
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP).

Oziroë argentinensis (Lillo & Hauman) Speta

Sin.: *Fortunatia argentinensis* (Lillo & Hauman) Ravenna, *Oziroë argentinensis* (Lillo & Hauman) Ravenna, comb. superfl., *Oziroë correntina* Ravenna, *Scilla argentinensis* Lillo & Hauman
Hierba. Nativa. 0-3200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, SAL, TUC). PRY(CON).

Oziroë arida (Poepp.) Speta

Sin.: *Fortunatia arida* (Poepp.) Ravenna, *Ornithogalum aridum* Poepp., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don var. *chloroleucum* (Lindl.) Baker, *Ornithogalum chilense* Phil., *Ornithogalum chloroleucum* Lindl., *Oziroë arida* (Poepp.) Ravenna, comb. superfl., *Oziroë chloroleuca* (Poepp.) Speta, *Scilla chloroleuca* (Lindl.) Kunth
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Oziroë biflora (Ruiz & Pav.) Speta

Sin.: *Camassia biflora* (Ruiz & Pav.) Cocucci, *Fortunatia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don, *Ornithogalum geminiflorum* Herb. ex Lindl., *Oziroë biflora* (Ruiz & Pav.) Ravenna, comb. superfl., *Scilla biflora* Ruiz & Pav., *Scilla geminiflora* (Herb.) Kunth, *Scilla triflora* Phil.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Oziroë pomensis Ravenna

Sin.: *Oziroë totorensis* Ravenna
Hierba. Nativa. 1800-3600 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(TAR).

Trichopetalum Lindl.

Trichopetalum chosmalensis Guagl. & Belgrano

Hierba. Endémica. 1000 m
Países: ARG(NEU).

Trichopetalum plumosum (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.

Sin.: *Anthericum plumosum* Ruiz & Pav., *Bottionea thysanotoides* Colla,

Endocoma parviflora Raf., *Endocoma peruviana* Raf., *Trichopetalum gracile* Lindl., *Trichopetalum stellatum* Lindl.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Trihesperus Herb.

Trihesperus glaucus (Ruiz & Pav.) Herb.

Sin.: *Anthericum glaucum* Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUU).

Yucca L.

Yucca aloifolia L.

Arbolito. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(ERI, LPA, TUC).

Yucca gloriosa L.

Arbolito. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).

ASPHODELACEAE

Asphodelus L.

Asphodelus fistulosus L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COR, LPA). CHL(AYP, ATA).

Kniphofia Moench

Kniphofia uvaria (L.) Oken

Sin.: *Aloe uvaria* L.
Hierba. Introducida. 100-1000 m.
Países: ARG(COR).

Pasithea D. Don

Pasithea caerulea (Ruiz & Pav.) D. Don

Sin.: *Anthericum caeruleum* Ruiz & Pav., *Pasithea caerulea* (Ruiz & Pav.) D. Don var. *grandiflora* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

ASTELIACEAE

Astelia Banks & Sol. ex R. Br., nom. cons.

Astelia pumila (G. Forst.) Gaudich.

Sin.: *Astelia pumila* (G. Forst.) R. Br., comb. illeg., *Melanthium pumilum* G. Forst.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

ASTERACEAE

Abrotanella Cass.

Abrotanella diemii Cabrera

Hierba. Endémica. 1400-1700 m.
Países: ARG(NEU).

Abrotanella emarginata (Gaudich.) Cass.

Sin.: *Oligosporus emarginatus* Gaudich.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Abrotanella linearifolia A. Gray

Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(LLA, AIS, MAG, JFE).

Abrotanella purpurea Swenson

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(LLA, AIS, MAG).

Abrotanella submarginata A. Gray

Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(MAG).

Abrotanella trichoachaenia Cabrera

Hierba. Endémica. 800-1600 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(AIS, MAG).

Abrotanella trilobata Swenson

Hierba. Endémica. 400-800 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Acanthospermum Schrank, nom. cons.

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

Sin.: *Acanthospermum brasiliense* Schrank, *Acanthospermum hirsutum* DC., nom. superfl., *Acanthospermum xanthioides* (Kunth) DC., *Centrospermum xanthioides* Kunth, *Melampodium australe* Loefl., *Orcya adhaerens* Vell.,
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Acanthospermum consobrinum S.F.

Blake

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(CEN).

Acanthospermum hispidum DC.Sin.: *Acanthospermum humile* DC. var. *hispidum* (DC.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Acanthostyles R.M. King & H. Rob.**Acanthostyles buniifolius** (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Acanthostyles buniifolius* (L.)R.M. King & H. Rob. var. *saucechicoense* (Hieron.) Ariza, *Acanthostyles saucechicoense* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *bakerii* Kuntze, *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *buniifolium*, *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *hieronymi* Kuntze, *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *saucechicoense* (Hieron.) Ariza, *Eupatorium crithmifolium* Griseb., *Eupatorium pinnatifidum* DC. var. *virgata* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium pinnatifidum* DC., nom. illeg., *Eupatorium pinnatifidum* H. Buek, *Eupatorium saucechicoense* Hieron., *Eupatorium virgatum* D. Don ex Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

Achillea L.**Achillea millefolium** L.Sin.: *Achillea lanulosa* Nutt., *Achillea sudetica* Opiz

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, LPA, LRI, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). URY(CAS, FLA, MON, SAO).

Achillea ptarmica L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(LLA).

Achyrocline (Less.) DC.**Achyrocline alata** (Kunth) DC.Sin.: *Achyrocline alata* (Kunth) DC. var. *vautheriana* (DC.) Baker, *Achyrocline argentina* O. Hoffm., *Achyrocline flavescens* Griseb., *Achyrocline pterocaula* DC., *Achyrocline rufescens* (Kunth) DC., *Achyrocline vautheriana* DC., *Gnaphalium alatum* Kunth, *Gnaphalium rufescens* Kunth, *Gnaphalium incanum* Kunth

Subarbusto. Nativa. 1500-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA). URY(ART, CAS, CLA, MON, ROC, SJO, TAC, TYT).

Achyrocline anabelae Deble

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

Achyrocline candicans (Kunth) DC.Sin.: *Gnaphalium candicans* Kunth

Hierba a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Achyrocline crassiuscula (Malme)

Deble & Marchiori

Sin.: *Achyrocline satureioides* (Lam.)DC. var. *crassiuscula* Malme

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Achyrocline flaccida (Weinm.) DC.Sin.: *Achyrocline citrina* Griseb., *Achyrocline satureioides* (Lam.) DC. var. *albicans* Griseb., *Gnaphalium flaccidum* Weinm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 800-3400 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, COA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO).

Achyrocline gardnerii (Baker) Deble

& Marchiori

Sin.: *Achyrocline satureioides* Gardner, hom. illeg., *Stenocline gardneri* Baker, *Stenophalium gardneri* (Baker) D.J.N. Hind

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Achyrocline gertiana Deble &

Marchiori

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, COA).

Achyrocline glandulosa Blake

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Achyrocline hyperchlora Blake

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Achyrocline luisiana Deble

Subarbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: BRA(RGS).

Achyrocline macella Deble &

Marchiori

Subarbusto. Nativa. 1000 m.

Países: BRA(PAR).

Achyrocline marchiorii Deble

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

Achyrocline mathiolaefolia DC.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Achyrocline ramosissima BrittonSin.: *Achyrocline brittoniana* Deble & Marchiori, nom. superfl., *Gnaphalium ramosissimum* Sch. Bip., hom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 2200-4000 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

CHL(AYP).

Achyrocline rupestris Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2900-4700 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP).

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.Sin.: *Gnaphalium satureioides* Lam.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, COA, GUA, PAI). URY(CAS, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Achyrocline tomentosa RusbySin.: *Achyrocline polycephala* Rusby

Subarbusto. Nativa. 700-3600 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR). PRY(AMA, PAI).

Achyrocline vargasiana DC.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Achyrocline venosa Rusby

Subarbusto. Nativa. 1600-2800 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA,
MIE, PAI, PHA).

Acilepidopsis H. Rob.**Acilepidopsis echitifolia** (Mart. ex DC.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia echitifolia* Mart. ex DC.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SC).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Acmella Rich. ex Pers.**Acmella alpestris** (Griseb.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes alpestris* Griseb.
Hierba. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,
JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR).
PRY(PAI, PHA).

Acmella bellidioides (Sm.) R.K. Jansen

Sin.: *Ceratocephalus arnicoides* (DC.)
Kuntze, *Ceratocephalus decumbens* (Sm.)
Kuntze var. *doronicoides* (DC.) Kuntze,
Rudbeckia bellidioides Sm., *Spilanthes*
arnicoides DC. var. *intermedia* Chodat,
Spilanthes arnicoides DC. var. *setosa* Chodat,
Spilanthes arnicoides DC., *Spilanthes*
bellidioides (Sm.) Cabrera, *Spilanthes*
blepharicarpa DC., *Spilanthes doronicoides*
DC., *Spilanthes grandis* DC., *Spilanthes*
grisea (Chodat) A.H. Moore var. *intermedia*
(Chodat) A.H. Moore, *Spilanthes grisea*
(Chodat) A.H. Moore var. *micra* A.H.
Moore, *Spilanthes grisea* (Chodat) A.H.
Moore var. *setosa* (Chodat) A.H. Moore,
Spilanthes longifolia DC., *Spilanthes*
sphaerocephala DC.

Hierba. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, MIE, PHA, SPE).
URY(MON, TAC).

Acmella brachyglossa Cass.

Sin.: *Ceratocephalus caespitosus* (DC.)
Kuntze, *Spilanthes arrayana* Gardner,
Spilanthes caespitosa DC., *Spilanthes*
eggersii Hieron., *Spilanthes limonica* A.H.
Moore, *Spilanthes ocymifolia* (Lam.) A.H.

Moore f. *radiifera* A.H. Moore
Hierba. Nativa. 100-3000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA).

Acmella ciliata (Kunth) Cass.

Sin.: *Acmella fimbriata* (Kunth) Cass.,
Ceratocephalus ciliatus (Kunth) Kuntze,
Ceratocephalus fimbriatus (Kunth) Kuntze,
Ceratocephalus poeppigii (DC.) Kuntze,
Spilanthes ciliata Kunth, *Spilanthes fimbriata*
Kunth, *Spilanthes melampodioides* Gardner,
Spilanthes poeppigii DC., *Spilanthes*
popayanensis Hieron.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CHA, JUJ). BRA(PAR, SCA).

Acmella decumbens (Sm.) R.K. Jansen
var. **affinis** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes affinis* Hook. & Arn.,
Spilanthes americana (L. f.) Hieron.
f. *ciliatifolia* A.H. Moore, *Spilanthes*
eurycarena A.H. Moore, *Spilanthes*
micralloeophylla A.H. Moore
Hierba. Endémica. 400-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA,
LRI, RNE, SDE, SLU, TUC).

Acmella decumbens (Sm.) R.K. Jansen
var. **decumbens**

Sin.: *Ceratocephalus decumbens* (Sm.)
Kuntze var. *macropoda* (DC.) Kuntze,
Ceratocephalus decumbens (Sm.) Kuntze,
Rudbeckia decumbens Sm., *Spilanthes*
americana (L. f.) Hieron. var. *stolonifera*
(DC.) A.H. Moore, *Spilanthes arnicoides*
DC. var. *macropoda* (DC.) Baker,
Spilanthes decumbens (Sm.) A.H. Moore
var. *macropoda* (DC.) A.H. Moore,
Spilanthes decumbens (Sm.) A.H. Moore,
Spilanthes helenioides Hook. & Arn.,
Spilanthes macropoda DC., *Spilanthes*
stenophylla Hook. & Arn. *Spilanthes*
stolonifera DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, ÑEE).
URY(CAS, MON, ROC).

Acmella glaberrima (Hassl.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes glaberrima* Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SDE,
SFE). CHL(MAU). PRY(AMA, CAA,
CEN, CON, MIE, PHA, SPE).

Acmella grisea (Chodat) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes arnicoides* DC. f. *grisea*
Chodat, *Spilanthes arnicoides* DC. var.
grisea (Chodat) Chodat, *Spilanthes grisea*

(Chodat) A.H. Moore
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).
BRA(PAR). PRY(CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Acmella leptophylla (DC.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes arnicoides* DC. var.
leptophylla (DC.) Baker, *Spilanthes*
arnicoides DC. f. *minor* Chodat,
Spilanthes arnicoides DC. f. *nervosa*
Chodat, *Spilanthes decumbens* (Sm.) A.H.
Moore var. *leptophylla* (DC.) A.H. Moore,
Spilanthes grisea (Chodat) A.H. Moore
var. *chodatana* A.H. Moore, *Spilanthes*
leptophylla DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).
PRY(APA, CAA, GUA, PHA).

Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes oleracea* L.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

Acmella oppositifolia (Lam.) R.K. Jansen

Sin.: *Acmella mutisii* (Kunth) Cass.,
nom. superfl., *Acmella occidentalis* Rich.,
nom. superfl., *Anthemis americana* L. f.,
hom. illeg., *Anthemis occidentalis* Willd.,
nom. superfl., *Anthemis oppositifolia*
Lam., *Ceratocephalus americanus* Kuntze,
nom. superfl., *Spilanthes americana*
Hieron., nom. superfl., *Spilanthes*
mutisii Kunth, nom. superfl., *Spilanthes*
oppositifolia (Lam.) D'Arcy
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

Acmella psilocarpa R.K. Jansen

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).

Acmella pusilla (Hook. & Arn.) R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes americana* (L. f.)
Hieron. f. *longiinternodiata* A.H.
Moore, *Spilanthes pusilla* Hook. & Arn.,
Spilanthes stolonifera DC. var. *pusilla*
(Hook. & Arn.) Baker
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS).
PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, PAI,
PHA). URY(RNO).

Acmella serratifolia R.K. Jansen

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(PHA). URY(COL, RIV, TYT).

Acrisione B.Nord.**Acrisione cymosa** (J. Remy) B. Nord.

Sin.: *Senecio cymosus* J. Remy
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Acrisione denticulata (Hook. & Arn.)B. Nord. var. **denticulata**

Sin.: *Cacalia denticulata* Hook. & Arn.,
Danaa yegua Colla, *Senecio denticulatus*
(Hook. & Arn.) DC. var. *araeus* Phil.,
Senecio denticulatus (Hook. & Arn.) DC.
var. *depilis* Phil., *Senecio denticulatus*
(Hook. & Arn.) DC., hom. illeg., *Senecio*
ovalifolius Turcz., *Senecio rancaguensis*
J. Remy, *Senecio yegua* (Colla) Cabrera
var. *depilis* (Phil.) Cabrera, *Senecio yegua*
(Colla) Cabrera var. *yegua*
Arbusto. Endémica. 700-900 m.
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Acrisione denticulata (Hook. & Arn.)B. Nord. var. **pilota** (Phil.) B. Nord.

Sin.: *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC.
var. *pilotus* Phil., *Senecio yegua* (Colla) Cabrera
var. *pilotus* (Phil.) Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LLA, RME).

Actinoseris (Endl.) Cabrera**Actinoseris radiata** (Vell.) Cabrera

Sin.: *Ingenhuzia radiata* Vell., *Onoseris*
brevifolia D. Don, *Seris denticulata*
DC., *Richterago radiata* (Vell.) Roque,
Trichocline radiata (Vell.) S.F. Blake
Hierba. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Adenocaulon Hook.**Adenocaulon chilense** Less.

Sin.: *Adenocaulon lechleri* Sch. Bip.,
Boerhavia nudicaulis Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS, MAG).

Adenostemma J.R. Forst. & G.
Forst.**Adenostemma brasilianum** (Pers.) Cass.

Sin.: *Adenostemma brasilianum*
(Pers.) Cass. var. *triangulare* (DC.)
Malme, *Adenostemma triangularis* DC.,

Adenostemma viscosum J.R. Forst. var.
brasilianum (Pers.) Benth., *Adenostemma*
viscosum J.R. Forst. var. *triangulare*
(DC.) Benth., *Verbesina brasiliana* Pers.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, MIS, SAL,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
AMA, CAU, GUA, PAI). URY(CLA, MAL,
MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Adenostemma involucreatum

R.M. King & H. Rob.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Adenostemma verbesina (L.) Kuntze

Sin.: *Adenostemma swartzii* Cass., *Cotula*
verbesina L., *Lavenia decumbens* Sw.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, GUA).

Ageratina Spach**Ageratina azangaroensis** (Sch. Bip. ex

Wedd.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium azangaroense* Sch.
Bip. ex Wedd., *Eupatorium prasiifolium*
Griseb. var. *glanduliferum* R.E. Fr.,
Fleischmannia prasiifolia (Griseb.) R.M.
King & H. Rob. var. *glandulifera* (R.E.
Fr.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Ageratina glechnophylla (Less.) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Ageratina remyana* (Phil.)
R.M. King & H. Rob., *Eupatorium*
glechnophyllum Less., *Eupatorium*
remyanum Phil.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, RME).

Ageratina lorentzii (Hieron.) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium lorentzii* Hieron.
Hierba. Nativa. 2000-3400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Ageratina tenuis (R.E. Fr.) R.M. King

& H. Rob.

Sin.: *Eupatorium tenue* R.E. Fr.
Subarbusto. Endémica. 1500-1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Ageratum L.**Ageratum conyzoides** L.

Sin.: *Ageratum conyzoides* L. var. *hirtum*
(Lam.) DC., *Ageratum hirtum* Lam.,
Ageratum hirsutum Poir., *Ageratum latifolium*
Cav., *Carelia conyzoides* (L.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).
PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA,
ITA). URY(ART).

Ageratum fastigiatum (Gardner)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Isocarpha fastigiata* Gardner
Hierba a arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Agoseris Raf.**Agoseris chilensis** (Less.) Greene

Sin.: *Macrorhynchus chilensis* Less.,
Troximon chilense A. Gray
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Agoseris coronopifolia (d'Urv.) K.L.

Chambers ex D.M. Moore

Sin.: *Agoseris australis* (Phil.)
Macloskie, *Agoseris pumila* (Gaudich.)
Macloskie, *Macrorhynchus australis*
Phil., *Macrorhynchus elatus* Phil.,
Macrorhynchus poeppigii DC.,
Macrorhynchus pumilum (Gaudich.)
DC., *Taraxacum coronopifolium* d'Urv.,
Taraxacum pumilum Gaudich., *Agoseris*
poeppigii (DC.) Greene, *Troximon*
coronopifolius (d'Urv.) Cabrera, *Troximon*
poeppigii (DC.) De Wild., *Troximon*
pumilum (Gaudich.) De Wild.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Aldama La Llave**Aldama adenotricha** (S.F. Blake)

E.E. Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera adenotricha* S.F. Blake
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Aldama amphichlora (S.F. Blake)

E.E. Schill. & Panero

- Sin.: *Viguiera amphichlora* S.F. Blake
Hierba. Endémica. 200-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).
- Aldama anchusifolia** (DC.) E.E.Schill.
& Panero var. **anchusifolia**
Sin.: *Leighia anchusifolia* DC., *Leighia baldwiniana* Nutt., *Leighia dissitifolia* DC., *Leighia lomatonoura* DC., *Rhysolepis anchusifolia* (DC.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera anchusifolia* (DC.) Baker var. *anchusifolia*
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).
- Aldama anchusifolia** (DC.) E.E.Schill.
& Panero var. **imarginata** (S.F. Blake)
Magenta & Pirani
Sin.: *Leighia immarginata* DC., *Leighia stenophylla* Hook. & Arn., *Viguiera anchusifolia* (DC.) Baker var. *immarginata* (DC.) Baker, *Viguiera stenophylla* (Hook. & Arn.) Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, PAY, SJO, TAC).
- Aldama aspilioides** (Baker) E.E.Schill.
& Panero
Sin.: *Rhysolepis aspilioides* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera aspilioides* Baker, *Wedelia aspilioides* (Baker) B.L. Turner
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Aldama atacamensis** (Phil.) E.E.Schill.
& Panero
Sin.: *Rhysolepis atacamensis* (Phil.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera atacamensis* Phil., *Viguiera linearis* Reiche
Subarbusto. Endémica. 2800-2900 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Aldama breviflosculosa** (S.F. Blake)
E.E.Schill. & Panero
Sin.: *Viguiera breviflosculosa* S.F. Blake
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CLA, FLA, LAV, MAL, RIV, TAC, TYT).
- Aldama densifolia** (Baker) E.E.Schill.
& Panero
Sin.: *Viguiera densifolia* Baker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU).
- Aldama fabrisii** (A.A. Sáenz)
E.E.Schill. & Panero
Sin.: *Rhysolepis fabrisii* (A.A. Sáenz) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera fabrisii* A.A. Sáenz
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).
- Aldama filifolia** (Sch. Bip. ex Baker)
E.E.Schill. & Panero
Sin.: *Viguiera filifolia* Sch. Bip.
Hierba. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).
- Aldama gilliesii** (Hook. & Arn.)
E.E.Schill. & Panero
Sin.: *Flourensia hispidula* Phil., *Helianthus heteropappus* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Leighia gilliesii* Hook. & Arn., *Rhysolepis gilliesii* (Hook. & Arn.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera gilliesii* (Hook. & Arn.) Hieron.
Subarbusto. Endémica. 1600-3300 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
- Aldama helianthoides** (Rich.) E.E. Schill. & Panero
Sin.: *Flourensia atacamensis* (Phil.) Reiche, *Helianthus atacamensis* Phil., *Helianthus procumbens* Pers., *Rhysolepis helianthoides* (Rich.) H. Rob. & A.J. Moore, *Sanvitalia helianthoides* Rich., *Viguiera pazensis* Rusby, *Viguiera pflanzii* Perkins, *Viguiera procumbens* (Pers.) S.F. Blake, *Viguiera punensis* S.F. Blake
Hierba. Nativa. 1300-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR).
- Aldama knobiana** (Mondin & Magenta) E.E.Schill. & Panero
Sin.: *Viguiera knobiana* C.A. Mondin & Magenta
Subarbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(RGS).
- Aldama linearifolia** (Chodat)
E.E.Schill. & Panero
Sin.: *Aldama rojasii* (S.F. Blake) E.E.Schill. & Panero, *Rhysolepis linearifolia* (Chodat) H. Rob. & A.J. Moore, *Rhysolepis rojasii* (S.F. Blake) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera linearifolia* Chodat, *Viguiera rojasii* S.F. Blake
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, PAI, SPE).
- Aldama macrorhiza** (Baker) E.E.Schill.
& Panero
Sin.: *Rhysolepis macrorhiza* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera hassleriana*
- Chodat, *Viguiera macrorhiza* Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN).
- Aldama megapotamica** (Malme)
Magenta & Pirani
Sin.: *Viguiera megapotamica* Malme
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Aldama meridionalis** (Magenta)
E.E.Schill. & Panero
Sin.: *Viguiera meridionalis* Magenta
Hierba o subarbusto. Endémica. 600-700 m.
Países: BRA(RGS).
- Aldama misionensis** (A.A. Sáenz) Freire
Sin.: *Viguiera misionensis* A.A. Sáenz
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).
- Aldama mollis** (Griseb.) E.E.Schill. & Panero
Sin.: *Helianthopsis mollis* (Griseb.) Sala & Echarte, *Helianthus argentinus* A.A. Sáenz, *Rhysolepis mollis* (Griseb.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera mollis* Griseb.
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
- Aldama nudicaulis** (Baker) E.E.Schill.
& Panero
Sin.: *Rhysolepis nudicaulis* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera nudicaulis* Baker
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, TAC, TYT).
- Aldama paranensis** (Malme) Magenta & Pirani
Sin.: *Aspilia paranensis* Malme, *Viguiera paranensis* (Malme) J.U. Santos, *Wedelia paranensis* (Malme) B.L. Turner
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Aldama pilicaulis** (S.F. Blake)
E.E.Schill. & Panero
Sin.: *Viguiera pilicaulis* S.F. Blake, *Viguiera robusta* Gardner var. *scaberrima* Hassl., *Viguiera robusta* Gardner var. *confusa* Hassl.
Hierba. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).
- Aldama pilosa** (Baker) E.E.Schill. & Panero
Sin.: *Aldama salicifolia* (Hassl.) E.E.Schill. & Panero, *Rhysolepis pilosa* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore, *Rhysolepis*

salicifolia (Hassl.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera malmei* S.F. Blake, *Viguiera pilosa* Baker, *Viguiera salicifolia* Hassl., *Viguiera villaricensis* S.F. Blake
Hierba. Endémica. 300-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Aldama revoluta (Meyen) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Flourensia corymbosa* DC. var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Flourensia corymbosa* DC. var. *lanceolata* (Meyen) Reiche, *Flourensia corymbosa* DC., *Flourensia gayana* (Phil.) Reiche, *Helianthus araucanus* Phil., *Helianthus gyanus* Phil., *Helianthus lanceolatus* Meyen, *Helianthus revolutus* Meyen, *Viguiera corymbosa* (DC.) Blake, *Viguiera gayana* (Phil.) Cabrera ex Espinosa, nom. illeg., *Viguiera poeppigii* A. Gray, nom. illeg., *Viguiera revoluta* (Meyen) S.F. Blake

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, RME).

Aldama robusta (Gardner) E.E. Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera robusta* Gardner

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Aldama santacatarinensis (H. Rob. & A.J. Moore) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Rhysolepis santacatarinensis* H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera santacatarinensis* (H. Rob. & A.J. Moore) A.A. Sáenz, *Viguiera santacatarinensis* (H. Rob. & A.J. Moore) Magenta & C.A. Mondin, comb. superfl.

Arbusto. Endémica. 400-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Aldama squalida (S. Moore) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Viguiera squalida* S. Moore
Hierba a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Aldama subdentata (S.F. Blake)

E.E.Schill. & Panero
Sin.: *Viguiera subdentata* S.F. Blake
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Aldama trichophylla (Dusén)

Magenta
Sin.: *Viguiera trichophylla* Dusén
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aldama tuberosa (Griseb.) E.E.Schill. & Panero var. **guaranitica** (Chodat) Magenta

Sin.: *Aldama guaranitica* (Chodat) E.E.Schill. & Panero, *Rhysolepis guaranitica* (Chodat) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera guaranitica* Chodat, *Viguiera tuberosa* Griseb. f. *angustifolia* Hassl., *Viguiera tuberosa* Griseb. f. *major* Hassl., *Viguiera tuberosa* Griseb. f. *scaberula* Hassl., *Viguiera tuberosa* Griseb. var. *guaranitica* (Chodat) Hassl.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA, SPE).

Aldama tuberosa (Griseb.) E.E.Schill. & Panero var. **tuberosa**

Sin.: *Rhysolepis tuberosa* (Griseb.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera tuberosa* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CON, ITA, PHA). URY(ART, PAY, RNO, RIV).

Aldama tucumanensis (Hook. & Arn.) E.E.Schill. & Panero

Sin.: *Leighia tucumanensis* Hook. & Arn., *Rhysolepis tucumanensis* (Hook. & Arn.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera discoidea* (Griseb.) S.F. Blake, *Viguiera oligodonta* S.F. Blake, *Viguiera stenophylla* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* Griseb., *Viguiera tucumanensis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* (Griseb.) Cabrera, *Viguiera tucumanensis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *oligodonta* (Blake) Cabrera, *Viguiera tucumanensis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *tucumanensis*
Hierba. Nativa. 500-3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Amblyopappus Hook. & Arn.

Amblyopappus pusillus Hook. & Arn. var. **pauciflorus** (Phil.) Reiche

Sin.: *Amblyopappus pauciflorus* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Amblyopappus pusillus Hook. & Arn. var. **pusillus**

Sin.: *Aroma tenuifolia* Nutt., *Infantea chilensis* J. Remy
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, JFE).

Ambrosia L.

Ambrosia arborescens Mill.

Sin.: *Franseria artemisioides* Willd., *Franseria conwayi* Rusby
Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.
Países: CHL(AYP, COQ).

Ambrosia artemisiifolia L.

Sin.: *Ambrosia artemisiifolia* L. var. *elatior* (L.) Descourt., *Ambrosia chilensis* Hook. & Arn., *Ambrosia elatior* L., *Ambrosia peruviana* Cabrera, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO). PRY(CAA, COA, PHA). URY(ART, CAS, FLA, MON, PAY, RNO, RIV).

Ambrosia artemisioides Meyen & Walp. ex Meyen

Sin.: *Franseria fruticosa* Phil., *Franseria meyeniana* Sch. Bip.
Arbusto. Nativa. 1700-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Ambrosia chamissonis (Less.) Greene

Sin.: *Franseria bipinnatifida* Nutt. var. *insularis* Reiche, *Franseria chamissonis* Less.
Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Ambrosia peruviana Willd.

Sin.: *Ambrosia paniculata* Michx. var. *peruviana* (Willd.) O.E. Schulz
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Ambrosia polystachya DC.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ambrosia scabra Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, DFE, SFE). BRA(RGS, SCA).

Ambrosia tenuifolia Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(CEN, PHA). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO).

Ameghinoa Speg.**Ameghinoa patagonica** Speg.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Anaphalis DC.**Anaphalis chilensis** Reiche

Sin.: *Helichrysum chilense* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 500-800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Antennaria Gaertn.**Antennaria chilensis** J. Remy var. **chilensis**

Sin.: *Gnaphalium affine* d'Urv. var. *parvulum* Speg.

Hierba. Endémica. 1600-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Antennaria chilensis J. Remy var. **magellanica** (Sch. Bip.) Reiche

Sin.: *Antennaria magellanica* Sch. Bip.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Antennaria sleumeri Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-2100 m.
Países: ARG(SAL).

Anthemis L.**Anthemis arvensis** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(LBO, BIO, ARA, LLA, RME). URY(MON).

Anthemis cotula L.

Sin.: *Chamaemelum cotula* (L.) All., *Maruta cotula* (L.) DC.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(CEN, ITA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Aphyllocladus Wedd.**Aphyllocladus denticulatus** (J. Remy)

Cabrera var. **calvus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Jobaphes virgatus* Phil. var. *calvus* Phil.
Arbusto. Endémica. 2000-2900 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Aphyllocladus denticulatus (J. Remy)

Cabrera var. **denticulatus**
Sin.: *Cyclolepis denticulata* J. Remy, *Jobaphes virgatus* Phil., *Plazia virgata* (Phil.) O. Hoffm.
Arbusto. Endémica. 700-2700 m.
Países: CHL(ATA).

Aphyllocladus ephedroides Cabrera

Arbusto. Endémica. 1200-1600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Aphyllocladus sanmartinianus Molfino

Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Aphyllocladus spartioides Wedd.

Sin.: *Hyalis spartioides* (Wedd.) Griseb., *Plazia spartioides* (Wedd.) Kuntze
Arbusto. Nativa. 2400-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Apopyros G.L. Nesom**Apopyros corymbosus** (Hook. & Arn.) G.L. Nesom

Sin.: *Aster setosus* Baker, *Aster tuberosus* Less. ex Baker, *Conyza blanchetii* Sch. Bip. ex Baker, *Conyza setosa* (Baker) Malme, *Diplopappus corymbosus* Hook. & Arn., *Erigeron blanchetii* Sch. Bip. ex Baker
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, COA).

Archidasphyllum (Cabrera)

P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo

Archidasphyllum diacanthoides

(Less.) P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo
Sin.: *Chuquiraga leucoxydon* Poepp. ex Less., *Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera, *Flotovia diacanthoides* Less., *Flotovia stiffoides* Speg., *Piptocarpha diacanthoides* Hook. & Arn.
Árbol. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Archidasphyllum excelsum (D.

Don) P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo
Sin.: *Chuquiraga excelsa* D. Don, *Dasyphyllum excelsum* (D. Don) Cabrera, *Flotovia excelsa* (D. Don) DC., *Piptocarpha excelsa* (D. Don) Hook. & Arn.
Árbol. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Arctium L.**Arctium minus** (Hill) Bernh.

Sin.: *Arctium degeni* Lindb., *Arctium pubens* Bab., *Lappa glabra* Lam., *Lappa minor* Hill
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, SJU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(CAS, FLA, MON, SOR).

Arctotheca Vaill.**Arctotheca calendula** (L.) Levyns

Sin.: *Arctotis calendula* L. var. *superba* (L.) L., *Arctotis calendula* L. var. *tristis* (L.) L., *Arctotis calendula* L., *Arctotis calendulacea* Willd., *Arctotis superba* L., *Arctotis tristis* L., *Cryptostemma calendula* (L.) Druce, *Cryptostemma calendulaceum* (L.) R. Br.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Arctotis L.**Arctotis stoechadifolia** P.J. Bergius

Sin.: *Arctotis decumbens* Thunb., *Arctotis grandis* Thunb.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI). BRA(RGS). URY(COL).

Argyranthemum Webb ex Sch. Bip.**Argyranthemum frutescens** (L.) Sch. Bip.

Sin.: *Chrysanthemum frutescens* L., *Pyrethrum frutescens* (L.) Willd.
Subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). CHL(COQ, RME).

Aristeguetia R.M. King & H. Rob.**Aristeguetia salvia** (Colla) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium salvium* Colla
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Arnica L.**Arnica angustifolia** Vahl

Sin.: *Arnica alpina* (L.) Olin & Ladau
 subsp. *angustifolia* (Vahl) Macloskie, *Arnica alpina* (L.) Olin & Ladau subsp. *genuina* Maguire, nom. inval., *Arnica alpina* (L.) Olin & Ladau var. *angustifolia* (Vahl) Fernald, *Arnica alpina* (L.) Olin & Ladau, hom. illeg., *Arnica angustifolia* Vahl subsp. *alpina* (L.) L.K. Ferguson, *Arnica attenuata* Greene, *Arnica intermedia* Turcz., *Arnica lowii* Holm, *Arnica montana* L. var. *alpina* L., *Arnica montana* L. var. *angustifolia* (Vahl) Hook., *Arnica plantaginea* Pursh, *Arnica sornborgeri* Fernald, *Arnica terrae-novae* Fernald
 Hierba. Introducida. 1500-1700 m.
 Países: ARG(NEU). CHL(LLA).

Artemisia L.**Artemisia abrotanum** L.

Arbusto o subarbusto. Introducida.
 500-1000 m.
 Países: ARG(NEU, RNE, SFE, TDF).

Artemisia absinthium L.

Subarbusto. Introducida. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, DFE, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE).

Artemisia annua L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, NEU, SAL, SFE, SJU, TUC).

Artemisia copa Phil. var. **copa**

Arbusto o arbolito. Endémica. 3000-4700 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU).
 CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, VAL).

Artemisia copa Phil. var. **trifida** Acevedo

Arbusto. Endémica. 2400 m.
 Países: CHL(ANT).

Artemisia douglasiana Besser

Hierba. Introducida. 500-1000 m.
 Países: ARG(COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

Artemisia echegarayi Hieron.

Subarbusto. Endémica. 2000-3100 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Artemisia magellanica Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

Artemisia mendozana DC. var. **mendozana**

Sin.: *Seriphidium mendozanum* (DC.)
 Bremer & Humphries
 Subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Artemisia mendozana DC. var.

paramilloensis F.A. Roig & Ambrosetti
 Subarbusto. Endémica. 2400-3100 m.
 Países: ARG(MEN).

Artemisia verlotorum Lamotte

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU).
 URY(CLA, FLA, MON, RNO).

Aspilia Thouars**Aspilia attenuata** (Gardner) Baker

Sin.: *Viguiera attenuata* Gardner,
Wedelia attenuata (Gardner) B.L. Turner
 Subarbusto. Nativa. 700-900 m.
 Países: BRA(PAR).

Aspilia aurantiaca Griseb. var.

aurantiaca
 Sin.: *Wedelia aurantiaca* (Griseb.)
 B.L. Turner
 Subarbusto. Nativa. 500-2500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Aspilia aurantiaca Griseb. var.

vulcanica Cabrera
 Subarbusto. Nativa. 200-2200 m.
 Países: ARG(JUJ).

Aspilia camporum Chodat

Sin.: *Wedelia camporum* (Chodat)
 B.L. Turner
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, PAI).

Aspilia clauseniana Baker

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS). BRA(PAR).
 PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).

Aspilia floribunda (Gardner) Baker

Sin.: *Aspilia gracilis* (Gardner) Baker,
Aspilia pseudoviguiera H. Rob., *Viguiera floribunda* Gardner, *Viguiera gracilis* Gardner, *Viguiera ramosissima* Gardner
 Arbusto. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR).

Aspilia foliacea (Spreng.) Baker

Sin.: *Aspilia burchellii* Sch. Bip. ex
 Baker, *Aspilia elegans* (Gardner) Benth.
 & Hook. f., *Aspilia foliacea* (Spreng.)
 Baker var. *angustifolia* (Gardner)
 Baker, *Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker
 var. *hirsuta* (Gardner) Baker, *Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker var. *oblonga* Baker, *Aspilia glabra* (Gardner) Benth.
 & Hook. f., *Aspilia hirsuta* (Gardner)
 B.D. Jacks. & Hook. f., *Aspilia pusilla*
 Baker, *Viguiera elegans* Gardner, *Viguiera foliacea* Spreng., *Viguiera glabra* Gardner,
Viguiera hirsuta Gardner, *Viguiera pusilla*
 Less. ex Baker, *Wedelia burchellii* (Baker)
 B.L. Turner, *Wedelia glabra* (Gardner)
 B.L. Turner, *Wedelia hirsuta* (Gardner)
 B.L. Turner
 Hierba. Nativa. 0-200 m.
 Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAU).

Aspilia hassleriana Chodat

Sin.: *Aspilia hassleriana* Chodat var.
scaberrima Chodat, *Wedelia hassleriana*
 (Chodat) B.L. Turner
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(APA).

Aspilia latissima Malme

Sin.: *Aspilia cuyabensis* Malme
 Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

Aspilia leucanthema Chodat

Sin.: *Wedelia leucanthema* (Chodat)
 B.L. Turner
 Subarbusto. Endémica. 300-600 m.
 Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Aspilia linearis S.F. Blake

Sin.: *Aspilia linearifolia* Baker, nom. illeg.
 Hierba. Nativa. 100-300 m.
 Países: ARG(COS, MIS).

Aspilia montevidensis (Spreng.) Kuntze

Sin.: *Aspilia arillata* (DC.) Griseb.,
Aspilia buphthalmiflora (DC.) Griseb.,
Aspilia calendulacea (DC.) Griseb., *Aspilia montevidensis* (Spreng.) Kuntze var. *setosa*
 (Griseb.) Cabrera, *Aspilia setosa* Griseb.,
Leighia arillata DC., *Leighia buphthalmiflora*
 DC., *Leighia calendulacea* DC., *Verbesina montevidensis* Spreng., *Wedelia montevidensis* (Spreng.) B.L. Turner
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).
 URY(ART, CAS, CLA, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).

Aspilia pascalioides Griseb.Sin.: *Wedelia pascalioides* (Griseb.)

B.L. Turner

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, RNO, RIV, SAO, SJO, TYT).

Aspilia phyllostachya BakerSin.: *Wedelia phyllostachya* (Baker)

B.L. Turner

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: PRY(CON).

Aspilia reflexa (Sch. Bip. ex Baker) BakerSin.: *Aspilia setosa* Griseb. var. *reflexa* (Sch. Bip. ex Baker) Chodat, *Viguiera reflexa* Sch. Bip. ex Baker, *Wedelia reflexa* (Baker) B.L. Turner, *Wedelia sessilifolia* Mart. ex Baker

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN).

Aspilia riedelli BakerSin.: *Wedelia riedelii* (Baker) B.L. Turner

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: PRY(CAU).

Aspilia silphioides (Hook. & Arn.)

Benth. & Hook. f.

Sin.: *Gymnopsis helianthoides* DC., *Leighia silphioides* Hook. & Arn., *Wedelia silphioides* (Hook. & Arn.) B.L. Turner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, COA, ÑEE, PHA). URY(MON, RNO, SJO).

Asteropsis Less.**Asteropsis megapotamica** (Spreng.)

Marchesi

Sin.: *Aster megapotamicus* Spreng., *Asteropsis macrocephala* Less., *Neja macrocephala* DC., *Podocoma macrocephala* (Less.) Herter, *Podopappus tomentosus* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

Austrobrickellia R.M. King & H. Rob.**Austrobrickellia arnottii** (Baker)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium arnottii* Baker, *Eupatorium**tenuiflorum* (Griseb.) Hieron., *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *a* Hook. & Arn., *Mikania tenuiflora* Griseb., *Willoughbya tenuiflora* (Griseb.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ).

Austrobrickellia patens (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. var. **patens**Sin.: *Eupatorium patagonicum* Klatt, *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *patens*, *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *gracilior* Lorentz, *Eupatorium patens* Phil., hom. illeg., *Eupatorium vattuonei* Hicken, *Eupatorium xerolepis* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.

Arbusto. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, PHA).

Austrobrickellia patens (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. var. **rhodolaena** (Griseb.) Ariza & S.E. FreireSin.: *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *rhodolaenum* Griseb.

Arbusto. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

Austrobrickellia patens (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. var. **tomentosa** (Hieron.) Ariza & S.E. FreireSin.: *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *tomentosum* Hieron.

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Austrocritonia R.M. King & H. Rob.**Austrocritonia velutina** (Gardner)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium velutinum* Gardner.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Austro eupatorium R.M. King & H. Rob.**Austro eupatorium apense** (Chodat) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium apense* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, SPE).

Austro eupatorium inulifolium

(Kunth) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Austro eupatorium entreriense* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium entreriense* Hieron., *Eupatorium inulifolium* Kunth f. *suaveolens* (Kunth) Hieron., *Eupatorium inulifolium* Kunth, *Eupatorium molle* Kunth, nom. illeg., *Eupatorium pallescens* DC. var. *bonariense* DC., *Eupatorium pallescens* DC. var. *hirsuta* DC., *Eupatorium pallescens* DC., *Eupatorium pallidum* Hook. & Arn., *Eupatorium paranense* Hook. & Arn., *Eupatorium suaveolens* Kunth

Arbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO).

Austro eupatorium laetevirens

(Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium laetevirens* Hook. & Arn., *Eupatorium steviifolium* DC. var. *angustius* DC., *Eupatorium steviifolium* DC. var. *laetevirens* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium steviifolium* DC. var. *salicinum* Chodat, *Eupatorium tweedeanum* Hook. & Arn. var. *angustius* (DC.) Malme

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI).

Austro eupatorium neglectum (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium neglectum* B.L. Rob.

Subarbusto rupícola. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Austro eupatorium picturatum

(Malme) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium picturatum* Malme

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Austro eupatorium rosmarinaceum (Cabrera & Vittet) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium rosmarinaceum*Cabrera & Vittet, *Eupatorium steviifolium* DC. var. *rosmarinifolia* Baker

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Austro eupatorium silphiifolium (Mart.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium silphiifolium* Mart.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Ayapana R.M. King & H. Rob.

Ayapana amygdalina (Lam.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium amygdalinum*
Lam. var. *amygdalinum*, *Eupatorium amygdalinum* Lam. var. *ocythlaenum* (DC.) Baker, *Eupatorium hasslerianum* Chodat, *Eupatorium oxythlaenum* DC., *Eupatorium oxythlaenum* DC. f. *hasslerianum* (Chodat) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Ayapanopsis R.M. King & H. Rob.

Ayapanopsis esperanzae (Hassl.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium schininii* Cabrera, *Eupatorium esperanzae* Hassl. var. *schininii* (Cabrera) Cabrera, *Eupatorium esperanzae* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, COA, PAD).

Ayapanopsis tucumanensis (Lillo & B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium tucumanense* Lillo & B.L. Rob.
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Aylacophora Cabrera

Aylacophora deserticola Cabrera
Sin.: *Nardophyllum deserticola* (Cabrera) G.L. Nesom
Arbusto. Endémica. 500-700 m.
Países: ARG(NEU).

Baccharis L., nom. cons.

Baccharis acaulis (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera
Sin.: *Baccharis acaulis* (Wedd. ex R.E. Fr.) Malag., nom. illeg., *Heterothalamus acaulis* Wedd. ex R.E. Fr., *Pseudobaccharis acaulis* (Wedd. ex R.E.

Fr.) Cabrera, *Psila caespitosa* Phil.
Hierba. Nativa. 3300-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Baccharis albida Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE).

Baccharis albolanosa A.S.Oliveira & Deble Oliveira & Deble
Sin.: *Lanugothamnus albolanosus* (A.S. Oliveira & Deble) Deble
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Baccharis aliena (Spreng.) Joch.Müll.
Sin.: *Heterothalamus alienus* (Spreng.) Kuntze, *Heterothalamus brunoides* Less., nom. superfl., *Marshallia aliena* Spreng.
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(COR, LRI, SLU).
BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

Baccharis alnifolia Meyen & Walp.
Arbusto. Nativa. 3000-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Baccharis alpina Kunth
Sin.: *Baccharis alpina* Kunth var. *nivalis* Wedd., *Baccharis alpina* Kunth var. *nummuloides* Heering, *Baccharis alpina* Kunth var. *serpyllifolia* Wedd., *Baccharis alpina* Kunth f. *macrocephala* Hieron., *Baccharis caespitosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *nummuloides* (Heering) Cuatrec., *Baccharis caespitosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *alpina* (Kunth) Cuatrec., *Baccharis humifusa* Kunth
Subarbusto. Nativa. 4000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP).

Baccharis amambayensis Zardini & Soria
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Baccharis angusticeps Dusén ex Malme
Subarbusto. Endémica. 1100-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis anomala DC.
Sin.: *Pingraea anomala* (DC.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(ART, DUR, RNO, RIV, TAC, TYT).

Baccharis aphylla (Vell.) DC.
Sin.: *Baccharis nuda* (Vell.) DC., *Chrysocoma aphylla* Vell., *Chrysocoma nuda* Vell.
Subarbusto. Nativa. 800 m.
Países: BRA(PAR).

Baccharis apicifoliosa A.A. Schneid. & Boldrini
Arbusto. Endémica. 700-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis aracatubensis Malag. & Hatschbach ex G.M. Barroso
Sin.: *Baccharis delicata* Malag. & Hatschbach
Subarbusto. Endémica. 700-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis arenaria Baker
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, ROC).

Baccharis argentina Heering
Sin.: *Baccharis flabellata* Hook. & Arn. var. *argentina* (Heering) Ariza
Arbusto. Endémica. 0-2100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC).

Baccharis artemisioides Hook. & Arn.
Sin.: *Lanugothamnus artemisioides* (Hook. & Arn.) Deble
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, RNE, SLU, SFE, TUC).

Baccharis articulata (Lam.) Pers.
Sin.: *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. var. *gaudichaudiana* (DC.) Baker, *Baccharis gaudichaudiana* DC., *Conyza articulata* Lam., *Molina articulata* (Lam.) Less., *Pingraea articulata* (Lam.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO, TYT).

Baccharis axillaris DC.
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera

Sin.: *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera, *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Malag., comb. superfl., *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cuatrec., comb. superfl., *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Malag., comb. superfl., *Heterothalamus boliviensis* Wedd. var. *latifolius* R.E. Fr., *Heterothalamus boliviensis* Wedd., *Pseudobaccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera, *Pseudobaccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera, *Psila boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera, *Psila boliviensis* (Wedd.) Cabrera

Arbusto. Nativa. 1500-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Baccharis brachylaenoides DC. var. **brachylaenoides**

Sin.: *Baccharis grandimucronata* I.L. Teodoro, *Baccharis meridensis* Steyerl., *Baccharis oblanceolata* Rusby, *Baccharis oblongifolia* (Ruiz & Pav.) Pers., *Baccharis venulosa* DC., *Molina oblongifolia* Ruiz & Pav., *Psila brachylaenoides* (DC.) Aristeg.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis brachylaenoides DC.

var. **polycephala** (I.L. Teodoro) G.M. Barroso
Sin.: *Baccharis brachylaenoides* DC.
var. *polycephala* (I.L. Teodoro) Govaerts, comb. superfl., *Baccharis brachylaenoides* DC. var. *rufidula* (Sch. Bip.) A.S. Oliveira & Deble, comb. illeg., *Baccharis polycephala* Sch. Bip., nom. nud., *Pseudobaccharis polycephala* I.L. Teodoro
Arbusto. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis brevifolia DC.

Sin.: *Baccharis myrsinoides* Hook. & Arn., *Baccharis xerophila* Mart.
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(TYT).

Baccharis breviseta DC.

Sin.: *Baccharidastrum argutum* (Less.) Cabrera, *Conyza arguta* Less.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CON, COA, GUA, ITA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, RNO, ROC, SJO, TAC).

Baccharis cabreræ Ariza

Arbusto. Endémica. 2600 m.
Países: ARG(SAL).

Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Molina caespitosa* Ruiz & Pav.
Subarbusto. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT, LBO).

Baccharis calliprinos Griseb.

Sin.: *Baccharis adscendens* Pers., *Baccharis mirabilis* Heering, *Baccharis petiolata* DC. var. *rotundifolia* Phil., *Baccharis petiolata* DC., *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *calliprinos* (Griseb.) Joch.Müll., *Baccharis scandens* (Ruiz & Pav.) Pers., *Molina scandens* Ruiz & Pav., *Pingraea scandens* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 1400-3500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Baccharis calvescens DC.

Sin.: *Baccharis oleifolia* Gardner
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis camporum DC. f. **camporum**

Sin.: *Baccharis camporum* DC. f. *typica* Heering, nom. inval., *Baccharis cephalotes* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, SPE).

Baccharis camporum DC. f.

parvifolia Heering
Subarbusto. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Baccharis capitalensis Heering

Arbusto. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Baccharis caprariifolia DC.

Sin.: *Baccharis bairdii* Hook. & Arn., *Baccharis caprariifolia* DC. subsp. *recurvata* (Gardner) Malag., comb. illeg., *Baccharis grisea* Baker
Baccharis recurvata Gardner
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, SPE). URY(RIV, TYT).

Baccharis chionolaenoides D.B.

Falkenb. & Deble
Sin.: *Lanugothamnus chionolaenoides* (D.B. Falkenb. & Deble) Deble
Subarbusto. Endémica. 1800 m.
Países: BRA(SCA).

Baccharis cognata DC.

Sin.: *Baccharis hoehneana* I.L., Teodoro, *Baccharis pauciflosculosa* DC. var. *puncticulata* DC.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

Baccharis concava (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Molina concava* Ruiz & Pav., *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *intermedia* Heering
Arbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: CHL(BIO).

Baccharis concinna G.M. Barroso

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Baccharis conyzoides (Less.) DC.

Sin.: *Molina conyzoides* Less., *Pingraea conyzoides* (Less.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis cordobensis Heering

Sin.: *Baccharis rotundifolia* Spreng. var. *stuckertii* Heering, *Baccharis sessiliflora* Vahl var. *stuckertii* (Heering) Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, SFE).

Baccharis coridifolia DC.

Sin.: *Baccharis coridifolia* DC. var. β , *Eupatorium montevidense* Spreng., *Lanugothamnus montevidensis* (Spreng.) Deble
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE).
URY(ART, CAS, COL, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, TAC, TYT).

Baccharis coronata Giuliano

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis crispa Spreng.

Sin.: *Baccharis cylindrica* (Less.) DC., *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers.

var. *crispa* (Spreng.) Baker, *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *cylindrica* (Less.) Baker, *Baccharis perplexa* Malag. & J.E. Vidal, *Pingraea crispa* (Spreng.) F.H. Hellwig, *Molina crispa* (Spreng.) Less., *Molina cylindrica* Less., *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. subsp. *crispa* (Spreng.) Joch.Müll., *Baccharis lorentzii* (J.S. Muell.) Deble, *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. subsp. *lorentzii* J.S. Muell.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI). URY(LAV, MAL, MON, RIV).

Baccharis cultrata Baker

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(LAV, MAL, MON, RIV, TAC).

Baccharis curitybensis Heering

Sin.: *Lanugothamnus curitybensis* (Heering ex Malme) Deble

Arbusto. Nativa. 900-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis cymosa Phil.

Sin.: *Pingraea cymosa* (Phil.) F.H. Hellwig

Arbusto. Endémica. 1000-1300 m.

Países: CHL(LRI, LLA).

Baccharis darwinii Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis angulata* Griseb., *Baccharis angulata* Griseb. var. *andina* Hieron., *Baccharis angulata* Griseb. var. *gracilis* Heering, *Baccharis grossedentata* Heering, *Baccharis ulicina* Hook. & Arn. var. *subintegrifolia* Kuntze, *Neomolina darwinii* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig, nom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(LLA, AIS). URY(RNO).

Baccharis deblei A.S. Oliveira &

Marchiori

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis deltoidea Baker

Sin.: *Baccharis tridentata* Vahl var. *deltoidea* (Baker) Heering

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Baccharis dentata (Vell.) G.M. Barroso

Sin.: *Baccharis fuchsiifolia* Gardner, *Baccharis macrodonta* DC., *Baccharis orgyalis* DC., *Chrysocoma dentata* Vell., *Chrysocoma maritima* Vell., *Baccharis orgyalis* DC. f. *fuchsiifolia* (Gardner) Heering, *Baccharis orgyalis* DC. var. *fuchsiifolia* (Gardner) I.L. Teodoro Malag.

Arbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, GUA).

Baccharis divaricata Hauman

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, RNE).

Baccharis dracunculifolia DC. subsp. **dracunculifolia**

Sin.: *Baccharis bracteata* Hook. & Arn., *Baccharis doniana* Hook. & Arn., *Baccharis dracunculifolia* DC. f. *spectabilis* Heering, *Baccharis dracunculifolia* DC. f. *subviscosa* Kuntze, *Baccharis leptospermoides* DC., *Baccharis paucidentata* Sch. Bip., nom. nud., *Baccharis pulverulenta* Klatt, *Conyza linearifolia* Spreng., nom. nud.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, bSFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC, TYT).

Baccharis dracunculifolia DC. subsp. **tandilensis** (Speg.) Giuliano

Sin.: *Baccharis tandilensis* Speg.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Baccharis dunensis A.A. Schneid. &

G. Heiden

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

Baccharis effusa Griseb.

Arbusto. Nativa. 900-2800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Baccharis elaeoides J. Remy

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(BIO, LRI, LLA).

Baccharis elliptica Gardner

Subarbusto. Nativa. 900 m.

Países: BRA(PAR).

Baccharis erigeroides DC.

Sin.: *Baccharis erigeroides* DC. var. *dusenii* Heering, *Baccharis puberula* DC., *Lanugothamnus erigeroides* (DC.) Deble

Subarbusto. Nativa. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis erioclada DC.

Sin.: *Baccharis subintegrifolia* Sch. Bip., nom. nud.

Arbusto. Nativa. 200-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Baccharis famatinensis Ariza

Arbusto. Endémica. 2100 m.

Países: ARG(LRI).

Baccharis flabellata Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 200-2500 m.

Países: ARG(COR, LPA, LRI, SDE, SJU, SLU). BRA(RGS). URY(ART, PAY, SAO).

Baccharis flexuosiramosa A.A.

Schneid. & Boldrini

Arbusto. Endémica. 900-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis floccosa Deble & A.S.

Oliveira

Arbusto. Endémica. 1200-1700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis frenguelli Cabrera

Sin.: *Baccharis hassleriana* I.L. Teodoro

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE). PRY(CEN, COA, PAI).

Baccharis genistelloides (Lam.) Pers.

Sin.: *Baccharis venosa* (Ruiz & Pav.) Pers., *Conyza genistelloides* Lam., *Molina venosa* Ruiz & Pav.

Subarbusto. Nativa. 3300-4800 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Baccharis genistifolia DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, SFE). URY(CAS, FLO, MAL, MON, ROC, SJO).

Baccharis gibertii Baker

Sin.: *Lanugothamnus gibertii* (Baker) Deble

Arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, ROC, SJO).

Baccharis gilliesii A. Gray

Sin.: *Baccharis icma* Stuck. ex Heering, *Baccharis involucreta* (Phil.) O. Hoffm., *Baccharis nana* D. Don ex Baker, *Baccharis paucidentata* DC. var. β , *ICMA involucreta* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Baccharis glaziovii Baker

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis glutinosa Pers.

Sin.: *Baccharis angustifolia* (Cass.) Desf., nom. illeg., *Baccharis farinosa* Pers. ex Spreng, nom. superfl., *Baccharis glutinosa* Pers. var. *angustissima* (DC.) Giuliano, *Baccharis huydobriana* J. Remy, p.p., *Baccharis litoralis* Phil., *Baccharis longipes* Kunze ex DC. var. *angustissima* Phil., *Baccharis medullosa* DC. var. *latifolia* Hieron. ex Heering, *Baccharis medullosa* DC., *Baccharis pingraea* DC. f. *latifolia* DC., *Baccharis pingraea* DC. var. *angustissima* DC., *Baccharis pingraea* DC. var. *latifolia* DC., nom. superfl., *Baccharis pingraea* DC. var. *pingraea*, *Baccharis prenanthoides* Baker, p.p., *Baccharis serrulata* (Lam.) Pers. var. *pingraea* (DC.) Baker, *Baccharis subpingraea* Heering f. *crassifolia* Heering, *Baccharis subpingraea* Heering f. *crassifolia* Heering, p.p., *Baccharis subpingraea* Heering f. *pseudoulicina* Heering, *Baccharis subpingraea* Heering, *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze, comb. illeg., *Conyza montevidensis* Spreng., *Molina viscosa* Ruiz & Pav., *Pingraea angustifolia* Cass., *Pingraea viscosa* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SJO).

Baccharis gnaphalioides Spreng.

Sin.: *Baccharis psammophila* Malme, *Baccharis radicans* DC., *Lanugothamnus gnaphalioides* (Spreng.) Deble

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC, TAC).

Baccharis gracilis DC.

Sin.: *Neomolina gracilis* (DC.) F.H. Hellwig

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAA, GUA).

Baccharis grandimucronata Malag.

Sin.: *Baccharis nebulae* Malag. & Hatschbach ex A.S. Oliveira

Arbusto. Nativa. 1000-1900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis grisebachii Hieron.

Sin.: *Baccharis abietina* Kuntze, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *andicola* Hauman

Arbusto. Nativa. 2000-3800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Baccharis helichrysoides DC.

Sin.: *Baccharis lanuginosa* Gardner, *Baccharis leucolepis* Sch. Bip., nom. nud., *Baccharis polyantha* Spreng., hom. illeg., *Lanugothamnus helichrysoides* (DC.) Deble

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, GUA).

Baccharis hirta DC.

Sin.: *Baccharis prenanthoides* Baker, p.p.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, MON, RIV).

Baccharis humilis Sch. Bip. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Baccharis hyemalis Deble

Sin.: *Heterothalamus rupestris* Deble, A.S. Oliveira & Marchiori

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Baccharis hypericifolia Baker

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Baccharis illinitoides Malag.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: PRY(AMA, CAU).

Baccharis incisa Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis axillaris* DC. var. *acutiloba* DC., *Baccharis axillaris* DC. var. *dentata* DC., *Baccharis incisa* Hook. & Arn. var. *dentata* (DC.) Baker

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Baccharis inexpectata Deble & A.S.

Oliveira

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Baccharis intermedia DC.

Sin.: *Baccharis gayana* Phil., *Baccharis volckmannii* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Baccharis intermixta Gardner

Arbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis isabelae Soria & Zardini

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA, PAI).

Baccharis itapirocensis A.S. Oliveira & Deble

Subarbusto. Endémica. 1400-1800 m.

Países: BRA(PAR).

Baccharis jocheniana G. Heiden & Macias

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Baccharis juncea (Lehm.) Desf. subsp. **clavata** Joch.Müll.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Baccharis juncea (Cass.) Desf. subsp. **juncea**

Sin.: *Arrhenachne juncea* Cass., *Baccharis subulata* D. Don ex Hook. & Arn., *Stephananthus junceus* Lehm.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, LRI, LLA, AIS, RME). URY(MON).

Baccharis junciformis DC.

Sin.: *Baccharis brachystachys* (Baker) Malag. & J.E. Vidal, *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *brachystachys* Baker, *Baccharis heeringeana* Malag., *Baccharis trimeroides* Malme, *Baccharis usterii* Heering

Arbusto a subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Baccharis kurtziana Ariza

Arbusto. Endémica. 1700-2100 m.

Países: ARG(LRI, SAL, SJU).

Baccharis lateralis Baker

Sin.: *Baccharis montana* Sch. Bip., nom. nud., *Baccharis schultzei* Baker
Arbusto. Nativa. 900-2200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Baccharis floribunda* Kunth, *Baccharis polyantha* Kunth, *Baccharis polyantha* Kunth var. *macrophylla* Hieron., *Baccharis polyantha* Kunth f. *genuina* Hieron., nom. inval., *Baccharis riparia* Kunth, *Pingraea latifolia* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Pluchea glabra* Griseb., *Molina latifolia* Ruiz & Pav.
Arbusto o arbolito. Nativa. 800-2400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Baccharis leucocephala Dusén

Sin.: *Lanugothamnus leucocephalus* (Dusén) Deble
Arbusto. Endémica. 800-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis leucopappa DC.

Sin.: *Baccharis helichrysoides* DC. var. *leucopappa* (DC.) Baker, *Lanugothamnus leucopappus* (DC.) Deble
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis lilloi Heering

Arbusto. Nativa. 2000-3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Baccharis linearifolia (Lam.) Pers. subsp. **linearifolia**

Sin.: *Baccharis baldwinii* Hook. & Arn., *Baccharis leptoccephala* DC., *Baccharis leptophylla* DC., *Baccharis pseudotenuifolia* I.L. Teodoro, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *rufescens*, *Baccharis curvifolia* Gardner, *Baccharis denticulata* D. Don ex DC., *Baccharis fluminensis* Glaz. ex I.L. Teodoro, nom. nud., *Baccharis guianensis* M.R. Schomb., nom. nud., *Baccharis maritima* Baker, *Baccharis pseudotenuifolia* I.L. Teodoro var. *leptophylla* (DC.) Giuliano, *Baccharis paucidentata* DC., *Baccharis pseudotridentata* Heering, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *leptocephala* (DC.) Baker, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *leptophylla* (DC.) Baker, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *subrufescens* (Heering) Ariza, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *tenuifolia* (DC.) Baker, nom. inval., *Baccharis rufescens* Spreng. var. *varians* (Gardner) Baker, *Baccharis santiaguensis* Heering, *Baccharis*

subspathulata Gardner, *Baccharis subrufescens* Heering, *Baccharis tenuifolia* DC., hom. illeg., *Baccharis tenuifolia* DC. var. *leptophylla* (DC.) Malme, nom. inval., *Baccharis varians* Gardner, p.p.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

Baccharis linearifolia (Lam.) Pers.

subsp. **polycephala** (Wedd.) Joch.Müll.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(MIS, SAL).

Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.

subsp. **linearis**
Sin.: *Baccharis holmbergii* Hicken, *Baccharis lingulata* Kunze ex Less., *Baccharis linifolia* Meyen, *Baccharis montteana* Phil., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn., *Molina linearis* Ruiz & Pav.
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.

subsp. **pycnocephala** F.H. Hellwig
Sin.: *Baccharis callistemooides* Walp., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *callistemooides* (Walp.) Heering ex Reiche, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subandina* (Phil.) Heering, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subsinuata* DC., *Baccharis subandina* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Baccharis longiattenuata A.S.

Oliveira
Arbolito o arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis lycioides J. Remy

Sin.: *Baccharis negerii* Heering, *Baccharis valdiviana* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Baccharis lymanii G.M. Barroso

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis macraei Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *lucida* Heering
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Baccharis magellanica (Lam.) Pers.

Sin.: *Baccharis tricuneata* (L. f.) Pers. var. *magellanica* (Lam.) Cuatrec., *Conyza magellanica* Lam.
Arbusto. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Baccharis malmei Joch.Müll.

Arbusto. Nativa. 900-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis megapotamica Spreng. var. **megapotamica**

Sin.: *Baccharis pyramidalis* Gardner
Arbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, GUA). URY(RIV, ROC, TAC, TYT).

Baccharis megapotamica Spreng. var. **weirii** (Baker) G.M. Barroso

Sin.: *Baccharis weirii* Baker
Arbusto. Nativa. 700-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis melanopotamica Speg.

Sin.: *Baccharis dusenii* O. Hoffm.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, RNE, SLU).

Baccharis mesoneura DC.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis microcephala (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis mendes-magalhaensis* Barreto, nom. nud., *Baccharis microptera* Baker, *Molina microcephala* Less.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Baccharis microdonta DC.

Sin.: *Baccharis meridionalis* Heering & Dusén, *Baccharis refracta* Burch. ex Baker, *Baccharis sebastianopolitana* Baker
Arbusto. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SAO).

Baccharis milleflora (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis genistelloides* (Lam.)
Pers. var. *milleflora* (Less.) Baker, *Molina milleflora* Less.

Subarbusto. Nativa. 0-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis minutiflora Mart. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis montana DC.

Sin.: *Baccharis elaeagnoides* Steud. ex Baker, *Baccharis semiserrata* DC. var. *elaeagnoides* (Steud. ex Baker) Barroso
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, ITA, PAI).

Baccharis multiflosculosa Heering

Arbusto. Nativa. 2100-2300 m.
Países: ARG(SAL).

Baccharis multifolia A.S. Oliveira, Deble & Marchiori

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Baccharis mylodontis F.H. Hellwig

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(MAG).

Baccharis myricifolia DC.

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis myriocephala DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA). URY(Desconocida).

Baccharis napaea G. Heiden

Subarbusto. Endémica. 700-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis neaei DC.

Sin.: *Baccharis bezanilleana* J. Remy var. *solisii* (Phil.) Reiche, *Baccharis bezanilleana* J. Remy, *Baccharis rhetinodes* Meyen & Walp., *Baccharis solieri* J. Remy var. *williamsii* (Phil.) Heering, *Baccharis solieri* J. Remy, *Baccharis solisii* Phil., *Baccharis talcareguensis* Heering ex Reiche, *Baccharis williamsii* F. Phil. ex Phil.
Arbusto. Endémica. 0-3200 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Baccharis nebularis G. Heiden

Arbusto. Endémica. 1400-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis neorupestris Deble & A.S.

Oliveira
Sin.: *Baccharis rupestris* Heering, nom. inval.
Arbusto. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Baccharis niederleinii Heering var. **niederleinii**

Arbusto. Endémica. 1200-1300 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Baccharis niederleinii Heering var. **potrerillana** Ariza

Arbusto. Endémica. 2200-2500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Baccharis nitida (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Baccharis nitida* (Ruiz & Pav.)
Pers. f. *angustifolia* Cuatrec., *Baccharis oronocensis* DC., *Baccharis oronocensis* DC. var. *perua* Cuatrec., *Baccharis popayanensis* Hieron., *Baccharis prinoides* Kunth, *Molina nitida* Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativa. 900-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Baccharis nivalis (Wedd.) Sch. Bip. ex Phil.

Sin.: *Heterothalamus nivalis* Wedd., *Lucilia dioica* Phil., *Palenia delfinii* Phil.
Hierba. Endémica. 500-3500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Baccharis notoserigila Griseb.

Sin.: *Baccharis curtifolia* S. Moore, *Baccharis genistifolia* DC. var. β
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU, CEN, COA, PHA). URY(CAS, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TAC).

Baccharis nummularia Heering ex Malme

Sin.: *Baccharis barrosoana* Mattos
Arbolito. Endémica. 900-2200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis obovata Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis foliosa* Hook. & Arn., *Baccharis obovata* Hook. & Arn. subsp. *umbelliformis* (DC.) F.H. Hellwig, *Baccharis umbelliformis* DC., *Baccharis umbelliformis* DC. f. *frigida* Heering, nom. superfl., *Baccharis umbelliformis* DC. var. β , *Baccharis umbelliformis* DC. var. *typica* Heering, nom.

inval., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *vulgaris* Heering

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Baccharis ochracea Spreng.

Sin.: *Baccharis velutina* DC., *Lanugothamnus ochraceus* (Spreng.) Deble
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).

Baccharis opuntioides Mart. ex Baker

Arbusto. Nativa. 1200-2500 m.
Países: BRA(SCA).

Baccharis oreophila Malme

Arbusto. Endémica. 1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis organensis Baker

Arbolito. Nativa. 800-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis oxyodonta DC.

Sin.: *Baccharis triplinervia* DC., *Pingraea oxyodonta* (DC.) F.H. Hellwig
Arbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CEN, GUA, PAI). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON).

Baccharis palustris Heering

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis pampeana A.S. Oliveira, Deble & Marchiori

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Baccharis paniculata DC.

Sin.: *Baccharis philippii* Heering, *Neomolina paniculata* (DC.) F.H. Hellwig, nom. illeg., *Baccharis floribunda* Phil., hom. illeg., *Baccharis leptoccephala* Phil., hom. illeg., *Nardophyllum paniculatum* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Baccharis paranensis Heering & Dusén

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis patagonica Hook. & Arn. subsp. **palenae** (Phil.) F.H. Hellwig
Sin.: *Baccharis palenae* Phil., *Baccharis patagonica* Hook. & Arn. var. *palenae* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémica.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Baccharis patagonica Hook. & Arn. subsp. **patagonica**

Sin.: *Baccharis cuneifolia* (Lam.) DC., hom. illeg., *Chrysocoma cuneifolia* Jacq., *Conyza cuneifolia* Lam.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Baccharis patens Baker

Sin.: *Baccharis bakeri* Heering, *Baccharis squarrosa* Baker, *Lanugothamnus patens* (Baker) Deble
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

Baccharis paucicostata Joch.Müll. & Giuliano

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1900-3200 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Baccharis pauciflosculosa DC.

Sin.: *Baccharis subincisa* Heering & Dusén
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis pedersenii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). PRY(COA, GUA, ITA).

Baccharis penningtonii Heering

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, SFE).
BRA(RGS). URY(CAS, COL, MON, SJO).

Baccharis pentaptera (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis stenocephala* Baker, *Molina pentaptera* Less.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis pentodonta Malme

Sin.: *Baccharis gracillima* Heering ex Dusén, *Baccharis pluridentata* Heering
Arbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, GUA).

Baccharis pentziifolia Sch. Bip. ex Baker var. **minor** G.M. Barroso
Arbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis pentziifolia Sch. Bip. ex Baker var. **pentziifolia**

Sin.: *Baccharis praemorsa* Heering, nom. nud., *Baccharis sphenophylla* Dusén ex Malme, *Baccharis subumbelliformis* Heering ex Malme
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis perulata Kuntze

Sin.: *Baccharis densiflora* Wedd. subsp. *perulata* (Kuntze) Joch.Müll.
Arbusto. Nativa. 1200-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Baccharis petraea Heering

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).
PRY(CEN, COA, PAI). URY(FLO, FLA).

Baccharis petrophila R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 3600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Baccharis phyllicifolia DC.

Sin.: *Baccharis anabelae* (Deble) G. Heiden, *Lanugothamnus anabelae* Deble, *Lanugothamnus phyllicifolius* (DC.) Deble
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis phyteuma Heering

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE).

Baccharis phyteumoides (Less.) DC.

Sin.: *Molina phyteumoides* Less.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(ÑEE).
URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Baccharis pilcensis F.H. Hellwig

Arbusto. Endémica. 1600-2200 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Baccharis pluricapitulata (Deble) G. Heiden

Sin.: *Lanugothamnus pluricapitulatus* Deble
Arbusto. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(RGS).

Baccharis poeppigiana DC. subsp. **austropedicellata** F.H. Hellwig

Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Baccharis poeppigiana DC. subsp. **ocellata** (Phil.) F.H. Hellwig

Sin.: *Baccharis ocellata* Phil., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *ocellata* (Phil.) Heering ex Reiche
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO).

Baccharis poeppigiana DC. subsp. **poeppigiana**

Sin.: *Baccharis obovata* Hook. & Arn. var. *poeppigiana* (DC.) Cabrera, *Baccharis umbelliformis* DC. var. *poeppigiana* (DC.) Heering ex Reiche, *Baccharis pedicellata* DC.
Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Baccharis polifolia Griseb.

Arbusto. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Baccharis polygama Ariza

Arbusto. Endémica. 2200-3400 m.
Países: ARG(TUC).

Baccharis pseudomyriocephala Malag.

Sin.: *Baccharidastrum myriocephala* Baker, hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis pseudovillosa Malag. & J. Vidal

Sin.: *Baccharis villosa* Heering, hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 500-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis psiadioides (Less.) Joch.Müll.

Sin.: *Heterothalamus psiadioides* Less., *Baccharis czermakii* Hochr.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

Baccharis pulchella Sch. Bip. ex Griseb.

Sin.: *Baccharis arguta* Gillies ex Hook. & Arn., nom. illeg., *Baccharis plucheiformis* Kuntze, *Baccharis pulchella* Sch. Bip. ex Griseb. var. *grisea* Heering, *Baccharis subsculpta* Hochr., *Neomolina pulchella* (Sch. Bip. ex Griseb.) Hellwig
Arbusto. Nativa. 100-3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Baccharis punctulata DC.

Sin.: *Baccharis amygdalina* Griseb., *Baccharis melastomifolia* Hook. & Arn., *Baccharis oxyodonta* DC. var. *punctulata* (DC.) Baker, *Pingraea punctulata* (DC.) Hellwig
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
 URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TAC, TYT).

Baccharis pycnantha Phil.

Sin.: *Pingraea pycnantha* (Phil.) F.H. Hellwig
 Arbusto. Endémica.
 Países: CHL(ATA).

Baccharis quitensis Kunth

Sin.: *Baccharis flexuosa* Baker, *Baccharis mattogrossensis* Heering ex Malme, *Baccharis pendula* Heering, *Pingraea flexuosa* (Baker) F.H. Hellwig
 Arbusto. Nativa. 500-3000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(SCA).

Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn. var. *gama*, *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn. var. β , *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn., *Baccharis fastigiata* Phil. ex Reiche, *Baccharis ovata* Hook. & Arn., *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *angolensis* Kuntze, *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Heering ex Reiche, comb. superfl., *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *typica* Heering, nom. inval., *Baccharis rigida* Hook. & Arn., *Baccharis sessilifolia* (Less.) DC., *Molina racemosa* Ruiz & Pav., *Molina sessilifolia* Less., *Neomolina racemosa* (Ruiz & Pav.) Hellwig
 Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
 CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Baccharis ramboi G. Heiden & Macias

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis retamoides Phil.

Sin.: *Pseudobaccharis retamoides* (Phil.) Cabrera, *Psila retamoides* (Phil.) Cabrera
 Subarbusto. Endémica. 900-3100 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Baccharis reticularia DC.

Sin.: *Baccharis arctostaphylloides* Baker, *Baccharis bahiensis* Baker, *Baccharis claussenii* Baker, *Baccharis micropoda* Baker, *Baccharis vauthieri* DC.
 Arbolito. Nativa. 0-1200 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis reticularioides Deble &

A.S. Oliveira
 Arbusto. Nativa. 700-1400 m.
 Países: BRA(PAR).

Baccharis retusa DC.

Sin.: *Baccharis halimimorpha* DC., *Baccharis ramosissima* Gardner, *Baccharis salzmännii* DC.
 Arbolito. Nativa. 0-2000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(CAU, CEN, COA).

Baccharis rhexioides Kunth

Sin.: *Baccharis trichoclada* DC., *Baccharis trinervis* Pers. var. *rhexioides* (Kunth) Baker, *Baccharis venusta* Kunth, *Pingraea rhexioides* (Kunth) F.H. Hellwig, *Pseudobaccharis rhexioides* (Kunth) V.M. Badillo
 Arbusto. Nativa.
 Países: ARG(JUU, SAL).

Baccharis rhomboidalis J. Remy subsp. **rhomboidalis**

Sin.: *Baccharis involucreta* Phil., *Baccharis nemorosa* Phil., *Baccharis rhomboidalis* J. Remy var. *nemorosa* (Phil.) Heering ex Reiche
 Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
 Países: CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Baccharis rhomboidalis J. Remy subsp. **truncata** F.H. Hellwig

Sin.: *Baccharis rhomboidalis* J. Remy var. *truncata* Heering, *Baccharis truncata* Phil., nom. illeg.
 Arbusto. Endémica.
 Países: ARG(NEU, RNE).

Baccharis riograndensis Malag. & J.E. Vidal

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS).

Baccharis rodriguezii Ariza

Arbusto. Endémica. 3100 m.
 Países: ARG(SAL, TUC).

Baccharis rufescens Spreng. var. **ventanicola** Cabrera

Sin.: *Baccharis ventanicola* (Cabrera)

Soria & Zardini

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI).

Baccharis sagittalis (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis chubutensis* Speg., *Molina sagittalis* Less., *Pingraea sagittalis* (Less.) F.H. Hellwig
 Subarbusto. Nativa. 0-2400 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Baccharis alamanii* DC., *Baccharis araucana* Phil., *Baccharis chilquilla* DC., nom. superfl., *Baccharis coerulescens* DC., *Baccharis confertifolia* Colla var. *confertifolia*, *Baccharis cuervii* Phil., *Baccharis fevillei* DC., *Baccharis glutinosa* Pers. var. *incisa* Heering, *Baccharis huydobriana* J. Rémy, *Baccharis iresinoides* Kunth, *Baccharis kraussei* Heering, *Baccharis lanceolata* Kunth emend. Heering, *Baccharis linifolia* DC., hom. illeg., *Baccharis linifolia* Phil., hom. illeg., *Baccharis longifolia* DC., *Baccharis longipes* Kunze ex DC., *Baccharis marginalis* DC. var. *araucana* (Phil.) Heering, *Baccharis marginalis* DC. var. *linifolia* (Phil.) Heering, *Baccharis marginalis* DC. var. *longipes* (Kunze ex DC.) Heering, *Baccharis marginalis* DC., *Baccharis pallida* Heering, *Baccharis parviflora* (Ruiz & Pav.) Pers., *Baccharis purpurascens* Heering, *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *longifolia* (DC.) Cuatrec., *Baccharis sphaerocephala* Hook. & Arn. var. *krausei* (Heering) Malag., comb. illeg., *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *nigricans* Kuntze, *Molina parviflora* Ruiz & Pav., *Molina salicifolia* Ruiz & Pav., *Molina striata* Ruiz & Pav., *Pingraea marginalis* (DC.) F.H. Hellwig, *Pingraea salicifolia* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig
 Arbusto. Nativa. 0-3500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(APY, BOQ, CEN, PHA). URY(COL).

Baccharis samensis Joch.Müll.

Arbusto. Nativa. 3400-3800 m.
 Países: ARG(SAL).

Baccharis santelicens Phil.

Sin.: *Baccharis santelicens* Phil. subsp. *chrysophylla* F.H. Hellwig, *Baccharis tola* Phil. var. *chrysophylla* (F.H. Hellwig) Joch.Müll., *Baccharis tola* Phil. subsp. *santelicens* (Phil.) Joch.Müll.
 Arbusto. Nativa. 1900-4800 m.
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Baccharis scabrifolia G. Heiden

Sin.: *Baccharis multipaniculata* A.S. Oliveira & Deble, *Lanugothamnus scabrifolius* (G. Heiden) Deble
 Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis scopulorum A.A. Schneid. & G. Heiden

Subarbusto. Endémica. 1300-1500 m.
 Países: BRA(SCA).

Baccharis sculpta Griseb.

Sin.: *Baccharis pentlandii* DC. subsp. *sculpta* (Griseb.) Joch.Müll., *Pluchea montana* Griseb.
 Arbusto. Nativa. 1800-3000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Baccharis selloi Baker

Sin.: *Baccharis microthamna* Sch. Bip. ex Baker
 Arbusto. Nativa. 0-1100 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis semiserrata DC.

Arbusto. Nativa. 0-1400 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, ITA, PAI).

Baccharis sessiliflora Vahl

Sin.: *Baccharis camporum* DC. var. *glaucescens* Chodat & Hassl., *Baccharis glaucescens* (Chodat & Hassl.) Soria & Zardini, *Baccharis rotundifolia* Spreng.
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, APY, APA, CAU, CEN, CON, PHA). URY(MAL, MON, PAY, RIV).

Baccharis sessilifolia DC.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

Baccharis singularis (Vell.) G.M. Barroso

Sin.: *Chrysocoma singularis* Vell., *Chrysocoma purpurea* Vell., *Baccharis senicola* Mart., *Baccharis daphnoides*

Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis spartioides (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy

Sin.: *Baccharis sarophora* Phil., *Heterothalamus spartioides* Hook. & Arn. ex DC., *Pseudobaccharis spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera, *Psila spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera
 Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA, COQ).

Baccharis sphaerocephala Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis radin* Phil., *Pingraea sphaerocephala* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig
 Arbusto. Endémica. 0-700 m.
 Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Baccharis sphagnophila A.A. Schneid. & G. Heiden

Subarbusto. Endémica.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis spicata (Lam.) Baill.

Sin.: *Baccharis attenuata* Don ex Hook. & Arn., *Baccharis platensis* Spreng., *Eupatorium spicatum* Lam.
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Baccharis stenophylla Ariza

Sin.: *Baccharis subpingraea* Heering f. *nana* Heering
 Hierba. Endémica. 0-2500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, SLU, SFE). URY(COL, FLO, FLA, MON, RNO).

Baccharis subdentata DC.

Sin.: *Baccharis subcapitata* Gardner
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA).

Baccharis suberectifolia A.S. Oliveira & Deble

Sin.: *Lanugothamnus suberectifolius* (A.S. Oliveira & Deble) Deble
 Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Baccharis subtropicalis G. Heiden

Sin.: *Baccharis sagittalis* (Less.) DC. var. *montevidensis* Baker
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Baccharis taltalensis I.M. Johnst.

Sin.: *Neomolina taltalensis* (I.M. Johnst.) F.H. Hellwig, nom. illeg.
 Subarbusto. Endémica. 300-900 m.
 Países: CHL(ANT, ATA).

Baccharis tarchonanthoides DC.

Sin.: *Baccharis ibitensis* Handro, *Lanugothamnus tarchonanthoides* (DC.) Deble
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis tenella Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis tenella* Hook. & Arn. var. β , *Heterothalamus tenellus* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Pseudobaccharis tenella* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Psila tenella* (Hook. & Arn.) Cabrera
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU).

Baccharis tenuiptera Deble

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS).

Baccharis thymifolia Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.
 Países: ARG(MEN).

Baccharis tola Phil. subsp.

altiplanicola F.H. Hellwig
 Arbusto. Nativa. 3100-4500 m.
 Países: CHL(TAR, ANT).

Baccharis tola Phil. subsp. **fimbriata**

Joch.Müll.
 Arbusto. Nativa. 2700-4000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Baccharis tola Phil. var. **incarum** (Wedd.) Joch.Müll.

Sin.: *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. var. *subviscosa* Kuntze, *Baccharis microphylla* Kunth var. *incarum* Wedd., *Baccharis incarum* (Wedd.) Cuatrec., comb. superfl., *Baccharis incarum* (Wedd.) Heering, comb. superfl., *Baccharis incarum* (Wedd.) Perkins
 Arbusto. Endémica. 1900-4800 m.
 Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR, ANT).

Baccharis tola Phil. subsp. **tola**

Sin.: *Baccharis incarum* (Wedd.) Perkins
var. *lejia* (Phil.) Cabrera, *Baccharis lejia*
Phil., *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers.
var. *viscosissima* Kuntze, *Baccharis tafiensis*
Heering, *Baccharis tola* Phil. var. *lejia* (Phil.)
Reiche, *Baccharis tola* Phil. var. *viscosissima*
(Kuntze) Joch.Müll.

Arbusto. Nativa. 2200-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA).

Baccharis triangularis Hauman

Sin.: *Baccharis trimera* (Less.) DC. var.
viscosissima Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, RNE, SLU).

Baccharis tridentata Vahl

Sin.: *Baccharis affinis* DC., *Baccharis*
dentosa Mart., nom. nud., *Baccharis*
illinita DC., *Baccharis saltensis* Baker,
Baccharis subopposita DC. var. *affinis*
(DC.) Baker, *Baccharis subopposita* DC.,
Baccharis tridentata Vahl var. *subopposita*
(DC.) Cabrera, *Baccharis tweediei* Hook.
& Arn., p.p.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU,
CAA, CAN, CON, GUA, MIE). URY(CAS,
LAV, MAL, MON, RIV, SAO, TAC).

Baccharis trilobata A.S. Oliveira & Marchiori

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

Baccharis trimera (Less.) DC.

Sin.: *Baccharis genistelloides* (Lam.)
Pers. var. *trimera* (Less.) Baker, *Molina*
trimera Less.

Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ,
LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA,
ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA,
COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO,
RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Baccharis trinervis Pers. var. **debilis** (Rusby) Joch.Müll.

Sin.: *Baccharis debilis* Rusby

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL). PRY(APY, CON).

Baccharis trinervis Pers. var. **trinervis**

Sin.: *Baccharis cinerea* DC., *Baccharis*
laxa Gardner, *Baccharis rhexioides* Kunth
var. *parvifolia* Hieron., *Conyza trinervia*
Mill., *Conyza trinervis* Lam., hom.
illeg., *Heterothalamus trinervis* (Pers.)
Hook. & Arn., *Pseudobaccharis trinervis*
(Pers.) I.L.Teodoro, comb. superfl.,
Pseudobaccharis trinervis (Pers.) V.M.

Badillo, *Psila trinervis* (Pers.) Cabrera
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Baccharis trineura Soria & Zardini

Sin.: *Baccharis triplinervia* (Spreng.) Baker,
hom. illeg., *Polypappus triplinervis* (Spreng.)
Less., *Vernonia triplinervia* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY).

Baccharis tucumanensis Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis tucumanensis* Hook. &
Arn. var. *angustifolia* (Heering) Cabrera,
Baccharis tucumanensis Hook. & Arn.
var. *myrtilloides* (Griseb.) Cabrera,
Baccharis myrtilloides Griseb., *Baccharis*
myrtilloides Griseb. f. *angustifolia*
Heering, *Baccharis tucumanensis* Hook.
& Arn. var. β

Arbusto. Nativa. 500-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SLU, TUC).

Baccharis uleana Malag.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Baccharis ulicina Hook. & Arn.

Sin.: *Baccharis pinnatifida* Klatt,
Baccharis strobiliana Ces., *Baccharis*
ulicina Hook. & Arn. var. *humilis* Hook.
& Arn., nom. nud., *Baccharis ulicina*
Hook. & Arn. var. *multifida* (Griseb.)
Kuntze, *Baccharis ulicina* Hook. & Arn.
var. β , *Neomolina ulicina* (Hook. & Arn.)
Hellwig, *Vittadinia multifida* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL,
SCR, SDE, SFE, SLU, TUC).

Baccharis umbellata G. Heiden & O.S. Ribas

Subarbusto. Endémica. 1600-2000 m.

Países: BRA(PAR).

Baccharis uncinella DC.

Sin.: *Baccharis discolor* Baker
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis urvilleana Brongn.

Sin.: *Baccharis muelleri* Baker
Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Baccharis vernalis F.H. Hellwig

Sin.: *Baccharis concava* (Ruiz & Pav.)

Pers. var. *floribunda* Heering
Arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO).

Baccharis vernicosa Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Baccharis vincifolia Baker

Arbolito. Endémica. 0-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(MON).

Baccharis vismioides DC.

Arbusto. Nativa. 700 m.

Países: BRA(PAR).

Baccharis vulneraria Baker

Sin.: *Baccharis pseudoserrulata* I.L.
Teodoro, *Baccharis serrulata* DC., hom.
illeg., *Baccharidastrum triplinervium*
(Less.) Cabrera, *Conyza triplinervia* Less.

Subarbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, CEN, COA, GUA, PAI).
URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, MON,
RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Baccharis zoellneri F.H. Hellwig

subsp. **minor** F.H. Hellwig

Arbusto. Endémica. 800-1400 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Baccharis zoellneri F.H. Hellwig

subsp. **zoellneri**

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LRI,
LLA, AIS, MAG).

Bahia Lag.**Bahia ambrosioides** Lag.

Sin.: *Achyropappus maritimus*
Poepp. ex DC., nom. nud., *Eriophyllum*
ambrosioides (Lag.) Kuntze, *Stylesia*
ambrosioides (Lag.) Nutt., *Stylesia*
puberula Nutt.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE).

Baltimora L.

Baltimora geminata (Brandegee)

Stuessy

Sin.: *Baltimora ovata* Rusby,
Melampodium geminatum Brandegee,
Melampodium bonairensis Bold.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(APY).

Barnadesia Mutis ex L.

Barnadesia odorata Griseb.

Arbusto. Nativa. 400-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Barrosoa R.M. King & H. Rob.

Barrosoa betonicaeformis (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Conoclinium betonicaeforme*
DC., *Eupatorium betonicaeforme*
(DC.) Baker var. *ascendens* Baker,
Eupatorium betonicaeforme (DC.)
Baker var. *betonicaeforme*, *Eupatorium*
betonicaeforme (DC.) Baker var.
hastatum Baker

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, FOR, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MAL, ROC, TYT).

Barrosoa cabreræ (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium cabreræ* B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE).

Barrosoa candolleana (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn., *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn. var. *lancifolium* Baker, *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn. var. *paranaensis* Baker, *Eupatorium palustre* (DC.) Baker var. *guaraniticum* Chodat, hom. illeg., *Eupatorium palustre* (DC.) Baker var. *verbenaceum* Chodat

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE).

Barrosoa ramboi (Cabrera) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ramboi* Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Bejaranoa R.M. King & H. Rob.

Bejaranoa balansae (Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium balansae* Hieron., *Eupatorium balansae* Hieron. var. *menthoides* Chodat, *Eupatorium balansae* Hieron. var. *reticulatum* (Chodat) Chodat, *Eupatorium balansae* Hieron. f. *foliosum* Chodat, *Eupatorium bracteanum* Gardner var. *reticulatum* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, CON, COA, GUA, NAS, PAI, PHA, SPE).

Bellis L.

Bellis perennis L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

Belloa J. Remy

Belloa eriophora (J. Rémy) M.O. Dillon

Sin.: *Lucilia eriophora* J. Remy

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, ARA, RME).

Belloa nivea (Phil.) M.O. Dillon

Sin.: *Belloa chilensis* (Hook. & Arn.) J. Remy, *Chevreulia nivea* Phil., *Gnaphalium andicola* Kuntze, hom. illeg., *Gnaphalium frigidum* Poepp., nom. inval., *Lucilia araucana* Phil., *Lucilia chilensis* Hook. & Arn., *Lucilia chilensis* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Lucilia frigida* Reiche, nom. inval., *Lucilia nivea* (Phil.) Cabrera

Hierba. Endémica. 900-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(TAR, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Berroa Beauverd

Berroa gnaphalioides (Less.)

Beauverd

Sin.: *Gnaphalium gnaphalioides* (Less.) Kuntze, *Lucilia argentea* Hook. & Arn., *Lucilia gnaphalioides* Less., *Lucilia nitens* Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SJO, SJO).

Bidens L.

Bidens alba (L.) DC.

Sin.: *Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch. Bip., *Coreopsis alba* L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bidens andicola Kunth var. andicola

Sin.: *Bidens andicola* Kunth var. *heterophylla* Kuntze, *Bidens andicola* Kunth var. *normalis* Kuntze, *Bidens cosmantha* Griseb. var. *diversifolia* Griseb., *Bidens fruticulosa* Meyen ex Walp.

Hierba. Nativa. 1500-3900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Bidens andicola Kunth var. cosmantha (Griseb.) Sherff

Sin.: *Bidens cosmantha* Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

Bidens aurea (Aiton) Sherff

Sin.: *Coreopsis aurea* Aiton

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LRI, LLA, RME, IPA).

Bidens bipinnata L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bidens chodatii Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON, PAI, SPE).

Bidens exigua Sherff

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Bidens gardneri Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAA, CAN, CON, COA, SPE).

Bidens hassleriana (Chodat) A.A. Sáenz

Sin.: *Bidens riedelii* Baker var. *hassleriana* Chodat, *Bidens riedelii* Baker var. *hirsuta* Hassl., *Bidens riedelii* Baker f. *intermedia* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAN).

Bidens laevis (L.) Britton, Stern & Poggenb.

Sin.: *Bidens chrysanthemoides* Michx., nom. inval., *Bidens helianthoides* Kunth, *Helianthus laevis* L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(CEN, COA, PAI). URY(Desconocida).

Bidens mandonii (Sherff) Cabrera

Sin.: *Bidens andicola* Kunth var. *mandonii* Sherff

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Bidens pilosa L. var. **alausensis**

(Kunth) Sherff

Sin.: *Bidens alausensis* Kunth, *Bidens valparadisiaca* Colla, *Bidens chilensis* DC.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: CHL(TAR, COQ, VAL, LBO, BIO, RME, JFE).

Bidens pilosa L. var. **apiifolia** (DC.) Sherff

Sin.: *Bidens chilensis* DC. var. *apiifolia* DC.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Bidens pilosa L. var. **pilosa**

Sin.: *Bidens californica* DC., *Bidens hirsuta* Nutt., hom. illeg., *Bidens hispida* Kunth, *Bidens leucantha* Willd. f. *discoidea* Sch. Bip., *Bidens leucantha* Willd. var. *pilosa* (L.) Griseb., *Bidens leucantha* Willd. var. *sundaica* (Blume) Hassk., *Bidens montaubanii* Phil., *Bidens pilosa* L. var. *brevifoliata* Hieron., *Bidens pilosa* L. var. *discoidea* Sch. Bip., *Bidens pilosa* L. var. *dubia* (Cass.) O.E. Schulz, *Bidens pilosa* L. var. *minor* (Blume) Sherff, *Bidens reflexa* Link, *Bidens sunaica* Blume var. *minor* Blume, *Bidens sunaica* Blume, *Kerneria dubia*

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE, IPA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MON, SAO).

Bidens pseudocosmos Sherff

Hierba. Nativa. 2900-3400 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL, TUC). CHL(ANT, COQ).

Bidens reptans (L.) G. Don

Sin.: *Bidens antiguensis* J.M. Coult., *Bidens squarrosa* Kunth var. *tereticaulis* (DC.) Roseman, *Bidens squarrosa* Kunth, *Bidens tereticaulis* DC. var. *antiguensis* (J.M. Coult.) O.E. Schulz, *Bidens tereticaulis* DC., *Bidens trifoliata* Bertol., *Coreopsis reptans* L., *Coreopsis trifoliata* Bertol.

Subarbusto. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUU, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Bidens riedelii Baker

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Bidens segetum Mart. ex Colla

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bidens subalternans DC. var.

simulans Sherff

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR).

Bidens subalternans DC. var.

subalternans

Sin.: *Bidens platensis* Manganaro, *Bidens quadrangularis* DC.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).

Bidens subalternans DC. var.

unipinnata Sherff

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SLU). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

Bidens tenera O.E. Schulz

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(JUU). PRY(AMA).

Bidens triplinervia Kunth var.

macrantha (Wedd.) Sherff

Sin.: *Bidens andicola* Kunth var. *decomposita* Kuntze, *Bidens grandiflora* Balb. var. *breviloba* Kuntze, *Bidens humilis* Wedd. var. *macrantha* Wedd., *Bidens macrantha* Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Bidens triplinervia Kunth var. **triplinervia**

Sin.: *Bidens affinis* Klotzsch & Otto, *Bidens pedunculata* Phil.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, MEN). CHL(AYP, TAR).

Bishovia R.M. King & H. Rob.

Bishovia mikaniifolia (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Chacoa mikaniifolia* (B.L. Rob.)

R.M. King & H. Rob., *Eupatorium mikaniifolium* B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA).

Blennosperma Less.

Blennosperma chilense Less.

Sin.: *Apalus anthemifolius* (Bertero ex Colla) DC., *Soliva radiata* Poepp. ex Less., *Unxia anthemidifolia* Bertero ex Colla, *Unxia anthemidifolia* Bertero ex Less.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Brachyclados D. Don

Brachyclados caespitosus (Phil.) Speg.

Sin.: *Brachyclados obtusifolius* Kuntze, *Brachyclados pygmaeus* Kuntze, *Lavidia caespitosa* Phil.

Arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Brachyclados lycioides D. Don

Sin.: *Baucis lavandulifolia* Phil., *Brachyclados involutus* Kuntze, *Brachyclados lycioides* D. Don var. *microcephala* Hieron., *Brachyclados macrocephalus* Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(COQ, VAL).

Brachyclados megalanthus Speg.

Sin.: *Brachyclados lycioides* D. Don var. *macrocephala* Hieron.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, RNE).

Brachylaena R.Br.

Brachylaena discolor DC.

Arbusto. Introducida.

Países: BRA(SCA).

Brickellia Elliott, nom. cons.**Brickellia diffusa** (Vahl) Gray

Sin.: *Bulbostylis diffusa* (Vahl) DC.,
Coleosanthus diffusus (Vahl) Kuntze,
Eupatorium capillare Desv., *Eupatorium*
diffusum Vahl, *Eupatorium leptopodium*
Gardner, *Eupatorium trichosantherum* A. Rich.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del
área del proyecto).

Burkartia Crisci**Burkartia lanigera** (Hook. & Arn.) Crisci

Sin.: *Perezia lanigera* Hook. & Arn.,
Perezia sessiliflora Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Cabreraea Bonifacino**Cabreraea andina** (Cabrera)

Bonifacino
Sin.: *Chiliophyllum andinum* Cabrera
Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Calea L.**Calea acaulis** Baker

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR). PRY(Desconocida).

Calea asclepiaefolia Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

Calea bakeriana Chodat

Sin.: *Calea bakeriana* Chodat var.
dentata Chodat, *Calea bakeriana* Chodat
var. *volubilis* Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CAU, CEN).

Calea cabreriae Pruski

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Calea chodatii Hassl.

Sin.: *Calea nitida* Chodat, hom. illeg.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Calea clematidea Baker

Sin.: *Calea rojasiana* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA,
MIE, PAI). URY(ART, RIV, TAC).

Calea crenata Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del
proyecto). PRY(CON).

Calea cuneifolia DC.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN).

Calea cymosa Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, CAA, CON, ITA, MIE).

Calea formosa Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Calea gentianoides DC.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Calea hassleriana Chodat

Sin.: *Calea platylepis* Sch. Bip. ex Baker
var. *mollis* Chodat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU,
CAA, CAN, SPE).

Calea hymenolepis Baker

Hierba a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Calea ilienii Malme

Subarbusto. Endémica. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Calea kristinia Pruski

Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Calea longifolia (DC.) Baker

Sin.: *Meyeria longifolia* DC.
Hierba. Nativa. 600-900 m.
Países: BRA(PAR).

Calea marginata S.F. Blake

Hierba. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Calea mediterranea (Vell.) Pruski

Sin.: *Bupththalmum mediterraneum*
Vell., *Calea platylepis* Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(CAN, ITA).

Calea monocephala Dusén

Subarbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).

Calea myrtifolia (DC.) Baker

Sin.: *Meyeria myrtifolia* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Calea parvifolia (DC.) Baker

Sin.: *Meyeria parvifolia* DC.
Subarbusto. Nativa. 1100-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Calea phyllolepis Baker

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Calea pilosa Baker

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CEN, PAI).

Calea pinnatifida (R. Br.) Less.

Sin.: *Actinea conmutata* Spreng., *Calea*
glabra DC., *Calea pinnatifida* (R. Br.) Less. var.
glabra (DC.) Baker, *Caleacte pinnatifida* R. Br.,
Mocinna brasiliensis Spreng.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, PAI).

Calea rupicola Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CON, COA, PAI).

Calea triantha (Vell.) Pruski

Sin.: *Aster trianthus* Vell., *Calea hispida*
(DC.) Baker, *Meyeria hispida* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Calea uniflora Less. var. **discoidea** Baker

Sin.: *Calea pedunculosa* DC.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Calea uniflora Less. var. **uniflora**

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Calea verticillata (Klatt) Pruski

Sin.: *Calea catalaonensis* Krasch.,
Calea clauseniana Baker var. *balansana*
Baker, *Calea multijuga* Krasch., *Tridax*
verticillata Klatt
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

Calendula L.**Calendula arvensis L.**

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE).
CHL(COQ, VAL, BIO, RME).
URY(MON).

Calendula officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, LPA, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, BIO, RME, JFE).

Calendula tripterocarpa Rupr.

Hierba. Introducida. 800-1200 m.
Países: CHL(COQ).

Calopappus Meyen**Calopappus acerosus Meyen**

Sin.: *Calopappus acanthifolius* J. Remy, *Nassauvia acanthifolia* (J. Remy) G.F. Grandjot, *Nassauvia acerosa* (Meyen) Wedd., *Nassauvia remyana* Wedd.
Hierba. Endémica. 2300-3200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Calyplocarpus Less.**Calyplocarpus biaristatus (DC.) H. Rob.**

Sin.: *Blainvillea biaristata* DC., *Calyplocarpus megapotamica* (DC.) Sch. Bip., *Oligogyne synedrelloides* Hook. & Arn., *Oligogyne megapotamica* DC.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, ITA, PAI). URY(ART, COL, FLO, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

Calyplocarpus vialis Less.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(IPA).

Campovassouria R.M. King & H. Rob.

Campovassouria barbosa H. Rob.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Campovassouria cruciata (Vell.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Campovassouria bupleurifolia* (DC.) R.M. King & H. Rob., *Chrysocoma cruciata* Vell., *Eupatorium asclepiadeum*

DC., *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *asclepiadeum* (DC.) Baker, *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *bupleurifolium*, *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *ensifolium* (Griseb.) Hieron., *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *linifolium* (DC.) Baker, *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *microcephalum* Hieron., *Eupatorium cruciatum* (Vell.) Ariza, *Eupatorium ensifolium* Griseb., *Eupatorium graminifolium* Chodat, *Eupatorium linifolium* DC.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, LAV, RNO, RIV, SJO, TAC).

Campuloclinium DC.**Campuloclinium burchellii (Baker)**

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium burchellii* Baker, *Eupatorium chlorocephalum* Dusén, nom. nud., *Eupatorium glaziouii* Baker var. *molle* Hassl., *Eupatorium griseopubescens* Dusén ex Malme, *Eupatorium riedelii* Baker f. *guaraniticum* Chodat & Hassl., *Eupatorium riedelii* Baker var. *microcephalum* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON).

Campuloclinium chlorolepis (Baker)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium chlorolepis* Baker, *Eupatorium paranaense* Dusén, nom. nud.
Hierba. Nativa. 600-800 m.
Países: BRA(PAR).

Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC.

Sin.: *Campuloclinium hickenii* (Cabrera & Vittet) R.M. King & H. Rob., *Campuloclinium macrocephalum* (Less.) DC. var. *strigosum* DC., *Campuloclinium strigosum* (DC.) Sch. Bip. ex Baker, *Chromolaena pratensis* Gardner, *Eupatorium betonicaeforme* (DC.) Baker f. *alternifolium* Hicken, *Eupatorium denudatum* Chodat, *Eupatorium donianum* Hook. & Arn., *Eupatorium hickenii* Cabrera & Vittet, *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *angustifolium* Baker, *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Eupatorium macrocephalum*

Less. var. *stigmatosum* (Chodat) Hassl., *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *strigosum* Baker, *Eupatorium macrocephalum* Less., *Eupatorium stigmatosum* Chodat f. *roseoinvolucratum* Chodat & Hassl., *Eupatorium stigmatosum* Chodat var. *subcalvatum* Chodat, *Eupatorium stigmatosum* Chodat var. *violaceum* Chodat, *Eupatorium stigmatosum* Chodat

Hierba. Nativa. 0-2700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

Campuloclinium megacephalum

(Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium megacephalum* Baker
Hierba. Nativa. 600-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

Campuloclinium purpurascens (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium purpurascens* Sch. Bip. ex Baker, *Eupatorium glaziouii* Baker
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA).

Campuloclinium riedelii (Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium riedelii* Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Campuloclinium scabrum (Klatt) J. Calvo & Roque

Sin.: *Campuloclinium tubaraoense* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium tubaraoense* Hieron., *Trichogonia scabra* Klatt
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Carduus L.**Carduus acanthoides L.**

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, SAL, SFE). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SJO).

Carduus nutans L.

Hierba. Introducida. 600-1000 m.
Países: CHL(VAL, ARA, RME).

Carduus pycnocephalus L.

Sin.: *Carduus tenuiflorus* Curtis var. *pycnocephalus* (L.) DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(CAS, FLA, LAV, MON, PAY, SJO, SOR).

Carduus tenuiflorus Curtis

Sin.: *Carduus pycnocephalus* L. var. *tenuiflorus* (Curtis) Fiori & Bég., comb. superfl., *Carduus pycnocephalus* L. var. *tenuiflorus* (Curtis) Ball

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, JFE). URY(CAS, FLA, MON).

Carduus thoermeri Weinm.

Sin.: *Carduus leiophyllus* Petrovic, *Carduus nutans* L. subsp. *leiophyllus* (Petrovic) Stoj. & Stef.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(SCA). CHL(VAL, LBO, ARA, AIS, MAG, RME). URY(PAY, RNO, SOR).

Carthamus L.**Carthamus lanatus** L.

Sin.: *Kentrophyllum lanatum* (L.) DC. ex Duby

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LPA, RNE, SFE, SDE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TYT).

Carthamus tinctorius L.

Sin.: *Carduus tinctorius* Falk
Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, JUJ, MIS, SAL, SJU, TUC). CHL(COQ, BIO, RME).

Centaurea L., nom. cons.**Centaurea atacamensis** (Reiche) I.M.

Johnst.
Sin.: *Centaurea atacamensis* (Reiche) Ravenna, comb. superfl., *Centaurea floccosa*

Hook. & Arn. var. *atacamensis* Reiche

Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ANT, ATA, VAL).

Centaurea benedicta (L.) L.

Sin.: *Cnicus benedictus* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, COS, LPA, MEN, NEU). BRA(SCA). CHL(VAL, MAU, RME). URY(ART, CLA).

Centaurea bulbosa Hook. & Arn.

Sin.: *Centaurea dianthoides* J. Remy
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA).

Centaurea cachinalensis Phil.

Arbusto. Endémica. 0-2800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Centaurea calcitrapa L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SFE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, SJO, SOR).

Centaurea chilensis Hook. & Arn. var. **breviloba** DC.

Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL).

Centaurea chilensis Hook. & Arn. var. **chilensis**

Subarbusto. Endémica. 1500-3500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Centaurea chilensis Hook. & Arn. var. **stenolepis** Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Centaurea cyanus L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, RNE). CHL(AIS, RME).

Centaurea debeauxii Gren. & Gordon

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(MON).

Centaurea diffusa Lam.

Sin.: *Acosta diffusa* (Lam.) Soják, *Centaurea parviflora* Sibth. & Sm. non Lam.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA).

Centaurea floccosa Hook. & Arn.

Sin.: *Centaurea illapelina* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-2900 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Centaurea gayana J. Remy

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Centaurea iberica Trevir. ex Spreng.

Sin.: *Calcitrapa iberica* (Trevir. ex Spreng.) Schur, *Leucanthea iberica* (Trevir. ex Spreng.) Á. Löve & D. Löve
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, NEU, RNE).

Centaurea jacea L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE).
CHL(ARA).

Centaurea melitensis L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, FLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Centaurea monocephala J. Remy

Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Centaurea nigra L.

Hierba. Introducida. 900-1000 m.
Países: CHL(ARA).

Centaurea nigrescens Willd.

Sin.: *Centaurea dubia* Suter subsp. *vochinensis* (Bernh. ex Rchb.) Hayek ex Hegi, *Centaurea vochinensis* Bernh. ex Rchb.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Centaurea solstitialis L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). CHL(VAL, LBO, MAU, RME). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MON, PAY).

Centaurodendron Johow**Centaurodendron dracaenoides**

Johow
Sin.: *Plectocephalus dracaenoides* (Johow) F.H. Hellwig
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Centaurodendron palmiforme Skottsbo.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Centipeda Lour.

Centipeda elatinoides (Less.) Benth. & Hook. f. ex O. Hoffm.

Sin.: *Myriogyne elatinoides* Less.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Centratherum Cass.

Centratherum camporum (Hassl.) Malme

Sin.: *Centratherum camporum* (Hassl.) Malme var. *albicans* (Hassl.) Malme, *Centratherum confertum* K. Kirkman, nom. illeg., *Centratherum punctatum* Cass. var. *albicans* Hassl., *Centratherum punctatum* Cass. subsp. *camporum* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, MIE, PAI, SPE).

Centratherum punctatum Cass.

Sin.: *Ampherephis aristata* Kunth, *Ampherephis intermedia* Link, *Ampherephis mutica* Kunth, *Ampherephis pilosa* Cass., *Ampherephis pulchella* Cass., *Amphibecis violacea* Schrank, *Baccarodes holtonii* (Baker) Kuntze, *Baccarodes muticum* (Kunth) Kuntze, *Baccarodes punctatum* (Cass.) Kuntze, *Baccarodes violaceum* (Schrank) Kuntze, *Baccharoides brachylepis* (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze, *Baccharoides punctatum* (Cass.) Kuntze, *Centratherum brachylepis* Sch. Bip. ex Baker, *Centratherum brevispinum* Cass., *Centratherum camporum* (Hassl.) Malme var. *longipes* (Hassl.) Malme, *Centratherum holtonii* Baker, *Centratherum intermedium* (Link) Less., *Centratherum longispinum* Cass., *Centratherum muticum* (Kunth) Less., *Centratherum pulchellum* (Cass.) Steud., *Centratherum punctatum* Cass. f. *brachyphyllum* Hassl., *Centratherum punctatum* Cass. f. *foliosum* (Chodat) Hassl., *Centratherum punctatum* Cass. var. *foliosum* Chodat, *Centratherum punctatum* Cass. var. *longipes* Hassl., *Centratherum punctatum* Cass. var. *parviflorum* Baker, *Centratherum punctatum* Cass. var. *viscosissimum* Hassl., *Centratherum violaceum* (Schrank) Gleason, *Crantzia ovata* Vell., *Spixia violacea* Schrank

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, NEE, PAI).

Chacoa R.M. King & H. Rob.

Chacoa pseudoprasiiifolia (Hassl.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium fiebrigii* Hassl. var. *heterophylla* Hassl., nom. illeg., *Eupatorium fiebrigii* Hassl., nom. illeg. var. *acuminata* Hassl., *Eupatorium fiebrigii* Hassl., nom. illeg., *Eupatorium pseudoprasiiifolium* Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Chaetanthera Ruiz & Pav.

Chaetanthera albiflora (Phil.)

A.M.R. Davies

Sin.: *Chaetanthera albiflora* Phil., nom. inval., *Chaetanthera linearis* Poepp. ex Less. var. *albiflora* Phil., *Chaetanthera linearis* Poepp. ex Less. var. *taltalensis* I.M. Johnst., *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less. var. *albiflora* Phil., *Chaetanthera microphylla* (Cass.) Hook. & Arn. var. *albiflora* (Phil.) Cabrera

Hierba. Endémica. 1600-1800 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Chaetanthera australis Cabrera

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU, RNE).

Chaetanthera chilensis (Willd.) DC.

var. **chilensis**

Sin.: *Chaetanthera argentea* D. Don, p.p., *Chaetanthera argentea* Phil., hom. illeg., *Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *argentea* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *involuta* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera collina* Phil., *Chaetanthera eryngioides* D. Don, *Chaetanthera grandiflora* Steud., *Chaetanthera involucreta* Phil., *Chaetanthera nana* Phil., *Chaetanthera sericea* Lag., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *argentea* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *nana* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera subligiosa* Kuntze, *Chaetanthera tenuifolia* D. Don var. *eryngioides* (D. Don) Hook. & Arn., *Perdicium chilense* Willd.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).

Chaetanthera chilensis (Willd.) DC.

var. **tenuifolia** (D. Don) Cabrera

Sin.: *Chaetanthera argentea* D. Don, p.p., *Chaetanthera tenuifolia* D. Don Hierba. Endémica.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO).

Chaetanthera ciliata Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Chaetanthera depauperata (Hook. & Arn.) A.M.R. Davies

Sin.: *Chaetanthera leptcephala* Cabrera, *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less. var. *depauperata* (Hook. & Arn.) DC., *Chaetanthera microphylla* (Cass.) Hook. & Arn. var. *depauperata* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 700-2900 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Chaetanthera elegans Phil. var. **elegans**

Sin.: *Chaetanthera brachylepis* Phil., *Chaetanthera elata* Phil., *Chaetanthera humilis* Phil., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera valdiviana* Phil., *Chaetanthera volckmanni* Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

Chaetanthera elegans Phil. var.

pratensis (Phil.) Cabrera

Sin.: *Chaetanthera andina* Phil., *Chaetanthera andina* Phil. var. *pratensis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera araucana* Phil., *Chaetanthera comata* Phil., *Chaetanthera elegans* Phil. var. *andina* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera foliosa* Phil., *Chaetanthera montana* Phil., *Chaetanthera pratensis* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Chaetanthera elegans Phil. var.

pulchra Cabrera

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Chaetanthera euphrasioides (DC.) F. Meigen

Sin.: *Chaetanthera debilis* Meyen & Walp., *Chaetanthera euphrasioides* Reiche var. *spinulosa* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera euphrasioides* Reiche, hom. illeg., *Elachia euphrasioides* DC., *Elachia spinulosa* Phil., *Tylloma euphrasioides* (DC.) Wedd.

Hierba. Endémica. 1200-3700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Chaetanthera flabellata D. Don

Sin.: *Chaetanthera flabellata* D. Don var. *prostrata* (D. Don) Hook. & Arn., *Chaetanthera multicaulis* DC. var. *prostrata* DC., *Chaetanthera prostrata* D. Don, *Elachia euphrasioides* Deless. non DC., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 1600-2600 m.
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Chaetanthera flabellifolia Cabrera

Sin.: *Pachylaena elegans* Phil.
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: CHL(COQ).

Chaetanthera frayjorgensis A.M.R. Davies

Sin.: *Tylloma brachylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *microphyllum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chaetanthera glabrata (DC.) F.

Meigen

Sin.: *Tylloma glabratum* DC., *Tylloma glabratum* DC. var. *rotundifolium* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *stolpi* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *strictum* (Phil.) Reiche, *Tylloma rotundifolium* Phil., *Tylloma stolpi* Phil.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Chaetanthera glandulosa J. Remy var. **glandulosa**

Sin.: *Tiltilia pungens* Phil. ex Reiche, nom. nud.
Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Chaetanthera glandulosa J. Remy

var. **gracilis** A.M.R. Davies
Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: CHL(VAL).

Chaetanthera incana Poepp. ex Less.

Sin.: *Chaetanthera chilensis* Hook. & Arn., hom. illeg., *Chaetanthera incana* Poepp. ex Less. var. *spathulata* DC., *Chaetanthera obtusata* Phil., *Chaetanthera scariosa* D. Don, *Chaetanthera spathulata* Poepp. ex Less.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Chaetanthera kalinae A.M.R. Davies

Hierba. Endémica. 2300-3100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chaetanthera lanata (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Chaetanthera philippii* B.L. Rob., *Chondrochilus grandiflorus* Phil., *Chondrochilus involucratum* Phil., *Chondrochilus lanatus* Phil., *Tylloma lanatum* Phil., *Tylloma involucratum* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 2600-3900 m.
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Chaetanthera limbata (D. Don) Less.

Sin.: *Chaetanthera schroederi* G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Tylloma ciliatum* Phil., *Tylloma eurylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma limbatum* D. Don, *Tylloma strictum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Chaetanthera linearis Poepp. ex Less.

Sin.: *Chaetanthera kunthiana* Less., p.p., *Chaetanthera linearifolia* Poepp. ex Steud., nom. nud., *Chaetanthera microphylla* Kuntze, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Chaetanthera microphylla (Cass.)

Hook. & Arn.

Sin.: *Chaetanthera delicatula* Phil., *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less., *Chaetanthera pentapetala* Phil., *Chaetanthera salsoloides* (D. Don) Kuntze, *Cherina microphylla* Cass., *Euthrixia affinis* D. Don, *Euthrixia salsoloides* D. Don, *Onoseris linifolia* Bertero, nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Chaetanthera moenchioides Less.

Sin.: *Chaetanthera albicans* Bertero, nom. nud., *Chaetanthera moenchioides* Less. var. *pauciflora* F. Meigen, *Chaetanthera moenchioides* Less. var. *sulphurea* F. Meigen, *Chaetanthera tenuifolia* Deless., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2300 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Chaetanthera multicaulis DC.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Chaetanthera perpusilla (Wedd.)

Anderb. & S.E. Freire

Sin.: *Chaetanthera aymarae* Martic. & Quezada, *Luciliopsis perpusilla* Wedd.
Hierba. Nativa. 2200-3300 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Chaetanthera peruviana A. Gray

Hierba. Nativa. 3700-3800 m.
Países: CHL(AYP).

Chaetanthera pubescens A.M.R.

Davies

Hierba. Endémica. 600-3500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chaetanthera ramosissima D. Don

Sin.: *Chaetanthera berteriana* Colla, hom. illeg., *Chaetanthera kunthiana* Less., p.p. *Chaetanthera tenella* Less. var. *tenella*, *Minythodes umbellata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Chaetanthera renifolia (J. Remy)

Cabrera

Sin.: *Chaetanthera crenata* (Phil.) F. Meigen, comb. illeg., *Chondrochilus crenatus* Phil., *Elachia renifolia* J. Remy, *Tylloma renifolium* (J. Remy) Wedd.

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: CHL(RME).

Chaetanthera serrata Ruiz & Pav.

Sin.: *Chaetanthera spinulosa* Cass., *Proselia serrata* (Ruiz & Pav.) D. Don
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Chaetanthera spathulifolia Cabrera

Sin.: *Carmelita spathulata* Phil., *Chaetanthera spathulata* (Phil.) Hauman, comb. illeg.
Hierba. Endémica. 2700-4100 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL).

Chaetanthera splendens (J. Remy)

A.L. Rob.

Sin.: *Elachia splendens* J. Remy,
Tylloma splendens (J. Remy) Wedd.
 Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
 Países: ARG(SJU). CHL(COQ, RME).

Chaetanthera taltalensis (Cabrera)

A.M.R. Davies

Sin.: *Chaetanthera tenella* Less. var.
taltalensis Cabrera
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Chaetanthera villosa D. Don

Sin.: *Carmelita formosa* Gay ex DC.
 Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
 Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
 CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Chaptalia Vent., nom. cons.**Chaptalia arechavaletae** Hieron. ex

Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI,
 MIS). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL,
 FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC,
 SJO, SOR, TYT).

Chaptalia cordifolia (Baker) Cabrera

Sin.: *Trichocline cordifolia* Baker
 Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chaptalia exscapa (Pers.) Baker var.**chilensis** (DC.) Burkart

Sin.: *Gerbera chilensis* (DC.) Sch. Bip.,
Loxodon chilensis DC., *Thyrsanthema*
chilensis (DC.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
 ARA, RME).

Chaptalia exscapa (Pers.) Baker var.
exscapa

Sin.: *Gerbera brevipes* (Cass.) Sch.
 Bip., comb. illeg., *Leria exscapa* DC.,
Loxodon brevipes Cass., nom. superfl.,
Thyrsanthema exscapa (Pers.) Kuntze,
Tussilago exscapa Pers.
 Hierba. Nativa. 0-4000 m.
 Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, SFE,
 SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, FLO,
 FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SOR).

Chaptalia ignota Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).

BRA(RGS). URY(ART, CLA, PAY, RNO, SAO).

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart

Sin.: *Chaptalia integrifolia* (Cass.)
 Baker, hom. illeg., *Chaptalia microdonta*
 Greene, *Leria integrifolia* Cass., *Leria*
lutescens Sch. Bip., nom. nud., *Leria*
nutans (L.) DC. var. *integrifolia* (Cass.)
 Less., *Thyrsanthema integrifolia* (Cass.)
 Kuntze, *Tussilago integerrima* Vell.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SJU,
 SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA,
 CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).
 URY(CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY,
 RNO, RIV, TAC).

Chaptalia modesta Burkart

Hierba. Nativa. 2000-3900 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

Chaptalia nutans (L.) Pol.

Sin.: *Chaptalia diversifolia* Greene,
Chaptalia ebracteata (Kuntze) K. Schum.,
Chaptalia erosa Greene, *Chaptalia majuscula*
 Greene, *Chaptalia nutans* (L.) Hemsl.,
 comb. superfl., *Chaptalia nutans* (L.) Pol.
 var. *texana* (Greene) Burkart, *Chaptalia*
subcordata Greene, *Chaptalia texana* Greene,
Gerbera nutans (L.) Sch. Bip., *Leria lyrata*
 (Pers.) Cass, comb. illeg., *Leria nutans* (L.)
 DC., *Thyrsanthema ebracteata* Kuntze,
Thyrsanthema nutans (L.) Kuntze, *Tussilago*
lyrata Pers., hom. illeg., *Tussilago nutans* L.,
Tussilago vaccina Vell.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,
 SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,
 CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).
 URY(ART, RIV, SAO, TAC).

Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker

Sin.: *Chaptalia graminifolia* (Dusén)
 Cabrera, *Chaptalia mandonii* Burkart,
Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker
 subsp. *bracteata* (Cass.) Burkart,
Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker
 var. *graminifolia* Dusén ex Malme,
Chaptalia runcinata Kunth, *Chaptalia*
runcinata Kunth var. *graminifolia*
 (Dusén ex Malme) Burkart, *Gerbera*
bracteata (Cass.) Sch. Bip., comb.
 superfl., *Leria mandonii* Sch. Bip.,
 nom. nud., *Lieberkuhna bracteata*
 Cass., nom. superfl., *Loxodon longipes*
 Cass., nom. illeg., *Oxydon bicolor* Less.,

nom. illeg., *Perdicium piloselloides*
 Vahl, *Thyrsanthema piloselloides* (Vahl)
 Kuntze, *Tussilago sinuata* Pers. subsp.
piloselloides (Vahl) Pers., *Tussilago*
sinuata Pers.

Hierba. Endémica. 1800-3000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS,
 SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
 URY(CAS, FLO, FLA, MAL, MON, PAY,
 RNO, ROC, SJO, TAC).

Chaptalia similis R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
 MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Chaptalia sinuata (Less.) Baker

Sin.: *Leria nutans* (L.) DC. var.
sinuata Less., *Leria sinuata* (Less.) DC.,
Thyrsanthema sinuata (Less.) Kuntze
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS,
 ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SJU, SLU,
 SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,
 APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA,
 GUA, MIE, PAI). URY(COL, LAV, MAL, PAY,
 RNO, RIV, SAO).

Chersodoma Phil., emend.
Cabrera**Chersodoma arequipensis** (Cuatrec.)

Cuatrec.

Sin.: *Chersodoma longipedicellata* Ricardi &
 Martic., *Senecio arequipensis* Cuatrec.
 Subarbusto. Nativa. 3200-3700 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Chersodoma argentina Cabrera

Arbusto. Endémica. 2000-4500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Chersodoma candida Phil.

Sin.: *Senecio chersodomus* Reiche, nom.
 nud., *Senecio oxyodon* Phil.
 Arbusto. Nativa. 3600-4200 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP,
 TAR, ANT).

Chersodoma glabriuscula (Cabrera)
M.O. Dillon & Sagást.

Sin.: *Chersodoma declina* (Wedd.)
 Cabrera var. *glabriuscula* (Cabrera)
 Cabrera, *Senecio declinus* Wedd. var.
glabriusculus Cabrera
 Arbusto. Endémica. 3200-5000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera
Sin.: *Senecio jodopappus* Sch. Bip. ex Wedd.,
nom. superfl., *Senecio jodopappus* Sch. Bip.
Arbusto. Nativa. 3000-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Chevreulia Cass.

Chevreulia acuminata Less.

Sin.: *Chevreulia elegans* Rusby,
Chevreulia filiformis Hook. & Arn.,
Chevreulia longipes Wedd.
Hierba. Nativa. 0-3600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).
URY(CAS, CLA, MON, PAY, RNO, TAC).

Chevreulia diemii Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU,
ARA, LLA).

Chevreulia lycopodioides (d'Urv.) DC.

Sin.: *Gnaphalium lycopodioides* d'Urv.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LLA).

Chevreulia pusilla DC.

Sin.: *Chevreulia lanceolata* J. Remy
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO,
BIO, ARA, LRI, LLA).

Chevreulia revoluta A.A. Schneid. & R. Trevis.

Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Chevreulia sarmentosa (Pers.) S.F. Blake

Sin.: *Chaptalia sarmentosa* (Pers.)
S.F. Blake, *Chevreulia stolonifera* Cass.,
nom. illeg., *Chevreulia thoursii* J. Remy,
nom. illeg., *Gnaphalium calycinum* Poir.,
Leria caespitosa (Thouars) Spreng.,
Tussilago sarmentosa Pers., *Xeranthemum*
caespitosum Thouars

Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,
ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL,
SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA). PRY(GUA,
ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, FLA,
MAL, MON, PAY, RNO, ROC).

Chiliophyllum Phil., nom. cons.

Chiliophyllum densifolium Phil.
Sin.: *Phyllochilium densifolium* (Phil.)
Cabrera
Arbusto. Endémica. 2000-2600 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Chiliotrichiopsis Cabrera

Chiliotrichiopsis keidelii Cabrera
Arbusto. Nativa. 2200-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Chiliotrichiopsis ledifolia (Griseb.)
Cabrera

Sin.: *Gutierrezia ledifolia* Griseb.
Arbusto. Endémica. 2300-3300 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Chiliotrichum Cass.

Chiliotrichum diffusum (G. Forst.)
Kuntze

Sin.: *Amellus diffusus* G. Forst.,
Aster magellanicus Spreng., hom.
illeg., *Chiliotrichum amelloideum* Cass.,
nom. illeg. var. *diffusum* (G. Forst.)
Nees, *Chiliotrichum amelloideum* Cass.,
nom. illeg. var. *lanceolatum* Nees,
Chiliotrichum amelloideum Cass., nom.
illeg. var. *rosmarinifolium* (Less.) Nees,
Chiliotrichum amelloideum Cass., nom.
illeg., *Chiliotrichum angustifolium* Phil.,
Chiliotrichum diffusum (G. Forst.)
Kuntze f. *typica* Speg., nom. illeg.,
Chiliotrichum diffusum (G. Forst.) Kuntze
var. *angustifolium* Speg., *Chiliotrichum*
diffusum (G. Forst.) Kuntze var. *media*
Speg., *Chiliotrichum feliciae* Hombr. &
Jacq., *Chiliotrichum longifolium* Phil.,
Chiliotrichum rosmarinifolium Less.,
Chiliotrichum tenue Phil., *Chiliotrichum*
virgatum Phil., *Tropidolepis diffusa* (G.
Forst.) Tausch
Arbusto. Endémica. 0-2700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA,
LLA, AIS, MAG).

Chiliotrichum fuegianum (O. Hoffm.)
Bonifacino

Sin.: *Chiliophyllum fuegianum* O. Hoffm.
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Chionolaena DC.

Chionolaena capitata (Baker) S.E. Freire
Sin.: *Achyrocline capitata* Baker
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chondrilla L.

Chondrilla juncea L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Chresta Vell. ex DC.

Chresta plantaginifolia (Less.) Gardner
Sin.: *Eremanthus plantaginifolius* (Less.)
Baker, *Vernonia plantaginifolia* Less.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Chresta sphaerocephala DC.

Sin.: *Eremanthus sphaerocephalus* (DC.)
Malme
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Chromolaena DC.

Chromolaena adenolepis (Sch.Bip. ex
Baker) R.M.King & H.Rob.
Sin.: *Eupatorium adenolepis* Sch. Bip.
ex Baker
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chromolaena angusticeps (Malme)
R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium angusticeps* Malme
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Chromolaena arnottiana (Griseb.)
R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium arnottianum* Griseb.
Subarbusto. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU,
SFE, SDE, TUC).

Chromolaena ascendens (Sch.Bip.)
R.M.King & H.Rob.

Sin.: *Eupatorium ascendens* Sch. Bip.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Chromolaena asperrima (Baker) R.M.
King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium asperrimum* Baker,
Eupatorium asperrimum Baker f.
pauciflorum Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Chromolaena barbacensis (Hieron.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium barbacense* Hieron.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CHO).

Chromolaena caaguazuensis

(Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium caaguazuense*Hieron., *Eupatorium caaguazuense*Hieron. var. *crassifolium* Chodat,*Eupatorium caaguazuense* Hieron. var.*hirsutum* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, PAR).

PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA,

PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Chromolaena christieana (Baker)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium christieanum* Baker,*Eupatorium laevigatum* B.L. Rob.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN, CHO, CON, COA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Chromolaena connivens (Rusby) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium cochabambense*Hieron., *Eupatorium connivens* Rusby

Arbusto. Nativa.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Chromolaena cryptantha (Sch. Bip.

ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium cryptanthum* Sch. Bip. ex Baker

Hierba a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Chromolaena cylindrocephala (Sch.

Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium cylindrocephalum* Sch. Bip. ex Baker

Arbusto a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Chromolaena elliptica (Hook. & Arn.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Chromolaena latisquamulosa*

(Hieron.) R.M. King & H. Rob.,

Chromolaena umbelliformis (Dusén)R.M. King & H. Rob., *Eupatorium**ellipticum* Hook. & Arn., *Eupatorium**latisquamulosum* (Hieron.) Malme,*Eupatorium rhinanthaceum* DC. var.*latisquamulosum* Hieron., *Eupatorium**umbelliforme* Dusén

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, COA, ITA, PAI).

Chromolaena ferruginea R.M. King

& H. Rob.

Sin.: *Eupatorium charpinii* Cabrera,*Eupatorium ferrugineum* Gardner,*Eupatorium ferrugineum* Gardner var.*paraguariense* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del

proyecto). PRY(APY, CHO, CON).

Chromolaena gentianoides (B.L.

Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Brickellia gentianoides* B.L. Rob.,*Chromolaena oinopolepis* (Malme) R.M. King& H. Rob., *Eupatorium oinopolepis* (Malme)Cabrera, *Eupatorium rhinanthaceum* DC. var.*oinopolepis* Malme

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chromolaena hirsuta (Hook. & Arn.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium bartisiifolium* DC. var.*trichophorum* (DC.) Baker, *Eupatorium**bartisiifolium* DC., *Eupatorium congestum*Hook. & Arn. var. *hirsutum* (Hook. &Arn.) Cabrera, *Eupatorium congestum*Hook. & Arn. var. *truncatum* Hassl.,*Eupatorium hexanthum* DC., *Eupatorium**hirsutum* Hook. & Arn. var. *alfa*Hook. & Arn., *Eupatorium hirsutum*Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn.,*Eupatorium hirsutum* Hook. & Arn. var.*triseriale* (Griseb.) Hieron., *Eupatorium**hirsutum* Hook. & Arn. var. *triseriale*Hassl., *Eupatorium hirsutum* Hook. &Arn., *Eupatorium subhastatum* Hook.& Arn. var. *hexanthum* (DC.) Malme,*Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn.var. *hirsutum* (Hook. & Arn.) Griseb.,*Eupatorium subhastatum* Hook. &Arn. var. *trichophorum* (DC.) Malme,*Eupatorium subhastatum* Hook. &Arn. var. *triseriale* Griseb., *Eupatorium**subhastatum* Hook. & Arn., *Eupatorium**tozziifolium* DC. var. *subpetiolatum*Chodat, *Eupatorium trichophorum* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA,

GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

URY(ART, COL, FLO, LAV, MAL, MON,

RIV, SJO, SJO, TAC, TYT).

Chromolaena hookeriana (Griseb.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Chromolaena jujuiense* (Hieron.)R.M. King & H. Rob., *Eupatorium**ciliatum* Hook. & Arn., hom. illeg.,*Eupatorium conyzoides* Vahl var.*ciliatum* (Hook. & Arn.) Hieron.,*Eupatorium hookerianum* Griseb. var.*jujuiense* (Hieron.) Cabrera, *Eupatorium**hookerianum* Griseb., *Eupatorium**jujuiense* Hieron.

Arbusto. Nativa. 400-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Chromolaena ivifolia (L.) R.M. King

& H. Rob.

Sin.: *Chromolaena luquensis* (Chodat)R.M. King & H. Rob., *Chromolaena**polyantha* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King& H. Rob., *Eupatorium affine* Hook. &Arn., p.p., *Eupatorium callilepis* Bakervar. *oligocephalum* Griseb., *Eupatorium**conyzoides* Vahl var. *affine* (Hook. &Arn.) Baker, *Eupatorium ivifolium*L. var. *foliosum* Chodat, *Eupatorium**ivifolium* L. var. *genuinum* Hassl.,*Eupatorium ivifolium* L. var. *hirsutum*Hassl., *Eupatorium ivifolium* L. var.*perturbinatum* B.L. Rob., *Eupatorium**ivifolium* L. var. *pilcomayense* Hassl.,*Eupatorium ivifolium* L., *Eupatorium**luquense* Chodat, *Eupatorium**paucicapitulatum* Hieron., *Eupatorium**polyanthum* Sch. Bip. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,

AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,

COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

URY(ART, CLA, PAY, RNO, ROC, SAO,

SJO, SJO, TAC, TYT).

Chromolaena kleinii (Cabrera) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium kleinii* Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M.King & H. Rob. var. **arenaria** (Baker)

S.E. Freire & Ariza

Sin.: *Eupatorium laevigatum* Lam. var.*arenarium* Baker

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). URY(CLA,

COL, ROC).

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob. var. **laevigata**

Sin.: *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *laevigatum*, *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *longepetiolatum* Hassl., *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *psidifolia* (DC.) Hassl., *Eupatorium laevigatum* Hieron. var. *squamulosum* Hieron., *Eupatorium psidifolium* DC.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, COL, PAY, RIV, SJO, SJO, TAC).

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob. var. **submembranacea** (Hieron.) S.E. Freire & Ariza

Sin.: *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *submembranacea* Hieron.
Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Chromolaena latisquamulosa

(Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium rhinanthaceum* DC. var. *latisquamulosum* Hieron.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chromolaena margaritensis (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium conyzoides* Vahl subsp. *margaritense* Hassl., *Eupatorium margaritense* (Hassl.) Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).

Chromolaena maximiliani (Schrad. ex DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium maximiliani* Schrad. ex DC.
Arbusto a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium conyzoides* Mill., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *paucidentatum* Baker, *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *pauciflora* Baker, *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *scaberulum* Hassl., *Eupatorium conyzoides* Vahl, hom. illeg., *Eupatorium odoratum* L. var. *odoratum*, *Eupatorium odoratum* L. var. *pauciflorum* (Baker) Hieron.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Chromolaena orbignyana (Klatt)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Chromolaena densiflora* (Morong) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium densiflorum* Morong, *Eupatorium orbignyana* Klatt, *Eupatorium oxylepis* DC. var. *densiflorum* (Morong) Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Chromolaena oxylepis (DC.) R.M.

King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium ferrugineum* Gardner f. *parvifolium* Hack., *Eupatorium oxylepis* DC.
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Chromolaena palmaris (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium palmare* Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chromolaena pedunculosa (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Chromolaena foliata* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob., *Chromolaena paraguariensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *foliatum* Sch. Bip. ex Baker, *Eupatorium foliatum* (Sch. Bip. ex Baker) Hieron. var. *incanum* Hieron., *Eupatorium foliatum* (Sch. Bip. ex Baker) Hieron., *Eupatorium oxylepis* DC. subsp. *paraguariense* (Hieron.) Hassl., *Eupatorium paraguariense* Hieron., *Eupatorium pedunculosa* Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

Chromolaena punctulata (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium punctulatum* DC.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Chromolaena pungens (Gardner)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium pungens* Gardner
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chromolaena rhinanthacea (DC.)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium rhinanthaceum* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Chromolaena rojasii (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium rojasii* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Chromolaena squalida (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium dichotomum* Sch. Bip. ex Miq., *Eupatorium squalidum* DC. var. *squalidum*, *Eupatorium squalidum* DC. var. *subvelutinum* (DC.) Baker, *Eupatorium subvelutinum* DC.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chromolaena squarrosoramosa

(Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Chromolaena oyadensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium oyadense* Hieron. var. *paraguayense* Hieron., *Eupatorium oyadense* Hieron., *Eupatorium squarrosoramosum* Hieron., *Eupatorium squarrosoramosum* Griseb., hom. Illeg.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, GUA, PAI, PHA, SPE).

Chromolaena squarrulosa (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Chromolaena ascendens* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob., *Chromolaena congesta* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium ascendens* Sch. Bip. ex Baker var. *parcisetosum* B.L. Rob., *Eupatorium bracteatum* Hook. & Arn., *Eupatorium caaguazuense* Hieron. var. *nervosum* Chodat, *Eupatorium congestum* Hook. & Arn., *Eupatorium liatrideum* DC. var. *subcanum* DC., *Eupatorium liatridium* DC., *Eupatorium squarrulosum* Hook. & Arn., *Eupatorium tozziifolium* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(COL, LAV, TAC).

Chromolaena stachyophylla

(Spreng.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium claussenii* Gardner,
Eupatorium pulchrum Gardner,
Eupatorium scaberrimum Walp.,
Eupatorium stachyophyllum Spreng.,
Eupatorium subalternifolium DC.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Chromolaena tecta (Gardner) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium tectum* Gardner
 Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Chromolaena toldensis (Hieron.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium toldense* Hieron.

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Chromolaena tunariensis (Hieron.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium conyzoides* Mill.
 var. *tunariense* Hieron., *Eupatorium
 tunariense* (Hieron.) B.L. Rob.

Subarbusto. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Chromolaena ulei (Hieron.) R.M. King

& H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ulei* Hieron.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Chromolaena verbenacea (DC.) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium rhodolepis* Chodat,
Eupatorium verbenaceum DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
 SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA,
 MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Chromolaena xylorhyza (Sch. Bip. ex

Baker) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa.

Sin.: *Eupatorium xylorhizum* Sch. Bip.
 ex Baker

Países: BRA(PAR, SCA).

Chrysanthellum Rich.**Chrysanthellum indicum** DC. subsp.**afroamericanum** B.L. Turner

Sin.: *Adenospermum tuberculatum*
 Hook. & Arn., *Chrysanthellum*

argentinum Ariza & Cerana,
Chrysanthellum boliviense Sch. Bip.,
 nom. nud., *Chrysanthellum tuberculatum*
 (Hook. & Arn.) Cabrera, *Chrysanthellum
 weberbaueri* I.C. Chung, *Hinterhubera
 kotschyi* Sch. Bip. ex Hochst., nom. nud.,
Plagiocheilus erectus Rusby

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
 JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,
 TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

Chrysanthemoides Fabr.**Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl.Sin.: *Osteospermum moniliferum* L.

Arbusto. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Chrysanthemum L.**Chrysanthemum coronarium** L.

Sin.: *Glebionis coronaria* (L.) Cass. ex
 Spach, *Matricaria coronaria* (L.) Desr.,
Xanthophthalmum coronarium (L.) P.D. Sell

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, LPA). CHL(ATA, COQ,
 VAL, MAU, BIO, JFE). URY(CAS, MON).

Chrysanthemum segetum L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(LLA).

Chrysolaeana H. Rob.**Chrysolaeana candelabrum** (Chodat)

Dematteis

Sin.: *Vernonia candelabrum* Chodat

Hierba. Endémica.

Países: PRY(CAU).

Chrysolaeana cognata (Less.) Dematteis

Sin.: *Cacalia cognata* (Less.) Kuntze,
Vernonia cinerascens Sch. Bip. ex Baker,
 nom. nud., *Vernonia cognata* Less.,
Vernonia senecionea Mart. ex DC. f.
calvata Chodat, *Vernonia senecionea*
 Mart. ex DC. var. *adenocarpa* DC.,
Vernonia senecionea Mart. ex DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
 MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN,
 CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
 URY(COL, RIV, TAC).

Chrysolaeana cordifolia Dematteis

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS).

Chrysolaeana cristobaliana Dematteis

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(Fuera del área del
 proyecto). PRY(AMA, CAN, SPE).

Chrysolaeana desertorum (Mart. ex

DC.) Dematteis

Sin.: *Cacalia desertorum* (Mart. ex
 DC.) Kuntze, *Lessingianthus desertorum*
 (Mart. ex DC.) H. Rob., *Vernonia
 desertorum* Mart. ex DC. var. *longipes*
 Baker, *Vernonia desertorum* Mart. ex DC.

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(PAR).

Chrysolaeana dusenii (Malme) DematteisSin.: *Vernonia dusenii* Malme

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Chrysolaeana flexuosa (Sims) H. Rob.

Sin.: *Cacalia flexuosa* (Sims) Kuntze,
Vernonia flexuosa Sims var. *ensifolia* Hieron.,
Vernonia flexuosa Sims var. *glabra* Arechav.,
 nom. nud., *Vernonia flexuosa* Sims var.
macrocephala Hieron., *Vernonia flexuosa*
 Sims var. *microcephala* Hieron., *Vernonia
 flexuosa* Sims, *Vernonia montevidensis* Nees
 ex Otto & A. Dietr.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
 ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN,
 CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
 URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV,
 MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).

Chrysolaeana guaranitica Dematteis

Sin.: *Vernonia desertorum* Mart. ex DC.
 var. *macrocephala* Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, CAN, CON).

Chrysolaeana lithospermifolia

(Hieron.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia desertorum* Mart. ex
 DC. var. *polycephala* Chodat, *Vernonia
 lithospermifolia* Hieron.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
 CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA,
 MIE, PAI, SPE).

Chrysolaeana nicolackii H. Rob.

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Chrysolaena obovata (Less.)

Dematteis

Sin.: *Cacalia obovata* (Less.) Kuntze, *Chrysocoma herbacea* Vell., *Chrysolaena herbacea* (Vell.) H. Rob., *Vernonia chrysophylla* Gardner, *Vernonia densevillosa* Mart. ex DC., *Vernonia herbacea* (Vell.) Rusby, *Vernonia obovata* Less., *Vernonia paucifolia* Rusby

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chrysolaena oligophylla (Vell.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia oligophylla* (Vell.) Kunth, *Chrysocoma oligophylla* Vell., *Vernonia hypochlora* Malme

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chrysolaena platensis (Spreng.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia platensis* (Spreng.) Kuntze, *Conyza platensis* Spreng., *Vernonia platensis* (Spreng.) Less., *Vernonia virens* Sch. Bip. ex Baker f. *robustior* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO, TAC).

Chrysolaena propinqua (Hieron.)H. Rob. var. **canescens** (Chodat)

Dematteis

Sin.: *Vernonia lepidifera* Chodat var. *canescens* Chodat, *Vernonia propinqua*

Hieron. var. *canescens* (Chodat) Dematteis

Hierba. Nativa. 100-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, COA, PAI).

Chrysolaena propinqua (Hieron.) H.Rob. var. **propinqua**

Sin.: *Vernonia lepidifera* Chodat, *Vernonia propinqua* Hieron.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, AMA, CAN, GUA, ITA, MIE, PHA, SPE).

Chrysolaena sceptrum (Chodat)

Dematteis

Sin.: *Vernonia cognata* Less. var. *sceptrum* (Chodat) Cabrera, *Vernonia sceptrum* Chodat

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Chrysolaena simplex (Less.)

Dematteis

Sin.: *Cacalia simplex* (Less.) Kuntze, *Lessingianthus simplex* (Less.) H. Rob., *Vernonia erigerontis* Mart. ex DC., nom. nud., *Vernonia simplex* Less. var. *angustifolia* Less., *Vernonia simplex* Less. var. *latifolia* Less., *Vernonia simplex* Less. var. *regnellii* Baker, *Vernonia simplex* Less.

Subarbusto. Nativa. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chrysolaena verbascifolia (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia verbascifolia* (Less.) Kuntze, *Vernonia verbascifolia* Less. var. *laxa* Arechav., nom. nud., *Vernonia verbascifolia* Less. var. *robustior* Arechav., nom. nud. *Vernonia verbascifolia* Less.

Subarbusto. Endémica. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, AMA, CAU, COA, GUA, PAI).

Chuquiraga Juss.**Chuquiraga acanthophylla** Wedd.

Sin.: *Chuquiraga punensis* Gaspar
Arbusto. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Chuquiraga atacamensis Kuntze

Sin.: *Chuquiraga glabra* Phil., nom. illeg.
Arbusto. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Chuquiraga aurea Skottsbo.

Sin.: *Chuquiraga erinacea* D. Don f. *pulvinata* Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Chuquiraga avellanadae Lorentz

Sin.: *Chuquiraga argentea* (Speg.) Speg. var. *dusenii* (O. Hoffm.) Speg., *Chuquiraga avellanadae* Lorentz var. *dusenii* (O. Hoffm.) Hosseus, *Chuquiraga dusenii* O. Hoffm., *Chuquiraga kingii* Ball
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Chuquiraga calchaquina Cabrera

Arbusto. Endémica. 2300-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Chuquiraga echegarayi Hieron.

Arbusto. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(SJU).

Chuquiraga erinacea D. Don subsp. **erinacea**

Sin.: *Chuquiraga erinacea* D. Don var. *mollior* Lorentz, *Chuquiraga erinacea* D. Don var. *unguis-cati* (Ces.) Hauman, *Chuquiraga junipera* Phil., nom. illeg., *Chuquiraga junipera* Decne., *Chuquiraga ungui-cati* Ces.

Arbusto. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

Chuquiraga erinacea D. Don subsp. **hystrix** (Don) C. Ezcurra

Sin.: *Chuquiraga hystrix* D. Don
Arbusto. Endémica. 500-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

Chuquiraga kuschelii Acevedo

Arbusto. Endémica. 2900-3900 m.
Países: CHL(AYP).

Chuquiraga longiflora (Griseb.)

Hieron.

Sin.: *Chuquiraga chrysantha* Field & Gardner var. *longiflora* Griseb., *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *macrocephala* Wedd.
Arbusto. Nativa. 2500-3900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Chuquiraga morenonis (Kuntze) C. Ezcurra

Sin.: *Chuquiraga argentea* (Speg.) Speg., nom. illeg., *Chuquiraga kingii* Speg., hom. illeg., *Chuquiraga spinosa* Less. var. *morenonis* Kuntze, *Doniophyton argenteum* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Chuquiraga oppositifolia D. Don

Sin.: *Barnadesia flavescens* Meyen, *Chuquiraga alpina* Poepp. ex Less., *Chuquiraga chrysantha* Field & Gardner, *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *angustifolia* Ces., *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *macrantha* J. Remy
Arbusto. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Chuquiraga parviflora (Griseb.)

Hieron.

Sin.: *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *microcephala* Wedd., *Chuquiraga spinosa* Less. var. *parviflora* Griseb.
Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Chuquiraga rosulata Gaspar

Arbusto. Endémica. 400-1800 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

Chuquiraga ruscifolia D. Don

Arbusto. Endémica. 1800-3200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Chuquiraga spinosa Less. subsp.

australis C. Ezcurra
Arbusto. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUJ). CHL(ANT, ATA).

Chuquiraga spinosa Less. subsp.

rotundifolia (Wedd.) C. Ezcurra
Sin.: *Chuquiraga rotundifolia* Wedd.
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Chuquiraga straminea Sandwith

Arbusto. Endémica. 600-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Chuquiraga ulicina (Hook. & Arn.)

Hook. & Arn. subsp. **acicularis** (D. Don) C. Ezcurra
Sin.: *Chuquiraga acicularis* D. Don,
Chuquiraga revoluta Fielding & Gardner
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Chuquiraga ulicina (Hook. & Arn.)

Hook. & Arn. subsp. **ulicina**
Sin.: *Barnadesia ulicina* Hook. & Arn.,
Chuquiraga incana Phil., nom. illeg.,
Chuquiraga incana D. Don, *Chuquiraga ulicina* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. var. *incana* (Phil.) I.M. Johnst.
Arbusto. Endémica. 0-1700 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cichorium L.**Cichorium intybus** L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(ART, CAS, MON, RNO).

Cirsium Mill.**Cirsium arvense** (L.) Scop.

Sin.: *Serratula arvensis* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Sin.: *Carduus lanceolatus* L., *Carduus vulgaris* Savi, *Cirsium lanceolatum* (L.) Scop., *Cirsium vulgare* (Savi) Airy Shaw, comb. superfl.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). PRY(ÑEE). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Cladanthus Cass.**Cladanthus mixtus** (L.) Chevall.

Sin.: *Anthemis mixta* L., *Chamaemelum mixtum* (L.) All., *Ormenis mixta* (L.) Dumort.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO). URY(CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TYT).

Clibadium F. Allam. ex L.**Clibadium armanii** (Balb.) Sch. Bip. ex O.E. Schulz

Sin.: *Clibadium rotundifolium* DC., *Eupatorium armanii* Balb.
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, SPE).

Clibadium peruvianum Poepp. ex DC.

Sin.: *Clibadium heterotrichum* S.F. Blake, *Clibadium psilogynum* S.F. Blake, *Clibadium remotiflorum* O.E. Schulz, *Clibadium vargasianum* H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Cnicothamnus Griseb.**Cnicothamnus azafran** (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Cnicothamnus lorentzii* Griseb.
var. *azafran* Cabrera
Arbusto o arbolito. Nativa. 1300-2200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

Cnicothamnus lorentzii Griseb.

Sin.: *Lefrovia rhaponticoides* Franch.
Arbusto o arbolito. Nativa. 500-1400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Coleostephus Cass.**Coleostephus myconis** (L.) Cass.

Sin.: *Chrysanthemum myconis* L., *Coleostephus myconis* (L.) Rchb. f., *Kremeria myconys* (L.) Maire, *Leucanthemum myconis* (L.) Giraud, *Matricaria myconis* (L.) Desr., *Myconella myconis* (L.) Sprague, *Myconia myconis* (L.) Briq. & Cavill., *Pyrethrum myconis* (L.) Moench

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA). CHL(MAU, ARA, AIS). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, SJO).

Conyza Less., nom. cons.**Conyza andina** J. Remy

Sin.: *Conyza arvensis* Phil., *Conyza dumetorum* Phil., *Conyza hirtella* (DC.) Martic., nom. illeg., *Erigeron hirtellus* DC.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Conyza arabidifolia J. Remy

Sin.: *Conyza asperula* Phil., *Conyza coxi* Phil., *Conyza paulsenii* Phil.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Conyza blakei (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Erigeron blakei* Cabrera, *Erigeron bonariensis* L. f. *filifolia* Chodat, *Erigeron montevidensis* Baker, nom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MIS, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC).

Conyza boelckeii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(NEU).

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

var. **angustifolia** (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Conyza linearis* DC., *Erigeron bonariensis* L. var. *angustifolius* Cabrera
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(CEN). URY(MON).

Conyza bonariensis (L.) Cronquist
var. **bonariensis**

Sin.: *Conyza hispida* Kunth, *Conyza plebeja* Phil., *Erigeron bonariensis* L., *Erigeron bonariensis* L. f. *grisea* Chodat, *Marsea bonariensis* (L.) V.M. Badillo

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, IDE, JFE, IPA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Conyza burkartii Zardini

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

Conyza bustillosiana J. Remy

Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL, RME).

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Sin.: *Erigeron canadensis* L.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Conyza catharinensis Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Conyza copiapina Phil.

Hierba. Endémica. 200-1500 m.
Países: CHL(ATA).

Conyza cordata Kuntze

Sin.: *Conyza chilensis* Spreng. var. *auriculata* Griseb., *Erigeron cordatus* (Kunth) Cabrera
Hierba. Endémica. 1000-2700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Conyza coronopifolia Kunth

Sin.: *Conyza obtusa* Kunth
Hierba. Nativa. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Conyza depilis Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(BIO).

Conyza deserticola Phil.

Sin.: *Conyza punensis* Cabrera, *Erigeron cinarens* Sch. Bip. ex Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Conyza foliosa Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ARA).

Conyza gayana Phil.

Sin.: *Conyza araucana* Phil., *Conyza canescens* Phil., *Conyza consanguinea* Phil., *Conyza monticola* Phil., *Conyza vulgaris* Phil., hom. illeg., *Erigeron consanguineus* (Phil.) Cabrera, *Erigeron stenophyllus* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Conyza glabrata Phil.

Hierba. Endémica. 1000 m.
Países: CHL(RME).

Conyza glandulitecta Cabrera

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, GUA).

Conyza laevigata (Rich.) Pruski

Sin.: *Conyza apurensis* Kunth, *Conyza subspatulata* Cronquist, *Erigeron apurensis* (Kunth) Griseb., *Erigeron laevigatus* Rich., *Erigeron spathulatus* Vahl, *Marsea spathulata* (Vahl) V.M. Badillo
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SLU).

Conyza larrainiana J. Remy

Sin.: *Conyza conglomerata* Phil., *Conyza pratensis* Phil., *Erigeron larrainianus* (J. Remy) Cabrera
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LLA, AIS, MAG).

Conyza lateralis Phil.

Hierba. Endémica. 500-600 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Conyza lechleri (Sch. Bip.) Cabrera

Sin.: *Erigeron lechleri* Sch. Bip.
Hierba. Endémica. 500-2100 m.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, LRI, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

Conyza lorentzii Griseb.

Sin.: *Erigeron lorentzii* (Griseb.) Cabrera
Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, SDE, SFE, SLU, TUC). URY(RNO).

Conyza macrophylla Spreng.

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, PAY, ROC, TAC).

Conyza magnimontana Cabrera

Hierba. Endémica. 0-3200 m.
Países: ARG(RNE, SJU).

Conyza monorchis (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Erigeron monorchis* Griseb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TAC).

Conyza oligantha Cabrera

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(NEU, SCR).

Conyza pampeana (Parodi) Cabrera

Sin.: *Erigeron pampeanus* Parodi
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, COL, FLO, FLA, LAV, PAY, SJO, SOR, TAC).

Conyza pencana Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Conyza primulifolia (Lam.) Cuatrec. & Lourteig

Sin.: *Conyza chilensis* Spreng. var. *carnea* Chodat & Hassl., *Conyza chilensis* Spreng. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Conyza chilensis* Spreng. var. *integrifolia* Phil., *Conyza chilensis* Spreng., *Conyza myosotifolia* Kunth, *Conyza notobellidistrum* Griseb. var. *oblongifolia* Griseb., *Conyza scabiosaefolia* J. Remy, *Conyza yungasensis* Rusby, *Erigeron chilensis* (Spreng.) D. Don ex G. Don, *Inula primulifolia* Lam., *Marsea chilensis* (Spreng.) Kuntze, *Marsea chilensis* (Spreng.) V.M. Badillo, nom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). PRY(APY, CAU, CAN, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Conyza reitziana Cabrera

Hierba. Endémica. 1400-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Conyza retirensis Cabrera

Hierba. Endémica. 1600 m.
Países: BRA(SCA).

Conyza saltensis Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SAL, SJU).

Conyza serrana Cabrera

Sin.: *Erigeron platensis* Speg.
Hierba. Endémica. 500-1600 m.
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, SAL).
BRA(PAR, RGS). URY(SJO).

Conyza spiciformis (Griseb.) Zardini

Sin.: *Erigeron spiciformis* Griseb.
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Conyza spiculosa (Hook. & Arn.)

Zardini
Sin.: *Conyza colinensis* Phil., *Conyza patens* Phil., *Erigeron colinensis* Phil., *Erigeron spiculosus* Hook. & Arn., *Erigeron spinulosum* Hook. & Arn. var. *umbrosa* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Conyza stenophylla Phil.

Sin.: *Conyza armeriifolia* Phil., *Conyza linifolia* Phil., hom. illeg., *Erigeron flagellifolius* Cabrera
Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Conyza suffruticosa Phil.

Hierba. Nativa.
Países: CHL(RME).

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var.

leiotheca (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Sin.: *Conyza bilbaoana* J. Remy, *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *leiotheca* (S.F. Blake) Cuatrec., *Conyza elata* Kunth & Bouché, *Conyza floribunda* Kunth var. *laciniata* Cabrera, *Conyza floribunda* Kunth, *Conyza myriocephala* J. Remy, *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker var. *floribunda* (Kunth) J.B. Marshall, *Erigeron bilbaoanus* (J. Remy) Cabrera, *Erigeron bonariensis* L. f. *glabrata* Speg., *Erigeron bonariensis* L. var. *floribundum* (Kunth) Cuatrec., *Erigeron bonariensis* L. var. *leiothecus* S.F. Blake, *Erigeron floribundus* (Kunth) Sch. Bip., *Marsea*

bonariensis (L.) V.M. Badillo var.

leiotheca (S.F. Blake) V.M. Badillo
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, FLA, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**

Sin.: *Conyza albida* Willd. ex Spreng., *Conyza altissima* Naudin ex Debeaux, *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist f. *subleiotheca* Cuatrec., *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *microcephala* (Cabrera) Cabrera, *Conyza erigeroides* DC., *Conyza floribunda* Kunth var. *subleiotheca* (Cuatrec.) J.B. Marshall, *Erigeron albidum* (Willd. ex Spreng.) A. Gray, *Erigeron albidus* (Spreng.) Herter, comb. superfl., *Erigeron bonariensis* L. var. *microcephalus* Cabrera, *Erigeron sumatrensis* Retz.
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA). URY(MON, SOR).

Conyza tenera Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Conyza thermanum Phil.

Sin.: *Erigeron thermanum* (Phil.) Cabrera
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Conyza tunariensis (Kuntze) Zardini

Sin.: *Erigeron tunariensis* Kuntze
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Conyza valdiviana Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Coreopsis L.**Coreopsis fasciculata** Wedd.

Hierba. Nativa. 2800-4200 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(LPA).

Coreopsis lanceolata L.

Sin.: *Coreopsoides lanceolata* (L.) Moench
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, LPA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(SAO).

Coreopsis suaveolens Sherff

Subarbusto. Endémica. 3400-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Coreopsis tinctoria Nutt.

Sin.: *Calliopsis tinctoria* (Nutt.) DC., *Diplosastera tinctoria* (Nutt.) Tausch
Hierba. Introducida. 200-500 m.
Países: ARG(COR, LPA, MIS, SJU). BRA(SCA).

Cosmos Cav.**Cosmos bipinnatus** Cav.

Sin.: *Cosmos bipinnatus* Cav. var. *exaristatus* DC.
Hierba. Introducida. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, SAL). BRA(RGS).

Cosmos peucedanifolius Wedd. var. **peucedanifolius**

Sin.: *Bidens peucedanifolius* (Wedd.) Kuntze, *Cosmos marginatus* Klatt
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cosmos peucedanifolius Wedd. var. **tiraquensis** (Kuntze) Sherff

Sin.: *Bidens peucedanifolius* (Wedd.) Kuntze var. *tiraquensis* Kuntze, *Cosmos subpubescens* Wedd.
Hierba. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Cosmos sulphureus Cav.

Sin.: *Bidens artemisiifolia* Poepp. & Endl. var. *sulphurea* (Cav.) Kuntze, *Bidens sulphurea* (Cav.) Sch. Bip., *Coreopsis artemisiaefolia* Jacq., *Coreopsis artemisiifolia* Sessé & Moç., *Cosmea sulphurea* Willd., nom. inval., *Cosmos aurantiacus* Klatt, *Cosmos gracilis* Sherff, *Cosmos sulphureus* Cav. var. *exaristatus* Sherff, *Cosmos sulphureus* Cav. var. *hirsuticaulis* Sherff
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Cotula L.

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.

Sin.: *Anacyclus australis* Sieber ex Spreng., *Cotula membranacea* D.G. Lloyd, *Lancisia australis* (Sieber ex Spreng.) Rydb., *Leptinella tenella* (A. Cunn.) D. G. Lloyd & C. J. Webb, *Soliva tenella* A. Cunn., *Strongylosperma australe* (Sieber ex Spreng.) Less.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, IDE, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, COL, MON, SJO, SOR, TAC).

Cotula coronopifolia L.

Sin.: *Cotula montevidensis* Spreng., *Lancisia coronopifolia* (L.) Rydb.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJO). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, IDE, JFE). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).

Cotula mexicana (DC.) Cabrera

Sin.: *Cotula cabreræ* Caro, *Cotula minuta* (L. f.) Schinz, nom. illeg., *Cotula pedicellata* (Ruiz & Pav.) Cabrera, nom. illeg., *Cotula pygmaea* (Kunth) Benth. & Hook. ex Hemsl, nom. illeg., *Gymnostyles minuta* (L. f.) Spreng., *Gymnostyles peruviana* Spreng., nom. illeg., *Hippia minuta* L. f., *Lancisia minuta* (L. f.) Rydb., *Soliva mexicana* DC., *Soliva minuta* (L. f.) Sweet, *Soliva pedicellata* Ruiz & Pav., *Soliva pedunculata* Ruiz & Pav. ex Steudel, nom. inval., *Soliva pygmaea* Kunth

Hierba. Nativa. 3500-4400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

Crepis L.**Crepis capillaris** (L.) Wallr.

Sin.: *Crepis virens* L., nom. illeg., *Lapsana capillaris* L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS).

Crepis foetida L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Crepis pulchra L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(COR). CHL(LBO, MAU, BIO).

Crepis setosa Hallier f.

Sin.: *Barkhausia setosa* (Haller f.) DC.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, RNE, SFE). BRA(RGS). CHL(ARA). URY(COL, SOR).

Crepis vesicaria L. subsp.

taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller

Sin.: *Barkhausia haenseleri* Boiss. ex DC., *Crepis taraxacifolia* Thuill. subsp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) Nyman, *Crepis taraxacifolia* Thuill., *Crepis vesicaria* L. subsp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) P.D. Sell
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). CHL(BIO, ARA).

Criscia Katinas**Criscia stricta** (Spreng.) Katinas

Sin.: *Onoseris stricta* Spreng., *Perezia pampeana* Speg., *Trichocline heterophylla* Griseb., hom. illeg., *Trixis stricta* (Spreng.) Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Critonia P. Browne

Critonia arachnoidea (Legname) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium arachnoideum* Legname
Árbol. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ).

Critonia megaphylla (Baker) R.M.

King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium megaphyllum* Baker
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Critonia morifolia (Mill.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium morifolium* Mill.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Critoniopsis Sch. Bip.**Critoniopsis quinqueflora** (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia quinqueflora* Less.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cuatrecasasiella H. Rob.

Cuatrecasasiella argentina (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Luciliopsis argentina* Cabrera
Hierba. Nativa. 2500-4300 m.
Países: ARG(JUJ, LRI). CHL(AYP, TAR, ANT).

Cyclolepis Gillies ex D. Don**Cyclolepis genistoides** Gillies ex D. Don

Sin.: *Gochnatia genistoides* (D. Don) Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 900-1900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJO, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Cynara L.**Cynara cardunculus** L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE, IPA). URY(CAS, MON, PAY, RNO, SOR).

Cyrtocymura H. Rob.**Cyrtocymura cincta** (Griseb.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia cincta* (Griseb.) Kuntze, *Vernonia cincta* Griseb., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *cincta* (Griseb.) Cabrera
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APA, APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia scorpioides* (Lam.) Kuntze, *Chrysocoma repanda* Vell., *Conyza scorpioides* Lam., *Lepidaploa scorpioides* (Lam.) Cass., *Vernonia arborescens* (L.) Sw. var. *corrientensis* Hieron., *Vernonia centriflora* Link & Otto, *Vernonia flavescens* Less., *Vernonia lanuginosa* Gardner, *Vernonia longeracemosa* Mart. ex DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *longeracemosa* DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *longifolia* DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *subrepanda* (Pers.) DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *subtomentosa* DC., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers., *Vernonia subrepanda* Pers., *Vernonia tournefortioides* Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(COL).

Dahlia Cav.**Dahlia pinnata** Cav.

Sin.: *Dahlia pinnata* Cav. var. *nana* Jacks., *Dahlia pinnata* Cav. var. *variabilis* Voss, nom. superfl., *Dahlia sambucifolia* Salisb., *Dahlia superflua* W.T. Aiton, nom. superfl., *Dahlia variabilis* Desf., nom. superfl., *Georgina superflua* DC., nom. superfl., *Georgina variabilis* Willd., nom. superfl.

Hierba. Introducida. 1000-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Dasyanthina H. Rob.**Dasyanthina palustris** (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Vernonia palustris* Gardner
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CEN).

Dasycondylus R.M. King & H. Rob.**Dasycondylus debeauxii** (B.L. Rob.)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium debeauxii* B.L. Rob.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dasycondylus dusenii R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Dasycondylus resinosa (Spreng.)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Mikania resinosa* Spreng.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dasyphyllum Kunth**Dasyphyllum armatum** (J. Kost.) Cabrera

Sin.: *Chuquiraga armata* J. Kost., *Flotovia armata* (J. Kost.) Tovar
Arbusto. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.)

Cabrera var. **brasiliense**
Sin.: *Carthamus fluminensis* Vell., *Chuquiraga brasiliensis* (Spreng.) Kuntze, *Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker, *Chuquiraga racemosa* Baker, *Flotovia brasiliensis* (Spreng.) Cabrera ex Tovar, *Flotovia glabra* Spreng., *Ioannea brasiliensis* Spreng., *Johannia brasiliensis* Spreng.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.)

Cabrera var. **divaricatum** (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Barnadesia divaricata* Griseb., *Chuquiraga brasiliensis* (Spreng.) Kuntze var. *divaricata* (Griseb.) Kuntze, *Flotovia divaricata* (Griseb.) Hieron.
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Dasyphyllum donianum (Gardner)

Cabrera
Sin.: *Chuquiraga doniana* (Gardner) Baker, *Chuquiraga latifolia* (Gardner) Baker, *Dasyphyllum latifolium* (Gardner) Cabrera, *Flotovia doniana* Gardner, *Flotovia latifolia* Gardner
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Dasyphyllum flagellare (Casar.) Cabrera

Sin.: *Chuquiraga regnelli* Baker, *Flotovia flagellaris* Casar., *Flotovia regnellii* Sch. Bip., nom. nud.
Arbusto. Nativa. 700-2100 m.
Países: BRA(PAR).

Dasyphyllum floribundum (Gardner)

Cabrera
Sin.: *Chuquiraga floribunda* (Gardner) Baker, *Flotovia floribunda* Gardner

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA).

Dasyphyllum inerme (Rusby) Cabrera

Sin.: *Barnadesia inermis* Rusby
Arbusto. Nativa. 700-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Dasyphyllum lanceolatum (Less.) Cabrera

Sin.: *Flotovia lanceolata* Less.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).

Dasyphyllum maria-lianae Zardini & Soria

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(GUA, SPE).

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera

Sin.: *Chuquiraga spinescens* (Less.) Baker, *Flotovia spinescens* Less.
Árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dasyphyllum sprengelianum

(Gardner) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga chapadensis* S. Moore, *Chuquiraga mattogrosensis* Malme, *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker f. *mattogrosensis* (Malme) Hassl., *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker f. *paraguariensis* Hassl., *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker f. *subinermis* Hassl., *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker var. *chapadensis* (S. Moore) Hassl., *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker, *Flotovia sprengeliana* Gardner
Arbusto. Nativa. 300-1500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Dasyphyllum synacanthum (Baker)

Cabrera
Sin.: *Chuquiraga synacantha* Baker, *Flotovia synacantha* Sch. Bip., nom. nud.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.)

Cabrera var. **multiflorum** (Baker) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker var. *multiflora* Baker
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.)Cabrera var. **tomentosum**

Sin.: *Chuquiraga paniculata* D. Don, *Chuquiraga tomentosa* (Spreng.) Baker, *Flotovia paniculata* (D. Don) DC., *Flotovia tomentosa* Spreng.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Dasyphyllum vagans (Gardner) CabreraSin.: *Chuquiraga vagans* (Gardner)Baker, *Flotovia vagans* Gardner

Arbusto. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Dasyphyllum varians (Gardner) CabreraSin.: *Chuquiraga glabra* (Spreng.)Baker var. *hassleriana* (Chodat) Chodat,*Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker var.*rectispina* Chodat, *Chuquiraga glabra*(Spreng.) Baker var. *variens* (Gardner)Baker, *Chuquiraga hassleriana* Chodat,*Chuquiraga varians* (Gardner) Rusby,*Dasyphyllum brasiliense* (Spreng.)Cabrera var. *variens* Cabrera, *Flotovia**variens* Gardner

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Delairea Lem.**Delairea odorata** Lem.Sin.: *Senecio mikanioides* Otto exWalp., *Senecio scandens* DC., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 200-600 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA).

CHL(VAL, BIO, LRI, LLA, JFE).

URY(CAS, MON).

Delilia Spreng.**Delilia biflora** (L.) KuntzeSin.: *Delilia berteroi* Spreng., *Elvira**biflora* (L.) DC., *Elvira martyni* Cass.,nom. superfl., *Milleria biflora* L., *Meratia**sprengelii* Cass., nom. superfl.

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Dendrophorbium (Cuatrec.) C.

Jeffrey

Dendrophorbium bomanii (R.E. Fr.)

C. Jeffrey

Sin.: *Senecio bomanii* R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Dendrophorbium brachycodon

(Baker) C. Jeffrey

Sin.: *Senecio brachycodon* Baker

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Dendrophorbium bradei (Cabrera) C.

Jeffrey

Sin.: *Senecio bradei* Cabrera.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Dendrophorbium catharinense

(Dusén ex Cabrera) C. Jeffrey

Sin.: *Senecio catharinensis* Dusén ex

Cabrera

Hierba. Endémica. 700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Dendrophorbium fruticosum (Vell.)

C. Jeffrey

Sin.: *Senecio fruticosus* Vell.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Dendrophorbium limosum C. Jeffrey

Enredadera. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dendrophorbium paranense (Malme)

Matezenb. & Baptista

Sin.: *Senecio paranensis* Malme

Hierba. Endémica. 1200-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dendrophorbium peregrinum

(Griseb.) C. Jeffrey

Sin.: *Senecio peregrinus* Griseb.

Arbusto. Nativa. 400-800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Dendrophorbium pluricephalum

(Cabrera) C. Jeffrey

Sin.: *Senecio missionum* Cabrera,*Senecio myriocephalus* Baker, hom.illeg., *Senecio pluricephalus* Cabrera,*Dendrophorbium missionum* (Cabrera) C.

Jeffrey

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(GUA, PAI).

Dendrophorbium subnemoralis

(Dusén) A. Teles

Sin.: *Senecio melloi* Cabrera, nom.superfl., *Senecio subnemoralis* Dusén

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dimerostemma Cass.**Dimerostemma annuum** (Hassl.) H. Rob.Sin.: *Oyedaea annua* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA).

Dimerostemma apense (Chodat)

M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum apense* (Chodat)Pruski, comb. superfl., *Angelphytum apensis*(Chodat) A.A. Sáenz, *Aspilia apensis* Chodat,*Wedelia apensis* (Chodat) B.L. Turner,*Zexmenia apensis* (Chodat) Hassl.

Hierba. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(AMA, COA).

Dimerostemma arnottii (Baker)

M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum arnottii* (Baker)H. Rob., *Angelphytum oppositifolium*(A.A. Sáenz) H. Rob., *Angelphytum**paraguariense* (Chodat) H. Rob.,*Dimerostemma oppositifolia* (A.A. Sáenz)M.D. Moraes, *Verbesina arnottii* Bakerf. *gracilis* Chodat, *Verbesina arnottii*Baker f. *scabriuscula* Chodat, *Verbesina**arnottii* Baker var. *angustifolia* Chodat,*Verbesina arnottii* Baker var. *oblongifolia*Chodat, *Verbesina arnottii* Baker var.*tomentosa* Chodat, *Verbesina arnottii*Baker, *Verbesina paraguariensis* Chodat,*Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f.*angustifolia* Hassl., *Zexmenia arnottii*(Baker) Hassl. f. *calvescus* Hassl.,*Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f.*graminifolia* Hassl., *Zexmenia arnottii*(Baker) Hassl. f. *intermedia* Hassl.,*Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl. f.*macrocephala* Hassl., *Zexmenia arnottii*(Baker) Hassl. f. *sericea* Hassl., *Zexmenia**arnottii* (Baker) Hassl., *Zexmenia**oppositifolia* A.A. Sáenz, *Zexmenia**paraguariensis* (Chodat) S.F. Blake

Subarbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,

MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,

AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,

COA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART,

RNO, RIV).

Dimerostemma aspilioides (Griseb.)

M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum aspilioides* (Griseb.)H. Rob., *Verbesina aspilioides* Griseb.,*Zexmenia aspilioides* (Griseb.) Hassl.

Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC).
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON).

Dimerostemma grisebachii (Baker)
M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum grisebachii* (Baker)
H. Rob., *Verbesina grisebachii* Baker,
Zexmenia grisebachii (Baker) Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR).
BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, PAI, PHA).

Dimerostemma hieronymi (Hassl.)
M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum hieronymi* (Hassl.)
H. Rob., *Zexmenia hieronymi* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Dimerostemma indutum (Chodat)
M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum indutum* (Chodat)
H. Rob., *Aspilia induta* Chodat, *Zexmenia induta* (Chodat) Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: PRY(CAU, CEN, COA, GUA).

Dimerostemma myrtifolium
(Chodat) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum myrtifolium* (Chodat) H.
Rob., *Verbesina myrtifolia* Chodat, *Zexmenia myrtifolia* (Chodat) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Dimerostemma pseudosilphioides
(Hassl.) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum pseudosilphioides*
(Hassl.) H. Rob., *Zexmenia pseudosilphioides* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Dimerostemma reitzii (H. Rob.) M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum hatschbachii* H.
Rob., *Angelphytum reitzii* H. Rob.,
Zexmenia arnotti (Baker) Hassl. f.
angustissima Hassl.
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, AMA).

Dimerostemma tenuifolium (Hassl.)
M.D. Moraes

Sin.: *Angelphytum tenuifolium* (Hassl.)
H. Rob., *Zexmenia tenuifolia* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(RGS).
PRY(PHA).

Dinoseris Griseb.

Dinoseris salicifolia Griseb.

Sin.: *Dinoseris salicifolia* Griseb. var.
araneosa Kuntze, *Dinoseris salicifolia*
Griseb. var. *normalis* Kuntze, nom.
superfl., *Hyaloseris boliviensis* J. Kost.,
Hyaloseris salicifolia (Griseb.) Hieron.
Arbusto. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, TUC).

Diplostephium Kunth

Diplostephium cinereum Cuatrec.
Arbusto. Nativa. 3600-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Diplostephium meyenii Wedd.

Sin.: *Aster trachyticus* F. Phil.
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Diplostephium tacorense Hieron.

Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: CHL(ATA).

Disynaphia Hook. & Arn. ex DC.

Disynaphia calyculata (Hook. & Arn.)
R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Disynaphia montevidensis* DC.,
Eupatorium calycinum Sch. Bip. ex Baker,
nom. illeg., *Eupatorium calyculatum*
Hook. & Arn., *Stevia calycina* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS, SCA).
URY(CAS, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).

Disynaphia ericoides (DC.) R.M. King
& H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ericoides* DC.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS). URY(RIV).

Disynaphia filifolia (Hassl.) R.M. King
& H. Rob.

Sin.: *Eupatorium filifolium* Hassl.,
Eupatorium filifolium Hassl. var.
longifolium Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CON, SPE).

Disynaphia ligulaefolia (Hook. &
Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium gnidioides* DC.,
Eupatorium ligulaefolium Hook. & Arn.
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Disynaphia littoralis (Cabrera) R.M.
King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium littorale* Cabrera
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Disynaphia multicrenulata (Sch. Bip.
ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Disynaphia achillea* (Chodat) R.M.
King & H. Rob., *Eupatorium achillea*
Chodat, *Eupatorium multicrenulatum*
Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU,
CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
URY(TAC).

Disynaphia radula (Chodat) R.M.
King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium radula* Chodat,
Eupatorium radula Chodat var.
obtusifolium Chodat, *Eupatorium radula*
Chodat var. *serratum* Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CAU, SPE).

Disynaphia senecionidea (Baker)
R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium senecionideum* Baker.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Disynaphia spathulata (Hook. &
Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Disynaphia albissima* (Hassl.)
R.M. King & H. Rob., *Eupatorium*
albissimum Hassl., *Eupatorium*
halimifolium DC., *Eupatorium*
spathulatum Hook. & Arn.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU).

Disynaphia tacuarembensis (Hieron.
& Arechav.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium tacuarembense*
Hieron. & Arechav.
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: URY(TAC).

Disynaphia variolata (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium variolatum* B.L. Rob.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Dittrichia Greuter

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

Sin.: *Erigeron viscosus* L.
Arbusto. Introducida. 0-400 m.
Países: CHL(VAL).

Dolichlasium Lag.

Dolichlasium lagascae D. Don

Sin.: *Dolichlasium glanduliferum* Lag. ex Hook. & Arn., nom. superfl., *Trixis glandulifera* Benth. & Hook. f. ex Hieron.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(LPA, LRI, MEN, NEU, SJU, SCR).

Doniophyton Wedd.

Doniophyton anomalum (D. Don) Kurtz

Sin.: *Chuquiraga anomala* D. Don, *Chuquiraga patagonica* Phil., *Doniophyton andicolum* Wedd., *Doniophyton flavescens* Suess., *Doniophyton patagonicum* (Phil.) Hieron.

Subarbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU).
CHL(ARA, RME).

Doniophyton weddellii Katinas & Stuessy

Subarbusto. Endémica. 1900-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU).
CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

Duseniella K. Schum.

Duseniella patagonica (O. Hoffm.) K. Schum.

Sin.: *Dusenia patagonica* O. Hoffm., *Duseniella bicolor* Suess.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Dyssodia Cav.

Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc.

Sin.: *Boebera chrysanthemoides* Willd.,

nom. superfl., *Boebera ciliosa* Rydb., *Boebera glandulosa* Pers., nom. illeg., *Boebera papposa* (Vent.) Rydb., *Boebera roseata* Rydb., *Dyssodia ciliosa* (Rydb.) Standl., *Dyssodia chrysanthemifolia* Steud., nom. superfl., *Dyssodia chrysanthemoides* (Willd.) Lag., *Dyssodia fastigiata* DC., *Dyssodia roseata* (Rydb.) Gentry, nom. superfl., *Tagetes papposa* Vent., *Tagetes pumila* Willd., nom. illeg.
Hierba. Introducida. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Eclipta L., nom. cons.

Eclipta elliptica DC.

Sin.: *Spilanthes wedelioides* Hook. & Arn., *Wollastonia prostrata* DC.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).

Eclipta megapotamica (Spreng.) Sch. Bip. ex Blake

Sin.: *Eclipta lanceolata* DC., *Verbesina megapotamica* Spreng.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS).

Eclipta prostrata (L.) L.

Sin.: *Eclipta alba* (L.) Hassk., *Eclipta erecta* L., nom. illeg., *Galinsoga oblongifolia* (Hook.) DC., *Polygyne inconspicua* Phil., *Verbesina alba* L., *Verbesina conyzoides* Trew, *Verbesina prostrata* L., *Wiborgia oblongifolia* Hook.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, RME). PRY(APY, AMA, CAN, COA, PHA). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Egletes Cass.

Egletes viscosa (L.) Less.

Sin.: *Cotula viscosa* L.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, ÑEE, PHA).

Elephantopus L.

Elephantopus micropappus Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Elephantopus mollis Kunth

Sin.: *Elephantopus cernuus* Vell., *Elephantopus cervinus* Vell., *Elephantopus hypomalacus* S.F. Blake, *Elephantopus pilosus* Philipson, *Elephantopus scaber* L. var. *tomentosus* (L.) Sch. Bip. ex Baker, *Elephantopus tomentosus* L.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, RIV, TAC).

Elephantopus palustris Gardner

Sin.: *Elephantopus vaginatus* Gardner
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, SPE).

Eleutheranthera Poit.

Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch. Bip.

Sin.: *Melampodium ruderale* Sw.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Emilia Cass.

Emilia fosbergii Nicolson

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA).

Emilia sonchifolia (L.) DC.

Sin.: *Cacalia sonchifolia* L.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Encelia Adans.

Encelia canescens Lam. var. **canescens**

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Encelia canescens Lam. var.

oblongifolia (DC.) S.F. Blake

Sin.: *Encelia oblongifolia* DC.
Subarbusto. Endémica. 0-2700 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Encelia canescens Lam. var.

parvifolia (Kunth) Ball

Sin.: *Encelia canescens* Lam. var. *lanuginosa* I.M. Johnst., *Encelia canescens* Lam. var. *tomentosa* (Walp.) Ball, *Encelia parvifolia* Kunth, *Encelia tomentosa* Walp.
Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Enydra Lour.**Enydra anagallis** Gardner

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, COL, ROC, SJO).

Enydra sessilis (Sw.) DC.

Sin.: *Eclipta sessilis* Sw.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).

Erechtites Raf.**Erechtites goyazensis** (Gardner) Cabrera

Sin.: *Erechtites missionum* Malme var. *lanceolatus* Chodat & Hassl., *Senecio goyazensis* Gardner
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. **acalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.

Sin.: *Erechtites agrestis* (Sw.) Standl. & Steyerl., *Erechtites acalioides* (Fisch. ex Spreng.) Less., *Erechtites carduifolius* (Cass.) DC. var. *latifolius* Klatt, *Erechtites carduifolius* (Cass.) DC., *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. f. *pubescens* Kuntze, nom. illeg., *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *carduifolia* (Cass.) Griseb., *Erechtites hieraciifolius* Walp., *Erechtites sulcatus* Gardner, *Gynura aspera* Ridl., *Gynura malasica* (Ridl.) Ridl., *Gynura zeylanica* Trin. var. *malasica* Ridl., *Neoceis carduifolia* Cass., *Senecio acalioides* Fisch. ex Spreng., *Senecio carduifolius* (Cass.) Desf., *Senecio fischeri* Sch. Bip., nom. nud., *Sonchus agrestis* Sw., *Sonchus brasiliensis* Meyen & Walp., *Sonchus occidentalis* Spreng.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**

Sin.: *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. f. *minor* Waisb.,

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. *glabrescens* Kuntze, *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *intermedius* Fernald, *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *praealtus* (Raf.) Fernald, *Erechtites praealta* Raf., *Neoceis hieracifolia* (L.) Cass., *Neoceis rigidula* Cass., *Senecio hieraciifolius* L. var. *giganteus* Raf., *Senecio hieraciifolius* L., *Senecio seminudus* Bory, *Senecio sonchoides* Vuk., *Senecio vukotinovici* Schloss. *Sonchus laevis* Sloane
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA).

Erechtites ignobilis Baker

Sin.: *Senecio ignobilis* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Erechtites leptanthus (Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio leptanthus* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Erechtites missionum Malme

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU).

Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) Less. ex DC. f. **organensis** (Gardner) Belcher

Sin.: *Erechtites organensis* Gardner, *Erechtites valerianifolius* (Link ex Spreng.) Less. ex DC. var. *organensis* (Gardner) Baker
Hierba. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) Less. ex DC. f. **prenanthoides** (Kunth) Cuatrec.

Sin.: *Cacalia prenanthoides* Kunth, *Erechtites ambigua* DC., *Erechtites petiolatus* Benth., *Erechtites prenanthoides* (Kunth) Greenm., hom. illeg., *Senecio albiflorus* Sch. Bip., *Senecio lactuoides* Klatt
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) Less. ex DC. f. **reductus** Belcher

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).

Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) Less. ex DC. f. **valerianifolius**

Sin.: *Crassocephalum valerianifolium* (Link ex Spreng.) Less., *Erechtites gardneriana* Cabrera, *Erechtites valerianifolius* (Wolf) DC., nom. inval., *Gynura rosea* Ridl., *Senecio valerianifolius* Desf., hom. illeg., *Senecio valerianifolius* Gardner, hom. illeg., *Senecio valerianifolius* Link ex Spreng., *Senecio valerianifolius* Wolf ex Link, nom. nud., *Sonchus erythropappus* Meyen & Walp. ex Walp.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(RIV, ROC, TAC, TYT).

Eriachaenium Sch. Bip.**Eriachaenium magellanicum** Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Erigeron L., nom. cons.**Erigeron andicola** DC.

Sin.: *Aster andicola* Hauman, *Aster bellidiastrum* Nees ex Walp., hom. illeg., *Erigeron andicola* DC. f. *humilior* Vierh., *Erigeron andinus* Phil., *Erigeron araucanus* Phil., *Erigeron biflorus* Phil., *Erigeron cabrerarum* Solbrig, *Erigeron ciliaris* Phil.
Hierba. Endémica. 500-4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Erigeron campanensis Valdeb.,

Lowrey & Stuessy
Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: CHL(VAL).

Erigeron cinereus Hook. & Arn.

Sin.: *Erigeron andicola* DC. f. *pleiocephalus* Vierh., *Erigeron dusenii* Vierh., *Erigeron dusenii* Vierh. f. *purpurascens* Vierh., *Erigeron dusenii* Vierh. f. *viridis* Vierh., *Erigeron poeppigii* DC.
Hierba. Endémica. 500-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Erigeron corrales-molinensis Danton

Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(JFE).

Erigeron fasciculatus Colla

Sin.: *Aster breviflorus* Phil., *Aster litoralis* Phil., *Erigeron berterianus* DC., *Erigeron subandinus* Phil., *Haplopappus hispidulus* DC.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Erigeron fernandezii (Colla) Harling

Sin.: *Erigeron fernandezianus* (Colla) Solbrig, nom. illeg., *Erigeron fruticosum* DC., *Terranea fernandezia* Colla

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Erigeron gilliesii (Hook. & Arn.) Cabrera

Sin.: *Aster albertii* Phil., *Aster gayanus* DC., *Aster gilliesii* Hook. & Arn., *Astradelphus chilensis* J. Remy, *Erigeron pratensis* Phil., *Erigeron remyanus* Wedd., *Gusmania chilensis* J. Remy

Hierba. Endémica. 800-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Erigeron illapelinus Phil.

Hierba. Endémica. 2400-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ).

Erigeron imbricatus Vierh.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Erigeron incertus (d'Urv.) Skotts. b.

Sin.: *Erigeron sullivanii* Hook. f., *Hieracium incertum* d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(TDF).

Erigeron ingae Skotts. b.

Sin.: *Erigeron ingae* Skotts. b. var. *innocentium* Skotts. b., *Erigeron turricola* Skotts. b.

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(JFE).

Erigeron karwinskianus DC.

Sin.: *Erigeron karwinskianus* DC. var. *mucronatus* Hieron., *Erigeron mucronatus* DC., *Erigeron trilobus* Sond.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(COR). CHL(VAL, BIO, LLA, RME).

Erigeron lanceolatus Wedd.

Sin.: *Erigeron lanceolatus* Wedd. var. *subacaulis* Wedd.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Erigeron leirolepis Solbrig

Hierba. Endémica. 3000 m.

Países: ARG(MEN).

Erigeron leptopetalus Phil.

Sin.: *Erigeron brevicaulis* Phil., *Erigeron erianthus* Speg., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *skottsbergii* Vierh., *Erigeron nubigenus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(ATA, COQ, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG, RME).

Erigeron luteoviridis Skotts. b.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Erigeron luxurians (Skotts. b.) Solbrig

Sin.: *Erigeron litoralis* (Phil.) Skotts. b. var. *luxurians* Skotts. b.

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Erigeron myosotis Pers.

Sin.: *Erigeron angustifolius* Peralta, *Erigeron fernandezii* Phil., *Erigeron gayanus* J. Remy var. *leptophyllus* Speg., *Erigeron glabratus* Reiche, hom. illeg., *Erigeron ibari* Phil., *Erigeron lacarensis* Phil., *Erigeron myosotis* Pers. f. *pluriceps* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. f. *spithameus* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *fuegiae* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *magellanicus* (Sch. Bip.) Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *polymorphoides* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *pseudomagellanicus* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. var. *elongatum* Sch. Bip., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. f. *densehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. f. *sparsehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. f. *tragopogonoides* Skotts. b. ex Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd., *Erigeron platylepis* Vierh., *Erigeron polyphyllum* Phil., *Erigeron sullivanii* Hook. f. var. *magellanicum* Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Erigeron othonnifolius Hook. & Arn.

Sin.: *Aster prostratus* Phil., *Erigeron vidali* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

Erigeron patagonicus Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(BIO, AIS, MAG).

Erigeron pulcher Phil.

Hierba. Endémica. 2700-3200 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(VAL, RME).

Erigeron rosulatus Wedd.

Sin.: *Erigeron brittonianus* Rusby, *Erigeron pulvinatus* Wedd.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR).

Erigeron rupicola Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Erigeron schnackii Solbrig

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Erigeron stuessyi Valdeb.

Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: CHL(JFE).

Eupatorium L.**Eupatorium amambayense** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Eupatorium areniscophilum Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, COA).

Eupatorium gnaphalloides Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(GUA).

Eupatorium lineatum Sch. Bip. ex Baker

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Eupatorium maracayuense Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

Eupatorium rosengurtii Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Euryops (Cass.) Cass., nom. cons.**Euryops chrysanthemoides** (DC.) B. Nord.

Sin.: *Gamolepis chrysanthemoides* DC.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI).

Exostigma G. Sancho

Exostigma notobellidiastrum

(Griseb.) G. Sancho

Sin.: *Baccharidastrum notobellidiastrum* (Griseb.) Herter, *Conyza notobellidiastrum* Griseb., *Erigeron notobellidiastrum* (Griseb.) Blake, *Erigeron pauciflorus* Less., nom. nud., *Marsea notobellidiastrum* (Griseb.) Kuntze, *Podocoma notobellidiastrum* (Griseb.) G.L. Nesom

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

Exostigma rivulare (Gardner) G. Sancho

Sin.: *Baccharidastrum rivulare* (Gardner) Herter, *Conyza rivularis* Gardner, *Erigeron gardneri* Cabrera, *Podocoma rivularis* (Gardner) G.L. Nesom,

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, GUA). URY(MON, RNO).

Facelis Cass.

Facelis lasiocarpa (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Facelis capillaris* Rusby, *Facelis schultzi* Beauverd, *Filago lasiocarpa* Griseb., *Lucilia erecta* Benoist

Hierba. Nativa. 1800-3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Facelis plumosa (Wedd.) Sch. Bip.

Sin.: *Facelis weddelliana* Beauverd, nom. superfl., *Lucilia plumosa* Wedd.

Hierba. Nativa. 2800-4500 m.

Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR).

Facelis retusa (Lam.) Sch. Bip.

Sin.: *Facelis apiculata* Cass., nom. illeg., *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *congesta* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *gigantea* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *laxa* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *nana* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. f. *planifolia* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *andicola* (Nees) Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *candelabrum* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *patula* Beauverd, *Gnaphalium retusum* Lam., *Helichrysum retusum* (Lam.) Spreng., *Leptalea apiculata* (Cass.)

D. Don ex Hook. & Arn., *Pteropogon andicola* Ness, *Pteropogon chilense* Fisch. & Meyer, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SLU, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SJO, TAC).

Famatinanthus Ariza & S.E. Freire

Famatinanthus decussatus (Hieron.)

Ariza & S.E. Freire

Sin.: *Aphyllocladus decussatus* Hieron.

Arbusto. Endémica. 1800-2500 m.

Países: ARG(LRI).

Flaveria Juss.

Flaveria bidentis (L.) Kuntze

Sin.: *Ethulia bidentis* L., *Eupatorium chilense* Molina, *Flaveria bidentis* (L.) B.L. Rob., comb. superfl., *Flaveria bonariensis* DC., *Flaveria capitata* Juss. ex Sm., *Flaveria chilensis* (Molina) J.F. Gmel., *Flaveria contrayerba* (Cav.) Pers., *Milleria chiloensis* Juss., nom. nud., *Milleria contrayerba* Cav., *Vermifuga corymbosa* Ruiz & Pav., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME). PRY(APY, CON, PHA). URY(MON).

Flaveria haumanii Dimitri & Orfila

Sin.: *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze var. *angustifolia* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU, SDE). CHL(TAR, ANT, ATA).

Fleischmannia Sch. Bip.

Fleischmannia dissolvens (Baker)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium dissolvens* Baker

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, ERI, SDE).

BRA(PAR). PRY(GUA, PHA).

Fleischmannia hassleri H. Rob.

Subarbusto. Endémica.

Países: PRY(CAU, CEN, COA).

Fleischmannia laxicephala (Cabrera)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium laxicephalum* Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Fleischmannia microstemon (Cass.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium microstemon* Cass.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Fleischmannia prasiifolia (Griseb.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium argentinum* Ariza,

Eupatorium prasiifolium Griseb., nom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 200-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Fleischmannia remotifolia (DC.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium remotifolium* DC.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Fleischmannia schickendantzii

(Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium schickendantzii* Hieron.

Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Flourensia DC.

Flourensia fiebrigii S.F. Blake

Sin.: *Flourensia blakeana* M.O. Dillon,

Flourensia hirta S.F. Blake

Arbusto. Nativa. 1200-4000 m.

Países: ARG(CAT, COS, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Flourensia hirtissima S.F. Blake

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(LPA, NEU, RNE).

Flourensia niederleinii S.F. Blake

Arbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(LRI).

Flourensia suffrutescens (R.E. Fr.)

S.F. Blake

Sin.: *Encelia suffrutescens* R.E. Fr.,

Flourensia polyclada S.F. Blake

Subarbusto. Endémica. 2500-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Flourensia thurifera (Molina) DC.

Sin.: *Diomedea thurifera* (Molina) Bertero ex Colla, *Flourensia besseriana* Hook. & Arn., *Flourensia campestris* Griseb., *Flourensia grindelioides* S. Moore, *Flourensia leptopoda* S.F. Blake, *Flourensia oolepis* S.F. Blake, *Flourensia riparia* Griseb., *Flourensia thurifera* (Molina) DC. var. *lanceolata* J. Remy, *Helianthus besserianus* (Meyen & Walp.) Benth. & Hook., *Helianthus campestris* (Griseb.) Kuntze, *Helianthus glutinosus* Hook. & Arn., *Helianthus riparia* (Griseb.) Kuntze, *Helianthus thurifera* Molina
Arbusto. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Flourensia tortuosa Griseb.

Sin.: *Flourensia macroligulata* Seeligm.
Arbusto. Endémica. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gaillardia Foug.

Gaillardia aristata Pursh

Sin.: *Gaillardia aristata* Pursh var. *foliacea* Lunell, *Gaillardia bracteosa* Standl., *Gaillardia hallii* Rydb., *Gaillardia perennis* Loisel., *Gaillardia richardsonii* Hort, *Gaillardia roezlii* Regel, *Gaillardia rustica* Cass., *Polatherus scaber* Raf., *Virgilia grandiflora* Nutt.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR).

Gaillardia cabreræ Covas

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(LPA).

Gaillardia megapotamica (Spreng.)

Baker var. **megapotamica**
Sin.: *Actinea heterophylla* Juss. var. *latifolia* Kuntze, *Cercostylos brasiliensis* (Less.) Less., *Gaillardia doniana* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* Griseb., *Guentheria megapotamica* Spreng., *Polypteris brasiliensis* Less.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SFE, SLU). BRA(RGS). URY(RNO, SOR).

Gaillardia megapotamica (Spreng.)

Baker var. **radiata** (Griseb.) Baker
Sin.: *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker f. *bicolor* Kuntze, *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker f. *biflora*

Kuntze, *Gaillardia scabiosoides* (Arn. ex DC.) Benth. & Hook. f. var. *radiata* Griseb.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(MON).

Gaillardia megapotamica (Spreng.)

Baker var. **scabiosoides** (Arn. ex DC.) Baker
Sin.: *Cercostylos scabiosoides* Arn. ex DC., *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker f. *flava* Kuntze, *Gaillardia megapotamica* (Spreng.) Baker f. *fuscrobura* Kuntze, *Gaillardia scabiosoides* (Arn. ex DC.) Benth. & Hook. f.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(RNO).

Gaillardia tontalensis Hieron.

Hierba. Endémica. 2400-3700 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Galinsoga Ruiz & Pav.

Galinsoga mandonii Sch. Bip.

Sin.: *Galinsoga calva* Rusby, *Galinsoga calva* Sch. Bip., nom. nud., *Galinsoga unxioides* Griseb.
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SFE, TUC).

Galinsoga parviflora Cav.

Sin.: *Adventina parviflora* Raf., *Galinsoga quinqueradiata* Ruiz & Pav., nom. superfl., *Wiborgia acmella* Roth, *Wiborgia parviflora* (Cav.) Kunth
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(CEN, GUA).

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

Sin.: *Adventina ciliata* Raf., *Galinsoga aristulata* Bricknell, *Galinsoga caracasana* (DC.) Sch. Bip., *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake, *Galinsoga parviflora* Cav. var. *hispida* DC., *Galinsoga urticaefolia* (Kunth) Benth., *Stemmatella urticifolia* (Kunth) O. Hoffm., *Vargasia caracasana* DC., *Wiborgia urticifolia* Kunth
Hierba. Nativa. 900-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(ÅR. RGS, SCA).

Gamochaeta Wedd.

Gamochaeta affinis Cabrera

Sin.: *Gamochaeta malvinensis* (H. Koyama) T.R. Dudley, comb. illeg., *Gnaphalium affine* d'Urv., hom. illeg., *Gnaphalium malvinense* H. Koyama
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Gamochaeta aliena (Hook. & Arn.)

Cabrera
Sin.: *Gnaphalium alienum* Hook. & Arn., *Gnaphalium stachydidifolium* Lam. var. *alienum* (Hook. & Arn.) Reiche
Hierba. Endémica. 200-2600 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Gamochaeta alpina (Poepp.) S.E.

Freire & Anderb.
Sin.: *Gamochaetopsis alpina* (Poepp. & Endl.) Anderb. & S.E. Freire, *Laennecia alpina* Poepp., *Lucilia alpina* (Poepp.) Cabrera
Hierba. Endémica. 700-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

Gamochaeta ambatensis Ariza

Hierba. Endémica. 2600-2700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).

Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.

Sin.: *Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd. var. *alpina* Wedd., *Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguelen, *Gamochaeta guatemalensis* (Gand.) Cabrera, *Gamochaeta irazuensis* G.L. Nesom, *Gamochaeta spicata* Cabrera, *Gnaphalium americanum* Mill., *Gnaphalium coarctatum* Willd., *Gnaphalium consanguineum* Gaudich., *Gnaphalium guatemalense* Gand., *Gnaphalium purpureum* L. var. *americanum* (Mill.) Klatt, *Gnaphalium purpureum* L. var. *spicatum* Baker, nom. illeg., *Gnaphalium purpureum* L. var. *spicatum* Klatt, *Gnaphalium spicatum* Lam., nom. illeg., *Gnaphalium spicatum* Mill. var. *chonoticum* Hook. f.
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, ITA, SPE). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SJO, TYT).

Gamochaeta andina (Phil.) Cabrera

Sin.: *Gnaphalium andinum* Phil.,
Gnaphalium petraeum Phil.
Hierba. Endémica. 2100-2700 m.
Países: CHL(MAU, BIO, RME).

Gamochaeta antarctica (Hook. f.)

Cabrera
Sin.: *Gnaphalium antarcticum* Hook. f.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Gamochaeta argentina Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
LPA, LRI, MEN, SLU, SFE). BRA(RGS).
URY(LAV, MAL, MON, SJO).

Gamochaeta axillaris (J. Remy)

Cabrera
Sin.: *Gnaphalium axillare* J. Remy,
Gnaphalium stachydifolium Lam. var.
axillare (J. Remy) Reiche
Hierba. Endémica. 1700-2000 m.
Países: CHL(LRI, RME).

Gamochaeta calviceps (Fernald)

Cabrera
Sin.: *Gnaphalium calviceps* Fernald
Hierba. Nativa. 0-2900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,
MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN,
COA, PAI). URY(MON).

Gamochaeta camaquaensis Deble

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Gamochaeta capitata Wedd.

Sin.: *Gamochaeta weddelliana* (Rusby)
Anderb., nom. superfl., *Gnaphalium*
capitatum (Wedd.) Griseb., hom. illeg.,
Gnaphalium weddellianum Rusby,
Stuckertiella capitata (Wedd.) Beauverd
Hierba. Nativa. 2000-3400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Gamochaeta chamissonis (DC.)

Cabrera
Sin.: *Gamochaeta fernandeziana* (Phil.)
Anderb., *Gamochaeta julietii* (Phil.) Anderb.,
Gamochaeta polybotrya (Phil.) Cabrera,
Gamochaeta serranoi (Phil.) Cabrera,
Gamochaeta suffruticosa (Phil.) Anderb.,
Gnaphalium chamissonis DC., *Gnaphalium*
fernandezianum Phil., *Gnaphalium julietii*
Phil., *Gnaphalium polybotryum* Phil.,
Gnaphalium purpureum L. var. *chamissonis*

(DC.) Klatt, *Gnaphalium purpureum* L. var.
julietii (Phil.) Reiche, *Gnaphalium serranoi*
Phil., *Gnaphalium suffruticosum* Phil.

Hierba. Endémica. 700-3900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(AYP, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

Gamochaeta depilata (Phil.) Cabrera

Sin.: *Gnaphalium depilatum* Phil.,
Gnaphalium obscurum Phil.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL,
MAU, BIO, ARA, LRI, AIS).

Gamochaeta deserticola Cabrera

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP,
TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, RME).

Gamochaeta diffusa Deble &

Marchiori
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Gamochaeta erecta Deble

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Gamochaeta erythraetis (Wedd.)

Cabrera
Sin.: *Belloa erythraetis* (Wedd.)
Cabrera, *Gnaphalium erythraetis* (Wedd.)
Griseb., *Merope erythraetis* Wedd.
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera

Sin.: *Gamochaeta stagnalis* (I.M.
Johnst.) Anderb., *Gnaphalium falcatum*
Lam., *Gnaphalium heteroides* Klatt,
Gnaphalium purpureum L. var. *falcatum*
(Lam.) Torr. & Gray, *Gnaphalium*
stachydifolium Lam. var. *falcatum* (Lam.)
Klatt, *Gnaphalium stagnale* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
ERI, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE).
BRA(RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA).
PRY(CAN, PAI). URY(CAS, COL, MON,
ROC, SJO, SOR).

Gamochaeta filaginea (DC.) Cabrera

Sin.: *Gamochaeta berteroaana* (DC.)
Cabrera, *Gnaphalium bellidifolium*
Phil., *Gnaphalium berteroaanum* DC.,
Gnaphalium filagineum DC., *Gnaphalium*
stachydifolium Lam. var. *berteroaanum*
(DC.) Klatt

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN,
MIS, RNE, SJU, SLU, SFE, SDE).
BRA(PAR, RGS). CHL(COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).
URY(FLO, FLA, MON, RNO, SJO, SJO).

Gamochaeta girardiana Deble & A.S.

Oliveira
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Gamochaeta hiemalis Cabrera

Sin.: *Gamochaeta brasiliensis* Deble,
nom. superfl., *Gamochaeta hiemale*
(Rizzini) Cabrera, comb. illeg.,
Gnaphalium hiemale Rizzini, nom. illeg.
Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gamochaeta humilis Wedd.

Hierba. Nativa. 3500-4600 m.
Países: CHL(AYP, ANT).

Gamochaeta longipedicellata

Cabrera
Hierba. Endémica. 3500-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ). CHL(TAR).

Gamochaeta neuquensis Cabrera

Hierba. Endémica. 700-1200 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA,
LLA, MAG, RME).

Gamochaeta nigrevestis Deble &

Marchiori
Hierba. Nativa. 1000-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Gamochaeta nivalis Cabrera

Sin.: *Gamochaeta spiciformis* (Sch. Bip.)
Cabrera var. *subaffinis* Cabrera, *Gnaphalium*
affine d'Urv. f. *pusillum* Speg., *Gnaphalium*
nivale Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 800-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA,
LLA, AIS, MAG).

Gamochaeta oligantha (Phil.) L.E. Navas

Sin.: *Gamochaeta monticola* (Phil. ex
Reiche) Cabrera, *Gnaphalium monticola* Phil.
ex Reiche, *Gnaphalium oliganthum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL,
MAG, RME).

Gamochaeta pensylvanica (Willd.)

Cabrera

Sin.: *Gamochaeta platensis* (Cabrera) Cabrera, *Gnaphalium pensylvanicum* Willd., *Gnaphalium peregrinum* Fernald, *Gnaphalium platense* Cabrera, *Gnaphalium purpureum* L. subsp. *pensylvanica* (Willd.) O.Bolòs & Vigo, *Gnaphalium purpureum* L. var. *spathulatum* Baker, *Gnaphalium spathulatum* Lam., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-3400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, LAV, MON, PAY, SAO, SJO, SJO).

Gamochaeta peregrina (Beauverd)

S.E. Freire & Anderb.

Sin.: *Stuckertiella peregrina* Beauverd, *Stuckertiella peregrina* Beauverd var. *fusca* Beauverd, *Stuckertiella peregrina* Beauverd var. *albida* Beauverd

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SLU, TUC).

Gamochaeta procumbens (Phil.) CabreraSin.: *Gnaphalium procumbens* Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2200 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, LRI, RME).

Gamochaeta purpurea (L.) CabreraSin.: *Gnaphalium purpureum* L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CHL(IPA). PRY(CAU, PHA). URY(MON).

Gamochaeta ramosa S.E. Freire,

Bayón & Baeza

Sin.: *Gnaphalium ramosum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Gamochaeta rizzinii Cabrera

Hierba. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Gamochaeta serpyllifolia Wedd.

Sin.: *Gamochaeta munozii* Cabrera, nom. superfl., *Gnaphalium serpyllifolium* J. Remy, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 700-3200 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, AIS, RME).

Gamochaeta simplicicaulis (Willd. ex Spreng.) Cabrera

Sin.: *Gamochaeta spicata* Cabrera, *Gnaphalium purpureum* L. var. *simplicicaule* (Willd. ex Spreng.) Klatt, *Gnaphalium simplicicaule* Willd. ex Spreng.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(APA, AMA). URY(CAS, CLA, LAV, MON, RNO, ROC, SJO, TAC, TYT).

Gamochaeta sphacelata (Kunth) Cabrera

Sin.: *Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd. var. *linearifolia* Wedd.,

Gnaphalium pedunculatum I.M.

Johnst., *Gnaphalium purpureum* L. var. *sphacelatum* (Kunth) Speg., *Gnaphalium sphacelatum* Kunth, *Gnaphalium sphacelatum* Kunth var. *legitimum* DC., nom. inval., *Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *sphacelatum* (Kunth) Reiche

Hierba. Nativa. 2200 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(RGS).

URY(Desconocida).

Gamochaeta spiciformis (Sch. Bip.)

Cabrera

Sin.: *Gamochaeta chilensis* Deble, *Gamochaeta foliosa* (Phil.) Anderb., comb. illeg., *Gamochaeta peteroana* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium affine* d'Urv. var. *medium* Speg., *Gnaphalium foliosum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium mucronatum* Phil., nom. illeg., *Gnaphalium peteroanum* Phil., *Gnaphalium purpureum* L. var. *mucronatum* (Phil.) Skottsb., *Gnaphalium spiciforme* Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 200-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Gamochaeta stachydifolia (Lam.) Cabrera

Sin.: *Gnaphalium agreste* Phil., *Gnaphalium purpureum* L. var. *stachydifolium* (Lam.) Baker, *Gnaphalium stachydifolium* Lam.

Hierba. Nativa. 400-1800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, BIO, LRI, RME, JFE). URY(CAS, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

Gamochaeta subfalcata (Cabrera) CabreraSin.: *Gnaphalium subfalcatum* Cabrera

Hierba. Nativa. 0-4100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME). PRY(COA). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).

Gamochaeta valparadisea (Phil.) Anderb.Sin.: *Gnaphalium valparadiseum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

Gamochaeta villaroelii (Phil.) CabreraSin.: *Gnaphalium villaroelii* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).

Gazania Gaertn.**Gazania rigens** (L.) Gaertn.Sin.: *Gorteria rigens* (L.) L., *Othonna rigens* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA).

Gnaphalium L.**Gnaphalium aldunateoides** J. Remy

Sin.: *Gnaphalium diminutivum* Phil., *Gnaphalium insulare* Klatt, *Gnaphalium insulare* Phil., *Gnaphalium phaeolepis* Phil., *Gnaphalium rivulare* Kuntze

Pseudognaphalium aldunateoides (J. Rémy) C. Monti, Bayón & S.E. Freire

Hierba. Endémica. 500-3700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

Gnaphalium perpusillum Phil.

Sin.: *Pseudognaphalium perpusillum* (Phil.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Gnaphalium polycaulon Pers.Sin.: *Gnaphalium multicaule* Willd.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(PHA).

Gochnatia Kunth**Gochnatia cardenasii** S.F. Blake

Arbusto. Nativa. 3300-3500 m.

Países: ARG(JUJ).

- Gochnatia curviflora** (Griseb.) O. Hoffm.
Sin.: *Moquinia curviflora* Griseb.
Arbusto. Nativa. 1400-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **fascicularis** (D. Don) Cabrera
Sin.: *Gochnatia fascicularis* (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn., *Gochnatia multiflora* F. Phil., *Pentaphorus fascicularis* D. Don
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Sin.: *Gochnatia australis* Phil., *Gochnatia berteriana* Phil., *Gochnatia cuspidata* Phil., *Gochnatia integerrima* Phil., *Gochnatia laxiflora* Phil., *Gochnatia litoralis* Phil., *Gochnatia pyriformis* (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn., *Gochnatia racemosa* Phil., *Gochnatia rigida* D. Don ex Hook. & Arn., *Pentaphorus foliolosus* D. Don, *Pentaphorus pyriformis* D. Don
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
- Gochnatia glutinosa** (D. Don) Hook. & Arn.
Sin.: *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. var. *media* Kuntze, *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. var. *puberula* Kuntze, *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. var. *viscosissima* Kuntze, *Gochnatia viscosissima* (Kuntze) S.F. Blake, *Pentaphorus glutinosus* D. Don
Arbusto. Endémica. 500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, TUC).
- Gochnatia palosanto** Cabrera
Arbusto. Nativa. 600-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
PRY(APY).
- Graphistylis** B. Nord.
- Graphistylis argyrotricha** (Dusén) B. Nord.
Sin.: *Senecio argyrotrichus* Dusén
Arbusto a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Graphistylis dichroa** (Bong.) D.J.N. Hind
Sin.: *Cacalia dichroa* Bong.
- Arbusto a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).
- Graphistylis oreophila** (Dusén) B. Nord.
Sin.: *Senecio oreophilus* Dusén.
Arbusto a subarbusto. Nativa. 1700 m.
Países: BRA(SCA).
- Graphistylis organensis** (Casar.) B. Nord.
Sin.: *Senecio organensis* Casar.
Arbusto a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).
- Graphistylis serrana** (Zardini) B. Nord.
Sin.: *Senecio serranus* Zardini
Arbusto a subarbusto. Nativa. 0-700 m
Países: BRA(PAR).
- Grazielia** R.M. King & H. Rob.
- Grazielia brevipetiolata** R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium brevipetiolatum* (Sch. Bip.) Baker ex Hieron., hom. illeg., *Eupatorium hieronymi* S.E. Freire, *Eupatorium vernoniopsis* Sch. Bip. ex Baker var. *brevipetiolata* Sch. Bip., nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(FLA, LAV, MAL, ROC, SJO).
- Grazielia dimorpholepis** (Baker) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium dimorpholepis* Baker.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Grazielia gaudichaudiana** (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *bipinnatum* Dusén ex Malme, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *gaudichaudianum*, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *leucodon* Baker, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. f. *lobatum* Dusén ex Malme, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *macrodon* Dusén ex Malme, *Eupatorium gaudichaudianum* DC. var. *oppositifolium* Dusén ex Malme
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Grazielia intermedia** (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium intermedium* DC.
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(RIV, TAC).
- Grazielia multifida** (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Dimorpholepis multifida* (DC.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium multifidum* DC.
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Grazielia nummularia** (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium nummularia* Hook. & Arn.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Grazielia schultzei** R.M. King & H. Rob.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Grazielia serrata** (Spreng.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Dimorpholepis serrata* (Spreng.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium alpestre* Gardner, *Eupatorium comptoniifolium* DC., *Eupatorium confertum* Gardner, *Eupatorium intermedium* DC. var. *agustifolium* Hieron., *Eupatorium serratum* Spreng. var. *alpestris* (Gardner) Baker, *Eupatorium serratum* Spreng. var. *confertum* (Gardner) Baker, *Eupatorium serratum* Spreng.
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA).
URY(CAS, CLA, MAL, RIV, TAC, TYT).
- Grindelia** Willd.
- Grindelia aegialitis** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAD).
- Grindelia andina** (Phil.) Phil.
Sin.: *Chrysophthalmum andinum* Phil., *Helianthus australis* Phil.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(MAU).
- Grindelia anethifolia** (Phil.) A. Bartoli & Tortosa var. **anethifolia**
Sin.: *Aster anethifolius* (Phil.) Kuntze, *Aster pectinatus* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus pinnatifidus* Hook. & Arn., hom. illeg., *Haplopappus anethifolius* Phil., *Haplopappus araucanus* Phil., *Haplopappus moyanoi* Speg., *Haplopappus pectinatus* Phil. var. *anethifolius* (Phil.) Reiche, *Haplopappus pectinatus* Phil.
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA).

Grindelia anethifolia (Phil.) A. Bartoli & Tortosa var. **eligulata** A. Bartoli & Tortosa
Subarbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(NEU).

Grindelia atlantica Deble & A.S. Oliveira
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).

Grindelia boliviana Rusby
Arbusto o subarbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Grindelia brachystephana Griseb.
Sin.: *Grindelia bergii* (Hieron.) Cabrera, *Grindelia brachystephana* Griseb. var. *bergii* Hieron., *Grindelia tehuelches* (Speg.) Cabrera, *Haplopappus patagonicus* Speg., nom. illeg., *Haplopappus tehuelches* Speg., nom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, RNE, SCR, SDE, SFE, SLU).

Grindelia buphthalmoides DC.
Sin.: *Grindelia argentina* Deble & A.S. Oliveira, *Grindelia rupestris* A. Bartoli, Tortosa & Marchesi
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(TYT).

Grindelia cabreræ Ariza var. **alatocarpa** Ariza
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR).

Grindelia cabreræ Ariza var. **cabreræ**
Sin.: *Grindelia pulchella* Dunal var. *serratifolia* Kuntze, *Grindelia pulchella* Dunal var. *sublinearis* Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE, TUC).

Grindelia chacoensis A. Bartoli & Tortosa
Sin.: *Grindelia puberula* Hook. & Arn. var. *microcephala* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, SFE).

Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera
Sin.: *Grindelia foliosa* D. Don ex Hook. & Arn., *Grindelia resinosa* Hook. & Arn.,

Grindelia speciosa Hook. & Arn. var. *integrifolia* Speg., *Grindelia speciosa* Hook. & Arn., *Grindelia speciosa* Lindl. & Paxton, *Grindelia volkensii* Kuntze var. *angustifolia* Kuntze, *Grindelia volkensii* Kuntze var. *latifolia* Kuntze, *Grindelia volkensii* Kuntze, *Haplopappus hoorebekia* DC., nom. illeg., *Hoorebekia chiloense* Cornel.
Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Grindelia coronensis A. Bartoli & Tortosa
Arbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE).

Grindelia covasii A. Bartoli & Tortosa
Sin.: *Grindelia chiloensis* (Cornel.) Cabrera var. *pampeana* Covas
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(LPA).

Grindelia gaucha Deble & A.S. Oliveira
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Grindelia globularifolia Griseb.
Subarbusto. Endémica. 2000-2200 m.
Países: ARG(COR).

Grindelia glutinosa (Cav.) Mart.
Sin.: *Aster glutinosus* Cav., *Grindelia glutinosa* (Cav.) Dunal, nom. illeg., *Grindelia montana* Phil., *Grindelia peruviana* Sch. Bip.
Subarbusto. Nativa. 500-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Grindelia linearifolia A. Bartoli, Tortosa & Marchesi
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(PAY, SOR).

Grindelia mendocina A. Bartoli & Tortosa var. **mendocina**
Arbusto. Endémica. 2400-2900 m.
Países: ARG(MEN).

Grindelia mendocina A. Bartoli & Tortosa var. **radiata** A. Bartoli & Tortosa
Arbusto. Endémica. 2700-2900 m.
Países: ARG(MEN).

Grindelia orientalis A. Bartoli, Tortosa & G.H. Rua
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(MAL, ROC).

Grindelia patagonica A. Bartoli & Tortosa
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE).

Grindelia prostrata A. Bartoli & Tortosa
Subarbusto. Endémica. 1000-3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SLU).

Grindelia prunelloides (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **discoidea** Tortosa & A. Bartoli
Sin.: *Aster chryseus* Kuntze, *Haplopappus chryseus* (Kuntze) Cabrera, *Haplopappus chrysocephalus* Reiche, *Pyrrocoma aurea* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2300-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU).

Grindelia prunelloides (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**
Sin.: *Aster prunelloides* (Poepp. ex Less.) Kuntze, *Diplopappus prunelloides* Poepp. ex Less., *Haplopappus ameghinoi* Speg., *Haplopappus illinii* Speg., *Haplopappus mustersii* Speg., *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC. var. *lanatus* Cabrera, *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC. var. *mustersii* (Speg.) Cabrera, *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC. var. *sphaerocephalus* Reiche, *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC.
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Grindelia puberula Hook. & Arn.
Sin.: *Grindelia puberula* Hook. & Arn. f. *angustifolia* Malme
Arbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY).

Grindelia pulchella Dunal var. **discoidea** (Hook. & Arn.) A. Bartoli & Tortosa
Sin.: *Grindelia discoidea* Hook. & Arn., *Grindelia anomala* DC.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, LRI, MEN, SDE, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MON, PAY, RNO).

Grindelia pulchella Dunal var. **pulchella**

Sin.: *Grindelia diffusa* Gillies ex Hook. & Arn., *Grindelia pulchella* Dunal var. *normalis* Kuntze

Subarbusto. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(LAV, RNO, SAO, TAC).

Grindelia pygmaea Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(RNE).

Grindelia ragonesei Cabrera

Sin.: *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn. var. *spathulata* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(CHA, COS, SFE).

Grindelia scorzonerifolia Hook. & Arn.

Sin.: *Grindelia pectinata* Baker, *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn. var. *pectinata* (Baker) Hassl., *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn. var. *subintegra* Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(PHA). URY(DUR, TAC).

Grindelia tarapacana Phil.

Sin.: *Grindelia obovata* Rusby
Arbusto. Nativa. 2900-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Grindelia ventanensis A. Bartoli & Tortosa

Subarbusto. Endémica. 500-600 m.
Países: ARG(BAI).

Gutierrezia Lag.**Gutierrezia ameghinoi** Speg.

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Gutierrezia baccharoides Sch. Bip.

Sin.: *Gutierrezia baccharoides* Sch. Bip. var. *hoffmannii* (Kuntze) Hauman, *Gutierrezia hoffmannii* Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Gutierrezia chubutensis Ratto & A. Bartoli

Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(CHU).

Gutierrezia espinosae Acevedo

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Gutierrezia gayana (J. Remy) Reiche

Sin.: *Brachyris gayana* (J. Remy) J. Remy, *Odontocarpa gayana* J. Remy
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Gutierrezia gilliesii Griseb.

Sin.: *Gutierrezia mandonii* (Sch. Bip.) Solbrig subsp. *gilliesii* (Griseb.) Solbrig, *Gutierrezia spathulata* (Phil.) Kurtz var. *gilliesii* (Griseb.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).

Gutierrezia isernii (Phil.) Phil. var. **isernii**

Sin.: *Brachyris isernii* Phil., *Gutierrezia mandonii* (Sch. Bip.) Solbrig subsp. *isernii* (Phil.) Solbrig
Arbusto. Endémica. 900-2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).

Gutierrezia isernii (Phil.) Phil. var. **nivea** Ratto & A. Bartoli

Arbusto. Endémica. 900-2700 m.
Países: ARG(COR, MEN, SLU).

Gutierrezia leucantha Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Gutierrezia mandonii (Sch. Bip.)

Solbrig var. **anomala** Ratto & A. Bartoli
Arbusto. Endémica. 2700-3100 m.
Países: ARG(SAL).

Gutierrezia mandonii (Sch. Bip.)

Solbrig var. **mandonii**
Sin.: *Brachyris mandonii* Sch. Bip., *Gutierrezia gilliesii* Griseb. var. *scabriuscula* Griseb.
Arbusto. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Gutierrezia mendocina Ratto & A. Bartoli

Subarbusto. Endémica. 2000-2100 m.
Países: ARG(MEN).

Gutierrezia neaeana (DC.) Sch. Bip. ex S.F. Blake

Sin.: *Brachyris neaeana* DC.
Arbusto. Endémica. 2500-4000 m.
Países: CHL(ATA).

Gutierrezia repens Griseb.

Sin.: *Gutierrezia ruizlealii* Solbrig
Arbusto. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gutierrezia resinosa (Hook. & Arn.) S.F. Blake

Sin.: *Brachyris floribunda* Phil., *Brachyris paniculata* DC., *Galinsoga resinosa* Hook. & Arn., *Gutierrezia compacta* Phil., *Gutierrezia laricifolia* D. Don, *Odontocarpa poeppigii* DC.
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Gutierrezia solbrigii Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).

Gutierrezia spathulata (Phil.) Kurtz

Sin.: *Brachyris spathulata* Phil., *Gutierrezia brachyris* Macloskie var. *patagonica* (Speg.) Macloskie, *Gutierrezia paniculata* (DC.) Phil. var. *patagonica* Speg., *Gutierrezia pulviniformis* Cabrera, *Gutierrezia spathulata* (Phil.) Kurtz var. *ochroleuca* Kurtz
Arbusto. Endémica. 1300-2400 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR).

Gutierrezia taltalensis Phil.

Sin.: *Gutierrezia copiapina* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Gutierrezia tortosae Ratto & A. Bartoli

Subarbusto. Endémica. 2000-4400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Guynesomia Bonifacino & Sancho**Guynesomia scoparia** (Phil.)

Bonifacino & Sancho
Sin.: *Hinterhubera scoparia* (Phil.) Cabrera, *Nardophyllum scoparium* Phil.
Arbusto. Endémica. 1400-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Gymnanthemum Cass.**Gymnanthemum amygdalinum** (Delile) Sch. Bip. ex Walp.

Sin.: *Vernonia amygdalina* Delile
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Gymnocoronis DC.

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. var. **subcordata** (DC.) Baker

Sin.: *Gymnocoronis subcordata* DC., *Piqueria subcordata* (DC.) Gardner

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(COL, SOR).

Gymnocoronis spilanthoides

(D. Don ex Hook. & Arn.) DC. var.

spilanthoides

Sin.: *Alomia spilanthoides* D. Don ex Hook. & Arn., *Gymnocoronis attenuata* DC., *Gymnocoronis spilanthoides* (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. var. *attenuata* (DC.) Baker, *Piqueria attenuata* (DC.) Gardner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAA, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, DUR, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

Gynura Cass., nom. cons.

Gynura aurantiaca (Blume) DC.

Sin.: *Cacalia aurantiaca* Blume
Hierba. Introducida. 300-2400 m.
Países: ARG(SAL).

Gypothamnium Phil.

Gypothamnium pinifolium Phil.

Sin.: *Plazia pinnifolia* (Phil.) O. Hoffm.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Gyptidium R.M. King & H. Rob.

Gyptidium militare (B.L. Rob.) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium militare* B.L. Rob.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR).

Gyptidium trichobasis (Baker) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium candolleianum* Hook. & Arn. var. *curitybanum* Dusén ex Malme, *Eupatorium trichobasis* Baker
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gyptis (Cass.) Cass.

Gyptis artemisifolia (Griseb.) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium artemisiifolium* Griseb.

Subarbusto. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI).

Gyptis commersonii Cass.

Sin.: *Eupatorium bacleanum* DC., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron. var. *dentata* Speg., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron. var. *pinnata* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SJO, TAC).

Gyptis crassipes (Hieron.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *oppositifolium* Baker, *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker, nom. illeg., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. var. *burchellii* Baker, *Eupatorium crassipes* Hieron., *Eupatorium hunzingeri* Hieron., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *crassipes* (Hieron.) B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *lasiolepis* (B.L. Rob.) B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *longicuneatum* B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *oppositifolium* (Baker) B.L. Rob., *Eupatorium lasiolepis* B.L. Rob., *Gyptis alternifolia* R.M. King & H. Rob.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

Gyptis lanigera (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker f. *paraguayensis* Chodat, *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *asperum* Hassl., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *aureoviride* (Chodat) Hassl., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *deltoideum* Chodat, *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *hispidulum* Hassl., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *vernoniopsis* Hassl., *Eupatorium aureoviride* Chodat,

Eupatorium lanigerum Hook. & Arn. var. *aureoviride* (Chodat) B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *deltoideum* (Chodat) B.L. Rob., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *lanigerum*, *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., p.p., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *minus* Hook. & Arn., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *typicum* B.L. Rob., *Eupatorium oblongifolium* (Spreng.) Baker var. *hirsutum* Chodat, *Eupatorium vernoniopsis* Sch. Bip. ex Baker, *Gyptis vernoniopsis* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, COL, MON, PAY, RIV, TAC).

Gyptis tanacetifolia (Gillies ex Hook. & Arn.) D.J.N. Hind & Flann

Sin.: *Eupatorium ceratophyllum* Hook. & Arn., *Eupatorium erodiifolium* DC., *Eupatorium erodiifolium* DC. var. *obtusiloba* Hieron., *Eupatorium tanacetifolium* Gillies ex Hook. & Arn., *Gyptis pinnatifida* Cass. ex R.M. King & H. Rob., nom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SJO, TYT).

Haplopappus Cass.

Haplopappus angustifolius (DC.) Reiche

Sin.: *Aster atenes* Kuntze, *Aster stewardensis* Kuntze, *Haplopappus durus* Reiche, *Pyrrocoma angustifolia* DC., *Pyrrocoma rigida* Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(ATA, COQ).

Haplopappus anthylloides Meyen & Walp.

Sin.: *Aster anthylloides* (Meyen & Walp.) Kuntze, *Aster radicans* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus arbutoides* J. Remy var. *glandulosa* Hicken, *Haplopappus bellidifolius* Phil. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche, *Haplopappus brachylepis* Phil., *Haplopappus radicans* J. Remy
Arbusto. Endémica. 1900-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus baylahuen J. Remy
Sin.: *Aster baylahuen* (J. Remy)
Kuntze, *Aster lastarrianus* (J. Remy)
Kuntze, *Haplopappus domeykoi*
Phil., *Haplopappus fluehmannii* Phil.,
Haplopappus lastarrianus J. Remy,
Haplopappus medicinalis Phil.
Arbusto. Endémica. 2700-3500 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

Haplopappus bezanillanus (J. Remy) Reiche
Sin.: *Aster bezanillanus* Kuntze,
Pyrrcoma bezanillana J. Remy
Subarbusto. Endémica. 300-2800 m.
Países: CHL(COQ).

Haplopappus boelckei Tortosa & A. Bartoli
Hierba. Endémica. 2500-2700 m.
Países: ARG(MEN).

Haplopappus canescens (Phil.) Reiche
Sin.: *Aster griseus* Kuntze, *Chroilema subcanescens* Bernh., *Grindelia canescens* Bertero, *Haplodiscus exserens* Phil., *Haplopappus argenteus* Steud., *Haplopappus canescens* (Phil.) Reiche var. *exserens* Reiche, *Haplopappus polycladus* Phil., *Pyrrcoma canescens* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Haplopappus cerberoanus (J. Remy) Reiche subsp. **cerberoanus**
Sin.: *Aster cerberoanus* (J. Remy)
Kuntze, *Aster denticulatus* (Phil.)
Kuntze, *Haplopappus denticulatus* (Phil.)
Reiche, *Pyrrcoma cerberoana* J. Remy,
Pyrrcoma denticulata Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Haplopappus cerberoanus (J. Remy) Reiche subsp. **elquianus** Klingeb.
Arbusto. Endémica. 800-2000 m.
Países: CHL(COQ).

Haplopappus chrysanthemifolius (Less.) DC.
Sin.: *Andromachia alternifolia* Kuntze,
Aster berteroi Kuntze, *Diplopappus chrysanthemifolius* Less., *Diplopappus coquimbensis* Hook. & Arn., *Diplopappus inuloies* Hook. & Arn., *Grindelia glutinosa* Bertero, *Haplopappus acanthodon* Phil., *Haplopappus berteri* DC. var. *lanceolatus* DC., *Haplopappus berteri* DC., *Haplopappus formosus* Phil., *Haplopappus hirsutus* Phil., *Haplopappus hirtellus* Phil. var. *hirsutus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus*

leucanthemifolius Phil.
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Haplopappus decurrens J. Remy
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Haplopappus deserticolus Phil.
Sin.: *Haplopappus involucratus* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Haplopappus diplopappus J. Remy subsp. **diplopappus**
Subarbusto. Endémica. 800-3600 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Haplopappus diplopappus J. Remy subsp. **villosus** (Phil.) L. Klingenberg
Sin.: *Aster diplopappus* (J. Remy)
Kuntze, *Aster venosus* Kuntze,
Aster villiger Kuntze, *Diplopappus spinulosus* Hook. & Arn., *Haplopappus diplopappus* J. Remy var. *struthionum* (Speg.) Cabrera, *Haplopappus pallidus* Phil., *Haplopappus ptereoanus* Phil., *Haplopappus ptereoanus* Phil., *Haplopappus reticulatus* Phil., *Haplopappus struthionum* Speg., *Haplopappus villosus* Phil., *Pyrrcoma reticulata* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR).
CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus donianus (Hook. & Arn.) Reiche
Sin.: *Diplopappus donianus* Hook. & Arn., *Haplodiscus tenuifolius* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

Haplopappus elatus (Phil.) Reiche
Sin.: *Haplodiscus elatus* Phil.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Haplopappus foliosus DC.
Sin.: *Aster foliosus* (DC.) Kuntze, *Aster polyphyllus* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus foliosus* Hook. & Arn., *Haplopappus polyphyllus* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus glutinosus Cass.
Sin.: *Aster glutinosus* (Less.) Kuntze,
Aster oligodontus Kuntze, *Aster*

senebierifolius Kuntze, nom. illeg., *Diplopappus coronopifolius* Less., nom. illeg., *Diplopappus glutinosus* Less., *Haplopappus arbutoides* J. Remy var. *glabratus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus arbutoides* J. Remy, *Haplopappus australis* Phil., *Haplopappus bustillosianus* J. Remy, *Haplopappus coronopifolius* (Less.) DC. var. *laxus* Phil., *Haplopappus coronopifolius* (Less.) DC., nom. superfl., *Haplopappus glabratus* Phil., *Haplopappus glutinosus* (Less.) DC., hom. illeg., *Haplopappus glutinosus* Cass. f. *patagonicus* (Phil.) Cabrera, *Haplopappus glutinosus* Cass. f. *spathulatus* Cabrera, *Haplopappus obovatus* Phil., *Haplopappus patagonicus* Phil., *Haplopappus paucidentatus* Phil.
Arbusto. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Haplopappus graveolens (Phil.) Reiche
Sin.: *Haplodiscus graveolens* Phil.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(RME).

Haplopappus grindelioides (Less.) DC.
Sin.: *Aster grindelioides* (Less.)
Kuntze, *Aster marginalis* (Phil.) Kuntze,
Aster reversus Kuntze, *Diplopappus grindelioides* Less., *Haplopappus corniculatus* Phil., *Haplopappus heterocomus* Phil., *Haplopappus heterophysus* Phil., *Haplopappus marginalis* Phil. var. *heterophysus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus marginalis* Phil., *Haplopappus reflexus* Phil., *Haplopappus tilitensis* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémica. 600-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

Haplopappus hirtellus Phil.
Sin.: *Aster hirtellus* (Phil.) Kuntze,
Haplopappus hirtellus Phil. var. *limarensis*
Reiche, *Haplopappus limarensis* Phil.,
Haplopappus vidali Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Haplopappus humilis (Phil.) Reiche
Sin.: *Haplodiscus humilis* Phil.
Arbusto. Endémica. 100-1100 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Haplopappus integerrimus (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **integerrimus**

Sin.: *Diplopappus integerrimus* Hook. & Arn., *Grindelia acerosa* Bertero ex Phil., nom. nud., *Haplopappus acerosus* (Bertero) Phil., *Haplopappus pulchellus* DC. var. *elongatus* J. Remy, *Steriphe acerosa* (Bertero ex Phil.) Phil.
Arbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).

Haplopappus integerrimus (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **punctatus** (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark

Sin.: *Aster adalbertii* Kuntze, *Conyza punctata* Willd., *Diplopappus chamissonis* Less., *Diplopappus punctatus* Less. ex DC., *Haplopappus chamissonis* (Less.) DC., *Haplopappus punctatus* (Willd.) H.M. Hall
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(MAU, BIO).

Haplopappus ischnos (Phil.) Reiche

Sin.: *Haplodiscus ischnos* Phil., *Haplodiscus landbecki* Phil.
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(COQ).

Haplopappus kingii (Phil.) Reiche

Sin.: *Haplodiscus kingii* Phil.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Haplopappus latifolius (Phil.) Reiche

Sin.: *Haplodiscus latifolius* Phil., *Haplodiscus vernicosus* Phil. var. *geissei* Phil.
Arbusto. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(COQ).

Haplopappus linifolius (Phil.) Reiche

Sin.: *Aster linoideus* (Phil.) Kuntze, *Pyrrocoma linifolia* Phil.
Arbusto. Endémica. 1800-2200 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Haplopappus macraeanus (J. Remy) Reiche

Sin.: *Aster macraeanus* (J. Remy) Kuntze, *Pyrrocoma macraeana* J. Remy
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL).

Haplopappus macrocephalus (Poepp. ex Less.) DC.

Sin.: *Aster macrocephalus* (Poepp. ex Less.) Kuntze, *Diplopappus macrocephalus* Poepp. ex Less., *Haplopappus caespitosus* Nutt.
Subarbusto. Endémica. 100-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Haplopappus maulinus Klingenb.

Arbusto. Endémica. 400-2300 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Haplopappus mendocinus Tortosa & A. Bartoli

Arbusto. Endémica. 1100-1600 m.
Países: ARG(LPA, MEN).

Haplopappus meyenii Walp.

Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Haplopappus mieresii P. Medina & Nic. García

Subarbusto. Endémica. 1200-1300 m.
Países: CHL(COQ).

Haplopappus mucronatus (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.

Sin.: *Aster ilicifolius* (J. Remy) Kuntze, *Baccharis hookeriana* DC., *Baccharis mucronata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Diplopappus mucronatus* Hook. & Arn., *Haplopappus fonckii* Phil., *Haplopappus hookerianus* DC., *Haplopappus ilicifolius* J. Remy
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Haplopappus multifolius Phil. ex Reiche

Sin.: *Aster multifolius* (Phil. ex Reiche) Kuntze, *Pyrrocoma foliosa* Phil.
Arbusto. Endémica. 700-3200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Haplopappus nahuelbutae Klingenb.

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Haplopappus ochagavianus Phil.

Arbusto. Endémica. 100-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Haplopappus parvifolius (DC.) Gay

Sin.: *Aster parvifolius* (DC.) Kuntze, *Pyrrocoma parvifolia* DC.
Subarbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Haplopappus pedunculatus J. Remy

Sin.: *Aster pedunculatus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus corymbosus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus rosmarinifolius* Reiche, *Steriphe corymbosa* Phil.
Arbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Haplopappus philippii (Kuntze)

H.M. Hall
Sin.: *Aster philippii* Kuntze, *Haplopappus paniculatus* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Haplopappus phyllophorus Reiche

Sin.: *Haplodiscus densifolius* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Haplopappus pinea (Phil.) Reiche

Sin.: *Aster pineus* (Phil.) Kuntze, *Pyrrocoma pinea* Phil.
Arbusto. Endémica. 2000-2400 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Haplopappus pinnatifidus Nutt.

Sin.: *Aster andinus* Kuntze, *Aster setiger* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus setiger* Hook. & Arn., *Haplopappus setigerus* (Phil.) Meigen, *Pyrrocoma nuttalli* J. Remy, nom. superfl., *Pyrrocoma setigera* Phil.
Arbusto. Endémica. 500-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus platylepis Phil.

Sin.: *Haplopappus litoralis* Phil., *Haplopappus ilicifolius* J. Remy var. *platylepis* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémica. 200-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Haplopappus poeppigianus (Hook. & Arn.) A. Gray

Sin.: *Haplodiscus polycladus* Phil.
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Haplopappus pristiphyllus (J. Remy)

H.M. Hall
Sin.: *Aster pristiphyllus* (J. Remy) Kuntze, *Pyrrocoma pristiphylloides* J. Remy
Arbusto. Endémica.
Países: CHL (Desconocida).

Haplopappus pulchellus DC.

Sin.: *Aster valparaisanus* Kuntze, *Grindelia pulchella* Bertero
Arbusto. Endémica. 300-1600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus racemiger Klingenb.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Haplopappus reicheanus H.M. Hall
Sin.: *Haplopappus vernicosus* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémica. 700-2200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Haplopappus remyanus Wedd.
Sin.: *Aster remyanus* (Wedd.) Kuntze,
Haplodiscus vernicosus Phil., *Haplopappus*
prinophyllus Phil., *Pyrrocoma ilicifolia* J.
Remy
Arbusto. Endémica. 300-2400 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Haplopappus rengifoanus J. Remy
Sin.: *Aster rengifoanus* (J. Remy)
Kuntze, *Haplodiscus pachyphyllus* Phil.
Arbusto. Endémica. 100-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, LBO).

Haplopappus rigidus Phil.
Sin.: *Aster atacamensis* Kuntze, nom.
illeg., *Haplopappus doellianus* Phil.,
Haplopappus villanuevae Phil.
Arbusto. Endémica. 3400-4000 m.
Países: ARG(CAT, SAL). CHL(ANT,
ATA, COQ).

Haplopappus rosulatus H.M. Hall
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Haplopappus rotundifolius H.M. Hall
Sin.: *Diplopappus foliolosus* Hook. &
Arn., *Diplopappus ilicifolius* Hook. & Arn.
Arbusto. Nativa. 1000-3000 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Haplopappus saxatilis (J. Remy) Reiche
Sin.: *Aster saxatilis* (J. Remy)
Kuntze, *Haplodiscus sphacelatus* Phil.,
Haplopappus angustifolius (DC.) Reiche
subsp. *saxatilis* (J. Rémy) Klingenb.,
Haplopappus sphacelatus (Phil.) Reiche,
Pyrrocoma saxatilis J. Remy
Arbusto. Endémica. 400-1700 m.
Países: CHL(COQ, MAU, RME).

Haplopappus scaposus J. Remy
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL, LBO).

Haplopappus schumannii (Kuntze)
G.K. Br. & W.D. Clark
Sin.: *Aster schumannii* Kuntze,
Haplopappus armerioides Phil.,
Haplopappus poeppigianus (Hook. &
Arn.) A. Gray var. *radiatus* A. Gray,
Haplopappus sericeus Phil., *Steriphe*
navarri Phil.
Arbusto. Endémica. 1400-3000 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Haplopappus scrobiculatus (Nees) DC.
Sin.: *Aster cuneifolius* (Nutt.) Kuntze,
Aster densifolius (J. Remy) Kuntze, *Aster*
scrobiculatus (Nees) Kuntze, *Diplopappus*
bellidifolius Hook. & Arn., *Diplopappus*
cuneatus Hook. & Arn., *Diplopappus*
scrobiculatus Nees, *Haplopappus cuneifolius*
Nutt., *Haplopappus densifolius* J. Remy,
Perezia spathulata Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 2600-3700 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Haplopappus serrulatus Reiche
Sin.: *Haplopappus spinulosus* Phil.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(RME).

Haplopappus setulosus Klingenb.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Haplopappus stelliger J. Remy
Sin.: *Aster stelliger* (J. Remy) Kuntze
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Haplopappus stolpii Phil.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Haplopappus taeda Reiche
Sin.: *Haplodiscus peteroanus* Phil.
Arbusto. Endémica. 300-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus uncinatus Phil.
Sin.: *Aster uncinatus* (Phil.) Kuntze,
Diplopappus canescens Hook. & Arn.,
Haplopappus candolei Phil., *Haplopappus*
uncinatus Phil. var. *candolei* (Phil.)
Reiche
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Haplopappus undulatus Klingenb.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Haplopappus velutinus J. Remy
Sin.: *Aster illinitus* (Phil.) Kuntze,
Haplodiscus fallax Phil., *Haplodiscus*
longiscapus Phil., *Haplodiscus zañartui*
Phil., *Haplopappus baccharidifolius*
Phil., *Haplopappus fallax* Phil.,
Haplopappus glutinosus Cass. var.
illinitus (Phil.) Reiche, *Haplopappus*
illinitus Phil., *Haplopappus longipes*
(Phil.) Reiche, *Haplopappus longiscapus*
Phil., *Haplopappus stenophyllus*

Phil., *Haplopappus subandinus* Phil.,
Haplopappus velutinus J. Remy
subsp. *illinitus* (Phil.) L. Klingenberg,
Haplopappus virgatus Phil., *Haplopappus*
zañartui (Phil.) Reiche, *Pyrrocoma*
longipes Phil.
Arbusto. Endémica. 1300-2100 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, RME).

Haplopappus vicuniensis Klingenb.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Haroldia Bonifacino

Haroldia mendocina (Cabrera)
Bonifacino
Sin.: *Chiliotrichiopsis mendocina* Cabrera
Arbusto. Endémica. 2200-2600 m.
Países: ARG(MEN).

Hatschbachiella R.M. King &
H. Rob.

Hatschbachiella polyclada (Dusén ex
Malme) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium polycladum* Dusén
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Hatschbachiella tweedieana (Hook.
& Arn.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Austroeupatorium tweedieanum*
(Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.,
Eupatorium erigeroides DC., *Eupatorium*
steviifolium DC. var. *erigeroides* (DC.)
Baker, *Eupatorium steviifolium* DC.
var. *viscosum* Chodat, *Eupatorium*
tweedieanum Hook. & Arn. var.
tweedieanum
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL,
MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Hebeclinium DC.

Hebeclinium macrophyllum (L.) DC.
Sin.: *Ageratum guianense* Aubl.,
Eupatorium dryadeum DC., *Eupatorium*
macrophyllum L., *Eupatorium molle* Sw.,
nom. illeg., *Eupatorium populifolium*
Mart., nom. illeg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR).
BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Hedypnois Mill.**Hedypnois rhagadioloides** (L.) F.W. Schmidt

Sin.: *Hedypnois cretica* (L.) Dum. Cours., *Hedypnois cretica* (L.) Willd., comb. superfl., *Hedypnois polymorpha* DC., *Hyoseris cretica* L., *Hyoseris rhagadioloides* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA).
CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA).
URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, SAO, SJO, SJO).

Helenium L.**Helenium argentinum** Ariza

Sin.: *Actinea heterophylla* Juss. f. *concolor* Kuntze, nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss. var. *linearifolia* Kuntze, *Helenium donianum* (Hook. & Arn.) Seckt var. *linearifolium* (Kuntze) Bierner
Hierba. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(COR, SDE, SLU).

Helenium aromaticum (Hook.) L.H. Bailey

Sin.: *Cephalophora aromatica* (Hook.) Schrad., *Cephalophora collina* Phil., *Cephalophora lanceolata* Phil., *Cephalophora tenera* Cass., *Graemia aromatica* Hook., *Helenium collinum* (Phil.) F. Meigen
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Helenium atacamense Cabrera

Sin.: *Cephalophora litoralis* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Helenium donianum (Hook. & Arn.) Seckt

Sin.: *Actinea doniana* (Hook. & Arn.) Kuntze, comb. superfl., *Cephalophora doniana* Hook. & Arn., *Gaillardia doniana* (Hook. & Arn.) Griseb., *Helenium donianum* (Hook. & Arn.) Cabrera, comb. superfl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Helenium glaucum (Cav.) Stuntz

Sin.: *Cephalophora berteriana* Phil., *Cephalophora borchersii* Phil., *Cephalophora foliosa* Phil., *Cephalophora*

glaucum Cav., *Cephalophora gracilis* Phil., *Cephalophora plantaginea* DC., *Cephalophora plantaginea* DC. var. *spathulata* (F. Phil.) Reiche, *Cephalophora punctata* Klatt, *Cephalophora rigida* Phil., *Cephalophora spathulata* F. Phil., *Cephalophora stolpii* Phil., *Ethulia repanda* Nees ex DC., nom. nud., *Gaillardia glauca* (Cav.) Baill., *Heleniastrum glaucum* (Cav.) Kuntze, *Helenium borchersii* (Phil.) Cabrera, *Helenium foliosum* (Phil.) Cabrera, *Helenium gracile* (Phil.) Cabrera, *Helenium plantagineum* (DC.) J.F. Macbr., *Hymenopappus glaucus* (Cav.) Spreng.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Helenium insulare (Phil.) Cabrera

Sin.: *Actinea insularis* (Phil.) Kuntze, *Cephalophora insularis* Phil.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(BIO).

Helenium ovallense Bierner

Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: CHL(COQ).

Helenium radiatum (Less.) Seckt

Sin.: *Actinea alternifolia* Spreng., nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss. var. *dentata* Kuntze, nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss. f. *bicolor* Kuntze, nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss., *Actinella heterophylla* (Juss.) Pers., comb. superfl., *Actinea radiata* (Less.) Kuntze, comb. superfl., *Cephalophora heterophylla* (Juss.) Less., *Cephalophora radiata* Less., *Helenium alternifolium* (Spreng.) Cabrera, comb. illeg., *Helenium heterophyllum* (Juss.) Malme, hom. illeg., *Helenium mattfeldianum* Herter, nom. superfl., *Helenium radiatum* (Less.) Bierner, comb. superfl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TYT).

Helenium urmenetae (Phil.) Cabrera var. **leguiffei** (Phil.) Bierner

Sin.: *Cephalophora leguiffei* Phil., *Cephalophora peraltae* Phil., *Helenium leguiffei* (Phil.) J.F. Macbr.
Hierba. Endémica. 300-1300 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Helenium urmenetae (Phil.) Cabrera var. **urmenetae**

Sin.: *Cephalophora setigera* Phil.,

Cephalophora urmenatae Phil., *Helenium longiaristatum* (Phil.) Cabrera
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

Helenium vallenariense (Phil.) Bierner

Sin.: *Cephalophora vallenariense* Phil.
Hierba. Endémica. 400-1200 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Helianthus L.**Helianthus annuus** L.

Sin.: *Helianthus aridus* Rydb., *Helianthus erythrocarpus* Barth, *Helianthus indicus* L., *Helianthus lenticularis* Douglas ex Lindl., *Helianthus macrocarpus* DC., *Helianthus multiflorus* Hook., *Helianthus ovatus* Lehm., *Helianthus platycephalus* Cass., nom. inval., *Helianthus tubaeformis* Nutt.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, LPA, SLU, SFE, SDE).

Helianthus × laetiflorus Pers.

Sin.: *Helianthus laetiflorus* Pers. var. *tricuspis* (Elliott) Torr. & A. Gray, *Helianthus scaberrimus* Elliott, *Helianthus tricuspis* Elliott
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Helianthus petiolaris Nutt.

Sin.: *Helianthus integrifolius* Nutt., *Helianthus integrifolius* Nutt. var. *gracilis* Nutt., *Helianthus patens* Lehm., *Helianthus petiolaris* Nutt. var. *patens* (Lehm.) Rydb. ex Porter & Britton, *Helianthus praecox* Engelm. & A. Gray
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SLU).

Helianthus tuberosus L.

Sin.: *Helianthus esculentus* Warsz., *Helianthus serotinus* Tausch
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(CAS, MON).

Helichrysum Mill.**Helichrysum foetidum** (L.) Moench

Sin.: *Gnaphalium foetidum* L.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Helminthotheca Vaill.**Helminthotheca echioides** (L.) Holub

Sin.: *Helminthia echioides* (L.) Gaertn.,
Helminthia echioides (L.) Holub, *Picris*
echioides L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA,
MEN, RNE, SAL, SLU). CHL(AYP, TAR,
ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, RME, IPA). URY(MON).

Helogyne Nutt.**Helogyne apaloidea** Nutt.

Sin.: *Brachyandra tenuifolia* (Phil.)
Reiche, *Leto tenuifolia* Phil.

Arbusto. Nativa. 700-3200 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Helogyne macrogyne (Phil.) B.L. Rob.

Sin.: *Brachyandra macrogyne* Phil.

Arbusto. Endémica. 2000-3800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Helogyne tacaquirensis Hieron.

Sin.: *Eupatorium dejetum* B.L. Rob.,
Eupatorium tacaquirense (Hieron.) B.L. Rob.

Arbusto. Nativa. 3000-3600 m.

Países: ARG(JUJ).

Heterocondylus R.M. King & H. Rob.**Heterocondylus alatus** (Vell.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Bulbostylis ramosissima* Gardner,
Eupatorium vauthierianum DC. var.
campestre Dusén ex Malme, *Eupatorium*
vauthierianum DC. var. *trichotomum*
Baker, *Heterocondylus vauthierianus*
(DC.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heterocondylus amphidictyus (DC.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium amphidictyum* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Heterocondylus decipiens (Baker)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium decipiens* Baker

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heterocondylus didymus (Klatt) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium didymum* Klatt var.
glandulitectum B.L. Rob., *Ayapanopsis*
dydima (Klatt) R.M. King & H. Rob.,
Eupatorium didymum Klatt

Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Heterocondylus grandis (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium grande* Sch. Bip. ex Baker

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA,
GUA, PAI).

Heterocondylus lysimachioides

(Chodat) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium lysimachioides*
Chodat, *Eupatorium estrellense* Hassl.,
Eupatorium lysimachioides Chodat var.
estrellense (Hassl.) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA (Fuera del área del
proyecto). PRY(APA, AMA, CAU).

Heterocondylus pumilus (Gardner)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Bulbostylis pumila* Gardner,
Eupatorium agrigaudium Cabrera,
Heterocondylus reitzii R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Heterocondylus vitalbae (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium vitalbae* DC.,
Eupatorium vitalbae DC. var.
serratifolium Chodat, *Eupatorium*
vauthierianum DC. var. *ramosissimum*
(Gardner) Baker

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, CAU, CAN, GUA, SPE).

Heterosperma Cav.**Heterosperma diversifolium** Kunth

Sin.: *Heterosperma pinnatum* Kunth
var. *depressum* (Griseb.) Kuntze,
Heterosperma pinnatum Kunth
var. *diversifolium* (Kunth) Kuntze,
Heterospermum depressum Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Heterosperma nanum (Nutt.) Sherff

Sin.: *Bidens involuocrata* Phil.,

Heterosperma involuocratum (Phil.)
Reiche, *Heterosperma pinnatum* Kunth
var. *involuocratum* Kuntze, *Microdonta*
nana Nutt.

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Heterosperma ovatifolium Cav.

Sin.: *Bidens rhombifolia* Sch. Bip.,
nom. nud., *Heterosperma pinnatum*
Kunth var. *maritimum* (Kunth) Kuntze,
Heterosperma pinnatum Kunth var.
ovatifolium (Cav.) Kuntze, *Heterosperma*
rhombifolium (Sch. Bip.) Griseb., comb.
illeg., *Heterospermum maritimum* Kunth,
Heterospermum ovatum Willd.

Hierba. Nativa. 500-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI,
SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR).

Heterosperma tenuisectum (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Heterosperma diversifolium* Kunth
var. *tenuisectum* Griseb., *Heterosperma*
pinnatum Kunth var. *biternatum* Kuntze

Hierba. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SJU, SLU, TUC).

Heterothalamulopsis Deble, A.S. Oliveira & Marchiori**Heterothalamulopsis wagenitzii**

(F.H. Hellwig) Deble, A.S. Oliveira & Marchiori

Sin.: *Baccharis wagenitzii* (F.H.
Hellwig) Joch.Müll., *Heterothalamus*
wagenitzii F.H. Hellwig

Subarbusto. Endémica. 1000-1900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Heterotheca Cass.**Heterotheca subaxillaris** (Lam.)

Britton & Rusby

Sin.: *Heterotheca latifolia* Buckley,
Inula subaxillaris Lam.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, LPA, SLU).

Hieracium L.**Hieracium achalense** Sleumer

Sin.: *Hieracium champaquiense* Sleumer

Hierba. Endémica. 1000-2200 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Hieracium adenocephalum (Sch. Bip.) Arv.-Touv.

Sin.: *Hieracium chilense* Less. var. *adenocephalum* (Sch. Bip.) Griseb., *Hieracium mandonii* Britton, comb. illeg., *Pilosella adenocephala* Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 2100-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Hieracium antarcticum d'Urv.

Sin.: *Hieracium andinum* Phil., *Hieracium antarcticum* d'Urv. var. *fuegiensis* Speg., *Hieracium antarcticum* d'Urv. var. *myostidifolium* (Sch. Bip.) Sleumer, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *andinum* (Phil.) Zahn, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *antarcticum* (d'Urv.) Zahn, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *myosotidifolium* (Sch. Bip.) Zahn, *Hieracium magellanicum* Sch. Bip., *Hieracium myostidifolium* Sch. Bip., *Hieracium philippii* Albov, *Hieracium triste* Macloskie, hom. illeg., *Pilosella magellanica* (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Pilosella myosotidifolia* (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).
CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Hieracium argentinense Zahn

Sin.: *Hieracium argentinense* Zahn var. *sublorentzianum* Sleumer, *Hieracium subargentinense* Zahn var. *rufocomatulum* Sleumer, *Hieracium subargentinense* Zahn var. *subargentinense*

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Hieracium astroadenium Sleumer

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SLU, TUC).

Hieracium aurantiacum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, MAG).

Hieracium burkartii Sleumer

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Hieracium catamarcense Sleumer

Hierba. Endémica. 2000-3100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN).

Hieracium chacoense (Zahn) Sleumer

Sin.: *Hieracium paraguayense* Arv.-Touv. var. *chacoense* Zahn
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Hieracium chilense Less.

Sin.: *Hieracium gayanum* Arv.-Touv., *Hieracium orthotrichum* R.E. Fr., *Pilosella chilensis* (Less.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Pilosella orthotricha* (R.E. Fr.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Hieracium cienegae Zahn

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Hieracium commersonii Monnier var. **commersonii**

Sin.: *Hieracium polygonatum* Zahn, *Hieracium semiglabratum* J. Vahl ex Froel., nom. inval., *Hieracium semiglabratum* Comm. ex Fr., nom. superfl., *Hieracium uruguayense* Arv.-Touv., *Pilosella semiglabrata* F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).

Hieracium commersonii Monnier var. **megapotanicum**

Sin.: *Hieracium commersonii* Monnier var. *lorentzii* Malme
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Hieracium cordobense Sleumer

Sin.: *Hieracium cordobense* Sleumer var. *mollisetum* Sleumer
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Hieracium criniceps Sleumer

Sin.: *Hieracium petrophytes* Sleumer
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(COR, MEN, SLU).

Hieracium dasychaetocomum Zahn

Hierba. Nativa. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hieracium eriaadenium Sleumer

Sin.: *Hieracium eriaadenium* Sleumer var. *subadenocephalum* Sleumer
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Hieracium flagellare Willd.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Hieracium fulvipes Wedd.

Sin.: *Hieracium fiebrigianum* Zahn, *Hieracium fulvipes* Wedd. var. *nigerrimum* Sleumer, *Hieracium lagopus* Soest non Don, *Pilosella fulvipes* (Wedd.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Hieracium gigantium Sleumer

Sin.: *Hieracium gigantium* Sleumer var. *canofloccosum* Sleumer, *Hieracium gigantium* Sleumer var. *setulosum* Sleumer
Hierba. Endémica. 2000-2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, SLU).

Hieracium gilliesianum Sleumer

Sin.: *Hieracium sordidum* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(COR, MEN, SJU, SLU).

Hieracium glaucifolium Poepp. ex Froel.

Sin.: *Hieracium chilense* Ball, *Hieracium chilense* Skottsb., hom. illeg., *Hieracium chubutense* Speg., *Pilosella glaucifolia* (Poepp. ex Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Hieracium ignatianum Baker

Hierba. Endémica. 400-700 m.
Países: BRA(PAR).

Hieracium jaretanum (Zahn) Sleumer

Sin.: *Hieracium streptochaetum* Zahn subsp. *jaretanum* Zahn
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(LRI).

Hieracium kieslingii Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ).

Hieracium lorentzianum Zahn

Sin.: *Hieracium lorentzianum* Zahn var. *pilosissimum* Sleumer
Hierba. Endémica. 2500-3700 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Hieracium luteomontanum Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ).

Hieracium mandonii (Sch. Bip.) Arv.-Touv.

Sin.: *Hieracium chilense* Ball, *Hieracium eriosphaerophorum* Zahn var. *castillense* Zahn, *Hieracium eriosphaerophorum* Zahn, *Hieracium mandonii* (Sch. Bip.)

Arv.-Touv. var. *pseudargentinese* (Sleumer) Cabrera, *Hieracium pseudargentinese* Sleumer, *Hieracium sanctae-victoriae* Sleumer, *Pilosella mandonii* Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Hieracium mendocinum Sleumer

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Hieracium microcephalum Sch. Bip.

Sin.: *Hieracium bangii* Rusby subsp. *austroboliviense* Zahn, *Hieracium bangii* Rusby var. *siambonicum* Zahn, *Hieracium bangii* Rusby, *Hieracium microcephalum* Sch. Bip. var. *subglandulosum* Sleumer

Hierba. Nativa. 1000-2700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Hieracium mosonii Malme

Sin.: *Hieracium warmingii* Baker var. *lechleri* Zahn

Hierba. Nativa. 100-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Hieracium murorum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Hieracium neofurcatum Sleumer

Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Hieracium niederleinii (Zahn)

Sleumer

Sin.: *Hieracium bangii* Rusby subsp. *niederleinii* Zahn, *Hieracium frigidum* Wedd. var. *elatius* Griseb., *Hieracium lorentzianum* Zahn var. *subtucumanicum* Zahn, *Hieracium niederleinii* (Zahn) Sleumer var. *subcatamarcense* Sleumer
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hieracium padcayense Sleumer

Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Hieracium palezieuxii Zahn

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LPA, SFE). BRA(RGS). URY(COL).

Hieracium paraguayense Arv.-Touv.

Sin.: *Hieracium ignatianum* Baker var. *paraguense* (Baker) Zahn, *Hieracium paraguense* Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Hieracium patagonicum Hook. f.

Sin.: *Hieracium austroamericanum* Dahlst., *Hieracium chilense* Less. var. *navarinum* Zahn, *Hieracium poeppigianum* Zahn, *Pilosella patagonica* (Hook. f.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG).

Hieracium pilosella L. subsp.

euronotum Nägeli & Peter
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(MAG).

Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAG).

Hieracium schreiteri Sleumer

Hierba. Nativa. 3000-5000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Hieracium sordidum Griseb.

Sin.: *Hieracium sordidum* Griseb. var. *subglandulosum* Sleumer
Hierba. Endémica. 2400-3300 m.
Países: ARG(CAT, LRI, TUC).

Hieracium stachyoideum Arv.-Touv.

Sin.: *Hieracium boliviense* (Wedd.) Sch. Bip. var. *stachyoideum* (Arv.-Touv.) Zahn, *Mandonia pilosella* Sch. Bip.
Hierba. Nativa. 3300-3600 m.
Países: ARG(SAL).

Hieracium streptochaetum Zahn

Sin.: *Hieracium adenocephalum* (Sch. Bip.) Arv.-Touv. var. *subsetulosa* Zahn, *Hieracium sordidum* Griseb. var. *subfrigidum* Griseb., *Hieracium streptochaetum* Zahn var. *epilosum* Sleumer, *Hieracium streptochaetum* Zahn f. *floccosius* Sleumer
Hierba. Endémica. 2600-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Hieracium tandilense Sleumer

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Hieracium tucumanicum (Zahn)

Sleumer var. **esetosum** Sleumer
Hierba. Endémica. 2600-0 m.
Países: ARG(TUC).

Hieracium tucumanicum (Zahn)

Sleumer var. **tucumanicum**
Sin.: *Hieracium boliviense* (Wedd.) Sch. Bip. var. *setosopilosum* Kuntze, *Hieracium boliviense* (Wedd.) Sch. Bip. subsp. *tucumanicum* Zahn
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hieracium urvillei Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hieracium vervoortii Sleumer

Hierba. Endémica. 2200-2500 m.
Países: ARG(CAT).

Holocheilus Cass.

Holocheilus brasiliensis (L.) Cabrera

Sin.: *Cacalia scabra* Vahl, *Cleanthes brasiliensis* (L.) D. Don, *Cleanthes ochroleuca* (Cass.) Parodi, *Cleanthes othonoides* (Less.) Griseb., *Holocheilus ochroleucus* Cass., *Leuceria echioides* D. Don, *Perdicium brasiliense* L., *Perezia ochroleuca* (Cass.) Less., *Platycheilus ochroleucus* Cass., *Trixis brasiliensis* (L.) DC. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Trixis brasiliensis* (L.) DC. var. *sellowii* (Less. ex DC.) Hassl., nom. illeg., *Trixis brasiliensis* (L.) DC., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn., *Trixis othonoides* Less., *Trixis sellowii* Less. ex DC., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

Holocheilus fabrisii Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-2700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Holocheilus hieracioides (D. Don) Cabrera

Sin.: *Cleanthes hieracioides* D. Don var. *thrincooides* Griseb., *Cleanthes hieracioides* D. Don, *Leucheria conyzoides* D. Don, *Leucheria thrincooides* Griseb., *Trixis hieracioides* (D. Don) DC., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *incisa* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *pusilla* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *robusta* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *subintegra* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. var. *hieracioides* (D. Don) Kuntze, *Trixis ochroleuca* (Cass.)

Hook. & Arn. var. *thrincooides* (Griseb.) Kuntze, *Trixis ochroleuca* Baker, hom. illeg., *Trixis sonchoides* Chodat, *Trixis thrincooides* (Griseb.) Hassl.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, ITA, PHA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Holocheilus illustris (Vell.) Cabrera

Sin.: *Castra illustris* Vell., *Trixis denticulata* Dusén ex Malme, *Trixis hieronymi* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(PAY, RNO, RIV).

Holocheilus monocephalus C.A. Mondin

Hierba. Endémica. 1000-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Holocheilus pinnatifidus (Less.)

Cabrera
Sin.: *Trixis pinnatifida* Less.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Holocheilus schulzii (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Trixis schulzii* Cabrera
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, SPE).

Huarpea Cabrera

Huarpea andina Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(SJU).

Hyalis D. Don ex Hook. & Arn.

Hyalis argentea D. Don ex Hook. & Arn. var. **argentea**

Sin.: *Plazia argentea* (D. Don ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Vernonia argentea* Gillies ex Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 1600-2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU).

Hyalis argentea D. Don ex Hook. & Arn. var. **latisquama** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 100-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).

Hyalis argentea D. Don ex Hook. & Arn. var. **macroserma** F.A. Roig
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MEN).

Hyalis lancifolia Baker

Sin.: *Hyalis lorentzii* Hieron., *Plazia acaciifolia* J. Kost.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(PHA).

Hyaloseris Griseb.

Hyaloseris andrade-limae Cristóbal & Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SDE).

Hyaloseris camataquiensis Hieron. ex J. Kost.

Arbusto. Nativa. 3400-3600 m.
Países: ARG(JUJ).

Hyaloseris cinerea (Griseb.) Griseb. var. **cinerea**

Sin.: *Gochnatia cinerea* Griseb.
Arbusto. Endémica. 800-1200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).

Hyaloseris cinerea (Griseb.) Griseb. var. **tomentella** Griseb.

Sin.: *Hyaloseris tomentella* (Griseb.) Hieron.
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: ARG(COR, LRI, SJU, SLU).

Hyaloseris rubicunda Griseb.

Arbusto. Endémica. 1100-2900 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

Hymenostephium Benth.

Hymenostephium debile (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Viguiera cabrerai* H. Rob., *Viguiera debilis* (Cabrera) Ariza, *Wulffia debilis* Cabrera
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hymenoxys Cass.

Hymenoxys anthemoides (Juss.) Cass.

Sin.: *Actinea anthemoides* (Juss.) Kuntze, *Actinea haenkeana* (DC.) Kuntze, *Actinella anthemoides* (Juss.)

A. Gray, *Actinella anthemoides* (Cass.) Herter, comb. illeg., *Actinella anthemoides* (Juss.) Malme, *Hymenopappus anthemoides* Juss., *Hymenoxys haenkeana* DC., *Hymenoxys parodii* I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(PHA). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, SAO).

Hymenoxys cabrerai K.L. Parker

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, RNE, SFE).

Hymenoxys robusta (Rusby) K.L. Parker

Sin.: *Cephalophora robusta* Rusby
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Hymenoxys tweediei Hook. & Arn.

Sin.: *Actinea tweediei* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Actinella tweediei* (Hook. & Arn.) Malme
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(FLO, RNO, SOR).

Hypochaeris L.

Hypochaeris acaulis (J. Remy) Britton

Sin.: *Achyrophorus acaulis* J. Remy
Hierba. Endémica. 1400-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, RME).

Hypochaeris alba Cabrera

Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: ARG(COS). PRY(ITA).

Hypochaeris albiflora (Kuntze) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.

Sin.: *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *albiflora* Kuntze, *Hypochaeris microcephala* (Sch. Bip.) Cabrera var. *albiflora* (Kuntze) Cabrera
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CON, GUA, MIE, SPE). URY(LAV).

Hypochaeris apargioides Hook. & Arn.

Sin.: *Achyrophorus apargioides* (Hook. & Arn.) DC., *Hypochaeris berterii* Colla
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Hypochaeris arenaria Gaudich.

Sin.: *Achyrophorus andinus* DC., *Achyrophorus arenarius* (Gaudich.) DC., *Achyrophorus humilis* Phil., *Achyrophorus magellanicus* Sch. Bip., *Achyrophorus psycrophilus* Wedd., *Achyrophorus webbii* Sch. Bip., nom. nud., *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *laciniata* Phil., *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *andina* (DC.) Cabrera, *Hypochaeris humilis* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris psycrophila* (Wedd.) Reiche, *Hypochaeris pygmaea* Phil., *Hypochaeris ushuaiae* Skottsb., *Leontodon arenarius* (Gaudich.) Albou, *Seriola andina* DC., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Hypochaeris argentina Cabrera

Hierba. Nativa. 1700-4200 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Hypochaeris caespitosa Cabrera

Hierba. Endémica. 1400-2800 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Hypochaeris catharinensis Cabrera

Hierba. Endémica. 800-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypochaeris chillensis (Kunth)

Hieron.

Sin.: *Achyrophorus brasiliensis* (Less.) Sch. Bip., *Achyrophorus chillensis* Sch. Bip., nom. inval., *Achyrophorus chillensis* (Kunth) Sch. Bip., nom. superfl., *Achyrophorus sagittatus* Phil., *Achyrophorus selloi* Sch. Bip., *Apargia chillensis* Kunth, *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *chacoensis* Hassl., *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *sulfurea* Kuntze, *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *tweediei* (Hook. & Arn.) Baker, *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb., *Hypochaeris chillensis* (Sch. Bip.) Britton, *Hypochaeris chillensis* (Kunth) Britton, comb. illeg., *Hypochaeris tweediei* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Leontodon chillense* (Kunth) DC., *Porcellites brasiliensis* Less. var. *hirta* Less., *Porcellites brasiliensis* Less. var. *integrifolia* Less., nom. nud., *Porcellites brasiliensis* Less. var. *pinnatifida* Less., nom. nud., *Porcellites brasiliensis* Less.,

Seriola brasiliensis (Less.) Less., *Seriola tweediei* Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

Hypochaeris chondrilloides (A. Gray)

Cabrera

Sin.: *Achyrophorus chondrilloides* A. Gray, *Achyrophorus deserticola* Phil., *Achyrophorus glaucus* Phil., *Hypochaeris glabrata* Phil., *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche f. *halofila* Hauman, *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Hypochaeris halophila* (Hauman) Cabrera, *Oreophila chondrilloides* D. Don ex A. Gray, nom. inval., *Oreophila chondrilloides* Hook. & Arn., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TDF). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Hypochaeris clarionoides (J. Remy)

Reiche

Sin.: *Achyrophorus clarionoides* J. Remy, *Achyrophorus microphyllus* J. Remy, *Hypochaeris clarionoides* (J. Remy) Reiche var. *microphylla* (J. Remy) Cabrera, *Hypochaeris microphylla* (J. Remy) Reiche, *Hypochaeris nana* Phil., *Hypochaeris tenuifolia* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *clarionoides* (J. Remy) Bortiri

Hierba. Endémica. 2500-3400 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, MAG, RME).

Hypochaeris × confusa C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(RGS).

Hypochaeris cupressorum F. Phil.

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Hypochaeris deserticola Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ATA).

Hypochaeris echegarayi Hieron.

Sin.: *Achyrophorus setosus* Wedd., *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *leucantha* Cabrera,

Hypochaeris ornata J. Kost., *Hypochaeris setosa* (Wedd.) Rusby, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 3100-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

Hypochaeris elata (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Griseb.

Sin.: *Achyrophorus elatus* Wedd.

Hierba. Nativa. 1200-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Hypochaeris eremophila Cabrera

Sin.: *Distoecha taraxacoides* Phil.

Hierba. Nativa. 2800-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Hypochaeris foliosa (Phil.) Reiche

Sin.: *Achyrophorus foliosus* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT).

Hypochaeris gayana (DC.) Cabrera

Sin.: *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *gayanus* DC., *Hypochaeris philippii* Kuntze var. *glabrescens* Kuntze, *Hypochaeris tenerifolia* (J. Remy) Dusén var. *glabrescens* (Kuntze) Cabrera

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Hypochaeris glabra L.

Sin.: *Hypochaeris minima* Willd. ex d'Urv., *Hypochaeris pumila* Phil.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TYT).

Hypochaeris grandidentata (Phil.)

Reiche

Sin.: *Achyrophorus grandidentatus* Phil.

Hierba. Endémica. 200-2500 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Hypochaeris grisebachii Cabrera

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI).

URY(CAS, CLA, FLA, MAL).

Hypochaeris hispidula Phil.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LLA).

Hypochaeris hookeri Phil.

Sin.: *Hypochaeris montana* (Phil.)
Reiche var. *hookeri* (Phil.) Bortiri,
Hypochaeris stenophylla Dusén
Hierba. Endémica. 200-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Hypochaeris incana (Hook. & Arn.)

Macloskie var. **incana**
Sin.: *Achyrophorus incanus* (Hook. & Arn.) Sch. Bip., *Achyrophorus leucanthus* Speg., *Hypochaeris incana* (Hook. & Arn.) Macloskie var. *leucantha* (Speg.) Cabrera, *Hypochaeris leucantha* (Speg.) Speg., *Seriola incana* Hook. & Arn., *Hypochaeris lanata* Dusén
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

Hypochaeris incana (Hook. & Arn.)

Macloskie var. **integrifolia** (Sch. Bip.) Cabrera
Sin.: *Achyrophorus coronopifolius* Sch. Bip., *Achyrophorus coronopifolius* Sch. Bip. var. *integrifolius* Sch. Bip., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *coronopifolia* (Sch. Bip.) Speg., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *integrifolia* (Sch. Bip.) Speg., *Hypochaeris coronopifolia* (Sch. Bip.) Franch., *Hypochaeris ibari* Phil., *Leontodon coronopifolium* (Sch. Bip.) Comm. ex Albov
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

Hypochaeris laciniosa Phil.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(BIO).

Hypochaeris lessingii (Sch. Bip.)

Reiche
Sin.: *Achyrophorus lessingii* Sch. Bip.
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Hypochaeris lutea (Vell.) Britton

Sin.: *Achyrophorus bipontinae* Sch. Bip., *Achyrophorus brasiliensis* Gardner, nom. illeg., *Achyrophorus gardneri* Sch. Bip., *Achyrophorus trichocephalus* Sch. Bip., *Hypochaeris gardneri* (Sch. Bip.) Baker, *Hypochaeris lutea* (Vell.) Britton var. *trichocephala* (Sch. Bip.) Cabrera
Hypochaeris rosengurtii Cabrera,
Prenanthes lutea Vell.
Hierba. Nativa. 200-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA). URY(CLA, FLA, SJO).

Hypochaeris megapotamica Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR).

Hypochaeris melanolepis Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: CHL(VAL).

Hypochaeris meyeniana (Walp.)

Benth. & Hook. f. ex Griseb.
Sin.: *Achyrophorus meyenianus* (Walp.) Walp., *Achyrophorus meyenianus* (Walp.) Walp. var. *ciliatus* Wedd., *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *brachylepis* Cabrera, *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *ciliata* (Wedd.) Perkins, *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *eriolaenoides* Cabrera, *Oreophila meyeniana* Walp.
Hierba. Nativa. 1700-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Hypochaeris microcephala (Sch. Bip.)

Cabrera
Sin.: *Achyrophorus microcephalus* Sch. Bip., *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *microcephala* (Sch. Bip.) Baker, *Seriola brasiliensis* (Less.) Less. var. *parviflora* Hook. & Arn.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, TYT).

Hypochaeris montana (Phil.) Reiche

Sin.: *Achyrophorus montanus* Phil., *Hypochaeris stenophylla* Dusén var. *laciniata* Hicken
Hierba. Endémica. 1800-4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SCR, SJU). CHL(RME).

Hypochaeris nahuelvutae Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: CHL(ARA).

Hypochaeris neopinnatifida C.F.

Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.
Sin.: *Hypochaeris pinnatifida* (Speg.) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb., nom. illeg., *Hypochaeris rosengurtii* Cabrera var. *pinnatifida* (Speg.) Cabrera,

Hypochaeris variegata (Lam.) Baker var. *acutibracteata* Speg., *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *pinnatifida* Speg.
Hierba. Endémica. 200-700 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA).

Hypochaeris palustris (Phil.) De Wild.

Sin.: *Achyrophorus palustris* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2100 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Hypochaeris pampasica Cabrera

Hierba. Endémica. 0-2700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU).

Hypochaeris parodii Cabrera

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hypochaeris patagonica Cabrera

Sin.: *Hypochaeris chubutensis* Bortiri
Hierba. Endémica. 300-800 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

Hypochaeris petiolaris (Hook. & Arn.)

Griseb.
Sin.: *Achyrophorus petiolaris* (Hook. & Arn.) DC., *Seriola petiolaris* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SFE, SLU, TUC). URY(CAS, COL, MON, SJO).

Hypochaeris pilosa Reiche

Sin.: *Hypochaeris hirta* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Hypochaeris radicata L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, COL, FLO, MAL, MON, ROC, SJO).

Hypochaeris scorzonerae (DC.) F.

Muell. var. **glabrata** (DC.) Reiche
Sin.: *Achyrophorus chrysanthus* DC., *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *glabrata* DC., *Hypochaeris crisantha* Poepp. ex DC., *Oreophila taraxacoïdes* Don, *Seriola taraxacoïdes* (Don) Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Hypochaeris scorzonerae (DC.) F. Muell. var. **ramosa** (DC.) Reiche
Sin.: *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *ramosa* DC.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(VAL).

Hypochaeris scorzonerae (DC.) F. Muell. var. **scorzonerae**
Sin.: *Hypochaeris sonchoides* Kunth, *Achyrophorus scorzonerae* DC.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Hypochaeris spathulata (J. Remy) Reiche var. **chiloensis** (J. Remy) Reiche
Sin.: *Achyrophorus spathulatus* J. Remy var. *chiloensis* J. Remy
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(LBO, LLA).

Hypochaeris spathulata (J. Remy) Reiche var. **spathulata**
Sin.: *Achyrophorus spathulatus* J. Remy
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Hypochaeris taraxacoides Ball
Sin.: *Achyrophorus stenocephalus* A. Gray ex Wedd., nom. inval., *Achyrophorus taraxacoides* Walp., hom. illeg., *Hypochaeris stenocephala* (A. Gray ex Wedd.) Kuntze var. *integrifolia* Kuntze, *Hypochaeris stenocephala* (A. Gray ex Wedd.) Kuntze var. *taraxacoides* (Meyen & Walp.) Kuntze, *Achyrophorus taraxacoides* Walp. var. *stenocephalus* A. Gray ex Wedd., *Hypochaeris stenocephala* (A. Gray ex Wedd.) Kuntze, comb. illeg., *Hypochaeris stenophylla* Dusén var. *integrifolia* Kuntze, *Oreophila taraxacifolia* Meyen & Walp., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 2600-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Hypochaeris tenerifolia (J. Remy) Dusén
Sin.: *Achyrophorus lechleri* Sch. Bip., nom. inval., *Achyrophorus tenerifolius* J. Remy
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, MAG).

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb. var. **eurylepis** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Achyrophorus araucanus* Phil., *Achyrophorus odoratus* (Poepp. & Endl.)

Walp., *Hypochaeris eurylepis* Phil., *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. f. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. f., *Oreophila odorata* Poepp. & Endl.
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb. var. **linearifolia** (DC.) Bortiri
Sin.: *Achyrophorus graminifolius* Phil., nom. nud., *Achyrophorus angustissimus* Phil., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *linearifolius* DC., *Hypochaeris graminifolia* Phil.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, RME).

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tenuifolia**
Sin.: *Achyrophorus spinuliger* Phil., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *neaeanus* DC., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC., *Achyrophorus volckmannii* Phil., *Hypochaeris spinuligera* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris volckmannii* (Phil.) Phil., *Oreophila tenuifolia* D. Don ex Hook. & Arn., nom. inval., *Seriola tenuifolia* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 1300-3200 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Hypochaeris thermarum Phil.
Hierba. Endémica. 2500-3400 m.
Países: CHL(MAU).

Hypochaeris thrincioides (J. Remy) Reiche
Sin.: *Achyrophorus brevicaulis* Phil., *Achyrophorus philippi* Sch. Bip. ex Sched
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Hypochaeris toltensis Reiche
Sin.: *Hypochaeris grandiflora* F. Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ARA).

Hypochaeris tropicalis Cabrera var. **australis** Cabrera
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI). PRY(MIE). URY(ART, CLA, FLA, PAY, SAO, SOR).

Hypochaeris tropicalis Cabrera var. **tropicalis**
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(PAI).

Hypochaeris variegata (Lam.) Baker
Sin.: *Achyrophorus variegatus* (Lam.) Sch. Bip., *Apargia variegata* Willd., *Hieracium variegatum* Lam., *Hypochaeris philippii* Kuntze, *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *glaucescens* Speg., *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *nana* Speg., *Leontodon variegatum* Willd. ex Poir.
Hierba. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS). BRA(RGS). URY(COL, LAV, MAL, MON).

Hysterionica Willd.

Hysterionica aberrans (Cabrera) Cabrera var. **aberrans**
Sin.: *Hysterionica bakeri* Hicken var. *aberrans* Cabrera
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(TUC).

Hysterionica aberrans (Cabrera) Cabrera var. **hunzikeri** Ariza
Hierba. Endémica. 2200-2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Hysterionica bakeri Hicken
Sin.: *Hysterionica caurina* Johnst., *Hysterionica grisebachi* Hieron., nom. nud.
Hierba. Endémica. 100-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Hysterionica cabreranae Ariza
Subarbusto. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Hysterionica dianthifolia (Griseb.) Cabrera var. **dianthifolia**
Sin.: *Erigeron dianthifolius* Griseb., *Neja dianthifolia* (Griseb.) G.L. Nesom
Subarbusto. Endémica. 2000-2900 m.
Países: ARG(COR).

Hysterionica dianthifolia (Griseb.) Cabrera var. **pulvinata** (Cabrera) Ariza
Sin.: *Hysterionica pulvinata* Cabrera, *Neja pulvinata* (Cabrera) G.L. Nesom
Subarbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(COR).

Hysterionica filiformis (Spreng.)

Cabrera

Sin.: *Diplopappus stenophyllus* Hook. & Arn., *Erigeron filiformis* Spreng., *Hysterionica gracilis* (D. Don ex Sweet) Benth. & Hook. f., *Hysterionica setuligera* Gand., *Neja ciliaris* DC., *Neja gracilis* D. Don ex Sweet, *Neja filiformis* (Spreng.) Nees, *Neja tenuifolia* DC., *Polyactidium sprengelii* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CLA, COL, LAV, RIV, ROC).

Hysterionica glaucifolia (Kuntze)

Solbrig

Sin.: *Erigeron glaucifolius* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(MEN).

Hysterionica jasionoides Willd.

Sin.: *Chrysopsis andicola* Phil., *Diplopappus hispidus* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Erigeron mendocinum* Greene, *Heterochaeta hispida* DC., *Hysterionica intermedia* Hieron., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC).

Hysterionica matzenbacherii A.A.

Schneid.

Hierba. Endémica. 900-1400 m.

Países: BRA(SCA).

Hysterionica nebularis Deble, A.S.

Oliveira & Marchiori

Subarbusto. Endémica. 900 m.

Países: BRA(RGS).

Hysterionica nidorelloides (DC.) Baker

Sin.: *Diplopappus villosus* Hook. & Arn., nom. illeg., *Hysterionica montevidensis* Baker, *Hysterionica villosa* (Hook. & Arn.) Cabrera, comb. illeg., *Neja nidorelloides* DC.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(CEN, ITA). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC).

Hysterionica pinifolia (Poir.) Baker

Sin.: *Diplopappus pinifolius* Hook. & Arn., *Erigeron pinifolius* Poir., *Neja pinifolia* (Poir.) G.L. Nesom

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, ROC).

Hysterionica pinnatiloba Matzenb.

Subarbusto. Endémica. 900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Hysterionica pinnatisecta Matzenb.

Subarbusto. Endémica. 1000-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Hysterionica pulchella Cabrera

Sin.: *Erigeron lanceolatus* Wedd. var. *lorentzianus* Griseb., *Hysterionica bakeri* Hicken f. *decumbens* Hicken, *Hysterionica famatinense* Hieron., nom. nud.

Hierba. Endémica. 2500-4400 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Ianthopappus Roque & D.J.N. Hind**Ianthopappus corymbosus** (Less.)

Roque & D.J.N. Hind

Sin.: *Actinoseris corymbosa* (Less.) Cabrera, *Gochnatia corymbosa* Less., *Onoseris corymbosa* (Less.) Benth. & Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(ART).

Ichthyothere Mart.**Ichthyothere integrifolia** (DC.) Baker

Sin.: *Ichthyothere agrestis* Baker, *Latreillea integrifolia* DC.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

Ichthyothere mollis Baker

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Idiothamnus R.M. King & H. Rob.**Idiothamnus lilloi** (B.L. Rob.) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium lilloi* B.L. Rob.

Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Idiothamnus pseudorgyalis R.M. King

& H. Rob.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Inulopsis (DC.) O. Hoffm.**Inulopsis scaposa** (DC.) O. Hoffm.

Sin.: *Aster longipes* Gardner, *Haplopappus scaposus* DC., *Leucopsis scaposa* (DC.) Baker

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, ITA).

Inulopsis stenophylla Dusén

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Isostigma Less.**Isostigma acaule** (Baker) Chodat

Sin.: *Bidens acaulis* Baker, *Isostigma vailianum* Britton

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, PHA).

Isostigma cordobense Cabrera

Sin.: *Isostigma crithmifolium* Less. var. *nanum* Sherff

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(COR).

Isostigma dissitifolium Baker

Sin.: *Isostigma peucedanifolium* (Spreng.) Less. var. *dissitifolium* (Baker) Hassl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(COA, PAI).

Isostigma herzogii Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(APY).

Isostigma hoffmannii Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(APY).

Isostigma molfinianum Sherff

Sin.: *Bodenbenderia riojana* Kurtz, nom. nud.

Hierba o subarbusto. Endémica. 1400-4600 m.

Países: ARG(CAT, LRI).

Isostigma peucedanifolium (Spreng.)

Less. var. **crithmifolium** (Less.) G. Peter

Sin.: *Isostigma crithmifolium* Less.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(RGS). PRY(ITA, MIE). URY(ART, PAY, RIV, SAO, TAC).

Isostigma peucedanifolium (Spreng.)Less. var. **peucedanifolium**

Sin.: *Isostigma peucedanifolium* (Spreng.) Less. var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Tragoceras peucedanifolium* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(ITA, MIE). URY(ART, SAO).

Isostigma peucedanifolium (Spreng.)Less. var. **speciosum** (Less.) G. PeterSin.: *Isostigma peucedanifolium* (Spreng.)Less. f. *discoidea* Hassl., *Isostigma**peucedanifolium* (Spreng.) Less. f. *radiata*Hassl., *Isostigma speciosum* Less.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(APA, AMA, CAN, COA).

Isostigma simplicifolium Less. var.**riedelii** (Baker) G. PeterSin.: *Isostigma riedelii* (Baker) Chodat,*Isostigma speciosum* Less. var. *riedelii* Baker

Hierba. Endémica. 200-300 m.

Países: BRA(RGS). PRY(AMA, CAU,

CAN, CON, SPE).

Jaegeria Kunth**Jaegeria hirta** (Lag.) Less.Sin.: *Acmella hirta* Lag., *Eclipta**bellidioides* (Spreng.) Sch. Bip. exBlake, *Jaegeria bellidioides* Spreng.,*Jaegeria discoidea* Klatt, *Jaegeria hirta*(Lag.) Less. var. *glabra* Baker, *Jaegeria**mnioides* Kunth, *Jaegeria parviflora* DC.,*Jaegeria repens* DC., *Spilanthes ecliptoides*Gardner, *Spilanthes karvinskiana* DC.,*Spilanthes mariannae* DC., *Spilanthes**sessilifolia* Hemsl.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN,

COA). URY(CLA, COL, RNO, RIV, ROC,

SAO, SOR, TAC, TYT).

Jaumea Pers.**Jaumea linearifolia** (Juss.) DC.Sin.: *Jaumea linearis* Pers., nom. illeg.,*Kleinia linearifolia* Juss.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

URY(CAS, MAL, MON, ROC).

Jungia L. f.**Jungia floribunda** Less.Sin.: *Jungia affinis* Gardner, *Jungia**floribunda* Less. var. *affinis* (Gardner)Baker, *Jungia pubescens* (Lag.) Kuntzevar. *floribunda* (Less.) Kuntze, *Jungia**pubescens* (Lag.) Kuntze var. *tomentosa*Kuntze, *Jungia pyramidalis* D. Don,*Jungia tomentosa* Sch. Bip. ex Baker

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA,

GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV,

ROC, TAC).

Jungia pauciflora RusbySin.: *Jungia herzogiana* P. Beauv. ex J. Kost.,*Jungia mandonii* Sch. Bip., nom. illeg., *Jungia**orbicularis* Rusby, *Jungia pubescens* (Lag.)Kuntze var. *boliviensis* Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Jungia polita Griseb.Sin.: *Jungia divaricata* Rusby, *Jungia**polita* Griseb. var. *divaricata* (Rusby)Kuntze, *Jungia polita* Griseb. var. *glabra*Kuntze, *Jungia polita* Griseb. var.*tomentosa* Kuntze

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-

2700 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,

SJU, SLU, TUC). CHL(TAR).

Jungia sellowii Less.

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Jungia sordida J. Kost.Sin.: *Jungia pubescens* (Lag.) Kuntzevar. *grandistipulata* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 900-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Katinasia Bonifacino**Katinasia cabreræ** (Bonifacino)

Bonifacino

Sin.: *Nardophyllum cabreræ* Bonifacino

Arbusto. Endémica. 700-1600 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Kaunia R.M. King & H. Rob.**Kaunia lasiophthalma** (Griseb.) R.M.

King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium hiemale* Lillo,*Eupatorium lasiophthalmum* Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-1800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Kaunia rufescens (P.W. Lund ex DC.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium rufescens* P.W. Lundex DC., *Eupatorium rufescens* P.W. Lundex DC. var. *glabratum* Hieron. ex B.L.Rob., *Eupatorium rufescens* P.W. Lund exDC. var. *glabratum* Hieron. ex Kuntze,nom. nud., *Eupatorium subtriplinerve*

Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(CON, GUA).

Kaunia saltensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob.Sin.: *Eupatorium saltense* Hieron.,*Eupatorium eucosmum* B.L. Rob.

Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Kieslingia Faúndez, Saldivia & A.E.Martic.**Kieslingia chilensis** Faúndez, Saldivia & A.E.Martic.

Arbusto. Endémica. 1600-2500 m.

Países: CHL(ATA).

Koanophyllon Arruda**Koanophyllon consanguineum** (DC.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium consanguineum* DC.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Koanophyllon lobatifolia (Cabrera)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium lobatifolium* Cabrera

Hierba. Endémica. 500 m.

Países: BRA(SCA).

Koanophyllon simillimum (B.L. Rob.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium laeve* DC., *Eupatorium**laeve* DC. var. *latifolia* Sch. Bip. exHieron., *Eupatorium laeve* DC. var.*macrophyllum* Chodat, *Eupatorium laeve*DC. var. *pubens* B.L. Rob., *Eupatorium**simillimum* B.L. Rob.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,

SCA). PRY(CAU, CEN, CON, COA, GUA,

PAI, PHA, SPE).

Koanophyllon solidaginoides

(Kunth) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium filicaule* Sch. Bip.ex A. Gray, *Eupatorium solidaginoides*Kunth, *Eupatorium stipuliferum* Rusby,*Koanophyllon stipuliferum* (Rusby)R.M. King & H. Rob., *Ophryosporus**solidaginoides* (Kunth) Hieron.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COS, JUJ, SAL,

SDE). PRY(APY, CHO).

Koanophyllon tinctorium Arruda

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(GUA, ITA, MIE, PAI).

Lactuca L.**Lactuca canadensis** L.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Lactuca saligna L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, DFE, LPA, MEN, NEU, SLU). URY(FLA, MON, PAY).

Lactuca sativa L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR). CHL(AYP, TAR, RME).

Lactuca serriola L.

Sin.: *Lactuca scariola* L.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(PAI). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Lactuca virosa L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Laennecia Cass.**Laennecia altoandina** (Cabrera) G.L.

Nesom
Sin.: *Conyza altoandina* Cabrera
Hierba. Endémica. 3900-4200 m.
Países: ARG(JUJ).

Laennecia artemisioides (Meyen & Walp.) G.L. Nesom

Sin.: *Conyza andicola* Phil., *Conyza artemisioides* Meyen & Walp., *Conyza senecioides* (Wedd.) Cabrera, *Erigeron artemisioides* (Meyen & Walp.) Sch. Bip., *Erigeron senecioides* Wedd., *Marsea artemisiaefolia* (Meyen & Walp.) Kuntze
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, RME).

Laennecia sophiifolia (Kunth) G.L.

Nesom
Sin.: *Conyza coulteri* A. Gray var. *tenuisecta* A. Gray, *Conyza pulchella* Kunth, *Conyza serpentaria* Griseb., *Conyza sophiaefolia* Kunth, *Eschenbachia tenuisecta* (A. Gray) Wootton & Standl., *Marsea sophiifolia* (Kunth) Kuntze, *Marsea sophiifolia* (Kunth) V.M. Badillo, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 300-2200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Lagascea Cav., nom. cons.**Lagascea mollis** Cav.

Sin.: *Lagascea campestris* Gardner, *Lagascea kunthiana* Gardner, *Lagascea parvifolia* Klatt, *Nocca mollis* (Cav.) Jacq.
Hierba. Nativa. 100-1300 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, CEN).

Lagenophora Cass.**Lagenophora hariotii** Franch.

Sin.: *Lagenifera hariotii* (Franch.) T.R. Dudley, comb. superfl., *Lagenophora hirsuta* Poepp. ex Less. var. *gracilis* Albov
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Lagenophora hirsuta Poepp. ex Less.

Sin.: *Lagenophora commersonii* Cass. var. *hirsuta* (Poepp. ex Less.) Hook. f., *Lagenophora hirsuta* Skottsbo.
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Lagenophora nudicaulis (Comm. ex Lam.) Dusén

Sin.: *Aster nudicaulis* Comm. ex Lam., *Bellis magellanica* DC., *Calendula magellanica* Willd., *Calendula pusilla* Thouars, *Lagenifera nudicaulis* (Comm. ex Lam.) T.R. Dudley, *Lagenophora commersonii* Cass., *Lagenophora purpurascens* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Lapsana L.**Lapsana communis** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

Lasthenia Cass.**Lasthenia kunthii** (Less.) Hook. & Arn.

Sin.: *Hymenatherum kunthii* Less., *Lasthenia bridgesii* (Poepp. & Endl.) Steud., *Lasthenia chilensis* Steud., nom. nud., *Lasthenia obtusifolia* Cass., *Lasthenia obtusifolia* Cass. var. *bridgesii* (Poepp. & Endl.) DC., *Rancagua bridgesii* Poepp. & Endl., *Rancagua feuillei* (Bertero ex Colla) Poepp. & Endl., *Tagetes feuillei* Bertero ex Colla
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

Leontodon L. f., nom. cons.**Leontodon autumnalis** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(SCR). CHL(VAL, MAG).

Leontodon hirtus L.

Sin.: *Thrinicia hirta* Roth
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: CHL(VAL, BIO, LRI, LLA).

Leontodon saxatilis Lam.

Sin.: *Hyoseris taraxacoides* Vill., nom. superfl., *Leontodon taraxacoides* (Vill.) Willd. ex Mérat., hom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, COR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

Lepidaploa (Cass.) Cass.**Lepidaploa amambaia** H. Rob.

Sin.: *Vernonia amambaia* (H. Rob.) Dematteis
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CEN, CON).

Lepidaploa argyrotricha (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.

Sin.: *Vernonia argyrotricha* Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lepidaploa balansae (Hieron.) H. Rob.

Sin.: *Lessingianthus dorsiventralis* (Chodat) H. Rob., *Vernonia balansae* Hieron., *Vernonia dorsiventralis* Chodat
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Lepidaploa chamissonis (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia chamissonis* (Less.) Kuntze, *Vernonia chamissonis* Less., *Vernonia parodii* Cabrera
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR, SCA). PRY(CHO, PAI, PHA).

Lepidaploa decumbens (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Vernonia decumbens* Gardner
Hierba. Nativa. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lepidaploa eriolepis (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Cacalia eriolepis* (Gardner) Kuntze, *Vernonia eriolepis* Gardner
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lepidaploa novarae (Cabrera) A.J.

Vega & Dematteis
Sin.: *Vernonia novarae* Cabrera
Arbusto. Endémica. 600-1800 m.
Países: ARG(SAL).

Lepidaploa pseudomuricata H. Rob.

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lepidaploa psilostachya (DC.) H.

Rob.
Sin.: *Vernonia oxylepis* Sch. Bip. ex Baker, *Vernonia psilostachya* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, COA).

Lepidaploa remotiflora (Rich.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia hirtiflora* Sch. Bip. ex Baker, *Vernonia leonensis* Cabrera, *Vernonia lithospermoides* Baker, *Vernonia remotiflora* Rich., *Vernonia remotiflora* Rich. var. *tricholepis* (DC.) Baker, *Vernonia sessiliflora* Willd. ex Less., *Vernonia tricholepis* DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Lepidaploa salzmanii (DC.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia argyropappa* H. Buek, *Vernonia herbertii* Cuatrec., *Vernonia miersiana* Gardner, *Vernonia poeppigiana* DC., *Vernonia salzmanii* DC., *Vernonia velutina* Hieron.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Lepidaploa setososquamosa

(Hieron.) M.B. Angulo & Dematteis
Sin.: *Vernonia remotiflora* Rich. var. *aristifera* Cabrera, *Vernonia setososquamosa* Hieron.
Hierba. Nativa. 500-1400 m.
Países: ARG(SAL). PRY(APA, AMA, CAN, CON).

Lepidaploa tarijensis (Griseb.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia tarijensis* (Griseb.) Kuntze, *Vernonia sericea* Rich. var. *tarijensis* Griseb., *Vernonia tarijensis* (Griseb.) Hieron.
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL).

Lepidophyllum Cass.**Lepidophyllum cupressiforme** (Lam.)

Cass.
Sin.: *Baccharis cupressiformis* (Lam.) Pers., *Conyza cupressiformis* Lam., *Gutierrezia cupressiformis* (Lam.) Sch. Bip., *Athanasia cupressiformis* (Lam.) Comm. ex Cass., *Brachyridium cupressiforme* (Lam.) Meisn., nom. illeg., *Grindelia cupressiformis* (Lam.) Sch. Bip. ex Reiche
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Leptinella Cass.**Leptinella scariosa** Cass.

Sin.: *Cotula acaenoides* (Hook. & Arn.) Alb., *Cotula hombronii* Franch., *Cotula scariosa* (Cass.) Franch., *Leptinella acaenoides* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, LRI, LLA, AIS, MAG).

Leptocarpha DC.**Leptocarpha rivularis** DC.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Leptostelma D. Don**Leptostelma catharinense** (Cabrera)

A. Teles & Sobral
Sin.: *Erigeron catharinensis* Cabrera
Hierba. Endémica. 1200-2000 m.
Países: BRA(SCA).

Leptostelma maxima D. Don

Sin.: *Aster maximus* (D. Don) Less., *Erigeron alpestris* Gardner, *Erigeron maximus* (D. Don) DC. var. *minor* Baker, *Erigeron maximus* (D. Don) DC. var. *palustris* (Gardner) Baker, *Erigeron maximus* (D. Don) DC., *Erigeron palustris* Gardner, *Erigeron scaberrimus* Gardner, *Erigeron schuchtii* Sch. Bip., nom. nud., *Erigeron sulcatum* DC.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA, PAI).

Leptostelma meyeri (Cabrera) A. Teles

Sin.: *Erigeron meyeri* Cabrera
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, ERI).

Leptostelma tucumanense (Cabrera)

A. Teles
Sin.: *Erigeron tucumanensis* Cabrera
Hierba. Endémica. 2400-2600 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Leptostelma tweediei (Hook. & Arn.)

D. J. N. Hind & G.L. Nesom
Sin.: *Erigeron tweediei* Hook. & Arn., *Erigeron seneciiformis* S.F. Blake, *Haplopappus tweediei* (Hook. & Arn.) Malme, *Leucopsis tweediei* (Hook. & Arn.) Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).

Lessingianthus H. Rob.**Lessingianthus alegretensis** Deble &

R. Matielo
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Lessingianthus arachniolepis

(Ekman ex Dusén) H. Rob.
Sin.: *Vernonia arachniolepis* Ekman ex Dusén
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Lessingianthus argenteus (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia argentea* (Less.) Kuntze, *Vernonia argentea* Less.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN).

Lessingianthus asteriflorus (Mart. ex DC.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia asteriflora* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Vernonia asteriflora* Mart. ex DC., *Vernonia kuntzei* Hieron., *Cacalia kuntzei* (Hieron.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, GUA).

Lessingianthus bardanoides (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia bardanoides* (Less.) Kuntze, *Vernonia bardanoides* Less., *Vernonia cirsiiflora* Mart. ex Baker, *Vernonia reticulata* Gardner

Arbusto. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

Lessingianthus bellulus (Dematteis) M.B. Angulo

Sin.: *Vernonia bellula* Dematteis

Subarbusto. Nativa. 600 m.

Países: PRY(CAN).

Lessingianthus brevifolius (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia brevifolia* (Less.) Kuntze var. *ericifolia* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Cacalia brevifolia* (Less.) Kuntze, *Vernonia brevifolia* Less. var. *ericifolia* (Hook. & Arn.) Baker, *Vernonia brevifolia* Less. var. *squarrosifoliata* Hieron., *Vernonia brevifolia* Less., *Vernonia ericifolia* Hook. & Arn., *Vernonia filifolia* Mart., *Vernonia linosyrifolia* Chodat f. *major* Chodat, *Vernonia linosyrifolia* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, SAO, TAC).

Lessingianthus cataractum (Hieron.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia cataractarum* Hieron.

Arbusto. Endémica. 300-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lessingianthus centauropsideus (Hieron.) M.B. Angulo & Dematteis

Sin.: *Vernonia centauropsidea* Hieron.

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(SAL).

Lessingianthus conceptionis M.B. Angulo & Dematteis

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.

Países: PRY(CON).

Lessingianthus constrictus

(Matzenb. & Mafioleti) Dematteis

Sin.: *Vernonia constricta* Matzenb. & Mafioleti

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

Lessingianthus correntinus (Cabrera & Cristóbal) Dematteis

Sin.: *Vernonia correntina* Cabrera & Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Lessingianthus durus (Mart. ex DC.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia dura* Mart. ex DC.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Lessingianthus elegans (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Vernonia elegans* Gardner

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Lessingianthus exiguus (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonia exigua* Cabrera

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lessingianthus glabratus (Less.)

H. Rob. var. **angustifolius** (Cabrera) Dematteis

Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var. *angustifolia* Cabrera

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

Lessingianthus glabratus (Less.) H. Rob. var. **glabratus**

Sin.: *Cacalia glabrata* (Less.) Kuntze, *Cacalia lappoides* (Baker) Kuntze, *Cacalia radula* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Vernonia ensifolia* Mart., *Vernonia glabrata* Less. f. *oxyphylla* Chodat, *Vernonia glabrata* Less. var. *cuneifolia* Chodat, *Vernonia glabrata* Less. var. *glabrata*, *Vernonia glabrata* Less. var. *serrata* Chodat, *Vernonia lappoides* Baker, *Vernonia oxyodonta* Malme, *Vernonia radula* Mart. ex DC. var. *latifolia* DC. *Vernonia radula* Mart. ex DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(RIV, SAO, TAC).

Lessingianthus grandiflorus (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia grandiflora* Less.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, SPE).

Lessingianthus hasslerianus (Chodat) M.B. Angulo

Sin.: *Vernonia hassleriana* Chodat

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: PRY(AMA, CAN, ITA).

Lessingianthus hypochaeris (DC.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia hypochaeris* (DC.) Kuntze, *Vernonia hypochaeris* DC.

Hierba. Nativa. 300-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, CAN).

Lessingianthus intermedius (DC.) Dematteis

Sin.: *Cacalia intermedia* (DC.) Kuntze, *Vernonia intermedia* DC., *Vernonia linearifolia* Hook. & Arn., *Vernonia squarrosa* (D. Don) Less. var. *angustifolia* Less.

Subarbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(ERI). BRA(RGS).

URY(MAL, MON).

Lessingianthus lanatus (Chodat) Dematteis

Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var. *lanata* Chodat, *Vernonia lanata* (Chodat) Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, COA, GUA, PAI).

Lessingianthus laniferus (Cristóbal & Dematteis) M.B. Angulo

Sin.: *Vernonia lanifera* Cristóbal & Dematteis

Subarbusto. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lessingianthus lorentzii (Hieron.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia lorentzii* Hieron.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

Lessingianthus macrocephalus (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia macrocephala* Less.

Subarbusto. Endémica. 100-400 m.

Países: BRA(RGS). URY(CLA, MON, RIV, TAC).

Lessingianthus macrophyllus (Less.)

H. Rob.

Sin.: *Cacalia macrophylla* (Less.)
Kuntze, *Vernonia macrophylla* Less.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Lessingianthus magnificus Deble,

Dematteis & Marchiori

Sin.: *Vernonia magnifica* (Deble,
Dematteis & Marchiori) Dematteis
Arbusto. Endémica. 100-400 m.
Países: BRA(RGS).

Lessingianthus mollissimus (D.

Don ex Hook. & Arn.) H. Rob. var.

microcephalus (Hieron.) Dematteis

Sin.: *Vernonia mollissima* D. Don ex
Hook. & Arn. var. *microcephala* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR, COS, MIS).

Lessingianthus mollissimus (D.

Don ex Hook. & Arn.) H. Rob. var.

mollissimus

Sin.: *Cacalia mollissima* (D. Don ex Hook. &
Arn.) Kuntze, *Vernonia mollissima* D. Don ex
Hook. & Arn. var. *mollissima*
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA,
CAU, CAN).

Lessingianthus niederleinii (Hieron.)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia hystricosa* Cabrera &
Dematteis, *Vernonia microdonta* Sch. Bip.
ex Baker, nom. nud., *Vernonia niederleinii*
Hieron., *Vernonia valenzuelae* Chodat
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU,
CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI,
PHA, SPE).

Lessingianthus paraguariensis

Dematteis

Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(AMA).

Lessingianthus parvifolius (Chodat)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var.
parvifolia Chodat, *Vernonia parvifolia*
(Chodat) Cabrera
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CEN, COA, PAI).

Lessingianthus plantaginodes

(Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia plantaginoides* (Less.)
Kuntze, *Vernonia plantaginoides* (Less.)
Hieron., *Vernonia pseudosquarrosa*
Hieron., *Vernonia rubricaulis* Bonpl. f.
plantaginoides Less., *Vernonia rubricaulis*
Bonpl. f. *squarrosa* Less., *Vernonia*
squarrosa (Less.) Less, nom. illeg.,
Vernonia squarrosa (Less.) Less. var.
plantaginea Less., *Vernonia squarrolosa*
Mattf. ex Malme
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Lessingianthus platyphyllus

(Chodat) H. Rob.

Sin.: *Vernonia platyphylla* Chodat
Subarbusto. Endémica. 400-800 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAN).

Lessingianthus polyphyllus (Sch. Bip.

ex Baker) H. Rob.

Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var.
linearifolia Chodat, *Vernonia glabrata*
Less. var. *bracteata* Chodat, *Vernonia*
polyphylla Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN,
COA, MIE).

Lessingianthus profusus (Dematteis

& Cabrera) M.B. Angulo

Sin.: *Vernonia profusa* Dematteis &
Cabrera
Subarbusto. Endémica. 600-800 m.
Países: PRY(AMA, CAN, COA).

Lessingianthus pseudoincanus

(Hieron.) Dematteis & M.B. Angulo

Sin.: *Cacalia rubricaulis* (Bonpl.)
Kuntze var. *pseudoincana* (Hieron.)
Kuntze, *Vernonia acutifolia* Hook. var.
ambigua DC., *Vernonia pseudoincana*
(Hieron.) Cabrera, *Vernonia rubricaulis*
Bonpl. f. *latifolia* Less., *Vernonia*
rubricaulis Bonpl. var. *denudata*
Baker, *Vernonia rubricaulis* Bonpl. var.
pseudoincana Hieron., *Vernonia salicifolia*
Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, MEN, SAL, SLU, SFE, SDE).
BRA(RGS). PRY(CEN, ÑEE). URY(ROC).

Lessingianthus psilophyllus (DC.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia graminifolia* (Gardner)
Kuntze, *Cacalia psilophylla* (DC.) Kuntze,

Vernonia graminifolia Gardner, *Vernonia*
psilophylla DC.

Subarbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Lessingianthus pubescens M.B.

Angulo & Dematteis

Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var.
puberula Chodat
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(APA, APY,
AMA, CAU, CEN, CON, COA, MIE, SPE).

Lessingianthus pumillus (Vell.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia sessilifolia* Less.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA,
CAN, CON).

Lessingianthus pusillus (Dematteis)

M.B. Angulo

Sin.: *Vernonia pusilla* Dematteis
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE,
SDE). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, COA,
MIE, PAI, PHA).

Lessingianthus ramellae (Cabrera)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia ramellae* Cabrera, *Vernonia*
sessilifolia Less. var. *auriculata* Chodat
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(PAI).

Lessingianthus reitzianus (Cabrera)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia reitziana* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1200-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lessingianthus rubricaulis (Bonpl.)

H. Rob.

Sin.: *Cacalia rubricaulis* (Bonpl.)
Kuntze, *Vernonia chromolepis* Gardner,
Vernonia intermedia DC. var. *ramosior*
DC., *Vernonia linearis* D. Don ex Hook.
& Arn., nom. nud., *Vernonia rubricaulis*
Bonpl. f. *bonplandiana* Less., nom. illeg.
Vernonia rubricaulis Bonpl. var. *australis*
Hieron., *Vernonia rubricaulis* Bonpl.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,
AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA,
GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(PAY, RIV).

Lessingianthus saltensis (Hieron.)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia saltensis* Hieron.

Subarbusto. Nativa. 300-1300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Lessingianthus sanctipauli (Hieron.)

Dematteis

Sin.: *Vernonia sanctipauli* Hieron

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lessingianthus sellowii (Less.) H. Rob.Sin.: *Cacalia sellowii* (Less.) Kuntze, *Vernonia sellowii* Less.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, MIE). URY(ART, MON, PAY, RIV, TAC).

Lessingianthus spicatus (Cabrera)

Dematteis

Sin.: *Vernonia spicata* Cabrera

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(MIS).

Lessingianthus teyucuarensis

(Cabrera) Dematteis

Sin.: *Vernonia teyucuarensis* Cabrera

Subarbusto. Endémica. 100-300 m.

Países: ARG(MIS).

Lessingianthus ulei (Hieron.) H. Rob.Sin.: *Vernonia ulei* Hieron.

Subarbusto. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lessingianthus varroniifolius (DC.)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia varroniifolia* DC.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Lessingianthus westermanii (Ekman

& Dusén ex Malme) H. Rob.

Sin.: *Vernonia westermanii* Ekman &

Dusén ex Malme

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Leucanthemum Mill.**Leucanthemum vulgare** Lam.Sin.: *Chrysanthemum leucanthemum* L., *Leucanthemum leucanthemum* (L.) Rydb., nom. inval., *Tanacetum leucanthemum*

(L.) Sch. Bip.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF).

BRA(RGS). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME). URY(CAS, COL, MON, SJO, SOR).

Leucheria Lag.**Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.Sin.: *Chabraea fragans* Phil., *Chabraea multifida* DC., *Lasiorrhiza achillaeifolia* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Lasiorrhiza anthemidifolia* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza fragans* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza multifida* (DC.) Kuntze, *Lasiorrhiza ibari* (Phil.) Macloskie, *Leuceria anthemidifolia* Phil., *Leuceria ibari* Phil., *Leuceria ibari* Phil. var. *glabrata* Speg., *Leuceria ibari* Phil. var. *glandulosa* Speg., *Leuceria multifida* (DC.) S. Moore

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

Leucheria amoena Phil.

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU).

Leucheria apiifolia Phil.

Hierba. Endémica. 2500 m.

Países: CHL(MAU).

Leucheria arancioi Jara-Arancio,

Ratto & A. Bartoli

Sin.: *Leucheria diemii* Cabrera var.*purpurea* Ratto, Bello & A. Bartoli

Hierba. Endémica. 1200-1300 m.

Países: ARG(SCR).

Leucheria bridgesii Hook. & Arn.Sin.: *Chabraea pulchella* Phil.,*Lasiorrhiza pulchella* (Phil.) Kuntze, comb. illeg., *Leuceria microcephala* Reiche

Hierba. Endémica. 1000-3300 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Leucheria candidissima D. DonSin.: *Chabraea candidissima* (D. Don)DC., *Lasiorrhiza candidissima* (D. Don) Macloskie, *Leuceria candidissima* D. Don f. *subintegra* Skottsb., *Leuceria laciniata* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 2000-3200 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, RME).

Leucheria cerberoana J. RemySin.: *Leuceria glabrata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Leucheria coerulescens J. RemySin.: *Leucheria aurita* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Leucheria congesta D. DonSin.: *Chabraea canescens* Phil., *Lasiorrhiza glomerulata* Kuntze, *Leuceria canescens* (Phil.) Reiche, *Leuceria glomerulata* (Kuntze) K. Schum., *Leuceria sonchoides* Phil.

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Leucheria cumingii Hook. & Arn.Sin.: *Chabraea modesta* Phil., *Leuceria**debilis* Phil., *Leuceria modesta* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Leucheria daucifolia (D. Don) CrisciSin.: *Chabraea daucifolia* (D. Don)Wedd., *Chabraea laciniata* Wedd.,*Ptilurus daucifolius* D. Don

Hierba. Nativa. 2600-4800 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Leucheria diemii Cabrera

Hierba. Endémica. 1500-2100 m.

Países: ARG(NEU, SCR).

Leucheria eriocephala Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SCR).

Leucheria floribunda DC.Sin.: *Eizaguirrea candollei* J. Remy, nom. inval., *Eizaguirrea cirsioides* Phil., *Eizaguirrea sonchifolia* Turcz., *Lasiorrhiza floribunda* (DC.) Kuntze, *Leuceria racemosa* Phil., *Leuceria sonchifolia* (Turcz.) Reiche

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Leucheria garciana J. Remy

Hierba. Endémica. 2500 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

Leucheria gayana (J. Remy) Reiche

Sin.: *Chabraea gayana* J. Remy, *Leuceria nudicaulis* Phil., *Leuceria popetana* Phil.

Hierba. Endémica. 1800-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Leucheria gilliesii Hook. & Arn.

Sin.: *Leuceria hieracioides* D. Don, hom. illeg., *Leuceria nivea* Phil.

Hierba. Endémica. 1900-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, ARA, RME).

Leucheria glabriuscula (Phil.) Reiche

Sin.: *Chabraea glabriuscula* Phil.

Hierba. Endémica. 1000 m.

Países: CHL(RME).

Leucheria glacialis (Poepp. ex Less.)

Reiche

Sin.: *Chabraea glacialis* (Poepp. ex Less.) DC., *Lasiorrhiza glacialis* Poepp. ex Less., *Leuceria araucana* Phil., *Leuceria discolor* Phil., *Leuceria glacialis* (Poepp. ex Less.) Reiche var. *longifolia* (Phil.) Cabrera, *Leuceria longifolia* Phil., *Leuceria pauciflora* Phil., *Leuceria thermanum* (Phil.) Reiche var. *araucana* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-2600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Leucheria glandulosa D. Don

Sin.: *Chabraea elongata* Bertero ex Colla, *Chabraea glandulosa* (D. Don) DC., *Lasiorrhiza glandulosa* (D. Don) DC., *Leuceria peduncularis* J. Remy

Hierba. Endémica. 600-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

Leucheria graui Katinas, M.C. Tellería & Crisci

Hierba. Endémica. 2200-2400 m.

Países: CHL(MAU).

Leucheria hahnii Franch.

Sin.: *Chabraea integrifolia* Phil., hom. illeg., *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC. var. *integrifolia* Sch. Bip., nom. nud., *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC. var. *pinnatifida* Sch. Bip., nom. nud., *Lasiorrhiza fueguiana* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza gracilis* (Albov) Macloskie, *Lasiorrhiza hahnii* (Franch.) Macloskie, *Lasiorrhiza lanata* (Albov) Macloskie, *Lasiorrhiza patagonica* (Speg.) Macloskie, *Leuceria fuegina* Phil., *Leuceria gracilis*

Albov, *Leuceria hahnii* Franch. var. *lanata* (Albov) Cabrera, *Leuceria lanata* Albov f. *virescens* Albov, *Leuceria lanata* Albov, *Leuceria patagonica* Speg., *Leuceria gossypina* Hook. & Arn. var. *integrifolia* Sch. Bip., *Leuceria gossypina* Hook. & Arn. var. *pinnatifida* Sch. Bip., *Leuceria integrifolia* (Phil.) Reiche ex B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Leucheria hieracioides Cass.

Sin.: *Chabraea prenanthoides* Bertero, *Lasiorrhiza acanthoides* (D. Don) Kuntze, *Lasiorrhiza hieracioides* (Cass.) Kuntze, *Leuceria acanthoides* D. Don, *Leuceria divaricata* D. Don

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Leucheria leontopodioides (Kuntze)

K. Schum.

Sin.: *Lasiorrhiza hoffmannii* (Dusén) Macloskie, *Lasiorrhiza lanigera* (O. Hoffm. ex Dusén) Macloskie, *Lasiorrhiza leontopodioides* Kuntze, *Leuceria hoffmannii* Dusén, *Leuceria lanigera* O. Hoffm. ex Dusén

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(MEN, SCR, TDF). CHL(MAG).

Leucheria lithospermifolia (Less.)

Reiche subsp. **integrifolia** (Phil.) Grau & Zinnecker

Sin.: *Chabraea integrifolia* Phil.,

Leuceria integrifolia (Phil.) Crisci

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

Leucheria lithospermifolia

(Poepp. ex Less.) Reiche subsp.

lithospermifolia

Sin.: *Chabraea lithospermifolia* (Poepp. ex Less.) DC., *Lasiorrhiza lithospermifolia* Poepp. ex Less., *Leuchaeria volcanica* Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 1400-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Leucheria magna Phil.

Sin.: *Lasiorrhiza stricta* (Phil.)

Macloskie, *Leuceria stricta* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(ARA, AIS).

Leucheria meladensis Katinas, Crisci & A.E. Martic.

Hierba. Endémica. 1000-1100 m.

Países: CHL(MAU).

Leucheria menana J. Remy

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Leucheria millefolium Dusén & Skottsbo.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

Leucheria multiflora Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Leucheria nutans (J. Remy) Reiche

Sin.: *Chabraea nutans* J. Remy, *Chabraea poeppigii* Phil., *Clybatis volkmanii* Phil., *Lasiorrhiza nutans* (J. Remy) Kuntze

Hierba. Endémica. 1300-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA).

Leucheria oligocephala J. Remy

Sin.: *Trixis senecioides* Hook.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Leucheria paniculata Poepp. ex Less.

Hierba. Endémica. 0-2800 m.

Países: ARG(RNE). CHL(BIO, ARA, MAG, RME).

Leucheria papillosa Cabrera

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Leucheria polyclados (J. Remy) Reiche

Sin.: *Chabraea polyclados* J. Remy

Hierba. Endémica. 3000-3100 m.

Países: CHL(ATA).

Leucheria pteropogon (Griseb.)

Cabrera

Sin.: *Senecio pteropogon* Griseb.

Hierba. Endémica. 3500-0 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(ANT).

Leucheria purpurea (Vahl) Hook. & Arn.

Sin.: *Chabraea purpurea* (Vahl) DC., *Lasiorrhiza purpurea* (Vahl) Less., *Leuceria purpurea* (Vahl) S. Moore ex Rendle, *Perdicium purpureum* Vahl

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Leucheria rosea Poepp. ex Less.

Sin.: *Lasiorrhiza rosea* Less. var. *albiflora* Kuntze, *Lasiorrhiza rosea* Less. var. *andryaloides* (DC.) Kuntze, comb. illeg., *Leuceria andryaloides* DC., nom. superfl., *Leucheria lepida* Phil.

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Leucheria runcinata D. Don

Sin.: *Chabraea barrasiana* J. Remy, *Chabraea concinna* Phil., *Chabraea coquimbana* Phil., *Chabraea landbeckii* Phil., *Chabraea oligocephala* Phil., *Chabraea runcinata* (D. Don) Hook., *Chabraea tenerifolia* Phil., *Leuceria barrasiana* (J. Remy) F. Meigen, comb. superfl., *Leuceria barrasiana* (J. Remy) Reiche var. *tenerifolia* (Phil.) Reiche, *Leuceria barrasiana* (J. Remy) Reiche, comb. superfl., *Leuceria concinna* (Phil.) Reiche, *Leuceria coquimbana* (Phil.) Reiche, *Leuceria meyeniana* Walp., *Leuceria paucicapitata* Reiche, *Leucheria landbeckii* (Phil.) Reiche, *Leucheria tenerifolia* (Phil.) Phil.

Hierba. Endémica. 3000-0 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Leucheria salina (J. Remy) Hieron.

subsp. **salina**

Sin.: *Chabraea salina* J. Remy, *Chabraea salinasi* Phil. var. *bipinnatifida* Phil., *Lasiorrhiza salina* (J. Remy) Kuntze, *Leuceria salina* (J. Remy) Dusén, comb. superfl., *Leuceria salina* (J. Remy) Reiche

Hierba. Endémica. 2000-4500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Leucheria salina (J. Remy) Hieron.

subsp. **zöllneri** Crisci

Hierba. Endémica. 3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, LBO, RME).

Leucheria scrobiculata D. Don

Sin.: *Chabraea glabra* DC., *Chabraea scrobiculata* (D. Don) DC., *Chabraea scrobiculata* (D. Don) DC. var. *pentacephala* Phil., *Lasiorrhiza glabra* (DC.) Kuntze, *Lasiorrhiza scrobiculata* (D. Don) Kuntze, *Leuceria scrobiculata* D. Don var. *glabra* (DC.) Hauman, *Mimela pedicularifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 1900-3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(VAL, LBO, RME).

Leucheria senecioides Hook. & Arn.

Sin.: *Chabraea abbreviata* Bertero ex Colla, *Chabraea cinerea* (D. Don) DC., *Lasiorrhiza cinerea* (D. Don) Less., *Lasiorrhiza senecioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Leuceria abbreviata* (Bertero) Steud., *Leuceria cinerea* D. Don, *Leuceria senecioides* Hook. & Arn. var. *purpurescens* DC.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Leucheria suaveolens (d'Urv.) Speg.

Sin.: *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC., *Lasiorrhiza ceterachifolia* Cass., *Lasiorrhiza gossypina* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Lasiorrhiza suaveolens* (d'Urv.) Macloskie, *Lasiorrhiza viscosa* Cass., *Leuceria suaveolens* (d'Urv.) Druce, comb. superfl., *Leuceria suaveolens* (d'Urv.) Skottsb., *Leucheria gossypina* Hook. & Arn., *Leucheria suaveolens* (d'Urv.) Rob., comb. superfl., *Perdicium suaveolens* d'Urv., *Picris macloviana* d'Urv., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(TDF).

Leucheria tenuis Less.

Sin.: *Chabraea berteroniana* Steud., *Chabraea tenuior* Bertero ex Colla

Hierba. Endémica. 900-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, ARA, RME).

Leucheria thermanum (Phil.) Phil.

Sin.: *Chabraea thermanum* Phil., *Leuceria thermanum* (Phil.) Reiche, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Leucheria tomentosa (Less.) Crisci

Sin.: *Chabraea tomentosa* (Less.) DC., *Lasiorrhiza pulchella* (D. Don) Steud., *Lasiorrhiza tomentosa* Less., *Leuceria eriochlaena* J. Remy, *Leuceria pulchella* D. Don

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Leucheria viscida (Bertero ex Colla) Crisci

Sin.: *Chabraea rosea* DC., *Chabraea viscida* Bertero ex Colla, *Chabraea viscida* Bertero ex DC., nom. nud., *Lasiorrhiza philippiana* Kuntze, *Lasiorrhiza rosea* Less., *Leuceria chillanensis* Reiche, *Leuceria glandulosa* Phil., nom. illeg., *Leuceria leucomalla* Phil., *Leuceria neaei* DC., *Leuceria rosea* (Less.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Leunisia Phil.**Leunisia laeta** Phil.

Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Liabum Adans.**Liabum acuminatum** Rusby

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1100 m.
Países: ARG(SAL).

Logfia Cass.**Logfia gallica** (L.) Coss. & Germ.

Sin.: *Filago gallica* L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Lomanthus B. Nord. & Pelser**Lomanthus bangii** (Rusby) B. Nord. & Pelser

Sin.: *Senecio bangii* Rusby

Subarbusto. Nativa. 3000-3700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Lophopappus Rusby**Lophopappus cuneatus** R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 2800-4000 m.
Países: ARG(JUJ). CHL(TAR).

Lophopappus foliosus Rusby

Sin.: *Proustia foliosa* (Rusby) Ferreyra

Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR).

Lophopappus tarapacanus (Phil.)

Cabrera

Sin.: *Gochnatia tarapacana* Phil.

Arbusto. Nativa. 2200-4700 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Lorentzianthus R.M. King & H. Rob.**Lorentzianthus viscidus** (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium viscidum* Hook. & Arn., *Eupatorium viscidum* Hook. & Arn. var. *protractum* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1600-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Lucilia Cass.**Lucilia acutifolia** (Poir.) Cass.

Sin.: *Gnaphalium commersonii* Spreng., nom. superfl., *Gnaphalium jamesonii* (Baker) Kuntze, *Gnaphalium virescens* (Less.) Kuntze, *Helichrysum montevidense* Spreng., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. f. *microphylla* (Cass.) Less., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. f. *nivea* Less., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. f. *virescens* Less., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. var. *virescens* (Less.) DC., *Lucilia jamesonii* Baker, *Lucilia lundii* Baker, *Lucilia microphylla* Cass., *Pachyrhynchus xeranthemoides* DC., *Serratula acutifolia* Poir.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, PAI). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

Lucilia ferruginea Baker

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Lucilia kunthiana (DC.) Zardini

Sin.: *Belloa kunthiana* (DC.) Anderb. & S.E. Freire, *Conyza kunthiana* DC., *Conyza pusilla* Kunth, hom. illeg., *Gnaphalium kunthianum* (DC.) Kuntze, *Lucilia affinis* Wedd., *Lucilia pusilla* Hieron., *Lucilia venezuelensis* Steyerl., *Lucilia violacea* Wedd., *Merope kunthiana* (DC.) Wedd., *Mniodes kunthiana* (DC.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Hierba. Nativa. 3200-5000 m.

Países: ARG(JUJ). CHL(AYP).

Lucilia linearifolia Baker

Hierba. Nativa. 100-2200 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lucilia lycopodioides (Less.) S.E. Freire

Sin.: *Hymenopholis imbricata* Gardner, *Lucilia flagelliformis* Wedd., *Lucilia glomerata* Baker, *Oligandra lucilioides* Less., *Oligandra lycopodioides* Less.

Hierba. Nativa. 900-2100 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lucilia nitens Less.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC).

Lucilia recurva Wedd.

Hierba. Nativa. 2500-2800 m.

Países: ARG(SAL).

Lucilia tomentosa Wedd.

Sin.: *Lucilia squarrosa* Baker

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.

Países: BRA(PAR).

Lulia Zardini**Lulia nervosa** (Less.) Zardini

Sin.: *Trichocline nervosa* Less.

Hierba. Nativa. 800-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lycapsus Phil.**Lycapsus tenuifolius** Phil.

Sin.: *Alomia tenuifolia* (Phil.) Benth. & Hook. f. ex Reiche

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(IDE).

Macrachaenium Hook. f.**Macrachaenium gracile** Hook. f. var. **gracile**

Sin.: *Macrachaenium foliosum* Albov

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Macrachaenium gracile Hook. f. var. **radiatum** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Macropodina R.M. King & H. Rob.**Macropodina blumenavii** (Hieron.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium blumenavii* Hieron., *Eupatorium blumenavii* Hieron. f. *major* Hieron.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA).

Macropodina reitzii R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium kingii* Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(SCA).

Madia Molina**Madia chilensis** (Nutt.) Reiche

Sin.: *Madariopsis chilensis* Nutt.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Madia sativa Molina

Sin.: *Madia viscosa* Cav.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Malacothrix DC.**Malacothrix clevelandii** A. Gray

Sin.: *Malacothrix senecioides* Reiche, *Crepis geisseana* Phil.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Malacothrix coulteri Harv. & A. Gray ex A. Gray

Sin.: *Zollikoferia elquiensis* Phil., *Malacolepis coulteri* (Harv. & A. Gray ex A. Gray) A. Heller, *Malacothrix coulteri* Harv. & A. Gray ex A. Gray var. *cognata* Jeps.

Hierba. Introducida. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ).

Malmeanthus R.M. King & H. Rob.**Malmeanthus catharinensis** R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium subintegerrimum*

Malme var. *aliciae* Cabrera

Árbol. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(SCA).

Malmeanthus subintegerrimum (Malme) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium subintegerrimum*

Malme var. *subintegerrimum*

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA).

PRY(APA, ITA). URY(ART, RIV, TAC).

Marticoenia Crisci**Marticoenia foliosa** (Phil.) Crisci

Sin.: *Lasiorrhiza foliosa* (Phil.) Kuntze, *Leuceria foliosa* Phil.

Arbusto. Endémica. 2700-3300 m.

Países: CHL(ATA, VAL, RME).

Matricaria L., nom. cons.**Matricaria chamomilla** L.

Sin.: *Chamomilla recutita* (L.)
Rausch., *Chamomilla vulgaris* Gray,
Chrysanthemum chamomilla (L.) Bernh.,
Matricaria chamomilla L. var. *recutita* (L.)
Grierson, *Matricaria recutita* L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,
DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU,
RNE, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA).
CHL(ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA,
LLA, RME, JFE). PRY(CAA). URY(CAS,
CLA, MON, SJO).

Matricaria discoidea DC.

Sin.: *Artemisia matricarioides* Less.,
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.,
Santolina suaveolens Pursh

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,
RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Melampodium L.**Melampodium divaricatum** (Rich.) DC.

Sin.: *Dysodium divaricatum* Rich.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Melanthera Rohr**Melanthera latifolia** (Gardner)

Cabrera
Sin.: *Echinocephalum angustifolium*
Gardner, *Echinocephalum lanceolatum*
Gardner, *Echinocephalum latifolium*
Gardner

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, APA, AMA, CAA, CEN).
URY(ART, PAY, RNO, SAO).

Mesanthophora H. Rob.**Mesanthophora brunneri** H. Rob.

Sin.: *Vernonia brunneri* (H. Rob.) Cabrera
Hierba. Nativa. 100-200 m.
Países: PRY(CON).

Mesanthophora rojasii (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonia rojasii* Cabrera
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CEN).

Microgyne Less.**Microgyne marchesiana** Bonifacino

& Sancho
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: URY(TAC).

Microgyne trifurcata Less.

Sin.: *Erigeron tridactylus* DC.,
Microgynella trifurcata (Less.) Grau,
Vittadinia trifurcata (Less.) Griseb.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
ERI, LPA, SDE, SFE, SLU). BRA(RGS).
URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL,
MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).

Microliabum Cabrera**Microliabum candidum** (Griseb.) H. Rob.

Sin.: *Austroliabum candidum*
(Griseb.) H. Rob. & Brettell, *Liabum*
auriculatum Griseb., *Liabum candidum*
Griseb., *Liabum candidum* Griseb. var.
subcirrhosum (S.F. Blake) Cabrera,
Liabum subcirrhosum Blake
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-
2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU, TUC).

Microliabum eremophilum (Cabrera)

H. Rob.
Sin.: *Austroliabum eremophilum*
(Cabrera) H. Rob. & Brettell, *Liabum*
eremophilum Cabrera

Hierba o subarbusto. Endémica.
2500-3000 m.

Países: ARG(LRI, SAL, TUC).

Microliabum glanduliferum

(Cabrera) H. Rob.
Sin.: *Liabum candidum* Griseb. var.
glanduliferum Cabrera
Hierba. Endémica. 800-1400 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Microliabum humile (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Angelianthus humilis* (Cabrera) H. Rob.
& Brettell, *Liabellum humile* Cabrera
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Microliabum mulgediifolium

(Muschl.) H. Rob.
Sin.: *Austroliabum mulgediifolium*
(Muschl.) H. Rob. & Brettell, *Liabum*
mulgediifolium Muschl,
Hierba o subarbusto. Nativa. 1200-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Microliabum polymnioides (R.E. Fr.)

H. Rob.
Sin.: *Austroliabum polymnioides*
(R.E. Fr.) H. Rob. & Brettell, *Liabum*
polymnioides R.E. Fr.
Hierba o subarbusto. Nativa. 600-
2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Micropsis DC.**Micropsis australis** Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, LPA, RNE).

Micropsis dasycarpa (Griseb.)

Beauverd
Sin.: *Filago dasycarpa* Griseb.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU,
CEN, COA, MIE, PAI). URY(ART, CLA,
COL, FLA).

Micropsis nana DC.

Sin.: *Lasiophyton pusillum* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 300-2500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME, JFE).

Micropsis ostenii Beauverd

Sin.: *Micropsis bonaerensis* Manganaro
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).
URY(CAS, FLA, PAY, SAO, SJO, SOR, TAC).

Micropsis spathulata (Pers.) Cabrera

Sin.: *Evax spathulata* Pers.,
Gnaphalium bracteatum Willd., nom.
illeg., *Gnaphalium involucrellum* Lam.,
hom. illeg., *Micropsis herterii* Beauverd,
Micropsis involucrellum Cabrera, *Micropsis*
nana Speg., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO,
FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).

Microseris D. Don**Microseris pygmaea** D. Don

Sin.: *Bellardia pusilla* Colla, *Fichtea*
poeppigii Sch. Bip., *Hyoseris tenella*
Poepp., *Krigia chilensis* Nees, *Krigia*
pinnatifida Bertero ex DC., *Krigia*
chilensis Bertero, *Krigia pusilla* Hort ex
DC., *Lepidonema chilense* Fisch. & C.A.
Mey., *Microseris brevipes* Phil.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Mikania Willd.**Mikania anethifolia** (DC.) Matzenb.

Sin.: *Eupatorium anethifolium* DC., *Mikania carvifolia* Hieron. ex Arechav., *Mikania verticillata* Sch. Bip. ex Baker
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Mikania anisodora Hassl.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA).

Mikania argyreiae DC.

Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, PAI).

Mikania barrosoana G.M.Barroso

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Mikania buchtienii B.L. Rob.

Liana. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Mikania buddleiaefolia DC.

Sin.: *Mikania discolor* Baker
Liana. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania burchellii Baker

Sin.: *Mikania salicifolia* Hassl., *Willoughbya burchellii* (Baker) Kuntze, *Willoughbya campanulata* (Gardner) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, GUA).

Mikania calcarulata B.L. Rob.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Mikania campanulata Gardner

Sin.: *Mikania sublaxa* Malme
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania capricorni B.L. Rob.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania chlorolepis Baker

Sin.: *Willoughbya chlorolepis* Baker
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

Mikania clematidifolia Dusén

Enredadera. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania cordifolia (L. f.) Willd.

Sin.: *Cacalia cordifolia* L. f., *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. var. *tomentosa* Hieron., *Mikania gonoclada* DC., *Willoughbya cordifolia* (L. f.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CLA, COL, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

Mikania cynanchifolia Hook. & Arn. ex B.L. Rob.

Sin.: *Mikania cynanchifolia* Hook. & Arn. ex B.L. Rob. f. *intermedia* (Malme) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *mollis* Chodat, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *cynanchifolia* Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. f. *intermedia* (Malme) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. subsp. *cynanchifolia* (Baker) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *intermedia* Malme
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON, PHA).

Mikania daspitti W.C. Holmes & McDaniel

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(GUA).

Mikania decumbens Malme

Sin.: *Mikania kleiniana* Cabrera
Enredadera. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania diversifolia DC.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania dusenii B.L. Rob.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).

Mikania euryanthela (Malme) W.C. Holmes

Sin.: *Mikania laxa* DC. subsp. *euryanthela* Malme
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Mikania fulva (Hook. & Arn.) Baker

Sin.: *Eupatorium fulvum* Hook. & Arn., *Mikania hassleriana* Chodat f. *cuneifolia*

Chodat, *Mikania hassleriana* Chodat, *Mikania montevidensis* Spreng. ex Baker, nom. nud., *Mikania senecioides* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud., *Mikania ternifolia* DC. var. *senecioides* Baker, *Mikania ternifolia* DC., *Willoughbya ternifolia* (DC.) Kuntze

Subarbusto. Endémica. 500-1400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CON, COA, PAI). URY(ART, LAV, MAL, MON, ROC).

Mikania glomerata Spreng.

Sin.: *Cacalia trilobata* Vell., *Mikania glomerata* Spreng. var. *montana* Hassl., *Mikania hatschbachii* G.M. Barroso, *Mikania hederifolia* DC., *Mikania scansoria* DC., *Willoughbya glomerata* (Spreng.) Kuntze
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CON, COA, ITA, PAI).

Mikania guaco Bonpl.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

Mikania guaranitica Hassl.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE). BRA(PAR). PRY(COA, PAI).

Mikania haenkeana DC.

Sin.: *Mikania monzonensis* Hieron., *Mikania pellucidivenia* Hieron., *Willoughbya haenkeana* (DC.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 500-800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Mikania hastato-cordata Malme

Enredadera. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania hemisphaerica Sch. Bip. ex Baker

Sin.: *Willoughbya hemisphaerica* (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU).

Mikania hirsutissima DC. var. **hirsutissima**

Sin.: *Eupatorium hirtum* Less., nom. nud., *Mikania hirsutissima* DC. var. *martiana* (Gardner) Baker, *Mikania martiana* Gardner, *Mikania sepiaria* Gardner, *Willoughbya hirsutissima* (DC.) Kuntze
Liana. Nativa. 200-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, GUA, PAI).

Mikania hirsutissima DC. var. **ursina** Baker
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mikania hoehnei B.L. Rob.
Sin.: *Mikania testudinaria* Baker, p.p.
Enredadera. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania hoffmanniana Dusén ex Malme var. **hoffmanniana**
Liana. Nativa. 600-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania hoffmanniana Dusén ex Malme var. **microphylla** Malme
Liana. Nativa. 1000-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania hoffmanniana Dusén ex Malme var. **polycephala** (Dusén) Malme
Liana. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Mikania involucrata Hook. & Arn.
Sin.: *Mikania bracteosa* DC.
Liana. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(LAV, MAL, ROC, TYT).

Mikania jujuyensis Cabrera
Enredadera. Endémica. 1700-2000 m.
Países: ARG(JUJ).

Mikania laevigata Sch. Bip. ex Baker
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania lanuginosa DC.
Sin.: *Mikania affinis* Gardner
Liana. Nativa. 500-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania lasiandrae DC.
Sin.: *Mikania strigosa* Gardner
Liana. Nativa. 400-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania ligustrifolia DC.
Sin.: *Mikania racemosa* Mart.
Enredadera. Nativa. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania lindbergii Baker var. **collina** Baker
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania lindbergii Baker var. **lindbergii**
Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania lindleyana DC.
Sin.: *Mikania acrensis* B.L. Rob.,
Willoughbya lindleyana (DC.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, SPE).

Mikania lundiana DC.
Sin.: *Mikania catharinensis* Hieron.,
Willoughbya lundiana (DC.) Kuntze
Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania mendocina Phil.
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Mikania micrantha Kunth
Sin.: *Mikania glechomaefolia* Sch.
Bip. ex Baker, *Mikania orinocensis* Kunth, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *subcymosa* (Gardner) Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *umbellifera* (Gardner) Baker, *Mikania subcrenata* Hook. & Arn., *Mikania subcymosa* Gardner, *Mikania umbellifera* Gardner, *Willoughbya micrantha* (Kunth) Rusby
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, FLA, MON, RNO, SAO, SJO, SOR).

Mikania microcephala DC.
Enredadera. Nativa. 600-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Mikania microlepis Baker
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania microptera DC.
Enredadera. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania minima (Baker) B.L. Rob.
Sin.: *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *minima* Baker
Enredadera. Endémica.
Países: ARG(TUC).

Mikania nana W.C. Holmes
Enredadera. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).

Mikania nigricans Gardner
Liana. Nativa. 200-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania nummularia DC.
Sin.: *Mikania flavescens* Gardner
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mikania oblongifolia DC.
Sin.: *Kanimia oblongifolia* (DC.) Baker,
Willoughbya oblongifolia (DC.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 200-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania obsoleta (Vell.) G.M. Barroso
Sin.: *Cacalia obsoleta* Vell.
Enredadera. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania officinalis Mart.
Hierba. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania oreophila M.R. Ritter & Miotto
Enredadera. Nativa. 700-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania orleansensis Hieron.
Liana. Endémica. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania paniculata DC.
Enredadera. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Mikania paranensis Dusén
Enredadera. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania parodii Cabrera
Enredadera. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, SFE). BRA(RGS, SCA).
URY(ROC, SAO, SOR, TYT).

Mikania periplocifolia Hook. & Arn.
Sin.: *Mikania araucana* Phil., *Mikania auricularis* Griseb., *Mikania niederleinii* Hieron., *Mikania scandens* (L.) Willd. subsp. *paraguayensis* Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *periplocifolia* (Hook. & Arn.) Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *sagittifolia* Hassl., *Willoughbya scandens* (L.) Kuntze var. *periplocifolia* (Hook. & Arn.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN,

MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN,
CHO, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA,
PAY, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Mikania pilcomayensis (Hassl.) B.L. Rob.
Sin.: *Mikania scandens* (L.) Willd. var.
pilcomayensis Hassl.
Liana. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(PHA).

Mikania pinnatiloba DC.
Sin.: *Willoughbya pinnatiloba* DC.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).

Mikania pseudohoffmanniana G.M.
Barroso var. **microphylla** G.M. Barroso
Enredadera. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Mikania pseudohoffmanniana G.M.
Barroso var. **pseudohoffmanniana**
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania pseudorimachii W.C. Holmes
& McDaniel
Liana. Endémica. 500-600 m.
Países: PRY(CEN, GUA, PAI, PHA).

Mikania psilostachya DC.
Sin.: *Mikania consanguinea* Gardner,
Mikania lima Schldt., *Mikania*
polystachya DC., *Mikania psilostachya*
DC. var. *scabra* Baker, *Mikania*
psilostachya DC. var. *racemulosa* Baker
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mikania rufescens Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Mikania riedeliana* Casar. ex B.L. Rob.,
Mikania pachylepis Sch. Bip. ex Baker
Liana. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania saltensis Hieron.
Sin.: *Willoughbya saltensis* (Hieron.)
Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC).

Mikania salviifolia Gardner
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(COA, PAI).

Mikania sericea Hook. & Arn.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania sessilifolia DC.
Subarbusto. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania setigera Sch. Bip.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mikania siambonensis Hieron.
Enredadera. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(TUC).

Mikania smaragdina Dusén ex Malme
Sin.: *Mikania latisquama* Cabrera,
Mikania smaragdina Dusén ex Malme
var. *nebulorum* Dusén ex Malme
Enredadera. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania smilacina DC.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mikania sulcata (Hook. & Arn.) B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium sulcatum* Hook. &
Arn., *Mikania pentstemonoides* DC.
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). PRY(CON, COA,
PAI). URY(ART, FLA, PAY, SAO, SOR).

Mikania summinima W.C. Holmes
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Mikania ternata (Vell.) B.L. Rob.
Sin.: *Cacalia septemnata* Vell., *Cacalia*
ternata Vell., *Mikania apiifolia* DC., *Mikania*
apiifolia DC. var. *gracilima* Dusén ex Malme,
Mikania dentata Spreng., *Willoughbya*
ternata (Vell.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CAN, GUA).

Mikania thapsoides DC.
Sin.: *Eupatorium scandens* Link, nom.
illeg., *Eupatorium thapsoides* (DC.) Niederl.,
Kaninia thapsoides (DC.) Jackson & Hook.
f., *Mikania lagoensis* Baker, *Willoughbya*
thapsoides (DC.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, GUA, MIE).

Mikania thyrsoidea Baker
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mikania trachypleura B.L. Rob.
Sin.: *Mikania ypacareyensis* W.C.
Holmes & McDaniel, nom. superfl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,
CAN, CEN, COA, GUA). URY(ART, PAY,
SAO, SOR).

Mikania triangularis Baker
Enredadera. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(SCA).

Mikania trinervis Hook. & Arn.
Sin.: *Mikania estrellensis* Baker,
Mikania laevis DC.
Liana. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania triphylla Spreng. ex Baker
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mikania ulei Hieron.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mikania urticifolia Hook. & Arn.
Sin.: *Mikania humilis* Kuntze ex
Hieron., *Mikania joergensenii* B.L. Rob.,
Mikania phyllopoda Griseb., *Willoughbya*
phyllopoda (Griseb.) Kuntze
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,
SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(COA).

Mikania variifolia Hieron.
Sin.: *Mikania sapucayensis* Hassl.
Enredadera o liana. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA,
PAI). URY(PAY).

Mikania viminea DC.
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Mikania virgata B.L. Rob.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mikania vitifolia DC.
Sin.: *Willoughbya vitifolia* DC.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mniodes (A. Gray) Benth.

Mniodes burkartii (Cabrera) S.E.
Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey
Sin.: *Belloa burkartii* (Cabrera)

Cabrera, *Gnaphalium burkartii* Cabrera, *Lucilia burkartii* (Cabrera) S.E. Freire, *Luciliocline burkartii* (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Nativa. 3100-3700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Mniodes catamarcensis (Cabrera) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey
Sin.: *Belloa catamarcensis* Cabrera, *Lucilia catamarcensis* (Cabrera) S.E.

Freire, *Luciliocline catamarcense* (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Hierba. Endémica. 3000 m.
Países: ARG(CAT).

Mniodes coarctata Cuatrec.

Hierba. Nativa. 4500-5000 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Mniodes lopezmirandae (Cabrera)

S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Sin.: *Belloa lopezmirandae* Cabrera, *Gnaphalium americanum* Mill. var. *discolor* Griseb., *Lucilia lopezmirandae* (Cabrera) S.E. Freire, *Luciliocline lopezmirandae* (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Nativa. 2200-4200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Mniodes pickeringii (A. Gray) S.E.

Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey
Sin.: *Belloa pickeringii* (A. Gray) Sagást. & M.O. Dillon, *Lucilia pickeringii* A. Gray, *Lucilia pickeringii* A. Gray var. *minor* A. Gray, *Luciliocline pickeringii* (A. Gray) M.O. Dillon & Sagást.

Hierba. Nativa. 3500-4900 m.
Países: ARG(SAL).

Mniodes piptolepis (Wedd.) S.E.

Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey
Sin.: *Belloa piptolepis* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium evacoides* Klatt, *Gnaphalium piptolepis* (Wedd.) Griseb., *Lucilia piptolepis* Wedd., *Luciliocline piptolepis* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást., *Merope piptolepis* Wedd.

Hierba. Nativa. 3200-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

CHL(AYP, TAR).

Mniodes santanica (Cabrera) S.E.

Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey
Sin.: *Belloa santanica* (Cabrera) Cabrera, *Gnaphalium santanicum* Cabrera, *Lucilia santanica* (Cabrera) S.E. Freire, *Luciliocline santanica* (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Endémica. 3100-3400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Mniodes schultzii (Wedd.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Sin.: *Belloa schultzii* (Wedd.) Cabrera, *Belloa argentea* (Wedd.) Cabrera, *Belloa cerrateae* (Ferreyra) Sagást. & M.O. Dillon, *Belloa virescens* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium schultzii* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium viridescens* Cabrera, *Lucilia schultzii* (Wedd.) A. Gray, *Merope caespititia* Wedd., *Merope schultzii* Wedd., *Merope virescens* Wedd., *Mniodes cerratei* Ferreyra, *Luciliocline schultzii* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást.

Hierba. Nativa. 3900-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Mniodes subspicata (Cabrera) S.E.

Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey
Sin.: *Belloa punae* (Cabrera) Cabrera, *Belloa subspicata* Wedd., *Gnaphalium punae* Cabrera, *Lucilia subspicata* (Wedd.) Hieron., *Luciliocline subspicata* (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire

Hierba. Nativa. 3000-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP).

Montanoa La Llave & Lex.

Montanoa bipinnatifida (Kunth) K. Koch

Sin.: *Montanoa elegans* K. Koch, *Montanoa heracleifolia* Brongn. ex Groenl., nom. nud., *Montanoa pyramidata* Sch. Bip. ex C. Koch, *Polymnia grandis* Kunth, nom. nud., *Uhdea bipinnatifida* Kunth
Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Moquiinastrum (Cabrera) G. Sancho

Moquiinastrum argentinum

(Cabrera) G. Sancho
Sin.: *Gochnatia argentina* (Cabrera) Cabrera, *Moquinia argentina* Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, SDE, TUC). PRY(PHA).

Moquiinastrum argyreum (Dusén ex Malme) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia argyrea* (Dusén ex Malme) Cabrera, *Moquinia argyrea* Dusén ex Malme
Arbusto. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).

Moquiinastrum barrosoae (Cabrera) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia barrosoae* Cabrera, *Gochnatia paraguayensis* Cabrera, *Moquinia velutina* Bong. var. *cordata* Chodat
Arbusto. Nativa. 500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CHO, CON).

Moquiinastrum cinereum (Hook. & Arn.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia cinerea* (Hook.) Cabrera, comb. illeg., *Gochnatia orbiculata* (Malme) Cabrera, *Moquinia orbiculata* Malme, *Moquinia cinerea* (Hook.) DC., *Moquinia orbiculata* Malme f. *ovata* Malme, *Spadonia cinerea* Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Moquiinastrum cordatum (Less.) G. Sancho var. **cordatum**

Sin.: *Gochnatia cordata* Less.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).

Moquiinastrum cordatum (Less.) G. Sancho var. **mollisimum** (Hassl.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia cordata* Less. var. *mollissima* Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(CAU).

Moquiinastrum haumanianum (Cabrera) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia haumaniana* Cabrera
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, SPE).

Moquiinastrum mollisimum (Malme) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia mollissima* (Malme) Cabrera, *Moquinia mollissima* Malme
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Moquiinastrum paniculatum (Less.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia lanuginosa* (Baker) Cabrera, *Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera, *Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera var. *lanuginosa* (Less.) Cabrera, *Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera var. *polycephala* (Gardner) Cabrera, *Moquinia congesta* Gardner, *Moquinia desertorum* Gardner, *Moquinia lanuginosa* Baker, *Moquinia paniculata* (Less.) DC., *Moquinia polycephala* Gardner,

Moquinia tomentosa Bong., *Spadonia paniculata* Less.

Arbusto. Nativa. 1300 m.

Países: BRA(PAR).

Moquiniastrium polymorphum

(Less.) G. Sancho subsp.

ceanothifolium (Less.) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia malmei* Cabrera, *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera subsp. *ceanothifolia* (Less.) Cabrera, *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *ceanothifolia* (Less.) DC., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *eleagnifolia* (Less.) DC., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *obtusifolia* (Less.) DC., *Spadonia polymorpha* Less. var. *ceanothifolia* Less., *Spadonia polymorpha* Less. var. *elaeagnifolia* Less., *Spadonia polymorpha* Less. var. *obtusifolia* Less.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA, MIE, SPE). URY(ART, CLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, TAC, TYT).

Moquiniastrium polymorphum

(Less.) G. Sancho subsp. **floccosum**

(Cabrera) G. Sancho

Sin.: *Gochnatia polymorpha* (Less.)

Cabrera subsp. *floccosa* Cabrera

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Moquiniastrium polymorphum

(Less.) G. Sancho subsp. **polymorphum**

Sin.: *Baccharis lessingiana* DC., *Baccharis tomentosa* Thunb., *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera subsp. *polymorpha*, *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *populifolia* (Less.) DC., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC., *Spadonia polymorpha* Less. var. *populifolia* Less. *Spadonia polymorpha* Less.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Moquiniastrium pulchrum (Cabrera)

G. Sancho

Sin.: *Gochnatia pulchra* Cabrera

Arbusto. Nativa. 500-1100 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Moquiniastrium ramboi (Cabrera) G.

Sancho

Sin.: *Gochnatia ramboi* Cabrera

Subarbusto. Nativa. 500-600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Moquiniastrium sordidum (Less.) G.

Sancho

Sin.: *Gochnatia sordida* (Less.) Cabrera,

Moquinia polymorpha (Less.) DC. var.

sordida (Less.) DC., *Moquinia sordida*

(Less.) Malme, *Spadonia polymorpha*

Less. var. *sordida* Less.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Moquiniastrium velutinum (Bong.) G.

Sancho

Sin.: *Gochnatia velutina* (Bong.)

Cabrera, *Moquinia velutina* Bong.

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Moscharia Ruiz & Pav.

Moscharia pinnatifida Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Moscharia solbrigii Crisci

Hierba. Endémica. 300-500 m.

Países: CHL(COQ).

Munnozia Ruiz & Pav.

Munnozia hastifolia (Poepp.) H. Rob. & Brettell

Sin.: *Heterotheca deltoidea* Klatt,

Liabum hastifolium Poepp., *Liabum*

laticiferum V.M. Badillo

Subarbusto. Nativa. 800-1600 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Mutisia L. f.

Mutisia acerosa Less.

Sin.: *Mutisia parviflora* J. Remy,

Mutisia ulicina D. Don

Arbusto. Endémica. 1200-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Mutisia acuminata Ruiz & Pav. var.

hirsuta (Meyen) Cabrera

Sin.: *Mutisia hirsuta* Meyen, *Mutisia viciaefolia* Cav. var. *hirsuta* (Meyen) Wedd.

Arbusto. Nativa. 2500-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Mutisia acuminata Ruiz & Pav. var.

paucijuga (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Mutisia viciaefolia* Cav. var.

paucijuga Griseb.

Arbusto. Nativa. 1700-3400 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Mutisia araucana Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-1400 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Mutisia brachyantha Phil.

Subarbusto. Endémica. 1200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Mutisia burkartii Cabrera

Arbusto. Endémica. 1800 m.

Países: ARG(NEU).

Mutisia campanulata Less.

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA).

Mutisia cana Poepp.

Sin.: *Mutisia glauca* Phil., *Mutisia glauca* J. Remy, *Mutisia polyphylla* Phil., *Mutisia reticulata* Phil., *Mutisia volckmanni* Phil.

Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Mutisia castellanosii Cabrera var. **castellanosii**

Sin.: *Mutisia retrorsa* Cav. var.

castellanosii (Cabrera) Cabrera

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SLU).

Mutisia castellanosii Cabrera var.

comechingoniana Ariza

Enredadera. Endémica.

Países: ARG(COR).

Mutisia castellanosii Cabrera var.

hieronymi (Kuntze) Ariza

Sin.: *Mutisia retrorsa* Cav. var.

hieronymi Kuntze

Enredadera. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Mutisia coccinea A. St.-Hil. var.

coccinea

Sin.: *Mutisia hypoleuca* Mart. ex Zucc. ex Baker, *Mutisia speciosa* Aiton ex Hook. var. *alborufescens* A. St.-Hil.

Enredadera. Nativa. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mutisia coccinea A. St.-Hil. var.

dealbata (Less.) Cabrera

Sin.: *Mutisia dealbata* (Less.) DC.,

Mutisia dealbata (Less.) DC. var.

guaranitica Chodat, *Mutisia hayenbeckii*

Hieron. & Arechav., *Mutisia speciosa*

Aiton ex Hook. var. *dealbata* Less.,

Mutisia speciosa Aiton ex Hook. var.

elliptica Chodat

Enredadera. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA).

PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA,

PAI). URY(CLA, FLO, MON, RNO, ROC).

Mutisia decurrens Cav. var.

decurrens

Sin.: *Aplophyllum decurrens* (Cav.) Cass.,

Mutisia decurrens Cav. var. *andina* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Mutisia decurrens Cav. var.

patagonica (Phil.) S.F. Blake

Sin.: *Mutisia patagonica* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO).

Mutisia friesiana Cabrera

Subarbusto. Nativa. 3500-4600 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Mutisia hamata Reiche

Sin.: *Mutisia microphylla* Phil., hom.

illeg., *Mutisia philippi* R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 2500-4500 m.

Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Mutisia homoeantha Wedd.

Arbusto. Nativa. 3400-3500 m.

Países: ARG(SAL).

Mutisia ilicifolia Hook. var.

decandolleana (Phil. ex Reiche)

Cabrera

Sin.: *Mutisia candolleana* Phil., *Mutisia decandolleana* Phil.

Arbusto. Endémica. 200-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Mutisia ilicifolia Hook. var. **ilicifolia**

Sin.: *Aplophyllum ilicifolium* (Cav.)

Cass., *Mutisia breviflora* Phil., *Mutisia*

consobrina Phil., *Mutisia eriocephala*

Phil., *Mutisia grossedentata* Phil., *Mutisia*

ilicifolia Hook., *Mutisia ilicifolia* Hook.

var. *cavanillesii* DC., *Mutisia involucrata*

Phil. var. *consobrina* Phil.

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,

BIO, RME).

Mutisia involucrata Phil.

Subarbusto. Endémica. 300-1700 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Mutisia kurtzii R.E. Fr. var. **anomala**

(Lillo) Cabrera

Sin.: *Mutisia anomala* Lillo

Arbusto. Endémica. 2700-3800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Mutisia kurtzii R.E. Fr. var. **kurtzii**

Arbusto. Endémica. 2000-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Mutisia kurtzii R.E. Fr. var. **pinnata**

Cabrera

Arbusto. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(JUU).

Mutisia lanigera Wedd.

Subarbusto. Nativa. 3500-4500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Mutisia latifolia D. Don f. **latifolia**

Arbusto. Endémica. 0-2400 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

Mutisia latifolia D. Don f. **bracteata**

(J. Remy) Cabrera

Sin.: *Mutisia bracteata* J. Remy

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Mutisia ledifolia Decne. ex Wedd.

Sin.: *Mutisia ledifolia* Decne. ex Wedd.

f. *dentata* Cabrera, *Mutisia ledifolia*

Decne. ex Wedd. f. *glabrata* Cuatrec.,

Mutisia ledifolia Decne. ex Wedd. f.

longiflora J. Kost.

Arbusto. Nativa. 3000-4200 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

CHL(AYP, TAR, ANT).

Mutisia linearifolia Cav.

Sin.: *Aplophyllum linearifolium* (Cav.) Cass.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO).

Mutisia linifolia Hook.

Arbusto. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Mutisia macrophylla Phil.

Subarbusto. Endémica. 200-500 m.

Países: CHL(BIO).

Mutisia oligodon Poepp. & Endl.

Sin.: *Mutisia gayana* J. Remy, *Mutisia*

meyeniana J. Remy ex Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO, ARA).

Mutisia orbignyana Wedd.

Sin.: *Mutisia cneorifolia* Decne. ex

Wedd., nom. nud., *Mutisia neriifolia*

Decne. ex Wedd., nom. nud.

Arbusto. Nativa. 3200-4000 m.

Países: ARG(JUU).

Mutisia retrorsa Cav.

Sin.: *Guariruma retrorsum* (Cav.)

Cass., *Mutisia retrorsa* Cav. var. *latifolia*

Kuntze, *Mutisia retrorsa* Cav. var.

normalis Kuntze, *Mutisia retrorsa* Cav.

f. *tomentosa* Hauman, *Mutisia runcinata*

Willd., nom. superfl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).

Mutisia rosea Poepp. ex Less.

Sin.: *Mutisia alba* Phil., *Mutisia*

berteriana Endl. ex Poepp., *Mutisia*

berterii DC., *Mutisia landbeckii* Phil.,

Mutisia subulata Ruiz & Pav. var. *rosea*

(Less.) Ruiz & Pav.

Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,

BIO, RME).

Mutisia saltensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Mutisia sinuata Cav.

Sin.: *Guariruma sinuatum* (Cav.) Cass.,

Mutisia dentata Phil., *Mutisia popetana*

Phil., *Mutisia sanguinea* Meyen, *Mutisia*

sinuata Cav. var. *brachycephala* Phil.,

Mutisia sinuata Cav. var. *taraxacifolia*

(Less.) Kuntze, *Mutisia taraxacifolia*

Less., *Mutisia taraxacifolia* Less. f.

cirrhifera Hauman, *Mutisia taraxacifolia*

Less. var. *integerrima* Phil.

Arbusto. Endémica. 1700-3500 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Mutisia speciosa Aiton ex Hook.

Sin.: *Mutisia arachnoidea* Mart. ex D.

Don, *Mutisia caryophyllata* Vell.

Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA).

Mutisia spectabilis Phil.

Subarbusto. Endémica. 1300-2800 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Mutisia spinosa Ruiz & Pav. var.**pulchella** (Speg.) Cabrera

Sin.: *Mutisia bridgesii* Endl. ex Poepp. & Endl., *Mutisia heterochroa* Gand., *Mutisia lechleri* Sch. Bip., nom. nud., *Mutisia pulchella* Speg., *Mutisia retusa* J. Remy, *Mutisia retusa* J. Remy var. *pulchella* (Speg.) Skottsbo.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Mutisia spinosa Ruiz & Pav. var.**spinosa**

Sin.: *Mutisia auriculata* Poepp. ex Less., *Mutisia chubutensis* Speg., *Mutisia hastata* Bertero ex DC., nom. nud., *Mutisia ilicifolia* Hook. f. *alata* Hauman, *Mutisia ilicifolia* Hook. f. *paucidentata* Hauman, *Mutisia ilicifolia* Hook. var. *truncata* (D. Don) DC., *Mutisia moyanoi* Speg., *Mutisia retusa* J. Remy var. *glaberrima* Phil., *Mutisia retusa* J. Remy var. *moyanoi* (Speg.) Skottsbo., *Mutisia truncata* D. Don

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Mutisia splendens Renjifo

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(VAL, RME).

Mutisia subspinosa Cav.

Sin.: *Guariruma subspinosa* (Cav.) Cass.

Subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

CHL(ATA, BIO).

Mutisia subulata Ruiz & Pav. f.**rosmarinifolia** (Poepp. & Endl.)

Cabrera

Sin.: *Mutisia gracilis* Meyen, *Mutisia hookeri* Meyen, *Mutisia linearifolia* Hook., hom. illeg., *Mutisia hookeri* Meyen var. *rosmarinifolia* Poepp. & Endl., *Mutisia elegans* Phil., *Mutisia linearifolia* Cav. var. *hookeri* (Meyen) Reiche, *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Meyen) Walp., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *major* Hook. & Arn.

Subarbusto. Endémica. 1700-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Mutisia subulata Ruiz & Pav. f.**subulata**

Sin.: *Guariruma inflexum* (Cav.) Cass., *Mutisia hookeri* Meyen var. *scandens* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav., *Mutisia inflexa* Cav. var. *imberbis* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav. var. *melanopoga* Poepp. & Endl., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *cavanillesii* Hook. & Arn., *Mutisia versicolor* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Mutisia tridens Poepp. ex Less.

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(BIO).

Nardophyllum Hook. & Arn.**Nardophyllum bryoides** (Lam.)

Cabrera

Sin.: *Anactinia hookeri* J. Remy, nom. illeg., *Aster nardophyllum* Kuntze, *Baccharis bryoides* (Lam.) Pers., *Chiliodrimum darwinii* Hook. f., *Chiliodrimum humile* Hook. f., *Chiliodrimum kingii* Hook. f., *Conyza bryoides* Lam., *Dolichogyne parvifolia* Phil. ex Kuntze, *Microchaete humilis* (Hook. f.) Sch. Bip., *Nardophyllum darwinii* (Hook. f.) A. Gray, *Nardophyllum humile* (Hook. f.) A. Gray, *Nardophyllum kingii* (Hook. f.) A. Gray, *Nardophyllum nardophyllum* (Kuntze) Macloskie, nom. illeg., *Nardophyllum obtusifolium* Hook. & Arn., *Nardophyllum parvifolium* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Nardophyllum chiliotrichioides (J.

Remy) A. Gray

Sin.: *Dolichogyne chiliotrichioides* J. Remy, *Nardophyllum bracteolatum* Hauman

Arbusto. Endémica. 0-3800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Nardophyllum genistoides (Phil.) A. Gray

Sin.: *Dolichogyne genistoides* Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(VAL, RME).

Nardophyllum lanatum (Meyen)

Cabrera

Sin.: *Barnadesia lanata* Meyen, *Dolichogyne candollei* J. Remy, nom.

superfl., *Dolichogyne gnaphalioides* DC., *Dolichogyne staehelinoides* DC., *Gochnatia revoluta* D. Don ex Hook. & Arn., *Nardophyllum candollei* (J. Remy) F. Meigen, comb. superfl., *Nardophyllum revolutum* (D. Don ex Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Nardophyllum staehelinoides* (DC.) Macloskie

Arbusto. Endémica. 1200-3200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Nardophyllum patagonicum

(Cabrera) G.L. Nesom

Sin.: *Palaepappus patagonicus* Cabrera

Arbusto. Endémica. 300-700 m.

Países: ARG(CHU).

Nassauvia Comm. ex Juss.**Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**

Sin.: *Nassauvia aculeata* (Less.) Poepp. & Endl. var. *spinosa* (D. Don) Cabrera, *Nassauvia diazii* (Phil.) Reiche, *Nassauvia latifolia* (Phil.) F. Meigen, *Nassauvia spinosa* (D. Don) Reiche, comb. illeg., *Panargyrum diazii* Phil., *Panargyrum latifolium* Phil., *Panargyrum pectinatum* Phil., *Panargyrum spinosum* D. Don, *Penthanthus aculeatus* Less.

Hierba o arbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

Nassauvia aculeata (Less.) Poepp. & Endl. var. **azorelloides** (Speg.) Cabrera

Sin.: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén, *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *azorelloides* Speg., *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *subspinosa* (Phil.) Macloskie, *Nassauvia subspinosa* (Phil.) Albov, *Panargyrum abbreviatum* Hook. & Arn., *Panargyrum subspinosa* Phil.

Hierba o arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

CHL(AIS, MAG).

Nassauvia aculeata (Less.) Poepp. & Endl. var. **robusta** (Cabrera) Cabrera

Sin.: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *robusta* Cabrera

Hierba o arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

CHL(AIS, MAG).

Nassauvia ameghinoi Speg.

Sin.: *Nassauvia morenonis* Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Nassauvia argentea Phil.

Sin.: *Nassauvia revoluta* D. Don var. *argentea* (Phil.) Hosseus
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Nassauvia argyrophylla Speg. ex

Cabrera
Hierba o subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Nassauvia axillaris (Lag. ex Lindl.) D. Don

Sin.: *Acanthophyllum axillare* (Lag. ex Lindl.) Hook. & Arn., *Strongyloma axillare* (Lag. ex Lindl.) DC., *Triptilion axillare* Lag. ex Lindl.
Arbusto. Nativa. 1000-4600 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(COQ, VAL, RME).

Nassauvia chubutensis Speg.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(CHU).

Nassauvia coronipappa Arroyo & Martic.

Hierba. Endémica. 800-1100 m.
Países: CHL(MAG).

Nassauvia cumingii Hook. & Arn.

Sin.: *Nassauvia glabrata* Phil., *Nassauvia macracantha* DC., *Nassauvia macracantha* DC. var. *glabrata* (Phil.) Reiche, *Nassauvia macracantha* DC. var. *spicata* (J. Remy) Hauman, *Nassauvia spicata* J. Remy, *Nassauvia spinosa* Phil., *Nassauvia suaveolens* D. Don, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 2700-4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Nassauvia darwinii (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén

Sin.: *Nassauvia candollei* Macloskie, *Nassauvia darwinii* (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén var. *laxa* (Phil.) Skotts., *Nassauvia lagascae* (DC.) Reiche, hom. illeg., *Nassauvia laxa* (Phil.) Speg., *Panargyrum darwinii* Hook. & Arn., *Panargyrum lagascae* DC., *Panargyrum laxum* Phil.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Nassauvia dentata Griseb.

Sin.: *Nassauvia cespitosa* Wedd., *Nassauvia patula* Phil.
Hierba. Endémica. 1200-2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Nassauvia digitata Wedd.

Sin.: *Nassauvia lycopodioides* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO).

Nassauvia dusenii O. Hoffm.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Nassauvia falklandica R. Upson &

D.J.N. Hind
Hierba. Endémica. 400-500 m.
Países: ARG(TDF).

Nassauvia fuegiana (Speg.) Cabrera

Sin.: *Nassauvia scleranthoides* O. Hoffm. ex Dusén, *Strongylomopsis fuegiana* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF).

Nassauvia gaudichaudii (Cass.) Cass.

Sin.: *Mastigophorus gaudichaudi* Cass.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Nassauvia glomerata (D. Don) Wedd.

Sin.: *Panargyrum densifolium* Phil., *Panargyrum glomeratum* D. Don
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Nassauvia glomerulosa (Lag. ex Lindl.) D. Don

Sin.: *Acanthophyllum rosulatum* Hook. & Arn., *Nassauvia axillaris* (Lag. ex Lindl.) D. Don var. *contracta* Speg., *Nassauvia bryoides* O. Hoffm., *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don var. *columnaris* Hauman, *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don f. *paradoxa* Skotts., *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don f. *struthionum* (Phil.) Skotts., *Nassauvia modesta* O.

Hoffm., *Nassauvia rosulata* (Hook. & Arn.) Balls, *Nassauvia struthionum* (Phil.) Speg., *Nassauvia struthionum* (Phil.) Speg. var. *robusta* Speg., *Strongyloma glomerulosum* (Lag. ex Lindl.) DC., *Strongyloma struthionum* Phil., *Triptilion glomerulosum* Lag. ex Lindl.
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG, RME).

Nassauvia hillii Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(NEU).

Nassauvia juniperina Skotts.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. **globosa** Skotts.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. **lagascae**

Sin.: *Caloptilion lagascae* (D. Don) Hook. & Arn., *Nassauvia lagascae* (D. Don) F. Meigen f. *glabrescens* Hauman, *Nassauvia lanata* Reiche, *Portalesia procumbens* Meyen, *Sphaerocephalus lagascae* D. Don
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, LRI, MAG, RME).

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. **lanata** (Phil.) Skotts.

Sin.: *Caloptilion lagascae* (D. Don) Hook. & Arn. var. *lanata* Phil., *Nassauvia humilis* Phil., *Nassauvia lanata* Reiche var. *lanigera* (Phil.) Reiche, *Nassauvia lanigera* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Nassauvia latissima Skotts.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Nassauvia looseri Cabrera

Sin.: *Panargyrum acerosum* Phil., *Panargyrum heterophyllum* Phil., *Nassauvia heterophylla* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: CHL(RME).

Nassauvia maeviae Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR). CHL(AIS, MAG).

Nassauvia magellanica J.F. Gmel.

Sin.: *Nassauvia heterophylla* Albov,
Nassauvia magellanica J.F. Gmel. var.
purpurascens (S. Moore) Cabrera,
Nassauvia purpurascens S. Moore,
Nassauvia suaveolens Willd.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Nassauvia pentacaenoides Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Nassauvia pinnigera D. Don

Sin.: *Nassauvia multiflora* Meyen
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,
LBO, MAU, RME).

Nassauvia planifolia Wedd.

Hierba. Endémica. 1600-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Nassauvia pulcherrima Cabrera

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LRI, LLA).

Nassauvia pygmaea (Cass.) Hook. f.

var. **intermedia** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Nassauvia intermedia* Phil.,
Nassauvia pumila Poepp. & Endl.,
Nassauvia pumila Poepp. & Endl. var.
intermedia (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LLA).

Nassauvia pygmaea (Cass.) Hook. f.
var. **pygmaea**

Sin.: *Nassauvia nordenskjoeldii* O.
Hoffm. ex Dusén, *Nassauvia pumila*
Poepp. & Endl. var. *nordenskjoeldii* (O.
Hoffm. ex Dusén) Reiche, *Triachne*
pygmaea Cass.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL,
BIO, ARA, AIS, MAG).

Nassauvia pyramidalis Meyen

Sin.: *Nassauvia macracantha* DC. var.
pungens (Phil.) Hauman, *Nassauvia*
pungens Phil.
Hierba. Endémica. 2000-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO,
MAU, BIO, RME).

Nassauvia ramosissima DC.

Hierba. Endémica. 600-2000 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, LLA).

Nassauvia revoluta D. Don

Sin.: *Nassauvia brevifolia* Phil., *Nassauvia*
nivalis Poepp. ex Less., *Nassauvia nivalis*
Poepp. & Endl. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche,
Nassauvia nivalis Poepp. & Endl. var. *sericea*
Phil., *Nassauvia revoluta* D. Don var. *nivalis*
(Poepp. ex Less.) Hosseus, *Nassauvia*
sericea Phil.
Hierba o subarbusto. Endémica.
1000-4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS, MAG, RME).

Nassauvia ruizii Cabrera

Hierba. Endémica. 3000-3700 m.
Países: ARG(MEN).

Nassauvia sceptrum Dusén

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Nassauvia serpens d'Urv.

Sin.: *Nassauvia durvillei* Cass.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Nassauvia sprengelioides DC.

Sin.: *Nassauvia araucana* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Nassauvia sublobata Cabrera

Hierba. Endémica. 1900-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Nassauvia ulicina (Hook. f.) Macloskie

Sin.: *Nassauvia patagonica* Speg.,
Nassauvia patagonica Speg. var. *elatior*
Speg., *Trianthus ulicinus* Hook. f.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Nassauvia uniflora (D. Don) Hauman

Sin.: *Nassauvia oligocephala* (DC.)
Wedd., *Panargyrum oligocephalum* DC.,
Panargyrum uniflorum D. Don
Hierba. Endémica. 2800-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,
VAL, RME).

Neocabreria R.M. King & H. Rob.**Neocabreria catharinensis** (Cabrera)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium catharinense* Cabrera,

Symphypappus catharinensis (Cabrera)

R.M. King & H. Rob.
Arbusto. Endémica. 1500 m.
Países: BRA(SCA).

Neocabreria concinna (DC.) R.M.

King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium concinnum* DC.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Neocabreria malacophylla (Klatt)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium malachophyllum*
Klatt, *Eupatorium niederleinii* Hieron.,
Eupatorium niederleinii Hieron. var.
latifolia Hieron.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, ITA).

Neocabreria pennivenia (B.L. Rob.)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Symphypappus pennivenius* B.L. Rob.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Neocabreria serrulata (DC.) R.M.

King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium acuminatum* Hook. &
Arn., *Eupatorium serrulatum* DC.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA).

Nordenstamia Lundin**Nordenstamia fabrisii** (Cabrera) B. Nord.

Sin.: *Aequatorium fabrisii* (Cabrera) C.
Jeffrey, *Gynoxys fabrisii* Cabrera
Arbusto. Nativa. 1600-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Nothoschkuhria B.G. Baldwin**Nothoschkuhria degenerica** (Kuntze)

B.G. Baldwin
Sin.: *Rothia degenerica* Kuntze,
Schkuhria degenerica (Kuntze) R.E. Fr.,
Schkuhria oolepis Sch. Bip., nom. nud.,
Schkuhria pusilla Wedd. var. *major* Sch.
Bip., nom. nud.
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Noticastrum DC.

Noticastrum acuminatum (DC.) Cuatrec.
Sin.: *Aster calendulaceus* (Griseb.) Kuntze,

Haplopappus acuminatus DC., *Haplopappus calendulaceus* Griseb., *Leucopsis acuminata* (DC.) Malme, *Leucopsis calendulacea* (Griseb.) Baker, *Noticastrum calendulaceum* (Griseb.) Malme

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PHA). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SJO, TAC).

Noticastrum adscendens DC.

Sin.: *Aster adscendens* (DC.) Reiche, *Aster pradensis* Phil., *Diplopappus sericeus* Less. var. *glandulosa* Hook. & Arn., *Noticastrum glandulosum* Phil., *Noticastrum pradense* (Phil.) Phil., *Noticastrum sanfurgi* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Noticastrum antucense Phil.

Sin.: *Aster antucensis* (Phil.) Kuntze, *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze var. *antucensis* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 100-300 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Noticastrum argenteum Cabrera

Sin.: *Aster marginatus* Kunth var. *argenteus* Wedd.

Hierba. Nativa. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJO, TUC).

Noticastrum argentinense (Cabrera)

Cuatrec.

Sin.: *Aster argentinensis* Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI).

Noticastrum calvatum (Baker)

Cuatrec.

Sin.: *Aster calvatus* (Baker) Herter, *Leucopsis calvata* Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TAC).

Noticastrum chebataroffii (Herter)

Zardini

Sin.: *Aster chebataroffii* Herter

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(MON).

Noticastrum decumbens (Baker)

Cuatrec.

Sin.: *Aster decumbens* Baker

Hierba. Endémica. 800-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Noticastrum diffusum (Pers.) Cabrera

Sin.: *Aster montevidensis* (Spreng.)

Griseb., *Diplopappus diffusus* (Pers.)

Hook. & Arn., *Erigeron diffusus*

Pers., *Haplopappus diffusus* (Pers.)

DC., *Leucopsis diffusa* (Pers.) Baker

Noticastrum montevidense (Spreng.)

Cuatrec., *Onoseris montevidensis* Spreng.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, MEN, SAL, SLU, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SJO, SJO).

Noticastrum erectum J. Remy

Sin.: *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze,

Aster erectus (J. Remy) Reiche

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Noticastrum eriophorum J. Remy

Sin.: *Aster eriophorus* (J. Remy)

Kuntze, *Aster eriophorus* (J. Remy)

Reiche, *Aster leucopappus* (Phil.) Reiche,

Leucopsis harveyi Baker, *Leucopsis sericea*

(Less.) Baker var. *eriophora* (J. Remy)

Baker, *Noticastrum leucopappum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Noticastrum gnaphalioides (Baker)

Cuatrec.

Sin.: *Aster gnaphalioides* (Baker)

Hassl., *Leucopsis gnaphalioides* Baker

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, GUA). URY(LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SOR).

Noticastrum hatschbachii Zardini

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Noticastrum jujuyense Cabrera

Hierba. Nativa. 1500-3500 m.

Países: ARG(JUJ).

Noticastrum macrocephalum (Baker)

Cuatrec.

Sin.: *Aster macrocephalus* (Baker)

Hassl., *Aster macrocephalus* (Baker)

Hassl. var. *pseudognaphalioides* Hassl.,

Leucopsis macrocephala Baker

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CAU, ITA, MIE, PHA).

Noticastrum malmei Zardini

Sin.: *Aster psammophilus* (Malme)

Herter, *Aster psammophilus* (Malme)

I.L. Teodoro, *Leucopsis psammophila*

Malme, *Leucopsis psammophila* Malme

var. *calvescens* Malme

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(ROC).

Noticastrum marginatum (Kunth)

Cuatrec.

Sin.: *Aster acaulis* Wedd., *Aster marginatus* Kunth, *Aster perezii* Cuatrec.,

Noticastrum marginatum (Kunth)

Cuatrec. f. *acaulis* (Wedd.) Cuatrec.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, SAL, SJO, SLU, TUC).

Noticastrum psammophilum (Klatt)

Cuatrec.

Sin.: *Aster psammophilus* Klatt

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Noticastrum sericeum (Less.) Less.

ex Phil.

Sin.: *Aster albus* (Phil.) Reiche, comb.

illeg., *Aster albus* (Phil.) Kuntze, *Aster*

haplopappus (J. Remy) Kuntze, comb. illeg.,

Aster haplopappus (J. Remy) Reiche, *Aster*

marginatus Kunth var. *tomentosus* Wedd.,

Aster nitens Kuntze, *Aster notosericeus*

Griseb., *Aster sericeus* (Less.) Nees,

Diplopappus sericeus Less., *Haplopappus*

sericeus (Less.) DC., *Leucopsis sericea* (Less.)

Baker, *Noticastrum album* Phil., *Noticastrum*

haplopappus J. Remy, nom. superfl.,

Noticastrum philippii Sch. Bip., nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,

SLU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,

ARA, LRI, LLA, RME). URY(SAO).

Novenia S.E. Freire

Novenia acaulis (Benth. & Hook. f. ex

B.D. Jacks.) S.E. Freire & F.H. Hellwig

Sin.: *Dolichogyne acaulis* Benth. &

Hook. f., *Gnaphalium tunariense* Kuntze,

Lepidophyllum acaule Benth. & Hook.

f. ex B.D. Jacks., *Lucilia tunariensis*

(Kuntze) K. Schum., *Mniodes tunariensis*

(Kuntze) Hieron. ex Weberb., *Novenia*

tunariensis (Kuntze) S.E. Freire

Subarbusto. Nativa. 3100-5000 m.

Países: ARG(SAL).

Ocyroe Phil.**Ocyroe armata** (Wedd.) Bonifacino

Sin.: *Dolichogyne armata* Wedd.,
Nardophyllum armatum (Wedd.) Reiche,
Ocyroe spinosa Phil.

Arbusto. Nativa. 2800-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(ANT).

Onopordum L.**Onopordum acanthium** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,
DFE, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SLU,
SCR). BRA(RGS). CHL(ARA, RME).
URY(MON).

Onopordum nervosum Boiss.

Sin.: *Onopordum arabicum* Hook.,
nom. inval.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(COR).

Onoseris Willd.**Onoseris alata** Rusby

Hierba. Nativa. 700-1400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Onoseris hastata Wedd.

Hierba. Nativa. 2100-2200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Ophryosporus Meyen**Ophryosporus anomalus** R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Piqueria cumingii* B.L. Rob., hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Ophryosporus axilliflorus (Griseb.) Hieron.

Sin.: *Eupatorium axilliflorum* Griseb.
Arbusto. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SLU, TUC).

Ophryosporus burkartii Cabrera

Arbusto. Endémica. 3000-3200 m.
Países: ARG(JUJ).

Ophryosporus charua (Griseb.) Hieron.

Sin.: *Mikania charua* Griseb.,
Willoughbya charua (Griseb.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 500-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SJU, SLU, TUC).

Ophryosporus floribundus (DC.)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Piqueria floribunda* DC.
Arbusto. Nativa.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Ophryosporus heptanthus (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium heptanthus* (Sch.
Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.,
Eupatorium origanoides Meyen & Walp.,
Ophryosporus origanoides (Meyen &
Walp.) Hieron.
Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Ophryosporus hoppii (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Trychionolepis hoppii* B.L. Rob.
Arbusto. Nativa.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Ophryosporus johnstonii B.L. Rob.

Arbusto. Endémica. 1200-1300 m.
Países: CHL(ATA).

Ophryosporus laxiflorus Baker

Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ophryosporus lorentzii Hieron.

Sin.: *Eupatorium laeve* Griseb.
Arbusto. Endémica. 1500-3200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ophryosporus macrodon Griseb.

Sin.: *Eupatorium kuntzei* Hieron.
Arbusto. Nativa. 2000-3900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ophryosporus paradoxus (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.

Sin.: *Eupatorium paradoxus* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Ophryosporus pinifolius (Phil.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Piqueria pinifolia* (Phil.) Hieron.
ex B.L. Rob., *Stevia pinifolia* Phil.
Arbusto. Nativa. 2700-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Ophryosporus piquerioides (DC.)

Benth. ex Baker
Sin.: *Eupatorium clavatum* Griseb.,
Eupatorium piquerioides DC., *Mikania*
mandonii Sch. Bip., *Ophryosporus*

clavulatus (Griseb.) Griseb.,
Ophryosporus mandonii (Sch. Bip.) Hook.
f. & A.B. Jacks, comb. illeg. *Ophryosporus*
saltensis Hieron.

Arbusto. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ophryosporus regnellii Baker

Sin.: *Eupatorium regnellii* Sch. Bip.
Arbusto. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ophryosporus triangularis Meyen

Sin.: *Eupatorium foliolosum* DC.,
Ophryosporus foliolosus
Arbusto. Endémica. 0-3400 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Oriastrum Poepp.**Oriastrum acerosum** (J. Remy) Phil. var. **acerosum**

Sin.: *Chaetanthera acerosa* (J. Remy)
Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. *acerosa*,
Chaetanthera pallida (Phil.) Hauman,
Egania acerosa J. Remy, *Egania pallida*
Phil., *Egania racemosa* Pritz., *Oriastrum*
incanum Phil., *Oriastrum pallidum* (Phil.)
Phil., *Oriastrum parviflorum* Phil.,
Oriastrum pusillum Poepp. & Endl. var.
uncinatum (Phil.) Reiche, *Oriastrum*
uncinatum Phil.

Hierba. Endémica. 2800-4000 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ,
VAL, RME).

Oriastrum acerosum (J. Remy) Phil. var. **dasycarpum** Cabrera

Hierba. Endémica. 3600-4000 m.
Países: ARG(SJU). CHL(COQ).

Oriastrum achenohirsutum

(Tombesi) A.M.R. Davies
Sin.: *Chaetanthera acheno-hirsuta*
(Tombesi) Arroyo, A.M.R. Davies & Till-
Bottraud, *Chaetanthera pulvinata* (Phil.)
Hauman var. *acheno-hirsutum* Tombesi
Hierba. Endémica. 3900-4100 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ATA).

Oriastrum apiculatum (J. Remy)

A.M.R. Davies
Sin.: *Chaetanthera apiculata* (J. Remy)
F. Meigen, *Chaetanthera lanigera* Phil.,
Egania apiculata J. Remy, *Oriastrum*
albicaule Phil. var. *albicaule*, *Oriastrum*
albicaule Phil. var. *nivale* (Phil.) Reiche,
Oriastrum nivale Phil.
Hierba. Endémica. 3000-3300 m.
Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, RME).

Oriastrum chilense (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Aldunantea chilensis* J. Remy, *Chaetanthera pusilla* (D. Don) Hook. & Arn., *Oriastrum pusillum* Reiche, hom. illeg., *Oriastrum pusillum* Reiche, hom. illeg. var. *uncinatum* Reiche, *Tylloma pusillum* D. Don

Hierba. Endémica. 2100-3800 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, RME).

Oriastrum dioicum (J. Remy) Phil.

Sin.: *Chaetanthera dioica* (J. Remy) B.L. Rob., *Egania dioica* J. Remy
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, COQ, RME).

Oriastrum gnaphalioides (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Aldunantea gnaphalioides* J. Remy, *Chaetanthera gnaphalioides* (J. Remy) I.M. Johnst., *Chondrochilus parvifolius* Phil., *Oriastrum albiflorum* (Phil.) Reiche, *Oriastrum leucocephalum* Phil., *Tylloma albiflorum* Phil.

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU).
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Oriastrum lycopodioides (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Aldunantea lycopodioides* J. Remy, *Chaetanthera lycopodioides* (J. Remy) Cabrera, *Oriastrum gayi* Phil., *Oriastrum glabriusculum* Phil., *Oriastrum lycopodioides* (J. Remy) Wedd. var. *glabriusculum* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 3000-3900 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO).

Oriastrum minutum (Phil.) Nicola, S.E. Freire & Ariza

Sin.: *Chaetanthera minuta* (Phil.) Cabrera, *Oriastrum gossypinum* Phil., *Tylloma gnaphalioides* Phil., *Tylloma minutum* Phil.

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SAL, SJU).
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Oriastrum pentacaenoides Phil.

Sin.: *Chaetanthera pentacaenoides* (Phil.) Hauman

Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Oriastrum pulvinatum Phil. var. **polymallum** (Phil.) Hicken

Sin.: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *polymalla* (Phil.) Hicken,

Oriastrum polymallum Phil., *Oriastrum totalensis* A.M.R. Davies

Hierba. Endémica. 3000-4600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(TAR, COQ).

Oriastrum pulvinatum Phil. var. **pulvinatum**

Sin.: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *pulvinata*

Hierba. Endémica. 2800-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Oriastrum pusillum Poepp. & Endl.

Sin.: *Chaetanthera planiseta* Cabrera
Hierba. Endémica. 2300-3400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Oriastrum revolutum (Phil.) A.M.R. Davies

Sin.: *Chaetanthera revoluta* (Phil.) Cabrera, *Egania appressa* Phil., *Egania revoluta* Phil., *Oriastrum dioicum* (J. Remy) Phil. var. *revolutum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 3500-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Oriastrum sphaeroidale Reiche

Sin.: *Chaetanthera sphaeroidalis* (Reiche) Hicken, *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *acuminati-bracteata* Hauman

Hierba. Endémica. 3200-5000 m.
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).
CHL(ANT, ATA, COQ).

Oriastrum stuebelii (Hieron.) A.M.R. Davies

var. **abbreviatum** (Cabrera) Nicola, S.E. Freire & Ariza

Sin.: *Chaetanthera stuebelii* Hieron. var. *abbreviata* Cabrera, *Oriastrum abbreviatum* (Cabrera) A.M.R. Davies
Hierba. Endémica. 3400-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Oriastrum stuebelii (Hieron.) A.M.R. Davies

var. **argentinum** (Cabrera) Nicola, S.E. Freire & Ariza
Sin.: *Chaetanthera stuebelii* (Hieron.) A.M.R. Davies var. *argentina* Cabrera, *Oriastrum famatinae* A.M.R. Davies, *Oriastrum stuebelii* (Hieron.) A.M.R. Davies var. *cryptum* A.M.R. Davies
Hierba. Endémica. 3100-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Oriastrum tarapacensis A.M.R. Davies

Hierba. Endémica. 4100-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Oriastrum werdermannii A.M.R. Davies

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ).

Orthopappus Gleason**Orthopappus angustifolius** (Sw.) Gleason

Sin.: *Elephantosis angustifolia* (Sw.) DC., *Elephantopus angustifolius* Sw., *Elephantopus nudiflorus* Willd.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(TAC).

Osmia Sch. Bip.**Osmia ramosissima** (Gardner) Sch. Bip.

Sin.: *Eupatorium ramosissimum* Gardner
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Oxyphyllum Phil.**Oxyphyllum ulicinum** Phil.

Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ANT, ATA).

Pachylaena Hook. & Arn.**Pachylaena atriplicifolia** D. Don ex Hook. & Arn.

Sin.: *Chionopectera gayophyta* DC., *Pachylaena gayophyta* (DC.) Hieron., *Pachylaena rosea* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 1400-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Pacourina Aubl.**Pacourina edulis** Aubl.

Sin.: *Pacourina edulis* Aubl. var. *spinosissima* Britton, *Pacourinopsis dentata* Cass., nom. illeg., *Pacourinopsis integrifolia* Cass.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SFE).
BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Panphalea Lag.**Panphalea araucariophila** Cabrera

Hierba. Endémica. 1300-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Panphalea bupleurifolia Less.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS).
URY(CAS, CLA, CLA, FLA, LAV, MAL,
MON, PAY, SAO, SJO, SJO, TAC).

Panphalea cardaminifolia Less.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ART, MON).

Panphalea commersonii Cass.

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS). URY(CAS, CLA,
FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO).

Panphalea heterophylla Less.

Sin.: *Panphalea tweedii* Gardner
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL,
CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY,
RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

Panphalea maxima Less.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(CAS,
CLA, FLA, LAV, MON, PAY, TYT).

Panphalea missionum Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(COA, ITA).

Panphalea ramboi Cabrera

Sin.: *Panphalea ramboi* Cabrera var.
scaposa Merxm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Panphalea smithii Cabrera

Hierba. Endémica. 1000-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Panphalea tenuissima Trujillo,

Bonifacino & E. Pasini
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Paranephelius Poepp.**Paranephelius asperifolius** (Muschl.)

H. Rob. & Brettell
Sin.: *Liabum asperifolium* Muschl.
Hierba. Nativa. 3000-3700 m.
Países: ARG(SAL).

Parastrephia Nutt. emend.

Cabrera

Parastrephia lepidophylla (Wedd.)

Cabrera
Sin.: *Dolichogyne lepidophylla* Wedd.
Arbusto. Nativa. 3400-4800 m.
Países: ARG(JUU, SJU). CHL(AYP,
TAR, ANT).

Parastrephia lucida (Meyen) Cabrera

Sin.: *Baccharis lucida* Meyen, *Baccharis*
phyliciformis Meyen, *Diplostephium*
tovari Cuatrec., *Dolichogyne glabra* Phil.,
Dolichogyne rigida Wedd., *Dolichogyne*
rupestris Wedd., *Lepidophyllum*
abietinum (Phil.) Reiche, *Lepidophyllum*
lucidum (Meyen) Cabrera, *Lepidophyllum*
phyliciforme (Meyen) Hieron. ex R.E.
Fr., *Lepidophyllum phyliciforme* (Meyen)
Hieron. ex R.E. Fr. var. *resinosum*
(Walp.) Blake, *Lepidophyllum rigidum*
(Wedd.) Benth. & Hook., *Parastrephia*
ericoides Nutt., *Parastrephia phyliciformis*
(Meyen) Cabrera, *Polycladus abietinus*
Phil., *Vernonia phylicaeformis* Walp.,
Vernonia phyliciformis (Meyen) Walp.,
Vernonia phyliciformis (Meyen) Walp.
var. *resinosa* Walp.
Arbusto. Nativa. 2900-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Parastrephia quadrangularis

(Meyen) Cabrera
Sin.: *Baccharis quadrangularis* Meyen,
Lepidophyllum cupressinum (Phil.)
Kuntze, *Lepidophyllum meyenii* A. Gray,
nom. illeg., *Lepidophyllum quadrangulare*
(Meyen) Benth. & Hook., *Lepidophyllum*
tola Cabrera, nom. illeg., *Polycladus*
cupressinus Phil.

Arbusto. Nativa. 3000-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Parastrephia teretiuscula (Kuntze)

Cabrera
Sin.: *Lepidophyllum teretiusculum* Kuntze
Arbusto. Nativa. 3200-3900 m.
Países: CHL(AYP, ANT).

Parthenium L.**Parthenium cineraceum** Rollins

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Parthenium hysterothorus L.

Sin.: *Argyrochaeta bipinnatifida* Cav.,
Echetosis pentasperma Phil., *Parthenium*
glomeratum Rollins, *Parthenium lobatum*
Buckley, *Parthenium pinnatifidum*
Stokes, nom. superfl., *Villanova*
bipinnatifida Ortega
Hierba. Nativa. 0-3600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,
NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, PHA).
URY(MON, RNO, SAO).

Pascalía Ortega**Pascalía glauca** Ortega

Sin.: *Aspilia ecliptaefolia* (DC.) Baker,
Helianthus copiapinus Phil., *Leighia*
ecliptifolia DC., *Lorentzia pascaloides* Griseb.,
Wedelia chrysostephana Griseb., *Wedelia*
copiapina (Phil.) Reiche, *Wedelia ecliptaefolia*
(DC.) B.L. Turner, *Wedelia glauca* (Ortega)
O. Hoffm. ex Hicken, *Wedelia glauca*
(Ortega) S.F. Blake, comb. superfl.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,
MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU,
SFE, SDE). CHL(ATA). PRY(PHA).
URY(COL, MON, RNO, SJO).

Pascalía subvaginata (N.E. Br.)

Strother
Sin.: *Wedelia crassiuscula* S.F. Blake,
Wedelia subvaginata N.E. Br., *Wedelia*
subvaginata N.E. Br. var. *major* Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
SFE). PRY(CEN, COA, PHA).

Pectis L.**Pectis guaranitica** Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON).

Pectis odorata Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, CON, PHA).

Pectis sessiliflora (Less.) Sch. Bip.

Sin.: *Cryptopetalum ciliare* Cass.,
Lorentea cryptopetala DC., nom. illeg.,
Lorentea sessiliflora Less.
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SDE, TUC).

Pectis substriata Rusby

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Perezia Lag.**Perezia atacamensis** (Phil.) Reiche

Sin.: *Clarionea atacamensis* Phil.,
Perezia hunzikeri Cabrera, *Perezia keshua*
Cabrera

Hierba. Nativa. 3500-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).
CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Perezia bellidifolia (Phil.) Reiche

Sin.: *Homoeanthus bellidifolius* Phil.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Perezia burkartii Cabrera

Hierba. Endémica. 3400-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Perezia calophylla (Phil.) Reiche

Sin.: *Homoeanthus calophyllus* Phil.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Perezia capito (Phil.) Reiche

Sin.: *Homoeanthus capito* Phil.
Endémica. 1500-2600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO).

Perezia carthamoides (D. Don) Hook. & Arn.

Sin.: *Clarionea carthamoides* D. Don,
Clarionea carthamoides D. Don var. *crispa*
(Meyen) Phil., *Clarionea multicapitata* J.
Remy, *Clarionea spectabilis* Phil., *Perezia*
diversifolia Meyen, *Perezia diversifolia*
Meyen var. *crispa* Meyen, *Perezia*
multicapitata (J. Remy) Wedd.

Hierba. Endémica. 1800-3800 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, RME).

Perezia catharinensis Cabrera

Hierba. Endémica. 600-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Perezia ciliosa (Phil.) Reiche

Sin.: *Clarionea ciliosa* Phil.
Hierba. Nativa. 2500-4600 m.
Países: ARG(JUJ, TUC). CHL(AYP,
TAR, ANT).

Perezia delicata Vuilleum.

Hierba. Endémica. 900-2200 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Perezia dentata (Cabrera) Katinas

Sin.: *Perezia ciliosa* (Phil.) Reiche var.
dentata Cabrera
Hierba. Nativa. 3900-5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Perezia eryngioides (Cabrera) Crisci & Martic.

Sin.: *Trixis eryngioides* Cabrera
Hierba. Endémica. 700-1700 m.
Países: BRA(SCA).

Perezia fonkii (Phil.) Reiche

Sin.: *Clarionea affinis* Phil., *Clarionea*
fonkii Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(ARA, LLA).

Perezia kingii Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, LPA).
URY(CAS, FLA, MON, SOR).

Perezia lactucooides (Vahl) Less.

Sin.: *Aster magellanicus* Lam.,
Chaetanthera magellanica (Lam.)
Spreng., *Clarionea glaberrima* Cass.,
nom. illeg., *Clarionea lactucooides* (Vahl)
D. Don, *Homoianthus magellanicus*
(Lam.) DC. var. *lactuoides* (Vahl) Hook.,
Homoianthus magellanicus (Lam.) DC.,
Homoianthus palustris Phil., *Perdicium*
lactuoides Vahl, *Perdicium laevigatum*
Banks & Sol. ex Hook. f., nom. nud.,
Perezia lactucooides (Vahl) Less. subsp.
palustris (Phil.) Vuilleum., *Perezia*
palustris (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Perezia linearis Less.

Sin.: *Homoeanthus rigidus* Phil.,
Homoianthus linearis (Less.) DC.,
Homoianthus pectinellus Gand.
Hierba. Endémica. 600-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

Perezia lyrata (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Clarionea pinnata* Phil.,
Homoianthus gayanus J. Remy,
Homoianthus lyratus J. Remy, *Perezia*
pinnata (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO,
MAU, BIO, ARA, LLA).

Perezia magellanica (L. f.) Lag.

Sin.: *Clarionea elegans* Phil., *Clarionea*
magellanica (L. f.) Lag. ex DC., *Perdicium*
magellanicum L. f., *Perdicium sinuatum*
Banks & Sol. ex Hook. f., nom. nud.,
Perezia elegans (Phil.) Albov, *Perezia*
lagascae Cass., nom. illeg., *Perezia*
magellanica (L. f.) Less., comb. superfl.
Hierba. Endémica. 200-1400 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA,
AIS, MAG).

Perezia megalantha Speg.

Sin.: *Perezia oleracea* Kuntze
Hierba. Endémica. 1200-0 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Perezia multiflora (Humb. & Bonpl.)

Less. subsp. **multiflora**
Sin.: *Chaetanthera multiflora* Humb.
& Bonpl., *Clarionea polycephala* Cass.,
nom. illeg., *Clarionia acanthoides* D. Don
ex Hook. & Arn., nom. nud., *Homanthis*
multiflorus (Humb. & Bonpl.) Kunth,
Homoianthus multiflorus (Humb. &
Bonpl.) DC., *Perezia acanthoides* Hook.
& Arn., *Perezia bidentata* Meyen, *Perezia*
glomerata Rusby, *Perezia multiflora*
(Humb. & Bonpl.) Less. var. *achalensis*
Kuntze, *Scolymanthus cnicooides* Willd. ex
Less., nom. nud.
Hierba. Nativa. 1100-4900 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN,
SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA).
CHL(AYP, TAR).

Perezia multiflora (Humb. & Bonpl.)

Less. subsp. **sonchifolia** (Baker)
Vuilleum.
Sin.: *Perezia aletes* J.F. Macbr., *Perezia*
sonchifolia Baker, *Perezia sonchifolia*
Baker var. *tandilensis* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, LPA, RNE).
BRA(RGS, SCA). URY(CAS, DUR, LAV,
MAL, MON, RNO, TAC).

Perezia nutans Less.

Sin.: *Calorezia nutans* (Less.) Panero,
Perdicium nutans Poepp. ex Less.,
nom. nud., *Perezia gayana* DC., *Perezia*
perfoliata J. Remy
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, RME).

Perezia pedicularidifolia Less.

Sin.: *Clarionea comosa* Phil., *Clarionea*
humilis Phil., *Clarionea laciniata* Phil.,

Clarionea parvifolia Phil., *Clarionea variabilis* Phil., *Clarionea volkmanii* Phil., *Homoeanthus variabilis* Phil., *Perdicium pedicularidifolium* Poepp. ex Less., nom. nud., *Perezia laciniata* (Phil.) Reiche var. *comosa* (Phil.) Reiche, *Perezia laciniata* (Phil.) Reiche, *Perezia pedicularidifolia* Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Perezia pedicularidifolia* Less. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Perezia variabilis* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 1000-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Perezia pilifera (D. Don) Hook. & Arn.
Sin.: *Clarionea lechleri* Sch. Bip., *Clarionea pilifera* D. Don, *Homoeanthus humilis* Phil., *Perezia lechleri* (Sch. Bip.) De Wild., *Perezia linearis* Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Perezia pilifera* (D. Don) Hook. & Arn. var. *nirihuaoesis* Hosseus
Hierba. Endémica. 1500-4300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Perezia pinnatifida (Humb. & Bonpl.) Wedd.
Sin.: *Chaetanthera pinnatifida* Humb. & Bonpl., *Perezia cirsiifolia* Wedd., *Perezia coerulescens* Wedd. var. *amplibracteata* Tovar, *Perezia coerulescens* Wedd., *Perezia integrifolia* Wedd., *Perezia nitidifolia* J. Kost., *Perezia nivalis* Wedd., *Perezia pygmaea* Wedd., *Perezia violacea* Wedd.
Hierba. Nativa. 3300-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR).

Perezia poeppigii Less.
Sin.: *Clarionea caulescens* Phil., *Clarionea nana* Phil., *Clarionema virens* (D. Don) Phil. var. *humilis* Phil., *Clarionia virens* D. Don, *Homoeanthus brevicaulis* Phil., *Homoeanthus remyanus* Phil., *Homoianthus brevicaulis* Phil., *Homoianthus pristiphyllus* J. Remy, *Perezia pristiphylla* (J. Remy) Wedd., *Perezia virens* (D. Don) Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 1200-2900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Perezia prenanthoides Less.
Sin.: *Calorezia prenanthoides* (Less.) Panero, *Perezia brachylepis* Phil.
Hierba. Endémica. 1200-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LLA).

Perezia pungens (Humb. & Bonpl.) Less.
Sin.: *Chaetanthera pungens* Humb. & Bonpl., *Clarionea ciliaris* (D. Don ex Hook. & Arn.) DC., *Clarionia pungens* (Humb. & Bonpl.) D. Don, *Homanthis pungens* (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Homoeanthus nivalis* Phil., *Homoeanthus pungens* (Humb. & Bonpl.) Spreng., *Homoianthus scaber* Benth., *Leucheria fasciata* Klatt, *Perezia abbiatti* Cabrera, *Perezia aracencis* J. Kost., *Perezia carduncelloides* Griseb., *Perezia ciliaris* D. Don ex Hook. & Arn., *Perezia conaicaensis* Tovar, *Perezia coriacea* Tovar, *Perezia elongata* Kuntze, *Perezia foliosa* Rusby, *Perezia fosbergii* Tovar, *Perezia glandulosa* Meyen, *Perezia laurifolia* Kuntze, *Perezia mandonii* Rusby, *Perezia obtusisquama* J. Kost., *Perezia pungens* (Humb. & Bonpl.) Less. var. *cernua* Rusby, *Perezia purpurata* Wedd., *Perezia scapellifolia* J. Kost. var. *parviflora* J. Kost., *Perezia scapellifolia* J. Kost., *Perezia stuebelii* Hieron., *Perezia sublyrata* Domke, *Perezia sublyrata* Domke var. *glabrescens* Tovar, *Perezia weberbaueri* Hieron. ex Domke
Hierba. Nativa. 2000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Perezia recurvata (Vahl) Less. subsp. **beckii** (Hook. & Arn.) Cabrera
Sin.: *Perezia beckii* Hook. & Arn., *Perezia flavescens* Dusén, *Perezia pectinata* (Phil.) Reiche, *Homoeanthus pectinatus* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU).

Perezia recurvata (Vahl) Less. subsp. **recurvata**
Sin.: *Chaetanthera recurvata* (Vahl) Spreng., *Clarionea recurvata* (Vahl) D. Don, *Clarionea reflexa* (Meyen) Phil., *Clarionia recurvata* (Vahl) D. Don, *Homoianthus donianus* (Less.) J. Remy, *Homoianthus echinulatus* Cass., *Homoianthus inermis* Meyen & Walp., nom. superfl., *Homoianthus patagonicus* Gand., *Homoianthus pectinatus* Phil., *Perdicium recurvatum* Vahl, *Perezia doniana* Less., *Perezia patagonica* Speg., *Perezia patagonica* Speg. var. *intermedia* Speg., *Perezia recurvata* (Vahl) Less. subsp. *patagonica* (Speg.) Cabrera, *Perezia recurvata* (Vahl) Less. var. *sessilis* Dusén, *Perezia reflexa* Meyen

Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Perezia recurvata (Vahl) Less. subsp. **triceps** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Homoeanthus triceps* Phil., *Perezia triceps* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA).

Perezia spathulata (Lag. ex D. Don) Hook. & Arn.
Sin.: *Clarionea spathulata* Lag. ex D. Don, *Homoianthus germaini* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Homoianthus viscosus* (Poepp. ex Less.) DC., *Perdicium viscosum* Poepp. ex Less., nom. nud., *Perezia viscosa* Poepp. ex Less.
Hierba. Endémica. 100-1200 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LLA).

Perezia squarrosa (Vahl) Less. subsp. **cubataensis** (Less.) B.B. Simpson
Sin.: *Perezia cubataensis* Less., *Homoianthus cubataensis* (Less.) DC., *Homoianthus laevis* (Less.) DC., *Perezia laevis* Less.
Hierba. Nativa. 700-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Perezia squarrosa (Vahl) Less. subsp. **squarrosa**
Sin.: *Homoianthus ambiguus* Cass., nom. superfl., *Homoianthus squarrosus* (Vahl) DC., *Perdicium squarrosus* Vahl
Hierba. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA, PAI). URY(CAS, MAL).

Perezia volcanensis Cabrera
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Perityle Benth.

Perityle emoryi Torr.
Sin.: *Closia anthemoides* Phil., *Closia brachypetala* Phil., *Closia chilensis* Regel & Körn., *Closia cotula* J. Remy, *Closia cotula* J. Remy var. *elata* (Phil.) Reiche, *Closia discoidea* Phil., *Closia digitata* Phil., *Closia elata* Phil., *Closia elata* Phil. var. *nana* Phil., *Closia foliosa* Phil., *Closia pusilla* Phil., *Closia viridis* Phil., *Closia villosa* Phil., *Laphamia emoryi* (Torr.) Benth. & Hook. f. ex Jacks., *Laphamia nuda* (Torr.) Benth. & Hook. f. ex

Jacks., *Perityle discoidea* (Phil.) I.M. Johnst., *Perityle emoryi* Torr. var. *elata* (Phil.) I.M. Johnst., *Perityle emoryi* Torr. var. *nuda* (Torr.) A. Gray, *Perityle grayi* Rose, *Perityle nuda* Torr., *Perityle rothrockii* Rose
Hierba. Nativa. 0-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Picradeniopsis Rydb. ex Britton

Picradeniopsis multiflora (Hook. & Arn.) B.G. Baldwin

Sin.: *Achyropappus neomexicanus* (A. Gray) A. Gray ex Rydb., *Achyropappus schkuhrioides* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Amblyopappus neomexicanus* (A. Gray) A. Gray, *Bahia gilliesii* A. Gray, *Bahia neomexicana* (A. Gray) A. Gray, *Cephalobembix neomexicana* (A. Gray) Rydb., *Rothia intermedia* Kuntze, *Rothia pusilla* (Wedd.) Kuntze, *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn. var. *aristata* (R.E. Fr.) Cabrera, *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn. var. *pusilla* (Wedd.) Cabrera, *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn. var. *typica* Cabrera, nom. inval., *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn., *Schkuhria neomexicana* A. Gray, *Schkuhria pusilla* Wedd. var. *aristata* R.E. Fr., *Schkuhria pusilla* Wedd. var. *longipedicellata* Hauman, *Schkuhria pusilla* Wedd.

Hierba. Nativa. 500-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT). URY(TAC).

Picrosia D. Don

Picrosia cabreriana A.G. Schulz

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Picrosia longifolia D. Don

Sin.: *Picrosia australis* Decne., *Picrosia longifolia* D. Don var. *angustissima* Kuntze, *Prenanthes subdentata* Hook., *Psilopogon albiflorus* Phil., *Tragopogon fritillarioides* Less.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, ÑEE, PHA, SPE). URY(MON).

Piptocarpha R. Br.

Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme

Árbol. Nativa. 300-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptocarpha axillaris (Less.) Baker

Sin.: *Vernonia axillaris* Less.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptocarpha densifolia Dusén ex G.L. Smith

Arbusto o árbol. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptocarpha isotrichia (DC.) Cabrera & Vittet

Sin.: *Vernonia isotricha* DC.
Liana. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(SCA).

Piptocarpha leprosa (Less.) Baker

Sin.: *Vernonia leprosa* Less.
Arbusto. Nativa. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker subsp. **crassifolia** (Baker) G. Lom. Sm.

Sin.: *Piptocarpha macropoda* (DC.) Baker var. *crassifolia* Baker
Árbol. Nativa. 200-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptocarpha notata (Less.) Baker

Sin.: *Carphobolus notatus* (Less.) Sch. Bip., *Vernonia notata* Less.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Piptocarpha oblonga (Gardner) Baker subsp. **lepidota** (Sch. Bip.) G.L. Smith

Sin.: *Piptocarpha reitziana* Cabrera
Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptocarpha oblonga (Gardner) Baker subsp. **oblonga**

Sin.: *Carphobolus oblongus* (Gardner) Sch. Bip., *Vernonia oblonga* Gardner
Liana. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piptocarpha organensis Cabrera

Arbusto o árbol. Nativa. 300-900 m.
Países: BRA(SCA).

Piptocarpha quadrangularis (Vell.) Baker

Sin.: *Chrysocoma quadrangularis* Vell.
Liana. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piptocarpha ramboi G.L. Smith

Liana. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptocarpha regnellii (Sch. Bip.)

Cabrera
Sin.: *Carphobolus regnellii* Sch. Bip.
Arbolito. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piptocarpha rotundifolia (Less.)

Baker
Sin.: *Vernonia rotundifolia* Less.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Piptocarpha sellowii (Sch. Bip.) Baker

Sin.: *Carphobolus sellowii* Sch. Bip., *Piptocarpha sellowii* (Sch. Bip.) Baker var. *balansiana* Hieron.
Liana. Nativa. 100-600 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, GUA, PAI).

Piptocarpha tomentosa Baker

Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Plagiocheilus Arn. ex DC.

Plagiocheilus tanacetoides Haenke ex DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(PHA).

Plazia Ruiz & Pav.

Plazia cheiranthifolia (J. Remy) Wedd.

Sin.: *Agladendron cheiranthifolium* J. Remy
Arbusto. Nativa. 2600-2800 m.
Países: CHL(COQ).

Plazia daphnoides Wedd.

Sin.: *Harthamnus boliviensis* H. Rob., *Plazia daphnoides* Wedd. var. *glabrescens* Wedd., *Plazia daphnoides* Wedd. var. *villosa* Wedd.
Arbusto. Nativa. 2600-4400 m.
Países: ARG(JUJ, MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR).

Plectocephalus D. Don

Plectocephalus tweediei (Hook. & Arn.) N. Garcia & Susanna

Sin.: *Centaurea tweediei* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(GUA). URY(ART, CLA, FLA, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Pleocarphus D. Don

Pleocarphus revolutus D. Don

Sin.: *Jungia dentata* (D. Don) Reiche, *Jungia revoluta* (D. Don) Reiche, *Jungia revoluta* (D. Don) Reiche var. *dentata* (Phil.) Reiche, *Pleocarphus dentatus* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Pluchea Cass.

Pluchea chingoyo (Kunth) DC.

Sin.: *Conyza chingoyo* Kunth
Arbusto. Nativa. 1000-2500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Pluchea laxiflora Hook. & Arn.

Sin.: *Pluchea macrophylla* Sch. Bip. ex Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pluchea microcephala R.K. Godfrey

Hierba. Nativa. 200-400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Pluchea oblongifolia DC.

Sin.: *Pluchea organensis* Gardner
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera

Sin.: *Conyza sagittalis* Lam., *Epaltes brasiliensis* DC., *Gnaphalium suaveolens* Vell., *Pluchea quitoc* DC., *Pluchea suaveolens* (Vell.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(COL, MON, SOR).

Podanthus Lag.

Podanthus mitiqui Lindl.

Sin.: *Euxenia mitiqui* DC.
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Podanthus ovatifolius Lag.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

Podocoma Cass.

Podocoma bellidifolia Baker

Sin.: *Leucopsis podocomoides* Baker
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Podocoma blanchetiana Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CON, COA, SPE).

Podocoma hieracifolia (Poir.) Cass.

Sin.: *Erigeron hieracifolius* Poir., *Erigeron primulifolium* Juss. ex Cass., *Podocoma blanchetiana* Baker var. *intermedia* Hassl., *Podocoma erigerifolia* Steud., *Podocoma foliosa* Dusén ex Malme, *Podocoma primulifolia* Cass., *Podopappus pubescens* Hook. & Arn.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CON, MIE). URY(FLA, MON, ROC).

Podocoma hirsuta (Hook. & Arn.)

Baker
Sin.: *Podocoma hirsuta* (Hook. & Arn.) Baker var. *macrophylla* Arechav., *Podocoma regnellii* Baker, *Podopappus hirsutus* Hook. & Arn.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(CAS, FLA, SJO).

Podocoma spagazzinii Cabrera

Sin.: *Podocoma asperrima* Dusén ex Malme
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHA, SAL). BRA(RGS, SCA). URY(RIV).

Polyachyrus Lag.

Polyachyrus annuus I.M. Johnst.

Sin.: *Polyachyrus mollendoensis* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Polyachyrus carduoides Phil.

Sin.: *Polyachyrus foliosus* Phil., *Polyachyrus glabratus* Phil., *Polyachyrus latifolius* Phil., *Polyachyrus rigidus* I.M. Johnst.
Subarbusto. Endémica. 800-3000 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Polyachyrus cinereus Ricardi & Weldt

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Polyachyrus fuscus (Meyen) Walp.

Sin.: *Diaphoranthus fuscus* Meyen, *Polyachyrus fuscus* (Meyen) Walp. var. *roseus* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus nesites* I.M. Johnst., *Polyachyrus roseus* Phil.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Polyachyrus gayi J. Remy

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Polyachyrus poeppigii Kuntze ex

Less. subsp. **multifidus** (D. Don) Ricardi & Weldt
Sin.: *Polyachyrus multifidus* D. Don, *Polyachyrus oblongiflorus* J. Kost., *Polyachyrus sanromani* Phil., *Polyachyrus selinoides* Reiche
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Polyachyrus poeppigii Kuntze ex

Less. subsp. **poeppigii**
Sin.: *Polyachyrus auritus* D. Don, *Polyachyrus calderensis* Phil., *Polyachyrus decurrens* Lag. ex DC., *Polyachyrus litoralis* Phil., *Polyachyrus macrotis* Phil., *Polyachyrus poeppigii* Kuntze ex Less. var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus tenuifolius* Phil., *Polyachyrus virgatus* I.M. Johnst.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Polyachyrus sphaerocephalus D. Don

Sin.: *Polyachyrus bridgesii* Poepp. & Endl., *Polyachyrus echinopsoides* Hook., *Polyachyrus glandulosus* Nutt., *Polyachyrus niveus* Lag. ex DC., *Polyachyrus tarapacanus* Phil., *Polyachyrus uniflorus* Sch. Bip., *Polyachyrus villosus* Wedd.
Subarbusto. Nativa. 3300-4000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Porophyllum Guett.**Porophyllum angustissimum**

Gardner

Sin.: *Kleinia filifolia* Hook. & Arn., nom. illeg., *Porophyllum arenosum* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud., *Porophyllum riedelii* Baker

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(ERI, MIS). BRA(RGS).

Porophyllum cabreræ D.J.N. Hind

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(SAL).

Porophyllum curticeps Malme

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Porophyllum hasslerianum Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Porophyllum lanceolatum DC.

Sin.: *Kleinia exserta* Hook. & Arn., *Porophyllum excertum* (Hook. & Arn.) Baker, *Porophyllum lanceolatum* DC. f. *depauperatum* Chodat & Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. f. *foetens* Chodat & Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *angustius* Chodat & Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *corymbosus* (Chodat) Chodat & Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *glaucum* Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *induratum* Chodat & Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *lineare* (DC.) Hassl., *Porophyllum lineare* DC. var. *corymbosum* Chodat, *Porophyllum lineare* DC., *Porophyllum martii* Baker, *Porophyllum prenanthoides* DC.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(COA, GUA, PAI, PHA).

Porophyllum linifolium (Ard.) DC.

Sin.: *Cacalia linaria* Cav. var. *pumila* Poir., *Cacalia linifolia* Ard., *Cacalia suffruticosa* L., nom. illeg., *Kleinia filifolia* Spreng., *Kleinia pumila* Hook. & Arn., *Kleinia suffruticosa* (L.) Willd., comb. illeg., *Porophyllum filifolium* (Spreng.) DC., *Porophyllum linifolium* (L.) DC., comb. illeg., *Porophyllum suffruticosum* (L.) Cass, comb. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(RGS). URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, PAY, SOR, TAC).

Porophyllum obscurum (Spreng.) DC.

Sin.: *Kleinia linifolia* Gillies & D. Don ex Hook. & Arn., *Kleinia obscura* Spreng., *Porophyllum eremophilum* Cabrera, *Porophyllum haenkei* DC., *Porophyllum oblanceolatum* Rusby

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, MIE). URY(SJO, TAC).

Porophyllum oppositifolium Kuntze

Sin.: *Porophyllum platyphyllum* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.

Sin.: *Cacalia glandulosa* Salisb., nom. superfl., *Cacalia porophyllum* L., *Cacalia ruderale* (Jacq.) Sw., *Kleinia porophyllum* (L.) Willd., *Kleinia ruderale* Jacq., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *genuinum* Urb., nom. inval., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *intermedium* DC., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *ruderale* (Jacq.) Urb., *Porophyllum ellipticum* Cass., *Porophyllum latifolium* Benth., *Porophyllum macrolepidium* Malme, *Porophyllum porophyllum* (L.) Kuntze, comb. illeg., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. f. *suffruticosum* Chodat & Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *angustifolium* Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *ellipticum* (Cass.) A. Gray ex B.L. Rob., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *glandulosum* Chodat & Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *macrolepidium* (Malme) Chodat & Hassl., *Tagetes integrifolia* Muschl.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, GUA, ITA, SPE). URY(ART, TAC).

Porophyllum spathulatum C.R.

Carneiro & A.A. Schneid.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

Praxelis Cass.**Praxelis clematidea** R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium catarium* Veldkamp, *Eupatorium clematideum* Griseb., hom. illeg., *Eupatorium urticifolium* L. f. var. *clematideum* Hieron. ex Kuntze, *Eupatorium urticifolium* L. f. var. *nanum* Hieron. ex Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE).

Praxelis grandiflora (DC.) Sch. Bip.

Sin.: *Eupatorium kleinioides* Kunth var. *latifolium* Chodat, *Eupatorium variegatum* Malme, *Ooclinium grandiflorum* DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, SPE).

Praxelis kleinioides (Kunth) Sch. Bip.

Sin.: *Campuloclinium kleinioides* (Kunth) DC., *Eupatorium kleinioides* Kunth var. *microcephalum* Chodat, *Eupatorium kleinioides* Kunth var. *subglabratum* Hieron., *Eupatorium kleinioides* Kunth, *Eupatorium sanctopaulense* B.L. Rob. var. *subglabratum* (Hieron.) Malme, *Eupatorium subglabratum* (Hieron.) Cabrera & Vittet, *Ooclinium paucidentatum* DC., *Ooclinium pedunculare* DC., *Praxelis paucidentata* (DC.) Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, ÑEE).

Praxelis missiona (Malme) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium kleinioides* Kunth var. *hecantha* Baker, *Eupatorium missionum* Malme

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA, MIE).

Praxelis ostenii (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium ostenii* B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

Praxelis pauciflora (Kunth) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium pauciflorum* Kunth
Hierba. Nativa.
Países: BRA(RGS, PAR, SCA).
PRY(CEN).

Praxelis sanctopaulensis (B.L. Rob.)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Chromolaena sanctopaulensis* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium sanctopaulense* B.L. Rob.
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Proustia Lag.

Proustia cuneifolia D. Don var. **cuneifolia**

Sin.: *Proustia pungens* Poepp. ex Less., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *cuneifolia* (D. Don) Wedd., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *heterophylla* Kuntze, *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *integrifolia* Hook. & Arn., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *spinulosa* Hook. & Arn.
Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Proustia cuneifolia D. Don subsp. **cinerea** (Phil.) Luebert

Sin.: *Proustia cinerea* Phil., *Proustia cuneifolia* D. Don f. *cinerea* (Phil.) Fabris
Arbusto. Endémica. 300-1200 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Proustia cuneifolia D. Don subsp. **mendocina** (Phil.) Katinas

Sin.: *Proustia cuneifolia* D. Don f. *mendocina* (Phil.) Fabris, *Proustia mendocina* Phil.
Arbusto. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).

Proustia cuneifolia D. Don subsp. **mollis** (Kuntze) G. Sancho

Sin.: *Proustia angustifolia* Wedd., *Proustia angustifolia* Wedd. var. *mollis* Kuntze, *Proustia cuneifolia* D. Don f. *angustifolia* (Wedd.) Fabris
Arbusto. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Proustia cuneifolia D. Don subsp. **tipia** (Phil.) Luebert

Sin.: *Proustia cuneifolia* D. Don f. *tipia* (Phil.) Fabris, *Proustia tipia* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Proustia pyrifolia DC.

Sin.: *Proustia glandulosa* DC., *Proustia oblongifolia* D. Don, *Proustia pyrifolia* DC. var. *canescens* DC., *Proustia pyrifolia* DC. f. *glandulosa* (DC.) Fabris
Arbusto. Endémica. 200-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Pseudelephantopus Rohr

Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronquist

Sin.: *Chaetospora funckii* (Turcz.) S.F. Blake, *Chaetospora spiralis* (Less.) Aspl. & S.F. Blake, *Distreptus spiralis* Less., *Pseudelephantopus funckii* (Turcz.) Cabrera, comb. superfl., *Pseudelephantopus funckii* (Turcz.) Philipson, *Spirochaeta funckii* Turcz.
Hierba. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Pseudognaphalium Kirp.

Pseudognaphalium cabreræ (S.E. Freire) S.E. Freire, Bayón, Baeza, Giuliano & C. Monti

Sin.: *Gnaphalium cabreræ* S.E. Freire, *Gnaphalium cabreræ* S.E. Freire, nom. inval., *Gnaphalium fastigiatum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium philippii* Cabrera, hom. illeg., *Pseudognaphalium cabreræ* (S.E. Freire) Deble, nom. inval., *Pseudognaphalium fastigiatum* Bayón, nom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE).
CHL(TAR, MAU, ARA, RME).

Pseudognaphalium cheiranthifolium (Lam.) Hilliard & B.L. Burt

Sin.: *Gnaphalium acutifolium* Phil., *Gnaphalium araucanum* Phil., *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. var. *multiflorum* J. Kost., *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. var. *paniculatum* (Bertero ex Colla) Skottsbo., *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam., *Gnaphalium citrinum* Hook. & Arn., *Gnaphalium*

paniculatum Bertero ex Colla, *Gnaphalium valdivianum* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, SJO, TYT).

Pseudognaphalium cymatoides (Kunze ex DC.) Anderb.

Sin.: *Gnaphalium canum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium cheiranthifolium* Bertero, hom. illeg., *Gnaphalium cymathoides* Kunze ex DC. var. *glabrum* Walp., *Gnaphalium cymathoides* Kunze ex DC., *Gnaphalium indicum* L., *Gnaphalium moelleri* Phil., *Gnaphalium ulophyllum* Hook. & Arn., *Pseudognaphalium moelleri* (Phil.) Anderb.
Hierba. Nativa. 0-4300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Pseudognaphalium dysodes (Spreng.) S. E. Freire, Bayón & C. Monti

Sin.: *Gnaphalium dysodes* Spreng., *Gnaphalium graveolens* Kunth, hom. illeg., *Pseudognaphalium graveolens* Anderb.
Hierba. Nativa. 3400-4300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, TUC).

Pseudognaphalium gaudichaudianum (DC.) Anderb.

Sin.: *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. var. *gaudichaudianum* (DC.) Baker, *Gnaphalium gaudichaudianum* DC. var. *subrufescens* DC., *Gnaphalium gaudichaudianum* DC., *Gnaphalium mendocinum* Phil., *Pseudognaphalium austrobrasilicum* Deble & Marchiori, *Pseudognaphalium mendocinum* (Phil.) Deble & Marchiori
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, TAC, TYT).

Pseudognaphalium gayanum (J. Remy) Anderb.

Sin.: *Gnaphalium gayanum* J. Remy, *Gnaphalium heterophyllum* Phil., *Gnaphalium heterotrichum* Phil., *Gnaphalium leucocephalum* Phil., nom.

illeg., *Gnaphalium pseudohelichrysium* Reiche, *Gnaphalium robustum* Phil., *Hypelichrysium heterotrichum* (Phil.) Kirp., *Pseudognaphalium heterotrichum* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium robustum* (Phil.) Anderb.
Hierba. Endémica. 0-4500 m.
Países: ARG(SLU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG, RME).

Pseudognaphalium glanduliferum (Griseb.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire
Sin.: *Gnaphalium glanduliferum* Griseb.
Subarbusto. Endémica. 2200-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL).

Pseudognaphalium jujuyense (Cabrera) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium jujuyense* Cabrera
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Pseudognaphalium lacteum (Meyen & Walp.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium argyrolepis* Phil., *Gnaphalium badium* Wedd., *Gnaphalium frigidum* Wedd., *Gnaphalium lacteum* Meyen & Walp., *Pseudognaphalium badium* (Wedd.) Anderb., *Pseudognaphalium frigidum* (Wedd.) Anderb.
Hierba. Nativa. 2500-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, BIO).

Pseudognaphalium landbeckii (Phil.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium landbeckii* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Pseudognaphalium leucopeplum (Cabrera) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium leucopeplum* Cabrera
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(MON, SJO).

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L. Burt
Sin.: *Gnaphalium helichrysoides* Wedd., *Gnaphalium luteoalbum* L., *Gnaphalium nanum* Humb., Bonpl. & Kunth, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(TDF). BRA(RGS). CHL(RME).

Pseudognaphalium munoziae Bayón C. Monti & S.E. Freire
Hierba. Endémica. 3500-4200 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Pseudognaphalium psilophyllum (Meyen & Walp.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium glandulosum* Klatt, *Gnaphalium psilophyllum* Meyen & Walp., *Pseudognaphalium glandulosum* (Klatt) Anderb.
Hierba. Endémica. 800-4600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, LLA).

Pseudognaphalium remyanum (Phil.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium remyanum* Phil.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(RME).

Pseudognaphalium tarapacanum (Phil.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium tarapacanum* Phil.
Hierba. Endémica. 2600-4200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, MAU, BIO, RME).

Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium andicola* Phil., *Gnaphalium coquimbense* Phil., *Gnaphalium illapelinum* Phil. var. *illapelinum*, *Gnaphalium illapelinum* Phil. var. *lanatum* Phil., *Gnaphalium longifolium* Phil., *Gnaphalium melanosphaeroides* Wedd., *Gnaphalium montevidense* Spreng., *Gnaphalium pratense* Phil., *Gnaphalium subnudum* Phil., *Gnaphalium versatile* Rusby, *Gnaphalium viravira* Less., hom. illeg., *Gnaphalium viravira* Molina, *Pseudognaphalium andicola* (Phil.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire, *Pseudognaphalium coquimbense* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium illapelinum* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium melanosphaeroides* (Wedd.) Anderb., *Pseudognaphalium montevidense* (Spreng.) Anderb., *Pseudognaphalium pratense* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium versatile* (Rusby) Anderb.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Pseudognaphalium yalaense (Cabrera) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium yalaense* Cabrera
Hierba. Endémica. 1600-3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Pseudogynoxys (Greenm.) Cabrera

Pseudogynoxys benthamii Cabrera
Sin.: *Pseudogynoxys cabreriae* H. Rob. & Cuatrec., *Senecio benthamii* Baker, hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera
Sin.: *Senecio chenopodioides* Kunth
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pseudogynoxys cordifolia (Cass. ex Gaudich.) Cass.
Sin.: *Gynoxys cordifolia* Cass.
Arbusto. Introducida. 200-300 m.
Países: CHL(AYP).

Psilocarphus Nutt.

Psilocarphus brevissimus Nutt.
Sin.: *Psilocarphus globiferus* Nutt.
Hierba. Nativa. 300-3000 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Psilocarphus tenellus Nutt. var. **globiferus** (Bertero ex DC.) Morefield
Sin.: *Benzanilla chilensis* J. Remy, *Micropus globiferus* Bertero ex DC., *Psilocarphus berteri* I.M. Johnst., *Psilocarphus chilensis* (J. Remy) A. Gray, *Psilocarphus globiferus* (Bertero ex DC.) Speg., comb. illeg., *Psilocarphus globiferus* (Bertero ex DC.) Speg. var. *minus* Cabrera, *Psilocarphus tenellus* Nutt. var. *tenuis* (Eastw.) Cronquist, *Psilocarphus tenuis* Eastw.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Pterocaulon Elliott

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.
Sin.: *Baccharis erioptera* Benth., *Chlaenobolus alopecuroides* (Lam.) Cass., *Conyza alopecuroides* Lam., *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC. var. *glabrescens* Chodat, *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.)

DC. var. *polystachyum* DC., *Pterocaulon interruptum* DC. var. *monostachyum* DC., *Pterocaulon interruptum* DC. var. *polystachyum* DC., *Pterocaulon interruptum* DC., *Pterocaulon latifolium* Kuntze, *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *alopecuroides* (Lam.) Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subcorymbosa* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(MON, ROC).

Pterocaulon angustifolium DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(PAY).

Pterocaulon balansae Chodat

Sin.: *Pterocaulon paniculatum* Arechav., *Pterocaulon polystachyum* DC. var. *tomentosa* Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subpaniculata* Arechav.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI). URY(CAS, MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Pterocaulon cabreriae M. Monge, Anderb. & Semir

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN).

Pterocaulon cordobense Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SFE, SLU). BRA(RGS). PRY(COA, GUA, PHA). URY(CAS, COL, MAL, MON, SOR).

Pterocaulon lanatum Kuntze

Sin.: *Pterocaulon hassleri* Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, PAI, SPE).

Pterocaulon lorentzii Malme

Sin.: *Pterocaulon malmeanum* Chodat, *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *angustifolia* Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *spicata* Arechav.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PHA). URY(CAS, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TAC).

Pterocaulon polypterum (DC.) Cabrera

Sin.: *Baccharis polyptera* DC., *Pterocaulon bakeri* Malme, *Vernonia pterocaulon* Baker
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(CLA).

Pterocaulon polystachyum DC.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(MON, PAY, RIV).

Pterocaulon purpurascens Malme

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).

Pterocaulon rugosum (Vahl) Malme

Sin.: *Chlaenobolus rugosus* (Vahl) Cass., *Conyza rugosa* Vahl, *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC. var. *mollis* Chodat, *Pterocaulon spicatum* DC. var. *brachystachyum* DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, PHA, SPE).

Pterocaulon virgatum (L.) DC.

Sin.: *Chlaenobolus virgatus* (L.) Cass., *Conyza virgata* (L.) L., *Gnaphalium virgatum* L., *Pterocaulon pilcomayense* Malme, *Pterocaulon pompilianum* Standl. & Williams, *Pterocaulon subspicatum* Malme ex Chodat, *Pterocaulon subvirgatum* Malme, *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subvirgata* (Malme) Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, MON, PAY, RNO, ROC).

Quechualia H. Rob.

Quechualia fulta (Griseb.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia fulta* (Griseb.) Kuntze, *Quechualia trixioides* (Rusby) H.

Rob., *Vernonia fulta* Griseb., *Vernonia senecionaeifolia* Britton, *Vernonia trixioides* Rusby
Arbusto. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SFE, TUC).

Radlkoferotoma Kuntze

Radlkoferotoma berroi (Hutch.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Carelia berroi* Hutch.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

Radlkoferotoma cistifolium (Less.) Kuntze

Sin.: *Carelia cistifolia* Less.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, TYT).

Radlkoferotoma ramboi (Cabrera) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Carelia ramboi* Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).

Ratibida Raf.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. f. **columnifera**

Sin.: *Rudbeckia columnifera* Nutt.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(SFE).

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. f. **pulcherrima** (DC.) W.M. Sharp

Sin.: *Obeliscaria columnaris* (Pursh) DC. var. *pulcherrima* (DC.) D. Don, *Obeliscaria pulcherrima* DC., *Ratibida columnifera* (Nutt.) Wooton & Standl. var. *pulcherrima* (DC.) Woot. & Standl.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(SLU).

Raulinoreitzia R.M. King & H. Rob.

Raulinoreitzia crenulata (Spreng.)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Ageratina dendroides* (Spreng.) R.M. King & H. Rob., *Baccharis crenulata* Spreng., *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Hieron. var. *tucumanense* Hieron., *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Spreng. ex Hieron., comb. illeg., *Eupatorium dendroides* Spreng.,

Eupatorium laevigatum Griseb., hom. illeg., *Eupatorium neurophyllum* Mart. ex Baker, nom. nud., *Eupatorium pentanthum* Sch. Bip., nom. nud., *Eupatorium piauihiense* Gardner, *Eupatorium polystachyum* DC. var. *polystachyum*, *Eupatorium polystachyum* DC. var. *subcordatum* Cabrera & Vittet, *Eupatorium tremulum* Hook. & Arn. var. β Hook. & Arn., *Mikania arborea* Kunth, nom. illeg.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PHA, SPE). URY(PAY).

Raulinoitezia leptophlebia (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium leptophlebium* (B.L. Rob.) Steyererm., *Symphiopappus leptophlebius* B.L. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Raulinoitezia tremula (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Hieron., hom. illeg. var. *xylophyloides* (DC.) Hicken, *Eupatorium dendroides* Spreng. var. *xylophyloides* (DC.) Baker, *Eupatorium tremulum* Hook. & Arn., *Eupatorium xylophyloides* DC.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, RNO, SJO).

Rhaponticum Vaill.

Rhaponticum repens (L.) Hidalgo

Sin.: *Acroptilon picris* (Pall. ex Willd.) C.A. Mey., *Acroptilon repens* (L.) DC., *Centaurea picris* Pall. ex Willd., *Centaurea repens* L., *Serratula picris* (Pall. ex Willd.) M. Bieb.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, RNE, SCR).

Salmea DC.

Salmea scandens (L.) DC.

Sin.: *Bidens scandens* L., *Calea amellus* (L.) L., *Fornicaria scandens* (L.) Raf., *Salmea eupatoria* DC. var. *intermedia* DC., *Salmea grandiceps* Cass., *Salmea nitida* (La Llave & Lex.) Sch. Bip. ex

Klatt, nom. inval., *Salmea oppositiceps* Cass., *Salmea parviceps* Cass., *Salmea pubescens* (S.F. Blake) Standl. & Steyererm., *Salmea salicifolia* Brongn. ex Neumann, *Salmea scandens* (L.) DC. var. *amellus* (L.) Kuntze, *Salmea scandens* (L.) DC. var. *genuina* S.F. Blake, nom. inval., *Salmea scandens* (L.) DC. var. *obtusata* S.F. Blake, *Salmea scandens* (L.) DC. subsp. *paraguariensis* Hassl., *Salmea scandens* (L.) DC. var. *pubescens* S.F. Blake, *Salmea sessilifolia* Griseb., *Salmea tomentosa* Nash, *Salmeopsis clausenii* Benth., *Santolina amellus* L., *Spilanthes nitida* La Llave & Lex., *Verbesina scandens* Klatt

Arbusto. Nativa. 1500-1600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). PRY(GUA, PAI, SPE).

Sanvitalia Lam.

Sanvitalia versicolor Griseb.

Hierba. Nativa. 300-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Schistocarpha Less.

Schistocarpha eupatorioides (Fenzl) Kuntze

Sin.: *Neilreichia eupatorioides* Fenzl, *Schistocarpha hoffmanii* Kuntze, *Schistocarpha oppositifolia* (Kuntze) Rydb., *Zycona oppositifolia* Kuntze

Hierba. Nativa. 800-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Schkuhria Roth, nom. cons.

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.

Sin.: *Amblyopappus mendocina* Phil., *Pectis pinnata* Lam., *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *pallida* Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *purpurascens* Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze, *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *isopappa* (Benth.) Hieron., *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *pomasquiensis* Hieron., *Schkuhria abrotanoides* Roth, *Schkuhria advena* Thell., *Schkuhria bonariensis* Hook. & Arn., *Schkuhria coquimbana* Phil., *Schkuhria isopappa* Benth., *Schkuhria octoaristata* DC., *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *abrotanoides* (Roth) Cabrera, *Schkuhria pinnata*

(Lam.) Kuntze ex Thell. var. *octoaristata* (DC.) Cabrera, *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *typica* Cabrera, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, COQ). PRY(AMA, CEN). URY(COL).

Schlechtendalia Less., nom. cons.

Schlechtendalia luzulaefolia Less.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS). URY(CLA, LAV, MAL, MON, ROC).

Scolymus L.

Scolymus hispanicus L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, SFE). CHL(VAL).

Scorzonera L.

Scorzonera laciniata L.

Sin.: *Podospermum laciniatum* (L.) DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, SCR).

Senecio L.

Senecio acanthifolius Hombr. & Jacquinot

Sin.: *Iocenes acanthifolius* (Hombr. & Jacq.) Nord. subsp. *virens* (Phil.) B. Nord., *Iocenes acanthifolius* (Hombr. & Jacq.) Nord., *Senecio acanthifolius* Hombr. & Jacquinot subsp. *virens* (Phil.) Cabrera & Zardini, *Senecio auriculatus* Albov, hom. illeg., *Senecio ombrophyllus* Skottsbo., *Senecio virens* Phil.

Hierba. Endémica. 200-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Senecio achalensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1500-1700 m.

Países: ARG(COR).

Senecio adamantinus Bong.

Sin.: *Senecio camporum* Gardner, *Senecio sessilis* Vell.

Hierba. Nativa. 1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

- Senecio adenophyllus** Meyen & Walp.
Sin.: *Senecio adenophyllus* Meyen & Walp.
var. *oblongifolius* Wedd., nom. nud.
Arbusto. Nativa. 4200-4900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Senecio adenotrichius** DC.
Sin.: *Adenotrichia amplexicaulis* Lindl.,
Heterolepis conyzoides Bertero ex DC.
Hierba. Endémica. 300-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Senecio adrianicus** Cabrera
Arbusto. Endémica. 2300 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
- Senecio alcornis** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio chrysanthemoides* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Senecio algens** Wedd.
Hierba. Nativa. 3700-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Senecio alloeophyllus** O. Hoffm. var. **alloeophyllus**
Subarbusto. Endémica. 1300-1800 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).
- Senecio alloeophyllus** O. Hoffm. var. **glaberrimus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF).
- Senecio almeidae** Phil.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Senecio altoandinus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 4500-4900 m.
Países: ARG(JUJ).
- Senecio ambatensis** Cabrera
Arbusto. Endémica. 2900-3500 m.
Países: ARG(CAT).
- Senecio ameghinoi** Speg.
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU).
- Senecio anconquijae** Cabrera f. **anconquijae** Cabrera
Hierba. Endémica. 3800-4500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
- Senecio anconquijae** Cabrera f. **discoideus** Cabrera
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.
Países: ARG(TUC).
- Senecio angulatus** L. f.
Enredadera. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, DFE, SDE).
CHL(TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Senecio angustissimus** Phil.
Sin.: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC.
var. *angustissimus* (Phil.) Speg., *Senecio nahuelbutanus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA).
- Senecio anthemidiphyllus** J. Remy
Sin.: *Senecio brachylepis* Phil., *Senecio campanae* Phil., *Senecio hakeifolius* Hook. & Arn. var. *viscidus* Hook. & Arn., *Senecio psammoecus* Cabrera, *Senecio psammophilus* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 2700 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME).
- Senecio antofagastanus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1000 m.
Países: CHL(ANT).
- Senecio apensis** Cabrera
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN, CON).
- Senecio aquaticus** Hill subsp. **aquaticus**
Hierba. Introducida.
Países: CHL(BIO, LLA).
- Senecio aquaticus** Hill subsp. **barbareifolius** (Wimm. & Grab.) Walters
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA).
- Senecio aquilaris** Cabrera
Subarbusto. Nativa. 4900-5000 m.
Países: ARG(JUJ).
- Senecio arechavaletae** Baker
Hierba. Endémica. 900 m.
Países: ARG(BAI). URY(MON, ROC).
- Senecio argillosus** Baker
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MON).
- Senecio argophylloides** Griseb. var. **argophylloides**
Arbusto. Endémica. 2800-3600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).
- Senecio argophylloides** Griseb. var. **rupestris** Cabrera
Arbusto. Endémica. 3200-4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
- Senecio argyreus** Phil.
Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).
- Senecio aristianus** J. Remy
Sin.: *Senecio guayacanensis* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).
- Senecio arleguianus** J. Remy
Arbusto. Endémica. 1200 m.
Países: CHL(COQ).
- Senecio arnicoides** Hook. & Arn.
Sin.: *Aster plantagineus* Poepp. ex DC.,
Senecio plantagineus Bertero ex Colla
Hierba. Endémica. 800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).
- Senecio arnottii** Hook. f.
Sin.: *Senecio arnottii* Hook. f. var. *major* Macloskie, *Senecio limbardioides* Hook. & Arn. var. *alfa* Hook. & Arn., *Senecio limbardioides* Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn., *Senecio limbardioides* Hook. & Arn., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(NEU, SCR, TDF).
CHL(LLA, MAG).
- Senecio aspericaulis** J. Remy
Sin.: *Senecio hypsophylus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2400-2800 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, RME).
- Senecio asplenifolius** Griseb.
Sin.: *Senecio roripifolius* Cabrera
Hierba. Endémica. 3200-4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, TUC).
- Senecio atacamensis** Phil.
Arbusto. Endémica. 3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT).
- Senecio australandinus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1500 m.
Países: ARG(SCR).

- Senecio baccharidifolius** Poepp. ex DC.
Subarbusto. Endémica. 1500-1600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).
- Senecio bahioides** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *glaber* Hook. & Arn., *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *lanosus* Hook. & Arn., *Senecio irregularis* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).
- Senecio balsamicus** Phil.
Subarbusto. Endémica. 2700 m.
Países: CHL(ATA).
- Senecio barbarae** Cabrera
Hierba. Endémica. 4300-5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(ANT).
- Senecio barrosianus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(MAU).
- Senecio beaufilsii** Kuntze
Sin.: *Senecio beaufilsii* Kuntze var. *toninii* Kuntze
Subarbusto. Endémica. 1500-1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR). CHL(MAG).
- Senecio behnii** Ricardi & Martic.
Subarbusto. Endémica. 3200-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR).
- Senecio belenensis** Griseb.
Hierba. Endémica. 3200 m.
Países: ARG(CAT).
- Senecio benaventianus** J. Remy
Subarbusto. Endémica. 200-2000 m.
Países: CHL(COQ).
- Senecio bergii** Hieron.
Sin.: *Senecio quequensis* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE).
- Senecio berteroi** (DC.) Pelsner
Sin.: *Balsisia berteroi* DC., *Robinsonia berteroi* (DC.) R.W. Sanders, Stuessy & Martic.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Senecio boelckei** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1600-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
- Senecio bonariensis** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn., *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn. var. β Hook. & Arn., *Senecio rhodaster* Baker, *Senecio sagittarioides* Speg., *Senecio sagittifolius* Baker, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MEN, SJU, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MON, SJO, SOR).
- Senecio botijae** Ehrh.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(ANT).
- Senecio brachylobus** Phil.
Subarbusto. Endémica. 500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Senecio bracteolatus** Hook. & Arn.
var. **bracteolatus**
Sin.: *Senecio coxi* Phil., *Senecio diabolicus* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA).
- Senecio bracteolatus** Hook. & Arn.
var. **luteus** Tortosa & A. Bartoli
Arbusto. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(NEU).
- Senecio bracteolatus** Hook. & Arn.
var. **valderramae** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio inutilis* Speg., *Senecio valderramae* Phil.
Arbusto. Endémica. 1000-1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).
- Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less.
var. **brasiliensis**
Sin.: *Cineraria brasiliensis* Spreng.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, ITA, MIE). URY(MAL, MON).
- Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less.
var. **incanus** Baker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA). URY(MAL, MON).
- Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less.
var. **tripartitus** (DC.) Baker
Sin.: *Senecio tripartitus* DC., *Senecio amabilis* Vell., *Senecio cannabinifolius* Hook. & Arn. var. *a*, *Senecio megapoticus* H. Buek, *Senecio cannabinifolius* Hook. & Arn. var. β
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, ITA, MIE). URY(CAS, COL, MAL, MON, SJO, SOR).
- Senecio bravensis** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).
- Senecio breviscapus** DC.
Sin.: *Senecio acaulis* Phil., *Senecio chamaecephalus* Wedd., *Senecio werneroides* Wedd., *Werneria cortusifolia* Griseb., nom. superfl., *Werneria werneroides* (Wedd.) Kuntze
Hierba. Nativa. 2500-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).
- Senecio bridgesii** Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).
- Senecio brunonianus** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio serenensis* J. Remy
Subarbusto. Endémica. 100 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).
- Senecio buglossus** Phil.
Sin.: *Senecio limonius* Phil., *Senecio valdivianus* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).
- Senecio burkartii** Cabrera
Sin.: *Senecio hygrophilus* Cuatrec., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 3800-4000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
- Senecio bustillosianus** J. Remy var. **borchersii** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio borchersii* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1800-2200 m.
Países: CHL(VAL, RME).
- Senecio bustillosianus** J. Remy var. **bustillosianus**
Sin.: *Senecio schulzeanus* Meigen
Subarbusto. Endémica. 2600-2700 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).
- Senecio cachinalensis** Phil. var. **cachinalensis**
Sin.: *Senecio breanus* Phil., *Senecio larrañagae* Phil.
Arbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Senecio cachinalensis Phil. var.**copiapinus** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio copiapinus* Phil.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Senecio cajonensis Cabrera

Hierba. Endémica. 4600 m.
Países: ARG(CAT).

Senecio calchaquinus Cabrera

Sin.: *Lomanthus calchaquinus* (Cabrera)
B. Nord. & Pelser
Subarbusto. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(TUC).

Senecio calingastensis Tombesi

Subarbusto. Endémica. 2500-3600 m.
Países: ARG(SJU).

Senecio calocephalus Poepp.

Sin.: *Senecio columbaria* J. Remy
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Senecio canchahuinganquensis

Cabrera

Arbusto. Endémica. 1000-1200 m.
Países: ARG(NEU).

Senecio candidans DC.

Sin.: *Brachypappus candidans* (J. Vahl) Sch. Bip., *Cacalia candidans* Vahl, *Culcitium gayanum* J. Remy, *Senecio culciremey* Cuatrec.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

Senecio candollei Wedd.

Sin.: *Culcitium glaciale* Meyen & Walp., *Culcitium humile* DC., *Senecio anacephalus* Griseb., *Senecio glacialis* (Meyen & Walp.) Cuatrec., *Senecio mandonianus* Wedd.

Hierba. Nativa. 3500-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Senecio caparoensis Cabrera

Hierba. Nativa. 1400-1600 m.
Países: BRA(SCA).

Senecio carbonensis C. Ezcurra,

Ferreira & Clayton

Subarbusto. Endémica. 1500-1800 m.
Países: ARG(RNE).

Senecio catamarcensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Senecio ceratophylloides Griseb.

Sin.: *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg. var. *macrodon* (Baker) Malme, *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg. var. *major* D. Don ex Hook. & Arn., *Senecio chilensis* Less. var. *ceratophyllus* (D. Don ex Hook. & Arn.) Baker, *Senecio chilensis* Less. var. *macrodon* Baker, *Senecio cuspidatus* DC. var. *ceratophylloides* (Griseb.) Kuntze, *Senecio cuspidatus* DC. var. *ceratophyllus* (D. Don ex Hook. & Arn.) Baker, *Senecio cuspidatus* DC. var. *macrodon* (Baker) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE, SLU). BRA(RGS). URY(CAS, MAL, MON).

Senecio cerberoanus J. Remy var. **cerberoanus**

Sin.: *Senecio berterianus* DC. var. *obtusus* DC., *Senecio phaedrus* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Senecio cerberoanus J. Remy var. **lanatus** Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ).

Senecio chamomillifolius Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ATA).

Senecio chañaralensis Phil.

Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Senecio chilensis Less. f. **discoideus**

Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU).

Senecio chilensis Less. var.**argophyllus** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio argophyllus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Senecio chilensis Less. var. **chilensis**

Sin.: *Senecio argenteus* Kuntze ex DC., *Senecio linearifolius* Colla, *Senecio phagnaloides* DC.

Subarbusto. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Senecio chillanensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 700-1800 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Senecio chionophilus Phil.

Sin.: *Senecio hollermayeri* Cabrera, *Senecio vulcanicus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 1500-2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Senecio chipauquilensis Troiani & Steibel

Subarbusto. Endémica. 900 m.
Países: ARG(RNE).

Senecio chrysanthemum Dusén var. **chrysanthemum**

Subarbusto. Endémica. 300-1500 m.
Países: ARG(SCR).

Senecio chrysanthemum Dusén var.

discoideus Ratto, Sbarra & Tortosa
Subarbusto. Endémica. 1100-1200 m.
Países: ARG(SCR).

Senecio chrysocomoides Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio capillarifolius* Spæg., *Senecio chubutensis* Spæg.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).

Senecio chrysolepis Phil.

Sin.: *Senecio juncalensis* Phil.
Subarbusto. Nativa. 3400-4200 m.
Países: ARG(CAT, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA).

Senecio cisplatinus Cabrera

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(RIV).

Senecio clarioneifolius J. Rémy

Subarbusto. Endémica. 2300-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Senecio clivicola Wedd. var. **clivicola**

Sin.: *Senecio fiebrigianus* Cabrera, *Senecio pampae* Lingelsh. var. *penicillatus* Lingelsh.

Arbusto. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Senecio clivicola Wedd. var. **pampae**

(Lingelsh.) Cabrera
Sin.: *Senecio pampae* Lingelsh.
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

- Senecio coluhuapiensis** Speg.
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU).
- Senecio comberi** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 900 m.
Países: ARG(NEU).
- Senecio conyzifolius** Baker
Hierba. Endémica. 500-1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Senecio coquimbensis** Phil.
Sin.: *Senecio berterianus* DC., hom. illeg., *Senecio glanduloso-hirtellus* Reiche
Arbusto. Endémica. 100-700 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Senecio corcovadensis** Cabrera
Arbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU).
- Senecio coronopodiphyllus** J. Rémy
Sin.: *Metazanthus cacalioides* Meyen
Subarbusto. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, LBO, RME).
- Senecio corrugatus** (Phil.) Pelsner
Sin.: *Robinsonia corrugata* Phil., *Robinsonia gayana* Decne., *Robinsonia longifolia* Phil.
Arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Senecio coscayanus** Ricardi & Martic.
Arbusto. Endémica. 3200-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR).
- Senecio covasii** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1800-2800 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, RME).
- Senecio covuncensis** Cabrera
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(NEU).
- Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **crassiflorus**
Sin.: *Cineraria crassiflora* Poir., *Cineraria vestita* Spreng., *Senecio andryaloides* DC., *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. var. *andryaloides* (DC.) Arechav., *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. var. *tricuspis* Baker, *Senecio culcitium* J. Rémy
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI).
BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC, SJO).
- Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **maritimus** (Malme) Cabrera
Sin.: *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. f. *maritimus* Malme
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MON, ROC).
- Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **subceratophyllus** Cabrera
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, MAL, MON).
- Senecio cremeiflorus** Mattf.
Hierba. Endémica. 2000-2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Senecio cremnicola** Cabrera
Hierba. Endémica. 4000 m.
Países: ARG(LRI).
- Senecio cremnophilus** I.M. Johnst.
Subarbusto. Endémica. 3200-3400 m.
Países: ARG(SJU).
- Senecio crepidifolius** DC.
Subarbusto. Nativa. 2500-3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU).
- Senecio crepidioides** Phil.
Subarbusto. Endémica. 400-600 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).
- Senecio crithmoides** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio bipontinii* Wedd., *Senecio carnifolius* Cabrera, *Senecio diazii* Phil., *Senecio iberidifolius* Phil., *Senecio julietii* Phil., *Senecio remyanus* Phil., *Senecio sarcophyllus* Phil., hom. illeg., *Senecio schultzii* Wedd., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 1700-4500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).
- Senecio cruseoi** Pelsner
Sin.: *Robinsonia gracilis* Decne.
Arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).
- Senecio cryptocephalus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
- Senecio ctenophyllus** Phil.
Sin.: *Senecio vittatus* Reiche
Arbusto. Endémica. 1000-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Senecio cumingii** Hook. & Arn. var. **bracteosus** (J. Remy) Cabrera
Sin.: *Senecio bracteosus* J. Remy
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL).
- Senecio cumingii** Hook. & Arn. var. **cumingii**
Sin.: *Senecio paralias* Phil.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Senecio cuneatus** Hook. f.
Sin.: *Senecio arenicola* Reiche, *Senecio dusenii* O. Hoffm. ex Macloskie, nom. superfl.
Hierba. Endémica. 600 m.
Países: ARG(SCR). CHL(AIS, MAG).
- Senecio cylindrocephalus** Cabrera
Arbusto. Endémica. 2200-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).
- Senecio darwinii** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. var. *laxus* Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).
- Senecio davilae** Phil.
Subarbusto. Endémica. 600-3000 m.
Países: CHL(VAL, RME).
- Senecio deferens** Griseb.
Sin.: *Senecio stenopteris* Griseb.
Hierba. Endémica. 400-3000 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA).
- Senecio delicatulus** Cabrera & Zardini
Subarbusto. Endémica. 4300 m.
Países: ARG(CAT).
- Senecio depressus** Hook. & Arn.
Sin.: *Culcitium depressum* D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud., *Senecio confertissimus* Cabrera, *Senecio poeppigii* Hook. & Arn. var. *condensatus* Reiche
Subarbusto. Endémica. 3100 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU).
- Senecio desideratus** DC.
Sin.: *Senecio hauthalii* Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).
- Senecio diaguita** Cabrera
Arbusto. Endémica. 2000-3200 m.
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).

Senecio dichotomus Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-2900 m.
Países: CHL(ANT).

Senecio diemii Cabrera

Hierba. Endémica. 1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(ARA).

Senecio digitatus Phil.

Sin.: *Werneria pigmophila* S.F. Blake
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(TAR, ANT).

Senecio divaricoides Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1600 m.
Países: ARG(NEU).

Senecio donianus Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio arachnoideus* Phil., hom. illeg., *Senecio arachnoideus* Phil. var. *viridis* Hauman, *Senecio lanuginosus* D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud.
Subarbusto. Endémica. 2700-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Senecio dryophyllus Meyen & Walp.

Sin.: *Senecio amphibolus* Wedd. var. *socialis* (Wedd.) Cabrera, *Senecio amphibolus* Wedd., *Senecio socialis* Wedd., *Senecio subvulgaris* Kuntze, *Senecio tarapacanus* Phil.
Subarbusto. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio eightsii Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Senecio elquiensis Cabrera

Hierba o subarbusto. Endémica. 800 m.
Países: CHL(COQ).

Senecio eriophyton J. Remy

Arbusto. Endémica. 3500-4800 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
CHL(ANT, ATA, COQ).

Senecio erraticus Bertol.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(LLA).

Senecio eruciformis J. Remy var.**brachycephalus** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio rutaceus* Phil. var. *brachycephalus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1200-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Senecio eruciformis J. Remy var.**eruciformis**

Sin.: *Senecio rutaceus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2200-2600 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

Senecio espinosae Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(MAU).

Senecio evacoides Sch. Bip.

Subarbusto. Nativa. 3500-4800 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP).

Senecio evenius (Phil.) Pelsler

Sin.: *Robinsonia evenia* Phil.
Arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Senecio expansus Wedd.

Hierba. Nativa. 3900-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Senecio fabrisii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1500-2400 m.
Países: ARG(CAT, SAL).

Senecio falklandicus Hook. f.

Sin.: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. f. *falklandicus* (Hook. f.) Skotts., *Senecio littoralis* Gaudich., nom. illeg., *Senecio littoralis* Gaudich. var. *lanata* Gaudich.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Senecio famatinensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(LRI).

Senecio farinifer Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio apricus* Phil., *Senecio belophyllus* J. Remy, *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *longifolia* Phil.
Subarbusto. Endémica. 700-3400 m.
Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

Senecio ferruglii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(CHU).

Senecio filaginoides DC. var. **filaginoides**

Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn., *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *gilliesii* Hook. & Arn., *Senecio albolanatus* Phil., hom. illeg., *Senecio caricifolius* Hook. & Arn., *Senecio doeringii* Hieron., *Senecio leuciscus* Phil., *Senecio leyboldtii*

Phil., *Senecio meyenii* Phil., *Senecio quenselii* Skotts., *Senecio sericeus* Kuntze, p.p., *Senecio sericeus* Kuntze var. *gilliesii* (Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 400-2700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TDE, TUC). CHL(BIO, MAG).

Senecio filaginoides DC. var.**lobulatus** (Hook. & Arn.) Cabrera

Sin.: *Senecio albiflorus* Phil., hom. illeg., *Senecio calceiflorus* Cabrera, *Senecio psammophilus* Griseb., *Senecio sericeus* Kuntze var. *candolleanus* Kuntze
Arbusto. Nativa. 1600-4300 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC).

Senecio fistulosus Poepp. ex Less. var. **fistulosus**

Sin.: *Senecio amplus* J. Rémy, *Senecio cordillerae* Phil., *Senecio dombeyanus* DC., *Senecio hualtata* Bertero ex DC. var. *variabilis* (Phil.) Reiche, *Senecio hualtata* Bertero ex DC., *Senecio quillotensis* Phil., *Senecio variabilis* Phil.
Hierba. Endémica. 1600-2400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Senecio fistulosus Poepp. ex Less. var.

ochroleucus (Hook. & Arn.) Cabrera
Sin.: *Senecio fistulosus* Poepp. ex DC., nom. superfl., *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn., *Senecio xanthocephalus* Dusén
Hierba. Endémica. 1200-3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
CHL(COQ, VAL, BIO, LLA).

Senecio flagellifolius Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1700-2700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Senecio fragantissimus Tortosa & A.

Bartoli
Arbusto. Endémica. 800 m.
Países: ARG(SLU).

Senecio francisci Phil.

Arbusto. Endémica. 1300-3500 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Senecio friesii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SJU).

Senecio ganganensis Cabrera

Arbusto. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SJU).

Senecio garaventai Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1600-1900 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Senecio gayanus DC.Sin.: *Senecio soloanus* Phil., *Senecio sotoanus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 700-1000 m.

Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Senecio gilliesii Hook. & Arn. var.**dasycarpus** Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, RNE).

Senecio gilliesii Hook. & Arn. var. **gilliesii**Sin.: *Cacalia candicans* Poepp. ex DC., *Cacalia nivea* Kuntze ex DC., *Culcitium dentatum* Don ex Hook. & Arn., *Culcitium gilliesii* (Hook. & Arn.) Speg., *Culcitium poeppigii* DC., *Senecio passus-crucis* Kuntze, *Senecio poeppigii* (DC.) Wedd., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 700-3200 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO).

Senecio glaber Less.Sin.: *Senecio ahrensi* Phil., *Senecio delfinii* Phil., *Senecio fernandezi* Phil., *Senecio glaber* Less. var. *pratensis* (Phil.) Cabrera, *Senecio möelleri* Phil., *Senecio molinae* Phil., *Senecio phyllocomus* Phil., *Senecio pratensis* Phil. var. *delfinii* (Phil.) Reiche, *Senecio pratensis* Phil., *Senecio tocornali* Phil.

Subarbusto. Endémica. 1100-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Senecio glabratus Hook. & Arn.Sin.: *Senecio auriculatus* Poepp. ex DC., *Senecio berterianus* Colla, *Senecio macrotus* Kuntze ex Meyen, *Senecio valparadisiacus* Colla

Subarbusto. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAG).

Senecio glandulifer Dematteis & Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR).

Senecio glandulosus Don ex Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 2200-2800 m.

Países: ARG(CAT, MEN).

Senecio gnidioides Phil. var. **gilvus**

(Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio gilvus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA).

Senecio gnidioides Phil. var. **gnidioides**

Subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR).

CHL(LBO, BIO, ARA, MAG, RME).

Senecio goldsackii Phil.Sin.: *Senecio gilliesianus* Hieron. var. *arachnoidea* Hieron., *Senecio stipellatus* O. Hoffm.

Subarbusto. Endémica. 200-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

Senecio grandis Gardner

Hierba. Nativa. 1600 m.

Países: BRA(PAR).

Senecio grandjotii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3200-3800 m.

Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Senecio grindeliifolius DC.

Subarbusto. Endémica. 2700-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Senecio grossidens Dusén ex Malme

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(PAI, PHA).

Senecio guatulamensis M. Muñoz, Moreira & Trenqualye

Subarbusto. Endémica. 700-800 m.

Países: CHL(COQ).

Senecio gunckelii Cabrera

Arbusto. Endémica. 1500 m.

Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Senecio haenkeanus Cuatrec.Sin.: *Culcitium haenkei* Wedd., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 4500-5000 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Senecio haenkei DC.Sin.: *Senecio chionotus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-3500 m.

Países: ARG(SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

Senecio hakeifolius Bertero ex DC.var. **hakeifolius**Sin.: *Senecio hakeifolius* Bertero ex DC.var. *ochroleucus* (Phil.) Reiche, *Senecio leptophyllus* Hook. & Arn., *Senecio linearilobus* Bong. var. *beta* Hook. & Arn., *Senecio ochroleucus* Phil., hom. illeg., *Senecio platycodon* Baker, p.p., *Senecio valparadisiensis* J. Remy

Subarbusto. Endémica. 100-3000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Senecio hakeifolius Bertero ex DC.var. **vidalii** (Phil.) ReicheSin.: *Senecio vidalii* Phil.

Subarbusto. Endémica. 200 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Senecio haloragis J. Remy var.**glandulosus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(MAU).

Senecio haloragis J. Remy var.**haloragis**Sin.: *Senecio germainii* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Senecio hatcherianus O. Hoffm. ex Macloskie

Arbusto. Endémica. 1800-2100 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR).

Senecio helgae Cabrera

Hierba. Endémica. 4000-4600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(ANT).

Senecio hemmendorffii Malme

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Senecio heteroschizus Baker

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS). URY(PAY).

Senecio heterotrichus DC.Sin.: *Senecio maldonadensis* Baker

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, RIV).

Senecio hickenii HaumanSin.: *Senecio clavatus* Hauman

Subarbusto. Endémica. 3500-4000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL).

Senecio hieracium J. Rémy

Sin.: *Senecio pearcei* Phil.
 Hierba. Endémica. 1200-2500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
 CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Senecio hieronymi Griseb.

Sin.: *Senecio charaguensis* Cuatrec.,
Senecio tafiensis Cabrera
 Subarbusto. Nativa. 200-3500 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ,
 LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). PRY(APA,
 CAN, CEN, PAI).

Senecio hilairianus Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-800 m.
 Países: BRA(SCA).

Senecio hirsutulus Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica.
 0-100 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Senecio hirtus Cabrera

Sin.: *Senecio crispus* Phil., hom. illeg.
 Arbusto. Endémica. 3500-4000 m.
 Países: CHL(ANT, ATA).

Senecio hjertingii Cabrera

Arbusto. Endémica. 1600-2300 m.
 Países: ARG(MEN).

Senecio hoehnei Cabrera

Subarbusto. Endémica. 800-1200 m.
 Países: BRA(PAR).

Senecio hualtaranensis Petenatti,

Ariza & Del Vitto
 Subarbusto. Endémica. 700 m.
 Países: ARG(LRI, SLU).

Senecio huitrinicus Cabrera

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
 Países: ARG(NEU).

Senecio humifusus (Hook. f.) Cabrera

Sin.: *Melalema humifusa* Hook. f.,
Senecio darwinii Hook. & Arn. var.
eradiatus A. Gray
 Hierba. Endémica. 900-1000 m.
 Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Senecio humillimus Sch. Bip. ex Wedd.

Sin.: *Senecio humillimus* Sch. Bip. ex
 Wedd. var. *fruticulosus* Wedd., *Senecio*
humillimus Sch. Bip. ex Wedd. var.
melanolepis Wedd., *Senecio pulviniformis*
 Hieron.
 Hierba. Nativa. 3500-4800 m.
 Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR).

Senecio icoglossoides Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: URY(CAS, MON, SJO, SOR).

Senecio icoglossus DC. var.

icoglossus
 Hierba. Nativa. 700-2400 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 URY(SAO).

Senecio icoglossus DC. var.

splendens Cabrera
 Hierba. Endémica. 500 m.
 Países: ARG(COS, ERI, MIS).
 BRA(RGS). PRY(COA, PAI).

Senecio illapelinus Phil.

Subarbusto. Endémica. 3100-3600 m.
 Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL).

Senecio illinitus Phil.

Sin.: *Senecio cervicornis* Phil.
 Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
 MAU, RME).

Senecio infimus Cabrera

Hierba. Endémica. 3100-3800 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Senecio invalidus C. Jeffrey

Sin.: *Senecio debilis* Phil., hom. illeg.
 Subarbusto. Endémica. 1100-1500 m.
 Países: CHL(LBO).

Senecio irgangii Matzenb. & Mondin

Subarbusto.
 Países: BRA(RGS).

Senecio isernii Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica.
 0-100 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Senecio jacobiformis J. Remy

Hierba o subarbusto. Endémica.
 0-2600 m.
 Países: CHL(ANT, COQ).

Senecio jaffuelii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1700-4500 m.
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(RME).

Senecio jarae Phil.

Hierba. Nativa. 2400-5000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
 SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio jilesii Cabrera

Arbusto. Endémica. 2000 m.
 Países: CHL(COQ).

Senecio jobii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2100-2500 m.
 Países: ARG(MEN, NEU, SCR).

Senecio johnstonianus Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2000-2700 m.
 Países: CHL(ATA).

Senecio jorquerae Phil.

Subarbusto. Endémica. 3000-3500 m.
 Países: CHL(ATA).

Senecio juergensii Mattf.

Hierba. Nativa. 800-1400 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senecio jujuyensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3700-4200 m.
 Países: ARG(JUJ).

Senecio julianus Speg.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
 Países: ARG(SCR).

Senecio jungei Phil.

Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.
 Países: CHL(COQ).

Senecio keshua Cabrera

Sin.: *Culcitium albigolium* Zoellner,
Culcitium oligocephalum Cabrera, *Senecio*
zoellneri Martic. & Quezada
 Hierba. Endémica. 3200-5000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR).

Senecio kingii Hook. f. var. **kingii**

Sin.: *Senecio gymnocaulos* Phil., *Senecio*
poculiferus S. Moore
 Hierba. Endémica. 100-3800 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
 SJU, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU,
 BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Senecio kingii Hook. f. var. **paradoxus**
(Albov ex Kurtz) Cabrera

Sin.: *Senecio kurtzii* Albov, nom. illeg.
 hom., *Senecio paradoxus* Albov ex Kurtz
 Hierba. Endémica.
 Países: ARG(NEU, SCR).

Senecio krapovickasii Cabrera

Hierba. Endémica. 4300-4700 m.
 Países: ARG(LRI).

Senecio kunturinus Cabrera

Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
 Países: ARG(SAL, TUC).

Senecio laetevirens Phil.

Subarbusto. Endémica. 2000-3200 m.
 Países: ARG(MEN). CHL(VAL, RME).

Senecio laevicaulis DC.

Sin.: *Senecio holophyllus* J. Remy
Subarbusto. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Senecio landbeckii Phil.

Subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Senecio langei Malme

Subarbusto. Nativa. 800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senecio lanifer Mart. ex C. Jeffrey

Sin.: *Senecio vernonioides* Sch. Bip. ex Baker, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 300-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, PAI).

Senecio lanosissimus Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1800-4000 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Senecio laseguei Hombr. & Jacquinet

Sin.: *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet var. *intermedius* Sch. Bip., *Senecio magellanensis* Macloskie, nom. superfl., *Senecio magellanicus* Phil., hom. illeg., *Senecio philippii* De Wild.
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Senecio lastarrianus J. Remy

Sin.: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *angustifolius* DC., *Senecio nitidus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 900-2000 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Senecio laucanus Ricardi & Martic.

Hierba. Endémica. 4200-4400 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Senecio leptocaulos Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-1600 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Senecio leptolobus DC.

Sin.: *Cineraria megapotamica* Spreng., p.p., *Senecio pinnatus* Poir. var. *leptolobus* (DC.) Baker, *Senecio uruguayensis* Cabrera
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA, TAC, TYT).

Senecio leptoschizus Bong.

Sin.: *Senecio leptoschizus* Bong. var. *leptocladus* Baker
Hierba. Nativa. 1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senecio leucomallus A. Gray var.

incisus A. Gray
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Senecio leucomallus A. Gray var.

leucomallus
Sin.: *Senecio hyadesii* Franch.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Senecio leucopeplus Cabrera

Sin.: *Senecio candolleanus* Hook. & Arn., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI).

Senecio leucophyton Phil.

Subarbusto. Endémica. 1500-1800 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU).

Senecio leucostachys Baker

Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *pinnatifidus* Hook. & Arn., *Senecio sericeus* (Kuntze) Kuntze var. *pinnatifidus* (Hook. & Arn.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 700-1900 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU).

Senecio leucus Phil.

Arbusto. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(SAL). CHL(ANT, ATA, COQ).

Senecio lilloi Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(LRI).

Senecio limosus Dusén ex Malme

Subarbusto. Endémica. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senecio linarensis Soldano

Sin.: *Senecio subdentatus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 900-2000 m.
Países: CHL(MAU).

Senecio linariifolius Poepp. ex DC.

var. **aclonetus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio aclonetus* Phil., *Senecio encelia* J. Remy, *Senecio microcephalus* Phil. var. *aclonetus* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-2200 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Senecio linariifolius Poepp. ex DC.

var. **heliophytoides** (Phil.) Reiche
Sin.: *Senecio heliophytoides* Phil.,

Senecio lacarensis Phil.

Subarbusto. Endémica. 1200-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Senecio linariifolius Poepp. ex DC.

var. **linariifolius**
Sin.: *Senecio promaucanus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1000-2900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS).

Senecio linariifolius Poepp. ex DC.

var. **subtomentosus** Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(RNE).

Senecio linearilobus Bong.

Subarbusto. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR).

Senecio lithostaurus Cabrera

Sin.: *Senecio remyanus* Phil. f. *eradiatus* Kuntze
Subarbusto. Endémica. 1500-3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(RME).

Senecio looseri Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3000-5000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Senecio lorentziella Hicken

Sin.: *Senecio depressus* Hauman, hom. illeg., *Senecio lorentzii* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 2900-3500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Senecio lorentzii Griseb.

Sin.: *Senecio lorentzii* Griseb. var. *latifolius* Cabrera, *Senecio lorentzii* Griseb. var. *radiatus* Cabrera
Hierba. Endémica. 2200-3400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Senecio x luloi M.G. López & Xifreda

Hierba. Endémica.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR). PRY (Desconocida). URY(Desconocida).

Senecio luridus Phil.

Arbusto. Endémica. 2400 m.
Países: CHL(ATA).

Senecio maculatus Cabrera

Hierba. Endémica. 4000-4300 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Senecio madagascariensis Poir.

Sin.: *Senecio incognitus* Cabrera
 Hierba. Introducida. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ). URY(CAS, MON, RNO, ROC, SAO).

Senecio madariagae Phil.

Arbusto. Endémica. 3400-3500 m.
 Países: ARG(SAL). CHL(TAR, ANT).

Senecio maeviae Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.
 Países: ARG(MEN, NEU).

Senecio magellanicus Hook. & Arn.

Sin.: *Culcitium dasyphyllum* Gand., *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot f. *angustifolia* Skotts., *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot f. *latifolia* Skotts., *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot f. *typica* Skotts., nom. inval., *Culcitium magellanicum* (Hook. & Arn.) Hombr. & Jacquinot, *Culcitium sessile* Speg., *Culcitium tenellum* Dusén, *Senecio culcitenellus* Cuatrec., *Senecio dasyphyllum* (Gand.) Cuatrec., *Senecio neosessilis* Cuatrec., *Senecio santacruzensis* Cabrera, nom. superfl., *Senecio tunicatus* Kuntze, *Senecio vaginifolius* Sch. Bip.

Hierba. Endémica. 200-1600 m.
 Países: ARG(SJU, SCR, TDF).
 CHL(AIS, MAG).

Senecio manguensis Cabrera & Zardini

Subarbusto. Endémica. 1700-1900 m.
 Países: ARG(MEN, SJU).

Senecio mapuche Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1800-2200 m.
 Países: CHL(VAL, RME).

Senecio martinensis Dusén

Hierba. Endémica. 600-1200 m.
 Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
 CHL(AIS, MAG).

Senecio masafuerae (Skotts.) Pelsner

Sin.: *Robinsonia masafuerae* Skotts.
 Arbolito. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(JFE).

Senecio masatierrae Pelsner

Sin.: *Robinsonia macrocephala* Decne.
 Arbolito. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(JFE).

Senecio mattfeldianus Cabrera

Sin.: *Senecio sagittifolius* Arechav.
 Hierba. Endémica. 0-100 m.
 Países: BRA(SCA). URY(CAS, MAL, MON).

Senecio maulinus Reiche

Sin.: *Senecio leucomallus* Phil., hom. illeg.
 Subarbusto. Endémica. 200-2800 m.
 Países: CHL(MAU).

Senecio megaoreinus Zardini

Subarbusto. Endémica. 500 m.
 Países: ARG(RNE).

Senecio melanopotamicus Cabrera

Arbusto. Endémica. 0-600 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE).

Senecio mesembrynus Cabrera

Sin.: *Senecio bakeri* Reiche
 Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
 Países: CHL(AIS, MAG).

Senecio microcephalus Phil. var.

angustifolius Cabrera
 Arbusto. Endémica. 300-800 m.
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Senecio microcephalus Phil. var. **microcephalus**

Arbusto. Endémica. 300-800 m.
 Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
 CHL(LLA).

Senecio microphyllus Phil.

Sin.: *Senecio hakeifolius* Hook. & Arn. var. *adenophyllus* Hook. & Arn., *Senecio gypsophilus* Phil., *Senecio bowenkampi* Phil., *Senecio alfalfalis* Phil.
 Arbusto. Endémica. 1500-2300 m.
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Senecio micropifolius DC.

Sin.: *Senecio pelolepis* Johnst.
 Subarbusto. Endémica. 1900-4300 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Senecio microtis Phil.

Arbusto. Endémica. 0-3200 m.
 Países: CHL(ATA).

Senecio minutifolius Phil.

Arbusto. Endémica. 1600-3200 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Senecio miser Hook. f.

Sin.: *Senecio ericoides* Reiche, *Senecio fueginus* Phil., *Senecio miser* Hook. f. f. *major* Albov, *Senecio prichardii* S. Moore, *Senecio*

verruculosus Kuntze var. *dentatus* Kuntze, *Senecio verruculosus* Kuntze var. *subulatus* Kuntze, *Senecio verruculosus* Kuntze
 Subarbusto. Endémica. 100-1500 m.
 Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF).
 CHL(MAG).

Senecio montevidensis (Spreng.)

Baker

Sin.: *Cineraria montevidensis* Spreng., *Senecio chilensis* Baker, hom. illeg., *Senecio cuspidatus* DC., *Senecio cuspidatus* DC. var. *montevidensis* (Spreng.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).
 BRA(RGS). URY(CAS, MON).

Senecio montianus J. Remy

Subarbusto. Endémica. 2400-3000 m.
 Países: CHL(COQ, LBO, MAU, RME).

Senecio munnozii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
 Países: CHL(COQ).

Senecio murinus Phil.

Subarbusto. Endémica. 400-1400 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Senecio murorum J. Remy

Arbusto. Endémica. 100-200 m.
 Países: CHL(COQ, RME).

Senecio mustersii Speg. var. **dentatus**

Cabrera

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1400 m.
 Países: ARG(RNE, SCR).

Senecio mustersii Speg. var.

mustersii

Arbusto o subarbusto. Endémica. 700-1300 m.
 Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Senecio myriophyllus Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1200 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Senecio neaei DC. var. **incisus** DC.

Sin.: *Senecio sericeus* Kuntze var. *incisus* (DC.) Kuntze

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-2600 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, SCR).
 CHL(MAG).

Senecio neaei DC. var. **neaei**

Sin.: *Senecio sericeus* Kuntze var. *neaei* (DC.) Kuntze

Arbusto o subarbusto. Endémica. 300-1800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, AIS).

Senecio nemiae A. Bartoli, Tortosa & S.E. Freire

Arbusto. Endémica. 500 m.

Países: ARG(RNE).

Senecio niederleinii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(LRI).

Senecio nigrescens Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio chamaedryfolius* Less.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

Senecio nublensis Soldano

Sin.: *Senecio carnosus* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Senecio nutans Sch. Bip.

Sin.: *Senecio graveolens* Wedd., *Senecio graveolens* Wedd. var. *psiloachaenius*

Cabrera, *Senecio psychrophilus* Wedd.

Arbusto. Nativa. 3500-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio obesus Klatt

Subarbusto. Endémica. 600-1500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Senecio obtectus Kuntze

Subarbusto. Endémica. 2200-2600 m.

Países: ARG(MEN). CHL(LBO, RME).

Senecio octolepis Griseb. var. **octolepis**

Arbusto. Endémica. 2000-3200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Senecio octolepis Griseb. var. **saltensis** (Hicken) Cabrera

Sin.: *Senecio mendocinus* Phil. f.

saltensis Hicken

Arbusto. Endémica. 2800-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

Senecio odonellii Cabrera

Hierba. Endémica. 3000 m.

Países: ARG(MEN).

Senecio oleosus Vell.

Sin.: *Senecio hastatus* Bong.

Hierba. Nativa. 800-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Senecio oligoleucus Baker

Subarbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: URY(MON).

Senecio oligophyllus Baker

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(AMA).

Senecio oreinus Cabrera

Sin.: *Senecio andicola* Phil., hom. illeg., *Senecio monticola* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 1700-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ).

Senecio oreophyton J. Rémy

Sin.: *Senecio medicinalis* Phil.,

Senecio uspallatensis Hook. & Arn.

var. *retroflexus* Hook. & Arn., *Senecio uspallatensis* Hook. & Arn. var. *tenuior* Hook. & Arn.,

Arbusto. Endémica. 3100-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

Senecio ostenii Mattf. var. **balaenicus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(MAL).

Senecio ostenii Mattf. var. **ostenii**

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(BAI). URY(MAL).

Senecio otaeguianus Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(VAL).

Senecio otites Kunze ex DC.

Sin.: *Senecio chiloensis* Phil., *Senecio otophorus* Phil., nom. illeg.

Hierba. Endémica. 600-1100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Senecio otopterus Griseb.

Hierba. Endémica. 1700-3200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Senecio oxyphyllus DC.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(CLA, RIV).

Senecio pachyphyllos J. Remy

Sin.: *Senecio domeykoanus* Phil.,

Senecio sedifolius Phil.

Subarbusto. Endémica. 1200-3200 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Senecio pampeanus Cabrera

Sin.: *Senecio pampeanus* Cabrera f. *serratus* Cabrera

Hierba. Nativa. 200-2400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SLU, SFE, TUC).

Senecio pappii Ricardi & Martic.

Subarbusto. Endémica. 3200-3600 m.

Países: CHL(ANT).

Senecio paraguariensis Mattf.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(SCA). PRY(CEN, COA, PAI).

Senecio parodii Cabrera

Hierba. Endémica. 300-1200 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA).

Senecio patagonicus Hook. & Arn.

var. **alyssoides** (Sch. Bip.) Cabrera

Sin.: *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet, *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet var. *alyssoides* Sch. Bip.,

Senecio exilis Hombr. & Jacquinet, *Senecio floccidus* Hombr. & Jacquinet

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

CHL(AIS, MAG).

Senecio patagonicus Hook. & Arn.

var. **andersonii** (Hook. f.) Cabrera

Sin.: *Senecio andersonii* Hook. f.,

Senecio andersonii Hook. f. var. β Hook. f., *Senecio forsteri* Phil.

Subarbusto. Endémica. 100-900 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

CHL(AIS, MAG).

Senecio patagonicus Hook. & Arn.

var. **lobatifolius** (Hombr. & Jacquinet) Cabrera

Sin.: *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet var. *lobatifolia* Hombr. & Jacquinet, *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet var. *pinnatifidus* Macloskie,

Senecio danyaussii Hombr. & Jacquinet var. β J. Remy, nom. inval., *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinet var. *trifurcatus* Sch. Bip., *Senecio xanthoxylon* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

CHL(MAG).

Senecio patagonicus Hook. & Arn.var. **patagonicus**

Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn.
var. *lobulatus* Hook. & Arn., *Senecio choiquelahuensis* Speg., *Senecio hookeri* Hombr. & Jacquinot, nom. illeg., *Senecio lechleri* Phil., *Senecio palenae* Phil.
Subarbusto. Endémica. 200-1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Senecio paucidentatus DC. var.**limbardioides** (Hook. & Arn.) Cabrera

Sin.: *Senecio olivaceus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(VAL).

Senecio paucidentatus DC. var.**paucidentatus**

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Senecio paulensis Bong.

Hierba. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senecio pelquensis Dusén

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(SCR).

Senecio pemehuensis Soldano

Sin.: *Senecio scoparius* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 1400 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Senecio pentaphyllus Phil.

Sin.: *Senecio lacinosus* Phil., *Senecio navarri* Phil., *Senecio pentaphyllus* Phil.
var. *navarri* (Phil.) Reiche, *Senecio schoenleini* Meigen
Subarbusto. Endémica. 2300-2500 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Senecio perezii Cabrera f.**integerrima** Cabrera

Arbusto. Endémica. 1200-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Senecio perezii Cabrera f. **perezii**

Arbusto. Endémica. 600-1200 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Senecio peripotamus C. Jeffrey

Sin.: *Senecio rivularis* J. Remy, hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 300-2700 m.
Países: CHL(COQ).

Senecio peteroanus Phil.

Subarbusto. Endémica. 1600-2100 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(MAU, ARA).

Senecio petrophyus Pelsler

Sin.: *Robinsonia saxatilis* Danton
Arbusto. Endémica. 300 m.
Países: CHL(JFE).

Senecio pfisteri Ricardi & Martic.

Hierba. Endémica. 4000-4900 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio philippicus Regel & Körn.

Sin.: *Senecio paposanus* Phil.
Arbusto. Endémica. 200-900 m.
Países: CHL(ANT).

Senecio philippii Sch. Bip. ex Wedd.

Sin.: *Senecio ammophilus* Phil., *Senecio hirthi* Phil.
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF).
CHL(LLA, AIS, MAG).

Senecio phyllicifolius Poepp. ex DC.

Sin.: *Cineraria phyllicifolia* Poepp. ex DC.
Subarbusto. Endémica. 200-2000 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Senecio phylloleptus Cuatrec.

Arbusto. Endémica. 2900-3900 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Senecio pichineuquensis Tortosa & A.

Bartoli var. **albus** Tortosa & A. Bartoli
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(NEU).

Senecio pichineuquensis Tortosa & A.

Bartoli var. **pichineuquensis**
Arbusto. Endémica. 1300-1600 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Senecio pilquensis H. Buek

Sin.: *Senecio heterophyllus* DC., hom. illeg., *Senecio phylloleptus* Steud., *Senecio porophylloides* J. Remy
Subarbusto. Endémica. 900-1700 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LLA).

Senecio pinachensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(NEU).

Senecio pinnatus Poir. var. **pinnatus**

Sin.: *Cineraria megapotamica* Spreng., *Senecio feuillei* Phil., *Senecio gilliesianus* Hieron. var. *glaberrima* Hieron., *Senecio gilliesianus* Hieron., *Senecio gilliesii* Phil., hom. illeg., *Senecio pinnatus* Poir. var. *pectinatus* Baker, *Senecio pinnatus* Poir. var. *tenuisectus* Griseb.
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PHA). URY(CAS, COL, MON, RNO, TAC).

Senecio pinnatus Poir. var.**simplicifolius** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SLU, SFE).

Senecio pissisi Phil.

Subarbusto. Endémica. 3000-4100 m.
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(COQ).

Senecio planiflorus Kunze ex Cabrera

Sin.: *Senecio littoralis* Poepp. ex DC., nom. inval., *Senecio sinuatilobus* DC. var. *littoralis* DC.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Senecio platensis Arechav.

Sin.: *Senecio pinnatus* DC., nom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MON, ROC, SJO).

Senecio poeppigii Hook. & Arn. var.**discoideus** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1800 m.
Países: ARG(NEU).

Senecio poeppigii Hook. & Arn. var.**poeppigii**

Sin.: *Senecio dealbatus* Phil., *Senecio micropifolius* DC. var. *β. monocephalus* DC., *Senecio williamsii* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1300-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, MAG).

Senecio pogonias Cabrera

Sin.: *Senecio aquaniger* Cabrera & Zardini, *Senecio barbatus* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Senecio polygaloides Phil.

Sin.: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *discoideus* Kuntze, *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *tenuifolius* DC., *Senecio multibracteatus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 2000-3100 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Senecio polyphyllus Kunze ex DC.

Sin.: *Senecio tristis* Phil. var. *comberi* Greenm.
Subarbusto. Endémica. 1700-2600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Senecio portalesianus J. Remy var.

lanuginosus (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio antucensis* Phil. var. *lanuginosa* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1400-2500 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Senecio portalesianus J. Remy var. **portalesianus**

Sin.: *Senecio antucensis* Phil., *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *β nana* D. Don ex Hook. & Arn., *Senecio polyphyllus* Kunze ex DC. var. *antucensis* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémica. 1500-2800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Senecio portulacoides J. Remy

Sin.: *Senecio macer* Phil.
Arbusto. Endémica. 1200-2800 m.
Países: CHL(COQ).

Senecio potosianus Klatt

Sin.: *Senecio attenuatus* Sch. Bip. ex Rusby var. *microphyllus* Britton, *Senecio clavifolius* Rusby
Arbusto. Nativa. 3000-4400 m.
Países: ARG(JUU).

Senecio prenanthifolius Phil.

Sin.: *Senecio helianthoides* Phil., *Senecio ranconensis* Sch. Bip. ex Phil., nom. nud., *Senecio ranconensis* Sch. Bip. ex Lechl., nom. nud.
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, ARA, LLA).

Senecio promatensis Matzenb.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).

Senecio proteus J. Remy var. **geissei** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio geissei* Phil.
Arbusto. Endémica. 1200-1800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Senecio proteus J. Remy var. **proteus**

Sin.: *Senecio bracteolatus* Phil., *Senecio foliolosus* Reiche, *Senecio pinnatifidus* Phil., *Senecio stenophyllus* Phil.
Arbusto. Endémica. 800-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Senecio pseudalmeidae Cabrera

Arbusto. Endémica. 300 m.
Países: CHL(ANT).

Senecio pseudaspericaulis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(NEU, TDF).

Senecio pseuderuroides Cabrera

Arbusto. Endémica. 1900 m.
Países: CHL(RME).

Senecio pseudodepressus L. Salomón

& S.E. Freire
Subarbusto. Endémica. 3600-3700 m.
Países: ARG(SJU).

Senecio pseudotites Griseb.

Sin.: *Senecio pseudotites* Griseb. var. *glabra* Hicken
Hierba. Endémica. 2500-3600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Senecio pterophorus DC.

Sin.: *Senecio balansae* Baker, *Senecio grisebachii* Baker var. *balansae* (Baker) Cabrera, *Senecio grisebachii* Baker var. *leptotus* Cabrera, *Senecio grisebachii* Baker var. *pseudovernonioides* Cabrera, *Senecio grisebachii* Baker var. *subincanus* Cabrera, *Senecio grisebachii* Baker, *Senecio icoglossus* DC. var. *araneosus* Griseb., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(PAY, RNO, SAO, SJO).

Senecio pubescens Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1500-1600 m.
Países: CHL(COQ).

Senecio puchii Phil.

Subarbusto. Nativa. 4000-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio pulcher Hook. & Arn. f.

albiflorus Matzenb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Senecio pulcher Hook. & Arn. f. **pulcher**

Sin.: *Senecio icoglossus* DC. var. *araneosus* DC.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC).

Senecio pulicarioides Baker var.

auriculatus Baker
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).

Senecio pulicarioides Baker var.

pulicarioides
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Senecio pumilus Tortosa & A. Bartoli

Sin.: *Senecio breviramulus* Tortosa & A. Bartoli
Arbusto. Endémica. 1900-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Senecio punae Cabrera

Arbusto. Endémica. 3000-4600 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Senecio pycnanthus Phil.

Sin.: *Senecio pycnanthus* Phil. var. *brevifolia* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(MAU).

Senecio ragonesei Cabrera

Hierba. Endémica. 1800-3300 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Senecio rahmeri Phil. var. **rahmeri**

Subarbusto. Endémica. 4100-4300 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL). CHL(ANT, ATA).

Senecio rahmeri Phil. var. **sericeus**

Cabrera
Subarbusto. Endémica. 4300 m.
Países: ARG(LRI).

Senecio ramboanus Cabrera

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Senecio rauchii Matzenb.

Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Senecio reedi Phil.

Arbusto. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(MEN).

Senecio reicheanus Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2700-4200 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Senecio reitzianus Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Senecio renjifoanus Phil.

Subarbusto. Endémica. 1600-3300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
CHL(RME).

Senecio repollensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1200-2200 m.
Países: ARG(NEU, SCR).

Senecio retanensis Cabrera

Sin.: *Senecio sectilis* Griseb. var.
radiatus Griseb.
Subarbusto. Endémica. 2200-2800 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Senecio ricardii Martic. & Quezada

Arbusto. Endémica. 3100-3400 m.
Países: CHL(ATA).

Senecio riograndensis Matzenb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Senecio riojanus Cabrera var.

radiatus Cabrera
Subarbusto. Endémica. 300-1100 m.
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN,
NEU, RNE, SJU, SLU).

Senecio riojanus Cabrera var.

riojanus
Subarbusto. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, RNE, SJU).

Senecio rudbeckiifolius Meyen & Walp.

Sin.: *Senecio flagellisectus* Griseb.
Arbusto. Nativa. 700-2300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
SLU, TUC).

Senecio rufescens DC.

Sin.: *Senecio adenophylloides* Sch. Bip.,
Senecio austrorufescens Cuatrec.
Arbusto. Nativa. 3500-5200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
CHL(MAU).

Senecio ruiz-lealii Cabrera

Hierba. Endémica. 2600-2700 m.
Países: ARG(MEN).

Senecio saltensis Hook. & Arn.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
SAL, SDE, SFE). URY(RNO).

Senecio sanagastae Cabrera

Subarbusto. Endémica. 600-2600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Senecio sandwichii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 600-1200 m.
Países: ARG(NEU).

Senecio santelicens Phil.

Sin.: *Senecio crispus* Phil. var. *santelensis*
(Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 3500-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).
CHL(ANT, ATA).

Senecio santiagoensis Kuntze

Sin.: *Senecio leucanthemifolius* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2300-2500 m.
Países: CHL(RME).

Senecio saxicola Wedd.

Subarbusto. Nativa. 200-300 m.
Países: CHL(AYP, ATA).

Senecio schoenemannii Phil.

Subarbusto. Endémica. 1300 m.
Países: CHL(MAU).

Senecio schreiteri Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1700-2100 m.
Países: ARG(CAT, SAL, SJU, TUC).

Senecio schyzotus (Cabrera) Iamónico

Sin.: *Senecio grisebachii* Baker var.
schyzotus Cabrera
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Senecio scopulorum Poepp.

Hierba o subarbusto. Endémica. 900-
1500 m.
Países: CHL(BIO).

Senecio scorzonrifolius Meyen & Walp.

Sin.: *Senecio armeriifolius* Phil.
Hierba. Nativa. 4400-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio sectilis Griseb.

Arbusto. Endémica. 1200-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,
SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Senecio segethii Phil.

Sin.: *Senecio peraltae* Phil.
Hierba. Endémica. 4100-4200 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

Senecio selloi (Spreng.) DC.

Sin.: *Cineraria selloi* Spreng., *Senecio*
doroniciflorus Hook. & Arn., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).
URY(CAS, COL, MON, ROC, SAO,
SJO, SOR).

Senecio sericeonitens Speg.

Sin.: *Senecio argentatus* S. Moore,
Senecio morenonis Kuntze, *Senecio*
patagonicus Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 700-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

Senecio serratifolius (Meyen & Walp.)

Cuatrec.
Sin.: *Calcitium serratifolium* Meyen
& Walp., *Senecio cernuiflorus* Cabrera,
Senecio cernuus Phil., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio sinuatilobus DC.

Sin.: *Senecio mollis* Poepp. ex DC.
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Senecio skottsbergii Cabrera var.

anomalus Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(AIS).

Senecio skottsbergii Cabrera var.

skottsbergii
Subarbusto. Endémica. 600-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).
CHL(AIS, MAG).

Senecio smithii DC.

Sin.: *Brachypappus smithii* (DC.) Sch.
Bip., *Cineraria gigantea* Sm., *Cineraria*
leucantha Banks & Sol. ex Walp., *Senecio*
kurtzii Phil., *Senecio punctarenicus*
Krause, *Senecio verbascifolius* Hombr. &
Jacquinot ex Decne
Hierba. Endémica. 0-2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Senecio socompae Cabrera

Subarbusto. Endémica. 3500-4000 m.
Países: ARG(SAL). CHL(ANT).

Senecio sorianoii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 500-600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).

Senecio spinosus DC.

Arbusto. Nativa. 3900-4600 m.
Países: CHL(AYP).

Senecio steparius Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(NEU).

Senecio stigophlebius Baker

Sin.: *Senecio stigophlebius* Cabrera, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 800-900 m.

Países: BRA(SCA).

Senecio subarnicoides Cabrera

Hierba. Endémica. 900-1800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Senecio subauritus Phil.

Subarbusto. Endémica. 900-1500 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Senecio subdiscoideus Sch. Bip. ex Wedd.

Sin.: *Metazanthus grandiflorus*

Meyen, *Senecio breviculus* Phil.,

Senecio caespitosus Phil., *Senecio kingii*

Hook. f. f. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex

Wedd.) Hosseus, *Senecio purpuratus*

Phil., *Senecio purpuratus* Phil. var.

subdiscoideus (Sch. Bip. ex Wedd.) Reiche

Subarbusto. Endémica. 1600-3800 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Senecio subpanduratus O. Hoffm.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, TDF).

Senecio subpubescens Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1000-2300 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, MAG).

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. **erectus** Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio mendocinus* Phil., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var.

macranthus Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. **salsus** (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Senecio disparifolius* Cabrera, *Senecio diversifolius* Phil., hom. illeg., *Senecio innovans* Klatt, *Senecio salsus* Griseb.,

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn.

var. *diversifolius* (Phil.) Cabrera

Arbusto. Nativa. 2500-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. **subulatus**

Sin.: *Senecio subulatus* D. Don ex

Hook. & Arn. var. *elatior* Hook. & Arn.,

Senecio subulatus D. Don ex Hook. &

Arn. var. *prostratus* D. Don

Arbusto. Endémica. 1000-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).

Senecio subumbellatus Phil.

Sin.: *Senecio antirrhinifolius* Phil., *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *subdiscoideus*

DC., *Senecio multicaulis* Poepp., hom. illeg.,

Senecio thermarum Phil.

Subarbusto. Endémica. 1500-3600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Senecio sundtii Phil.

Subarbusto. Nativa. 3600-4700 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

CHL(ANT).

Senecio sylvaticus L.

Hierba. Introducida. 600-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(ARA, LLA, AIS).

Senecio tacorensis Cabrera

Sin.: *Senecio olivaceobracteatus* Ricardi & Martic.

Subarbusto. Nativa. 3500-4700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Senecio tacuarembensis Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(TAC).

Senecio talquinus Phil.

Subarbusto. Endémica. 2100 m.

Países: CHL(MAU).

Senecio tandilensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI).

Senecio tehuelches (Speg.) Cabrera

Sin.: *Senecio miser* Hook. f. var.

tehuelches Speg.

Subarbusto. Endémica. 400-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).

Senecio thurifer (Decne.) Pelsler

Sin.: *Robinsonia thurifera* Decne.

Arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Senecio tilcarensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2800-3100 m.

Países: ARG(JUJ).

Senecio tinctolobus I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémica. 3000-4300 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Senecio tocomarensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 4300 m.

Países: ARG(SAL, SJU).

Senecio toroanus Cabrera

Sin.: *Senecio saucensis* Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2000-2700 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Senecio trafulensis Cabrera

Subarbusto. Endémica. 800-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Senecio tricephalus Kuntze

Sin.: *Senecio tupungatoi* Hauman

Subarbusto. Endémica. 2500-3800 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SCR).

Senecio trichocaulon Baker

Sin.: *Senecio trichocodon* Baker var.

trichocaulon (Baker) Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

PRY(APA).

Senecio trichocodon Baker

Sin.: *Senecio grüneri* Cabrera

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA, CAU).

Senecio tricuspidatus Hook. & Arn.

var. **dentatus** (Sch. Bip.) Cabrera

Sin.: *Senecio ibari* Phil., *Senecio*

longipes Hook. f., *Senecio longipes* Hook.

f. var. *dentatus* Sch. Bip., *Senecio longipes*

Hook. f. var. *integrifolius* Sch. Bip.

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Senecio tricuspidatus Hook. & Arn.

var. **dumosus** (Phil.) Cabrera

Sin.: *Senecio dumosus* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(SCR, TDF).

Senecio tricuspidatus Hook. & Arn.

var. **tricuspidatus**

Sin.: *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm.,

Senecio nordenskjöldii O. Hoffm. var.

simplicior O. Hoffm. ex Dusén, *Senecio*

paeninsularis S. Moore

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

CHL(AIS, MAG).

Senecio trifidus Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio demissus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 2700-4000 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

CHL(RME).

Senecio trifurcatus (G. Forst.) Less.

Sin.: *Cineraria trifurcata* (G. Forst.) Spreng., *Senecio pentadactylus* Phil., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pentadactylus* (Phil.) Speg., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pisensis* Sch. Bip. ex Wedd., *Tussilago trifurcata* G. Forst. Hierba. Endémica. 800-1600 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Senecio trifurcifolius Hieron.

Subarbusto. Nativa. 4200-5100 m. Países: CHL(AYP, TAR).

Senecio triodon Phil. var. **neuquensis**

(Cabrera) Cabrera
Sin.: *Senecio neuquensis* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 1400-2000 m. Países: ARG(NEU). CHL(ARA).

Senecio triodon Phil. var. **triodon**

Sin.: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *subradiatus* DC.
Subarbusto. Endémica. 1200-2500 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Senecio tripinnatifidus Reiche

Subarbusto. Endémica. 1100-1300 m. Países: CHL(COQ, VAL).

Senecio tristis Phil.

Sin.: *Senecio consanguineus* Phil., *Senecio setulosus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1200-2100 m. Países: ARG(CHU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Senecio troncosii Phil.

Sin.: *Senecio thinophilus* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1800 m. Países: CHL(ANT, ATA).

Senecio tucumanensis Cabrera

Hierba. Endémica. 3700 m. Países: ARG(TUC).

Senecio tweediei Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio argentinensis* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, MON, SJO).

Senecio uspillatensis Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio incaae* Phil.
Arbusto. Endémica. 2200-3000 m. Países: ARG(MEN, SJU).

Senecio vaginatus Hook. & Arn.

Sin.: *Senecio littoralis* Gaudich. var. *glabrata* Gaudich.
Hierba. Endémica. 0-600 m. Países: ARG(TDF).

Senecio varvarcensis Cabrera var.

pinnatus Tortosa & A. Bartoli
Subarbusto. Endémica. 1300-1600 m. Países: ARG(NEU).

Senecio varvarcensis Cabrera var.

varvarcensis
Subarbusto. Endémica. 2000 m. Países: ARG(NEU).

Senecio ventanensis Cabrera

Sin.: *Senecio pinnatus* Poir. var. *glandulosus* Ball
Arbusto. Endémica. 800 m. Países: ARG(BAI).

Senecio vervoorstii Cabrera

Arbusto. Endémica. 2200 m. Países: ARG(CAT).

Senecio vira-vira Hieron.

Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *glabriusculus* Griseb., *Senecio argentinus* Baker, *Senecio pinnatus* Poir. var. *achalensis* Griseb., *Senecio sericeus* Kuntze var. *glabriusculus* (Griseb.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m. Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, LPA, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(ART, LAV, MAL, MON, SJO).

Senecio viridis Phil. var. **radiatus** R.E. Fr.

Arbusto. Endémica. 2500-3700 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT).

Senecio viridis Phil. var. **viridis**

Arbusto. Endémica. 3000-4400 m. Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT).

Senecio viscosissimus Colla

Sin.: *Cineraria humilis* Poepp., *Senecio hakeaefolius* Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 0-400 m. Países: CHL(ANT, COQ, VAL).

Senecio volckmannii Phil. var.

volckmannii
Sin.: *Senecio ascotanensis* Phil., *Senecio doñaee-annae* Phil., *Senecio rosmarinus* Phil. var. *ascotanensis* (Phil.) Cabrera, *Senecio rosmarinus* Phil., *Senecio*

spegazzinii Cabrera, *Senecio volckmannii*

Phil. var. *lejocarpus* Cabrera
Subarbusto. Nativa. 3300-4500 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Senecio volckmannii Phil. var.

pinohachense Tortosa & A. Bartoli
Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m. Países: ARG(NEU).

Senecio vulgaris L.

Hierba. Introducida. 0-1200 m. Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(ATA, VAL, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE). URY(MON).

Senecio websteri Hook. f.

Sin.: *Senecio websteri* Hook. f. var. *subdiscoideus* A. Gray
Hierba. Endémica. 0-600 m. Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Senecio werdermannii Greenm.

Sin.: *Senecio modestus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 2000-3000 m. Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Senecio westermanii Dusén

Hierba. Nativa. Países: BRA(PAR).

Senecio xerophilus Phil. var.

deserticola (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Senecio cremophilus* Phil., hom. illeg., *Senecio deserticola* Cabrera, *Senecio eremophilus* Phil.
Subarbusto. Endémica. 4500 m. Países: CHL(ANT).

Senecio xerophilus Phil. var.

xerophilus
Subarbusto. Endémica. 3700-4700 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT).

Senecio yalae Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-3800 m. Países: ARG(JUJ, SAL).

Senecio zapahuirensis Martic. &

Quezada
Arbusto. Endémica. 2100-3200 m. Países: CHL(AYP, TAR).

Senecio zapalae Cabrera

Hierba. Endémica. 600-1200 m. Países: ARG(NEU, SCR).

Senecio zosterifolius Hook. & Arn.

Sin.: *Haplostichia stolonifera* Phil., *Senecio cotuloides* Reiche, *Senecio graminifolius* Phil., *Senecio potamogetonifolius* Sch. Bip. ex Phil., *Senecio uliginosus* Phil.
Hierba. Endémica. 600-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA).

Sigesbeckia L.**Sigesbeckia orientalis** L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(PAI).

Sigesbeckia serrata DC.

Sin.: *Sigesbeckia mandonii* Sch. Bip., nom. nud.
Hierba. Nativa. 1300-2900 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Silybum Vaill., nom. cons.**Silybum marianum** (L.) Gaertn.

Sin.: *Carduus marianus* L.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(MAL).

Simsia Pers.**Simsia dombeyana** DC.

Sin.: *Encelia hirsuta* Kuntze, *Encelia hirsuta* Kuntze f. *radiata* Kuntze, *Simsia hirsuta* (Kuntze) S.F. Blake
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY).

Smallanthus Mack.**Smallanthus araucariophilus** C.A.

Mondin
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).

Smallanthus connatus (Spreng.) H. Rob.

Sin.: *Gymnolomia connata* Spreng., *Polymnia andrei* Arechav., *Polymnia*

connata (Spreng.) S.F. Blake, *Polymnia silphiooides* DC., *Polymnia silphiooides* DC. var. *perennis* Speg. ex Bettfr.

Hierba. Nativa. 200-1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APA, CAN, MIE, PAI). URY(COL, MAL, RNO, ROC, TAC, TYT).

Smallanthus macroscyphus (Baker)

A. Grau ex A.A. Sáenz
Sin.: *Polymnia macroscypha* Baker
Hierba. Nativa. 1200-2200 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA).

Smallanthus riograndensis C.A.

Mondin
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Smallanthus siegesbeckia (DC.) H. Rob.

Sin.: *Polymnia siegesbeckia* DC.
Hierba. Nativa. 600-1600 m.
Países: BRA(PAR). PRY(GUA).

Solidago L.**Solidago argentinensis** López Laph. & Semple

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL).

Solidago chilensis Meyen

Sin.: *Aster sagei* Phil., *Solidago coquimbana* Phil., *Solidago floribunda* Phil., *Solidago laxiflora* Phil., *Solidago linearifolia* DC. var. *brachypoda* Speg., *Solidago linearifolia* DC., *Solidago microglossa* DC. var. *linearifolia* (DC.) Baker, *Solidago parviflora* Phil., *Solidago recta* Phil., *Solidago valdiviana* Phil.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE). PRY(APY, COA). URY(MON, PAY, SOR).

Solidago microglossa DC.

Sin.: *Solidago chilensis* Meyen var. *megapotamica* (DC.) Cabrera, *Solidago microglossa* DC. var. *megapotamica* DC.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APA, APY, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Solidago patagonica Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(AIS).

Solidago virgaurea L.

Hierba. Introducida.
Países: ARG(RNE).

Soliva Ruiz & Pav.**Soliva anthemifolia** (Juss.) Sweet

Sin.: *Gymnostyles anthemifolia* Juss.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA, ITA). URY(ART, MON).

Soliva macrocephala Cabrera

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLA, MON, SOR).

Soliva sessilis Ruiz & Pav.

Sin.: *Gymnostyles alata* Spreng., *Gymnostyles barclayana* (DC.) Steud., *Gymnostyles chilensis* Spreng., *Gymnostyles pterosperma* Juss., *Soliva alata* (Spreng.) DC., *Soliva barclayana* DC., *Soliva daucifolia* Nutt., *Soliva microloma* Phil., *Soliva neglecta* Cabrera, *Soliva pterosperma* (Juss.) Less., *Soliva sessilis* Ruiz & Pav. var. *barclayana* (DC.) Baker, *Soliva valdiviana* Phil.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APA, CON, COA, GUA, MIE, SPE). URY(COL, FLO, MON).

Soliva stolonifera (Brot.) R. Br. ex Sweet

Sin.: *Gymnostyles lusitanica* Spreng., *Gymnostyles nasturtiifolia* Juss., *Gymnostyles stolonifera* (Brot.) R. Br. ex G. Don, *Hippia stolonifera* Brot., *Soliva acaulis* Hook. & Arn., *Soliva anthemifolia* (Juss.) Sweet var. *acaulis* (Hook. & Arn.) Baker, *Soliva lusitanica* (Spreng.) Less., *Soliva nasturtiifolia* (Juss.) DC., *Soliva urbica* Phil.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI). CHL(MAU, RME). URY(FLA, MON).

Soliva triniifolia Griseb.

Hierba. Endémica.
Países: ARG(COR).

Sommerfeltia Less., nom. cons.**Sommerfeltia cabreræ** Chebat.

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: URY(RIV, TAC).

Sommerfeltia spinulosa (Spreng.) Less.

Sin.: *Conyza spinulosa* Spreng.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC).

Sonchus L.**Sonchus arvensis** L.

Hierba. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(MEN). CHL(MAG).

Sonchus asper (L.) Hill

Sin.: *Sonchus oleraceus* L. var. *asper* L.
Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, IDE, JFE, IPA). PRY(GUA). URY(CLA, FLO, ROC, SOR).

Sonchus berterioanus (Decne.) S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris berterioana* (Decne.) Hook. & Arn., *Dendroseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *insignis* (Bertero) Johow, *Phoenicoseris berteriana* (Decne.) Skotts., *Rea berteriana* Decne., *Rea pinnata* Bertero ex Decne. var. *insignis* Bertero
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Sonchus brassicifolius S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris litoralis* Skotts.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Sonchus lobatiflorus S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris gigantea* Johow
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Sonchus marginatus (Bertero ex Decne.) S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris macrophylla* D. Don var. *marginata* (Bertero ex Decne.) Johow, *Dendroseris marginata* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn., *Rea marginata* Bertero ex Decne.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Sonchus micranthus (Bertero ex Decne.) S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris micrantha* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn., *Rea longifolia* Phil. ex Reiche, *Rea micrantha* Bertero ex Decne.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Sonchus neriifolius (Hook. & Arn.) S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris neriifolia* (Decne.) Hook. & Arn., *Rea leucantha* Bertero, *Rea neriifolia* Decne.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Sonchus oleraceus L.

Sin.: *Sonchus gracilis* Phil., *Sonchus rivularis* Phil.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, MAG, RME, IDE, JFE). PRY(APY, CAN). URY(CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Sonchus phoeniciformis S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn., *Phoenicoseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Skotts., *Rea pinnata* Bertero ex Decne.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Sonchus pruinatus (Johow) S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris micrantha* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *pruinata* Johow, *Dendroseris pruinata* (Johow) Skotts., *Rea pruinata* (Johow) Skotts.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Sonchus regius (Skotts.) S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris regia* Skotts.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Sonchus sinuatus S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris macrantha* (Bertero ex Decne.) Skotts., *Rea macrantha* Bertero ex Decne.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Sonchus splendens S.-C. Kim & Mejías

Sin.: *Dendroseris macrophylla* D. Don
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Sonchus tenerrimus L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE).

Sphagneticola O. Hoffm.**Sphagneticola brachycarpa** (Baker) Pruski

Sin.: *Aspilia callosa* Chodat, *Aspilia silphioides* Benth. & Hook. f. f. *parvifolia* Hassl. ex Chodat, nom. illeg., *Stemmodontia brachycarpa* (Baker) Morong, *Thelechitonia brachycarpa* (Baker) H. Rob. & Cuatrec., *Thelechitonia muricata* Cuatrec., *Wedelia brachycarpa* Baker, *Wedelia callosa* (Chodat) B.L. Turner, *Wedelia pilosa* Baker var. *brachycarpa* (Baker) Hassl., *Wedelia pilosa* Baker

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(SCA). PRY(CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski

Sin.: *Complaya trilobata* (L.) Strother, *Silphium trilobatum* L., *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc., *Thelechitonia trilobata* (L.) H. Rob. & Cuatrec.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Spilanthes Jacq.**Spilanthes leiocarpa** DC.

Sin.: *Ceratocephalus leiocarpus* (DC.) Kuntze, *Spilanthes urens* Jacq. var. *hispidula* DC.

Hierba. Nativa. 200-300 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Spilanthes nervosa Chodat

Sin.: *Spilanthes barinensis* Aristeg.,
Spilanthes urens Jacq. var. *nervosa*
(Chodat) Hassl., *Spilanthes urens* Jacq. f.
lanea A.H. Moore, *Spilanthes urens* Jacq.
f. *ciliatifolia* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Spilanthes paraguayensis R.K. Jansen

Sin.: *Spilanthes urens* Jacq. var.
typica Hassl.

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Spilanthes urens Jacq.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Spinoliva G. Sancho, Luebert & Katinas

Spinoliva ilicifolia (Hook. & Arn.) G.
Sancho subsp. **baccharoides** (D. Don ex
Hook. & Arn.) G. Sancho

Sin.: *Proustia baccharoides* D. Don ex
Hook. & Arn., *Proustia ilicifolia* Hook. &
Arn. f. *baccharoides* (D. Don ex Hook. &
Arn.) Fabris
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Spinoliva ilicifolia (Hook. & Arn.) G.
Sancho subsp. **ilicifolia**

Sin.: *Proustia ilicifolia* Hook. & Arn.,
Proustia olivillo Phil., *Proustia pungens* Poepp.
ex Less. var. *ilicifolia* (Hook. & Arn.) DC.,
Proustia reticulata Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 900-2000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Stachycephalum Sch. Bip. ex Benth.

Stachycephalum argentinum Griseb.
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Stenachaenium Benth.

Stenachaenium adenanthum (Sch.
Bip. ex Krasch.) Krasch.

Sin.: *Dichropappus adenanthus* Sch.
Bip. ex Krasch.
Hierba. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stenachaenium campestre Baker

Sin.: *Stenachaenium macrocephalum*
Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).
URY(CLA, COL, MON, SJO, SOR).

Stenachaenium macrocephalum

Benth. ex Benth. & Hook.f.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Stenachaenium megapotamicum

(Spreng.) Baker f. **minor** Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Stenachaenium megapotamicum

(Spreng.) Baker var. **megapotamicum**

Sin.: *Conyza megapotamica* Spreng.,
Pluchea macrocephala DC.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, GUA). URY(CAS, CLA, LAV,
MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, TAC).

Stenachaenium megapotamicum

(Spreng.) Baker var. **pedunculata** Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(SPE).

Stenachaenium riedelii Baker

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, PAI).
URY(RIV, TAC).

Stenocephalum Sch. Bip.

Stenocephalum apiculatum (Mart. ex
DC.) Sch. Bip.

Sin.: *Vernonia apiculata* Mart. ex DC.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Stenocephalum hexanthum Sch. Bip.

Sin.: *Cacalia hexantha* (Sch. Bip.) Kuntze,
Vernonia hexantha (Sch. Bip.) Baker var.
hexantha, *Vernonia megapotamica* Spreng.
var. *hexantha* (Sch. Bip.) Cabrera, *Vernonia*
megapotamica Spreng. subsp. *eriocephala*
Malme

Subarbusto. Nativa. 200-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).
BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU,
CAA, COA, MIE, PAI).

Stenocephalum hystrix (Chodat) H. Rob.

Sin.: *Vernonia hystrix* Chodat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAA, CAN, COA,
MIE, PAI).

Stenocephalum megapotamicum

(Spreng.) Sch. Bip.

Sin.: *Stenocephalum melanotrichum*
(DC.) Sch. Bip., *Stenocephalum*
penicillatum Sch. Bip., *Vernonia*
abbatobiana Chodat, *Vernonia hexantha*
(Sch. Bip.) Baker var. *balansae* Chodat,
Vernonia hexantha (Sch. Bip.) Baker var.
eleagnoides Chodat, *Vernonia hexantha*
(Sch. Bip.) Baker var. *nivea* (Chodat)
Chodat, *Vernonia hexantha* (Sch. Bip.)
Baker var. *paraguariensis* Chodat,
Vernonia megapotamica Spreng., *Vernonia*
megapotamica Spreng. var. *argentina*
Hieron., *Vernonia megapotamica*
Spreng. var. *melanotrichia* DC., *Vernonia*
megapotamica Spreng. var. *penicillata*
(Sch. Bip.) Baker, *Vernonia nivea* Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN,
COA, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CLA,
LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC).

Stevia Cav.**Stevia achalensis** Hieron.

Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, MEN, SAL, TUC).

Stevia alpina Griseb. var. **alpina**

Sin.: *Stevia grisebachiana* Hieron.,
Stevia schickendantzii Hieron.
Subarbusto. Endémica. 1700-2700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Stevia alpina Griseb. var. **glutinosa**

Ariza & Cerana
Subarbusto. Endémica. 1700-3100 m.
Países: ARG(CAT).

Stevia alternifolia Hieron.

Hierba. Nativa. 100-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stevia amambayensis B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, COA, PAI).

Stevia ammotropha B.L. Rob.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CEN, MIE).

- Stevia amplexicaulis** Hassl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).
- Stevia apensis** B.L. Rob.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, CAU, CON, PAI).
- Stevia aristata** D. Don ex Hook. & Arn.
Sin.: *Stevia aristata* D. Don ex Hook. & Arn. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). PRY(APA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(PAY, SJO).
- Stevia balansae** Hieron.
Sin.: *Stevia hassleriana* Chodat
Subarbusto. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
- Stevia breviaristata** Hook. & Arn.
Sin.: *Stevia boliviensis* Sch. Bip. ex Rusby, *Stevia discolor* B.L. Rob., *Stevia lorentzii* Griseb., *Stevia pubigera* Hieron., *Stevia pubigera* Hieron. var. *subglabrata* Hieron., *Stevia schultzei* Hieron.
Hierba. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). PRY(APY).
- Stevia burkartii** B.L. Rob.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(TAC).
- Stevia camachensis** Hieron.
Hierba. Nativa. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Stevia carapariensis** Cabrera & Vittet
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(SAL).
- Stevia catharinensis** Cabrera
Hierba. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON).
- Stevia centinelae** Cabrera
Hierba. Endémica. 2600-2700 m.
Países: ARG(JUJ).
- Stevia chamaedrys** Griseb. var. **chamaedrys**
Sin.: *Stevia nevadensis* Hieron.
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Stevia chamaedrys** Griseb. var. **glandulifera** Ariza & Cerana
Hierba. Endémica. 2900-3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI).
- Stevia cinerascens** Sch. Bip. ex Baker
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RNO, RIV, SOR).
- Stevia clauseni** Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Stevia collina** Gardner
Sin.: *Stevia commixta* B.L. Rob.
Subarbusto. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).
- Stevia congesta** Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CAS, MAL).
- Stevia crassicephala** Cabrera
Hierba. Endémica. 1700-2500 m.
Países: ARG(JUJ).
- Stevia crenulata** Baker
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Stevia cruziana** Malme
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Stevia cuneata** Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, PHA).
- Stevia entriensis** Hieron.
Sin.: *Dissothrix hassleriana* Chodat, *Stevia entriensis* Hieron. var. *minor* Hieron., *Stevia hirsuta* Griseb., hom. illeg., *Stevia oxylaena* Griseb., hom. illeg., *Stevia oxylaena* DC. var. *villosa* Hieron., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA). URY(COL, RNO, TAC).
- Stevia estrellensis** B.L. Rob.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, SPE).
- Stevia fiebrigii** Hieron. var. **fiebrigii**
Hierba. Nativa. 2300-2600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Stevia fiebrigii** Hieron. var. **jujuiensis** Cabrera
Hierba. Endémica. 1300-1700 m.
Países: ARG(JUJ).
- Stevia fiebrigii** Hieron. var. **vattuonei** (Hicken) Cabrera
Sin.: *Stevia fiebrigii* Hieron. var. *gracillima* B.L. Rob., *Stevia satuireifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. *vattuonei* Hicken
Hierba. Endémica. 1200-1500 m.
Países: ARG(CAT, SAL).
- Stevia gardneriana** Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Stevia gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Sin.: *Stevia arnottiana* Baker, nom. superfl., *Stevia lanceolata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Stevia tenuifolia* Phil.
Hierba. Endémica. 900-3100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU).
- Stevia gilliesii** Hook. & Arn. var. **glandulosa** Ariza & Cerana
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
- Stevia gratioloides** Hook. & Arn.
Sin.: *Stevia veronicae* DC. var. *gratioloides* (Hook. & Arn.) Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, DUR, RIV, ROC, TAC, TYT).
- Stevia heptachaeta** DC.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Stevia involucrata** Sch. Bip. ex Baker
Hierba. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Stevia jujuyensis** Cabrera
Hierba. Endémica. 1000-1600 m.
Países: ARG(JUJ).
- Stevia leptophylla** Baker
Sin.: *Stevia guaranitica* Chodat
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA, PAI).
- Stevia lilloi** B.L. Rob.
Hierba. Endémica. 1500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Stevia lundiana DC.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Stevia maimarensis (Hieron.) Cabrera

Sin.: *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. *maimarensis* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 2400-3300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Stevia menthaefolia Sch. Bip.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Stevia mercedensis Hieron. var.

glanditecta B.L. Rob.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SLU).

Stevia mercedensis Hieron. var. **mercedensis**

Sin.: *Stevia mercedensis* Hieron. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval.
Hierba. Nativa. 400-2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC).

Stevia mercedensis Hieron. var.

pereyrae B.L. Rob.
Sin.: *Stevia pereyrae* (B.L. Rob.) Cabrera
Hierba. Endémica. 3200-3700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Stevia minor Griseb.

Hierba. Endémica. 3100-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

Stevia multiaristata Spreng.

Sin.: *Pectis violacea* Griseb., *Stevia hirsuta* Hook. & Arn., *Stevia laxa* Hook. & Arn., *Stevia laxa* Hook. & Arn. var. *curtula* Malme, *Stevia megapotamica* DC., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. *laxa* (Hook. & Arn.) Baker, *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. *multiaristata* (Spreng.) Baker, *Stevia violacea* (Griseb.) Hieron. ex Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(COL, FLA, LAV, MON, PAY, RIV, SJO, TYT).

Stevia myriadenia Sch. Bip. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 1000-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stevia okadae Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-3400 m.
Países: ARG(SAL).

Stevia ophryodonta B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(TYT).

Stevia ophryophylla B.L. Rob.

Hierba. Nativa. 700-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stevia parvifolia Hassl.

Hierba. Endémica. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Stevia philippiana Hieron.

Sin.: *Porophyllum tarapacanam* Zoellner, *Stevia hyssopifolia* Phil. var. *panulensis* B.L. Rob. & Fernald, *Stevia hyssopifolia* Phil., hom. illeg., *Stevia menthaefolia* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Stevia pohliana Baker

Hierba. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Stevia potrerensis Hieron.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Stevia procumbens Hieron.

Sin.: *Stevia boliviensis* Griseb., p.p.
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni

Sin.: *Eupatorium rebaudianum* Bertoni, *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Hemsl., comb. superfl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, CON, COA, ITA).

Stevia regnellii Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 1000-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Stevia rojasii Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Stevia sabulonis B.L. Rob.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(MIE). URY(MAL).

Stevia sanguinea Hieron.

Sin.: *Stevia camporum* Griseb., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1500-2600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip.

ex Klotzsch var. **patagonica** (Hieron.) Hieron.
Sin.: *Stevia multiaristata* Spreng. var. *patagonica* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 300-2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, NEU, RNE).

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. **satureiifolia**

Sin.: *Carelia saturiifolia* (Lam.) Juss. ex Cav., *Eupatorium satureiifolium* Lam., *Mikania satureiifolia* (Lam.) Willd., *Nothites satureiifolia* (Lam.) DC., *Stevia linariifolia* DC., *Stevia multiaristata* Griseb., hom. illeg., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch f. *genuina* Hieron., nom. inval., *Stevia saturiifolia* (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch f. *angustifolia* Baker
Subarbusto. Nativa. 200-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch var. **ventanensis** Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI).

Stevia schreiteri B.L. Rob.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL).

Stevia selloi (Spreng.) Sch. Bip. ex Baker

Sin.: *Kleinia selloi* Spreng., *Stevia selloi* (Spreng.) B.L. Rob. var. *ypacarayensis* B.L. Rob.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(MAL).

Stevia spathulata Cabrera

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(CAU).

Stevia tarijensis Hieron.

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Stevia tenuis Hook. & Arn.

Sin.: *Stevia veronicae* DC. var. *tenuis* (Hook. & Arn.) Baker
Hierba. Endémica. 900-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stevia vaga Griseb. var. **effusa**

(Hieron.) Ariza & Cerana
Sin.: *Stevia boliviensis* Griseb., p.p.,
Stevia effusa Hieron., *Stevia effusa*
Hieron. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval.
Subarbusto. Endémica. 300-3100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
SAL, SJU, TUC).

Stevia vaga Griseb. var. **saltensis**

(Hieron.) Ariza & Cerana
Sin.: *Stevia effusa* Hieron. var.
saltensis Hieron.
Subarbusto. Endémica. 1400-2400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Stevia vaga Griseb. var. **vaga**

Sin.: *Stevia diversipapposa* Hieron.,
Stevia diversipapposa Hieron.
f. *breviaristata* Hieron., *Stevia*
diversipapposa Hieron. f. *exaristata*
Hieron., *Stevia diversipapposa* Hieron. f.
longiaristata Hieron., *Stevia procumbens*
Hieron. var. *tucumanensis* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 1100-2600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Stevia veronicae DC.

Hierba. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stevia villaricensis (B.L. Rob.) Cabrera & Vittet

Sin.: *Stevia aristata* D. Don ex Hook. &
Arn. var. *villaricensis* B.L. Rob.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(GUA).

Stevia yaconensis Hieron. var. **aristifera** B.L. Rob.

Hierba. Nativa. 2200-2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Stevia yaconensis Hieron. var. **saltensis** (Hieron.) B.L. Rob.

Sin.: *Stevia saltensis* Hieron.
Hierba. Nativa. 1200-2100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU).

Stevia yaconensis Hieron. var. **subglandulosa** Hieron.

Hierba. Endémica. 1000-2200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Stevia yaconensis Hieron. var. **yaconensis**

Sin.: *Stevia yacoensis* Hieron. var.
typica B.L. Rob., nom. inval.
Hierba. Nativa. 1400-2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Stevia yalae Cabrera

Hierba. Endémica. 2300-2600 m.
Países: ARG(JUJ).

Steyermarkia Standl.**Steyermarkia dispalata** (Gardner)

R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium dispalatum* Gardner
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Steyermarkia dusenii (Malme) R.M.

King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium dusenii* Malme
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Steyermarkia pyrifolia (DC.) R.M.

King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium pyrifolium* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Stiffia J.C. Mikan**Stiffia chrysantha** J.C. Mikan

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Stomatanthes R.M. King & H. Rob.**Stomatanthes oblongifolius**

(Spreng.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Conyza oblongifolia* Spreng.,
Eupatorium elongatum Hook. & Arn.,
Eupatorium oblongifolium (Spreng.)
Baker f. *odoratissima* Hassl., *Eupatorium*
oblongifolium (Spreng.) Baker var.
elongatum (Hook. & Arn.) Baker,
Eupatorium oblongifolium (Spreng.)
Baker var. *oxyodontum* B.L. Rob.,
Eupatorium oblongifolium (Spreng.)
Baker var. *tucumanense* Baker,
Eupatorium oblongifolium (Spreng.)
Baker, *Kuhnia glabrata* DC. var. *a* DC.,
nom. inval., *Kuhnia glabrata* DC. var. *β*
DC., nom. inval.
Subarbusto. Nativa. 100-300 m.
Países: ARG(ERI, MIS, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, MIE).
URY(MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC).

Stomatanthes subcapitatus (Malme)

H. Rob.
Sin.: *Eupatorium subcapitatum* Malme
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Strophopappus DC.**Strophopappus regnellii** (Baker) R.

Esteves
Sin.: *Stilpnopappus regnellii* Baker
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Struchium P. Browne**Struchium sparganophorum** (L.)

Kuntze
Sin.: *Ethulia sparganophora* L.,
Sparganophorus vaillantii Crantz
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Symphiopappus Turcz.**Symphiopappus casarettoi** B.L. Rob.

Sin.: *Eupatorium casarettoi* (B.L. Rob.)
Steyerm.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphiopappus compressum

(Gardner) B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium compressum* Gardner
Árbol. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphiopappus cuneatus (DC.) Sch.

Bip. ex Baker
Sin.: *Eupatorium cuneatum* DC.
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphiopappus itatayensis

(Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium itatayense* Hieron.,
Symphiopappus polystachyus Baker var.
microcephala Baker
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphiopappus lymansmithii B.L. Rob.

Sin.: *Eupatorium lymansmithii* (B.L.
Rob.) Steyerm.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphiopappus reitzii (Cabrera)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium benjamin-lincolnii* Steyererm. var. *vernicosum* (Baker) Steyererm., *Eupatorium reitzii* Cabrera, *Symphiopappus reticulatus* Baker var. *vernicosus* Baker

Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Symphotrichum Nees**Symphotrichum glabrifolium** (DC.)

G.L. Nesom

Sin.: *Aster glabrifolius* (DC.) Reiche, *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *australis* (Phil.) Reiche, *Erigeron australis* Phil., *Erigeron glabrifolius* DC., *Erigeron scorzoneraefolium* J. Remy

Hierba. Endémica. 1500-2400 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Symphotrichum graminifolium

(Spreng.) G.L. Nesom

Sin.: *Aster cabraerae* Ariza, *Aster divaricatus* Baker, hom. illeg. var. *graminifolius* (Spreng.) Baker, *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron. var. *graminifolius* (Spreng.) Hieron., *Conyza graminifolia* Spreng., *Conyzanthus graminifolius* (Spreng.) Tamamsch.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(FLA).

Symphotrichum laeve (L.) Á. Löve &

D. Löve

Sin.: *Aster laevis* L.

Subarbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphotrichum patagonicum

(Cabrera) G.L. Nesom

Sin.: *Aster patagonicus* Cabrera

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(MAG).

Symphotrichum peteroanum (Phil.)

G.L. Nesom

Sin.: *Aster peteroanus* Phil., *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *latifolius* Cabrera

Hierba. Endémica. 1000-2200 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

Symphotrichum regnellii (Baker)

G.L. Nesom

Sin.: *Aster regnellii* Baker, *Erigeron regnellii* Sch. Bip., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Symphotrichum squamatum

(Spreng.) G.L. Nesom

Sin.: *Aster asteroides* (Bertero ex Colla) Rusby, comb. illeg., *Aster divaricatus* Baker, hom. illeg., *Aster exilis* Elliott var. *australis* A. Gray, *Aster linifolius* Griseb., hom. illeg., *Aster moelleri* (Phil.) Reiche, *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron., *Aster subtropicus* Morong, *Baccharis asteroides* Bertero ex Colla, *Conyza berteroana* Phil., *Conyza squamata* Spreng., *Conyzanthus squamatus* (Spreng.) Tamamsch., *Erigeron depilis* Phil., *Erigeron semiamplexicaule* Meyen, *Symphotrichum subulatum* (Michx.)

G.L. Nesom var. *squamatum* (Spreng.)

S.D. Sundb., *Tripolium conspicuum* J. Remy, *Tripolium moelleri* Phil., *Tripolium oliganthum* Phil., *Tripolium subulatum* Nees & C. Mart. var. *brasilianum* DC.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(MON, TYT).

Symphotrichum vahlii (Gaudich.)

G.L. Nesom

Sin.: *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *robusta* De Wild., *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *tenuifolius* (Phil.) Cabrera, *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn., *Aster zosterifolius* Reiche, *Astradelphus calbucanus* Phil., *Erigeron graminifolius* Phil., *Erigeron pugae* Phil., *Erigeron tripolioides* Phil., *Erigeron vahlii* Gaudich. var. *robusta* Albov, *Erigeron vahlii* Gaudich., *Symphotrichum vahlii* (Gaudich.) G.L. Nesom var. *tenuifolium* (Phil.) G.L. Nesom, *Tripolium humile* Phil., *Tripolium tenuifolium* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Synedrella Gaertn.**Synedrella nodiflora** (L.) Gaertn.

Sin.: *Ucacou nodiflorum* (L.) Hitchc., *Verbesina nodiflora* L.

Hierba. Nativa. 300-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Synedrellopsis Hieron. & Kuntze**Synedrellopsis grisebachii** Hieron. & Kuntze ex Kuntze

Sin.: *Synedrella nodiflora* Griseb. ex Kuntze, nom. nud.

Hierba. Nativa. 300-1800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, AMA).

Tagetes L.**Tagetes argentina** Cabrera

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(COR, MEN, SJU, SLU).

Tagetes biflora Cabrera

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU, SLU).

CHL(ATA).

Tagetes campanulata Griseb.

Subarbusto. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Tagetes filifolia Lag.

Sin.: *Diglossus variabilis* Cass., *Tagetes anisata* Lillo, *Tagetes dichotoma* Turcz., *Tagetes foeniculacea* Poepp. ex DC., hom. illeg., *Tagetes multifida* DC., *Tagetes pseudomicrantha* Lillo, *Tagetes pusilla* Kunth, *Tagetes scabra* Brandege, *Tagetes silenoides* Meyen & Walp.

Hierba. Nativa. 1000-4400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Tagetes laxa Cabrera

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Tagetes minuta L.

Sin.: *Tagetes bonariensis* Pers., *Tagetes glandulifera* Schrank, *Tagetes glandulosa* Link, *Tagetes porophyllum* Vell.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(APY, AMA, COA, PHA). URY(COL, LAV, MON, TAC).

Tagetes multiflora Kunth

Sin.: *Tagetes andina* M. Ferraro, *Tagetes erythrocephala* Rusby, *Tagetes multiflora* Kunth var. *rupestris* Wedd.

Hierba. Nativa. 1000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Tagetes ostenii Hicken

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(RNO, SAO).

Tagetes pauciloba DC.

Sin.: *Tagetes mendocina* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

Tagetes perezii Cabrera

Subarbusto. Endémica. 2200-3100 m.
Países: ARG(SJU).

Tagetes praetermissa (Strother) H. Rob.

Sin.: *Vilobia praetermissa* Strother
Nativa. 3300-3600 m.
Países: ARG(JUJ).

Tagetes riojana M. Ferraro

Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Tagetes rupestris Cabrera

Hierba. Endémica. 2100-2600 m.
Países: ARG(TUC).

Tagetes terniflora Kunth

Sin.: *Tagetes cabreriae* M. Ferraro, *Tagetes gigantea* Carrière, *Tagetes graveolens* L'Hér. ex DC., *Tagetes tinctoria* Walp.

Hierba. Nativa. 700-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Tanacetum L.

Tanacetum balsamita L.

Sin.: *Balsamita major* Desf., *Chrysanthemum balsamita* (L.) Baill., hom. illeg., *Chrysanthemum balsamita*

L., *Chrysanthemum balsamitoides* Nábelek, *Leucanthemum balsamita* (L.) Over, *Matricaria balsamita* (L.) Desr., *Pyrethrum balsamita* (L.) Willd. var. *tanacetoides* Boiss., *Pyrethrum balsamita* (L.) Willd., *Pyrethrum balsamitoides* (Nábelek) Tzvelev, *Pyrethrum majus* (Desf.) Tzvelev, *Pyrethrum tanacetum* DC., nom. illeg., *Tanacetum balsamita* L. subsp. *balsamitoides* (Sch. Bip.) Grierson, *Tanacetum balsamitoides* Sch. Bip.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, LPA, MEN).

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

Sin.: *Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh., *Leucanthemum parthenium* (L.) Gren. & Godr., *Matricaria parthenium* L., *Pyrethrum parthenium* (L.) Sm.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME). URY(MON).

Tanacetum vulgare L.

Sin.: *Chrysanthemum vulgare* (L.) Bernh., nom. illeg., *Pyrethrum vulgare* (L.) Boiss.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, TDF, TUC). BRA(PAR). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON).

Taraxacum F.H. Wigg., nom. cons.

Taraxacum angustisquameum

Dahlst. ex H. Lindb.
Hierba. Endémica. 800 m.
Países: CHL(RME).

Taraxacum copidophyllum Dahlst.

Hierba. Endémica. 500 m.
Países: CHL(RME).

Taraxacum duplidentifrons Dahlst.

Hierba. Introducida. 500-600 m.
Países: ARG(TDF).

Taraxacum fernandezianum Dahlst.

ex Skotts. b.
Sin.: *Taraxacum cuzcense* A.J. Richards, *Taraxacum subspathulatum* A.J. Richards
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(ERI, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(RME, JFE).

Taraxacum gilliesii Hook. & Arn.

Sin.: *Taraxacum andinum* Dahlst., *Taraxacum dens-leonis* Desf. var. *laevigatum* (Willd.) Hook., *Taraxacum ibari* Phil., *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. var. *magellanicum* (Comm. ex Sch. Bip.) Reiche, *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip., *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip. var. *lobatum* Dahlst., *Taraxacum rhusiocarpum* Dahlst.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(MAG, RME).

Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.

Sin.: *Leontodon erythrospermum* (Andrz.) Eichw., *Leontodon laevigatus* Willd., *Taraxacum erythrospermum* Andrz., *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. var. *erythrospermum* (Andrz.) J. Weiss, *Taraxacum officinale* F.H. Wigg. var. *erythrospermum* (Andrz.) Bab., *Taraxacum officinale* F.H. Wigg. var. *laevigatum* (Willd.) Bouvier

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Taraxacum marklundii Palmgr.

Hierba. Introducida. 500 m.
Países: CHL(RME).

Taraxacum officinale F.H. Wigg.

Sin.: *Leontodon taraxacum* L., *Leontodon vulgaris* Lam., nom. illeg., *Taraxacum dens-leonis* Desf., *Taraxacum vulgare* (Lam.) Schrank., nom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, IPA). PRY(APA, CAA, GUA). URY(MON, ROC).

Taraxacum patagonicum Uhlemann

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(MAG).

Taraxacum plumbeum Dahlst.

Hierba. Introducida. 500 m.
Países: ARG(SCR). CHL(RME).

Taraxacum stictophyllum Dahlst.

Hierba. Introducida. 200-500 m.
Países: ARG(SCR).

Taraxacum vatisectum Markl.

Hierba. Introducida. 500 m.
Países: CHL(RME).

Tessaria Ruiz & Pav.**Tessaria absinthioides** (Hook. & Arn.) DC.

Sin.: *Baccharis absinthioides* Hook. & Arn., *Gynheteria incana* Spreng., p.p., *Pluchea absinthioides* (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec.

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(COA). URY(MAL, MON, ROC).

Tessaria ambigua DC.

Sin.: *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. var. *ambigua* (DC.) R.E. Fr., *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. var. *ambigua* (DC.) S.E. Freire, *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. var. *obtusifolia* Hassl., *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. var. *polyandra* Cabrera

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, PHA).

Tessaria dodoneifolia (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **dodoneifolia**

Sin.: *Conyza straminea* Chodat, *Eupatorium dodoneifolium* Hook. & Arn., *Pluchea dodoneifolia* (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec., *Tessaria straminea* (Chodat) Hassl., *Tessaria viscosa* Lillo

Arbusto. Nativa. 600-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(CEN, PHA). URY(COL).

Tessaria dodoneifolia (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **plucheoides** (Hassl.) S.E. Freire

Sin.: *Tessaria plucheoides* Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: PRY(CEN, PHA).

Tessaria fastigiata (Griseb.) Cabrera

Sin.: *Pluchea fastigiata* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 700-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

PRY(APY).

Tessaria integrifolia Ruiz & Pav.

Sin.: *Gynheteria incana* Spreng., p.p., *Tessaria ambigua* DC. var. *uniflora* Cuatrec., *Tessaria dentata* Ruiz & Pav., *Tessaria legitima* DC.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, CEN, ÑEE, PHA). URY(COL).

Thamnoseric F. Phil.**Thamnoseric lacerata** (Phil.) F. Phil. f. **lacerata**

Sin.: *Rhea lacerata* Phil., *Sonchus*

laceratus (Phil.) S.-C Kim & Mejías

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(IDE).

Thamnoseric lacerata (Phil.) F. Phil. f. **obtusifolia** Skottsb.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(IDE).

Thelesperma Less.**Thelesperma megapotamicum** (Spreng.) Kuntze

Sin.: *Bidens gracilis* Torr., *Bidens leyboldii* Phil., *Bidens megapotamica* Spreng., *Bidens paradoxa* Don ex Hook. & Arn., *Cosmidium gracile* (Torr.) Nutt., *Isostigma megapotamicum* (Spreng.) Sherff, *Thelesperma gracile* (Torr.) A. Gray, *Thelesperma megapotamicum* (Spreng.) Herter, comb. superfl., *Thelesperma scabiosoides* Less.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SFE, SDE). URY(PAY).

Thymophylla Lag.**Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small

Sin.: *Dyssodia belenidium* (DC.)

Macloskie, comb. superfl., *Dyssodia belenidium* (DC.) O. Hoffm., *Dyssodia berlandieri* (DC.) S.F. Blake, *Dyssodia cupulata* A. Nelson, *Dyssodia gracilis* (Rydb.) Cory, *Dyssodia pentachaeta* (DC.) B.L. Rob. var. *belenidium* (DC.) Strother, *Dyssodia thurberi* (A. Gray) A. Nelson, *Dyssodia thurberi* (A. Gray) B.L. Rob, comb. superfl., *Hymenatherum belenidium* DC., *Hymenatherum berlandieri* DC., *Hymenatherum candolleianum* Hook. & Arn., nom. illeg., *Hymenatherum pentachaetum* DC., *Hymenatherum thurberi* A. Gray, *Tagetes belenidium* (DC.) Kuntze, *Thymophylla*

belenidium (DC.) Cabrera, *Thymophylla gracilis* Rydb., *Thymophylla pentachaeta* (DC.) Small var. *belenidium* (DC.)

Strother, *Thymophylla thurberi* (A. Gray) Wooton & Standl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE).

Tilesia G. Mey.**Tilesia baccata** (L.) Pruski

Sin.: *Chatiakella platyglossa* Cass., *Chatiakella stenoglossa* Cass., *Coreopsis baccata* L., *Pascalina baccata* (L.) Spreng., *Wulffia baccata* (L.) Kuntze, *Wulffia platyglossa* (Cass.) DC., *Wulffia stenoglossa* DC.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN).

Tithonia Desf. ex Juss.**Tithonia diversifolia** (Hemsl.) A. Gray

Sin.: *Miracalia diversifolia* Hemsl.

Arbusto a subarbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake

Sin.: *Tagetes rotundifolia* Mill., *Tithonia uniflora* J.F. Gmel.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, SCA).

Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass.

Sin.: *Helianthus tubiformis* Jacq.

Hierba. Introducida. 200-2000 m.

Países: ARG(CHA, COR, JUJ, SAL, SDE).

Tolpis Adans.**Tolpis barbata** (L.) Gaertn.

Sin.: *Crepis barbata* L., *Tolpis umbellata* Bertol.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Tragopogon L.**Tragopogon dubius** Scop.

Sin.: *Tragopogon major* Jacq.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR).

Tragopogon porrifolius L.

Hierba. Introducida. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, AIS, RME).

Tragopogon pratensis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, TDF).

Trichocline Cass.**Trichocline aurea** (D. Don) Reiche

Sin.: *Bichenia aurea* D. Don,
Chaetanthera berteriana Less., *Trichocline pedicularifolia* Walp.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Trichocline auriculata (Wedd.)

Hieron. var. **auriculata**

Sin.: *Bichenia auriculata* Wedd.
Hierba. Nativa. 3300-4600 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Trichocline auriculata (Wedd.)

Hieron. var. **breviscapa** Zardini
Hierba. Endémica. 3300-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Trichocline boecheri Cabrera

Hierba. Endémica. 1500-3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Trichocline catharinensis Cabrera

Sin.: *Trichocline catharinensis* Cabrera
var. *discolor* Cabrera

Hierba. Endémica. 700-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(ROC).

Trichocline caulescens Phil.

Sin.: *Chaetanthera crispa* Phil.,
Onoseris lanata Phil., *Trichocline nivea*
Phil., *Trichocline stuebelii* Phil.

Hierba. Nativa. 1800-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Trichocline cineraria (D. Don) Hook. & Arn.

Sin.: *Bichenia cineraria* D. Don,
Bichenia crenata (J. Remy) Wedd.,
Chaetanthera crenata J. Remy,
Gerbera cineraria (D. Don) Kuntze,
Leuceria contrayerba Kurtz, *Trichocline contrayerba* (Kurtz) Hauman, *Trichocline crenata* (J. Remy) Reiche, *Trichocline tontalensis* Hieron.

Hierba. Endémica. 1700-3400 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL).

Trichocline cisplatina E. Pasini &

M.R. Ritter

Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(RGS). URY(ROC).

Trichocline dealbata (Hook. & Arn.)

Benth. & Hook. f. ex Griseb.

Sin.: *Chaetanthera dealbata* Hook.
& Arn., *Chaetanthera parviflora* Phil.,
Gerbera pulvinata Kuntze, *Trichocline cineraria* (D. Don) Hook. & Arn. var.
pulvinata (Kuntze) Hauman

Hierba. Endémica. 2000-3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, RME).

Trichocline deserticola Zardini

Sin.: *Onoseris spathulata* Phil.,
Trichocline spathulata (Phil.) Zardini,
comb. illeg.

Hierba. Endémica. 3500-4000 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Trichocline exscapa Griseb.

Hierba. Endémica. 2200-4300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Trichocline heterophylla (Spreng.) Less.

Sin.: *Chaptalia heterophylla* (Spreng.)
D. Don, *Onoseris heterophylla* Spreng.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). URY(CAS, FLA,
MAL, MON).

Trichocline humilis Less.

Sin.: *Trichocline heterophylla* (Spreng.)
Less. var. *humilis* (Less.) Baker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). PRY(PAI). URY(ART, CAS,
MAL, ROC, SAO, SOR, TAC).

Trichocline incana (Lam.) Cass.

Sin.: *Arnica incana* (Lam.) Pers.,
Doronicum incanum Lam., *Gerbera incana*
(Lam.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI, SAL). BRA(RGS).
URY(ART, COL, MAL, MON, PAY,
ROC, SJO).

Trichocline linearifolia Malme

Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Trichocline macrocephala Less.

Sin.: *Trichocline foliosa* Hook. & Arn.
Hierba. Nativa. 600-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Trichocline macrorrhiza Cabrera

Hierba. Endémica. 2400-3700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Trichocline maxima Less.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

Trichocline plicata D. Don ex Hook. & Arn.

Sin.: *Brachyclados stuckertii* Speg.,
Gerbera plicata (D. Don ex Hook. & Arn.)
Kuntze, *Trichocline argentea* Griseb.
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Trichocline reptans (Wedd.) Hieron.

Sin.: *Bichenia reptans* Wedd., *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze f. *aurantiaca*
Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze
f. *pallida* Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.)
Kuntze var. *intermedia* Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze var. *reptans*
(Wedd.) Kuntze, *Trichocline reptans*
(Wedd.) B.L. Rob., comb. superfl.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU,
SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY).

Trichocline sinuata (D. Don) Cabrera

Sin.: *Bichenia sinuata* D. Don
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA,
MEN, RNE, SLU, SFE).

Trichocline speciosa Less.

Sin.: *Trichocline collina* Baker,
Trichocline paraguayensis Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, COA, GUA, SPE).

Trichogonia (DC.) Gardner**Trichogonia chodatii** (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium chodatii* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU).

Trichogonia hassleri Mattf.

Sin.: *Trichogonia menthifolia* Gardner f.
attenuata Hassl., *Trichogonia menthifolia*
Gardner f. *cordata* Hassl., *Trichogonia menthifolia*
Gardner var. *martii* Hassl.,
Trichogonia menthifolia Gardner var.
tomentosula Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CON,
COA, GUA).

Trichogonia phlebodes (B.L. Rob.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium phlebodes* B.L. Rob.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Trichogonia rhodotricha Malme

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS).

Trichogonia salviifolia Gardner

Sin.: *Trichogonia fiebrigii* Mattf.,
Trichogonia salviifolia Gardner f.
linearifolia Hassl., *Trichogonia salviifolia*
Gardner f. *microphylla* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, AMA, CHO, CON,
COA, GUA, PAI, PHA).

Trichogoniopsis R.M. King &
H. Rob

Trichogoniopsis adenantha (DC.)

R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium adenanthum* DC.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Tridax L.

Tridax paraguayensis Kuntze

Sin.: *Calea paraguayensis* (Kuntze) Deble
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Tridax procumbens L.

Sin.: *Amellus pedunculatus* Ortega ex
Willd., nom. inval., *Balbisia canescens*
Pers., *Balbisia divaricata* Cass., *Balbisia*
elongata Willd., *Balbisia pedunculata*
Ortega ex Hoffmans., nom. illeg., *Tridax*
procumbens L. var. *canescens* (Pers.) DC.,
Tridax procumbens L. var. *ovatifolia* B.L.
Rob. ex Greenm.
Hierba. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(COR, FOR, JUJ, SAL,
TUC). BRA(PAR, SCA).

Tripleurospermum Sch. Bip.

Tripleurospermum inodorum (L.)

Sch. Bip.

Sin.: *Chamaemelum inodorum* (L.)
Vis., *Chamomilla inodora* (L.) K.
Koch, *Chrysanthemum inodorum* (L.)
L., *Matricaria inodora* L., *Matricaria*

perforata Mérat, *Pyrethrum inodorum*
(L.) Moench, *Tripleurospermum*
maritimum (L.) W.D.J. Koch subsp.
inodorum (L.) Appleg., *Tripleurospermum*
perforatum (Mérat) Laínz,
Tripleurospermum perforatum (Mérat)
Wagenitz, comb. superfl.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, ERI, NEU, RNE, SCR,
TDE, TUC). CHL(MAG). URY(CAS, MON).

Triptilion Ruiz & Pav.

Triptilion achilleae DC.

Sin.: *Triptilion achillea* DC. var.
glabrisceps Speg., *Triptilion chilense* Bertero
ex DC., nom. nud., *Triptilion dusenii* O.
Hoffm., *Triptilion euphrasioides* DC.,
Triptilion tenuifolium Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(LBO, BIO, ARA, LLA, RME).

Triptilion benaventei J. Remy

Hierba. Endémica. 1000-1300 m.
Países: CHL(ARA).

Triptilion berteroi Phil.

Hierba. Endémica. 1200-1600 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Triptilion capillatum (D. Don) Hook.
& Arn.

Sin.: *Nassauvia capillata* D. Don,
Triptilion andinum Phil., *Triptilion*
capillatum (D. Don) Hook. & Arn.
var. *andinum* (Phil.) Reiche, *Triptilion*
capillatum (D. Don) Hook. & Arn. var.
laxum (Phil.) Reiche, *Triptilion laxum* Phil.
Hierba. Endémica. 300-2200 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,
LBO, RME).

Triptilion cordifolium Lag. ex Lindl.

Sin.: *Nassauvia cordifolia* (Lag. ex
Lindl.) D. Don, comb. illeg., *Triptilion*
maritimum Poepp. ex DC., nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Triptilion gibbosum J. Remy

Sin.: *Triptilion compactum* Phil.,
Triptilion pusillum Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Triptilion spinosum Ruiz & Pav.

Sin.: *Nassauvia diffusa* D. Don, nom.
illeg., *Nassauvia spinosa* (Ruiz & Pav.)

D. Don, *Triptilion bulbosum* J. Remy,
Triptilion diffusum D. Don, *Triptilion*
digitatum Phil., *Triptilion humile* Phil.,
Triptilion integrifolium Phil., *Triptilion*
laciniatum Willd., *Triptilion millefolium*
Phil., *Triptilion pectinatum* Phil. var.
millefolium (Phil.) Reiche, *Triptilion*
pectinatum Phil., *Triptilion ramulosum*
Phil., *Triptilion remyanum* Phil.,
Triptilion spinosum Ruiz & Pav. var.
erichlaenum DC., *Triptilion spinosum*
Ruiz & Pav. var. *integrifolium* (Phil.)
Reiche, *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav.
var. *remyanum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Trixis P. Browne

Trixis cacalioides (Kunth) D. Don

Sin.: *Perdium cacalioides* Kunth, *Trixis*
frutescens P. Browne var. *denticulata*
Less., *Trixis hexantha* S. Moore, *Trixis*
neaeana DC., *Trixis papillosa* Gillies ex
D. Don, *Trixis paradoxo* Cass., *Trixis*
subparadoxa Herrera
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU,
SLU, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT,
ATA). PRY(APY).

Trixis divaricata (Kunth) Spreng.
subsp. **discolor** (D. Don) Katinas

Sin.: *Trixis antimenorrhoea*
(Schrank) Kuntze subsp. *discolor* (D.
Don) Katinas, *Trixis antimenorrhoea*
(Schrank) Kuntze var. *discolor* (D.
Don) Cabrera, *Trixis antimenorrhoea*
(Schrank) Kuntze f. *discolor* (D. Don)
Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank)
Kuntze var. *heterophylla* Kuntze, *Trixis*
antimenorrhoea (Schrank) Kuntze f.
sublanata Kuntze, *Trixis discolor* D.
Don, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng.
f. *petiolata* Chodat, *Trixis divaricata*
(Kunth) Spreng. var. *glandulifera* Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI,
FOR, LRI, SJU, SLU, SFE, SDE).
PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI).

Trixis divaricata (Kunth) Spreng.
subsp. **divaricata**

Sin.: *Cacalia flexuosa* Willd. ex Less.,
nom. nud., *Castra regia* Vell., *Perdium*
divaricatum Kunth, *Perdium flexuosum*
Kunth, *Prionanthes antimenorrhoea*

Schrank, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Mart. ex Baker, nom. inval., *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *auriculata* (Hook.) Cabrera, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *cladoptera* (Baker) Cabrera, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *divaricata* (Spreng.) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *flexuosa* (Kunth) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *petiolata* Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *typica* Cabrera, nom. inval., *Trixis auriculata* Hook., *Trixis calcarea* Gardner, *Trixis diffusa* Rusby, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *auriculata* (Hook.) DC., *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *cladoptera* Baker, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *discolor* (D. Don) Griseb., *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *exauriculata* DC., *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. f. *subpetiolata* Chodat, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *odoratissima* (Gardner) Baker, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *sprengeliana* (Gardner) Baker, *Trixis flexuosa* (Kunth) Spreng., *Trixis odoratissima* Gardner, *Trixis salicifolia* D. Don, *Trixis scandens* Poepp. ex Herrera, nom. nud., *Trixis sprengeliana* Gardner Arbusto. Nativa. 0-4000 m. Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA). URY(RNO).

Trixis glaziovii Baker

Sin.: *Trixis glaziovii* Baker var. *aurantiaca* Dusén
Hierba. Nativa. 600-3000 m.
Países: BRA(PAR).

Trixis grisebachii Kuntze

Sin.: *Trixis frutescens* P. Browne var. *cacalioides* Griseb.
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Trixis hassleri Chodat

Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(AMA, PAI).

Trixis lessingii DC.

Sin.: *Trixis brasiliensis* Less. var. *aquatica* Less., *Trixis brasiliensis* Less., nom. illeg., *Trixis grandis* S.F. Blake, *Trixis lessingii* DC.

var. *aquatica* (Less.) DC., *Trixis lessingii* DC. var. *glabrata* Chodat, *Trixis lessingii* DC. var. *major* Chodat, *Trixis lundii* DC., *Trixis picroides* Gardner
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAU, CAN, COA, PAI).
URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

Trixis nobilis (Vell.) Katinas

Sin.: *Castra nobilis* Vell., *Trixis glaberrima* Less., *Trixis glabrata* Baker, nom. illeg., *Trixis megapotamica* Hook. & Arn., *Trixis rosea* Baker, nom. nud., *Trixis stricta* Mart., nom. nud., *Trixis suaveolens* Baker, nom. nud., *Trixis verbasciformis* Less., *Trixis verbasciformis* Less. var. *glaberrima* (Less.) Malme, *Trixis verbasciformis* Less. var. *intermedia* Malme

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Trixis ophiorhiza Gardner subsp.

glandulifera (Hassl.) Katinas
Sin.: *Trixis ophiorhiza* Gardner var. *glandulifera* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(AMA).

Trixis ophiorhiza Gardner subsp. **ophiorhiza**

Sin.: *Trixis cerroleonensis* Soria & Zardini, *Trixis chionopappa* Baker, nom. illeg., *Trixis hoffmaniana* Taub.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Trixis pallida Less.

Sin.: *Trixis lorentzii* Arechav., *Trixis pallida* Less. var. *australis* Griseb., *Trixis pallida* Less. var. *subsericea* Chodat
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RNO, RIV, SAO, SOR).

Trixis praestans (Vell.) Cabrera

Sin.: *Cacalia praestans* Baker, nom. illeg., *Castra praestans* Vell., *Trixis flexuosa* Baker, nom. illeg., *Trixis missionum* Cabrera, *Trixis mollissima* D. Don
Arbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, COA). URY(COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TYT).

Trixis proustioides Hieron.

Sin.: *Trixis matisiana* Díaz & Vélez, *Trixis monteseoensis* Sagást. & M.O. Dillon, *Trixis ragonesei* Cabrera
Arbusto. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Trixis spicata Gardner

Sin.: *Trixis ravenii* Zardini & Soria
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Trixis thyrsoides Dusén ex Malme

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Urmenetea Phil.**Urmenetea atacamensis** Phil.

Sin.: *Onosotis atacamensis* (Phil.) Hoffm.
Hierba. Endémica. 2400-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
CHL(ANT, ATA).

Urolepis (DC.) R.M. King & H. Rob.**Urolepis hecatantha** (DC.) R.M. King & H. Rob.

Sin.: *Eupatorium hecatanthum* (DC.) Baker, *Eupatorium populifolium* Hook. & Arn., hom. illeg., *Hebeclinium hecatanthum* DC., *Hebeclinium urolepis* DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

Urospermum Scop.**Urospermum picroides** (L.) E.W. Schmidt

Sin.: *Tragopogon picroides* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, SFE).
CHL(COQ, VAL, RME). URY(MON).

Verbesina L., nom. cons.**Verbesina aurita** Phil.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
CHL(ANT, ATA).

Verbesina caleaefolia Cabrera

Subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(AMA).

Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray

Sin.: *Verbesina australis* Baker, *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray subsp. *exauriculata* (B.L. Rob. & Greenm.) J.R. Coleman, *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray var. *exauriculata* B.L. Rob. ex Greenm., *Verbesina encelioides* (Cav.) Echegaray, comb. superfl., *Verbesina exauriculata* (B.L. Rob. & Greenm.) Cockerell, *Verbesina microptera* (DC.) Herter, nom. illeg., *Verbesina scabra* Phil., hom. illeg., *Ximenesia encelioides* Cav. var. *exauriculata* (B.L. Rob. & Greenm.) F.C. Gates, *Ximenesia encelioides* Cav., *Ximenesia microptera* DC.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ANT, ATA). PRY(APY). URY(PAY, RNO, SJO, SOR).

Verbesina glabrata Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbesina guaranitica Chodat

Sin.: *Zexmenia guaranitica* (Chodat) S.F. Blake

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, CAN, CON).

Verbesina lilloi S.F. Blake

Sin.: *Chaenocephalus alatus* Lillo, *Verbesina saltensis* Cabrera

Subarbusto. Endémica. 1200-2900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Verbesina macrophylla (Cass.) S.F. Blake

var. **nelidae** (Cabrera) Olsen

Sin.: *Verbesina nelidae* Cabrera

Subarbusto. Nativa. 800-2400 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Verbesina rugosa Chodat

Arbusto. Endémica. 100-500 m.

Países: PRY(CAN).

Verbesina saubinetia Klatt

Hierba. Endémica. 500-700 m.

Países: CHL(COQ).

Verbesina sordescens DC. var.**glabrata** Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Verbesina sordescens DC. var.**sordescens**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, MIE, PAI, PHA).

Verbesina subcordata DC.

Sin.: *Verbesina auriculata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Verbesina heterosperma* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI). URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

Verbesina subdiscoidea Toledo

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(AMA).

Verbesina suncho (Griseb.) S.F. Blake

Sin.: *Chaenocephalus heterophyllus* Griseb., *Chaenocephalus macrophyllus* Griseb., *Chaenocephalus suncho* Griseb., *Verbesina allophylla* S.F. Blake, *Verbesina octantha* S.F. Blake

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Vernonanthura H. Rob.**Vernonanthura amplexicaulis** (R.E. Fr.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia amplexicaulis* R.E. Fr., *Vernonia canaminina* Gleason, *Vernonia prenanthoides* Gleason, *Vernonanthura canaminina* (Gleason) H. Rob.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(AMA).

Vernonanthura beyrichii (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia beyrichii* Less., *Vernonia denticulata* DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Vernonanthura brasiliiana (L.) H. Rob.

Sin.: *Baccharis brasiliiana* L., *Vernonia assans* Mart. ex DC., *Vernonia brasiliiana* (L.) Druce, *Vernonia odoratissima* Kunth, *Vernonia salvifolia* Chodat, *Vernonia scabra* Pers.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, SPE).

Vernonanthura catharinensis

(Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonia catharinensis* Cabrera

Arbusto. Nativa. 300-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vernonanthura chamaedrys (Less.)

H. Rob.

Sin.: *Cacalia chamaedrys* (Less.)

Kuntze, *Vernonia chamaedrys* Less.,

Vernonia illex Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Vernonanthura chaquensis (Cabrera)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia chaquensis* Cabrera

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).

PRY(APA, CAU, CAA, GUA).

Vernonanthura cichoriiflora

(Chodat) H. Rob.

Sin.: *Vernonia cichoriiflora* Chodat

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN, SPE).

Vernonanthura crassa (Vell.) H. Rob.

Sin.: *Chrysocoma crassa* Vell., *Vernonia crassa* (Vell.) Ekman ex Malme

Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Vernonanthura cuneifolia (Gardner)

H. Rob.

Sin.: *Vernonia cuneifolia* Gardner,

Vernonia itapensis Chodat

Arbusto. Nativa. 300-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Vernonanthura cupularis (Chodat) H. Rob.

Sin.: *Vernonia cupularis* Chodat var. *cupularis*, *Vernonia cupularis* Chodat var. *oligocephala* Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAN, CON, COA, PAI).

Vernonanthura densiflora (Gardner)

A.J. Vega & Dematteis

Sin.: *Vernonia densiflora* Gardner

Árbol. Nativa. 300-1100 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, ITA).

Vernonanthura diffusa (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonanthura divaricata* (Spreng.) H. Rob., *Vernonia diffusa* Less.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob.

Sin.: *Eupatorium discolor* Spreng.,
Vernonia discolor (Spreng.) Less.
Árbol. Nativa. 100-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vernonanthura divaricata (Spreng.)

H. Rob.
Sin.: *Conyza divaricata* Spreng.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vernonanthura ferruginea (Less.)

H. Rob.
Sin.: *Cacalia ferruginea* (Less.) Kuntze,
Vernonia crenata Gardner, *Vernonia*
ferruginea Less., *Vernonia polycephala* DC.
Arbusto. Nativa. 600-800 m.
Países: BRA(RGS). PRY(AMA).

Vernonanthura hilariana (Gardner)

A.J. Vega & Dematteis
Sin.: *Vernonia hilariana* Gardner
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Vernonanthura laxa (Gardner) H. Rob.

Sin.: *Vernonia laxa* Gardner
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Vernonanthura lindbergii (Baker) H. Rob.

Sin.: *Vernonia lindbergii*, *Vernonia*
subpaludosa Malme
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Vernonanthura lipoensis (Cabrera)

H. Rob.
Sin.: *Vernonanthura nebularum*
(Cabrera) H. Rob., *Vernonia lipoensis*
Cabrera, *Vernonia nebularum* Cabrera
Arbusto o arbolito. Endémica. 1400-
2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Vernonanthura lorentensis (Hieron.)

H. Rob.
Sin.: *Vernonia lorentensis* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA,
CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Vernonanthura lucida (Less.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia lucida* (Less.) Kuntze,
Vernonia lucida Less., *Vernonia nitidula*
Less. var. *lucida* (Less.) Arechav.
Subarbusto. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,
CAN, ITA, PHA, SPE).

Vernonanthura montevidensis

(Spreng.) H. Rob.
Sin.: *Baccharis montevidensis* Spreng.,
Cacalia montevidensis (Spreng.) Kuntze,
Piptocarpha nitidula (Less.) Griseb.,
Vernonia arechavaletae André,
Vernonia florida Gardner, *Vernonia*
gochnatioides Hook. & Arn. ex DC.,
Vernonia nitidula Less., *Vernonia*
nitidula Less. var. *acutifolia* Griseb.,
Vernonia nitidula Less. var. *florida*
(Gardner) Baker, *Vernonia nitidula*
Less. var. *intermedia* Chodat
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA,
ITA, MIE, SPE). URY(ART, COL, MAL,
MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC).

Vernonanthura mucronulata (Less.)

H. Rob.
Sin.: *Vernonia collina* Gardner,
Vernonia mucronulata Less.
Arbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vernonanthura nana A.J. Vega &

Dematteis
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(PAR).

Vernonanthura nudiflora (Less.) H.

Rob. f. **albiflora** (Matzenb.) Deble
Sin.: *Vernonia nudiflora* Less. f.
albiflora Matzenb.
Subarbusto. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(RGS).

Vernonanthura nudiflora (Less.) H.

Rob. f. **nudiflora**
Sin.: *Cacalia nudiflora* (Less.) Kuntze,
Vernonia angustifolia D. Don ex Hook. & Arn.,
nom. nud., *Vernonia nudiflora* Less. f. *nudiflora*
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
LPA, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY(ART, COL, FLA, RNO, RIV,
SAO, SJO, TAC).

Vernonanthura oligactoides (Less.)

H. Rob.
Sin.: *Cacalia oligactoides* (Less.)
Kuntze, *Vernonia conyzoides* Chodat,
Vernonia oligactoides Less., *Vernonia*
sorocabae Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, AMA, CAN, SPE).

Vernonanthura oligolepis (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.

Sin.: *Cacalia oligolepis* (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze, *Vernonia imbricata* Chodat, *Vernonia oligolepis* Sch. Bip. ex Baker
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Vernonanthura perangusta (Malme)

A.J. Vega & Dematteis
Sin.: *Vernonia perangusta* Malme
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Vernonanthura petiolaris (DC.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia diffusa* Less. var.
macrocephala Hieron., *Vernonia petiolaris*
DC., *Vernonia petiolaris* DC. var.
pauciflora DC.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAN).

Vernonanthura pinguis (Griseb.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia pinguis* Griseb.
Arbusto o arbolito. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(AMA).

Vernonanthura polyanthes (Spreng.)

A.J. Vega & Dematteis
Sin.: *Cacalia polyanthes* (Spreng.)
Kuntze, *Eupatorium polyanthes* Spreng.,
Vernonia polyanthes (Spreng.) Less.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vernonanthura pseudolinearifolia

(Hieron.) A.J. Vega & Dematteis
Sin.: *Vernonia pseudolinearifolia* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, PAY,
RIV, TAC, TYT).

Vernonanthura puberula (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vanillosma multiflorum* Mart.,
Vernonia estrellensis Gardner, *Vernonia*
puberula Less. var. *puberula*, *Vernonia*
puberula Less. var. *serrulata* Hieron.,
Vernonia serrulata Sch. Bip.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN).

Vernonanthura rigiophylla (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.

Sin.: *Cacalia rigiophylla* (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze, *Vernonia elsieae* Stutts, *Vernonia rigiophylla* Sch. Bip. ex Baker
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Vernonanthura schulziana (Cabrera) H. Rob.

Sin.: *Vernonia schulziana* Cabrera
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA). BRA(RGS).

Vernonanthura squamulosa (Hook. & Arn.) H. Rob.

Sin.: *Cacalia praecox* Kuntze, *Cacalia squamulosa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Vernonia praecox* (Kuntze) K. Schum., *Vernonia squamulosa* Hook. & Arn.
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). PRY(COA).

Vernonanthura subverticillata (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.

Sin.: *Vernonia subverticillata* Sch. Bip. ex Baker
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Vernonanthura tweedieana (Baker) H. Rob.

Sin.: *Chrysocoma arborea* Vell., *Vernonia tweedieana* Baker
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Vernonanthura viscidula (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia viscidula* Less.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Vernonanthura westiniana (Less.) H. Rob.

Sin.: *Vernonia hebeclada* DC., *Vernonia westiniana* Less.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vernonia Schreb., nom. cons.

Vernonia echioides Less.

Sin.: *Eupatorium arechavaletae* Baker, *Vernonia lingua* Chodat, *Vernonia oreophila* Speg., hom. illeg., *Vernonia spegazzini* Hicken, *Vernonia verbenacea* DC.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CEN, CON, GUA, ITA, PHA, SPE). URY(DUR, FLO, MON, SJO, TAC).

Vernonia glanduloso-dentata Hieron.
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).

Vernonia incana Less.

Sin.: *Cacalia incana* (Less.) Kuntze, *Vernonia immunis* Griseb.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CEN, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, RNO).

Vernonia viminea Ekman ex Malme
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Viguiera Kunth

Viguiera simulans S.F. Blake
Subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Villanova Ruiz & Pav.

Villanova oppositifolia Lag.
Sin.: *Vasquezia biternata* Phil., *Vasquezia anemonifolia* (Kunth) S.F. Blake, *Vasquezia oppositifolia* (Lag.) S.F. Blake, *Villanova anemonifolia* (Kunth) Less., *Unxia anemonifolia* Kunth
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: CHL(ANT).

Villanova robusta Phil.

Hierba. Endémica. 3200-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Vittetia R.M. King & H. Rob.

Vittetia orbiculata (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium orbiculatum* DC.
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Volutaria Cass.

Volutaria tubuliflora (Murb.) Sennen
Hierba. Introducida.
Países: CHL(ATA, COQ).

Wedelia Jacq., nom. cons.

Wedelia brachylepis Griseb.
Sin.: *Zexmenia brachylepis* (Griseb.) Cabrera
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS,

SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CON).

Wedelia buphtalmiflora Lorentz

Sin.: *Zexmenia buphtalmiflora* (Lorentz) Ariza
Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Wedelia holwayii S.F. Blake

Subarbusto. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Wedelia kerrii N.E. Br.

Sin.: *Wedelia kerrii* N.E. Br. var. *decumbens* Hassl., *Wedelia longepetiolata* Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, ITA).

Wedelia saltensis Cabrera

Arbusto o subarbusto. Nativa. 600-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Wedelia subvelutina DC.

Sin.: *Wedelia subvelutina* DC. var. *linearifolia* Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAN).

Wedelia trichostephia DC.

Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Werneria Kunth

Werneria aretioides Wedd.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Werneria cochlearis Griseb.

Sin.: *Werneria brachypappa* Phil., hom. illeg., *Werneria pygmaea* Gillies & Hook. var. *rhodopappa* Phil.
Hierba. Endémica. 3900-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(ANT).

Werneria glaberrima Phil.

Hierba. Endémica. 3500-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Werneria heteroloba Wedd.

Sin.: *Werneria heteroloba* Wedd. f. *microcephala* Rockh., *Werneria heteroloba* Wedd. var. *obtusiloba* (S.F. Blake) Rockh., *Werneria obtusiloba* S.F. Blake
Hierba. Nativa. 3500-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Werneria pinnatifida J. Remy

Nativa. 3500-3900 m.
Países: ARG(SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Werneria pumila Kunth

Sin.: *Werneria calyculata* Turcz.,
Werneria densa Benth.
Hierba. Nativa. 3600-4500 m.
Países: ARG(SAL).

Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn.

var. **apiculata** (Sch. Bip.) Wedd.
Sin.: *Werneria apiculata* Sch. Bip.
Hierba. Nativa. 2900-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. var. **pygmaea**

Sin.: *Werneria brachypappa* Sch. Bip.,
Werneria denticulata S.F. Blake, *Werneria rhizoma* J. Remy
Hierba. Nativa. 2200-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Werneria solivifolia Sch. Bip.

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Werneria spathulata Wedd.

Hierba. Nativa. 4000-4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Werneria villosa A. Gray

Sin.: *Werneria caulescens* (Wedd.)
Griseb., *Werneria nubigena* Kunth var.
caulescens Wedd.
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Xanthium L.**Xanthium ambrosioides** Hook. & Arn.

Sin.: *Xanthium spinosum* L. var.
ambrosioides (Hook & Arn.) Löve & Dans.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).

Xanthium argenteum Widder

Hierba. Endémica. 400-1500 m.
Países: CHL(MAU, RME).

Xanthium spinosum L. var.

pseudinerme Widder ex Parodi
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(COR, DFE).

Xanthium spinosum L. var. **spinosum**

Sin.: *Acanthoxanthium spinosum* (L.) E.
Fourn.
Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(JPAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). PRY(APY, CEN, PAI). URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Xanthium strumarium L.

Sin.: *Xanthium australe* Millsp. & Sherff, *Xanthium cavanillesii* Schouw var. *cordobense* Widder ex Parodi, *Xanthium cavanillesii* Schouw, *Xanthium echinatum* Murray var. *cavanillesii* (Schouw) O. Bolòs & Vigo, *Xanthium saccharatum* Wallr., *Xanthium strumarium* L. subsp. *cavanillesii* (Schouw) D. Löve & Dans.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, MAU, BIO, RME). PRY(CEN, PAI). URY(CAS, CLA, MON, PAY, RNO, SJO).

Xenophyllum V.A. Funk**Xenophyllum incisum** (Phil.) V.A.

Funk var. **incisum**
Sin.: *Werneria incisa* Phil.
Subarbusto. Endémica. 4300-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Xenophyllum incisum (Phil.) V.A.

Funk var. **pubescens** (Rockh.) Cabrera & S.E. Freire
Sin.: *Werneria incisa* Phil. var.
pubescens Rockh.
Subarbusto. Endémica. 4500-5000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

Xenophyllum juniperinum (Hieron.)

J. Calvo
Sin.: *Xenophyllum lycopodioides* (S.F. Blake) V.A. Funk, *Werneria juniperina* Hieron., *Werneria lycopodioides* S.F. Blake
Subarbusto. Nativa. 4100-5000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk

Sin.: *Werneria lorentziana* Hieron.,
Werneria poposa Phil.
Subarbusto. Nativa. 3500-5300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Xenophyllum pseudodigitatum

(Rockh.) V.A. Funk
Sin.: *Werneria pseudodigitata* Rockh.
Subarbusto. Endémica. 4000-5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Xenophyllum rosenii (R.E. Fr.) V.A. Funk

Sin.: *Werneria rosenii* R.E. Fr.
Subarbusto. Nativa. 5200 m.
Países: ARG(JUJ).

Xenophyllum weddellii (Phil.) V.A. Funk

Sin.: *Werneria decumbens* Hieron.,
Werneria weddellii Phil.
Subarbusto. Nativa. 4000-5000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Xerochrysum Tzvelev**Xerochrysum bracteatum** (Vent.)

Tzvelev
Sin.: *Xeranthemum bracteatum* Vent.
Subarbusto. Introducida. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Youngia Cass.**Youngia japonica** (L.) DC.

Sin.: *Prenanthes japonica* L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(COR, ERI, TUC).

Yunquea Skottsbo.**Yunquea tenzii** Skottsbo.

Arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Zinnia L., nom. cons.**Zinnia peruviana** (L.) L.

Sin.: *Chrysogonum peruvianum* L.,
Crassina leptopoda (DC.) Kuntze,
Crassina peruviana (L.) Kuntze, *Crassina tenuiflora* (Jacq.) Kuntze, *Crassina verticillata* (Andrews) Kuntze, *Lepia multiflora* (L.) Hill, *Lepia pauciflora* (L.) Hill, comb. superfl., *Zinnia hybrida* Roem. & Usteri, *Zinnia intermedia* Engelm., *Zinnia leptopoda* DC., *Zinnia mendocina* Phil., *Zinnia multiflora* L., *Zinnia pauciflora* L. var. *flava* (Kuntze) Seckt, *Zinnia pauciflora* L., nom. superfl., *Zinnia revoluta* Cav., *Zinnia tenuiflora* Jacq., *Zinnia verticillata* Andrews

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, CEN).

ATHEROSPERMATAEAE

Laureliopsis Schodde

Laureliopsis philippiana (Looser) Schodde

Sin.: *Laurelia philippiana* Looser, *Laurelia serrata* Phil., hom. illeg.
Árbol. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

BALANOPHORACEAE

Helosis Rich.

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng.

Sin.: *Cynomorium cayennense* Sw., *Helosis brasiliensis* Schott & Endl.
Hierba parásita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Langsdorffia Mart.

Langsdorffia heterotepala L.J.T. Cardoso, R.J.V. Alves & J.M.A. Braga

Hierba parásita. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Langsdorffia hypogaea Mart.

Hierba parásita. Nativa. 700-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).

Lophophytum Schott & Endl.

Lophophytum leandri Eichler

Hierba parásita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

Lophophytum mirabile Schott & Endl. subsp. **bolivianum** (Wedd.) B.Hansen

Sin.: *Lophophytum bolivianum* Wedd.
Hierba parásita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, PAI, SPE).

Lophophytum mirabile Schott & Endl. subsp. **mirabile**

Hierba parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ombrophytum Poepp. ex Endl.

Ombrophytum subterraneum (Aspl.) B. Hansen

Sin.: *Juelia lilloana* Sleumer, *Juelia meyeri* Sleumer, *Juelia subterranea* Aspl.
Hierba parásita. Nativa. 500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(ANT).

Scybalium Schott & Endl.

Scybalium fungiforme Schott & Endl.

Hierba parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

BALSAMINACEAE

Impatiens L.

Impatiens balsamina L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Impatiens glandulifera Royle

Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Impatiens walleriana Hook. f.

Sin.: *Impatiens sultani* Hook. f.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

BASELLACEAE

Anredera Juss.

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

Sin.: *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis subsp. *gracilis* (Miers) Xifreda & Argimón, *Boussingaultia cordifolia* Ten., *Boussingaultia gracilis* Miers, *Boussingaultia gracilis* Miers f. *pseudobaselloides* Hauman, *Boussingaultia gracilis* Miers var. *pseudobaselloides* (Hauman) L.H. Bailey
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL (VAL, IPA). PRY(APY, CEN, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(COL, MON).

Anredera diffusa (Moq.) Sperling

Sin.: *Tandonia diffusa* Moq.
Hierba. Nativa. 2900-3000 m.
Países: CHL(AYP).

Anredera krapovickasii (Villa) Sperling

Sin.: *Anredera krapovickasii* (Villa) Govaerts, nom. illeg., *Boussingaultia krapovickasii* Villa
Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Anredera tucumanensis (Lillo & Hauman) Sperling

Sin.: *Boussingaultia tucumanensis* Lillo & Hauman, *Boussingaultia tucumanensis* Lillo & Hauman var. *brasiliensis* Hauman
Enredadera. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Ullucus Caldas

Ullucus tuberosus Caldas subsp.

aborigineus (Brücher) Sperling
Sin.: *Ullucus aborigineus* Brücher, *Ullucus tuberosus* Caldas f. *rubriflorus* Kuntze
Enredadera. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUU).

BEGONIACEAE

Begonia L.

Begonia angularis Raddi

Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Begonia angulata Vell.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia balansae C. DC.

Sin.: *Begonia balansae* C. DC. var. *glabrior* C. DC.
Hierba. Nativa. 100-900 m.
Países: ARG(MIS). PRY(CAN, COA, PAI).

- Begonia barkleyana** L.B. Sm.
Sin.: *Begonia dusenii* Brade, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Begonia biguassuensis** Brade
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).
- Begonia boliviensis** A. DC.
Sin.: *Begonia argentinensis* Speg.,
Begonia boliviensis A. DC. var. *latipetala*
Irmsch., *Begonia boliviensis* A. DC. var.
volcanensis L.B. Sm. & B.G. Schub.
Hierba. Nativa. 700-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Begonia calvescens** (Brade ex L.B. Sm.
& R.C. Sm.) E.L. Jacques & Mamede
Sin.: *Begonia schenckii* Irmsch. var.
calvescens Brade ex L.B. Sm. & R.C. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Begonia campos-portoana** Brade
Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: BRA(SCA).
- Begonia capanemae** Brade
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Begonia catharinensis** Brade
Hierba. Endémica. 400-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Begonia ciliatifolia** Funez & J.C.
Jaramillo
Hierba. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(SCA).
- Begonia coccinea** Hook.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).
- Begonia convolvulacea** (Klotzsch) A. DC.
Sin.: *Begonia geniculata* Vell., hom.
illeg., *Wageneria convolvulacea* Klotzsch
Hierba. Nativa. 300-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Begonia cucullata** Willd.
Sin.: *Begonia agrial* Rojas Acosta,
Begonia cucullata Willd. var. *arenosicola*
(C. DC.) L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia*
cucullata Willd. var. *hookeri* (A. DC.) L.B.
Sm. & B.G. Schub., *Begonia cucullata*
Willd. var. *spatulata* (Lodd.) Golding,
Begonia paludicola C. DC., *Begonia*
sellowii Klotzsch, *Begonia semperflorens*
Hook., nom. illeg., *Begonia semperflorens*
Link & Otto var. *hookeri* A. DC., *Begonia*
semperflorens Link & Otto var. *sellowii* A.
DC., *Begonia semperflorens* Link & Otto,
Begonia hookeri Sw., *Begonia spatulata*
Lodd., *Begonia subcucullata* C. DC. var.
arenosicola C. DC., *Begonia subcucullata*
C. DC.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA,
CAN, COA, ITA, ÑEE, PHA). URY(ART,
CAS, CLA, COL, CLA, MAL, MON,
RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).
- Begonia descoleana** L.B. Sm. & B.G. Schub.
Hierba. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA).
- Begonia echinosepala** Regel var.
echinosepala
Sin.: *Begonia itajaiensis* Brade
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Begonia echinosepala** Regel var.
elongatifolia Irmsch.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).
- Begonia fiebrigii** C. DC.
Hierba. Endémica. 100-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
PRY(APA).
- Begonia fischeri** Schrank
Sin.: *Begonia brasiliensis* Klotzsch,
Begonia fischeri Schrank var. *brasiliensis*
Irmsch., *Begonia fischeri* Schrank var.
elata Irmsch., *Begonia fischeri* Schrank
var. *malvacea* (Klotzsch) Irmsch.,
Begonia fischeri Schrank var. *tovarensis*
(Klotzsch) Irmsch., *Begonia malvacea*
Klotzsch, *Begonia intercedens* Irmsch.,
Begonia setosa Klotzsch, *Begonia*
tovarensis Klotzsch
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Begonia fruticosa** A. DC.
Hierba. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Begonia fuscocaulis** Brade
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).
- Begonia garuvae** L.B. Sm. & R.C. Sm.
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(SCA).
- Begonia hassleri** C. DC.
Hierba. Endémica. 200-500 m.
Países: ARG(MIS).
- Begonia hilariana** A. DC.
Sin.: *Begonia raulinii* Brade
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).
- Begonia hirtella** Link
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Begonia hispida** Schott ex A. DC.
Sin.: *Begonia hammoniae* Irmsch.,
Begonia reitzii Brade
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Begonia huegelii** (Klotzsch) A. DC.
Sin.: *Wageneria huegelii* Klotzsch
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Begonia incisoserrata** (Klotzsch) A. DC.
Sin.: *Scheidweilera incisoserrata*
Klotzsch
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Begonia insularis** Brade
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).
- Begonia isopterocarpa** Irmsch.
Sin.: *Begonia bauensis* Brade
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Begonia itatinensis** Irmsch. ex Brade
Hierba o subarbusto. Nativa. 700-900 m.
Países: BRA(SCA).
- Begonia itupavensis** Brade
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Begonia konderreisiana** L.B. Sm. &
R.C. Sm.
Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: BRA(SCA).
- Begonia lineolata** Brade
Hierba. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(SCA).
- Begonia lucidissima** Golding & Kareg.
Sin.: *Begonia lucida* D. Parodi, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CEN).

Begonia marinae Tebbitt

Hierba. Nativa. 2200-3600 m.
Países: ARG(SAL).

Begonia micranthera Griseb.

Sin.: *Begonia hieronymi* Lindau var. *rhacophylla* Irmsch., *Begonia hieronymi* Lindau, *Begonia micranthera* Griseb. var. *fimbriata* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia micranthera* Griseb. var. *foliosa* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia micranthera* Griseb. var. *hieronymi* (Lindau) L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia micranthera* Griseb. var. *nana* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia micranthera* Griseb. var. *rhacophylla* (Irmsch.) L.B. Sm. & Wassh., *Begonia micranthera* Griseb. var. *typica* L.B. Sm. & B.G. Schub., nom. inval., *Begonia micranthera* Griseb. var. *venturii* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia rubricaulis* Hook. var. *volcanensis* L.B. Sm. & B.G. Schub.

Hierba. Nativa. 700-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Begonia obovatistipula C. DC.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Begonia paleata Schott ex A. DC.

Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia paranaensis Brade

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia parvistipulata Irmsch.

Hierba. Endémica. 200-1800 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia per-dusenii Brade

Sin.: *Begonia chapecoensis* Brade, *Begonia schubertiana* Irmsch.
Hierba. Nativa. 200-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Begonia pilgeriana Irmsch.

Hierba. Endémica. 400-800 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia pluvialis L.B. Sm. ex S.F. Sm.

& Wassh.
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Begonia polyandra Irmsch.

Sin.: *Begonia blumenaviensis* Irmsch., *Begonia blumenaviensis* Irmsch. subsp. *brachyphylla* Irmsch.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia pulchella Raddi

Sin.: *Begonia similis* Brade
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Begonia radicans Vell.

Sin.: *Begonia fritz-muelleri* Brade, *Begonia limmingheana* Morren, *Begonia procumbens* Vell.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Begonia rubricaulis Hook.

Sin.: *Huszia rubricaulis* (Hook.) Klotzsch
Hierba. Nativa. 1500-3600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Begonia rufosericea J.M. Toledo & Barboza

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia rupium Irmsch.

Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Begonia scharfii Hook. f.

Sin.: *Begonia schenckii* Irmsch.
Subarbusto. Endémica. 300-700 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia serranegrae L.B. Sm. ex S.F. Sm. & Wassh.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Begonia sleumeri L.B. Sm. & B.G. Schub.

Hierba. Endémica. 3000-3400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Begonia solitudinis Brade

Hierba. Endémica. 1000-1700 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia squamipes Irmsch.

Hierba. Endémica. 800-1400 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia stenolepis L.B. Sm. & R.C. Sm.

Hierba. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Begonia subvillosa Klotzsch

Sin.: *Begonia heineri* Brade, *Begonia leptotricha* C. DC., *Begonia schmidtiana* Regel, *Begonia serafinensis* Brade var. *cerqueirae* Brade, *Begonia serafinensis* Brade, *Begonia subvillosa* Klotzsch var. *leptotricha* (C. DC.) L.B. Sm. & Wassh.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN). URY(RIV).

Begonia tafiensis Lillo

Hierba. Endémica. 2700-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Begonia tominana Golding

Sin.: *Begonia coriacea* A. DC., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 1000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Begonia trevisoensis J.C. Jaramillo

Subarbusto. Endémica. 500-600 m.
Países: BRA(SCA).

Begonia valdensium A. DC.

Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Begonia wollnyi Herzog

Sin.: *Begonia parodiana* L.B. Sm. & B.G. Schub.
Hierba. Nativa. 700-1300 m.
Países: ARG(SAL).

BERBERIDACEAE

Berberis L.**Berberis actinacantha** Mart.

Sin.: *Berberis actinacantha* Mart.
var. *crispa* (Gay) Reiche, *Berberis brachyacantha* Phil. ex Reiche, *Berberis congestiflora* Gay var. *hakeoides* Hook. f., *Berberis coquimbensis* Muñoz, *Berberis crispa* Gay, *Berberis florida* Phil., *Berberis hakeoides* (Hook. f.) C.K. Schneid., *Berberis variiflora* C.K. Schneid.
Arbusto. Endémica. 100-1900 m.
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Berberis andeana Job

Árbol. Endémica. 1900-2100 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Berberis argentinensis Hosseus

Sin.: *Berberis pseudospinulosa* Job
Arbusto. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Berberis bidentata Lechl.

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Berberis callehua Ayarde & Bulacio

Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Berberis campos-portoi Brade

Sin.: *Berberis kleinii* Mattos
Arbusto. Nativa. 1000-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn. var. **brachybotria** (Gay) Landrum

Sin.: *Berberis brachybotria* Gay, *Berberis brachybotria* Gay var. *brevispina* Reiche
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn. var. **chilensis**

Sin.: *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *diffusa* (Gay) Reiche, *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *ferox* (Gay) Reiche, *Berberis diffusa* Gay, *Berberis ferox* Gay, *Berberis fragrans* Phil. ex Reiche, *Berberis gayi* K. Koch
Arbusto. Endémica. 300-1600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Berberis comberi Sprague & Sandwith

Arbusto. Endémica. 900-1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Berberis commutata Eichler

Sin.: *Berberis mikuna* Job
Arbusto. Nativa. 1300-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Berberis congestiflora Gay

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ARA, LLA).

Berberis copahuensis Job

Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(NEU).

Berberis corymbosa Hook. & Arn.

Sin.: *Berberis corymbosa* Hook. & Arn. var. *paniculata* (Phil.) Reiche, *Berberis paniculata* Phil.

Arbusto. Endémica. 300-600 m.
Países: CHL(JFE).

Berberis darwinii Hook.

Sin.: *Berberis costulata* Gand., *Berberis knightii* (Lindl.) K. Koch, *Mahonia knightii* Lindl.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Berberis empetrifolia Lam.

Sin.: *Berberis empetrifolia* Lam. var. *magellanica* C.K. Schneid., *Berberis mutabilis* Phil., *Berberis wawrana* C.K. Schneid.

Subarbusto. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Berberis fiebrigii C.K. Schneid.

Arbusto. Nativa. 2600-2800 m.
Países: ARG(JUJ).

Berberis glomerata Hook. & Arn.

Sin.: *Berberis glomerata* Hook. & Arn. var. *zahlbruckneriana* (C.K. Schneid.) Ahrendt, *Berberis zahlbruckneriana* C.K. Schneid.
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(COQ).

Berberis grevilleana Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Berberis actinacantha* Mart. var. *grevilleana* (Gillies ex Hook. & Arn.) C.K. Schneid.
Arbusto. Endémica. 1800-2800 m.
Países: ARG(COR, MEN, SJU).

Berberis hieronymi C.K. Schneid.

Sin.: *Berberis ruscifolia* Lam. var. *subintegrifolia* Kurtz
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(COR).

Berberis horrida Gay

Sin.: *Berberis actinacantha* Mart. var. *mollis* Reiche, *Berberis actinacantha* Mart. var. *horrida* (Gay) Reiche, *Berberis pilosifolia* Ahrendt
Arbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Berberis ilicifolia L. f.

Sin.: *Berberis lagenaria* Poir., *Berberis subantarctica* Gand.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(LLA, AIS, MAG).

Berberis jobii Orsi

Arbusto. Endémica. 1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Berberis jujuyensis Job

Arbusto. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(JUJ).

Berberis laurina Thunb.

Sin.: *Berberis coriacea* A. St.-Hil., *Berberis glaucescens* A. St.-Hil., *Berberis spinulosa* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(DUR, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).

Berberis lilloana Job

Arbusto. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Berberis litoralis Phil.

Arbusto o arbolito. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Berberis masafuerana Skottsbl.

Arbusto o arbolito. Endémica. 200-1100 m.
Países: CHL(JFE).

Berberis microphylla G. Forst.

Sin.: *Berberis antucoana* C.K. Schneid., *Berberis barilochensis* Job, *Berberis buxifolia* Lam. var. *antarctica* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *antucoana* (C.K. Schneid.) Orsi, *Berberis buxifolia* Lam. var. *gracilior* Albov, *Berberis buxifolia* Lam. var. *nuda* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *papillosa* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *spinosissima* Reiche, *Berberis buxifolia* Lam., *Berberis cuneata* DC., *Berberis dulcis* Sweet, *Berberis heterophylla* Juss. ex Poir. var. *pluriflora* Reiche, *Berberis heterophylla* Juss. ex Poir., *Berberis inermis* Pers., *Berberis marginata* Gay, *Berberis michay* Job, *Berberis parodii* Job, *Berberis spinosissima* (Reiche) Ahrendt
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Berberis montana Gay

Sin.: *Berberis buxifolia* Lam. var. *montana* (Gay) Reiche, *Berberis cabreræ* Job, *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean var. *hirsutipes* Sprague, *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean, *Berberis coletioides* Lechl. var. *gracilis* (C.K. Schneid.) Ahrendt, *Berberis coletioides* Lechl., *Berberis montana* Gay var. *chillanensis* C.K. Schneid., *Berberis montana* Gay var. *coletioides* (Lechl.) C.K. Schneid., *Berberis montana* Gay var. *gracilis* C.K. Schneid., *Berberis polypetala* Phil.
Arbusto. Endémica. 500-2700 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Berberis montevidensis C.K. Schneid.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: URY(MON).

Berberis negeriana Tischler

Arbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: CHL(BIO).

Berberis rotundifolia Poepp. & Endl.

Sin.: *Berberis philippii* Ahrendt, *Berberis polymorpha* Phil., *Berberis umbellata* Phil., hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 200-2300 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Berberis ruscifolia Lam.

Sin.: *Berberis ruscifolia* Lam. var. *coriacea* Job

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, LRI, NEU, SDE, SFE, SLU). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Berberis sellowiana C.K. Schneid.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS). URY(MON).

Berberis serratodentata Lechl.

Sin.: *Berberis pearcei* Phil.

Arbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

Berberis trigona Kunze ex Poepp. & Endl.

Sin.: *Berberis grisebachii* Lechl.,

Berberis linearifolia Phil., *Berberis linearifolia* Phil. var. *longifolia* (Reiche) Ahrendt, *Berberis trigona* Kunze ex

Poepp. & Endl. var. *longifolia* Reiche

Arbusto. Endémica. 500-1800 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, MAG).

Berberis valdiviana Phil.

Sin.: *Berberis valdiviana* Phil. var.

gracilifolia Ahrendt

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

BERBERIDOPSISACEAE

Berberidopsis Hook. f.**Berberidopsis corallina** Hook. f.

Arbusto. Endémica. 100-600 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

BETULACEAE

Alnus Mill.**Alnus acuminata** Kunth

Sin.: *Alnus acuminata* Kunth var. *spachii* Regel, *Alnus ferruginea* Kunth var. *aliso* Griseb., *Alnus jorullensis* Kunth var. *acuminata* (Kunth) Kuntze, *Alnus jorullensis* Kunth var. *spachii* (Regel) Winckler, *Alnus mirbelli* Spach, *Alnus spachii* (Regel) Callier

Árbol. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Sin.: *Alnus betula* L. var. *glutinosa* L., *Betula alnus* L. var. *glutinosa* L.

Árbol. Introducida.

Países: ARG(COR, NEU). CHL(COQ, BIO, LLA, RME).

Alnus incana (L.) Moench

Sin.: *Betula alnus* L. var. *incana* L.

Árbol. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE).

Alnus rubra Bong.

Árbol. Introducida.

Países: ARG(NEU).

Betula L.**Betula pendula** Roth

Árbol. Introducida

Países: ARG(CHU, COR, RNE).

BIGNONIACEAE

Adenocalymma Mart. ex Meisn.**Adenocalymma apterospermum**

(Sandwith) Udulutsch, R. G. & Assis

Sin.: *Adenocalymma marginatum* (Cham.) DC. var. *apterospermum* Sandwith

Liana. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Adenocalymma bracteatum (Cham.) DC.

Sin.: *Adenocalymma bracteatum* (Cham.) DC. var. *macradenum* Bureau, *Adenocalymma macrostachyum* Miers, *Bignonia bracteata* Cham.

Liana. Nativa. 200-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Adenocalymma comosum (Cham.) DC.

Sin.: *Adenocalymma acutissimum* (Cham.) Miers, *Adenocalymma comosum* (Cham.) DC. var. *acutissimum* Bureau, *Adenocalymma comosum* (Cham.) DC. var. *lanceolatum* Bureau & K. Schum., *Adenocalymma comosum* (Cham.) DC. var. *nitidum* (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum., *Adenocalymma comosum* (Cham.) DC. var. *typicum* Bureau & K. Schum., nom. inval., *Adenocalymma nitidum* Mart. ex DC., *Adenocalymma sepiarum* Mart. ex DC., *Adenocalymma prehensile* Miers, *Bignonia acutissima* Cham., *Bignonia comosa* Cham.

Liana. Nativa. 200-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Adenocalymma duseunii Kraenzl.

Liana. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Adenocalymma hatschbachii A.H.

Gentry

Liana. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

Adenocalymma marginatum (Cham.) DC.

Sin.: *Bignonia marginata* Cham.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(SAO).

Adenocalymma paulistarum Bureau

ex K. Schum.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(APY, APA).

Adenocalymma peregrinum (Miers)

L.G. Lohmann

Sin.: *Adenocalymma peregrinum* (Miers) L.G. Lohmann, nom. nud., *Memora cuspidata* Hassl., *Memora cuspidata* Hassl. f. *cirrhifera* Hassl., *Memora cuspidata* Hassl. f. *parvifoliolata* Hassl., *Memora peregrina* (Miers) Sandwith, *Pleonotoma peregrina* Miers

Liana. Nativa. 400-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Adenocalymma scansile Miers

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

PRY(APA, ITA).

Amphilophium Kunth**Amphilophium bracteatum** (Cham.)

L.G. Lohmann

Sin.: *Haplolophium bracteatum* Cham., *Haplolophium lundii* DC.

Liana. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR).

Amphilophium carolinae (Lindl.) L.

G. Lohmann

Sin.: *Amphilophium cynanchoides* (DC.) L.G. Lohmann, *Anemopaegma clematideum* Griseb., *Bignonia baclei* DC., *Bignonia carolinae* Lindl., *Pithecoctenium carolinae* (Lindl.) G. Nicholson, *Pithecoctenium clematideum* (Griseb.) Griseb., *Pithecoctenium cynanchoides* DC., *Pithecoctenium cynanchoides* DC. var. *pellucidum* Hassl.

Liana. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CHO, ÑEE, NAS, PHA). URY(PAY, RNO).

Amphilophium crucigerum (L.) L.G.

Lohmann

Sin.: *Anisostichus crucigera* (L.) Small, *Bignonia botryoides* Cham., *Bignonia crucigera* L., *Bignonia echinata* Jacq., *Bignonia phaseoloides* Cham., *Bignonia squalus* Vell., *Bignonia tilifolia* Kunth, *Bignonia vitalba* Cham. var. *aequinoctialis* Cham., *Bignonia vitalba* Cham. var. *extratropica* Cham., *Bignonia vitalba* Cham., *Nevesarmondia cordifolia* (Mart.) K. Schum., *Petastoma phaseoloides* (Cham.) Miers, *Pithecoctenium aubletii* Splitg., *Pithecoctenium botryoides* (Cham.) DC., *Pithecoctenium catharinae* DC., *Pithecoctenium cordifolium* Mart., *Pithecoctenium crucigerum* (L.) A.H. Gentry, *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill. f. *grandiflora* Hassl., *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill. var. *intermedium* Hassl., *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill. var. *tomentosum* Hassl., *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill. var. *typicum* Sprague, nom. inval., *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill., *Pithecoctenium glaucum* Rusby, *Pithecoctenium hatschbachii* A.H. Gentry, *Pithecoctenium hexagonum* DC. var. *brasilianum* DC., *Pithecoctenium hexagonum* DC., *Pithecoctenium lundii* DC., *Pithecoctenium muricatum* Moç. ex DC., *Pithecoctenium phaseoloides* (Cham.)Schenck, *Pithecoctenium squalus* (Vell.) DC., *Pithecoctenium tribachiatum* Loes., *Pithecoctenium vitalba* (Cham.) DC., *Pithecoctenium vitalba* DC. f. *glabratum* Hassl., *Pithecoctenium vitalba* DC. f. *intermedium* Hassl., *Pithecoctenium vitalba* DC. var. *extratropica* (Cham.) DC., *Pithecoctenium vitalba* DC. var. *rostratum* Hassl.

Liana. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Amphilophium dolichooides (Cham.)

L.G. Lohmann

Sin.: *Amphilophium dolichooides* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Bignonia dolichooides* Cham., *Pithecoctenium dolichooides* (Cham.) Bureau & K. Schum.

Liana. Nativa. 300-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Amphilophium dusenianum

(Kraenzl.) L.G. Lohmann

Sin.: *Amphilophium glaziovii* Bureau ex K. Schum., *Amphilophium neoglaziovii* L.G. Lohmann, nom. nud., *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *begonifolium* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *glabrum* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *robustius* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *stenocarpum* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *symmetricum* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini, *Distictis glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Bureau & K. Schum., *Haplolophium dusenianum* Kraenzl., *Haplolophium glaziovii* (Bureau & K. Schum.) A.H. Gentry, *Pithecoctenium glaziovii* Bureau & K. Schum., *Urbanella duseniana* (Kraenzl.) Dusén ex Melch., *Urbanolophium dusenianum* (Kraenzl.) Melch., *Urbanolophium glaziovii* (Bureau & K. Schum.) Melch.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Amphilophium elongatum (Vahl)

L.G. Lohmann

Sin.: *Bignonia elongata* Vahl, *Distictella elongata* (Vahl) Urb., *Distictis elongata* (Vahl) Bureau & K. Schum., *Doxantha elongata* (Vahl) Miers, *Pithecoctenium**elongatum* (Vahl) Klotzsch, *Pithecoctenium obovatum* Mart. ex DC. Liana. Nativa. 100-900 m. Países: BRA(PAR, SCA).**Amphilophium falcatum** (Vell.) L.G.

Lohmann

Sin.: *Amphilophium falcatum* (Vell.) L. G. Lohmann, nom. nud., *Bignonia falcata* Vell., *Pithecoctenium cordifolia* DC., nom. inval., *Pithecoctenium falcatum* (Vell.) A. Pool

Liana. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

Amphilophium paniculatum (L.) KunthSin.: *Amphilophis xerophilum* Hassl., *Amphilophium glanduliferum* Mart.ex DC., *Amphilophium macrophyllum* Kunth, *Amphilophium molle* Cham. & Schltdl., *Amphilophium mollicomum* Pittier, *Amphilophium mutisii* Kunth, *Amphilophium paniculatum* (L.)Kunth var. *imatacense* A.H. Gentry, *Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth var. *molle* (Cham. & Schltdl.) Standl., *Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth var. *mollicomum* (Pittier) A.H. Gentry, *Amphilophium purpureum* Brandege, *Arrabidaea paniculata* (L.) Seem., *Bignonia paniculata* L., *Endoloma purpurea* Raf.

Liana. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Amphilophium pannosum (DC.)

Bureau & K. Schum.

Sin.: *Amphilophium jelskii* Zahlbr., *Amphilophium oxylophium* Donn. Sm., *Bignonia pannosa* DC., *Bignonia pubescens* Pav. ex DC., hom. illeg.

Liana. Nativa. 600-1600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Amphilophium sandwichii Fabris

Liana. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Amphilophium vauthieri DC.Sin.: *Amphilophium paraguariense* Hassl. ex A.G. Schulz

Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC).

Anemopaegma Mart. ex Meisn.**Anemopaegma arvense** (Vell.)

Stellfeld ex Souza

Sin.: *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *angustifolium* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *glabrum* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *hirsuta* Hassl., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *latifolium* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *petiolatum* Bureau, *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *puberulum* Bureau, *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *pubescens* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *sessilifolium* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *verticellatum* Bureau, *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC., *Anemopaegma sessilifolium* Mart. ex DC., *Anemopaegma subundulatum* Bureau & K. Schum., *Bignonia arvensis* Vell., *Bignonia miranda* Cham., *Jacaranda arvensis* (Vell.) Steud.

Hierba. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K. Schum.

Sin.: *Anemopaegma chamberlaynii* (Sims) Bureau & K. Schum. var. *brachybotrys* DC., *Anemopaegma chamberlaynii* (Sims) Bureau & K. Schum. var. *tenerior* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma citrifolium* (DC.) Baill., *Anemopaegma longipes* K. Schum., *Anemopaegma racemosum* Mart. ex DC. var. *bachybotrys* DC., *Anemopaegma racemosum* Mart. ex DC., *Anemopaegma scandens* (Vell.) Mello ex K. Schum., *Bignonia aequinoctialis* L. var. *chamberlaynii* (Sims) Ker Gawl., *Bignonia chamberlaynii* Sims var. *tenerior* Cham., *Bignonia chamberlaynii* Sims, *Bignonia scandens* Vell., *Jacaranda arrabidae* Steud., *Macfadyena citrifolia* (DC.) Miers, *Tabebuia citrifolia* DC.

Liana. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON, PHA, SPE).

Anemopaegma flavum Morong

Sin.: *Anemopaegma symmetricum* Rusby, *Anemopaegma sylvestre* S. Moore
Liana. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). PRY(CEN, COA, GUA, ÑEE).

Anemopaegma glaucum Mart. ex DC.

Sin.: *Anemopaegma glaucum* Mart. ex DC. var. *laceifolia* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma glaucum* Mart. ex DC. var. *pubescens* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma glaucum* Mart. ex DC. var. *triplinervium* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma lanceifolium* DC., *Anemopaegma lanceifolium* DC. var. *puberum* DC., *Anemopaegma triplinervium* Mart. ex DC., *Anemopaegma typus* Bureau & K. Schum.
Arbusto. Nativa. 600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Anemopaegma longipetiolatum

Sprague

Sin.: *Anemopaegma fiebrigianum* Kraenzl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, SPE).

Anemopaegma nebulosum Firetti-

Leggieri & L.G. Lohmann

Liana. Endémica. 1200-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anemopaegma prostratum DC.

Liana. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON).

Argyia D. Don**Argyia adscendens** DC. var. **adscendens**

Sin.: *Argyia huidobriana* Clos, *Argyia lutea* Phil., *Argyia viridis* Phil. var. *lutea* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 900-3200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Argyia adscendens DC. var. **viridis** (Phil.) Gleisner & RicardiSin.: *Argyia viridis* Phil.

Hierba. Endémica. 1800-2500 m.

Países: CHL(COQ, RME).

Argyia bifrons Phil.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.

Países: CHL(ATA).

Argyia bustillosii Phil.

Sin.: *Argyia australis* Phil., *Argyia potentillifolia* DC. var. *australis* (Phil.) Macloskie, comb. superfl., *Argyia potentillifolia* DC. var. *australis* (Phil.) Spig.

Subarbusto. Endémica. 800-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, BIO).

Argyia checoensis (Meyen) I.M. Johnst.

Sin.: *Argyia incana* Phil., *Argyia sitiens* I.M. Johnst., *Oxalis checoensis* Meyen

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Argyia conaiensis Ravenna

Subarbusto. Endémica. 2000 m.

Países: CHL(ATA).

Argyia farnesiana Gleisner & Ricardi

Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: CHL(COQ).

Argyia geranioides DC.

Hierba. Endémica. 900-1400 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Argyia glutinosa Phil.

Hierba. Endémica. 1400-2900 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Argyia potentillifolia DC.

Hierba. Endémica. 200-3500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Argyia radiata (L.) D. Don

Sin.: *Argyia canescens* D. Don, *Argyia chrysantha* Phil., *Argyia digitalina* Phil., *Argyia eremophila* Phil., *Argyia feuille* DC., *Argyia glabriuscula* Phil., *Argyia puberula* DC., *Argyia tenuifolia* C. Presl, *Argyia villosa* Phil., *Argyia viridis* Phil. var. *digitalina* (Phil.) Reiche, *Bignonia radiata* L., *Oxymitus argyloides* C. Presl

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Argyia robusta Sandwith

Hierba. Endémica. 100-1500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU).

Argyia tomentosa Phil.

Sin.: *Argyia tenella* Phil., *Argyia tomentosa* Phil. var. *tenella* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 2400-2900 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Argyia uspallatensis DC.

Sin.: *Argyia trifoliata* DC., *Tecoma uspallatensis* Mart. ex DC.

Hierba. Endémica. 1700-4100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, VAL).

Bignonia L.**Bignonia binata** Thunb.

Sin.: *Adenocalymma ocositense* Donn. Sm., *Arrabidaea schumanniana* Huber, *Bignonia binata* Silva Manso, *Bignonia eximia* Morong, *Bignonia noterophila* DC., *Bignonia purpurea* Lodd. ex Hook. f., *Bignonia umbellata* DC., *Bignonia umbellulata* DC., *Clytostoma binatum* (Thunb.) Sandwith, *Clytostoma elegans* Standl., *Clytostoma isthmicum* Pittier, *Clytostoma noterophilum* (DC.) Bureau & K. Schum., *Petastoma multiglandulosa* Kraenzl.

Liana. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Bignonia callistegioides Cham.

Sin.: *Bignonia lindleyi* DC., *Bignonia picta* Lindl., nom. illeg., *Bignonia speciosa* Graham, *Clytostoma calystegioides* (Cham.) Bureau ex Griseb., *Clytostoma uniflorum* K. Schum., *Cuspidaria callistegioides* (Cham.) DC., *Pithecoctenium callistegioides* (Cham.) Niederl.

Liana. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MEN, MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(APY, CEN). URY(CAS, CLA, FLA, MON, RNO, SAO, SOR).

Bignonia decora (S. Moore) L.G.

Lohmann

Sin.: *Anemopaegma decorum* S. Moore, *Arrabidaea decora* (S. Moore) Hassl. var. *macrophylla* Hassl., *Arrabidaea decora* (S. Moore) Hassl., *Bignonia decora* (S. Moore) L.G. Lohmann, nom. nud., *Clytostoma decorum* (S. Moore) Bureau & K. Schum., *Cydista decora* (S. Moore) A.H. Gentry

Liana. Nativa. 100-400 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, GUA, SPE).

Bignonia sciuripabulum (Hovel.) L.G.

Lohmann

Sin.: *Arrabidaea sciuripabulum* K. Schum., nom. nud., *Clytostoma itatiaense* J.C. Gomes, *Clytostoma sciuripabulum* Bureau & K. Schum., *Clytostoma sciuripabulum* Hovel. var. *longiflorum* Sprague, *Clytostoma sciuripabulum* Hovel., *Pithecoctenium sciuripabulum* (K. Schum.) Corr. Mélló

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CAN, GUA, ITA, SPE).

Campsidium Seem.**Campsidium valdivianum** (Phil.) W. Bull

Sin.: *Campsidium chilense* Reissek & Seem., *Campsidium valdivianum* (Phil.) Skottsbo., comb. superfl., *Tecoma valdiviana* Phil.

Arbusto o liana. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, LLA, AIS).

Campsis Lour.**Campsis radicans** (L.) Bureau

Sin.: *Campsis radicans* (L.) Seem.

Liana. Introducida. 400-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SAL).

Cuspidaria DC., nom. cons.**Cuspidaria convoluta** (Vell.) A.H. Gentry

Sin.: *Bignonia convoluta* Vell., *Bignonia pterocarpa* Cham., *Bignonia tetraquetra* Cham., *Cuspidaria populeaster* Mart. ex DC., *Cuspidaria pterocarpa* (Cham.) DC. var. *pubescens* Corr. Mélló, *Cuspidaria pterocarpa* (Cham.) DC., *Cuspidaria trifoliata* DC., *Lochmocydia populeaster* Mart. ex DC., *Nouletia pterocarpa* (Cham.) Pichon, *Saldanhaea convoluta* Corr. Mélló

Liana. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Cuspidaria lateriflora (Mart.) DC.

Sin.: *Lochmocydia laterifolia* (Mart.) Mart., *Saldanhaea confertiflora* Bureau, *Saldanhaea lateriflora* (Mart.) Bureau, *Saldanhaea lateriflora* (Mart.) Bureau var. *elliptica* Bureau, *Saldanhaea lateriflora* (Mart.) Bureau var. *ovata* Bureau, *Tecoma lateriflora* Mart.

Liana. Nativa. 500-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Cuspidaria pulchella (Cham.) K. Schum.

Sin.: *Arrabidaea pulchella* (Cham.) Bureau, *Arrabidaea tobiatensis* Chodat, *Bignonia pulchella* Cham., *Cuspidaria paucifolia* DC., *Fridericia pulchella* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Lundia pauciflora* Mart. ex DC., *Mansoa schwackei* Bureau & K. Schum., *Paracarpea pulchella* (Cham.) Pichon

Liana. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAN).

Cybistax Mart. ex Meisn.**Cybistax antisiphilitica** (Mart.) Mart.

Sin.: *Bignonia antisiphilitica* Mart., *Cybistax antisiphilitica* (Mart.) Mart. var. *trichocalyx* Bureau & K. Schum.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI).

Dolichandra Cham.**Dolichandra chodatii** (Hassl.) L.G.

Lohmann

Sin.: *Dolichandra chodatii* (Hassl.)

L.G. Lohmann, nom. nud., *Parabignonia chodatii* (Hassl.) A.H. Gentry, *Paradolichandra chodatii* Hassl., *Paradolichandra chodatii* Hassl. var. *brachycalyx* Hassl.

Arbusto o liana. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, CON, PHA, SPE).

Dolichandra cynanchoides Cham.

Sin.: *Bignonia coccinea* Vell., *Dolichandra cynanchoides* Cham. var. *latifolia* Hassl., *Macfadyena coccinea* (Vell.) Miens, *Macfadyena cynanchoides* (Cham.) Morong var. *latifolia* Hassl., *Macfadyena cynanchoides* (Cham.) Morong, *Spathodea dolichandra* Steud.

Liana. Nativa. 500-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL, MON, RNO, RIV, SAO).

Dolichandra dentata (K. Schum.) L.G.

Lohmann

Sin.: *Dolichandra dentata* (K. Schum.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Macfadyena dentata* K. Schum., *Macfadyena tweediana* Griseb. ex Lorentz, nom. inval.

Enredadera o liana. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, FLA, MON, SAO).

Dolichandra hispida (DC.) L.H.

Fonseca & L.G. Lohmann

Sin.: *Macfadyena hispida* (DC.) Seem., *Macfadyena mollis* (Sond.) Seem., *Macfadyena pubescens* S. Moore, *Spathodea hispida* DC., *Spathodea mollis* Sond.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, ITA).

Dolichandra quadrivalvis (Jacq.) L.G. Lohmann

Sin.: *Bignonia fraxinifolia* (Kunth) Spreng., *Bignonia populifolia* DC., *Bignonia quadrivalvis* Jacq., *Melloa fraxinifolia* (Kunth) K. Schum. ex Schnee, *Melloa populifolia* (DC.) Britton, *Melloa populifolia* (DC.) Bureau, *Melloa quadrivalvis* (Jacq.) A.H. Gentry, *Phryganocydia pisoniana* Mart. ex DC., nom. nud., *Spathodea fraxinifolia* Kunth, *Spathodea pisoniana* DC., *Tabebuia pisoniana* (DC.) Miers, *Tecoma pisoniana* (DC.) DC. ex Bureau & K. Schum.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

Dolichandra uncata (Andrews) L.G. Lohmann

Sin.: *Bignonia pachyptera* DC., nom. nud., *Bignonia uncata* Andrews, *Bignonia uncata* Sims, nom. inval., *Bignonia uncinata* G. Mey., *Dolichandra fenziiana* Miq., *Dolichandra uncata* (Andrews) Miers, *Macfadyena fenziiana* (Miq.) Miers, *Macfadyena guatemalensis* S.F. Blake, *Macfadyena hassleri* Sprague, *Macfadyena uncata* (Andrews) Sprague & Sandwith, *Macfadyena uncinata* (G. Mey.) A. DC., *Macfadyena unculata* K. Schum., *Pachyptera puberula* DC., *Spathodea uncata* (Andrews) Spreng., *Spathodea uncinata* (G. Mey.) Spreng.

Enredadera o liana. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS).

Dolichandra unguiculata (Vell.) L.G. Lohmann

Sin.: *Bignonia unguiculata* Vell., *Dolichandra maximilianii* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Dolichandra unguiculata* (Vell.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Doxantha unguiculata* (Vell.) Miers, *Parabignonia maximilianii* (Mart. ex DC.) Bureau ex K. Schum., *Parabignonia unguiculata* (Vell.) A.H. Gentry, *Tecoma maximilianii* Mart. ex DC.

Enredadera o liana. Nativa. 100 m.

Países: BRA(PAR).

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann

Sin.: *Batocydia exoleta* Mart. ex DC.,

Batocydia unguis Mart. ex DC., nom. nud., *Batocydia unguis-cati* (L.) Mart. ex Britton, nom. illeg., *Batocydia unguis-cati* (L.) Mart. ex Britton, nom. nud., *Bignonia acutistiopula* Schltld., *Bignonia californica* Brandegee, *Bignonia catharinensis* Schenk, *Bignonia dasyonyx* S.F. Blake, *Bignonia exoleta* Vell., *Bignonia gracilis* Lodd., *Bignonia inflata* Griseb., *Bignonia lanuginosa* Hemsl., *Bignonia pseudounguis* Desf., *Bignonia triantha* DC., *Bignonia tweediana* Lindl., *Bignonia unguis* L., *Bignonia unguis-cati* L. var. *exoleta* (Vell.) Sprague, *Bignonia unguis-cati* L. var. *gracilis* (Lodd.) DC., *Bignonia unguis-cati* L. var. *guatemalensis* K. Schum. & Loes., *Bignonia unguis-cati* L. var. *radicans* DC., *Bignonia unguis-cati* L. var. *serrata* Bureau & K. Schum., *Bignonia unguis-cati* L., *Bignonia vespertilia* Barb. Rodr., *Dolichandra kohautiana* C. Presl, *Doxantha acutistipula* (Schltld.) Miers, *Doxantha adunca* Miers, *Doxantha chelophora* Miers, nom. nud., *Doxantha dasyonyx* (S.F. Blake) S.F. Blake, *Doxantha exoleta* (Vell.) Miers, *Doxantha mexicana* Miers, nom. nud., *Doxantha praesignis* Miers, nom. nud., *Doxantha radicans* (DC.) Miers, *Doxantha serrulata* Miers, nom. nud., *Doxantha tenuicula* Miers, nom. nud., *Doxantha tweediana* (Lindl.) Miers, *Doxantha unguis* (L.) Miers, *Doxantha unguis-cati* (L.) Miers var. *exoleta* (Vell.) Fabris, *Doxantha unguis-cati* (L.) Miers, *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H. Gentry, *Microbignonia auristellae* Kraenzl.

Enredadera o liana. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE). URY(ART, COL, FLA, MON, RNO, RIV, SJO).

Eccremocarpus Ruiz & Pav.

Eccremocarpus scaber Ruiz & Pav.

Sin.: *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) D. Don, comb. illeg., *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) Sweet, *Eccremocarpus scaber* Ruiz & Pav. var. *sepium* Bertero ex A.DC., *Eccremocarpus sepium* Bertero Arbusto. Nativa. 200-2400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, ARA, LLA, RME).

Fridericia Mart.

Fridericia candicans (Rich.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea calodictyos* Sprague, *Arrabidaea candicans* (Rich.) DC. var. *latifolia* DC., *Arrabidaea candicans* (Rich.) DC., *Arrabidaea orbignyana* DC., *Arrabidaea pachycalyx* Sprague, *Arrabidaea pruinosa* Klotzsch ex Bureau & K. Schum., *Arrabidaea quinqueruvia* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea rhodothyrus* Kraenzl., *Arrabidaea schomburgkii* Klotzsch ex Bureau & K. Schum., *Arrabidaea subincana* DC., *Arrabidaea zuliaensis* Pittier, *Bignonia candicans* Rich., *Bignonia colorata* Poir., *Fridericia candicans* (Rich.) L.G. Lohmann, nom. nud.

Liana. Nativa. 100-200 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Fridericia caudigera (S. Moore) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea caudigera* (S. Moore) A.H. Gentry, *Arrabidaea coleocalyx* Bureau & K. Schum. var. *induta* Sprague, *Arrabidaea coleocalyx* Bureau & K. Schum. var. *micrantha* Sprague, *Arrabidaea coleocalyx* Bureau & K. Schum., *Bignonia caudigera* S. Moore, *Fridericia caudigera* (S. Moore) L.G. Lohmann, nom. nud.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann

Sin.: *Adenocalymma portoricense* Bello, *Arrabidaea chica* (Bonpl.) Verl., *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. f. *cuprea* (Cham.) Sandwith, *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *acutifolia* Bureau, *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *angustifolia* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *cuprea* (Cham.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *thyrsoides* (DC.) Bureau, *Arrabidaea cuprea* (Cham.) Bornm., hom. illeg., *Arrabidaea cuprea* Pittier, *Arrabidaea larensis* Pittier, *Arrabidaea rosea* DC., *Arrabidaea triphylla* Willd. ex DC., *Bignonia chica* Bonpl., *Bignonia cuprea* Cham. var. *grandiflora* Cham., *Bignonia cuprea* Cham. var. *parviflora* Cham., *Bignonia cuprea* Cham., *Bignonia*

rubescens S. Moore, *Bignonia rufescens* DC., *Bignonia thyrsoidea* DC., *Fridericia chica* (Bonpl.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Lundia chica* (Bonpl.) Seem., *Temnocydia carajuda* Mart. ex DC., *Vasconcellia acutiflora* Mart. ex DC.

Liana. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, MIE, SPE).

Fridericia conjugata (Vell.) L.G. Lohmann

Sin.: *Adenocalymma paniculatum* Benth. ex Miers, *Arrabidaea amazonica* K. Schum., *Arrabidaea chironura* Bureau ex Glaz., nom. nud., *Arrabidaea conjugata* (Vell.) Mart., *Arrabidaea virescens* DC. var. *farinosa* Salzm. ex DC., *Arrabidaea virescens* DC., *Bignonia ciliata* Wawra, *Bignonia conjugata* Vell., *Bignonia farinosa* Salzm. ex DC., *Fridericia conjugata* (Vell.) L.G. Lohmann, nom. nud.

Liana. Nativa. 300-400 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Fridericia craterophora (DC.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea craterophora* (DC.) Bureau, *Arrabidaea craterophora* (DC.) Bureau var. *acutifolia* Bureau, *Bignonia craterophora* DC.

Liana. Nativa. 300-400 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G. Lohmann

Sin.: *Adenocalymma friesianum* Kraenzl., *Arrabidaea acuminata* (J.R. Johnst.) Urb., *Arrabidaea barquisimetensis* Pittier, *Arrabidaea corallina* (Jacq.) Sandwith, *Arrabidaea guaricensis* Pittier, *Arrabidaea lenticellosa* Pittier, *Arrabidaea obliqua* (Kunth) Bureau var. *hirsuta* (DC.) Dugand, *Arrabidaea obliqua* (Kunth) Bureau, *Arrabidaea obovata* DC., *Arrabidaea ovalifolia* Pittier, *Arrabidaea praecox* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *glabrescens* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *mollis* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *puberula* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *subglabra* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *elliptica* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var.

genuina Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *induta* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *oxyphylla* Sprague & Sandwith, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *praecox* (Hassl.) Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *typica* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea rotundata* (DC.) Bureau ex K. Schum., *Arrabidaea sickiana* J.C. Gomes, *Arrabidaea spraguei* Pittier, *Bignonia acuminata* J.R. Johnst., *Bignonia balbisiana* DC. var. *glabra* DC., *Bignonia balbisiana* DC. var. *hirsuta* DC., *Bignonia balbisiana* DC., *Bignonia boliviana* Rusby, *Bignonia columbiana* Morong, *Bignonia corallina* Jacq., *Bignonia dichotoma* Jacq., *Bignonia glabrata* Kunth, *Bignonia hibiscifolia* Cham., *Bignonia obliqua* Kunth, *Bignonia rotundata* DC., *Bignonia villosa* Bertero ex Spreng., *Cremastus balbisianus* (DC.) Miers, *Cuspidaria hibiscifolia* (Cham.) Bureau, *Fridericia dichotoma* (Jacq.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Panterpa dichotoma* (Jacq.) Miers, *Petastoma obliquum* (Kunth) Miers, *Piriadacus hibiscifolius* (Cham.) Pichon, *Tabebuia chapadensis* S. Moore

Liana. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Fridericia fagoides (Cham.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea fagoides* (Cham.) Bureau, *Bignonia fagoides* Cham., *Bignonia grewioides* S. Moore, *Fridericia fagoides* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud.

Liana. Nativa. 300-400 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Fridericia florida (DC.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea cardenasii* Rusby, *Arrabidaea divaricata* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea florida* DC., *Arrabidaea panamensis* Sprague, *Bignonia nitida* Britton ex Bureau & K. Schum., nom. nud., *Fridericia florida* (DC.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Vasconcellia florida* Bureau ex DC.

Liana. Nativa. 100-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

Fridericia leucopogon (Cham.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea leucopogon* (Cham.) Sandwith, *Bignonia leucopogon* Cham., *Panterpa leucopogon* (Cham.) Miers, *Petastoma leucopogon* (Cham.) Bureau, *Petastoma leucopogon* (Cham.) Bureau var. *glabra* K. Schum., *Petastoma puniceum* (Mart.) Miers

Liana. Nativa. 100-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Fridericia platyphylla (Cham.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *acuminata* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *attenuata* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *cuneata* (DC.) Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *firma* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *induta* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *platyphylla* (DC.) Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *rigida* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau, *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *acuminata* Bureau, *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *cuneata* DC., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *elliptica* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *firma* (Bureau) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *firmula* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *heterophylla* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *induta* (Bureau) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *lasiorrhachis* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *puberula* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *stricta* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum., nom. illeg., *Bignonia brachypoda* DC. var. *acutifolia* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *cuneata* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *elliptica* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *firmula* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *heterophylla* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *platyphylla* (Cham.) DC., nom. illeg., *Bignonia*

brachypoda DC. var. *pubescens* Sond., *Bignonia brachypoda* DC., *Bignonia platyphylla* Cham., *Bignonia regnelliana* Sond., *Fridericia platyphylla* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma simplicifolia* Miers
Liana. Nativa. 300-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CON, PAI, SPE).

Fridericia pubescens (L.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea blanchetii* DC. var. *desertotum* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea blanchetii* DC., *Arrabidaea carabobensis* Pittier, *Arrabidaea cordifolia* Klotzsch, *Arrabidaea desertorum* DC., *Arrabidaea lundellii* Standl., *Arrabidaea pleei* DC., *Arrabidaea pubescens* (L.) A.H. Gentry, *Arrabidaea sieberi* A. DC., *Bignonia blanchetii* DC., *Bignonia pubescens* L., *Bignonia sieberi* DC., *Bignonia tomentella* S. Moore, *Fridericia pubescens* (L.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma pubescens* (L.) Miers, *Vascentellia desertorum* Mart. ex DC.
Liana. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CON, SPE).

Fridericia samydoides (Cham.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea anguillulicarpa* Hassl., *Arrabidaea samydoides* (Cham.) Sandwith, *Bignonia samydoides* Cham., *Bignonia variabilis* Mart., *Bignonia varians* DC., *Fridericia samydoides* (Cham.) L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma crenatum* Miers, *Petastoma glabrum* Miers, *Petastoma laurifolium* Kraenzl., *Petastoma samydoides* (Cham.) Miers
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, SPE).

Fridericia speciosa Mart.

Sin.: *Fridericia guilielma* Mart., *Tabebuia sanguinea* DC.
Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(Desconocida).

Fridericia triplinervia (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea ateramnantha* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea triplinervia* (Mart. ex DC.) Baill. ex Bureau var. *brachycalyx* Hassl., *Arrabidaea triplinervia* (Mart. ex DC.) Baill. ex Bureau, *Bignonia triplinervia* Mart. ex DC., *Fridericia triplinervia* (Mart. ex DC.)

L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma triplinervia* (Mart. ex DC.) Miers, *Saritaea triplinervia* (Mart. ex DC.) Dugand
Liana. Nativa. 100-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Fridericia truncata (Sprague) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea truncata* (Sprague) Sandwith, *Fridericia truncata* (Sprague) L.G. Lohmann, nom. nud., *Mansoa truncata* Sprague var. *parviflora* (Hassl.) Sandwith, *Mansoa truncata* Sprague, *Petastoma truncatum* (Sprague) Hassl., *Petastoma truncatum* (Sprague) Hassl. var. *grandiflorum* Hassl., *Petastoma truncatum* (Sprague) Hassl. var. *parviflorum* Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, CON, PHA).

Fridericia whitei (Rusby) L.G. Lohmann

Sin.: *Anemopaegma whitei* Rusby, *Arrabidaea whitei* (Rusby) Sandwith, *Fridericia whitei* (Rusby) L.G. Lohmann, nom. nud., *Petastoma whitei* (Rusby) Sandwith
Enredadera. Nativa. 200-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Handroanthus Mattos

Handroanthus albus (Cham.) Mattos

Sin.: *Tabebuia alba* (Cham.) Sandwith, *Tecoma alba* Cham.
Árbol. Nativa. 200-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA).

Handroanthus catarinensis (A.H. Gentry) S. Grose

Sin.: *Tabebuia catarinensis* A.H. Gentry
Arbusto. Endémica. 700-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos

Sin.: *Gelseminum chrysotrichum* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Handroanthus chrysotrichus* (Mart. ex DC.) Mattos var. *obtusata* (DC.) Mattos, *Tabebuia chrysotricha* (Mart. ex DC.) Standl., *Tecoma chrysotricha* Mart. ex DC. var. *obtusata* (DC.) Bureau & K. Schum., *Tecoma chrysotricha* Mart. ex DC.,

Tecoma flavescens Mart. ex DC., *Tecoma grandis* Kraenzl., *Tecoma ochracea* Cham. var. *denudata* Cham., *Tecoma obtusata* DC.
Arbolito o árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos

Sin.: *Bignonia heptaphylla* Vell., *Handroanthus avellanadae* (Lorentz ex Griseb.) Mattos var. *paullensis* (Toledo) Mattos, *Handroanthus eximus* (Miq.) Mattos, *Tabebuia avellanadae* Lorentz ex Griseb. var. *paullensis* Toledo, *Tabebuia eximia* (Miq.) Sandwith, *Tabebuia heptaphylla* (Vell.) Toledo, *Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl. var. *lepidota* (Bureau) Toledo, *Tabebuia ipe* (Mart. ex K. Schum.) Standl., *Tecoma curialis* Saldanha, *Tecoma eximia* Miq., *Tecoma impetiginosa* Mart. ex DC. var. *lepidota* Bureau, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum., *Tecoma ipe* Mart., nom. nud., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *glabra* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *grandiflora* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *parviflora* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. var. *desinens* Sprague
Árbol. Nativa. 100-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ROC, SAO).

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos

Sin.: *Gelseminum avellanadae* (Lorentz ex Griseb.) Kuntze, *Handroanthus avellanadae* (Lorentz ex Griseb.) Mattos, *Handroanthus impetiginosus* (Mart. ex DC.) Mattos var. *lepidotus* (Bureau) Mattos, *Tabebuia avellanadae* Lorentz ex Griseb., *Tabebuia dugandii* Standl., *Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl., *Tabebuia ipe* (Mart. ex K. Schum.) Standl. var. *integra* (Sprague) Sandwith, *Tabebuia nicaraguensis* S.F. Blake, *Tabebuia palmeri* Rose, *Tabebuia schunkevigoi* D.R. Simpson, *Tecoma adenophylla* Bureau & K. Schum., *Tecoma avellanadae* (Lorentz ex Griseb.) Speg. var. *alba* Lillo, *Tecoma avellanadae* (Lorentz ex Griseb.) Speg., *Tecoma impetiginosa* Mart. ex DC., *Tecoma impetiginosa* Mart., nom. nud., *Tecoma integra* (Sprague) Hassl., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *lepidota* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f.

leucotricha Hassl., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. var. *integra* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. var. *integrifolia* Hassl.
Árbol. Nativa. 200-1400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Handroanthus lapacho (K. Schum.)

S. Grose

Sin.: *Tabebuia lapacho* (K. Schum.)
Sandwith, *Tecoma lapacho* K. Schum.
Árbol. Nativa. 700-1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Handroanthus ochraceus (Cham.)

Mattos var. **aguaraguensis** M.A.

Zapater & Califano

Árbol. Endémica. 500-600 m.
Países: ARG(SAL).

Handroanthus ochraceus (Cham.)

Mattos subsp. **ochraceus**

Sin.: *Tabebuia heteropoda* (DC.)
Sandwith, *Tabebuia ochracea* (Cham.)
Standl., *Tabebuia ochracea* (Cham.)
Standl. subsp. *heteropoda* (DC.) A.H.
Gentry, *Tecoma hassleri* Sprague, *Tecoma heteropoda* DC., *Tecoma ochracea* Cham.
Árbol. Nativa. 100-1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Handroanthus pulcherrimus

(Sandwith) S. Grose

Sin.: *Tabebuia pulcherrima* Sandwith,
Tecoma petropolitana Glaz., nom. nud.
Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, ITA, MIE, ÑEE).

Handroanthus serratifolius (Vahl)

S. Grose

Sin.: *Bignonia araliacea* Cham.,
Bignonia conspicua Rich. ex DC., nom. nud.,
Bignonia flavescens Vell., *Bignonia patrisiana* DC., nom. nud., *Bignonia serratifolia* Vahl, *Gelseminum araliaceum* (Cham.) Kuntze, *Handroanthus araliaceus* (Cham.) Mattos,
Handroanthus atractocarpus (Bureau & K. Schum.) Mattos, *Handroanthus flavescens* (Vell.) Mattos, *Tabebuia araliacea* (Cham.) Morong & Britton,
Tabebuia monticola Pittier, *Tabebuia serratifolia* (Vahl) G. Nicholson,
Tecoma araliacea (Cham.) DC., *Tecoma*

atractocarpa Bureau & K. Schum.,
Tecoma conspicua DC., *Tecoma nigricans* Klotzsch, nom. nud., *Tecoma patrisiana* DC., *Tecoma serratifolia* (Vahl) G. Don,
Tecoma speciosa DC. ex Mart.
Árbol. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(PAR).

Handroanthus umbellatus (Sond.)

Mattos

Sin.: *Tabebuia umbellata* (Sond.)
Sandwith var. *lanceolata* (Bureau & K. Schum.) Toledo, *Tabebuia umbellata* (Sond.) Sandwith, *Tecoma umbellata* Sond., *Tecoma umbellata* Sond. var. *lanceolata* Bureau & K. Schum.
Árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Handroanthus vellosi (Toledo)

Mattos

Sin.: *Bignonia longiflora* Vell.,
Handroanthus longiflorus (Vell.) Mattos,
Tabebuia vellosi Toledo, *Tecoma alba* Cham. var. *subdenudata* Bureau, *Tecoma longiflora* (Vell.) Bureau & K. Schum.
Arbusto o árbol. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR).

Jacaranda Juss.

Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers.

Sin.: *Bignonia brasiliana* Lam.
Árbol. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Jacaranda caroba (Vell.) DC.

Sin.: *Bignonia caroba* Vell., *Jacaranda caroba* (Vell.) DC. var. *oxyphylla* (Cham.) Bureau, *Jacaranda oxyphylla* Cham.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Jacaranda cuspidifolia Mart.

Sin.: *Jacaranda chapadensis* Barb. Rodr., *Jacaranda cuspidifolia* Kunth, nom. illeg., *Jacaranda cuspidifolia* Mart. ex DC. var. *calycina* Bureau
Árbol. Nativa. 100-1300 m.
Países: ARG(SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Jacaranda decurrens Cham.

Sin.: *Jacaranda decurrens* Cham. var. *glabrata* Hassl., *Jacaranda decurrens* Cham. subsp. *symmetrifoliolata* Farias & Proença, *Jacaranda pteroides* Silva Manso, *Jacaranda robertii* S. Moore
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Jacaranda micrantha Cham.

Sin.: *Jacaranda intermedia* Sond.
Árbol. Nativa. 100-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, ITA, PAI).

Jacaranda mimosifolia D. Don

Sin.: *Jacaranda chelonina* Griseb.,
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Árbol. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CAT, ERI, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, COA). URY(MON).

Jacaranda mutabilis Hassl.

Sin.: *Jacaranda mutabilis* Hassl. var. *angustiflora* Hassl., *Jacaranda mutabilis* Hassl. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Jacaranda mutabilis* Hassl. f. *integra* Hassl., *Jacaranda mutabilis* Hassl. var. *parvifolia* Hassl., *Jacaranda mutabilis* Hassl. f. *subcoaetanea* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Jacaranda puberula Cham.

Sin.: *Bignonia obovata* Vell., *Jacaranda digitaliflora* Lem. var. *albiflora* Lem., *Jacaranda digitaliflora* Lem., *Jacaranda endotricha* DC., *Jacaranda gloxiniflora* Lem., *Jacaranda hebeophora* DC., *Jacaranda paulista* Silva Manso, *Jacaranda puberula* Cham. var. *macrophylla* Cham., *Jacaranda puberula* Cham. var. *microphylla* Cham., *Jacaranda purpurea* Vattimo, *Jacaranda semiserrata* Cham., *Jacaranda subrhombica* DC.
Arbolito o árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, GUA).

Lundia DC.

Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith

Sin.: *Arrabidaea corymbifera* Bureau ex K. Schum., *Bignonia corymbifera* Vahl, *Bignonia umbrosa* Kunth, *Cuspidaria corymbifera* (Vahl) Baill. ex K. Schum., *Lundia phaseolifolia* Rusby, *Lundia truncata* Rusby, *Lundia umbrosa* (Kunth) Bureau, *Lundia umbrosa* (Kunth) Bureau var. *coccinea* Bureau, *Lundia valenzuelae* Dugand, *Petastoma corymbiferum* (Vahl) Miers
Liana. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Lundia virginalis DC.

Sin.: *Alsocidia virginalis* Mart. ex DC., nom. nud., *Bignonia hebantha* Mart. ex

DC., nom. nud., *Bignonia nitidula* Mart. ex DC., nom. nud., *Bignonia virginalis* Mart. ex DC., *Lundia glabra* DC., *Lundia hebantha* DC., *Lundia nitidula* DC. var. *virginalis* (DC.) Bureau & K. Schum., *Lundia nitidula* DC., *Lundia virginalis* DC. var. *nitidula* (DC.) A.H. Gentry
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mansoa DC.

Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & K. Schum.

Sin.: *Adenocalymma glomeratum* Sprague, *Adenocalymma splendens* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea grandiflora* Hassl., *Bignonia difficilis* Cham., *Chodanthus praepensus* (Miers) Sandwith, *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *glomeratus* Hassl., *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *grandiflora* Hassl., *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl., *Clytostoma punctatum* Bureau ex Glaz., *Cydista difficilis* (Cham.) Miers, *Cydista praepensa* Miers, *Mansoa acuminatissima* Bureau & K. Schum., *Mansoa laevis* DC.
Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Perianthomega Bureau ex Baill.

Perianthomega vellozoi Bureau

Sin.: *Bignonia perianthomega* Vell., *Memora perianthomega* (Vell.) Miers, *Stizophyllum triternatum* J.C. Gomes
Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON).

Podranea Sprague

Podranea ricasoliana (Tanfani)

Sprague

Sin.: *Tecoma ricasoliana* Tanfani
Arbusto o liana. Introducida. 700-800 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

Pyrostegia C. Presl

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers

Sin.: *Bignonia ignea* Vell., *Bignonia tubulosa* Klotzsch, *Bignonia venusta* Ker Gawl., *Jacaranda echinata* Spreng., *Pyrostegia amabilis* Miers, nom. nud., *Pyrostegia dichotoma* Miers ex K. Schum., *Pyrostegia ignea* (Vell.) C. Presl, *Pyrostegia pallida* Miers, nom. nud., *Pyrostegia parviflora* Miers, nom. nud., *Pyrostegia reticulata* Miers, nom. nud., *Pyrostegia tecomiflora* (Rusby) K. Schum., *Pyrostegia tubulosa* (Klotzsch) Bureau & K. Schum., *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers var. *typica* Sprague, nom. inval., *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers var. *villosa* Hassl. ex Sprague, *Tecoma venusta* (Ker Gawl.) Lem., *Tynanthus igneus* Barb. Rodr.

Liana. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Sparattosperma Mart. ex Meisn.

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum.

Sin.: *Bignonia leucantha* Vell., *Bignonia leucoxyloides* DC., nom. nud., *Bignonia subvernica* Cham., nom. nud., *Sparattosperma lithontripticum* Mart. ex DC. var. *subtomentosum* Bureau, *Sparattosperma lithontripticum* Mart. ex DC., *Sparattosperma stenocarpum* Bureau & K. Schum., *Sparattosperma vernicosum* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *subtomentosa* Bureau, *Sparattosperma vernicosum* (Cham.) Bureau & K. Schum., *Spathodea vernicosa* Cham., *Tecoma salzmanni* DC., *Tecoma subvernica* DC.

Árbol. Nativa. 100-400 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Stizophyllum Miers

Stizophyllum perforatum (Cham.) Miers

Sin.: *Bignonia arrabidaea* Steud., *Bignonia calycina* DC., *Bignonia dentata* DC., *Bignonia glandulosa* Mart. ex DC., nom. illeg., *Bignonia glandulosa* Mart., nom. illeg., *Bignonia longisiliqua* Vell., *Bignonia occidentalis* Salzm. ex

DC., *Bignonia perforata* Cham., *Bignonia physaloides* Cham., *Bignonia punctata* DC., *Bignonia velutina* DC., *Petastoma physaloides* (Cham.) Miers, *Petastoma urceolare* Kraenzl., *Stizophyllum dentatum* (DC.) Miers, *Stizophyllum denticulatum* Miers, *Stizophyllum glandulosum* (Mart. ex DC.) Miers, *Stizophyllum longisiliquum* Bureau ex Baill., *Stizophyllum occidentale* (Salzm. ex DC.) Miers, *Stizophyllum perforatum* (Cham.) Miers var. *dentatum* (Miers) Bureau, *Stizophyllum perforatum* (Cham.) Miers var. *physaloides* (Cham.) Bureau, *Stizophyllum velutinum* (DC.) Miers
Liana. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Tabebuia Gomes ex DC.

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore

Sin.: *Bignonia aurea* Silva Manso, *Bignonia squamellulosa* DC., nom. nud., *Gelsemium caraiba* (Mart.) Kuntze, *Handroanthus caraiba* (Mart.) Mattos, *Handroanthus leucophlaeos* (Mart. ex DC.) Mattos, *Tabebuia argentea* (Bureau & K. Schum.) Britton, *Tabebuia caraiba* (Mart.) Bureau, *Tabebuia suberosa* Rusby, *Tecoma argentea* Bureau & K. Schum. f. *parviflora* Hassl., *Tecoma argentea* Bureau & K. Schum., *Tecoma aurea* (Silva Manso) DC., *Tecoma caraiba* Mart. var. *grandiflora* Hassl., *Tecoma caraiba* Mart. var. *squamellulosa* (DC.) Bureau & K. Schum., *Tecoma caraiba* Mart., *Tecoma leucophlaeos* Mart. ex DC., *Tecoma squamellulosa* DC., *Tecoma trichocalycina* DC.

Árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, FOR, SAL).
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CHO, CON, COA, ÑEE, PHA).

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC.

Sin.: *Bignonia cassinoides* Lam., *Bignonia obtusifolia* Lam., *Bignonia tabebuya* Vell., *Bignonia uliginosa* Gomes, *Catalpa cassinoides* (Lam.) Spreng., *Spathodea magnolioides* Cham., *Tabebuia magnolioides* (Cham.) Miers, *Tabebuia uliginosa* (Gomes) DC., *Tecoma uliginosa* Mart. ex DC.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb.

Sin.: *Bignonia morongii* Britton, *Gelsemium nodosum* (Griseb.) Kuntze,

Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb. var. *parviflora* Griseb., *Tecoma nodosa* Griseb.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith

Sin.: *Bignonia roseo-alba* Ridl., *Handroanthus odontodiscus* (Bureau & K. Schum.) Mattos, *Handroanthus piutinga* (Pilg.) Mattos, *Handroanthus roseo-albus* (Ridl.) Mattos, *Sparattosperma neurocalyx* Bureau & K. Schum., *Tabebuia odontodiscus* (Bureau & K. Schum.) Toledo, *Tabebuia papyrophloios* (Bureau & K. Schum.) Melch., *Tabebuia piutinga* (Pilg.) Sandwith, *Tecoma mattogrossensis* Kraenzl., *Tecoma odontodiscus* Bureau & K. Schum. var. *paraguariensis* Hassl., *Tecoma papyrophloios* Bureau & K. Schum., *Tecoma schumanni* Kraenzl.
Árbol. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Tanaecium Sw.

Tanaecium cyrtanthum (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum.

Sin.: *Tanaecium brasiliense* Miers, *Tecoma cyrtantha* Mart. ex DC.
Arbusto. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

Tanaecium mutabile (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea muehlbergiana* Hassl., *Arrabidaea mutabilis* Bureau & K. Schum., *Fridericia mutabilis* (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann, nom. nud.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Tanaecium pyramidatum (Rich.) L.G. Lohmann

Sin.: *Adenocalymma densiflora* Rusby, *Arrabidaea dichasia* J.D. Sm., *Bignonia brachiata* Sessé & Moç., *Bignonia dasyantha* DC., *Bignonia ehretioides* Cham., *Bignonia laurifolia* Vahl, *Bignonia lenta* Mart. ex DC., *Bignonia martiusiana* DC., *Bignonia pyramidata* Rich., *Bignonia rupestris* Gardner, *Bignonia sinclairii*

Benth., *Bignonia striata* DC., *Memora lenta* (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum., *Mussatia venezuelensis* Bureau, *Pachygenium perrottetii* DC., *Pachyptera dasyantha* DC., *Pachyptera umbelliformis* DC., *Paragonia pyramidata* (Rich.) Bureau var. *elliptica* Bureau, *Paragonia pyramidata* (Rich.) Bureau var. *tomentosa* Bureau & K. Schum., *Paragonia pyramidata* (Rich.) Bureau, *Petastoma leiophyllum* Kraenzl., *Petastoma macrocalyx* Kraenzl., *Pithecoctenium reticulare* DC., *Tabebuia pyramidata* (Rich.) DC., *Zeyheria surinamensis* Miq.
Liana. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA). URY(Desconocida).

Tanaecium selloi (Spreng.) L.G. Lohmann

Sin.: *Arrabidaea dichotoma* Bureau, *Arrabidaea selloi* (Spreng.) Sandwith, *Bignonia coriacea* Sellow ex Steud., *Bignonia dichotoma* Vell., hom. illeg., *Bignonia selloi* Spreng.
Liana. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(ART).

Tanaecium tetramerum (A.H. Gentry) Zuntini & L.G. Lohmann

Sin.: *Sphingiphila tetramera* A.H. Gentry
Arbolito. Nativa. 100-200 m.
Países: PRY(APY).

Tecoma Juss.

Tecoma capensis (Thunb.) Lindl.

Sin.: *Bignonia capensis* Thunb., *Ducoudraea capensis* Bureau, *Tecoma petersii* Klotzsch, *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach, *Tecomaria krebsii* Klotzsch, *Tecomaria petersii* Klotzsch
Arbusto o subarbusto. Introducida.
0-100 m.
Países: ARG(COS).

Tecoma fulva (Cav.) D. Don subsp. **fulva**

Sin.: *Bignonia fulva* Cav., *Bignonia meyeniana* Schauer, *Stenolobium fulvum* (Cav.) Sprague, *Tecomaria fulvum* (Cav.) Seem.
Arbusto. Nativa. 200-2300 m.
Países: CHL(TAR).

Tecoma fulva (Cav.) D. Don subsp. **garrocha** (Hieron.) J.R.I. Wood

Sin.: *Gelsemium garrocha* (Hieron.) Kuntze var. *bicolor* Kuntze, *Gelsemium garrocha* (Hieron.) Kuntze, *Stenolobium cochabambense* Herzog, *Stenolobium garrocha* (Hieron.) R.E. Fr., *Stenolobium guaracha* Hieron. ex Bureau & K. Schum., nom. nud., *Tecoma cochabambensis* Herzog, *Tecoma garrocha* Hieron.

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-2900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth var. **stans**

Sin.: *Bignonia frutescens* Mill., *Bignonia incisa* DC., nom. nud., *Bignonia sorbifolia* Salisb., *Bignonia stans* L., *Bignonia tecoma* Wehmer, *Bignonia tecomiflora* Rusby, *Bignonia tecomoides* DC., *Gelsemium stans* (L.) Kuntze, *Stenolobium incisum* Rose & Standl., *Stenolobium molle* (Kunth) Seem., *Stenolobium quinquejugum* Loes., *Stenolobium stans* (L.) Seem. var. *apiifolium* (DC.) Seem., *Stenolobium stans* (L.) Seem. var. *multijugum* R.E. Fr., *Stenolobium stans* (L.) Seem. var. *pinnatum* Seem., *Stenolobium stans* (L.) Seem., *Stenolobium tronadora* Loes., *Tecoma incisa* (Rose & Standl.) I.M. Johnst., *Tecoma sorbifolia* Kunth, *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *angustatum* Rehder, *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *apilifolia* DC., *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *mollis* (Kunth) Siddiqi, *Tecoma tronadora* (Loes.) I.M. Johnst., *Tecoma velutina* Lindl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CEN).

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth var. **velutina** DC.

Sin.: *Gelsemium molle* (Kunth) Kuntze, *Tecoma fabrisii* T. Mey., *Tecoma mollis* Kunth
Arbusto o arbolito. Nativa. 1200-2100 m.
Países: ARG(SAL).

Tecoma tenuiflora (DC.) Fabris

Sin.: *Bignonia tenuiflora* DC., *Gelsemium amoenum* Kuntze, *Gelsemium amoenum* Kuntze var. *tomentosum* Kuntze, *Gelsemium amoenum* Kuntze var. *pubescens* Kuntze, *Stenolobium amoenum* K. Schum.
Arbusto. Nativa. 1400-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Tourrettia Foug., nom. cons.

Tourrettia lappacea (L'Hér.) Willd.

Sin.: *Dombeya lappacea* L'Hér.,
Tourrettia volubilis J.F. Gmel., nom. illeg.
Enredadera. Nativa. 1000-2800 m.
Países: ARG(SAL).

Tynanthus Miers

Tynanthus cognatus (Cham.) Miers

Sin.: *Bignonia cognata* Cham.,
Schizopsis chimonantha Bureau ex Baill.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tynanthus elegans Miers

Sin.: *Bignonia elegans* Cham., hom. illeg.,
Schizopsis regnelliana Bureau ex Baill.
Liana. Nativa. 300-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tynanthus micranthus Corr. Mélló ex K. Schum.

Liana. Nativa. 100-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, CAN).

Xylophragma Sprague

Xylophragma myrianthum (Cham. ex Steud.) Sprague

Sin.: *Bignonia myriantha* Cham. ex Steud., *Saldanhaea myriantha* (Cham. ex Steud.) Bureau, *Saldanhaea myriantha* (Cham. ex Steud.) Bureau var. *pubescens* Bureau, *Tecoma myriantha* DC., nom. nud., *Xylophragma myrianthum* (Cham. ex Steud.) Sprague var. *magnolifolium* J.C. Gomes
Liana. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Xylophragma pratense (Bureau & K. Schum.) Sprague

Sin.: *Bignonia pratensis* Poepp. ex Bureau & K. Schum., *Rojasiophyton tuberculatum* Hassl., *Saldanhaea pratensis* Bureau & K. Schum., *Tecoma pratensis* Bureau & K. Schum.
Liana. Nativa. 600-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Zeyheria Mart.

Zeyheria montana Mart.

Sin.: *Bignonia digitalis* Vell., *Jacaranda quinquefolia* Steud. ex DC., *Zeyheria digitalis* (Vell.) Hoehne & Kuhlm.,

Zeyheria velloziana Miers

Arbusto o subarbusto. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau

Sin.: *Bignonia tuberculosa* Vell.,
Jacaranda tuberculosa Steud., *Zeyheria kuntzei* K. Schum.
Árbol. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

BIXACEAE

Bixa L.

Bixa orellana L.

Sin.: *Bixa americana* Poir., nom. illeg.,
Bixa urucurana Willd.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, PAI, PHA).

Cochlospermum Kunth

Cochlospermum regium (Schrank) Pilg.

Sin.: *Maximiliana regia* Schrank,
Maximiliana regia Schrank var.
glaberrima Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).

Cochlospermum tetraporum Hallier f.

Sin.: *Cochlospermum argentinensis* (Speg.) Hauman, *Cochlospermum zahlbruckneri* Osterm., *Maximiliana argentinensis* Speg., *Maximiliana tetrapora* (Hallier f.) Blake
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

BORAGINACEAE

Amsinckia Lehm.

Amsinckia calycina (Moris) Chater

Sin.: *Amsinckia angustifolia* Lehm. var. *microcarpa* Speg., *Amsinckia angustifolia* Lehm. var. *pseudolycopsioides* Clos, *Amsinckia angustifolia* Lehm., *Amsinckia basistaminea* Ces., *Amsinckia hispida* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *microcarpa* (Speg.) Brand, *Amsinckia hispida* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Amsinckia pseudolycopsioides* (Clos)

Speg., *Cryptantha spegazzinii* I.M.

Johnst., *Lithospermum calycinum* Moris, *Lithospermum chilense* Colla, *Lithospermum hispidum* Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. 0-4500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Amsinckia tessellata A. Gray

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
CHL(RME).

Anchusa L.

Anchusa officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Antiphytum DC. ex Meisn.

Antiphytum cruciatum (Cham.) DC.

Sin.: *Anchusa cruciata* Cham.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, MAL, RIV, TYT).

Asperugo L.

Asperugo procumbens L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Borago L.

Borago officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).
URY(CAS, FLA, MON).

Buglossoides Moench

Buglossoides arvensis (L.) I.M.

Johnst.
Sin.: *Lithospermum arvense* L.,
Lithospermum officinale Molino, hom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). CHL(AIS).
URY(CAS, ROC).

Cordia L.**Cordia alliodora** (Ruiz & Pav.) Oken

Sin.: *Cerdana alliodora* Ruiz & Pav.,
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken f.
albotomentosa Chodat

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CON, GUA).

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Sin.: *Cordia patagonula* Aiton,
Patagonica americana (L.) Kuntze,
Patagonula alba Rojas Acosta, nom.
nud., *Patagonula americana* L. var. *glabra*
Cham., *Patagonula americana* L. var.
hirsuta Fresen., *Patagonula americana*
L., *Patagonula australis* Salisb., nom.
superfl., *Patagonula fuscata* Rojas
Acosta, nom. nud., *Patagonula glabra*
Miers, nom. superfl., *Patagonula*
tweediana Miers

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, ÑEE,
PAI, PHA). URY(ART).

Cordia bordasii Schinini

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Cordia decandra Hook. & Arn.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cordia ecalyculata Vell.

Sin.: *Cordia leptocaula* Fresen., *Cordia*
salicifolia Cham.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN,
CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

Cordia glabrata A. DC.

Sin.: *Cordia glabrata* A. DC. var.
amambayensis Chodat, *Cordia glabrata* A.
DC. var. *longipeda* (Mez) Chodat, *Cordia*
glabrata A. DC. var. *orbicularis* Chodat
& Vischer, *Cordia longipeda* Mez, *Cordia*
longituba Chodat & Vischer

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, CON,
COA, PAI).

Cordia glaziioviana (Taub.)

Gottschling & J.S. Mill.

Sin.: *Auxemma glaziioviana* Taub.

Árbol. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY).

Cordia magnoliifolia Cham.

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cordia rufescens A. DC.

Arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Cordia saccellia Gottschling & J.S. Mill.

Sin.: *Saccellium lanceolatum* Humb.
& Bonpl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Cordia sellowiana Cham.

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Cordia silvestris Fresen.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cordia superba Cham.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cordia taguahyensis Vell.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Cordia tarodae M. Stapf

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.

Sin.: *Cordia chamissoniana* Steud.
var. *aemilii* Chodat, *Cordia frondosa*
Schott ex Spreng., *Cordia gerascanthus*
Jacq., *Cordia hassleriana* Chodat, *Cordia*
hypoleuca DC., *Cordiada trichotoma* Vell.,
Lithocardium gerascanthus (L.) Kuntze
var. *puberulum* Kuntze

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, PAI, SPE).

Cryptantha Lehm. ex G. Don**Cryptantha albida** (Kunth) I.M. Johnst.

Sin.: *Cryptantha argentinica* Brand,
Cryptantha falcata (Hieron.) I.M.

Johnst., *Eritrichium falcatum* Hieron.,
Myosotis albida Kunth

Hierba. Nativa. 300-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL).

Cryptantha alfalfalis (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium alfalfalis* Phil.,

Eritrichium rigidum Phil.

Hierba. Endémica. 700-1100 m.

Países: CHL(LBO, RME).

Cryptantha alyssoides (A. DC.) Reiche

Sin.: *Cryptantha talquina* (Phil.) Brand,
Eritrichium alyssoides A. DC., *Eritrichium*
gilliesii Phil., *Eritrichium talquinum* Phil.

Hierba. Endémica. 1000-2700 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Cryptantha aprica (Phil.) Reiche

Sin.: *Cryptantha candelabrum* Brand,

Eritrichium apricum Phil., *Eritrichium*

bridgesii Phil., *Eritrichium closii* Phil.,

Eritrichium denudatum Phil., *Eritrichium*

lignosum Phil., *Eritrichium rengifoanum* Phil.

Hierba. Endémica. 400-2400 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Cryptantha argentea I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Cryptantha aspera (Phil.) Grau

Sin.: *Eritrichium asperum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Cryptantha calycina (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium calycinum* Phil.

Hierba. Endémica. 3100-3800 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cryptantha calycotricha I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Cryptantha capituliflora (Clos) Reiche

Sin.: *Eritrichium capituliflorum* Clos,

Eritrichium cephalanthum Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,
VAL, RME).

Cryptantha chaetocalyx (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Cryptantha divaricata*

Reiche, *Eritrichium chaetocalyx*

Phil., *Eritrichium divaricatum* Phil.,

Eritrichium pustulosum Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Cryptantha chispae Grau

Sin.: *Eritrichium affine* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ).

Cryptantha circumscissa (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.

Sin.: *Cryptantha circumscissa* (Hook. & Arn.) I.M. Johnst. var. *genuina* I.M. Johnst., nom. inval., *Greeneocharis circumscissa* (Hook. & Arn.) Rydb., *Lithospermum circumscissum* Hook. & Arn.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(MEN, NEU).

Cryptantha cynoglossoides (Phil.)

I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium cynoglossoides* Phil., *Eritrichium uspallatense* Phil.
Hierba. Endémica. 700-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ).

Cryptantha dichita (Phil.) I.M.

Johnst.

Sin.: *Eritrichium dichita* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Cryptantha diffusa (Phil.) I.M.

Johnst.

Sin.: *Cryptantha borchersii* (Phil.) Hauman, *Cryptantha debilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha famatinae* Brand, *Eritrichium borchersii* Phil., *Eritrichium debile* Phil., *Eritrichium diffusum* Phil., *Eritrichium micranthum* Phil.
Hierba. Nativa. 2000-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Cryptantha dimorpha (Phil.) Greene

Sin.: *Eritrichium dimorphum* Phil.
Hierba. Endémica. 600-2000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Cryptantha diplotricha (Phil.) Reiche

Sin.: *Cryptantha axillaris* (Phil.) Reiche, *Cryptantha capituliflora* (Clos) Reiche var. *compacta* Brand, *Cryptantha diplotricha* (Phil.) Reiche var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha hossei* Brand, *Cryptantha modesta* Brand, *Eritrichium axillare* Phil., *Eritrichium diplotrichum* Phil., *Eritrichium diplotrichum* Phil. var. *humilis* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR).

Cryptantha dolichophylla (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium dolichophyllum* Phil.
Hierba. Endémica. 100-1200 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Cryptantha filaginea (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium filagineum* Phil.
Hierba. Nativa. 0-2600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cryptantha filiformis (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium filiforme* Phil., *Eritrichium mite* Phil.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(TAR, ANT, COQ).

Cryptantha gayi I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Cryptantha globulifera (Clos) Reiche

Sin.: *Cryptantha floribunda* (Phil.) Reiche, *Eritrichium carrizalense* Phil., *Eritrichium floribundum* Phil., hom. illeg., *Eritrichium glareosum* Phil., *Eritrichium globuliferum* Clos, *Eritrichium oliganthum* Phil., *Eritrichium parvulum* Phil., *Eritrichium sphaerophorum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME).

Cryptantha glomerata Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. **glomerata**

Sin.: *Cryptantha candolleana* Brand, *Cryptantha clandestina* (Trevir.) I.M. Johnst., *Cryptantha philippiana* Brand, *Eritrichium diplasianthum* Phil., *Eritrichium foliosum* Phil., *Eritrichium longisetum* Phil., *Eritrichium strictum* Phil., *Lithospermum clandestinum* Trevir.
Hierba. Endémica. 0-2800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Cryptantha glomerata Lehm.

ex Fisch. & C.A. Mey. subsp.

quadrinuculata Grau

Sin.: *Cryptantha vidali* (Phil.) Reiche, *Eritrichium vidali* Phil.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Cryptantha glomerulifera (Phil.) I.M.

Johnst.

Sin.: *Eritrichium glomeruliferum* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, RME).

Cryptantha gnaphalioides (A. DC.)

Reiche

Sin.: *Eritrichium fruticosum* Phil., *Eritrichium gnaphalioides* A. DC.
Hierba. Endémica. 0-2900 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cryptantha haplostachya (Phil.) I.M.

Johnst.

Sin.: *Eritrichium haplostachyum* Phil.
Hierba. Endémica. 200 m
Países: CHL(ATA).

Cryptantha hispida (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium hispidum* Phil.
Hierba. Endémica. 2700-3800 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Cryptantha involucrata (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium involucreatum* Phil.
Hierba. Endémica. 1300-3500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, RME).

Cryptantha kingii (Phil.) Reiche

Sin.: *Cryptantha macrocalyx* (Phil.) Reiche, *Cryptantha virens* (Phil.) Reiche, *Eritrichium kingii* Phil., *Eritrichium macrocalyx* Phil., *Eritrichium virens* Phil.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Cryptantha latefissa R.L. Pérez-Mor.

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(SJU).

Cryptantha limensis (A. DC.) I.M.

Johnst.

Sin.: *Eritrichium limense* A. DC.
Hierba. Nativa. 3800 m
Países: CHL(ANT).

Cryptantha linearis (Colla) Greene

Sin.: *Cryptantha fallax* (Phil.) Reiche, *Cryptantha gracilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha minutiflora* (Phil.) Brand, *Eritrichium fallax* Phil., *Eritrichium gracile* Phil., *Eritrichium lineare* (Colla) DC., *Eritrichium minutiflorum* Phil., *Myosotis linearis* Colla
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Cryptantha longifolia (Phil.) Reiche

Sin.: *Eritrichium longifolium* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Cryptantha mariorcardiana Teillier
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA).

Cryptantha maritima Greene var.
pilosa I.M. Johnst.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(MEN, SJU).

Cryptantha marticorenae Grau
Hierba. Endémica. 300-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Cryptantha mendocina I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(LPA, MEN, SLU).

Cryptantha papillosa R.L. Pérez-Mor.
Hierba. Endémica. 2200-2300 m.
Países: ARG(NEU).

Cryptantha patagonica (Speg.) I.M. Johnst.
Sin.: *Amsinckia patagonica* Speg.,
Cynoglossospermum humile (Ruiz & Pav.)
Kuntze, *Eritrichium diffusum* Speg., hom.
illeg., *Eritrichium parvulum* Macloskie,
hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, SJU).

Cryptantha phaceloides (Clos) Reiche
Sin.: *Eritrichium phaceloides* Clos
Hierba. Endémica. 3300 m
Países: CHL(ANT, ATA).

Cryptantha romanii I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 500 m
Países: CHL(ANT, ATA).

Cryptantha spathulata (Phil.) Reiche
Sin.: *Eritrichium spathulatum* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO).

Cryptantha subamplexicaulis (Phil.)
Reiche
Sin.: *Eritrichium subamplexicaule* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Cryptantha taltalensis I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cryptantha volckmannii (Phil.) I.M.
Johnst.
Sin.: *Cryptantha chrysantha* (Phil.)
Reiche, *Eritrichium chrysanthum* Phil.,
Eritrichium volckmannii Phil.
Hierba. Endémica. 600-2900 m.
Países: CHL(COQ).

Cryptantha werdermanniana I.M.
Johnst.
Hierba. Endémica. 2300 m
Países: CHL(ANT).

Cynoglossum L.

Cynoglossum amabile Stapf & J.R.
Drumm.
Hierba. Introducida. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
TUC). BRA(PAR).

Cynoglossum creticum Mill.
Sin.: *Cynoglossum molle* Phil.,
Cynoglossum officinale Hauman, hom.
illeg., *Cynoglossum pictum* Sol.
Hierba. Introducida. 500-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,
RNE, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

Cynoglossum zeylanicum Thunb. ex
Lehm.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(MAU, ARA, LLA).

Echium L.

Echium plantagineum L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,
ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, SAL, SLU,
SFE, TDF, TUC). BRA(PAR). CHL(LBO,
MAU, BIO, ARA). URY(ART, MON).

Echium vulgare L. var. **vulgare**
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, MAG, RME).

Echium vulgare L. var. **wierzbickii**
(Haberle) Coste
Sin.: *Echium wierzbickii* Haberle
Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU).

Ehretia P. Browne

Ehretia cortesia Gottschling
Sin.: *Cortesia cuneata* Hauman, hom.
illeg., *Cortesia cuneifolia* Cav., *Cortesia*
microphylla Miens
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(COR, LRI, MEN, SDE,
SFE, SJU, SLU).

Euploca Nutt.

Euploca aurata (Phil.) M.W. Frohl.
Sin.: *Heliotropium auratum* Phil.
Hierba. Endémica. 800-3800 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL,
SJU, TUC).

Euploca campestris (Griseb.) Diane &
Hilger
Sin.: *Heliotropium andinum* Rusby,
Heliotropium campestre Griseb.
Hierba. Nativa. 400-2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR,
JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE,
TUC). PRY(APY, AMA, BOQ).

Euploca catamarcense (I.M. Johnst.)
M.W. Frohl.
Sin.: *Heliotropium catamarcense* I.M.
Johnst.
Hierba. Endémica. 500-800 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Euploca cerroleonensis (R. Degen))
R. Degen
Sin.: *Heliotropium cerroleonense* R. Degen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Euploca chrysantha (Phil.) Diane &
Hilger
Sin.: *Heliotropium chrysanthum* Phil.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, LPA, LRI, MEN,
NEU, RNE, SAL, SJU).

Euploca distantiflora (I.M. Johnst.)
J.I. M. Melo & R. Degen
Sin.: *Heliotropium distantiflorum* I.M.
Johnst.
Hierba. Endémica.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, PAI).

Euploca dunaensis (R. Degen)) R.
Degen
Sin.: *Heliotropium dunaense* R. Degen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Euploca filiformis (Lehm.) J.I. M.
Melo & Semir
Sin.: *Heliotropium filiforme* Lehm.,
Heliotropium tenue Roem. & Schult.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera
del área del proyecto). PRY(AMA, CAN,
PAI). URY(ART).

Euploca fruticosa (L.) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium fruticosum* L.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(SAL).

Euploca hassleriana (Chodat) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium hasslerianum* Chodat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, SAL). PRY(CAU, PHA).

Euploca krapovickasii J.I. M. Melo & Semir

Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Euploca margaritensis (I.M. Johnst.) J.I. M. Melo & R. Degen

Sin.: *Heliotropium margaritense* Hassl.
ex I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Euploca mendocina (Phil.) Diane & Hilger

Sin.: *Heliotropium mendocinum* Phil.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE, TUC).

Euploca ocellata (Cham.) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium ocellatum* Cham.,
Schleidenia ocellata (Cham.) Fresen.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(SPE). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

Euploca pallescens (I.M. Johnst.) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium pallescens* I.M. Johnst.
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger

Sin.: *Heliotropium inundatum* Sw. f. *elliptica* Chodat, *Heliotropium inundatum* Sw. f. *pusilla* Hassl., *Heliotropium inundatum* Sw. var. *chacoense* R.E. Fr., *Heliotropium inundatum* Sw., *Heliotropium procumbens* Mill., *Heliotropium riparium* Mart. ex Colla
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(SOR).

Euploca salicoides (Cham.) J.I. M. Melo & Semir

Sin.: *Heliotropium clauseni* A.DC. f. *robustior* Chodat, *Heliotropium clauseni* A.DC., *Heliotropium hispidum* Kunth var. *maximum* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Heliotropium maximum* Chodat & Hassl., *Heliotropium salicoides* Cham., *Schleidenia salicoides* (Cham.) Fresen.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

Hackelia Opiz**Hackelia revoluta** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Sin.: *Cynoglossum ovatifolium* Griseb., *Cynoglossum revolutum* Ruiz & Pav., *Lappula revoluta* (Ruiz & Pav.) Brand, *Lappula revoluta* (Ruiz & Pav.) Brand f. *fibrigii* (Krause) Brand, *Lappula revoluta* (Ruiz & Pav.) Brand f. *ovatifolia* (Griseb.) Brand
Hierba. Nativa. 1500-3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Heliotropium L.**Heliotropium abbreviatum** Rusby

Hierba. Nativa. 2600-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Heliotropium amplexicaule Vahl

Sin.: *Cochranea anchusaefolia* (Poir.) Gürke var. *latifolia* (DC.) Hicken, *Cochranea anchusaefolia* (Poir.) Gürke, *Cochranea anchusifolia* (Poir.) Gürke var. *latifolia* (DC.) Hicken, *Heliohytum anchusifolium* (Poir.) DC. var. *angustifolium* DC., *Heliotropium anchusifolium* Poir. f. *grandiflorum* Kuntze, *Heliotropium anchusifolium* Poir. f. *medium* Kuntze, *Heliotropium anchusifolium* Poir. f. *parviflorum* Kuntze, *Heliotropium anchusifolium* Poir. var. *lithospermifolium* (DC.) Griseb., *Heliotropium anchusifolium* Poir., *Heliotropium lithospermifolium* (DC.) Speg.
Hierba o subarbusto. Nativa. 100-1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(RME). URY(CAS, MON, SOR, TAC).

Heliotropium angiospermum Murray

Sin.: *Heliotropium parviflorum* L., *Heliotropium simplex* Meyen
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). CHL(TAR). PRY(COA).

Heliotropium chenopodiaceum (A. DC.) Clos var. **chenopodiaceum**

Sin.: *Cochranea chenopodiacea* (A. DC.) Miers, *Heliohytum chenopodiaceum* A. DC.
Arbusto. Endémica. 200-1700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Heliotropium chenopodiaceum (A. DC.) Clos var. **ericoideum** (Miers) Reiche

Sin.: *Cochlearia ericoidea* Miers, *Eritrichium glabratum* Phil., *Heliotropium pearcei* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-2300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Heliotropium curassavicum L. var. **argentinum** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, PHA). URY(MAL, MON).

Heliotropium curassavicum L. var. **curassavicum**

Sin.: *Heliotropium curassavicum* L. var. *genuinum* I.M. Johnst., nom. inval., *Heliotropium curassavicum* L. var. *parviflorum* Ball
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, FOR, LRI, RNE, SAL, SLU, SDE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME). PRY(APY, PHA).

Heliotropium curassavicum L. var. **fruticosum** I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémica. 400-2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Heliotropium elongatum Hoffm. ex Roem. & Schult.

Sin.: *Heliotropium elongatum* Hoffm. ex Roem. & Schult. var. *genuinum* I.M. Johnst., nom. inval.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA).

Heliotropium eremogenum I.M. Johnst.
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Heliotropium filifolium (Miers) I.M. Johnst.
Sin.: *Cochranea filifolia* Miers, *Cochranea kingi* Phil., *Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *filifolium* (Miers) Reiche, *Heliotropium kingi* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ATA).

Heliotropium floridum (A. DC.) Clos
Sin.: *Cochranea florida* (A. DC.) Miers, *Heliophytum floridum* A.DC., *Heliotropium floridum* (A. DC.) Clos var. *latifolium* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Heliotropium geissei F. Phil. ex Phil.
Hierba. Endémica. 1000-1200 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, RME).

Heliotropium glutinosum Phil.
Sin.: *Cochranea glutinosa* (Phil.) Phil.
Arbusto. Endémica. 1100-1500 m.
Países: CHL(ATA).

Heliotropium huascoense I.M. Johnst.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Heliotropium inconspicuum Reiche
Sin.: *Cochranea parviflora* Phil.
Arbusto. Endémica. 1000-1200 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Heliotropium indicum L.
Sin.: *Heliophytum indicum* (L.) DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, MIE, ÑEE, PHA).

Heliotropium jaffuelii I.M. Johnst.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Heliotropium johnstonii Ragonese
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SDE, SJU).

Heliotropium krauseanum Fedde
Arbusto. Nativa. 700 m
Países: CHL(TAR).

Heliotropium kurtzii Gangui
Hierba. Endémica.
Países: ARG(MEN, NEU).

Heliotropium leiocarpum Morong
Sin.: *Heliotropium leiocarpum* Morong f. *albiflora* Chodat, *Heliotropium leiocarpum* Morong f. *minor* Chodat
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Heliotropium lilloi (I.M. Johnst.) J.I. M. Melo
Sin.: *Tournefortia lilloi* I.M. Johnst., *Tournefortia undulata* Griseb., hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 500-1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Heliotropium linariifolium Phil.
Sin.: *Heliotropium linearifolium* F. Phil., *Heliotropium longiflorum* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Heliotropium longistylum Phil.
Sin.: *Cochranea longistyla* (Phil.) Phil., *Heliotropium vernicosum* Phil.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Heliotropium megalanthum I.M. Johnst.
Sin.: *Cochranea corymbosa* Miers, *Cochranea crassifolia* (Phil.) Phil., *Heliotropium corymbosum* (Miers) Reiche, *Heliotropium crassifolium* Phil.
Hierba o arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Heliotropium microstachyum Ruiz & Pav.
Sin.: *Coldenia phaenocarpa* Phil., *Heliophytum brachystachyum* DC., *Heliotropium brachystachyum* (DC.) Griseb.
Hierba. Nativa. 2000-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SFE, SJU, TUC).

Heliotropium myosotifolium (A. DC.) Reiche
Sin.: *Cochranea hebecula* Miers, *Cochranea hispidula* Miers, *Cochranea myosotifolia* (A. DC.) Miers, *Cochranea sentis* Phil., *Heliophytum stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *myosotifolium* A.DC., *Heliotropium canum* Phil., *Heliotropium hispidulum* (Miers) Reiche, *Heliotropium hispidulum* Phil., *Heliotropium stenophyllum* Hook. & Arn.

var. *myosotifolium* (A. DC.) Clos
Arbusto. Endémica. 0-2400 m.
Países: CHL(TAR, ATA).

Heliotropium nicotianaefolium Poir.
Sin.: *Heliotropium sidaefolium* Cham., *Tournefortia heliotropioides* Hook.
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(COA, PAI). URY(COL, PAY, RNO, SJO, SOR).

Heliotropium paronychioides A. DC.
Hierba. Endémica. 100-4000 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Heliotropium patagonicum (Speg.) I.M. Johnst.
Sin.: *Valentina patagonica* Speg., *Valentiniella patagonica* (Speg.) Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Heliotropium philippianum I.M. Johnst.
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Heliotropium phylicoides Cham.
Sin.: *Heliophytum phylicoides* (Cham.) DC., *Heliotropium phylicoides* Cham. f. *luciliaefolium* Arechav.
Subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(COL, LAV, SAO).

Heliotropium pinnatisectum R.L. Pérez-Mor.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU).

Heliotropium pycnophyllum Phil.
Sin.: *Cochranea pycnophylla* (Phil.) Phil. ex Reiche, *Heliotropium breanum* Phil., *Heliotropium brevifolium* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Heliotropium ruiz-lealii I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 1000 m
Países: ARG(SJU).

Heliotropium schreiteri I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SJU, SDE). PRY(APY, PHA).

Heliotropium sclerocarpum Phil.

Sin.: *Cochranea sclerocarpa* Phil.,
Heliotropium chenopodiaceum (A. DC.)
Clos var. *sclerocarpa* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ATA).

Heliotropium sinuatum (Miers) I.M. Johnst.

Sin.: *Cochranea sinuata* Miers,
Heliotropium izagae Phil., *Heliotropium*
rosmarinifolium Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Heliotropium stenophyllum Hook. & Arn.

Sin.: *Cochranea conferta* Miers,
nom. nud., *Cochranea congesta* Miers,
Cochranea stenophylla (Hook. & Arn.)
Miers, *Heliophytum stenophyllum*
(Hook. & Arn.) A. DC., *Heliotropium*
rosmarinifolium Bertero ex A. DC.,
Heliotropium rosmarinifolium Bertero
ex Steud., nom. nud., *Heliotropium*
stenophyllum (Hook. & Arn.) A. DC. var.
rosmarinifolium (Bertero ex A. DC.) Clos,
Meladendron chilense Molina
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Heliotropium taltalense (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Cochranea rugosa* (Phil.) Phil.,
Cochranea taltalensis Phil., *Heliotropium*
rugosum Phil.
Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Heliotropium tiaridioides Cham.

Sin.: *Heliotropium monostachyum*
Cham. var. *tiaridioides* (Cham.) Chodat,
Heliotropium transalpinum Vell. var.
tiaridioides (Cham.) I.M. Johnst.,
Heliotropium tiaridioides Cham. var.
genuina I.M. Johnst., nom. inval.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA,
CEN, ITA).

Heliotropium transalpinum Vell. var. **arcanum** Di Fulvio & Ariza

Arbusto. Nativa. 300-800 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL).

Heliotropium transalpinum Vell. var. **transalpinum**

Sin.: *Heliotropium monostachyum*
Cham., *Heliotropium tiaridioides* Cham.

var. *schizocarpum* I.M. Johnst.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI).
URY(ART, SAO).

Heliotropium veronicifolium Griseb.

Sin.: *Heliotropium repens* Griseb.,
Heliotropium repens Griseb. var. *medium*
Kuntze, *Heliotropium repens* Griseb.
var. *stenophyllum* Kuntze, *Heliotropium*
salsum Griseb.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR,
FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC).
PRY(APY, CON).

Ixorhea Fenzl**Ixorhea tschudiana** Fenzl

Sin.: *Oxyosmyles viscosissima* Speg.
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(SAL, TUC).

Johnstonella Brand**Johnstonella parviflora** (Phil.)

Hasenstab & M.G. Simpson
Sin.: *Cryptantha microphylla* (Phil.)
Reiche, *Cryptantha parviflora* (Phil.)
Reiche, *Eritrichium microphyllum* Phil.,
Eritrichium parviflorum Phil.
Hierba. Nativa. 0-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Lappula Moench**Lappula redowskii** (Hornem.) Greene

Sin.: *Echinosperrum patagonicum*
Speg., *Echinosperrum redowskii*
(Hornem.) Lehm., *Lappula inconspicua*
Brand, *Lappula patagonica* (Speg.)
Macloskie & Dusén, *Lappula redowskii*
(Hornem.) Greene var. *desertorum*
(Greene) I.M. Johnst., *Lappula redowskii*
(Hornem.) Greene var. *eu-redowskii*
Brand, *Lappula redowskii* (Hornem.)
Greene var. *occidentalis* (S. Watson)
Rydb., *Lappula texana* (Scheele) Britton,
Myosotis redowskii Hornem.
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN,
NEU, RNE, SCR, SJU, SLU). CHL(MAG).

Lithospermum L.**Lithospermum officinale** L.

Hierba. Introducida. 800-800 m.
Países: ARG(NEU).

Lycopsis L.**Lycopsis arvensis** L.

Sin.: *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb.
Hierba. Introducida. 500-1500 m.
Países: ARG(COR, LPA, MEN, NEU,
RNE, SLU).

Moritzia DC. ex Meisn.**Moritzia ciliata** (Cham.) DC. ex Meisn.

Sin.: *Anchusa ciliata* Cham.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Moritzia dusenii I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 900 m
Países: BRA(PAR, SCA).

Myosotis L.**Myosotis albiflora** Banks & Sol. ex Hook. f.

Sin.: *Eritrichium albiflorum* Griseb.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Myosotis antarctica Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(MAG).

Myosotis arvensis (L.) Hill

Sin.: *Myosotis scorpioides* L. var.
arvensis L.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, TDF,
TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, MAG, RME, JFE).

Myosotis azorica H.C. Watson ex Hook.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,
RNE). CHL(LLA).

Myosotis discolor Pers. subsp.

canariensis (Pit.) Grau
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(AIS, MAG).

Myosotis discolor Pers. subsp. **discolor**

Sin.: *Myosotis versicolor* (Pers.) Sm.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(TAR, MAU, ARA, LRI, MAG).

Myosotis latifolia Poir.

Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, LRI, LLA, AIS, JFE). URY(MON).

Myosotis laxa Lehm.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE). BRA(PAR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE).

Myosotis ramosissima Rochel

Hierba. Introducida.
Países: CHL(MAG).

Myosotis scorpioides L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.

Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(JFE).

Myosotis verna Nutt.

Sin.: *Eritrichium pampeanum* Speg., *Myosotis virginica* (L.) Britton, Stern & Poggenb.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR, TDF).

Myriopus Small**Myriopus breviflorus** (DC.) Luebert

Sin.: *Tournefortia breviflora* DC.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, PAI). URY(ROC).

Myriopus paniculatus (Cham.)

Feuille
Sin.: *Tournefortia elegans* Cham., *Tournefortia paniculata* Cham., hom. illeg., *Tournefortia paniculata* Cham. var. *austrina* I.M. Johnst.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, SPE). URY(SAO).

Myriopus rubicundus (Salzm. ex DC.)

Luebert
Sin.: *Tournefortia rubicunda* Salzm. ex DC.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Myriopus salzmännii (DC.) Diane & Hilger

Sin.: *Tournefortia salzmännii* DC., *Tournefortia salzmännii* DC. var. *blanchetiana* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Myriopus villosus (Salzm. ex DC.) J.I. M. Melo

Sin.: *Tournefortia villosa* Salzm. ex DC.
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, TUC). BRA(PAR, SCA).

Nama L., nom. cons.**Nama dichotomum** (Ruiz & Pav.) Choisy

Sin.: *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy f. *amplifolia* Brand, *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy var. *amplifolia* (Brand) C.L. Hitchc., *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy f. *stricta* (Phil.) Brand, *Nama stricta* Phil., *Hydrolea dichotoma* Ruiz & Pav., *Marilaunidium dichotomum* (Ruiz & Pav.) Kuntze
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, RME).

Nama jamaicensis L.

Sin.: *Marilaunidium jamaicense* (L.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC).

Nama undulatum Kunth var. **australe** C.L. Hitchc.

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU). CHL(ATA).

Nama undulatum Kunth var. **undulatum**

Sin.: *Conanthes echioides* (Griseb.) Kuntze, *Nama echioides* Griseb., *Nama echioides* Griseb. var. *hispida* Griseb., *Marilaunidium undulatum* (Kunth) Kuntze, *Nama undulatum* Kunth var. *hispidum* (Griseb.) Brand
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Nesocaryum I.M. Johnst.**Nesocaryum stylosum** (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Heliotropium stylosum* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(IDE).

Omphalodes Mill.**Omphalodes linifolia** (L.) Moench

Sin.: *Cynoglossum linifolium* L.
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(ARA).

Pectocarya DC. ex Meisn.**Pectocarya anomala** I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 2300-2600 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Pectocarya boliviana (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *boliviana* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Pectocarya dimorpha (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *dimorpha* I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Cynoglossum lineare* Ruiz & Pav., *Pectocarya chilensis* DC., *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *genuina* I.M. Johnst., nom. inval., *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Pectocarya lateriflora* (Lam.) DC., *Pectocarya linearis* (Ruiz & Pav.) DC. var. *ferocula* I.M. Johnst.
Hierba. Introducida. 500-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, AIS, RME).

Pectocarya pusilla (A. DC.) A. GraySin.: *Gruvelia pusilla* A. DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(VAL, LBO).

Phacelia Juss.**Phacelia artemisioides** Griseb.Sin.: *Phacelia glandulosa* Nutt. var. *patagonica* Ball

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(MAL, MON, SJO).

Phacelia brachyantha Benth.Sin.: *Phacelia brachyantha* Benth. var. *paniculata* A. DC., *Phacelia clinopodioides* Bertero, *Phacelia simplicifolia* Colla, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAG, RME).

Phacelia cumingii (Benth.) A. GraySin.: *Eutoca cumingii* Benth., *Eutoca frigida* Phil., *Eutoca grandis* Phil., *Eutoca litoralis* Phil., *Eutoca peraltae* Phil., *Eutoca pinnatifida* Phil., *Eutoca pusilla* Phil., *Microgenetes cumingii* (Benth.) A. DC., *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *frigida* (Phil.) Brand, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *grandis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *pusilla* (Phil.) Reiche, *Phacelia frigida* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 3200-3800 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Phacelia nana Wedd.Sin.: *Eutoca lomarifolia* Phil.

Hierba. Nativa. 3500-4700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT).

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd.Sin.: *Phacelia boliviana* Brand, *Phacelia foliosa* Phil., *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *decumbens* Brand, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *elatior* Griseb., *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *foliosa* (Phil.) Reiche, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *lobulata*Hicken, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *robusta* Wedd., *Phacelia viscosa* Phil.

Hierba. Nativa. 1000-4600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, NEU, SAL, SCR, SDE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Phacelia sanzinii Hicken

Hierba. Endémica. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Phacelia secunda J.F. Gmel. var.**pinnata** (Vahl) DeginaniSin.: *Aldea pinnata* Ruiz & Pav., *Heliotropium pinnatum* Vahl, nom. illeg., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *amoena* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *pinnata* (Vahl) Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *robusta* Brand, *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. var. *robusta* (Brand) J.F. Macbr., *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *pinnata* (Ruiz & Pav.) Constance

Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TUC). CHL(MAU, MAG).

Phacelia secunda J.F. Gmel. var.**secunda**Sin.: *Aldea circinata* Willd., nom. superfl., *Hydrophyllum magellanicum* Lam., *Phacelia circinata* J. Jacq., nom. illeg. var. *acutiloba* A. DC., *Phacelia circinata* J. Jacq., nom. illeg. var. *obtusiloba* A. DC., *Phacelia circinata* J. Jacq., nom. illeg. var. *paniculata* A. DC., *Phacelia circinata* J. Jacq., nom. illeg., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *andina* Phil. ex Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *genuina* Brand, nom. inval., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *plantaginea* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville, *Phacelia parviflora* Phil., hom. illeg., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *parviflora* (Phil.) Constance, *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *plantaginea* (Brand) Constance

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Phacelia setigera Phil. var.**humahuauense** DeginaniSin.: *Phacelia pinnatifida* Griseb. exWedd. f. *minor* Hicken

Hierba. Endémica. 4000-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Phacelia setigera Phil. var. **setigera**Sin.: *Phacelia pinnatifida* Griseb. exWedd. var. *setigera* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 4000-4800 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SDE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Phacelia sinuata Phil.

Hierba. Endémica. 1000-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT, COQ).

Plagiobothrys Fisch. & C.A. Mey.**Plagiobothrys armeriifolius** (Phil.)

I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium armeriifolius* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO).

Plagiobothrys calandrinoides (Phil.)

I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya alternifolia* Brand, *Allocarya humilis* Brand, p.p., *Eritrichium albiflorus* Griseb., *Eritrichium calandrinoides* Phil., *Eritrichium humile* Macloskie, hom. illeg., *Eritrichium nubigenum* Phil. ex F. Meigen, *Plagiobothrys albiflorus* (Griseb.) R.L. Pérez-Mor. ex D.M. Moore, *Plagiobothrys lechleri* I.M. Johnst., *Plagiobothrys procumbens* Macloskie, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, MAG, RME).

Plagiobothrys collinus (Phil.) I.M.

Johnst.

Sin.: *Cryptantha collina* (Phil.) Reiche, *Cryptantha inconspicua* (Phil.) Reiche, *Eritrichium collinum* Phil., *Eritrichium inconspicuum* Phil.

Hierba. Endémica. 100-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Plagiobothrys congestus (Wedd.)

I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium humile* (Ruiz & Pav.) DC. var. *congestum* Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC).

Plagiobothrys corymbosus (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya corymbosa* (Ruiz & Pav.) Brand, *Allocarya sessiliflora* (DC.) Greene var. *nubigena* Phil. ex Reiche, *Allocarya sessiliflora* (DC.) Greene, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene var. *pulchella* (Phil.) Reiche, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene, *Cryptantha corymbosa* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Eritrichium humile* (Ruiz & Pav.) DC. var. *capillatum* Clos, *Eritrichium sessiliflorum* DC., *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil. var. *pulchellum* Phil., *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil., *Myosotis corymbosa* Ruiz & Pav., *Plagiobothrys tenuifolius* (Schlecht. ex Phil.) I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Plagiobothrys foliosus I.M. Johnst.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA).

Plagiobothrys fulvus (Hook. & Arn.)

I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya muricata* (Ruiz & Pav.) Reiche, *Eritrichium asperum* Phil., hom. illeg., *Eritrichium fulvum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *pinguis* Phil., *Eritrichium fulvum* (Hook. & Arn.) A. DC., *Eritrichium laxiflorum* Phil., *Lithospermum muricatum* Ruiz & Pav., *Myosotis fulva* Hook. & Arn., *Plagiobothrys muricatus* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Plagiobothrys rufescens* Fisch. & C.A. Mey., *Plagiobothrys rufescens* Fisch. & C.A. Mey. var. *laxiflorus* (Phil.) Reiche

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Plagiobothrys germainii (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya germainii* (Phil.) Reiche, *Eritrichium germainii* Phil.
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Plagiobothrys gracilis (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Sin.: *Echinosperrum gracile* (Ruiz & Pav.) Lehm., *Myosotis gracilis* Ruiz & Pav., *Rochelia gracilis* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, MAG, RME).

Plagiobothrys humilis (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium humile* (Ruiz & Pav.) DC., *Myosotis humilis* Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(TUC).

Plagiobothrys myosotoides (Lehm.) Brand

Sin.: *Eritrichium pugae* Phil., *Eritrichium tinctorium* A. DC., *Lithospermum myosotoides* Lehm., *Plagiobothrys tinctorius* (Ruiz & Pav.) A. Gray
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Plagiobothrys oppositifolius (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium cinereum* Phil., *Eritrichium limonium* Phil., *Eritrichium oppositifolius* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ARA).

Plagiobothrys pedicellaris (Phil.)

I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya capitata* (Clos) Brand var. *longipes* (Phil. ex Reiche) Brand, *Allocarya pedicellaris* (Phil.) Reiche, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene var. *longipes* Phil. ex Reiche, *Eritrichium pedicellare* Phil., *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil. var. *longipes* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA).

Plagiobothrys polycaulis (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium bracteatum* Phil., *Eritrichium delicatulum* Phil., *Eritrichium flavicans* Phil., *Eritrichium graminifolium* Phil., *Eritrichium polycaulis* Phil., *Eritrichium vernum* Phil., *Plagiobothrys graminifolius*
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Plagiobothrys pratensis (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium pratense* Phil.
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Plagiobothrys procumbens (Colla) A. Gray

Sin.: *Allocarya procumbens* (Colla) Greene, *Eritrichium illapelinum* Phil.,

Eritrichium tenuicaule Phil., *Myosotis procumbens* Colla

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Plagiobothrys pulchellus (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium pulchellum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Plagiobothrys uliginosus (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Allocarya uliginosa* (Phil.) Greene, *Eritrichium uliginosum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Plagiobothrys verrucosus (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Eritrichium verrucosum* Phil., *Plagiobothrys myosotoides* (Lehm.) Brand var. *patagonicus* (I.M. Johnst.) Brand, *Plagiobothrys patagonicus* I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
CHL(VAL, LBO, MAU, LLA, AIS, RME).

Selkirkia Hemsl.

Selkirkia berteroi (Colla) Hemsl.

Sin.: *Cynoglossum berteroi* Colla
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(JFE).

Selkirkia limense (Willd.) Holstein & Weigend

Sin.: *Cynoglossum alatum* Molina, nom. superfl., *Cynoglossum decurrens* Ruiz & Pav., *Cynoglossum limense* Willd.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Selkirkia pauciflora (Ruiz & Pav.) Holstein & Weigend

Sin.: *Cynoglossum azocarti*, *Cynoglossum paniculatum* Hook. & Arn. f. *philippianum* Brand, *Cynoglossum paniculatum* Hook. & Arn. var. *azocartii* (Phil.) Reiche, *Cynoglossum paniculatum* Hook. & Arn., *Cynoglossum pauciflorum* Ruiz & Pav.
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Symphytum L.

Symphytum officinale L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Thaumatocaryon Baill.

Thaumatocaryon dasyanthum

(Cham.) I.M. Johnst.

Sin.: *Anchusa dasyantha* Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Thaumatocaryon tetraquetrum

(Cham.) I.M. Johnst.

Sin.: *Anchusa tetraquetra* Cham.,

Moritzia tetraquetra (Cham.) Brand

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).
PRY(APA).

Tiquilia Pers.

Tiquilia atacamensis (Phil.) A.T.

Richardson

Sin.: *Coldenia atacamensis* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Tiquilia grandiflora (Phil.) A.T.

Richardson

Sin.: *Coldenia grandiflora* Phil.

Subarbusto. Nativa. 1400 m

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Tiquilia litoralis (Phil.) A.T.

Richardson

Sin.: *Coldenia littoralis* Phil.

Subarbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Tiquilia nuttallii (Hook.) A.T.

Richardson

Sin.: *Coldenia decumbens* Hauman,

Coldenia nuttallii Hook., *Tiquiliopsis nuttallii* (Hook.) A. Heller

Hierba. Nativa. 700-3000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

Tiquilia paronychioides (Phil.) A.T.

Richardson

Sin.: *Coldenia paronychioides* Phil.

Subarbusto. Nativa. 0-3300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Tiquilia tacnensis A.T. Richardson

Subarbusto. Nativa. 1900-2000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Tournefortia L.

Tournefortia bicolor Sw.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAN).

Tournefortia gardneri A. DC.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Tournefortia membranacea DC.

Arbusto a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(RGS, SCA).

Tournefortia salicifolia DC.

Arbusto a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Varronia P. Browne

Varronia axillaris (I.M. Johnst.)

Borhidi

Sin.: *Cordia axillaris* I.M. Johnst.

Arbusto. Nativa. 200-300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Varronia curassavica Jacq.

Sin.: *Cordia chacoensis* Chodat, *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. & Schult., *Cordia salicina* DC., *Cordia verbenacea* DC.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, MIE). URY(MAL, ROC).

Varronia dichotoma Ruiz & Pav.

Sin.: *Cordia bifurcata* Roem. & Schult., *Cordia corymbosa* (L.) G. Don f. *detonsa* I.M. Johnst., nom. inval.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(COL, RNO, SJO, TAC).

Varronia guaranitica (Chodat &

Hassl.) J.S. Mill.

Sin.: *Cordia guaranitica* Chodat & Hassl., *Cordia guaranitica* Chodat & Hassl. var. *foliosa* Chodat & Hassl., *Cordia guaranitica* Chodat & Hassl. var. *pedunculosa* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, SAL). PRY(CAA, COA, PAI).

Varronia guazumifolia Desv.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Varronia paucidentata (Fresen.)

Friesen

Sin.: *Cordia paucidentata* Fresen. var. *subulata* Chodat & Hassl., *Cordia paucidentata* Fresen. var. *valenzuelensis*

Chodat, *Cordia paucidentata* Fresen., *Cordia uruguayana* Arechav.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, MIE). URY(ART, SAO).

Varronia polycephala Lam.

Sin.: *Cordia monosperma* (Jacq.) Roem. & Schult., *Cordia discolor* Cham., *Cordia hermannifolia* Cham., *Cordia ulmifolia* (Juss.) DC., *Cordia polycephala* (Lam.) I.M. Johnst.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, PAI).

Varronia sessilifolia (Cham.) Borhidi

Sin.: *Cordia sessilifolia* Cham.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Varronia urticifolia (Cham.) J.S. Mill.

Sin.: *Cordia urticifolia* Cham.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Varronia villicaulis (Fresen.) Borhidi

Sin.: *Cordia caaguazuensis* Chodat, *Cordia sessilifolia* Cham. var. *tomentosa* (Chodat & Hassl.) I.M. Johnst., *Cordia villicaulis* Fresen., *Cordia villicaulis*

Fresen. var. *tomentosa* Chodat & Hassl.

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAU, COA).

BRASSICACEAE

Aimara Salariato & Al-Shehbaz

Aimara rollinsii (Al-Shehbaz &

Martic.) Salariato & Al-Shehbaz

Sin.: *Menonvillea rollinsii* Al-Shehbaz & Martic.

Subarbusto. Endémica. 2600-3400 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Alliaria Heist. ex Fabr.

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

Sin.: *Alliaria officinalis* Andrz. ex M. Bieb., hom. illeg., *Arabis petiolata* M. Bieb., *Erysimum alliaria* L., *Sisymbrium alliaria* (L.) Scop.

Hierba. Introducida. 400-800 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

Alshehbazia Salariato & Zuloaga**Alshehbazia friesii** (O.E. Schulz)

Salariato, Zuloaga & Al-Shehbaz

Sin.: *Eudema friesii* O.E. Schulz,
Petroravenia friesii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Hierba. Nativa. 4500-5000 m.

Países: ARG (SAL). CHL (AYP, TAR, ANT).

Alshehbazia hauthalii (Gilg &

Muschl.) Salariato & Zuloaga

Sin.: *Brayopsis hauthalii* (Gilg & Muschl.) Skottsbg., *Brayopsis skottsbergii* Gilg ex Skottsbg., *Eudema hauthalii* Gilg & Muschl., *Onuris hauthalii* (Gilg & Muschl.) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 300-4000 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Alshehbazia werdermannii (O.E.

Schulz) Salariato, Zuloaga & Al-Shehbaz

Sin.: *Eudema werdermannii* O.E. Schulz, *Petroravenia werdermannii* (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Hierba. Nativa. 3800-4700 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(ATA).

Alyssum L.**Alyssum alyssoides** (L.) L.Sin.: *Clypeola alyssoides* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, MAG).

Arabidopsis (DC.) Heynh., nom. cons.**Arabidopsis thaliana** (L.) Heynh.Sin.: *Arabis thaliana* L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(SCR). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS). URY(MON).

Aschersoniodoxa Gilg & Muschl.**Aschersoniodoxa cachensis** (Speg.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Braya cachensis* Speg.

Hierba. Nativa. 4000-5100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Atacama O. Toro, Mort & Al-Shehbaz**Atacama nivea** (Phil.) O. Toro, Mort & Al-ShehbazSin.: *Mathewsia nivea* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium niveum* Phil.

Hierba o subar busto. Endémica. 2500-3500 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Barbarea W.T. Aiton, nom. cons.**Barbarea verna** (Mill.) Asch.Sin.: *Barbarea praecox* R. Br., *Erysimum vernum* Mill.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Barbarea vulgaris W.T. AitonSin.: *Erysimum barbarea* L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Brassica L.**Brassica juncea** (L.) Czern.Sin.: *Sinapis juncea* L.

Hierba. Introducida. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS, SAL, SJU). BRA(PAR). PRY(APY).

Brassica napus L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(ERI, JUJ). CHL(ATA, COQ, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE).

Brassica nigra (L.) W.D.J. KochSin.: *Sinapis nigra* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, RNE, SAL, SJU, SFE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME, JFE).

Brassica oleracea L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(LLA, MAG, JFE, IPA).

Brassica rapa L.Sin.: *Brassica campestris* L.

Hierba. Introducida. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(APY). URY(MON).

Brassica tournefortii Gouan

Hierba. Introducida.

Países: CHL(VAL).

Brayopsis Gilg & Muschl.**Brayopsis calycina** (Desv.) Gilg & Muschl.Sin.: *Braya calycina* (Desv.) Wedd., *Brayopsis alpaminae* Gilg & Muschl. var. *argentea* (Gilg & Muschl.) O.E. Schulz, *Brayopsis argentea* Gilg & Muschl., *Brayopsis calycina* (Desv.) Gilg & Muschl. var. *filiformis* O.E. Schulz, *Brayopsis weberbaueri* Gilg & Muschl., *Draba calycina* Desv., *Englerocharis alpaminae* (Gilg & Muschl.) Baehni & J.F. Macbr. var. *argentea* (Gilg & Muschl.) Baehni & J.F. Macbr., *Englerocharis calycina* (Desv.) Baehni & J.F. Macbr. var. *filiformis* (O.E. Schulz) Baehni & J.F. Macbr., *Englerocharis calycina* (Desv.) Baehni & J.F. Macbr., *Englerocharis weberbaueri* (Gilg & Muschl.) Baehni & J.F. Macbr., *Hesperis calycina* (Desv.) Kuntze, *Sisymbrium calycinum* (Desv.) Wedd. Hierba. Nativa. 3500-4900 m. Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).**Brayopsis monimocalyx** O.E. SchulzSin.: *Braya monimocalyx* Gilg & Muschl. ex Hosseus, nom. nud.

Hierba. Nativa. 4100-4800 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Cakile Mill.**Cakile maritima** Scop.Sin.: *Bunias cakile* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(MAL, ROC).

Camelina Crantz**Camelina alyssum** (Mill.) Thell.Sin.: *Camelina parodii* Ibarra & La Porte, *Camelina sativa* (L.) Crantz var. *dentata* (Willd.) Ibarra & La Porte, *Myagrimum alyssum* Mill., *Myagrimum dentatum* Willd.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, SFE). CHL(RME).

Camelina microcarpa Andr. ex DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE). CHL(RME).

Camelina sativa (L.) Crantz

Sin.: *Myagrum sativum* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SFE).
URY(SOR).

Capsella Medik., nom. cons.**Capsella bursa-pastoris** (L.) Medik.

Sin.: *Thlaspi bursa-pastoris* L.
Hierba. Introducida. 0-3800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, IPA). URY(CAS).

Cardamine L.**Cardamine africana** L.

Sin.: *Cardamine ovata* Benth. var. *corymbosa* Britton, *Cardamine innovans* O.E. Schulz
Hierba. Introducida. 500-3400 m.
Países: ARG(MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LLA, AIS, IPA).

Cardamine bonariensis Pers.

Sin.: *Cardamine alsophila* Phil. var. *bracteata* (Phil.) Reiche, *Cardamine alsophila* Phil. var. *caespitosa* (Phil.) Reiche, *Cardamine alsophila* Phil. var. *pusilla* (Phil.) Reiche, *Cardamine alsophila* Phil. var. *tridens* (Phil.) Reiche, *Cardamine alsophila* Phil., *Cardamine andicola* Phil., *Cardamine axillaris* Wedd. var. *tucumanensis* Griseb., *Cardamine axillaris* Wedd., *Cardamine bonariensis* Pers. var. *flaccida* (Cham. & Schltdl.) J.F. Macbr., *Cardamine bonariensis* Pers. var. *minima* (Steud.) J.F. Macbr., *Cardamine bonariensis* Pers. var. *tucumanensis* (Griseb.) O.E. Schulz, *Cardamine bracteata* Phil., *Cardamine caespitosa* Phil., *Cardamine cymbalaria* Chodat & Wilczek, *Cardamine demissa* Triana & Planch., *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. subsp. *alsophila* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. subsp. *bonariensis* (Pers.) O.E. Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. subsp. *minima* (Steud.) O.E. Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. var. *pilosa* O.E. Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. var. *tucumanensis* (Griseb.) O.E. Schulz,

Cardamine flaccida Cham. & Schltdl., *Cardamine minima* Steud., *Cardamine nasturtioides* Bertero ex Barnéoud, *Cardamine nemophila* Phil., *Cardamine pusilla* Phil., *Cardamine radicans* (Walp.) Kuntze, *Cardamine ramosissima* Steud., *Cardamine tridens* Phil., *Nasturtium radicans* Walp., *Nasturtium turfosum* Kunze ex Walp.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SJU, SCR, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(APA). URY(CAS, FLA, SOR).

Cardamine chenopodiifolia Pers.

Sin.: *Arabis commersonii* DC., *Arabis spathulata* (Poir.) DC., *Cardamine fernandeziana* (Phil.) Johow, *Cardamine argentina* Speg., *Heterocarpus fernandezianus*, *Sisymbrium bellidifolium* Poir., *Sisymbrium spathulatum* Poir.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(JFE). PRY(GUA). URY(CAS, MON, SJO, SOR).

Cardamine chilensis DC.

Sin.: *Cardamine callitrichoides* Speg., *Cardamine chilensis* DC. var. *angustifolia* O.E. Schulz, *Cardamine chilensis* DC. var. *nana* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Cardamine chilensis* DC. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Cardamine micropetala* Phil., *Cardamine nana* Barnéoud, *Cardamine ramosissima* Steud. var. *micropetala* (Phil.) Reiche, *Cardamine solisii* Phil., *Cardamine valdiviana* Phil. var. *callitrichoides* (Speg.) O.E. Schulz, *Cardamine valdiviana* Phil., *Cardamine vulgaris* Phil. var. *micropetala* (Phil.) O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SAL). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Cardamine cordata Barnéoud

Sin.: *Cardamine andina* Phil., *Cardamine calbucana* Phil., *Cardamine cordata* Barnéoud var. *decumbens* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Cardamine decumbens* Barnéoud, *Cardamine monticosa* Phil., *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn. subsp. *andina* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine peteroana* Phil., *Cardamine rostrata* Griseb. var. *alpina* Chodat & Wilcz.

Hierba. Endémica. 700-2900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Cardamine flexuosa With.

Sin.: *Cardamine hirsuta* L. subsp. *flexuosa* (With.) Forbes & Hemsl., *Cardamine hirsuta* L. var. *flexuosa* (With.) Hook. f. & T. Anderson
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MEN, SAL).

Cardamine geraniifolia (Poir.) DC.

Sin.: *Dentaria geraniifolia* (Poir.) Reiche, *Sisymbrium geraniifolium* Poir.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Cardamine glacialis (G. Forst.) DC.

Sin.: *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb. var. *andicola* Albov, *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb. var. *pauciflora* Speg., *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb. var. *umbrosa* Albov, *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb., *Cardamine ciliata* Phil., *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. subsp. *litoralis* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *elatior* A. Gray, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pubescens* Phil. ex O.E. Schulz, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pumila* A. Gray, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *soehrensii* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine gongyloides* Phil., *Cardamine hirsuta* L. var. *antiscorbutica* (Banks & Sol. ex Griseb.) Reiche, *Cardamine hirsuta* L. var. *magellanica* (Phil.) Reiche, *Cardamine hirsuta* L. var. *soehrensii* (Phil.) Reiche, *Cardamine litoralis* Phil., *Cardamine magellanica* Phil., *Cardamine palenae* Phil., *Cardamine pratensis* L. var. *minor* Barnéoud, *Cardamine soehrensii* Phil., *Cardamine strictula* Steud., *Sisymbrium glaciale* G. Forst., *Sisymbrium grandiflorum* Molina
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(ATA, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Cardamine hirsuta L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, JUJ, LPA, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE). URY(MON).

Cardamine kruesselii Johow ex Reiche

Hierba. Endémica.

Países: CHL(JFE).

Cardamine marginata Phil.Sin.: *Cardamine vulgaris* Phil. var. *marginata* (Phil.) O.E. Schulz

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO, ARA).

Cardamine rostrata Griseb.Sin.: *Cardamine lechleriana* Steud., *Cardamine reniformis* Phil., *Cardamine rostrata* Griseb. var. *dichondroides* Speg., *Cardamine rostrata* Griseb. var. *reniformis* (Phil.) O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(CHU). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Cardamine tenuirostris Hook. & Arn.Sin.: *Cardamine affinis* Hook. & Arn., *Cardamine flavescens* Phil., *Cardamine pentaphylla* Phil., hom. illeg., *Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn. subsp. *affinis* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz, *Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn. subsp. *reicheana* O.E. Schulz, *Nasturtium stenophyllum* F. Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Cardamine tuberosa DC.Sin.: *Cardamine cognata* Steud., *Cardamine granulata* Phil., *Cardamine thyrsoides* O.E. Schulz, *Cardamine tuberosa* DC. subsp. *cognata* (Steud.) O.E. Schulz, *Cardamine tuberosa* DC. var. *granulata* (Phil.) Reiche, *Cardamine tuberosa* DC. var. *velutina* Speg.

Hierba. Endémica. 0-2700 m.

Países: ARG(CHU). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, AIS, RME).

Cardamine variabilis Phil.Sin.: *Cardamine integrifolia* Phil. var. *diversifolia* O.E. Schulz, *Cardamine integrifolia* Phil., hom. illeg. var. *dichondroides* Speg., *Cardamine integrifolia* Phil., hom. illeg., *Cardamine ovata* Phil., hom. illeg., *Cardamine thermarum* Martic., *Cardamine triphylla* Phil., *Cardamine variabilis* Phil. var. *pinnatisecta* O.E. Schulz, *Sisymbrium simpsonii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Cardamine volckmannii Phil.Sin.: *Cardamine hirsuta* L. var. *nivalis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hook. f., *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn., *Cardamine petiolulata* Phil. ex O.E. Schulz, *Cardamine stricta* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3800 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Cardamine vulgaris Phil.Sin.: *Cardamine garaventae* O.E. Schulz, *Cardamine grandjotii* O.E. Schulz, *Cardamine hirsuta* L. var. *vulgaris* (Phil.) Reiche, *Cardamine intermedia* Steud., *Cardamine macrostachya* Phil., *Cardamine vulgaris* Phil. var. *oligozyga* O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Chilocardamum O.E. Schulz**Chilocardamum castellanosii** (O.E. Schulz) Al-ShehbazSin.: *Sisymbrium castellanosii* O.E. Schulz

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Chilocardamum longistylum

(Romanczuk) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium longistylum*

Romanczuk

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU).

Chilocardamum onuridifolium

(Ravenna) Al-Shehbaz

Sin.: *Dimitria onuridifolia* Ravenna, *Sisymbrium onuridifolium* (Ravenna) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Chilocardamum patagonicum (Speg.)

O.E. Schulz

Sin.: *Sisymbrium flexicaule* Dusén, *Sisymbrium patagonicum* Speg., *Thelypodium flexicaule* (Dusén) Gilg & Muschl.

Hierba o arbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Chorispora R. Br. ex DC, nom. cons.**Chorispora tenella** (Pall.) DC.Sin.: *Raphanus tenellus* Pall.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(RME).

Cremolobus DC.**Cremolobus chilensis** (Lag. ex DC.) DC.Sin.: *Biscutella chilensis* Lag. ex DC., *Cremolobus aphanopterus* A. Gray, *Cremolobus benoistii* J.F. Macbr., *Cremolobus humilis* Muschl., *Cremolobus parviflorus* Wedd., *Cremolobus paysonii* O.E. Schulz, *Cremolobus pinnatifidus* Hook. var. *integrifolius* A. Gray, *Cremolobus pinnatifidus* Hook., *Cremolobus sinuatus* Hook., *Cremolobus stenophyllus* Muschl., *Cremolobus weberbaueri* Muschl., *Loxoptera stenophylla* (Muschl.) O.E. Schulz, *Urbanodoxa tarapacana* Ricardi & Martic.

Hierba. Nativa. 0-4400 m.

Países: ARG(JUU, TUC). CHL(AYP, TAR).

Cremolobus subscandens Kuntze

Hierba. Nativa. 200-2700 m.

Países: ARG(JUU).

Delpinophytum Speg.**Delpinophytum patagonicum** (Speg.) Speg.Sin.: *Coronopus patagonicus* (Speg.) Muschl., *Delpinoella patagonica* Speg. Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Descurainia Webb & Berthel., nom. cons.**Descurainia antarctica** (E. Fourn.) O.E. SchulzSin.: *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *bonarellii* O.E. Schulz, *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *patagonica* (Speg.) O.E. Schulz, *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *purpureola* (Speg.) O.E. Schulz, *Descurainia argentea* O.E. Schulz, *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *patagonica* Speg., *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *purpureola* Speg., *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *leiocarpa* O.E. Schulz, *Descurainia glandulifera* (Speg.) Gilg & Muschl., *Descurainia nana* Romanczuk, *Hesperis antarctica* (E. Fourn.) Kuntze, *Sisymbrium antarcticum* E. Fourn., *Sisymbrium glanduliferum* Speg., *Sisymbrium sophia* L. var. *canescens* Hook. f., *Sophia glandulifera* (Speg.) Macloskie, *Sophia pinnata*

(Walter) Howell var. *patagonica* (Speg.) Macloskie, *Sophia pinnata* (Walter) Howell var. *purpureola* (Speg.) Macloskie Hierba. Endémica. 0-600 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

Descurainia canoensis Al-Shehbaz Hierba. Nativa. 3500-3700 m. Países: CHL(AYP).

Descurainia depressa (Phil.) Prantl ex Reiche

Sin.: *Descurainia brachycarpa* (Phil.) Prantl ex Reiche, *Descurainia depressa* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *pflanzii* (Muschl.) O.E. Schulz, *Descurainia latisiliqua* O.E. Schulz, *Descurainia pflanzii* Muschl., *Descurainia titicacensis* (Walp.) Lillo var. *dasycarpa* O.E. Schulz, *Sisymbrium brachycarpum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium depressum* Phil. Hierba. Nativa. 3500-5000 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Descurainia erodiifolia (Phil.) Prantl ex Reiche

Sin.: *Descurainia appendiculata* (Griseb.) O.E. Schulz var. *angustisecta* O.E. Schulz, *Descurainia appendiculata* (Griseb.) O.E. Schulz, *Descurainia argentina* O.E. Schulz var. *brachysiliqua* (Chodat & Wilczek) O.E. Schulz, *Descurainia argentina* O.E. Schulz, *Descurainia brevifruca* Boelcke ex Mart.-Laborde, *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *appendiculata* (Griseb.) Hosseus, *Descurainia heterotricha* Speg., *Sisymbrium canescens* Nutt. f. *brachysiliqua* Chodat & Wilczek, *Sisymbrium canescens* Nutt. var. *appendiculatum* Griseb., *Sisymbrium erodiifolium* Phil., *Sophia heterotricha* (Speg.) Macloskie Hierba. Endémica. 200-3200 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME). URY(SAO).

Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr.

Sin.: *Descurainia leptoclada* Muschl. var. *dasycarpa* O.E. Schulz, *Descurainia leptoclada* Muschl. var. *glandulosa* O.E. Schulz, *Descurainia leptoclada* Muschl., *Descurainia myriophylla* (Willd. ex DC.) R.E. Fr. var. *glandulosa* O.E. Schulz,

Descurainia perkinsiana Muschl., *Descurainia pulcherrima* Muschl., *Descurainia titicacensis* (Walp.) Lillo var. *glandulosa* O.E. Schulz, *Descurainia titicacensis* (Walp.) Lillo, *Hesperis myriophylla* (Willd. ex DC.) Kuntze, *Nasturtium myriophyllum* (Willd. ex DC.) Spreng., *Sisymbrium adpressum* Turcz., *Sisymbrium myriophyllum* Willd. ex DC., *Sisymbrium titicacense* Walp.

Hierba. Nativa. 1900-4600 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Descurainia nuttallii (Colla) O.E. Schulz

Sin.: *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *elegantula* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *glabrescens* (Speg.) O.E. Schulz, *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *tenuissima* (Phil.) Reiche, *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl, *Descurainia diversifolia* O.E. Schulz, *Descurainia glabrescens* (Speg.) Speg., *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl var. *macrophylla* (Barnéoud) Prantl ex Reiche, *Descurainia tenuissima* (Phil.) Speg., *Hesperis cumingiana* (Fisch. & E. Mey.) Kuntze, *Sisymbrium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey., *Sisymbrium cumingii* C. Presl, *Sisymbrium elegantulum* Phil., *Sisymbrium glabrescens* Speg., *Sisymbrium macrophyllum* Barnéoud, *Sisymbrium nuttalli* Colla, *Sisymbrium tenuissimum* Phil., *Sophia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Macloskie, *Sophia glabrescens* (Speg.) Macloskie, *Sophia tenuissima* (Phil.) Macloskie Hierba. Endémica. 0-3200 m. Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, LLA, MAG, RME).

Descurainia pimpinellifolia

(Barnéoud) O.E. Schulz Sin.: *Descurainia altoandina* Romanczuk, *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *pimpinellifolium* (Barnéoud) Reiche, *Descurainia diversifolia* O.E. Schulz var. *cunninghamii* O.E. Schulz, *Descurainia glaucescens* (Phil.) Prantl ex Reiche, *Descurainia pimpinellifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glaucescens* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche f. *umbellifera* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium glaucescens* Phil., hom. illeg.,

Sisymbrium pimpinellifolium Barnéoud, *Sisymbrium umbelliferum* Phil., *Sophia glaucescens* (Phil.) Macloskie

Hierba. Endémica. 1500-4000 m. Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl Sin.: *Hesperis sophia* (L.) Kuntze, *Sisymbrium sophia* L.

Hierba. Introducida. 0-600 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG, RME).

Descurainia stricta (Phil.) Prantl ex Reiche

Sin.: *Descurainia adpressa* Boelcke, *Descurainia minutiflora* Prantl ex Reiche var. *florida* (Phil.) Reiche, *Descurainia minutiflora* Prantl ex Reiche, *Descurainia rubescens* (Phil.) Reiche, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *florida* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *minutiflora* (Prantl ex Reiche) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *rubescens* (Phil.) O.E. Schulz, *Hesperis florida* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium floridum* Phil., *Sisymbrium minutiflorum* Phil., hom. illeg., *Sisymbrium rubescens* Phil., *Sisymbrium strictum* Phil.

Hierba. Endémica. 3200-4700 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Dictyophragmus O.E. Schulz

Dictyophragmus punensis

(Romanczuk) Al-Shehbaz Sin.: *Sisymbrium punense* Romanczuk Hierba. Endémica. 3100-3800 m. Países: ARG(JUJ).

Diploaxis DC.

Diploaxis eruroides (L.) DC.

Sin.: *Sinapis eruroides* L. Hierba. Introducida. Países: ARG(MEN, SJU).

Diploaxis muralis (L.) DC.

Sin.: *Brassica muralis* (L.) Huds., *Sinapis muralis* (L.) W.T. Aiton, *Sisymbrium murale* L. Hierba. Introducida. 0-700 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(ATA, COQ, RME).

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

Sin.: *Sisymbrium tenuifolium* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE). URY(MON).

Draba L., nom. cons.**Draba burkartiana** O.E. Schulz

Sin.: *Draba burkartiana* O.E. Schulz
var. *parodiana* O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Draba funiculosa Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Draba gilliesii Hook. & Arn.

Sin.: *Draba araucana* Phil., *Draba azorellicola* O.E. Schulz, *Draba chubutensis* Speg., *Draba colchaguensis* Phil., *Draba davilae* Phil., *Draba gilliesii* Hook. & Arn. f. *araucana* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. f. *bagualensis* O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *argentina* O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *davilae* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *glabrata* (Gilg ex Speg.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *rosulata* (Phil.) Reiche, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *stolonifera* (Barnéoud) Reiche, *Draba magellanica* Lam. var. *glabrata* Gilg ex Speg., *Draba rosulata* Phil., *Draba stolonifera* Barnéoud
Hierba. Endémica. 400-4000 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Draba lapaziana Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 4300-4800 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Draba loayzana Al-Shehbaz

Hierba. Nativa. 4400-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Draba macleanii Hook. f.

Sin.: *Draba atacamensis* Gilg
Hierba. Nativa. 3900-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Draba magellanica Lam.

Sin.: *Draba atuelica* Chodat & Wilczek, *Draba chodatii* O.E. Schulz,

Draba falklandica Hook. f., *Draba incana* L. var. *magellanica* (Lam.) Hook. f., *Draba incana* L. var. *sylvatica* (Albov) Macloskie, *Draba kurtzii* Gilg ex Hosseus, nom. nud., *Draba magellanica* Lam. var. *citrina* O.E. Schulz, *Draba magellanica* Lam. var. *falklandica* (Hook. f.) O.E. Schulz, *Draba magellanica* Lam. var. *saffordii* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba magellanica* Lam. var. *sylvatica* Albov, *Draba rosularis* Chodat & Wilczek, hom. illeg., *Draba saffordii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-3400 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Draba pusilla F. Phil.

Sin.: *Draba magellanica* Lam. var. *subglabrata* Speg., *Draba schoenleinii* F. Meigen, *Draba subglabrata* (Speg.) O.E. Schulz, *Draba subglabrata* (Speg.) O.E. Schulz var. *leiocarpa* O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 500-3400 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, LBO, MAU, MAG, RME).

Draba thlaspiiformis (Phil.) Al-Shehbaz

Sin.: *Draba philippii* O.E. Schulz, *Eudema thlaspiiforme* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).

Draba tucumanensis O.E. Schulz

Sin.: *Draba chodatii* O.E. Schulz var. *subtorta* O.E. Schulz, *Draba atuelica* Chodat & Wilczek var. *hirsutior* O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 2700-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

Draba verna L.

Sin.: *Erophila verna* (L.) DC.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, COS, ERI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, AIS, MAG, RME).

Eruca Mill.**Eruca vesicaria** (L.) Cav. subsp. **sativa** (Mill.) Thell.

Sin.: *Brassica vesicaria* L., *Eruca sativa* Mill.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(VAL).

Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. **vesicaria**

Hierba. Introducida.
Países: CHL(VAL).

Erysimum L.**Erysimum cheiranthoides** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Erysimum repandum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Exhalimolobos Al-Shehbaz & C.D. Bailey**Exhalimolobos burkartii** (Romanczuk & Boelcke) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sin.: *Polypsecadium burkartii*
Romanczuk & Boelcke
Hierba. Endémica. 800-1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Exhalimolobos pazense (Rusby) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sin.: *Halimolobos adpressus* O.E. Schulz, *Sisymbrium pazense* Rusby
Hierba. Nativa. 1600-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SCR, TUC).

Exhalimolobos weddellii (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sin.: *Draba greggioides* Griseb., *Greggia montana* Griseb., *Halimolobos boelckeii* Mart.-Laborde, *Halimolobos hispidula* (DC.) O.E. Schulz var. *weddellii* (E. Fourn.) Rollins, *Halimolobos montanus* (Griseb.) O.E. Schulz var. *andina* O.E. Schulz, *Halimolobos montanus* (Griseb.) O.E. Schulz, *Halimolobos weddellii* (E. Fourn.) O.E. Schulz, *Hesperis weddellii* (E. Fourn.) Kuntze, *Sisymbrium hispidulum* (DC.) Triana & Planch. var. *weddellii* (E. Fourn.) Baehni & J.F. Macbr., *Sisymbrium weddellii* E. Fourn.
Hierba. Nativa. 300-3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(ART, COL, RNO, SAO, TAC).

Hesperis L.**Hesperis matronalis** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF). CHL(MAG).

Hirschfeldia Moench**Hirschfeldia incana** (L.) Lagr.-Foss.Sin.: *Sinapis incana* L.

Hierba. Introducida. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME, JFE, IPA). URY(PAY, SJO).

Hollermayera O.E. Schulz**Hollermayera valdiviana** (Phil.)

Ravenna

Sin.: *Armoracia valdiviana* Phil.,*Hollermayera sylvatica* O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 600-700 m.

Países: CHL(ARA, LLA).

Hornungia Rchb.**Hornungia procumbens** (L.) HayekSin.: *Bursa procumbens* (L.) Kuntze, *Capsella procumbens* (L.) Fr., *Draba tenuis* Barnéoud, *Hutchinsia procumbens* (L.) Desv., *Hutchinsia reticulata* Griseb., *Hutchinsia tenuis* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Hymenolobus procumbens* (L.) Nutt. ex Schinz & Thell., *Lepidium procumbens* L., *Microcardamum tenue* (Barnéoud) O.E. Schulz

Hierba. Introducida. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, MAG).

Iberis L.**Iberis amara** L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE, SFE).

Isatis L.**Isatis tinctoria** L.

Hierba. Introducida. 100-500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Ivania O.E. Schulz**Ivania cremnophila** (I.M. Johnst.)

O.E. Schulz

Sin.: *Cardamine cremnophila* I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 2700-3300 m.

Países: CHL(ATA).

Ivania juncalensis Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2400-2600 m.

Países: CHL(VAL).

Lepidium L.**Lepidium angustissimum** Phil.Sin.: *Lepidium tayloriae* Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 1900-2400 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Lepidium appelianum Al-ShehbazSin.: *Cardaria pubescens* (C.A. Mey.)Jarm., *Hymenophysa pubescens* C.A. Mey.

Hierba. Introducida. 300-1600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Lepidium argentinum Thell.Sin.: *Lepidium argentinum* Thell. var. *stenocarpum* (Thell.) Thell., *Lepidium argentinum* Thell. var. *virginicifolium* Thell., *Lepidium bonariense* L. var. *stenocarpum* Thell.

Hierba. Endémica. 1800-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

Lepidium auriculatum Regel & Körn.Sin.: *Lepidium aletes* J.F. Macbr., *Lepidium araucanum* Phil., *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *araucanum* (Phil.) Reiche, *Lepidium calycinum* Godr., *Lepidium pubescens* Desv. var. *fallax* Thell., *Lepidium subvaginatum* Steud. ex Thell.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG). PRY(APA, CEN, COA, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SJO, SJO, TYT).

Lepidium bipinnatifidum Desv.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, LLA). URY(MON).

Lepidium boelckeanum Prina

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, MEN, SLU, SFE, SDE).

Lepidium boelckei Al-ShehbazSin.: *Lepidium marginatum* Griseb., hom. illeg., *Lepidium meyenii* Walp. subsp. *marginatum* (Griseb.) Thell.

Hierba. Endémica. 3000-3400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Lepidium bonariense L.Sin.: *Lepidium bonariense* L. var. *hirsutulum* Thell., *Lepidium bonariense* L. var. *microcarpum* Thell., *Lepidium bonariense* L. var. *pseudovirginicum* Thell., *Lepidium mendocinum* Phil., *Thlaspi multifidum* Poir.

Hierba. Nativa. 0-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME, JFE, IPA). PRY(AMA, CEN, COA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, ROC, SAO, SJO, TYT).

Lepidium burkartii Boelcke

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(ERI).

Lepidium campestre (L.) W.T. AitonSin.: *Thlaspi campestre* L.

Hierba. Introducida.

Países: CHL.

Lepidium chalepense L.Sin.: *Cardaria chalepensis* (L.) Hand.-Mazz., *Cardaria draba* (L.) Desv. var. *chalepensis* (L.) O.E. Schulz

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU, TDF).

Lepidium chichicara Desv.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Lepidium coronopus (L.) Al-ShehbazSin.: *Cochlearia coronopus* L., *Coronopus squamatus* (Forssk.) Asch., *Lepidium squamatum* Forssk.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(LLA).

Lepidium cumingianum Fisch. & C.A. Mey.Sin.: *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *berteroanum* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *orbiculatum* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. var. *canescens* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. var. *subsagittatum* Thell.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(TAR, VAL, LBO, BIO, RME).

Lepidium densiflorum Schrad.

Sin.: *Lepidium neglectum* Thell.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(LPA, MEN, SLU).

Lepidium depressum Thell.

Hierba. Nativa. 3800-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Lepidium didymum L.

Sin.: *Coronopus didymus* (L.) Sm.,
Coronopus didymus L. var. *macrocarpus*
Muschl., *Coronopus didymus* L. var.
procumbens Muschl., *Coronopus*
leptocarpus Boelcke var. *microcarpus*
Boelcke, *Coronopus leptocarpus* Boelcke,
Lepicochlea americana Rojas Acosta,
Senebiera didyma (L.) Pers., *Senebiera*
pinnatifida DC.

Hierba. Nativa. 0-2900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,
MEN, MIS, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU,
SLU, TDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
MAG, RME, IPA). PRY(CEN, COA).
URY(MON).

Lepidium draba L.

Sin.: *Cardaria draba* (L.) Desv.,
Cochlearia draba (L.) L.

Hierba. Introducida. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,
NEU, RNE, SCR, SFE, SLU, TDF).
CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, AIS, MAG,
RME). URY(MON).

Lepidium filisegmentum C.L. Hitchc.

Sin.: *Lepidium reticulatum* Howell var.
austrro-americanum Thell.

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: ARG(CHU, LPA, RNE, SCR).

Lepidium gracile (Chodat & Hassl.)

Boelcke

Sin.: *Lepidium bonariense* L. var. *gracile*
Chodat & Hassl., *Lepidium calycinum*
Stephan ex Willd. var. *gracile* (Chodat &
Hassl.) Thell.

Hierba. Nativa. 100-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
FOR, SLU, SFE, SDE). PRY(CON, PHA).

Lepidium heterophyllum Benth.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(ARA).

Lepidium hickenii Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI).

Lepidium horstii Johow ex Skottsbo.

Hierba. Endémica. 300

Países: CHL(IDE).

Lepidium johnstonii C.L. Hitchc.

Hierba. Endémica. 700-1500 m.

Países: ARG(SAL). CHL(ANT).

Lepidium jujuyanum Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 3700-4500 m.

Países: ARG(JUJ).

Lepidium latifolium L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COR). CHL(ANT, COQ, MAU).

Lepidium meyenii Walp.

Sin.: *Lepidium affine* Wedd., hom.
illeg., *Lepidium gelidum* Wedd., *Lepidium*
meyenii Walp. subsp. *affine* (Wedd.)
Thell., *Lepidium meyenii* Walp. subsp.
gelidum (Wedd.) Thell., *Lepidium meyenii*
Walp. var. *gelidum* (Wedd.) Hosseus,
Lepidium peruvianum G. Chacón,
Lepidium weddellii J.F. Macbr., hom.
illeg., *Lepidium* Hierba. Nativa. 3000-
4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Lepidium myrianthum Phil.

Sin.: *Lepidium ruderales* L. var.
myrianthum (Phil.) Reiche, *Lepidium*
spicatum Desv. f. *microcarpum* Hicken

Hierba. Endémica. 200-3400 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LPA,
LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).
CHL(ANT).

Lepidium nitidum Nutt. ex Torr. & A. Gray

Sin.: *Lepidium bipinnatifidum* Desv.
var. *curicoanum* (Phil.) Reiche, *Lepidium*
bipinnatifidum Desv. var. *tenuifolium* (Phil.)
Reiche, *Lepidium chilense* Kunze, *Lepidium*
curicoanum Phil., *Lepidium tenuifolium* Phil.
Lepidium tenuissimum Steud.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

Lepidium parodii Thell.

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, RNE, SFE).

Lepidium pedersenii Al-Shehbaz

Sin.: *Lepidium aletes* J.F. Macbr. var.
integrifolium (Thell.) Boelcke, *Lepidium*
calycinum Stephan ex Willd. var.
integrifolium Thell.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SFE, TUC). PRY(APA, APY).

Lepidium perfoliatum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Lepidium philippianum (Kuntze) Thell.

Sin.: *Lepidium philippianum* (Kuntze)
Thell. var. *brachystylum* Thell., *Lepidium*
suffruticosum Phil., hom. illeg.,
Nasturtium philippianum Kuntze, *Onuris*
reichei Gilg & Muschl.

Hierba. Endémica. 2400-3000 m.

Países: CHL(RME).

Lepidium pinnatifidum Ledeb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(RNE).

Lepidium pseudodidymum Thell. ex Druce

Sin.: *Coronopus australis* (Hook. f.)
Speg., *Coronopus didymus* (L.) Sm. subsp.
australis (Hook. f.) Muschl., *Coronopus*
pinnatifidus (DC.) Gaertn. var. *australis*
(Hook. f.) Reiche, *Lepidium inclusum*
O.E. Schulz, *Senebiera australis* Hook. f.,
Senebiera pinnatifida DC. var. *australis*
(Hook. f.) De Wild.

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG, RME).

Lepidium rahmeri Phil.

Hierba. Nativa. 2600-4200 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Lepidium raimondii O.E. Schulz

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

Lepidium reichei Phil. ex Reiche

Sin.: *Lepidium barneoudianum* Sukorý,
Lepidium bonariense L. var. *gayi* Thell.,
Lepidium brevicaule Barnéoud, hom.
illeg., *Lepidium morrisonii* C.L. Hitchc.,
Nasturtium brevicaule (Barnéoud)

Kuntze

Hierba. Endémica. 2500-3600 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ,
VAL, RME).

Lepidium rhytidocarpum (Hook.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Coronopus rhytidocarpus* (Hook.)
Macloskie, *Senebiera rhytidocarpa* Hook.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, SFE).
URY(PAY, SAO, TAC).

Lepidium ruderales L.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lepidium santacruzense Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(SCR).

Lepidium sativum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR, TDF).
CHL(BIO, ARA).

Lepidium serratum (Poir.) Al-Shehbaz

Sin.: *Coronopus serratus* (Poir.) Desv.,
Senebiera serrata Poir.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(SOR).

Lepidium spathulatum Phil.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Lepidium spicatum Desv.

Sin.: *Lepidium racemosum* Griseb.,
Lepidium spicatum Desv. var. *calyx-*
persistente Boelcke, *Lepidium spicatum*
Desv. var. *racemosum* (Griseb.) Boelcke
Hierba. Endémica. 0-3300 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI,
LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE).
CHL(ATA, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).
URY(CAS, COL, LAV).

Lepidium strictum (S. Watson) Rattan
ex B.L. Rob.

Sin.: *Lepidium oxycarpum* Torr. & A.
Gray var. *strictum* S. Watson
Hierba. Endémica. 0-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,
VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Lepidium stuckertianum (Thell.)

Boelcke
Sin.: *Lepidium bonariense* L. var.
stuckertianum Thell.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, FOR, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU,
SFE, SDE, TUC).

Lepidium tandilense Boelcke

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, RNE). URY(MON).

Lepidium virginicum L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(VAL, IDE). PRY(CAU, CEN, GUA).

Lithodraba Boelcke**Lithodraba mendocinensis** (Hauman)

Boelcke
Sin.: *Xerodraba mendocinensis* Hauman
Arbusto. Endémica. 1700-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Lobularia Desv., nom. cons.**Lobularia maritima** (L.) Desv.

Sin.: *Alyssum maritimum* (L.) Lam.,
Clypeola maritima L.
Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI,
JUJ, LPA, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU).
CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MON).

Lunaria L.**Lunaria annua** L.

Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Malcolmia R. Br., nom. cons.**Malcolmia maritima** (L.) R. Br.

Sin.: *Cheiranthus maritimus* L.
Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: ARG(SCR).

Mancoa Wedd., nom. cons.**Mancoa foliosa** (Wedd.) O.E. Schulz

Sin.: *Hutchinsia foliosa* Wedd.
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Mancoa hispida Wedd.

Sin.: *Mancoa minima* Rollins, *Radicula*
scabra Rusby
Hierba. Nativa. 3400-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Mancoa venturii Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2300-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Mathewsia Hook. & Arn.**Mathewsia auriculata** Phil.

Subarbusto. Endémica. 100-2700 m.
Países: CHL(TAR, ATA, COQ).

Mathewsia foliosa Hook. & Arn.

Hierba o subarbusto. Endémica.
0-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Mathewsia incana Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Mathewsia linearifolia Turcz.

Sin.: *Mathewsia collina* I.M. Johnst.,
Mathewsia laciniata Phil.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Matthiola R. Br.**Matthiola incana** (L.) R. Br.

Sin.: *Cheiranthus incanus* L.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(ANT, JFE).

Menonvillea DC.**Menonvillea chilensis** (Turcz.) B.D. Jacks.

Sin.: *Cymatoptera chilensis* Turcz.,
Menonvillea aptera Phil., *Menonvillea*
chilensis (Turcz.) B.D. Jacks. var. *aptera*
(Phil.) Rollins, *Menonvillea media* Turcz.,
Menonvillea orbiculata Phil. f. *glabra* Gilg
& Muschl., *Menonvillea orbiculata* Phil.
var. *parviflora* (Phil.) Reiche, *Menonvillea*
parviflora Phil. var. *aptera* (Phil.) I.M.
Johnst., *Menonvillea parviflora* Phil.,
Menonvillea parvula Phil. *Menonvillea*
pinnatifida Barnéoud var. *parvula* (Phil.)
Gilg & Muschl.

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Menonvillea cicatricosa (Phil.) Rollins

Sin.: *Hexaptera cicatricosa* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1800-2800 m.
Países: ARG(MEN). CHL(LBO, MAU).

Menonvillea comberi Sandwith

Sin.: *Menonvillea hirsuta* Rollins,
Menonvillea scapigera (Phil.) Rollins
subsp. *hirsuta* (Rollins) Prina
Hierba. Endémica. 1000-1700 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA).

Menonvillea constitutionis (F. Phil.)

Rollins
Sin.: *Hexaptera constitutionis* F. Phil.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Menonvillea cuneata (Gillies & Hook.) Rollins

Sin.: *Decaptera trifida* Turcz., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *violacea* (Phil.) Reiche, *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook., *Hexaptera jussiaei* Barnéoud var. *tridens* (Phil.) Reiche, *Hexaptera jussiaei* Barnéoud, *Hexaptera kurtzii* Hosseus, *Hexaptera tridens* Phil., *Hexaptera violacea* Phil.

Hierba. Endémica. 1700-4600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Menonvillea famatinensis (Boelcke) Rollins

Sin.: *Hexaptera famatinensis* Boelcke, *Hexaptera famatinensis* Boelcke var. *sphaerocarpa* Boelcke, *Hexaptera pinnatifida* Gillies & Hook. var. *nana* Hieron., nom. nud., *Menonvillea famatinensis* (Boelcke) Rollins var. *sphaerocarpa* (Boelcke) Rollins

Hierba. Endémica. 3700-4500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Menonvillea filifolia Fisch. & C.A. Mey.

Sin.: *Menonvillea angustifolia* C. Presl, *Menonvillea linearis* DC. var. *filifolia* (Fisch. & C.A. Mey.) Rollins

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Menonvillea flexuosa Phil.

Sin.: *Menonvillea crassa* Rollins, *Menonvillea falcata* Reiche, *Menonvillea flexuosa* Phil. f. *tomentosa* Gilg & Muschl.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Menonvillea frigida (Phil.) Rollins

Sin.: *Hexaptera frigida* Phil.
Hierba. Endémica. 3900-4700 m.
Países: CHL(ANT).

Menonvillea linearis DC.

Sin.: *Dispeltophorus crassifolius* Lehm., *Menonvillea linearis* DC. var. *trifida* (Phil.) Reiche, *Menonvillea linearis* DC. var. *virgata* (Phil.) Reiche, *Menonvillea robustula* Steud., *Menonvillea trifida* Phil., *Menonvillea virgata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Menonvillea litoralis (Barnéoud) Rollins

Sin.: *Hexaptera litoralis* Barnéoud, *Menonvillea arachnoidea* O.E. Schulz, *Menonvillea gayi* Phil.

Hierba. Endémica. 200-1100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Menonvillea macrocarpa (I.M.

Johnst.) Rollins
Sin.: *Hexaptera macrocarpa* I.M. Johnst.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Menonvillea marticorenae (Al-Shehbaz) Salariato & Al-Shehbaz

Sin.: *Menonvillea filifolia* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *marticorenae* Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Menonvillea minima Rollins

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Menonvillea nordenskjoeldii (Dusén) Rollins

Sin.: *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. f. *brevifolia* Skottsbl., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *nordenskjoeldii* (Dusén) Gilg & Muschl., *Hexaptera nordenskjoeldii* Dusén

Hierba. Endémica. 500-2100 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
CHL(AIS, MAG).

Menonvillea orbiculata Phil.

Sin.: *Menonvillea alata* Rollins, *Menonvillea orbiculata* Phil. var. *perplexa* Rollins
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Menonvillea patagonica Speg.

Sin.: *Menonvillea alyssoides* Rollins
Hierba. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Menonvillea pinnatifida Barnéoud

Hierba. Endémica. 800-3000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

Menonvillea purpurea (Hastings)

Rollins
Sin.: *Hexaptera linearis* Barnéoud, *Hexaptera purpurea* Hastings
Hierba. Endémica. 0-2800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Menonvillea rigida Rollins

Hierba. Endémica. 1500-1900 m.
Países: ARG(NEU, RNE).

Menonvillea scapigera (Phil.) Rollins subsp. **longipes** (Rollins) Prina

Sin.: *Hexaptera pinnatifida* Gillies & Hook., *Menonvillea hookeri* Rollins, *Menonvillea longipes* Rollins, *Menonvillea*

perstylosa Rollins

Hierba. Endémica. 1100-3300 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).
CHL(ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, RME).

Menonvillea scapigera (Phil.) Rollins subsp. **scapigera**

Sin.: *Hexaptera scapigera* Phil.
Hierba. Endémica. 2200-4300 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SCR, SJU).

Menonvillea spathulata (Gillies & Hook.) Rollins

Sin.: *Hexaptera cuneata* (Gillies & Hook.) Rollins var. *edentata* Kuntze, *Hexaptera pusilla* Phil., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook. subsp. *pusilla* (Phil.) Gilg & Muschl., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook. var. *pusilla* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 2200-4100 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, RME).

Menonvillea virens (Phil.) Rollins

Sin.: *Hexaptera virens* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA).

Menonvillea zuloagaensis Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 3400-3500 m.
Países: ARG(SJU).

Mostacillastrum O.E. Schulz

Mostacillastrum ameghinoi (Speg.)

O.E. Schulz
Sin.: *Sisymbrium ameghinoi* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Mostacillastrum andinum (Phil.)

Al-Shehbaz
Sin.: *Hesperis andina* (Phil.) Kuntze, *Hesperis corymbosa* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium amplexicaule* Phil. var. *corymbosum* (Phil.) Reiche, *Sisymbrium andinum* Phil. f. *dolichocarpum* Hauman, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *hossei* O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *latifolium* Phil., *Sisymbrium andinum* Phil. var. *morenoanum* (Chodat & Wilczek) O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil., *Sisymbrium consanguineum* Phil. ex Reiche, *Sisymbrium corymbosum* Phil. var. *consanguineum* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz, *Sisymbrium corymbosum*

Phil., *Sisymbrium morenoanum* Chodat & Wilczek var. *robustum*, *Sisymbrium morenoanum* Chodat & Wilczek, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *latifolium* (Phil.) Speg.

Hierba. Endémica. 1800-3300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU).
CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Mostacillastrum carolinense

(Scappini, C.A. Bianco & Prina) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium carolinense* Scappini, C.A. Bianco & Prina
Subarbusto. Endémica. 1500-1700 m.
Países: ARG(SLU).

Mostacillastrum commune (Speg.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium andinum* Phil. var. *exauriculatum* (Speg.) O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *pubescens* Gilg & Muschl., hom. illeg., *Sisymbrium andinum* Speg., hom. illeg., *Sisymbrium commune* (Speg.) Romanczuk, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *commune* Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *exauriculatum* Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *glaucum* Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *normalis* Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *pubescens* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *purpurascens* Speg.

Hierba. Endémica. 100-3300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).
CHL(COQ, VAL, RME).

Mostacillastrum dianthoides (Phil.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium arequipanum* Al-Shehbaz, *Sisymbrium dianthoides* Phil.
Hierba. Endémica. 3200-4400 m.
Países: ARG(JUJ).
CHL(TAR, ANT).

Mostacillastrum ferreyrae (Förther & Weigend) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium ferreyrae* Förther & Weigend
Hierba. Nativa. 300-1000 m.
Países: CHL(TAR).

Mostacillastrum gracile (Wedd.) Al-Shehbaz

Sin.: *Heterothrix gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Pennellia gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Phlebiopragmus macrorrhizus*

(Muschl.) O.E. Schulz, *Sisymbrium gracile* Wedd., *Thelypodium macrorrhizus* Muschl.

Hierba. Nativa. 1800-3900 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

Mostacillastrum hunzikeri Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 700-2200 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Mostacillastrum leptocarpum

(Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis leptocarpa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Nasturtium hastatum* Phil., *Sisymbrium andinum* Phil. var. *hastatum* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *juncalense* O.E. Schulz, *Sisymbrium gayanum* Barnéoud, *Sisymbrium hastatum* Phil., *Sisymbrium leptocarpum* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 1800-3200 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
CHL(COQ, VAL, RME).

Mostacillastrum orbignyanum (E.

Fourn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis orbignyana* (E. Fourn.) Kuntze, *Mostacillastrum elongatum* O.E. Schulz var. *latisiliquum* O.E. Schulz, *Mostacillastrum elongatum* O.E. Schulz, *Sisymbrium elongatum* (O.E. Schulz) Romanczuk, *Sisymbrium orbignyanum* E. Fourn.

Hierba. Nativa. 700-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Mostacillastrum pectinifolium (Al-

Shehbaz) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium pectinatifolium* Al-Shehbaz
Hierba. Nativa. 2300-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Mostacillastrum sagittatum (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis sagittata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium ciliatum* Phil., *Sisymbrium fruticosum* Reiche, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *ciliatum* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn., *Sisymbrium volckmannii* Phil., *Sophia sagittata* (Hook. & Arn.) Macloskie

Hierba. Endémica. 100-3700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME).

Mostacillastrum saltaensis Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2100-2400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Mostacillastrum stenophyllum

(Gillies ex Hook. & Arn.) O.E. Schulz
Sin.: *Hesperis stenophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium stenophyllum* Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 300-1200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SLU, SDE, TUC).

Mostacillastrum subscandens (Speg.) Al-Shehbaz

Sin.: *Descurainia subscandens* (Speg.) Gilg & Muschl., *Erucastrum obtusangulum* Hieron., hom. illeg., *Sisymbrium subscandens* Speg., *Sophia subscandens* (Speg.) Macloskie

Hierba. Endémica.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE).

Mostacillastrum ventanense

(Boelcke) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium perenne* Speg., hom. illeg., *Sisymbrium ventanense* Boelcke
Hierba. Endémica. 300-800 m.
Países: ARG(BAI).

Nasturtium W.T. Aiton, nom. cons.

Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb.

Sin.: *Rorippa microphylla* (Boenn. ex Rchb.) Hyl. ex A. Löve & D. Löve, *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek subsp. *microphyllum* (Boenn. ex Rchb.) O. Bòlos & Vigo, *Nasturtium officinale* W.T. Aiton var. *microphyllum* (Boenn. ex Rchb.) Beck ex Thell.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(ERI).
CHL(VAL, LBO).

Nasturtium officinale W.T. Aiton

Sin.: *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek, *Nasturtium fontanum* (Lam.) Asch., *Nasturtium siifolium* Phil., *Sisymbrium nasturtium-aquaticum* L.

Hierba. Introducida. 0-4100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS).
CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).
PRY(CEN).
URY(MON, ROC).

Neslia Desv., nom. cons.

Neslia paniculata (L.) Desv.

Sin.: *Myagrammum paniculatum* L., *Vogelia paniculata* (L.) Hornem.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SFE).

Neuontobotrys O.E. Schulz

Neuontobotrys berningeri O.E.

Schulz

Hierba. Endémica. 0-3200 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Neuontobotrys choiquense

(Romanczuk) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium choiquense*

Romanczuk

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Neuontobotrys elloanensis Al-

Shehbaz

Hierba. Endémica. 3500 m.

Países: CHL(ANT).

Neuontobotrys frutescens (Gillies ex

Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis frutescens* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium catamarcense* Romanczuk, *Sisymbrium frutescens* Gillies ex Hook. & Arn., *Sisymbrium tomentosum* Romanczuk, *Sisymbrium tomentosum* Romanczuk var. *pauciovulatum* Romanczuk

Hierba o arbusto. Endémica. 800-2700 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Neuontobotrys grayana (Baehni &

J.F.Macbr.) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium amplexicaule* A. Gray, hom. illeg., *Sisymbrium grayanum* Baehni & J.F. Macbr.

Hierba o subarbusto. Nativa. 2600-3300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Neuontobotrys intricatissima (Phil.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Draba intricatissima* Phil., *Eremodraba intricatissima* (Phil.) O.E. Schulz, *Hesperis intricatissima* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium intricatissimum* (Kuntze) O.E. Schulz

Hierba. Nativa. 1400-2900 m.

Países: CHL(TAR).

Neuontobotrys lanata (Walp.) Al-

Shehbaz

Sin.: *Arabis lanata* Walp., *Hesperis foliosa* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *pubescens* Phil. ex Reiche, *Sisymbrium donnarosae* Martic., *Sisymbrium foliosum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium lanatum* (Walp.) O.E. Schulz var. *fragile* (Wedd.) O.E. Schulz, *Sisymbrium lanatum* (Walp.) O.E. Schulz,

Sisymbrium pubescens (Phil. ex Reiche)

O.E. Schulz, *Sisymbrium pubescens* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz var. *glabrescens* O.E. Schulz

Hierba o subarbusto. Nativa. 2400-4100 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,

COQ, RME).

Neuontobotrys linearifolia (Kuntze)

Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis linearifolia* Kuntze, *Neuontobotrys linifolia* O.E. Schulz, *Sisymbrium linifolium* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 100-3800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

Neuontobotrys mendocina

(Romanczuk) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium mendocinum*

Romanczuk

Hierba. Endémica. 2200-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(RME).

Neuontobotrys polyphylla (Phil.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium polyphyllum* Phil.

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(CAT). CHL(ANT).

Neuontobotrys robusta (Chodat &

Wilczek) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium robustum* Chodat & Wilczek

Subarbusto. Endémica. 2000-2600 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

Neuontobotrys tarapacana (Phil.)

Al-Shehbaz

Sin.: *Arabis tarapacana* Phil., *Cardamine desertycola* Phil., *Neuontobotrys desertycola* (Phil.) Al-Shehbaz, *Sisymbrium amplexicaule* Phil., hom. illeg., *Sisymbrium intricatissimum* (Phil.) Reiche var. *berningeri* O.E. Schulz, *Sisymbrium intricatissimum* (Phil.) Reiche var. *brachycarpum* O.E. Schulz, *Sisymbrium philippianum* I.M. Johnst., *Sisymbrium tarapacanum* Phil.

Hierba o subarbusto. Nativa. 1700-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Noccaea Moench

Noccaea magellanica (Comm. ex Poir.)

Holub

Sin.: *Draba depilis* Phil., *Thlaspi alpestre* L. var. *gracile* (Phil.) Gilg &

Muschl., *Thlaspi andicola* Hook. & Arn., *Thlaspi commutatatum* Reiche, hom. illeg., *Thlaspi exile* Phil., *Thlaspi glaucophyllum* Barnéoud, *Thlaspi gracile* Phil., *Thlaspi magellanicum* Comm. ex Poir., *Thlaspi magellanicum* Comm. ex Poir. var.

andicola (Hook. & Arn.) O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Onuris Phil.

Onuris alismatifolia Gilg ex Skottsdb.

Hierba. Endémica. 500-1100 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Onuris graminifolia Phil.

Sin.: *Draba oligosperma* Speg., hom. illeg., *Draba spegazziniana* Dusén, *Onuris graminifolia* Phil. var. *austroamericana* Boelcke, *Onuris oligosperma* (Speg.) Gilg & Muschl.

Hierba. Endémica. 1100-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Onuris hatcheriana (Gilg ex Macloskie) Gilg & Muschl.

Sin.: *Draba hatcheriana* Gilg ex Macloskie

Hierba. Endémica. 900-1800 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Onuris papillosa O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 100-1200 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Onuris spegazziniana Gilg & Muschl.

Sin.: *Draba graminifolia* Speg.

Hierba. Endémica. 600-1800 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

CHL(MAG).

Parodiodoxa O.E. Schulz

Parodiodoxa chionophila (Speg.) O.E. Schulz

Sin.: *Thlaspi chionophilum* Speg.

Hierba. Endémica. 3500-5100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Pennellia Nieuwl.

Pennellia boliviensis (Muschl.) Al-Shehbaz

Sin.: *Streptanthus boliviensis* Muschl.

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Pennellia brachycarpa Beilstein & Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 3600-3700 m.
Países: ARG(JUJ).

Pennellia yalaensis Salariato & Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 1800-1900 m.
Países: ARG(JUJ).

Petroravenia Al-Shehbaz

Petroravenia eseptata Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 4500-4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Phlebolobium O.E. Schulz

Phlebolobium maclovianum (d'Urv.)

O.E. Schulz

Sin.: *Arabis falklandica* Benth. & Hook. f., *Arabis macloviana* (d'Urv.) Hook. f., *Brassica macloviana* d'Urv., *Erysimum maclovianum* (d'Urv.) Gay ex Gaudich.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Physaria (Nutt. ex Torr. & A. Gray) A. Gray

Physaria crassistigma O'Kane & Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2100-2900 m.
Países: ARG(MEN).

Physaria lateralis O'Kane & Al-Shehbaz

Sin.: *Lesquerella mendocina* (Phil.) A. Gray var. *microcarpa* O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 1100-2400 m.
Países: ARG(COR, LRI, MEN, NEU, SJU, SLU).

Physaria mendocina (Phil.) O'Kane & Al-Shehbaz

Sin.: *Alyssum mendocinum* (Phil.) Kuntze, *Lesquerella mendocina* (Phil.) Kurtz, *Lesquerella montevidensis* (Eichler) S. Watson, *Vesicaria artica* Hook. & Arn., *Vesicaria mendocina* Phil., *Vesicaria montevidensis* Eichler
Hierba. Endémica. 200-1600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU). URY(PAY).

Physaria okanensis Al-Shehbaz & Prina

Hierba. Endémica. 4000 m.
Países: ARG(CAT).

Physaria pygmaea O'Kane & Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2500-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).

Physaria urbaniana (Muschl.) O'Kane & Al-Shehbaz

Sin.: *Alyssum boliviense* Muschl., *Alyssum urbanianum* Muschl.
Hierba. Nativa. 2000-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

Polypsecadium O.E. Schulz

Polypsecadium arnottianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis arnottiana* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium arnottianum* Gillies ex Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 700-1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).

Polypsecadium brasiliense (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium brasiliense* O.E. Schulz
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Polypsecadium gilliesii (Romanczuk) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium gilliesii* Romanczuk
Hierba. Endémica. 700-4300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Polypsecadium grandiflorum

Romanczuk & Boelcke
Hierba. Endémica. 1000-3300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Polypsecadium harmsianum

(Muschl.) O.E. Schulz
Sin.: *Polypsecadium harmsianum* (Muschl.) O.E. Schulz var. *dentatum* (Muschl.) O.E. Schulz, *Sisymbrium ragoneseanum* O.E. Schulz, *Thelypodium harmsianum* Muschl., *Thelypodium harmsianum* Muschl. var. *dentatum* Muschl.
Hierba. Nativa. 1000-3200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Polypsecadium litorale (Phil.) Al-Shehbaz

Sin.: *Hesperis litoralis* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium litorale* Phil., *Sisymbrium litorale* Phil. var. *virgatum* O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, BIO).

Polypsecadium magellanicum (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz

Sin.: *Arabis macloviana* Reiche, hom. illeg., *Arabis magellanica* (Juss. ex Pers.) Dusén, *Brassica antarctica* Molina, *Brassica magellanica* Juss. ex Pers., *Cardamine patagonica* Speg., *Hesperis magellanica* (Juss. ex Pers.) Kuntze, *Schizopetalon fuegianum* Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg. var. *glabrum* Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg. var. *hispidum* Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg., *Sisymbrium maclovianum* Speg., *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook. f., *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook. f. f. *glabrum* (Speg.) O.E. Schulz, *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook. f. f. *hispidum* (Speg.) O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Polypsecadium tucumanense (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sin.: *Sisymbrium arnottianum* Gillies ex Hook. & Arn. var. *dolichocarpum* O.E. Schulz, *Sisymbrium arnottianum* Gillies ex Hook. & Arn. var. *tucumanense* O.E. Schulz, *Sisymbrium tucumanense* (O.E. Schulz) Romanczuk, *Sisymbrium tucumanense* (O.E. Schulz) Romanczuk var. *rigidocarpum* Romanczuk
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Polypsecadium zoellneri Al-Shehbaz

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Raphanus L.

Raphanus raphanistrum L.

Hierba. Introducida. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(COA, ITA). URY(MAL).

Raphanus sativus L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE). PRY(MIE). URY(MON, RNO, SAO, SOR).

Rapistrum Crantz, nom. cons.**Rapistrum rugosum** (L.) All.

Sin.: *Myagrum rugosum* L.
 Hierba. Introducida. 0-2000 m.
 Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, IPA). PRY(CEN). URY(MAL, MON).

Rorippa Scop.**Rorippa austroamericana** Mart.-Laborde

Hierba. Endémica. 2000-4300 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, LLA, RME).

Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie var. **bonariensis**

Sin.: *Cardamine indica* (L.) Kuntze var. *bonariensis* (Poir.) Kuntze, *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC., *Nasturtium indicum* (L.) DC. subsp. *bonariense* (Poir.) Kuntze & Muschl., *Nasturtium macrorrhizum* Steud., *Nasturtium pamparum* Speg., *Nasturtium tweediei* O.E. Schulz, *Rorippa pamparum* (Speg.) Cabrera, *Sisymbrium bonariense* Poir.
 Hierba. Nativa. 0-2400 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(RME). URY(COL, FLA, MON).

Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie var. **chacoensis** Mart.-Laborde

Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). PRY(COA).

Rorippa burkartii (Mart.-Laborde) Al-Shehbaz

Sin.: *Rorippa bonariensis* (Poir.) Macloskie var. *burkartii* Mart.-Laborde
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, ERI, MIS).

Rorippa clandestina (Spreng.) J.F. Macbr.

Sin.: *Cardamine clandestina* (Spreng.) Kuntze, *Nasturtium clandestinum* Spreng., *Nasturtium clandestinum* Spreng. var. *brevistylum* O.E. Schulz, *Nasturtium clandestinum* Spreng. var. *sodiroyi* O.E. Schulz, *Nasturtium pumilum* Cambess., *Rorippa clandestina* (Spreng.)

J.F. Macbr. var. *sodiroyi* (O.E. Schulz) J.F. Macbr.

Hierba. Nativa. 300-2200 m.
 Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS). BRA(RGS). PRY(APA).

Rorippa coxii (F. Phil. ex Phil.) L.E. Navas

Sin.: *Nasturtium coxi* F. Phil. ex Phil., *Nasturtium patens* Phil., *Rorippa ventanensis* Boelcke, *Sisymbrium laciniosum* Phil., *Turritis chilensis* Phil. ex Reiche
 Hierba. Endémica. 100-300 m.
 Países: ARG(BAI, COR). CHL(VAL, ARA, RME).

Rorippa dubia (Pers.) H. Hara

Sin.: *Nasturtium dubium* (Pers.) Kuntze, *Nasturtium sinapis* (Burm. f.) O.E. Schulz, *Rorippa sinapis* (Burm. f.) J.F. Macbr., comb. superfl., *Rorippa sinapis* (Burm. f.) Ohwi & Hara, p.p., *Sisymbrium dubium* Pers., *Sisymbrium sinapis* Burm. f.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, MIS, TUC). BRA(PAR).

Rorippa hilariana (Walp.) Cabrera

Sin.: *Cardamine hilariana* Walp., *Cardamine nasturtioides* Cambess., hom. illeg., *Nasturtium hilarianum* (Walp.) Hauman, *Nasturtium nasturtioides* Herter, *Nasturtium platense* Speg.
 Hierba. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, RNE, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(CAS, MON, PAY, ROC).

Rorippa mandonii (E. Fourn.) Mart.-Laborde

Sin.: *Diplotaxis vernalis* Phil., *Hesperis mandonii* (E. Fourn.) Kuntze, *Nasturtium eggersii* O.E. Schulz, *Rorippa eggersii* (O.E. Schulz) J.F. Macbr., *Sisymbrium mandonii* E. Fourn.

Hierba. Nativa. 100-3000 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU).

Rorippa nana (Schltdl.) J.F. Macbr.

Sin.: *Kardanoglyphos nana* Schltdl., *Mathewsia boliviana* Gilg & Muschl., *Mathewsia diffusa* Rusby, *Nasturtium nanum* (Schltdl.) Wedd., *Nasturtium nanum* (S. Watson) Kuntze, hom. illeg., *Radicula nana* (Wedd.) Druce, *Radicula nana* (Schltdl.) Rusby, hom. illeg.
 Hierba. Nativa. 2400-4400 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Rorippa palustris (L.) Besser

Sin.: *Nasturtium palustre* (L.) DC., *Sisymbrium palustre* (L.) Pollich, *Sisymbrium amphibium* L. var. *palustre* L.
 Hierba. Introducida. 100-1600 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE). BRA(PAR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Rorippa philippiana Macloskie

Sin.: *Descurainia chubutica* O.E. Schulz, *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC. var. *micranthum* (Phil.) Reiche, *Nasturtium micranthum* Phil., hom. illeg., *Nasturtium philippianum* Speg., nom. illeg., *Rorippa chubutica* (O.E. Schulz) Mart.-Laborde
 Hierba. Endémica. 0-2900 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Rorippa sylvestris (L.) Besser

Sin.: *Cardamine silvestris* (L.) Kuntze, *Nasturtium sylvestre* (L.) W.T. Aiton, *Sisymbrium sylvestre* L.
 Hierba. Introducida. 0-600 m.
 Países: ARG(CHU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Sarcodraba Gilg & Muschl.**Sarcodraba andina** O.E. Schulz

Sin.: *Ateixa andina* (O.E. Schulz) Ravenna
 Hierba. Endémica. 3000-4500 m.
 Países: ARG(LRI, SJU).

Sarcodraba dusenii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sin.: *Grammosperma dusenii* O.E. Schulz
 Hierba. Endémica. 500-1000 m.
 Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Sarcodraba karraikensis (Speg.) Gilg & Muschl.

Sin.: *Draba karraikensis* Speg., *Draba karraikensis* Speg. var. *major* Speg., *Draba karraikensis* Speg. var. *minor* Speg., *Sarcodraba karraikensis* (Speg.) Gilg & Muschl. var. *major* (Speg.) O.E. Schulz, *Sarcodraba karraikensis* (Speg.) Gilg & Muschl. var. *minor* (Speg.) O.E. Schulz
 Hierba. Endémica. 400-800 m.
 Países: ARG(SCR).

Sarcodraba subterranea O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(SCR).

Schizopetalon Sims

Schizopetalon arcuatum Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: CHL(ATA).

Schizopetalon bipinnatifidum Phil.
Hierba. Endémica. 300-2400 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Schizopetalon biseriatum Phil.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Schizopetalon brachycarpum Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 2100-2300 m.
Países: CHL(RME).

Schizopetalon corymbosum Al-Shehbaz
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL).

Schizopetalon dentatum (Barnéoud) Gilg & Muschl.
Sin.: *Diploxaxis chilensis* Barnéoud, *Perreymondia dentata* Barnéoud, *Perreymondia multifida* Barnéoud, *Perreymondia viridis* Phil., *Schizopetalon viride* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 600-2300 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Schizopetalon maritimum Barnéoud
Sin.: *Schizopetalon gayanum* Barnéoud
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Schizopetalon rupestre (Barnéoud) Reiche
Sin.: *Perreymondia brongniartii* Barnéoud, *Perreymondia rupestris* Barnéoud, *Schizopetalon brongniartii* (Barnéoud) Reiche, *Schizopetalon dentatum* (Barnéoud) Gilg & Muschl. var. *san-romanii* (Phil.) Gilg & Muschl., *Schizopetalon san-romanii* Phil., *Schizopetalon walkeri* Sims var. *brongniartii* (Barnéoud) Gilg & Muschl.
Hierba. Endémica. 1900-4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL).

Schizopetalon tenuifolium Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA).

Schizopetalon walkeri Sims
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Sibara Greene

Sibara anethifolia (Phil.) Al-Shehbaz
Sin.: *Heterothrix anethifolia* (Phil.) O.E. Schulz, *Nasturtium anethifolium* Phil., *Sisymbrium carnosulum* Phil., *Werdermannia anethifolia* (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Sibara dilloniorum Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT).

Sibara macrostachya (Phil.) Al-Shehbaz
Sin.: *Nasturtium macrostachyum* Phil., *Sisymbrium larranagae* Phil., *Sisymbrium macrostachyum* Phil., *Sisymbrium pectinatum* Reiche, *Werdermannia macrostachya* (Phil.) O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ANT).

Sibara mendocina (Boelcke & S.C. Arroyo) Al-Shehbaz
Sin.: *Werdermannia mendocina* Boelcke & S.C. Arroyo
Subarbusto. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(MEN).

Sibara pinnata (Barnéoud) Al-Shehbaz
Sin.: *Nasturtium deserticola* Phil., *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud var. *pubescens* Barnéoud, *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud, *Werdermannia pinnata* (Barnéoud) O.E. Schulz
Hierba. Endémica. 2800
Países: CHL(ANT, ATA).

Sibara tehuelches (Speg.) Al-Shehbaz
Sin.: *Pterygiosperma tehuelches* (Speg.) O.E. Schulz, *Sisymbrium pinnatum* Speg., hom. illeg., *Sisymbrium tehuelches* Speg., *Streptanthus tehuelches* (Speg.) Gilg & Muschl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Sinapis L.

Sinapis alba L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, TDF).

Sinapis arvensis L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, RNE, SFE, TDF).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ).
PRY(APY).

Sisymbrium L.

Sisymbrium altissimum L.
Hierba. Introducida. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO).

Sisymbrium austriacum Jacq.
Sin.: *Sisymbrium berterioanum* Phil.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, ARA, LLA, RME).

Sisymbrium erysimoides Desf.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(DFE).

Sisymbrium irio L.
Hierba. Introducida. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC).
CHL(AYP, ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, MAG, RME). URY(MON).

Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Sin.: *Erysimum officinale* L.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE). URY(CAS, FLA, MON, SOR).

Sisymbrium orientale L.
Hierba. Introducida. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).
URY(MON).

Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(SCR).

Stenodraba O.E. Schulz

Stenodraba chillanensis (Phil.) O.E. Schulz
Sin.: *Draba chillanensis* Phil., *Weberbaueria chillanensis* (Phil.) Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 2000-2900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Stenodraba colchaguensis

(Barnéoud) O.E. Schulz

Sin.: *Arabis colchaguensis* (Barnéoud) Turcz., *Arabis drabaeformis* Schltdl., *Braya pusilla* A. Gray, *Cardamine colchaguensis* Barnéoud, *Draba andina* Phil., *Draba patagonica* Phil., *Erysimum pusillum* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Hesperis colchaguensis* (Barnéoud) Kuntze, *Hesperis pusilla* (A. Gray) Kuntze, *Sisymbrium colchaguensis* (Barnéoud) Wedd. ex E. Fourn., *Sisymbrium pusillum* (A. Gray) Wedd. ex E. Fourn., hom. illeg., *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz var. *hirticaulis* O.E. Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz var. *patagonica* (Phil.) O.E. Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz var. *stylosa* O.E. Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz, *Stenodraba patagonica* (Phil.) Ravenna, *Stenodraba pusilla* (A. Gray) Boelcke var. *patagonica* (Phil.) Boelcke, *Stenodraba pusilla* (A. Gray) Boelcke, *Weberbaueria colchaguensis* (Barnéoud) Al-Shehbaz, *Weberbaueria pusilla* (A. Gray) O.E. Schulz

Hierba. Nativa. 500-3700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, MAU, LLA, AIS, MAG, RME).

Stenodraba imbricatifolia

(Barnéoud) O.E. Schulz

Sin.: *Braya imbricatifolia* (Barnéoud) A. Gray, *Draba imbricatifolia* Barnéoud, *Hesperis imbricatifolia* (Barnéoud) Kuntze, *Sisymbrium imbricatifolium* (Barnéoud) Wedd., *Stenodraba imbricatifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glabrata* O.E. Schulz, *Weberbaueria imbricatifolia* (Barnéoud) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2800-4200 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Stenodraba lagunae (O.E. Schulz)

Salariato & Al-Shehbaz

Sin.: *Weberbaueria lagunae* (O.E. Schulz) Al-Shehbaz, *Stenodraba suffruticosa* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *lagunae* O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 3800-4000 m.

Países: CHL(ATA).

Stenodraba lechleri (E. Fourn.)

Ravenna

Sin.: *Hesperis lechleri* (E. Fourn.) Kuntze, *Hesperis petraea* Kuntze, *Heterothrix petraea* (Kuntze) O.E. Schulz, *Pennellia lechleri* (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey, *Pennellia petraea* (Kuntze) O.E. Schulz, *Sisymbrium*

caespitosum Phil., *Sisymbrium fastigiatum* Phil., *Sisymbrium lechleri* E. Fourn., *Sisymbrium petraeum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium stenophyllum* Schltdl., hom. illeg., *Stenodraba fastigiata* (Phil.) Ravenna, *Stenodraba glareosa* Ravenna, *Weberbaueria lechleri* (E. Fourn.) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 300-2100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, BIO, ARA, RME).

Stenodraba parvifolia (Phil.) O.E. Schulz

Sin.: *Pennellia parvifolia* (Phil.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey, *Sisymbrium hispidum* Phil., hom. illeg., *Sisymbrium parvifolium* Phil., *Sisymbrium vestitum* (Ravenna) Al-Shehbaz, *Stenodraba vestita* Ravenna, *Weberbaueria parvifolia* (Phil.) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 1500-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Stenodraba stenophylla (Leyb.) O.E. Schulz

Sin.: *Draba cauquenensis* Phil., *Draba leyboldii* Phil., *Draba stenophylla* Leyb., *Stenodraba stenophylla* (Leyb.) O.E. Schulz var. *leyboldii* (Phil.) O.E. Schulz, *Weberbaueria stenophylla* (Leyb.) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: CHL(MAU, RME).

Stenodraba suffruticosa (Barnéoud)

O.E. Schulz

Sin.: *Draba imbricatifolia* Barnéoud var. *suffruticosa* (Barnéoud) Reiche, *Draba suffruticosa* Barnéoud, *Hesperis suffruticosa* (Barnéoud) Kuntze, *Sisymbrium suffruticosum* (Barnéoud) E. Fourn., *Weberbaueria suffruticosa* (Barnéoud) Al-Shehbaz

Hierba. Endémica. 3300-4100 m.

Países: CHL(COQ).

Strigosella Boiss.**Strigosella africana** (L.) Botsch.

Sin.: *Hesperis africana* L., *Malcolmia africana* (L.) W.T. Aiton

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Teesdalia R. Br.**Teesdalia nudicaulis** (L.) R. Br.Sin.: *Iberis nudicaulis* L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(MAG).

Thlaspi L.**Thlaspi arvense** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT, MAG).

Tomostima Raf.**Tomostima australis** (R. Br.) Al-

Shehbaz, M. Koch & Jordon-Thaden

Sin.: *Draba ameghinoi* Speg., *Draba argentina* Speg., *Draba argentina* Speg. var. *grandiflora* Speg., *Draba argentina* Speg. var. *latifolia* Speg., *Draba australis* R. Br., *Draba australis* R. Br. var. *ameghinoi* (Speg.) Kurtz, *Draba australis* R. Br. var. *uruguayana* Arechav. ex Kurtz, *Draba australis* R. Br. f. *uruguayana* (Arechav. ex Kurtz) O.E. Schulz

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, MAG). URY(PAY).

Trichotolinum O.E. Schulz**Trichotolinum deserticola** (Speg.)

O.E. Schulz

Sin.: *Descurainia deserticola* (Speg.) Speg., *Descurainia deserticola* (Speg.) Gilg & Muschl., comb. illeg., *Sisymbrium deserticola* Speg., *Sophia deserticola* (Speg.) Macloskie

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Tropidocarpum Hook.**Tropidocarpum lanatum** (Barnéoud)

Al-Shehbaz & R.A. Price

Sin.: *Agallis lanata* (Barnéoud) Gilg & Muschl. ex O.E. Schulz, *Agallis montana* Phil., *Lepidium lanatum* Barnéoud

Hierba. Endémica. 200-900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Weberbaueria Gilg & Muschl.**Weberbaueria densifolia** Al-Shehbaz

Hierba. Nativa. 4200-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ).

Weberbaueria herzogii (O.E. Schulz)

Al-Shehbaz

Sin.: *Sarcodraba herzogii* O.E. Schulz

Hierba. Nativa. 3100-4700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Weberbaueria peruviana (DC.) Al-Shehbaz

Sin.: *Arabis bracteata* Wedd., *Hesperis peruviana* (DC.) Kuntze, *Sisymbrium anomalum* Wedd., *Sisymbrium peruvianum* DC.

Hierba. Nativa. 2800-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Weberbaueria spathulifolia (A. Gray) O.E. Schulz

Sin.: *Arabis spathulata* Walp., nom. illeg., *Braya densiflora* Muschl., *Hesperis orophila* (Wedd.) Kuntze, *Hesperis spathulifolia* (A. Gray) Kuntze, *Sisymbrium oliganthum* Wedd., *Sisymbrium orophilum* Wedd., *Sisymbrium septaceum* Wedd., *Sisymbrium spathulifolium* A. Gray, *Weberbaueria densiflora* (Muschl.) Gilg & Muschl., *Weberbaueria spathulifolia* (A. Gray) O.E. Schulz var. *integrifolia* O.E. Schulz
Hierba. Nativa. 3600-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).

Xerodraba Skottsrb.

Xerodraba colobanthoides Skottsrb.

Sin.: *Eudema colobanthoides* (Skottsrb.) O.E. Schulz, *Skottsbergianthus colobanthoides* (Skottsrb.) Boelcke, *Skottsbergianthus sorianoii* (Boelcke) Boelcke, *Skottsbergiella colobanthoides* (Skottsrb.) Boelcke, *Skottsbergiella sorianoii* Boelcke
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU).

Xerodraba glebaria (Speg.) Skottsrb.

Sin.: *Braya glebaria* Speg., *Eudema glebaria* (Speg.) Gilg & Muschl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Xerodraba lycopodioides (Speg.)

Skottsrb.
Sin.: *Braya lycopodioides* Speg. var. *contracta* Speg., *Braya lycopodioides* Speg., *Braya pectinata* Speg., *Eudema lycopodioides* (Speg.) Gilg & Muschl., *Eudema pectinata* (Speg.) Gilg & Muschl., *Xerodraba lycopodioides* (Speg.) Skottsrb. var. *contracta* (Speg.) O.E. Schulz, *Xerodraba pectinata* (Speg.) Skottsrb.
Subarbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Xerodraba monantha (Gilg ex Kuntze) Skottsrb.

Sin.: *Braya monantha* (Gilg ex Kuntze)

Speg., *Draba monantha* Gilg ex Kuntze, *Eudema monantha* (Gilg ex Kuntze) Gilg & Muschl.

Hierba. Endémica.
Países: ARG(SCR).

Xerodraba patagonica (Speg.)

Skottsrb. subsp. **patagonica**
Sin.: *Braya patagonica* Speg., *Draba monantha* Gilg ex Kuntze var. *microphylla* Gilg, nom. nud. *Eudema patagonica* (Speg.) Gilg & Muschl.
Subarbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Xerodraba patagonica (Speg.)

Skottsrb. subsp. **pyncophylloides** (Speg.) Salariao & Al-Shehbaz
Sin.: *Braya pyncophylloides* Speg., *Eudema microphylla* Gilg & Muschl., *Eudema pyncophylloides* (Speg.) Gilg & Muschl., *Xerodraba microphylla* (Gilg & Muschl.) Skottsrb., *Xerodraba pyncophylloides* (Speg.) Skottsrb., *Xerodraba pyncophylloides* (Speg.) Skottsrb. var. *microphylla* (Gilg & Muschl.) O.E. Schulz
Subarbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Zuloagocardamum Salariao & Al-Shehbaz

Zuloagocardamum jujuyensis

Salariao & Al-Shehbaz
Hierba. Endémica. 3700 m.
Países: ARG(JUJ).

BROMELIACEAE

Acanthostachys Klotzsch

Acanthostachys strobilacea (Schult. f.) Klotzsch

Sin.: *Acanthostachys exilis* Bertoni, *Hohenbergia strobilacea* Schult. f.
Hierba epífita. Nativa. 700-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

Aechmea Ruiz & Pav., nom. cons.

Aechmea apocalyptic Reitz

Sin.: *Ortgiesia apocalyptic* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea bicolor L.B. Sm.

Sin.: *Ortgiesia bicolor* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Endémica. 400-500 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea blumenavii Reitz var. **alba** Reitz

Sin.: *Ortgiesia blumenavii* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *alba* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Endémica. 300-800 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea blumenavii Reitz var.

blumenavii

Sin.: *Ortgiesia blumenavii* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker

Sin.: *Aechmea pulchra* (Beer) Mez, *Aechmea tinctoria* (Mart.) Mez, *Macrochordion bromeliifolium* (Rudge) Beer, *Tillandsia bromeliifolia* Rudge
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE).

Aechmea calyculata (E. Morren) Baker var. **calyculata**

Sin.: *Aechmea gamosepala* A. Cast., nom. illeg., *Aechmea selloana* Baker, *Aechmea thyrsgera* Speg., *Chevaliera thyrsgera* (Speg.) Mez, *Hohenbergia calyculata* (E. Morren) Baker, *Hoplophytum calyculatum* E. Morren, *Macrochordion luteum* Regel & Linden, *Macrochordion nudiusculum* K. Koch, *Ortgiesia calyculata* (E. Morren) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 100-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea calyculata (E. Morren) Baker var. **variegata** Strehl

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 500-600 m.
Países: BRA(RGS).

Aechmea candida E. Morren ex Baker

Sin.: *Ortgiesia candida* (E. Morren ex Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Aechmea caudata Lindm.

Sin.: *Aechmea caudata* Lindm.
var. *variegata* M.B. Foster, *Aechmea henningsiana* Wittm., *Aechmea platzmannii* Wittm., *Ortgiesia caudata* (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba terrestre, epífita o rupícola.
Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea coelestis (K. Koch) E. Morren

Sin.: *Hohenbergia coelestis* (K. Koch) Baker, *Hoplophytum coeleste* K. Koch, *Ortgiesia coelestis* (K. Koch) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Nativa. 600-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aechmea cylindrata Lindm.

Sin.: *Aechmea cylindrata* Lindm. var. *micrantha* Lindm., *Aechmea hyacinthus* F. Muell., *Ortgiesia cylindrata* (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea dealbata E. Morren ex Baker

Sin.: *Aechmea esseri* E. Gross & Rauh, *Platyachmea dealbata* (E. Morren ex Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Aechmea distichantha Lem. f. **albiflora** L.B. Sm.

Sin.: *Platyachmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress f. *albiflora* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg.
Hierba epífita. Endémica. 300-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Aechmea distichantha Lem. f. **distichantha**

Sin.: *Aechmea excavata* Baker, *Aechmea hookeri* Lem., *Aechmea platyphylla* Hassl., *Aechmea polystachia* (Vell.) Mez var. *excavata* (Baker) Mez, *Aechmea polystachia* (Vell.) Mez var. *myriophylla* Hassl., *Aechmea polystachia* (Vell.) Mez, *Hohenbergia distichantha* (Lem.) Baker, *Platyachmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 700-2200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Aechmea distichantha Lem. var. **glaziovii** (Baker) L.B. Sm.

Sin.: *Aechmea glaziovii* Baker, *Platyachmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *glaziovii* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 800-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Aechmea distichantha Lem. var. **schlumbergeri** E. Morren ex Mez

Sin.: *Aechmea grandiceps* (Griseb.) Mez, *Aechmea polystachia* (Vell.) Mez var. *longifolia* A. Cast., *Chevaliera grandiceps* Griseb., *Platyachmea distichantha* (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *schlumbergeri* (E. Morren ex Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 200-1800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Aechmea gamosepala Wittm. var. **gamosepala**

Sin.: *Aechmea gamosepala* Wittm. var. *angustifolia* Wittm., *Ortgiesia gamosepala* (Wittm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea gamosepala Wittm. var. **nivea** Reitz

Sin.: *Ortgiesia gamosepala* (Wittm.) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *nivea* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea gracilis Lindm.

Sin.: *Ortgiesia gracilis* (Lindm.) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Aechmea joannis Strehl var. **joannis**

Sin.: *Aechmea joannis* Strehl var. *alvipetala* Strehl
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Aechmea kertesziae Reitz var. **kertesziae**

Sin.: *Ortgiesia kertesziae* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea kertesziae Reitz var. **viridi-aurata** Reitz

Sin.: *Ortgiesia kertesziae* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *viridi-aurata* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Endémica. 300-800 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea kleinii Reitz

Sin.: *Pothuava kleinii* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Endémica. 1000-1300 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea leppardii Philcox

Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea lindenii (E. Morren) Baker var. **lindenii**

Sin.: *Aechmea comata* (Gaudich.) Baker, comb. illeg., *Hoplophytum lindenii* E. Morren, *Macrochordion lindenii* (E. Morren) Wittm., *Ortgiesia lindenii* (E. Morren) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava comata* Gaudich., nom. illeg.
Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Aechmea lindenii (E. Morren) Baker var. **makoyana** Mez

Sin.: *Aechmea comata* (Gaudich.) Baker var. *makoyana* (Mez) L.B. Sm., nom. illeg.
Hierba epífita. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(SCA).

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

Sin.: *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *cuspidata* Baker, *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *flavomarginata* E. Pereira, *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *tabuleirensis* Reitz, *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. f. *tabuleirensis* (Reitz) Reitz, *Pothuava nudicaulis* (L.) Regel var. *cuspidata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava nudicaulis* (L.) Regel var. *flavomarginata* (E. Pereira) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava spicata* Gaudich., nom. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea organensis Wawra

Sin.: *Aechmea caudata* Lindm. var. *eipperii* Reitz, *Ortgiesia organensis* (Wawra) L.B. Sm. & W.J. Kress
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aechmea ornata Baker

Sin.: *Aechmea hystrix* E. Morren, *Aechmea ornata* Baker var. *hoehneana* L.B. Sm., *Aechmea ornata* Baker var. *nationalis* Reitz, *Chevaliera ornata* Gaudich., nom. illeg., *Echinostachys hystrix* (E. Morren) Wittm., *Pothuava ornata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava ornata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *hoehneana* (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Pothuava ornata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *nationalis* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aechmea pectinata Baker

Sin.: *Aechmea crocophylla* (E. Morren) Baker, *Chevaliera crocophylla* E. Morren, *Pothuava pectinata* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aechmea pimentivelosoi Reitz

Sin.: *Aechmea pimentivelosoi* Reitz var. *glabra* Reitz, *Aechmea pimentivelosoi* Reitz var. *etomentosa* Reitz, nom. nud., *Ortgiesia pimentivelosoi* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Ortgiesia pimentivelosoi* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *glabra* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Endémica. 300-400 m.

Países: BRA(SCA).

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.

Sm. var. *albobracteata* Strehl

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(RGS).

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.

Sm. var. *benrathii* (Mez) Reitz

Sin.: *Aechmea benrathii* Mez, *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *benrathii* (Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(SCA).

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.

Sm. var. *ortgiesii* (Baker) Reitz

Sin.: *Aechmea ortgiesii* Baker, *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress var. *ortgiesii* (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Ortgiesia tillandsioides* Regel

Hierba epífita o terrestre. Nativa.

0-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.

Sm. var. *recurvata*

Sin.: *Aechmea ampullacea* Mez var. *longifolia* Hassl., *Aechmea ampullacea* Mez, *Aechmea guaratubensis* E. Pereira, *Macrochordion recurvatum* Klotzsch, *Ortgiesia guaratubensis* (E. Pereira) L.B. Sm. & W.J. Kress, *Ortgiesia recurvata* (Klotzsch) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA). URY(CLA, RNO, TAC).

Aechmea rubroaristata Leme & Fraga

Hierba. Endémica. 1100-1500 m.

Países: BRA(SCA).

Aechmea triangularis L.B. Sm.

Hierba. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Aechmea winkleri Reitz

Sin.: *Ortgiesia winkleri* (Reitz) L.B. Sm. & W.J. Kress

Hierba epífita. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Ananas Mill.**Ananas ananassoides** (Baker) L.B. Sm.

Sin.: *Acanthostachys ananassoides* Baker, *Ananas guaraniticus* Bertoni

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, SPE).

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. f.

var. *bracteatus*

Sin.: *Ananassa bracteata* Lindl., *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f. var. *rudis* Bertoni

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, PAI).

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. f.

var. *tricolor* (Bertoni) L.B. Sm.

Sin.: *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f. var. *striatus* M.B. Foster, *Ananas comosus* (L.) Merr. var. *tricolor* (Bertoni) Camargo

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(RGS). PRY(APA, PAI).

Ananas fritzmuelleri Camargo

Sin.: *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. f. var. *albus* L.B. Sm.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Billbergia Thunb.**Billbergia alfonsi-joannis** Reitz

Hierba epífita. Nativa. 700-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. var. **amoena**

Sin.: *Billbergia amoena* (Lodd.) Lindl. var. *rubra* M.B. Foster, *Tillandsia amoena* Lodd.

Hierba epífita o terrestre. Nativa.

0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. var.

viridis L.B. Sm.

Hierba epífita o terrestre. Nativa.

0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Billbergia distachia (Vell.) Mez var.

concolor Reitz

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

Billbergia distachia (Vell.) Mez var.

distachia

Sin.: *Tillandsia distachia* Vell.

Hierba epífita o terrestre. Nativa.

0-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Billbergia distachia (Vell.) Mez var.

maculata Reitz

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Billbergia distachia (Vell.) Mez var.

straussiana (Wittm.) L.B. Sm.

Sin.: *Billbergia bakeri* E. Morren var. *straussiana* Wittm.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Billbergia magnifica Mez var.

acutisepala Hassl.

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Billbergia magnifica Mez var.

magnifica

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel

Sin.: *Billbergia bonplandiana* Gaudich. ex Mez, *Billbergia linearifolia* Baker, *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel var. *striata* Reitz

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI). URY(MON, RIV).

Billbergia porteana Brongn. ex Beer
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.
Sin.: *Bromelia pyramidalis* Sims
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Billbergia schimperiana Wittm. ex Baker
Sin.: *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel var. *schimperiana* (Wittm. ex Baker) Mez, *Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel f. *rupestris* Hassl.
Hierba epífita. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(SCA). PRY(Desconocida).

Billbergia zebrina (Herb.) Lindl.
Sin.: *Billbergia cantherae* André,
Bromelia zebrina Herb.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART).

Bromelia Plum. ex L.

Bromelia antiacantha Bertol.
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, RIV, ROC).

Bromelia balansae Mez
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Bromelia hieronymi Mez
Hierba. Nativa. 400-700 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Bromelia serra Griseb.
Sin.: *Rhodostachys argentina* Baker
Hierba. Nativa. 100-1200 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, PAI, PHA).

Catopsis Griseb.

Catopsis berteroniana (Schult. f.) Mez
Sin.: *Catopsis mosenii* Mez, *Tillandsia berteroniana* Schult. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez
Sin.: *Catopsis modesta* F.J. Müll.,
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez var. *dioica* L.B. Sm., *Tillandsia sessiliflora* Ruiz & Pav.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Deinacanthon Mez

Deinacanthon urbanianum (Mez) Mez
Sin.: *Bromelia urbaniana* (Mez) L.B. Sm., *Rhodostachys urbaniana* Mez
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CHO, PHA).

Deuterocohnia Mez

Deuterocohnia brevifolia (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Sin.: *Abromeitiella brevifolia* (Griseb.) A. Cast. subsp. *chlorantha* (Speg.) Schulze-Motel, *Abromeitiella brevifolia* (Griseb.) A. Cast., *Abromeitiella chlorantha* (Speg.) Mez, *Dyckia grisebachii* Baker, *Lindmania brevifolia* (Griseb.) Hauman, *Lindmania chlorantha* (Speg.) Hauman, *Mezothamnus brevifolius* (Griseb.) Harms, *Navia brevifolia* Griseb., *Pitcairnia brevifolia* (Griseb.) R.E. Fr., *Pitcairnia chlorantha* (Speg.) A. Cast., *Tillandsia chlorantha* Speg.
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Deuterocohnia chrysantha (Phil.) Mez
Sin.: *Pitcairnia chrysantha* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Deuterocohnia digitata L.B. Sm.
Hierba. Nativa. 2900 m.
Países: ARG(SAL).

Deuterocohnia haumanii A. Cast.
Hierba. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SJU, TUC).

Deuterocohnia longipetala (Baker) Mez
Sin.: *Deuterocohnia longipetala* (Baker) Mez f. *uberrima* A. Cast., *Dyckia decomposita* Baker, *Dyckia longipetala* Baker, *Puya flava* Willd. ex Baker, nom. nud., *Puya weberii* Schlumb.
Hierba. Nativa. 400-2100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Deuterocohnia lorentziana (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Sin.: *Abromeitiella abstrusa* A. Cast., *Abromeitiella lorentziana* (Mez) A. Cast., *Hepetis lorentziana* (Mez) Mez, *Pitcairnia lorentziana* Mez
Hierba. Nativa. 1700-1900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Deuterocohnia meziana Kuntze ex Mez subsp. **meziana**
Sin.: *Deuterocohnia divaricata* Mez, *Deuterocohnia paraguariensis* Hassl.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CON).

Deuterocohnia meziana Kuntze ex Mez subsp. **vallegrandensis** S.E. Gómez, Slanis & A. Grau
Hierba. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(JUJ).

Deuterocohnia meziana Kuntze ex Mez subsp. **vogtii** N.Schütz
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Deuterocohnia recurvipetala E. Gross
Hierba. Endémica. 500 m.
Países: ARG(Desconocida).
Notas: Conocida sólo de la localidad típica, Cerro Colorado, una localidad ambigua

Deuterocohnia schreiteri A. Cast.
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Deuterocohnia strobilifera Mez var. **inermis** L.B. Sm.
Hierba. Nativa. 2500-3400 m.
Países: ARG(SAL).

Dyckia Schult. f.

Dyckia affinis Baker
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(CON, PAI).

Dyckia agudensis Irgang & Sobral
Hierba. Endémica. 400 m.
Países: BRA(RGS).

Dyckia alba S. Winkl.
Hierba terrestre. Endémica. 400 m.
Países: BRA(RGS).

- Dyckia bracteata** (Wittm.) Mez
Sin.: *Dyckia dissitiflora* Schult. f. var. *bracteata* Wittm.
Hierba. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia brevifolia** Baker
Sin.: *Dyckia gemellaria* E. Morren ex Mez, *Dyckia sulphurea* K. Koch
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(SCA).
- Dyckia cabreræ** L.B. Sm. & Reitz
Hierba. Endémica. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dyckia choristaminea** Mez
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia commixta** Hassl.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA).
- Dyckia crocea** L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia delicata** Larocca & Sobral
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia deltoidea** (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Sin.: *Dyckia coccinea* Mez var. *deltoidea* L.B. Sm., *Dyckia tuberosa* (Vell.) Beer var. *deltoidea* (L.B. Sm.) L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia distachya** Hassl.
Sin.: *Dyckia distachya* Hassl. f. *induta* Hassl., *Dyckia interrupta* Mez
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA).
- Dyckia domfelicianensis** Strehl
Hierba terrestre. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia dusenii** L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dyckia elisabethæ** S. Winkl.
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia encholirioides** (Gaudich.) Mez
Sin.: *Dyckia catharinensis* K. Koch,
- Dyckia catharinensis* K. Koch var. *dentata* Wittm., *Dyckia encholirioides* (Gaudich.) Mez var. *rubra* (Wittm.) Reitz, *Encholirion catharinense* (K. Koch) Benth. & Hook. f. ex Mez, nom. nud., *Encholirion garreli* Beer, nom. illeg., *Garrelia encholirioides* Gaudich.
Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dyckia exserta** L.B. Sm.
Hierba rupícola. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).
- Dyckia ferox** Mez
Sin.: *Dyckia ferox* Mez f. *australis* Hassl., *Dyckia ferox* Mez subsp. *hamosa* (Mez) Hassl., *Dyckia ferox* Mez f. *hamosa* (Mez) A. Cast., *Dyckia ferox* Mez f. *vulgaris* Hassl., *Dyckia hamosa* Mez
Hierba. Nativa. 1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR). PRY(COA, PAI).
- Dyckia floribunda** Griseb.
Sin.: *Dyckia chaguar* A. Cast., *Dyckia gilliesii* Baker
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 800-1200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU). PRY(PAI).
- Dyckia fosteriana** L.B. Sm. var. **fosteriana**
Hierba rupícola. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia fosteriana** L.B. Sm. var. **robustior** L.B. Sm.
Hierba rupícola. Endémica. 1900 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia frigida** Hook. f.
Sin.: *Dyckia regalis* Linden & E. Morren ex Baker, nom. nud.
Hierba. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia gracilis** Mez
Hierba. Nativa. 200-500 m.
Países: ARG(CHA).
- Dyckia hatschbachii** L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 500 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia hebdingii** L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia ibicuiensis** Strehl
Hierba terrestre. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia ibiramensis** Reitz
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(SCA).
- Dyckia insignis** Hassl.
Sin.: *Dyckia grandiflora* Mez, *Dyckia insignis* Hassl. var. *flaviflora* Hassl., *Dyckia insignis* Hassl. var. *macrantha* Hassl., *Dyckia insignis* Hassl. var. *obtusiflora* Hassl.
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(CON).
- Dyckia irmgardiae** L.B. Sm.
Hierba terrestre. Endémica. 200-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia jonesiana** Strehl.
Hierba rupícola. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia julianæ** Strehl
Hierba terrestre. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia leptostachya** Baker
Sin.: *Dyckia apensis* Mez, *Dyckia conspicua* Mez, *Dyckia boliviensis* Mez, *Dyckia hassleri* Mez, *Dyckia longifolia* Mez, *Dyckia rojasii* Mez
Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA).
- Dyckia lutziana** L.B. Sm.
Hierba terrestre. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia maritima** Baker
Sin.: *Dyckia tomentosa* Mez, *Prionophyllum maritimum* (Baker) Mez
Hierba rupícola. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Dyckia microcalyx** Baker var. **microcalyx**
Sin.: *Dyckia microcalyx* Baker var. *inermis* Hassl., *Dyckia microcalyx* Baker var. *micrantha* Hassl., *Dyckia minutiflora* Mez
Hierba terrestre o rupícola. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, GUA, PAI).

- Dyckia microcalyx** Baker var. **ostenii** L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
- Dyckia minarum** Mez
Hierba rupícola. Nativa. 900-1300 m.
Países: BRA(SCA).
- Dyckia mitis** A. Cast.
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS).
- Dyckia monticola** L.B. Sm. & Reitz
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: BRA(SCA).
- Dyckia niederleinii** Mez
Sin.: *Dyckia missionum* Mez, *Dyckia missionum* Mez var. *breviflora* Hassl.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS).
- Dyckia pampeana** H. Bünker
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(TAC).
- Dyckia polycladus** L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia pontesii** H. Bünker, L. Witeck & K. Soares
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia pseudococcinea** L.B. Sm.
Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 500 m.
Países: BRA(PAR).
- Dyckia racinae** L.B. Sm.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia ragonesei** A. Cast.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE).
- Dyckia reitzii** L.B. Sm.
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **angustior** L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **montevidensis** (K. Koch) L.B. Sm.
Sin.: *Dyckia montevidensis* K. Koch, *Dyckia rariflora* Schult. f. var. *montevidensis* (K. Koch) Baker ex Hauman & Vanderveken
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, LAV, RNO, RIV).
- Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **remotiflora**
Sin.: *Dyckia rariflora* Schult. f. var. *cunninghami* Baker, *Dyckia rariflora* Schult. f. var. *remotiflora* (Otto & A. Dietr.) Baker, comb. illeg., *Dyckia vaginosa* Mez
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC).
- Dyckia remotiflora** Otto & A. Dietr. var. **tandilensis** (Speg.) Cabrera
Sin.: *Dyckia montevidensis* K. Koch var. *tandilensis* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).
- Dyckia retardata** S. Winkl.
Hierba terrestre. Endémica. 300-1200 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia retroflexa** S. Winkl.
Hierba terrestre. Endémica. 300-1200 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia rigida** Strehl
Hierba terrestre. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia selloa** (K. Koch) Baker
Sin.: *Dyckia grandifolia* Baker, *Dyckia macrantha* Baker, *Dyckia myriostachya* Baker, *Prionophyllum selloum* K. Koch
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). URY(Desconocida).
- Dyckia strehliana** H. Bünker & R. Pontes
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia subinermis** Mez
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS).
- Dyckia tobatiensis** Hassl.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: PRY(COA).
- Dyckia tomentella** Mez
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(AMA, PHA).
- Dyckia tuberosa** (Vell.) Beer
Sin.: *Dyckia coccinea* Mez, *Tillandsia tuberosa* Vell.
Hierba. Nativa. 800-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dyckia tweediei** Mez
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SAL, SDE).
- Dyckia velascana** Mez
Hierba terrestre o rupícola. Endémica. 700-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).
- Dyckia velloziifolia** Mez
Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(CAU).
- Dyckia vestita** Hassl.
Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(APY, CON, PAI).
- Dyckia vicentensis** Strehl
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia virgata** Mez
Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(PAI, PHA).
- Dyckia waechteri** Strehl
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).
- Dyckia walteriana** Leme
Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: BRA(PAR).
- Edmundoa** Leme
- Edmundoa lindenii** (Regel) Leme var. **lindenii**
Sin.: *Aechmea eburnea* (E. Morren) Baker, *Aechmea viridis* (E. Morren) Baker, *Canistrum eburneum* E. Morren, nom. illeg., *Canistrum lindenii* (Regel) Mez, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *exiguum* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *magnum* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *parvum* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez var. *pehnkii* Reitz, *Nidularium lindenii* Regel
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Edmundoa lindenii (Regel) Leme var. **rosea** (E. Morren) Leme

Sin.: *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *elatum* Reitz, nom. nud., *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *humile* Reitz, *Canistrum lindenii* (Regel) Mez f. *procerum* Reitz

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Fascicularia Mez

Fascicularia bicolor (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **bicolor**

Sin.: *Billbergia bicolor* (Ruiz & Pav.) Schult. f., *Bromelia bicolor* Ruiz & Pav., *Bromelia joinvillei* E. Morren, *Fascicularia micrantha* (Phil.) Mez, *Fascicularia parviflora* Mez, *Rhodostachys bicolor* (Ruiz & Pav.) Benth. ex Hook. f. ex Baker, *Rhodostachys micrantha* Phil.

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 600 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Fascicularia bicolor (Ruiz & Pav.) Mez subsp. **canaliculata** E.C. Nelson & Zizka

Sin.: *Bromelia albobracteata* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Fascicularia kirchhoffiana* (Wittm.) Mez, *Rhodostachys albo-bracteata* (Steud. ex Baker) Baker, *Rhodostachys pitcairniifolia* (B. Verl.) Benth. var. *kirchhoffiana* Wittm.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Fosterella L.B. Sm.

Fosterella albicans (Griseb.) L.B. Sm.

Sin.: *Cottendorfia albicans* Griseb., *Lindmania albicans* (Griseb.) Mez
Hierba rupícola. Nativa. 900-2100 m.
Países: ARG(SAL).

Fosterella penduliflora (C.H. Wright) L.B. Sm.

Sin.: *Catopsis penduliflora* C.H. Wright, *Lindmania penduliflora* (C.H. Wright) Stapf
Hierba rupícola. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Fosterella rojasii (L.B. Sm.) L.B. Sm.

Sin.: *Lindmania rojasii* L.B. Sm.
Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(AMA).

Greigia Regel

Greigia berteroi Skottsb.

Sin.: *Hesperogreigia berteroi* (Skottsb.) Skottsb.

Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: CHL(JFE).

Greigia landbeckii (Lechl. ex Phil.)

Phil. ex F. Phil.

Sin.: *Bromelia landbeckii* Lechl. ex Phil.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(BIO, LRI, LLA).

Greigia pearcei Mez

Hierba. Endémica. 100-400 m.
Países: CHL(BIO, LRI, LLA).

Greigia sphacelata (Ruiz & Pav.) Regel

Sin.: *Billbergia sphacelata* (Ruiz & Pav.) Schult. f., *Bromelia discolor* Lindl., *Bromelia crassa* Steud., nom. nud., *Bromelia clandestina* Carrière, nom. nud., *Bromelia sphacelata* Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Hohenbergia Schult. f.

Hohenbergia augusta (Vell.) E. Morren

Sin.: *Aechmea augusta* (Vell.) Baker, *Hoplophytum augustum* (Vell.) Beer, *Tillandsia augusta* Vell.

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Neoregelia L.B. Sm.

Neoregelia chlorosticta (Baker) L.B. Sm.

Sin.: *Aregelia chlorosticta* (Baker) Mez, *Billbergia chlorosticta* Baker, nom. nud., *Karatas chlorosticta* Baker, *Neoregelia marmorata* L.B. Sm., *Neoregelia sarmentosa* (Regel) L.B. Sm. var. *chlorosticta* (Baker) L.B. Sm., *Nidularium chlorosticta* E. Morren ex Baker, nom. nud., *Regelia chlorosticta* (Baker) Lindm.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Neoregelia doeringiana L.B. Sm.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR).

Neoregelia laevis (Mez) L.B. Sm.

Sin.: *Aregelia laevis* Mez, *Karatas candida* Mez, nom. illeg., *Neoregelia laevis* (Mez) L.B. Sm. f. *maculata* H. Luther, *Neoregelia maculata* L.B. Sm.

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Nidularium Lem.

Nidularium albiflorum (L.B. Sm.) Leme

Sin.: *Nidularium rubrum* Beer ex L.B. Sm. var. *albiflorum* L.B. Sm.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Nidularium amazonicum (Baker)

Linden & E. Morren ex Lindm.
Sin.: *Canistrum amazonicum* (Baker) Mez, *Karatas amazonica* Baker, *Wittrockia amazonica* (Baker) L.B. Sm., *Wittrockia smithii* Reitz
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 200-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nidularium angustibracteatum Leme

Hierba epífita o terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Nidularium angustifolium Ule

Sin.: *Nidularium viridium* E. Pereira & Leme
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 300-900 m.
Países: BRA(PAR).

Nidularium billbergioides (Schult. f.) L.B. Sm.

Sin.: *Canistropsis billbergioides* (Schult. f.) Leme, *Hohenbergia billbergioides* Schult. f., *Nidularium billbergioides* (Schult. f.) L.B. Sm. var. *citrinum* (Burch. ex Baker) Reitz, *Nidularium citrinum* Mez, *Tillandsia citrina* Burch. ex Baker
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Nidularium campo-alegrense Leme

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Nidularium campos-portoi (L.B. Sm.)

Wand. & B.A. Moreira
Sin.: *Wittrockia campos-portoi* L.B. Sm.
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Nidularium catarinense Leme
Hierba epífita. Endémica. 300-900 m.
Países: BRA(SCA).

Nidularium innocentii Lem. var. **innocentii**
Sin.: *Karatas innocentii* (Lem.)
Antoine, *Nidularium exostigmum*
Tardivo, *Nidularium innocentii* Lem. var.
paxianum (Mez) L.B. Sm., *Nidularium*
paxianum Mez

Hierba epífita o terrestre. Nativa.
0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nidularium innocentii Lem. var. **lineatum** (Mez) L.B. Sm.
Sin.: *Nidularium lineatum* Mez
Hierba epífita o terrestre. Nativa.
0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Nidularium innocentii Lem. var. **striatum** (Bull.) Wittm.
Sin.: *Nidularium innocentii* Lem. var.
bauense Reitz, *Nidularium striatum* Bull.
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 200 m.
Países: BRA(SCA).

Nidularium jonesianum Leme
Hierba epífita. Endémica. 200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Nidularium longiflorum Ule
Sin.: *Nidularium innocentii* Lem.
var. *wittmackianum* (Harms) L.B. Sm.,
Nidularium wittmackianum Harms
Hierba epífita o terrestre. Nativa.
0-1300 m.
Países: BRA(PAR).

Nidularium microps E. Morren ex Mez
Sin.: *Aregelia microps* (E. Morren
ex Mez), *Canistropsis microps* (E.
Morren ex Mez) Leme
Hierba epífita o terrestre. Nativa.
200-800 m.
Países: BRA(SCA).

Nidularium procerum Lindm.
Sin.: *Aechmea purpurea* Baker,
Canistrum purpureum E. Morren,
nom. nud., *Nidularium affine* Mez,
Nidularium gracile Tardivo, *Nidularium*
insularis E. Pereira & Leme, *Nidularium*
kermesianum F.J. Müll. ex Mez,
Nidularium porphyreum Mez, *Nidularium*
procerum Lindm. var. *kermesianum*
(F.J. Müll. ex Mez) Reitz, *Nidularium*
terminale Ule
Hierba epífita o terrestre. Nativa.
0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nidularium purpureum Beer
Sin.: *Karatas purpurea* (Beer) Antoine,
Nidularium discolor Beer
Hierba rupícola. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Nidularium rosulatum Ule
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Nidularium rutilans E. Morren
Sin.: *Nidularium regelioides* Ule
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Nidularium scheremetiewii Regel
Sin.: *Karatas scheremetiewii* (Regel)
Antoine, *Nidularium corcovadense* Ule
Hierba epífita o terrestre. Nativa.
300-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Ochagavia Phil.

Ochagavia andina (Phil.) Zizka,
Trumpler & Zoellner
Sin.: *Rhodostachys andina* Phil.
Hierba. Endémica. 700-2500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Ochagavia carnea (Beer) L.B. Sm. &
Looser
Sin.: *Bromelia carnea* Beer, *Bromelia*
lindleyana Lem., nom. illeg., *Ochagavia*
chamissonis (Mez) L.B. Sm. & Looser,
Ochagavia grandiflora (Phil.) Mez,
Pourretia argentea Wittm., nom.
nud., *Rhodostachys carnea* (Beer)
Mez, *Rhodostachys chamissonis* Mez,
Rhodostachys grandiflora Phil., *Ruckia*
elleteti Regel
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

Ochagavia elegans Phil.
Sin.: *Rhodostachys elegans* (Phil.) Mez
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(JFE).

Ochagavia litoralis (Phil.) Zizka,
Trumpler & Zoellner
Sin.: *Bromelia pitcairniifolia* (B. Verl.)
K. Koch, *Fascicularia litoralis* (Phil.) Mez,
Fascicularia pitcairniifolia (B. Verl.) Mez,
Hechtia carnea Wittm., nom. nud., *Hechtia*
pitcairniifolia B. Verl., *Ochagavia lindleyana*
Mez, *Placseptalia rebecca* Espinosa,
Rhodostachys litoralis Phil., *Rhodostachys*
pitcairniifolia (B. Verl.) Benth.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

Pitcairnia L'Hér., nom. cons.

Pitcairnia chiriguana A. Cast.
Hierba. Endémica. 600 m.
Países: ARG(SAL).

Pitcairnia flammea Lindl. var. **flammea**
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pitcairnia flammea Lindl. var. **floccosa** L.B. Sm.
Sin.: *Pitcairnia muscosa* Mart. ex Schult. f.
Hierba. Nativa. 700-1900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pitcairnia flammea Lindl. var. **glabrior** L.B. Sm.
Hierba. Nativa. 600-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pitcairnia oranensis L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 800 m.
Países: ARG(SAL).

Pitcairnia paraguayensis L.B. Sm.
Hierba terrestre o epífita. Endémica.
400-500 m.
Países: PRY(AMA).

Pitcairnia saltensis L.B. Sm.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(SAL).

Pseudananas Hassl. ex Harms

Pseudananas sagenarius (Arruda) Camargo
Sin.: *Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult.
f. var. *sagenarius* (Arruda) Bertoni,
Ananas macrodontes E. Morren, *Ananas*
sativus Schult. f. var. *macrodontes* (E.
Morren) Bertoni, *Ananas sativus* Schult.
f. var. *sagenarius* (Arruda) Bertoni,
Bromelia sagenaria Arruda, *Pseudananas*
macrodontes (E. Morren) Harms
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS,
SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CAU, CAN,
CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI).

Puya Molina

Puya alpestris (Poepp.) Gay subsp. **alpestris**
Sin.: *Pourretia alpestris* Poepp., *Puya*
pumila Ravenna, *Puya whytei* Hook. f.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU, SJU). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

- Puya alpestris** (Poepp.) Gay subsp.
zoellneri (Mez) Zizka, J.V. Schneid. & Novoa
 Sin.: *Pitcairnia alpestris* L.H. Bailey, nom. nud.
 Hierba. Endémica. 300-400 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Puya assurgens** L.B. Sm.
 Hierba. Endémica. 1700-2000 m.
 Países: ARG(JUJ).
- Puya berteroniana** Mez
 Hierba. Endémica. 0-2000 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Puya boliviensis** Baker
 Sin.: *Puya copiapina* Phil., *Puya whytei*
 Hook. f.
 Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
 Países: CHL(ANT, ATA).
- Puya bravoii** E. Aráoz & A. Grau
 Hierba. Endémica. 3100 m.
 Países: ARG(SAL).
- Puya castellanosii** L.B. Sm.
 Hierba. Endémica. 2300-3000 m.
 Países: ARG(SAL).
- Puya chilensis** Molina
 Sin.: *Pitcairnia chilensis* Lodd. ex Loudon,
 nom. nud., *Pitcairnia coarctata* (Ruiz & Pav.)
 Pers., *Pourretia coarctata* Ruiz & Pav., *Puya*
chilensis Molina var. *gigantea* (Phil.) Baker,
Puya coarctata (Ruiz & Pav.) Fisch., *Puya*
gigantea Phil., *Puya quillotana* W. Weber,
Puya suberosa Molina
 Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).
- Puya coerulea** Lindl. var. **coerulea**
 Sin.: *Pourretia caerulea* Miers, nom. nud.
 Hierba. Endémica. 500-2000 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Puya coerulea** Lindl. var. **intermedia**
 (L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser
 Sin.: *Puya paniculata* Phil., *Puya*
violacea (Brongn.) Mez var. *intermedia*
 L.B. Sm. & Looser
 Hierba. Endémica. 400-700 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).
- Puya coerulea** Lindl. var. **monteroana**
 (L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser
 Sin.: *Puya violacea* (Brongn.) Mez var.
monteroana L.B. Sm. & Looser
 Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
 Países: CHL(LBO).
- Puya coerulea** Lindl. var. **violacea**
 (Brongn.) L.B. Sm. & Looser
 Sin.: *Puya rubricaulis* (Steud.) Miers,
Pourretia rubricaulis Miers, *Pitcairnia*
violacea Brongn., *Pourretia violacea*
 Linden, *Pitcairnia philippii* Baker, *Puya*
glabrata Phil. ex Baker, nom. nud.,
Puya violacea (Brongn.) Mez, *Pitcairnia*
coerulea (Lindl.) Benth. ex Baker
 Hierba. Endémica. 400-1200 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).
- Puya dyckioides** (Baker) Mez
 Sin.: *Pitcairnia dyckioides* Baker
 Hierba. Nativa. 1300-3400 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Puya gilmartiniae** G.S. Varad. & A.R.
 Flores
 Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
 Países: CHL(COQ).
- Puya harmsii** (A. Cast.) A. Cast.
 Sin.: *Puya spathacea* (Griseb.) Mez var.
harmsii A. Cast.
 Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
 Países: ARG(CAT, COR, LRI, TUC).
- Puya hofstenii** Mez
 Sin.: *Puya hauthalii* Mez
 Hierba. Nativa. 3500-3800 m.
 Países: ARG(JUJ).
- Puya lilloi** A. Cast.
 Hierba. Endémica. 1200-2500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Puya micrantha** Mez
 Hierba. Endémica. 1500-1700 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).
- Puya mirabilis** (Mez) L.B. Sm.
 Sin.: *Pitcairnia mirabilis* Mez, *Pitcairnia*
mirabilis Mez var. *tucumana* A. Cast.
 Hierba. Nativa. 900-2000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Puya novarae** G.S. Varad. ex S.E.
 Gómez & A. Grau
 Hierba. Endémica. 2600-4100 m.
 Países: ARG(SAL).
- Puya smithii** A. Cast.
 Hierba. Endémica. 1500-3500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Puya spathacea** (Griseb.) Mez
 Sin.: *Pitcairnia spathacea* Griseb., *Puya*
formosa Speg.
 Hierba. Nativa. 1400-2800 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
 MEN, SAL, SLU, TUC).
- Puya venusta** Phil.
 Sin.: *Puya venusta* Phil. ex Baker, nom.
 nud., *Pitcairnia venusta* Baker, *Pitcairnia*
sphaerocephala Baker, *Puya coquimbensis*
 Mez, *Puya gaudichaudii* Mez
 Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL).
- Puya verwoortii** S.E. Gómez & A. Grau
 Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
 Países: ARG(SJU).
- Puya volcanensis** Castellón
 Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).
- Puya weberiana** E. Morren ex Mez
 Sin.: *Puya flora* Speg.
 Hierba. Endémica. 3600-4000 m.
 Países: ARG(SAL, TUC).
- Puya yakespala** A. Cast.
 Hierba. Endémica. 3400-4000 m.
 Países: ARG(SAL).
- Quesnelia** Gaudich.
- Quesnelia arvensis** (Vell.) Mez
 Sin.: *Bromelia arvensis* Vell.
 Hierba epífita o terrestre. Nativa.
 Países: BRA(PAR).
- Quesnelia humilis** Mez
 Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR).
- Quesnelia imbricata** L.B. Sm.
 Hierba epífita o terrestre. Endémica.
 300-2000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).
- Quesnelia testudo** Lindm.
 Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR).
- Racinaea** M.A. Spencer & L.B. Sm.
- Racinaea aeris-incola** (Mez) M.A.
 Spencer & L.B. Sm.
 Sin.: *Catopsis maculata* E. Morren ex
 Baker, *Tillandsia aeris-incola* (Mez) Mez,
Vriesea aeris-incola Mez
 Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).
- Racinaea spiculosa** (Griseb.) M.A.
 Spencer & L.B. Sm. var. **spiculosa**
 Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Racinaea spiculosa (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. var. **ustulata** (Reitz) M.A. Spencer & L.B. Sm.

Sin.: *Tillandsia triticea* Burch. ex Baker var. *ustulata* Reitz, *Tillandsia spiculosa* Griseb. var. *ustulata* (Reitz) L.B. Sm., *Tillandsia triticea* Burch. ex Baker, *Tillandsia viridis* Baker, *Vriesea viridis* E. Morren ex Baker, nom. nud.
Hierba epífita. Nativa. 300-2500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tillandsia L.

Tillandsia aeranthos (Loisel.) L.B. Sm. var. **aemula** Strehl
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia aeranthos (Loisel.) L.B. Sm. var. **aeranthos**

Sin.: *Amalia aeris-incola* Schult. f., nom. nud., *Anoplophytum aeranthus* (Loisel.) Beer, *Anoplophytum dianthoideum* (G. Rossi) Beer, *Pourretia aeranthos* Loisel., *Tillandsia aeranthos* (Loisel.) L.B. Sm. var. *rosea* Strehl, *Tillandsia aeranthos* (Loisel.) L.B. Sm. var. *aemula* Strehl, *Tillandsia aeranthos* Desf. ex Steud., nom. nud., *Tillandsia bicolor* Brongn., *Tillandsia dianthoidea* G. Rossi, *Tillandsia microxiphion* Baker, *Tillandsia unca* Griseb.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PAI). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).

Tillandsia afonsoana Strehl
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia aizoides Mez
Hierba epífita. Nativa. 200-1300 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Tillandsia albertiana Verv.
Hierba epífita. Endémica. 800 m.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia andicola Gillies ex Baker
Hierba epífita. Endémica.
Países: ARG(BAI, CAT, MEN, SLU).

Tillandsia angulosa Mez
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Tillandsia arequitae (André) André ex Mez
Sin.: *Tillandsia xiphioides* Ker Gawl.
var. *arequitae* André
Hierba epífita. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(LAV).

Tillandsia argentina C.H. Wright
Hierba epífita. Nativa. 400-1300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Tillandsia arhiza Mez
Sin.: *Tillandsia arhiza* Mez var. *rupestris* (Mez) Hassl., *Tillandsia rupestris* Mez, *Tillandsia rupestris* Mez var. *pendens* Chodat & Vischer
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(PAI).

Tillandsia australis Mez
Sin.: *Tillandsia maxima* Lillo & Hauman, hom. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 700-3900 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Tillandsia bandensis Baker subsp. **bandensis**
Sin.: *Tillandsia bandensis* Baker var. *intermedia* Hassl., *Tillandsia recurvata* (L.) L. var. *majuscula* Mez
Hierba epífita. Nativa. 300-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(ÑEE, PHA). URY(ART, COL, RNO, SAO, SJO).

Tillandsia bandensis Baker subsp. **grandipetala** Rossado
Hierba rupícola. Endémica. 0-300 m.
Países: URY(CLA, TYT).

Tillandsia bella Strehl
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia bergeri Mez
Sin.: *Tillandsia dianthoidea* G. Rossi var. *grisea* Guillaumin
Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

Tillandsia brealitoensis L. Hrom.
Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia buchlohii Rauh
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(Desconocida).

Tillandsia caliginosa W. Till
Sin.: *Tillandsia crocata* (E. Morren)

N.E. Br. f. *major* Rauh, nom. nud., *Tillandsia crocata* (E. Morren) N.E. Br. var. *tristis* Rauh
Hierba epífita. Nativa. 1900-3000 m.
Países: ARG(CAT, ERI, JUJ, SAL, TUC).

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav.
Sin.: *Diaphoranthema capillaris* (Ruiz & Pav.) Beer, *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *hieronymi* (Mez) L.B. Sm., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *incana* (Mez) L.B. Sm., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *typica* L.B. Sm., nom. inval., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. var. *incana* Mez, *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. var. *lanuginosa* Mez, *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez f. *percordobensis* (Mez) A. Cast., *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez f. *perusneoides* (Mez) A. Cast., *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *percordobensis* Mez, *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *perusneoides* Mez, *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez, *Tillandsia hieronymi* Mez, *Tillandsia incana* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia lanuginosa* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia permutata* A. Cast., *Tillandsia propinqua* Gay var. *saxicola* Hieron.
Hierba epífita. Nativa. 300-3600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL). URY(COL, MON).

Tillandsia castellanii L.B. Sm.
Hierba epífita. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SLU).

Tillandsia chasmophyta H. Büneker, R. Pontes & K. Soares
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia colorata L. Hrom.
Hierba epífita. Endémica.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia crocata (E. Morren) N.E. Br.
Sin.: *Phytarrhiza crocata* E. Morren, *Tillandsia mandonii* E. Morren ex Mez
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS). URY(SOR).

Tillandsia diaguitensis A. Cast.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY).

Tillandsia didisticha (E. Morren)

Baker

Sin.: *Anoplophytum didistichum* E. Morren, *Tillandsia crassifolia* Baker, *Tillandsia oranensis* Baker, *Tillandsia purpurea* Griseb., hom. illeg., *Tillandsia vernicosa* A. Cast., hom. illeg.

Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, ÑEE, PAI).

Tillandsia dorotheae Rauh

Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia dura Baker

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Tillandsia duratii Vis. var. **duratii**

Sin.: *Tillandsia circinalis* Griseb.
Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY). URY(ART, SAO).

Tillandsia duratii Vis. var. **saxatilis** (Hassl.) L.B. Sm.

Sin.: *Tillandsia confusa* Hassl., *Tillandsia confusa* Hassl. var. *minor* Hassl., *Tillandsia confusa* Hassl. var. *saxatilis* Hassl., *Tillandsia decomposita* Baker, *Tillandsia duratii* Vis. var. *confusa* (Hassl.) L.B. Sm., *Tillandsia tomentosa* N.E. Br., *Tillandsia weddellii* Baker
Hierba epífita. Nativa. 200-3000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CEN, CHO, COA, ÑEE, PHA).

Tillandsia erecta Gillies ex Baker

Sin.: *Tillandsia rigida* Gillies ex Baker, nom. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 1300-2700 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Tillandsia esseriana Rauh & L.B. Sm.

Hierba epífita. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(AMA).

Tillandsia friesii Mez

Hierba epífita. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Tillandsia funebris A. Cast.

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: ARG(CAT, FOR, SAL, TUC). PRY(APY, PHA).

Tillandsia gardneri Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tillandsia geissei Phil.

Hierba epífita. Endémica. 200-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Tillandsia geminiflora Brongn.

Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(LAV, TYT).

Tillandsia genseri Rauh

Hierba epífita. Endémica. 1500-1800 m.
Países: ARG(JUU).

Tillandsia gilliesii Baker subsp. **gilliesii**

Sin.: *Tillandsia myosura* Griseb. ex Baker var. *saxicola* A. Cast., nom. nud.
Hierba epífita. Nativa. 1800-2800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Tillandsia gilliesii Baker subsp. **polysticha** W. Till & L. Hrom.

Hierba epífita. Endémica. 1700-2500 m.
Países: ARG(JUU, TUC).

Tillandsia guelzii Rauh

Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU).

Tillandsia hirta W. Till & L. Hrom.

Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia itaubensis Strehl

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia ixioides Griseb. subsp. **ixioides**

Sin.: *Anoplophytum luteum* E. Morren ex Baker, nom. nud., *Tillandsia canescens* Baker, nom. nud., *Tillandsia ixioides* Griseb. var. *occidentalis* A. Cast., *Tillandsia lutea* Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, PAI). URY(COL, MON).

Tillandsia ixioides Griseb. subsp. **viridiflora** (Rauh) Gouda

Sin.: *Tillandsia jucunda* Castellanos var. *viridiflora* Rauh
Hierba epífita. Nativa. 600-1000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Tillandsia jonesii Strehl

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia jonesii Strehl

Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia jucunda A. Cast.

Hierba epífita. Nativa. 600-900 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Tillandsia landbeckii Phil.

Hierba epífita. Nativa. 300-1500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Tillandsia leonamiana E. Pereira

Sin.: *Tillandsia meridionalis* Baker var. *subsecundifolia* W. Weber & Ehlers
Hierba epífita. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Tillandsia leucopetala H. Büneker, R. Pontes & L. Witeck

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia linearis Vell.

Sin.: *Anoplophytum lineare* (Vell.) Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. f.

Sin.: *Tillandsia undulata* Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

Tillandsia lorentziana Griseb.

Sin.: *Tillandsia lorentziana* Griseb. f. *simplex* Kuntze, *Tillandsia lorentzii* André
Hierba epífita. Nativa. 100-3300 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CON, PAI).

Tillandsia mallemontii Glaz. ex Mez

Sin.: *Phytarrhiza uniflora* E. Morren ex Baker, nom. nud.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tillandsia marconae W. Till & Vitek

Hierba epífita. Nativa. 600-800 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Tillandsia markusii L. Hrom.

Hierba epífita. Endémica.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia mereliana Schinini

Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: PRY(APY, CEN, PHA).

Tillandsia meridionalis Baker

Sin.: *Tillandsia pulchella* Mez, hom. illeg., *Tillandsia stricta* Mez, hom. illeg., *Tillandsia stricta* Sol. ex Sims var. *paraguariensis* Hassl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART).

Tillandsia minutiflora Donadío

Sin.: *Tillandsia coarctata* Gillies ex Baker var. *pedicellata* Mez
Hierba epífita. Nativa. 800-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CHO).

Tillandsia mollis H. Hrom. & W. Till var. **reptans** Ayarde & Bulacio

Hierba epífita. Endémica. 2600-2700 m.
Países: ARG(JUJ).

Tillandsia montana Reitz

Hierba epífita. Endémica. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tillandsia muhriae W. Weber

Sin.: *Tillandsia albei* Ehlers, *Tillandsia guasamayensis* Palací & Gilmartin
Hierba epífita. Nativa. 2600-3400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Tillandsia myosura Griseb. ex Baker

Sin.: *Tillandsia nappi* Lorentz & Niederl.
Hierba epífita. Nativa. 700-2600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). URY(Desconocida).

Tillandsia pedicellata (Mez) A. Cast.

Sin.: *Tillandsia coarctata* Gillies ex Baker var. *pedicellata* Mez
Hierba epífita. Nativa.
Países: ARG(CA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SLU).

Tillandsia peiranoi A. Cast. var. **alba**

Rutschm. ex Rauh
Hierba epífita. Endémica. 800-900 m.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia peiranoi A. Cast. var. **peiranoi**

Hierba epífita. Endémica.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia pfeufferi Rauh

Hierba epífita. Endémica. 1000-1800 m.
Países: ARG(JUJ).

Tillandsia pohliana Mez

Hierba epífita. Nativa. 700-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, SPE).

Tillandsia polystachia (L.) L.

Sin.: *Renalmia polystachya* L.
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR).

Tillandsia polzii Ehlers

Hierba rupícola. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia porongoensis L. Hrom. & P. Schneid.

Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(LRI).

Tillandsia pseudomontana W. Weber & Ehlers

Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Tillandsia ramellae W. Till & S. Till

Hierba epífita. Endémica. 600-700 m.
Países: PRY(APY).

Tillandsia rectangula Baker

Sin.: *Tillandsia propinqua* Gay var. *rectangula* (Baker) Griseb.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

Tillandsia recurvata (L.) L.

Sin.: *Diaphoranthema recurvata* (L.) Beer, *Renalmia recurvata* L., *Tillandsia monostachys* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *argentea* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *brevifolia* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *caespitosa* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *contorta* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *elongata* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *genuina* André, nom. inval., *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *major* André, *Tillandsia recurvata* (L.) L. f. *minor* André, *Tillandsia recurvata* (L.)

L. f. *minuta* (Mez) A. Cast., *Tillandsia recurvata* (L.) L. var. *ciliata* E. Morren ex Mez, *Tillandsia recurvata* (L.) L. var. *minuta* Mez

Hierba epífita. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CLA, MON, SOR).

Tillandsia reichenbachii Baker

Sin.: *Tillandsia euosma* Speg., *Tillandsia herzogii* Wittm., *Tillandsia tucumanensis* Mez

Hierba epífita. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Tillandsia retorta Griseb. ex Baker

Sin.: *Tillandsia caespitosa* Gillies ex Baker, nom. nud., *Tillandsia nappi* Lorentz & Niederl. var. *darwinii* Lorentz & Niederl.

Hierba epífita. Endémica. 600-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Tillandsia rohdenardini Strehl

Hierba epífita. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia rosarioae L. Hrom.

Hierba epífita. Endémica.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia schreiteri Lillo & A. Cast.

Hierba epífita. Nativa. 1300-2400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Tillandsia seideliana E. Pereira

Hierba epífita. Endémica. 200-800 m.
Países: BRA(SCA).

Tillandsia sphaerocephala Baker var. **sphaerocephala**

Hierba epífita. Nativa. 900-3500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Tillandsia sphaerocephala Baker var. **tarijensis** Ehlers & L. Hrom.

Hierba epífita. Nativa. 2400-2600 m.
Países: ARG(JUJ).

Tillandsia streptocarpa Baker

Sin.: *Tillandsia streptocarpa* Baker var. *filifolia* Hassl., *Tillandsia streptocarpa* Baker var. *pungens* Chodat & Vischer
Hierba epífita. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Tillandsia stricta Sol. ex Sims var. **disticha** L.B. Sm.
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tillandsia stricta Sol. ex Sims var. **stricta**
Hierba epífita. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA, PAI). URY(TYT).

Tillandsia tenebra L. Hrom. & W. Till
Hierba epífita. Endémica. 300-1100 m.
Países: ARG(LRI).

Tillandsia tenuifolia L. var. **tenuifolia**
Sin.: *Tillandsia astragaloides* Mez, *Tillandsia autumnalis* F. Muell., *Tillandsia pulchella* Hook. var. *rosea* Mez, p.p., *Tillandsia pulchella* Hook. var. *surinamensis* Mez, *Tillandsia pulchella* Hook., *Tillandsia tenuifolia* L. var. *surinamensis* (Mez) L.B. Sm.
Hierba epífita. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CAN, GUA, MIE, ÑEE, PAD).

Tillandsia tenuifolia L. var. **vaginata** (Wawra) L.B. Sm.
Sin.: *Tillandsia pulchella* Hook. var. *vaginata* (Wawra) A. Cast., *Tillandsia pulchra* Hook. var. *vaginata* Wawra
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAA, CEN, CON, GUA).

Tillandsia tenuifolia L. var. **vaginata** (Wawra) L.B. Sm.

Sin.: *Tillandsia pulchella* Hook. var. *vaginata* (Wawra) A. Cast., *Tillandsia pulchra* Hook. var. *vaginata* Wawra
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAA, CEN, CON, GUA).

Tillandsia toropiensis Rauh
Hierba epífita. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia tragophoba M.O. Dillon
Hierba epífita. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(ANT).

Tillandsia tricholepis Baker
Sin.: *Tillandsia polytrichoides* E. Morren, *Tillandsia tricholepis* Baker var. *argentea* Hassl.
Hierba epífita. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS).
PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, SAO, TAC).

Tillandsia uruguayensis Rossado
Hierba epífita. Endémica. 100-300 m.
Países: URY(RIV, TAC).

Tillandsia usneoides (L.) L.
Sin.: *Renalmia usneoides* L., *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *cretacea* Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *crispa* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *ferruginea* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *filiformis* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *genuina* André, nom. inval., *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *longissima* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. f. *major* André, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *cretacea* (Mez) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *ferruginea* (André) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *longissima* (André) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *robusta* (Mez) Mez
Hierba epífita. Nativa. 0-3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(CAU, CAA, CON, GUA, ITA, ÑEE, PHA). URY(ART, FLA, SOR).

Tillandsia vernicosa Baker
Sin.: *Tillandsia drepanophylla* Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Tillandsia violaceiflora L. Hrom.
Hierba epífita. Endémica.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia virescens Ruiz & Pav.
Sin.: *Diaphoranthema virescens* (Ruiz & Pav.) Beer, *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *cordobensis* (Hieron.) L.B. Sm., *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. f. *virescens* (Ruiz & Pav.) L.B. Sm., *Tillandsia cordobensis* Hieron., *Tillandsia dependens* Hieron. ex Mez var. *sanzinii* Hicken, *Tillandsia hieronymi* Mez var. *lichenoides* (Hieron.) A. Cast., *Tillandsia lichenoides* Hieron., *Tillandsia propinqua* Gay, *Tillandsia pusilla* Gillies ex Baker, *Tillandsia stolpi* Phil., *Tillandsia virescens* Ruiz & Pav. var. *sanzinii* (Hicken) A. Cast., *Tillandsia williamsii* Rusby
Hierba epífita. Nativa. 400-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO).

Tillandsia winkleri Strehl
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia witeckii H. Büneker, R. Pontes & K. Soares
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var. **minor** L. Hrom.
Hierba epífita. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var. **tafiensis** L.B. Sm.
Hierba epífita. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var. **xiphioides**
Sin.: *Anoplophytum xyphyoides* Beer, nom. nud., *Phytarrhiza xiphioides* (Ker Gawl.) E. Morren, nom. nud., *Tillandsia macrocnemis* Griseb., *Tillandsia odorata* Gillies ex Baker, nom. illeg., *Tillandsia sericea* E. Morren, nom. nud., *Tillandsia suaveolens* Lem., *Tillandsia unca* Hicken, hom. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 700-2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(CLA, SJO).

Tillandsia zecheri W. Till f. **brealitoensis** Palací & G.K. Br.
Hierba epífita. Endémica. 500-1800 m.
Países: ARG(SAL).

Tillandsia zecheri W. Till var. **cafayatensis** Palací & G.K. Br.
Sin.: *Tillandsia muhrrii* Rauh, hom. illeg.
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Tillandsia zecheri W. Till var. **zecheri**
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.
Países: ARG(SAL).

Vriesea Lindl., nom. cons.

Vriesea altodaserrae L.B. Sm.
Hierba epífita o terrestre. Nativa.
100-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea biguassuensis Reitz
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Vriesea brusquensis Reitz
Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea carinata Wawra
Sin.: *Tillandsia carinata* (Wawra) Baker, *Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl. var. *carinata* (Wawra) E. Morren
Hierba epífita o terrestre. Nativa.
0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea corcovadensis (Britten) Mez

Sin.: *Tillandsia corcovadensis* Britten, *Tillandsia ventricosa* Wawra, hom. illeg., *Vriesea rubida* E. Morren ex Baker, nom. nud., *Vriesea rubida* E. Morren ex Mez, *Vriesea ventricosa* (Wawra) Mez, comb. illeg. Hierba epífita. Nativa. 200-900 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea declinata Leme

Hierba epífita. Endémica. 400 m. Países: BRA(SCA).

Vriesea drepanocarpa (Baker) Mez

Sin.: *Tillandsia drepanocarpa* Baker, *Tillandsia pabstiana* E. Pereira, *Vriesea dusenii* L.B. Sm. Hierba epífita. Nativa. 0-200 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea eltoniana E. Pereira & Ivo

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m. Países: BRA(PAR).

Vriesea ensiformis (Vell.) Beer

Sin.: *Tillandsia ensiformis* Vell., *Tillandsia selloana* Baker, *Vriesea ensiformis* (Vell.) Beer var. *striata* A. Seidel Hierba epífita. Nativa. 1500 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea erythroductylon (E. Morren)

E. Morren ex Mez Sin.: *Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl. var. *erythroductylon* E. Morren Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-900 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea flammea L.B. Sm.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea flava A.F. Costa, H. Luther & Wand.

Hierba epífita. Nativa. 700-900 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea friburgensis Mez var.**friburgensis**

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-900 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, GUA).

Vriesea friburgensis Mez var.**paludosa** (L.B. Sm.) L.B. Sm.

Sin.: *Vriesea paludosa* L.B. Sm. Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-700 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea friburgensis Mez var.**tucumanensis** (Mez) L.B. Sm.

Sin.: *Vriesea argentinensis* Speg., *Vriesea glutinosa* Lindl. var. *viridis* Hassl., *Vriesea tucumanensis* Mez Hierba epífita o terrestre. Nativa. 700-900 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, PAI, SPE).

Vriesea gigantea Gaudich.

Sin.: *Tillandsia gigantea* (Gaudich.) Griseb., *Tillandsia reticulata* Baker, *Tillandsia tessellata* Linden, *Vriesea mosenii* Mez, *Vriesea reticulata* (Baker) Mez, *Vriesea tessellata* (Linden) E. Morren Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea guttata Linden & André

Sin.: *Tillandsia guttata* (Linden & André) Baker, *Vriesea guttata* Linden & André var. *eguttata* Reitz, *Vriesea guttata* Linden & André var. *striata* Reitz Hierba epífita. Nativa. 300-1700 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea heterostachys (Baker) L.B. Sm.

Sin.: *Tillandsia heterostachys* Baker Hierba epífita. Nativa. Países: BRA(PAR).

Vriesea hieroglyphica (Carrière) E.

Morren Sin.: *Massangea hieroglyphica* Carrière, *Tillandsia hieroglyphica* (Carrière) Baker Hierba epífita. Nativa. 0-800 m. Países: BRA(PAR).

Vriesea hoehneana L.B. Sm.

Hierba epífita. Nativa. 900-1300 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea incurvata Gaudich.

Sin.: *Tillandsia incurvata* (Gaudich.) Baker, *Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl. var. *truffautina* André, *Vriesea rostrum-aquillae* Mez Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea inflata (Wawra) Wawra

Sin.: *Tillandsia inflata* (Wawra) Baker, *Vriesea carinata* Wawra var. *inflata* Wawra, *Vriesea incurvata* Gaudich. var. *inflata* (Wawra) Mez Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea jonghei (K. Koch) E. Morren

Sin.: *Tillandsia jonghei* K. Koch, *Vriesea gamba* F. Muell. Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea longicaulis (Baker) Mez

Sin.: *Tillandsia longicaulis* Baker, *Vriesea longicaulis* (Baker) Mez var. *secunda* Mez Hierba epífita. Nativa. 700-1900 m. Países: BRA(SCA).

Vriesea lubbersii (Baker) E. Morren ex Mez

Sin.: *Tillandsia lubbersii* Baker Hierba epífita. Nativa. 0-800 m. Países: BRA(SCA).

Vriesea maxoniana (L.B. Sm.) L.B. Sm.

Sin.: *Tillandsia maxoniana* L.B. Sm., *Vriesea icterica* A. Cast. Hierba epífita. Nativa. 900-1500 m. Países: ARG(SAL).

Vriesea morreniana E. Morren

Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea muelleri Mez

Hierba epífita. Nativa. 300-1500 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea neoglutinosa Mez

Sin.: *Tillandsia glutinosa* Mart. ex Schult. f., *Vriesea glutinosa* (Mart. ex Schult. f.) Wawra, nom. illeg. hom. Hierba epífita o terrestre. Nativa. Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea paratiensis E. Pereira

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m. Países: BRA(PAR).

Vriesea pauperrima E. Pereira

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR, RGS).

Vriesea philippocoburgii Wawra

Sin.: *Tillandsia philippocoburgii* (Wawra) Baker Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea pinottii Reitz

Hierba epífita. Endémica. 0-100 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea platynema Gaudich. var. **flava** Reitz

Hierba epífita o terrestre. Endémica. 500-1500 m. Países: BRA(SCA).

Vriesea platynema Gaudich. var. **platynema**

Sin.: *Tillandsia platynema* (Gaudich.) Griseb.
Hierba epífita. Nativa. 300-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea platynema Gaudich. var. **striata** (Wittm.) Wittm. ex Mez

Sin.: *Vriesea corallina* Regel var. *striata* Wittm.
Hierba epífita. Endémica. 400-800 m.
Países: BRA(SCA).

Vriesea platynema Gaudich. var. **variegata** (Guillon) Reitz

Sin.: *Encholirion roseum* Antoine var. *variegatum* Guillon
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea platzmannii E. Morren

Sin.: *Tillandsia platzmannii* (E. Morren) Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea procera (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. **debilis** Mez

Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Vriesea procera (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. **procera**

Sin.: *Tillandsia erectifolia* Baker, *Tillandsia procera* Mart. ex Schult. f., *Vriesea catharinensis* F. Muell., *Vriesea procera* (Mart. ex Schult. f.) Wittm. var. *gracilis* (Gaudich.) Mez
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(Desconocida). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).

Vriesea psittacina (Hook.) Lindl. var. **decolor** Wawra

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CAU).

Vriesea rastrensis Leme

Hierba epífita. Endémica. 500-1400 m.
Países: BRA(SCA).

Vriesea reitzii Leme & A.F. Costa
Hierba epífita. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea rodigasiana E. Morren

Sin.: *Tillandsia rodigasiana* (E. Morren) Baker, *Tillandsia tweedieana* Baker, *Vriesea tweedieana* (Baker) F. Muell., *Vriesea vitellina* F. Muell.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea rubens Gomes da Silva & A.F. Costa

Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(SCA).

Vriesea scalaris E. Morren

Sin.: *Tillandsia scalaris* (E. Morren) Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea tijucana E. Pereira

Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea triangularis Reitz

Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Vriesea unilateralis (Baker) Mez

Sin.: *Tillandsia unilateralis* Baker
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vriesea vagans (L.B. Sm.) L.B. Sm.

Sin.: *Vriesea philippocoburgii* Wawra var. *vagans* L.B. Sm.
Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Vriesea vulpinoidea L.B. Sm.

Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Wittrockia Lindm.**Wittrockia cyathiformis** (Vell.) Leme

Sin.: *Canistrum cyathiforme* (Vell.) Mez, *Canistrum regnellii* Mez, p.p., *Canistrum schwackeanum* Mez, *Hohenbergia cyathiformis* (Vell.) Beer, *Mosenia sicarius* Lindm., *Tillandsia cyathiformis* Vell.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-1900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Wittrockia superba Lindm.

Sin.: *Canistrum cruentum* F. Muell., *Canistrum superbum* (Lindm.) Mez, *Nidularium superbum* (Lindm.) Ule
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

BURMANNIACEAE

Apteria Nutt.**Apteria aphylla** (Nutt.) Barnhart ex Small

Sin.: *Apteria gentianoides* Jonker, *Apteria lilacina* (Miers) Miers, *Lobelia aphylla* Nutt.
Saprófita. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA).

Burmannia L.**Burmannia alba** Mart.

Sin.: *Burmannia sellowiana* Seub. var. *albiflora* Seub., *Burmannia sellowiana* Seub. var. *violacea* Seub., *Tripterella alba* (Mart.) Schult. & Schult. f.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA).

Burmannia australis Malme

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CAU, COA, PAI).

Burmannia capitata (Walter ex J.F. Gmel.) Mart.

Sin.: *Anonymos capitatus* Walter, nom. nud., *Tripterella capitata* (Walter ex J.F. Gmel.) Michx., *Vogelia capitata* Walter ex J.F. Gmel.
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Burmannia flava Mart.

Sin.: *Burmannia flava* Mart. var. *macroptera* Jonker, *Tripterella flava* (Mart.) Schult. & Schult. f.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CON, PAI).

Cymbocarpa Miers**Cymbocarpa refracta** Miers

Saprófita. Nativa. 100-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dictyostega Miers

Dictyostega orobanchoides (Hook.)

Miers subsp. **orobanchoides**

Sin.: *Apteria orobanchoides* Hook.,
Dictyostega schomburgkii Miers
Saprófita. Nativa. 900-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dictyostega orobanchoides (Hook.)

Miers subsp. **parviflora** (Benth.)
Snelders & Maas

Sin.: *Dictyostega orobanchoides* (Hook.)
Miers var. *parviflora* (Benth.) Jonker,
Dictyostega schomburgkii Miers var.
parviflora Benth.
Saprófita. Nativa. 0-1700 m.
Países: BRA(SCA).

Gymnosiphon Blume

Gymnosiphon divaricatus (Benth.)

Benth. & Hook.

Sin.: *Ptychomeria divaricata* Benth.
Saprófita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Miersiella Urb.

Miersiella umbellata (Miers) Urb.

Sin.: *Dictyostega umbellata* Miers
Saprófita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

BURSERACEAE

Commiphora Jacq.

Commiphora leptophloeos (Mart.)

J. Gillet

Sin.: *Bursera leptophloeos* Mart.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY).

Protium Burm. f.

Protium heptaphyllum (Aubl.)

Marchand

Sin.: *Icica heptaphylla* Aubl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,
CAN, CON, COA, PAI).

Protium kleinii Cuatrec.

Sin.: *Protium dusenii* Sw.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CABOMBACEAE

Cabomba Aubl.

Cabomba aquatica Aubl.

Hierba acuática. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cabomba caroliniana A. Gray

Sin.: *Cabomba australis* Speg., *Cabomba caroliniana* A. Gray var. *flavida* Ørgaard,
Nectris caroliniana (A. Gray) Steud.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, RNE,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,
BOQ, CEN, ÑEE, PHA, SPE). URY(SOR).

Cabomba furcata Schult. & Schult. f.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CACTACEAE

Acanthocalycium Backeb.

Acanthocalycium ferrarii Rausch

Sin.: *Acanthocalycium variiflorum*
Backeb., nom. inval., *Acanthocalycium thionanthum* (Speg.) Backeb. var.
variiflorum (Rausch) Donald, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose
var. *ferrarii* (Rausch) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var.
variiflora (Backeb.) Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(TUC).

Acanthocalycium glaucum F. Ritter

Sin.: *Acanthocalycium aurantiacum*
Rausch, *Acanthocalycium thionanthum*
(Speg.) Backeb. var. *aurantiacum*
(Rausch) Donald, *Acanthocalycium thionanthum* (Speg.) Backeb. var.
glaucum (F. Ritter) Donald, *Echinopsis aurantiaca* (Rausch) Friedrich & G.D.
Rowley, *Echinopsis glaucina* Friedrich & G.D. Rowley, *Lobivia thionantha* (Speg.)
Britton & Rose var. *aurantiaca* (Rausch)
Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.)

Britton & Rose var. *glauca* (F. Ritter) Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Acanthocalycium klimpelianum

(Weid. & Werderm.) Backeb.

Sin.: *Acanthocalycium klimpelianum*
(Weid. & Werderm.) Backeb. var.
macranthum (Rausch) J.G. Lamb.,
Acanthocalycium peitscherianum Backeb.,
Acanthocalycium spiniflorum (K. Schum.)
Backeb. f. *peitscherianum* (Backeb.)
Donald, *Acanthocalycium spiniflorum*
(K. Schum.) Backeb. var. *klimpelianum*
(Weid. & Werderm.) Donald, *Echinopsis klimpeliana* Weid. & Werderm.,
Echinopsis peitscherana (Backeb.)
Friedrich & G.D. Rowley, comb. illeg.,
Lobivia klimpeliana (Weid. & Werderm.)
A. Berger, *Lobivia spiniflora* (K. Schum.)
Rausch var. *klimpeliana* (Weid. &
Werderm.) Rausch, *Lobivia spiniflora* (K.
Schum.) Rausch var. *macrantha* Rausch,
Lobivia spiniflora (K. Schum.) Rausch
var. *peitscherana* (Backeb.) Rausch,
Spinicalycium klimpelianum (Weid. &
Werderm.) Fric
Hierba suculenta. Endémica. 1000-
1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, SDE).

Acanthocalycium spiniflorum (K.
Schum.) Backeb.

Sin.: *Acanthocalycium spiniflorum* (K.
Schum.) Backeb. f. *violaceum* Donald,
Acanthocalycium violaceum (Werderm.)
Backeb., *Echinocactus spiniflorus* K. Schum.,
Echinopsis spiniflora (K. Schum.) A. Berger,
Echinopsis violacea Werderm., *Lobivia spiniflora* (K. Schum.) Rausch var. *violacea*
(Werderm.) Rausch, *Lobivia spiniflora* (K.
Schum.) Rausch, *Spinicalycium spiniflorum*
(K. Schum.) Fric, *Spinicalycium violaceum*
(Werderm.) Fric
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Acanthocalycium thionanthum
(Speg.) Backeb.

Sin.: *Acanthocalycium brevispinum* F.
Ritter, *Acanthocalycium catamarcense*
F. Ritter, *Acanthocalycium chionanthum*
(Speg.) Backeb., *Acanthocalycium griseum*
Backeb., *Acanthocalycium thionanthum*
(Speg.) Backeb. var. *chionanthum* (Speg.)
Hosseus, *Echinocactus chionanthum*
Speg., *Echinocactus thionanthum*

Speg., *Echinopsis brevispina* (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis chionantha* (Speg.) Werderm., *Echinopsis thionantha* (Speg.) Werderm., *Lobivia chionantha* (Speg.) Britton & Rose, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *brevispina* (F. Ritter) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *catamarcense* (F. Ritter) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *chionantha* (Speg.) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *erythrantha* Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *munita* Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Airampoa Fric

Airampoa ayrampo (Azara) Doweld

Sin.: *Cactus ayrampo* Azara, *Opuntia cedegreniana* Backeb., *Opuntia ianthinantha* (F. Ritter) Iliff, *Opuntia multiareolata* Backeb., *Opuntia obliqua* Backeb., *Opuntia soehrensii* Britton & Rose, *Opuntia tilcarensis* Backeb. var. *rubellispina* Backeb., *Platyopuntia ianthinantha* F. Ritter, nom. illeg., *Platyopuntia soehrensii* (Britton & Rose) F. Ritter, comb. illeg., *Tunilla ianthinantha* (F. Ritter) D.R. Hunt & Iliff, *Tunilla soehrensii* (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff
Subarbusto suculento. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
CHL(TAR, ANT).

Austrocactus Britton & Rose

Austrocactus bertinii (Cels) Britton & Rose

Sin.: *Austrocactus gracilis* Backeb., *Cereus bertinii* Cels, *Malacocarpus bertinii* (Cels) Hosseus, *Notocactus bertinii* (Cels) Marshall
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Austrocactus ferrarii R. Kiesling, E. Sarnes & N. Sarnes

Subarbusto. Endémica. 2800-2900 m.
Países: ARG(MEN).

Austrocactus patagonicus (F.A.C. Weber) Hosseus

Sin.: *Cereus patagonicus* F.A.C. Weber,

Echinocactus intertextus Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(ARA, AIS).

Austrocactus philippii (Regel & E. Schmidt) Buxb.

Sin.: *Austrocactus hibernus* F. Ritter, *Cereus philippi* Regel & Schmidt, *Echinocactus philippii* (Regel & E. Schmidt) K. Schum., *Echinopsis philippii* (Regel & E. Schmidt) G. Nicholson, *Erdisia philippii* (Regel & E. Schmidt) Britton & Rose
Subarbusto suculento. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(MAU).

Austrocactus spiniflorus (Phil.) F. Ritter

Sin.: *Cereus hypogaeus* F.A.C. Weber ex Regel, *Corryocactus spiniflorus* (Phil.) Hutchison, *Echinocereus clavata* K. Schum., *Echinocereus hypogaeus* Rümpler, *Erdisia spiniflora* (Phil.) Britton & Rose, *Eulychnia clavata* Phil., *Opuntia bicolor* Phil., *Opuntia clavata* Phil., *Opuntia spiniflora* Phil.
Hierba suculenta. Endémica. 1500-2500 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Austrocyliindropuntia Backeb.

Austrocyliindropuntia miquelii (Monv.) Backeb.

Sin.: *Cylindropuntia miquelii* (Monv.) Backeb., *Maihueniopsis miquelii* (Monv.) R. Kiesling, *Miqueliopuntia miquelii* (Monv.) F. Ritter, *Opuntia geissei* Phil., *Opuntia miquelii* Monv.
Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Austrocyliindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb. var.

humahuacana (Backeb.) R. Kiesling
Sin.: *Austrocyliindropuntia humahuacana* (Backeb.) Backeb. & F.M. Knuth, *Cylindropuntia humahuacana* Backeb., *Opuntia shaferi* Britton & Rose var. *humahuacana* (Backeb.) G.D. Rowley, *Trichopuntia shaferi* (Britton & Rose) Guiggi subsp. *humahuacana* (Backeb.) Guiggi
Subarbusto. Nativa. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Austrocyliindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb. var. **shaferi**

Sin.: *Austrocyliindropuntia vestita*

(Salm-Dyck) Backeb. var. *shaferi* (Britton & Rose) F. Ritter, *Austrocyliindropuntia weingartiana* (Backeb.) Backeb., *Cylindropuntia weingartiana* (Backeb.) Backeb., *Opuntia shaferi* Britton & Rose, *Opuntia weingartiana* Backeb., *Trichopuntia shaferi* (Britton & Rose) Guiggi
Subarbusto. Nativa. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Austrocyliindropuntia verschaffeltii (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.

Sin.: *Austrocyliindropuntia hypsophila* (Speg.) Backeb., *Austrocyliindropuntia verschaffeltii* (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb. var. *longispina* Backeb., *Austrocyliindropuntia verschaffeltii* (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb. var. *hypsophila* (Speg.) Backeb., *Banfiopuntia verschaffeltii* (Cels ex F.A.C. Weber) Guiggi, *Cylindropuntia hypsophila* (Speg.) Backeb., *Cylindropuntia verschaffeltii* (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb., *Opuntia digitalis* F.A.C. Weber, *Opuntia hypsophila* Speg., *Opuntia verschaffeltii* Cels ex F.A.C. Weber, *Opuntia verschaffeltii* Cels ex F.A.C. Weber var. *digitalis* F.A.C. Weber
Subarbusto. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Austrocyliindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb.

Sin.: *Cylindropuntia vestita* (Salm-Dyck) Backeb., *Opuntia vestita* Salm-Dyck, *Trichopuntia vestita* (Salm-Dyck) Guiggi
Subarbusto. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Blossfeldia Werderm.

Blossfeldia liliputana Werderm.

Sin.: *Blossfeldia campaniflora* Backeb., *Blossfeldia fechsleri* Backeb., *Blossfeldia liliputana* Werderm. f. *fechsleri* (Backeb.) Krainz, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *atroviridis* (Backeb.) Krainz, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *campaniflora* (Backeb.) Krainz, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *formosa* F. Ritter, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *pedicellata* (F. Ritter) Krainz, comb. illeg., *Blossfeldia pedicellata* F. Ritter, *Parodia liliputana* (Werderm.) N.P. Taylor
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU).

Brasiliopuntia A. Berger**Brasiliopuntia brasiliensis** (Willd.) A. Berger

Sin.: *Cactus brasiliensis* Willd., *Opuntia argentina* Griseb., *Opuntia brasiliensis* (Willd.) Haw., *Opuntia hieronymii* Griseb.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Brasiliopuntia schulzii (A. Cast. & Lelong) Backeb.

Sin.: *Opuntia arborea* Rojas Acosta, *Opuntia schulzii* A. Cast. & Lelong
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Browningia Britton & Rose**Browningia caineana** (Cárdenas) D.R. Hunt

Sin.: *Castellanosia caineana* Cárdenas
Árbol suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON).

Browningia candelaris (Meyen)

Britton & Rose
Sin.: *Cactus candelaris* (Meyen) Meyen, *Cereus candelaris* Meyen
Árbol suculento. Nativa. 2000-3000 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Cereus Mill.**Cereus aethiops** Haw.

Sin.: *Cereus aethiops* Haw. var. *landbeckii* (Phil.) Backeb., *Cereus aethiops* Haw. var. *melacanthus* (K. Schum.) Backeb., *Cereus azureus* Parm. ex Pfeiff., *Cereus chalibaeus* Salm-Dyck, *Cereus coerulescens* Salm-Dyck var. *landbeckii* (Phil.) K. Schum., *Cereus coerulescens* Salm-Dyck var. *melacanthus* K. Schum., *Cereus coerulescens* Salm-Dyck, *Cereus landbeckii* Phil., *Piptanthocereus aethiops* (Haw.) F. Ritter, nom. illeg.
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).

Cereus argentinensis Britton & Rose

Sin.: *Cereus platygonus* Speg., hom. illeg.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Cereus forbesii Otto ex C.F. Först.

Sin.: *Piptanthocereus forbesii* (Otto ex C.F. Först.) Riccob., nom. illeg.
Árbol. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE).

Cereus haenkeanus F.A.C. Weber ex K. Schum.

Árbol suculento. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Cereus hildmannianus K. Schum.

Árbol suculento. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cereus lanosus (F. Ritter) P.J. Braun

Sin.: *Piptanthocereus lanosus* F. Ritter
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Cereus paraguayensis K. Schum.

Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CON, COA).

Cereus stenogonus K. Schum.

Sin.: *Cereus dayami* Speg., *Cereus roseiflorus* Speg., *Piptanthocereus dayami* (Speg.) F. Ritter, nom. illeg.
Árbol suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, ÑEE, PAI, SPE). URY(RNO).

Cereus uruguayanus R. Kiesling

Sin.: *Cereus alacriportamus* Pfeiff., *Cereus hildmannianus* K. Schum. subsp. *uruguayanus* (R. Kiesling) N.P. Taylor, *Piptanthocereus uruguayanus* F. Ritter, nom. illeg.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, COL, RIV, TAC, TYT).

Cleistocactus Lem.**Cleistocactus baumannii** (Lem.) Lem. subsp. **baumannii**

Sin.: *Cereus anguinus* Gürke, *Cereus baumannii* Lem., *Cleistocactus baumannii* (Lem.) Lem. var. *colubrinus* Riccob., *Cereus tweediei* Hook., *Cleistocactus croceiflorus* F. Ritter, *Cleistocactus paraguariensis* F. Ritter
Hierba suculenta. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. subsp. **horstii** (P.J. Braun) N.P. Taylor

Sin.: *Cleistocactus horstii* P.J. Braun
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Cleistocactus ferrarii R. Kiesling

Subarbusto suculento. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Cleistocactus hyalacanthus (K. Schum.) Gosselin

Sin.: *Cereus hyalacanthus* K. Schum., *Cleistocactus jujuyensis* (Backeb.) Backeb., *Cleistocactus jujuyensis* Backeb. var. *fulvus* F. Ritter, *Cleistocactus straussii* Backeb. var. *jujuyensis* Backeb.
Subarbusto suculento. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Cleistocactus smaragdiflorus (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Sin.: *Cereus smaragdiflorus* F.A.C. Weber
Subarbusto suculento. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Copiapoa Britton & Rose**Copiapoa ahremephiana** N.P. Taylor & G.J. Charles

Arbusto suculento. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa algarrobensis Katt., nom. illeg.

Subarbusto suculento. Endémica.
Países: CHL(TAR).

Copiapoa boliviana (Pfeiff.) F. Ritter

Sin.: *Copiapoa atacamensis* Middled., *Copiapoa calderana* F. Ritter subsp. *atacamensis* (Middled.) D.R. Hunt, *Echinocactus bolivianus* Pfeiff.
Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa calderana F. Ritter

Sin.: *Copiapoa atacamensis* Middled. var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa calderana* F. Ritter var. *spiniosior* F. Ritter, *Copiapoa lembckeii* Backeb., nom. inval.
Subarbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa cinerascens (Salm-Dyck)
Britton & Rose

Sin.: *Copiapoa appplanata* Backeb., nom. inval., *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *appplanata* F. Ritter, *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *intermedia* F. Ritter, *Echinocactus ambiguus* Hildm. ex K. Schum., *Echinocactus cinerascens* Salm-Dyck
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. **cinerea**

Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *tenebrosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa tenebrosa* F. Ritter, *Echinocactus cinereus* Phil.
Arbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. **columna-alba** (F. Ritter)
Backeb.

Sin.: *Copiapoa columna-alba* F. Ritter, *Copiapoa columna-alba* F. Ritter var. *nuda* F. Ritter, *Copiapoa melanohystris* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica.
0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. **gigantea** (Backeb.) N.P. Taylor

Sin.: *Copiapoa albispina* Backeb., nom. nud., *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *haseltoniana* (Backeb.) N.P. Taylor, *Copiapoa gigantea* Backeb. var. *haseltoniana* (Backeb.) F. Ritter, *Copiapoa gigantea* Backeb., *Copiapoa haseltoniana* Backeb.
Arbusto suculento. Endémica. 700-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa coquimbana (Rümppler)
Britton & Rose var. **coquimbana**

Sin.: *Copiapoa alticostata* F. Ritter, *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *alticostata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *armata* F. Ritter, *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *pendulina* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *pseudocoquimbana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *wagenknechtii* F. Ritter, *Copiapoa pendulina* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana*

F. Ritter var. *chaniarensis* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *vulgata* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter, *Copiapoa serenana* Voldan, *Copiapoa vallenarensis* F. Ritter, *Copiapoa wagenknechtii* F. Ritter, *Echinocactus coquimbana* Rümppler
Arbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Copiapoa coquimbana (Rümppler)

Britton & Rose var. **fiedleriana** (K. Schum.) A.E. Hoffm.
Sin.: *Copiapoa fiedleriana* (K. Schum.) Backeb., *Copiapoa pepiniana* (K. Schum.) Backeb. var. *fiedleriana* Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica.
0-200 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa dealbata F. Ritter

Sin.: *Copiapoa carrizalensis* F. Ritter, *Copiapoa carrizalensis* F. Ritter var. *gigantea* F. Ritter, *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *dealbata* (F. Ritter) Backeb., *Copiapoa dealbata* F. Ritter var. *carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa dealbata* F. Ritter f. *gigantea* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa decorticans N.P. Taylor & G.J. Charles

Subarbusto suculento. Endémica.
0-200 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa echinata F. Ritter

Sin.: *Copiapoa echinata* F. Ritter var. *borealis* F. Ritter, *Copiapoa echinata* F. Ritter f. *pulla* F. Ritter, *Copiapoa megarrhiza* Britton & Rose var. *echinata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa totalensis* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica.
0-200 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa echinoides (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Sin.: *Copiapoa cuprea* F. Ritter, *Copiapoa dura* F. Ritter, *Copiapoa echinoides* (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *cuprea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinocactus echinoides* Lem. ex Salm-Dyck
Subarbusto suculento. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa eremophila F. Ritter

Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose f. *albispina* F. Ritter, *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *eremophila* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Arbusto suculento. Endémica. 400-1000 m.
Países: CHL(TAR).

Copiapoa grandiflora F. Ritter

Sin.: *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *grandiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Subarbusto suculento. Endémica.
Países: CHL(ANT, ATA).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison
var. **esmeraldana** (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Sin.: *Copiapoa esmeraldana* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison
var. **humilis**

Sin.: *Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *paposoensis* (F. Ritter) A. Hoffm., nom. inval., *Copiapoa paposoensis* F. Ritter, nom. inval., *Echinocactus humilis* Phil.
Hierba suculenta. Endémica. 200-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison
var. **longispina** (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Sin.: *Copiapoa longispina* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **taltalensis** (Werderm.) A.E. Hoffm.

Sin.: *Copiapoa chaniaralensis* F. Ritter, *Copiapoa taltalensis* (Werderm.) Looser, *Echinocactus taltalensis* Werderm.
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison
var. **tenuissima** (F. Ritter) G. Charles

Sin.: *Copiapoa tenuissima* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 600-800 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison
var. **tocopillana** (F. Ritter) G. Charles

Sin.: *Copiapoa tocopillana* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **varispinata** (F. Ritter) G. Charles
Sin.: *Copiapoa varispinata* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa hypogaea F. Ritter var. **hypogaea**
Sin.: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *barquitenis* F. Ritter, *Copiapoa mollicula* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 400-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Copiapoa hypogaea F. Ritter var. **montana** (F. Ritter) G. Charles
Sin.: *Copiapoa montana* F. Ritter, *Copiapoa olivana* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa krainziana F. Ritter
Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *krainziana* (F. Ritter) Slaba, *Copiapoa krainziana* F. Ritter var. *scopulina* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 300-900 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa laui L. Diers
Sin.: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *laui* (L. Diers) A. Hoffm.
Hierba suculenta. Endémica. 100-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Copiapoa longistaminea F. Ritter
Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *longistaminea* (F. Ritter) Slaba
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa marginata (Salm-Dyck) Britton & Rose var. **bridgesii** (Pfeiff.) A.E. Hoffm.
Sin.: *Copiapoa bridgesii* (Pfeiff.) Backeb., *Echinocactus bridgesii* Pfeiff.
Subarbusto suculento. Endémica. 200-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Copiapoa marginata (Salm-Dyck) Britton & Rose var. **marginata**
Sin.: *Copiapoa streptocaulon* (Hook.) Oosten, *Echinocactus columnaris* Pfeiff., *Echinocactus marginatus* Salm-Dyck, *Echinocactus streptocaulon* Hook.
Subarbusto suculento. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa megarhiza Britton & Rose
Sin.: *Copiapoa megarhiza* Britton & Rose var. *microrhiza* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 200-800 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa rarissima F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa rupestris F. Ritter
Sin.: *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *hornilloensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *rupestris* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter, *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *rubriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa hornilloensis* F. Ritter, *Copiapoa rubriflora* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT).

Copiapoa serpentisulcata F. Ritter
Sin.: *Copiapoa serpentisulcata* F. Ritter var. *castanea* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ATA).

Copiapoa solaris (F. Ritter) F. Ritter
Sin.: *Copiapoa conglomerata* (Phil.) Lembcke, *Copiapoa ferox* Lembcke & Backeb., nom. inval., *Echinocactus conglomeratus* Phil., *Pilocopiapoa solaris* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Corryocactus Britton & Rose

Corryocactus brevistylus (K. Schum. ex Vaupel) Britton & Rose
Sin.: *Cereus brevistylus* K. Schum., *Corryocactus krausii* Backeb.
Árbol suculento. Nativa. 2000-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Cumulopuntia F. Ritter

Cumulopuntia dactylifera (Vaupel) E.F. Anderson
Sin.: *Cumulopuntia pentlandii* (Salm-Dyck) F. Ritter var. *dactylifera* (Vaupel) F. Ritter, *Opuntia dactylifera* Vaupel
Hierba suculenta. Nativa.
Países: CHL(ANT).

Cumulopuntia pentlandii (Salm-Dyck) F. Ritter
Sin.: *Cumulopuntia rossiana* (Heinr. & Backeb.) F. Ritter, *Maihueniopsis pentlandii* (Salm-Dyck) R. Kiesling, *Opuntia pentlandii* Salm-Dyck, *Tephrocactus pentlandii* (Salm-Dyck) Backeb., *Tephrocactus pentlandii* (Salm-Dyck) Backeb. var. *rossianus* Heinr. & Backeb.
Subarbusto suculento. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CHA, JUJ).

Cumulopuntia sphaerica (C.F. Först.) E.F. Anderson
Sin.: *Cumulopuntia berteri* (Colla) F. Ritter, nom. inval., *Cumulopuntia tubercularis* F. Ritter, *Opuntia leucophaea* Phil., *Opuntia sphaerica* C.F. Först., *Tephrocactus dimorphus* (C.F. Först.) Backeb.
Hierba suculenta. Nativa. 0-3500 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Cylindropuntia (Engelm.) F.M. Knuth

Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. Knuth
Arbusto suculento. Introducida. 800-900 m.
Países: ARG(COR).

Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M. Knuth
Sin.: *Cactus tunicatus* Lehm., *Cylindropuntia tunicata* (Lehm.) Knuth var. *chilensis* F. Ritter, *Opuntia puelchana* A. Cast., *Opuntia tunicata* (Lehm.) Pfeiff., *Opuntia tunicata* (Lehm.) Pfeiff. var. *chilensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Arbusto suculento. Introducida. 500-3500 m.
Países: ARG(LPA, MEN). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Denmoza Britton & Rose

Denmoza rhodacantha (Salm-Dyck) Britton & Rose
Sin.: *Cereus erythrocephalus* (K. Schum.) A. Berger, *Cleistocactus rhodacanthus* (Salm-Dyck) Lem., *Denmoza erythrocephala* (K. Schum.) A. Berger, *Echinocactus rhodacanthus* Salm-Dyck, *Echinopsis rhodacantha* (Salm-Dyck) C.F. Först., *Pilocereus erythrocephalus* K. Schum., *Pilocereus rhodacanthus* (Salm-Dyck) Speg.
Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Cárdenas, *Echinopsis nigra* Backeb., *Furiolobivia dulcis-pauli* (Fric) Y. Ito, nom. illeg., *Furiolobivia ferox* (Britton & Rose) Y. Ito, *Furiolobivia longispina* (Britton & Rose) Y. Ito, *Furiolobivia nigra* (Backeb.) Y. Ito, *Lobivia ferox* Britton & Rose, *Lobivia hastisfera* Werderm., *Lobivia horrida* F. Ritter, *Lobivia longispina* Britton & Rose, *Lobivia pictiflora* F. Ritter, *Lobivia varispina* F. Ritter, *Pseudolobivia dulcis-pauli* (Fric) Krainz, hom. illeg., *Pseudolobivia ferox* (Britton & Rose) Backeb., *Pseudolobivia longispina* (Britton & Rose) Backeb. var. *nigra* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia longispina* (Britton & Rose) Backeb., *Pseudolobivia nigra* (Backeb.) Backeb.
Subarbusto suculento. Nativa. 2000-3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR).

Echinopsis mamillosa Gürke

Sin.: *Echinopsis kermesina* (Krainz) Krainz, *Echinopsis mamillosa* Gürke var. *flexilis* Rausch, *Echinopsis mamillosa* Gürke var. *kermesina* (Krainz) Friedrich, *Echinopsis ritteri* Boed., *Neolobivia ritteri* (Boed.) Y. Ito, *Pseudolobivia kermesina* Krainz
Hierba suculenta. Nativa. 2500-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Echinopsis oxygona (Link) Zucc.

Sin.: *Cereus geminatus* Otto, *Cereus multiplex* (Pfeiff.) Zucc., *Cereus turbinatus* Pfeiff., *Echinocactus eyriesii* Turpin, *Echinocactus oxygonus* Link, *Echinopsis eyriesii* (Turpin) Zucc. ex Pfeiff. & Otto, *Echinopsis geminata* (Otto) K. Schum., *Echinopsis multiplex* (Pfeiff.) Pfeiff. & Otto, *Echinopsis paraguayensis* F. Ritter, *Echinopsis turbinata* Pfeiff. & Otto
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(GUA). URY(CLA, TAC).

Echinopsis rhodotricha K. Schum.

Sin.: *Echinopsis adolphofriedrichii* G. Moser, *Echinopsis chacoana* Schütz, *Echinopsis minuana* Speg., *Echinopsis rhodotricha* K. Schum. subsp. *chacoana* (Schütz) P.J. Braun & Esteves, *Echinopsis rhodotricha* K. Schum. var. *brevispina* F. Ritter, *Echinopsis rhodotricha* K. Schum. var. *rosiflora* K. Schum.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SDE, SFE). PRY(APY, CON, COA). URY(PAY, RNO, SJO).

Echinopsis tubiflora (Pfeiff.) Zucc.

Sin.: *Cereus tubiflorus* Pfeiff.
Hierba subleñosa. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Epiphyllum Haw.

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.

Sin.: *Cactus phyllantus* L., *Epiphyllum phyllanthus* (L.) Haw. var. *paraguayense* (F.A.C. Weber) Backeb., *Phyllocactus phyllanthus* (L.) Link, *Phyllocactus phyllanthus* (L.) Link var. *paraguayense* F.A.C. Weber
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Eriosyce Phil.

Eriosyce aurata (Pfeiff.) Backeb. var. *aurata*

Sin.: *Echinocactus auratus* Pfeiff., *Echinocactus ceratistes* Otto ex Pfeiff., *Echinocactus sandillon* Gay, *Eriosyce algarrobensis* F. Ritter, *Eriosyce ceratistes* Britton & Rose, *Eriosyce ihotzkyana* F. Ritter var. *ausseiana* (F. Ritter) F. Ritter, *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *algarrobensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *mollensis* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *vallenarensis* (Backeb.) A.E. Hoffm.
Arbusto suculento. Endémica. 1500-2500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Eriosyce aurata (Pfeiff.) Backeb. var. *spinibarbis* (F. Ritter) Katt.

Sin.: *Eriosyce spinibarbis* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémica. 2000-2500 m.
Países: CHL(ATA).

Eriosyce ihotzkyana F. Ritter

Arbusto suculento. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ).

Eriosyce lapampaensis F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica. 200-2500 m.
Países: CHL(ATA).

Eriosyce megacarpa F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA).

Eriosyce rodentiophila F. Ritter

Sin.: *Eriosyce rodentiophila* F. Ritter
var. *lanata* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémica. 100-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Eulychnia Phil.

Eulychnia acida Phil.

Sin.: *Eulychnia acida* Phil. var. *elata* F. Ritter, *Eulychnia acida* Phil. var. *procumbens* F. Ritter
Árbol suculento. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Eulychnia aricensis F. Ritter

Árbol suculento. Endémica. 400-700 m.
Países: CHL(TAR).

Eulychnia breviflora Phil.

Sin.: *Cereus panoplaeatus* Monv., *Eulychnia barquitenis* F. Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var. *taltalensis* F. Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var. *tenuis* F. Ritter, *Eulychnia saint-pieana* F. Ritter var. *barquitenis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Árbol suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Eulychnia castanea Phil.

Sin.: *Cereus castaneus* (Phil.) K. Schum., *Philippicereus castaneus* (Phil.) Backeb.
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Eulychnia coquimbana (Molina) S.

Albesiano
Sin.: *Cactus coquimbanus* Molina, *Cereus coquimbanus* (Molina) K. Schum., *Echinopsis coquimbana* (Molina) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus coquimbanus* (Molina) Britton & Rose
Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Eulychnia iquiquensis (K. Schum.)

Britton & Rose
Sin.: *Cereus iquiquensis* K. Schum., *Eulychnia breviflora* Phil. subsp. *iquiquensis* (K. Schum.) D.R. Hunt, *Eulychnia iquiquensis* (K. Schum.) Britton & Rose var. *pullilana* F. Ritter
Árbol suculento. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Eulychnia saint-pieana F. Ritter

Árbol suculento. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Eulychnia vallenarensis P.C. Guerrero & H.E. Walter
Arbusto. Endémica. 600-1300 m.
Países: CHL(ATA).

Frailea Britton & Rose

Frailea buenekeri W.R. Abraham
Sin.: *Frailea buenekeri* W.R. Abraham subsp. *densispina* Hofacker & K. Herm, *Frailea densispina* (Hofacker & K. Herm) N. Gerloff
Hierba suculenta. Endémica. 200 m.
Países: BRA(RGS).

Frailea castanea Backeb.
Sin.: *Frailea asteroides* Werderm.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, RIV, SAO).

Frailea cataphracta (Dams) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus cataphractus* Dams, *Frailea cataphracta* (Dams) Britton & Rose subsp. *tuyensis* (Buining & G. Moser) Braun & Esteves, *Frailea tuyensis* Buining & G. Moser
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS). PRY(COA).

Frailea curvispina Buining & Brederoo
Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).

Frailea erythracantha R. Pontes, Oliveira-Deble & Deble
Hierba suculenta. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(RGS).

Frailea gracillima (Lem.) Britton & Rose subsp. **gracillima**
Sin.: *Echinocactus gracillimus* Lem., *Frailea alacriportana* Backeb. & Voll, *Frailea albifusca* F. Ritter, *Frailea gracillima* (Lem.) Britton & Rose subsp. *alacriportana* (Backeb. & Voll) N. Gerloff, *Frailea gracillima* (Lem.) Britton & Rose subsp. *albifusca* (F. Ritter) Braun & E. Pereira, *Frailea lepida* Buining & Brederoo, *Frailea pseudogracillima* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV).

Frailea gracillima (Lem.) Britton & Rose subsp. **horstii** (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves

Sin.: *Frailea horstii* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Frailea mamifera Buining & Brederoo subsp. **angelae** R. Kiesling & Metzger
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).

Frailea mamifera Buining & Brederoo subsp. **mamifera**
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Frailea perumbilicata F. Ritter
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART).

Frailea phaeodisca (Speg.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus pygmaeus* Speg. var. *phaeodisca* Speg., *Frailea perbella* Prestle, *Frailea pygmaea* (Speg.) Britton & Rose var. *phaeodisca* Speg.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, DUR, LAV, RIV, TAC).

Frailea pumila (Lem.) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus pumilus* Lem., *Frailea albiareolata* Buining & Brederoo, *Frailea carminifilamentosa* Backeb., *Frailea chrysacantha* Hrabec, nom. inval.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose subsp. **albicolumnaris** (F. Ritter) Hofacker
Sin.: *Frailea albicolumnaris* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose subsp. **fulviseta** (Buining & G. Moser) Braun & Esteves
Sin.: *Frailea fulviseta* Buining & Brederoo
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose subsp. **pygmaea**
Sin.: *Echinocactus dadakii* Fric, *Echinocactus pulcherrimus* Arechav., *Echinocactus pygmaeus* Speg., *Frailea asperispina* F. Ritter, *Frailea aureispina* F. Ritter, *Frailea dadakii* (Fric) A. Berger, *Frailea pulcherrima* (Arechav.) Speg.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(LAV, MAL, MON, RIV, SAO, TYT).

Frailea schilinzkyana (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose

Sin.: *Cactus schilinzkyanus* (F. Haage ex K. Schum.) Kuntze, *Echinocactus grahlianus* F. Haage ex K. Schum., *Echinocactus schilinzkyanus* F. Haage ex K. Schum., *Frailea conceptionensis* Buining & G. Moser, *Frailea friedrichii* Buining & G. Moser, *Frailea grahliana* (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose, *Frailea ignacionensis* Buining & G. Moser
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CON, PAI). URY(RNO).

Gymnocalycium Pfeiff. ex Mittler

Gymnocalycium albiareolatum Rausch
Sin.: *Gymnocalycium albiareolatum* Rausch var. *ramosum* Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium alenae Kulhánek
Hierba suculenta. Endémica. 600-700 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium amerhauseri H. Till
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium andreae (Boed.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus andreae* Boed., *Gymnocalycium andreae* (Boed.) Backeb. var. *grandiflorum* Krainz & Andreae, *Gymnocalycium andreae* (Boed.) Backeb. f. *sveticianum* Pazout ex H. Till
Hierba suculenta. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium angelae Merregalli
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Gymnocalycium anisitsii (K. Schum.) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus anisitsii* K. Schum., *Echinocactus damsii* K. Schum., *Echinocactus joossensianum* Boed., *Gymnocalycium anisitsii* (K. Schum.) Britton & Rose subsp. *multiproliferum* (P.J. Braun) P.J. Braun, *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *centrispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.)

Britton & Rose var. *multiproliferum*
P.J. Braun, *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *rotundulum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *torulosum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *tucavocense* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose, *Gymnocalycium joossensianum* (Boed.) Britton & Rose
Hierba suculenta. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Gymnocalycium baldianum (Speg.) Speg.
Sin.: *Echinocactus baldianus* Speg., *Echinocactus sanguiniflorus* Werderm., *Gymnocalycium baldianum* (Speg.) Speg. f. *venturianum* (Fric ex Backeb.) J.G. Lamb., *Gymnocalycium baldianum* (Speg.) Speg. var. *albiflorum* C.A.L. Bercht, *Gymnocalycium sanguiniflorum* (Werderm.) Werderm., *Gymnocalycium venturianum* Fric ex Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT).

Gymnocalycium bayrianum H. Till
Sin.: *Gymnocalycium spegazzinii* Britton & Rose var. *bayrianum* (H. Till) Halda
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus var. **brigittae** Piltz
Hierba suculenta. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus var. **bruchii**
Sin.: *Echinocactus lafaldensis* Berger, *Frailea bruchii* Speg., *Gymnocalycium andreae* (Boed.) Backeb. subsp. *carolinense* Neuhuber, *Gymnocalycium bruchii* (Speg.) Hosseus var. *enorme* (Oehme) Backeb., *Gymnocalycium bruchii* (Speg.) Hosseus var. *hossei* Backeb., *Gymnocalycium lafaldense* Vaupel
Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus var. **niveum** Rausch
Sin.: *Gymnocalycium albispinum* Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium bueneckeri (Buining) Swales
Sin.: *Gymnocalycium horstii* Buining var. *bueneckeri* Buining
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Gymnocalycium calochlorum (Boed.) Y. Ito
Sin.: *Echinocactus calochlorus* Boed., *Echinocactus prolifer* Backeb., *Gymnocalycium calochlorum* (Boed.) Y. Ito var. *proliferum* (Backeb.) Backeb., *Gymnocalycium papschii* H. Till
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium campestre Repka
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium capillense (Schick) Hosseus
Sin.: *Echinocactus capillaensis* Schick, *Echinocactus sigelianum* Schick, *Echinocactus sutterianum* Schick, *Gymnocalycium deezianum* Dölz, *Gymnocalycium sigelianum* (Schick) Hosseus, *Gymnocalycium sutterianum* (Schick) Hosseus
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium castellanosii Backeb. var. **bozsingianum** (Schütz) Piltz
Sin.: *Gymnocalycium bozsingianum* Schütz
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium castellanosii Backeb. var. **castellanosii**
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium castellanosii Backeb. subsp. **acorrugatum** (J.G. Lamb.) R. Kiesling & Metzger
Sin.: *Gymnocalycium acorrugatum* J.G. Lamb.
Hierba suculenta. Endémica.
Países: ARG(SJU).

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler
Sin.: *Echinocactus denudatus* Link & Otto
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV).

Gymnocalycium erinaceum J.G. Lamb.
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium eurypleurum F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.
Países: PRY(APY).

Gymnocalycium fischeri Halda, Kupcák, Lukasik & Sladk.
Hierba suculenta. Endémica.
Países: ARG(SLU).

Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler
Sin.: *Cactus gibbosus* Haw., *Cereus gibbosus* (Haw.) Pfeiff., *Echinocactus brachypetalus* (Speg.) Werderm., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *cerebriformis* Speg., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *chubutensis* Speg., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *cristatus* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *ferox* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *leonensis* Hildm. ex K. Schum., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *leucacanthus* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *leucodictyus* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *pluricostatus* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *polygonus* K. Schum., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *schlumbergeri* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC., *Echinocactus leucodictyus* Salm-Dyck, *Gymnocalycium borthii* Koop ex H. Till, *Gymnocalycium brachypetalum* Speg., *Gymnocalycium chubutense* (Speg.) Speg., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *brachypetalum* (Speg.) Papsch, *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *celsianus* (Labour.) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *celsianus* Rümpler, *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *chubutense* (Speg.) Papsch, *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *fennellii* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *fennellii* (F. Haage ex Quehl) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *ferox* (Labour.) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium strigilium* Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SCR, SLU).

Gymnocalycium horstii Buining
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Gymnocalycium hybopleurum (K. Schum.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus multiflorus*
Hook. var. *hybopleurus* K. Schum.,
Gymnocalycium ambatoense Piltz,
Gymnocalycium catamarcense H. Till &
W. Till subsp. *acinacispinum* H. Till &
W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H.
Till & W. Till subsp. *schmidianum* H. Till
& W. Till, *Gymnocalycium catamarcense*
H. Till & W. Till, p.p., *Gymnocalycium*
hybopleurum (K. Schum.) Backeb.
var. *breviflorum* Backeb., nom. inval.,
Gymnocalycium hybopleurum (K. Schum.)
Backeb. var. *centrispinum* Backeb., nom.
inval., *Gymnocalycium hybopleurum*
(K. Schum.) Backeb. var. *euchlorum*
Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium*
hybopleurum (K. Schum.) Backeb.
var. *ferocior* Backeb., nom. inval.,
Gymnocalycium hybopleurum (K. Schum.)
Backeb. var. *ferox* Backeb., nom. inval.,
Gymnocalycium nigriareolatum Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 1000-
2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Gymnocalycium hyptiacanthum
(Lem.) Britton & Rose

Sin.: *Echinocactus hyptiacanthus* Lem.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). URY(CAS, COL,
FLA, LAV, MAL, RNO, ROC, SAO, SOR).

Gymnocalycium kieslingii O. Ferrari
f. **albiareolatum** O. Ferrari
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium kieslingii O. Ferrari
f. **castaneum** O. Ferrari
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium kieslingii O. Ferrari
f. **kieslingii**
Hierba suculenta. Endémica. 500-
1500 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium kroenleinii R.
Kiesling, Rausch & O. Ferrari
Hierba suculenta. Endémica. 1200-
1400 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium kuehhasii Neuhuber
& Sperling
Hierba suculenta. Endémica. 500-600 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium leptanthum (Speg.) Speg.
Sin.: *Echinocactus platensis* Speg. var.
leptanthus Speg.
Hierba suculenta. Endémica. 500-
1000 m.
Países: ARG(SDE).

Gymnocalycium marianae Perea, O.
Ferrari, Las Peñas & R. Kiesling
Hierba suculenta. Endémica. 1700-1800 m.
Países: ARG(CAT).

Gymnocalycium marsoneri Fric ex Y. Ito
Sin.: *Gymnocalycium knebelii* Fric,
nom. nud.
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Gymnocalycium mazanense (Backeb.)
Backeb.
Sin.: *Echinocactus mazanensis* Backeb.,
Gymnocalycium guachinense Schütz,
Gymnocalycium mazanense (Backeb.)
Backeb. var. *breviflorum* Backeb.,
Gymnocalycium mazanense (Backeb.)
Backeb. var. *ferox* Backeb., nom. inval.,
Gymnocalycium nidulans Fric ex Backeb.,
Gymnocalycium weissianum Backeb.,
Gymnocalycium weissianum Backeb.
var. *atroroseum* Backeb., nom. inval.,
Gymnocalycium weissianum Backeb. var.
cinerascens Backeb., nom. inval.
Hierba suculenta. Endémica. 500-
1000 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium megatae Y. Ito
Sin.: *Gymnocalycium eytianum*
Cárdenas, *Gymnocalycium fricianum*
Plesnik, nom. inval., *Gymnocalycium*
tudae Y. Ito
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Gymnocalycium mesopotamicum R.
Kiesling
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Gymnocalycium mihanovichii (Fric
ex Gürke) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus mihanovichii* Fric ex Gürke
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, PHA).

Gymnocalycium monvillei (Lem.)
Britton & Rose subsp. **achirasense** (H.
Till & Schatzl ex H. Till) H. Till
Sin.: *Gymnocalycium achirasense* H.
Till & Schatzl ex H. Till, *Gymnocalycium*

horrispinum G. Frank ex H. Till var.
achirasense (H. Till & Schatzl ex H. Till) Lodé
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Gymnocalycium monvillei (Lem.)
Britton & Rose subsp. **horridispinum**
(G. Frank ex H. Till) H. Till
Sin.: *Gymnocalycium horridispinum* G.
Frank ex H. Till
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium monvillei (Lem.)
Britton & Rose subsp. **monvillei**
Sin.: *Echinocactus brachyanthum* Gürke,
Echinocactus monvillei Lem., *Echinocactus*
multiflorus Hook. var. *albispinus* K. Schum.,
Echinocactus multiflorus Hook. var. *parisiense*
K. Schum., *Echinocactus multiflorus* Hook.,
Gymnocalycium brachyanthum (Gürke)
Britton & Rose, *Gymnocalycium monvillei*
(Lem.) Britton & Rose subsp. *brachyanthum*
(Gürke) H. Till, *Gymnocalycium monvillei*
(Lem.) Britton & Rose var. *grandiflorum*
(Backeb.) H. Till, *Gymnocalycium multiflorum*
(Hook.) Britton & Rose var. *albispinus* K.
Schum., *Gymnocalycium multiflorum* (Hook.)
Britton & Rose var. *parisiense* (K. Schum.)
Backeb., *Gymnocalycium multiflorum*
(Hook.) Britton & Rose, *Gymnocalycium*
schuetzianum H. Till & Schatzl
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Gymnocalycium mostii (Gürke)
Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus kurtzianum*
Gürke, *Echinocactus mostii* Gürke,
Gymnocalycium bicolor Schütz,
Gymnocalycium inmemoratum A.
Cast. & Lelong, *Gymnocalycium*
kurtzianum (Gürke) Britton & Rose,
Gymnocalycium mostii (Gürke) Britton &
Rose var. *kurtzianum* (Gürke) Backeb.,
Gymnocalycium tobuschianum Schick,
Gymnocalycium valnicekianum Jajó,
Gymnocalycium valnicekianum Jajó var.
polycentralis Schütz
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium mucidum Oehme
Sin.: *Gymnocalycium ferrarii* Rausch,
Gymnocalycium glaucum F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium neuhuberi H. Till & W. Till

Hierba suculenta. Endémica.
Países: ARG(SLU).

Gymnocalycium ochoterenae Backeb. subsp. **ochoterenae**

Sin.: *Gymnocalycium bodenbenderianum* (Hosseus ex A. Berger) A. W. Hill subsp. *intertextum* (Backeb. ex H. Till) H. Till, *Gymnocalycium intertextum* Backeb. ex H. Till, *Gymnocalycium kozelskianum* Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium mosserianum* Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. subsp. *herbsthoferianum* H. Till & Neuhuber, *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. var. *cinereum* Backeb., *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. var. *polygonum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. var. *scoparium* H. Till & Neuhuber, *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. var. *tenuispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. var. *variispinum* Backeb., nom. inval.
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Gymnocalycium ochoterenae Backeb. subsp. **vatteri** (Buining) Papsch

Sin.: *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. var. *altautinense* Papsch, *Gymnocalycium vatteri* Buining
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium oenanthemum Backeb.

Sin.: *Gymnocalycium carminanthum* Borth & Koop, *Gymnocalycium tillianum* Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT).

Gymnocalycium paediophilum F. Ritter ex Schütz

Sin.: *Gymnocalycium paediophilum* F. Ritter, nom. illeg.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Gymnocalycium paraguayense (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzging & R. Kiesling

Sin.: *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *andersohnianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *heuschkelianus* F. Haage,

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *meiklejohnianus* F. Haage, *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *andersohnianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *heuschkelianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *meiklejohnianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb. var. *andersohnianum* (F. Haage) Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb. var. *anoplum* Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb. var. *heuschkelianum* (F. Haage) Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb. var. *meiklejohnianum* (F. Haage) Schütz, nom. inval.
Hierba suculenta. Endémica. 100-300 m.
Países: PRY(COA, PAI).

Gymnocalycium paraguayense (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**

Sin.: *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *anisitsii* Fric, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *bruennowianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *delaetianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *golzianus* Mundt, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *paraguayensis* F. Haage, nom. inval., *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *roseiflorus* K. Schum., *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *scheidelianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *wagnerianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *wieditzianus* F. Haage, *Echinocactus paraguayensis* K. Schum. ex Chodat & Hassl., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *delaetianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *golzianum* (Mundt) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *paraguayense* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *roseiflorum* (K. Schum.) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium*

denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *scheidelianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *wieditzianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium paraguayense* (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *roseiflorum* (K. Schum.) Schütz, *Gymnocalycium paraguayense* (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *scheidelianum* (F. Haage) Schütz, *Gymnocalycium paraguayense* (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *wagnerianum* (F. Haage) Schütz, *Gymnocalycium paraguayense* (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *wieditzianum* (F. Haage) Schütz

Hierba suculenta. Endémica. 100-300 m.
Países: PRY(COA, PAI).

Gymnocalycium parvulum (Speg.) Speg.

Sin.: *Echinocactus parvulum* Speg., *Echinocactus platensis* Speg. var. *parvula* (Speg.) Speg., *Gymnocalycium berchtii* Neuhuber
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SLU).

Gymnocalycium pflanzii (Vaupel)

Werderm. subsp. **argentinense** H. Till & W. Till
Sin.: *Gymnocalycium marquezii* Cárdenas var. *argentinense* Backeb., nom. inval.

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL). PRY(APY, PHA).

Gymnocalycium pugionacanthum Backeb. ex H. Till

Sin.: *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *belenense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *encispinum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *montanum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *schmidianum* H. Till & W. Till
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Gymnocalycium quehlianum (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus

Sin.: *Echinocactus platensis* Speg. var. *quehlianus* (F. Haage ex Quehl) Speg., *Echinocactus quehlianus* F. Haage ex Quehl, *Gymnocalycium asterium* A. Cast. var. *minimum* Pazout, nom. inval., *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *albispinum*

Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *flavispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *zantnerianum* Schick, *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *rolfianum* Schick, *Gymnocalycium stellatum* Speg. var. *flavispinum* Bozsing ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium stellatum* Speg. var. *kleinianum* Rausch ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium stellatum* Speg. var. *zantnerianum* (Schick) H. Till & W. Till
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium ragonesei A. Cast.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CAT).

Gymnocalycium raineri H. Till
Hierba suculenta. Endémica.
Países: ARG(CAT).

Gymnocalycium reductum (Link) Pfeiff. & Otto var. ***platense*** (Speg.) R. Kiesling
Sin.: *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *platensis* Speg., *Echinocactus platensis* Speg., *Gymnocalycium platense* (Speg.) Britton & Rose
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI).

Gymnocalycium reductum (Link) Pfeiff. & Otto var. ***reductum***
Sin.: *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *nobilis* Lem., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *ventanica* Speg., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *nobile* (K. Schum.) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium platense* (Speg.) Britton & Rose var. *ventanica* (Speg.) R. Kiesling, *Gymnocalycium schatzlianum* Strigl & W. Till
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI).

Gymnocalycium ritterianum Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium robustum R. Kiesling, O. Ferrari & Metzger
Hierba suculenta. Endémica.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Rose var. ***jujuyense*** Backeb.
Sin.: *Brachycalycium tilcarensis* (Backeb.) Backeb., nom. illeg., *Gymnocalycium saglionis* (Cels) Britton & Rose var. *tilcarensis* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium saglionis* (Cels) Britton & Rose subsp. *tilcarensis* (Backeb.) H. Till & W. Till, comb. illeg., *Gymnocalycium tilcarensis* Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Rose var. ***saglionis***
Sin.: *Echinocactus saglionis* Cels
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

Gymnocalycium schickendantzii (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. ***delaetii*** (K. Schum.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus delaetii* K. Schum., *Gymnocalycium delaetii* (K. Schum.) Hosseus
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Gymnocalycium schickendantzii (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. ***schickendantzii***
Sin.: *Echinocactus schickendantzii* F.A.C. Weber, *Gymnocalycium antherostele* F. Ritter, *Gymnocalycium michoga* Fric ex Y. Ito, *Gymnocalycium pungens* Fleischer
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Gymnocalycium schroederianum Osten subsp. ***bayense*** R. Kiesling
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Gymnocalycium schroederianum Osten subsp. ***boessii*** R. Kiesling, Marchesi & O. Ferrari
Sin.: *Gymnocalycium erolesii* Neuhuber & C.A.L. Bercht
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(SFE).

Gymnocalycium schroederianum Osten subsp. ***paucicostatum*** R. Kiesling
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Gymnocalycium schroederianum Osten subsp. ***schroederianum***
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). URY(RNO).

Gymnocalycium spegazzinii Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus loricatus* Speg., nom. illeg., *Gymnocalycium spegazzinii* Britton & Rose var. *major* Backeb., *Gymnocalycium spegazzinii* Britton & Rose var. *punillense* H. Till & W. Till
Hierba suculenta. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Gymnocalycium stellatum Speg.
Sin.: *Echinocactus bodenbenderianus* Hosseus ex A. Berger, *Echinocactus stellatus* Speg., hom. illeg., *Gymnocalycium asterium* A. Cast. var. *paucispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium asterium* A. Cast., nom. illeg., *Gymnocalycium bodenbenderianum* (Hosseus ex A. Berger) A. W. Hill, *Gymnocalycium obductum* Piltz, *Gymnocalycium occultum* Fric ex Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium piltziorum* Schütz, *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *stellatum* Dözl, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till subsp. *kozelskianum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till subsp. *paucispinum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till subsp. *piltziorum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *guasayense* Strigl, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *guthianum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *mirandaense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *pipanacoense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *platygonum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *sanjuanense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium stellatum* Speg. subsp. *occultum* Fric ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium triacanthum* Backeb., nom. inval.
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU).

Gymnocalycium stenopleurum F. Ritter
Sin.: *Gymnocalycium friedrichii* (Werderm.) Pazout, nom. inval., *Gymnocalycium mihanovichii* (Fric ex Gürke) Britton & Rose var. *friedrichii* Werderm.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Gymnocalycium stuckertii (Speg.)

Britton & Rose

Sin.: *Echinocactus stuckertii* Speg.
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SLU).

Gymnocalycium sutterianum

(Schick) Hosseus subsp.

arachnispinum Repka

Hierba suculenta. Endémica.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium sutterianum(Schick) Hosseus subsp. **dolezalii**

(Halda & Milt) Repka

Hierba suculenta. Endémica.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium tatingaense Piltzsubsp. **fuschilloi** Neuhuber

Hierba suculenta. Endémica. 600-700 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium tatingaense Piltzsubsp. **tatingaense**

Sin.: *Gymnocalycium gaponi* Neuhuber
Hierba suculenta. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR).

Gymnocalycium uebelmannianum

Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(LRI).

Gymnocalycium uruguayense

(Arechav.) Britton & Rose

Sin.: *Echinocactus guerkeanum* Heese,
Echinocactus uruguayense Arechav.,
Gymnocalycium artigas Herter,
Gymnocalycium guerkeanum (Heese)
Britton & Rose

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).

URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Haageocereus Backeb.**Haageocereus australis** Backeb.

Sin.: *Haageocereus australis* Backeb.
f. *subtilispinus* F. Ritter, *Haageocereus multicolorispinus* Buining
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(TAR).

Haageocereus fascicularis (Meyen) F. Ritter

Sin.: *Cereus fascicularis* Meyen,
Trichocereus fascicularis (Meyen) Britton
& Rose, *Weberbauerocereus fascicularis* (Meyen) Backeb.

Arbusto suculento. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Harrisia Britton**Harrisia bonplandii** (Pfeiff.) Britton & Rose

Sin.: *Cereus balansae* K. Schum.,
Cereus bonplandii Pfeiff., *Cereus guelichii* Speg.,
Eriocereus bonplandii (Pfeiff.) Riccob.,
Eriocereus guelichii (Speg.) A. Berger,
Harrisia balansae (K. Schum.) N.P. Taylor,
Harrisia guelichii (Speg.) Britton & Rose,
Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. *bonplandii* (Pfeiff.) Braun & E. Pereira

Hierba suculenta. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CON, COA, GUA, NAS, PAI, PHA, SPE).

Harrisia hahniana (Backeb.) Kimnach & Hutchison ex Kimnach

Sin.: *Echinopsis hahniana* (Backeb.) R.S. Wallace,
Mediocactus hahnianus Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 200 m.
Países: PRY(CON).

Harrisia martinii (Labour.) Britton

Sin.: *Cereus martinii* Labour., *Cereus martinii* Labour. var. *perviridis* Weing.,
Eriocereus martinii (Labour.) Riccob.
Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PHA).

Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **pomanensis**

Sin.: *Cereus pomanensis* F.A.C. Weber ex K. Schum.,
Eriocereus polyacanthus F. Ritter,
Eriocereus pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) A. Berger,
Eriocereus tarijensis F. Ritter,
Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. *tarijensis* (F. Ritter) Braun & E. Pereira
Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp.**regelii** (Weing.) R. Kiesling

Sin.: *Cereus regelii* Weing., *Eriocereus regelii* (Weing.) Backeb., *Harrisia regelii* (Weing.) Borg
Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI, SFE). URY(ART, RNO).

Harrisia tortuosa (Forbes ex Otto & D. Dietr.) Britton & Rose

Sin.: *Cereus arendtii* Hildmann & Mathsson ex K. Schum.,
Cereus tortuosus Forbes ex Otto & D. Dietr.,
Eriocereus tortuosus (Forbes ex Otto & D. Dietr.) Riccob.
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, COA). URY(ART, MON, RNO).

Hattiora Britton & Rose**Hattiora gaertneri** (Regel) Barthlott

Sin.: *Rhipsalidopsis gaertneri* (Regel) Moran
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hattiora rosea (Lagerh.) Barthlott

Sin.: *Rhipsalidopsis rosea* (Lagerh.) Britton & Rose,
Rhipsalis rosea Lagerh.
Hierba epífita. Nativa. 1000-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hattiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose

Sin.: *Rhipsalis salicornioides* Haw.
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR).

Islaya Backeb.**Islaya caligophila** (R. Pinto) Faúndez & R. Kiesling

Sin.: *Eriosyce caligophila* R. Pinto
Hierba suculenta. Endémica. 600-700 m.
Países: CHL(TAR).

Islaya iquiquensis (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Sin.: *Eriosyce iquiquensis* (F. Ritter) Ferryman,
Eriosyce recondita (F. Ritter) Katt. subsp. *iquiquensis* (F. Ritter) Katt.,
Neochilena iquiquensis (F. Ritter) Backeb.,
Neoporteria aricensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floribunda* (Backeb.) A.E. Hoffm.,
Neoporteria aricensis (F. Ritter) Donald & G.D.

Rowley var. *saxifraga* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria iquiquensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *residua* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria residua* (F. Ritter & Buining) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus aricensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus floribundus* (Backeb.) F. Ritter, nom. inval., *Pyrrhocactus residuus* F. Ritter & Buining, *Pyrrhocactus saxifragus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 600-1000 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Islaya islayensis (C.F. Först.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus islayensis* C.F. Först., *Islaya krainziana* F. Ritter, *Eriogyce islayensis* (C.F. Först.) Katt., *Neoporteria krainziana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
Hierba suculenta. Nativa.
Países: CHL(TAR).

Islaya laui (Luthy) Faúndez & R. Kiesling
Sin.: *Eriogyce laui* Luthy, *Rimacactus laui* (Luthy) Mottram
Hierba suculenta. Endémica. 500-700 m.
Países: CHL(ANT).

Lepismium Pfeiff.

Lepismium lineare (K. Schum.) Barthlott
Sin.: *Rhipsalis linearis* K. Schum.
Hierba suculenta. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

Lepismium warmingianum (K. Schum.) Barthlott
Sin.: *Rhipsalis warmingiana* K. Schum.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leucostele Backeb.

Leucostele litoralis (Johow) P.C. Guerrero & H.E. Walter
Sin.: *Cereus litoralis* Johow, *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *litoralis* (Johow) Lowry, *Echinopsis litoralis* (Johow) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose subsp. *litoralis* (Johow) Faúndez, *Trichocereus litoralis* (Johow) Looser
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO).

Leucostele nigripilis (Phil.) P.C. Guerrero & H.E. Walter
Sin.: *Cereus nigripilis* Phil., *Echinopsis nigripilis* (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus coquimbanus* (Molina) Britton & Rose var. *nigripilis* (Phil.) Borg, *Trichocereus nigripilis* (Phil.) Baker
Arbusto suculento. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Leucostele skottsbergii (Backeb. ex Skotts.) P.C. Guerrero & H.E. Walter
Sin.: *Cereus skottsbergii* Backeb. ex Skotts.
Arbusto suculento. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(COQ).

Lobivia Britton & Rose

Lobivia bruchii Britton & Rose
Sin.: *Echinopsis bruchii* (Britton & Rose) A. Cast. & Lelong, *Echinopsis grandis* (Britton & Rose) Friedrich, *Eriogyce bruchii* (Britton & Rose) Backeb., *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *bruchii* (Britton & Rose) Rausch, *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *grandis* (Britton & Rose) Rausch, *Lobivia grandis* Britton & Rose, *Pseudobolivia grandis* (Britton & Rose) Krainz, *Soehrensia bruchii* (Britton & Rose) Backeb., *Soehrensia grandis* (Britton & Rose) Backeb., *Trichocereus bruchii* (Britton & Rose) F. Ritter var. *brevispinus* F. Ritter, *Trichocereus grandis* (Britton & Rose) F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(TUC).

Lobivia chrysantha (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**
Sin.: *Echinopsis chrysantha* Werderm., *Echinopsis hossei* Werderm., *Hymenorebutia chrysantha* (Werderm.) F. Ritter, *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. var. *hossei* (Werderm.) Backeb., *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. var. *janseniana* Backeb., *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. var. *leucantha* (Backeb.) Backeb., *Lobivia dragai* Fric, *Lobivia hanseniana* Backeb., *Lobivia hossei* (Werderm.) Backeb., *Lobivia janseniana* Backeb., *Lobivia klusacekii* Fric, *Lobivia polaskiana* Backeb., *Lobivia schuldtii* Fric, *Lobivia staffenii* Fric
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Lobivia chrysantha (Werderm.) Backeb. var. **hypocyrtia** Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Lobivia chrysochete (Werderm.) Wessner var. **chrysochete**
Sin.: *Echinopsis chrysochete* Werderm., *Lobivia chrysochete* (Werderm.) Wessner var. *markusii* (Rausch) Rausch, *Lobivia chrysochete* (Werderm.) Wessner var. *subtilis* Rausch, *Lobivia hystrix* F. Ritter, *Lobivia markusi* Rausch
Hierba suculenta. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Lobivia chrysochete (Werderm.) Wessner var. **minutiflora** Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 3500-4000 m.
Países: ARG(SAL).

Lobivia crassicaulis Backeb. ex R. Kiesling
Sin.: *Echinopsis crassicaulis* (Backeb. ex R. Kiesling) Friedrich & Glaetzle, *Helianthocereus crassicaulis* Backeb., nom. inval., *Trichocereus catamarcensis* F. Ritter, nom. inval.
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT).

Lobivia densispina (Werderm.) Buining
Sin.: *Echinopsis densispina* Werderm. var. *pectinifera* (Wessner) J.G. Lamb., *Echinopsis densispina* Werderm., *Echinopsis rebutioides* (Backeb.) Friedrich, *Hymenorebutia albolanata* Buining, *Hymenorebutia chlorogona* (Wessner) F. Ritter, *Hymenorebutia densispina* (Werderm.) Buining, *Hymenorebutia pectinifera* (Wessner) Donald, *Hymenorebutia rebutioides* Fric & Kreuz., *Lobivia albolanata* (Buining) Krainz, *Lobivia chlorogona* Wessner, *Lobivia densispina* (Werderm.) Buining var. *blossfeldii* Wessner, *Lobivia densispina* (Werderm.) Buining var. *sanguinea* Wessner, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose subsp. *densispina* (Werderm.) G.D. Rowley, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *densispina* (Werderm.) Rausch, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *rebutioides* (Backeb.) Rausch, *Lobivia napina* Pazout, *Lobivia pectinifera* Wessner, *Lobivia rebutioides*

Backeb. var. *citriniflora* Backeb., *Lobivia rebutioides* Backeb. var. *krausiana* Backeb., *Lobivia rebutioides* Backeb., *Lobivia scoparia* Werderm., *Lobivia sublimiflora* Backeb., *Lobivia wessneriana* Fritzen, *Salpingolobivia densispina* (Werderm.) Y. Ito
Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Lobivia einsteinii (Fric) Rausch

Sin.: *Cylindrorebutia einsteinii* (Fric) Donald, *Lobivia aurantida* Wessner, *Lobivia columnaris* Wessner, *Lobivia conoidea* Wessner, *Lobivia einsteinii* (Fric) Rausch var. *atrospinoso* Rausch, *Lobivia einsteinii* (Fric) Rausch var. *aureiflora* Rausch, *Lobivia einsteinii* (Fric) Rausch var. *elegans* (Backeb.) Rausch, *Lobivia schmiedcheniana* J. Köhler, *Mediolobivia aurantida* (Wessner) Backeb. var. *flaviflora* Backeb., *Mediolobivia aurantida* (Wessner) Backeb., *Mediolobivia aureiflora* Backeb., *Mediolobivia boedekeriana* Backeb., *Mediolobivia conoidea* (Wessner) Krainz var. *columnaris* (Wessner) Backeb., *Mediolobivia conoidea* (Wessner) Krainz, *Mediolobivia duarsmaiana* Backeb., *Mediolobivia elegans* Backeb., *Mediolobivia rubelliflora* Backeb., *Mediolobivia rubriflora* Backeb., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *einsteinii* (Fric) Backeb., comb. illeg., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *karrereri* (Fric) Backeb., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *rubriviridis* (Fric) Backeb., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *steineckeii* (Fric) Backeb., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz, *Rebutia einsteinii* (Fric) Kreuz., *Rebutia nicolai* Fric & Kreuz., *Rebutia rubriviride* Fric & Kreuz., *Rebutia aureiflora* Backeb., *Rebutia blossfeldii* Werderm., *Rebutia einsteinii* Fric var. *atrospinoso* (Rausch) Sida, *Rebutia einsteinii* Fric var. *karrei* (Fric ex Backeb.) Sida, *Rebutia einsteinii* Fric var. *rubroviridis* (Backeb.) Buining & Donald, *Rebutia einsteinii* Fric, *Rebutia sarothroides* Werderm., *Rebutia schmiedcheniana* (U. Köhler) W.T. Marshall
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Lobivia euanthema Backeb.

Sin.: *Digitorebutia euanthema* (Backeb.) Buining, *Lobivia euanthema* Backeb. var. *tilcarensis* Rausch, *Mediolobivia euanthema* (Backeb.) Krainz, *Mediolobivia euanthema* (Backeb.) Krainz var. *oculata* (Werderm.) Krainz, *Rebutia oculata* Werderm., *Rebutia pilifera* Fric
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Lobivia famatimensis (Speg.) Britton & Rose var. **famatimensis**

Sin.: *Chileorebutia reichei* Kreuz., nom. nud., *Echinocactus famatimensis* Speg., *Echinopsis famatimensis* (Speg.) Werderm., *Lobivia famatimensis* (Speg.) Britton & Rose var. *jachalensis* Rausch, *Rebutia famatimensis* (Speg.) Speg., *Reicheocactus pseudoreichianus* Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Lobivia famatimensis (Speg.) Britton & Rose var. **sanjuanensis** Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(SJU).

Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Sin.: *Acanthocalycium formosum* (Pfeiff.) Backeb., *Acanthocalycium oreopepon* (Speg.) Backeb., *Echinocactus formosus* Pfeiff., *Echinopsis formosa* (Pfeiff.) Jacobi ex Salm-Dyck, *Echinopsis ingens* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis oreopepon* (Speg.) Werderm., *Echinopsis uebelmanniana* (Lembcke & Backeb.) A.E. Hoffm., nom. inval., *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *uebelmanniana* (Lembcke & Backeb.) Rausch, *Lobivia oreopepon* Speg., *Soehrensia formosa* (Pfeiff.) Backeb. var. *maxima* Backeb., *Soehrensia formosa* (Pfeiff.) Backeb. var. *polycephala* Backeb., *Soehrensia formosa* (Pfeiff.) Backeb., *Soehrensia ingens* Backeb., *Soehrensia oreopepon* (Speg.) Backeb., *Soehrensia uebelmanniana* Lembcke & Backeb., nom. inval., *Trichocereus formosus* (Pfeiff.) F. Ritter, *Trichocereus ingens* (Backeb.) F. Ritter, *Trichocereus uebelmannianus* (Lembcke & Backeb.) F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU). CHL(ANT).

Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds var. **rosarioana** (Rausch) Rausch

Sin.: *Lobivia rosarioana* Rausch
Subarbusto suculento. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(LRI).

Lobivia gonjianii (R. Kiesling) R. Kiesling

Sin.: *Lobivia einsteinii* (Fric) Rausch var. *gonjianii* (R. Kiesling) Donald,

Rebutia einsteinii Fric var. *gonjianii* (R. Kiesling) Donald, *Rebutia fleischreiana* Slaba, *Rebutia gonjianii* R. Kiesling
Hierba suculenta. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. **amblayensis** (Rausch)

Rausch ex G.D. Rowley
Sin.: *Lobivia amblayensis* Rausch var. *albispina* Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(SAL).

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. **fechseri** (Rausch) Rausch ex G.D. Rowley

Sin.: *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *hualfimensis* (Rausch) Rausch, *Lobivia hualfimensis* Rausch, *Lobivia hualfimensis* Rausch var. *fechseri* Rausch
Hierba suculenta. Endémica.
Países: ARG(SAL).

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Sin.: *Echinocactus haematanthus* Speg., *Echinopsis amblayensis* (Rausch) Friedrich, *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *elongata* (Backeb.) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *hualfimensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *jasimanensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt, *Echinopsis hualfimensis* (Rausch) Friedrich & Glaetzle, *Lobivia amblayensis* Rausch, *Lobivia elongata* Backeb., *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *elongata* (Backeb.) Rausch, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *jasimanensis* Rausch, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *viridis* Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Sin.: *Echinopsis cachensis* Speg., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *chorrillosensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *kuehnrichii* (Fric) J.G. Lamb., *Echinopsis kuehnrichii* (Fric) Friedrich & Glaetzle, *Hymenorebutia drijveriana* (Backeb.) F. Ritter, *Hymenorebutia kuehnrichii* (Fric)

F. Ritter, *Lobivia cachensis* (Speg.) Britton & Rose, *Lobivia chorrillosensis* Rausch, *Lobivia drijveriana* Backeb. var. *astranthema* Backeb., *Lobivia drijveriana* Backeb. var. *aurantiaca* Backeb., *Lobivia drijveriana* Backeb. var. *nobilis* Backeb., *Lobivia drijveriana* Backeb., *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose subsp. *kuehnrichii* (Fric) G.D. Rowley, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *chorrillosensis* (Rausch) G.D. Rowley, *Lobivia kuehnrichii* Fric, *Lobivia nigrispina* Backeb. var. *rubiflora* Backeb., *Lobivia nigrispina* Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Lobivia jajoiana Backeb. var. **jajoiana**

Sin.: *Lobivia buiningiana* F. Ritter, *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. subsp. *jajoiana* (Backeb.) G.D. Rowley, *Lobivia gregeri* Kreuz., *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *aurata* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *carminantha* Wessner, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *caspalensis* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *elegans* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *fleischeriana* Backeb., *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *nidularis* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *nigrostoma* (Kreuz. & Buining) Backeb., *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *pungens* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *splendens* Wessner, *Lobivia nigrostoma* Kreuz. & Buining, *Lobivia vatteri* Krainz, *Lobivia vatteri* Krainz var. *robusta* Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Lobivia jajoiana Backeb. var. **paucicostata** (Rausch) Rausch

Sin.: *Lobivia glauca* Rausch, *Lobivia glauca* Rausch var. *paucicostata* Rausch, *Lobivia minatinigra* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Lobivia kieslingii Rausch

Sin.: *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *kieslingii* (Rausch) Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(TUC).

Lobivia korethroides (Werderm.) Werderm.

Sin.: *Echinopsis dulci-pauli* (Fric) Kraenzl., hom. illeg., *Echinopsis korethroides* Werderm., *Eriosyce korethroides* (Wessner) Backeb., *Lobivia*

bruchii Britton & Rose var. *nivalis* (Fric) Rausch, *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *nivalis* (Fric) Rausch, *Soehrensia korethroides* (Werderm.) Backeb., *Trichocereus korethroides* (Werderm.) F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Lobivia marsoneri (Werderm.) Backeb. var. **iridescens** (Backeb.) Rausch

Sin.: *Lobivia iridescens* Backeb., *Lobivia muhriae* Backeb., *Lobivia muhriae* Backeb. var. *flaviflora* Backeb., *Lobivia uitewaaleana* Buining
Hierba suculenta. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUJ).

Lobivia marsoneri (Werderm.)

Backeb. var. **marsoneri**
Sin.: *Echinopsis marsoneri* Werderm., *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. subsp. *marsoneri* (Werderm.) G.D. Rowley, *Lobivia haageana* Backeb. var. *albihepatica* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *bicolor* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *chrysantha* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *croceantha* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *durispina* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *grandiflora-stellata* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb., *Lobivia rubescens* Backeb., *Lobivia rubescens* Backeb. var. *tenuispina* Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Lobivia nigricans Wessner

Sin.: *Digitorebutia carmeniana* Rausch, *Digitorebutia nigricans* (Wessner) Buining, *Lobivia nigricans* Wessner var. *albispina* Rausch, *Lobivia nigricans* Wessner var. *carmeniana* (Rausch) Rausch, *Lobivia nigricans* Wessner var. *petersenii* (Fric) Rausch, *Mediolobivia nigricans* (Wessner) Krainz, *Rebutia nigricans* (Wessner) D.R. Hunt
Hierba suculenta. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(SAL).

Lobivia pugionacantha (Rose & Boed.) Backeb.

Sin.: *Echinopsis pugionacantha* Rose & Boed., *Lobivia pugionacantha* (Rose & Boed.) Backeb. var. *corrugata* Rausch, *Lobivia pugionacantha* (Rose & Boed.) Backeb. var. *flaviflora* Backeb.
Hierba suculenta. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Lobivia pygmaea (R.E. Fr.) Backeb.

Sin.: *Acantholobivia haagei* (Fric & Schelle) Y. Ito, *Digitorebutia haagei* (Fric & Schelle) Fric, *Digitorebutia mudanensis* Rausch, *Digitorebutia nazarenoensis* Rausch, *Echinopsis pygmaea* R.E. Fr., *Lobivia digitiformis* Backeb., *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *elegantula* Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *mazaroensis* Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *mudanensis* (Rausch) Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *pelzliana* Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner, *Lobivia neohaageana* Backeb. var. *flavovirens* Backeb., *Lobivia neohaageana* Backeb., *Lobivia pygmaea* (R.E. Fr.) Backeb. var. *tafiensis* Rausch, *Mediolobivia eos* Rausch, *Mediolobivia haagei* (Fric & Schelle) Backeb. var. *flavovirens* (Backeb.) Backeb., *Mediolobivia haagei* (Fric & Schelle) Backeb., *Mediolobivia pectinata* (Backeb.) Backeb. ex Krainz var. *atrovirens* (Backeb.) Backeb., *Mediolobivia pectinata* (Backeb.) Backeb. ex Krainz var. *digitiformis* (Backeb.) Backeb., *Mediolobivia pygmaea* (Fric) Backeb., *Mediolobivia pygmaea* (R.E. Fr.) Backeb. var. *flavovirens* (Backeb.) Backeb., *Pygmaeolobivia haagei* (Fric & Schelle) Backeb., *Rebutia haagei* Fric & Schelle, *Rebutia nazarenoensis* (Rausch) B. Fearn & Percy, *Rebutia pygmaea* (R.E. Fr.) Britton & Rose, *Reolobivia haagei* (Fric & Schelle) Fric
Hierba suculenta. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUJ).

Lobivia saltensis (Speg.) Britton & Rose

Sin.: *Echinopsis nealeana* (Backeb.) Friedrich, *Echinopsis pseudocachensis* (Backeb.) Friedrich, *Echinopsis saltensis* Speg. var. *nealeana* (Backeb.) J.G. Lamb., *Echinopsis saltensis* Speg. var. *pseudocachensis* (Backeb.) J.G. Lamb., *Echinopsis saltensis* Speg., *Lobivia emmae* Backeb. var. *brevispina* Backeb., *Lobivia emmae* Backeb., *Lobivia nealeana* Backeb., *Lobivia pseudocachensis* Backeb. var. *cinnabarina* Backeb., *Lobivia pseudocachensis* Backeb. var. *sanguinea* Backeb., *Lobivia pseudocachensis* Backeb., *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *multicostata* (Backeb.) Rausch, *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *nealeana* (Backeb.) Rausch, *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *pseudocachensis* (Backeb.) Rausch, *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *zapallarensis* Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Lobivia sanguiniflora Backeb.

Sin.: *Echinopsis sanguiniflora* (Backeb.)
D.R. Hunt, *Lobivia breviflora* Backeb., *Lobivia duursmaiana* Backeb., *Lobivia polycephala* Backeb., *Lobivia sanguiniflora* Backeb.
var. *breviflora* (Backeb.) Rausch, *Lobivia sanguiniflora* Backeb. var. *duursmaiana* (Backeb.) Rausch, *Lobivia sanguiniflora* Backeb. var. *pseudolateritia* Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Lobivia schreiteri A. Cast. var.**riolarenis** Rausch

Hierba suculenta. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(CAT).

Lobivia schreiteri A. Cast. var.**schreiteri**

Sin.: *Echinopsis schreiteri* (A. Cast.)
Werderm. ex Backeb., *Echinopsis stilowiana* (Backeb.) J.G. Lamb., *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *schreiteri* (A. Cast.) Rausch, *Lobivia schreiteri* A. Cast. var. *stilowiana* (Backeb.) Rausch, *Lobivia stilowiana* Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(TUC).

Lobivia silvestrii (Speg.) G.D. Rowley

Sin.: *Cereus silvestrii* Speg.,
Chamaecereus silvestrii (Speg.) Britton & Rose, *Echinopsis chamacereus* Friedrich & Glaetzle
Hierba suculenta. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Lobivia walteri R. Kiesling

Sin.: *Echinopsis walteri* (R. Kiesling)
Friedrich & Glaetzle, *Lobivia huascha* (F.A.C. Weber) W.T. Marshall var. *walteri* (R. Kiesling) Rausch, *Trichocereus walteri* (R. Kiesling) J.G. Lamb.
Subarbusto suculento. Endémica.
2000-2500 m.
Países: ARG(SAL).

Maihuenia (F.A.C. Weber) K. Schum.**Maihuenia patagonica** (Phil.) Britton & Rose

Sin.: *Maihuenia albolanata* F. Ritter, *Maihuenia andicola* Comber, *Maihuenia brachydelphys* K. Schum., *Maihuenia cumulata* F. Ritter, *Maihuenia latispina* F. Ritter, *Maihuenia tehuelches* Speg., *Maihuenia valentinii* Speg., *Opuntia patagonica* Phil.
Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LLA, AIS, MAG).

Maihuenia poeppigii (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.

Sin.: *Maihuenia philippii* (F.A.C. Weber)
K. Schum., *Opuntia maihuen* J. Remy, *Opuntia poeppigii* Otto & Pfeiff., *Pereskia philippii* F.A.C. Weber, *Pereskia poeppigii* Salm-Dyck
Subarbusto suculento. Endémica.
500-1000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Maihueniopsis Speg.**Maihueniopsis archiconoidea** F. Ritter

Sin.: *Opuntia archiconoidea* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémica.
1200-1800 m.
Países: CHL(ATA).

Maihueniopsis atacamensis (Phil.) F. Ritter

Sin.: *Opuntia atacamensis* Phil.,
Tephrocactus atacamensis (Phil.) F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica.
4100 m.
Países: CHL(ANT).

Maihueniopsis boliviana (Salm-Dyck)

R. Kiesling subsp. **boliviana**
Sin.: *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter, *Cumulopuntia famatinensis* F. Ritter, *Cumulopuntia pampana* F. Ritter, *Opuntia boliviana* Salm-Dyck, *Tephrocactus bolivianus* (Salm-Dyck) Backeb., *Tephrocactus flexispinus* Backeb., nom. inval., *Tephrocactus melanacanthus* Backeb., nom. inval.
Subarbusto suculento. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU).

Maihueniopsis boliviana (Salm-Dyck)

R. Kiesling subsp. **echinacea** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling
Sin.: *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *echinacea* (F. Ritter) D.R. Hunt, *Cumulopuntia echinacea* (F. Ritter) F. Ritter, *Opuntia echinacea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Tephrocactus echinaceus* F. Ritter
Hierba suculenta. Nativa. 2600-4000 m.
Países: CHL(TAR).

Maihueniopsis boliviana (Salm-Dyck)

R. Kiesling subsp. **ignescens** (Vaupel) Faúndez & R. Kiesling
Sin.: *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *ignescens* (Vaupel) D.R. Hunt, *Cumulopuntia hystrix* F.

Ritter, *Cumulopuntia ignescens* (Vaupel) F. Ritter, *Cumulopuntia ticnamarensis* F. Ritter, *Cumulopuntia tortispina* F. Ritter, *Opuntia ignescens* Vaupel, *Tephrocactus ignescens* (Vaupel) Backeb.

Hierba suculenta. Nativa. 3300-4500 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Maihueniopsis camachoi (Espinosa)

F. Ritter
Sin.: *Opuntia camachoi* Espinosa, *Tephrocactus camachoi* (Espinosa) Backeb., *Tephrocactus chilensis* Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica. 3900 m.
Países: CHL(ANT).

Maihueniopsis colorea (F. Ritter) F.

Ritter
Sin.: *Opuntia colorea* (F. Ritter) D.R. Hunt, *Tephrocactus coloreus* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica.
1300-3500 m.
Países: CHL(ATA).

Maihueniopsis crassispina F. Ritter

Sin.: *Opuntia crassispina* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémica. 200 m.
Países: CHL(ATA).

Maihueniopsis darwinii (Hensl.) F.

Ritter var. **darwinii**
Sin.: *Opuntia darwinii* Hensl., *Tephrocactus darwinii* (Hensl.) Backeb. ex Fric
Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR). CHL(AIS).

Maihueniopsis darwinii (Hensl.) F.

Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling
Sin.: *Maihueniopsis albomarginata* F. Ritter, *Maihueniopsis neuquensis* (Borg) F. Ritter, *Opuntia hickenii* Britton & Rose, *Opuntia neuquensis* Borg, *Opuntia platyacantha* Pfeiff., *Tephrocactus hickenii* (Britton & Rose) Speg., *Tephrocactus neuquensis* (Borg) Backeb., *Tephrocactus platycanthus* (Pfeiff.) Lem., *Tephrocactus platycanthus* (Pfeiff.) Lem. var. *neoplatycanthus* Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica.
0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Maihueniopsis domeykoensis F. Ritter

Sin.: *Opuntia domeykoensis* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA).

Maihueiopsis glomerata (Haw.) R. Kiesling

Sin.: *Maihueiopsis conoidea* (F. Ritter ex Backeb.) F. Ritter, *Maihueiopsis hypogaea* (Werderm.) F. Ritter, *Maihueiopsis leoncito* (Werderm.) F. Ritter, *Maihueiopsis leptoclada* F. Ritter, *Maihueiopsis molfinoi* Speg., *Maihueiopsis tarapacana* (Phil.) F. Ritter, *Opuntia conoidea* (F. Ritter ex Backeb.) G.D. Rowley, *Opuntia glomerata* Haw., *Opuntia hypogaea* Werderm., *Opuntia leoncito* Werderm., *Opuntia molfinoi* (Speg.) Werderm., *Opuntia ovallei* Gay, *Opuntia tarapacana* Phil., *Tephrocactus conoideus* F. Ritter ex Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *andicola* (Pfeiff.) Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *atratospinus* Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *fulvispinus* (Lem.) Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb., *Tephrocactus leoncito* (Werderm.) Backeb., *Tephrocactus reicheanus* (Espinosa) Backeb., *Tephrocactus tarapacanus* (Phil.) Backeb. Subarbusto suculento. Nativa. 2000-4000 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

Maihueiopsis grandiflora F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 1700 m. Países: CHL(COQ).

Maihueiopsis minuta (Backeb.) R. Kiesling
Sin.: *Maihueiopsis mandragora* (Backeb.) F. Ritter, comb. illeg., *Opuntia mandragora* (Backeb.) G.D. Rowley, comb. illeg., *Opuntia minuta* (Backeb.) A. Cast., *Tephrocactus mandragora* Backeb., *Tephrocactus minutus* Backeb. Subarbusto suculento. Endémica. 1500-2500 m. Países: ARG(JUJ, SAL).

Maihueiopsis nigrispina (K. Schum.) R. Kiesling
Sin.: *Opuntia nigrispina* K. Schum., *Opuntia purpurea* R.E. Fr., *Platyopuntia nigrispina* (K. Schum.) F. Ritter, comb. illeg., *Tephrocactus nigrispinus* (K. Schum.) Backeb. Subarbusto suculento. Nativa. 2500-3500 m. Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR).

Maihueiopsis ovata (Pfeiff.) F. Ritter
Sin.: *Maihueiopsis ovata* (Pfeiff.) F. Ritter f. *calva* F. Ritter, *Opuntia ovata* Pfeiff., *Opuntia russellii* Britton & Rose, *Tephrocactus ovatus* (Pfeiff.) Backeb., *Tephrocactus russellii* (Britton & Rose) Backeb. Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m. Países: ARG(MEN, SJU). CHL(VAL, RME).

Maihueiopsis rahmeri (Phil.) F. Ritter
Sin.: *Opuntia rahmerii* Phil. Hierba suculenta. Endémica. Países: CHL(TAR).

Maihueiopsis recurvata (Gilmer & H.P. Thomas) R. Kiesling
Sin.: *Cumulopuntia recurvata* Gilmer & H.P. Thomas, *Tephrocactus curvispinus* Backeb., nom. inval. Subarbusto suculento. Endémica. 800-2400 m. Países: ARG(SJU).

Maihueiopsis wagenknechtii F. Ritter
Sin.: *Opuntia wagenknechtii* (F. Ritter) D.R. Hunt Subarbusto suculento. Endémica. 2000 m. Países: CHL(COQ).

Monvillea Britton & Rose

Monvillea cavendishii (Monv.) Britton & Rose
Sin.: *Cereus cavendishii* Monv., *Cereus paxtonianus* Monv., *Cereus rhodoleucanthus* K. Schum., *Cereus saxicolus* Morong, *Praecereus saxicolus* (Morong) N.P. Taylor Subarbusto suculento. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Monvillea euchlora (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Backeb.
Sin.: *Cereus euchlorus* F.A.C. Weber ex K. Schum., *Cereus lauterbachii* K. Schum., *Monvillea alticostata* F. Ritter, *Praecereus euchlorus* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) N.P. Taylor Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, COA, ITA, PAI).

Monvillea krapovickiana R. Kiesling
Arbusto suculento. Endémica. 0-200 m. Países: ARG(FOR).

Monvillea phatnosperma (K. Schum.) Britton & Rose var. **arenasi** L.J. Oakley & R. Kiesling
Sin.: *Cereus kroenleinii* (R. Kiesling) P.J. Braun & Esteves, *Monvillea kroenleinii* R. Kiesling, nom. inval. Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(APY, NAS, PHA).

Monvillea phatnosperma (K. Schum.) Britton & Rose var. **phatnosperma**
Sin.: *Cereus kroenleinii* N.P. Taylor, *Cereus phatnospermus* K. Schum. subsp. *kroenleinii* (N.P. Taylor) P.J. Braun & Esteves, *Cereus phatnospermus* K. Schum., *Monvillea phatnosperma* (K. Schum.) Britton & Rose subsp. *kroenleinii* (N.P. Taylor) Lodé Arbusto suculento. Nativa. 100-400 m. Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, PHA).

Monvillea spegazzinii (F.A.C. Weber) Britton & Rose
Sin.: *Cereus anisitsii* K. Schum., *Cereus marmoratus* Zeiss., nom. nud., *Cereus spegazzinii* F.A.C. Weber var. *hassleri* Weing., *Cereus spegazzinii* F.A.C. Weber, *Monvillea marmorata* (Zeiss.) Fric & Kreuz. Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, FOR, SFE). PRY(APY, CON, PHA).

Neoporteria Britton & Rose

Neoporteria castanea F. Ritter
Sin.: *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *castanea* (F. Ritter) Katt. Hierba suculenta. Endémica. Países: CHL(LBO, MAU).

Neoporteria clavata (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.
Sin.: *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. subsp. *clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *nigrihorrida* (Backeb.) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *vallenarenensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *wagenknechtii* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. f. *grandiflora* F. Ritter, *Neoporteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *nigrihorrida* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Neoporteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *parviflora* F. Ritter, *Neoporteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *procera*

F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter var. *graciana* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter var. *serenana* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter, *Neoporteria nigrihorrida* (Backeb.) Backeb. f. *crassispina* F. Ritter, *Neoporteria nigrihorrida* Backeb., *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter, *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *microsperma* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *napina* F. Ritter, *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ).

Neoporteria nidus (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Sin.: *Echinocactus nidus* Söhrens ex K. Schum., *Echinocactus senilis* Phil., nom. illeg., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *coimasensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *elquiensis* Katt., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt., *Neoporteria coimasensis* F. Ritter f. *crassispina* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter f. *tenuispina* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter var. *robusta* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter, *Neoporteria gerocephala* Y. Ito, *Neoporteria multicolor* F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *coimasensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *gerocephala* (Y. Ito) F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *matancillana* F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *multicolor* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria robusta* F. Ritter, *Neoporteria senilis* Backeb., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *robusta* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(COQ).

Neoporteria sociabilis F. Ritter

Sin.: *Eriosyce sociabilis* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria sociabilis* F. Ritter var. *napina* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Neoporteria subgibbosa (Haw.) Britton & Rose

Sin.: *Cactus berteri* Colla, *Cereus dichroacanthus* Mart. ex Pfeiff., *Echinocactus acutissima* Otto & Dietr.,

Echinocactus castaneoides Cels ex Salm-Dyck, *Echinocactus subgibbosus* Haw., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *litoralis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt., *Neoporteria castanea* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Neoporteria litoralis* F. Ritter var. *intermedia* F. Ritter, *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *intermedia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Neoporteria villosa (Monv.) A. Berger

Sin.: *Cactus villosus* Monv., *Echinocactus villosus* (Monv.) Labour., *Eriosyce villosa* (Monv.) Katt., *Neoporteria atrispinosa* Backeb., *Neoporteria laniceps* F. Ritter, *Neoporteria villosa* (Monv.) A. Berger var. *laniceps* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Hierba suculenta. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Neowerdermannia Fric

Neowerdermannia chilensis Backeb.

Sin.: *Sulcorebutia chilensis* (Backeb.) F.H. Brandt, *Weingartia chilensis* (Backeb.) Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 3000-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Neowerdermannia vorwerkii Fric

Sin.: *Sulcorebutia vorwerkii* (Fric) Brand, comb. illeg., *Weingartia vorwerkii* (Fric) Backeb.

Hierba suculenta. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Nopalea Salm-Dyck

Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck

Sin.: *Cactus cochenillifer* L.
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON, PHA).

Opuntia Mill.

Opuntia anacantha Speg. var. **anacantha**

Sin.: *Opuntia canina* Speg.
Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL). PRY(PHA).

Opuntia anacantha Speg. var. **kiska-loro** (Speg.) R. Kiesling

Sin.: *Opuntia bispinosa* Backeb., nom. inval., *Opuntia kiska-loro* Speg., *Platyopuntia kiska-loro* (Speg.) F. Ritter, comb. illeg.

Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SDE).

Opuntia anacantha Speg. var. **retrorsa** (Speg.) R. Kiesling

Sin.: *Opuntia fuscolineata* Starmühler & Muncher, *Opuntia retrorsa* Speg., *Platyopuntia retrorsa* (Speg.) F. Ritter, comb. illeg.

Subarbusto suculento. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, ÑEE, PAI, PHA). URY(PAY, RNO).

Opuntia anacantha Speg. var. **utkilio** (Speg.) R. Kiesling

Sin.: *Opuntia utkilio* Speg.
Subarbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, SAL). PRY(APY).

Opuntia arechavaletae Speg.

Sin.: *Opuntia viridirubra* (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, ROC).

Opuntia aurantiaca Lindl.

Sin.: *Opuntia maldonaensis* Arechav., *Opuntia montevidensis* Speg.
Subarbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). URY(MON).

Opuntia bonaerensis Speg.

Subarbusto suculento. Endémica. 200 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SFE).

Opuntia colubrina A. Cast.

Sin.: *Austrocylindropuntia colubrina* (A. Cast.) Backeb.
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY).

Opuntia discolor Britton & Rose

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SDE). PRY(APY).

Opuntia elata Salm-Dyck var. **cardiosperma** (K. Schum.) R. Kiesling
Sin.: *Opuntia cardiosperma* K. Schum., *Opuntia chakensis* Speg., *Opuntia limitata* F. Ritter ex P.J. Braun & Esteves, *Opuntia mieckleyi* K. Schum., *Platyopuntia limitata* F. Ritter, nom. illeg.
Hierba suculenta. Endémica.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE, SDE). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

Opuntia elata Salm-Dyck var. **elata**
Sin.: *Opuntia canterae* Arechav., *Opuntia delaetiana* (F.A.C. Weber) Vaupel, *Opuntia elata* Salm-Dyck var. *delaetiana* F.A.C. Weber ex Rol.-Goss., *Opuntia pituitosa* (F. Ritter) J. Iliff, *Opuntia pyrrhantha* (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves, *Platyopuntia pituitosa* F. Ritter, nom. illeg., *Platyopuntia pyrrhantha* F. Ritter, nom. illeg.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MEN, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, MAL, PAY, SAO).

Opuntia elata Salm-Dyck var. **obovata** E. Walther
Sin.: *Opuntia rioplatense* F. Font
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS). URY(MAL, MON, PAY, SJO).

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. f. **amyklaea** (Ten.) Schelle
Sin.: *Opuntia amyklaea* Ten., *Opuntia cordobensis* Speg., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. var. *amyklaea* (Ten.) A. Berger, *Opuntia megacantha* Salm-Dyck, *Opuntia streptacantha* Lem., *Platyopuntia cordobensis* (Speg.) F. Ritter, comb. illeg.
Subarbusto suculento. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SDE).

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. f. **ficus-indica**
Sin.: *Cactus ficus-indica* L., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. var. *decumana* (Willd.) Speg., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. var. *gymnocarpa* F.A.C. Weber, *Opuntia fusciculis* Griff., *Opuntia paraguayensis* K. Schum., *Opuntia tuna-blanca* Speg.
Arbusto suculento. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

Opuntia megapotamica Arechav. var. **chadihuensis** L.J. Oakley & Villamil
Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Opuntia megapotamica Arechav. var. **megapotamica**
Sin.: *Opuntia atrovirens* Speg., *Opuntia brunneogemmia* F. Ritter ex C. Schindwein, *Opuntia monacantha* Haw. subsp. *brunneogemmia* (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves, *Opuntia prasina* Speg., *Platyopuntia brunneogemmia* F. Ritter, nom. illeg.

Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

Opuntia megapotamica Arechav. var. **salagria** (A. Cast.) L.J. Oakley
Sin.: *Opuntia salagria* A. Cast.
Arbusto suculento. Endémica.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, SLU, SFE, SDE).

Opuntia monacantha Haw.
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Opuntia penicilligera Speg.
Subarbusto suculento. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, NEU, RNE).

Opuntia quimilo K. Schum.
Sin.: *Opuntia distans* Britton & Rose, *Platyopuntia quimilo* (K. Schum.) F. Ritter, comb. illeg.
Arbusto suculento. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, CON).

Opuntia robusta J.C. Wendl.
Arbusto. Introducida. 300-2100 m.
Países: ARG(SAL).

Opuntia salmiana Parm.
Sin.: *Austrocyliodropuntia albiflora* (K. Schum.) Backeb., *Austrocyliodropuntia salmiana* (Parm.) Backeb. var. *albiflora* (K. Schum.) Backeb., *Austrocyliodropuntia salmiana* (Parm.)

Backeb. var. *spiegazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Austrocyliodropuntia salmiana* (Parm.) Backeb., *Austrocyliodropuntia spiegazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Cylindropuntia spiegazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Opuntia albiflora* K. Schum., *Opuntia mucheri* Starmühler, *Opuntia spiegazzinii* F.A.C. Weber, *Opuntia wagneri* F.A.C. Weber ex Rol.-Goss., *Platyopuntia salmiana* (Parm.) F. Ritter, comb. illeg., *Salmiopuntia salmiana* (Parm.) Guiggi, *Salmiopuntia salmiana* (Parm.) Kreuz.

Subarbusto suculento. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU). PRY(APY).

Opuntia schickendantzii F.A.C. Weber
Sin.: *Austrocyliodropuntia schickendantzii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Cylindropuntia schickendantzii* (F.A.C. Weber) Backeb.
Subarbusto suculento. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Opuntia spinulifera Salm-Dyck
Arbusto suculento. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).

Opuntia stenarthra K. Schum.
Sin.: *Opuntia assumptionis* K. Schum., *Opuntia cognata* F. Ritter ex P.J. Braun & Esteves, *Opuntia subsphaerocarpa* Speg., *Platyopuntia cognata* F. Ritter, nom. illeg.
Subarbusto suculento. Endémica.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. **hildmannii** (Fric) Backeb.
Sin.: *Opuntia hildmannii* Fric, *Opuntia vulpina* F.A.C. Weber
Subarbusto suculento. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. **pampeana** (Speg.) Backeb.
Sin.: *Opuntia brunnescens* Britton & Rose, *Opuntia maculacantha* C.F. Först., *Opuntia pampeana* Speg.
Subarbusto suculento. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SDE, SFE). URY(RNO).

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. **sulphurea**

Sin.: *Platyopuntia sulphurea* (Gillies ex Salm-Dyck) F. Ritter

Subarbusto suculento. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, TUC).

Opuntia ventanensis A. Long

Subarbusto suculento. Endémica.

0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Oreocereus (A. Berger) Riccob.

Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.

Sin.: *Borzicactus celsianus* (Lem. ex Salm-Dyck) Kimnach, *Cereus celsianus* A. Berger, *Oreocereus bruennowii* (Britton & Rose) Backeb., *Oreocereus celsianus* (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob. var. *bruennowii* Britton & Rose, *Oreocereus maximus* Backeb., *Oreocereus neocelsianus* Backeb., *Pilocereus celsianus* Lem. ex Salm-Dyck

Arbusto suculento. Nativa. 3500-4000 m.

Países: ARG(JUJ).

Oreocereus hempelianus (Gürke) D.R. Hunt

Sin.: *Arequipa australis* F. Ritter, *Arequipa hempeliana* (Gürke) Kreuz. & Buining, *Arequipa rettigii* (Quehl) Kreuz. & Buining, *Arequipa soehrensii* Kreuz. ex Backeb., nom. inval., *Arequipa weingartiana* (Backeb.) Kreuz. & Buining, *Echinopsis hempelianus* Gürke, *Oreocereus australis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Arbusto suculento. Nativa. 2400-3700 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Oreocereus leucotrichus (Phil.)

Wagenkn. ex F. Ritter

Sin.: *Arequipa leucotricha* (Phil.) Britton & Rose, *Arequipa variicolor* (Backeb.) Backeb., *Borzicactus hendriksenianus* (Backeb.) Kimnach, *Borzicactus leucotrichus* (Phil.) Kimnach, *Echinocactus leucotrichus* Phil., *Oreocereus hendriksenianus* Backeb., *Oreocereus variicolor* Backeb.

Arbusto suculento. Nativa. 2400-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Oreocereus trollii (Kupper) Backeb.

Sin.: *Borzicactus celsianus* (Lem.) Riccob. var. *trollii* (Kupper) G.D. Rowley, *Borzicactus trollii* (Kupper) Kimnach,

Cereus trollii Kupper

Subarbusto suculento. Nativa. 3000-4000 m.

Países: ARG(JUJ).

Parodia Speg.

Parodia alacriportana Backeb. & Voll

Sin.: *Brasiliparodia alacriportana* (Backeb. & Voll) F. Ritter, *Brasiliparodia brevihamata* (W. Haage ex Backeb.) F. Ritter, *Brasiliparodia bueneckerii* (Buining) F. Ritter, *Brasiliparodia catarinensis* F. Ritter, *Notocactus alacriportanus* (Backeb. & Voll) Buxb., *Notocactus brevihamatus* (W. Haage ex Backeb.) Buxb., *Notocactus bueneckerii* (Buining) Krainz, *Parodia alacriportana* Backeb. & Voll subsp. *brevihamata* (W. Haage ex Backeb.) Hofacker & P.J. Braun, *Parodia alacriportana* Backeb. & Voll subsp. *bueneckerii* (Buining) Hofacker & P.J. Braun, *Parodia alacriportana* Backeb. & Voll subsp. *catarinensis* (F. Ritter) Hofacker & P.J. Braun, *Parodia brevihamata* W. Haage ex Backeb., *Parodia bueneckerii* Buining, *Parodia catarinensis* (F. Ritter) F.H. Brandt

Hierba suculenta. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Parodia allosiphon (Marchesi) N.P.

Taylor

Sin.: *Notocactus allosiphon* Marchesi Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV).

Parodia arnostiana (Lisal & Kolarik)

Hofacker

Sin.: *Notocactus arnostianus* Lisal & Kolarik.

Hierba rupícola. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Parodia aureicentra Backeb.

Sin.: *Parodia aureicentra* Backeb. var. *muhrii* (F.H. Brandt) J.G. Lamb., *Parodia aureicentra* Backeb. var. *rauschii* (Backeb.) J.G. Lamb., *Parodia aureicentra* Backeb. var. *variicolor* (F. Ritter) J.G. Lamb., *Parodia muhrii* F.H. Brandt, *Parodia rauschii* Backeb., *Parodia uhligiana* Backeb., *Parodia variicolor* F. Ritter, *Parodia variicolor* F. Ritter var. *robustispina* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(SAL).

Parodia buiningii (Buxb.) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus buiningii* Buxb. Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV, SAO).

Parodia carambeiensis (Buining & Brederoo) Hofacker

Sin.: *Notocactus carambeiensis* Buining & Brederoo, *Notocactus villa-velhensis* (Backeb. & Voll) Slaba

Hierba suculenta. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(PAR).

Parodia chrysacanthion (K. Schum.)

Backeb.

Sin.: *Echinocactus chrysacanthion* K. Schum. Hierba suculenta. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUJ).

Parodia claviceps (F. Ritter) F.H. Brandt

Sin.: *Eriocactus claviceps* F. Ritter, *Notocactus claviceps* (F. Ritter) Krainz Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia concinna (Monv.) N.P. Taylor

Sin.: *Echinocactus apricus* Arechav., *Echinocactus concinnus* Monv., *Frailea caespitosa* (Speg.) Britton & Rose, *Notocactus apricus* (Arechav.) A. Berger, *Notocactus caespitosum* (Speg.) Backeb., *Notocactus concinnoides* Prauser, *Notocactus eremiticus* F. Ritter, *Notocactus gibberulus* Prestle, *Notocactus joadii* (Hook. f.) Herter, *Notocactus olimarensis* Prestle, *Notocactus rubrigemmatum* W.R. Abraham, *Parodia caespitosa* (Speg.) N.P. Taylor Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, TYT).

Parodia crassigiba (F. Ritter) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus arachnitis* F. Ritter, *Notocactus crassigibus* F. Ritter, *Notocactus meonacanthus* Prestle, *Notocactus uebelmannianus* Buining var. *pleiocephalus* N. Gerloff & G. König, *Notocactus uebelmannianus* Buining, *Parodia meonacantha* (Prestle) Hofacker, *Parodia wernerii* Hofacker, *Parodia wernerii* Hofacker subsp. *pleiocephala* (N. Gerloff & G. König) Hofacker Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Parodia fusca (F. Ritter) Hofacker & P.J. Braun

Sin.: *Notocactus fuscus* F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Parodia gaucha M. Machado & Larocca

Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(RGS).

Parodia graessneri (K. Schum.) F.H. Brandt

Sin.: *Acanthocephala graessneri* (K. Schum.) Backeb., *Brasilicactus elachisanthus* (F.A.C. Weber) Backeb., *Brasilicactus graessnerii* (K. Schum.) Backeb., *Dactylanthocactus graessneri* (K. Schum.) Y. Ito, *Echinocactus graessneri* (K. Schum.), *Malacocarpus graessneri* (K. Schum.) Britton & Rose, *Notocactus graessneri* (K. Schum.) A. Berger, *Parodia elachisantha* (F.A.C. Weber) F.H. Brandt, *Parodia haselbergii* (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt subsp. *graessneri* (K. Schum.) Hofacker & P.J. Braun
Hierba suculenta. Endémica. 0-1800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Parodia haselbergii (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt

Sin.: *Brasilicactus haselbergii* (F. Haage) Backeb., *Echinocactus haselbergii* F. Haage ex Rümpler, *Malacocarpus haselbergii* (F. Haage) Britton & Rose, *Notocactus haselbergii* (F. Haage ex Rümpler) A. Berger, *Sericocactus haselbergii* (F. Haage ex Rümpler) Y. Ito
Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia herteri (Werderm.) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus herteri* (Werderm.) Buining & Kreuz., *Notocactus pseudoherteri* Buining, *Notocactus rubriflorus* Berger
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

Parodia horstii (F. Ritter) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus horstii* F. Ritter, *Notocactus purpureus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia leninghausii (K. Schum.) F.H. Brandt

Sin.: *Echinocactus leninghausii* K. Schum., *Eriocactus leninghausii* (K. Schum.) Backeb., *Notocactus leninghausii* (K. Schum.) Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia linkii (Lehm.) R. Kiesling

Sin.: *Cactus linkii* Lehm., *Echinocactus linkii* (Lehm.) Pfeiff., *Notocactus linkii* (Lehm.) Herter, *Notocactus linkii* (Lehm.) Herter f. *multiflorus* (Fric ex Buining) F. Ritter, *Notocactus megapotamicus*

(Osten) Herter, *Notocactus ottonis* (Lehm.) A. Berger var. *megapotamicus* (Osten) Buining

Hierba suculenta. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, PAI). URY(ART, CLA, RIV, SAO, TAC).

Parodia maassii (Heese) A. Berger

Sin.: *Echinocactus escayachensis* Vaupel, *Echinocactus maassii* Heese, *Parodia maassii* (Heese) A. Berger var. *carminatiflora* F. Ritter, *Parodia maassii* (Heese) A. Berger var. *schaferi* F. Ritter
Hierba suculenta. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Parodia magnifica (F. Ritter) F.H. Brandt

Sin.: *Eriocactus magnificus* F. Ritter, *Notocactus magnificus* (F. Ritter) N.P. Taylor
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia mammulosa (Lem.) N.P. Taylor

Sin.: *Echinocactus floricomus* Arechav., *Echinocactus mammulosus* Lem., *Notocactus floricomus* (Arechav.) Backeb., *Notocactus mammulosus* (Lem.) A. Berger, *Notocactus mueller-moelleri* Backeb. & F.M. Knuth, *Notocactus paulus* Schlosser & Brederoo, *Notocactus roseoluteus* Vliet
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(ART, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).

Parodia microsperma (F.A.C. Weber)

Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Sin.: *Parodia dextrohamata* Backeb., nom. inval., *Parodia dichroacantha* F.H. Brandt & Weskamp, nom. inval., *Parodia fuscato-viridis* Backeb., *Parodia gutekunstiana* Backeb., *Parodia heteracantha* F. Ritter & Weskamp, *Parodia horrida* F.H. Brandt, *Parodia hummeliana* A.B. Lau & Weskamp, *Parodia kilianana* Backeb. var. *rigida* F.H. Brandt, *Parodia kilianana* Backeb., *Parodia lohaniana* A.B. Lau & Weskamp, *Parodia piltziorum* Weskamp, *Parodia pluricentralis* F.H. Brandt, *Parodia rigida* Backeb., *Parodia tolobana* Weskamp
Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Sin.: *Echinocactus microspermus* F.A.C. Weber var. *erythranthus* Speg., *Echinocactus microspermus* F.A.C. Weber var. *thionanthus* Speg., *Echinopsis microspermus* F.A.C. Weber, *Parodia aconquijaensis* Weskamp, *Parodia albofuscata* F.H. Brandt, *Parodia argerichana* Weskamp, *Parodia atroviridis* Backeb., nom. illeg., *Parodia aureispina* Backeb. var. *australis* F.H. Brandt, *Parodia aureispina* Backeb. var. *elegans* Backeb., *Parodia aureispina* Backeb. var. *erythrostaminea* F.H. Brandt, *Parodia aureispina* Backeb. var. *rubiflora* F.H. Brandt, *Parodia aureispina* Backeb. var. *vulgaris* F.H. Brandt, *Parodia aureispina* Backeb., *Parodia belenencis* Weskamp, *Parodia betaniana* F. Ritter, *Parodia campestris* F.H. Brandt, *Parodia capillitaensis* F.H. Brandt, *Parodia carapariana* F.H. Brandt, *Parodia carminata* Backeb., *Parodia catamarcensis* Backeb. var. *riojensis* (F. Ritter & Weskamp) J.G. Lamb., *Parodia catamarcensis* Backeb. var. *rubriflora* Backeb., *Parodia catamarcensis* Backeb., *Parodia cebilarensis* Weskamp, *Parodia chlorocarpa* F. Ritter, *Parodia dextrohamata* Backeb. var. *stenopetala* Backeb., *Parodia elegans* Fehcher ex Backeb., nom. inval., *Parodia erythrantha* (Speg.) Backeb. var. *thionantha* (Speg.) Backeb., *Parodia erythrantha* (Speg.) Backeb., *Parodia fecheri* Backeb., *Parodia formosa* F. Ritter, *Parodia glischrocarpa* F. Ritter, *Parodia herzogii* Rausch, *Parodia lembckeri* Weskamp, *Parodia macrancistra* (K. Schum.) Backeb., *Parodia malyana* Rausch var. *rubriflora* F.H. Brandt, *Parodia malyana* Rausch, *Parodia mercedesiana* Weskamp, *Parodia mesembrina* F.H. Brandt var. *juanensis* Weskamp, *Parodia mesembrina* F.H. Brandt, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *aurantiaca* F.H. Brandt, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *cafayatensis* Backeb., *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *erythrantha* (Speg.) Weskamp, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *macrancistra* (K. Schum.) Borg, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *microthele* (Backeb.) Krainz, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *opulenta* F.H. Brandt, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *rigidissima* F.H. Brandt, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber)

Speg. var. *weberiana* (F.H. Brandt) J.G. Lamb., *Parodia microthele* Backeb., *Parodia minima* Rausch, nom. illeg., *Parodia minuscula* Rausch, *Parodia mutabilis* Backeb. var. *carneospinosa* Backeb., *Parodia mutabilis* Backeb. var. *sanguiniflora* (Backeb.) F.H. Brandt, *Parodia mutabilis* Backeb., *Parodia nana* Weskamp, *Parodia pachysa* F.H. Brandt, *Parodia papagayana* F.H. Brandt, *Parodia parvula* F.H. Brandt, *Parodia pluricentralis* F.H. Brandt var. *erythroflora* F.H. Brandt, *Parodia pluricentralis* F.H. Brandt var. *xanthoflora* F.H. Brandt, *Parodia pusilla* F.H. Brandt, *Parodia riojensis* F. Ritter & Weskamp, *Parodia rubelliamata* Backeb. var. *aureiflora* Backeb., *Parodia rubelliamata* Backeb., nom. inval., *Parodia rubriflora* Backeb., nom. inval., *Parodia rubristraminea* F. Ritter, *Parodia saint-pieana* Backeb., *Parodia sanagasta* Weing. var. *saltensis* F.H. Brandt, *Parodia sanagasta* Weing. var. *viridior* Backeb., *Parodia sanagasta* Weing., *Parodia sanguiniflora* Backeb. var. *comata* F. Ritter, *Parodia sanguiniflora* Backeb., *Parodia scopoides* Backeb., *Parodia setifera* Backeb. var. *longihamata* Werderm., *Parodia setifera* Backeb. var. *nigriceutra* Backeb., *Parodia setifera* Backeb., *Parodia spanisa* F.H. Brandt, *Parodia spegazziniana* F.H. Brandt var. *aurea* F.H. Brandt, *Parodia spegazziniana* F.H. Brandt, *Parodia superba* F.H. Brandt, *Parodia tafiensis* Backeb., *Parodia talaensis* F.H. Brandt, *Parodia thionantha* F.H. Brandt, *Parodia tuberculosi-costata* Backeb. var. *amblayana* F.H. Brandt, *Parodia tuberculosi-costata* Backeb., *Parodia tucumanensis* Weskamp, *Parodia uebelmanniana* F. Ritter, *Parodia wagneriana* Weskamp, *Parodia weberiana* F.H. Brandt, *Parodia weiskampiana* Krasucka & Spanoswski, *Parodia winbergii* Weskamp
Hierba suculenta. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).

Parodia mueller-melchersii (Backeb.) N.P. Taylor
Sin.: *Notocactus eugeniae* Vliet, *Notocactus gutierrezii* W.R. Abraham, *Notocactus mueller-melchersii* Backeb., *Notocactus roseiflorus* Schloss. & Brederoo, *Notocactus rutilans* Däniker & Krainz, *Notocactus veenianus* Vliet, *Notocactus winkleri* Vliet, *Parodia mammulosa* (Lem.) N.P. Taylor subsp.

eugeniae (Vliet) Hofacker, *Parodia mueller-melchersii* (Backeb.) N.P. Taylor subsp. *gutierrezii* (W.R. Abraham) Hofacker, *Parodia mueller-melchersii* (Backeb.) N.P. Taylor subsp. *winkleri* (Vliet) Hofacker, *Parodia rutilans* (Däniker & Krainz) N.P. Taylor, *Parodia rutilans* (Däniker & Krainz) N.P. Taylor subsp. *veeniana* (Vliet) Hofacker
Hierba suculenta. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(RGS). URY(MON, RIV, TAC).

Parodia muricata (Otto) Hofacker
Sin.: *Echinocactus muricatus* Otto
Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Parodia neohorstii (S. Theun.) N.P. Taylor
Sin.: *Notocactus neohorstii* S. Theun.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia nigrispina (K. Schum.) F.H. Brandt
Sin.: *Echinocactus nigrispinus* K. Schum., *Eriocactus nigrispinus* (K. Schum.) F. Ritter, nom. inval., *Malacocarpus nigrispinus* (K. Schum.) Britton & Rose, *Notocactus nigrispinus* (K. Schum.) Buining, nom. inval., *Notocactus nigrispinus* (K. Schum.) G. Schaeff., *Notocactus schumannianus* (Nicolai) Fric var. *nigrispinus* (K. Schum.) Y. Ito, *Notocactus schumannianus* (Nicolai) Fric f. *nigrispinus* (K. Schum.) Neduchal
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.
Países: PRY(COA, GUA).

Parodia nivosa Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(SAL).

Parodia notorauschii D.R. Hunt
Sin.: *Notocactus rauschii* Vliet, *Notocactus spinibarbis* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(RIV).

Parodia ottonis (Lehm.) N.P. Taylor
Sin.: *Cactus ottonis* Lehm., *Echinocactus arechavaletae* Speg., *Echinocactus ottonis* (Lehm.) Link & Otto, *Malacocarpus ottonis* (Lehm.) Britton & Rose, *Notocactus arechavaletae* (Speg.) Herter, *Notocactus ottonis* (Lehm.) A. Berger
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Parodia oxycostata (Buining & Brederoo) Hofacker subsp. **gracilis** (F.Ritter) Hofacker
Sin.: *Notocactus glaucinus* F. Ritter var. *gracilis* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Parodia oxycostata (Buining & Brederoo) Hofacker subsp. **oxycostata**
Sin.: *Notocactus oxycostatus* Buining & Brederoo
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia penicillata Fehser & Steeg
Sin.: *Parodia penicillata* Fehser & Steeg var. *fulviceps* Backeb., *Parodia penicillata* Fehser & Steeg var. *nivosa* Fehser
Hierba suculenta. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Parodia rechensis (Buining) F.H. Brandt
Sin.: *Brasiliparodia rechensis* (Buining) F. Ritter, *Notocactus rechensis* Buining
Hierba suculenta. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia rudibuenekeri (W.R. Abraham) Hofacker & P.J. Braun
Sin.: *Notocactus glomeratus* N. Gerloff, *Notocactus rudibuenekeri* W.R. Abraham
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia schumanniana (Nicolai) F.H. Brandt
Sin.: *Chrysocactus schumannianus* (Nicolai) Y. Ito, *Echinocactus buchheimianus* Quehl, *Echinocactus grossei* K. Schum., *Echinocactus schumannianus* Nicolai, *Eriocactus grossei* (K. Schum.) Backeb. var. *aureispinus* F. Ritter, *Eriocactus schumannianus* (Nicolai) Backeb., nom. illeg., *Eriocactus warasii* F. Ritter, *Eriocephalia grossei* (K. Schum.) Y. Ito, *Eriocephalia schumanniana* (Nicolai) Backeb., nom. inval., *Malacocarpus grossei* (K. Schum.) Britton & Rose, *Malacocarpus schumannianus* (Nicolai) Britton & Rose, *Notocactus grossei* (K. Schum.) Fric f. *aureispinus* (F. Ritter) J. Theun. ex Havlicek, *Notocactus grossei* (K. Schum.) Fric var. *aureispinus* (F. Ritter) J. Theun., *Notocactus*

grossei (K. Schum.) Fric, *Notocactus schumannianus* (Nicolai) Fric, *Notocactus warasii* (F. Ritter) Hewitt & Donald, *Parodia grossei* (K. Schum.) F.H. Brandt var. *aureispina* (F. Ritter) F.H. Brandt, *Parodia grossei* (K. Schum.) F.H. Brandt, *Parodia warasii* (F. Ritter) F.H. Brandt
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(GUA, PAI).

Parodia scopa (Spreng.) N.P. Taylor subsp. **neobuenekeri** (F. Ritter) Hofacker & P.J. Braun
Sin.: *Notocactus neobuenekeri* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Parodia scopa (Spreng.) N.P. Taylor subsp. **scopa**
Sin.: *Echinocactus scopa* Spreng., *Notocactus scopa* (Spreng.) Backeb., *Notocactus soldtianus* Vliet
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, ROC, TYT).

Parodia scopa (Spreng.) N.P. Taylor subsp. **succinea** (F. Ritter) Hofacker & P.J. Braun
Sin.: *Notocactus succineus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Parodia stockingeri (Prestle) Hofacker & P.J. Braun
Sin.: *Notocactus stockingeri* Prestle
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia stuemeri (Werderm.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus stuemeri* Werderm., *Parodia crucinigricentra* Subík, *Parodia friciana* F.H. Brandt, *Parodia gigantea* Krainz, *Parodia jujuyana* Fric, *Parodia pseudostuemeri* Backeb., *Parodia rubricentra* Backeb., *Parodia schuetziana* Jajó, *Parodia scoparia* F. Ritter, *Parodia setosa* Backeb., *Parodia stuemeri* (Werderm.) Backeb. var. *robustior* Backeb., *Parodia stuemeri* (Werderm.) Backeb. var. *tilcarensis* Werderm. & Backeb., *Parodia tilcarensis* (Werderm. & Backeb.) Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Parodia submammulosa (Lem.) R. Kiesling subsp. **minor** R. Kiesling
Hierba suculenta. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(CAT).

Parodia submammulosa (Lem.) R. Kiesling subsp. **submammulosa**
Sin.: *Echinocactus mammulosus* Lem. var. *pampeana* Speg., *Echinocactus mammulosus* Lem. var. *submammulosus* (Lem.) Speg., *Echinocactus pampeanus* Speg., *Echinocactus submammulosus* Lem., *Notocactus mammulosus* (Lem.) A. Berger var. *pampeanus* (Speg.) A. Cast., *Notocactus pampeanus* (Speg.) Backeb., *Notocactus submammulosus* (Lem.) Backeb. var. *pampeanus* (Speg.) Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SLU).

Parodia tabularis (Ruempler) D.R. Hunt
Sin.: *Echinocactus tabularis* Ruempler, *Notocactus bommeljei* Vliet, *Notocactus brederooianus* Prestle, *Notocactus tabularis* (Ruempler) D.R. Hunt, *Parodia tabularis* (Ruempler) D.R. Hunt subsp. *bommeljei* (Vliet) Hofacker
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MAL).

Parodia tenuicylindrica (F. Ritter) D.R. Hunt
Sin.: *Notocactus minimus* Fric & Kreuz. ex Buiningm *Notocactus tenuicylindricus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Parodia turecekiana R. Kiesling
Sin.: *Notocactus turecekianus* (R. Kiesling) W.R. Abraham
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(RNO).

Parodia wedermanniana (Herter) N.P. Taylor
Sin.: *Notocactus ferrugieneus* Schlosser, *Notocactus vanvlietii* Rausch, *Notocactus wedermannianus* Herter
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(DUR, RIV, TAC).

Pentacalia Cass.

Pentacalia desiderabilis (Vell.) Cuatrec.
Sin.: *Senecio desiderabilis* Vell., *Senecio ellipticus* DC.
Arbusto o liana. Nativa. 300-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pentacalia epiphytica (Kuntze) Cuatrec.
Sin.: *Senecio epiphyticus* Kuntze, *Senecio steinbachianus* Cuatrec.
Arbusto. Nativa. 1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Pereskia Mill.

Pereskia aculeata Mill.
Sin.: *Cactus pereskia* L., *Pereskia pereskia* (L.) H. Karst., comb. illeg.
Arbusto suculento. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, PAI).

Pereskia grandifolia Haw.
Arbusto suculento. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pereskia nemorosa Rojas Acosta
Sin.: *Pereskia amapola* F.A.C. Weber, *Pereskia amapola* F.A.C. Weber var. *argentina* (F.A.C. Weber) Weing., *Pereskia argentina* F.A.C. Weber
Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, COA, PAI, SPE). URY(ART).

Pereskia sacharosa Griseb.
Sin.: *Rhodocactus sacharosa* (Griseb.) Backeb.
Arbusto suculento. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY).

Pfeiffera Salm-Dyck

Pfeiffera ianthothele (Monv.) F.A.C. Weber
Sin.: *Cereus ianthothele* Monv., *Lepismium ianthothele* (Monv.) Barthlott, *Pfeiffera cereiformis* Salm-Dyck, *Rhipsalis cereiformis* (Salm-Dyck) C.F. Först., *Rhipsalis ianthothele* (Monv.) F.H. Brandt
Hierba epífita. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Pilosocereus Byles & G.D. Rowley

Pilosocereus machrisii (Y. Dawson) Backeb.
Sin.: *Cephalocereus machrisii* Y. Dawson, *Pilocereus jauruensis* Buining & Brederoo, *Pilocereus machrisii* (Y. Dawson) Backeb., *Pilocereus*

paraguayensis F. Ritter, *Pilosocereus jauruensis* (Buining & Brederoo) P.J. Braun, *Pseudopilocereus machrisii* (Y. Dawson) Buxb.

Arbusto suculento. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Pterocactus K. Schum.

Pterocactus araucanus A. Cast.

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Pterocactus australis (F.A.C. Weber)

Backeb.

Sin.: *Opuntia australis* F.A.C. Weber
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
CHL(AIS).

Pterocactus fischeri Britton & Rose

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Pterocactus gonjianii R. Kiesling

Hierba suculenta. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(SJU).

Pterocactus hickenii Britton & Rose

Sin.: *Opuntia skottsbergii* Britton & Rose, *Pterocactus skottsbergii* (Britton & Rose) Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).

Pterocactus megliolii R. Kiesling

Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SJU).

Pterocactus neuquensis R. Kiesling,

E. Sarnes & N. Sarnes
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1200 m.
Países: ARG(NEU).

Pterocactus reticulatus R. Kiesling

Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Pterocactus tuberosus (Pfeiff.)

Britton & Rose f. **lelongii** (Ruiz Leal ex R. Kiesling) R. Kiesling
Sin.: *Pterocactus kuntzei* K. Schum. f. *lelongii* Ruiz Leal ex R. Kiesling
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Pterocactus tuberosus (Pfeiff.)

Britton & Rose f. **tuberosus**
Sin.: *Opuntia tuberosa* Pfeiff., *Pterocactus decipiens* Gürke, *Pterocactus kuntzei* K. Schum.
Hierba suculenta. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

Pterocactus valentinii Speg.

Sin.: *Pterocactus pumilus* Britton & Rose
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU).

Puna R. Kiesling

Puna bonniae D.J. Ferguson & R.

Kiesling
Sin.: *Maihueniopsis bonnieae* (D.K. Ferguson & R. Kiesling) E.F. Anderson, *Opuntia bonnieae* (D.J. Ferguson & R. Kiesling) Halda & Janeba
Hierba suculenta. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(CAT).

Puna clavarioides (Pfeiff.) R. Kiesling

Sin.: *Austrocylindropuntia clavarioides* (Pfeiff.) Backeb. var. *ruiz-lealii* (A. Cast.) Backeb., *Austrocylindropuntia clavarioides* (Pfeiff.) Backeb., *Cylindropuntia clavarioides* (Pfeiff.) F.M. Knuth, *Maihueniopsis clavarioides* (Pfeiff.) E.F. Anderson, *Opuntia clavarioides* Pfeiff., *Opuntia ruiz-lealii* A. Cast.
Hierba suculenta. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Puna subterranea (R.E. Fr.) R.

Kiesling
Sin.: *Cumulopuntia subterranea* (R.E. Fr.) F. Ritter, *Maihueniopsis subterranea* (R.E. Fr.) E.F. Anderson, *Opuntia subterranea* R.E. Fr., *Tephrocactus subterraneus* (R.E. Fr.) Backeb., *Tephrocactus variiflorus* Backeb.
Hierba suculenta. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Pyrrhocactus A. Berger

Pyrrhocactus aspillagae (Söhrens) F. Ritter

Sin.: *Echinocactus aspillagae* Söhrens, *Eriosyce aspillagae* (Söhrens) Katt. subsp. *maechleri* H.E. Walter, *Eriosyce aspillagae* (Söhrens) Katt., *Neoporteria aspillagae* (Söhrens) Backeb., *Neoporteria*

horrida (Gay) D.R. Hunt var. *aspillagae* (Söhrens) A.E. Hoffm.

Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Pyrrhocactus bulbocalyx (Werderm.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus bulbocalyx* Werderm., *Eriosyce bulbocalyx* (Werderm.) Katt., *Neoporteria bulbocalyx* (Werderm.) Donald & G.D. Rowley
Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

Pyrrhocactus catamarcensis (Speg.)

F. Ritter

Sin.: *Echinocactus catamarcensis* Speg., *Echinocactus catamarcensis* Speg. var. *obscura* Speg., *Echinocactus catamarcensis* Speg. var. *pallida* Speg., *Pyrrhocactus melanaeanthus* Backeb., nom. inval.
Hierba suculenta. Endémica. 800-1000 m.
Países: ARG(SJU).

Pyrrhocactus chilensis (Hildm. ex K.

Schum.) Katt. var. **albidiflorus** F. Ritter
Sin.: *Eriosyce chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. *albidiflorus* (F. Ritter) Katt.
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(COQ).

Pyrrhocactus chilensis (Hildm. ex K.

Schum.) F. Ritter var. **chilensis**
Sin.: *Echinocactus chilensis* Hildm. ex K. Schum., *Eriosyce chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Katt., *Neochilenia chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Backeb., *Neoporteria chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Britton & Rose, *Pyrrhocactus krausii* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Pyrrhocactus confinis F. Ritter

Sin.: *Eriosyce confinis* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia confinis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria confinis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria kunzei* (C.F. Först.) Backeb. var. *confinis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA).

Pyrrhocactus crispus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus crispus* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria crispa* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *crispa* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ATA).

Pyrrhocactus curvispinus (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Sin.: *Cactus curvispinus* Bertero ex Colla, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *choapensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *limariensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt., *Eriosyce limariensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *gracilis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *lissocarpa* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus aconcaguensis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus choapensis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus curvispinus* (Bertero ex Colla) Backeb., *Neoporteria choapensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *aconcaguensis* (F. Ritter & Buining) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *coliguayensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *limariensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria litoralis* F. Ritter, *Pyrrhocactus aconcaguensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *descendens* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *mollensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus choapensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus coliguayensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus grandiflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *orientalis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus limariensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter var. *gracilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter, *Pyrrhocactus pamaensis* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 200-2000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Pyrrhocactus echinus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *echinus* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *echinus* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D.

Rowley var. *glaucescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus glaucescens* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 400-800 m.
Países: CHL(ANT).

Pyrrhocactus engleri (F. Ritter) F. Ritter

Sin.: *Eriosyce engleri* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus engleri* F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *engleri* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria engleri* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
Hierba suculenta. Endémica. 1900 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Pyrrhocactus eriosyzoides (F. Ritter)

F. Ritter
Sin.: *Eriosyce crispera* (F. Ritter) Katt. subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispera* (F. Ritter) Katt. var. *carrizalensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispera* (F. Ritter) Katt. var. *huascensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispera* (F. Ritter) Katt. var. *totalensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *carrizalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *huascensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *totalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *transitensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce kunzei* (C.F. Först.) Katt. var. *transitensis* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus atroviridis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus carrizalensis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus eriosyzoides* F. Ritter, *Neochilenia huascensis* (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia totalensis* (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia transitensis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *totalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria eriosyzoides* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria huascensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria jussieuvi* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *huascensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria kunzei* (C.F. Först.) Backeb., *Neoporteria totalensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *carrizalensis* (F. Ritter) Ferryman,

Neoporteria totalensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A. Hoffm., comb. illeg., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *atroviridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *domeykoensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *transitensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus atroviridis* F. Ritter, *Pyrrhocactus carrizalensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus eriosyzoides* (F. Ritter) F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus huascensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus kunzei* (C.F. Först.) Y. Ito, *Pyrrhocactus totalensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus transiens* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Pyrrhocactus floccosus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *floccosa* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria eriocephala* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floccosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus floccosus* F. Ritter var. *minor* (F. Ritter) F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 200-600 m.
Países: CHL(ANT).

Pyrrhocactus garaventai (F. Ritter) F. Ritter

Sin.: *Eriosyce garaventae* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus garaventai* F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *garaventae* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria garaventae* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria subaiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley
Hierba suculenta. Endémica. 1000-3000 m.
Países: CHL(VAL).

Pyrrhocactus heinrichianus

(Backeb.) F. Ritter

Sin.: *Chilenia jussieuvi* (Monv. ex Salm-Dyck) Backeb., *Chilenia occulta* (Phil.) Backeb., *Echinocactus occultus* Phil., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *intermedia* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. var. *setosiflora* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt., *Neoporteria chorosensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria deherdtiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Neoporteria dimorpha* (F. Ritter)

Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chaniarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chorosensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *dimorpha* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *setosiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *trapichensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *wagenknechtii* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose, *Neoporteria occulta* (Phil.) Britton & Rose, *Neoporteria ritteri* Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria setosiflora* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus chaniarensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *spinosior* F. Ritter, *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter var. *intermedius* F. Ritter, *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus trapichensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus wagenknechtii* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Pyrrhocactus kattermannii R.

Kiesling
Sin.: *Acanthocalycium andreaeanum* (Backeb.) Donald, nom. inval., *Eriosyce andreaana* Katt., *Neochilenia andreaana* Backeb., nom. inval., *Neoporteria andreaana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, comb. illeg., *Pyrrhocactus andreaanus* (Backeb.) F. Ritter, comb. illeg.
Subarbusto suculento. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Pyrrhocactus marksianus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *lissocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *marksiana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria marksiana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus marksianus* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus truncatipetalus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Pyrrhocactus pachacoensis Rausch

Sin.: *Eriosyce strausiana* (K. Schum.) Katt. var. *pachacoensis* (Rausch) Katt., *Malacocarpus catamarcensis* (Speg.) Britton & Rose
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Pyrrhocactus paucicostatus (F.

Ritter) F. Ritter
Sin.: *Delaetia woutersiana* Backeb., nom. inval., *Eriosyce paucicostata* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *paucicostata* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus paucicostatus* F. Ritter, *Neochilenia paucicostata* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria fusca* (Muehlenpf.) Britton & Rose, *Neoporteria haenkeana* (C.F. Först.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria neohankeana* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *neohankeana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *viridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria woutersiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *densispinus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *elongatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *flaviflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter, *Pyrrhocactus paucicostatus* (F. Ritter) F. Ritter var. *viridis* (F. Ritter) F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT).

Pyrrhocactus philippianus Faúndez

Sin.: *Eriosyce occulta* Katt., *Pyrrhocactus occultus* F. Ritter, nom. inval., *Pyrrhocactus occultus* F. Ritter var. *spinosior* F. Ritter, nom. inval.
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT).

Pyrrhocactus pilispinus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *pilispina* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pilispina* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria pilispina* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA).

Pyrrhocactus pygmaeus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *pygmaea* (F. Ritter) Katt.,

Neoporteria calderana (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley f. *gracilis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley f. *pygmaea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pulchella* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *scoparia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria scoparia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria taltalensis* Hutchison var. *transiens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus gracilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus pulchellus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Pyrrhocactus reconditus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce recondita* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia recondita* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *vexata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus vexatus* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 400-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Pyrrhocactus sanjuanensis (Speg.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus sanjuanensis* Speg., *Eriosyce vertongenii* (J.G. Lamb.) D.R. Hunt, *Eriosyce villicumensis* (Rausch) Katt., *Neoporteria sanjuanensis* (Speg.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria umadeave* (Werderm.) Donald & G.D. Rowley var. *marayesensis* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria villicumensis* (Rausch) Donald, *Pyrrhocactus marayesensis* (Backeb.) J.G. Lamb., *Pyrrhocactus megloli* Rausch, *Pyrrhocactus strausianus* (K. Schum.) A. Berger var. *sanjuanensis* (Speg.) J.G. Lamb., *Pyrrhocactus umadeave* Werderm. var. *marayesensis* Backeb., *Pyrrhocactus vertongenii* J.G. Lamb., *Pyrrhocactus villicumensis* Rausch
Hierba suculenta. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SJU).

Pyrrhocactus simulans F. Ritter

Sin.: *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *simulans* (F. Ritter) Katt.,

Eriosyce simulans (F. Ritter) Katt.,
Neochilenia simulans (F. Ritter) Backeb.,
Neopterteria simulans (F. Ritter) Donald
& G.D. Rowley
Hierba succulenta. Endémica. 100-400 m.
Países: CHL(COQ).

Pyrrhocactus strausianus (K.
Schum.) A. Berger

Sin.: *Echinocactus strausianus* K. Schum.,
Eriosyce strausiana (K. Schum.) Katt.,
Malacocarpus strausianus (K. Schum.)
Britton & Rose, *Neopterteria strausiana*
(K. Schum.) Donald & G.D. Rowley,
Pyrrhocactus platyacanthus F. Ritter
Hierba succulenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Pyrrhocactus taltalensis (Hutchison)
F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison)
Katt., *Neochilenia taltalensis* (Hutchison)
Backeb., *Neopterteria rupicola* (F. Ritter)
Donald & G.D. Rowley, *Neopterteria*
taltalensis Hutchison, *Pyrrhocactus rupiculatus*
F. Ritter, *Pyrrhocactus tenuis* F. Ritter
Hierba succulenta. Endémica. 500-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Pyrrhocactus tuberisulcatus (Jacobi)
A. Berger

Sin.: *Cactus horridus* Bertero ex
Colla, nom. illeg., *Echinocactus horridus*
(Bertero ex Colla) J. Remy ex Gay,
Echinocactus tuberisulcatus Jacobi,
Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla)
Katt. var. *armata* (F. Ritter) Katt.,
Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla)
Katt. var. *mutabilis* (F. Ritter) Katt.,
Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla)
Katt. var. *robusta* (F. Ritter) Katt.,
Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla)
Katt. var. *tuberisulcata* (Jacobi) Katt.,
Neopterteria horrida (Gay) D.R. Hunt
var. *armata* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,
Neopterteria horrida (Gay) D.R. Hunt
var. *odoriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,
Neopterteria horrida (Gay) D.R. Hunt,
Neopterteria tuberisulcata (Jacobi)
Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus*
armatus F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus*
(Gay) Backeb. f. *vegasanus* (F. Ritter)
F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay)
Backeb. var. *mutabilis* F. Ritter,
Pyrrhocactus horridus (Gay) Backeb.
var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter,
Pyrrhocactus horridus Backeb., nom.
inval., *Pyrrhocactus odoriflorus* F. Ritter,
Pyrrhocactus robustus F. Ritter
Hierba succulenta. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Pyrrhocactus umadeave (Werderm.)
Backeb.

Sin.: *Echinocactus umadeave* Werderm.,
Eriosyce umadeave (Werderm.) Katt.,
Friesia umadeave Fric ex Kreuz., nom.
inval., *Neopterteria umadeave* (Werderm.)
Donald & G.D. Rowley
Hierba succulenta. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Quiabentia Britton & Rose

Quiabentia verticillata (Vaupel) Borg

Sin.: *Pereskia pflanzii* Vaupel,
Pereskia verticillata Vaupel, *Quiabentia*
chacoensis Backeb. var. *jujuyensis*
Backeb., *Quiabentia chacoensis* Backeb.,
Quiabentia pflanzii (Vaupel) Vaupel
Arbusto succulento. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL).
PRY(APY, PHA).

Rebutia K. Schum.

Rebutia deminuta (F.A.C. Weber) A.
Berger

Sin.: *Aylostera deminuta* (F.A.C.
Weber) Backeb. var. *pseudominuscula*
(Speg.) Backeb., *Aylostera deminuta*
(F.A.C. Weber) Backeb., *Aylostera*
pseudodemina (Backeb.) Backeb.
var. *albiflora* Backeb., *Aylostera*
pseudodemina (Backeb.) Backeb.
var. *albisetata* Backeb., *Aylostera*
pseudodemina (Backeb.) Backeb.
var. *grandiflora* Backeb., *Aylostera*
pseudodemina (Backeb.) Backeb.
var. *schneideriana* Backeb., *Aylostera*
pseudodemina (Backeb.) Backeb.
var. *schumanniana* (Backeb.) Backeb.,
Aylostera pseudodemina (Backeb.)
Backeb., *Aylostera pseudominuscula*
(Speg.) Speg., *Echinopsis deminuta* F.A.C.
Weber, *Echinopsis pseudominuscula*
Speg., *Rebutia deminuta* (F.A.C. Weber)
A. Berger var. *pseudominuscula* (Speg.)
Donald, *Rebutia pseudodemina*
Backeb. var. *longisetata* Backeb.,
Rebutia pseudodemina Backeb.
var. *schumanniana* Backeb., *Rebutia*
pseudodemina Backeb., *Rebutia*
pseudominuscula (Speg.) Britton & Rose
Hierba succulenta. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Rebutia fiebrigii (W.R. Guerke)
Britton & Rose

Sin.: *Aylostera fiebrigii* (Gürke)

Backeb., *Aylostera jujuyana* (Rausch) W.
Haage, *Aylostera spegazziniana* (Backeb.)
Backeb. var. *atroviridis* Backeb., *Aylostera*
spegazziniana (Backeb.) Backeb., *Aylostera*
spinosissima (Backeb.) Backeb., *Echinocactus*
fiebrigii W.R. Guerke, *Lobivia steinmannii*
(Salm-Dyck) Backeb. var. *christinae* (Rausch)
Rausch, *Rebutia buiningiana* Rausch, *Rebutia*
christinae Rausch, *Rebutia fabrisii* Rausch
var. *aureiflora* Rausch, *Rebutia fabrisii* Rausch
var. *nana* Rausch, *Rebutia fabrisii* Rausch,
Rebutia fiebrigii (W.R. Guerke) Britton &
Rose var. *densisetata* (Cullman) Oeser, *Rebutia*
hoffmannii L. Diers & Rausch, *Rebutia*
jujuyana Rausch, *Rebutia kieslingii* Rausch,
Rebutia spegazziniana Backeb., *Rebutia*
spinosissima Backeb., *Rebutia walteri* L. Diers
Hierba succulenta. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Rebutia margarethae Rausch

Hierba succulenta. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Rebutia marsoneri Werderm.

Sin.: *Rebutia calliantha* Bewer. var.
berylloides Buining & Donald, *Rebutia*
calliantha Bewer. var. *brevisetata* Backeb.,
Rebutia hyalacantha (Backeb.) Backeb.,
Rebutia krainziana Kesselr. var. *brevisetata*
(Backeb.) Donald, *Rebutia krainziana*
Kesselr., *Rebutia marsoneri* Werderm.
var. *spathula* (Backeb.) Donald, *Rebutia*
marsoneri Werderm. var. *vatterii*
(Backeb.) Donald, *Rebutia minuscula*
K. Schum. var. *marsoneri* (Werderm.)
E. Scholz, *Rebutia permutata* Backeb.,
Rebutia wessneriana Bewer. var.
berylloides (Buining & Donald) Donald
Hierba succulenta. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Rebutia minuscula K. Schum. subsp.
minuscula

Sin.: *Rebutia chrysacantha* Backeb.
var. *elegans* (Backeb.) Backeb., *Rebutia*
chrysacantha Backeb. var. *kesselringiana*
(Bewer.) Donald, *Rebutia chrysacantha*
Backeb., *Rebutia dasyphrisa* Werderm.,
Rebutia graciliflora Backeb., *Rebutia*
grandiflora Backeb., *Rebutia knuthiana*
Backeb., *Rebutia minuscula* K. Schum.
subsp. *grandiflora* (Backeb.) Donald,
Rebutia minuscula K. Schum. subsp.
violaciflora (Backeb.) Donald, *Rebutia*
minuscula K. Schum. var. *grandiflora*
(Backeb.) Krainz, *Rebutia senilis* Backeb.
var. *arescens* Backeb., *Rebutia senilis*
Backeb. var. *brevisetata* Backeb., *Rebutia*
senilis Backeb. var. *chrysacantha*

(Backeb.) Donald, *Rebutia senilis* Backeb. var. *hyalacantha* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *iseliniana* Krainz, *Rebutia senilis* Backeb. var. *kesselringiana* Bewer., *Rebutia senilis* Backeb. var. *lilacinorosea* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *schieliana* Bewer., *Rebutia senilis* Backeb. var. *semperflorens* Poind., *Rebutia senilis* Backeb. var. *sieperdaiana* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *stuemeri* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb., *Rebutia violaciflora* Backeb. var. *knuthiana* (Backeb.) Donald, *Rebutia violaciflora* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *citricarpa* Fric ex Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *coerulescens* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *dasyphrissa* (Werderm.) Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *elegans* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *graciliflora* (Backeb.) Donald, *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *luteirosea* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *salmonia* Fric ex Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *violaciflora* (Backeb.) Backeb.
Hierba suculenta. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Rebutia minuscula K. Schum. subsp. **wessneriana** (Bewer.) Muruaga
Sin.: *Rebutia calliantha* Bewer., *Rebutia krainziana* Kesselr. var. *wessneriana* (Bewer.) Krainz & Haarm., *Rebutia wessneriana* Bewer., *Rebutia wessneriana* Bewer. var. *calliantha* (Bewer.) Donald
Hierba. Endémica. 2000-2100 m.
Países: ARG(JUJ).

Rebutia tarijensis Rausch
Hierba suculenta. Nativa. 3000-3100 m.
Países: ARG(SAL).

Rhipsalis Gaertn.

Rhipsalis aculeata F.A.C. Weber
Sin.: *Lepismium aculeatum* (F.A.C. Weber) Barthlott, *Lepismium lumbricoides* (Lem.) Barthlott f. *aculeatum* Barthlott & N.P. Taylor
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(PHA). URY(ART).

Rhipsalis agudoensis N.P. Taylor
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn subsp. **baccifera**

Sin.: *Cassyta baccifera* J.S. Muell., *Rhipsalis cassitta* Gaertn.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn subsp. **shaferi** (Britton & Rose) Barthlott & N.P. Taylor

Sin.: *Rhipsalis shaferi* Britton & Rose
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Rhipsalis burchellii Britton & Rose
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Rhipsalis campos-portoana Loefgr.
Hierba epífita. Nativa. 0-2300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis cereuscula Haw.
Sin.: *Cereus saglionis* Lem., *Rhipsalis penduliflora* N.E. Br., *Rhipsalis saglionis* (Lem.) Otto
Hierba epífita. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART).

Rhipsalis clavata F.A.C. Weber
Sin.: *Hatiora clavata* (F.A.C. Weber) Moran, *Hatiora clavata* (F.A.C. Weber) Moran var. *delicatula* (Loefgr.) A. Cast., *Rhipsalis clavata* F.A.C. Weber var. *delicatula* Loefgr.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Rhipsalis cruciforme (Vell.) A. Cast.
Sin.: *Cactus cruciformis* Vell., *Cereus squamulosus* Salm-Dyck ex DC., *Lepismium cavernosum* Lindb., *Lepismium cruciformis* (Vell.) Miq., *Rhipsalis cavernosa* (Lindb.) K. Schum., *Rhipsalis squamulosa* (Salm-Dyck) K. Schum.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CLA).

Rhipsalis dissimilis (G. Lindb.) K. Schum. f. **dissimilis**
Sin.: *Lepismium dissimilis* G. Lindb.
Hierba epífita. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Rhipsalis dissimilis (G. Lindb.) K. Schum. f. **epiphyllanthoides** (Backeb.) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Lepismium epiphyllanthoides* Backeb.
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Rhipsalis elliptica G. Lindb.
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis floccosa Pfeiff. subsp. **hohenauensis** (F. Ritter) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Rhipsalis hohenauensis* F. Ritter
Hierba epífita. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, PHA, SPE). URY(RIV).

Rhipsalis floccosa Pfeiff. subsp. **pulvinigera** (G. Lindb.) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Lepismium gibberulum* (F.A.C. Weber) Backeb., *Rhipsalis gibberula* F.A.C. Weber, *Rhipsalis pulvinigera* G. Lindb.
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis floccosa Pfeiff. subsp. **tucumanensis** (F.A.C. Weber) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Lepismium tucumanensis* (F.A.C. Weber) Backeb., *Rhipsalis tucumanensis* F.A.C. Weber
Hierba epífita. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Rhipsalis grandiflora Haw.
Sin.: *Cactus funalis* Spreng.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Rhipsalis houlettiana Lem.
Sin.: *Acanthorhipsalis houlettiana* (Lem.) Volgin, *Lepismium houlettianum* (Lem.) Barthlott
Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis lindbergiana K. Schum.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Rhipsalis lorentziana Griseb.
Sin.: *Lepismium lorentzianum* (Griseb.) Barthlott
Hierba epífita. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Rhipsalis lumbricoides (Lem.) Lem.
ex Salm-Dyck

Sin.: *Cereus lumbricoides* Lem.,
Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott,
Rhipsalis leucorhaphis K. Schum.,
Rhipsalis sarmentacea Otto & D. Dietr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN,
COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART,
FLA, MAL, SAO, SOR, TAC, TYT).

Rhipsalis monacantha Griseb.

Sin.: *Acanthorhipsalis monacantha*
(Griseb.) Britton & Rose, *Lepismium*
monacanthum (Griseb.) Barthlott,
Pfeiffera monacantha (Griseb.) P.V. Heath
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Rhipsalis neves-armondii K. Schum.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Rhipsalis pachyptera Pfeiff.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex
Pfeiff.) Salm-Dyck

Sin.: *Lepismium paradoxum* Salm-Dyck
ex Pfeiff.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis pilocarpa Loefgr.

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR).

Rhipsalis puniceo-discus G. Lindb.

Sin.: *Lepismium puniceo-discus* (G.
Lindb.) Backeb.
Hierba epífita. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis teres (Vell.) Steud. f.

capilliformis (F.A.C. Weber) Barthlott
& N.P. Taylor
Sin.: *Rhipsalis capilliformis* F.A.C. Weber
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Rhipsalis teres (Vell.) Steud. f.

heteroclada (Britton & Rose) Barthlott
& N.P. Taylor
Sin.: *Rhipsalis heteroclada* Britton & Rose
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis teres (Vell.) Steud. f.

prismatica (Lem.) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Hattoria prismatica* Lem., *Rhipsalis*
prismatica (Lem.) Ruempler
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Rhipsalis teres (Vell.) Steud. f. **teres**

Sin.: *Cereus teres* Vell., *Rhipsalis*
albolanata F. Ritter
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhipsalis trigona Pfeiff.

Sin.: *Lepismium trigonum* (Pfeiff.)
Backeb.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Selenicereus (A. Berger) Britton
& Rose

Selenicereus anthonyanus

(Alexander) D.R. Hunt
Sin.: *Cryptocereus anthonyanus*
Alexander
Arbusto suculento. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Selenicereus setaceus (Salm-Dyck ex
DC.) Werderm.

Sin.: *Cereus setaceus* Salm-Dyck ex DC.,
Cereus lindmanii F.A.C. Weber, *Mediocactus*
lindmanii (F.A.C. Weber) Backeb., *Cereus*
lindbergianus F.A.C. Weber, *Cereus hassleri*
K. Schum., *Mediocactus hassleri* (K. Schum.)
Backeb., *Mediocactus setaceus* (Salm-
Dyck ex DC.) Borg, *Hylocereus setaceus*
(Salm-Dyck ex DC.) R. Bauer, *Selenicereus*
macdonaldiae (Hook.) Britton & Rose,
Selenicereus rizzinii Scheinvar
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA,
CEN, CON, PAI, PHA).

Selenicereus undatus (Haw.) D.R. Hunt

Sin.: *Cereus undatus* Haw., *Hylocereus*
undatus (Haw.) Britton & Rose
Hierba suculenta. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Setiechinopsis (Backeb.) de Haas

Setiechinopsis mirabilis (Speg.) de Haas
Sin.: *Acanthopetalus mirabilis* (Speg.)
Y. Ito, *Arthrocareus mirabilis* (Speg.)
Marshall, *Echinopsis mirabilis* Speg.,
Setiechinopsis mirabilis (Speg.) de Haas
var. *gracilior* Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica.
500-1000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SDE, SJU).

Stetsonia Britton & Rose

Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton
& Rose

Sin.: *Cereus coryne* Salm-Dyck
Árbol suculento. Nativa. 200-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,
JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE). PRY(APY,
CON, PHA).

Tephrocactus Lem.

Tephrocactus alexanderi (Britton &
Rose) Backeb.

Sin.: *Opuntia alexanderi* Britton &
Rose var. *bruchii* (Speg.) G.D. Rowley,
Opuntia alexanderi Britton & Rose,
Opuntia bruchii Speg., *Tephrocactus*
alexanderi (Britton & Rose) Backeb. var.
bruchii (Speg.) Backeb., *Tephrocactus*
alexanderi (Britton & Rose) Backeb. var.
subsphaericus (Backeb.) Backeb., nom.
inval., *Tephrocactus bruchii* (Speg.) Speg.,
Tephrocactus subsphaericus Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica.
500-1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).

Tephrocactus aoracanthus (Lem.) Lem.

Sin.: *Cereus ovatus* Pfeiff., nom. illeg.,
Opuntia aoracantha Lem., *Opuntia*
hossei (Krainz & Gräser) G.D. Rowley,
Opuntia paediophila A. Cast., *Tephrocactus*
aoracanthus (Lem.) Lem. var. *paediophilus*
(A. Cast.) J.G. Lamb., *Tephrocactus hossei*
Krainz & Gräser, *Tephrocactus paediophilus*
(A. Cast.) F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica.
500-1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.)

Backeb. var. **articulatus**
Sin.: *Cereus articulatus* Pfeiff., *Opuntia*
articulata (Pfeiff.) D.R. Hunt, *Opuntia*
diademata Lem. var. *inermis* Speg.,
Opuntia glomerata Haw. var. *inermis*
(Speg.) A. Cast., *Opuntia strobiliformis*
A. Berger, *Tephrocactus articulatus*
(Pfeiff.) Backeb. var. *calvus* (Lem.)
Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.)
Backeb. var. *diadematus* (Lem.) Backeb.,
Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb.
var. *inermis* (Speg.) Backeb., *Tephrocactus*
calvus Lem.
Subarbusto suculento. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,
SJU, SLU).

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.)

Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Sin.: *Cereus syringacanthus* Pfeiff.,
Opuntia diademata Lem. var. *oligacantha*
Speg., *Opuntia diademata* Lem. var.
polyacantha Speg., *Opuntia diademata*
Lem., *Opuntia glomerata* Haw. f.
oligacantha (Speg.) A. Cast., *Opuntia*
papyracantha Phil., *Opuntia turpinii*
Lem., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.)
Backeb. var. *papyracanthus* (Phil.)
Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.)
Backeb. var. *polyacanthus* (Speg.)
Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.)
Backeb. var. *syringacanthus* (Speg.)
Backeb., *Tephrocactus diadematus* (Lem.)
Lem., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.)
Backeb. var. *oligacanthus* Speg.
Subarbusto suculento. Endémica.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL,
SDE, SJU, SLU).

Tephrocactus geometricus (A. Cast.)

Backeb.

Sin.: *Opuntia geometrica* A. Cast.
Subarbusto suculento. Endémica.
500-1500 m.
Países: ARG(CAT).

Tephrocactus halophilus (Speg.)

Backeb.

Sin.: *Opuntia halophila* Speg.
Subarbusto suculento. Endémica.
1000-1500 m.
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

Tephrocactus molinensis (Speg.)

Backeb.

Sin.: *Maihueniopsis molinensis* (Speg.)
F. Ritter, *Opuntia guerkei* Schelle,
Opuntia molinensis Speg., *Opuntia*
schumannii Speg.
Subarbusto suculento. Endémica.
500-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Tephrocactus weberi (Speg.) Backeb.

var. **deminutus** Rausch

Subarbusto suculento. Endémica.
1500-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Tephrocactus weberi (Speg.) Backeb.

var. **weberi**

Sin.: *Opuntia weberi* Speg., *Opuntia*
weberi Speg. var. *dispar* A. Cast., *Opuntia*
weberi Speg. var. *setiger* (Backeb.)
Backeb., *Tephrocactus setiger* Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica.
500-1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

Thelocephala Y. Ito**Thelocephala esmeraldana** (F. Ritter)

F. Ritter

Sin.: *Chileorebutia esmeraldana* F.
Ritter, *Eriocyce esmeraldana* (F. Ritter)
Katt., *Neochilenia esmeraldana* (F. Ritter)
Backeb., *Neoporteria esmeraldana* (F.
Ritter) Donald & G.D. Rowley
Hierba suculenta. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(ANT).

Thelocephala glabrescens (F. Ritter)

F. Ritter

Sin.: *Eriocyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck)
Katt. subsp. *glabrescens* (F. Ritter) Katt.
Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA).

Thelocephala krausii (F. Ritter) F.

Ritter

Sin.: *Eriocyce krausii* (F. Ritter) Katt.,
Neoporteria esmeraldana (F. Ritter)
Donald & G.D. Rowley var. *malleolata*
(F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephala*
longirapa F. Ritter, *Thelocephala*
malleolata (F. Ritter) F. Ritter,
Thelocephala malleolata (F. Ritter) F.
Ritter var. *solitaria* (F. Ritter) F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Thelocephala napina (Phil.) Y. Ito

Sin.: *Chileorebutia aerocarpa* F.
Ritter, *Chileorebutia duripulpa* F. Ritter,
Chileorebutia napina (Phil.) F. Ritter,
Echinocactus napinus Phil., *Eriocyce*
aerocarpa (F. Ritter) Katt., *Eriocyce*
napina (Phil.) Katt. subsp. *aerocarpa*
(F. Ritter) Ferryman, *Eriocyce napina*
(Phil.) Katt. subsp. *challensis* R. Keim
& I. Schaub, *Eriocyce napina* (Phil.)
Katt. subsp. *lembckei* Katt., *Eriocyce*
napina (Phil.) Katt. var. *duripulpa* (F.
Ritter) Katt., *Eriocyce napina* (Phil.)
Katt., *Eriocyce odieri* (Lem. ex Salm-
Dyck) Katt. subsp. *fulva* (F. Ritter)
Katt., *Eriocyce spectabilis* A.E. Hoffm.
& H.E. Walter, nom. nud., *Neochilenia*
aerocarpa (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia*
duripulpa (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia*
lembckei Backeb., *Neochilenia napina*
(Phil.) Backeb. var. *mitis* (Phil.) Backeb.,
Neochilenia napina (Phil.) Backeb.,
Neoporteria napina (Phil.) Backeb. f.
glabrescens (F. Ritter) A.E. Hoffm.,
Neoporteria napina (Phil.) Backeb. f.
nuda (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria*
napina (Phil.) Backeb. var. *aerocarpa*
(F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria*

napina (Phil.) Backeb. var. *duripulpa* (F.
Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria napina*
(Phil.) Backeb. var. *lembckei* (Backeb.)
A.E. Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.)
Backeb., *Thelocephala aerocarpa* (F.
Ritter) F. Ritter, *Thelocephala duripulpa*
(F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala fulva* F.
Ritter, *Thelocephala lembckei* (Backeb.) F.
Ritter, *Thelocephala nuda* F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 100-600 m.
Países: CHL(ATA).

Thelocephala odieri (Lem. ex Salm-

Dyck) F. Ritter

Sin.: *Chileorebutia odieri* (Lem. ex Salm-
Dyck) F. Ritter, *Echinocactus odieri* Lem. ex
Salm-Dyck, *Eriocyce odieri* (Lem. ex Salm-
Dyck) Katt. var. *monte-amargensis* Katt.,
Eriocyce odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt.,
Neochilenia odieri (Lem. ex Salm-Dyck)
Backeb., *Neoporteria monte-amargensis*
(Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom.
inval., *Neoporteria odieri* (Lem. ex Salm-
Dyck) Backeb., *Neoporteria reichei* (K.
Schum.) Backeb.

Hierba suculenta. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ATA).

Thelocephala tenebrica F. Ritter

Sin.: *Eriocyce tenebrica* (F. Ritter)
Katt., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb.
var. *fankhauseri* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,
Thelocephala fankhauseri F. Ritter
Hierba suculenta. Endémica. 100-600 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Thelocephala weisseri (A. Hoffm. &

H. Walter) Faúndez & Saldivia

Sin.: *Eriocyce odieri* var. *weisseri* A.
Hoffm. & H. Walter
Hierba suculenta. Endémica.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Trichocereus (A. Berger) Riccob.**Trichocereus andalgalensis** (F.A.C.

Weber) Hosseus

Sin.: *Cereus andalgalensis* F.A.C.
Weber, *Cereus huascha* F.A.C. Weber
var. *rubriflorus* F.A.C. Weber, *Echinopsis*
huascha (F.A.C. Weber) G.D. Rowley
var. *rubriflora* (F.A.C. Weber) G.D.
Rowley, *Helianthocereus huascha* (F.A.C.
Weber) Backeb. var. *rubriflorus* (F.A.C.
Weber) Backeb., *Lobivia andalgalensis*
(F.A.C. Weber) Britton & Rose, *Lobivia*
huascha (F.A.C. Weber) Marshall var.
andalgalensis (F.A.C. Weber) Rausch,
Salpingolobivia andalgalensis (F.A.C.

Weber) Y. Ito, *Trichocereus auricolor* Backeb., *Trichocereus huascha* (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. *rubriflorus* (F.A.C. Weber) Backeb.

Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT).

Trichocereus angelesii R. Kiesling
Sin.: *Echinopsis angelesiae* (R. Kiesling) G.D. Rowley

Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL).

Trichocereus arboricola Kimnach
Sin.: *Echinopsis arboricola* (Kimnach) Mottram

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL).

Trichocereus atacamensis (Phil.) W.T. Marshall & T.M. Bock

Sin.: *Cereus atacamensis* Phil., *Cereus eriocarpus* Phil., *Cereus pasacana* (F.A.C. Weber) F.A.C. Weber, *Echinopsis atacamensis* (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *pasacana* (F.A.C. Weber) G. Navarro, *Echinopsis atacamensis* (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis pasacana* (F.A.C. Weber) Friedrich & G.D. Rowley, *Helianthocereus atacamensis* (Phil.) Backeb., *Helianthocereus pasacana* (F.A.C. Weber) Backeb., *Pilocereus pasacanus* F.A.C. Weber, *Trichocereus pasacana* (F.A.C. Weber) Britton & Rose
Arbusto suculento. Nativa. 2000-3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(TAR, ANT).

Trichocereus bolligerianus (Mächler & H.E. Walter) S. Albesiano

Sin.: *Echinopsis bolligeriana* Mächler & H.E. Walter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *conjungens* F. Ritter
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(VAL, LBO).

Trichocereus cabreræ R. Kiesling
Sin.: *Echinopsis cabreræ* (R. Kiesling) G.D. Rowley

Arbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Trichocereus candicans (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose
Sin.: *Cereus candicans* Gillies ex Salm-Dyck var. *courantii* K. Schum., *Cereus*

candicans Gillies ex Salm-Dyck, *Cereus gladiatus* Lem., *Cereus lamprochlorus* Lem. var. *salinicola* Speg., *Echinocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Rümpler, *Echinopsis candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt var. *gladiata* (Lem.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt var. *tenuispina* (Pfeiff.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt, *Echinopsis courantii* (K. Schum.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *gladiatus* Backeb., *Trichocereus courantii* (K. Schum.) Backeb.

Arbusto suculento. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

Trichocereus chiloensis (Colla)
Britton & Rose subsp. **australis** (F. Ritter) S. Albesiano

Sin.: *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter
Arbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Trichocereus chiloensis (Colla)
Britton & Rose subsp. **chiloensis**
Sin.: *Cactus chiloensis* Colla, *Cereus chiloensis* (Colla) DC., *Cereus quisco* J. Remy ex Gay, *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *borealis* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *eburneus* F. Ritter, nom. inval.
Arbusto suculento. Endémica. 0-1700 m.
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Trichocereus chiloensis (Colla)
Britton & Rose subsp. **eburneus** (Phil. ex K. Schum.) S. Albesiano

Sin.: *Cereus chiloensis* (Colla) DC. var. *eburnea* Phil. ex K. Schum.
Arbusto. Endémica. 900 m.
Países: CHL(COQ).

Trichocereus chiloensis (Colla)
Britton & Rose subsp. **panhoplites** (K. Schum.) S. Albesiano
Sin.: *Cereus chiloensis* (Colla) DC. var. *panhoplites* K. Schum., *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *panhoplites* (K. Schum.) F. Ritter, nom. inval.
Arbusto. Endémica. 1100-1300 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Trichocereus deserticola (Werderm.) Looser

Sin.: *Cereus deserticola* Werderm., *Echinopsis deserticola* (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley var. *fulvilana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinopsis deserticola* (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley, *Eulychnia spinibarbis* (Pfeiff.) Britton & Rose, *Trichocereus fulvilanus* F. Ritter, *Trichocereus serenanus* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémica. 400-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Trichocereus fabrisii R. Kiesling
Sin.: *Echinopsis fabrisii* (R. Kiesling) G.D. Rowley, *Trichocereus volcanensis* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Trichocereus faundezi S. Albesiano
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: CHL(COQ).

Trichocereus glaucus F. Ritter f. **pendens** F. Ritter

Sin.: *Echinopsis glauca* (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley f. *pendens* (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley
Arbusto suculento. Endémica. 400-600 m.
Países: CHL(TAR).

Trichocereus huascha (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Sin.: *Cereus huascha* F.A.C. Weber var. *flaviflora* F.A.C. Weber, *Cereus huascha* F.A.C. Weber, *Echinopsis huascha* (F.A.C. Weber) G.D. Rowley, *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *auricolor* (Backeb.) Backeb., *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *macranthus* Backeb., *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *roseiflorus* (Y. Ito) Backeb., *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb., *Helianthocereus hyalacanthus* (Speg.) Backeb., *Lobivia huascha* (F.A.C. Weber) Marshall, *Lobivia hyalacantha* Speg., *Salpingolobivia huascha* (F.A.C. Weber) Y. Ito
Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Trichocereus huascha (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **pecheretianus** Backeb. ex R. Kiesling
Sin.: *Helianthocereus pecheretianus* Backeb., nom. inval., *Helianthocereus pecheretianus* Backeb. var. *viridior* Backeb.
Subarbusto suculento. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Trichocereus lamprochlorus (Lem.)

Britton & Rose

Sin.: *Cereus lamprochlorus* Lem., *Cereus nitens* Salm-Dyck, *Echinocereus lamprochlorus* (Lem.) Rümpler, *Echinopsis lamprochlora* (Lem.) F.A.C. Weber ex Friedrich & Glaetzle, *Echinopsis purpureopilosa* (Weing.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus neolamprochlorus* Backeb., *Trichocereus purpureopilosus* Weing.

Subarbusto suculento. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(COR, LRI).

Trichocereus pectiniferus S.

Albesiano

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ).

Trichocereus pseudocandicans

Backeb. ex R. Kiesling

Sin.: *Echinopsis pseudocandicans* (Backeb.) ex R. Kiesling Friedrich & Glaetzle, *Helianthocereus pseudocandicans* Backeb. var. *flaviflorus* (Backeb.) Backeb., comb. illeg., *Helianthocereus pseudocandicans* Backeb. var. *roseoflorus* (Backeb.) Backeb., comb. illeg., *Helianthocereus pseudocandicans* Backeb., nom. inval., *Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose f. *rubriflorus* F. Ritter *Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *roseoflorus* Backeb., nom. inval.

Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(LRI).

Trichocereus rowleyi (Friedrich) R.

Kiesling

Sin.: *Chamaecereus grandiflorus* (Fric) Britton & Rose, *Echinopsis rowleyi* Friedrich, *Helianthocereus grandiflorus* (Britton & Rose) Backeb., *Lobivia grandiflora* Britton & Rose var. *lobivioidea* (F. Ritter) Rausch, *Lobivia grandiflora* Britton & Rose var. *longispina* Rausch, *Lobivia grandiflora* Britton & Rose, *Lobivia purpureominiata* F. Ritter, *Trichocereus lobivioidea* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT).

Trichocereus schickendantzii (F.A.C.

Weber) Britton & Rose

Sin.: *Cereus schickendantzii* F.A.C. Weber, *Echinopsis friedrichii* G.D. Rowley, *Echinopsis schickendantzii* F.A.C. Weber,

Salpingolobivia shaferi (Britton & Rose) Y. Ito, *Trichocereus shaferi* Britton & Rose Subarbusto suculento. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Trichocereus skottsbergii Backeb.

Sin.: *Echinopsis skottsbergii* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley Arbusto suculento. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(COQ).

Trichocereus smrzianus (Backeb.)

Backeb.

Sin.: *Echinopsis smrziana* Backeb., *Soehrensia smrziana* (Backeb.) Backeb. Subarbusto suculento. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(SAL).

Trichocereus spinibarbis (Pfeiff.) F.

Ritter

Sin.: *Cereus spinibarbis* Pfeiff., *Echinopsis spinibarbis* (Pfeiff.) A.E. Hoffm. Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Trichocereus strigosus (Salm-Dyck)

Britton & Rose

Sin.: *Cereus strigosus* Salm-Dyck, *Echinopsis strigosa* (Salm-Dyck) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus strigosus* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *flaviflorus* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

Trichocereus tarijensis (Vaupel)

Werderm.

Sin.: *Cereus tarijensis* Vaupel, *Echinopsis poco* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis tarijensis* (Vaupel) Friedrich & G.D. Rowley, *Helianthocereus poco* (Backeb.) Backeb. var. *albiflorus* Cárdenas, *Helianthocereus poco* (Backeb.) Backeb. var. *sanguiniflorus* Backeb., *Helianthocereus tarijensis* (Vaupel) Backeb., *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds subsp. *tarijensis* (Vaupel) Rausch, *Trichocereus poco* Backeb., *Trichocereus poco* Backeb. var. *sanguiniflorus* Backeb.

Arbusto suculento. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(JUU).

Trichocereus terscheckii (Parm. ex

Pfeiff.) Britton & Rose

Sin.: *Cereus terscheckii* Parm. ex Pfeiff.,

Echinopsis terscheckii (Parm. ex Pfeiff.) Friedrich & G.D. Rowley, *Pilocereus terscheckii* Parm. ex Pfeiff., *Trichocereus terscheckii* (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose var. *montanus* Backeb.

Árbol suculento. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Trichocereus thelegonoides (Speg.)

Britton & Rose

Sin.: *Cereus thelegonoides* Speg., *Echinopsis rubinghiana* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis thelegonoides* (Speg.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus rubinghianus* Backeb.

Arbusto suculento. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Trichocereus thelegonus (F.A.C.

Weber) Britton & Rose

Sin.: *Cereus thelegonus* F.A.C. Weber, *Echinopsis thelegona* (F.A.C. Weber) Friedrich & G.D. Rowley Arbusto suculento. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Trichocereus undulosus S. Albesiano

Arbusto suculento. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(COQ).

Trichocereus uyupampensis Backeb.

Arbusto suculento. Nativa. 400-600 m.

Países: CHL(AYP).

Trichocereus vatteri R. Kiesling

Sin.: *Echinopsis vatteri* (R. Kiesling) G.D. Rowley, *Trichocereus callianthus* F. Ritter Subarbusto suculento. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(LRI).

Tunilla D.R. Hunt & Iliff

Tunilla chilensis (F. Ritter) D.R. Hunt & Iliff

Sin.: *Opuntia alcerrecensis* (F. Ritter) Iliff, comb. illeg., *Platyopuntia chilensis* F. Ritter, nom. illeg.

Hierba suculenta. Nativa. 3500 m.

Países: CHL(TAR).

Tunilla corrugata (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff

Sin.: *Opuntia aulacothele* F.A.C. Weber, *Opuntia corrugata* Salm-Dyck, *Opuntia longispina* Haw. var. *brevispina* Backeb., *Opuntia longispina* Haw. var. *corrugata* (Salm-Dyck) Backeb., *Opuntia longispina* Haw. var. *flavidispina* Backeb., *Opuntia*

longispina Haw. var. *intermedia* Backeb.,
Platyopuntia corrugata (Salm-Dyck) F.
Ritter, comb. illeg.

Subarbusto suculento. Endémica.
1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

Tunilla tilcarensis (Backeb.) D.R.
Hunt & J. Iliff

Sin.: *Opuntia tilcarensis* Backeb.,
Platyopuntia soehrensii (Britton & Rose)
F. Ritter, comb. illeg. var. *tilcarensis*
(Backeb.) F. Ritter

Hierba suculenta. Endémica. 2000-
2700 m.
Países: ARG(JUJ).

Weingartia Werderm.

Weingartia neumanniana (Backeb.)
Werderm.

Sin.: *Echinocactus neumannianus*
Backeb., nom. nud., *Gymnocalycium*
neumannianum (Backeb.) Hutch.,
Rebutia neumanniana (Backeb.) D.R.
Hunt, *Spegazzinia neumanniana* Backeb.

Hierba suculenta. Endémica. 3000-
3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Wigginsia D.M. Porter

Wigginsia calvescens (N. Gerloff &
A.D. Nilson) Font

Sin.: *Notocactus calvescens* N. Gerloff
& A.D. Nilson
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS).

Wigginsia corynodes (Otto ex Pfeiff.)
D.M. Porter

Sin.: *Echinocactus corynodes* Otto ex Pfeiff.,
Malacocarpus arechavaletai (K. Schum. ex
Speg.) Berg, *Wigginsia arechavaletai* (K.
Schum. ex Speg.) D.M. Porter
Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(ROC).

Wigginsia erinacea (Haw.) D.M. Porter

Sin.: *Cactus erinaceus* Haw., *Parodia*
erinacea (Haw.) N.P. Taylor
Hierba suculenta. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Wigginsia pauciareolata (Arechav.) R.
Kiesling

Sin.: *Echinocactus pauciareolatus*
Arechav., *Malacocarpus pauciareolatus*

(Arechav.) A. Berger
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). URY(SOR).

Wigginsia sessiliflora (Hook.) D.M.
Porter

Sin.: *Echinocactus sessiliflorus* Hook.,
Echinocactus tetracanthus Lem.,
Malacocarpus sessiliflorus (Hook.)
Backeb., *Malacocarpus stegmannii*
Backeb., nom. inval., *Malacocarpus*
tetracanthus Lem., *Wigginsia stegmannii*
(Backeb.) D.M. Porter, comb. illeg.
Hierba suculenta. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE).
URY(RNO).

Wigginsia shaeferiana W.R. Abraham
& S. Theun.

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Wigginsia tephraantha (Link &
Otto) D.M. Porter

Sin.: *Echinocactus tephraanthus* Link
& Otto, *Malacocarpus tephraanthus*
(Link & Otto) K. Schum.
Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(COL).

Yavia R. Kiesling & Piltz

Yavia cryptocarpa R. Kiesling & Piltz
Hierba suculenta. Endémica. 3600-3800 m.
Países: ARG(JUJ).

CALCEOLARIACEAE

Calceolaria L.

Calceolaria aiseniana Ehrh.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(AIS).

Calceolaria alba Ruiz & Pav.
Subarbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Calceolaria andina Benth.
Sin.: *Calceolaria secunda* Witasek
Subarbusto. Endémica. 800-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria angustifolia (Lindl.) Sweet
Sin.: *Calceolaria berteroi* Colla,
Calceolaria integrifolia L. var. *angustifolia*

Lindl., *Calceolaria salicariifolia* Phil.,
Arbusto o subarbusto. Endémica.
0-2600 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria arachnoidea Graham
subsp. **arachnoidea**

Hierba. Endémica. 1900-2600 m.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Calceolaria arachnoidea Graham
subsp. **nubigena** (Poepp.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria arachnoidea* Graham
var. *lanata* Meyen ex Walp. & Schauer,
Calceolaria arachnoidea Graham var. *viridis*
Benth., *Calceolaria nubigena* Poepp.

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, RME).

Calceolaria ascendens Lindl. subsp.
ascendens

Sin.: *Calceolaria uspollatensis* Kraenzl.
Subarbusto. Endémica. 0-1900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Calceolaria ascendens Lindl. subsp.
exigua (Witasek) Nic. García

Sin.: *Calceolaria exigua* Witasek,
Calceolaria miserrima Kraenzl.,
Calceolaria parvifolia Phil., nom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 1600-2100 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Calceolaria ascendens Lindl. subsp.
glandulifera (Witasek) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria bipartita* Phil.,
Calceolaria glandulifera Witasek
Arbusto. Endémica. 800-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria ascendens Lindl. subsp.
pristiphylla (Phil.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria ascendens* Lindl. var.
pristiphylla (Phil.) Kraenzl., *Calceolaria*
pristiphylla Phil.
Arbusto. Endémica. 500-1800 m.
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, RME).

Calceolaria asperula Phil.
Hierba. Endémica. 900-2000 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Calceolaria auriculata Phil.
Subarbusto. Endémica. 200 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Calceolaria biflora Lam.

Sin.: *Calceolaria biflora* Lam. f. *falklandica* (S. Moore) W. Bowden, *Calceolaria falklandica* (S. Moore) Kraenzl., *Calceolaria plantaginea* Sm., nom. superfl., *Fagelia falklandica* S. Moore

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Calceolaria brunellifolia Phil.

Sin.: *Calceolaria bellidifolia* Benth., *Calceolaria bellidifolia* Benth. var. *angustifolia* Speg.

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Calceolaria caleuana M. Muñoz & Moreira

Sin.: *Calceolaria espinosae* M. Muñoz & Moreira, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 2100-2300 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Calceolaria campanae Phil.

Sin.: *Calceolaria gnaphaliifolia* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(VAL).

Calceolaria cana Cav.

Hierba. Endémica. 600-2500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Calceolaria cavanillesii Phil.

Sin.: *Calceolaria recta* Witasek

Hierba. Endémica. 500-2100 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Calceolaria chelidonioides Kunth

Sin.: *Calceolaria cantensis* López Guillén, *Calceolaria conocarpa* Pennell subsp. *irregularis* López Guillén, *Calceolaria glutinosa* Heer & Regel, *Calceolaria gracilis* Kunth var. *stenoptera* Diels, *Calceolaria grandepinnata* Edwin, *Calceolaria lilloi* Descole & Borsini, *Calceolaria obscura* Pennell, *Fagelia chelidonioides* (Kunth) Kuntze, *Fagelia diversifolia* Pennell, *Fagelia pinnatisecta* Pennell

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL). CHL(VAL).

Calceolaria collina Phil. subsp. **collina**

Sin.: *Calceolaria ascendens* Lindl.

var. *coquimbensis* Benth., *Calceolaria coquimbensis* (Benth.) Kraenzl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Calceolaria collina Phil. subsp.**conferta** (Witasek) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria conferta* Witasek, *Calceolaria fulva* Witasek f. *viscosa* Witasek

Arbusto. Endémica. 400-1600 m.

Países: CHL(COQ).

Calceolaria collina Phil. subsp.**subincisa** (Benth.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria abscondita* Witasek, *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *subincisa* Benth., *Calceolaria quadriradiata* Phil.

Arbusto. Endémica. 200-800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav.subsp. **corymbosa**

Sin.: *Calceolaria cordata* Phil., *Calceolaria herbertiana* Lindl., *Calceolaria herbertiana* Lindl. var. *parviflora* Lindl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav.subsp. **floccosa** (Witasek) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria floccosa* Witasek

Hierba. Endémica. 2200-2700 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU).

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav.subsp. **mimuloides** (Clos) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria mimuloides* Clos, *Calceolaria oligantha* Phil.

Hierba. Endémica. 2200-3500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav.subsp. **montana** (Cav.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria mollissima* Walp. & Schauer, *Calceolaria montana* Cav., *Calceolaria villosa* Phil.

Hierba. Endémica. 2200-3100 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav.subsp. **santiagina** C. Ehrh.

Hierba. Endémica. 700-2300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav.subsp. **tetraphylla** (Phil.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria tetraphylla* Phil.

Hierba. Endémica. 700-1600 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Calceolaria crenatiflora Cav.

Sin.: *Calceolaria cunninghamii* Vatke, *Calceolaria hollermayeri* Kraenzl., *Calceolaria pendula* Sweet

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Calceolaria densifolia Phil. subsp. **densifolia**

Arbusto. Endémica. 1200-1300 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Calceolaria densifolia Phil. subsp.**laxa** C. Ehrh.

Subarbusto. Endémica. 1300-1700 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. subsp.**araucana** (Phil.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria araucana* Phil.

Hierba. Endémica. 200-1000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LLA).

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. subsp.**cumingiana** (Witasek) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria cummingiana* Witasek, *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var.

cumingiana (Witasek) Reiche

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. subsp.**dentata**

Sin.: *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *chiloensis* (Lindl.) Kraenzl., *Calceolaria chiloensis* Lindl., *Calceolaria compacta* Phil., *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *chiloensis* (Lindl.) Benth., *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *compacta* (Phil.)

Reiche, *Calceolaria laetevirens* Kraenzl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Calceolaria elatior Griseb.

Sin.: *Calceolaria camptoclada* Kraenzl., *Calceolaria leiophylla* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 400-2800 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Calceolaria filicaulis Clos subsp. **filicaulis**

Sin.: *Calceolaria flabellifolia* Kraenzl., *Calceolaria palenae* Phil.

Hierba. Nativa. 1400-2700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

- Calceolaria filicaulis** Clos subsp. **luxurians** (Witasek) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria cana* Cav. var. *pannosa* (Phil.) Reiche, *Calceolaria luxurians* Witasek, *Calceolaria pannosa* Phil.
Hierba. Endémica. 2200-3100 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Calceolaria flavovirens** C. Ehrh.
Arbusto. Endémica. 2200-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).
- Calceolaria fothergillii** Sol.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).
- Calceolaria georgiana** F. Phil.
Arbusto. Endémica. 400-700 m.
Países: CHL(COQ).
- Calceolaria germainii** Witasek
Hierba. Endémica. 600-2000 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU). CHL(MAU).
- Calceolaria glacialis** Wedd.
Hierba. Nativa. 3500-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU, TUC).
- Calceolaria glandulosa** Poepp. ex Benth. subsp. **alichahuensis** (M. Muñoz) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria alichahuensis* M. Muñoz, *Calceolaria dumetorum* Phil., *Calceolaria glutinosa* Meigen, nom. illeg.
Hierba. Endémica. 700-2100 m.
Países: CHL(COQ, VAL).
- Calceolaria glandulosa** Poepp. ex Benth. subsp. **glandulosa**
Sin.: *Calceolaria atrovirens* Witasek, *Calceolaria kingii* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Calceolaria hypericina** Poepp. ex Benth.
Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Calceolaria inamoena** Kraenzl.
Sin.: *Calceolaria aberrans* Kraenzl., *Calceolaria pulchella* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 3500-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR).
- Calceolaria integrifolia** L.
Sin.: *Calceolaria rugosa* Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).
- Calceolaria jujuyensis** Botta
Hierba o subarbusto. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Calceolaria lagunae-blancae** Kraenzl.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).
- Calceolaria lanigera** Phil.
Hierba. Endémica. 900-1500 m.
Países: CHL(LBO, MAU).
- Calceolaria latifolia** Benth.
Sin.: *Calceolaria latifolia* Benth. var. *longepetiolata* (Phil.) Reiche, *Calceolaria longepetiolata* Phil., *Calceolaria stachydifolia* Phil.
Hierba. Endémica. 500-1100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).
- Calceolaria lepida** Phil.
Subarbusto. Endémica. 1800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).
- Calceolaria lepidota** Kraenzl.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT).
- Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **cheiranthoides** (Witasek) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria cheiranthoides* Reiche ex Witasek
Arbusto. Endémica. 500 m.
Países: CHL(MAU).
- Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **glabrata** (Phil.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria glabrata* Phil.
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: CHL(MAU, BIO).
- Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **meyeniana**
Sin.: *Calceolaria andicola* Witasek, *Calceolaria crocea* Phil., *Calceolaria glabrata* Phil. var. *meyeniana* (Phil.) Reiche, *Calceolaria landbecki* Phil.
Arbusto. Endémica. 600-2300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, ARA, RME).
- Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **nahuelbutae** (Phil.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria nahuelbutae* Phil., *Calceolaria vernicosa* Phil.
Arbusto. Endémica. 800-1300 m.
Países: CHL(BIO, ARA).
- Calceolaria morisii** Walp.
Sin.: *Calceolaria hypoleuca* Kuntze, nom. nud., *Calceolaria polyphylla* Kraenzl., *Calceolaria salviaefolia* Colla, nom. illeg., *Calceolaria wettsteiniana* Witasek
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).
- Calceolaria nitida** Colla
Sin.: *Calceolaria pseudoglandulosa* Clos
Subarbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).
- Calceolaria nudicaulis** Benth.
Sin.: *Calceolaria pratensis* Phil.
Hierba. Endémica. 500-1800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).
- Calceolaria pallida** Phil.
Arbusto. Endémica. 1600-2200 m.
Países: CHL(LBO, MAU).
- Calceolaria paposana** Phil.
Subarbusto. Endémica. 200-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Calceolaria paralia** Cav.
Hierba. Endémica. 600-2300 m.
Países: CHL(LBO, MAU).
- Calceolaria parviflora** Benth.
Hierba. Endémica. 200-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SLU, TUC). URY(LAV, MAL).
- Calceolaria parvifolia** Wedd.
Sin.: *Calceolaria elliptica* Wedd., *Calceolaria lechioides* Rusby, *Fagelia bangii* Rusby
Hierba o subarbusto. Nativa. 3300-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Calceolaria pennellii** Descole & Borsini
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
- Calceolaria petioalaris** Cav.
Sin.: *Calceolaria connata* Hook. ex Graham, *Calceolaria cuspidata* Phil., *Calceolaria effusa* Phil., *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *cuspidata* (Phil.) Reiche, *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *latifolia* Clos, *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *oblongifolia* Clos
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria philippii Eyz.

Hierba. Endémica. 1300 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Calceolaria picta Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ).

Calceolaria pinifolia Cav.

Hierba. Endémica. 2600-4300 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL).

Calceolaria pinnata L.

Sin.: *Calceolaria bipinnatifida* Phil.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). CHL(ANT).

Calceolaria plectranthifolia Walp.

Sin.: *Calceolaria fiebrigiana* Kraenzl.,
Calceolaria foliosa Griseb., nom.
illeg., *Calceolaria hieronymi* Kraenzl.,
Calceolaria paucifolia Edwin & Wooden,
Fagelia plectranthifolia (Walp.) Kuntze
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
SAL, TUC).

Calceolaria poikilanthos Sandwith

Hierba. Endémica. 1300-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ARA).

Calceolaria polifolia Hook.

Sin.: *Calceolaria spatellifolia* Kraenzl.
Arbusto. Endémica. 0-2300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Calceolaria polyclada Kraenzl.

Sin.: *Calceolaria catamarcae* Kraenzl.,
Calceolaria grisebachii Kraenzl.
Hierba. Nativa. 700-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Calceolaria polyrrhiza Cav.

Sin.: *Calceolaria acutifolia* Witasek,
Calceolaria bergii Hieron., *Calceolaria*
borsinii Rossow, *Calceolaria chubutensis*
Skotts., *Calceolaria cymbiflora*
Sandwith, *Calceolaria lanceolata* Cav.
f. *acutifolia* (Witasek) W. Bowden,
Calceolaria lanceolata Cav. f. *polyrrhiza*
(Cav.) W. Bowden, *Calceolaria lanceolata*
Cav. var. *acutifolia* (Witasek) Reiche,
Calceolaria lanceolata Cav. var. *glabrata*
Speg., *Calceolaria lanceolata* Cav. var.
pusilla (Witasek) Reiche, *Calceolaria*
lanceolata Cav., *Calceolaria mendocina*
Phil., *Calceolaria patagonica* Kraenzl.,
Calceolaria prichardii (Rendle) Kraenzl.,

Calceolaria pusilla Witasek, *Fagelia*
prichardii Rendle

Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU,
RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO,
ARA, AIS, MAG).

Calceolaria purpurea Graham

Hierba. Endémica. 900-2300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria rinconada Ehrh.

Subarbusto. Endémica. 200-600 m.
Países: CHL(ANT).

Calceolaria rivularis Kraenzl.

Hierba palustre. Nativa. 1800-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Calceolaria rubiginosa C. Ehrh.

Subarbusto. Endémica. 400-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Calceolaria ruiz-leali Descole & Borsini

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Calceolaria santolinoides Kraenzl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 3400-4300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
SLU, TUC).

Calceolaria schickendantziana Kraenzl.

Sin.: *Calceolaria fabrisii* Botta &
Cabrera
Hierba. Nativa. 2000-3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Calceolaria segethii Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-2200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Calceolaria spathulata Witasek

Hierba. Endémica. 1900-2000 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Calceolaria stellariifolia Phil.

Sin.: *Calceolaria rupicola* F. Meigen
Subarbusto. Endémica. 2700-4300 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, RME).

Calceolaria talcana Grau & Ehr. Bayer

Arbusto. Endémica. 500-1300 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Calceolaria tenella Poepp. & Endl.

Sin.: *Calceolaria skottsbergii* Gand.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Calceolaria teucroides Griseb.

Sin.: *Calceolaria losseri* Kraenzl., *Calceolaria*
teucroides Griseb. var. *pumila* Griseb.,
Calceolaria ruiz-pavonii Descole & Borsini
Hierba o subarbusto. Nativa. 1000-3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Calceolaria thyrsoflora Graham

Sin.: *Calceolaria bridgesii* Kunze,
Calceolaria thyrsoflora Graham var.
alliacea Phil.
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Calceolaria tripartita Ruiz & Pav.

Sin.: *Calceolaria scabiosaefolia* Roem.
& Schult.
Hierba. Nativa. 0-3900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(COQ, VAL).

Calceolaria tucumana Descole

Hierba. Nativa. 2800-3900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Calceolaria umbellata Wedd.

Sin.: *Calceolaria lorentzii* Griseb.
Hierba. Nativa. 1500-3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Calceolaria undulata Benth.

Sin.: *Calceolaria brevistyla* Clos,
Calceolaria foliosa Phil.
Arbusto. Endémica. 1300-2200 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO).

Calceolaria uniflora Lam.

Sin.: *Calceolaria darwinii* Benth.,
Calceolaria minima Witasek, *Calceolaria*
nana Sm., *Calceolaria uniflora* Lam. var.
darwinii (Benth.) Witasek ex Reiche,
Calceolaria uniflora Lam. var. *minima*
(Witasek) Reiche, *Calceolaria uniflora*
Lam. var. *silvestris* Skotts., *Fagelia*
darwinii (Benth.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(AIS, MAG, RME).

Calceolaria valdiviana Phil. subsp. **crassifolia** (Phil.) C. Ehrh.

Sin.: *Calceolaria crassifolia* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Calceolaria valdiviana Phil. subsp. **valdiviana**

Sin.: *Calceolaria llaimae* Kraenzl.,
Calceolaria obtusifolia (Clos) Witasek,
Calceolaria plantaginea Sm. var.

obtusifolia Clos, *Calceolaria tenera* Phil., *Calceolaria tenerifolia* Phil., *Calceolaria werdermannii* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 600-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Calceolaria verbascifolia Bertero ex Phil.

Sin.: *Calceolaria borchersi* Phil.,
Calceolaria oreas Phil.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-1300 m.
Países: CHL(VAL, LBO).

Calceolaria viscosissima (Hook.) Lindl.

Sin.: *Calceolaria gmelinii* Phil.,
Calceolaria integrifolia L. var. *viscosissima*
Hook., *Calceolaria pubescens* Phil.,
Calceolaria robusta A. Dietr.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

Calceolaria volckmannii Phil.

Sin.: *Calceolaria benthami* Phil.,
Calceolaria bigemina Phil., *Calceolaria poeppigiana* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAU, BIO).

Calceolaria williamsii Phil.

Hierba. Endémica. 2400-2700 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Jovellana Ruiz & Pav.

Jovellana guentheri Kraenzl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(LLA).

Jovellana punctata Ruiz & Pav.

Sin.: *Calceolaria punctulata* Phil.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI).

Jovellana violacea (Cav.) G. Don

Sin.: *Calceolaria violacea* Cav.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI).

CALYCERACEAE

Acicarpa Juss.

Acicarpa obtusisepala Marchesi

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(ROC).

Acicarpa procumbens Less.

Sin.: *Acicarpa procumbens* Less. var.
viridiflora C.A. Muell.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI).
BRA(RGS, SCA). URY(ART, CLA, SAO, SJO, SOR, TAC).

Acicarpa runcinata Miers

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(FLO).

Acicarpa spathulata R. Br.

Sin.: *Cryptocarpa spathulata* (R. Br.) Cass.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acicarpa tribuloides Juss.

Sin.: *Acicarpa bonariensis* (Pers.)
Herter, *Acicarpa laxa* R.E. Fr., *Acicarpa pinnatifida* Miers, *Acicarpa tribuloides* Juss. var. *dentata* Kuntze, *Acicarpa tribuloides* Juss. var. *pinnatifida* (Miers) Kuntze, *Buphtalmium bonariense* Pers., *Cryptocarpa tribuloides* (Juss.) Cass.
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(MON, SAO, SJO).

Boopis Juss.

Boopis anthemoides Juss. var. **andina** Hieron.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Boopis anthemoides Juss. var. **anthemoides**

Sin.: *Boopis anthemoides* Juss. f. *patagonica* Hieron., *Boopis anthemoides* Juss. var. *rigidula* (Miers) Griseb., *Boopis anthemoides* Juss. var. *subscandens* Speg., *Boopis rigidula* Miers var. *patagonica* Hieron., *Boopis rigidula* Miers, *Gamocarpha angustifolia* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Boopis anthemoides Juss. var. **subintegrifolia** Hicken

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, LPA, MEN, SDE, SFE, SLU, TUC).

Boopis bupleuroides (Less.) C.A. Muell.

Sin.: *Acicarpa bupleuroides* Less.
Hierba. Endémica. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Boopis castillonii (Hicken) Pontiroli

Sin.: *Calycera castillonii* Hicken
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT).

Boopis filifolia Speg.

Sin.: *Boopis prichardii* S. Moore
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Boopis gracilis Phil.

Sin.: *Boopis bicolor* Phil., *Boopis gracilis* Phil. var. *decumbens* Chodat & Wilczek, *Boopis gracilis* Phil. var. *pozoaeformis* (Phil.) Hicken, *Boopis pozoaeformis* Phil., *Calycera boopidea* Hicken
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(MAU, BIO, RME).

Boopis jürgensii Pilg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Boopis necronensis Zavala, S.S.

Denham & Pozner
Hierba. Endémica. 3700-4300 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Boopis patagonica Speg.

Sin.: *Boopis alpina* Speg., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Boopis pterocalyx Zavala, S.S.

Denham & Pozner
Hierba. Endémica. 2300-2400 m.
Países: ARG(MEN).

Boopis pusilla Phil.

Hierba. Endémica. 1600 m.
Países: CHL(RME).

Calycera Cav.

Calycera calcitrapa Griseb.

Hierba. Endémica. 400-1900 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Calycera crassifolia (Miers) Hicken var. **crassifolia**

Sin.: *Acicarpa crassifolia* Miers, *Boopis crassifolia* (Miers) A. Gray, *Boopis crassifolia* (Miers) A. Gray var. *spinuligera* Speg., *Calycera crassifolia* (Miers) Hicken var. *spinuligera* (Speg.) Hicken

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).

Calycera crassifolia (Miers) Hicken var. **spinulosa** (Gillies ex Miers) Zavala, S. Denham & Pozner

Sin.: *Calycera foliosa* Phil. ex Reiche, *Calycera neuquenensis* Suess., *Calycera spinulosa* Gillies ex Miers, *Calycera spinulosa* Gillies ex Miers var. *serratifolia* Miers

Hierba. Endémica. 100-2600 m.

Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Calycera eryngioides J. Remy

Sin.: *Anomocarpus eryngioides* (J. Remy) Miers

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: CHL(COQ, LBO, RME).

Calycera herbacea Cav. var. **herbacea**

Sin.: *Boopis australis* Decne. var. *squarrosa* (Miers) Reiche, *Boopis squarrosa* Miers, *Boopis viridiflora* Miers, Chodat & Hassl., *Calycera cavanillesi* Rich., nom. superfl., *Calycera herbacea* Cav. var. *viridiflora* (Phil.) Pontiroli, *Calycera nudicaulis* Phil., *Calycera squarrosa* Miers, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers f. *squarrosa* (Miers) Hicken, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers, *Gymnocaulis viridiflorus* Phil.

Hierba. Endémica. 2200-3000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU, TUC). CHL(COQ, VAL, MAU, ARA, RME).

Calycera herbacea Cav. var. **sinuata** (Miers) Pontiroli

Sin.: *Calycera crenata* R.E. Fr., *Calycera intermedia* Phil., *Calycera involucrata* Phil., *Calycera pulvinata* J. Remy f. *cauligera* Hicken, *Calycera sinuata* Miers, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers f. *sinuata* (Miers) Hicken

Hierba. Endémica. 2500-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT).

Calycera horrida Hicken

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(NEU).

Calycera leucanthema (Poepp. ex Less.) Kuntze

Sin.: *Acicarpa lanata* Lag., *Anomocarpus leucanthemus* (Poepp. ex Less.) Miers, *Anomocarpus tenuifolius* Miers, *Anomocarpus tenuis* Miers, *Boopis integrifolia* Phil., *Boopis leucanthema* Poepp. ex Less., *Calycera integrifolia* (Phil.) Reiche, *Calycera lanata* Benth. & Hook. f., *Leucocera annua* Turcz.

Hierba. Endémica. 300-700 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

Calycera pulvinata J. Remy

Sin.: *Anomocarpus pulvinatus* (J. Remy) Miers, *Calycera pulvinata* J. Remy f. *crenata* (R.E. Fr.) Hicken

Hierba. Nativa. 3500-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

Calycera sessiliflora Phil.

Sin.: *Anomocarpus axillaris* Miers, *Anomocarpus subsessiliflorus* Miers, nom. superfl., *Calycera sessiliflora* Phil. var. *axillaris* (Miers) Reiche

Hierba. Endémica. 700-1900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Calycera sympaganthera (Ruiz & Pav.) Kuntze

Sin.: *Boopis balsamitaefolia* Juss., nom. superfl., *Calycera balsamitaefolia* (Juss.) Rich., nom. superfl., *Calycera sympaganthera* (Ruiz & Pav.) Martic. & Quezada, comb. superfl., *Scabiosa sympaganthera* Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 1300 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Gamocarpha DC., emend. S.S. Denham & Pozner**Gamocarpha alpina** (Poepp. ex Less.) H.V. Hansen subsp. **alpina**

Sin.: *Boopis alpina* Poepp. ex Less., *Boopis angustifolia* Phil., *Gamocarpha ligulata* Miers, *Gamocarpha poeppigii* DC. var. *angustifolia* (Phil.) Reiche, *Gamocarpha poeppigii* DC., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Gamocarpha alpina (Poepp. ex Less.) H.V. Hansen subsp. **gilliesii** (Miers) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Boopis breviscapa* Phil., *Boopis gilliesii* (Miers) Hauman, *Gamocarpha breviscapa* Phil., *Gamocarpha gilliesii*

Miers, *Gamocarpha gilliesii* Miers var. *gerthii* Hicken

Hierba. Endémica. 200-2500 m.

Países: ARG(MEN). CHL(TAR, VAL, LBO).

Gamocarpha australis (Decne.) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Acarpha australis* (Decne.) Griseb., *Boopis australis* Decne., *Boopis australis* Decne. var. *hickenii* Pontiroli, *Boopis australis* Decne. var. *leptophylla* (Speg.) Hicken, *Boopis leptophylla* Speg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Gamocarpha caespitosa (Phil.) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Boopis caespitosa* Phil., *Nastanthus caespitosus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus sanjuaninus* (Hieron.) Hieron.

Hierba. Endémica. 500-4300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, MAU).

Gamocarpha chubutensis (Speg.) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Boopis chubutensis* Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU).

Gamocarpha compacta (Phil.) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Boopis compacta* Phil., *Boopis diazi* Phil., *Nastanthus compactus* (Phil.) Miers, *Nastanthus diazi* (Phil.) Phil. ex Reiche

Hierba. Endémica. 3000-3700 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, MAU, RME).

Gamocarpha dentata Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).

Gamocarpha falklandica (D.M. Moore) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Nastanthus falklandicus* D.M. Moore

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(TDF).

Gamocarpha graminea (Phil.) S.S. Denham & Pozner

Sin.: *Boopis graminea* Phil., *Boopis graminea* Phil. var. *bracteata* Reiche

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA).

Gamocarpha macrocephala S.S.

Denham & Pozner

Sin.: *Acarpha laciniata* Stapf,*Nastanthus patagonicus* Speg.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Gamocarpha multicaulis (Phil.) S.S.

Denham & Pozner

Sin.: *Boopis multicaulis* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, ARA).

Gamocarpha polycephala Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO).

Gamocarpha pumila Miers

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU).

Gamocarpha raffaellii (Speg.) S.S.

Denham & Pozner

Sin.: *Boopis raffaellii* Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE).

Gamocarpha scapigera (J. Rémy) S.S.

Denham & Pozner

Sin.: *Boopis araucana* Phil., *Boopis**bellidifolia* Phil., *Boopis dubia* Phil.,*Boopis laciniata* (Miers) Ball, *Boopis**miersii* Phil., *Boopis reichei* Phil., *Boopis**scapigera* J. Remy, *Boopis spathulata*Phil., *Nastanthus araucanus* (Phil.)Reiche, *Nastanthus bellidifolius*(Phil.) Reiche var. *chubutensis* (Speg.)Hicken, *Nastanthus bellidifolius* (Phil.)Reiche, *Nastanthus chubutensis* Speg.,*Nastanthus laciniatus* Miers, *Nastanthus**scapiger* Miers, *Nastanthus scapigerus* (J.Remy) Miers, *Nastanthus spathulatus*(Phil.) Miers var. *bellidifolius* (Phil.)Pontiroli, *Nastanthus spathulatus* (Phil.)Miers var. *spathulatus*

Hierba. Endémica. 500-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, MAG, RME).

Gamocarpha selliana ReicheSin.: *Gamocarpha patagonica* Speg.,*Gamocarpha selliana* Reiche var.*multicaulis* Dusén

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,

TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Gamocarpha ventosa (Meyen) S.S.

Denham & Pozner

Sin.: *Boopis agglomeratus* (Miers)Hauman, comb. illeg., *Boopis breviflora*Phil., *Boopis gayana* Phil., *Boopis**ooaulis* Kuntze, *Boopis sanjuanina*Hieron., *Boopis scapigera* J. Remy var.*ventosa* (Meyen) Wedd., *Boopis ventosa*(Meyen) Kuntze, *Calycera andina* Miers,nom. nud., *Calycera ventosa* Meyen,*Nastanthus agglomeratus* Miers var.*agglomeratus*, *Nastanthus agglomeratus*Miers var. *breviflorus* (Phil.) Reiche,*Nastanthus agglomeratus* Miers var.*gayanus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus**agglomeratus* Miers var. *gilliesii* (Miers)Reiche, *Nastanthus agglomeratus*Miers var. *laciniatus* (Miers) Reiche,*Nastanthus agglomeratus* Miers var.*pinnatifidus* (Miers) Reiche, *Nastanthus**andina* (Miers) H.V. Hansen, nom. inval.,*Nastanthus caespitosus* (Phil.) Reiche var.*ventosus* (Meyen) Pontiroli, *Nastanthus**gayanus* (Phil.) Miers, *Nastanthus gilliesii*Miers, *Nastanthus pinnatifidus* Miers,*Nastanthus ventosus* (Meyen) Miers

Hierba. Endémica. 1500-3200 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).

CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

Moschopsis Phil.**Moschopsis ameghinoi** (Speg.) DusénSin.: *Boopis ameghinoi* Speg.,*Gamocarpha ameghinoi* (Speg.) Speg.,*Moschopsis ameghinoi* (Speg.) Hicken,

comb. superfl.

Hierba. Endémica. 200-500 m.

Países: ARG(SCR).

Moschopsis caleofuensis (Speg.) DusénSin.: *Gamocarpha caleofuensis* Speg.

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Moschopsis leyboldii Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

CHL(RME).

Moschopsis monocephala (Phil.) ReicheSin.: *Boopis monocephala* Phil.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,

SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Moschopsis rosulata (N.E. Br.) DusénSin.: *Acicarpha rosulata* N.E. Br.,*Gamocarpha rosulata* (N.E. Br.) Skottsbr.,*Moschopsis spathulata* Dusén

Hierba. Endémica. 700-2500 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).

CHL(MAG).

Moschopsis subandina (Speg.) DusénSin.: *Gamocarpha subandina* Speg.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(ARA, LRI, LLA).

Moschopsis trilobata Dusén

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

CAMPANULACEAE

Campanula L.**Campanula rapunculoides** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Campanula rotundifolia L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Cyphocarpus Miers**Cyphocarpus innocuus** Sandwith

Hierba. Endémica. 1000 m.

Países: CHL(COQ).

Cyphocarpus psammophilus Ricardi

Hierba. Endémica. 800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Cyphocarpus rigescens MiersSin.: *Cyphocarpus rigescens* Miers f.*glabratus* Phil. ex E. Wimm.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Diastatea Scheidw.**Diastatea micrantha** (Kunth)

McVaugh

Sin.: *Lobelia micrantha* Kunth

Hierba. Nativa. 1100-2000 m.

Países: ARG(JUJ).

Downingia Torr.**Downingia pusilla** (G. Don) Torr.Sin.: *Bolelia humilis* Greene, *Clintonia**pusilla* G. Don, *Downingia humilis*(Greene) Rattan, *Lobelia pusilla* Poepp.*Bolelia pusilla* (G. Don) Greene

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Hippobroma G. Don**Hippobroma longiflora** (L.) G. Don

Sin.: *Isotoma longiflora* (L.) C. Presl, *Laurentia longiflora* (L.) Endl., *Lobelia longiflora* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Legenere McVaugh**Legenere valdiviana** (Phil.) E. Wimm.

Sin.: *Dortmannia valdiviana* (Phil.) Kuntze, *Howellia limosa* Greene, *Howellia valdiviana* (Phil.) E. Wimm., *Legenere limosa* (Greene) McVaugh, *Lobelia valdiviana* (Phil.) Vatke, *Mezleria valdiviana* Phil.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(CHU). CHL(LLA).

Lobelia L.**Lobelia anceps** L. f.

Sin.: *Dortmannia anceps* (L. f.) Kuntze, *Lobelia alata* Labill., *Lobelia rupicola* Bertero ex Colla, *Rapuntium alatum* (Labill.) C. Presl, *Rapuntium anceps* (L. f.) C. Presl

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA). CHL(ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

Lobelia aquatica Cham.

Sin.: *Dortmannia aquatica* (Cham.) Kuntze, *Lobelia bracteolata* Vatke, hom. illeg., *Lobelia domingensis* A. DC., *Rapuntium aquaticum* (Cham.) C. Presl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(CON).

Lobelia bridgesii Hook. & Arn.

Sin.: *Dortmannia blanda* (D. Don) Kuntze, *Dortmannia bridgesii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Dortmannia lucaeana* (C. Presl) Kuntze, *Lobelia blanda* (D. Don) Heynh., *Lobelia lucaeana* (C. Presl) A. DC., *Rapuntium blandum* (D. Don) C. Presl, *Rapuntium bridgesii* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Rapuntium lucaeana* C. Presl, *Tupa blanda* D. Don, *Tupa bridgesii* (Hook. & Arn.) A. DC.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ARA, LLA).

Lobelia camporum Pohl

Sin.: *Dortmannia camporum* (Pohl) Kuntze, *Lobelia camporum* Pohl f. *angustifolia* E. Wimm., *Lobelia camporum* Pohl var. *lundiana* A. DC., *Lobelia paulista* E. Wimm., *Rapuntium camporum* (Pohl) C. Presl

Subarbusto. Nativa. 700-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lobelia exaltata Pohl

Sin.: *Dortmannia exaltata* (Pohl) Kuntze, *Haynaldia exaltata* (Pohl) Kanitz var. *ramosa* Kanitz, *Haynaldia exaltata* (Pohl) Kanitz, *Rapuntium exaltatum* (Pohl) C. Presl

Hierba. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lobelia excelsa Bonpl.

Sin.: *Dortmannia arguta* (Lindl.) Kuntze, *Dortmannia excelsa* (Bonpl.) Kuntze, *Lobelia arguta* Lindl., *Lobelia neriifolia* Moris, *Lobelia salicifolia* Sweet, *Rapuntium excelsum* (Bonpl.) C. Presl, *Tupa arguta* (Lindl.) G. Don, *Tupa glaucescens* Phil., *Tupa kingi* Phil., *Tupa salicifolia* (Sweet) G. Don

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Lobelia fastigiata Kunth

Sin.: *Dortmannia fastigiata* (Kunth) Kuntze, *Dortmannia gardneriana* (Kanitz) Kuntze, *Lobelia gardneriana* Kanitz, *Rapuntium fastigiatum* (Kunth) C. Presl

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN).

Lobelia fervens Thunb.

Hierba. Introducida

Países: BRA(PAR).

Lobelia hassleri Zahlbr.

Subarbusto. Endémica. 200-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA).

Lobelia hederacea Cham. var.

elliptica (Graham) Hook. & Arn.
Sin.: *Lobelia odorata* Graham, *Pratia elliptica* Hook. f., *Pratia hederacea* (Cham.) G. Don var. *elliptica* A. DC., *Pratia odorata* Graham, *Pratia serpyllacea* C. Presl
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, RNE). BRA(RGS, SCA). URY(LAV).

Lobelia hederacea Cham. var. **hederacea**

Sin.: *Pratia hederacea* (Cham.) G. Don
Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA).

Lobelia langeana Dusén

Hierba. Endémica. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Lobelia nana Kunth var.**flagelliformis** Wedd.

Sin.: *Dortmannia cymbalaria* (Griseb.) Kuntze, *Lobelia cymbalaria* Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Lobelia nana Kunth var. **nana**

Sin.: *Dortmannia nana* (Kunth) Kuntze, *Rapuntium nanum* (Kunth) C. Presl

Hierba. Nativa. 1900-2400 m.

Países: ARG(COR, SAL).

Lobelia nummularioides Cham. var. **nummularioides**

Sin.: *Dortmannia nummularioides* (Cham.) Kuntze, *Rapuntium nummularioides* (Cham.) C. Presl
Hierba. Nativa. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA, GUA).

Lobelia nummularioides Cham. var. **prostrata** (Zahlbr.) E. Wimm

Sin.: *Lobelia prostrata* Zahlbr.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAN, GUA).

Lobelia oligophylla (Wedd.) Lammers

Sin.: *Hypsela atacamensis* (Phil.) Benth. & Hook. f., *Hypsela atacamensis* (Phil.) F. Phil., hom. illeg., *Hypsela longiflora* (Hook. f.) Benth. & Hook. f., *Hypsela longiflora* (Hook. f.) F. Phil., *Hypsela oligophylla* (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Zahlbr., *Hypsela reniformis* (Kunth) C. Presl, *Hypsela subsessilis* (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Zahlbr., *Lobelia pratiana* Gaudich. ex Lammers, *Lysipomia reniformis* Kunth, *Pratia atacamensis* Phil., *Pratia longiflora* Hook. f., *Pratia oligophylla* Wedd., *Pratia pencana* Phil., *Pratia repens* Gaudich., *Pratia subsessilis* Wedd., *Viola algida* Humb. & Bonpl. ex Willd., nom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Lobelia paranaensis R. Braga

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Lobelia polyphylla Hook. & Arn.

Sin.: *Dortmannia besseriana* (C. Presl) Kuntze, *Dortmannia bracteosa* (C. Presl) Kuntze, *Dortmannia hyssopifolia* (C. Presl) Kuntze, *Dortmannia polyphylla* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Dortmannia purpurea* (G. Don) Kuntze, *Dortmannia subdentata* (C. Presl) Kuntze, *Lobelia axilliflora* (Phil.) Reiche, *Lobelia hyssopifolia* (C. Presl) Gay, *Lobelia ovata* Reiche, *Lobelia poeppigiana* Kunze ex A. DC., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *bracteosa* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *hyssopifolia* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *linearifolia* (Phil.) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *subdentata* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *angustifolia* (Hook. & Arn. ex A. DC.) Heynh., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *angustifolia* Hook. & Arn. ex A. DC., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *besseriana* (C. Presl) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *bracteosa* (C. Presl) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *coquimbana* (Vatke) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* (A. DC.) Heynh., *Rapuntium besserianum* C. Presl, *Rapuntium bracteosum* C. Presl, *Rapuntium hyssopifolium* C. Presl, *Rapuntium poeppigianum* (Kunze ex A. DC.) C. Presl, *Rapuntium polyphyllum* (Hook. & Arn.) C. Presl var. *angustifolium* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Rapuntium polyphyllum* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Rapuntium purpureum* (G. Don) C. Presl, *Rapuntium subdentatum* C. Presl, *Tupa atropurpurea* Vis., *Tupa axilliflora* Phil., *Tupa besseriana* (C. Presl) A. DC., *Tupa bracteosa* (C. Presl) A. DC., *Tupa coquimbana* Phil., *Tupa gayana* Phil., *Tupa hyssopifolia* (C. Presl) A. DC., *Tupa linearifolia* Phil., *Tupa ovata* Phil., *Tupa poeppigiana* Phil., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *angustifolia* (Hook. & Arn.) A. DC., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *besseriana* (C. Presl) Vatke, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *bracteosa* (C. Presl) Vatke, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *coquimbana* Vatke, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *latifolia* A. DC., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don, *Tupa purpurea* G. Don, *Tupa serrata* Phil., *Tupa subdentata* (C. Presl) A. DC. Arbusto. Endémica. 0-1200 m. Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Lobelia reniformis Cham.

Sin.: *Pratia reniformis* (Cham.) Kanitz, *Rapuntium reniforme* (Cham.) C. Presl Hierba. Endémica. 1000-1200 m. Países: ARG(MIS). BRA(SCA). PRY(Desconocida).

Lobelia stellfeldii R. Braga

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Lobelia tupa L.

Sin.: *Dortmannia berteroi* (A. DC.) Kuntze, *Dortmannia bicalcarata* Kuntze, *Dortmannia mucronata* (Cav.) Kuntze, *Dortmannia philippiana* Kuntze, *Dortmannia tupa* (L.) Kuntze, *Lobelia bicalcarata* (Kuntze) Zahlbr. ex K. Schum., *Lobelia feuillei* (G. Don) Voss, nom. illeg., *Lobelia mucronata* Cav. f. *hookeri* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav. f. *ovalifolia* E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav. var. *berteroi* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav., *Lobelia serrata* Meyen, *Lobelia tupa* L. var. *berteroi* (A. DC.) Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *bicalcarata* (Kuntze) E. Wimm., *Lobelia tupa* L. var. *montana* Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *mucronata* (Cav.) Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *pavonii* E. Wimm., *Rapuntium mucronatum* (Cav.) C. Presl, *Rapuntium tupa* (L.) C. Presl, *Tupa berteroi* A. DC., *Tupa cavanillesiana* G. Don, nom. illeg., *Tupa feuillei* G. Don var. *berteroi* (A. DC.) Vatke, *Tupa feuillei* G. Don var. *macrophylla* Vatke, *Tupa feuillei* G. Don var. *mucronata* (Cav.) Vatke, *Tupa feuillei* G. Don, *Tupa montana* Phil., *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC. var. *hookeri* A. DC., *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC. Arbusto. Endémica. 0-1000 m. Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

Lobelia xalapensis Kunth

Sin.: *Dortmannia cliffortiana* (L.) Kuntze var. *xalapensis* (Kunth) Kuntze, *Dortmannia mollis* (Graham) Kuntze, *Dortmannia monticola* (Kunth) Kuntze, *Dortmannia ocimoides* (Kunze) Kuntze, *Lobelia cliffortiana* L. var. *xalapensis* (Kunth) A. Gray, *Lobelia cliffortiana* L., *Lobelia mollis* Graham, *Lobelia monticola* Kunth, *Lobelia ocimoides* Kunze, *Lobelia palmaris* Willd. ex Roem. & Schult., *Rapuntium monticulum* (Kunth) C. Presl, *Rapuntium xalapense* (Kunth) C. Presl Hierba. Nativa. 0-2000 m. Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Siphocampylus Pohl**Siphocampylus argentinus** (Griseb.)

Hieron. ex E. Wimm var. **argentinus**
Sin.: *Centropogon argentinus* Griseb., *Siphocampylus argentinus* (Griseb.) Hieron. ex E. Wimm var. *cuspidatus* (E. Wimm.) E. Wimm., *Siphocampylus cuspidatus* E. Wimm. Hierba. Nativa. 1000-2000 m. Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Siphocampylus argentinus

(Griseb.) Hieron. ex E. Wimm var. **hirticorollinus** E. Wimm. Hierba. Endémica. 2500 m. Países: ARG(TUC).

Siphocampylus baccae Funez &

Hassemer Hierba. Endémica. 500-900 m. Países: BRA(SCA).

Siphocampylus betulaefolius (Cham.)

G. Don Sin.: *Lobelia betulaefolia* Cham. Subarbusto. Nativa. 500-1400 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Siphocampylus convolvulaceus

(Cham.) G. Don Sin.: *Lobelia convolvulacea* Cham. Arbusto o liana. Nativa. 0-1300 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Siphocampylus densidentatus E. Wimm

Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA)

Siphocampylus duploserratus Pohl

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Siphocampylus fiebrigii E. Wimm.

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m. Países: ARG(JUJ, SAL).

Siphocampylus fimbriatus Regel

Sin.: *Siphocampylus humboldtianum* Hook. Subarbusto. Nativa. 700-1800 m. Países: BRA(PAR, SCA).

- Siphocampylus fluminensis** (Vell.) E. Wimm.
Sin.: *Lobelia fluminensis* Vell.,
Siphocampylus fluminensis (Vell.) E. Wimm. var. *oppositifolius* E. Wimm.
Arbusto o hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **diversifolius** (Hicken) Pontiroli
Sin.: *Siphocampylus tupaeformis*
Zahlbr. var. *diversifolius* Hicken
Subarbusto. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **foliosus**
Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
- Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **glabratus** E. Wimm.
Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(COR).
- Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **lessenii** E. Wimm.
Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR).
- Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **minor** Zahlbr. ex Kuntze
Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR).
- Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **subcanus** Zahlbr. ex E. Wimm.
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).
- Siphocampylus fulgens** Lebas
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Siphocampylus hypopogon** E. Wimm.
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(MIS).
- Siphocampylus longepedunculatus** Pohl
Sin.: *Lobelia pedicellaris* C. Presl,
Lobelia scabra C. Presl, *Siphocampylus scaber* (C. Presl) A. DC.
Arbusto o liana. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Siphocampylus lorentzii** E. Wimm.
Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(COR).
- Siphocampylus lycioides** (Cham.) G. Don
Sin.: *Lobelia lycioides* Cham.
Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR).
- Siphocampylus macropodus** (Thunb.) G. Don
Sin.: *Lobelia macropoda* Thunb.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Siphocampylus nemoralis** Griseb.
Sin.: *Siphocampylus nemoralis* Griseb. var. *grisebachii* E. Wimm., *Siphocampylus nemoralis* Griseb. f. *hieronymi* E. Wimm.
Subarbusto. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Siphocampylus orbignyanus** A. DC.
Sin.: *Siphocampylus volubilis* (Kunth) G. Don
Subarbusto. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Siphocampylus sevegnaniae** Funez & Hassemer
Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).
- Siphocampylus sulphureus** E. Wimm.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Siphocampylus umbellatus** (Kunth) G. Don
Sin.: *Lobelia umbellata* Kunth
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Siphocampylus verticillatus** (Cham.) G. Don
Sin.: *Lobelia verticillata* Cham., *Siphocampylus verticillatus* (Cham.) G. Don var. *grandiflorens* E. Wimm.
Subarbusto. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI). URY(RIV).
- Siphocampylus yerbalensis** E. Wimm.
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(MIS).
- Triodanis** Raf.
Triodanis biflora (Ruiz & Pav.) Greene
Sin.: *Campanula biflora* Ruiz & Pav., *Campanula ludoviciana* Torr. ex A. Gray, nom. nud., *Campanula montevidensis* Spreng., *Dysmicodon californicum* Nutt., *Dysmicodon ovatum* Nutt., *Legousia biflora* (Ruiz & Pav.) Britton, *Pentagonia biflora* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Specularia californica* (Nutt.) Vatke, *Specularia ovata* (Nutt.) Vatke, *Specularia perfoliata* (L.) A. DC. f. *ramosa* Arechav., *Specularia perfoliata* (L.) A. DC. f. *rigida* Arechav., *Specularia perfoliata* (L.) A. DC., *Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. subsp. *biflora* (Ruiz & Pav.) Lammers, *Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. var. *biflora* (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, VAL, BIO, LLA, RME). PRY(APA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SJO, TAC).
- Wahlenbergia** Schrad. ex Roth, nom. cons.
Wahlenbergia berteroi Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(JFE).
- Wahlenbergia calycina** Schlttdl. ex Griseb.
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Wahlenbergia fernandeziana** A. DC.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(JFE).
- Wahlenbergia grahamae** Hemsl.
Subarbusto. Endémica. 400-600 m.
Países: CHL(JFE).
- Wahlenbergia linarioides** (Lam.) A. DC.
Sin.: *Campanula arida* Kunth, *Campanula chilensis* Molina, nom. superfl., *Campanula filiformis* Ruiz & Pav., *Campanula linarioides* Lam., *Wahlenbergia arida* (Kunth) Griseb., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *arida* (Kunth) A. DC., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *micrantha* Phil.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, ÑEE, PAI). URY(MON).

Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.
Sin.: *Campanula marginata* Thunb.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Wahlenbergia masafuerae (Phil.) Skottsb.
Sin.: *Euphorbia masafuerae* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(JFE).

Wahlenbergia peruviana A. Gray
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Wahlenbergia tuberosa Hook. f.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(JFE).

CANELLACEAE

Cinnamodendron Endl.

Cinnamodendron axillare (Nees ex Mart.) Endl. ex Walp.
Sin.: *Canella axillaris* Nees ex Mart.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cinnamodendron dinisii (Schwacke) Ochioni
Sin.: *Capsicodendron dinisii* Schwacke,
Capsicodendron pimenteira Hoehne,
Árbol. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CANNABACEAE

Celtis L.

Celtis brasiliensis (Gardner) Planch.
Sin.: *Celtis boliviensis* Planch., *Celtis flexuosa* (Wedd.) Miq., *Mertensia brasiliensis* Gardner, *Momisia flexuosa* Wedd.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Celtis chichape (Wedd.) Miq.
Sin.: *Celtis pubescens* (Kunth) Spreng. var. *chichape* (Wedd.) Baehni, *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *obtusata* Chodat

& Hassl. *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *chichape* (Wedd.) Planch., *Momisia chichape* Wedd.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, PAI, PHA). URY(MAL).

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
Sin.: *Celtis aculeata* Sw., *Celtis diffusa* Planch., *Celtis glycyarpa* Mart. ex Miq., *Celtis morifolia* Planch., *Celtis pubescens* (Kunth) Spreng., *Celtis spinosa* Spreng., *Celtis spinosissima* (Wedd.) Miq., *Celtis triflora* (Klotzsch) Miq., *Mertensia aculeata* (Wedd.) Schult., *Mertensia iguanaea* (Jacq.) Schult., *Mertensia pubescens* Kunth, *Momisia aculeata* (Sw.) Klotzsch, *Momisia iguanaea* (Jacq.) Rose & Standl., *Momisia pubescens* (Kunth) F.G. Dietr., *Momisia spinosissima* Wedd., *Momisia tarijensis* Wedd., *Momisia triflora* Ruiz ex Klotzsch, *Rhamnus iguanaeus* Jacq.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).

Celtis pallida Torr. var. **discolor** Hunz. & Dottori
Sin.: *Celtis ehrenbergiana* (Klotzsch) Liebm. var. *discolor* (Hunz. & Dottori) L.J. Oakley & D.E. Prado, *Celtis pallida* Torr. subsp. *sericea* (Romanczuk) Romanczuk, *Celtis sericea* Romanczuk, *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *velutina* Herzog
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Celtis pallida Torr. var. **pallida**
Sin.: *Celtis spinosa* Spreng. var. *pallida* (Torr.) M.C. Johnst., *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *subpilosa* Kuntze, *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *pallida* (Torr.) Planch., *Celtis weddelliana* (Planch.) Romanczuk
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, CON, PAI, PHA).

Celtis tala Gillies ex Planch.
Sin.: *Celtis spinosa* Spreng. var. *weddelliana* (Planch.) Baehni, *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *gilliesiana* Planch., *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *weddelliana* Planch., *Momisia integrifolia* Wedd.
Arbusto o árbol. Nativa
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

Humulus L.

Humulus lupulus L.
Enredadera. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Humulus scandens (Lour.) Merr.
Sin.: *Antidesma scandens* Lour., *Humulus japonicus* Siebold & Zucc.
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Trema L.

Trema micrantha (L.) Blume
Sin.: *Celtis micrantha* (L.) Sw., *Rhamnus micranthus* L., *Sponia micrantha* (L.) Decne.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

CANNACEAE

Canna L.

Canna ascendens Ciciarelli
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

Canna glauca L.
Sin.: *Canna glauca* L. var. *angusta* J.W. Richardson, *Canna glauca* L. var. *rubro-lutea* Hook., *Canna hassleriana* Kraenzl., *Canna pedicellata* C. Presl, *Canna stolonifera* A. Dietr.
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON).

Canna indica L.

Sin.: *Canna achiras* Gillies ex Lindl., *Canna amabilis* T. Koyama & Nb. Tanaka, *Canna brasiliensis* Link, *Canna coccinea* Mill., *Canna compacta* Roscoe, *Canna edulis* Ker Gawl., *Canna esculenta* Lodd., nom. nud., *Canna indica* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Canna lanuginosa* Roscoe, *Canna limbata* Roscoe, *Canna plurituberosa* T. Koyama & Nb. Tanaka, *Canna rubricaulis* Link, *Canna speciosa* Roscoe ex Sims, *Canna variegatifolia* Ciciarelli, *Canna warszewiczii* A. Dietr.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RNO, ROC, TAC).

Canna paniculata Ruiz & Pav.

Sin.: *Canna amambayensis* Kraenzl., *Canna confusa* J.W. Richardson & L.B. Sm., nom. illeg., *Canna denudata* Roscoe, *Canna jacquini* Bouché, *Canna kunzei* (Bouché) Kraenzl., *Canna linkii* Bouché, *Canna ottonis* (Bouché) Kraenzl., *Distemon kunzei* Bouché, *Distemon ottonis* Bouché
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Canna pedunculata Sims

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

CAPPARACEAE

Anisocapparis X. Cornejo & H.H. Iltis**Anisocapparis speciosa** (Griseb.) X. Cornejo & H.H. Iltis

Sin.: *Capparis malmeana* Gilg, *Capparis pruinosa* Griseb., *Capparis speciosa* Griseb. f. *malmeana* (Gilg) Hassl., *Capparis speciosa* Griseb. var. *normalis* Kuntze, *Capparis speciosa* Griseb. var. *pruinosa* (Griseb.) Hassl., *Capparis speciosa* Griseb. var. *vera* Hassl., *Capparis speciosa* Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

Atamisquea Miers ex Hook. & Arn.**Atamisquea emarginata** Miers ex Hook. & Arn.

Sin.: *Capparis atamisquea* Kuntze
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(PHA).

Capparicordis H.H. Iltis & X. Cornejo**Capparicordis tweediana** (Eichler) H.H. Iltis & X. Cornejo

Sin.: *Capparis tweediana* Eichler
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, ÑEE, PHA).

Capparidastrum (DC.) Hutch.**Capparidastrum coimbranum** (X.

Cornejo & H.H. Iltis) X. Cornejo & H.H. Iltis
Sin.: *Capparis coimbrana* X. Cornejo & H.H. Iltis
Árbol. Nativa.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Capparidastrum frondosum (Jacq.)

X. Cornejo & H.H. Iltis
Sin.: *Capparis frondosa* Jacq.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Capparidastrum humilis (Hassl.) X. Cornejo & H.H. Iltis

Sin.: *Capparis brasiliensis* DC. var. *puberula* Hieron., nom. nud., *Capparis humilis* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, ITA).

Crateva L.**Crateva tapia** L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Cynophalla (DC.) J. Presl**Cynophalla declinata** (Vell.) H.H. Iltis & X. Cornejo

Sin.: *Capparis declinata* Vell.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl

Sin.: *Capparis cynophallophora* L. var. *cynophallophora*, *Capparis cynophallophora* L. var. *pubescens* Hassl., *Capparis flexuosa* (L.) L. var. *pubescens* (Hassl.) H.H. Iltis, *Capparis flexuosa* (L.) L., *Morisonia flexuosa* L.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Cynophalla polyantha (Triana & Planch.) X. Cornejo & H.H. Iltis

Sin.: *Capparis polyantha* Triana & Planch.
Árbol. Nativa. 1000-1800 m.
Países: ARG(SAL).

Cynophalla retusa (Griseb.) X.

Cornejo & H.H. Iltis
Sin.: *Capparis cynophallophora* L. var. *cuneata* Malme, *Capparis cynophallophora* L. var. *retusa* (Griseb.) Kuntze, *Capparis retusa* Griseb., *Capparis retusa* Griseb. var. *velutina* Hauman
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, ÑEE, NAS, PAI, PHA).

Dactylaena Schrad. ex Schult. f.**Dactylaena pauciflora** Griseb.

Hierba. Nativa. 500-1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).

Sarcotoxicum X. Cornejo & H.H. Iltis**Sarcotoxicum salicifolium** (Griseb.)

X. Cornejo & H.H. Iltis
Sin.: *Capparis salicifolia* Griseb.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE). PRY(APY, BOQ, CHO, NAS, PHA).

CAPRIFOLIACEAE

Centranthus Lam. & DC.**Centranthus ruber** (L.) DC.

Sin.: *Valeriana rubra* L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, JUJ, MEN),
CHL(JFE).

Dipsacus L.**Dipsacus fullonum** L.

Sin.: *Dipsacus fullonum* L. var.
sylvestris (Huds.) Schmalh., *Dipsacus*
sylvestris Huds., *Dipsacus sylvestris* Mill.,
hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI,
RNE, SAL, SJU, SFE). URY(CAS, MON,
ROC, SJO, SOR).

Dipsacus sativus (L.) Honck.

Sin.: *Dipsacus fullonum* L. var. *sativus* L.,
Dipsacus sativus (L.) Garsault, nom. inval.
Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI,
MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

Knautia L.**Knautia arvensis** (L.) Coult.

Sin.: *Scabiosa arvensis* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(NEU).

Knautia integrifolia (L.) Bertol.

Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: CHL(ARA).

Lonicera L.**Lonicera japonica** Thunb. var. **japonica**

Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, NEU,
RNE, SAL). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, FLA,
MAL, MON, PAY, RIV, SJO, SOR, TAC).

Lonicera japonica Thunb. var. **repens**
(Siebold) Rehder

Sin.: *Lonicera brachypoda* DC. var.
repens Siebold
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Scabiosa L., nom. cons.**Scabiosa atropurpurea** L.

Sin.: *Scabiosa maritima* L.
Hierba o subarbusto. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ,
MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(SCA).
CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, JFE). URY(LAV, MON, PAY).

Stangea Graebn.**Stangea paulae** Graebn.

Hierba. Nativa. 4700-5200 m.
Países: CHL(TAR).

Symphoricarpos Duhamel**Symphoricarpos albus** (L.) S.F. Blake

Sin.: *Vaccinium album* L.
Arbusto. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Valeriana L.**Valeriana aequiloba** Clos

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ).

Valeriana atacamensis Borsini

Sin.: *Valeriana pubescens* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Valeriana boelckei Rossow

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, ARA).

Valeriana bornmuelleri Pilg.

Sin.: *Valeriana bornmuelleri* Briq.
Hierba. Endémica. 500 m.
Países: BRA(RGS).

Valeriana borsinii Rossow

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU).

Valeriana bracteosa Phil.

Sin.: *Valeriana rupestris* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-1600 m.
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

Valeriana bridgesii Hook. & Arn.

Sin.: *Valeriana phellocarpa* Phil.,
Valeriana regularis Clos, *Valeriana*
simplex Clos
Hierba. Endémica. 200-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Valeriana calchaquina Borsini

Sin.: *Stangea calchaquina* (Borsini)
Borsini
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Valeriana calvescens Briq.

Sin.: *Valeriana interrupta* Ruiz & Pav.
var. *calcitrapifolia* Griseb.
Hierba. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Valeriana candolleana Gardner

Sin.: *Valeriana scandens* Loefl. ex L.
var. *candolleana* (Gardner) C.A. Muell.
Enredadera. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(SCA). PRY(APA).

Valeriana carnosia Sm.

Sin.: *Valeriana magellanica* Lam.
Hierba. Endémica. 0-2700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA,
LLA, AIS, MAG).

Valeriana castellanosi Borsini

Hierba. Endémica. 4200-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
CHL(ANT).

Valeriana catharinensis Graebn.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Valeriana chamaedryfolia Cham. &
Schltdl.

Sin.: *Valerianopsis chamaedryfolia*
(Cham. & Schltdl.) C.A. Mull.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Valeriana chilensis Borsini

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU).

Valeriana clarionifolia Phil.

Sin.: *Phyllactis clarionifolia* (Phil.)
Speg., *Valeriana sarcophylla* Stuck. &
Briq., *Valeriana spegazzinii* Skottsbo.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR). CHL(MAU, AIS).

Valeriana clematitis Kunth

Enredadera. Nativa. 1500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Valeriana condamoana Graebn.

Sin.: *Valeriana romanana* Graebn.
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUJ).

Valeriana corymbulosa (Wedd.)

Cabrera

Sin.: *Phyllactis corymbulosa* Wedd.,
Valeriana triatomoides Borsini
 Hierba. Nativa. 2500-3500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Valeriana corynodes Borsini

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
 Países: ARG(SJU).

Valeriana crispa Ruiz & Pav.

Sin.: *Astrephia lobata* Hook. & Arn.,
Valeriana excelsa Reiche, *Valeriana floribunda* Phil., *Valeriana lobata* (Hook. & Arn.) Höck, *Valeriana oreocharis* Phil.
 Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
 Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Valeriana descolei Borsini

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
 Países: ARG(MEN, SJU).

Valeriana dinorrhiza (Griseb.) Höck

Sin.: *Phyllactis dinorrhiza* Griseb.
 Hierba. Endémica. 2000-5000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Valeriana effusa Griseb.

Sin.: *Valeriana approximata* Briq.,
Valeriana effusa Griseb. var. *fiebrigii* Briq., *Valeriana effusa* Griseb. var. *genuina* Briq., nom. inval., *Valeriana effusa* Griseb. var. *trifoliata* Griseb.
 Hierba. Nativa. 500-2000 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Valeriana eichleriana (C.A. Muell.)

Graebn.

Sin.: *Valerianopsis eichleriana*
 C.A.Mull.
 Hierba. Endémica. 700-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Valeriana eupatoria Sobral

Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-900 m.
 Países: BRA(RGS).

Valeriana ferax (Griseb.) Höck

Sin.: *Phyllactis ferax* Griseb.
 Hierba. Endémica. 2100-2300 m.
 Países: ARG(COR).

Valeriana fonckii Phil.

Sin.: *Valeriana crenata* Phil., *Valeriana spathulata* Phil., hom. illeg.
 Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
 CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Valeriana fragilis Clos

Sin.: *Betckea heterophylla* Phil.,
Valeriana heterophylla Phil., *Valeriana integrifolia* Phil.
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Valeriana gaimanensis Nagahama

Hierba. Endémica. 100-200 m.
 Países: ARG(CHU).

Valeriana gilgiana Graebn.

Sin.: *Valerianopsis foliosa* C.A.Mull.
 Hierba. Nativa. 500-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Valeriana glechomifolia F.G. Meyer

Hierba. Endémica. 800-1800 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Valeriana graciliceps Clos

Sin.: *Valeriana lutescens* Phil.
 Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Valeriana grandifolia Phil.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
 Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Valeriana hebecarpa DC.

Sin.: *Valeriana columbaria* Phil.
 Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
 Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).

Valeriana hornschurchiana Walp.

Sin.: *Valeriana bustillosii* Phil.,
Valeriana rotundiloba Clos
 Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
 Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Valeriana humahuacensis Borsini

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
 Países: ARG(JUJ).

Valeriana hunzikeri Borsini

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
 Países: ARG(LRI).

Valeriana hyalinorrhiza Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Valeriana iganciana Rabuske &

Külkamp

Hierba. Endémica. 1100-1300 m.
 Países: BRA(SCA).

Valeriana interrupta Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
 Países: CHL(TAR).

Valeriana kurtziana Borsini

Hierba. Endémica. 0-600 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Valeriana lapathifolia Vahl

Sin.: *Valeriana andonaegui* Phil.,
Valeriana cordata Griseb. var. *dentata* Phil., *Valeriana cordata* Griseb.,
Valeriana cordata Phil., hom. illeg.,
Valeriana lindaviana Graebn., *Valeriana parnasifolia* Sandwith
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
 CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Valeriana lasiocarpa Griseb.

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
 Países: ARG(CAT, TUC).

Valeriana laxiflora DC.

Sin.: *Valeriana astrephioides* Höck,
Valeriana foliosa Phil., *Valeriana laxa* Phil., *Valeriana laxiflora* DC. var. *cardaminifolia* Poepp. & Endl., *Valeriana lyrata* Phil., *Valeriana pearcei* Phil.,
Valeriana rupicola Poepp. & Endl.,
Valeriana sparsiflora Clos
 Hierba. Endémica. 100-2000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
 CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Valeriana lepidota Clos

Sin.: *Valeriana colchaguensis* Phil.,
Valeriana maipoana Ravenna
 Hierba. Endémica. 1000-2300 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Valeriana leucocarpa DC.

Sin.: *Valeriana chubutensis* Speg.
 Hierba. Endémica. 900-2000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
 CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, MAG).

Valeriana macrorrhiza DC.

Sin.: *Betckea gilliesii* Hook. & Arn.,
Phyllactis gilliesii (Hook. & Arn.) Wedd.,
Phyllactis macrorrhiza (DC.) Wedd. var. *pumila* Speg., *Phyllactis macrorrhiza* (DC.) Wedd., *Valeriana gilliesii* (Hook. & Arn.) Stuck. & Briq., *Valeriana macrorrhiza* DC. var. *pumila* Speg.
 Hierba. Endémica. 1500-2700 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

Valeriana moyanoi Speg.

Sin.: *Valeriana fonckii* Phil. var. *spiciformis* Dusén, *Valeriana radicalis* Clos var. *patagonica* Hicken
 Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
 CHL(AIS).

Valeriana munozii Borsini

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(MEN).

Valeriana nivalis Wedd.

Sin.: *Valeriana altoandina* Cabrera
Hierba. Nativa. 3600-4800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP,
TAR, ANT, ATA).

Valeriana obtusifolia DC.

Sin.: *Valeriana aegilitis* Phil., *Valeriana araucana* Phil., *Valeriana compacta* Phil., nom. illeg., *Valeriana crassicaulis* Phil., *Valeriana obovata* Clos
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LRI).

Valeriana papilla Bertero ex DC.

Sin.: *Valeriana berterii* Colla, *Valeriana papilla* Bertero ex DC. var. *andicola* Clos
Hierba. Endémica. 200-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Valeriana peltata Clos

Sin.: *Valeriana crispa* Hook. & Arn., hom. illeg., *Valeriana pterocarpa* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Valeriana petersenii Weberling & Reese

Hierba. Nativa. 3000-5000 m.
Países: CHL(AYP).

Valeriana philippiana Briq.

Sin.: *Valeriana pulchella* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

Valeriana polemoniifolia Phil.

Sin.: *Valeriana caudata* Phil., *Valeriana germainii* Briq., *Valeriana pilosa* Phil., hom. illeg., *Valeriana pugae* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Valeriana polybotrya (Griseb.) Höck

Sin.: *Phyllactis polybotria* Griseb.
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Valeriana polystachya Sm.

Sin.: *Valeriana glomerulosa* Briq., *Valerianopsis polystachya* (Sm.) C.A. Mull.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, DFE, RNE, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MON, RIV, SJO).

Valeriana pycnantha A. Gray

Hierba. Nativa. 4000-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Valeriana pyricarpa Borsini

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Valeriana radicalis Clos

Sin.: *Valeriana andina* F. Meigen
Hierba. Endémica. 2000-3400 m.
Países: CHL(RME).

Valeriana reitziana Borsini

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Valeriana ruizlealii Borsini

Hierba. Endémica. 1500-4100 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SAL, SJU).

Valeriana salicariifolia Vahl

Sin.: *Phyllactis salicariaefolia* (Vahl) Speg., *Valerianopsis angustifolia* C.A. Mull., *Valeriana muelleri* Graebn., *Valerianopsis salicariaefolia* (Vahl) C.A. Mull.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CLA, RNO, RIV, SJO).

Valeriana samolifolia Bertero ex Colla

Sin.: *Betckea samolifolia* DC., *Plectritis congesta* (Lindl.) DC., *Plectritis samolifolia* (DC.) Höck var. *pusilla* Speg., *Plectritis samolifolia* (DC.) Höck, *Valerianella samolifolia* (DC.) A. Gray
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Valeriana scandens Loeffl. ex L.

Sin.: *Valeriana bonariensis* Speg.
Enredadera. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CON). URY(COL).

Valeriana sedifolia d'Urv.

Sin.: *Aretiastrium sedifolium* (d'Urv.) Graebn., *Phyllactis magellanica* (Decne.) Speg. var. *azorelloides* Speg., *Phyllactis magellanica* (Decne.) Speg., *Phyllactis sedifolia* (d'Urv.) Wedd., *Valeriana magellanica* Decne. var. *azorelloides* (Speg.) Macloskie, *Valeriana magellanica* Decne., hom. illeg., *Valeriana magellanica* Hombr. & Jacquinot ex Decne, *Valeriana sedoides* Hombr. & Jacq. ex Decne.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Valeriana senecioides Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Valeriana serratifolia J.M. Acosta, L.

Salomón & C.A. Zanotti
Hierba. Endémica. 4500-4600 m.
Países: ARG(SAL).

Valeriana sphaerocarpa Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Valeriana stricta Clos

Sin.: *Valeriana elegans* Clos, *Valeriana glauca* DC., *Valeriana glauca* DC. var. *elegans* (Clos) Reiche
Subarbusto. Endémica. 1000-3300 m.
Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Valeriana stuckertii Briq.

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Valeriana tafiensis Borsini

Sin.: *Valeriana urticaefolia* Kunth var. *coarctata* Griseb.
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Valeriana tajuvensis Sobral

Arbusto. Endémica. 500-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Valeriana tucumana Borsini

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Valeriana tunuyanense E. Méndez

Hierba. Endémica. 3600-3700 m.
Países: ARG(MEN).

Valeriana ulei Graebn.

Sin.: *Phuodendron ulei* (Graebn.) A.W. Hill
Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Valeriana urbanii Phil.

Sin.: *Valeriana grisebachiana* Borsini
Hierba. Endémica. 3500-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Valeriana vaga Clos

Sin.: *Valeriana muriculata* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Valeriana valdiviana Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

Valeriana velutina Clos

Hierba. Endémica. 1500-2200 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Valeriana verticillata Clos

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Valeriana virescens ClosSin.: *Phyllactis regularis* (Clos) Speg., *Valeriana montteana* Phil., *Valeriana virescens* Clos var. *montteana* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Valerianella Mill.**Valerianella eriocarpa** Desv.Sin.: *Valerianella muricata* (Steven ex Roem. & Schult.) W.H.Baxter, *Valerianella truncata* (Rchb.) Betcke

Hierba. Introducida. 200-500 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LRI).

Valerianella locusta (L.) Laterr.Sin.: *Valeriana locusta* L. var. *locusta*, *Valeriana locusta* L. var. *olitoria* L., *Valerianella olitoria* (L.) Pollich

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Valerianella rimosa Bastard

Hierba. Introducida. 300 m.

Países: CHL(ARA).

Valerianella vesicaria MoenchSin.: *Valeriana locusta* L. var. *vesicaria* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Citronella engleriana (Loes.) R.A.

Howard

Sin.: *Villaresia engleriana* Loes.

Arbusto. Nativa. 1300-1800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Citronella gongonha (Mart.) R.A.

Howard

Sin.: *Cassine gongonha* Mart., *Ilex gongonha* (Mart.) D. Don, *Myginda gongonha* (Mart.) DC., *Villaresia cuspidata* Miers, *Villaresia gongonha* (Mart.) Miers

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ROC, TAC, TYT).

Citronella mucronata (Ruiz & Pav.)

D. Don

Sin.: *Patagua chilensis* Poepp. ex Neger, *Villaresia chilensis* Stuntz, *Villaresia gongonha* (Mart.) Miers var. *pungens* (Miers) Engl., *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav. var. *laeta* Miers, *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav., *Villaresia pungens* Miers

Árbol. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Citronella paniculata (Mart.) R.A.

Howard

Sin.: *Citronella paraguariensis* (Hassl.) R.A. Howard, *Leonia paniculata* Mart., *Leretia paniculata* (Mart.) Miq., *Villaresia paniculata* (Mart.) Miers var. *intermedia* Hassl., *Villaresia paniculata* (Mart.) Miers, *Villaresia paraguariensis* Hassl., *Villaresia ramiflora* Miers, *Villaresia virescens* Miers

Árbol. Nativa. 200-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Citronella toledo Hashim.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

CARDIOPTERIDACEAE

Citronella D. Don**Citronella apogon** (Griseb.) R.A.

Howard

Sin.: *Emmotum apogon* Griseb.

Árbol. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(PAR, SCA).

CARICACEAE

Carica L.**Carica chilensis** (Planch. ex A. DC.)

Solms

Sin.: *Papaya chilensis* (Planch. ex A. DC.) Kuntze, *Vasconcellea chilensis* Planch. ex A. DC.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Carica papaya L.Sin.: *Carica jimenezii* (Bertoni)Bertoni, *Carica papaya* L. var. *jimenezii* Bertoni

Arbolito. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, PAI).

Jacaratia A. DC.**Jacaratia corumbensis** KuntzeSin.: *Jacaratia hassleriana* Chodat,*Jacaratia heptaphylla* (Vell.) A.DC. f. *inermis* Kuntze

Arbusto. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.Sin.: *Carica dodecaphylla* Vell., *Carica spinosa* Aubl., *Jacaratia dodecaphylla* (Vell.) A.DC., *Jacaratia dodecaphylla* (Vell.) A.DC. f. *longiflora* Hassl., *Jacaratia dodecaphylla* (Vell.) A.DC. var. *lucida* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Vasconcellea A. St.-Hil.**Vasconcellea glandulosa** Pav. ex A. DC.Sin.: *Carica glandulosa* Pav. ex A.DC., *Carica gossypifolia* Griseb., *Carica triplisecta* Herzog, *Papaya gossypifolia* (Griseb.) Kuntze

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

BRA(Fuera del área del proyecto).

Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil.Sin.: *Carica lanceolata* (A. DC.)Hieron., *Carica quercifolia* (A. St.-Hil.)Hieron., *Papaya lanceolata* (A. DC.)Kuntze, *Papaya quercifolia* (A. St.-Hil.)Kuntze, *Vasconcellea lanceolata* A. DC.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, GUA, PAI, PHA, SPE).

URY(CLA, RIV).

CARYOCARACEAE

Caryocar L.**Caryocar brasiliense** Cambess. subsp. **brasiliense**

Arbolito o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Caryocar brasiliense Cambess. subsp. **intermedium** (Wittm.) Prance & M.F. Silva

Sin.: *Caryocar brasiliense* Cambess. f. *dentata* Chodat & Hassl., *Caryocar intermedium* Wittm.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN).

CARYOPHYLLACEAE

Agrostemma L.**Agrostemma githago** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SJU, TDF). CHL(BIO, ARA). URY(CAS, MON).

Arenaria L.**Arenaria achalensis** Griseb.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).

Arenaria bisulca (Bartl.) Fenzl & Rohrb.

Sin.: *Cherleria bisulca* Bartl.
Hierba. Introducida. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Arenaria catamarcensis Pax

Hierba. Endémica. 800-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

Arenaria digyna D.K.F. Schltldl.

Hierba. Nativa. 500-4200 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Arenaria fastigiata Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Arenaria groenlandica (Retz.) Spreng.

Sin.: *Stellaria groenlandica* Retz.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS).

Arenaria jussiaei Cambess. ex St.-Hil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var. **ensifolia** Rohrb.

Hierba. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var. **lanuginosa**

Sin.: *Arenaria alsinoides* Willd. ex D.K.F. Schltldl., *Arenaria diffusa* Elliot var. *tucumanensis* Griseb., *Arenaria lanuginosa* (Michx.) Rohrb. var. *genuina* Rohrb., nom. inval., *Arenaria lanuginosa* (Michx.) Rohrb. var. *tucumanensis* (Griseb.) Pax, *Arenaria megalantha* (Rohrb.) F. N. Williams var. *tucumanensis* (Griseb.) F. N. Williams, *Spergulastrum lanuginosum* Michx.

Hierba. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS).

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var. **megalantha** Rohrb.

Sin.: *Arenaria megalantha* (Rohrb.) F. N. Williams
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC).

Arenaria oligosperma Naudin

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Arenaria pleurantha Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(LLA, AIS).

Arenaria pycnophylloides Pax

Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

Arenaria rivularis Phil.

Hierba. Endémica. 3200-4700 m.
Países: ARG(JUJ, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Arenaria serpens Kunth

Sin.: *Arenaria andicola* Gillies ex Hook. & Arn. var. *caespitosa* (Phil.) Hauman, *Arenaria andicola* Gillies ex Hook. & Arn. var. *major* Gillies ex Hook. & Arn., *Arenaria andicola* Gillies ex Hook. &

Arn., *Arenaria caespitosa* Phil., nom. illeg., *Arenaria microphylla* Phil., *Arenaria palustris* Naudin var. *humilior* Ces., *Arenaria palustris* Naudin var. *patagonica* (Phil.) Reiche, *Arenaria palustris* Naudin, *Arenaria patagonica* Phil., *Arenaria serpens* Kunth var. *andicola* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb., *Arenaria serpens* Kunth var. *caespitosa* (Phil.) Hauman & Irigoyen, *Arenaria serpens* Kunth var. *microphylla* (Phil.) Speng., *Arenaria serpens* Kunth var. *palustris* (Naudin) Speng., *Arenaria serpens* Kunth var. *patagonica* (Phil.) Speng., *Arenaria serpens* Kunth var. *robusta* Speng., *Arenaria serpens* Kunth var. *serpylloides* (Naudin) Speng., *Arenaria serpylloides* Naudin, *Arenaria serpylloides* Naudin var. *andicola* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

Arenaria serpyllifolia L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE, SCR, SLU). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, MAG, RME). URY(PAY, TAC).

Augustea Iamónico**Augustea coquimbensis** (Gereau & Martic.) Iamónico

Sin.: *Polycarpon coquimbense* Gereau & Martic.
Arbusto. Endémica. 1200-1700 m.
Países: CHL(COQ).

Augustea moreirana (M. Muñoz)

Iamónico & Montesinos
Sin.: *Polycarpon moreiranum* M. Muñoz
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Augustea suffruticosa (Griseb.)

Iamónico
Sin.: *Polycarpon anomalum* Hassl., *Polycarpon australis* Britton, *Polycarpon suffruticosum* Griseb., *Polycarpon suffruticosum* Griseb. var. *virens* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, ÑEE, PHA).

Cardionema DC.

Cardionema andinum (Phil.) A. Nelson & J.F. Macbr.

Sin.: *Pentacaena andina* Phil.
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Cardionema burkartii Subils

Hierba. Nativa. 1500-4600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Cardionema kurtzii Subils

Hierba. Endémica. 1500-2600 m.
Países: ARG(COR, MEN). CHL(COQ).

Cardionema ramosissima (Weinm.)

A. Nelson & J.F. Macbr.
Sin.: *Acanthonychia polycnemoides* (Schltdl.) Rohrb., *Acanthonychia ramosissima* (Weinm.) Rohrb., *Loeflingia ramosissima* Weinm., *Paronychia confertissima* D. Parodi, *Paronychia pauciflora* Larrañaga, *Paronychia polycnemoides* Schltdl., *Paronychia ramosissima* (Weinm.) DC., *Pentacaena polycnemoides* (Schltdl.) Walp., comb. illeg., *Pentacaena polycnemoides* Bartl., *Pentacaena ramosissima* (Weinm.) Hook. & Arn.
Hierba. Nativa. 500-3600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME). PRY(CEN, PAI). URY(MON).

Cardionema rosetta (Cambess.)

A. Nelson & J.F. Macbr.
Sin.: *Acanthonychia ramosissima* (Weinm.) Rohrb. var. *rosetta* (Cambess.) Rohrb., *Paronychia rosetta* Cambess., *Pentacaena rosetta* (Cambess.) Walp.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(COA). URY(CLA).

Cerastium L.

Cerastium argentinum (Pax) F. N. Williams

Sin.: *Cerastium nutans* Raf. var. *argentinum* Pax
Hierba. Endémica.
Países: ARG(COR).

Cerastium arvense L.

Sin.: *Cerastium arvense* L. f. *glandulosum* (Wedd.) Rohrb., *Cerastium arvense* L. var. *fuegianum* Hook. f., *Cerastium arvense* L. var. *montanum* (Naudin) Reiche, *Cerastium arvense* L. var. *nervosum* (Naudin) Reiche, *Cerastium arvense* L. var. *parviflora* Dusén, *Cerastium arvense* L. var. *rigidum* Naudin, *Cerastium arvense* L. var. *verticellare* Naudin, *Cerastium arvense* L. var. *vestitum* Naudin, *Cerastium arvensiforme* Wedd. var. *glandulosum* Wedd., *Cerastium cardiopetalum* Naudin, *Cerastium colsmannii* Lehm. ex Spreng., *Cerastium diazii* Phil., *Cerastium fuegianum* Albov, *Cerastium grahamii* Gillies ex Griseb., *Cerastium lineare* d'Urv., hom. illeg., *Cerastium magellanicum* Phil., *Cerastium mendocinense* Gillies ex Griseb., *Cerastium montanum* Naudin, *Cerastium nervosum* Naudin
Hierba. Introducida. 0-3800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SJU, SLU, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Cerastium commersonianum Ser. ex DC. var. **commersonianum**

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Cerastium commersonianum Ser. ex DC. var. **darwinianum** F. N. Williams

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Cerastium dicotrichum Fenzl ex Rohrb.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, SCA). URY(LAV).

Cerastium fontanum Baumg. subsp. **vulgare** (Hartmann) Greuter & Burdet

Sin.: *Cerastium andinum* Phil., hom. illeg., *Cerastium caespitosum* Gilib., nom. illeg., *Cerastium holosteoides* Fr. f. *glandulosum* (Boenn.) Möschl, *Cerastium holosteoides* Fr., *Cerastium triviale* Link *Cerastium vulgare* Hartmann
Hierba. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Cerastium glomeratum Thuill.

Sin.: *Cerastium catharinense* L.B. Sm. & Downs, *Cerastium obovatum* Larrañaga, *Cerastium viscosum* L., p.p., *Cerastium vulgatum* L.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, MON).

Cerastium hieronymi Pax

Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT).

Cerastium humifusum Cambess.

Sin.: *Cerastium glabrum* Larrañaga, *Cerastium latifolium* L. var. *glabrum* Hook. & Arn., *Cerastium montioides* Naudin
Hierba. Nativa. 0-3800 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, MEN, SJU, SFE). BRA(RGS). CHL(ANT, COQ, VAL, AIS, MAG, RME). URY(CLA).

Cerastium junceum Möschl

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, RNE, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(Desconocida). URY(Desconocida).

Cerastium kunthii Briq.

Sin.: *Cerastium glutinosum* Kunth, nom. illeg.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(JUJ).

Cerastium lanceolatum (Poir.) Volponi

Sin.: *Alsine lanceolata* (Poir.) Macloskie, *Stellaria lanceolata* Poir.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(MAG).

Cerastium mollissimum Poir. var.

lorentzii Pax
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Cerastium mollissimum Poir. var. **mollissimum**

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, SLU).
BRA(RGS). URY(RIV).

Cerastium mucronatum Wedd.

Nativa. 4300-4400 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Cerastium rivulare Cambess.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAN, GUA, ITA, MIE).

Cerastium rivulariastrum Möschl & Pedersen

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN, CEN, GUA, MIE, PAI). URY(MON, SJO).

Cerastium selloi Schltld. ex Rohrb.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS).

Cerastium semidecandrum L.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS, SCA).

Cerastium soratense Rohrb.

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU).

Cerastium tucumanense Pax

Hierba. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Cerastium verecundum Ravenna

Hierba. Endémica. 1700-2000 m.
Países: CHL(RME).

Colobanthus Bartl.**Colobanthus lycopodioides** Griseb.

Sin.: *Colobanthus lechleri* Phil., nom. superfl., *Colobanthus patagonicus* Hieron. ex De Wild., *Colobanthus polycnemoides* Hieron., *Drudea lycopodioides* (Griseb.) Griseb.
Subarbusto. Endémica. 0-2300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(MAG, RME).

Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.

Sin.: *Colobanthus alatus* Pax, *Colobanthus aretioides* Gillies ex Hook. & Arn., *Colobanthus billardieri* Fenzl, *Colobanthus cherlerioides* Hook. f., *Colobanthus crassifolius* (d'Urv.) Hook. f. var. *aretioides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Macloskie, *Colobanthus crassifolius* (d'Urv.) Hook. f., *Colobanthus maclovianus* Gand., *Colobanthus meigeni* Phil., *Colobanthus quitensis* (Kunth) Bartl. var. *alatus* (Pax) Hosseus, *Colobanthus saginoides* Bartl., *Sagina*

crassifolia d'Urv., *Sagina quitensis* Kunth

Hierba. Nativa. 0-3800 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Colobanthus subulatus (d'Urv.) Hook. f.

Sin.: *Colobanthus benthamianus* Fenzl, *Colobanthus subulatus* (d'Urv.) Hook. f. var. *darwinii* Hook. f., *Sagina subulata* d'Urv.
Hierba. Endémica. 0-3700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

Corrigiola L.**Corrigiola crassifolia** Chaudhri

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, RME).

Corrigiola propinqua Gay

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO).

Corrigiola squamosa Hook. & Arn.

var. **latifolia** (Gay) Skottsb.
Sin.: *Corrigiola latifolia* Gay
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Corrigiola squamosa Hook. & Arn.

var. **poepigii** Chaudhri
Sin.: *Corrigiola collina* Poepp., nom. nud., *Corrigiola glomeruliflora* Steud.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Corrigiola squamosa Hook. & Arn.

var. **squamosa**
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Dianthus L.**Dianthus armeria** L.

Hierba. Introducida.
Países: ARG(CHU). CHL(ARA).

Dianthus deltoides L.

Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Drymaria Willd. ex Roem. & Schult.**Drymaria cordata** (L.) Willd. ex Roem. & Schult.

Sin.: *Drymaria cordata* (L.) Willd. ex

Roem. & Schult. var. *pacifica* Mizush., *Holosteum cordatum* L.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT). PRY(CEN, COA, GUA, PAI). URY(ROC).

Drymaria engleriana (Muschl.)

Baehni & J.F. Macbr. var. **devia** (Baehni & J.F. Macbr.) J.A. Duke
Sin.: *Drymaria devia* Baehni & J.F. Macbr.
Hierba. Nativa. 3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Drymaria glandulosa Bartl.

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Drymaria ovata Humb. & Bonpl. ex

Roem. & Schult.
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(TUC).

Drymaria paposana Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Drymaria villosa Cham. & Schltld.

Hierba. Nativa. 1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Herniaria L.**Herniaria austroamericana** Chaudhri & Rutish.

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.
Países: ARG(JUJ).

Herniaria cinerea DC.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(COQ).

Herniaria hirsuta L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SFE).

Holosteum L.**Holosteum umbellatum** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, NEU, RNE).

Lychnis L.**Lychnis coronaria** (L.) Desr.

Sin.: *Agrostemma coronaria* L., *Silene coronaria* (L.) Clairv.
Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(BAI). BRA(SCA). CHL(BIO, ARA).

Microphyes Phil.

Microphyes litoralis Phil.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Microphyes minima (Miers ex Colla) Briq.

Sin.: *Microphyes lanuginosus* Phil.,
Talinum minimum Miers ex Colla
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).

Microphyes robusta Ricardi var.
pallida Ricardi

Hierba. Endémica. 500-900 m.
Países: CHL(ATA).

Microphyes robusta Ricardi var.
robusta

Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Paronychia Mill.

Paronychia brasiliiana DC. var.
brasiliiana

Sin.: *Paronychia bonariensis* DC., nom.
superfl., *Paronychia punctoria* Larrañaga
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS).
URY(MON).

Paronychia brasiliiana DC. var.
pubescens Chaudhri

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI).

Paronychia cabreræ Chaudhri

Hierba. Nativa. 2800-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Paronychia camphorosmoides
Cambess.

Hierba. Nativa. 700-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paronychia chilensis DC. f. **subglabra**
Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, MIS). PRY(SPE).

Paronychia chilensis DC. var. **mutica**
(Phil.) Reiche

Sin.: *Paronychia mutica* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO).

Paronychia chilensis DC. subsp.
chilensis

Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
ERI, LPA, LRI, RNE, SCR, TUC).
BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, RME, JFE).

Paronychia chilensis DC. subsp.
subandina (Phil.) Chaudhri

Sin.: *Paronychia chilensis* DC. var.
subandina (Phil.) Reiche, *Paronychia*
subandina Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Paronychia communis Cambess. var.
chicligastensis Chaudhri

Hierba. Endémica.
Países: ARG(TUC).

Paronychia communis Cambess. var.
communis Cambess.

Sin.: *Paronychia communis* Cambess.
var. *pungentifolia* Chaudhri, *Paronychia*
paranensis Chaudhri
Hierba. Nativa. 600-3200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, PAI).
URY(ART, RNO, RIV, SJO, TAC).

Paronychia coquimbensis Gay var.
appressa (Phil.) Chaudhri

Sin.: *Paronychia appressa* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Paronychia coquimbensis Gay var.
coquimbensis

Sin.: *Paronychia chilensis* DC. var.
coquimbensis (Gay) Reiche
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL).

Paronychia franciscana Eastw.
Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, JFE).

Paronychia hieronymi Pax var.
hieronymi

Sin.: *Paronychia chilensis* DC. var.
hieronymi (Pax) Hosseus
Hierba. Endémica. 2500-4800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Paronychia hieronymi Pax var.
jujuyensis Chaudhri

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Paronychia johnstonii Chaudhri var.
johnstonii

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Paronychia johnstonii Chaudhri var.
scabrida Chaudhri

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Paronychia microphylla Phil.

Subarbusto. Endémica. 2200-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Paronychia muschleri Chaudhri

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(SAL).

Paronychia revoluta C.E. Carneiro &
A. Furlan

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Paronychia setigera (Gillies ex Hook.
& Arn.) F. Herm. subsp. **argillicola**
Pedersen

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Paronychia setigera (Gillies ex Hook.
& Arn.) F. Herm. subsp. **cordobensis**
Chaudhri

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI,
MEN, MIS, SLU, SFE, SDE).

Paronychia setigera (Gillies ex
Hook. & Arn.) F. Herm. var. **longiseta**
Chaudhri

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).
URY(ART).

Paronychia setigera (Gillies ex Hook.
& Arn.) F. Herm. subsp. **setigera**

Sin.: *Herniaria setigera* Gillies ex
Hook. & Arn., *Paronychia andina* Phil.,
nom. illeg., *Paronychia australis* Gillies
ex Hook. & Arn., nom. nud., *Paronychia*
chilensis DC. var. *andina* (Phil.) Reiche,
Paronychia subandina Gand., nom. illeg.
Hierba. Nativa. 200-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ,
LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU,
SCR). BRA(RGS). CHL(VAL, MAU, BIO,
RME). URY(MAL).

Paronychia setigera (Gillies ex
Hook. & Arn.) F. Herm. var. **subglabra**
Chaudhri

Hierba. Endémica.
Países: ARG(COR, MEN).

Petrorhagia (Ser.) Link

Petrorhagia dubia (Raf.) G. López & Romo

Sin.: *Dianthus dubius* Raf., *Petrorhagia velutina* (Guss.) P.W. Ball & Heywood
Hierba. Introducida. 0-1600 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG).

Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball & Heywood

Sin.: *Dianthus nanteuillii* Burnat
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE).

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood

Sin.: *Dianthus prolifer* L.
Hierba. Introducida. 200-600 m.
Países: CHL(LBO, BIO, ARA).

Philippiella Speg.

Philippiella patagonica Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(MAG).

Polycarpaea Lam., nom. cons.

Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.

Sin.: *Achyranthes corymbosa* L., *Polycarpaea brasiliensis* Cambess., *Polycarpaea corymbosa* (L.) Lam. var. *brasiliensis* (Cambess.) Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA).

Polycarpaea hassleriana Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Polycarpon Loeff. ex L.

Polycarpon apurense Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(CEN).

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

Sin.: *Mollugo tetraphylla* L.
Hierba. Introducida. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA).
URY(ROC).

Pycnophyllopsis Skottsbo.

Pycnophyllopsis lanatum (Phil.) M.E. Timaná

Sin.: *Pycnophyllum lanatum* Phil.
Hierba. Endémica. 1500-2600 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Pycnophyllopsis muscosa Skottsbo.

Hierba. Endémica. 900-1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).

Pycnophyllum J. Remy

Pycnophyllum bryoides (Phil.) Rohrb.

Sin.: *Stichophyllum bryoides* Phil.
Hierba. Nativa. 4100-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Pycnophyllum convexum Griseb.

Sin.: *Pycnophyllum argentinum* Pax, *Pycnophyllum mucronulatum* Mattf.
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Pycnophyllum macropetalum Mattf.

Hierba. Nativa. 4000-4800 m.
Países: ARG(SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Pycnophyllum molle J. Remy

Hierba. Nativa. 3500-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Pycnophyllum spathulatum Mattf.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Pycnophyllum tetrastichum J. Remy

Sin.: *Pycnophyllum glomeratum* Mattf.
Hierba. Nativa. 3300-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR).

Reicheella Pax

Reicheella andicola (Phil.) Pax

Sin.: *Bryopsis andicola* Reiche, *Lyallia andicola* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Sabulina Rchb.

Sabulina acutiflora (Fenzl ex Endl.)

Dillenb. & Kadereit

Sin.: *Alsine acutiflora* Fenzl ex Endl., *Alsine minuta* (Naudin) Rohrb., *Arenaria minuta* Naudin, *Minuartia acutiflora* (Fenzl ex Endl.) Mattf., *Minuartia minuta* (Naudin) Roquero
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Sabulina altoandina (Nicola &

Pozner) Dillenb. & Kadereit
Sin.: *Minuartia altoandina* Nicola & Pozner
Hierba. Endémica. 4800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Sagina L.

Sagina apetala Ard. var. **apetala**

Sin.: *Arenaria apetala* Larrañaga, hom. illeg., *Sagina apetala* Ard. var. *imberbis* Fenzl, *Sagina apetala* Ard. var. *urbica* (Phil.) Reiche, *Sagina ciliata* Fr., *Sagina urbica* Phil.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). PRY(SPE). URY(MON).

Sagina apetala Ard. var. **pachyrrhiza**

(Phil.) Reiche
Sin.: *Sagina pachyrrhiza* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).

Sagina apetala Ard. var. **valdiviana**

(Phil.) Reiche
Sin.: *Sagina valdiviana* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Sagina chilensis Naudin ex Gay

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS). BRA(RGS).
CHL(LBO, RME, JFE). URY(MAL).

Sagina humifusa (Cambess.) Fenzl & Rohrb.

Sin.: *Spergula humifusa* Cambess.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). URY(Desconocida).

Sagina procumbens L.

Sin.: *Sagina apetala* Ard. var. *melanopotamica* Speg., *Sagina apetala* Ard. var. *paludosa* Speg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Saponaria L.**Saponaria officinalis L.**

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). URY(CAS, FLA, RNO).

Scleranthus L.**Scleranthus annuus L.**

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA). URY(COL).

Silene L., nom. cons.**Silene andicola** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Melandrium andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb., *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *argentinense* Hosseus, *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *cucubaloides* (Fenzl ex Rohrb.) Hosseus, *Melandrium cucubaloides* Fenzl ex Rohrb., *Lychnis andicola* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rusby
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, BIO, ARA, LLA, MAG).

Silene antarctica (Kuntze) Pedersen

Sin.: *Lychnis antarctica* Kuntze, *Melandrium alpestre* Dusén
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Silene antirrhina L. var. antirrhina

Sin.: *Silene antirrhina* L. f. *albiflora* Chodat & Hassl., *Silene antirrhina* L. var. *pteronera* Ball, *Silene antirrhina* L. f. *roseiflora* Chodat & Hassl., *Silene pteroneura* (Ball) F. N. Williams
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA). URY(MON).

Silene antirrhina L. var. divaricata

Robinson
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: PRY(CEN).

Silene argentina (Pax) Bocquet

Sin.: *Lychnis argentina* Speg., *Melandrium argentinum* Pax
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, SLU).

Silene argentinensis Hauman

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, TUC).

Silene armeria L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(COR, NEU, RNE). BRA(PAR). CHL(BIO, ARA).

Silene bersieri Bocquet

Sin.: *Melandrium hieronymi* Pax, p.p.
Hierba. Endémica. 3200-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Silene chilensis (Naudin) Bocquet

Sin.: *Lychnis chilensis* Naudin, *Lychnis terminalis* Naudin, *Melandrium andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb. var. *nubigenum* (Phil.) Reiche, *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb., *Melandrium koslowskii* Dusén, *Melandrium terminale* (Naudin) Reiche, *Silene nubigena* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

Silene chubutensis (Speg.) Bocquet

Sin.: *Lychnis chubutensis* Speg., *Melandrium chubutense* (Speg.) Speg.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).

Silene cuspidata Pedersen f.

cuspidata
Hierba. Endémica. 800-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ARA).

Silene cuspidata Pedersen f. **inuncta**

Pedersen
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU).

Silene dioica (L.) Clairv.

Sin.: *Lychnis dioica* L., *Melandrium sylvestre* (Schkuhr) Röhl.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, TDF).

Silene echeagarayi (Hieron.) Bocquet

Sin.: *Melandrium echeagarayi* Hieron.
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Silene filifolia (Dusén) Bocquet

Sin.: *Melandrium filifolium* Dusén, *Melandrium magellanicum* (Desr.) Fenzl ex Rohrb. var. *robustum* Hosseus
Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Silene gallica L.

Sin.: *Silene anglica* L., *Silene spatulata* Larrañaga
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LRI, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(LAV, ROC, SJO).

Silene haumanii Bocquet var. **densa**

Bocquet
Hierba. Endémica. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Silene haumanii Bocquet var. **haumanii**

Sin.: *Melandrium friesii* Hauman
Hierba. Endémica. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Silene magellanica (Desr.) Bocquet

Sin.: *Lychnis graminea* Molina, nom. nud., *Lychnis magellanica* Desr., *Melandrium magellanicum* (Desr.) Fenzl ex Rohrb.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Silene mandonii (Rohrb.) Bocquet

Sin.: *Melandrium hieronymi* Pax, p.p., *Melandrium mandonii* Rohrb., *Melandrium rimbachii* Mattf.
Hierba. Nativa. 1500-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Silene margaritae Bocquet

Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT).

Silene maritima With.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Silene melanopotamica Pedersen

subsp. **agrostophylla** Pedersen
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(RNE).

Silene melanopotamica Pedersen subsp. **melanopotamica**

Sin.: *Silene inflata* (Salisb.) Sm. var. *patagonica* Speg., *Silene maritima* With. var. *patagonica* (Speg.) Hauman
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE).

Silene melanopotamica Pedersen subsp. **nivosimontana** Pedersen

Hierba. Endémica. 2500-2800 m.
Países: ARG(MEN).

Silene patagonica (Speg.) Bocquet

Sin.: *Lychnis patagonica* Speg. f. *glabrisucula* H. Ross, *Lychnis patagonica* Speg., *Melandrium densifolium* Dusén, *Melandrium patagonicum* (Speg.) Speg., *Silene densifolia* (Dusén) Bocquet
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(AIS, MAG).

Silene pendula L.

Sin.: *Silene cisplatensis* Cambess.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(MON).

Silene plutonica Naudin

Sin.: *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *plutonicum* (Naudin) Hosseus, *Melandrium plutonicum* (Naudin) Reiche, *Silene glutinosa* Walp., nom. nud.
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(RNE). CHL(LBO, ARA, LLA, RME).

Silene pratensis (Rafn) Godr. & Gren.

Sin.: *Lychnis alba* Mill., *Lychnis pratensis* Rafn, *Melandrium album* (Mill.) Garcke, *Saponaria dioica* Cham. & Schltldl., hom. illeg., *Silene alba* (Mill.) E.H.L. Krause
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SFE).

Silene vulgaris (Moench) Garcke

Sin.: *Behen vulgaris* Moench, nom. illeg., *Silene cucubalus* Wibel, nom. illeg., *Silene inflata* (Salisb.) Sm.
Hierba. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, NEU, RNE). CHL(ARA, RME).

Spergula L.**Spergula arvensis** L.

Sin.: *Spergula vulgaris* Boenn., *Spergularia arvensis* (L.) Cambess.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME). PRY(APY). URY(MON).

Spergula bocconii (Scheele) Pedersen

Sin.: *Alsine bocconii* Scheele, *Arenaria bocconii* Soleirol ex Steud., nom. nud., *Spergularia bocconii* (Scheele) Graebn., *Spergularia bocconii* Foucaud ex Merino, nom. nud.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, SFE). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LRI, MAG, RME, IDE, JFE). URY(ART, MON, SOR).

Spergula calva Pedersen

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE).

Spergula cerviana (Cham. & Schltldl.)

D. Dietr.
Sin.: *Arenaria cerviana* Cham. & Schltldl., *Arenaria polyantha* Phil., *Lepigonum purpureum* Kindb. var. *firmum* Kindb., *Spergularia cerviana* (Cham. & Schltldl.) G. Don, *Spergularia firma* (Kindb.) Rohrb., *Spergularia polyantha* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, MAU, BIO, ARA, RME).

Spergula depauperata (Naudin)

Pedersen
Sin.: *Arenaria depauperata* Naudin, *Lepigonum depauperatum* (Naudin) Kindb., *Lepigonum grandiflorum* Kindb., *Spergularia depauperata* (Naudin) Rohrb. var. *tenella* (Phil.) Hauman & Irigoyen, *Spergularia depauperata* (Naudin) Rohrb., *Spergularia grandiflora* (Kindb.) Rohrb., *Spergularia rengifoii* Phil., *Spergularia tenella* Phil., *Tissa depauperata* (Naudin) Reiche, *Tissa depauperata* (Naudin) Reiche var. *tenella* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 500-3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, RME).

Spergula diandra (Guss.) Murb.

Sin.: *Arenaria diandra* Guss., *Spergularia diandra* (Guss.) Boiss.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(RNE).

Spergula grandis Pers.

Sin.: *Arenaria grandis* (Pers.) Kunth, *Buda grandis* (Pers.) Kuntze, *Lepigonum grande*

(Pers.) Kindb., *Spergularia grandis* (Pers.) Cambess., *Tissa grandis* (Pers.) Britton
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SDE, SFE). BRA(RGS). PRY(PHA). URY(MON, TYT).

Spergula levis (Cambess.) D. Dietr.

Sin.: *Arenaria bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn., *Lepigonum laeve* (Cambess.) Kindb., *Spergularia bonariensis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken, *Spergularia levis* Cambess.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SCR, SFE). BRA(RGS). URY(MON).

Spergula pissisi (Phil.) Volponi

Sin.: *Arenaria pissisi* Phil., *Spergularia pissisi* (Phil.) I.M. Johnst., *Tissa pissisi* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

Spergula platensis (Cambess.)

Shinners var. **balansae** (R. Rossbach) Pedersen
Sin.: *Spergularia platensis* (Cambess.) Fenzl var. *balansae* R. Rossbach
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Spergula platensis (Cambess.)

Shinners var. **platensis**
Sin.: *Alsine platensis* (Cambess.) House, *Balardia platensis* Cambess., *Buda platensis* (Cambess.) Kuntze, *Spergularia angolensis* Phil., *Spergularia platensis* (Cambess.) Fenzl var. *septentrionalis* (Hassl.) Hauman & Irigoyen, *Spergularia platensis* (Cambess.) Fenzl, *Tissa platensis* (Cambess.) Reiche, *Tissa platensis* (Cambess.) Reiche f. *decumbens* Hassl., *Tissa platensis* (Cambess.) Hassl. var. *septentrionalis* (Hassl.) Hassl.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, RNE, SAL, SCR, SFE, TUC). CHL(BIO, ARA, RME). PRY(PHA). URY(ART, MON).

Spergula ramosa (Cambess.) D. Dietr. subsp. **ramosa**

Sin.: *Spergularia ramosa* Cambess., *Spergularia ramosa* Cambess. var. *diffusa* Rossbach
Hierba. Nativa. 0-3200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, PHA). URY(SOR, TAC).

Spergula ramosa (Cambess.) D. Dietr.
subsp. **rossbachiae** Pedersen
Hierba. Endémica. 0-3200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU,
RNE, SCR). URY(MON).

Spergula rubra (L.) D. Dietr.
Sin.: *Arenaria rubra* L., *Spergularia*
campestris (L.) Asch., *Spergularia rubra*
(L.) J. Presl & C. Presl
Hierba. Introducida.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO,
ARA, RME, JFE).

Spergula salina (J. Presl & C. Presl) D. Dietr.
Sin.: *Arenaria rubra* L. var. *marina* L.,
Spergularia salina J. Presl & C. Presl
Hierba. Cosmopolita. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN,
SCR, SFE, TDF).

Spergula villosa Pers.
Sin.: *Arenaria alba villosa* Larrañaga,
Arenaria berteriana Phil., *Lepigonum*
arenarium Kindb., *Lepigonum*
liebmannianum Lange, *Lepigonum*
villosum (Pers.) Fisch. & C.A. Mey.,
Spergularia aprica Phil., *Spergularia*
liebmanniana (Lange) Rohrb., *Spergularia*
remotiflora Steud., *Spergularia villosa*
(Pers.) Cambess. var. *berteroana* (Phil.)
Rohrb., *Spergularia villosa* (Pers.)
Cambess., *Tissa villosa* (Pers.) Britton
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, JUJ, LRI, RNE, SAL,
SJU, SLU, SCR, SFE). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, RME).
URY(MON).

Spergularia (Pers.) J. Presl & C.
Presl

Spergularia aberrans I.M. Johnst.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Spergularia arbuscula (Gay) I.M.
Johnst.
Sin.: *Arenaria lignosa* Phil., *Arenaria*
teretifolia Phil., *Paronychia arbuscula* Gay,
Spergularia fruticosa Phil., *Spergularia lignosa*
(Phil.) Rohrb., *Spergularia teretifolia* (Phil.)
Phil., *Tissa lignosa* (Phil.) Reiche, *Tissa*
teretifolia (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Spergularia confertiflora Steud.
Sin.: *Arenaria rubra* L. var. *polyphylla*
Phil., *Spergularia confertiflora* Steud. var.
polyphylla (Phil.) Skotts., *Spergularia*
polyphylla (Phil.) Rohrb., *Tissa polyphylla*
(Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(IDE, JFE).

Spergularia cremnophila I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Spergularia denticulata (Phil.) Phil.
Sin.: *Arenaria denticulata* Phil., *Tissa*
denticulata (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Spergularia dillenii Lebel
Hierba. Introducida.
Países: CHL(COQ, MAU, RME).

Spergularia fasciculata Phil.
Sin.: *Spergularia stuebellii* (Hieron.)
I.M. Johnst., *Tissa fasciculata* (Phil.)
Reiche, *Tissa stuebellii* Hieron.
Hierba. Nativa. 3000-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Spergularia floribunda (Gay) Rohrb.
Sin.: *Arenaria floribunda* Gay,
Lepigonum floribundum (Gay) Kindb.,
Spergularia coquimbensis Phil., *Tissa*
floribunda (Gay) Reiche
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Spergularia manicata (Skotts.) Kool
& Thulin
Sin.: *Paronychia manicata* Skotts.,
Sanctambrosia manicata Skotts. ex Kuschel
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(IDE).

Spergularia marina (L.) Griseb.
Sin.: *Buda marina* (L.) Dumort.,
Lepigonum marinum Wahlb.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, TDF).
CHL(COQ, VAL, BIO, AIS, MAG, RME).

Spergularia masafuerana Skotts.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(JFE).

Spergularia media (L.) C. Presl ex
Griseb.
Sin.: *Arenaria littoralis* Phil., *Arenaria*
marginata DC., nom. illeg., *Arenaria*

marina (L.) Sm., *Arenaria media* L.,
Lepigonum medium Wahlb., *Spergularia*
macrotheca Heynh.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG,
RME, IDE, JFE).

Spergularia pycnantha R. Rossbach
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Spergularia rupestris Cambess.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(LAV, MAL, SAO, TYT).

Spergularia stenocarpa (Phil.) I.M.
Johnst.
Sin.: *Arenaria stenocarpa* Phil.,
Spergularia borchersi Phil., *Spergularia*
larrañagae Phil., *Tissa borchersi* (Phil.)
Reiche
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Stellaria L.

Stellaria alsine Grimm
Sin.: *Stellaria uliginosa* Murr
Hierba. Introducida.
Países: CHL(AIS, MAG).

Stellaria antoniana Volponi
Hierba. Nativa. 1500-2900 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Stellaria aphanantha Griseb.
Hierba. Endémica. 3400-4300 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Stellaria arvalis Fenzl ex F. Phil.
Sin.: *Stellaria cuspidata* Willd. ex D.K.F.
Schltdl. var. *alsineformis* Naudin
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(TAR, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Stellaria chilensis Pedersen
Sin.: *Stellaria celsa* Ravenna, *Stellaria*
circinata Ravenna, *Stellaria concinna*
Ravenna
Hierba. Nativa. 0-3400 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE).

Stellaria cryptopetala Griseb.
Sin.: *Alsine cherleriae* (Fisch. ex Ser.)
Fenzl var. *andina* Kuntze
Hierba. Endémica. 2500-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Stellaria cuspidata Willd. ex D.K.F. Schltld.
Hierba. Nativa. 600-2600 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL, TUC).

Stellaria debilis d'Urv.
Sin.: *Alsine axillaris* (Phil.) Macloskie, *Alsine chubutensis* (Speg.) Macloskie, *Alsine debile* (d'Urv.) Macloskie, *Stellaria axillaris* Phil., *Stellaria chubutensis* Speg., *Stellaria debilis* d'Urv. var. *condensata* (A. Gray ex Macloskie) Hauman & Irigoyen, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *chubutensis* (Speg.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *magellanica* Phil., *Stellaria stenopetala* Phil. var. *typica* Hauman, nom. inval., *Stellaria stenopetala* Phil., *Stellaria xanthospora* Chodat & Wilczek
Hierba. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ, BIO, MAG).

Stellaria graminea L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Stellaria media (L.) Vill. var. **gymnocalyx** Trautv.
Sin.: *Stellaria glabra* Raunk.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC). PRY(ITA).

Stellaria media (L.) Cirillo var. **media**
Sin.: *Alsine media* L., *Stellaria hiemalis* (Bég.) Raunk., *Stellaria media* (L.) Vill. f. *malachoides* Macloskie, *Stellaria media* (L.) Vill. var. *normalis* Speg., nom. inval.
Hierba. Introducida. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(ROC).

Stellaria pallida (Dumort.) Crepin
Sin.: *Alsine pallida* Dumort., *Stellaria abortiva* Naudin
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, DFE, ERI, RNE). CHL(RME).

Stellaria parva Pedersen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, GUA).

Stellaria parviflora Banks & Sol. ex Hook. f. subsp. **ignis** Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Stellaria pedersenii Volponi
Hierba. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Stellaria serpens Ravenna
Hierba. Endémica. 1200-1500 m.
Países: CHL(RME).

Stellaria weddellii Pedersen
Sin.: *Stellaria cuspidata* Willd. ex D.K.F. Schltld. var. *sessilifolia* Wedd., nom. nud.
Hierba. Nativa. 3100-4500 m.
Países: ARG(JUJ). CHL(TAR).

Stellaria yungasensis (Rusby) Rusby ex Volponi
Sin.: *Alsine yungasensis* Rusby
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(SAL).

Vaccaria Medik.

Vaccaria pyramidata Medik.
Sin.: *Saponaria segetalis* Neck., nom. illeg., *Saponaria vaccaria* L., *Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke ex Asch.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, NEU, RNE, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(PAY).

CELASTRACEAE

Anthodon Ruiz & Pav.

Anthodon decussatum Ruiz & Pav.
Sin.: *Hippocratea decussata* (Ruiz & Pav.) Peyr., *Salacia decussata* (Ruiz & Pav.) G. Don
Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

Celastrus L.

Celastrus liebmannii Standl.
Sin.: *Maytenus racemosa* Reissk.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cheiloclinium Miers

Cheiloclinium serratum (Cambess.) A.C. Sm.
Sin.: *Salacia serrata* Cambess., *Tontelea serrata* (Cambess.) Endl. ex Walp.
Liana. Nativa. 100-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Elachyptera A.C. Sm.

Elachyptera festiva (Miers) A.C. Sm.
Sin.: *Hippocratea festiva* Miers
Liana. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Elachyptera micrantha (Cambess.) A.C. Sm.
Sin.: *Clercia micrantha* (Cambess.) Miers, *Hippocratea micrantha* Cambess.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Hippocratea L.

Hippocratea volubilis L.
Sin.: *Hemiangium excelsum* (Kunth) A.C. Sm., *Hippocratea excelsa* Kunth, *Hippocratea infuscata* Miers
Liana. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, MIE, PHA).

Lepuropetalon Elliott

Lepuropetalon spathulatum Muhl. ex Elliott
Sin.: *Cryptopetalum pussillum* Hook. & Arn., *Lepuropetalon pusillum* (Hook. & Arn.) Gay, *Pyxidantha spathulata* Muhl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(MAL, MON).

Maytenus Molina

Maytenus boaria Molina
Sin.: *Boaria molinae* DC., nom. illeg., *Boaria chilensis* Phil., *Celastrus boaria* (Molina) Baill., *Celastrus maytenus* Willd., nom. illeg., *Celastrus uncinatus* Ruiz & Pav., *Maytenus angustifolia* J. Mattos & N. Mattos, nom. illeg.,

Maytenus boaria Molina var. *angustifolia* Turcz., *Maytenus boaria* Molina var. *latifolia* Reissek, *Maytenus chilensis* DC. var. *angustifolia* DC., nom. illeg., *Maytenus chilensis* DC., nom. illeg., *Maytenus crenulata* C. Presl, *Maytenus uncinata* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Senecia maytenus* Lam., nom. illeg.

Árbol. Nativa. 0-3800 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Maytenus chubutensis (Speg.)

Lourteig, O'Donell & Sleumer
Sin.: *Pernettya chubutensis* Speg.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Maytenus disticha (Hook. f.) Urb.

Sin.: *Crossopetalum distichum* (Hook. f.) Kuntze, *Myginda disticha* Hook. f., *Rhacoma disticha* (Hook. f.) Loes.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 200-1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Maytenus magellanica (Lam.) Hook. f.

Sin.: *Cassine magellanica* Lam., *Celastrus magellanicus* (Lam.) DC., *Maytenus andina* Phil.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Maytenus verticillata (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Celastrus verticillatus* Ruiz & Pav., *Maytenus cuezzoi* Legname
Arbolito o árbol. Nativa. 1500-1800 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Maytenus viscifolia Griseb.

Sin.: *Tricerna viscifolium* (Griseb.) Lundell
Árbol. Endémica. 400-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).

Maytenus vitis-idaea Griseb.

Sin.: *Maytenus lorentzii* Briq., *Maytenus paraguariensis* Briq., *Maytenus paraguariensis* Briq. var. *genuina* Briq., nom. inval., *Maytenus paraguariensis*

Briq. var. *grandifolia* Briq., *Tricerna vitis-idaea* (Griseb.) Lundell
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA). URY(RNO, SOR).

Monteverdia A. Rich.

Monteverdia aquifolia (Mart.) Biral

Sin.: *Maytenus aquifolia* Mart.
Arbusto. Nativa. 100-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Monteverdia cassineformis

(Reissek) Biral
Sin.: *Maytenus cassineformis* Reissek
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(TYT).

Monteverdia dascyclada (Mart.) Biral

Sin.: *Maytenus dasyclados* Mart.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, ROC, TAC, TYT).

Monteverdia evonymoides (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus evonymoides* Reissek, *Maytenus evonymoides* Reissek var. *minarum* Briq., *Maytenus evonymoides* Reissek var. *pyncnodonta* Briq., *Maytenus pseudocasearia* Reissek
Árbol. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Monteverdia floribunda (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus floribunda* Reissek
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Monteverdia glaucescens (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus glaucescens* Reissek
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Monteverdia gonoclada (Mart.) Biral

Sin.: *Maytenus gonoclada* Mart.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Monteverdia ilicifolia (Mart. ex

Reissek) Biral
Sin.: *Celastrus spinifolium* Larrañaga, *Maytenus hassleri* Briq., *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek f. *angustior* Briq., *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek, nom. cons., *Maytenus officinalis*

Mabb., *Maytenus pilcomayensis* Briq.
Arbusto o árbol. Nativa. 100-2200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, CLA, FLA, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

Monteverdia littoralis (R.M.

Carvalho-Okano) Biral
Sin.: *Maytenus littoralis* R.M.
Carvalho-Okano
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).

Monteverdia patens (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus patens* Reissek
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Monteverdia robusta (Reissek) Biral

Sin.: *Maytenus robusta* Reissek
Árbol. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Monteverdia schummaniana (Loes.) Biral

Sin.: *Maytenus rostrata* Handro, *Maytenus schummaniana* Loes.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Monteverdia spinosa (Griseb.) Biral

Sin.: *Celastrus moya* Kuntze, *Gymnosporia boliviana* Loes., *Gymnosporia estableri* Herter, *Gymnosporia spinosa* (Griseb.) Loes. ex Hicken, nom. illeg., *Maytenus scutioides* (Griseb.) Lourteig & O'Donell, *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O'Donell, *Moya boliviana* (Loes.) Loes., *Moya scutioides* Griseb., *Moya spinosa* Griseb.
Arbusto. Nativa. 100-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA).

Monteverdia urbaniana (Loes.) Biral

Sin.: *Maytenus urbaniana* Loes.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Peritassa Miers

Peritassa campestris (Cambess.) A.C. Sm.

Sin.: *Calypso campestris* Cambess., *Salacia campestris* (Cambess.) Walp.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, MIE, SPE).

Peritassa hatschbachii Lombardi

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plenckia Reissek**Plenckia integerrima** Lundell

Sin.: *Viposia integerrima* (Lundell) Lundell
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Plenckia microcarpa Lundell

Sin.: *Austroplenckia microcarpa*
(Lundell) Lundell
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(PAI).

Plenckia populnea Reissek

Sin.: *Austroplenckia populnea* (Reissek)
Lundell
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA, PAI, SPE).

Pristimera Miers**Pristimera celastroides** (Kunth) A.C. Sm.

Sin.: *Clercia tweediana* Miers,
Hippocratea andina (Miers) J.F. Macbr.,
Hippocratea celastroides Kunth,
Hippocratea grisebachii Loes. var.
parvifolia Chodat & Hassl., *Hippocratea*
grisebachii Loes., *Hippocratea tenuiflora*
Mart. ex Peyr. f. *angustifolia* Chodat,
Hippocratea tenuiflora Mart. ex Peyr. var.
grisebachii (Loes.) Hassl., *Hippocratea*
verrucosa Griseb., nom. illeg., *Pristimera*
andina Miers

Liana. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
URY(PAY, RNO, SAO).

Salacia L., nom. cons.**Salacia crassifolia** (Mart. ex Schult.) G. Don

Sin.: *Anthodon crassifolium* Mart. ex Schult.
Arbusto. Nativa. 100-1300 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CAU, CAN, SPE).

Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G. Don

Sin.: *Anthodon ellipticum* Mart. ex Schult.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN,
CON, MIE).

Salacia grandifolia (Mart.) G. Don

Sin.: *Anthodon grandifolius* Mart.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Schaefferia Jacq.**Schaefferia argentinensis** Speg.

Sin.: *Schaefferia diemonis* Herter,
Schaefferia uruguayensis Speg.
Arbusto o árbol. Endémica. 300-2100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON,
GUA, PHA, SPE). URY(ART, RIV, SAO).

Semialarium N. Hallé**Semialarium paniculatum** (Mart. ex

Schult.) N. Hallé
Sin.: *Anthodon paniculatum* Mart. ex
Schult., *Hippocratea paniculata* (Mart. ex
Schult.) Hassl.

Liana. Nativa. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,
CON, COA, PHA, SPE).

Tontelea Miers, nom. cons.**Tontelea micrantha** (Mart. ex Schult.)

A.C. Sm.
Sin.: *Anthodon micranthum* Mart. ex
Schult., *Salacia micrantha* (Mart. ex Schult.)
G. Don, *Tontelea brachypoda* Miers
Arbusto. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,
CAN, CON, SPE).

Tontelea miersii (Peyr.) A.C. Sm.

Sin.: *Salacia miersii* Peyr.
Liana. Nativa. 100-900 m.
Países: BRA(PAR).

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum L.**Ceratophyllum demersum** L.

Sin.: *Ceratophyllum apiculatum*
Cham., *Ceratophyllum aquaticum* H.C.
Watson, *Ceratophyllum chilense* Leyb.,
Ceratophyllum cornutum Rich. ex
Gray, *Ceratophyllum demersum* L. var.
apiculatum (Cham.) Asch., *Ceratophyllum*

demersum L. var. *inermis* Gay ex Raddl.-
Sm., *Ceratophyllum demersum* L. var.
inflatum R.E. Fr., *Ceratophyllum demersum*
L. var. *laeve* Crepin, *Ceratophyllum*
demersum L. var. *oxycanthum* (Cham.) K.
Schum., *Ceratophyllum demersum* L. var.
oxycarpum (Cham.) Kuntze, *Ceratophyllum*
indicum Willd. ex Cham., *Ceratophyllum*
oxyacanthum Cham., *Ceratophyllum*
tricuspidatum Dumort., *Ceratophyllum*
tuberculatum Cham., *Ceratophyllum*
unicorne Dumort., *Ceratophyllum*
verticillatum Roxb., *Ceratophyllum*
vulgare Schleid., nom. illeg.,
Ceratophyllum vulgare Schleid., nom. illeg.
var. *oxyacanthum* (Cham.) Schleid.

Hierba acuática. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
FOR, LRI, RNE, SAL, SFE). BRA(RGS,
SCA). CHL(VAL, BIO, RME). PRY(APY).
URY(CLA, COL, ROC, SJO).

Ceratophyllum muricatum Cham.

subsp. **australe** (Griseb.) Les

Sin.: *Ceratophyllum australe* Griseb.,
Ceratophyllum cristatum Spruce ex K.
Schum., *Ceratophyllum demersum* L.
var. *cristatum* K. Schum., *Ceratophyllum*
echinatum A. Gray, *Ceratophyllum*
floridanum Fassett, *Ceratophyllum*
llerenae Fassett, *Ceratophyllum*
submersum L. var. *echinatum* (A. Gray)
Wilmot-Dear

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(TUC).

CERVANTESIACEAE

Acanthosyris (Eichler) Griseb.**Acanthosyris falcata** Griseb.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR,
JUJ, SAL, SFE, TUC). PRY(APA, APY,
CEN, COA, PHA).

Acanthosyris spinescens (Mart. & Eichler) Griseb.

Sin.: *Acanthosyris platensis* Speg.,
Osyris spinescens Mart. & Eichler
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CAS, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY,
RIV, SAO, SJO).

Jodina Hook. & Arn. ex Meisn.

Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.)
Reissek

Sin.: *Celastrus jodina* Steud., *Celastrus rhombifolius* Hook. & Arn., *Ilex cuneifolia* L. var. *bonariensis* DC., *Jodina bonariensis* Kuntze, *Jodina cuneifolia* Miers, *Jodina ruscifolia* Hook. & Arn.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(Desconocida). URY(CAS, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SAO, TYT).

CHENOPODIACEAE

Allenrolfea Kuntze

Allenrolfea patagonica (Moq.) Kuntze

Sin.: *Halopeplis patagonica* (Moq.) Ung.-Sternb., *Halostachys patagonica* Moq., *Spirostachys patagonica* (Moq.) Benth. & Hook., nom. superfl., *Spirostachys patagonica* (Moq.) Griseb.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU).

Allenrolfea vaginata (Griseb.) Kuntze

Sin.: *Spirostachys vaginata* Griseb.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Atriplex L., nom. cons.

Atriplex ameghinoi Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Atriplex argentina Speg.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Atriplex atacamensis Phil.

Arbusto. Endémica. 200-3000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Atriplex boecheri Aellen

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(MEN).

Atriplex braunii A. Soriano

Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Atriplex chapinii I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(IDE).

Atriplex chilensis Colla

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG).

Atriplex chizae Rosas

Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Atriplex clivicola I.M. Johnst.

Sin.: *Atriplex clivicola* I.M. Johnst. var. *lopholepis* I.M. Johnst., *Obione clivicola* (I.M. Johnst.) Ulbr.
Arbusto. Endémica. 200-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Atriplex coquimbana Phil.

Arbusto. Endémica. 300-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Atriplex cordubensis Gand. & Stuck.
subsp. **cordubensis**

Sin.: *Atriplex hjertingii* Aellen
Subarbusto. Nativa. 200-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Atriplex cordubensis Gand. & Stuck.
subsp. **grandibracteata** Múlgura

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Atriplex costellata Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Atriplex crenatifolia Chodat & Wilczek

Sin.: *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *macrophylla* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, LPA, MEN, NEU, SJU, SLU).

Atriplex eximia A. Soriano

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

Atriplex frigida Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Atriplex glaucescens Phil.

Sin.: *Atriplex polyphylla* Phil.
Arbusto. Endémica. 1300-3700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Atriplex heterosperma Bunge

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SJU).

Atriplex hortensis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU). CHL(COQ, RME).

Atriplex hystrix Phil.

Sin.: *Atriplex mucronata* Phil., *Obione hystrix* (Phil.) Ulbr., *Obione mucronata* (Phil.) Ulbr.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr.
var. **foliolosa** (Phil.) Rosas

Sin.: *Atriplex foliolosum* Phil., *Atriplex sanambrosiana* Sparre
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(IDE).

Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr.
var. **imbricata**

Sin.: *Atriplex axillaris* Phil., nom. illeg., *Atriplex microphylla* Phil., *Atriplex salaris* Phil., *Obione axillaris* (Phil.) Ulbr., *Obione imbricata* Moq.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 3500-3800 m.
Países: ARG(CAT, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, RME).

Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr.

Sin.: *Atriplex ceratophylla* Kuntze, *Atriplex lampa* (Moq.) D. Dietr. f. *latifolia* Hauman, nom. nud., *Obione lampa* Moq.
Subarbusto. Endémica. 800-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC).

Atriplex leuca Phil.

Sin.: *Atriplex densifolia* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Atriplex lithophila A. Soriano ex Múlgura

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU, SLU).

Atriplex madariagae Phil.

Arbusto. Endémica. 200-2700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Atriplex mendozensis Speg.

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(MEN).

Atriplex montevidensis Spreng.

Sin.: *Atriplex grisebachii* Kurtz ex Gand., *Atriplex montevidensis* Spreng. f. *conferta* Hicken, *Obione montevidensis* (Spreng.) Moq.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE). PRY(CEN, PHA). URY(MON, RNO).

Atriplex myriophylla Phil.

Sin.: *Atriplex andina* R.E. Fr., *Atriplex cristata* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *depauperata* Kuntze, *Atriplex cristata* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *pulvinata* Kuntze, *Atriplex herzogii* Standl., *Atriplex lilloi* Hauman, *Atriplex pusilla* Phil., nom. illeg., *Atriplex serpyllifolium* Herzog, *Obione myriophylla* (Phil.) Ulbr., *Obione pusilla* Wedd., nom. nud.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR).

Atriplex nitrophiloides A. Soriano ex

Múlgura

Hierba. Nativa. 2000-3700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Atriplex nummularia Lindl.

Arbusto. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(ANT, COQ).

Atriplex oreophila Phil.

Sin.: *Atriplex chenopodioides* Aellen, hom. illeg., *Atriplex humilis* Phil., hom. illeg., *Atriplex hypsophila* I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3500-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU). CHL(TAR, ATA, COQ).

Atriplex pamparum Griseb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Atriplex patagonica (Moq.) D. Dietr.

Sin.: *Obione patagonica* Moq.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SCR).

Atriplex patula L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, SCR, SFE). CHL(BIO, ARA, LLA, MAG, RME). URY(CAS).

Atriplex peruviana Moq.

Sin.: *Chenopodium cinereum* Moq.

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: CHL(AYP).

Atriplex philippii R.E. Fr.

Sin.: *Atriplex prostratum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: CHL(RME).

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

Sin.: *Atriplex hastata* L. var. *salinum* Green & Godr., *Atriplex patula* L. subsp. *hastata* (L.) H.M. Hall & Clem., *Atriplex patula* L. var. *hastata* (L.) A. Gray, *Atriplex platensis* Speg., *Atriplex triangularis* Willd.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, SJU, SCR, SFE). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(CAS, MON).

Atriplex quixadensis Del Vitto,

Múlgura & Petenatti

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SLU).

Atriplex repanda Phil.

Sin.: *Atriplex angustifolia* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, RME).

Atriplex retusa Gay

Sin.: *Atriplex deserticola* Phil., *Atriplex podocarpa* Phil., *Atriplex transandina* I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

Atriplex rosea L.

Sin.: *Atriplex arenicola* Hauman, *Atriplex arenicola* Hauman var. *albescens* Hauman, *Atriplex spatiosa* A. Nelson

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SDE). CHL(COQ).

Atriplex sagittifolia Speg.

Sin.: *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *heterophylla* Speg., *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *microphylla* Speg., *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *typica* Speg., nom. inval.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR).

Atriplex semibaccata R. Br.

Sin.: *Atriplex semibaccata* R. Br. var. *melanocarpa* Aellen, *Atriplex stuckertii* Gand.

Hierba. Introducida. 500-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Atriplex sorianoi Múlgura

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).

Atriplex spegazzinii A. Soriano ex

Múlgura

Sin.: *Atriplex flavescens* Speg., hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).

Atriplex suberecta I. Verd.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SFE, SDE). CHL(ATA, COQ).

Atriplex taltalensis I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Atriplex tatarica L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SCR). CHL(RME).

Atriplex undulata (Moq.) D. Dietr.

Sin.: *Obione undulata* Moq.

Arbusto. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SLU, SFE).

Atriplex vallenarensis Rosas

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Atriplex vulgatissima Speg.

Sin.: *Atriplex macrostyla* Speg., *Atriplex reichei* Volkens ex Dusén

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Bassia All.**Bassia hyssopifolia** (Pall.) Kuntze

Sin.: *Echinopsilon hyssopifolium* (Pall.) Moq., *Salsola hyssopifolia* Pall.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SJU). CHL(ANT, ATA, VAL, RME).

Bassia scoparia (L.) A.J. Scott

Sin.: *Chenopodium scoparia* L., *Kochia parodii* Aellen var. *contracta* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *densa* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *elongata* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *glabrescens* Aellen, *Kochia parodii* Aellen, *Kochia scoparia* (L.) Schrad., *Kochia scoparia* (L.) Schrad. f. *densa* (Aellen) A. Soriano, *Kochia scoparia* (L.) Schrad. f. *remotiflora* Beck, *Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *densiflora* Moq., *Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *pubescens* Fenzl, *Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *sieversiana* (Pall.) Graebn.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE).

Beta L.**Beta vulgaris** L. subsp. **maritima** (L.)

Arcang.

Sin.: *Beta maritima* L., *Beta vulgaris* L. var. *perennis* L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, RNE).
CHL(ATA, VAL, RME, JFE). URY(CAS, MON).

Beta vulgaris L. subsp. **vulgaris**

Sin.: *Beta vulgaris* L. subsp. *cicla* (L.) Schübl. & G. Martens, *Beta vulgaris* L. var. *cicla* L.

Hierba. Introducida. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SAL, SFE, TUC). CHL(TAR, JFE).

Blitum L.**Blitum nuttallianum** Schult.

Sin.: *Monolepis chenopodioides* Moq., *Monolepis nuttalliana* (Schult.) Green, *Monolepis patagonica* Ulbr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).

Chenopodiastrum S. Fuentes, Uotila & Borsch**Chenopodiastrum murale** (L.) S.

Fuentes, Uotila & Borsch

Sin.: *Chenopodium murale* L.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,

COS, ERI, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, IDE, JFE). URY(MAL, MON, PAY, RNO, SJO).

Chenopodium L.**Chenopodium album** L.

Sin.: *Chenopodium acutifolium* Phil., p.p., *Chenopodium album* L. var. *polymorphum* Aellen, *Chenopodium laxiflorum* Phil., *Chenopodium subaphyllum* Phil.

Hierba. Introducida. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(SPE). URY(COL, MON, PAY, RNO, SJO).

Chenopodium antarcticum (Hook. f.)

Benth. & Hook. f.

Sin.: *Blitum antarcticum* Hook. f., *Chenopodium antarcticum* (Hook. f.)

Speg., comb. superfl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Chenopodium borbasii Murr

Sin.: *Chenopodium zobellii* A. Ludw. & Aellen

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SDE, SJU, TUC).

Chenopodium carnosulum Moq.

Sin.: *Chenopodium fuegianum* Speg.

Hierba. Introducida. 0-4200 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, SAL, SCR, TDF, TUC). CHL(VAL, LLA, AIS, MAG).

Chenopodium cordobense Aellen

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, NEU, SDE, SJU).

Chenopodium cruseoanum Skottsb.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Chenopodium dessicatum A. Nelson

var. **leptophylloides** (Murr) Wahl

Sin.: *Chenopodium leptophyllum* (Nutt. ex Moq.) S. Watson var. *leptophylloides* (Murr) Thell. & Aellen, *Chenopodium*

petiolare Kunth var. *leptophylloides* Murr, *Chenopodium pratericola* Rydb., *Chenopodium pratericola* Rydb. subsp. *eupratericola* Allem, nom. inval., *Chenopodium pratericola* Rydb. var. *leptophylloides* (Murr) Aellen

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SFE, SDE).

Chenopodium ficifolium Sm.

Hierba. Introducida. 0-2700 m.

Países: CHL(VAL, LLA, MAG).

Chenopodium frigidum Phil.

Sin.: *Chenopodium hypsophilum*

Hauman

Hierba. Endémica. 3200-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

Chenopodium giganteum D. Don

Sin.: *Chenopodium amaranticolor* Coste & Reyn.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, MEN).
CHL(VAL, RME).

Chenopodium hircinum Schrad.

subsp. **catamarcense** Aellen

Hierba. Nativa. 500-3500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, TUC).

Chenopodium hircinum Schrad.

subsp. **hircinum**

Sin.: *Chenopodium bonariense* Ten., *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *angustifolium* Aellen, *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *deminutum* Aellen, *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *microphyllum* Thell. ex Parodi, *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *multidentatum* Aellen, *Chenopodium hircinum* Schrad. var. *andinum* Aellen, *Chenopodium hircinum* Schrad. var. *typicum* A. Ludw. & Aellen, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, LRI, LLA, RME).
PRY(COA). URY(MON).

Chenopodium nesodendron Skottsb.

Arbusto. Endémica. 300-500 m.

Países: CHL(JFE).

Chenopodium obscurum Aellen

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR).

Chenopodium pallidicaule Aellen

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Chenopodium papulosum Moq.

Sin.: *Chenopodium papulosum* Moq.
var. *hastatum* Kurtz, *Chenopodium rafaense* Chodat & Wilczek
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, SJU, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL, BIO, LLA).

Chenopodium petiolare Kunth

Sin.: *Chenopodium album* L. var. *andinum* J. Remy, *Chenopodium bolivianum* Murr, p.p., *Chenopodium hastatum* Phil., *Chenopodium paniculatum* Hook. var. *incanum* Murr, *Chenopodium paniculatum* Hook., *Chenopodium petiolare* Kunth f. *hastatum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium petiolare* Kunth f. *incanum* (Murr) Aellen, *Chenopodium petiolare* Kunth f. *scutatum* Aellen, *Chenopodium petiolare* Kunth f. *trilobium* Aellen, *Chenopodium sparsiflorum* Phil.
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Chenopodium philippianum Aellen

Sin.: *Chenopodium carnosulum* Moq. var. *patagonicum* (Phil.) Wahl, *Chenopodium patagonicum* Phil.
Hierba. Nativa. 2000-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Chenopodium pilcomayense Aellen

Hierba. Nativa. 0-5000 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE). PRY(APY, PHA).

Chenopodium purpurascens B. Juss.

ex Jacq.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Chenopodium quinoa Willd. var. **melanospermum** Hunz.

Sin.: *Chenopodium quinoa* Willd. subsp. *milleanum* (Aellen) Aellen
Hierba. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Chenopodium quinoa Willd. var. **quinoa**

Sin.: *Chenopodium canihua* O.F. Cook, *Chenopodium nuttalliae* Saff., *Chenopodium*

quinoa Willd. f. *purpureum* Aellen

Hierba. Nativa. 0-3800 m.
Países: ARG(COR). CHL(TAR, ANT, BIO, LLA).

Chenopodium ruiz-lealii Aellen

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(MEN).

Chenopodium sanctae-clarae Johow

Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(JFE).

Chenopodium sancti-ambrosii

Skottsbo.
Arbusto. Endémica. 300-500 m.
Países: CHL(IDE).

Chenopodium scabricaule Speg.

Sin.: *Chenopodium scabricaule* Speg. f. *megalosperma* Speg., *Chenopodium scabricaule* Speg. f. *pusilla* Speg., *Chenopodium scabricaule* Speg. f. *robusta* Speg.
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).

Chenopodium trifurcatum Phil.

Hierba. Endémica. 300-2900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chenopodium vulvaria L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, TDF).
CHL(TAR, ANT, VAL, LBO, MAU, RME).

Cycloloma Moq.**Cycloloma atriplicifolium** (Spreng.)

Coult.
Sin.: *Cycloloma platyphylla* (Michx.) Moq., *Salsola atriplicifolia* Spreng.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Dysphania R. Br.**Dysphania ambrosioides** (L.)

Mosyakin & Clemants
Sin.: *Ambrina ambrosioides* (L.) Spach, *Ambrina anthelmintica* Spach, *Ambrina incisa* Phil., *Ambrina parvula* Phil., *Chenopodium ambrosioides* L. f. *dentatum* (Fenzl) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *genuinum* (Willk.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *integrifolium* (Fenzl) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L.

f. *pinnatifidum* (Willk.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *rotundantum* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *euambrosioides* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *dentata* Fenzl, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *genuinum* Willk., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *integrifolium* Fenzl, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *pinnatifidum* Willk., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *suffruticosum* (Willd.) Asch. & Graebn., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *typicum* (Speg.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L., *Chenopodium suffruticosum* Willd. subsp. *remotum* Vorosh., *Chenopodium suffruticosum* Willd., *Teloxys ambrosioides* (L.) W.A. Weber

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, IDE, JFE). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA). URY(FLA, MON).

Dysphania bonariensis (Hook. f.)

Mosyakin & Clemants
Sin.: *Chenopodium bonariense* (Hook. f.) Hauman & Irigoyen, comb. illeg., *Chenopodium haumanii* Ulbr., *Roubieva bonariensis* Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). URY(PAY, SAO).

Dysphania burkartii (Aellen)

Mosyakin & Clemants
Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *burkartii* Aellen, *Chenopodium burkartii* (Aellen) Vorosch., *Chenopodium dunosum* L. Simón

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE). PRY(ITA). URY(ART, RIV).

Dysphania carinata (R. Br.) Mosyakin & Clemants

Sin.: *Ambrina carinata* (R. Br.) Moq., *Blitum carinatum* (R. Br.) Moq., *Chenopodium carinatum* R. Br., *Salsola carinata* (R. Br.) Spreng.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC).

Dysphania chilensis (Schrad.)

Mosyakin & Clemants

Sin.: *Ambrina andicola* Phil., *Ambrina chilensis* (Schrad.) Spach, *Ambrina denudata* Phil., *Chenopodium ambrosioides* L. f. *angustatum* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *angustifolium* (Moq.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *normale* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *chilense* (Schrad.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *andicola* (Phil.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *chilense* (Schrad.) Speg., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *denudatum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *euchilense* Aellen, *Chenopodium anthelminticum* L. var. *chilense* (Schrad.) Griseb., *Chenopodium chilense* Schrad. var. *angustifolium* Moq., *Chenopodium chilense* Schrad., *Chenopodium soolanum* Aellen, *Chenopodium vagans* Standl.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, RME).

Dysphania mandonii (S. Watson)

Mosyakin & Clemants

Sin.: *Chenopodium foetidum* Schrad. f. *pumilum* Kurtz ex R.E. Fr., *Chenopodium graveolens* Willd. f. *pumilum* (R.E. Fr.) Aellen, *Chenopodium graveolens* Willd. var. *bangii* (Murr) Aellen, *Chenopodium incisum* Poir. var. *bangii* Murr, *Chenopodium mandonii* (S. Watson) Aellen, *Chenopodium rigidum* Lingelsh., *Teloxys mandonii* S. Watson

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(VAL).

Dysphania microcarpa (Phil.)

Mosyakin & Clemants

Sin.: *Chenopodium microcarpum* (Phil.) A. Troncoso, *Chenopodium multifidum* L. var. *microcarpum* (Phil.) Reiche, *Chenopodium zoellneri* Aellen, *Roubieva microcarpa* Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL, RME).

Dysphania multifida L.

Sin.: *Ambrina pinnatisecta* Spach, *Chenopodium citriondorum* Steud., *Chenopodium multifidum* L. f. *intermedium* Aellen, *Chenopodium multifidum* L. f. *latisectum* Bontea &

Aellen, *Chenopodium multifidum* L. f. *spatulatum* Aellen, *Chenopodium multifidum* L. f. *typicum* Aellen, nom. inval., *Chenopodium multifidum* L., *Herniaria payco* Molina, *Roubieva multifida* (L.) Moq., *Teloxys multifida* (L.) W.A. Weber

Hierba. Introducida. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(PAY, ROC).

Dysphania oblanceolata (Speg.)

Mosyakin & Clemants

Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L. var. *oblanceolata* Speg., *Chenopodium oblanceolatum* (Speg.) Giusti

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF).

Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin

& Clemants

Sin.: *Chenopodium pumilio* R. Br. Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MIS, SDE, TUC). BRA(SCA). PRY(APA).

Dysphania retusa (Juss. ex Moq.)

Mosyakin & Clemants

Sin.: *Ambrina obovata* Moq., *Ambrina retusa* Moq., *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *retusum* (Moq.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *obovata* (Moq.) Speg., *Chenopodium obovatum* (Moq.) Moq., *Chenopodium retusum* (Moq.) Moq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA). BRA(RGS). URY(COL, ROC).

Dysphania venturii (Aellen) Mosyakin

& Clemants

Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *venturii* Aellen, *Chenopodium venturii* (Aellen) Cabrera, comb. superfl., *Chenopodium venturii* (Aellen) Aellen ex Vorosh.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Heterostachys Ung.-Sternb.

Heterostachys olivascens (Speg.)

Molfino

Sin.: *Spirostachys olivascens* Speg. Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MEN, RNE).

Heterostachys Ritteriana (Moq.)

Ung.-Sternb.

Sin.: *Halocnemum Ritterianum* Moq., *Halopeplis Gilliesii* Griseb., *Halostachys Ritteriana* (Moq.) Moq., *Spirostachys Ritteriana* (Moq.) Ung.-Sternb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). PRY(APY, PHA).

Holmbergia Hicken

Holmbergia tweedii (Moq.) Speg.

Sin.: *Chenopodium exocarpum* Griseb., *Chenopodium stuckertii* Gand., *Chenopodium tweedii* Moq., *Holmbergia exocarpa* (Griseb.) Hicken

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, APA, PHA). URY(RNO, SOR).

Maireana Moq.

Maireana brevifolia (R. Br.) Paul G. Wilson

Sin.: *Enchylaena tamariscina* (Lindl.) Druce, *Kochia brevifolia* R. Br., *Kochia tamariscina* (Lindl.) J.M. Black, *Kochia thymifolia* Lindl., *Salsola brachyphylla* Spreng., *Suaeda felicianae* A. Hoffm. & Teillier, *Suaeda tamariscina* Lindl.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, IDE).

Nitrophila S. Watson

Nitrophila atacamensis (Phil.)

Hieron. ex Ulbr.

Sin.: *Glaux atacamensis* Phil. Hierba. Endémica. 2300-4000 m.
Países: CHL(ANT).

Nitrophila australis Chodat & Wilczek var. **australis**

Sin.: *Glaux densiflora* Phil., *Glaux mucronata* Phil., *Nitrophila densiflora* (Phil.) Ulbr., *Nitrophila mucronata* (Phil.) Ulbr.

Hierba. Endémica. 0-3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU).

Nitrophila australis Chodat & Wilczek var. **kuntzei** (Ulbr.) A. Soriano

Sin.: *Nitrophila kuntzei* Ulbr. Hierba. Endémica.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Oxybasis Kar. & Kir.

Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Sin.: *Chenopodium ambiguum* R. Br., *Chenopodium glaucum* L., *Chenopodium glaucum* L. f. *paschale* Fuentes, *Chenopodium glaucum* L. subsp. *ambiguum* (R. Br.) Murr & Thell.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COR, SDE, TDF).
CHL(VAL, LLA, AIS, MAG, IPA).

Oxybasis macrosperma (Hook. f.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Sin.: *Blitum rubrum* (L.) C.A.Mey. var. *crassicaule* Moq., *Blitum rubrum* (L.) C.A.Mey. var. *macrosperma* (Hook. f.) Speg., *Blitum salsum* Phil., *Chenopodium farinosum* (S. Watson) Standl., *Chenopodium halophilum* Phil., *Chenopodium macrospermum* Hook. f. f. *subviride* Thell., *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *crassicaule* (Moq.) Aellen, *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *halophilum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *macrospermum*, *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *salsum* (Phil.) A. Troncoso, *Chenopodium macrospermum* Hook. f. var. *halophilum* (Phil.) Standl., *Chenopodium murale* L. var. *farinosum* S. Watson

Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF). CHL(ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, RME). PRY(PHA). URY(CAS, MON, SJO).

Oxybasis parodii (Aellen) Mosyakin & de Lange

Sin.: *Blitum rubrum* (L.) C.A.Mey. var. *hypoleucum* Speg., *Chenopodium glaucum* L. subsp. *parodii* (Aellen) Aellen, *Chenopodium parodii* Aellen

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Oxybasis urbana (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Sin.: *Chenopodium urbicum* L.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(JFE).

Salsola L.

Salsola kali L. var. **hirsuta** Hornem.

Sin.: *Salsola kali* L. f. *hirsuta* (Hornem.) Asch. & Graebn.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, NEU, RNE).

Salsola kali L. var. **kali**

Hierba. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MAL).

Salsola kali L. var. **tragus** (L.) Moq.

Sin.: *Salsola tragus* L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, MEN).

Salsola soda L. var. **pumila** Albert

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Salsola soda L. var. **soda**

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Sarcocornia A.J. Scott

Sarcocornia ambigua (Michx.) M.A.

Alonso & M.B. Crespo
Sin.: *Salicornia ambigua* Michx., *Salicornia gaudichaudiana* Moq.
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). URY(ROC).

Sarcocornia andina (Phil.) Freitag,

M.A. Alonso & M.B. Crespo
Sin.: *Salicornia andina* Phil.
Arbusto. Nativa. 2300-4200 m.
Países: ARG(SAL). CHL(ANT).

Sarcocornia magellanica (Phil.) M.A.

Alonso & M.B. Crespo
Sin.: *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp. f. *procumbens* Speg., *Salicornia magellanica* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Sarcocornia neei (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo

Sin.: *Salicornia bergii* Lorentz & Niederl., *Salicornia copiapina* Phil., *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp. f. *typica* Speg., nom. inval., *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp. var. *nachtigallii* Niederl., *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp., *Salicornia doeringii* Lorentz & Niederl., *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *andina* (Phil.) Gunckel, *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *corticosa* (Meyen) Gunckel, *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Speg., *Salicornia fruticosa* (L.) L. var.

macrostachya Speg., *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *peruviana* (Kunth) Ung.-Sternb., *Salicornia neei* Lag., *Salicornia peruviana* Kunth var. *andina* (Phil.) Reiche, *Salicornia peruviana* Kunth var. *corticosa* (Meyen) Reiche, *Salicornia peruviana* Kunth var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Reiche, *Salicornia peruviana* Kunth, *Salsola corticosa* Meyen, *Suaeda corticosa* Meyen

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, MEN, RNE, SJU, SFE, SDE, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE).

Sarcocornia pulvinata (R.E. Fr.) A.J. Scott

Sin.: *Salicornia pulvinata* R.E. Fr.
Hierba. Nativa. 3600-4200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR, ANT).

Suaeda Forssk. ex J.F. Gmel.

Suaeda altissima (L.) Pall.

Sin.: *Chenopodium altissimum* L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(RNE).

Suaeda argentinensis A. Soriano

Sin.: *Suaeda fruticosa* (L.) Forssk. var. *brachyphylla* (Speg.) Reiche, *Lerchea fruticosa* (L.) Moench var. *brachyphylla* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

Suaeda densiflora A. Soriano ex Giusti

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(RNE).

Suaeda divaricata Moq.

Sin.: *Lerchea divaricata* (Moq.) Speg., *Salsola mendocinensis* Gillies ex Moq.
Arbusto. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Suaeda foliosa Moq.

Sin.: *Suaeda brevifolia* Phil., *Suaeda divaricata* Moq. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Standl., *Suaeda parvifolia* Phil., *Suaeda tenuifolia* Phil.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Suaeda fruticosa Forssk. ex J.F. Gmel.
Sin.: *Chenopodium fruticosum* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Suaeda multiflora Phil.
Arbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ATA).

Suaeda nesophila I.M. Johnst.
Sin.: *Suaeda divaricata* Moq. var. *microphylla* F. Phil.
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(IDE).

Suaeda neuquenensis M.A. Alonso,
Conticello & Cerazo
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: ARG(NEU).

Suaeda patagonica Speg.
Sin.: *Lerchea patagonica* (Speg.) Speg.,
Suaeda patagonica Speg. var. *crassiuscula*
A. Soriano
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR,
ERI, LPA, MEN, RNE, SCR, SFE).
CHL(MAG).

CHRYSOBALANACEAE

Couepia Aubl.

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.)
Benth. ex Hook. f.
Sin.: *Couepia formosana* Taub., *Couepia*
suberosa Pilg., *Moquilea grandiflora* Mart.
& Zucc.
Árbol. Nativa. 300-1400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

Couepia uiti (Mart. & Zucc.) Benth. ex
Hook. f.
Sin.: *Couepia paraguariensis* Hassl.,
Moquilea uiti Mart. & Zucc.
Árbol. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CON).

Hirtella L.

Hirtella burchellii Britton
Sin.: *Hirtella sprucei* Benth. ex Hook. f.
subsp. *meridionalis* Hassl.
Árbol. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Hirtella hebeclada Moric. ex DC.
Sin.: *Hirtella gardneri* Benth., *Hirtella*
selloana Hook. f., *Hirtella tomentella*
Schott
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Parinari Aubl.

Parinari obtusifolia Hook. f.
Arbusto. Nativa. 200-1200 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(Desconocida).

CISTACEAE

Crocanthemum Spach

Crocanthemum brasiliense (Lam.)
Spach
Sin.: *Cistus brasiliensis* Lam.,
Halimium brasiliense (Lam.) Grosser,
Helianthemum brasiliense (Lam.) Pers.,
Helianthemum polygalaefolium Sweet,
Hudsonia australis Spreng.
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
MIS, SAL, SJU). BRA(RGS, SCA).
URY(PAY, SJO).

CLEOMACEAE

Cleome L.

Cleome chilensis DC.
Sin.: *Cleome chilensis* DC. var.
pubescens DC.
Hierba. Nativa. 300-700 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Cleome chodatiana H.H. Iltis
Sin.: *Physostemon hasslerianum* Chodat
Hierba o arbusto. Endémica. 400-600 m.
Países: PRY(CAU, SPE).

Cleome lanceolata (Mart. & Zucc.)
H.H. Iltis var. **paraguarensis** H.H. Iltis
Hierba. Nativa. 100-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, PHA).

Cleoserrata H.H. Iltis

Cleoserrata paludosa (Willd. ex Eichler)
H.H. Iltis ex Soares Neto & Roalson
Sin.: *Cleome paludosa* Willd. ex Eichler,
Cleome paludosa Willd. ex Eichler var.
brevipes Hauman, *Cleome paludosa* Willd.
ex Eichler var. *major* Chodat & Hassl.,
Cleome serrata Jacq. subsp. *paludosa*
(Willd. ex Eichler) H.H. Iltis1
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL,
SFE). BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, BOQ, CON, ÑEE, PHA).

Melidiscus Raf.

Melidiscus giganteus (L.) Raf.
Sin.: *Cleome friesii* Heilborn, *Cleome*
gigantea, *Cleome viridiflora* Schreb.
Arbusto. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
GUA, PAI).

Tarenaya Raf.

Tarenaya aculeata (L.) Soares Neto &
Roalson
Sin.: *Cleome aculeata* L., *Hemiscola*
aculeata (L.) Raf.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(Fuera del área
del proyecto). PRY(CEN, CON, COA,
ITA, PAI).

Tarenaya bicolor (Gardner) Soares
Neto & Roalson
Sin.: *Cleome bicolor* Gardner
Hierba o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tarenaya cordobensis (Eichler ex
Griseb.) Arana & Oggero
Sin.: *Cleome aculeata* L. var.
cordobensis (Eichler & Griseb.) Kuntze,
Cleome cordobensis Eichler ex Griseb.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ,
LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Tarenaya crenopetala (A. DC.) Soares
Neto & Roalson
Sin.: *Cleome crenopetala* A. DC.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Tarenaya eosina (J.F. Macbr.) Soares Neto & Roalson
Sin.: *Cleome eosina* J.F. Macbr., *Cleome microcarpa* Hassl., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CHO, CON, PHA).

Tarenaya guaranitica (Chodat & Hassl.) Soares Neto & Roalson
Sin.: *Cleome guaranitica* (Chodat & Hassl.) Briq., *Cleome rosea* Vahl ex DC. var. *guaranitica* Chodat & Hassl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Tarenaya hassleriana (Chodat) H.H. Iltis
Sin.: *Cleome hassleriana* Chodat, *Cleome houtteana* Schltdl.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, ITA, PHA, SPE).

Tarenaya inermis (Malme) Soares Neto & Roalson
Sin.: *Cleome inermis* Malme
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Tarenaya lilloi (S.A. Gómez) Arana & Oggero
Sin.: *Cleome lilloi* S.A. Gómez
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY).

Tarenaya parviflora (Kunth) H.H. Iltis
Sin.: *Cleome brasiliensis* Weinm., *Cleome parviflora* Kunth, *Cleome parviflora* Kunth subsp. *psoraleaefolia* (DC.) H.H. Iltis, comb. illeg., *Cleome psoraleaefolia* DC., *Cleome villosa* Gardner
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, GUA, SPE). URY(ART, SAO).

Tarenaya rosea (Vahl ex DC.) Soares Neto & Roalson
Sin.: *Cleome rosea* Vahl ex DC.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA).

Tarenaya titubans (Speg.) Soares Neto & Roalson
Sin.: *Cleome montevidense* Arechav., *Cleome titubans* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CLA, MON, ROC, SJO).

Tarenaya trachycarpa (Klotzsch ex Eichler) Soares Neto & Roalson
Sin.: *Cleome psoraleaefolia* DC. var. *trachycarpa* (Klotzsch ex Eichler) Kuntze, *Cleome trachycarpa* Klotzsch ex Eichler
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, CON, PHA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO).

Tarenaya tucumanensis (H.H. Iltis) Arana & Oggero
Sin.: *Cleome flexuosa* Griseb., nom. illeg., *Cleome tucumanensis* H.H. Iltis
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

CLETHRACEAE

Clethra L.

Clethra scabra Pers. var. **laevigata** (Meisn.) Sleumer
Sin.: *Clethra gardneri* Turcz., *Clethra laevigata* Meisn.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Clethra scabra Pers. var. **scabra**
Sin.: *Clethra brasiliensis* Cham., *Clethra maromensis* Villa
Árbol. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).

Clethra scabra Pers. var. **venosa** (Meisn.) Sleumer
Sin.: *Clethra brasiliensis* Cham. var. *venosa* Meisn.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Clethra uleana Sleumer
Arbusto o árbol. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

CLUSIACEAE

Calophyllum L.

Calophyllum brasiliense Cambess.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, ITA).

Clusia L.

Clusia criuva Cambess. subsp. **criuva**
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Clusia criuva Cambess. subsp. **parviflora** (Saldanha ex Engl.) Vesque
Sin.: *Clusia parviflora* Saldanha ex Engl.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Garcinia L.

Garcinia brasiliensis Mart.
Sin.: *Rheedia brasiliensis* (Mart.) Planch. & Triana
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA, PAI).

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi
Sin.: *Rheedia gardneriana* Planch. & Triana
Árbol. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).

Garcinia guacopary (S. Moore) M. Nee
Sin.: *Rheedia achachairu* Rusby, *Rheedia guacopary* S. Moore
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, MIS).

Kielmeyera Mart.

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.
Arbusto o árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc. var. **paranaensis** (Saddi) Bittrich
Sin.: *Kielmeyera paranaensis* Saddi
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc. var. **stenophylla** Saddi
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc. var. **variabilis**
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Tovomitopsis Planch. & Triana

Tovomitopsis paniculata (Spreng.) Planch. & Triana
Sin.: *Bertolonia paniculata* Spreng.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

COLUMELLIACEAE

Desfontainia Ruiz & Pav.

Desfontainia fulgens D. Don

Sin.: *Desfontainia chilensis* Gay, *Desfontainia novemdentata* Gand., *Desfontainia ilicifolia* Phil., *Desfontainia hookeri* Dunal, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *chilensis* (Gay) Reiche, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *hookeri* (Dunal) Reiche

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

COMBRETACEAE

Buchenavia Eichler

Buchenavia kleinii Exell

Sin.: *Buchenavia igaratensis* N.F. Mattos, *Terminalia kleinii* (Exell) Gere & Boatwr.

Árbol. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Combretum Loefl., nom. cons.

Combretum duarceanum Cambess.

Sin.: *Combretum anfractuosum* Mart. var. *macrostachyum* Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON).

Combretum fruticosum (Loefl.)

Stuntz

Sin.: *Combretum micropetalum* DC., *Combretum occidentale* L., nom. illeg., *Combretum secundum* Jacq., *Gaura fruticosa* Loefl.

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(RNO, SAO).

Combretum lanceolatum Pohl ex

Eichler

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, PHA, SPE).

Combretum laxum Jacq.

Sin.: *Combretum bugi* Cambess., *Combretum jacquinii* Griseb., nom. illeg., *Combretum mexicanum* Humb. & Bonpl., *Combretum mexicanum* Humb. & Bonpl. var. *obovatum* DC., *Combretum variabile* Mart.

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CEN, CON, PAI, SPE).

Combretum leprosum Mart.

Sin.: *Combretum hasslerianum* Chodat
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Combretum mellifluum Eichler

Sin.: *Combretum mellifluum* Eichler var. *cuspidatum* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Conocarpus L.

Conocarpus erectus L.

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

Laguncularia C.F. Gaertn.

Laguncularia racemosa (L.) C.F.

Gaertn.

Sin.: *Conocarpus racemosa* L.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Terminalia L., nom. cons.

Terminalia argentea Mart.

Sin.: *Myrobalanus argentea* (Mart.) Kuntze, *Myrobalanus biscutella* (Eichler) Kuntze, *Terminalia biscutella* Eichler, *Terminalia modesta* Eichler, hom. illeg., *Terminalia sericea* Cambess.

Arbusto o arbolito. Endémica. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Terminalia australis Cambess.

Sin.: *Myrobalanus australis*

(Cambess.) Kuntze

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(COL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

Terminalia catappa L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Terminalia glabrescens Mart.

Sin.: *Chuncoa brasiliensis* Cambess., *Myrobalanus glabrescens* (C. Mart.) Kuntze

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, CON).

Terminalia triflora (Griseb.) Lillo

Sin.: *Chuncoa triflora* Griseb., *Myrobalanus balansae* Kuntze, *Myrobalanus triflora* (Griseb.) Kuntze, *Terminalia balansae* (Kuntze) Hassl., comb. superfl., *Terminalia balansae* (Kuntze) K. Schum., *Terminalia hassleriana* Chodat var. *bernardiensis* Chodat, *Terminalia hassleriana* Chodat, *Terminalia reitzii* Exell, *Terminalia uleana* Engl. ex Alwan & Stace

Arbusto o árbol. Nativa. 300-1700 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

COMMELINACEAE

Callisia Loefl.

Callisia monandra (Sw.) Schult. & Schult. f.

Sin.: *Aploleia diffusa* Raf., *Aploleia monandra* (Sw.) H. E. Moore, *Callisia umbellulata* Lam., *Leptocallis monandra* (Sw.) A. Ludw. & Rohweder, *Leptocallis umbellulata* (Lam.) Pichon, *Tradescantia monandra* Sw.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Callisia repens (Jacq.) L.

Sin.: *Hapalanthus repens* Jacq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, PAI).

Commelina L.

Commelina benghalensis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Commelina catharinensis Hassemer, J.P.R. Ferreira, Funez & J.D. Medeiros
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Commelina dielsii Herter
Sin.: *Commelina erecta* L. f. *dielsii*
(Herter) Bacigalupo
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(ERI).

Commelina diffusa Burm. f.
Sin.: *Commelina cayennensis* Rich.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(CON, GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, RNO, SAO, SOR, TYT).

Commelina erecta L.
Sin.: *Commelina angustifolia* Michx., *Commelina assurgens* Larrañaga, *Commelina cyanantha* Rojas Acosta, *Commelina elegans* Kunth, *Commelina erecta* L. f. *candida* Standl. & Steyererm., *Commelina erecta* L. f. *hamipila* (Wright) Brashier, *Commelina erecta* L. f. *roseo-purpurea* (Herter) Bacigalupo, *Commelina erecta* L. f. *villosa* (C.B. Clarke) Standl. & Steyererm., *Commelina erecta* L. var. *angustifolia* (Michx.) Fernald, *Commelina erecta* L. var. *hamipila* (Wright) Fernald, *Commelina guaranitica* C.B. Clarke ex Chodat & Hassl., *Commelina hamipila* Wright, *Commelina pohliana* Seub., *Commelina roseo-purpurea* Herter, *Commelina sulcata* Willd., *Commelina villosa* (C.B. Clarke) C.B. Clarke, *Commelina virginica* L. var. *angustifolia* (Michx.) C.B. Clarke, *Commelina virginica* L. var. *australis* C.B. Clarke, *Commelina virginica* L. var. *villosa* C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, RME). PRY(AMA, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, PAY, ROC).

Commelina longicaulis Jacq.
Sin.: *Commelina schomburgkiana* Klotzsch, *Commelina sellowiana* Kunth
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, CEN, COA, MIE, PAI).

Commelina obliqua Vahl
Sin.: *Commelina robusta* Kunth, *Commelina vestita* Seub., *Commelina vilavelhensis* D. Corrêa da Maia, Cervi & Tardivo
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, MIE). URY(ART).

Commelina platyphylla Klotzsch ex Seub.
Sin.: *Commelina balansae* (C.B. Clarke) Herter, *Commelina platyphylla* Klotzsch ex Seub. var. *balansae* C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, CAU, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART).

Commelina tuberosa L.
Sin.: *Commelina alpestris* Standl. & Steyererm., *Commelina cayennensis* Rich. var. *pubescens* Griseb., *Commelina clandestina* Mart., *Commelina coelestis* Willd., *Commelina elliptica* Kunth, *Commelina fasciculata* Ruiz & Pav., *Commelina fasciculata* Ruiz & Pav. subsp. *chacoensis* Slanis & Bulacio
Hierba. Nativa. 1000-2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Dichorisandra J.C. Mikan, nom. cons.

Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.

Sin.: *Commelina hexandra* Aubl., *Dichorisandra aubletiana* Schult. f., *Dichorisandra aubletiana* Schult. f. f. *intermedia* (Mart.) C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Dichorisandra incurva Mart. ex Schult. f.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dichorisandra paranaensis D. Corrêa da Maia, Cervi & Tardivo
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dichorisandra pubescens Mart.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dichorisandra thyrsoiflora J.C. Mikan
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Floscopa Lour.

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.
Sin.: *Dithyrocarpus glabratus* Kunth
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

Gibasis Raf.

Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder
Sin.: *Aneilema geniculata* (Jacq.) Woodson, *Tradescantia geniculata* Jacq.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, GUA, PHA, SPE).

Murdannia Royle

Murdannia paraguayensis (C.B. Clarke ex Chodat) G. Brückn.
Sin.: *Aneilema paraguayensis* C.B. Clarke ex Chodat, *Phaeneilema paraguayensis* (C.B. Clarke ex Chodat) G. Brückn.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Tinantia Scheidw., nom. cons.

Tinantia erecta (Jacq.) Schtdl.
Sin.: *Tinantia fugax* Scheidw., *Tinantia fugax* Scheidw. var. *erecta* (Jacq.) Drum. ex C.B. Clarke, *Tradescantia erecta* Jacq., *Tradescantia latifolia* Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. 600-1600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
BRA(Fuera del área del proyecto).

Tradescantia L.

Tradescantia ambigua Mart. ex Schult. f.
Hierba. Nativa. 1400-2200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA, PAI).

Tradescantia boliviana (Hassk.) J.R. Grant

Sin.: *Mandonia boliviana* Hassk.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
PRY(APY, COA, GUA).

Tradescantia cerinthoides Kunth
Sin.: *Tradescantia blossfeldiana* Mildbraed,
Tradescantia koernickeana Seub.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(SJO).

Tradescantia chrysophylla Pellegr.
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tradescantia crassula Link & Otto
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(PAI). URY(CLA, MON, ROC, TYT).

Tradescantia cymbispatha C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS,
SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, CEN, COA, ITA, PAI, SPE).

Tradescantia fluminensis Vell.
Sin.: *Tradescantia albiflora* Kunth
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LRI, LLA,
JFE). PRY(APA, CEN, COA, ITA, PAI).
URY(CLA, MON, ROC, TAC, TYT).

Tradescantia multibracteata M.
Ferrarese, Büneker & Canto-Dorow
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS).

Tradescantia mundula Kunth
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt
Sin.: *Setcreasea pallida* Rose
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Tradescantia schwirkowskiana
Funez, Hassemer & J.P.R. Ferreira
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tradescantia serrana Hassemer &
Funez
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).

Tradescantia seubertiana Pellegr.
Hierba. Endémica. 700-1800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Tradescantia spathacea Sw.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tradescantia tenella Kunth
Sin.: *Tradescantia anagallidea* Seub.,
Tradescantia fluminensis Vell. var. *tenella*
(Kunth) C.B. Clarke
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAN, GUA). URY(CLA, LAV,
MON, TAC).

Tradescantia tucumanensis Pellegr.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL, TUC). PRY(GUA, MIE, ÑEE).

Tradescantia umbraculifera Hand.-
Mazz.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN,
GUA, PAI).

Tradescantia valida G. Brückn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Tradescantia zanonía (L.) Sw.
Sin.: *Commelina zanonía* L.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tradescantia zebrina Bosse
Sin.: *Tradescantia pendula* (Schnizl.)
D.R. Hunt, *Zebrina pendula* Schnizl.,
Zebrina purpusii G. Brückn.
Hierba. Introducida. 400-700 m.
Países: ARG(BAI, MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Tripogandra Raf.

Tripogandra diuretica (Mart.)
Handlos
Sin.: *Tradescantia diuretica* Mart.,
Tradescantia elongata G. Mey.
var. *diuretica* (Mart.) C.B. Clarke,
Tripogandra elongata (G. Mey.) Woodson
f. *diuretica* (Mart.) Standl. & Steyerl.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI,
FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, GUA).
URY(MON).

Tripogandra glandulosa (Seub.)
Rohweder
Sin.: *Descantaria glandulosa* (Seub.)
G. Brückn., *Descantaria pflanzii* G.
Brückn., *Descantaria radiata* (C.B.
Clarke) G. Brückn., *Tradescantia*
glandulosa Seub., *Tradescantia pflanzii*
G. Brückn., *Tradescantia radiata* C.B.
Clarke, *Tripogandra pflanzii* (G. Brückn.)
Rohweder, *Tripogandra pflanzii* (G.
Brückn.) Celarier, comb. superfl.,
Tripogandra pflanzii (G. Brückn.)
Burkart, comb. superfl., *Tripogandra*
radiata (C.B. Clarke) Bacigalupo
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE,
TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA,
CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PHA, SPE).
URY(CLA, RIV, TYT).

Tripogandra multiflora (Sw.) Raf.
Sin.: *Tradescantia multiflora* Sw.,
Tradescantia multiflora Sw. var. *parviflora*
(Ruiz & Pav.) C.B. Clarke, *Tradescantia*
parviflora Ruiz & Pav., *Tripogandra*
multiflora (Sw.) Woodson f. *parviflora*
(Ruiz & Pav.) Bacigalupo
Hierba. Nativa. 500-800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Tripogandra purpurascens (Schauer)
Handlos subsp. **australis** Handlos
Hierba. Nativa. 200-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).

CONNARACEAE

Connarus L.

Connarus rostratus (Vell.) L.B. Sm.
Sin.: *Canicidia rostrata* Vell., *Connarus*
cymosus Planch., *Connarus cymosus*
Planch. var. *angustifolius* Baker, p.p.
Arbusto o arbolito. Nativa. 100-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Connarus subpeltatus G. Schellenb.
Nativa.
Países: BRA(PAR).

Rourea Aubl., nom. cons.

Rourea gracilis G. Schellenb.
Liana. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

CONVOLVULACEAE

Aniseia Choisy**Aniseia argentina** (N.E. Br.) O'Donell

Sin.: *Aniseia cernua* Moric. var. *ambigua* Meisn., *Aniseia cernua* Moric. f. *parviflora* Chodat & Hassl., *Ipomoea argentina* N.E. Br., *Ipomoea argentinensis* Speg., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. var. *ambigua* (Meisn.) Arechav., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *chacoensis* Hassl., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *palmirensis* Arechav., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. var. *ambigua* (Meisn.) Hassl. f. *platensis* (N.E. Br.) Hassl., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *yapeyuana* Arechav.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CON, ÑEE, PHA). URY(ART, CLA, COL, DUR, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TYT).

Aniseia luxurians (Moric.) Athié-Souza & Buril

Sin.: *Ipomoea grisebachiana* Meisn., *Ipomoea jamesonii* Choisy, *Ipomoea luxurians* Moric., *Ipomoea sericantha* Griseb., nom. illeg., *Ipomoea sericea* Spreng. ex Choisy, nom. illeg., *Isea luxurians* (Moric.) O'Donell, *Jacquemontia luxurians* (Moric.) Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR). PRY(ÑEE).

Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy

Sin.: *Aniseia martinicensis* (Jacq.) Choisy var. *ambigua* Hallier f., *Convolvulus martinicensis* Jacq., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *acutifolia* Hassl., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *obtusiflora* Hassl., nom. superfl., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *paraguariensis* Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).

Bonomia Thouars, nom. cons.**Bonomia agrostopolis** (Vell.) Hallier f.

Sin.: *Bonomia tomentosa* Hassl. Arbusto. Nativa. 0-200 m. Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

Bonomia balansae Hallier f.

Arbusto. Nativa. 0-200 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CON).

Bonomia sericea (Griseb.) Hallier f.

var. **latifolia** O'Donell Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(SDE, TUC).

Bonomia sericea (Griseb.) Hallier f.

var. **sericea** Sin.: *Breweria sericea* Griseb., *Convolvulus breweraceus* Kuntze, nom. superfl. Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(CAT, CHA, COR, LRI, SDE, SLU).

Bonomia subsessilis Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-200 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Calystegia R. Br., nom. cons.**Calystegia brummittii** P.P.A. Ferreira & Sim.-Bianch.

Enredadera. Endémica. Países: BRA(RGS, SCA).

Calystegia sepium (L.) R. Br. var. **americana** (Sims) Kitag.

Sin.: *Aniseia arifolia* Meisn., *Calystegia acutifolia* Phil., *Calystegia rosea* Phil., *Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *rosea* Choisy, nom. illeg., *Calystegia sepium* (L.) R. Br. subsp. *americana* (Sims) Brummitt, *Convolvulus sepium* L. var. *americanus* Sims Enredadera. Introducida. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, RME, IPA). URY(CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).

Calystegia sepium (L.) R. Br. var. **sepium**

Sin.: *Convolvulus sepium* L., *Volvulus sepium* (L.) Junger Enredadera. Introducida. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN). BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE, IPA).

Calystegia soldanella (L.) R. Br.

Sin.: *Convolvulus soldanella* L. Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(BAI). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(CAS, MAL, MON, ROC).

Calystegia tuguriorum (G. Forst.) R. Br. ex Hook. f.

Sin.: *Calystegia hantelmanni* Phil., *Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *hantelmanni* (Phil.) Reiche, *Convolvulus tuguriorum* G. Forst Hierba. Nativa. 0-600 m. Países: CHL(LRI, AIS, JFE).

Camonea Raf.**Camonea umbellata** (L.) Simões & Staples

Sin.: *Convolvulus umbellatus* L., *Ipomoea polyanthes* Roem. & Schult., *Ipomoea umbellata* (L.) G. Mey., nom. illeg., *Merremia umbellata* (L.) Hallier f., *Merremia umbellata* (L.) Hallier f. var. *occidentalis* Hallier f. Enredadera. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CEN, CON).

Convolvulus L.**Convolvulus arvensis** L.

Sin.: *Convolvulus arvensis* L. var. *hastulatus* Meisn., *Convolvulus arvensis* L. var. *villosus* Choisy Enredadera. Introducida. 0-3200 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE). URY(CAS, COL, MON).

Convolvulus bonariensis Cav.

Sin.: *Aniseia diversifolia* Walp., *Convolvulus bonariensis* Cav. var. *multiflorus* Phil., *Convolvulus dissectus* Cav. var. *diversifolius* (Walp.) Reiche, *Convolvulus triflorus* Phil., nom. illeg. Enredadera. Nativa. 0-3000 m. Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(VAL, RME). PRY(COA). URY(LAV).

Convolvulus chilensis Pers.

Sin.: *Convolvulus canescens* Phil., *Convolvulus dissectus* Cav., nom. illeg., *Convolvulus dissectus* Cav. var. *canescens* (Phil.) Reiche
Enredadera. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. subsp. **crenatifolius**

Sin.: *Convolvulus crenatifolius* Ruiz & Pav. var. *argentiniticus* Hallier f.
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, RNE, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, SPE). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC).

Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. subsp. **montevidensis** (Spreng.) J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Sin.: *Breweria montevidensis* Peter, *Convolvulus crenatifolius* Ruiz & Pav. var. *montevidensis* (Spreng.) Hallier f., *Convolvulus montevidensis* Spreng. var. *megapotamicum* Meisn., *Convolvulus montevidensis* Spreng. var. *ottonis* (Meisn.) Chodat & Hassl., *Convolvulus montevidensis* Spreng., *Convolvulus ottonis* Meisn., *Ipomoea montevidensis* (Spreng.) G. Don, *Ipomoea ottoensis* Choisy
Enredadera. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, MIS, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). URY(CAS, COL, CLA, MON, RNO, SAO).

Convolvulus demissus Choisy

Sin.: *Convolvulus andinus* Phil., *Convolvulus demissus* Choisy var. *andinus* (Phil.) Reiche, *Convolvulus demissus* Choisy var. *ovatus* (Phil.) Reiche, *Convolvulus ovatus* Phil., nom. illeg.
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, LBO, MAU, RME).

Convolvulus ensifolius P.P.A. Ferreira & Sim.-Bianch.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Convolvulus hasslerianus (Chodat) O'Donell

Sin.: *Breweria hassleriana* Chodat, *Convolvulus mollis* Meisn., hom. illeg. f. *amplexicaulis* Hassl., *Convolvulus mollis* Meisn., hom. illeg. var. *hasslerianus*

(Chodat) Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, SPE).

Convolvulus hermanniae L'Hér. subsp. **erosus** (Desr.) J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Sin.: *Aniseia costata* (Meyen) Walp., *Convolvulus costatus* Meyen, *Convolvulus erosus* Desr., *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *elongatus* Choisy, nom. illeg., *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *viridis* Meisn., *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *albido-villosus* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Convolvulus mollis* Meisn., hom. illeg. var. *albido-villosus* Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-2800 m.
Países: BRA(RGS). CHL(RME). PRY(COA). URY(MON).

Convolvulus hermanniae L'Hér. subsp. **hermanniae**

Sin.: *Convolvulus crenatus* Jacq., *Convolvulus incanus* Vahl, *Ipomoea hermanniae* (L'Hér.) G. Don
Enredadera. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA). URY(FLO, MON, PAY, SAO, SJO, TAC).

Convolvulus laciniatus Desr. var. **hirsutus** Desr.

Sin.: *Convolvulus laciniatus* Desr. f. *pinnatisecta* Arechav., *Convolvulus lasianthus* Cav.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). CHL(ATA, COQ). URY(MON, SAO).

Convolvulus laciniatus Desr. var. **laciniatus**

Sin.: *Convolvulus geranioides* Phil., *Convolvulus laciniatus* Desr. var. *peduncularis* Meisn., *Convolvulus laciniatus* Desr. f. *subglabra* Arechav., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn., nom. illeg. var. *glabra* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL). URY(ART, CAS, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

Convolvulus lilloi O'Donell

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Convolvulus montanus Ooststr.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, MEN, SJU).

Convolvulus schulzei O'Donell
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS).

Cressa L.

Cressa nudicaulis Griseb.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

Cressa truxillensis Kunth
Sin.: *Cressa australis* R. Br. var. *petiolata* Meisn., *Cressa cretica* L. var. *truxillensis* (Kunth) Choisy
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, RME). PRY(APY). URY(MON).

Cuscuta L.

Cuscuta alataloba Yunck.
Sin.: *Cuscuta alataloba* Yunck. var. *monosperma* Yunck.
Enredadera parásita. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).

Cuscuta americana L.
Sin.: *Cuscuta americana* L. var. *spectabilis* (Choisy) Progel
Enredadera parásita. Nativa.
Países: ARG(JUJ). BRA(Fuera del área del proyecto).

Cuscuta andina Phil.
Sin.: *Cuscuta indecora* Choisy var. *integriuscula* (Engelm.) Yunck., *Cuscuta racemosa* Mart. var. *andina* (Phil.) Reiche
Enredadera parásita. Endémica.
Países: ARG(MEN). CHL(MAU).

Cuscuta argentinana Yunck. var. **argentinana**
Sin.: *Cuscuta argentinana* Yunck. var. *typica* Hunz., nom. inval.
Enredadera parásita. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Cuscuta argentinana Yunck. var. **parviflora** Hunz.
Enredadera parásita. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(TUC).

Cuscuta boliviana Yunck. var. **boliviana**

Sin.: *Cuscuta boliviana* Yunck. var. *typica* Hunz., nom. inval.

Enredadera parásita. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).

Cuscuta boliviana Yunck. var. **paranensis** Hunz.

Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Cuscuta campestris Yunck.

Sin.: *Cuscuta pentagona* Engelm. var. *calycina* Engelm.

Enredadera parásita. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS). CHL(TAR, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME). URY(CAS).

Cuscuta chilensis Ker Gawl.

Sin.: *Cuscuta aurea* Phil., nom. illeg. Enredadera parásita. Nativa. 1000-2300 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Cuscuta corniculata Engelm.

Sin.: *Cuscuta corniculata* Engelm. var. *racemulosa* Engelm.

Enredadera parásita. Nativa.

Países: BRA(RGS, SCA).

Cuscuta cristata Engelm. var.**chacoensis** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, SFE).

Cuscuta cristata Engelm. var. **cristata**

Sin.: *Cuscuta cristata* Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval.

Enredadera parásita. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LRI, SDE). URY(COL).

Cuscuta epilinum Weihe

Enredadera parásita. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR).

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. var. **angustissima** (Engelm.) Yunck.

Sin.: *Cuscuta epithymum* (L.) Murray

ex L. f. *angustissima* Engelm.

Enredadera parásita. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(ARA, RME).

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. var. **epithymum**

Sin.: *Cuscuta europaea* L. var. *epithymum* L., *Cuscuta epithymum* (L.) Murray ex L. var. *typica* Hunz., nom. inval.

Enredadera parásita. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE).

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. var. **macranthera** (Heldr. & Sartori ex Boiss.) Engelm.

Sin.: *Cuscuta macranthera* Heldr. & Sartori ex Boiss.

Enredadera parásita. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Cuscuta flossdorffii Hicken var. **flossdorffii**

Sin.: *Cuscuta brevisquamata* Yunck., *Cuscuta flossdorffii* Hicken var. *typica* Hunz., nom. inval.

Enredadera parásita. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(COR, LRI, TUC).

Cuscuta flossdorffii Hicken var. **microstyla** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(LRI).

Cuscuta flossdorffii Hicken var. **pampagrlandensis** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(SAL).

Cuscuta flossdorffii Hicken var. **tucumanensis** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 2500-3000 m.

Países: ARG(TUC).

Cuscuta friesii Yunck.

Enredadera parásita. Endémica. 3500-4000 m.

Países: ARG(JUJ).

Cuscuta globiflora Engelm.

Enredadera parásita. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cuscuta grandiflora Kunth

Enredadera parásita. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cuscuta incurvata Progel

Sin.: *Cuscuta incurvata* Progel var. *apaensis* Chodat & Hassl.

Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Cuscuta indecora Choisy var. **indecora**

Sin.: *Cuscuta decora* Choisy var. *integriuscula* Engelm., *Cuscuta indecora* Choisy var. *typica* Hunz., nom. inval.

Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, NEU, RNE, SAL, SDE). BRA(PAR). PRY(APY).

Cuscuta indecora Choisy var. **longisepala** Yunck.

Enredadera parásita. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(GUA).

Cuscuta indecora Choisy var. **neuropetala** (Engelm.) Hitchc.

Sin.: *Cuscuta neuropetala* Engelm.

Parásita. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Cuscuta insquamata Yunck. var. **argentina** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(SAL).

Cuscuta longiloba Yunck.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Cuscuta membranacea Yunck.

Enredadera parásita. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, LRI, SAL, TUC).

Cuscuta micrantha Choisy var. **holwayi** Yunck.

Enredadera parásita. Endémica.

Países: CHL(MAU).

Cuscuta micrantha Choisy var. **latiflora** Engelm.

Enredadera parásita. Endémica.

Países: CHL(ATA).

Cuscuta micrantha Choisy var. **micrantha**

Sin.: *Cuscuta micrantha* Choisy var. *typica* Yunck., nom. inval.
Enredadera parásita. Endémica. 3000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME).

Cuscuta microstyla Engelm. var. **bicolor** (Hunz.) Hunz.

Sin.: *Cuscuta bicolor* Hunz.
Enredadera parásita. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Cuscuta microstyla Engelm. var. **microstyla**

Sin.: *Cuscuta microstyla* Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval.
Enredadera parásita. Endémica. 1600-3100 m.
Países: CHL(BIO, RME).

Cuscuta obtusiflora Kunth

Sin.: *Cuscuta stuckertii* Yunck.
Enredadera parásita. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MEN, MIS, SFE, TUC). BRA(SCA). PRY(CEN).

Cuscuta odorata Ruiz & Pav. var. **botryoides** Engelm.

Enredadera parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cuscuta odorata Ruiz & Pav. var. **odorata**

Enredadera parásita. Nativa. 600-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, LBO).

Cuscuta parodiana Yunck. var. **parodiana**

Sin.: *Cuscuta odorata* Ruiz & Pav. var. *holwayana* Yunck., *Cuscuta parodiana* Yunck. var. *typica* Hunz., nom. inval.
Enredadera parásita. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Cuscuta parodiana Yunck. var. **tucumana** (Yunck.) Hunz.

Sin.: *Cuscuta tucumana* Yunck.
Enredadera parásita. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(TUC).

Cuscuta partita Choisy
Enredadera parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cuscuta pauciflora Phil.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SJU, SCR). CHL(MAU, LRI).

Cuscuta platyloba Progel var. **pampeana** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR).

Cuscuta platyloba Progel var. **platyloba**

Sin.: *Cuscuta platyloba* Progel var. *triangulata* Yunck., *Cuscuta platyloba* Progel var. *typica* Hunz., nom. inval., *Cuscuta racemosa* Mart. var. *calycina* Engelm.
Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(SCA). URY(CAS, CLA, COL, MON, RIV, ROC, SJO).

Cuscuta purpurata Phil.

Enredadera parásita. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cuscuta pusilla Phil.

Enredadera parásita. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Cuscuta racemosa Mart. var. **nuda** Engelm.

Enredadera parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cuscuta racemosa Mart. var. **racemosa**

Enredadera parásita. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Cuscuta rojasii Hunz.

Enredadera parásita. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Cuscuta rotundiflora Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Cuscuta rustica Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 4000 m.
Países: CHL(COQ).

Cuscuta suaveolens Ser.

Sin.: *Cuscuta floribunda* Phil., nom. illeg., *Cuscuta racemosa* Mart. var. *chiliana* Engelm.
Enredadera parásita. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, MEN, SJU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(DUR, SAO, SJO).

Cuscuta taimensis P.P.A. Ferreira & Dettke

Enredadera parásita. Endémica.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, TYT).

Cuscuta werdermannii Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 300 m.
Países: CHL(COQ).

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **carinata** (Yunck.) Yunck.

Sin.: *Cuscuta trichostyla* Engelm. var. *carinata* Yunck.
Enredadera parásita. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA). PRY(CEN, COA). URY(Desconocida).

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **lanceolata** Yunck.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MIS). PRY(APA).

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **longibracteata** Hunz.

Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR).

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **xanthochortos**

Sin.: *Cuscuta trichostyla* Engelm., *Cuscuta xanthochortos* Mart. ex Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval.
Enredadera parásita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(GUA).

Cuscuta yunckeriana Hunz.

Enredadera parásita. Endémica.
Países: ARG(RNE).

Dichondra J.R. Forst. & G. Forst.**Dichondra argentea** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Dichondra evolvulacea* (L. f.) Britton var. *argentea* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SLU).

Dichondra macrocalyx Meisn.

Sin.: *Dichondra evolvulacea* (L. f.) Britton var. *villosa* (D. Parodi) Kuntze, *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *macrocalyx* (Meisn.) Hoehne, *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *villosa* (D. Parodi) O'Donell, *Dichondra villosa* D. Parodi
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, SCA).

Dichondra micrantha Urb.

Sin.: *Proustia cuneifolia* D. Don var. *mendocina* (Phil.) Ariza
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: BRA(SCA).

Dichondra microcalyx (Hallier f.)

Fabris

Sin.: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *microcalyx* Hallier f., nom. inval., *Dichondra sericea* Sw. var. *microcalyx* (Hallier f.) H.T. Buck

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SJU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, ARA). PRY(COA, GUA, ÑEE). URY(CLA, DUR, FLA, MON, ROC).

Dichondra sericea Sw. var.

holosericea (O'Donell) Fabris

Sin.: *Dichondra argentea* Humb. & Bonpl. ex Willd. f. *macrophylla* Arechav., *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *holosericea* O'Donell

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU, SDE). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA). URY(ART, FLO, FLA, MAL, MON, SJO, SOR).

Dichondra sericea Sw. var. **sericea**

Sin.: *Dichondra parviflora* Meisn., *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *sericea* (Sw.) Choisy

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). PRY(CEN, COA, PAI). URY(CLA, LAV, MAL, MON, ROC, SOR).

Dichondra sericea Sw. var.

tomentosa H.T. Buck ex Tronc. & Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI). URY(RIV, SJO, TAC).

Distimake Raf.

Distimake aegyptius (L.) Simões & Staples

Sin.: *Convolvulus pentaphyllus* L., nom. illeg., *Ipomoea aegyptia* L., *Ipomoea pentaphylla* (L.) Jacq., nom. illeg., *Merremia aegyptia* (L.) Urb., *Merremia pentaphylla* (L.) Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA).

Distimake cissoides (Lam.) Simões & Staples

Sin.: *Batatas cissoides* (Lam.) Choisy, *Convolvulus cissoides* (Lam.) Griseb., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *guaranitica* Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *tomentosa* Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *diminuta* (Meisn.) Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *major* (Meisn.) Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *vulgaris* (Meisn.) Hassl., *Pharbitis cissoides* (Lam.) Peter

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, CAN, CON, COA, PAI, PHA).

Distimake contorquens (Choisy)

Simões & Staples
Sin.: *Ipomoea contorquens* Choisy, *Merremia contorquens* (Choisy) Hallier f.
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Distimake digitatus (Spreng.) Simões & Staples

Sin.: *Gerardia digitata* Spreng., *Merremia digitata* (Spreng.) Hallier f. var. *digitata*, *Merremia digitata* (Spreng.) Hallier f. var. *elongata* (Choisy) D.F. Austin & Staples
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Distimake dissectus (Jacq.) Simões & Staples var. **chacoensis** (O'Donell) Petrongari & Sim.-Bianch.

Sin.: *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *chacoensis* O'Donell
Enredadera. Nativa. 500-1100 m.
Países: ARG(SDE, TUC). PRY(APA, CAA, CEN, GUA).

Distimake dissectus (Jacq.) Simões & Staples var. **dissectus**

Sin.: *Convolvulus dissectus* Jacq., *Ipomoea sinuata* Ortega, *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *dissecta*
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA, PAI, SPE). URY(ART, PAY).

Distimake dissectus (Jacq.) Simões & Staples var. **edentatus** (Meisn.) Petrongari & Sim.-Bianch.

Sin.: *Ipomoea dissecta* (Jacq.) Pursh var. *maximiliani* (Meisn.) O'Donell, *Ipomoea fulva* Bertol., *Ipomoea maximiliani* Meisn., *Ipomoea sinuata* Ortega var. *edentata* Meisn., *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *edentata* (Meisn.) O'Donell, *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *maximiliani* (Meisn.) Hallier f., *Merremia sinuata* (Ortega) Hoehne var. *edentata* (Meisn.) Hoehne

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).

Distimake hasslerianus (Chodat) Simões & Staples

Sin.: *Ipomoea hassleriana* Chodat & Hassl. f. *hassleriana*, *Merremia hassleriana* (Chodat & Hassl.) Hassl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CON).

Distimake macrocalyx (Ruiz & Pav.) Simões & Staples

Sin.: *Batatas glabra* (Aubl.) Benth., *Convolvulus contortus* Vell., *Convolvulus glaber* Aubl., nom. illeg., *Convolvulus macrocalyx* Ruiz & Pav., *Ipomoea glabra* (Aubl.) Choisy, *Ipomoea macrocalyx* (Ruiz & Pav.) Choisy, *Merremia glabra* (Aubl.) Hallier f., *Merremia macrocalyx* (Ruiz & Pav.) O'Donell
Enredadera. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAN, COA, GUA, PAI).

Distimake maragniensis (Choisy) Petrongari & Sim.-Bianch.

Sin.: *Ipomoea maragniensis* Choisy
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Distimake tomentosus (Choisy) Petrongari & Sim.-Bianch.

Sin.: *Ipomoea tomentosa* Choisy, *Merremia tomentosa* (Choisy) Hallier f.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Evolvulus L.

Evolvulus alsinoides (L.) L.

Sin.: *Convolvulus alsinoides* L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CEN, COA, PAI).

Evolvulus arizonicus A. Gray

Enredadera. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA). URY(SAO).

Evolvulus aurigenus Mart.

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Evolvulus barbatus Meisn.

Sin.: *Evolvulus aurigenus* Mart. var. *viscidulus* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Evolvulus cardiophyllus Schltld.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA, PAI).

Evolvulus chamaepitys Mart. var. **paraguayensis** Ooststr.

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(AMA).

Evolvulus chrysotrichos Meisn.

Sin.: *Evolvulus guaraniticus* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, PAI).

Evolvulus convolvuloides (Willd.)

Stearn
Sin.: *Evolvulus glaber* Spreng., *Nama convolvuloides* Willd. ex Schult.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, TUC). PRY(APY, PHA).

Evolvulus corumbaensis Hoehne

Sin.: *Evolvulus pseudofilipes* Hassl., nom. nud.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Evolvulus elegans Moric. var. **capillaceus** Meisn.

Subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Evolvulus filipes Mart.

Sin.: *Evolvulus filipes* Mart. var. *exilis* (Meisn.) Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, COA).

Evolvulus glomeratus Nees & Mart. f. **echioides** (Moric.) Ooststr.

Sin.: *Evolvulus echioides* Moric.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Evolvulus glomeratus Nees & Mart. subsp. **grandiflorus** (D. Parodi) Ooststr.

Sin.: *Evolvulus grandiflorus* D. Parodi, *Evolvulus martii* Meisn. f. *saltense* Arechav., *Evolvulus paraguariensis* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA, ÑEE). URY(PAY, SAO).

Evolvulus hasslerianus Chodat

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(APA, AMA, CON).

Evolvulus latifolius Ker Gawl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Evolvulus linarioides Meisn.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(PHA).

Evolvulus niveus Mart.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Evolvulus nummularius (L.) L.

Sin.: *Convolvulus nummularius* L.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Evolvulus pusillus Choisy

Subarbutifome. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Evolvulus riedelii Meisn.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Evolvulus sericeus Sw. f. **pedunculatus** Ooststr.

Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(ERI, FOR, JUJ).

Evolvulus sericeus Sw. var. **elongatus** (Choisy) O'Donell

Sin.: *Evolvulus falcatus* Griseb., *Evolvulus incanus* Pers. var. *elongatus* Choisy, *Evolvulus sericeus* Sw. var.

falcatus (Griseb.) Ooststr., *Leucomalla lanuginosa* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TUC). CHL(RME).

Evolvulus sericeus Sw. var. **sericeus**

Sin.: *Evolvulus anomalus* Meisn., *Evolvulus araucanus* Phil., *Evolvulus holosericeus* Kunth, *Evolvulus sericeus* Sw. var. *holosericeus* (Kunth) Ooststr., *Evolvulus sericeus* Sw. var. *latior* Meisn.
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(CAS, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, TAC).

Evolvulus serpylloides Meisn.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy var. **cinereus** Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS, SAL). PRY(CEN, COA, PAI).

Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy var. **tenuis**

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA, GUA, PAI).

Ipomoea L. nom. cons.**Ipomoea acutisepala** O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Ipomoea aemilii (O'Donell) J.R.I.

Wood & R. Degen
Sin.: *Ipomoea malpighipila* O'Donell var. *aemilii* O'Donell
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(APA).

Ipomoea aequiloba J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Hierba. Nativa. 100-200 m.
Países: ARG(MIS).

Ipomoea alba L.

Sin.: *Calonyction aculeatum* (L.) House, *Calonyction bona-nox* (L.) Bojer, *Calonyction pulcherrimum* D.

Parodi, *Calonyction speciosum* Choisy, nom. illeg., *Convolvulus aculeatus* L., *Convolvulus aculeatus* L. var. *bona-nox* (L.) Kuntze, *Convolvulus bona-nox* (L.) Spreng., *Convolvulus pulcherrimus* Vell., *Ipomoea aculeata* (L.) Kuntze var. *bona-nox* (L.) Kuntze, *Ipomoea bona-nox* L., nom. superfl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, GUA, PAI). URY(MON).

Ipomoea altoparanaensis O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

Ipomoea amnicola Morong

Sin.: *Ipomoea nuda* N.E. Br., nom. illeg.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Ipomoea argentea Meisn.

Hierba voluble. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Ipomoea argentinica Peter

Sin.: *Argyrea juramenti* (Kuntze) K. Schum., *Ipomoea juramenti* (Kuntze) O'Donell, *Murucua juramenti* Kuntze, nom. superfl.

Enredadera. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(SCA).

Ipomoea aristolochiifolia G. Don

Sin.: *Convolvulus aristolochiifolius* Kunth, nom. illeg., *Ipomoea austin-smithii* Standl., *Ipomoea concinna* House, *Ipomoea cordata* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Ipomoea peckoltii* Meisn., *Ipomoea peninsularis* Brandege, *Ipomoea tuerckheimii* Vatke ex Donn. Sm., *Ipomoea tweediei* Hook.

Enredadera. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA).

Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.

Sin.: *Convolvulus asarifolius* Desr., *Ipomoea nymphaeifolia* Griseb., nom. illeg., *Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet, comb. superfl. var. *heterosepala* Chodat & Hassl., *Ipomoea urbica* Choisy, *Ipomoea urbica* Choisy var. *muricata* Choisy

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA).

Ipomoea austrobrasilensis J.R.I.

Wood & R.W. Scotland

Enredadera. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Sin.: *Convolvulus batatas* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ipomoea blanchetii Choisy

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ipomoea bonariensis Hook. var.

erecta J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Ipomoea bonariensis Hook. var.

bonariensis

Sin.: *Convolvulus hookerianus* D. Dietr., nom. superfl., *Ipomoea biglandulosa* Arechav., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *calvescens* Hallier f., *Ipomoea bonariensis* Hook. f. *mollis*, *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *chacoensis* O'Donell, *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *cordifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *grandiflora* Chodat & Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *pubisepala* Hassl., nom. superfl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *rupestris* Chodat & Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. f. *cordata* Hassl., nom. superfl., *Ipomoea bonariensis* Hook. f. *glabrata* Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. f. *intermedia* Hassl., nom. illeg., *Ipomoea cordobana* Peter, *Ipomoea heterotricha* Meisn., nom. illeg., *Ipomoea heterotricha* Meisn., hom. illeg. f. *homotricha*, *Ipomoea obtusiloba* Meisn., *Ipomoea obtusiloba* Meisn. var. *tridens* Meisn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, COA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, COL, SAO).

Ipomoea cairica (L.) Sweet

Sin.: *Batatas cavanillesii* (Roem. & Schult.) G. Don, *Convolvulus cairicus* L., *Convolvulus cavanillesii* (Roem. & Schult.) Spreng., *Convolvulus limphaticus* Vell., *Convolvulus tuberculatus* Desr.,

Ipomoea cairica (L.) Sweet var. *uniflora* (Meisn.) Hoehne, *Ipomoea cavanillesii* Roem. & Schult., *Ipomoea funaria* Larrañaga, *Ipomoea heptaphylla* Voigt, nom. illeg., *Ipomoea palmata* Forssk., *Ipomoea pentaphylla* Cav., nom. illeg., *Ipomoea rosea* Choisy var. *pluripartita* Hassl., *Ipomoea stipulacea* Jacq., *Ipomoea tuberculata* (Desr.) Roem. & Schult.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, PAI, PHA). URY(ART, COL, MON, PAY).

Ipomoea campestris Meisn.

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ipomoea carnea Jacq. subsp. **carnea**

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ipomoea carnea Jacq. subsp. **fistulosa**

(Mart. ex Choisy) D.F. Austin

Sin.: *Batatas crassicaulis* Benth., *Ipomoea crassicaulis* (Benth.) Robinson, *Ipomoea fistulosa* Mart. ex Choisy, *Ipomoea gossypoides* D. Parodi, *Ipomoea texana* J.M. Coult.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN, COA, ÑEE, PHA).

Ipomoea cheirophylla O'Donell

Enredadera. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY).

Ipomoea chiliantha Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA, PHA).

Ipomoea chodatiana O'Donell

Sin.: *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn., nom. illeg. f. *argentea* Hassl., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn., nom. illeg. f. *canescens* Hassl., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn., nom. illeg. var. *discolor* Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. var. *elliptica* Chodat & Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. var. *glabrata* Chodat & Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. var. *sericea* Chodat & Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. f.

retusa Chodat & Hassl.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CEN).

Ipomoea chondrosepala Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Ipomoea cordatotriloba Dennst. var. ***australis*** (O'Donell) D.F. Austin

Sin.: *Ipomoea trichocarpa* Elliot, nom. illeg., *Ipomoea trichocarpa* Elliot, nom. illeg. var. *australis* O'Donell

Enredadera. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI).

Ipomoea cordatotriloba Dennst. var. ***cordatriloba***

Liana. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS).

Ipomoea cordillerae J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *ovata* Hallier f.

Enredadera. Endémica. 0-600 m.

Países: PRY(COA, GUA, PAI).

Ipomoea crinicalyx S. Moore

Sin.: *Convolvulus crinicalyx* (S. Moore) Kuntze, *Ipomoea seleri* Millsp.

Enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Ipomoea delphinioides Choisy

Enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ipomoea descolei O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

PRY(ITA).

Ipomoea dolichopoda J.R.I. Wood & R. Degen

Enredadera. Endémica. 100-300 m.

Países: PRY(CAA).

Ipomoea dumetorum Willd. ex Roem. & Schult.

Sin.: *Convolvulus dumetorum* Kunth, *Convolvulus glaucescens* Kunth, *Convolvulus pauciflorus* Willd. ex Roem. & Schult., nom. illeg., *Convolvulus pauciflorus* Willd. ex Roem. & Schult. var. *chilensis* (A. Braun & Bouché)

Kuntze, *Convolvulus pulchellus* Kunth, *Ipomoea chilensis* A. Braun & Bouché, *Ipomoea dumetorum* Willd. ex Roem. & Schult. var. *glaucescens* (Kunth) Choisy, *Ipomoea oligantha* Choisy, *Ipomoea paposana* Phil., *Ipomoea pulchella* (Kunth) G. Don, comb. illeg.

Enredadera. Nativa. 900-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(ANT). PRY(APY).

Ipomoea estrellensis O'Donell

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Ipomoea fiebrigii Hassl. ex O'Donell

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

Ipomoea fimbriosepala Choisy

Sin.: *Aniseia hastata* Meisn., *Ipomoea phylloneura* Baker

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(COL, ROC).

Ipomoea grandifolia (Dammer)

O'Donell

Sin.: *Jacquemontia grandifolia* Dammer

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, MON, PAY, SOR).

Ipomoea guaranitica Chodat & Hassl.

Sin.: *Ipomoea cornucopia* Chodat & Hassl.,

Ipomoea patula Choisy var. *villosa* Meisn.

Enredadera. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, CAU, CAN).

Ipomoea hederifolia L.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Ipomoea hieronymi (Kuntze)

O'Donell

Sin.: *Argyreia hieronymi* (Kuntze) K.

Schum., *Argyreia megapotamica* Griseb.,

Ipomoea hieronymi (Kuntze) O'Donell

var. *calchaquina* O'Donell, *Ipomoea hieronymi* (Kuntze) O'Donell var. *kurtziana*

(O'Donell) O'Donell, *Ipomoea kurtziana*

O'Donell, *Murucoa hieronymi* Kuntze,

Murucoa megapotamica (Griseb.) Kuntze

Enredadera. Nativa. 500-2400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Ipomoea hirsutissima Gardner

Sin.: *Ipomoea hirsutissima* Gardner var. *integrifolia* Chodat & Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(CAN).

Ipomoea homotrichoidea O'Donell

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.

Sin.: *Convolvulus imperati* Vahl

Enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ipomoea indica (Burm.) Merr.

Sin.: *Convolvulus acuminatus* Vahl, *Convolvulus bogotensis* Kunth, *Convolvulus congestus* (R. Br.) Spreng., *Convolvulus indicus* Burm., *Convolvulus mollis* Kunth, nom. illeg., *Convolvulus portoricensis* Spreng., *Ipomoea acuminata* (Vahl) Roem. & Schult., *Ipomoea bogotensis* (Kunth) G. Don, *Ipomoea cathartica* Poir., *Ipomoea congesta* R. Br., *Ipomoea mollis* (Kunth) G. Don, *Ipomoea portoricensis* (Spreng.) G. Don, *Ipomoea vahliana* House, *Pharbitis acuminata* (Vahl) Choisy, *Pharbitis acuminata* (Vahl) Choisy var. *congesta* (R. Br.) Choisy, *Pharbitis bogotensis* (Kunth) Choisy, *Pharbitis cathartica* (Poir.) Choisy, *Pharbitis mollis* (Kunth) Choisy, *Pharbitis rosea* Choisy

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(JFE). PRY(GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CAS, COL, MON, PAY, SOR).

Ipomoea indivisa (Vell.) Hallier f.

Sin.: *Convolvulus indivisus* Vell.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MON, PAY, ROC, SOR, TAC).

Ipomoea itapuaensis J.R.I. Wood & R. Degen

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAA, ITA).

Ipomoea jujuyensis O'Donell

Enredadera. Nativa. 1000-2600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ipomoea kunthiana Meisn.

Sin.: *Ipomoea tacuareboensis* Arechav., *Ipomoea tacuareboensis* Arechav. f. *foliosa* Arechav.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA). URY(CLA, RIV, TAC).

Ipomoea lanuginosa O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).
PRY(ITA).

Ipomoea lilloana O'Donell

Hierba. Nativa. 0-2600 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Ipomoea lobata (Cerv. ex La Llave & Thell.) Thell.

Sin.: *Mina lobata* Cerv.
Enredadera. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(JUJ).

Ipomoea malpighipila O'Donell

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(APA, AMA, COA).

Ipomoea malvaeoides Meisn.

Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *argentea* O'Donell, *Ipomoea malvaeoides* var. *lineariloba* Hallier f., *Ipomoea pinifolioides* Arechav.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(CAN, CEN, CON, PAI). URY(ART, RIV).

Ipomoea marginisepala O'Donell

Sin.: *Ipomoea dichotoma* Kunth
Enredadera. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Ipomoea maurandioides Meisn. var. **maurandioides**

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, COA, PAI, PHA).

Ipomoea maurandioides Meisn. var. **subtomentosa** (Chodat & Hassl.) J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Sin.: *Ipomoea serpens* Meisn. var. *albiflora* Hallier f., *Ipomoea serpens* Meisn. f. *crassifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea serpens* Meisn. var. *subtomentosa* Chodat & Hassl., *Ipomoea subtomentosa* (Chodat & Hassl.) O'Donell f. *albiflora* (Hallier f.) O'Donell
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CEN, COA, PAI).

Ipomoea megalantha J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(CAU).

Ipomoea megapotamica Choisy

Sin.: *Argyrea megapotamica* Griseb. var. *puberula* Griseb., *Ipomoea megapotamica* Choisy var. *cordifolia* Hassl., *Ipomoea megapotamica* Choisy var. *pauciflora* Meisn.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(RGS). PRY(AMA).

Ipomoea mirabilis P.P.A. Ferreira & Sim.-Bianch.

Enredadera o liana. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Ipomoea morongii Britton

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, COA).

Ipomoea nil (L.) Roth

Sin.: *Convolvulus nil* L., *Convolvulus tomentosus* Vell., *Ipomoea cuspidata* Ruiz & Pav., *Ipomoea longicuspis* Meisn., *Ipomoea scabra* Forssk., *Pharbitis cuspidata* (Ruiz & Pav.) G. Don
Enredadera. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI, SPE). URY(SAO).

Ipomoea nitida Griseb.

Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *nitida* (Griseb.) Hallier f.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, PAY).

Ipomoea oblongifolia (Hassl.) O'Donell

Sin.: *Ipomoea argyrea* (Choisy) Meisn. f. *oblongifolia* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(AMA).

Ipomoea oranensis O'Donell

Enredadera. Nativa. 500-1800 m.
Países: ARG(SAL).

Ipomoea padillae O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Ipomoea paludosa O'Donell

Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. f. *apiculata* Chodat & Hassl. *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *integrifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *uliginosa* Chodat & Hassl., *Ipomoea paludosa* O'Donell var. *uliginosa* (Chodat & Hassl.) O'Donell
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Ipomoea pampeana P.P.A. Ferreira & Miotto

Enredadera. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).

Ipomoea paraguariensis Peter

Sin.: *Ipomoea argyrea* (Choisy) Meisn. var. *discolor* Hassl., *Ipomoea argyrea* (Choisy) Meisn. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Ipomoea argyrea* (Choisy) Meisn. var. *paraguariensis* (Peter) Chodat & Hassl., *Ipomoea argyrea* (Choisy) Meisn. f. *salicifolia* Hassl., nom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: PRY(CAU, CAN, GUA, PAI).

Ipomoea paranaensis Hoehne

Sin.: *Ipomoea ramboi* O'Donell
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. subsp. **brasiliensis** (L.) Ooststr.

Sin.: *Convolvulus brasiliensis* L.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. subsp. **pes-caprae**

Sin.: *Convolvulus pes-caprae* L.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA). CHL(IPA).

Ipomoea philomega (Vell.) House

Sin.: *Convolvulus philomega* Vell.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ipomoea platensis Ker Gawl.

Sin.: *Convolvulus platensis* (Ker Gawl.) Spreng., *Ipomoea digitata* L. var. *septempartita* Meisn., nom. illeg., *Ipomoea lineariloba* Peter
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(CEN, SPE). URY(MON, SJO).

Ipomoea plummerae A. Gray var. **cuneifolia** (A. Gray) J.F. Macbr.

Sin.: *Ipomoea cuneifolia* A. Gray, hom. illeg., *Ipomoea minuta* R.E. Fr. f. *adiantifolia* (Ooststr.) O'Donell
Enredadera. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ipomoea plummerae A. Gray var. **plummerae**

Sin.: *Ipomoea minuta* R.E. Fr.
Enredadera. Nativa. 1000-4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Ipomoea procumbens Mart. ex Choisy

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ipomoea procurrans Meisn.

Enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Ipomoea pubescens Lam.Sin.: *Batatas papiru* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Batatas subtriloba* (Ruiz & Pav.)G. Don, *Convolvulus papiru* (Ruiz & Pav.) Spreng., *Convolvulus pubescens* (Lam.) Willd., *Ipomoea papiru* Ruiz & Pav., *Ipomoea papiru* Ruiz & Pav. var. *subtriloba* (Ruiz & Pav.) Pers., *Ipomoea subtriloba* Ruiz & Pav., *Pharbitis pubescens* (Lam.) Choisy

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ipomoea purpurea (L.) RothSin.: *Convolvulus purpureus* L., *Ipomoea glandulifera* Ruiz & Pav., *Ipomoea hirsutula* J. Jacq., *Ipomoea purpurea* (L.) Roth var. *diversifolia* (Lindl.) O'Donell, *Pharbitis diversifolia* Lindl., *Pharbitis hispida* (Zuccagni) Choisy, *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt

Enredadera. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, RME). URY(MON, PAY).

Ipomoea quamoclit L.

Enredadera. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Ipomoea ramosissima (Poir.) ChoisySin.: *Convolvulus ramosissimus* Poir., *Ipomoea dichotoma* Choisy, nom. illeg., *Ipomoea ramosissima* (Poir.) Choisy f. *rosea* (Hallier f.) O'Donell, *Ipomoea ramosissima* (Poir.) Choisy var. *rosea* Hallier f.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

Ipomoea riograndensis P.P.A. Ferreira & Miotto

Enredadera. Endémica. 300-500 m.

Países: BRA(RGS).

Ipomoea rojasii Hassl.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAA, CON, COA).

Ipomoea rubens ChoisySin.: *Ipomoea riparia* G. Don, *Ipomoea villicalyx* N.E. Br.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(CEN).

Ipomoea rubriflora O'Donell

Enredadera. Nativa. 500-3400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Ipomoea saopaulista O'DonellSin.: *Ipomoea paulistana* O'Donell, nom. illeg.

Enredadera. Nativa. 100-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Ipomoea schulziana O'Donell

Enredadera. Nativa. 800-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Ipomoea setifera Poir.Sin.: *Calystegia setifera* (Poir.) Meisn., *Convolvulus ruber* Vahl, *Convolvulus setifer* (Poir.) Spreng., *Ipomoea assumptionis* Britton, *Ipomoea rubra* (Vahl) Millsp.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, APY, ITA).

Ipomoea setosa Ker Gawl.Sin.: *Batatas setosa* (Ker Gawl.) Lindl., *Calonyction pavonii* (Choisy) Hallier f., *Calonyction setosum* (Ker Gawl.) Hallier f., *Convolvulus setosus* (Ker Gawl.) Spreng., *Gomphipus setosus* (Ker Gawl.) Raf.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(SCA).

Ipomoea stuckertii O'DonellSin.: *Maripa decemlobata* Stuck. ex Seckt, nom. nud.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, SDE, SLU).

Ipomoea subalata Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA (fuera del área del proyecto). PRY (CON).

Ipomoea subrevoluta ChoisySin.: *Ipomoea dactylophylla* Griseb., *Ipomoea subrevoluta* Choisy f. *acutiloba* Hassl., *Ipomoea subrevoluta* Choisy var. *genuina* Hassl., nom. inval.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CEN, GUA, PAI).

Ipomoea sulina P.P.A. Ferreira & Miotto

Enredadera. Endémica. 700-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Ipomoea syringifolia Meisn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA, PAI).

Ipomoea theodori O'Donell

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(CAU).

Ipomoea tiliacea (Willd.) ChoisySin.: *Convolvulus tiliaceus* Willd.

Enredadera. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ipomoea tricolor Cav.

Enredadera. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, SAL).

Ipomoea triloba L.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA)

Ipomoea turbinata Lag., nom. illeg.Sin.: *Calonyction muricatum* (L.) G.Don, *Convolvulus muricatus* L., *Ipomoea muricata* (L.) Jacq.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Ipomoea uruguayensis Meisn.

Liana. Nativa.

Países: BRA(RGS, SCA).

URY(Desconocida).

Ipomoea valenzuelensis Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(COA, GUA, PAI).

Ipomoea vivianae Krapov.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY).

Ipomoea volcanensis O'Donell

Enredadera. Nativa. 1000-2200 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Ipomoea wrightii A. GraySin.: *Convolvulus heptaphyllus* Roxb., nom. illeg., *Ipomoea gracilipes* Hassl., *Ipomoea pulchella* Roth, *Ipomoea pulchella* Roth var. *lineariloba* Hassl., *Ipomoea radicans* Bertero ex Choisy, *Ipomoea spiralis* House

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(PHA).

Jacquemontia Choisy**Jacquemontia agrestis** (Choisy) Meisn.

Sin.: *Convolvulus agrestis* Choisy, *Jacquemontia diantha* Urb., *Jacquemontia palmeri* S. Watson

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, SAL, SLU). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CEN, CON, PAI).

Jacquemontia anomala O'Donell

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Jacquemontia blanchetii Moric.

Sin.: *Ipomoea filipedunculata* Rusby
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Jacquemontia cataractae Krapov.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

Jacquemontia densiflora (Meisn.) Hallier f.

Sin.: *Jacquemontia densiflora* Rusby, nom. illeg., *Jacquemontia rusbyana* Standl., *Jacquemontia violacea* (Vahl) Choisy var. *densiflora* Meisn.
Enredadera. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CEN, PHA).

Jacquemontia estrellensis Krapov.

Hierba. Nativa.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meisn.

Sin.: *Ipomoea evolvuloides* Moric., *Ipomoea prostrata* Meisn. var. *longepedunculata*, *Jacquemontia decumbens* O'Donell, *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. f. *albiflora* Hassl., nom. superfl., *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. f. *hirsutula* Hassl., *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. f. *tomentosula* Hassl., *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. var. *longepedunculata* Meisn., hom. illeg., *Jacquemontia hirsuta* Choisy var. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Montejacquia evolvuloides* (Moric.)

Roberty

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, ITA, PAI, PHA, SPE).

Jacquemontia ferruginea Choisy

Enredadera. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA).

Jacquemontia frankeana (Schltdl.)

M. Pastore & Sim.-Bianch.
Sin.: *Convolvulus frankeanus* Schltdl.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Jacquemontia fruticulosa Hallier f.

Sin.: *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. f. *angustifolia* Hassl., *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. f. *subsericea* Hassl., *Jacquemontia fruticulosa* Hallier f. f. *viscosissima* Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

Jacquemontia glabrescens (Meisn.)

M. Pastore & Sim.-Bianch.
Sin.: *Jacquemontia grandiflora* Meisn. var. *glabrescens* Meisn.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Jacquemontia guaranitica Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Jacquemontia heterotricha O'Donell

Sin.: *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. var. *tweediei* Meisn.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CON, COA).

Jacquemontia holosericea (Weinm.) O'Donell

Sin.: *Ipomoea holosericea* Weinm.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, GUA).

Jacquemontia linoides (Choisy) Meisn.

Sin.: *Ipomoea linoides* Choisy
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: PRY(AMA).

Jacquemontia lorentzii (Kuntze)

Peter ex O'Donell
Sin.: *Convolvulus lorentzii* Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, COA, PAI).

Jacquemontia martii Choisy

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAA).

Jacquemontia mucronifer (Choisy)

Hallier f.
Sin.: *Convolvulus mucronifer* Choisy
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Jacquemontia paraguayensis Britton

Sin.: *Jacquemontia fusca* (Meisn.) Hallier f. var. *altosiana* Chodat & Hassl., *Jacquemontia fusca* (Meisn.) Hallier f. f. *glabrior* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G. Don

Sin.: *Convolvulus pentanthos* Jacq.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL). PRY(COA, PAI, PHA).

Jacquemontia rojasiana O'Donell

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Jacquemontia selloi (Meisn.) Hallier f.

Sin.: *Ipomoea selloi* Meisn.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

Jacquemontia sphaerostigma (Cav.)

Rusby
Sin.: *Convolvulus sphaerostigma* Cav., *Jacquemontia hirsuta* Choisy var. *adenotricha* Hassl., *Jacquemontia hirsuta* Choisy f. *racemosa* Chodat & Hassl. m *Jacquemontia laxiflora* O'Donell
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON).

Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb.

Sin.: *Convolvulus praelongus* S. Moore, *Jacquemontia mattogrossensis* Hoehne, *Jacquemontia rondonii* Hoehne, *Ipomoea tamnifolia* L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR). PRY(CEN, COA, PHA).

Jacquemontia turneroides (Chodat & Hassl.) Hassl.

Sin.: *Ipomoea turneroides* Chodat & Hassl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, SPE).

Odonellia K.R. Robertson

Odonellia eriocephala (Moric.) K.R. Robertson

Sin.: *Ipomoea eriocephala* Moric.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Operculina Silva Manso

Operculina hamiltonii (G. Don) D.F. Austin & Staples

Sin.: *Ipomoea hamiltonii* G. Don,
Operculina alata (Ham.) Urb. var. *pubescens*
(Pilg.) O'Donell, *Operculina pterodes*
(Choisy) Meisn. f. *pubescens* Pilg.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CON).

Turbina Raf.

Turbina cordata (Choisy) D.F. Austin & Staples

Sin.: *Rivea cordata* Choisy
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Turbina corymbosa (L.) Raf.

Sin.: *Convolvulus corymbosus* L.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

CORIARIACEAE

Coriaria L.

Coriaria ruscifolia L.

Arbusto o arbolito. Endémica. 500-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

CORSIACEAE

Arachnitis Phil., nom. cons.

Arachnitis uniflora Phil.

Sin.: *Arachnitis quetruhuensis* Dimitri
Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

COSTACEAE

Costus L.

Costus arabicus L.

Sin.: *Costus pilgeri* K. Schum., *Costus verschaffeltii* Lem.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).

Costus scaber Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe

Sin.: *Alpinia spiralis* Jacq.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

CRASSULACEAE

Bryophyllum Salisb.

Bryophyllum daigremontianum

(Raym.-Hamet & H. Perrier) A. Berger
Sin.: *Kalanchoe daigremontiana* Raym.-
Hamet & H. Perrier
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, MIS).

Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Schinz

Sin.: *Kalanchoe delagoensis* Eckl. & Zeyh.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, SCA).

Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H. Perrier) Lauz.-March.

Sin.: *Kalanchoe fedtschenkoi* Raym.-
Hamet & H. Perrier
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MIS, SAL).

Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken

Sin.: *Cotyledon pinnata* Lam.,
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Crassula L.

Crassula caudiculata Bacigalupo & Rossow

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). URY(FLA, SJO).

Crassula closiana (Gay) Reiche

Sin.: *Tillaea closiana* Gay
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **connata**

Sin.: *Crassula erecta* (Hook. & Arn.)
Berger, *Crassula minima* (Miers) Reiche,
comb. illeg., *Tillaea connata* Ruiz &
Pav., *Tillaea erecta* Hook. & Arn., *Tillaea
minima* Miers, nom. nud., *Tillaea minima*
Miers ex Hook. & Arn., nom. illeg.,
Tillaea minima Gay
Hierba. Nativa. 0-3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
JUU, LRI, NEU, SAL, SCR, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, LLA, RME). URY(CAS,
LAV, MAL, SOR).

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A.

Berger var. **erectoides** M. Bywater &
Wickens
Hierba. Nativa.
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A.

Berger var. **muscoides** M. Bywater &
Wickens
Sin.: *Tillaea muscosa* Gay, hom. illeg.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Crassula decumbens Thunb.

Sin.: *Crassula ovallei* (Phil.) Reiche,
Crassula radicans (Phil.) Reiche, *Tillaea
ovallei* Phil., *Tillaea radicans* Phil., *Tillaea
rencana* Phil.
Hierba. Nativa.
Países: CHL(VAL).

Crassula drummondii (Torr. & A. Gray) Fedde

Sin.: *Tillaea drummondii* Torr. & A. Gray
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SJU).
CHL(MAU, RME). PRY(PAI). URY(CAS).

Crassula longipes (Rose) M. Bywater & Wickens

Sin.: *Tillaeastrum longipes* Rose
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, SFE).
BRA(RGS). URY(FLA, PAY).

Crassula minutissima (Skotts.) M. Bywater & Wickens
Sin.: *Tillaea minutissima* Skotts.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Crassula moschata G. Forst.
Sin.: *Bulliarda magellanica* DC., nom. nud., *Bulliarda moschata* (G. Forst.) d'Urv., *Crassula magellanica* (Willd. ex Schult.) Macloskie, *Tillaea chilensis* Gay, *Tillaea magellanica* Willd. ex Schult., *Tillaea moschata* (G. Forst.) DC.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(RNE, SCR, TDF).
CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Crassula peduncularis (Sm.) F. Meigen
Sin.: *Bulliarda bonariensis* DC., nom. nud., *Crassula bonariensis* (DC.) Cambess., nom. illeg., *Crassula paludosa* Schltdl. ex Reiche, *Crassula paludosa* Schltdl. ex Dusén, nom. illeg., *Tillaea bonariensis* DC. ex Britton, nom. illeg., *Tillaea paludosa* Schltdl. ex Lechl., nom. nud., *Tillaea peduncularis* Sm., *Tillaea simplex* Phil., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON).

Crassula phascoides (Griseb.) M. Bywater
Sin.: *Crassula androsace* Sparre ex Rossow, *Tristicha phascoides* Griseb.
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Crassula solieri (Gay) F. Meigen
Sin.: *Tillaea solierii* Gay, *Tillaea andicola* Phil., *Crassula andicola* (Phil.) Meigen
Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, RME).

Crassula tillaea Lest.-Garl.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME). URY(MON).

Crassula venezuelensis (Steyerm.) M. Bywater & Wickens
Sin.: *Tillaea venezuelensis* Steyerm.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(COR).

Echeveria DC.

Echeveria peruviana Meyen
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Kalanchoe Adans.

Kalanchoe crenata (Andrews) Haw.
Sin.: *Kalanchoe brasiliensis* Larrañaga, *Vereia crenata* Andrews
Hierba suculenta. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sedum L., nom. cons.

Sedum acre L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Sedum cymatopetalum Fröd.
Hierba. Nativa. 1800-4200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Sedum jujuyense Zardini
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(JUJ).

Sedum mexicanum Britton
Hierba suculenta. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Sedum thartii L.P. Hebert
Hierba. Introducida. 1400-1400 m.
Países: ARG(COR).

CUCURBITACEAE

Abobra Naudin

Abobra tenuifolia (Gillies) Cogn.
Sin.: *Abobra viridiflora* Naudin, *Bryonia tenuifolia* Gillies
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, SLU, SFE, SDE). URY(CAS).

Apodanthera Arn.

Apodanthera anatuyana (Mart. Crov.) Pozner
Sin.: *Melothria anatuyana* Mart. Crov.
Enredadera. Nativa. 100-400 m.
Países: ARG(FOR, SAL, SDE).

Apodanthera hirtella Cogn.
Enredadera. Nativa. 1800-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Apodanthera laciniosa (Schltdl.) Cogn.
Sin.: *Anguria laciniosa* Schltdl.
Enredadera. Nativa. 200-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Apodanthera linearis (Cogn.) Mart. Crov. var. **dissecta** (Cogn.) Belgrano
Sin.: *Apodanthera sagittifolia* (Griseb.) Mart. Crov. var. *dissecta* (Cogn.) Mart. Crov., *Wilbrandia sagittifolia* Griseb. var. *dissecta* (Cogn.) Mart. Crov., *Wilbrandia villosa* Cogn. var. *dissecta* Cogn.
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, SFE).
URY(COL, SJO).

Apodanthera linearis (Cogn.) Mart. Crov. var. **linearis**
Sin.: *Apodanthera sagittifolia* (Griseb.) Mart. Crov. var. *villosa* (Cogn.) Mart. Crov., *Wilbrandia linearis* Cogn., *Wilbrandia sagittifolia* Griseb. var. *villosa* (Cogn.) Mart. Crov., *Wilbrandia villosa* Cogn.
Enredadera. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, SJU, SLU, SFE).
BRA(RGS). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, SJO).

Apodanthera sagittifolia (Griseb.) Mart. Crov.
Sin.: *Wilbrandia sagittifolia* Griseb., *Wilbrandia sagittifolia* Griseb. var. *typica* Mart. Crov., nom. inval.
Enredadera. Endémica. 900-2300 m.
Países: ARG(COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

Apodanthera ulei (Cogn.) Mart. Crov.
Sin.: *Apodanthera catharinensis* Mart. Crov., *Melothria ulei* Cogn., *Wilbrandia dusenii* Harms
Enredadera. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cayaponia Silva Manso, nom. cons.

Cayaponia alarici M.L. Porto
Enredadera. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).

Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart. Crov.
Sin.: *Antagonia sandia* Griseb., *Bryonia bonariensis* Mill., *Bryonia ficifolia* Lam., nom. superfl., *Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart. Crov. f. *dissecta* (Cogn.)

Mart.Crov., *Cayaponia bonariensis* (Mill.)
 Mart.Crov. var. *dissecta* (Cogn.) M.L. Porto,
Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart.Crov. var.
rigida (Cogn.) M.L. Porto, *Cayaponia ficifolia*
 (Lam.) Cogn. var. *dissecta* (Cogn.) Cogn.,
Cayaponia ficifolia (Lam.) Cogn. var. *genuina*
 (Cogn.) Cogn., *Cayaponia ficifolia* (Lam.)
 Cogn. var. *rigida* (Cogn.) Cogn., *Cayaponia*
sandia Griseb., *Trianosperma ficifolia* (Lam.)
 Cogn. var. *dissecta* Cogn., *Trianosperma*
ficifolia (Lam.) Cogn. var. *genuina* Cogn.,
 nom. inval., *Trianosperma ficifolia* (Lam.)
 Cogn. var. *rigida* Cogn., *Trianosperma*
hilarianum Naudin

Enredadera. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE,
 ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE,
 TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, COA).
 URY(CAS, FLO, LAV, MAL, MON, PAY,
 RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).

Cayaponia breviloba (Griseb. ex
 Cogn.) Pozner

Sin.: *Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn.
 ex Griseb. var. *breviloba* Griseb. ex Cogn.
 Enredadera. Endémica.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Cayaponia cabocla (Vell.) Mart.

Sin.: *Bryonia cabocla* Vell., *Cayaponia*
cordifolia Cogn., *Cayaponia glaziovii* Cogn.
 Enredadera. Nativa. 0-1100 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cayaponia citrullifolia (Griseb.)

Cogn. ex Griseb.
 Sin.: *Antagonia citrullifolia* Griseb.,
Cayaponia citrullifolia (Griseb.) Cogn. ex
 Griseb. var. *genuina* Cogn., nom. inval.,
Cayaponia latifolia Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
 ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE,
 SDE, TUC). BRA(Fuera del área del
 proyecto). PRY(APA, APY, CAN, CEN,
 CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(CAS,
 MON, PAY).

Cayaponia diversifolia (Cogn.) Cogn.

Sin.: *Trianosperma diversifolia* Cogn.,
Trianosperma diversifolia Cogn. var.
subintegrifolia Cogn.

Enredadera. Nativa. 100-1400 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS).
 PRY(APA, CAN, PAI).

Cayaponia espelina (Silva Manso) Cogn.

Sin.: *Perianthopodus espelina* Silva Manso
 Enredadera. Nativa. 0-900 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA,
 CAU, CAN, SPE).

Cayaponia fluminensis (Vell.) Cogn.

Sin.: *Bryonia fluminensis* Vell.
 Enredadera. Nativa. 1500 m.
 Países: BRA(SCA).

Cayaponia glandulosa (Poepp. &
 Endl.) Cogn.

Sin.: *Bryonia glandulosa* Poepp. &
 Endl., *Cayaponia ottoniana* Cogn.,
Cayaponia poeppigii Cogn., *Cayaponia*
tomentosa Cogn.
 Enredadera. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Cayaponia martiana (Cogn.) Cogn.

Sin.: *Bryonia tayuya* Mart., hom.
 illeg., *Cayaponia martiana* (Cogn.) Cogn.
 var. *acutiloba* (Cogn.) Cogn., *Cayaponia*
tibiricae (Naudin) Cogn., *Trianosperma*
martiana Cogn., *Trianosperma martiana*
 Cogn. var. *acutiloba* Cogn., *Trianosperma*
martiana Cogn. var. *genuina* Cogn., nom.
 inval., *Trianosperma tibiricae* Naudin
 Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, ERI, MIS).
 BRA(PAR, RGS). URY(MON, ROC).

Cayaponia membranacea Gomes-Klein

Enredadera. Nativa. 0-300 m.
 Países: BRA(SCA).

Cayaponia palmata Cogn.

Sin.: *Cayaponia biflora* Cogn. ex
 Harms, *Cayaponia laxa* Cogn. ex Harms,
Cayaponia palustris Cogn., nom. nud.,
Cayaponia saldanhaei Cogn.
 Enredadera. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cayaponia pilosa (Vell.) Cogn.

Sin.: *Bryonia pilosa* Vell., *Cayaponia*
diffusa Silva Manso, *Dermophylla elliptica*
 Silva Manso
 Enredadera. Nativa. 200-800 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cayaponia podantha Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR,
 COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE).
 BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, COA,
 PAI, PHA). URY(PAY).

Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn.

Sin.: *Bryonia tayuya* Vell.
 Enredadera. Nativa. 600 m.
 Países: BRA(PAR).

Cayaponia ternata Cogn.

Enredadera. Nativa. 300-600 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cayaponia trifoliolata (Cogn.) Cogn.

Sin.: *Trianosperma trifoliolata* Cogn.
 Enredadera. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cayaponia trilobata (Cogn.) Cogn.

Sin.: *Trianosperma trilobata* Cogn.
 Enredadera. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Cayaponia ulei Cogn. ex Harms

Sin.: *Cayaponia ulei* Cogn. ex Harms
 var. *dentata* Cogn. ex Harms, *Cayaponia*
ulei Cogn. ex Harms var. *subtrilobata*
 Cogn. ex Harms, *Cayaponia ulei* Cogn. ex
 Harms var. *villosa* Cogn. ex Harms
 Enredadera. Endémica. 500-2100 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Cayaponia villosissima Cogn.

Enredadera. Nativa. 500-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Ceratosanthes Burm. ex Adans.

Ceratosanthes hilariana Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR,
 RGS). PRY(APA, AMA, CON).

Ceratosanthes multiloba Cogn.

Sin.: *Ceratosanthes diazii* Lillo,
Ceratosanthes fiebrigii Cogn.,
Ceratosanthes hassleri Cogn.
 Enredadera. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
 SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APA,
 AMA, CAU, PHA). URY(RIV, TAC).

Ceratosanthes palmata (L.) Urb.,

Sin.: *Trichosanthes palmata* L.
 Enredadera. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Citrullus Schrad. ex Eckl. &
 Zeyh., nom. cons.

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.

Sin.: *Cucumis colocynthis* L.
 Enredadera. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COR, SDE).
 PRY(APY).

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. &
 Nakai subsp. **lanatus**

Sin.: *Momordica lanata* Thunb., nom. cons.
 Enredadera. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COR, LPA, SLU).

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai subsp. **vulgaris** (Schrad. ex Eckl. & Zeyh.) Fursa

Sin.: *Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh., *Cucurbita citrullus* L.

Enredadera. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SJU). BRA(RGS).

Cucumis L.

Cucumis anguria L.

Sin.: *Cucumis anguria* Vell., hom. illeg., *Cucumis anguria* L. var. *longipes* (Hook. f.) A. Meeuse, *Cucumis anguroides* M. Roem., *Cucumis arada* L. ex Naudin & F. Muell., *Cucumis echinatus* Moench, nom. illeg., *Cucumis longipes* Hook. f., *Cucumis parviflorus* Salisb., nom. superfl.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU). BRA(SCA). PRY(APY).

Cucumis melo L. var. **dudaim** (L.)

Naudin

Sin.: *Cucumis dudaim* L., *Cucumis odoratissimus* Moench, nom. illeg.

Enredadera. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(COR, ERI, SDE).

Cucumis prophetarum L.

Enredadera. Introducida.

Países: ARG(SJU).

Cucurbita L.

Cucurbita ficifolia Bouché

Enredadera. Introducida. 1000-3000 m.

Países: ARG(SAL).

Cucurbita maxima Duchesne subsp. **andreana** (Naudin) Filov

Sin.: *Cucurbita andreana* Naudin

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LRI, MEN, SDE, SLU). URY(SOR).

Cucurbita maxima Duchesne subsp. **maxima**

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, ERI, JUJ, MEN).

Cucurbita moschata Duchesne

Sin.: *Cucurbita pepo* L. var. *moschata* Duchesne ex Lam.

Enredadera. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, FOR).

Cucurbita pepo L.

Enredadera. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COR, ERI, SJU, SFE).

BRA(PAR).

Cucurbitella Walp.

Cucurbitella asperata (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.

Sin.: *Cucurbita asperata* Gillies ex Hook. & Arn., *Cucurbita urkupinana* Cárdenas, *Cucurbitella cucumifolia* (Griseb.) Cogn., *Cucurbitella durieui* (Naudin) Cogn., *Cucurbitella integrifolia* Cogn., *Cucurbitella integrifolia* Cogn. var. *glabrior* Cogn., *Cucurbitella urkupinana* (Cárdenas) C. Jeffrey, *Prasopepon cucumifolius* Griseb., *Prasopepon durieui* Naudin, *Schizostigma asperatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn.

Enredadera. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(Desconocida). PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA). URY(MON, SOR).

Cyclanthera Schrad.

Cyclanthera eichleri Cogn.

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cyclanthera hystrix (Gillies) Arn.

Sin.: *Momordica hystrix* Gillies

Enredadera. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, PAI). URY(CAS, COL, RNO, TAC).

Cyclanthera oligoechinata L.F.P.

Lima & Pozner

Enredadera. Endémica. 100-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(APY, SPE).

Cyclanthera pedata (L.) Schrad.

Sin.: *Anguria pedatisecta* Ser.,

Cyclanthera digitata Arn., nom. nud., *Cyclanthera edulis* Naudin ex Huber, *Cyclanthera pedata* Arn. var. *edulis* (L.) Schrad., *Momordica pedata* L.

Enredadera. Introducida. 500-2800 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Cyclanthera quinquelobata (Vell.) Cogn.

Sin.: *Cyclanthera boliviensis* Mart.

Crov., *Cyclanthera brasiliensis* Cogn., *Cyclanthera killipii* Standl., *Cyclanthera trianaei* Cogn., *Cyclanthera trigonoloba* Toledo, *Cyclanthera trigonoloba* Toledo var. *caudata* Toledo, *Momordica quinquelobata* Vell.

Enredadera. Nativa. 300-2900 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL).

BRA(PAR).

Cyclanthera tamnifolia Griseb.

Sin.: *Cyclanthera microcarpa* Cogn.

Enredadera. Nativa. 700-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cyclanthera tenuifolia Cogn.

Sin.: *Cyclanthera kuhlmanniana* J.M. Toledo & Barboza

Enredadera. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cyclanthera tenuisejala Cogn.

Sin.: *Cyclanthera elegans* Cogn.,

Cyclanthera elegans Cogn. var. *genuina* Cogn., nom. inval., *Cyclanthera elegans* Cogn. var. *grandifolia* Cogn., *Cyclanthera elegans* Cogn. var. *obtusiloba* Cogn., *Cyclanthera elegans* Cogn. var. *warmingii* Cogn., *Cyclanthera tonduzii* Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Echinopepon Naudin

Echinopepon disjunctus Pozner

Enredadera. Endémica. 400-600 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Echinopepon racemosus (Steud.) C. Jeffrey

Sin.: *Echinocystis araneosa* Griseb.,

Echinocystis muricata Cogn., *Echinocystis racemosa* (Steud.) Mart. Crov., *Momordica muricata* Vell., hom. illeg., *Momordica racemosa* Steud.

Enredadera. Nativa. 300-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, SCA).

Fevillea L.

Fevillea passiflora Vell.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Fevillea trilobata L.

Sin.: *Fevillea cordifolia* Vell., hom. illeg., *Hypanthera guapeva* Silva Manso, *Nhandiroba trilobata* (L.) Kuntze
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA).

Halosicyos Mart. Crov. emend. Ruiz Leal**Halosicyos ragonesei** Mart. Crov.

emend. Ruiz Leal
Enredadera. Endémica. 700-900 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

Lagenaria Ser.**Lagenaria siceraria** (Molina) Standl.

Sin.: *Cucurbita lagenaria* L., *Cucurbita leucantha* Lam., nom. illeg., *Cucurbita siceraria* Molina, *Lagenaria leucantha* Rusby, nom. illeg., *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. var. *laevisperma* Millán, *Lagenaria vulgaris* Ser., *Lagenaria vulgaris* Ser. subsp. *asiatica* Kobayakova
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAA, PAI). URY(SOR).

Luffa Mill.**Luffa aegyptiaca** Mill.

Sin.: *Momordica cylindrica* L., *Momordica luffa* L.
Enredadera. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN).

Melothria L.**Melothria campestris** (Naudin) H.

Schaef. & S.S. Renner
Sin.: *Melancium campestre* Naudin
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

Melothria candolleana Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, CON, COA, GUA, PHA).

Melothria cucumis Vell.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN). URY(CAS, MON).

Melothria hirsuta Cogn.

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Melothria pendula L.

Sin.: *Melothria fluminensis* Gardner
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA).

Melothria schulziana Mart. Crov.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN).

Melothria uliginosa Cogn.

Enredadera. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, COA, PAI, PHA).

Melothria warmingii Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Melothrianthus Mart. Crov.**Melothrianthus smilacifolius** (Cogn.)

Mart. Crov.
Sin.: *Apodanthera smilacifolia* Cogn.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Momordica L.**Momordica charantia** L.

Sin.: *Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, JUJ, LRI, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, ÑEE).

Pseudocyclanthera Mart. Crov.**Pseudocyclanthera australis** (Cogn.)

Mart. Crov.
Sin.: *Cyclanthera australis* Cogn.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, CON).

Psiguria Neck. ex Arn.**Psiguria ternata** (M. Roem.) C. Jeffrey

Sin.: *Anguria grandiflora* Cogn., *Anguria ternata* M. Roem.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

Pteropepon (Cogn.) Cogn.**Pteropepon parodii** Mart. Crov.

Sin.: *Pteropepon argentinense* Mart. Crov.
Enredadera. Nativa. 1400-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Sicydium Schltldl.**Sicydium gracile** Cogn.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sicydium nereoi Pozner

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Sicyos L.**Sicyos baderoa** Hook. & Arn. var. **ambrosianus** (Skottsb.) Martic. & Quezada

Sin.: *Sicyos bryoniaefolius* Moris var. *ambrosianus* Skottsb.
Enredadera. Endémica. 400-500 m.
Países: CHL(IDE).

Sicyos baderoa Hook. & Arn. var. **baderoa**

Sin.: *Sicyos bryoniaefolius* Moris
Enredadera. Nativa. 0-900 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, JFE).

Sicyos edulis Jacq.

Sin.: *Sechium edule* (Jacq.) Sw.
Enredadera. Nativa.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sicyos ignarus Mart. Crov.

Enredadera. Endémica.
Países: ARG(SAL).

Sicyos kunthii Cogn.

Sin.: *Sicyos parviflorus* Kunth, hom. illeg.
Enredadera. Nativa. 1000-3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Sicyos malvifolius Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-2100 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, SDE, SJU, TUC). URY(MON).

Sicyos odonelli Mart. Crov.
Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Sicyos polyacanthus Cogn.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(PAY, SAO).

Sicyos warmingii Cogn. var.
longispinus Mart. Crov.
Enredadera. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Sicyos warmingii Cogn. var.
warmingii
Sin.: *Sicyos hieronymii* Cogn., nom. nud.
Enredadera. Nativa. 100-3100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(PAR).

Siolmatra Baill.

Siolmatra brasiliensis (Cogn.) Baill.
Sin.: *Alsomitra brasiliensis* Cogn.,
Alsomitra brasiliensis Cogn. var.
pubescens Griseb., *Fevillea triphylla*
Lorentz, nom. nud., *Fevillea triphylla*
Griseb., nom. nud., *Siolmatra brasiliensis*
(Cogn.) Baill. var. *pubescens* (Griseb.)
Cogn., *Siolmatra paraguayensis* Cogn.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del
área del proyecto). PRY(APY, CAN, COA,
GUA, PAI, SPE).

Wilbrandia Silva Manso

Wilbrandia ebracteata Cogn. var.
bracteata Mart. Crov.
Enredadera. Endémica. 300-500 m.
Países: ARG(MIS).

Wilbrandia ebracteata Cogn. var.
ebracteata
Sin.: *Wilbrandia longisepala* Cogn. var.
angustiloba Cogn.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAU, CAN,
GUA, SPE).

Wilbrandia ebracteata Cogn. var.
pedunculata Mart. Crov.
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(PAI, SPE).

Wilbrandia hibiscoides Silva Manso
Enredadera. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Wilbrandia longisepala Cogn.
Enredadera. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Wilbrandia verticillata (Vell.) Cogn.
Sin.: *Momordica verticillata* Vell.,
Wilbrandia riedeli Silva Manso
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA).

CUNONIACEAE

Caldcluvia D. Don

Caldcluvia paniculata (Cav.) D. Don
Sin.: *Dieterica paniculata* (Cav.) Ser. ex
A. DC., *Weinmannia dentata* Ruiz & Pav.
ex López, *Weinmannia paniculata* Cav.
Árbol. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Eucryphia Cav.

Eucryphia cordifolia Cav.
Sin.: *Eucryphia patagonica* Speg.,
Pellinia chilensis Molina, *Pellinia*
cordifolia (Cav.) Molina
Árbol. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Eucryphia glutinosa (Poepp. & Endl.) Baill.
Sin.: *Eucryphia pinnatifolia* Gay, *Fagus*
glutinosa Poepp. & Endl.
Árbol. Endémica.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Lamanonia Vell.

Lamanonia cuneata (Cambess.) Kuntze
Sin.: *Belangeria cuneata* Cambess., *Belangeria*
paraguaiensis Pamp., *Belangeria tomentosa*
Cambess. var. *calvata* Chodat & Hassl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).

Lamanonia ternata Vell.
Sin.: *Belangeria glabra* Cambess.,
Belangeria speciosa Cambess., *Belangeria*
tomentosa Cambess., *Lamanonia*
tomentosa (Cambess.) Kuntze,
Polystemon pentaphyllus D. Don
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(GUA, PAI).

Weinmannia L., nom. cons.

Weinmannia boliviensis R.E. Fr.
Sin.: *Weinmannia hieronymi* Engl.
Árbol. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Weinmannia discolor Gardner
Sin.: *Windmannia discolor* (Gardner)
Kuntze, *Weinmannia paulliniifolia* Pohl
ex Ser. f. *janeirensis* Pamp.
Arbusto. Nativa. 900-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Weinmannia humilis Engl.
Sin.: *Weinmannia microphylla*
Ruiz & Pav. f. *humilis* (Engl.) Pamp.,
Windmannia humilis (Engl.) Kuntze
Arbusto o arbolito. Nativa. 100-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Weinmannia organensis Gardner
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser.
Sin.: *Windmannia paulliniifolia* (Pohl
ex Ser.) Kuntze
Árbol. Nativa. 0-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Weinmannia pinnata L.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Weinmannia trichosperma Cav.
Sin.: *Weinmannia corymbosa* Ruiz &
Pav. ex López, *Windmannia trichosperma*
(Cav.) Kuntze
Árbol. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

CYCLANTHACEAE

Asplundia Harling

Asplundia brachypus (Drude) Harling
Sin.: *Asplundia polymera* (Hand.-Mazz.)
Harling subsp. *reitzii* Harling *Carludovicia*
brachypus Drude
Hierba hemiepífita o rupícola.
Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Asplundia glaucophylla Harling
Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

CYMODOCEACEAE

Halodule Endl.**Halodule wrightii** Asch.

Sin.: *Halodule brasiliensis* Lipkin
Países: BRA(SCA).

CYPERACEAE

Abildgaardia Vahl**Abildgaardia ovata** (Burm. f.) Kral

Sin.: *Abildgaardia monostachya* (L.) Vahl,
Carex ovata Burm. f., *Cyperus monostachyus*
L., *Fimbristylis micrantha* Boeck.,
Fimbristylis monostachya (L.) Hassk.,
Fimbristylis ovata (Burm. f.) J. Kern.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CON,
GUA, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA,
DUR, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR,
TAC, TYT).

Amphiscirpus Oteng-Yeb.**Amphiscirpus nevadensis** (S. Watson)
Oteng-Yeb.

Sin.: *Isolepis oreophila* Phil.,
Schoenoplectus nevadensis (S. Watson)
Soják, *Scirpus nevadensis* S. Watson,
Scirpus nevadensis S. Watson var.
remireoides (Griseb.) Beetle, *Scirpus*
remireoides Griseb.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, NEU, RNE,
SAL, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, MAG).

Androtrichum (Brongn.) Brongn.**Androtrichum giganteum** (Kunth) H.
Pfeiff.

Sin.: *Androcoma speciosa* Nees,
Androtrichum speciosum (Nees) Herter,
Scirpus giganteus Kunth

Hierba palustre. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
ERI, FOR). BRA(RGS, SCA). PRY(COA,
PAI). URY(CAS, COL, FLO, FLA, MON,
RNO, ROC, SJO, SOR).

Androtrichum trigynum (Spreng.)
H. Pfeiff.

Sin.: *Abildgaardia polycephala* Brongn.,
Androtrichum montevidense (Link) H.
Pfeiff., *Androtrichum montevidense*
(Link) Barros, comb. illeg., *Androtrichum*
polycephalum (Brongn.) Kunth,
Comostemon globuliferum (J. Presl & C.
Presl) Nees, *Comostemon montevidense*
(Link) Nees, *Cyperus globuliferum* J.
Presl & C. Presl, *Cyperus preslii* A. Dietr.,
Cyperus trigynum Spreng., *Eriophorum*
montevidense Link, *Scirpus montevidensis*
(Link) C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR,
RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, MAL,
MON, ROC, SJO).

Becquerelia Brongn.**Becquerelia cymosa** Brongn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Becquerelia muricata Nees

Sin.: *Scleria muricata* (Nees) Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bolboschoenus (Asch.) Palla**Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla
subsp. **maritimus**

Sin.: *Bolboschoenus maritimus* (L.)
Palla subsp. *cymosus* (Rchb.) Soják,
Schoenoplectus maritimus (L.) Lye,
Scirpus maritimus L., *Scirpus maritimus*
L. var. *cymosus* Rchb., *Scirpus maritimus*
L. f. *cymosus* (Rchb.) T. Koyama

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(LLA).

Bolboschoenus maritimus (L.)

Palla subsp. **paludosus** (A. Nelson) T.
Koyama

Sin.: *Bolboschoenus paludosus* (A.
Nelson) Oteng-Yeb., *Scirpus maritimus* L.
var. *digynus* Godr., *Scirpus maritimus* L.
var. *paludosus* (A. Nelson) Kük., *Scirpus*
paludosus A. Nelson, *Scirpus robustus*
Pursh var. *paludosus* (A. Nelson) Fernald

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, FOR,
LPA, MEN, RNE, SFE, TUC). BRA(RGS).

Bolboschoenus robustus (Pursh) Soják

Sin.: *Bolboschoenus robustus* (Pursh)

T. Koyama, comb. superfl., *Schoenoplectus*
robustus (Pursh) M.T. Strong, *Scirpus*
maritimus L. var. *macrostachyus* (Lam.)
Michx., *Scirpus maritimus* L. var. *robustus*
(Pursh) Kük., *Scirpus robustus* Pursh

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, FOR, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).
URY(MON, SJO).

Bulbostylis Kunth**Bulbostylis amambayensis** Barros

Sin.: *Bulbostylis spectabilis* Kral & M.T.
Strong

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

Bulbostylis arenaria (Nees) Lindm.

Sin.: *Isolepis arenaria* Nees, nom. nud.,
Oncostylis arenaria Nees

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Bulbostylis aspera M.G. López

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, PAI, SPE).

Bulbostylis brevifolia Palla

Sin.: *Bulbostylis aphylla* Barros

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON,
COA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(TAC).

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke
var. **capillaris**

Sin.: *Abildgaardia capillaris* (L.) Lye,
Fimbristylis capillaris (L.) A. Gray,
Fimbristylis tenella Raddi, *Isolepis capillaris*
(L.) Roem. & Schult., *Scirpus capillaris* L.,
Stenophyllus capillaris (L.) Britton

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU,
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, PAI). URY(ART, CLA, FLA,
MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SJO, TAC).

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke
var. **microstachys** (Boeck.) Barros

Sin.: *Scirpus microstachys* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS).

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke
var. **pyriformis** C.B. Clarke ex Lindm.

Sin.: *Fimbristylis capillaris* (L.) A. Gray var.
pyriformis (C.B. Clarke ex Lindm.) Hauman

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SDE). PRY(CEN, COA).

Bulbostylis communis M.G. López var. **scabrida** M.G. López & D.A. Simpson
Hierba. Nativa. 400-1200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, ITA, PAI, PHA).

Bulbostylis communis M.G. López & D.A. Simpson var. **communis**
Sin.: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke var. *elatior* (Griseb.) Osten, *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke f. *fasciculata* Osten, *Scirpus capillaris* L. var. *elatior* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, ITA, PHA). URY(ART, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, TAC).

Bulbostylis conifera (Kunth) C.B. Clarke
Sin.: *Fimbristylis conifer* Kunth
Hierba rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Bulbostylis conostachya (Boeckeler) Beetle
Sin.: *Isolepis conostachya* Boeckeler
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Bulbostylis consanguinea (Kunth) C.B. Clarke
Sin.: *Isolepis consanguinea* Kunth, *Oncostylis kunthiana* Nees, *Scirpus consanguineus* (Kunth) Boeck.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA). URY(TYT).

Bulbostylis contracta (Osten) M.G. López & D.A. Simpson
Sin.: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke var. *contracta* (Kük. ex Osten) Barros, *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke f. *contracta* Kük. ex Osten, *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B. Clarke f. *stenantha* Kük. ex Barros, *Bulbostylis juncooides* (Vahl) Kük. ex Herter f. *leuocarpa* (Barros) Barros
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LRI, SLU, SDE). URY(MON).

Bulbostylis eleocharoides Kral & M.T. Strong
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Bulbostylis edwalliana (Boeckeler) Prata
Sin.: *Scirpus edwallianus* Boeckeler
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Bulbostylis fendleri C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Bulbostylis fimbriata (Nees) C.B. Clarke
Sin.: *Oncostylis fimbriata* Nees
Hierba. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Bulbostylis funckii (Steud.) C.B. Clarke
Sin.: *Bulbostylis tenuispicata* (Boeck.) Barros, *Isolepis funckii* Steud., *Scirpus tenuispicatus* Boeck.
Hierba. Nativa. 1800-2100 m.
Países: ARG(COR, TUC).

Bulbostylis guaglianoneae M.G. López
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(MIS).

Bulbostylis hirtella (Schrad. ex Schult.) Urb.
Sin.: *Bulbostylis langsdorffiana* (Kunth) C.B. Clarke, *Isolepis hirtella* Schrad. ex Schult., *Isolepis langsdorffiana* Kunth, *Oncostylis hirtella* (Schrad. ex Schult.) Nees, *Scirpus hirtellus* (Schrad. ex Nees) Boeck., *Stenophyllus hirtellus* (Schrad. ex Schult.) H. Pfeiff.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, COA, GUA, SPE).

Bulbostylis jacobinae (Steud.) Lindm.
Sin.: *Fimbristylis jacobinae* Steud., *Scirpus glaucophyllus* Boeck.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B. Clarke
Sin.: *Isolepis junciformis* Kunth, *Oncostylis junciformis* (Kunth) Nees var. *humboldtiana* (Spreng.) Nees, *Scirpus humboldtiana* Spreng., *Scirpus junciformis* (Kunth) Poir., comb. illeg., *Scirpus junciformis* (Kunth) Kuntze, comb. illeg., *Scirpus juncooides* Willd. ex Kunth, nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, SPE).

Bulbostylis juncooides (Vahl) Kük. ex Herter f. **hirtella** Osten
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR). URY(CLA, DUR, FLO, SOR, TYT).

Bulbostylis juncooides (Vahl) Kük. ex Herter f. **subfimbriata** Kük. ex Osten
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). URY(TAC).

Bulbostylis juncooides (Vahl) Kük. ex Herter var. **ampliceps** Kük. ex Osten
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(CLA, CLA, RIV).

Bulbostylis juncooides (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**
Sin.: *Bulbostylis glaziovii* (Boeck.) C.B. Clarke, *Bulbostylis juncooides* (Vahl) Kük. ex Osten, comb. superfl., *Bulbostylis juncooides* (Vahl) Kük. ex Herter var. *genuina* Osten, nom. inval., *Schoenus juncooides* Vahl, *Scirpus glaziovii* Boeck., *Scirpus humilis* Willd. ex J. Presl & C. Presl, nom. nud., *Scirpus niederleinianus* Boeck.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, PAI). URY(MON, PAY, SAO, TAC).

Bulbostylis juncooides (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten
Sin.: *Bulbostylis argentina* Palla, *Fimbristylis argentina* (Palla) Molino, *Scirpus lorentzii* Boeck., *Stenophyllus argentinus* (Palla) Killip
Hierba. Nativa. 200-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SDE, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(ITA). URY(CLA, COL, FLA, MON, PAY, SAO, SJO, TYT).

Bulbostylis juncooides (Vahl) Kük. ex Herter var. **nana** (Griseb.) Barros
Sin.: *Scirpus juncooides* Willd. ex Kunth var. *nana* Griseb.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, SLU).

Bulbostylis loefgrenii (Boeck.) Prata & M.G. López
Sin.: *Scirpus loefgrenii* Boeck.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CON, SPE).

Bulbostylis papillosa Kük.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm.Sin.: *Schoenus paradoxus* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR).

Bulbostylis rugosa M.G. López

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CEN, CON, COA, SPE).

Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl)

C.B. Clarke

Sin.: *Fimbristylis scabra* (J. Presl & C. Presl) Hauman & Vanderveken, *Fimbristylis urvilleana* Steud., *Isolepis scabra* J. Presl & C. Presl

Hierba. Nativa. 100-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, ITA, MIE, PHA, SPE). URY(COL, MAL, RNO, RIV, SJO).

Bulbostylis sellowiana (Kunth) PallaSin.: *Fimbristylis sellowiana* (Kunth)Hauman & Vanderveken, *Isolepis sellowiana* Kunth

Hierba. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.)C.B. Clarke var. **brunneo-vaginata**

(Boeck.) C.B. Clarke

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.)C.B. Clarke var. **sphaerocephala**Sin.: *Bulbostylis sphaerocephala* (Boeck.)C.B. Clarke var. *macrocephala* (Maury)Kük. ex Osten, *Bulbostylis sphaerocephala*(Boeck.) C.B. Clarke var. *macrocephala*(Maury) Barros, comb. illeg., *Fimbristylis**brunneo-vaginata* (Boeck.) H. Pfeiff.,*Fimbristylis sphaerocephala* (Boeck.)Hauman & Vanderveken, *Fimbristylis**sphaerocephala* (Boeck.) Hauman &Vanderveken var. *brunneo-vaginata*

(Boeck.) Hauman & Vanderveken,

Scirpus brunneo-vaginatus Boeck.,*Scirpus sphaerocephalus* Boeck., *Scirpus**sphaerocephalus* Boeck. var. *macrocephalus*Maury, *Scirpus setifolius* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Bulbostylis sphaerolepis (Boeck.) BeetleSin.: *Bulbostylis closii* Barros, *Bulbostylis**major* Palla, *Bulbostylis scabra* (J. Presl & C.Presl) C.B. Clarke f. *evolutior* Lindm., *Scirpus**sphaerolepis* Boeck., *Stenophyllus scabrus*(J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff. f. *evolutior*

(Lindm.) H. Pfeiff.

Hierba. Nativa. 700-900 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Bulbostylis stenocarpa Kük.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Bulbostylis subtilis M.G. López

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, ITA, MIE, PAI).

Bulbostylis svenssoniana Steyerm.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Bulbostylis tenuifolia (Rudge)

J.F. Macbr

Sin.: *Bulbostylis capillaris* (L.) C.B.Clarke var. *tenuifolia* (Rudge) C.B.Clarke, *Scirpus tenuifolius* Rudge

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bulbostylis truncata (Nees)

M.T. Strong

Sin.: *Oncostylis truncata* Nees

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Bulbostylis vestita (Kunth) C.B. ClarkeSin.: *Isolepis vestita* Kunth

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bulbostylis wanderleyana Prata &

M.G. López

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Calyptrocarya Nees**Calyptrocarya glomerulata** (Brongn.) Urb.Sin.: *Becquerelia glomerulata* Brongn.,*Calyptrocarya longifolia* (Rudge) Kunth,*Dichromena longifolia* Spreng., *Schoenus**longifolius* Rudge

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, GUA).

Carex L.**Carex acaulis** d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

Carex acutata BoottSin.: *Carex anwandteri* Phil., *Carex foeminea* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(ATA, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Carex aematorhyncha E. Desv. var. **aematorhyncha**Sin.: *Carex campyloxis* Steud., *Carex filiformis* L. subsp. *aematorrhyncha* (E.Desv.) Kük., *Carex potamostauros* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Carex aematorhyncha E. Desv. var. **corralensis** (Phil.) Kük.Sin.: *Carex corralensis* Phil., *Carex filiformis* L. var. *gracilis* Kurtz ex Kük.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Carex andersonii BoottSin.: *Carex eleopsammodes* Steud.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Carex andina Phil.Sin.: *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *neuquensis* Barros

Hierba. Endémica. 1200-3300 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Carex aphylla KunthSin.: *Carex ebracteata* Phil.

Hierba. Endémica. 700-2700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Carex araucana Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Carex argentina Barros

Hierba. Endémica. 1000-2600 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, RME).

Carex aspericaulis (G.A. Wheeler)

J.R. Starr

Sin.: *Uncinia aspericaulis* G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 900 m.

Países: CHL(JFE).

Carex atropicta Steud.Sin.: *Carex fuegina* Phil., *Carex lechleri* Phil., hom. illeg., *Carex pampae* Kalela, p.p., *Carex peraltae* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, AIS, MAG, RME).

Carex aureolensis Steud.Sin.: *Carex atrovirens* Boeck., *Carex involucrata* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(Desconocida).

Carex austroamericana G.A. WheelerSin.: *Carex andina* Phil. var.*subabscondita* Kük., p.p.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Carex banksii Boott var. **abbreviata** Kük.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(NEU).

Carex banksii Boott var. **banksii**Sin.: *Carex germana* Boott, *Carex trifida* Franch., hom. illeg., *Carex trifida* Cav. var. *franchetii* Kurtz

Hierba. Endémica. 0-1900 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Carex banksii Boott var. **fonkii** (Phil.) Kük.Sin.: *Carex fonkii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAG).

Carex banksii Boott var. **gilliesii**

(Phil.) Kük.

Sin.: *Carex dessaueri* Phil., *Carex gilliesii* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: CHL(RME).

Carex berteroa E. Desv.Sin.: *Carex colchaguensis* Phil., *Carex moelleri* Phil., *Carex pungens* Boeck., *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *berteroana* (E. Desv.) Gunckel, *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *colchaguensis* (Phil.) Kük., *Carex setifolia*Kunze ex Kunth var. *pungens* (Boeck.) Kük.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Carex berteroniana Steud.Sin.: *Carex paleata* Boott

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(JFE).

Carex boelckeiana Barros

Hierba. Endémica. 2000-2100 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Carex boliviensis Van Heurck & Müll. Arg.Sin.: *Carex galbana* L.H. Bailey, *Carex lorentziana* Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-2300 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. **bonariensis**Sin.: *Carex papillosa* Nees

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, BIO, ARA). PRY(CAN, PHA). URY(CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

Carex bonariensis Desf. ex Poir. var. **glabrescens** Kurtz ex Kük.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(COR, TUC).

Carex brachycalama Griseb.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(COR).

Carex bracteosa Kunze ex Kunth

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Carex brasiliensis A. St.-Hil.Sin.: *Carex gynacandra* H. Pfeiff., *Carex procera* Kunth, *Carex tetrasticha* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA). URY(RIV).

Carex brongniartii KunthSin.: *Carex hypoxanthus* Steud., *Carex muehlenbergii* Brongn., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, DFE, ERI, MIS, TUC). BRA(RGS). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO, ROC, TAC).

Carex caduca BoottSin.: *Carex caduca* Boott var. *ortegae* (Phil.) Kük., *Carex ortegae* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Carex camptoglochin V.I. Krecz.Sin.: *Carex microglochin* Wahlenb. subsp. *fuegina* Kük., *Carex microglochin* Wahlenb. var. *oligantha* (Boott)Kük., *Carex oligantha* Boott, *Uncinia microglochin* (Wahlenb.) Spreng. var. *fuegina* (Kük.) Macloskie

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(LRI, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(LLA, AIS, MAG).

Carex canescens L.Sin.: *Carex canescens* L. var. *alpicola* Kurtz, hom. illeg., *Carex canescens* L. var. *curta* (Gooden.) Macloskie, *Carex canescens* L. var. *dubia* Kük., hom. illeg., *Carex canescens* L. var. *fallax* Kurtz ex Kük., *Carex canescens* L. var. *robustior* Blytt ex Andersson, *Carex curta* Hook. f., hom. illeg., *Carex curta* Gooden. var. *robustior* (Blytt ex Andersson) D.M. Moore & Chater, *Carex similis* d'Urv., *Carex skottsbergii* Gand.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Carex capitata L.Sin.: *Carex antarctogena* Roiv., *Carex arctogena* Harry Sm., *Carex capitata* L. f. *arctogena* (Harry Sm.) Raymond, *Carex rahuiensis* Kurtz ex V.I. Krecz.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Carex catamarcensis C.B. Clarke ex Kük.Sin.: *Carex latibracteolata* Kük.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, TUC). CHL(COQ).

Carex catharinensis Boeck.Sin.: *Carex fuscula* d'Urv. subsp. *catharinensis* (Boeck.) Luceño & M.V. Alves

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS).

Carex chilensis Brongn. ex DuperreySin.: *Carex incrassata* Schltdl., *Carex riparia* Curtis var. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük., *Carex riparia* Curtis subsp. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey)

Kük., *Carex riparia* Curtis f. *incrassata* (Schltdl.) Kük., *Carex vacillans* Steud.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, MIS, NEU, RNE, SFE, SJU). BRA(RGS). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS). PRY(PAI). URY(CAS, MON, RNO, SJO, SOR).

Carex chillanensis Phil.

Sin.: *Carex melanolepis* Phil., *Carex vulgaris* R.E. Fr.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, AIS, MAG, RME).

Carex crassiflora Kük.

Sin.: *Carex brunnescens* Boeck., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Carex darwinii Boott var. **darwinii**

Sin.: *Carex incompta* Franch.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Carex darwinii Boott var. **serranoi**

(Phil.) Kük.

Sin.: *Carex darwinii* Boott var.

robustior Kük., *Carex serranoi* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(LLA, AIS, MAG).

Carex darwinii Boott var. **urolepis**

(Franch.) Kük.

Sin.: *Carex darwinii* Boott var. *aristata* C.B. Clarke ex Kük., *Carex urolepis* Franch.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(LLA, AIS, MAG).

Carex decidua Boott

Sin.: *Carex decidua* Boott var. *minor*

Kük., *Carex pedicellata* Phil., *Carex rahmeri* Phil., *Carex vulgaris* R.E. Fr. var. *antucensis* Kük.

Hierba. Endémica. 0-2400 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Carex delacosta Kuntze

Sin.: *Uncinia brevicaulis* (Thouars)

Kunth var. *macloviana* (Gaudich.) C.B.

Clarke, *Uncinia delacosta* Steud., nom.

nud., *Uncinia macloviana* Gaudich.,

Uncinia montana Phil.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Carex distenta Kunze ex Kunth

Sin.: *Carex fuscula* d'Urv. var. *distenta* (Kuntze ex Kunth) Kük., *Carex huitensis*

Steud., *Carex pseudopunctata* Boeck.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU, TDF). BRA(SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS). URY(LAV, MAL).

Carex divisa Huds.

Sin.: *Carex praegracilis* W. Boott

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI). URY(MON).

Carex divulsa Stokes

Sin.: *Carex divulsa* Gooden., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI).

Carex dolichophylla J.R. Starr

Sin.: *Uncinia bella* Phil., *Uncinia*

bracteosa Phil., *Uncinia macrophylla*

Steud., *Uncinia phalaroides* C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 100-1100 m.

Países: CHL(BIO, LLA).

Carex dusenii Kük. ex Dusén

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SCR).

Carex erinacea Cav.

Sin.: *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers.,

Uncinia erinacea (Cav.) Pers. var.

angustata Kük., *Uncinia erinacea* (Cav.)

Pers. var. *longifolia* (Kük.) C.B. Clarke,

Uncinia longearistata Steud., *Uncinia*

longifolia Kunth, *Uncinia macrotricha*

Franch., *Uncinia philippii* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI,

LLA, AIS, MAG).

Carex excelsa Poepp. ex Kunth

Sin.: *Carex lechleri* Steud., *Carex*

pseudocyperus L. var. *haenkeana* (J. Presl &

C. Presl) Kük., *Carex pseudocyperus* L. var.

lechleri Boott, *Carex psilostachys* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, MIS,

NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,

BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Carex fecunda Steud.

Sin.: *Carex atropurpurea* Boeck., *Carex*

sedtitiosa Steud. ex Boott

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Carex feddeana H. Pfeiff.

Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *achalensis* Kurtz

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(SJO).

Carex fernandesiana (Nees ex Boeck.)

J.R. Starr

Sin.: *Uncinia angustata* Boeck., *Uncinia*

douglasii Boott, *Uncinia fernandesiana*

Nees ex Boeck.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(JFE).

Carex fernandezensis Mack. ex G.A.

Wheeler

Hierba. Endémica. 300-600 m.

Países: CHL(JFE).

Carex firmicaulis Kalela

Sin.: *Carex andicola* G.A. Wheeler,

Carex nebularum Phil. f. *major* (Kük.)

Kük., *Carex pycnostachya* Kar. & Kir. var. *major* Kük.

Hierba. Endémica. 100-1300 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, LLA).

Carex firmula (Kük.) J.R. Starr

Sin.: *Uncinia gracillis* d'Urv., hom. illeg.,

Uncinia tenuis Poepp. ex Kunth, *Uncinia*

tenuis Poepp. ex Kunth f. *firmula* Kük.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Carex flacca Schreb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Carex fossa G.A. Wheeler

Sin.: *Carex involucrata* Boott,

hom. illeg., *Carex sororia* Kunth var.

involucrata (Boott) Kük.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SAL, SFE). BRA(RGS). URY(LAV, SOR).

Carex fuscula d'Urv. f. **indecora**

(Kunth) Kük.

Sin.: *Carex indecora* Kunth

Hierba. Endémica.

Países: ARG(RNE, TDF). CHL(LLA).

Carex fuscula d'Urv. var.

pseudextensa Kük.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LLA).

Carex fuscula d'Urv. subsp. **fuscula**

Sin.: *Carex calbucana* Phil., *Carex fuscula* d'Urv. f. *elatior* Kurtz, *Carex fuscula* d'Urv. var. *hieronymi* (Boeck.) Kük., *Carex hieronymi* Boeck., *Carex inconspicua* Steud. var. *fuscula* (d'Urv.) Kük., *Carex indecora* Kunth var. *humilis* Kunth, *Carex valdiviana* Phil.
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Carex gayana E. Desv. var. **densa** Kük.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.
 Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, SCR, SJU, TDF). CHL(ATA, LBO, MAU, MAG).

Carex gayana E. Desv. var. **gayana**

Sin.: *Carex nitens* Phil.
 Hierba. Nativa. 0-3500 m.
 Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Carex gayana E. Desv. var. **rufa** Kük.

Sin.: *Carex gayana* E. Desv. var. *taurina* (Phil.) Kük., *Carex taurina* Phil.
 Hierba. Endémica. 500-2300 m.
 Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Carex gayana E. Desv. var.

shedonautos (Steud.) Kük.
 Sin.: *Carex shedonautos* Steud.
 Hierba. Endémica.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAG).

Carex hamata Sw.

Sin.: *Uncinia hamata* (Sw.) Urb., *Uncinia jamaicensis* Pers.
 Hierba. Nativa. 1500-2000 m.
 Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Carex herteri G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: URY(FLA).

Carex hilairei Boott

Sin.: *Carex glazioviana* Boeck., *Carex hilairei* Boott var. *glazioviana* (Boeck.) Kük.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Carex hookeri Kunth

Sin.: *Carex beecheiana* Boott ex E. Desv.
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(VAL, LBO, BIO, LLA, RME).

Carex humahuacaensis G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 3700 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ).

Carex hypoleucos E. Desv.

Sin.: *Carex nebulorum* Phil. var. *kurtziana* (Kük.) Kük., *Carex kurtziana* Kük.
 Hierba. Endémica. 1500-2300 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

Carex hypsipedos C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 3200-4500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Carex inconspicua Steud.

Hierba. Endémica. 0-2800 m.
 Países: ARG(LRI). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Carex kingii (Boott) Reznicek

Sin.: *Uncinia kingii* Boott
 Hierba. Endémica. 700-1000 m.
 Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Carex lamprocarpa Phil.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
 Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Carex lateriflora Phil.

Sin.: *Carex involucrata* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Carex reicheana* Boeck., *Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *lateriflora* (Phil.) Kük., *Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *major* Kük.
 Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Carex lechleriana (Steud.) J.R. Starr

Sin.: *Uncinia lechleriana* Steud.
 Hierba. Endémica. 100-800 m.
 Países: ARG(CHU, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Carex longii Mack. subsp. **meridionalis**

(Kük.) Luceño & M.V. Alves
 Sin.: *Carex albolutescens* Schwein. var. *meridionalis* Kük., *Carex longii* Mack. var. *meridionalis* (Kük.) G.A. Wheeler, *Carex meridionalis* (Kük.) Herter
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BRI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, COL, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SOR, TAC).

Carex macloviana d'Urv. var.

macloviana
 Sin.: *Carex allomacros* Steud., *Carex festiva* Dewey, *Carex inciso-dentata* Steud., *Carex*

macloviana d'Urv. f. *bracteata* Kük., *Carex pratensis* Phil., hom. illeg., *Carex propinqua* Nees & Meyen

Hierba. Nativa. 0-3800 m.
 Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Carex macloviana d'Urv. var. **pseudoleporina** Kük.

Sin.: *Carex leporina* L. var. *elatior* Boeck., *Carex leucocarpa* Phil.
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

Carex macloviana d'Urv. var. **thermarum** (Phil.) Kük.

Sin.: *Carex macloviana* d'Urv. var. *incrassata* Kük., *Carex thermarum* Phil.
 Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, TUC). CHL(VAL, MAU, BIO, RME).

Carex macloviformis (G.A. Wheeler) J.R. Starr

Sin.: *Uncinia macloviformis* G.A. Wheeler
 Hierba. Endémica. 1100-1400 m.
 Países: CHL(JFE).

Carex macrorrhiza Boeck.

Sin.: *Carex curvifolia* Boeck., *Carex macrorrhiza* Boeck. var. *simplex* Kük.
 Hierba. Nativa. 2000-4200 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, TUC). CHL(TAR, RME). URY(RIV, SOR).

Carex macrosolen Steud.

Sin.: *Carex macrocarpa* Phil.
 Hierba. Endémica. 0-900 m.
 Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Carex macrotrichoides J.R. Starr

Sin.: *Uncinia chilensis* G.A. Wheeler
 Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA).

Carex magellanica Lam.

Sin.: *Carex atrata* L. var. *magellanica* (Lam.) Wahlenb., *Carex cernua* Phil., hom. illeg.
 Hierba. Nativa. 0-2200 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Carex malmei Kalela

Sin.: *Carex atropicta* Steud. var. *platycarpa* Phil. ex Kük.

Hierba. Endémica. 2600-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, RME).

Carex mandoniana Boeck.

Hierba. Nativa.
Países: ARG(SAL, TUC).

Carex maritima Gunnerus

Sin.: *Carex incurva* Lightf., *Carex incurva* Lightf. var. *melanocystis* (E. Desv.) Kük., *Carex incurva* Lightf. var. *misera* (Phil.) Kük., *Carex melanocystis* E. Desv., *Carex melanocystis* E. Desv. var. *misera* (Phil.) Kük., *Carex misera* Phil., *Carex psammogaea* Steud.

Hierba. Nativa. 200-4200 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, MAG).

Carex meridensis (Steyerm.) J.R. Starr

Sin.: *Carex macrolepis* Decne., nom. nud., *Uncinia macrolepis* Decne., *Uncinia meridensis* Steyerm., *Uncinia smithii* Philcox
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Carex microglochin Wahlenb.

Hierba. Nativa. 200-4100 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(ATA, COQ, AIS, MAG).

Carex minutissima Barros

Hierba. Endémica. 500-1700 m.
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(AIS, MAG).

Carex molinae Phil.

Hierba. Endémica. 2200-2400 m.
Países: CHL(MAU).

Carex monodynamia (Griseb.) G.A. Wheeler

Sin.: *Carex atropicta* Steud. var. *monodynamia* Griseb., *Carex atropicta* Steud. f. *monodynamia* (Griseb.) Kük., *Carex atropicta* Steud. var. *pallescens* Kurtz ex Kük., *Carex atropicta* Steud. f. *pallescens* (Kurtz ex Kük.) Kük.

Hierba. Endémica. 2600-2900 m.
Países: ARG(COR).

Carex moorei G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 600-800 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Carex multifaria (Nees ex Boott) J.R. Starr

Sin.: *Uncinia macrostachya* E. Desv., *Uncinia multifaria* Nees ex Boott, *Uncinia multifaria* Nees ex Boott var. *macrostachya* (E. Desv.) Kük.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, JFE).

Carex multispicata Kunze ex Kunth

Sin.: *Carex acutata* Boott var. *multispicata* (Kunze ex Kunth) Kük.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Carex nebularum Phil.

Hierba. Nativa. 1000-2200 m.
Países: ARG(CHU, COR, JUJ, MEN, NEU, SCR, TUC). CHL(MAU, BIO, AIS, RME).

Carex negeri (Kük.) J.R. Starr

Sin.: *Uncinia negeri* Kük., *Uncinia negeri* Kük. var. *araucana* Gunckel
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, AIS).

Carex nelmesiana Barros

Sin.: *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* Kük., p.p.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Carex niederleiniana Boeck.

Sin.: *Carex acutata* Boott var. *hirtisquama* Kük., *Carex acutata* Boott var. *niederleiniana* (Boeck.) Kük., *Carex tucumanensis* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 2000-2800 m.
Países: ARG(CAT, LRI, RNE, TUC).

Carex ochrostachya Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Carex odontolepis Phil.

Sin.: *Carex banksii* Boott var. *odontolepis* (Phil.) Kük., *Carex promaucana* Phil.
Hierba. Endémica. 100-2300 m.
Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, RME).

Carex otrubae Podp.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(MON).

Carex ownbeyi G.A. Wheeler

Hierba. Nativa. 2500-3800 m.
Países: ARG(TUC).

Carex patagonica Speng.

Hierba. Endémica. 200-1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Carex phalaroides Kunth var. **capitellata** (Boeck.) Kük.

Sin.: *Carex capitellata* Boeck.
Hierba. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Carex phalaroides Kunth var. **elongata** Kük.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).
BRA(RGS). URY(FLA, MAL, MON, SAO, SOR, TYT).

Carex phalaroides Kunth var. **humilis** Boeck.

Hierba. Nativa. 1400-1600 m.
Países: BRA(SCA).

Carex phalaroides Kunth var. **macella** (Kunth) Kük.

Sin.: *Carex macella* Kunth
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LRI). BRA(RGS, SCA). URY(SOR).

Carex phalaroides Kunth subsp.

crassiflora (Kük.) Luceño & M.V. Alves
Sin.: *Carex gibertii* G.A. Wheeler, *Carex phalaroides* Kunth var. *crassiflora* Kük.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(RGS). URY(MON, SJO).

Carex phalaroides Kunth subsp.

moesta (Kunth) Luceño & M.V. Alves
Sin.: *Carex moesta* Kunth, *Carex phalaroides* Kunth var. *moesta* (Kunth) Kük.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, SAO).

Carex phalaroides Kunth subsp.

paraguayensis (Maury) Luceño & M.V. Alves
Sin.: *Carex paraguayensis* Maury, *Carex phalaroides* Kunth var. *paraguayensis* (Maury) Kük.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CAS, FLA, MAL).

Carex phalaroides Kunth subsp. **phalaroides**

Sin.: *Carex chlorolepis* Steud., *Carex schenkiana* Boeck., *Uncinia phalaroides* (Kunth) Nees

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, JFE). PRY(Desconocida). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Carex phleoides Cav.

Sin.: *Uncinia lasiocarpa* Steud. ex Boeck., *Uncinia leptostachya* Phil., *Uncinia longifolia* E. Desv., hom. illeg., *Uncinia montteana* Phil., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *brachytricha* Speg., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *nux-nigra* C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-2700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, NEU, RNE, SAL, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

Carex pisanoi G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(MAG).

Carex pleioneura G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 1900-3400 m.
Países: ARG(SJU). CHL(AYP, TAR, COQ, RME).

Carex plurinervia J.R. Starr

Sin.: *Uncinia costata* Kük.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(JFE).

Carex poeppigii C.B. Clarke ex G.A. Wheeler

Sin.: *Carex lamprocarpa* Phil. var. *rotundata* Kük.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Carex polystachya Sw. ex Wahlenb.

Sin.: *Carex cladostachya* Wahlenb., *Carex cladostachya* Wahlenb. var. *maxima* Kük.
Hierba. Nativa. 800-1400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Carex polysticha Boeck.

Sin.: *Carex pseudocyperus* L. var. *platygluma* C.B. Clarke ex Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *polysticha* (Boeck.) Kük.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN). URY(CLA, CLA,

LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO).

Carex pseudomacloviana G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 2900 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Carex pumila Thunb.

Sin.: *Carex urvillei* Brongn., *Carex sepulta* Phil.
Hierba. Introducida. 0-400 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG).

Carex punicola D.B. Poind., Jim.

Mejías & M. Escudero
Sin.: *Carex phalaroides* Kunth var. *parvula* R. Gross, *Carex umbellata* Schkuhr ex Willd. var. *depressa* Kük.
Hierba. Nativa. 2500-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Carex purpureovaginata Boeck.

Sin.: *Carex sphaerogyna* Baker var. *brasiliensis* H. Pfeiff.
Hierba. Nativa. 1200-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Carex quinquin Jim. Mejías & Dorr

Sin.: *Uncinia chlorostachya* Phil., *Uncinia loliacea* Phil., *Uncinia longispica* Boeck., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *longispica* (Boeck.) C.B. Clarke, *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *trichocarpa* (C.A. Mey.) C.B. Clarke, *Uncinia trichocarpa* C.A. Mey., *Uncinia urvillei* Steud.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LRI).

Carex reichei Kük.

Sin.: *Carex aueri* Kalela
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAU, MAG).

Carex rupicola (Pedersen) G.A. Wheeler

Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var. *rupicola* Pedersen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(CAS).

Carex sagei Phil.

Sin.: *Carex barrosii* Nelves, *Carex flava* L. subsp. *brevirostrata* Kük.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, MAG).

Carex saltaensis R. Gross

Hierba. Endémica. 2500 m.
Países: ARG(SAL).

Carex salticola J.R. Starr

Sin.: *Uncinia andina* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 700-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA).

Carex scabrida J.R. Starr

Sin.: *Uncinia scabriuscula* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 200-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, AIS, JFE).

Carex sellowiana Schltld.

Sin.: *Carex sellowiana* Schltld. var. *tenuis* Boeck., *Uncinia sellowiana* (Schltld.) Nees

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, RNO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Carex seticulmis Boeck.

Sin.: *Carex uleana* Boeck., *Uncinia phyllostachya* Nees
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Carex setifolia Kunze ex Kunth

Sin.: *Carex pissisii* Phil.
Hierba. Nativa. 0-2400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Carex soriano Barros

Hierba. Endémica. 100-800 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Carex sororia Kunth var.

pseudobracteosa (Kük.) Kük.
Sin.: *Carex involucrata* Boott var. *pseudobracteosa* Kük.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).

Carex sororia Kunth subsp. **sororia**

Sin.: *Carex involucrata* Boott var. *submuricata* C.B. Clarke ex Kük.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, RNE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

Carex stuessyi G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 900-1400 m.
Países: CHL(JFE).

Carex subandrogyna G.A. Wheeler & Guagl.

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Carex subantarctica Speng.

Sin.: *Carex chubutensis* C.B. Clarke,
Carex pampae Kalela, p.p.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(AIS, MAG).

Carex subdivulsa (Kük.) G.A. Wheeler

Sin.: *Carex involucrata* Boott var.
subdivulsa Kük., *Carex sororia* Kunth f.
subdivulsa (Kük.) Kük.
Hierba. Nativa. 2500-2800 m.
Países: ARG(LRI, SAL, TUC).

Carex subfuegiana G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 0-2400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU).

Carex toroensis G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(AIS, MAG).

Carex trachycystis Griseb.

Sin.: *Carex bonariensis* Desf. ex Poir. var.
remota Kük., *Carex bonariensis* Desf. ex Poir.
f. *remota* Kük., *Carex bonariensis* Desf. ex
Poir. var. *trachycystis* (Griseb.) Kük.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MEN, RNE, SDE, SFE, TUC). CHL(BIO). PRY(ÑEE, PHA). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, TAC).

Carex transandina G.A. Wheeler

Hierba. Endémica. 300-600 m.
Países: CHL(MAG).

Carex triangula J.R. Starr

Sin.: *Uncinia triquetra* Kük., *Uncinia lechleriana* Steud. var. *triquetra* (Kük.) Kük.
Hierba. Endémica. 100-1300 m.
Países: ARG(CHU, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Carex trichodes Steud. ex Boott

Hierba. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Carex trifida Cav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Carex turbaria J.R. Starr

Sin.: *Uncinia austroamericana* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Carex tweediana Nees

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(COA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).

Carex uruguensis Boeck.

Sin.: *Carex involucrata* Boott var.
angustata Kük., *Carex pseudoechinata* Boeck., *Carex sororia* Kunth subsp.
uruguensis (Boeck.) Luceño & M.V. Alves, *Carex uruguensis* C.B. Clarke, hom. illeg., *Carex uruguensis* Boeck. var.
angustata (Kük.) Kük., *Carex uruguensis* Boeck. var. *pseudoechinata* (Boeck.) Kük.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MON).

Carex vallis-pulchrae Phil. var.

barrosiana G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Carex vallis-pulchrae Phil. var. **vallis-pulchrae**

Sin.: *Carex castellanosi* Barros
Hierba. Endémica. 2000-3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
CHL(ATA, COQ, LBO, MAG, RME).

Carex vixdentata (Kük. ex Osten) G.A. Wheeler

Sin.: *Carex extensa* Gooden. var.
vixdentata Kük.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, RNE, SFE).
BRA(RGS). PRY(CAA). URY(CAS, MAL, MON).

Carex werdermannii Gross

Hierba. Endémica. 1000 m.
Países: CHL(LRI).

Carex wheeleri J.R. Starr

Sin.: *Uncinia araucana* G.A. Wheeler
Hierba. Endémica. 1400-1700 m.
Países: CHL(ARA).

Carpha Banks & Sol. ex R. Br.

Carpha schoenoides Banks & Sol. ex Hook. f.

Sin.: *Carpha alpina* R. Br. var.
schoenoides (Banks & Sol. ex Hook. f.)
Kük., *Carpha viridis* Phil.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Cladium P. Browne

Cladium jamaicense Crantz

Sin.: *Cladium effusum* Torr., *Cladium mariscus* (L.) Pohl subsp. *jamaicense* (Crantz) Kük., *Mariscus jamaicense* (Crantz) Britton, *Rhynchospora arundinacea* Boeck.

Hierba palustre. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(COS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(CAS, MON, ROC).

Cladium mariscus (L.) Pohl

Sin.: *Schoenus mariscus* L.
Hierba acuática. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cryptangium Schrad. ex Nees

Cryptangium junciforme (Kunth)

Boeckeler
Sin.: *Lagenocarpus junciformis* (Kunth) Kuntze
Sin.: *Scleria junciformis* Kunth
Hierba. Nativa. 800-1300 m.
Países: BRA(RGS).

Cryptangium polyphyllum (Nees)

Boeckeler
Sin.: *Acrocarpus polyphyllus* Nees,
Lagenocarpus polyphyllus (Nees) Kuntze
Hierba. Nativa. 200-900 m.
Países: BRA(PAR).

Cryptangium triquetrum Boeckeler

Sin.: *Lagenocarpus triqueter* (Boeck.) Kuntze
Hierba rupícola. Nativa. 900-1300 m
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyperus L.

Cyperus affinis Roem. & Schult.

Sin.: *Cyperus comosus* Poir.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, ITA).

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.

Sin.: *Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl. var. *gigas* (Lindm.) Guagl., *Cyperus argentinus* Boeck., *Cyperus cayennensis* (Lam.) Britton var. *gigas* (Lindm.) Barros, *Cyperus cayennensis* (Lam.) Britton var. *umbellato-flavus* (C.B. Clarke) Barros, *Cyperus cayennensis* (Lam.) Britton, nom. illeg., *Cyperus*

flavomarisculus Griseb., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *aggregatus* (Willd.) Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *angustatus* Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *argentinus* (Boeck.) Kük. ex Osten, *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *gigas* (Lindm.) Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *laevis* (Kunth) Kük., *Cyperus flavus* (Vahl) Nees, nom. illeg., *Cyperus retrorsus* Chapm. var. *australis* (Lindm.) Kük., *Didymia cyperomorpha* Phil., *Kyllinga cayennensis* Lam., *Mariscus aggregatus* Willd., *Mariscus cayennensis* (Lam.) Urb., *Mariscus cylindricus* Elliot var. *australis* Lindm., *Mariscus flavus* Vahl, *Mariscus flavus* Vahl var. *gigas* Lindm., *Mariscus flavus* Vahl f. *umbellato-flava* C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SJO, TAC, TYT).

Cyperus alternifolius L.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS, SCA).

Cyperus andinus Palla ex Kük.

Sin.: *Cyperus achalensis* Hieron.
Hierba. Nativa. 2500-4100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC).

Cyperus andreanus Maury var. **andreanus**

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyperus andreanus Maury var. **capitinduensis** (Maury) Kük.

Sin.: *Cyperus capitinduensis* Maury, *Cyperus ferrugineus* Boeck.
Hierba. Nativa. 100-900 m.
Países: ARG(ERI, JUJ, MIS). BRA(SCA). PRY(APA, CAA).

Cyperus andreanus Maury var. **foliosissimus** (Boeck.) Kük.

Sin.: *Cyperus foliosissimus* Boeck.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Cyperus andreanus Maury var. **yguazuensis** Kük.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Cyperus anisitsii Kük.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(GUA).

Cyperus barrosianus Herter

Sin.: *Cyperus lanceolatus* Poir. var. *tener* (C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.) Kük., *Cyperus tener* (Chodat & Hassl.) Osten ex Herter, hom. illeg., *Pycrus tener* C.B. Clarke ex Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(CLA, COL, MON, TYT).

Cyperus berroi (C.B. Clarke) Barros

Sin.: *Bisboeckelera berroi* (C.B. Clarke) Standl., *Cyperus berroi* (C.B. Clarke) T. Koyama, comb. superfl., *Hoppia berroi* C.B. Clarke
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, DUR, MAL, RNO, ROC, SAO, TAC).

Cyperus bipartitus Torr.

Sin.: *Cyperus argentinus* C.B. Clarke, hom. illeg., *Cyperus lagunetto* Steud., *Cyperus pauper* Phil., hom. illeg., *Cyperus rivularis* Kunth f. *subacaulis* Kük., *Cyperus rivularis* Kunth subsp. *lagunetto* (Steud.) Kük., *Cyperus rivularis* Kunth, *Pycrus bipartitus* (Torr.) C.B. Clarke, *Pycrus lagunetto* (Steud.) C.B. Clarke, *Pycrus rivularis* (Kunth) Palla
Hierba. Nativa. 400-2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, SAL, SLU, TUC).

Cyperus brasiliensis (Kunth) Bauters

Sin.: *Ascolepis brasiliensis* (Kunth) Benth. ex C.B. Clarke, *Ascolepis leucocephala* (Nees) L.T. Eiten, *Platylepis brasiliensis* Kunth, *Platylepis leucocephala* Nees, *Platylepis xanthocephala* Nees
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(COL, RIV).

Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk.

Sin.: *Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük. f. *gracilis* (Boeck.) Kük., *Kyllinga brevifolia* Rottb., *Kyllinga brevifolia* Rottb. var. *longifolia* Boeck., *Kyllinga cruciformis* Schrad. ex Roem. & Schult., *Kyllinga sororia* Kunth, *Kyllinga tenuis* Baldwin
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, GUA, ÑEE, SPE). URY(COL).

Cyperus burkartii Guagl.

Hierba. Nativa. 200-400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Cyperus celluloso-reticulatus Boeck.

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Cyperus cephalanthus Torr. & Hook.

Sin.: *Cyperus laetus* J. Presl var. *cephalanthus* (Torr. & Hook.) Kük., *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl subsp. *cephalanthus* (Torr. & Hook.) Pedersen
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(COS). PRY(CAU, CEN, COA).

Cyperus chalaranthus J. Presl & C. Presl

Sin.: *Cyperus diffusus* Vahl subsp. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) Kük., *Cyperus diffusus* Vahl var. *chalaranthus* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA).

Cyperus compressus L.

Hierba. Nativa. 100-200 m.
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Cyperus cornelii-ostenii Kük. var. **cornelii-ostenii**

Hierba. Nativa. 100-1600 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, CAU, CAN, CEN, COA, PAI).

Cyperus cornelii-ostenii Kük. var. **pilcomayensis** Kük.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE). PRY(APY).

Cyperus corymbosus Rottb. var. **corymbosus**

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyperus corymbosus Rottb. var. **subnodosus** (Nees & Meyen) Kük.

Sin.: *Chlorocyperus cordobensis* Palla, *Cyperus cordobensis* (Palla) Hicken, *Cyperus nodosus* Willd. var. *subnodosus* (Nees & Meyen) Boeck., *Cyperus subnodosus* Nees & Meyen

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, PHA). URY(ART, CLA, COL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Cyperus cyperoides (L.) Kuntze

Sin.: *Scirpus cyperoides* L.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: CHL(IPA).

Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük.

Sin.: *Cyperus tenuifolius* (Steud.)

Dandy ex Exell, *Kyllinga caespitosa* Nees, *Kyllinga flexuosa* Boeck., *Kyllinga pumila* Michx., *Kyllinga tenuifolia* Steud.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA). URY(CLA).

Cyperus difformis L.

Hierba. Introducida. 100-200 m.

Países: BRA(RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, BIO). URY(ROC).

Cyperus digitatus Roxb.

Sin.: *Cyperus digitatus* Roxb. f. *contractior* Kük., *Cyperus digitatus* Roxb. var. *obtusifolius* Kük.

Hierba palustre. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, CHO, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Cyperus distans L. f.

Sin.: *Cyperus purpureo-vaginatus* Boeck., *Cyperus squamulatus* Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyperus drummondii Torr. & Hook.

Sin.: *Cyperus robustus* Kunth, *Cyperus virens* Michx. var. *drummondii* (Torr. & Hook.) Kük., *Cyperus virens* Michx. var. *robustus* (Kunth) Kük.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR).

Cyperus entrerianus Boeck. var. **entrerianus**

Sin.: *Cyperus conoideus* Rich., *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. f. *conoideus* (Rich.) Nees, *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. var. *entrerianus* (Boeck.) Barros, *Cyperus luzulae* (L.) Rottb. ex Retz. var. *tucumanensis* (Boeck.) C.B. Clarke ex

Chodat, *Cyperus surinamensis* Rottb. var. *strictus* Kük., *Cyperus tucumanensis* Boeck.

Hierba palustre. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Cyperus entrerianus Boeck. var. **parvicapitulatus** Kük.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, ERI, FOR, MIS, SAL).

Cyperus eragrostis Lam. var.

compactus (E. Desv.) Kük.

Sin.: *Cyperus lutescens* Phil., hom. illeg., *Cyperus vegetus* Willd. var.

compactus E. Desv., *Cyperus vegetus*

Willd. var. *trigonus* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, COR, MEN, NEU, RNE, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA).

Cyperus eragrostis Lam. var. **eragrostis**

Sin.: *Cyperus compressus* Jacq., *Cyperus declinatus* Moench, *Cyperus eragrostis*

Lam. f. *latifrons* Kük., *Cyperus eragrostis*

Lam. f. *tener* Kük., *Cyperus monandrus*

Roth, *Cyperus vegetus* Willd., *Cyperus*

vegetus Willd. var. *obtusangulus* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Cyperus esculentus L. var. **esculentus**

Sin.: *Cyperus nervosus* Bertol.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyperus esculentus L. var.

leptostachyus Boeck.

Sin.: *Chlorocyperus phymatodes* (Mühlenb.) Palla, *Cyperus esculentus*

L. var. *phymatodes* (Mühlenb.) Kük.,

Cyperus phymatodes Mühlenb.

Hierba. Introducida. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CEN, CHO). URY(ART, CAS, CLA, DUR, MAL, MON, RNO, ROC, SOR, TAC, TYT).

Cyperus esculentus L. var. **macrostachyus** Boeck.

Sin.: *Cyperus esculentus* L. var.

lutescens (Torr. & Hook.) Kük. ex Osten, *Cyperus lutescens* Torr. & Hook.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, DFE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(PAY).

Cyperus felipponei Kük.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).

URY(CAS, FLO, SOR).

Cyperus flavescens L. var. **piceus** (Liebm.) Fernald

Sin.: *Cyperus flavescens* L. var.

paraensis (Nees) Boeck., *Cyperus piceus*

Liebm., *Cyperus tristachyus* Boeck.,

Pycurus flavescens (L.) Rchb. var. *piceus*

(Liebm.) Fernald, *Pycurus paraensis* Nees

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS). BRA(SCA).

PRY(COA). URY(MON, RIV).

Cyperus flavicomus Michx.

Sin.: *Cyperus albomarginatus* (Mart.

& Schrad. ex Nees) Steud., *Cyperus*

albomarginatus (Mart. & Schrad. ex

Nees) Steud. var. *pachyanthemus* Kük., C

Cyperus albomarginatus (Mart. & Schrad.

ex Nees) Steud. var. *sabulosus* (Mart. &

Schrad. ex Nees) Kük., *Cyperus sabulosus*

(Mart. & Schrad. ex Nees) Steud.,

Pycurus albomarginatus Mart. & Schrad.

ex Nees, *Pycurus flavicomus* (Michx.)

C.D. Adams, *Pycurus sabulosus* Mart. &

Schrad. ex Nees

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(ÑEE, SPE).

Cyperus fraternus Kunth

Sin.: *Cyperus reflexus* Vahl var.

fraternus (Kunth) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,

FOR, RNE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,

SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

PRY(AMA, CAN). URY(ART, CAS, CLA,

FLO, PAY, RNO, RIV, SAO).

Cyperus friburgensis Boeck.

Sin.: *Cyperus fusco-ferrugineus* Boeck.,

Cyperus martianus Schrad. ex Nees, hom. illeg.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAA,

CAN, GUA).

Cyperus fuscus L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(BIO).

Cyperus gardneri Nees

Hierba acuática flotante. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Cyperus giganteus Vahl

Sin.: *Chlorocyperus giganteus* (Vahl) Palla
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, ITA, MIE, ÑEE, PHA). URY(ART, CLA, COL, RNO, RIV, ROC, SOR, TAC, TYT).

Cyperus grammicus Kunze ex Kunth

Sin.: *Cyperus parvulus* Steud., *Pycrus grammicus* (Kunze ex Kunth) C.B. Clarke
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Cyperus haspan L. var. **amplissimus** Kük.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, ERI, MIS).
BRA(SCA). PRY(APA, COA).

Cyperus haspan L. var. **coarctatus** Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA). BRA(RGS).
URY(MON).

Cyperus haspan L. var. **haspan**

Sin.: *Cyperus adenophorus* Schrad., *Cyperus americanus* (Boeck.) Palla, *Cyperus autummalis* (Rottb.) Vahl, *Cyperus cayennensis* Willd. ex Link, *Cyperus efoliatus* Boeck., *Cyperus haspan* L. subsp. *juncoides* (Lam.) Kük., *Cyperus haspan* L. var. *adenophorus* (Schrad.) Kük., *Cyperus haspan* L. var. *americanus* Boeck., *Cyperus haspan* L. var. *riparius* (Schrad. ex Nees) Kük., *Cyperus juncoides* Lam., *Cyperus riparius* Schrad. ex Nees, *Scirpus autumnalis* Rottb., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.

Sin.: *Carex hermaphrodita* Jacq., *Cyperus hermaphroditus* (Jacq.) Standl. var. *longespicus* (Boeck.) Kük., *Cyperus incompletus* Link, *Cyperus longespicus*

Boeck., *Kyllinga incompleta* Jacq., *Cyperus ruizianus* Boeck., *Mariscus hermaphroditus* (Jacq.) Urb., *Mariscus jacquinii* Kunth

Hierba. Nativa. 0-2600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, ITA).

Cyperus hieronymi Boeck.

Hierba. Endémica. 900-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).

Cyperus imbricatus Retz.

Sin.: *Cyperus imbricatus* Retz. var. *viridispicatus* (Boeck.) Kük., *Cyperus involucratu* Poir., *Cyperus radiatus* Vahl, *Cyperus viridispicatus* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, MAU, LLA, RME). PRY(APY, APA, ITA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, FLO, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Cyperus incomtus Kunth var. **incomtus**

Sin.: *Cyperus cinereus* Maury, *Cyperus curvifolius* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC, TYT).

Cyperus incomtus Kunth var.

venturii (Kük.) Barros
Sin.: *Cyperus venturii* Kük.
Hierba. Endémica. 500-1200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, TUC).

Cyperus infucatus Kunth

Hierba. Nativa. 1300-1800 m.
Países: ARG(TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

Cyperus inops C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 200-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyperus intricatus Schrad. ex Schult.

Sin.: *Cyperus chamissoi* Schrad. ex Nees, *Cyperus ciliolatus* Boeck., *Cyperus consanguineus* Kunth var. *chamissoi* (Schrad. ex Nees) Kük., *Cyperus consanguineus* Kunth var. *usterii* (Palla) Kük., *Cyperus consanguineus* Kunth var. *varius* (Boeck.) Kük., *Cyperus*

consanguineus Kunth, *Cyperus longicaulis* Boeck., *Cyperus reflexus* Vahl var. *intricatus* (Schrad. ex Schult.) Kük., *Cyperus schenckianus* Boeck., *Cyperus schraderi* Herter, hom. illeg., *Cyperus usterii* Palla, *Cyperus varius* Boeck., *Cyperus virens* Michx. var. *widgrenii* (Boeck.) C.B. Clarke ex Barros, *Cyperus widgrenii* Boeck.

Hierba. Nativa. 1300-1800 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyperus involucratus Rottb.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, MEN, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT, MAU, LLA, RME).

Cyperus iria L.

Sin.: *Cyperus panicoides* Lam.
Hierba. Introducida. 100-1600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART).

Cyperus laevigatus L.

Sin.: *Acorellus laevigatus* (L.) Palla, *Acorellus pallae* Kneuck., *Chlorocyperus laevigatus* (L.) Palla, *Cyperus laevigatus* L. f. *reptans* C.B. Clarke, *Cyperus laevigatus* L. var. *junciformis* C.B. Clarke, *Cyperus laevigatus* L. var. *pallae* (Kneuck.) Kük., *Cyperus laevigatus* L. var. *reptans* (C.B. Clarke) Kük., *Cyperus mucronatus* Rottb., *Juncellus laevigatus* (L.) C.B. Clarke var. *junciformis* C.B. Clarke, *Juncellus laevigatus* (L.) C.B. Clarke var. *reptans* (Boeck.) C.B. Clarke, *Juncellus laevigatus* (L.) C.B. Clarke, *Pycrus laevigatus* (L.) Nees, *Pycrus mucronatus* (Roxb.) Nees
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, MAU).

Cyperus lanceolatus Poir.

Sin.: *Cyperus helvus* Liebm., nom. superfl., *Cyperus lepidus* Phil., *Cyperus olfersianus* Kunth var. *maximilianii* Boeck., *Cyperus olfersianus* Kunth, *Pycrus helvus* (Liebm.) C.B. Clarke, *Pycrus lanceolatus* (Poir.) C.B. Clarke, *Pycrus olfersianus* (Kunth) Nees, *Pycrus propinquus* Nees
Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU). PRY(CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, MON, RNO, RIV, SAO, TAC).

Cyperus laxus Lam.

Sin.: *Cyperus diffusus* Vahl, *Cyperus diffusus* Vahl var. *umbrosus* (Lindl. & Nees) Kük., *Cyperus limbatus* Maury, *Cyperus umbrosus* Lindl. & Nees ex Nees
 Hierba palustre. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Cyperus ligularis L.

Sin.: *Cyperus glauco-viridis* Boeck., *Cyperus trigonus* Boeck., *Mariscus ligularis* (L.) Urb., *Mariscus longus* Schrad. ex Nees, *Mariscus rufus* Kunth
 Hierba. Nativa. 0-100 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON, PAI, SPE).

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.

Sin.: *Cyperus bangianus* Gand., *Cyperus sphaerostachys* Link, *Scirpus luzulae* L.
 Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CON, GUA, SPE).

Cyperus manimae Kunth

Sin.: *Cyperus spectabilis* Link var. *coarctatus* Boeck., *Mariscus manimae* (Kunth) C.B. Clarke
 Hierba. Nativa. 700-2700 m.
 Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Cyperus megapotamicus Kunth var.

jaeggii (Boeck.) Kük. ex Barros
 Sin.: *Cyperus jaeggii* Boeck., *Pycnus megapotamicus* (Kunth) Nees var. *jaeggii* (Boeck.) Guagl.
 Hierba acuática. Endémica. 0-300 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(CEN). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, ROC, SJO, SJO, TAC).

Cyperus megapotamicus Kunth var. **megapotamicus**

Sin.: *Cyperus mauryi* Kuntze, *Cyperus nematodes* Cham. & Schrad. ex Nees, nom. nud., *Pycnus megapotamicus* (Kunth) Nees, *Pycnus nematodes* C.B. Clarke
 Hierba palustre. Nativa. 0-900 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Cyperus meridionalis Barros

Sin.: *Cyperus flavus* (Vahl) Nees var. *australis* Osten, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *impolitus* (Kunth) Kük., p.p.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Cyperus meyenianus Kunth

Sin.: *Chlorocyperus paranaguensis* Palla, *Cyperus meyenianus* Kunth var. *breviradiatus* Maury, *Cyperus meyenianus* Kunth var. *oligostachys* (Schrad.) Kük., *Cyperus meyenianus* Kunth var. *paranaguensis* (Palla) Kük., *Cyperus meyenianus* Kunth var. *patentissimus* Kük., *Cyperus palustris* (Schrad.) Kük., hom. illeg., *Cyperus prionensis* Boeck., *Mariscus meyenianus* (Kunth) Nees, *Mariscus oligostachys* Schrad.
 Hierba palustre. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA, PHA). URY(ART, CLA, RNO).

Cyperus mundtii (Nees) Kunth

Sin.: *Pycnus decumbens* T. Koyama, *Pycnus mundtii* Nees
 Hierba. Introducida.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Cyperus mundulus Kunth

Sin.: *Cyperus glaziouianus* Boeck.
 Hierba. Nativa. 0-600 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyperus muniziae G.C. Tucker

Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). PRY(CEN, PAI).

Cyperus niederleinianus Boeck.

Sin.: *Pycnus niederleinianus* (Boeck.) Lindm.
 Hierba. Nativa. 0-900 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(SCA). PRY(COA).

Cyperus niger Ruiz & Pav.

Sin.: *Cyperus biradiatus* Boeck., *Cyperus cimicinus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus longicuris* Boeck., *Cyperus lorentzianus* Boeck. var. *compressus* Boeck., *Cyperus lorentzianus* Boeck. var. *elatus* Boeck., *Cyperus lorentzianus* Boeck., *Cyperus melanostachyus* Kunth f. *variegata* (Kunth) Kurtz, nom. inval., *Cyperus melanostachyus* Kunth, *Cyperus niger* Ruiz & Pav. var. *lorentzianus*

(Boeck.) Kük., *Cyperus pergracilis* Boeck., *Cyperus variegatus* Kunth, *Pycnus cimicinus* (J. Presl & C. Presl) H. Pfeiff., *Pycnus melanostachyus* (Kunth) C.B. Clarke, nom. inval., *Pycnus niger* (Ruiz & Pav.) Cufod., *Pycnus niger* (Ruiz & Pav.) T. Koyama, comb. superfl.
 Hierba. Nativa. 0-2200 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyperus obtusatus (J. Presl & C. Presl) Mattf. & Kük.

Sin.: *Kyllinga obtusata* J. Presl & C. Presl, *Kyllinga peruviana* Lam., *Kyllinga pungens* Link, *Kyllinga rigida* Baldwin, *Kyllinga stricta* Schrad. ex Nees, *Kyllinga tenuis* Boeck., hom. illeg., *Kyllinga vaginata* Lam.
 Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, COA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, COL, CLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

Cyperus ochraceus Vahl

Sin.: *Cyperus ochraceus* Vahl var. *excelsior* Kük.
 Hierba. Nativa. 0-2400 m.
 Países: ARG(CHA, JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, PAI).

Cyperus odoratus L.

Sin.: *Cyperus acicularis* (Nees) Steud., *Cyperus cephalophorus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus conglobatus* Link, *Cyperus densiflorus* G. Mey., *Cyperus engelmannii* Steud., *Cyperus ferax* Rich. subsp. *engelmannii* (Steud.) Kük., *Cyperus ferax* Rich. subsp. *speciosus* (Vahl) Kük., *Cyperus ferax* Rich. var. *acicularis* (Nees) Kük., *Cyperus ferax* Rich. var. *bulbiferus* Barros, *Cyperus ferax* Rich. var. *conglobatus* (Link) Kük., *Cyperus ferax* Rich. var. *maximilianii* (Schrad. ex Nees) Boeck., *Cyperus ferax* Rich., *Cyperus ferox* Vahl, *Cyperus flexuosus* Vahl, *Cyperus hamiltonii* Kunth, *Cyperus huarmensis* (Kunth) M.C. Johnst., *Cyperus jubaeiflorus* Rudge, *Cyperus maximilianii* (Schrad. ex Nees) Griseb., *Cyperus pohlianus* (Nees) Kuntze, *Cyperus speciosus* Vahl, *Diclidium lenticulare* Schrad. ex Nees, *Diclidium lomenteum* Nees, *Diclidium maximilianii* Schrad. ex Nees, *Diclidium odoratum* Schrad. ex Nees, *Diclidium uliginosum* Schrad. ex

Nees, *Mariscus ferax* (Rich.) C.B. Clarke, *Mariscus pohlianus* Nees, *Torulinium confertum* Desv., *Torulinium ferax* (Rich.) Urb., *Torulinium odoratum* (L.) Hooper

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, LRI). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

Cyperus oxylepis Nees ex Steud.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CON, PHA).

Cyperus papyrus L.

Hierba acuática. Introducida.

Países: BRA(RGS).

Cyperus phaeocephalus Griseb.

Sin.: *Cyperus manimae* Kunth var. *phaeocephalus* (Griseb.) O'Neill & Ben. Ayers, *Cyperus phaeocephalus* Griseb. var. *major* Kük., *Mariscus phaeocephalus* (Griseb.) C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Cyperus poeppigii Kunth

Sin.: *Torulinium poeppigii* (Kunth) C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LBO, BIO, RME).

Cyperus pohlii (Nees) Steud.

Sin.: *Mariscus setiglumis* C.B. Clarke, *Papyrus pohlii* Nees

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PHA, SPE). URY(RNO, RIV, ROC, TAC).

Cyperus polystachyos Rottb.

Sin.: *Cyperus elongatus* Steud., *Cyperus paniculatus* Rottb., *Cyperus polystachyos* Rottb. var. *paniculatus* (Rottb.) C.B. Clarke, *Cyperus teretifolius* Steud., *Pycnus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv., *Pycnus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv. subsp. *riograndensis* D.A. Simpson

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY, COA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, ROC, SJO).

Cyperus prolixus Kunth

Sin.: *Comostemon schottii* Nees, *Cyperus amplissimus* Steud., *Cyperus bisumellatus* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

Cyperus redolens Maury

Sin.: *Cyperus flavus* (Vahl) Nees subsp. *redolens* (Maury) Osten, *Mariscus flavus* Vahl var. *humilis* C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, SFE). PRY(APY). URY(MAL, PAY, RIV, SOR).

Cyperus reflexus Vahl

Sin.: *Cyperus haematostachys* Steud., *Cyperus reflexus* Vahl var. *macrostachys* Boeck., *Cyperus reflexus* Vahl f. *major* Maury, *Cyperus sellowii* Link, *Cyperus reflexus* Vahl f. *capitata* Osten

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, RNE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(CAA, CAN, CEN, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Cyperus rigens J. Presl var. **impolitus** (Kunth) Hefler & Longhi-Wagner

Sin.: *Chlorocyperus balansae* (Maury) Palla, *Chlorocyperus serrae* Palla, *Cyperus balansae* Maury, *Cyperus impolitus* Kunth, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *balansae* (Maury) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *capitatus* Boeck., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *hassleri* (C.B. Clarke) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *impolitus* (Kunth) Kük., p.p., *Cyperus wacketii* Kük., *Mariscus balansae* (Maury) C.B. Clarke, *Mariscus hassleri* C.B. Clarke, *Mariscus impolitus* (Kunth) J. Raynal

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, FLO, MAL, MON, RIV, SAO, SJO).

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl var. **rigens**

Sin.: *Chlorocyperus oostachyus* (Nees) Palla, *Cyperus aurescens* Boeck., *Cyperus chilensis* Boeck., *Cyperus conceptionis* Steud., *Cyperus lacustris* Phil., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl f. *contracta* Osten, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl subsp. *oostachyus* (Nees) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *conceptionis* (Steud.) Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *laeviculmis* Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *maximus* Kük., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *parciflorus* Kük., *Cyperus nocha* Phil., *Cyperus oostachyus* Nees, *Cyperus paposanus* Phil., *Cyperus quinquespicatus* Boeck., *Cyperus rancoanus* Phil., *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl subsp. *serrae* (Boeck.) Pedersen, *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *capitatus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *maximus* (Kük.) Pedersen, *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *selmirae* Pedersen, *Cyperus rigens* J. Presl & C. Presl var. *umbellatus* J. Presl & C. Presl, *Cyperus serrae* Boeck., *Cyperus surinamensis* Rottb. var. *formosus* (Vahl) Kük., *Mariscus conceptionis* (Steud.) C.B. Clarke, *Mariscus rigens* (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ANT, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, CLA, COL, FLO, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, SJO, TAC).

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl subsp. **arechavaletae** (Boeck.) Pedersen

Sin.: *Cyperus arechavaletae* Boeck., *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *arechavaletae* (Boeck.) Kük., *Cyperus purpureovariegatus* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(MON).

Cyperus rotundus L.

Sin.: *Chlorocyperus rotundus* (L.) Palla
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, RME). PRY(COA). URY(CAS, MON, PAY, RNO, SOR).

Cyperus sellowianus (Kunth) T. Koyama

Sin.: *Hypolytrum glomeratum* Schrad.
ex Nees, nom. nud., *Lipocarpa glomerata* Nees, *Lipocarpa humboldtiana* Nees, *Lipocarpa sellowiana* Kunth

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, CLA, MON, RNO, RIV, ROC, TAC).

Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük.

Sin.: *Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük. f. *bulbiferus* (Kük.) Kük., *Kyllinga leucocephala* Baldwin, *Kyllinga martiana* Schrad. ex Nees, *Kyllinga monocephala* Kunth, nom. illeg., *Kyllinga odorata* Vahl var. *bulbifera* Kük., *Kyllinga odorata* Vahl var. *genuina* Osten, nom. inval., *Kyllinga odorata* Vahl var. *gracilis* Boeck., *Kyllinga odorata* Vahl var. *rigida* Boeck., *Kyllinga odorata* Vahl, *Kyllinga pellucido-albida* Boeck., *Kyllinga sesquiflora* Torr.

Hierba palustre. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, CHO, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, TYT).

Cyperus shepherdii G.C. Tucker & Gandhi

Sin.: *Mariscus palustris* Schrad.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Cyperus spectabilis Link var. **jujuyensis** Kük.

Hierba. Endémica. 1100-2400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Cyperus sphacelatus Rottb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyperus squarrosus L.

Sin.: *Cyperus aristatus* Rottb., nom. illeg., *Cyperus aristatus* Rottb. var. *inflexus* (H.L. Mühl.) Boeck. ex Kük., *Cyperus inflexus* H.L. Mühl., *Mariscus squarrosus* (L.) C.B. Clarke ex Hook. f., *Scirpus intricatus* L.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, TUC). BRA(Fuera

del área del proyecto). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, LRI, LLA, RME). PRY(APY, CON, COA). URY(CLA, DUR, ROC, SAO, SOR, TAC).

Cyperus strigosus L.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS).

Cyperus subsquarrosus (Muhl.) Batters

Sin.: *Hemicarpha micrantha* (Vahl) Britton, comb. superfl., *Hemicarpha micrantha* (Vahl) Pax, *Hemicarpha subsquarrosa* (Mühlenb.) Nees, *Isolepis micrantha* (Vahl) Roem. & Schult., *Lipocarpa micrantha* (Vahl) G.C. Tucker, *Scirpus micranthus* Vahl, *Scirpus minimus* Pursh, hom. illeg., *Scirpus subsquarrosus* Muhl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(COA). URY(CLA).

Cyperus surinamensis Rottb. var.

lutescens Boeck.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(APY, COA).

Cyperus surinamensis Rottb. var. **surinamensis**

Sin.: *Cyperus denticulatus* Schrad. ex Schult.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PHA). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, PAY, RNO, SAO, TAC).

Cyperus tenuis Sw.

Sin.: *Cyperus caracasanus* Kunth
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, PAI).

Cyperus tweediei C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 200-2700 m.
Países: ARG(TUC). CHL(VAL).

Cyperus uncinulatus Schrad. ex Nees

Sin.: *Cyperus hamatus* Schrad. ex Nees, *Cyperus paraguayensis* C.B. Clarke
Hierba palustre. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA, PAI, SPE). URY(RNO).

Cyperus unicolor Boeck.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(SCA). PRY(APA). URY(PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Cyperus uniolooides R. Br.

Sin.: *Cyperus angulatus* Nees, *Cyperus taubertii* Boeck., *Cyperus bromoides* Willd. ex Link, *Cyperus uniolooides* R. Br. var. *bromoides* (Link) C.B. Clarke, *Pycurus angulatus* (Nees) Nees, *Pycurus uniolooides* (R. Br.) C.B. Clarke

Hierba acuática. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, PAI). URY(PAY, RNO, RIV).

Cyperus virens Michx. var. **minarum** (Boeck.) Denton

Sin.: *Cyperus consanguineus* Kunth var. *minarum* (Boeck.) Kük., *Cyperus minarum* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA).

Cyperus virens Michx. var. **montanus** (Boeck.) Denton

Sin.: *Cyperus montanus* Boeck., *Cyperus uleanus* Boeck.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS, SFE). CHL(BIO).

Cyperus virens Michx. var. **virens**

Sin.: *Cyperus acutangulus* Boeck., *Cyperus baenitzii* Boeck., *Cyperus formosus* Vahl, *Cyperus vegetus* Willd. var. *acutangulus* (Boeck.) Kuntze, *Cyperus virens* Michx. var. *acutangulus* (Boeck.) Kük.

Hierba palustre. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, ARA). PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Cyperus volckmannii Phil.

Sin.: *Cyperus araeus* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ, MAU).

Cyperus xanthostachyus Steud.

Sin.: *Cyperus lechlerii* Steud.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Eleocharis R. Br.

Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. subsp. **acutangula**

Sin.: *Eleocharis fistulosa* (Poir.) Schult., comb. illeg., *Eleocharis planiculmis*

Steud., *Limnochloa acutangula* (Roxb.)
 Nees, *Limnochloa fistulosa* (Poir.) Nees,
 comb. illeg., *Scirpus acutangulus* Roxb.,
Scirpus fistulosus Poir., hom. illeg.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL, SFE,
 TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
 AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA,
 GUA, PAI). URY(CLA, RIV, TAC).

Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult.
 subsp. **brevisetata** Roseng.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS).

Eleocharis angustirostris R. Trevis.
 & Boldrini

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS).

Eleocharis argentina Barros

Hierba. Endémica. 200-700 m.
 Países: ARG(MEN).

Eleocharis atacamensis Phil.

Hierba. Endémica. 500-3600 m.
 Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI,
 MEN, SAL, SCR, SJU). CHL(ANT, ATA,
 COQ, BIO, LLA, MAG).

Eleocharis atobrunnea R. Trevis. &
 S. González

Hierba. Endémica. 0-600 m.
 Países: BRA(RGS).

Eleocharis atropurpurea (Retz.) J.

Presl & C. Presl
 Sin.: *Eleocharis atropurpurea* (Retz.)
 Kunth, comb. superfl., *Eleocharis erratica*
 (Rota ex De Not.) Steud., *Eleocharis*
laetevirens (Nees) Nees ex Steud.,
Eleocharis monandra Hochst. ex Steud.,
Eleogenus atropurpureus (Retz.) Nees,
Eleogenus laetevirens Nees, *Isolepis*
atropurpurea (Retz.) Roem. & Schult.,
Scirpus atropurpureus Retz., *Scirpus*
erraticus Rota ex De Not.

Hierba palustre. Nativa. 100-1100 m.
 Países: ARG(FOR, JUJ, SAL).
 BRA(Fuera del área del proyecto).
 PRY(APY).

Eleocharis baldwinii (Torr.) Chapm.

Sin.: *Chaetocyperus baldwinii* Chapm.
 Hierba. Introducida. 0-100 m.
 Países: URY(MON).

Eleocharis barrosii Svenson

Hierba. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE).
 BRA(SCA).

Eleocharis bicolor Chapm.

Sin.: *Eleocharis minima* Kunth var.
bicolor (Chapm.) Svenson, *Eleocharis*
villaricensis Maury, *Scirpus exiguus*
 Griseb., hom. illeg.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAA, PHA).

Eleocharis bonariensis Nees

Sin.: *Chaetocyperus bonariensis* (Nees)
 Nees, *Chaetocyperus obtusatus* Nees,
Eleocharis aciculariformis Greenm.,
Eleocharis acicularis (L.) Roem. &
 Schult. subsp. *bonariensis* (Nees) Osten,
Eleocharis striatula E. Desv., *Scirpus*
striatulus (E. Desv.) Griseb.

Hierba palustre. Nativa. 0-3000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN,
 MIS, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).
 BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ,
 VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
 PRY(APA, CAU, CAA, CEN, CON, COA,
 GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(CAS, DUR,
 FLA, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).

Eleocharis canindeyuensis Mereles &
 S. González

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(CAN).

Eleocharis capillacea Kunth

Sin.: *Chaetocyperus capillaceus*
 (Kunth) Nees
 Hierba acuática. Nativa. 200-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
 PRY(APA, CAU, CAA, COA, MIE, PAI, SPE).

Eleocharis confervoides (Poir.) Steud.

Sin.: *Rhynchospora ruppoides* Benth.,
Scirpus confervoides Poir., *Scirpus*
submersus C.H. Wright ex Sauvalle,
Websteria confervoides (Poir.) Hooper,
Websteria limnophila C.H. Wright,
Websteria submersa (C.H. Wright ex
 Sauvalle) Britton

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(AMA, CAU).

Eleocharis contracta Maury

Sin.: *Eleocharis nodulosa* (Roth)
 Schult. var. *subnodulosa* Svenson, p.p.,
Eleocharis nodulosa (Roth) Schult. var.
tenuis Boeck., *Eleocharis posadensis* Kük.
 Hierba acuática. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
 DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE,
 TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,

APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, ITA,
 MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, PAY,
 SAO, TAC).

Eleocharis cordillerana S. González,
 Guagl. & Ruthsatz

Hierba. Endémica. 500-900 m.
 Países: CHL(LRI, LLA).

Eleocharis crinalis (Griseb.) C.B. Clarke

Sin.: *Eleocharis brehmeriana* Boeck.,
Scirpus crinalis Griseb.
 Hierba palustre. Nativa. 500-3500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
 SLU, TUC). PRY(AMA, CON).

Eleocharis cylindrica Buckley

Sin.: *Eleocharis spagazzinii* Barros,
Eleocharis texana Britton
 Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE).
 PRY(APY, CAA, CEN, GUA, PAI, PHA).

Eleocharis debilis Kunth

Hierba palustre. Nativa. 200-800 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,
 CAA, CEN, PHA).

Eleocharis densicaespitosa R. Trevis.
 & Boldrini

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI). BRA(RGS).

Eleocharis dombeyana Kunth

Sin.: *Chaetocyperus stoloniferus* Nees,
Eleocharis bivaginata Steud., *Eleocharis*
montana C.B. Clarke, hom. illeg.,
Eleocharis stolonifera (Nees) Boeck.,
Eleocharis truncata Schltdl., *Limnochloa*
truncata (Schltdl.) Liebman.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN,
 SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA, RME).

Eleocharis dunensis Kük.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI,
 SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, FLO,
 FLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).

Eleocharis elegans (Kunth) Roem. &
 Schult.

Sin.: *Scirpus crassiculmis* Griseb.,
Scirpus elegans Kunth
 Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS,
 ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ,
 CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA,
 MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART,
 CLA, PAY, SJO, TAC).

Eleocharis elongata Chapm.

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Eleocharis filiculmis Kunth

Sin.: *Eleocharis balansaiana* Boeck.,
Eleocharis purpureovaginata Boeck.,
Eleocharis rothiana Boeck., *Eleocharis*
sulcata Nees ex Boeck., *Eleocharis sulcata*
Nees, nom. nud., *Eleocharis sulcata*
Nees ex Boeck. var. *filiculmis* (Kunth)
Kurtz, *Scirpidium sulcatum* Nees, *Scirpus*
filiculmis Schrad., nom. nud., *Scirpus*
sulcatus Roth, hom. illeg.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, RNE,
SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Eleocharis flavescens (Poir.) Urb.

Sin.: *Eleocharis albivaginata* Boeck.
var. *flaccida* (Rchb. ex Spreng.) Boeck.,
Eleocharis albivaginata Boeck. var.
humilis Boeck., *Eleocharis albivaginata*
Boeck. var. *stricta* Boeck., *Eleocharis*
arechavaletae Boeck., *Eleocharis flaccida*
(Rich. ex A. Spreng.) Urb., *Eleocharis*
flaccida (Rich. ex A. Spreng.) Urb. var.
arechavaletae (Boeck.) Osten, *Eleocharis*
ochreatea (Nees) Steud., *Eleocharis*
ocreatus Nees var. *flaccidus* Nees,
Eleocharis ocreatus Nees var. *minor*
Nees, *Eleocharis ocreatus* Nees var.
pallens Nees, *Scirpus flaccidus* Rchb. ex
Spreng., *Scirpus flavescens* Poir., *Scirpus*
gaudichaudianus Kunth

Hierba acuática. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(MAU, BIO, RME). PRY(AMA,
CAU, CAA, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI).
URY(CAS, SJO).

Eleocharis fuscopurpurea (Steud.) H. Pfeiff.

Sin.: *Eleocharis hyalinovaginata* Boeck.,
Eleocharis maculosa E. Desv., hom. illeg.,
Eleocharis melanocarpa Phil., *Eleocharis*
univaginata Boeck., *Eleocharis vincentina*
Phil., *Eleocharis vincentina* Phil. var. *arcuata*
(Kuntze) C.B. Clarke, *Isolepis fuscopurpurea*
Steud., *Scirpus desvauxii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN,
SFE, SJU, TUC). CHL(MAU, BIO, LRI,
LLA, JFE).

Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.

Sin.: *Chlorocharis capitata* (R. Br.)
Rikli, *Eleocharis caduca* (Delile) Schult.,
Eleocharis capitata R. Br., *Eleocharis*
caribaea (Rottb.) S.F. Blake, *Eleocharis*
geniculata (L.) Roem. & Schult. var.
minor (Vahl) Roem. & Schult., *Eleocharis*
microformis Buckley, *Eleocharis capitatus*
(R. Br.) Nees ex Wight, *Limnochloa*
geniculata (L.) Nees, *Scirpus brownii*
Spreng., *Scirpus caducus* Delile, *Scirpus*
capitatus Willd., *Scirpus caribaeus* Rottb.,
Scirpus geniculatus L., p.p., *Scirpus*
geniculatus L. var. *minor* Vahl

Hierba palustre. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, CON,
COA, PAI, SPE). URY(Desconocida).

Eleocharis glaucovirens Boeck.

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).
PRY(COA, PAI).

Eleocharis grandirostris (Lindm.) Mereles

Sin.: *Eleocharis sulcata* Nees ex Boeck.
var. *grandirostris* Lindm.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

Eleocharis guaglianioniana J.P.R.

Ferreira, Silv. Venturi & R. Trevis.
Hierba. Endémica. 1300-1400 m.
Países: BRA(SCA).

Eleocharis hatschbachii R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área
del proyecto).

Eleocharis haumaniana Barros

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, RNE, SFE). URY(CAS, COL,
FLA, MON, PAY, RNO, TAC).

Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult.

Sin.: *Scirpus interstinctus* Vahl
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, CON, COA, ÑEE, SPE).

Eleocharis jelskiana Boeckeler

Hierba acuática. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eleocharis kleinii Barros

Hierba. Endémica. 500-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eleocharis laeviglumis R. Trevis. & Boldrini

Hierba palustre. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Eleocharis lechleri Boeck.

Hierba. Nativa. 400-900 m.
Países: ARG(JUJ, RNE, SAL, TUC).
CHL(LRI, LLA).

Eleocharis loefgreniana Boeck.

Sin.: *Eleocharis leptostachys* Lindm.
Hierba. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eleocharis macrostachya Britton

Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR,
ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE,
SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDE, TUC).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, MAG, RME). URY(CAS,
FLA, LAV, MON, PAY, ROC, SJO).

Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult.

Sin.: *Eleocharis gracilis* Nees, *Eleocharis*
lehmanniana Boeck., *Eleocharis maculosa*
(Vahl) Roem. & Schult. var. *genuina*
Osten, nom. inval., *Eleocharis ocreatus*
Nees var. *binocreatus* Nees, *Eleocharis*
ocreatus Nees var. *albo-ater* Nees,
Eleocharis schottianus Nees, *Scirpus*
maculosus Vahl

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
LPA, NEU, RNE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, LLA, JFE).
URY(CAS, MON, RIV).

Eleocharis melanocephala E. Desv.

Sin.: *Scirpus melanocephalus* (E.
Desv.) Griseb.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
NEU, RNE, SAL, TUC). CHL(VAL, MAU,
BIO, ARA, LLA).

Eleocharis melanomphala C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ,
LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TUC).
CHL(RME).

Eleocharis melanostachys (d'Urv.)

C.B. Clarke

Sin.: *Eleocharis funebris* Speg.,
Eleocharis litoralis Phil., *Eleocharis macrorrhiza* Boeck., *Eleocharis simulans* C.B. Clarke, *Eleocharis valdiviana* Phil., *Fimbristylis melanostachys* (C.B. Clarke) Brongn., *Isolepis heteromorpha* Steud., *Scirpus melanostachys* d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ATA, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Eleocharis mendocina Phil.

Hierba. Endémica. 200-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU, TUC).

Eleocharis minarum Boeck.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(MIE).

Eleocharis minima Kunth

Sin.: *Chaetocyperus polymorphus* Nees & Lindl., p.p., *Eleocharis durandii* Boeck., *Eleocharis tenuissima* Boeck., *Eleocharis wrightiana* Boeck.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult.

Sin.: *Eleocharis consanguinea* Kunth, *Eleocharis montana* (Kunth) Roem. & Schult. var. *nodulosa* (Roth) Svenson, *Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult., *Eleocharis nodulosa* (Roth) Schult. f. *trigyna* Barros, *Eleogenus nodulosus* (Roth) Nees, *Scirpus montanus* Kunth, *Scirpus nodulosus* Roth

Hierba acuática. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

Eleocharis montevidensis Kunth

Sin.: *Eleocharis arenicola* Torr., *Eleocharis montana* (Kunth) Roem. & Schult. subsp. *montevidensis* (Kunth) Osten, *Limnochloa montevidensis* (Kunth) Nees

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult.Sin.: *Scirpus mutatus* L.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, PHA, SPE).

Eleocharis nana Kunth

Sin.: *Chaetocyperus punctatus* Nees, *Eleocharis punctata* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). URY(ROC).

Eleocharis neesii R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Eleocharis niederleinii Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA).

Eleocharis nigrescens (Nees) Steud.Sin.: *Scirpidium nigrescens* Nees

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Eleocharis nubigena C.B. Clarke

Sin.: *Eleocharis albibracteata* Nees & Meyen ex Kunth var. *nubigena* (C.B. Clarke) Barros

Hierba. Nativa. 900-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Eleocharis nudipes (Kunth) Palla

Sin.: *Eleocharis grandis* (Nees) Boeck., *Eleocharis pachystyla* C.B. Clarke var. *angustostachya* H. Pfeiff., *Eleocharis pachystyla* C.B. Clarke var. *macrostachya* H. Pfeiff., *Isolepis nudipes* Kunth, *Scirpidium grande* Nees

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, SPE). URY(RNO, RIV, TAC).

Eleocharis obtusa (Willd.) Schult.Sin.: *Scirpus obtusus* Willd.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, SFE).

Eleocharis obtusetrigona (Lindl. & Nees) Steud.Sin.: *Eleocharis fistulosa* (Poir.) Schult.,

comb. illeg. var. *obtusetrigona* (Lindl. & Nees) Barros, nom. inval., *Eleocharis strobilacea* Pedersen, *Limnochloa obtusetrigona* Lindl. & Nees

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, SPE). URY(ART, RNO).

Eleocharis occidentalis Mereles

Hierba palustre. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(PHA).

Eleocharis pachycarpa E. Desv.

Sin.: *Eleocharis dubia* Phil., *Eleocharis fuscanguinea* Boeck., *Eleocharis lepida* Phil., *Eleocharis leptocaulis* Steud., *Eleocharis liocarpa* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).

CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Eleocharis parodii Barros

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(FLO, FLA, LAV, PAY, RNO).

Eleocharis parvispicula R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Eleocharis pauciglumis R. Trevis. & D.J. Rosen

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Eleocharis plicarhachis (Griseb.) Svenson

Sin.: *Eleocharis elata* Boeck., *Scirpus plicarhachis* Griseb.

Hierba palustre. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(CHA, COS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, PAI, SPE).

Eleocharis pseudoalbibracteata S. González & Guagl.

Hierba. Endémica. 400-4400 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, IPA).

Eleocharis quinquangularis Boeck.

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, SPE).

Eleocharis quinqueflora (Hartmann)

O. Schwarz

Sin.: *Eleocharis pauciflora* (Lightf.)Link, *Isolepis andina* Phil., *Scirpus andinus* Phil., *Scirpus baeothryon* Ehrh., *Scirpus pauciflorus* Lightf., *Scirpus quinqueflorus* Hartmann

Hierba. Nativa. 2200-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, SAL, SCR, SJU). CHL(ANT, ATA, BIO).

Eleocharis rabenii Boeck.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(MON).

Eleocharis radicans (Poir.) KunthSin.: *Chaetocyperus costulatus* (Nees & Meyen) Nees, *Eleocharis acicularis* (L.) R. Br. var. *lilliputiana* Speg., *Eleocharis costulata* Nees & Meyen ex Kunth, *Eleocharis exigua* (Kunth) Roem. & Schult., *Eleocharis lindheimeri* (C.B. Clarke) Svenson, *Eleocharis rivularis* Phil., *Scirpus exiguus* Kunth, *Scirpus radicans* Poir.

Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG). PRY(APA, MIE). URY(CAS, COL, MON, ROC, SOR).

Eleocharis ramboana R. Trevis. &

Boldrini

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eleocharis riograndensis R. Trevis. &

Boldrini

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Eleocharis rostellata (Torr.) Torr.Sin.: *Scirpus rostellatus* Torr.

Hierba. Nativa. 300-1800 m.

Países: ARG(SJU, TUC).

Eleocharis sellowiana KunthSin.: *Eleocharis albivaginata* Boeck. var. *macrostachya* Boeck., *Eleocharis galapagensis* Svenson, *Eleocharis mesopotamica* Boeck., *Eleogenus sellowianus* (Kunth) Nees, *Scirpus sellowianus* (Kunth) Griseb.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, MON, SJO).

Eleocharis squamigera Svenson

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eleocharis subarticulata (Nees) Boeck.Sin.: *Chaetocyperus subarticulatus* Nees, *Eleocharis widgrenii* Boeck.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, PHA, SPE). URY(RIV, TAC).

Eleocharis tucumanensis Barros

Hierba. Nativa. 3900-4600 m.

Países: ARG(JUU, SJU, TUC).

CHL(TAR, ANT, AYP, COQ, RME).

Eleocharis uniflora SebergSin.: *Chillania pusilla* Roiv.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO).

Eleocharis urceolatoides R. Trevis. & Boldrini

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(CEN, COA).

Eleocharis viridans Kük. ex Osten

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON, ROC, TYT).

Ficinia Schrad.**Ficinia nodosa** (Rottb.) Goetgh.,

Muasya & D.A. Simpson

Sin.: *Isolepis monocephala* Steud., *Isolepis nodosa* (Rottb.) R. Br., *Scirpus molinianus* Beetle, *Scirpus nodosus* Rottb.

Hierba. Cosmopolita. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE).

Fimbristylis Vahl**Fimbristylis aspera** (Schrad.) Boeck.Sin.: *Schoenus asper* Schrad.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult.Sin.: *Isolepis autumnalis* (L.) J. Presl & C. Presl, *Scirpus autumnalis* L., *Scirpus mucronulatus* Michx.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Fimbristylis boldriniana R. Trevis. & H.N. Ronchi

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Fimbristylis campestris R. Trevis. & H.N. Ronchi

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS). PRY(CEN).

URY(PAY).

Fimbristylis castanea (Michx.) VahlSin.: *Scirpus castaneus* Michx.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR).

Fimbristylis complanata (Retz.) LinkSin.: *Fimbristylis autumnalis* (L.)Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Kük., *Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. & Schult. var. *complanata* (Retz.) Barros, comb. superfl., *Scirpus complanatus* Retz.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, ITA, ÑEE, SPE). URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO).

Fimbristylis cymosa R. Br.Sin.: *Fimbristylis glomerata* (Retz.)Nees, *Fimbristylis spathacea* Roth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl var. **dichotoma**Sin.: *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult., *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult. var. *diphylla* (Retz.) Kük., *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult. f. *tomentosa* (Vahl) Kük., *Fimbristylis brachyphylla* Schult., *Fimbristylis communis* Kunth, *Fimbristylis diphylla* (Retz.) Vahl, *Fimbristylis diphylla* (Retz.) Vahl var. *tomentosa* (Vahl) Barros, *Fimbristylis dregeana* Kunth, *Fimbristylis ecklonii* Nees, *Fimbristylis laxa* Vahl, *Fimbristylis polymorpha* Boeck., *Fimbristylis subtristachya* Steud., *Fimbristylis tomentosa* Vahl, *Scirpus annuus* All., *Scirpus dichotomus* L., *Scirpus diphyllus* Retz.

Hierba acuática. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl var. **floribunda** (Miq.) T. Koyama
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).

Fimbristylis littoralis Gaudich.
Sin.: *Fimbristylis miliacea* (L.) Vahl, *Scirpus miliaceus* L.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(ITA).

Fimbristylis spadicea (L.) Vahl
Sin.: *Scirpus spadiceus* L.
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).
URY(MON, SJO).

Fimbristylis squarrosa Vahl
Sin.: *Fimbristylis hirta* (Kunth)
Roem. & Schult., *Isolepis hirta* Kunth, *Pogonostylis squarrosus* Bertol.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, CON, PHA).
URY(CLA, DUR, PAY, RNO, SAO, TAC).

Fimbristylis stipitata R. Trevis. & H.N. Ronchi
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS).

Fimbristylis vahlii (Lam.) Link
Sin.: *Isolepis vahlii* (Lam.) Kunth, *Scirpus vahlii* Lam.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(CON, ITA).

Fuirena Rottb.

Fuirena incompleta Nees f. **glabra** Maury
Hierba palustre. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). PRY(PAI).

Fuirena incompleta Nees f. **incompleta**
Sin.: *Fuirena hexachaeta* Schltld.,

Scirpus incompletus (Nees) T. Koyama
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, SPE). URY(CLA, PAY, RNO, RIV).

Fuirena robusta Kunth
Sin.: *Fuirena bahiensis* Nees
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PAI, SPE).

Fuirena umbellata Rottb.
Sin.: *Fuirena brasiliensis* Raddi, *Scirpus umbellatus* (Rottb.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, ÑEE, SPE).

Hypolytrum Rich.

Hypolytrum schraderianum Nees
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Isolepis R. Br.

Isolepis aucklandica Hook. f.
Sin.: *Scirpus aucklandicus* (Hook. f.) Boeck.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(RNE).

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.
Sin.: *Cyperus pumilio* Steud., *Fimbristylis pygmaeum* Vahl, *Isolepis brachyphylla* J. Presl & C. Presl, *Isolepis brevis* (d'Urv.) Brongn., *Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult. f. *aphylla* (Boeck.) Vegetti, *Isolepis chlorostachya* Nees, *Isolepis chlorotica* Steud., *Isolepis erubescens* Steud., *Isolepis heterophylla* Steud., *Isolepis krausei* Phil., *Isolepis leptalea* (Koch) Schult., *Isolepis magellanica* Gaudich., *Isolepis microstachys* F. Phil. ex C.B. Clarke, *Isolepis modesta* Phil., *Isolepis monostachya* Phil., *Isolepis pholioides* Steud., *Isolepis pumilio* (Steud.) Boeck., *Isolepis purpurascens* Steud., *Isolepis pygmaea* (Vahl) Kunth var. *brevis* Hook. f., *Isolepis pygmaea* (Vahl) Kunth var. *elongata* Hook. f., *Isolepis pygmaea* (Vahl) Kunth, *Isolepis saviana* (Sebast. & Mauri) Schult., *Schoenoplectus cernuus* (Vahl) Hayek, *Schoenus krausei* (Phil.) Gunckel, *Schoenus nitens* (R. Br.) Poir.

subsp. *krausei* (Phil.) Kük., *Scirpus aegialitis* Phil., *Scirpus aphyllus* Boeck., *Scirpus arechavaletae* Boeck., *Scirpus brevis* d'Urv., *Scirpus brevis* Griseb., hom. illeg., *Scirpus cernuus* Vahl f. *aphyllus* (Boeck.) Barros, *Scirpus cernuus* Vahl, *Scirpus chloroticus* Phil., *Scirpus hookeri* Desv., hom. illeg., *Scirpus hookeri* Kunth, *Scirpus leptaleus* Koch, *Scirpus microstachyus* F. Phil., *Scirpus minimum* Hook. & Arn., hom. illeg., *Scirpus modestus* (F. Phil.) F. Phil., *Scirpus nudipes* Griseb., *Scirpus pygmaeus* (Vahl) A. Gray, *Scirpus riparius* Poir., hom. illeg., *Scirpus savii* Sebast. & Mauri, *Scirpus spadiceus* Phil., hom. illeg., *Scirpus terminalis* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME). URY(CAS, CLA, MAL, MON, SJO, TAC).

Isolepis nigricans Kunth

Sin.: *Cyperus urvilleanus* Steud., *Isolepis albescens* E. Desv., *Isolepis angachillensis* Steud., *Isolepis bridgesii* Palla, *Isolepis conceptionis* Steud., *Isolepis phaecocarpa* Phil., hom. illeg., *Isolepis psilocarpa* Kunth, nom. nud., *Isolepis ramulosa* Steud., *Isolepis urvillei* Steud., *Isolepis vivipara* Schrad. ex E. Desv., *Scirpus angachillensis* (Steud.) Boeck., *Scirpus bridgesii* Boeck., *Scirpus constitutionis* F. Phil., *Scirpus didymostachyus* Phil., *Scirpus nigricans* (Kunth) Poir., *Scirpus phaecarpus* F. Phil., *Scirpus albescens* (E. Desv.) F. Phil., *Isolepis nana* Phil., *Isolepis tristachya* Phil., *Scirpus gaudichaudii* Boeck. var. *tenuis* Boeck., *Scirpus trichocaulos* Phil., *Scirpus philippii* C.B. Clarke
Hierba. Nativa. 500-4000 m.
Países: ARG(LPA, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Isolepis ranko (Steud.) Vegetti

Sin.: *Cyperus ranko* Steud., *Isolepis perpusilla* Phil., hom. illeg., *Scirpus perpusillus* Boeck., nom. illeg., *Scirpus ranko* (Steud.) Gunckel, *Scirpus ranko* (Steud.) Beetle, comb. superfl.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(BIO, LRI, AIS).

Isolepis varians Steud.

Sin.: *Isolepis valdiviae* Steud., *Isolepis valdiviae* F. Phil. ex Boeck., nom. superfl., *Scirpus varians* (Steud.) Boeck. Hierba. Endémica. 700-1200 m. Países: ARG(BAI, CHU). CHL(BIO, ARA, LLA).

Lagenocarpus Nees emend. H. Pfeiff.**Lagenocarpus rigidus** (Kunth) Nees subsp. **rigidus**

Sin.: *Lagenocarpus dusenii* H. Pfeiff., *Lagenocarpus giganteus* H. Pfeiff., *Lagenocarpus scalariformis* H. Pfeiff., *Lagenocarpus rigidus* (Kunth) Nees subsp. *tremulus* (Nees) T. Koyama & Maguire, *Lagenocarpus tremulus* Nees, *Lagenocarpus topazinus* Nees, *Scleria rigida* Kunth Hierba. Nativa. 0-800 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees subsp. **tenuifolius** (Boeck.) T. Koyama & Maguire

Sin.: *Cryptangium tenuifolium* Boeck., *Lagenocarpus lapaensis* H. Pfeiff., *Lagenocarpus tenuifolius* (Boeck.) C.B. Clarke Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Machaerina Vahl**Machaerina austrobrasiliensis** M.T. Strong

Hierba. Nativa. 1000-2000 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Machaerina ensifolia (Boeck.) T. Koyama

Sin.: *Baumea ensifolia* (Boeck.) Palla, *Cladium ensifolium* (Boeck.) Benth., *Elynanthus ensifolium* Boeck. Hierba. Nativa. 900-2600 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Machaerina ficticia (Hemsl.) T. Koyama

Sin.: *Cladium ficticium* Hemsl. Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Machaerina scirpoidea (Steud.) T. Koyama

Sin.: *Agylla ensifolia* Phil., *Cladium ensifolium* (F. Phil.) H. Pfeiff., *Cladium scirpoideum* (Steud.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl., *Mariscus scirpoideus* (Steud.) Kuntze, *Terobera scirpoidea* Steud., *Vincentia scirpoidea* (Steud.) Boeck. Hierba. Endémica. 100-700 m. Países: CHL(JFE).

Oreobolus R. Br.**Oreobolus obtusangulus** Gaudich.

Sin.: *Oreobolus clandestinus* Phil., *Oreobolus obtusangulus* Gaudich. f. *borealis* Skottsbo. Hierba. Nativa. 0-1600 m. Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Oxycaryum Nees**Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Palla f. **cubense**

Sin.: *Anosporum ablepharum* (Griseb.) Maury, *Anosporum cubense* (Poepp. & Kunth) Boeck., *Anosporum piliferum* Maury, *Blepharolepis leucoblepharis* Nees, *Oxycaryum piliferum* (Maury) Palla, *Oxycaryum schomburgkianum* Nees, *Scirpus ablepharus* Griseb., *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth var. *gracilis* (Boeck.) Beetle, *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m. Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(SCA). PRY(APY, CEN, PHA). URY(ROC).

Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Palla f. **paraguayense** (Maury) Pedersen

Sin.: *Anosporum paraguayense* Maury, *Oxycaryum paraguayense* (Maury) Palla, *Scirpus cubensis* Poepp. & Kunth var. *paraguayensis* (Maury) Kük. ex Barros, *Scirpus paraguayensis* (Maury) Herter Hierba acuática. Nativa. 0-600 m. Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, PHA). URY(RNO, TAC).

Phylloscirpus C.B. Clarke**Phylloscirpus acaulis** (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson

Sin.: *Phylloscirpus andesinus* C.B.

Clarke, *Scirpus acaulis* Phil., *Scirpus atacamensis* (Phil.) Boeck. var. *exscapus* Kurtz, *Scirpus macrolepis* Phil., *Scirpus nubigenus* Phil., *Scirpus sessiliflorus* Phil. Hierba. Nativa. 2000-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Phylloscirpus boliviensis (Barros)

Dhooge & Goetgh.

Sin.: *Scirpus boliviensis* Barros Hierba. Nativa. 4100-4800 m. Países: CHL(TAR).

Phylloscirpus deserticola (Phil.)

Dhooge & Goetgh.

Sin.: *Scirpus deserticola* Phil. var. *semisubterraneus* (Boeck.) Barros, *Scirpus deserticola* Phil., *Scirpus distichophyllus* Boeck., *Scirpus semisubterraneus* Boeck., *Scirpus thermalis* Spruce, nom. inval.

Hierba. Nativa. 2000-4800 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

Pleurostachys Brongn.**Pleurostachys arcuata** W.W. Thomas, M.V. Alves & R. Trevis.

Hierba. Nativa. 0-100 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Pleurostachys distichophylla

(Boeck.) C.B. Clarke

Sin.: *Pleurostachys densefoliata* H. Pfeiff., *Rhynchospora distichophylla* Boeck. Hierba. Nativa. Países: BRA(PAR, SCA).

Pleurostachys foliosa Kunth

Sin.: *Nomochloa foliosa* (Kunth) Nees, *Pleurostachys cimaensis* H. Pfeiff., *Pleurostachys sellowii* Kunth, *Rhynchospora foliosa* (Kunth) L.B. Sm. Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Pleurostachys gaudichaudii Brongn.

Sin.: *Pleurostachys gaudichaudii* Brongn. f. *minor* Nees, *Pleurostachys graminifolia* Brongn. var. *gracilis* (Boeck.) Kük. & R. Gross, *Pleurostachys gracilis* Boeck. Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pleurostachys orbigniana Brongn.

Sin.: *Nemochloa beyrichii* Nees,
Nemochloa millegrana Nees,
Pleurostachys beyrichii (Nees) Steud.
 var. *beyrichii*, *Pleurostachys beyrichii*
 (Nees) Steud. var. *panicoides* H. Pfeiff.,
Pleurostachys millegrana (Nees) Steud.,
Pleurostachys panicoides (H. Pfeiff.)
 H. Pfeiff., *Rhynchospora orbigniana*
 (Brongn.) L.B. Sm.
 Hierba. Nativa. 200-700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pleurostachys puberula Boeck.

Sin.: *Pleurostachys montana* Palla,
Pleurostachys puberula Boeck. var.
montana (Palla) Kük. & R. Gross
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pleurostachys stricta Kunth

Sin.: *Pleurostachys calyptrocaryoides*
 R. Gross, *Pleurostachys muelleri* Boeck.,
Pleurostachys hoehneana R. Gross,
Pleurostachys rabenii Boeck., *Pleurostachys*
stricta Kunth var. *angustocarpa* H. Pfeiff.,
Pleurostachys stricta Kunth var. *rabenii*
 (Boeck.) H. Pfeiff.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pleurostachys tenuiflora Brongn.

Sin.: *Nomochloa tenuiflora* (Brongn.)
 Nees, *Rhynchospora tenuiflora* (Brongn.)
 L.B. Sm.
 Hierba. Endémica. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Pleurostachys urvillei Brongn.

Sin.: *Nemochloa urvillei* (Brongn.)
 Nees, *Pleurostachys dusenii* (H. Pfeiff.)
 H. Pfeiff., *Pleurostachys paranensis* Palla
 var. *dusenii* H. Pfeiff., *Pleurostachys*
paranensis Palla var. *ypirangensis* H.
 Pfeiff., *Pleurostachys paranensis* Palla,
Pleurostachys ulei Boeck., *Pleurostachys*
urvillei Brongn. f. *dusenii* (H. Pfeiff.)
 Kük. & R. Gross, *Pleurostachys urvillei*
 Brongn. f. *ypirangensis* (H. Pfeiff.)
 Kük. & R. Gross, *Pleurostachys urvillei*
 Brongn. var. *paranensis* (Palla) Kük. &
 R. Gross, *Pleurostachys ypirangensis* (H.
 Pfeiff.) H. Pfeiff.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Remirea Aubl.

Remirea maritima Aubl.
 Hierba. Nativa. 0-100 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Rhodoscirpus Léveillé-Bourret,
Donadio & J.R. Starr**Rhodoscirpus asper** (J. Presl & C. Presl)

Léveillé-Bourret, Donadio & J.R. Starr
 Sin.: *Scirpus asper* J. Presl & C. Presl,
Scirpus asper J. Presl & C. Presl var.
diffusus (Beetle) Beetle, *Scirpus asper* J.
 Presl & C. Presl var. *polystachya* Clarke,
Scirpus brachycaulos Phil., *Scirpus glaucus*
 Nees & Meyen ex Kunth, nom. illeg.,
Scirpus subasper Beetle, *Scirpus subasper*
 Beetle var. *diffusus* Beetle, *Scirpus*
trachycaulos Phil.

Hierba. Nativa. 700-3200 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
 MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).
 CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO,
 MAU, BIO, ARA, RME).

Rhynchospora Vahl**Rhynchospora albiceps** Kunth

Sin.: *Dichromena canescens* Maury,
Haplostylis albiceps (Kunth) Nees
 Hierba. Nativa. 0-600 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
 PRY(AMA, CAU, CAN, GUA).

Rhynchospora albobracteata A.C. Araújo

Sin.: *Dichromena rigida* Kunth,
Rhynchospora consanguinea (Kunth)
 Boeck. var. *rigida* (Kunth) Kük.,
Rhynchospora rigida (Kunth) Boeck.
 Hierba. Nativa. 0-1300 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Rhynchospora asperula (Nees) Steud.

Sin.: *Calyptrostylis asperula* Nees,
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var.
asperula (Nees) Kük.
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
 CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA,
 MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV).

Rhynchospora barrosiana Guagl.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU,
 CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI,
 SPE). URY(CAS, CLA, MAL, MON, PAY,
 RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).

Rhynchospora biflora Boeck.

Sin.: *Rhynchospora uniflora* Boeck.
 Hierba. Nativa. 1000-1500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora brasiliensis Boeck.

Hierba. Nativa. 900-1700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora breviscula H. Pfeiff.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Rhynchospora brittonii Gale

Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). URY(CAS, DUR, MON, PAY, SJO).

Rhynchospora brownii Roem. &

Schult. subsp. **americana** Guagl.
 Hierba. Nativa. 0-2700 m.
 Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
 MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA).
 PRY(AMA, CEN, MIE). URY(CLA, FLA,
 LAV, MON, RNO, SJO, TYT).

Rhynchospora caduciglumis P. Weber

& R. Trevis.
 Hierba. Endémica. 300-1400 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Rhynchospora castanea T. Koyama

Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Rhynchospora catharinensis Barros

Hierba. Endémica. 100-1100 m.
 Países: BRA(SCA).

Rhynchospora ciliata (G. Mey.) Kük.

Sin.: *Dichromena ciliata* Vahl, hom. illeg.,
Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck. subsp.
ciliata (Vahl) T. Koyama, *Rhynchospora*
nervosa (Vahl) Boeck. var. *ciliata* (Vahl)
 Kük., *Schoenus ciliatus* G. Mey.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora conferta (Nees) Boeck.

Sin.: *Psilocarya conferta* Nees
 Hierba. Nativa. 0-600 m.
 Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR,
 RGS, SCA).

Rhynchospora confinis (Nees) C.B. Clarke

Sin.: *Rhynchospora lundii* Boeck.,
Spermodon confinis Nees
 Hierba. Nativa. 0-1100 m.
 Países: ARG(COS, LRI, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU,
 CAA, COA, GUA, ITA).

Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeck.

Sin.: *Dichromena consanguinea* Kunth, *Rhynchospora consanguinea* (Kunth) Boeck. f. *subrigida* Kük., *Rhynchospora consanguinea* (Kunth) Boeck. f. *subspeciosa* Kük.

Hierba. Nativa. 300-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAU, CAN).

Rhynchospora contracta (Nees) J. Raynal

Sin.: *Dichromena micrantha* (Vahl) Kunth, comb. illeg., *Haloschoenus contractus* Nees, *Haloschoenus sparsus* (Sieber ex C. Presl) Nees, comb. illeg., *Juncus parviflorus* Poir., nom. illeg., *Rhynchospora micrantha* Vahl var. *contracta* (Nees) Kük., *Rhynchospora minutiflora* (Rich. ex Spreng.) C.D. Adams, comb. illeg., *Rhynchospora parviflora* Vahl ex Nees, nom. inval., *Rhynchospora sparsa* Sieber ex C. Presl, nom. inval., *Scleria minutiflora* Rich. ex Spreng., nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Rhynchospora coriifolia Boeck.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **angustirostris** (Barros) Guagl.

Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton f. *angustirostris* Barros

Hierba. Endémica. 200-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **bonariensis** Barros ex Cabrera & G. Dawson

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MON, RNO, RIV, ROC, SOR).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **chacoensis** (Barros) Svenson

Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton f. *chacoensis* Barros, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *singularis* Kük.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(AMA, CEN, CON, GUA, PHA). URY(RNO).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **corymbosa**

Sin.: *Calyptrostylis fascicularis* Nees, *Calyptrostylis florida* (Rudge) Nees, *Dichromena corymbosa* (L.) J.F. Macbr., *Rhynchospora aurea* Vahl, *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *florida* (Rudge) Kük., *Rhynchospora florida* (Rudge) Schult., *Rhynchospora surinamensis* (Rottb.) Nees, *Schoenus floridus* Rudge, *Schoenus surinamensis* Rottb., *Scirpus corymbosus* L.

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton var. **legrandii** (Kük. ex Barros) Guagl.

Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton subsp. *legrandii* (Kük. ex Barros) Luceño & Vanzela, *Rhynchospora legrandii* Kük. ex Barros

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR, SCA). URY(MON, SJO).

Rhynchospora crinigera Boeck.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, SJO).

Rhynchospora dentinux C.B. Clarke

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Rhynchospora edwalliana Boeck.

Sin.: *Rhynchospora flexuosa* C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora elatior Kunth var.

brevispiculosa (Kük.) A.C. Araújo
Sin.: *Haplostylis minor* Nees, *Rhynchospora diamantina* Kük., nom. illeg., *Rhynchospora diamantina* Kük. var. *brevispiculosa* Kük., *Rhynchospora leucostachys* Boeck., *Rhynchospora minor* (Nees) Steud., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Rhynchospora elatior Kunth var. **elatior**

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Rhynchospora emaciata (Nees) Boeck.

Sin.: *Haloschoenus emaciatus* Nees, *Rhynchospora tenuis* Link var. *emaciata* (Nees) Lindm.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, RIV).

Rhynchospora exaltata Kunth

Sin.: *Dichromena exaltata* (Kunth) J.F. Macbr., *Echinochoenus beyrichi* Nees, *Rhynchospora beyrichi* (Nees) Steud., *Rhynchospora exaltata* Kunth var. *beyrichi* (Nees) Kük., *Schoenus brasiliensis* Raddi

Hierba. Nativa. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).

Rhynchospora gigantea Link

Sin.: *Calyptrostylis gigantea* (Link) Nees, *Dichromena gigantea* (Link) J.F. Macbr., *Rhynchospora gigantea* Link var. *scaberrima* (Boeck.) Kük., *Rhynchospora scaberrima* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora glaziovii Boeck.

Sin.: *Rhynchospora floribunda* Boeck., *Rhynchospora hieronymi* Boeck. var. *floribunda* (Boeck.) Kük.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.

Sin.: *Cephaloschoenus globosus* (Kunth) Nees, *Cephaloschoenus pohlianus* Nees, *Chaetospora globosa* Kunth, *Rhynchospora alta* Boeck., *Rhynchospora cephalanta* A. Rich., hom. illeg., *Rhynchospora perrigida* Boeck., *Rhynchospora pohliana* (Nees) Steud., *Rhynchospora presleana* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, COA, SPE). URY(RIV, TAC).

Rhynchospora gollmeri Boeck.

Hierba. Nativa. 600-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora hassleri C.B. Clarke

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: PRY(AMA).

Rhynchospora hatschbachii T. Koyama
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora hieronymi Boeck.
subsp. **hieronymi**
Hierba. Nativa. 600-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora hieronymi Boeck.
subsp. **montevidensis** (Barros) Guagl.
Sin.: *Rhynchospora hieronymi* Boeck. f.
compacta Kük., *Rhynchospora hieronymi*
Boeck. var. *montevidensis* Barros,
Rhynchospora montevidensis (Barros) Herter
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL,
MON, RNO, SJO).

Rhynchospora holoschoenoides
(Rich.) Herter
Sin.: *Cephaloschoenus polycephalus*
(Pers.) Nees, *Ephippiorhynchium*
polycephalum (Pers.) Nees,
Ephippiorhynchium tenuirostre Nees,
Rhynchospora archavaletae Boeck.
var. *ostenii* (Kük.) Kük., *Rhynchospora*
archavaletae Boeck., *Rhynchospora*
cyperoides (Sw.) Mart. var. *triceps*
(Vahl) Boeck., *Rhynchospora cyperoides*
(Sw.) Mart., *Rhynchospora ostenii* Kük.,
Rhynchospora polycephala (Pers.) Wydler
ex Kunth, *Schoenus cyperoides* Sw.,
hom. illeg., *Schoenus holoschoenoides*
Rich., *Schoenus polycephala* Pers., nom.
superfl., *Schoenus triceps* Vahl
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, AMA, CAN, ITA).
URY(CAS, MON, ROC).

Rhynchospora iberae Guagl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(SCA).
PRY(SPE).

Rhynchospora junciformis (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena junciformis* Kunth
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora latibracteata Guagl.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). URY(RNO).

Rhynchospora loefgrenii Boeck.
Sin.: *Rhynchospora globosa* (Kunth) Roem.
& Schult. var. *loefgrenii* (Boeck.) Kük.

Hierba. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, GUA,
SPE). URY(TAC).

Rhynchospora marisculus Nees
Sin.: *Dichromena marisculus* (Nees) J.F.
Macbr., *Rhynchospora borinquensis* Britton,
Rhynchospora marisculus Nees var. *elatior*
Boeck., *Rhynchospora rigida* Schrad. ex
Nees, nom. nud., *Rhynchospora tenuiseta*
C. Wright ex Sauvalle, *Rhynchospora uleana*
Boeck., *Schoenus marisculus* Lindl. ex Nees,
nom. nud., *Schoenus marisculus* Salzm.,
nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, MIE,
PAI, SPE). URY(CAS, CLA, MAL, MON,
RNO, RIV, SJO).

Rhynchospora megapotamica (A.
Spreng.) H. Pfeiff. var. **megapotamica**
Sin.: *Hygrocharis luzulaeformis* Nees
ex Osten, nom. nud., *Rhynchospora*
kunthii Nees var. *composita* Nees,
nom. nud., *Rhynchospora luzuliformis*
Boeck., *Rhynchospora maculata* Maury,
Rhynchospora megapotamica (A. Spreng.)
Hauman & Vanderveken, comb. illeg.,
Scirpus megapotamicus A. Spreng.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA).
PRY(CEN). URY(ART, DUR, FLA, LAV,
MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SOR, TYT).

Rhynchospora megapotamica
(A. Spreng.) H. Pfeiff. var. **spicata**
(Boeck.) Kük.
Sin.: *Rhynchospora luzuliformis* Boeck.
var. *spicata* (Boeck.) Kük., *Rhynchospora*
spicata Boeck.

Hierba. Nativa. 700-1700 m.
Países: BRA(SCA).

Rhynchospora nardifolia (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena nardifolia* Kunth
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck.
Sin.: *Dichromena ciliata* Vahl
var. *vahlia* Griseb., *Dichromena*
nervosa Vahl, *Dichromena persooniana*
Nees, *Rhynchospora exigua* Boeck.,
Rhynchospora persooniana (Nees) Griseb.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR,
SCA). PRY(COA, GUA, PAI, SPE).

Rhynchospora organensis C.B. Clarke
Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton
var. *organensis* (C.B. Clarke) Kük.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI,
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA,
SPE). URY(DUR, FLA, RNO, SOR).

Rhynchospora paranaensis A.C.
Araújo & W.W. Thomas
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Rhynchospora patuligluma
C.B. Clarke ex Lindm.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Rhynchospora pedersenii Guagl.
Sin.: *Rhynchospora gigantea* Link var.
latifolia H. Pfeiff.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

Rhynchospora pilosa (Kunth) Boeck.
Sin.: *Dichromena pilosa* Kunth
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Rhynchospora polyantha Steud.
Hierba. Nativa. 1000-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora praecincta Maury
Sin.: *Rhynchospora hyalinolepis* Boeck.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).
PRY(ÑEE, PAI). URY(ART, FLA, PAY, SAO).

Rhynchospora pseudomacrostachya
G. Moore, Guagl. & Zartman
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Rhynchospora pubera (Vahl)
Boeckeler
Sin.: *Dichromena pubera* Vahl
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Rhynchospora pungens Liebm.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).
URY(PAY).

Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. subsp. **microcephala** (Bertero ex Spreng.) W.W. Thomas

Sin.: *Dichromena microcephala* Bertero ex Spreng., *Rhynchospora microcephala* (Bertero ex Spreng.) Kük.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. subsp. **radicans**
Sin.: *Dichromena radicans* Schltdl. & Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA).

Rhynchospora reitzii Silva-Filho,
W.W. Thomas & Boldrini

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Rhynchospora riparia (Nees) Boeck.

Sin.: *Haloschoenus riparius* Nees
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA).

Rhynchospora robusta (Kunth) Boeck.

Sin.: *Dichromena robusta* Kunth,
Psilocarya robusta (Kunth) Nees,
Rhynchospora semihirsuta Boeck.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, COA). URY(RIV).

Rhynchospora rostrata Lindm.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale

Sin.: *Dichromena glauca* (Vahl) J.F. Macbr., *Rhynchospora glauca* Vahl,
Rhynchospora glauca Vahl var. *altior* Kük., *Schoenus rugosus* Vahl
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, ÑEE). URY(TYT).

Rhynchospora rupestris A.C. Araújo & W.W. Thomas

Hierba. Nativa. 700-1200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Rhynchospora scutellata Griseb.

Sin.: *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton var. *puncticulata* (Kük. ex Osten) Kük., *Rhynchospora corymbosa* (L.)

Britton var. *minor* Kük., *Rhynchospora indianolensis* Small, *Rhynchospora pringlei* Greenm., hom. illeg., *Rhynchospora puncticulata* Kük. ex Osten, *Rhynchospora puncticulata* Kük. ex Osten var. *pleiocephala* Osten

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, PAY, RIV, SAO, TAC).

Rhynchospora serrana Silva-Filho,
W.W. Thomas & Boldrini

Hierba. Endémica. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Rhynchospora setigera (Kunth) Boeck.

Sin.: *Dichromena setigera* Kunth,
Rhynchospora stelligera Herter
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, GUA, SPE). URY(CLA, RIV, ROC, TAC, TYT).

Rhynchospora smithii W.W. Thomas

Hierba. Endémica. 1200-1300 m.
Países: BRA(SCA).

Rhynchospora splendens Lindm. f. **composita** Kük.

Hierba. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora splendens Lindm. f. **splendens**

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora spruceana C.B. Clarke

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Rhynchospora subsetosa C.B. Clarke

Sin.: *Rhynchospora selloiana* Boeck.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Rhynchospora subtilis Boeck.

Hierba. Nativa. 1000-2200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora tenella (Nees) Boeck.

Sin.: *Haloschaenus tenellus* Nees
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchospora tenerrima Nees ex Spreng.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Rhynchospora tenuis Link subsp. **austro-brasiliensis** T. Koyama

Sin.: *Haloschoenus capillaris* Nees var. *minor* Nees, nom. inval.

Hierba. Nativa. 200-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).
PRY(CAN).

Rhynchospora tenuis Link subsp. **tenuis**

Sin.: *Dichromena brasiliensis* Raddi,
Dichromena linkii J.F. Macbr., nom. superfl., *Fuirena gracilis* Spreng., *Haloschoenus capillaris* Nees, nom. illeg., *Haloschoenus capillaris* Nees var. *congestus* Nees, nom. inval., *Rhynchospora curvula* (Nees) Boeck., hom. illeg., *Rhynchospora gracilis* (Spreng.) Kuntze, hom. illeg., *Spermodon curvulus* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(CAS, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Rhynchospora terminalis (Nees)

Steud. var. **crassipes** (Boeck.) Kük.

Sin.: *Rhynchospora crassipes* Boeck.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CON, GUA).

Rhynchospora terminalis (Nees)

Steud. var. **terminalis**
Sin.: *Calyptrostylis terminalis* Nees
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Rhynchospora triflora Vahl

Sin.: *Dichromena triflora* (Vahl) J.F. Macbr., *Ephippiorhynchium triflorum* (Vahl) Nees, *Schoenus triflorus* (Vahl) Poir.
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

Rhynchospora trispicata (Nees)

Schrad. ex Steud.
Sin.: *Ephippiorhynchium trispicatum* Nees
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAN, CON).

Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.

Sin.: *Dichromena sellowiana* Kunth,
Dichromena velutina Kunth, *Psilocarya pohlii* Nees, *Psilocarya rufa* Nees, *Psilocarya sellowiana* (Kunth) Nees, *Psilocarya velutina* (Kunth) Nees, *Rhynchospora kuekenhali* Herter, hom. illeg., *Rhynchospora rufa* (Nees)

Boeck., *Rhynchospora velutina* (Kunth)
Boeck. var. *pohlii* (Nees) Boeck. ex Kük.,
Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.
var. *sellowiana* (Kunth) Boeck., *Schoenus*
velutinus Schrad. ex Kunth, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA,
ITA, ÑEE). URY(CLA, RNO, RIV, TAC).

Schoenoplectiella Lye

Schoenoplectiella mucronata (L.) J.

Jung & H.K. Choi

Sin.: *Schoenoplectus mucronatus* (L.)

Palla *Scirpus mucronatus* L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

Schoenoplectiella supina (L.) Lye

Sin.: *Isolepis supina* (L.) R. Br.,

Schoenoplectus supinus (L.) Palla, *Scirpus*
guaraniticus Pedersen, *Scirpus supinus* L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(SCA).

PRY(APY).

Schoenoplectus (Rchb.) Palla, nom. cons.

Schoenoplectus americanus (Pers.)

Volkart ex Schinz & R. Keller

Sin.: *Scirpus americanus* Pers., *Scirpus*
americanus Pers. var. *longispicatus*
Britton, *Scirpus chilensis* Nees & Meyen
var. *longisetis* (Kük.) Beetle, *Scirpus*
olneyi A. Gray ex Engelm. & A. Gray,
Scirpus olneyi A. Gray ex Engelm. & A.
Gray var. *longisetis* Kük.

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
ERI, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU,
SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP,
TAR, ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO,
LLA). URY(CAS, DUR, MON, SOR).

Schoenoplectus californicus (C.A.

Mey.) Soják var. **californicus**

Sin.: *Elytrospermum californicus*
C.A. Mey., *Malacochaete assimilis* Ces.,
Malacochaete chilense Nees & Meyen ex
Boeck., *Malacochaete oligostachya* Phil.
ex Boeck., *Malacochaete riparia* Nees
& Meyen, *Malacochaete sanguinolenta*
Nees & Meyen ex Boeck., *Malacochaete*
tatora Nees & Meyen, nom. nud.,
Schoenoplectus riparius (J. Presl & C.
Presl) Palla, *Scirpus californicus* (C.A.

Mey.) Britton, comb. superfl., *Scirpus*
californicus (C.A. Mey.) Steud. subsp.
tatora (Kunth) T. Koyama, *Scirpus*
californicus (C.A. Mey.) Steud. var. *tatora*
(Kunth) Barros, *Scirpus californicus* (C.A.
Mey.) Steud., *Scirpus chamissonis* Schrad.
ex Boeck., *Scirpus decipiens* A. St.-Hil.
ex Nees, *Scirpus rigidus* Schrad. ex Nees,
Scirpus riparius J. Presl & C. Presl

Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,
MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE,
SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS,
MAG, RME, IPA). PRY(APY, CEN, CHO,
COA, ÑEE, PHA). URY(CAS, CLA, COL,
FLO, LAV, MON, SJO, SOR).

Schoenoplectus californicus (C.A.

Mey.) Soják var. **spoliatus** (Barros)

Vegetti

Sin.: *Dichromena atrosanguinea* E.

Desv., *Malacochaete riparia* Nees &
Meyen var. *chamissoi* Nees, *Scirpus*
californicus (C.A. Mey.) Steud. var.
spoliatus Barros, *Scirpus riparius* J. Presl
& C. Presl var. *chamissoi* (Nees) H. Pfeiff.

Hierba acuática. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(LLA, AIS).

Schoenoplectus californicus (C.A.

Mey.) Soják var. **tereticulmis** (Steud.)

Vegetti

Sin.: *Scirpus californicus* (C.A.

Mey.) Steud. var. *tereticulmis* (Steud.)
Beetle, *Scirpus pseudotriquetus* Steud.,
Scirpus riparius J. Presl & C. Presl var.
tereticulmis (Steud.) C.B. Clarke, *Scirpus*
tereticulmis Steud.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, CHU, NEU,
RNE, SCR). CHL(LLA, AIS, MAG).

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla

var. **badius** (J. Presl & C. Presl) S.G. Sm.

Sin.: *Scirpus americanus* Pers. subsp.
monophyllus (J. Presl & C. Presl) T.
Koyama, *Scirpus americanus* Pers.
var. *polyphyllus* (Boeck.) Beetle, p.p.,
Scirpus badius J. Presl & C. Presl, *Scirpus*
monophyllus J. Presl & C. Presl, *Scirpus*
olneyi A. Gray ex Engelm. & A. Gray f.
australis Barros & Osten ex Osten, *Scirpus*
olneyi A. Gray ex Engelm. & A. Gray f.
minor Barros, *Scirpus pungens* Vahl var.
longisetis Benth. & F. Muell., *Scirpus*
pungens Vahl var. *nanus* Benth. & F. Muell.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
DFE, JUJ, MEN, SAL, SFE, TUC).
CHL(ATA, MAU, LLA). URY(COL, FLA,
MON, SJO, SOR).

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. **longispicatus** (Britton) S.G. Sm.

Sin.: *Schoenoplectus americanus* (Pers.)
Volkart ex Schinz & R. Keller subsp.
longispicatus (Britton) Soják, *Scirpus*
americanus Pers. var. *longibracteatus*
Barros & Osten, *Scirpus americanus* Pers.
var. *polyphyllus* (Boeck.) Beetle, p.p.,
Scirpus longispicatus (Britton) Smyth,
comb. illeg., *Scirpus pungens* Vahl var.
longibracteatus Osten & Barros, *Scirpus*
pungens Vahl var. *polyphyllus* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI,
LPA, RNE, SFE, SLU). CHL(COQ).
URY(FLA).

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. **pungens**

Sin.: *Schoenoplectus pungens* (Vahl)
Palla subsp. *longispicatus* (Britton) A.
Löve & D. Löve, *Scirpus americanus*
Pers. var. *conglomeratus* (Kunth) T.
Koyama, *Scirpus americanus* Pers. var.
pungens (Vahl) Barros & Osten, *Scirpus*
americanus Pers. f. *cordilleranus* (Kük.
& Barros) Barros, *Scirpus conglomeratus*
Kunth, *Scirpus pungens* Vahl

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI,
JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, TUC).
CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, LLA, RME).

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla

Sin.: *Schoenoplectus validus* (Vahl) A.
Löve & D. Löve, *Schoenoplectus validus*
(Vahl) T. Koyama, comb. superfl.,
Scirpus lacustris L. subsp. *validus* (Vahl)
Osten, *Scirpus lacustris* L. subsp. *validus*
(Vahl) T. Koyama, comb. superfl.,
Scirpus lacustris L. var. *validus* (Vahl)
Kük., *Scirpus tabernaemontani* C.C.
Gmel., *Scirpus validus* Vahl

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).
URY(COL, MON).

Schoenus L.**Schoenus andinus** (Phil.) H. Pfeiff.

Sin.: *Carpha andina* Phil., *Elynanthus sodalium* Franch., *Schoenus sodalium* (Franch.) Phil., *Schoenus sodalium* Har., nom. nud.

Hierba. Endémica. 200-1900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Schoenus antarcticus (Hook. f.) Dusén

Sin.: *Carpha antarctica* (Hook. f.) C.B. Clarke, *Chaetospora antarctica* Hook. f., *Elynanthus antarcticus* (Hook. f.) Franch.

Hierba. Endémica. 100-500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Schoenus lymanmithii M.T. Strong

Hierba. Endémica. 1600-1700 m.

Países: BRA(SCA).

Schoenus nigricans L.

Hierba. Introducida. 0-400 m.

Países: URY(MON).

Schoenus rhynchosporoides (Steud.) Kük.

Sin.: *Carpha laxa* (Hook. f.) Macloskie, *Carpha paniculata* Phil., *Chaetosperma rhynchospermoides* F. Phil., *Chaetospora laxa* Hook. f., *Chaetospora rhynchosporoides* Steud., *Elynanthus laxus* (Hook. f.) Macloskie

Hierba. Endémica. 100-1000 m.

Países: ARG(RNE, TDF). CHL(MAU, LRI, LLA, AIS, MAG).

Scirpus L., nom. cons.**Scirpus angustisquamis** Beetle

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ARA, LLA).

Scirpus chubutensis C.B. Clarke

Hierba. Endémica. 400-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU).

Scirpus melanocaulos Phil.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LBO, LRI, LLA).

Scirpus spagazzinianus Barros

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Scleria Bergius**Scleria bracteata** Cav.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Scleria ciliata Michx.

Sin.: *Scleria ciliata* Michx. var. *glabrescens* Maury, *Scleria pauciflora* H.L. Mühl. ex Willd., nom. inval., *Scleria sellowiana* Kunth f. *glabriuscula* Barros, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, SPE).

Scleria colorata Core

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Scleria composita (Nees) Boeck.

Sin.: *Hypoporum compositum* Nees, *Scleria scabrosa* Maury

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CAA, CEN, GUA).

Scleria cuyabensis Pilg.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(SPE).

Scleria distans Poir.

Sin.: *Hypoporum humile* Nees, nom. nud., *Hypoporum nutans* (Willd. ex Kunth) Nees, *Scleria hirtella* Sw. var. *nutans* Nees, *Scleria nutans* Willd. ex Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SJO).

Scleria filiculmis Boeck.

Sin.: *Scleria georgiana* Core var. *filiculmis* (Boeck.) H. Pfeiff.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Scleria flagellum-nigrorum P.J. Bergius

Sin.: *Scleria schulzii* Barros

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS). PRY(AMA, MIE, PHA).

Scleria gaertneri Raddi

Sin.: *Scleria melaleuca* C. Rchb. ex Schltld. & Cham., *Scleria pratensis* Lindl. ex Nees, *Scleria pterota* C. Presl, nom. nud., *Scleria simplicior* Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Scleria georgiana Core subsp.**australis** A.C. Araújo

Hierba. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Scleria hirtella Sw.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Scleria lacustris C. Wright

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: PRY(AMA).

Scleria latifolia Sw.

Sin.: *Schizolepis latifolia* (Sw.) Nees, *Schizolepis trigonocarpa* Nees, *Scleria arundinacea* Kunth, *Scleria cyanocarpa* Kunth, *Scleria latifolia* Sw. var. *arundinacea* (Kunth) H. Pfeiff., *Scleria olyroides* Kunth, *Scleria sylvestris* Poepp. & Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Scleria leptostachya Kunth

Sin.: *Hypoporum leptostachyum* (Kunth) Nees, *Scleria catharinensis* Boeck.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU). URY(MON, PAY, RNO, ROC, SOR).

Scleria longigluma Kük.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, SPE).

Scleria macrophylla J. Presl & C. Presl

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: PRY(APY).

Scleria microcarpa Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, COA, SPE).

Scleria mitis Bergius

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Scleria myricocarpa Kunth

Sin.: *Schizolepis myricocarpa* (Kunth) Nees

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Scleria obtusa Core

Hierba. Introducida.

Países: PRY(CON).

Scleria panicoides Kunth

Sin.: *Schizolepis panicoides* (Kunth) Nees
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA, GUA, ITA).

Scleria plusiophylla Steud.

Sin.: *Schizolepis foliosa* Nees, *Scleria latifolia* Sw. subsp. *foliosa* (Nees) T. Koyama
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI).

Scleria reticularis Michx.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Scleria scabra Willd.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
 Países: PRY(APY, AMA).

Scleria schiedeana Schltld.

Hierba. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Scleria secans (L.) Urb.

Sin.: *Mastigoscleria reflexa* (Kunth) Nees, *Schoenus secans* L., *Scleria caricifolia* Schrad., nom. nud., *Scleria reflexa* Kunth, *Scleria renggeriana* Steud.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

Scleria sellowiana Kunth

Sin.: *Chondrolomia sellowiana* (Kunth) Nees, *Scleria balansae* Maury, *Scleria sellowiana* Kunth var. *balansae* (Maury) C.B. Clarke, *Scleria sellowiana* Kunth f. *glabriuscula* Osten
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC, TYT).

Scleria uleana Boeck.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Scleria variegata (Nees) Steud.

Sin.: *Hypoporum variegatum* Nees
 Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Trichophorum Pers.**Trichophorum rigidum** (Steud.

Ex Lechler) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson
 Sin.: *Isolepis rigida* Steud. ex Lechl., *Scirpus rigidus* (Steud. ex Lechl.) Boeck., comb. illeg.
 Hierba. Nativa. 3600-4300 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Zameioscirpus Dhooze & Goetgh.**Zameioscirpus atacamensis** (Phil.)

Dhooze & Goetgh.
 Sin.: *Isolepis atacamensis* Phil., *Scirpus atacamensis* (Phil.) Boeck., *Scirpus hieronymi* Boeck.
 Hierba. Nativa. 3200-4800 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(TAR, ATA, COQ).

Zameioscirpus gaimardioides (E.

Desv.) Dhooze & Goetgh.
 Sin.: *Carex gaimardioides* E. Desv.
 Hierba. Nativa. 3100-4000 m.
 Países: ARG(NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, LBO, RME, MAU, VAL).

Zameioscirpus muticus Dhooze & Goetgh.

Sin.: *Zameioscirpus muticus* Dhooze & Goetgh., nom. nud.
 Hierba. Nativa.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL). CHL(TAR, ANT. AYP).

DILLENACEAE

Curatella Loeffl.**Curatella americana** L.

Árbol. Nativa. 100-200 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Davilla Vand.**Davilla elliptica** A. St.-Hil.

Sin.: *Davilla castaneaefolia* A. St.-Hil., *Davilla castaneaefolia* A. St.-Hil. var. *floribunda* A. St.-Hil., *Davilla elliptica* A. St.-Hil. var. *castaneaefolia* (A. St.-Hil.) Eichler
 Arbusto o liana. Nativa. 100-300 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

Davilla grandiflora A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 100-300 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Davilla rugosa Poir.

Sin.: *Davilla brasiliiana* DC., *Davilla pilosa* Miq.
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN).

Doliocarpus Rol.**Doliocarpus brevipedicellatus** Garcke

Liana. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl.

Sin.: *Tigarea dentata* Aubl.
 Liana. Nativa. 100-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, SPE).

Doliocarpus glomeratus Eichler

Liana. Nativa. 0-100 m.
 Países: BRA(PAR).

Doliocarpus schottianus Eichler

Sin.: *Doliocarpus lasiogyne* Benoist
 Liana. Nativa. 0-400 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Tetracera L.**Tetracera oblongata** DC.

Sin.: *Davilla radula* Mart., *Tetracera carpinifolia* Eichler, *Tetracera gardneri* Eichler, *Tetracera radula* (Mart.) Eichler
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, GUA, SPE).

Tetracera parviflora (Rusby) Sleumer

Sin.: *Davilla lechleri* Rusby, *Davilla parviflora* Rusby
 Liana. Nativa. 0-400 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CAN, COA, SPE).

Tetracera sellowiana Schltld.

Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Tetracera volubilis L.

Sin.: *Tetracera acuminata* DC., *Tetracera japurensis* Mart. & Zucc.
 Liana. Nativa. 0-200 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

DIOSCOREACEAE

Dioscorea L.**Dioscorea acanthogene** Rusby

Sin.: *Dioscorea paraguayensis* R. Knuth
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON).

Dioscorea acerifolia Phil.

Enredadera. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Dioscorea altissima Lam.

Sin.: *Dioscorea chondrocarpa* Griseb.
Enredadera. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dioscorea amaranthoides C. Presl

Sin.: *Dioscorea amaranthoides* C. Presl
var. *crumenigera* (Mart. ex Griseb.) Uline
ex R. Knuth, *Dioscorea amaranthoides* C.
Presl var. *elegantula* R. Knuth, *Dioscorea*
apäensis Chodat & Hassl., *Dioscorea*
silvestris Vell.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área
del proyecto). PRY(APA, CON).

Dioscorea andina Phil.

Enredadera. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU,
BIO, ARA).

Dioscorea antucoana Uline ex R. Knuth

Enredadera. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Dioscorea araucana Phil.

Enredadera. Endémica. 1500 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Dioscorea aristolochiifolia Poepp.

Sin.: *Dioscorea trichoneura* Phil.
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Dioscorea aspera Humb. & Bonpl.

Sin.: *Dioscorea scabra* Humb. & Bonpl.
ex Willd. var. *aspera* (Humb. & Bonpl.)
R. Knuth, *Helmia aspera* Kunth
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Dioscorea auriculata Poepp.

Sin.: *Dioscorea acutifolia* Phil.,
Dioscorea helicifolia Kunth
Enredadera. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

Dioscorea axilliflora Phil.

Enredadera. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Dioscorea beecheyi R. Knuth

Enredadera. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Dioscorea bermejensis R. Knuth

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL).

Dioscorea besseriana Kunth var.**berteroi** Uline ex R. Knuth

Enredadera. Endémica.
Países: CHL(RME).

Dioscorea besseriana Kunth var.**besseriana**

Enredadera. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO,
MAU, RME).

Dioscorea biloba (Phil.) Caddick &Wilkin subsp. **biloba**

Sin.: *Epipetrum bilobum* Phil.
Hierba. Endémica. 400-500 m.
Países: CHL(ANT, COQ).

Dioscorea biloba (Phil.) Caddick &

Wilkin subsp. **coquimbana** Viruel,
Segarra & L. Villar
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Dioscorea brachybotrya Poepp. var.**brachybotrya**

Sin.: *Dioscorea buchtienii* R. Knuth,
Dioscorea novemloba Steud. ex F. Phil.,
Dioscorea scandens Kunze ex Kunth
Enredadera. Endémica. 1500-1600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA).

Dioscorea brachybotrya Poepp. var.**germainii** Uline ex R. Knuth

Enredadera. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Dioscorea brachystachya Phil.

Enredadera. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Dioscorea bridgesii Griseb. ex Kunth

Enredadera. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Dioscorea bryoniifolia Poepp.

Sin.: *Dioscorea hederacea* Miers ex
Bertero
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Dioscorea bulbifera L.

Enredadera. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Dioscorea bulbotracha Hand.-Mazz.

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dioscorea calcarea R. Knuth

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dioscorea campestris Griseb.

Sin.: *Dioscorea campestris* Griseb. var.
longispicata Hauman, *Dioscorea campestris*
Griseb. f. *longispicata* (Hauman) R.
Knuth, *Dioscorea campestris* Griseb. f.
paraguayensis R. Knuth, *Dioscorea violacea*
R. Knuth, nom. illeg., *Helmia campestris*
(Griseb.) Knuth

Enredadera. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, CEN, COA, PAI). URY(ART,
PAY, RNO, SOR, TAC).

Dioscorea castilloniana Hauman ex

Castillón

Enredadera. Endémica.
Países: ARG(JUJ).

Dioscorea ceratandra R. Knuth

Sin.: *Dioscorea congestiflora* R. Knuth,
Dioscorea martiana Griseb. var. *caudata*
R. Knuth, *Dioscorea quirogae* R. Knuth
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON).

Dioscorea cienegensis R. Knuth

Sin.: *Dioscorea monadelphica* (Kunth)
Pax var. *opaca* Hicken
Enredadera. Endémica. 1500-1600 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS).

Dioscorea cinnamomifolia Hook.

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

Dioscorea cissophylla Phil.

Enredadera. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(LRI, LLA).

- Dioscorea commutata** R. Knuth
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).
- Dioscorea coronata** Hauman
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PHA).
URY(CLA, TAC, TYT).
- Dioscorea curitybensis** R. Knuth
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Dioscorea delicata** R. Knuth
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dioscorea demourae** R. Knuth
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dioscorea dodecaneura** Vell.
Sin.: *Dioscorea bangii* R. Knuth,
Dioscorea discolor Kunth, *Dioscorea*
huallagensis R. Knuth, *Dioscorea*
illustrata Linden & André, *Dioscorea*
racemosa Rusby
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS,
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAU, PAI, SPE).
- Dioscorea entomophila** Hauman
Sin.: *Dioscorea entomophila* Hauman
var. *tomentosa* Hauman
Enredadera. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
- Dioscorea fastigiata** Gay
Sin.: *Dioscorea cylindrostachya* I.M.
Johnst., *Dioscorea thinophila* Phil.
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).
- Dioscorea fractiflexa** R. Knuth
Enredadera. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Dioscorea furcata** Griseb.
Sin.: *Dioscorea fracta* Griseb., *Helmia*
fracta (Griseb.) Knuth, *Helmia furcata*
(Griseb.) Kunth
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI,
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(Desconocida). URY(SAO).
- Dioscorea gayi** Phil.
Enredadera. Endémica.
Países: CHL(ATA).
- Dioscorea geissei** Phil.
Enredadera. Endémica.
Países: CHL(ATA).
- Dioscorea glandulosa** Klotzsch ex Kunth
Sin.: *Dioscorea paranensis* R. Knuth,
Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. var.
glandulosa (Klotzsch ex Kunth) Griseb.
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, SCA). PRY(CAA, CON, GUA).
- Dioscorea glomerulata** Hauman
Sin.: *Dioscorea boliviensis* R. Knuth,
Dioscorea burroyacensis R. Knuth,
Dioscorea lorentzii R. Knuth, *Dioscorea*
nodosa R. Knuth
Enredadera. Nativa. 1200-2600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Dioscorea gouanioides** (Chodat &
Hassl.) R. Knuth
Sin.: *Dioscorea multiflora* Mart. ex
Griseb. var. *gouanioides* Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CON).
- Dioscorea gracilis** Hook. ex Poepp.
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(VAL).
- Dioscorea grandiflora** Mart. ex Griseb.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APA).
- Dioscorea grisebachii** Kunth
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Dioscorea hassleriana** Chodat & Hassl.
Sin.: *Dioscorea hassleriana* Chodat
& Hassl. var. *triloba* Chodat & Hassl.,
Dioscorea hastata Vell. var. *hassleriana*
(Chodat) R. Knuth, *Dioscorea*
platystemon Hauman var. *hassleriana*
(Chodat) R. Knuth
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR,
RGS). PRY(AMA, CEN, CON, COA,
GUA, PAI).
- Dioscorea haumanii** Xifreda
Enredadera. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).
- Dioscorea hieronymi** R. Knuth
Sin.: *Dioscorea chiquiacensis* R. Knuth,
Dioscorea megalantha Griseb. var. *subsessilis*
Hauman, *Dioscorea tafiensis* R. Knuth
Enredadera. Nativa. 500-2400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Dioscorea humifusa** Poepp. var.
gracilis (Hook. & Arn.) L.E. Navas
Enredadera. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(VAL, BIO, RME).
- Dioscorea humifusa** Poepp. var.
humifusa
Sin.: *Dioscorea nigrescens* Phil.
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, RME).
- Dioscorea humilis** Bertero ex Colla
subsp. **humilis**
Sin.: *Dioscorea pusilla* Hook.,
Epipetrum humile (Bertero ex Colla) Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).
- Dioscorea humilis** Bertero ex Colla
subsp. **polyanthes** (F. Phil.) Viruel,
Segarra & L. Villar
Sin.: *Dioscorea polyanthes* (F. Phil.) Caddick
& Wilkin, *Epipetrum polyanthes* F. Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU).
- Dioscorea laxiflora** Mart. ex Griseb.
Sin.: *Dioscorea calystegioides* Kunth,
Dioscorea laxiflora Mart. ex Griseb. var.
calystegioides (Kunth) Uline ex R. Knuth,
Dioscorea laxiflora Mart. ex Griseb. var.
cincinnata Uline ex R. Knuth
Enredadera. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Dioscorea litoralis** Phil.
Enredadera. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(VAL, BIO).
- Dioscorea longipes** Phil.
Enredadera. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(MAU, ARA).
- Dioscorea macrantha** Uline ex R. Knuth
Enredadera. Endémica.
Países: BRA(SCA).
- Dioscorea marginata** Griseb.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Dioscorea martiana** Griseb.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dioscorea megalantha Griseb.

Sin.: *Dioscorea lilloi* (Hauman)
Hauman, *Dioscorea megalantha* Griseb.
var. *lilloi* Hauman, *Dioscorea megalantha*
Griseb. var. *typica* emend. Hauman,
nom. inval.
Enredadera. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, SDE, TUC).

Dioscorea microbotrya Griseb.

Sin.: *Dioscorea gibertii* R. Knuth,
Dioscorea microbotrya Griseb. var.
grandifolia Hauman, *Dioscorea tweediei*
R. Knuth
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI,
FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC).
BRA(PAR). URY(PAY, RNO, SOR, TAC).

Dioscorea microcephala Uline

Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Dioscorea modesta Phil.

Sin.: *Dioscorea aristolochiifolia* Poepp.
var. *parvifolia* (Phil.) L.E. Navas & Erba,
Dioscorea parvifolia Phil.
Enredadera. Endémica.
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Dioscorea mollis Kunth

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Dioscorea monadelpha (Kunth) Griseb.

Sin.: *Dioscorea acutata* R. Knuth, *Dioscorea*
guaranitica Chodat & Hassl. f. *membranacea*
Chodat & Hassl., *Dioscorea monadelpha*
(Kunth) Pax, comb. superfl., *Dioscorea*
praetervisa R. Knuth, *Dioscorea similis* R.
Knuth, *Helmia monadelpha* Kunth
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(RIV, TAC).

Dioscorea monandra Hauman

Enredadera. Endémica. 2000-2200 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.

Sin.: *Dioscorea conceptionis* Chodat
& Hassl., *Dioscorea macrocapsa* R.
Knuth, *Dioscorea multiflora* Mart. ex
Griseb. var. *asuncionensis* R. Knuth,
Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb. var.
conceptionis (Chodat & Hassl.) Pellegr.,
Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb. var.
loefgrenii R. Knuth, *Dioscorea niederleinii*
R. Knuth, *Helmia multiflora* (Mart. ex
Griseb.) Kunth

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, CON,
COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, SAO).

Dioscorea multispicata R. Knuth

Enredadera. Nativa.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
PRY(AMA).

Dioscorea nana Poepp.

Enredadera. Endémica. 100-1300 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA).

Dioscorea nitida R. Knuth

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Dioscorea obtusifolia Hook. & Arn.

var. **obtusifolia**
Enredadera. Endémica.
Países: CHL(RME).

Dioscorea obtusifolia Hook. & Arn.

var. **philippii** Uline ex R. Knuth
Enredadera. Endémica.
Países: CHL(BIO, RME).

Dioscorea olfersiana Klotzsch ex

Griseb.
Sin.: *Dioscorea catharinensis* R. Knuth
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dioscorea oligophylla Phil.

Enredadera. Endémica.
Países: CHL(VAL, RME).

Dioscorea ovata Vell.

Sin.: *Dioscorea adenocarpa* Mart. ex
Griseb., *Dioscorea adenocarpa* Mart. ex
Griseb. var. *balansae* Uline, *Dioscorea*
adenocarpa Mart. ex Griseb. var.
chartacea Uline ex R. Knuth, *Dioscorea*
puncticulata R. Knuth, *Dioscorea*
trachyandra Griseb., *Helmia adenocarpa*
(Mart. ex Griseb.) Kunth
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CEN, CON, COA, PAI).

Dioscorea pallidinervia R. Knuth

Enredadera. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Dioscorea paupera Phil.

Enredadera. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ).

Dioscorea pedicellata Phil.

Enredadera. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO,
ARA, RME).

Dioscorea pencana Phil.

Enredadera. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(BIO).

Dioscorea pilcomayensis Hauman

Sin.: *Dioscorea pedicellata* Morong,
nom. illeg., *Dioscorea pellegrinii* Hassl.
ex R. Knuth, nom. superfl., *Dioscorea*
tamifolia Chodat & Hassl., nom. illeg.
Enredadera. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL).
PRY(APY, AMA, CON, PHA).

Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dioscorea polygonoides Humb. &

Bonpl. ex Willd.
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dioscorea puncticulata R. Knuth

Enredadera. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Dioscorea reticulata Gay

Sin.: *Dioscorea brachybotrya* Poepp.
var. *reticulata* (Gay) Uline ex R. Knuth,
Dioscorea nervosa Phil., *Dioscorea*
pedatifida Phil., *Dioscorea reticulata* Gay
var. *nervosa* (Phil.) L.E. Navas & Erba,
Dioscorea reticulata Gay var. *scabriuscula*
Speg., *Dioscorea thermarum* Phil.
Enredadera. Endémica. 200-2300 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU,
BIO, ARA, LLA).

Dioscorea rumicoides Griseb.

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dioscorea scabra Humb. & Bonpl. ex Willd.

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dioscorea saxatilis Poepp.

Sin.: *Dioscorea arenaria* Kunth,
Dioscorea heterophylla Poepp. var.
longifolia (Phil.) L.E. Navas & Erba,
Dioscorea heterophylla Poepp., *Dioscorea*
linearis Bertero ex Colla, *Dioscorea*
longifolia Phil., *Dioscorea parviflora* Phil.
Enredadera. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Dioscorea sellowiana Uline ex R. Knuth
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Dioscorea sinuata Vell.
Sin.: *Dioscorea bonariensis* Ten.,
Dioscorea crenata Vell., *Dioscorea crenata*
Kunth, nom. nud., *Dioscorea sinuata*
Vell. var. *bonariensis* (Ten.) Hauman,
Dioscorea variifolia Kunze, nom. nud.
Enredadera. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, CEN, COA, GUA, PHA).
URY(Desconocida).

Dioscorea spectabilis R. Knuth
Enredadera. Nativa.
Países: ARG(JUJ).

Dioscorea spicata (Vell.) Pedralli
Sin.: *Dioscorea albinervia* R. Knuth,
Dioscorea pallidinervia R. Knuth, *Smilax*
spicata Vell.
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dioscorea stegelmanniana R. Knuth
Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dioscorea stenocolpus Phil.
Enredadera. Endémica.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Dioscorea stenopetala Hauman
Sin.: *Dioscorea tucumanensis* R. Knuth
Enredadera. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Dioscorea subhastata Vell.
Sin.: *Dioscorea friesii* R. Knuth, *Dioscorea*
guaranitica Chodat & Hassl., *Dioscorea*
guaranitica Chodat & Hassl. var. *balansae*
Pellegr., *Dioscorea guaranitica* Chodat &
Hassl. f. *subcoriacea* Chodat & Hassl.,
Dioscorea lagoasanta Uline ex R. Knuth,
Dioscorea lagoasanta Uline ex R. Knuth
var. *rotiflora* Uline, *Dioscorea piratinyensis*
R. Knuth
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN,
COA, GUA, PAI, PHA).

Dioscorea tenella Phil.
Enredadera. Endémica. 400-700 m.
Países: CHL(ANT, COQ).

Dioscorea tenuis R. Knuth
Enredadera. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Dioscorea toldosensis R. Knuth
Enredadera. Nativa.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Dioscorea trifurcata Hauman
Enredadera. Endémica. 1200 m.
Países: ARG(CAT).

Dioscorea tubuliflora Uline ex R.
Knuth
Enredadera. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Dioscorea uliginosa Phil.
Enredadera. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA).

Dioscorea valdiviensis R. Knuth
Enredadera. Endémica.
Países: CHL(ARA, LLA).

Dioscorea variifolia Bertero ex Colla
Sin.: *Dioscorea acuminata* Steud.,
Dioscorea microphylla Steud.
Enredadera. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO,
ARA, RME).

Dioscorea volckmannii Phil.
Hierba. Endémica. 2300-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(LBO, MAU, RME).

DROSERACEAE

Drosera L.

Drosera brevifolia Pursh
Sin.: *Drosera maritima* A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-2100 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).
URY(CAS, MAL).

Drosera capillaris Poir.
Sin.: *Drosera brevifolia* Pursh var.
major Hook.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(PAI).
URY(CAS).

Drosera communis A. St.-Hil.
Sin.: *Drosera montana* A. St.-Hil. f.
parviflora Chodat
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).

Drosera latifolia (Eichler) Gonella &
Rivadavia
Sin.: *Drosera villosa* A. St.-Hil. var.
latifolia Eichler
Hierba. Nativa. 700-2600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Drosera montana A. St.-Hil.
Sin.: *Drosera communis* A. St.-Hil. var.
pauciflora Eichler, *Drosera parvifolia* A.
St.-Hil.
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Drosera uniflora Willd.
Sin.: *Drosera macloviana* Gand.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

EBENACEAE

Diospyros L.

Diospyros hassleri Hieron.
Arbusto. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del
proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Diospyros inconstans Jacq.
Sin.: *Maba inconstans* (Jacq.) Griseb.,
Macreightia inconstans (Jacq.) A. DC.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA,
MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RNO, SAO).

Diospyros lasiocalyx (Mart.) B. Walln.
Sin.: *Annona lasiocalyx* Mart.,
Diospyros hispida A. DC.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

ELAEAGNACEAE

Elaeagnus L.

Elaeagnus angustifolia L.
Sin.: *Elaeagnus argenteus* Moench,
Elaeagnus hortensis M. Bieb. var.
angustifolia (L.) Schltdl., *Elaeagnus*
hortensis M. Bieb. var. *orientalis* (L.)
Schltdl., *Elaeagnus hortensis* M. Bieb.,
Elaeagnus incana Lam., *Elaeagnus*
orientalis L., *Elaeagnus spinosa* L.,
Elaeagnus tomentosus Moench
Arbolito o árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(LPA, NEU, RNE, SCR).

ELAEOCARPACEAE

Aristotelia L'Hér., nom. cons.**Aristotelia chilensis** (Molina) Stuntz

Sin.: *Aristotelia glandulosa* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Aristotelia macqui* L'Hér., *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *alpestris* Reiche, *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *andina* Phil., *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *leucocarpa* Dimitri, *Cornus chilensis* Molina
 Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

Crinodendron Molina**Crinodendron brasiliense** Reitz & L.B. Sm.

Arbusto o arbolito. Endémica. 1400-2000 m.
 Países: BRA(SCA).

Crinodendron hookerianum Gay

Sin.: *Crinodendron eriocladum* Gand., *Tricuspidaria hookeriana* (Gay) A. Cunn., *Tricuspidaria lanceolata* Miq.
 Árbol. Endémica. 0-1100 m.
 Países: CHL(ARA, LRI, LLA).

Crinodendron patagua Molina

Sin.: *Crinodendron dependens* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Tricuspidaria dependens* Ruiz & Pav., *Tricuspidaria hexapetala* Turcz., *Tricuspidaria patagua* (Molina) Miers
 Árbol. Endémica. 0-1800 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE).

Crinodendron tucumanum Lillo

Sin.: *Crinodendron boliviensis* Villa
 Árbol. Nativa. 1000-3000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Sloanea L.**Sloanea garckeana** K. Schum.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.

Sin.: *Ablania guianensis* Aubl.
 Árbol. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Sloanea hatschbachii D. Sampaio & V.C. Souza

Árbol. Endémica.
 Países: BRA(PAR).

Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex

Benth. subsp. **australis** T.D. Penn.
 Árbol. Endémica.
 Países: BRA(SCA).

Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex

Benth. subsp. **hirsuta**
 Sin.: *Dasyntema hirsutum* Schott
 Árbol. Nativa
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sloanea lasiocoma K. Schum.

Sin.: *Sloanea monosperma* Vell. var. *coriacea* K. Schum.
 Árbol. Nativa.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Vallea Mutis ex L.f.**Vallea stipularis** L. f.

Árbol. Nativa. 1500-4000 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

ELATINACEAE

Elatine L.**Elatine lindbergii** Rohrb.

Hierba acuática. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elatine lorentziana Hunz.

Sin.: *Elatine opposita* Bacig.
 Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, SFE).

Elatine triandra Schkuhr var.

brachysperma (A. Gray) Fassett
 Sin.: *Elatine brachysperma* A. Gray
 Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, ERI, FOR).
 URY(MAL, SJO).

Elatine triandra Schkuhr var. **triandra**

Sin.: *Elatine chilensis* Naudin, *Elatine hydropiper* L. var. *triandra* (Schkuhr) Fiori, *Elatine nivalis* Speg.
 Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MEN, RNE, SFE).
 CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

EREMOLEPIDACEAE

Antidaphne Poepp. & Endl.**Antidaphne punctulata** (Clos) Kuijt

Sin.: *Eremolepis punctulata* (Clos) Griseb., *Eremolepis verrucosa* Griseb., *Lepidoceras punctulatum* Clos
 Arbusto parásito. Endémica. 0-1500 m.
 Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Eubracion Hook. f.**Eubracion ambiguum** (Hook. &

Arn.) Engl.
 Sin.: *Eubracion ambiguum* (Hook. & Arn.) Engl. var. *jamaicense* Krug & Urb., *Eubracion andalgalense* Abbiatti, *Eubracion arnottii* Hook. f., *Eubracion brasiliense* Eichler, *Viscum ambiguum* Hook. & Arn.

Arbusto parásito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
 URY(ART, FLA, MON, SAO, SJO, SOR).

Lepidoceras Hook. f.**Lepidoceras chilense** (Molina) Kuijt

Sin.: *Lepidoceras dombei* Hook. f., *Lepidoceras kingii* Hook. f., *Lepidoceras squamifer* Clos, *Myrtobium microphyllum* Miq., *Viscum chilense* Molina
 Arbusto parásito. Endémica. 0-2000 m.
 Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

ERICACEAE

Agarista D. Don ex G. Don**Agarista boliviensis** (Sleumer) Judd

Sin.: *Leucothoe boliviensis* Sleumer
 Arbusto o arbolito. Nativa. 1000-2500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Agarista chlorantha (Cham.) G. Don

Sin.: *Agarista serrulata* (Cham.) G. Don, *Andromeda chlorantha* Cham., *Andromeda serrulata* Cham., *Leucothoe chlorantha* (Cham.) DC., *Leucothoe serrulata* (Cham.) DC.
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-1700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Agarista eucalyptoides (Cham. & Schltdl.) G. Don

Sin.: *Agarista multiflora* (Pohl) G. Don, *Andromeda eucalyptoides* Cham. & Schltdl., *Andromeda multiflora* Pohl, *Leucothoe eucalyptoides* (Cham. & Schltdl.) DC., *Leucothoe multiflora* (Pohl) DC. var. *eucalyptoides* (Cham. & Schltdl.) Meisn.
Arbolito o árbol. Nativa. 200-2300 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(RIV).

Agarista minensis (Glaz. ex Sleumer) Judd

Sin.: *Leucothoe minensis* Glaz., nom. nud., *Leucothoe minensis* Glaz. ex Sleumer
Arbusto. Nativa. 900-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Agarista niederleinii (Sleumer) Judd var. **acutifolia** Judd

Arbusto o arbolito. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Agarista niederleinii (Sleumer) Judd var. **niederleinii**

Sin.: *Leucothoe niederleinii* Sleumer
Arbusto o arbolito. Endémica. 800-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Agarista nummularia (Cham. & Schltdl.) G. Don

Sin.: *Andromeda nummularia* Cham. & Schltdl., *Leucothoe nummularia* (Cham. & Schltdl.) DC., *Leucothoe nummularia* (Cham. & Schltdl.) DC. var. *floccigera* Sleumer
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Agarista oleifolia (Cham.) G. Don

Sin.: *Andromeda oleifolia* Cham.
Arbusto a árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Agarista paraguayensis (Sleumer) Judd

Sin.: *Leucothoe paraguayensis* Sleumer, *Leucothoe paraguayensis* Sleumer var. *calva* Sleumer
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, COA, PAI).

Agarista pulchella Cham. ex G. Don

Sin.: *Leucothoe pulchella* (Cham. ex G. Don) DC.
Arbusto. Nativa. 100-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Empetrum L.

Empetrum rubrum Vahl ex Willd.

Sin.: *Empetrum nigrum* L. var. *andinum* DC.
Subarbusto. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Gaultheria L.

Gaultheria antarctica Hook. f.

Sin.: *Arbutus serpyllifolia* Lam., *Gaultheria serpyllifolia* (Lam.) Skottsb., *Pernettya serpyllifolia* (Lam.) DC.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Gaultheria arassatubensis R.R. Silva & Cervi

Hierba. Endémica. 1400-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gaultheria bradeana Sleumer

Subarbusto. Nativa. 1600-2500 m.
Países: BRA(SCA).

Gaultheria caespitosa Poepp. & Endl.

Sin.: *Gaultheria minima* (Phil.) Sandwith, *Pernettya minima* Phil., *Pernettya quadrifida* Phil.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Gaultheria corvensis (R.R. Silva & Cervi) Romão & Kin.-Gouv.

Sin.: *Gaylussacia corvensis* R.R. Silva & Cervi
Subarbusto. Endémica. 1400-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Gaultheria erecta Vent.

Sin.: *Gaultheria saltensis* Sleumer
Arbusto. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(SCA).

Gaultheria insana (Molina) D.J. Middleton

Sin.: *Arbutus furiens* Hook. & Arn., *Arbutus punctata* Hook. & Arn., *Arbutus vernalis* Poepp. & Endl., *Gaultheria furiens* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Gaultheria punctata* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Gaultheria vernalis* (Poepp. & Endl.) Kunze, *Hippomanica*

insana Molina, *Pernettya furiens* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Pernettya insana* (Molina) Gunckel, *Pernettya melanocarpa* Phil., *Pernettya punctata* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Pernettya vernalis* (Poepp. & Endl.) Phil.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(CHU). CHL(TAR, ANT, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Gaultheria itatiaiae Wawra

Sin.: *Agarista itatiaiae* (Wawra) Wawra, *Gaultheria glaziovii* Warm. ex Glaz., nom. nud., *Leucothoe itatiaiae* (Wawra) Drude
Arbusto. Nativa. 1000-2300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gaultheria linifolia (Phil.) Teillier & R. Rodr.

Sin.: *Gaultheria poeppigii* DC. var. *linifolia* (Phil.) D.J. Middleton, *Pernettya leucocarpa* DC. var. *linearis* Reiche, p.p., *Pernettya linifolia* Phil., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *linifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *linifolia* (Phil.) Kausel, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *linifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *linifolia* (Phil.) Sleumer
Arbusto. Endémica. 0-1900 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Gaultheria marticorenae Teillier & P.W. Fritsch

Sin.: *Gaultheria angustifolia* (Lindl.) Teillier, *Gaultheria mucronata* (L. f.) Hook. & Arn. var. *angustifolia* (Lindl.) D.J. Middleton, *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., *Pernettya angustifolia* Lindl., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *linearis* Reiche, p.p., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *angustifolia* (Lindl.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

Gaultheria mucronata (L. f.) Hook. & Arn.

Sin.: *Arbutus mucronata* L. f., *Arbutus rigida* Banks & Sol. ex Hook. f., *Gaultheria mucronata* (L. f.) Hook. & Arn. var. *microphylla* (Homb.) D.J. Middleton, *Pernettya litoralis* Phil., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *microphylla* Phil. ex Reiche, *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex

Spreng. var. *parvifolia* (Phil.) Skottsbl., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *rupicola* (Phil.) Reiche, *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng., *Pernettya oblongifolia* Hombr. & Jacq., *Pernettya ovalifolia* Hombr. & Jacq., *Pernettya parvifolia* Phil., *Pernettya philippii* Gand., *Pernettya rupicola* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Gaultheria myrsinoides Kunth

Sin.: *Andromeda prostrata* Cav., *Pernettya cavanillesiana* G. Don, nom. illeg., *Pernettya densa* Rusby, *Pernettya pentandlii* DC., *Pernettya prostrata* (Cav.) DC., *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *pentlandlii* (DC.) Sleumer, *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *purpurea* (D. Don ex G. Don) Sleumer, *Pernettya prostrata* (Cav.) Sleumer, comb. superfl., *Pernettya purpurea* D. Don ex G. Don
Arbusto. Nativa. 2800-4100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Gaultheria nubigena (Phil.) B.L. Burt & Sleumer

Sin.: *Pernettya nubigena* Phil.
Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA).

Gaultheria phillyreifolia (Pers.) Sleumer

Sin.: *Arbutus phillyreifolia* Pers., *Gaultheria florida* Phil., *Gaultheria lanceolata* Phil., *Gaultheria mucronata* Phil., hom. illeg., *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *racemosa* Phil. ex Reiche, *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn., *Gaultheria phillyreifolia* (Pers.) Sleumer var. *florida* (Phil.) Kausel, *Pernettya ilicifolia* Miq., nom. nud., *Pernettya palenae* Phil., *Pernettya phillyreifolia* (Pers.) DC.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Gaultheria poeppigii DC.

Sin.: *Gaultheria myrtilloides* Poepp. & Endl., nom. illeg., *Gaultheria poeppigii* DC. var. *nana* (Sleumer) D.J. Middleton, *Pernettya buxifolia* Phil., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *buxifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *cordobensis*

Sleumer, *Pernettya myrtilloides* Griseb. ex Phil., *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *myrtilloides*, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *nana* (Sleumer) Sleumer, *Pernettya patagonica* Speg., *Pernettya philippiana* Speg., *Pernettya phillyreifolia* (Pers.) DC. var. *araucana* Kuntze, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *nana* Sleumer
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Gaultheria pumila (L. f.) D.J.

Middleton var. **leucocarpa** (DC.) D.J. Middleton
Sin.: *Pernettya andina* Meigen, nom. nud., *Pernettya breviflora* Phil., *Pernettya empetrifolia* (Lam.) Gaudich. var. *leucocarpa* (DC.) Wedd., *Pernettya gayana* (DC.) Decne., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *gayana* DC., *Pernettya leucocarpa* DC., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook. var. *leucocarpa* (DC.) Kausel, *Pernettya trinervia* Gand.
Arbusto. Endémica. 600-3200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Gaultheria pumila (L. f.) D.J. Middleton var. **pumila**

Sin.: *Andromeda empetrifolia* Lam., *Arbutus pumila* L. f., *Gaultheria pumila* (L. f.) D.J. Middleton var. *crassifolia* (Phil.) D.J. Middleton, *Pernettya crassifolia* Phil., *Pernettya empetrifolia* (Lam.) Gaudich., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook. var. *crassifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya pumila* (L. f.) Hook. var. *empetrifolia* (Lam.) Hook. f.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Gaultheria racemulosa (DC.) D.J. Middleton

Sin.: *Pernettya bridgesii* Phil., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *mutica* Hook. & Arn., *Pernettya racemulosa* DC., *Pernettya rigida* (Bertero ex Colla) DC.
Arbusto. Endémica. 100-1400 m.
Países: CHL(JFE).

Gaultheria renjifoana Phil.

Arbusto. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Gaultheria serrata (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv. var. **organensis** (Meisn.) Luteyn

Sin.: *Gaultheria organensis* Meisn., *Brossea organensis* (Meisn.) Kuntze
Arbusto. Nativa. 1000-2700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gaultheria serrata (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv. var. **serrata**

Sin.: *Andromeda serrata* Vell.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Gaultheria tenuifolia (Phil.) Sleumer

Sin.: *Gaultheria elegans* (Phil.) Reiche, *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *major* Hook. & Arn., *Gaultheria promaucana* Phil., *Gaultheria salicifolia* Phil., *Gaultheria tenuifolia* (Phil.) Sleumer var. *elegans* (Phil.) Kausel, *Gaultheria tenuifolia* (Phil.) Sleumer var. *promaucana* (Phil.) Kausel, *Pernettya elegans* Phil., *Pernettya promaucana* Phil., *Pernettya reticulata* Phil., *Pernettya tenuifolia* Phil.
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Gaultheria ulei Sleumer

Arbusto. Endémica. 1200-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gaylussacia Kunth

Gaylussacia amoena Cham.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Gaylussacia angustifolia Cham.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gaylussacia arassatubensis R.R. Silva & Cervi

Hierba. Endémica. 1300-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn.

Sin.: *Gaylussacia brasiliensis* (Spreng.) Meisn. var. *pubescens* (Cham. & Schltdl.) Meisn., *Gaylussacia pseudovaccinium* Cham. & Schltdl. var. *pubescens* Cham. & Schltdl., *Gaylussacia pseudovaccinium* Cham. & Schltdl., *Vaccinium brasiliensis* Spreng.
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN).

Gaylussacia caratuvensis R.R. Silva & Cervi
Arbusto. Endémica. 1500-1800 m.
Países: BRA(PAR).

Gaylussacia cardenasii A.C. Sm.
Arbusto. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Gaylussacia densa Cham.
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Gaylussacia paranaensis Romão & Kin.-Gouv.
Arbusto. Endémica. 800 m.
Países: BRA(PAR).

Gaylussacia pseudogaultheria Cham. & Schltdl.
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gaylussacia rhododendron Cham. & Schltdl.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Lebetanthus Endl., nom. cons.

Lebetanthus myrsinites (Lam.) Dusén
Sin.: *Andromeda myrsinites* Lam.,
Arbutus microphylla G. Forst., *Gaultheria microphylla* (G. Forst.) Hook. f.,
Lebetanthus americanus (Hook.) Endl.,
Pernettya hookeri Nied., *Pernettya myrsinites* (Lam.) G. Don, *Prionotes americana* Hook., *Prionotes myrsinites* (Lam.) Skottsb.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Vaccinium L.

Vaccinium floribundum Kunth
Sin.: *Vaccinium floribundum* Kunth
var. *ramosissimum* (Dunal) Sleumer,
Vaccinium ramosissimum Dunal
Arbusto. Nativa. 2500-3500 m.
Países: ARG(SAL).

ERIOCAULACEAE

Actinocephalus (Körn.) Sano

Actinocephalus polyanthus (Bong.) Sano
Sin.: *Dupatya polyanthus* (Bong.)
Kuntze, *Eriocaulon polyanthum* Bong.,

Paepalanthus polyanthus (Bong.) Kunth,
Paepalanthus polyanthus (Bong.) Kunth
var. *villosus* Beauverd, *Paepalanthus polyanthus* (Bong.) Kunth f. *villosus* (Beauverd) Moldenke & L.B. Sm.
Hierba. Nativa. 900-2300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Comanthera L.B. Sm.

Comanthera xeranthemoides (Bong.) L.R. Parra & Giul.
Sin.: *Eriocaulon xeranthemoides* Bong.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eriocaulon L.

Eriocaulon arechavaletae Herter
Sin.: *Eriocaulon latifolium* Arechav.,
hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(RGS). URY(CAS, TAC).

Eriocaulon caaguazuensis Ruhland
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, CAU, CAN).

Eriocaulon crassiscapum Bong.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Eriocaulon dictyophyllum Körn.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eriocaulon elichrysoide Bong.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

Eriocaulon gomphrenoides Kunth
Hierba. Nativa. 1000-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eriocaulon itapevense Alff & Stützel
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Eriocaulon leptophyllum Kunth
Sin.: *Eriocaulon argentinum* A. Cast.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA). URY(CAS).

Eriocaulon ligulatum (Vell.) L.B. Sm.
Sin.: *Dupatya ligulata* Vell., *Eriocaulon*

kunthii Körn., *Eriocaulon vaginatum* Körn.
Hierba. Nativa. 700-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eriocaulon magnificum Ruhland
Sin.: *Eriocaulon deslandesii* Silveira,
Eriocaulon reitzii Moldenke & L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(ROC).

Eriocaulon magnum Abbiatti
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, PAI).

Eriocaulon megapotamicum Malme
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Eriocaulon missionum A. Cast.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(MIS).

Eriocaulon modestum Kunth
Sin.: *Eriocaulon candidum* Moldenke,
Eriocaulon modestum Kunth f. *viviparum*
Herzog ex Moldenke & L.B. Sm.,
Eriocaulon moldenkei Herter, *Eriocaulon proximum* Steud.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAU, SPE). URY(CAS).

Eriocaulon radiosum (Ruhland) A. Oliveira
Sin.: *Eriocaulon ulaei* Ruhland var.
radiosum Ruhland
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Eriocaulon reitzii Moldenke & L.B. Sm.
Hierba acuática. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Eriocaulon sellowianum Kunth
Sin.: *Eriocaulon paranense* Moldenke,
Eriocaulon sellowianum Kunth var. *paranense*
(Moldenke) Moldenke & L.B. Sm.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).

Eriocaulon ulaei Ruhland
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Eriocaulon weddellianum A. Oliveira
Sin.: *Eriocaulon sellowianum* Kunth
var. *longifolium* Moldenke
Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Leiothrix Ruhland**Leiothrix arechavaletae** Ruhland

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MON, RIV).

Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland
var. **flavescens**

Sin.: *Dupatya flavescens* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon flavescens* Bong., *Leiothrix affinis* Silveira, *Leiothrix edwallii* Silveira, *Leiothrix flavescens* (Bong.) Ruhland var. *glabra* Silveira, *Leiothrix flavescens* (Bong.) Ruhland var. *parvifolia* Moldenke, *Leiothrix tenuifolia* Silveira, *Paepalanthus flavescens* (Bong.) Körn.

Hierba. Nativa. 1000-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland
var. **polystemma** (Silveira) Giul. & Hensold

Sin.: *Leiothrix polystemma* Silveira, *Leiothrix polystemma* Silveira var. *robusta* Silveira
Hierba. Nativa. 1000-1800 m.
Países: BRA(PAR).

Paepalanthus Mart.**Paepalanthus albo-vaginatus** Silveira
var. **albobracteatus** Tissot-Squalli

Hierba. Endémica. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paepalanthus albo-vaginatus Silveira
var. **albo-vaginatus**

Hierba. Nativa. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paepalanthus albo-vaginatus Silveira
var. **fuscobracteatus** Tissot-Squalli

Hierba. Endémica. 1100-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Paepalanthus balansae Ruhland var.
balansae

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, GUA, SPE).

Paepalanthus balansae Ruhland var.
densiflorus Moldenke

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Paepalanthus bellus Moldenke

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Paepalanthus bryoides (Riedel ex Bong.) Kunth

Sin.: *Dupatya bryoides* (Riedel ex Bong.) Kuntze, *Eriocaulon bryoides* Riedel ex Bong.
Hierba. Nativa. 600-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Paepalanthus caldensis Malme

Sin.: *Paepalanthus decipiens* Ruhland, *Paepalanthus dusenii* Ruhland ex Moldenke, nom. nud., *Paepalanthus ruhlandii* Silveira ex Ruhland
Hierba. Nativa. 600-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paepalanthus catharinae Ruhland
var. **catharinae**

Sin.: *Paepalanthus brevipedunculatus* Moldenke
Hierba. Endémica. 200-2200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paepalanthus catharinae Ruhland
var. **hatschbachii** (Moldenke) Moldenke & L.B. Sm.

Sin.: *Paepalanthus hatschbachii* Moldenke
Hierba. Endémica. 1000-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paepalanthus decorus Abbiatti

Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(RGS).

Paepalanthus henriquei Silveira & Ruhland

Hierba. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Paepalanthus kleinii (Moldenke & L.B.Sm.) Trovó

Sin.: *Paepalanthus leiseringii* Ruhland var. *kleinii* Moldenke & L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(SCA).

Paepalanthus paulensis Ruhland

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Paepalanthus planifolius (Bong.) Körn.

Sin.: *Dupatya planifolia* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon planifolium* Bong., *Paepalanthus iridifolius* Kunth, *Paepalanthus monticola* Mart., *Paepalanthus planifolius* (Bong.) Körn. var. *major* Körn.
Hierba. Nativa. 1100-2100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

Paepalanthus pruinosus Ruhland

Hierba. Nativa. 900-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paepalanthus striatus Ruhland

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Paepalanthus tessmannii Moldenke

Hierba. Endémica. 1000-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Syngonanthus Ruhland**Syngonanthus anthemidiflorus** (Bong.) Ruhland

Sin.: *Eriocaulon anthemidiflorum* Bong., *Paepalanthus anthemidiflorus* (Bong.) Kunth
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland

Sin.: *Dupatya caulescens* (Poir.) Kuntze, *Eriocaulon caulescens* Poir., *Eriocaulon splendens* Bong., *Paepalanthus caulescens* (Poir.) Kunth, *Syngonanthus caulescens* (Poir.) Ruhland var. *angustifolius* Moldenke, *Syngonanthus caulescens* (Poir.) Ruhland var. *proliferus* Moldenke
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(MAL).

Syngonanthus chrysanthus (Bong.) Ruhland

Sin.: *Dupatya chrysantha* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon chrysanthum* Bong., *Eriocaulon morulum* (Kunth) Steud., *Paepalanthus chrysanthus* (Bong.) Körn., *Paepalanthus morulum* Kunth
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON).

Syngonanthus fischerianus (Bong.) Ruhland

Sin.: *Dupatya fischeriana* (Bong.) Kuntze, *Eriocaulon fischerianum* Bong., *Eriocaulon nardifolium* (Kunth) Steud., *Paepalanthus fischerianus* (Bong.) Körn., *Paepalanthus nardifolius* Kunth, *Syngonanthus breviracemosus* Diogo
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Syngonanthus gracilis (Bong.)

Ruhland

Sin.: *Dupatya gracilis* (Bong.) Kuntze,
Eriocaulon gracile Bong., *Paepalanthus*
arechavaletae Körn. ex Arechav.

Paepalanthus gracilis (Bong.) Körn.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,
CAU, CON, SPE). URY(CAS).

Syngonanthus helminthorrhizus

(Mart. ex Körn.) Ruhland

Sin.: *Dupatya helminthorrhiza* (Mart.
ex Körn.) Kuntze, *Eriocaulon umbellatum*
Bong., *Paepalanthus helminthorrhizus*
Mart. ex Körn.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: PRY(AMA).

Syngonanthus nitens (Bong.) Ruhland

Sin.: *Dupatya nitens* (Bong.) Kuntze,
Eriocaulon nitens Bong., *Paepalanthus*
nitens (Bong.) Körn., *Syngonanthus*
chrysanthus (Bong.) Ruhland var.

castrensis Moldenke & L.B. Sm.,

Syngonanthus nanus Moldenke

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum P. Browne**Erythroxylum ambiguum** Peyr.

Sin.: *Erythroxylum ambiguum* Peyr. var.
hymenophyllum O.E. Schulz

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Erythroxylum anguifugum Mart.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON, SPE).

Erythroxylum argentinum O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum argentinum* O.E.
Schulz var. *calophyllum* O.E. Schulz,
Erythroxylum ovatum Griseb., hom. illeg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS,
SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Erythroxylum buxus Peyr.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Erythroxylum campestre A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Erythroxylum catharinense Amaral

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

Erythroxylum cuneifolium (Mart.)

O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum cuneifolium* (Mart.)

O.E. Schulz var. *silvaticum* O.E. Schulz,

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E.

Schulz var. *squarrosom* O.E. Schulz,

Erythroxylum microphyllum A. St.-Hil.

var. *cuneifolium* Mart.

Arbusto. Nativa. 1800-2000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ,
CAU, CAN, CEN, CHO, CON, COA,
GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE).

Erythroxylum cuspidifolium Mart.

Sin.: *Erythroxylum actinocalyx* Mart.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Erythroxylum deciduum A. St.-Hil.

Sin.: *Erythraea deciduum* A. St.-

Hil. var. *brevifolium* (Mart.) O.E.

Schulz, *Erythroxylum hasslerianum*

Chodat f. *angustifolium* Chodat &

Hassl., *Erythroxylum hasslerianum*

Chodat, *Erythroxylum nanum* A. St.-

Hil., *Erythroxylum nitidum* Mart. var.

brevifolium Mart.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN,
COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Erythroxylum gonoclados (Mart.)

O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum microphyllum* A. St.-

Hil. var. *gonocladum* Mart.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Erythroxylum microphyllum A. St.-Hil.

Sin.: *Erythroxylum perpusillum* Fern.

Casas

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, COA, SPE).

URY(ART, TYT).

Erythroxylum myrsinites Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, GUA, MIE).
URY(ART, RIV, TAC).

Erythroxylum pachyneurum O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum hasslerianum*

Chodat f. *ellipticum* Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU).

Erythroxylum paraguariense

(Chodat & Hassl.) O.E. Schulz

Sin.: *Erythroxylum distortum* Mart.

var. *paraguariense* Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON, COA, SPE).

Erythroxylum patentissimum O.E.

Schulz

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CON).

Erythroxylum pelleterianum A. St.-Hil.

Sin.: *Erythroxylum verruculosum* O.E. Schulz

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA,
CAN, COA, PAI, SPE).

Erythroxylum suberosum A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,
CAN, CON, SPE).

Erythroxylum substriatum O.E. Schulz

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Erythroxylum umbu Costa-Lima

Sin.: *Erythroxylum amplifolium*

(Mart.) O.E. Schulz, nom. illeg.,
Erythroxylum microphyllum A. St.-Hil.
var. *amplifolium* Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(ART, MON).

ESCALLONIACEAE

Escallonia Mutis ex L.f.**Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **alpina**

Sin.: *Escallonia alpina* Poepp. ex DC.
var. *glaberrima* Phil., *Escallonia araucana*
Phil., *Escallonia britteniana* Rendle,
Escallonia fonckii Phil. var. *araucana*
(Phil.) Reiche, *Escallonia fonckii* Phil.,
Escallonia misella Gand., *Escallonia*
sparsiflora Phil.

Arbusto. Endémica. 200-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, MAG, RME).

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. **glabrata** (Phil.) Sleumer
Sin.: *Escallonia glabrata* Phil.
Arbusto. Endémica. 600-2000 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Escallonia angustifolia C. Presl
Sin.: *Escallonia angustifolia* C. Presl
var. *coquimbensis* (J. Remy) Acevedo & Kausel, *Escallonia coquimbensis* J. Remy var. *salicifolia* Reiche, *Escallonia coquimbensis* J. Remy, *Escallonia graefiana* Hosseus, nom. nud.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-3300 m.
Países: ARG(SJU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ).

Escallonia bifida Link & Otto
Sin.: *Escallonia floribunda* Humb., Bonpl. & Kunth var. *montevicensis* Cham. & Schltld., nom. illeg., *Escallonia montevicensis* (Cham. & Schltld.) DC., *Escallonia pugae* Phil.
Árbol. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA). URY(MAL, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).

Escallonia callcottiae Hook. & Arn.
Sin.: *Escallonia callcottiae* Hook. & Arn. var. *fernandeziana* (Phil.) Engl., *Escallonia fernandeziana* Phil., *Escallonia rubricaulis* Colla
Arbusto o árbol. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(JFE).

Escallonia carmelitana Meyen
Sin.: *Escallonia alpina* Poepp. ex DC. var. *carmelitana* (Meyen) Acevedo & Kausel, *Escallonia flavescens* C. Presl
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Escallonia chlorophylla Cham. & Schltld.
Sin.: *Escallonia candida* Lem., *Escallonia canescens* A. St.-Hil., *Escallonia tomentosa* Cambess. ex Niederl., nom. nud.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Escallonia cordobensis (Kuntze) Hosseus
Sin.: *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *cordobensis* Kuntze
Arbusto. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Escallonia farinacea A. St.-Hil.
Sin.: *Escallonia farinacea* A. St.-Hil.

var. *jordanensis* (Sleumer) Sleumer, *Escallonia jordanensis* Sleumer
Arbusto. Nativa. 800-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Escallonia florida Poepp. ex DC.
Arbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Escallonia gayana Acevedo & Kausel
Sin.: *Escallonia paniculata* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Escallonia hypoglauca Herzog
Arbusto o árbol. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Escallonia illinita C. Presl var. **illinita**
Sin.: *Escallonia andina* Phil., p.p., *Escallonia grahamiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Escallonia illinita* C. Presl var. *alfa* Hook. & Arn., *Escallonia illinita* C. Presl var. *cupularis* Hook. & Arn. ex Reiche, *Escallonia mertensiana* Rupr. ex A. Gray, nom. nud.
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Escallonia illinita C. Presl var. **pubicalycina** Briq.
Sin.: *Escallonia illinita* C. Presl var. *stenopetala* (Kunze) Acevedo & Kausel, *Escallonia stenopetala* Kunze
Arbusto. Endémica. 100-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Escallonia laevis (Vell.) Sleumer
Sin.: *Escallonia humilis* A. St.-Hil., *Vigieria laevis* Vell.
Arbusto. Nativa. 800-2300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Escallonia ledifolia Sleumer
Arbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Escallonia leucantha J. Remy
Sin.: *Escallonia bellidifolia* Phil., *Escallonia modesta* Briq., *Escallonia pycnantha* Briq.
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Escallonia megapotamica Spreng.
Sin.: *Escallonia megapotamica* Spreng. var. *spiraeifolia* (Cham. & Schltld.)

Sleumer, *Escallonia resinosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *dodoneifolia* Cham. & Schltld., *Escallonia resinosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *spiraeifolia* Cham. & Schltld., *Escallonia sellowiana* DC. var. *salicifolia* A. St.-Hil., *Escallonia sellowiana* DC. var. *spiraeifolia* (Cham. & Schltld.) DC., *Escallonia sellowiana* DC., *Escallonia spiraeoides* A. St.-Hil., *Escallonia vaccinioides* A. St.-Hil., *Escallonia vaccinioides* A. St.-Hil. var. *guaranitica* A. St.-Hil.
Arbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO).

Escallonia millegrana Griseb.
Sin.: *Clethra bridgesii* B. Fedtsch., *Escallonia bridgesii* Rusby
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Escallonia myrtilloides L. f.
Sin.: *Escallonia adscendens* Rusby, *Escallonia corymbosa* (Ruiz & Pav.) Pers., *Escallonia hypsophila* Diels, *Escallonia tortuosa* Kunth, *Stereoxylon corymbosum* Ruiz & Pav.
Arbusto o árbol. Nativa. 2800-4000 m.
Países: ARG(SAL).

Escallonia myrtoidea Bertero ex DC.
Sin.: *Escallonia andina* Phil., p.p., *Escallonia arguta* C. Presl, *Escallonia claudii* Killip, *Escallonia illinita* C. Presl var. *andina* (Phil.) Reiche, *Escallonia microcarpa* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Escallonia reflexa* Gillies, *Escallonia revoluta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *berteroana* Kausel
Arbusto o árbol. Endémica. 100-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Escallonia obtusissima A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Escallonia petrophila Rambo & Sleumer
Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glabra** Engl.
Sin.: *Escallonia berteriana* DC., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *berteriana* (DC.) Pamp., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *resiniflua* (Walp.) Pamp., *Escallonia resiniflua* Walp.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers. var. **pulverulenta**

Sin.: *Escallonia spinulosa* Kunth ex Engl., nom. nud., *Stereoxylon pulverulentum* Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-2000 m. Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Escallonia revoluta (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Escallonia affinis* Rupr. ex A. Gray, nom. nud., *Escallonia hirsuta* C. Presl, *Escallonia thyrsoides* Bertero, nom. nud., *Stereoxylon revolutum* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-1800 m. Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI).

Escallonia rosea Griseb.

Sin.: *Escallonia chonotica* Phil., *Escallonia longidens* Phil., *Escallonia montana* Phil., *Escallonia pterocladon* Hook., *Escallonia rosea* Griseb. var. *rupestris* (Phil.) Reiche, *Escallonia rupestris* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m. Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glutinosa** (Phil.) Reiche

Sin.: *Escallonia glutinosa* Phil. Arbusto. Endémica. 100-2100 m. Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **macrantha** (Hook. & Arn.) Reiche

Sin.: *Escallonia macrantha* Hook. & Arn. Arbusto. Endémica. 0-1000 m. Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**

Sin.: *Escallonia concinna* Phil., *Escallonia dumetorum* Phil., *Escallonia duplicatoserrata* J. Remy, *Escallonia glandulosa* Smith, *Escallonia littoralis* Phil. var. *concinna* (Phil.) Reiche, *Escallonia littoralis* Phil., *Escallonia macrantha* Hook. & Arn. var. *duplicatoserrata* (J. Remy) Engl., *Escallonia poeppigiana* DC. var. *longifolia* DC., *Escallonia poeppigiana* DC., *Escallonia punctata* DC., *Escallonia rahmeri* Phil. var. *obovata* Speg., *Escallonia rahmeri* Phil., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *albiflora* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *concinna* (Phil.) Reiche, *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var.

dumetorum (Phil.) Acevedo & Kausel, *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *glabriuscula* Hook. & Arn., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *multiflora* Poepp. & Endl., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *poeppigiana* (DC.) Reiche, *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *punctata* (DC.) Hook. f., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *uniflora* Poepp. & Endl., *Stereoxylon rubrum* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-2300 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **thalassica** Kausel

Arbusto. Endémica. 0-400 m. Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Escallonia schreiteri Sleumer

Sin.: *Escallonia paniculata* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. var. *acuminatissima* Kuntze

Arbusto o arbolito. Nativa. 1000-3000 m. Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Escallonia serrata Sm.

Sin.: *Celastrus venustus* Banks & Sol. ex Hook. f., *Escallonia serrata* Sm. var. *microphylla* Pamp., *Stereoxylon serratum* (Sm.) Poir.

Arbusto. Endémica. 0-400 m. Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Escallonia tucumanensis Hosseus

Arbusto o árbol. Nativa. 500-2900 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers.

Sin.: *Escallonia angustifolia* Phil., nom. illeg., *Escallonia patagonica* Gand., *Escallonia philippiana* (Engl.) Mast., *Escallonia stenophylla* Phil., *Escallonia stricta* J. Remy, *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *pavoniana* Pamp., *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *philippiana* Engl., *Stereoxylon virgatum* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m. Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Tribeles Phil.**Tribeles australis** Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(RNE, SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Valdivia Gay ex J. Remy**Valdivia gayana** J. Remy

Hierba. Endémica. 0-300 m. Países: CHL(LRI).

EUPHORBIACEAE

Acalypha L.**Acalypha amblyodonta** (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Sin.: *Acalypha amblyodonta* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *villosa* Müll. Arg., *Acalypha cuspidata* Jacq. var. *amblyodonta* Müll. Arg., *Acalypha lagoensis* Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Ricinocarpus amblyodontus* (Müll. Arg.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA).

Acalypha apetiolata Allem & Waetcher

Subarbusto. Endémica. 0-600 m. Países: BRA(RGS).

Acalypha boliviensis Müll. Arg.

Sin.: *Ricinocarpus boliviensis* (Müll. Arg.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1700 m. Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, SDE, TUC).

Acalypha brasiliensis Müll. Arg.

Sin.: *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. f. *cordata* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *cordata* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *longipes* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *mollis* Müll. Arg., *Ricinocarpus brasiliensis* (Müll. Arg.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-2200 m. Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Acalypha chaquensis Cardiel & I.

Montero

Subarbusto. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CHA). PRY(APY).

Acalypha clausenii (Turcz.) Müll. Arg.

Sin.: *Odonteilema clausenii* Turcz. Subarbusto. Nativa. Países: BRA(PAR).

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **apicalis** (N.E. Br.) Cardiel & P. Muñoz

Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Acalypha communis* Müll. Arg. f. *longipetiolata* Chodat & Hassl., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *guaranitica* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APA, APY, AMA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **communis**

Sin.: *Acalypha agrestis* Morong ex Britton, *Acalypha apicalis* N.E. Br., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *agrestis* (Morong ex Britton) Chodat, *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *tomentella* Müll. Arg., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *tomentosa* Müll. Arg., *Acalypha gracilis* Griseb., hom. illeg., *Ricinocarpus cordobensis* (Müll. Arg.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SJO, TAC).

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.)

Cardiel & P. Muñoz

Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *salicifolia* Pax & K. Hoffm., *Acalypha paraguariensis* Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
PRY(APY, AMA, CEN, PAI, PHA, SPE).

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **saltensis** (Pax & K. Hoffm.) Cardiel & P. Muñoz

Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *saltensis* Pax & K. Hoffm., *Acalypha friesii* Pax & K. Hoffm.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **tracheliifolia** (Pax & K. Hoffm.)

Cardiel & P. Muñoz

Sin.: *Acalypha tracheliifolia* Pax & K. Hoffm.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(ERI). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, TAC).

Acalypha gracilis Spreng.

Sin.: *Acalypha divaricata* Baill., nom. illeg., *Acalypha gracilis* Spreng. var. *divaricata* (Baill.) Pax & K. Hoffm., comb. illeg., *Ricinocarpus gracilis* (Spreng.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA). URY(ART, PAY, SAO).

Acalypha hassleriana Chodat

Sin.: *Acalypha glandulosa* (Kuntze) Chodat & Hassl., nom. inval., *Acalypha glandulosa* Chodat & Hassl. var. *brevistachya* Chodat & Hassl., *Acalypha hassleriana* Chodat var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Acalypha hassleriana* Chodat var. *glandulosa* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Ricinocarpus glandulosus* Kuntze

Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(CAN, COA, SPE).

Acalypha herzogiana Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Acalypha dimorpha* Chodat & Hassl., nom. illeg., *Acalypha nitschkeana* Pax & K. Hoffm.

Hierba. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).
PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Acalypha lycioides Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Acalypha divaricata* Griseb., nom. illeg. Arbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Acalypha multicaulis Müll. Arg.

Sin.: *Acalypha multicaulis* Chodat & Hassl., nom. nud., *Acalypha multicaulis* Müll. Arg. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm., *Acalypha pruriens* Chodat & Hassl., nom. illeg., *Ricinocarpus multicaulis* (Müll. Arg.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(COL, CLA, SAO, TYT).

Acalypha omissa Pax & K. Hoffm.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Acalypha plicata Müll. Arg.

Sin.: *Acalypha cordifolia* Griseb., *Acalypha cordifolia* Hook. f. var. *polyadenia* Griseb., *Acalypha flabellifera*

Rusby, *Acalypha plicata* Griseb., nom. illeg., *Ricinocarpus cordifolius* (Griseb.) Kuntze, comb. illeg.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Acalypha poiretii Spreng.

Sin.: *Acalypha macrostachya* Poir., hom. illeg., *Ricinocarpus poiretii* (Spreng.) Kuntze

Hierba. Nativa. 400-1300 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).
BRA(SCA).

Acalypha schreiteri Lillo ex Lourteig & O'Donell

Arbusto o árbol. Endémica. 1500-1800 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Acalypha sehnmii Allem & Irgang

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Acalypha senilis Baill.

Sin.: *Acalypha rotundifolia* Herter, *Ricinocarpus senilis* (Baill.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CAU). URY(DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC, TYT).

Acalypha striolata Lingelsh.

Nativa. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA).

Acalypha uleana L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Acalypha variabilis Klotzsch ex Baill.

Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg. f. *hirsutissima* Chodat & Hassl., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *hirta* (Spreng.) Müll. Arg., comb. illeg., *Acalypha cordobensis* Müll. Arg. var. *rotundata* Griseb., *Acalypha cordobensis* Müll. Arg., *Acalypha hirta* Spreng., hom. illeg., *Acalypha montevidensis* Klotzsch ex Pax & K. Hoffm., nom. nud., *Acalypha variabilis* Klotzsch ex Baill. var. *albescens* Baill., *Acalypha variabilis* Klotzsch ex Baill. var. *angustifolia* Baill.

Hierba. Nativa. 700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SLU, SFE, SDE). PRY(AMA, CAU, COA, MIE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, FLO, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SJO).

Acalypha vellamea Baill.

Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg.
var. *brevipetiolata* Chodat & Hassl.,
Ricinocarpus vellameus (Baill.) Kuntze
Hierba. Nativa. 300-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS). PRY(AMA).

Acalypha villosa Jacq.

Sin.: *Ricinocarpus villosus* (Jacq.) Kuntze
Arbusto. Nativa. 100-400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CON).

Acalypha wilkesiana Müll. Arg.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CEN).

Actinostemon Mart. ex
Klotzsch**Actinostemon conceptionis** (Chodat
& Hassl.) Hochr.

Sin.: *Dactylostemon klotzschii* D.
Dietr. var. *conceptionis* Chodat & Hassl.,
Dactylostemon klotzschii D. Dietr. var.
heterophyllus Müll. Arg., *Dactylostemon*
klotzschii D. Dietr. var. *obtusatus* Chodat
& Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA,
PAI, SPE).

Actinostemon concolor (Spreng.)
Müll. Arg.

Sin.: *Actinostemon multiflorus* Müll.
Arg., *Actinostemon oligandrus* (Müll.
Arg.) Baill., *Actinostemon polymorphus*
Müll. Arg., *Dactylostemon oligandrus*
Müll. Arg., *Gussonia concolor* Spreng.,
Gymnanthes concolor (Spreng.) Müll.
Arg., *Stillingia concolor* (Spreng.) Baill.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN,
CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(TYT).

Actinostemon klotzschii (Didr.) Pax
Sin.: *Dactylostemon klotzschii* Didr.

Arbusto a árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Actinostemon rosellii L. Oliveira, A.L.
Melo & M.F. Sales
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Adelia L., nom. cons.**Adelia membranifolia** (Müll. Arg.)
Chodat & Hassl.

Sin.: *Adelia membranifolia* (Müll. Arg.)
Chodat & Hassl. f. *hirsuta* Chodat &
Hassl., *Adelia membranifolia* (Müll. Arg.)
Chodat & Hassl. var. *spinosa* Chodat &
Hassl., *Adelia spinosa* (Chodat & Hassl.)
Pax & K. Hoffm. var. *hassleri* Pax & K.
Hoffm., *Adelia spinosa* (Chodat & Hassl.)
Pax & K. Hoffm. var. *hirsuta* (Chodat &
Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Adelia spinosa*
(Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.,
Ricinella membranifolia Müll. Arg. var.
spinosa Chodat & Hassl., *Ricinella*
membranifolia Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, MIS). PRY(CEN,
CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

Adenopeltis Bertero ex A. Juss.**Adenopeltis serrata** (W.T. Aiton) I.M.
Johnst.

Sin.: *Adenopeltis colliguaya* Bertero ex A.
Juss., *Excoecaria colliguaya* (Bertero ex A.
Juss.) Baill., *Excoecaria marginata* (Baill.)
Griseb., *Excoecaria serrata* W.T. Aiton,
Stillingia glandulosa Dombey ex Baill.

Arbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Alchornea Sw.**Alchornea castaneifolia** (Willd.) A. Juss.

Sin.: *Alchornea castaneifolia* (Willd.)
A. Juss. var. *salicifolia* (Baill.) Baill.,
Hermesia castaneifolia Willd., *Hermesia*
salicifolia Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área
del proyecto). PRY(APY, CON, COA).

Alchornea glandulosa Poepp. subsp.
iricurana (Casar.) Secco

Sin.: *Alchornea iricurana* Casar.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, CAU, CAN, COA, ITA, PAI).

Alchornea sidifolia Müll. Arg.
Sin.: *Alchornea pycnogyne* Müll. Arg.
Árbol. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Alchornea triplinervia (Spreng.)
Müll. Arg.

Sin.: *Alchornea janeirensis* Casar.,
Alchornea nemoralis Mart., *Alchornea*
triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.
var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval.,
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.
Arg. var. *iricuranoideus* Chodat & Hassl.,
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.
Arg. var. *janeirensis* (Casar.) Müll. Arg.,
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.
Arg. var. *nemoralis* (Mart.) Pax & K.
Hoffm., *Antidesma triplinervia* Spreng.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, PAI).

Aleurites J.R. Forst. & G. Forst.**Aleurites moluccanus** (L.) Willd.

Sin.: *Jatropha moluccana* L.
Árbol. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(COS, MIS).

Aparisthium Endl.**Aparisthium cordatum** (A. Juss.) Baill.

Sin.: *Conceveibum cordatum* A. Juss.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Astraea Klotzsch**Astraea cincta** (Müll. Arg.) Caruzo &
Cordeiro

Sin.: *Astraea aureomarginata*
(Chodat & Hassl.) P.E. Berry, *Astraea*
hauthalii (Kuntze) P.E. Berry, *Croton*
aureomarginatus Chodat & Hassl., *Croton*
cinctus Müll. Arg., *Croton hauthalii*
(Kuntze) K. Schum., *Croton rumicifolius*
Chodat & Hassl., *Oxydectes cincta* (Müll.
Arg.) Kuntze, *Oxydectes hauthalii* Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).PRY(CAU, CAN,
PAI, SPE).

Astraea lobata (L.) Klotzsch

Sin.: *Croton lobatus* L.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA,
PAI, PHA). URY(ART, PAY, RNO, SAO,
SOR, TAC).

Astraea manihot (Müll. Arg.) O.L.M. Silva & Cordeiro
Hierba o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Avellanita Phil.

Avellanita bustillosii Phil.
Arbusto. Endémica. 300-800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Bernardia Mill., nom. cons.

Bernardia alarici Allem & Irgang
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Bernardia argentinensis Lourteig & O'Donell
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, SDE, TUC).

Bernardia asplundii Lourteig
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Bernardia caperoniifolia (Baill.) Müll. Arg.
Sin.: *Adelia caperoniifolia* Baill., *Bernardia guaranitica* Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(CAN).

Bernardia flexuosa Pax & K. Hoffm.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Bernardia hassleriana Chodat
Sin.: *Bernardia hassleriana* Chodat var. *tobatensis* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Bernardia leptostachys Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(CAN).

Bernardia longipedunculata (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Bernardia peduncularis* Müll. Arg. f. *spiciflora* Chodat & Hassl., *Bernardia peduncularis* Müll. Arg. f. *subcapituliflora* Chodat & Hassl., *Bernardia peduncularis* Müll. Arg. var. *longipedunculata* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CON).

Bernardia multicaulis Müll. Arg.
Sin.: *Bernardia apaensis* Chodat & Hassl. var. *subintegra* Chodat & Hassl., *Bernardia apaensis* Chodat & Hassl., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *apaensis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *fistulosa* Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *obovata* Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *subintegra* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg., *Polyboea lorentzii* (Müll. Arg.) Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI). URY(PAY, RNO).

Bernardia odonellii Villa
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Bernardia paraguariensis Chodat & Hassl.
Sin.: *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *orbiculata* Chodat & Hassl., *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *rhombofolia* Chodat & Hassl., *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *fruticosa* Chodat & Hassl., *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *parvifolia* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(APY).

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. var. **curuguatensis**
Sin.: *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *salicina* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 200-700 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. var. **polymorpha**
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAA, CAN, CON).

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. var. **setosa** Chodat & Hassl.
Sin.: *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *angustifolia* Pax & K. Hoffm., *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *elliptica* Pax & K. Hoffm.
Subarbusto. Endémica. 200-700 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg.
Sin.: *Adelia pulchella* Baill., *Bernardia ambigua* Pax & K. Hoffm., *Bernardia confertifolia* Müll. Arg. var. *glabrata* Pax & K. Hoffm., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *acuminata* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *acutidens* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *acutidentata* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *breviserrata* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *lanceolata* Müll. Arg., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Bernardia sellowii Müll. Arg.
Sin.: *Bernardia geniculata* Allem & J.L. Waechter, *Bernardia hagelundii* Allem & Irgang
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(COS, ERI, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(PAY).

Bernardia simplex Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Bia Klotzsch

Bia alienata Didr.
Sin.: *Bia sellowiana* Klotzsch ex Baill., *Tragia alienata* (Didr.) Múlgura & M.M. Gut., *Tragia cissooides* Müll. Arg., *Tragia sellowiana* (Baill.) Müll. Arg.
Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).

Breynia J.R. Forst. & G. Forst., nom. cons.

Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Caperonia A. St.-Hil.

Caperonia altissima Eskuche
Hierba palustre. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(SPE).

Caperonia buettneriacea Müll. Arg.
Subarbusto. Nativa. 400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Caperonia capiibarensis Eskuche
Hierba palustre. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(GUA, SPE).

Caperonia castaneifolia (L.) A. St.-Hil.
Sin.: *Croton castaneifolius* L., *Caperonia bahiensis* Müll. Arg. f. *latior* Chodat & Hassl., *Caperonia latior* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(AMA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(SAO).

Caperonia cordata A. St.-Hil.
Sin.: *Caperonia cordata* A. St.-Hil. var. *mollis* Pax & K. Hoffm.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAA, ITA, ÑEE, PHA). URY(CLA).

Caperonia glabrata Pax & K. Hoffm.
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(MIE, ÑEE, PHA).

Caperonia linearifolia A. St.-Hil.
Sin.: *Caperonia hystrix* Pax & K. Hoffm.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, MON, ROC, SJO, TYT).

Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil.
Sin.: *Croton palustris* L.
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAU, CEN, ÑEE, PHA).

Caperonia paraguayensis Pax & K. Hoffm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(SPE).

Chiropetalum A. Juss.

Chiropetalum anisotrichum (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia anisotricha* Müll. Arg., *Argythamnia gymnadenia* Müll. Arg., *Chiropetalum gymnadenium* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chiropetalum argentinense Skottsbo.
Sin.: *Argythamnia argentinense* (Skottsbo.) Allem & Irgang
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, LPA, LRI, SDE, SFE, SLU, TUC).

Chiropetalum berterianum Schltld. var. **berterianum**
Sin.: *Argythamnia berteriana* (Schltld.) Müll. Arg., *Chiropetalum berterianum* Schltld. f. *macrantha* Skottsbo.
Subarbusto. Endémica. 200-1800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

Chiropetalum berterianum Schltld. var. **psiladenium** Skottsbo.
Sin.: *Argythamnia berteriana* (Schltld.) Müll. Arg. var. *psiladenia* (Skottsbo.) J.W. Ingram
Subarbusto. Endémica. 600 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Chiropetalum boliviense (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia boliviensis* Müll. Arg., *Argythamnia triandra* (Griseb.) Allem & Irgang, *Chiropetalum triandrum* Griseb.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Chiropetalum canescens Phil.
Sin.: *Argythamnia canescens* (Phil.) F. Phil., *Argythamnia sponiella* Müll. Arg., *Chiropetalum gigouxii* Espinosa, *Chiropetalum sponiella* (Müll. Arg.) Pax
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Chiropetalum cremnophilum I.M. Johnst.
Sin.: *Argythamnia cremnophila* (I.M. Johnst.) J.W. Ingram
Subarbusto. Endémica. 200 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Chiropetalum foliosum (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia foliosa* Müll. Arg.
Hierba a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Chiropetalum griseum Griseb.
Sin.: *Argythamnia grisea* (Griseb.) Allem & Irgang, *Argythamnia mollis* Kuntze, nom. nud., *Chiropetalum cupreum* Pax & K. Hoffm.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, SLU). PRY(APY, ÑEE, PHA). URY(SJO).

Chiropetalum intermedium Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia intermedia* (Pax & K. Hoffm.) Allem & Irgang
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(CAS, FLO, FLA).

Chiropetalum molle (Baill.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia mollis* Baill., *Argythamnia pilosistyla* Allem & Irgang, *Chiropetalum pilosistylum* (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Chiropetalum patagonicum (Speg.) O'Donell & Lourteig
Sin.: *Aonikena patagonica* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SCR, SLU).

Chiropetalum phalacradenium (J.W. Ingram) L.B. Sm. & Downs
Sin.: *Argythamnia phalacradenia* J.W. Ingram
Subarbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Chiropetalum puntaloberense
Alonso Paz & Bassagoda
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(ROC).

Chiropetalum ramboi (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Argythamnia ramboi* Allem & Irgang
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Chiropetalum tricoccum (Vell.) Chodat & Hassl.
Sin.: *Argythamnia lineata* (Klotzsch) Baill., comb. illeg., *Argythamnia tricocca* (Vell.) Müll. Arg., *Chiropetalum lineatum* Klotzsch, nom. nud., *Chiropetalum tricoccum* (Vell.) Chodat & Hassl. f. *latifolius* Chodat & Hassl., *Desfontaena tricocca* Vell.
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI). URY(DUR, FLO, FLA, RNO, SAO).

Chiropetalum tricuspdatum (Lam.) A. Juss.

Sin.: *Argythamnia tricuspdatum* (Lam.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Argythamnia tricuspdatum* (Lam.) Müll. Arg. var. *lanceolata* (Cav.) Müll. Arg., *Argythamnia tricuspdatum* (Lam.) Müll. Arg., *Chiropetalum lanceolatum* (Cav.) A. Juss., *Chiropetalum ovatum* Phil., *Chiropetalum tricuspdatum* (Lam.) A. Juss. var. *genuinum* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Chiropetalum tricuspdatum* (Lam.) A. Juss. var. *lanceolatum* (Cav.) Pax & K. Hoffm., *Croton lanceolatum* Cav., *Croton tricuspdatum* Lam.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI).

Cnidoscolus Pohl

Cnidoscolus albomaculatus (Pax) I.M. Johnst.

Sin.: *Cnidoscolus tetracyclus* Pax & K. Hoffm., *Jatropha albomaculata* Pax, *Jatropha albomaculata* Pax var. *nana* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha albomaculata* Pax var. *stimulosissima* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha albomaculata* Pax var. *subcuneata* Pax, *Jatropha vitifolia* Mill. f. *nana* Chodat & Hassl., *Jatropha vitifolia* Mill. f. *stimulosissima* Chodat & Hassl.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Cnidoscolus appendiculatus (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha appendiculata* Pax & K. Hoffm.
Hierba. Endémica. 100-600 m.
Países: ARG(MIS, TUC). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CON, SPE).

Cnidoscolus campanulatus (Pax) Pax

Sin.: *Jatropha campanulata* Pax
Hierba o arbusto. Endémica. 100-400 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAA, CON, COA, SPE).

Cnidoscolus hasslerianus (Pax) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha hassleriana* Pax
Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Cnidoscolus leuconeurus (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Cnidoscolus leuconeurus* (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm. ex Fern. Casas, comb. superfl., *Jatropha leuconeura* Pax & K. Hoffm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAA).

Cnidoscolus loasoides (Pax) I.M. Johnst.

Sin.: *Jatropha loasoides* Pax
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). PRY(ITA).

Cnidoscolus maracayensis (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha maracayensis* Chodat & Hassl.
Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(CAN).

Cnidoscolus pteroneurus Fern. Casas
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Cnidoscolus serrulatus (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha serrulata* Pax & K. Hoffm.
Hierba o arbusto. Endémica. 100-700 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Cnidoscolus subinteger (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha subintegra* (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm., *Jatropha vitifolia* Mill. f. *subintegra* Chodat & Hassl.
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: PRY(ITA).

Cnidoscolus tenuifolius (Pax & K. Hoffm.) I.M. Johnst.

Sin.: *Jatropha tenuifolia* Pax & K. Hoffm., nom. illeg.
Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Cnidoscolus urens (L.) Arthur

Sin.: *Cnidoscolus lofgrenii* (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm., *Cnidoscolus neglectus* Pohl, *Cnidoscolus tubulosus* (Müll. Arg.) I.M. Johnst. var. *trilobus* (Müll. Arg.) Lourteig & O'Donell, *Cnidoscolus urens* (L.) Arthur var. *neglectus* (Pohl) Lourteig, *Cnidoscolus vitifolius* (Mill.) Pohl var. *repandus* Griseb., *Jatropha lofgrenii* Pax & K. Hoffm., *Jatropha tubulosa* Müll. Arg. var.

triloba Müll. Arg., *Jatropha urens* L.
Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, GUA, PAI).

Cnidoscolus vitifolius (Mill.) Pohl var. **cnicodendrum** (Griseb.) Lourteig & O'Donell

Sin.: *Cnidoscolus cnicodendrum* Griseb., *Jatropha vitifolia* Mill. var. *cnicodendrum* (Griseb.) Pax, *Jatropha vitifolia* Griseb. var. *grisebachii* Pax
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL). PRY(APY, PAI).

Colliguaja Molina

Colliguaja brasiliensis Klotzsch ex Baill.

Arbusto o árbol. Endémica. 500-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Colliguaja dombeyana A. Juss.

Arbusto. Endémica. 0-2700 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, RME).

Colliguaja integerrima Gillies & Hook.

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, SDE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, MAG, RME).

Colliguaja odorifera Molina

Sin.: *Croton colliguay* Molina, *Colliguaja obtusa* Regel, *Colliguaja triquetra* Gillies & Hook.
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Colliguaja salicifolia Gillies & Hook.

Sin.: *Colliguaja dombeyana* Gay, nom. illeg.
Arbusto. Endémica. 200-1800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Croton L.

Croton aberrans Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, MIE, PAI, SPE).

Croton ackermannianus (Müll. Arg.) G.L. Webster

Sin.: *Julocroton ackermannianus* Müll. Arg.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAA, PAI).

Croton allemii G.L. Webster

Sin.: *Julocroton ramboi* L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAN).

Croton andinus Müll. Arg.

Sin.: *Croton psammophilus* Lillo

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PHA).

Croton antisiphiliticus Mart.

Sin.: *Croton antisiphiliticus* Mart.

var. *cordiaefolius* Müll. Arg., *Croton*

antisiphiliticus Mart. var. *latifolius*

(Baill.) Müll. Arg., *Croton perdicipes* Baill.

var. *latifolius* Baill.

Hierba o subarbusto. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Croton apostolon Radcl.-Sm. &

Govaerts

Sin.: *Julocroton vulpinus* Croizat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton argenteus L.

Sin.: *Cicca argentea* (L.) Kuntze,

Cicca montevidensis (Klotzsch ex Baill.)

Kuntze, *Croton integer* (Chodat) Radcl.-

Sm. & Govaerts, *Julocroton argenteus*

(L.) Didr., *Julocroton camporum* Chodat

& Hassl., *Julocroton elaeagnoides* S.

Moore, *Julocroton integer* Chodat f.

parvifolia Chodat & Hassl., *Julocroton*

integer Chodat, *Julocroton linearifolius*

(Chodat & Hassl.) Croizat, *Julocroton*

montevidensis Klotzsch ex Müll. Arg. var.

linearifolius Chodat & Hassl., *Julocroton*

montevidensis Klotzsch ex Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC).

PRY(APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN,

ITA, ÑEE, PHA).

Croton argentinus Müll. Arg.

Arbusto. Endémica. 200-2100 m.

Países: ARG(BAI, COR, SLU).

BRA(RGS). URY(MON).

Croton argyrophyllus Kunth

Sin.: *Croton argyroglossus* Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(APY, CAN).

Croton beetlei Croizat

Árbol. Nativa. 200-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Croton berberifolius Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(AMA, PAI).

Croton bonplandianus Baill.

Sin.: *Croton pauperulus* Müll. Arg.,

Croton rivinoides Chodat, *Croton*

sparsiflorus Morong

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,

SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY,

AMA, BOQ, CON, COA, ÑEE, PHA).

URY(ART).

Croton bresolinii L.B. Sm. & Downs

Arbusto o subarbusto. Endémica. 100 m.

Países: BRA(SCA).

Croton calonervosus G.L. Webster

Sin.: *Julocroton nervosus* Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton calyciglandulosus Allem

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Croton calycireduplicatus Allem

Arbusto. Endémica. 900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Croton campestris A. St.-Hil.

Hierba, subarbusto o arbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA,

CAN, CAA, CAU, SPE).

Croton catamarcensis Ahumada

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, SDE).

Croton catharinensis L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 1400 m.

Países: BRA(SCA).

Croton ceanothifolius Baill.

Sin.: *Croton pallidulus* Baill.

Arbusto. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton celtidifolius Baill.

Sin.: *Croton cynanchicus* Baill., *Croton*

oreophilus Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton chaetophorus Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 500-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Croton chamaepitys Baill.

Sin.: *Croton arechavaletae* Herter ex

Arechav., *Croton pycnocephalus* Baill. var.

chamaepitys (Baill.) Müll. Arg., *Croton*

trichocephalus Müll. Arg. var. *brevifolius*

Müll. Arg., *Croton trichocephalus* Müll.

Arg. var. *intermedius* Müll. Arg.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(LAV, MAL).

Croton chilensis Müll. Arg.

Sin.: *Croton collinus* Phil., hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 300-800 m.

Países: CHL(ANT).

Croton chloroleucus Müll. Arg.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Croton chodatii (Croizat) P.E. Berry

Sin.: *Julocroton chodatii* Croizat,

Julocroton pycnophyllus Schlttd. f.

latifolia Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-600 m.

Países: PRY(CAN).

Croton cinerellus Müll. Arg.

Sin.: *Croton cinerellus* Müll. Arg. f.

parvifolia Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa.

Países: PRY(COA, GUA, PAI).

Croton confinis L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 1000-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Croton cooperianus (Croizat) Radcl.-

Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton cooperianus* Croizat

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(AMA).

Croton cordobensis Ahumada

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, COR, SDE, SLU).

Croton cuchillae-nigrae Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(MON, RIV, TAC).

Croton curiosus Croizat

Subarbusto. Nativa. 1500-2600 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Croton curuguatyensis Ahumada

Sin.: *Croton pohlianus* Müll. Arg. var. *macrophyllus* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 200-500 m.

Países: PRY(CAN).

Croton dichrous Müll. Arg.

Arbusto a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Croton didrichsenii G.L. Webster

Sin.: *Croton lithrifolius* (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts, *Croton solanaceus* (Müll.

Arg.) G.L. Webster, *Julocroton humilis*

Didr. var. *solanaceus* (Müll. Arg.) Müll.

Arg., *Julocroton humilis* Didr., *Julocroton*

lithrifolius Croizat, *Julocroton solanaceus*

(Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *niveus* Chodat

& Hassl., *Julocroton solanaceus* (Müll. Arg.)

Müll. Arg., *Julocroton typhicephalus* Croizat

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, COA, PAI).

Croton doctoris S. Moore

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Croton doratophylloides (Croizat)

G.L. Webster

Sin.: *Julocroton doratophylloides* Croizat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Croton doratophyllum Baill.

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Croton dracunculoides Baill.

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Croton dusenii Croizat

Subarbusto. Endémica. 900-1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton echinulatus (Griseb.) Croizat

Sin.: *Croton pycnocephalus* Baill. var. *echinulatus* Griseb.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(SAO).

Croton empোরorum Croizat

Arbusto. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(SAL).

Croton ericoides Baill.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

Croton erythroxyloides Baill.

Sin.: *Croton riedelianus* Müll. Arg.,

Croton buxifolius Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 1400-1500 m.

Países: BRA(SCA).

Croton eskucheii Ahumada

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(CEN, ÑEE).

Croton flavispicatus Rusby

Sin.: *Julocroton paniculatus* Pax & K. Hoffm.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).

Croton floribundus Spreng.

Sin.: *Croton maracayuensis* Chodat & Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Croton garckeanus Baill.

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton glandulosus L.

Sin.: *Croton divaricatus* Sw., *Croton*

glandulosus L. var. *scordioides* (Lam.)

Müll. Arg., *Croton scordioides* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI). URY(SAO).

Croton glechomifolius Müll. Arg.

Sin.: *Croton tragifolius* Baill.

Hierba. Nativa. 500-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

Croton gnaphalii Baill.

Sin.: *Croton herteri* Arechav., *Croton troncosoi* Ahumada

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(COL, SJO).

Croton goyazensis Müll. Arg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

Croton gracilipes Baill.

Sin.: *Croton hasslerianus* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Croton grandivelus Baill.

Sin.: *Croton grandivelus* Baill. var.

pannosus Müll. Arg., *Croton pycnocarpus* Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

Croton helichrysum Baill.

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS). 0-600 m.

Croton heterodoxus Baill.

Sin.: *Croton debilis* Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton heteroneurus Müll. Arg.

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(RGS). URY(MON).

Croton hieronymi Griseb.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

Croton hilarii Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: URY(LAV, ROC, TYT).

Croton hirtus L'Hér.

Sin.: *Croton glandulosus* L. subsp.

hirtus (L'Hér.) Croizat, *Croton*

glandulosus L. var. *cordovensis* Müll. Arg.,

Croton glandulosus L. var. *hirtus* (L'Hér.)

Müll. Arg., *Croton guaraniticus* Chodat &

Hassl., *Croton verbenifolius* Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR,

JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,

CAU, CAA, CAN, MIE, PAI, SPE).

Croton holodiscus (Croizat) Radcl.-

Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton holodiscus* Croizat

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(RGS). PRY(CAU).

Croton ichthygaster L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Croton integrilobus Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Croton isabellei Baill.

Arbusto. Endémica. 400-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

- Croton julopsidium** Baill.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(RGS).
- Croton kleinii** L.B. Sm. & Downs
Arbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(SCA).
- Croton lachnostachyus** Baill.
Sin.: *Croton sarcopetalus* Müll. Arg.,
Croton tucumanensis Griseb. var. *oblongatus*
Griseb., *Croton tucumanensis* Griseb.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE,
SFE, SLU, TUC). PRY(APY, CEN, COA,
PHA, SPE).
- Croton lachnostephanus** Baill.
Sin.: *Croton paxianus* Herter ex
Arechav., *Croton pycnocephalus* Baill.
var. *lachnostephanus* (Baill.) Müll. Arg.,
Croton trichocephalus Müll. Arg. var.
rigidus Müll. Arg.
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(MAL).
- Croton lanatus** Lam. var. **astrogynus**
(Baill.) P.E. Berry
Sin.: *Croton astrogynus* Baill., *Croton*
crassirameus Müll. Arg., *Croton laseguei*
Müll. Arg., *Croton macrostigma* Chodat,
Croton silvanus Croizat
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAA, COA, PAI).
- Croton lanatus** Lam. var. **lanatus**
Sin.: *Croton harmsianus* Herter ex
Arechav., *Croton thermarum* Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(LAV, MAL, MON).
- Croton lanatus** Lam. var. **lorentzii**
(Müll. Arg.) P.E. Berry
Sin.: *Croton lorentzii* Müll. Arg.
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI).
- Croton lanatus** Lam. var. **ruderalis**
(Ahumada) P.E. Berry
Sin.: *Croton ruderalis* Ahumada
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(ERI).
- Croton lanatus** Lam. var. **tatacuensis**
(Ahumada) P.E. Berry
Sin.: *Croton tatacuensis* Ahumada
Subarbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(COS).
- Croton landoltii** Ahumada
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS).
- Croton lauretynus** Ahumada
Sin.: *Croton multirameus* Ahumada
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).
- Croton leptophyllus** Müll. Arg.
Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR).
- Croton linearifolius** Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Croton lombardianus** Croizat
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(CAS, MON).
- Croton longicarpus** A.P.N. Pereira,
Caruzo & Riina
Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Croton lundianus** (Didr.) Müll. Arg.
Sin.: *Croton glandulosus* L. var.
lundianus (Didr.) L.B. Sm. & B.J. Downs,
Podostachys lundianus Dir.
Hierba, subarbusto o arbusto. Nativa.
400-1200 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Croton macrobothrys** Baill.
Sin.: *Croton vauthieri* Müll. Arg.
Árbol. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Croton malvoides** (Croizat) Radcl.-Sm.
& Govaerts
Sin.: *Julocroton malvoides* Croizat
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS).
PRY(PHA). URY(Desconocida).
- Croton microcarpus** Müll. Arg.
Subarbusto. Nativa. 100-300 m.
Países: PRY(CEN).
- Croton missionum** Croizat
Sin.: *Croton ituzaingensis* Ahumada
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(CAU, GUA).
- Croton montevidensis** Spreng.
Sin.: *Croton penaeaceus* Baill., *Oxydectes*
montevidensis (Spreng.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). URY(FLA,
LAV, MAL).
- Croton muellerianus** L.R. Lima
Arbusto o subarbusto. Endémica.
1300-1600 m.
Países: BRA(PAR).
- Croton myrianthus** Müll. Arg.
Sin.: *Croton pallidulus* Baill. var.
myrianthus (Müll. Arg.) L.B. Sm. & S.F. Sm.
Arbusto. Endémica. 700-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Croton nitrariifolius** Baill.
Sin.: *Croton codonocalyx* Baill., *Croton*
polymorphus Müll. Arg. var. *velleriflorus*
(Baill.) Müll. Arg., *Croton nitrariifolius*
Baill. var. *velleriflorus* (Baill.) Müll.
Arg., *Croton polymorphus* Müll. Arg.
var. *glabrescens* Müll. Arg., *Croton*
velleriflorus Baill.
Arbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(LAV, MAL,
MON, RIV, TAC, TYT).
- Croton occidentalis** Müll. Arg.
Sin.: *Croton occidentalis* Müll. Arg. var.
intermedius Chodat & Hassl., *Croton*
occidentalis Müll. Arg. var. *ovalifolius*
Chodat & Hassl., *Croton occidentalis*
Müll. Arg. var. *oblongifolius* Chodat &
Hassl., *Croton occidentalis* Müll. Arg.
var. *parvifolius* Chodat & Hassl., *Croton*
occidentalis Müll. Arg. var. *setosus*
Chodat & Hassl., *Croton occidentalis*
Müll. Arg. f. *rupestris* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN, CEN, COA, PAI).
- Croton odontadenius** Müll. Arg.
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(APA).
- Croton orbignyanus** Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CAT, COR). PRY(APY).
- Croton ovalifolius** Vahl
Sin.: *Croton siderophyllus* Baill. var.
hirsutus (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Croton*
venturii Croizat var. *cheirotenos* Croizat,
Croton venturii Croizat
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL,
SDE, TUC). PRY(APY, AMA, PHA).
- Croton pallidulus** Baill.
Arbusto a Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Croton paraguayensis** Chodat
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).

Croton parvifolius Müll. Arg.

Sin.: *Croton ventanicolus* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI,
LPA, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS).
URY(ROC, TYT).

Croton patrum L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.
Países: BRA(SCA).

Croton pedicellatus Kunth

Arbusto a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Croton pedersenii Ahumada

Subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CAU).

Croton pervicosus Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(AMA).

Croton phyllanthus (Chodat & Hassl.)

G.L. Webster

Sin.: *Julocroton phyllanthus* Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(CAN, SPE).

Croton piluliferus Rusby

Sin.: *Croton densiflorus* Pax & K. Hoffm.,
Croton oranensis Hieron., nom. nud.
Árbol. Nativa. 300-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Croton polygonoides L.B. Sm. &

Downs

Arbusto. Endémica. 800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton pycnocephalus Baill.

Sin.: *Croton pycnocephalus* Baill. var.
argyrocomus Baill., *Croton pycnocephalus*
Baill. var. *genuinus* Müll. Arg., nom.
inval., *Croton pycnocephalus* Baill. var.
leptophylloides Müll. Arg.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). URY(MAL, MON).

Croton pygmaeus L.R. Lima

Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Croton pyrosoma (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton pyrosoma* Croizat
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA).

Croton quintasii Allem

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Croton ramboi Allem

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Croton ramellae Ahumada

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, AMA).

Croton reitzii L.B. Sm. & Downs

Arbolito. Endémica. 500-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton robustior (L.B.Sm. & Downs)

Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton humilis* Didr. var.
robustior L.B. Sm. & Downs
Arbusto. Endémica. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).
PRY(CEN). URY(Desconocida).

Croton rupestris (Chodat & Hassl.)

G.L. Webster

Sin.: *Julocroton montevidensis*
Klotzsch ex Müll. Arg. f. *longepetiolata*
Chodat & Hassl., *Julocroton rupestris*
Chodat & Hassl. var. *velutinus* Chodat
& Hassl., *Julocroton rupestris* Chodat &
Hassl., *Julocroton velutinus* (Chodat &
Hassl.) Croizat
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAA,
CAN, CON, COA, PAI).

Croton rutilus (Chodat & Hassl.) G.L.

Webster

Sin.: *Julocroton pulcher* Croizat,
Julocroton rutilus Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). PRY(CAA, CAN).

Croton saltensis Griseb.

Sin.: *Croton saltensis* Griseb. var.
discolor Griseb.
Arbusto. Nativa. 400-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Croton salutaris Casar.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Croton santolinus Baill.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS).

Croton senescens Croizat

Sin.: *Croton fuscus* Müll. Arg. var.

microbracteata Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(CAU, COA).

Croton serpyllifolius Baill.

Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Croton serratifolius Baill.

Sin.: *Croton corrientesianus* Baill.,
nom. nud., *Croton garckeanus* Baill. var.
genuinus Müll. Arg., nom. inval., *Croton*
garckeanus Baill. var. *guaraniticus* Chodat
& Hassl., *Croton garckeanus* Baill. var.
major Müll. Arg., *Croton garckeanus*
Baill., *Croton myriadenus* Müll. Arg. f.
abortivus Müll. Arg., *Croton myriadenus*
Müll. Arg. var. *normalis* Müll. Arg., nom.
inval., *Croton myriadenus* Müll. Arg.,
Croton myriodontus Müll. Arg., *Croton*
pimelaes Baill. *Croton staechadis* Baill.
var. *silvaticus* (Chodat & Hassl.) Croizat
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COR, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,
CAU, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Croton setiger Hook.

Sin.: *Eremocarpus setiger* (Hook.) Benth.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, RME).

Croton spissirameus Radcl.-Sm. &

Govaerts

Sin.: *Julocroton crassirameus* Croizat
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA).

Croton splendidus Mart. ex Colla

Sin.: *Croton migrans* Casar., *Croton*
splendidus Baill., nom. illeg.
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton stenotrichus Müll. Arg.

Arbusto. Endémica. 900-1100 m.
Países: ARG(SAL). BRA(RGS, SCA).
URY(LAV).

Croton subcinerellus Croizat

Sin.: *Croton subcinerellus* Croizat var.
aquidabanensis Croizat
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CEN, PAI).

Croton subpannosus Müll. Arg. ex Griseb.

Sin.: *Croton dentosus* Griseb., *Julocroton brittonianum* Morong, *Julocroton serratus* Müll. Arg., *Julocroton subpannosus* (Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg. var. *chacoensis* Croizat, *Julocroton subpannosus* (Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg. var. *formosensis* Croizat, *Julocroton subpannosus* (Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg. var. *posadensis* Croizat, *Julocroton subpannosus* (Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg. var. *uruguayensis* Croizat, *Julocroton subpannosus* (Müll. Arg. ex Griseb.) Müll. Arg.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(COA, ÑEE). URY(DUR).

Croton thellungianus (Herter ex Arechav.) Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton thellungianus* Herter ex Arechav.

Arbusto. Endémica.
Países: URY(Desconocida).

Croton thymelinus Baill.

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Croton tricolor Klotzsch ex Baill.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Croton trinitatis Millsp.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Croton triqueter Lam.

Sin.: *Julocroton phagedaenicus* Mart., *Julocroton triqueter* (Lam.) Didr.
Arbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, PAI, SPE).

Croton urucurana Baill.

Sin.: *Croton dracona* Larrañaga, *Croton succiruber* D. Parodi
Arbolito o árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAD). URY(PAY, SAO).

Croton uruguayensis Baill.

Sin.: *Croton coelebogyne* Baill., *Croton gaudichaudii* Baill., *Croton minutiflorus* Müll. Arg.
Croton tenuissimus Baill., nom. nud.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS, SCA). PRY(APA). URY(FLO, PAY, ROC, SAO, SOR, TYT).

Croton verbascoides G.L. Webster

Sin.: *Julocroton verbascifolius* (Klotzsch) Müll. Arg. var. *angustifolius* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, SPE).

Croton villosissimus (Chodat &

Hassl.) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton villosissimus* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa.
Países: ARG(TUC). BRA(PAR, RGS).
PRY(CAN, ÑEE). URY(Desconocida).

Croton viridulus (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts

Sin.: *Julocroton viridulus* Croizat
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Croton vulnerarius Baill.

Sin.: *Croton stenandrus* Müll. Arg.
Arbusto o árbol. Nativa. 800-1400 m.
Países: BRA(PAR).

Croton yacaensis Croizat

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(COA).

Croton yerbalium Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica.
Países: PRY(CAN, SPE).

Dalechampia L.

Dalechampia anomala Pax & K. Hoffm.

Hierba voluble. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA (PAR). PRY(AMA).

Dalechampia bangii Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Dalechampia boliviana* Gand., hom. illeg.
Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(AMA, CON).

Dalechampia clauseniana Baill.

Sin.: *Dalechampia triphylla* Lam. var. *clauseniana* Müll. Arg., *Dalechampia triphylla* Lam. var. *villosa* Müll. Arg.
Hierba voluble. Nativa. 800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dalechampia ficifolia Lam.

Hierba voluble. Nativa. 200-300 m.
Países: BRA(SCA).

Dalechampia glechomifolia Baill.

Sin.: *Dalechampia microphylla* Müll. Arg.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Dalechampia guaranitica Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(CAU, CAA, CAN, SPE).

Dalechampia hassleriana Chodat

Hierba voluble. Endémica. 100-500 m.
Países: BRA (PAR). PRY(SPE).

Dalechampia leandrii Baill.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Dalechampia linearis Baill.

Sin.: *Dalechampia angustifolia* Mart. ex Pax & K. Hoffm., nom. nud., *Dalechampia linearis* Baill. var. *goyazensis* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia linearis* Baill. var. *hilariana* Baill., *Dalechampia linearis* Baill. var. *subintegra* Müll. Arg.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

Dalechampia meridionalis Müll. Arg.

Sin.: *Dalechampia pallida* Klotzsch ex Pax & K. Hoffm.
Hierba voluble. Nativa.
Países: BRA(PAR). URY(Desconocida).

Dalechampia micromeria Baill.

Sin.: *Dalechampia crenulata* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia micromeria* Baill. var. *angustifolia* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia micromeria* Baill. var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Dalechampia sellowiana* Müll. Arg. var. *subintegra* Müll. Arg., *Dalechampia sellowiana* Müll. Arg.
Hierba voluble. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Dalechampia pentaphylla Lam.

Hierba voluble. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dalechampia reitzkleinii L.B. Sm. & Downs

Hierba voluble. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dalechampia riparia L.B. Sm. & Downs

Hierba voluble. Endémica. 100 m.
Países: BRA(SCA).

Dalechampia scandens L.

Sin.: *Dalechampia fimbriata* Kunth,
Dalechampia scandens L. var. *fimbriata*
(Kunth) Müll. Arg.

Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR). PRY(CEN, COA, PHA).

Dalechampia serrula Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Dalechampia caperonioides* Baill. var.
lanceolata Chodat & Hassl., nom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Dalechampia stenosepala Müll. Arg.

Sin.: *Dalechampia patagonica* Pax &
K. Hoffm.
Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAA,
CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Dalechampia stipulacea Müll. Arg.

Sin.: *Dalechampia stipulacea* Müll. Arg.
var. *minor* (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA,
GUA, PAI, SPE).

Dalechampia sylvestris S. Moore

Hierba voluble. Introducida. 200-700 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Dalechampia triphylla Lam.

Hierba voluble. Nativa. 0-600 m.
Países: PRY(PAI).

Dalechampia ulmifolia Chodat & Hassl.

Sin.: *Dalechampia grüningiana* Pax,
Dalechampia ulmifolia Chodat & Hassl.
var. *grüningiana* (Pax) Pax
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(CAN, COA).

Dalechampia weddelliana Baill.

Sin.: *Dalechampia amambayensis* Pax &
K. Hoffm., *Dalechampia morifolia* Pax &
K. Hoffm., *Dalechampia trichophila* Pax &
K. Hoffm.
Subarbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, SPE).

Ditaxis Vahl ex A. Juss.

Ditaxis acaulis Herter ex Arechav.

Sin.: *Argythamnia acaulis* (Herter ex
Arechav.) J.W. Ingram
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(GUA). URY(TAC).

Ditaxis breviramea (Müll. Arg.) Pax &
K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia breviramea* Müll. Arg.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SDE,
TUC). PRY(APY).

Ditaxis catamarcensis (Griseb.) Pax

Sin.: *Aphora catamarcensis* Griseb.,
Argythamnia catamarcensis Griseb.
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-
1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI,
SAL, SFE, SLU, TUC).

Ditaxis jablonszkyana Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia jablonszkyana* (Pax
& K. Hoffm.) J.W. Ingram
Hierba o arbusto. Endémica. 1000-
1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Ditaxis malpighipila (Hicken) L.C.

Wheeler
Sin.: *Argythamnia malpighipila*
(Hicken) J.W. Ingram, *Croton*
malpighipilus Hicken
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(LPA, MEN, RNE, SAL, SJU).

Ditaxis montevidensis (Didr.) Pax

Sin.: *Argythamnia montevidensis*
(Didr.) Müll. Arg., *Stenonia*
montevidensis Didr.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, SFE). PRY(APY, APA, PHA).
URY(PAY, RNO, SOR).

Ditaxis rhizantha Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia rhizantha* (Pax & K.
Hoffm.) J.W. Ingram
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(ART, PAY, RIV, TAC).

Ditaxis rosularis Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia rosularis* (Pax & K.
Hoffm.) J.W. Ingram
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). URY(TAC).

Ditaxis salina Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Argythamnia salina* (Pax & K.
Hoffm.) J.W. Ingram
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(PAI).

Dysopsis Baill.

Dysopsis glechomoides (A. Rich.)
Müll. Arg.

Sin.: *Dysopsis gayana* Baill., nom. illeg.,
Dysopsis glechomoides (A. Rich.) Müll.
Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval.,
Hydrocotyle glechomoides A. Rich., *Molina*
chilensis Gay
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(COQ, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, MAG).

Dysopsis hirsuta (Müll. Arg.) Skottsrb.

Sin.: *Dysopsis glechomoides* (A. Rich.)
Müll. Arg. var. *hirsuta* Müll. Arg.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(JFE).

Euphorbia L.

Euphorbia acerensis Boiss.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
SDE, TUC).

Euphorbia adenoptera Bertol.

Sin.: *Chamaesyce adenoptera* (Bertol.) Small
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, MIS,
SFE). PRY(PHA).

Euphorbia amandi Oudejans

Sin.: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch
& Garcke) Boiss. var. *dentata* R.E. Fr.,
Euphorbia minuta Phil., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 1500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Euphorbia araucana Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA).

Euphorbia argillosa Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(CON).

Euphorbia bahiensis (Klotzsch &
Garcke) Boiss.

Sin.: *Anisophyllum bahiense* Klotzsch
& Garcke
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Euphorbia berteriana Spreng.

Sin.: *Chamaesyce barberiana* Croizat, *Chamaesyce berteriana* (Spreng.) Millsp.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(PHA).

Euphorbia besseri (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Anisophyllum besseri* Klotzsch & Garcke
Hierba. Endémica.
Países. CHL (Desconocida).

Euphorbia burkartii Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Euphorbia caespitosa Lam. var. **caespitosa**

Sin.: *Euphorbia caespitosa* Lam. subsp. *typica* Croizat, nom. inval.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MEN). URY(MON, ROC).

Euphorbia caespitosa Lam. var. **ventanica** (Croizat) Subils

Sin.: *Euphorbia caespitosa* Lam. subsp. *ventanica* Croizat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Euphorbia catamarcensis (Croizat) Subils

Sin.: *Chamaesyce catamarcensis* Croizat
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Euphorbia chamaerhodos Boiss.

Sin.: *Anisophyllum nanum* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce chamaerhodos* (Boiss.) Croizat, *Chamaesyce nana* (Klotzsch & Garcke) M.P. Simmons & W.J. Hayden, *Euphorbia chamaerhodos* Boiss. var. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Euphorbia macrorrhiza* Glaz., nom. nud., *Euphorbia nana* Klotzsch ex Boiss., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CON, MIE, PAI).

Euphorbia characias L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Euphorbia collina Phil. var. **andina** (Phil.) Subils

Sin.: *Euphorbia andina* Phil., *Euphorbia*

dasyclada Dusén, *Euphorbia portulacoides* L. var. *andensis* Croizat
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU, SCR). CHL(MAU, ARA, MAG).

Euphorbia collina Phil. var.

chrysophylla (Klotzsch & Garcke) Subils
Sin.: *Euphorbia chrysophylla* (Klotzsch & Garcke) Boiss., *Tithymalus chrysophyllus* Klotzsch & Garcke
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

Euphorbia collina Phil. var. **collina**

Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *collina* (Phil.) Croizat
Hierba. Endémica. 0-3100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

Euphorbia collina Phil. var.

glaucescens (Chodat & Wilczek) Subils
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *glaucescens* Chodat & Wilczek
Hierba. Endémica. 1500-3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).

Euphorbia collina Phil. var. **minor** (Hicken) Subils

Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *minor* Hicken
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SCR). CHL(MAG).

Euphorbia collina Phil. var.

nahuelhuapina (Croizat) Subils
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *nahuelhuapina* Croizat
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Euphorbia collina Phil. var.

patagonica (Hieron.) Subils
Sin.: *Euphorbia patagonica* Hieron.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF).

Euphorbia collina Phil. var.

spatulata (Chodat & Wilczek) Subils
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *spatulata* Chodat & Wilczek
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).

Euphorbia comosa Vell.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Euphorbia copiapina Phil.

Sin.: *Euphorbia calderensis* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT, ATA).

Euphorbia cyathophora Murray

Sin.: *Euphorbia heterophylla* L. var. *cyathophora* (Murray) Boiss., *Poinsettia cyathophora* (Murray) Klotzsch & Garcke
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COR, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT). PRY(GUA).

Euphorbia davidii Subils

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, SLU).

Euphorbia dentata Michx.

Sin.: *Euphorbia aureocincta* Croizat, *Poinsettia dentata* (Michx.) Klotzsch & Garcke
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SFE, SLU, TUC). PRY(PAI). URY(FLO).

Euphorbia dioeca Kunth

Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Euphorbia eichleri Müll. Arg.

Sin.: *Chamaesyce eichleri* (Müll. Arg.) Croizat
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Euphorbia elodes Boiss.

Hierba. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Euphorbia elquiensis Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ).

Euphorbia emarginata (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Anisophyllum emarginatum* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce emarginata* (Klotzsch & Garcke) Croizat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: URY(RNO).

Euphorbia engelmannii Boiss.

Sin.: *Chamaesaracha engelmannii* (Boiss.) Soják, *Euphorbia engelmannii* Boiss. var. *depressa* Boiss., *Euphorbia hortensis* Engelm. ex Boiss., nom. nud., *Euphorbia inclinata* Boiss., nom. nud., *Euphorbia rotundifolia* Hook. & Arn., nom. illeg.

Hierba. Endémica. 900-2000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

Euphorbia falcata L.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(RME).

Euphorbia germainii Phil.

Hierba. Endémica. 1600-3200 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Euphorbia graminea Jacq.

Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUJ). BRA(SCA).

Euphorbia guaraniorum P. Carrillo & V.W. Steinm.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: PRY(ITA, MIE).

Euphorbia helioscopia L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, MIS). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, LLA, RME).

Euphorbia heterophylla L.

Sin.: *Poinsettia heterophylla* (L.) Klotzsch & Garcke
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI). URY(SAO).

Euphorbia hieronymi Subils

Sin.: *Euphorbia dioica* Hieron., nom. illeg., *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *major* (Müll. Arg.) Croizat, p.p.
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

Euphorbia hinkleyorum I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Euphorbia hirta L. var. **hirta**

Sin.: *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp., *Euphorbia pilulifera* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl.
Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, IPA). PRY(APY, CEN).

Euphorbia hirta L. var. **ophthalmica** (Pers.) Allem & Irgang

Sin.: *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp. subsp. *procumbens* (DC.) Croizat, *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp. var. *procumbens* (DC.) Moldenke, *Chamaesyce ophthalmica* (Pers.) D.G. Burch, *Euphorbia hirta* L. var. *procumbens* (DC.) N.E. Br., *Euphorbia ophthalmica* Pers., *Euphorbia pilulifera* L. var. *procumbens* (DC.) Boiss., *Euphorbia procumbens* DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). CHL(TAR, VAL). PRY(APY). URY(ART, MON, PAY, SAO).

Euphorbia hirtella Boiss.

Sin.: *Chamaesyce hirtella* (Boiss.) Croizat, *Euphorbia hirtella* Boiss. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA). URY(CAS).

Euphorbia huanchalana (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Euphorbia huanchalana* (Klotzsch & Garcke) Boiss. subsp. *penazuelensis* Croizat, *Tithymalus huanchalana* Klotzsch & Garcke
Hierba. Nativa. 500-4300 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Euphorbia hunzikeri Subils

Sin.: *Chamaesyce hunzikeri* (Subils) Holub
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Euphorbia hypericifolia L.

Sin.: *Chamaesyce hypericifolia* (L.) Millsp., *Euphorbia boliviana* Rusby
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(VAL, IPA). PRY(APY).

Euphorbia hyssopifolia L.

Sin.: *Chamaesyce brasiliensis* (Lam.) Small, *Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small, *Euphorbia brasiliensis* Lam. f. *pruinosa* Chodat, *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *hyssopifolia* (L.) Boiss., nom. illeg., *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *paraguayensis* Chodat, *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *uniflora* Chodat & Hassl., *Euphorbia brasiliensis* Lam., *Euphorbia hyssopifolia* L. var.

paraguayensis (Chodat) Oudejans, *Euphorbia hyssopifolia* L. var. *pruinosa* (Chodat) Oudejans, *Euphorbia hyssopifolia* L. var. *uniflora* (Chodat & Hassl.) Oudejans

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA, PAI). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO).

Euphorbia insulana Vell.

Sin.: *Euphorbia anomala* Salzm. ex Boiss., *Euphorbia insulana* Vell. subsp. *pilcomayense* Croizat, *Euphorbia insulana* Vell. var. *pilcomayensis* (Croizat) Oudejans, *Poinsettia insulana* (Vell.) Klotzsch & Garcke
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, PHA).

Euphorbia invaginata Croizat

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Euphorbia klotzschii Oudejans var. **argentina** (Müll. Arg. ex Griseb.) Oudejans

Sin.: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *argentina* Müll. Arg. ex Griseb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(MAU).

Euphorbia klotzschii Oudejans var. **klotzschii**

Sin.: *Anisophyllum ovalifolium* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Croizat, *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small var. *montevicensis* (Boiss.) Croizat, *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *montevicensis* Boiss., *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss., hom. illeg., *Euphorbia serpens* Kunth var. *montevicensis* (Boiss.) Cabrera
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APY, BOQ, ÑEE, PAI). URY(MON, TAC).

Euphorbia klotzschii Oudejans var.**schizosepala** (Engelm. ex Boiss.)

Oudejans

Sin.: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *schizosepala* Engelm. ex Boiss.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE). URY(COL).

Euphorbia koernerana Allem & IrgangSin.: *Chamaesyce koerneriana* (Allem & Irgang) V.S. Raju & P.N. Rao

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Euphorbia kurtzii Subils

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(COR, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC).

Euphorbia lactiflua Phil.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Euphorbia lasiocarpa KlotzschSin.: *Chamaesyce lasiocarpa* (Klotzsch)Arthur, *Euphorbia hypericifolia* L. var.*lasiocarpa* (Klotzsch) Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).

Euphorbia lathyris L.Sin.: *Tithymalus lathyris* (L.) Hill

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SFE, TUC).

CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

Euphorbia lorentzii Müll. Arg.Sin.: *Euphorbia brasiliensis* Lam. var.*lorentzii* (Müll. Arg.) Griseb., *Chamaesyce**lorentzii* (Müll. Arg.) Croizat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(Desconocida).

Euphorbia lutulenta (Croizat)

Oudejans

Sin.: *Chamaesyce lutulenta* Croizat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(FLA).

Euphorbia macraulonia Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Euphorbia maculata L.Sin.: *Chamaesyce maculata* (L.) Small,*Chamaesyce supina* (Raf.) Moldenke,*Euphorbia supina* Raf.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME). URY(SJO).

Euphorbia marayensis SubilsSin.: *Chamaesyce marayensis* (Subils)

Holub

Hierba. Endémica. 700-1500 m.

Países: ARG(CAT, SAL, SJU).

Euphorbia marginata Pursh

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN). BRA(RGS).

Euphorbia meyeniana KlotzschSin.: *Chamaesyce meyeniana* (Klotzsch)

Croizat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

PRY(APY, PHA).

Euphorbia nutans Lag.Sin.: *Chamaesyce nutans* (Lag.) Small

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COS, JUJ).

Euphorbia oranensis (Croizat) SubilsSin.: *Chamaesyce oranensis* Croizat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY).

Euphorbia ovalleana Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Euphorbia pampeana Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(CAS).

Euphorbia papillosa A. St.-Hil. var. **cabreræ** SubilsSin.: *Euphorbia papillosa* A. St.-Hil. var. *erythrorrhiza* (Klotzsch &Garcke) Subils, *Euphorbia erythrorrhiza*(Klotzsch & Garcke) Boiss., *Tithymalus erythrorrhizus* Klotzsch & Garcke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(CAU).

Euphorbia papillosa A. St.-Hil. var. **papillosa**

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, PAI). URY(SAO).

Euphorbia paranensis Dusén

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Euphorbia pedersenii Subils

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS).

Euphorbia pentadactyla Griseb.Sin.: *Poinsettia pentadactyla* (Griseb.) Dusén

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE). PRY(PHA).

Euphorbia peperomioides Boiss.

Hierba. Nativa. 900-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Euphorbia peplus L.Sin.: *Tithymalus peplus* (L.) Hill

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA). URY(MON).

Euphorbia philippiana (Klotzsch & Garcke) Boiss.Sin.: *Euphorbia pygmaea* Phil., hom. illeg., *Tithymalus philippianus* Klotzsch & Garcke

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO).

Euphorbia platyphyllos L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(PHA).

Euphorbia porphyrantha Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(ANT, ATA).

Euphorbia portucasadiana (Croizat) SubilsSin.: *Chamaesyce portucasadiana*

Croizat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). PRY(PHA).

Euphorbia portulacoides L. var. **acutifolia** Boiss.

Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *porphyrantha* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SLU, TUC).

Euphorbia portulacoides L. var. **major** Müll. Arg.

Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *major* (Müll. Arg.) Croizat, p.p.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Euphorbia portulacoides L. var. **portulacoides**

Sin.: *Euphorbia chilensis* Gay, *Euphorbia portulacoides* L. var. *normalis* Kuntze, *Euphorbia portulacoides* L. var. *obtusifolia* (Müll. Arg.) Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *normalis* (Kuntze) Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. var. *obtusifolia* Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, SAL, SLU, SFE, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON).

Euphorbia potentilloides Boiss.

Sin.: *Anisophyllum caecorum* Klotzsch & Garcke, nom. nud., *Anisophyllum caecorum* Mart. ex Boiss., *Chamaesyce caecorum* (Mart. ex Boiss.) Croizat, *Chamaesyce potentilloides* (Boiss.) Croizat, *Euphorbia caecorum* Mart. ex Boiss.

Hierba. Nativa. 300-1400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, PAI). URY(RIV).

Euphorbia prostrata Aiton

Sin.: *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, SPE). URY(ART).

Euphorbia raphilippii Oudejans

Sin.: *Euphorbia lanceolata* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Euphorbia rhabdodes Boiss.

Sin.: *Tithymalus chrysophyllus* Klotzsch & Garcke var. *angustifolius* Klotzsch & Garcke

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Euphorbia rochaensis (Croizat)

Alonso Paz & Marchesi

Sin.: *Chamaesyce rochaensis* Croizat
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS). URY(ROC).

Euphorbia ruiz-lealii Subils

Sin.: *Chamaesyce ruiz-lealii* (Subils) Holub
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

Euphorbia sarcoceras O.L.M. Silva & Cordeiro

Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Euphorbia schickendantzii Hieron.

Sin.: *Euphorbia evonymocarpa* Chodat & Wilczek

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).

Euphorbia sciadophila Boiss.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CHO, PAI, SPE). URY(ART).

Euphorbia selloi (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Anisophyllum selloi* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce selloi* (Klotzsch & Garcke) Croizat var. *brevisemina* Croizat, *Chamaesyce selloi* (Klotzsch & Garcke) Croizat, *Euphorbia hassleriana* Chodat, *Euphorbia hebegyne* Pax & K. Hoffm. ex Emrich, *Euphorbia setosa* (Boiss.) Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(GUA). URY(COL, PAY, RIV).

Euphorbia serpens Kunth var.**microphylla** Müll. Arg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY). URY(COL, FLA, MON, PAY).

Euphorbia serpens Kunth var. **serpens**

Sin.: *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME, IPA). PRY(APY, PHA). URY(FLA, TAC).

Euphorbia serpyllifolia Pers.

Sin.: *Chamaesyce serpyllifolia* (Pers.) Small
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SLU, TUC).

Euphorbia spathulata Lam.

Sin.: *Euphorbia dictyosperma* Fisch. & C.A. Mey., *Euphorbia pseudopeplus* Speng.
Hierba. Introducida. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, LPA, MIS, RNE). BRA(RGS, SCA). URY(MON).

Euphorbia stenophylla (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sin.: *Tithymalus stenophyllus* Klotzsch & Garcke
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, RIV).

Euphorbia tarapacana Phil.

Hierba. Endémica. 100-1300 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Euphorbia terracina L.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(VAL).

Euphorbia thinophila Phil.

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Euphorbia thymifolia L.

Sin.: *Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(SCA). PRY(CEN).

Euphorbia verna Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(BIO).

Euphorbia vervoorstii Subils

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, SAL).

Gymnanthes Sw.**Gymnanthes boticario** Esser, M.F.A.

Lucena & M.V. Alves
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: PRY(APY).

Gymnanthes discolor (Spreng.) Müll. Arg.

Sin.: *Gussonia discolor* Spreng.,
Sebastiania discolor (Spreng.) Müll. Arg.
var. *fiebrigii* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania*
discolor (Spreng.) Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS).
PRY(APA, CEN, COA).

Gymnanthes edwalliana (Pax & K.

Hoffm.) Esser & L.S. Oliveira

Sin.: *Sebastiania edwalliana* Pax & K.
Hoffm.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, COA, GUA, PAI).

Gymnanthes nervosa Müll. Arg.

Sin.: *Sebastiania nervosa* (Müll. Arg.)
Müll. Arg.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). PRY(COA, PAI).

Hevea Aubl.**Hevea brasiliensis** (Willd. ex A. Juss.)
Müll. Arg.

Sin.: *Siphonia brasiliensis* Willd. ex A. Juss.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Jatropha L.**Jatropha bornmuelleri** Pax

Arbusto. Nativa. 500 m.
Países: BRA(RGS).

Jatropha breviloba (Morong) Pax &
K. Hoffm.

Sin.: *Jatropha gossypifolia* L. var.
breviloba Morong, *Jatropha ribifolia*
(Pohl) Baill. var. *breviloba* (Morong) Pax
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). PRY(APY,
AMA, CEN).

Jatropha curcas L.

Arbusto o arbolito. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR). PRY(COA).

Jatropha dissecta (Chodat & Hassl.) Pax

Sin.: *Jatropha gossypifolia* L. var.
dissecta Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CEN, COA, PAI).

Jatropha elliptica (Pohl) Oken

Sin.: *Adenoropium ellipticum* Pohl,
Jatropha eglanulosa Pax, *Jatropha*
elliptica (Pohl) Oken var. *guaranitica*
Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 200-400 m.
Países: PRY(CAU, PAI, SPE).

Jatropha excisa Griseb. var. **excisa**

Arbusto. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR,
JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,
TUC). PRY(APY).

Jatropha excisa Griseb. var.

pubescens Lourteig & O'Donell
Sin.: *Jatropha matacensis* A. Cast.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR, FOR, JUJ, SAL).
PRY(APY).

Jatropha excisa Griseb. var.

viridiflora Lourteig & O'Donell
Sin.: *Jatropha flavovirens* Pax &
Hoffm., p. p.
Arbusto. Nativa. 500-1800 m.
Países: ARG (JUJ, LRI, SAL, TUC).
PRY (APY).

Jatropha gossypifolia L. var.

elegans (Pohl) Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Jatropha gossypifolia L. var.
gossypifolia

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG (SGO). BRA(PAR, SCA).
PRY(APY, CAU, CEN, MIE).

Jatropha grossidentata Pax & K.
Hoffm.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL).
PRY(APY, PHA).

Jatropha guaranitica Speg.

Sin.: *Jatropha guaranitica* Speg. var.
stipularis Pax & K. Hoffm., *Jatropha*
ribifolia (Pohl) Baill. var. *ambigua* Pax,
Jatropha tacumbensis Pax & K. Hoffm.
Hierba a subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(APY, APA, AMA, CAU,
CAN, CEN, PHA).

Jatropha hieronymi Kuntze

Sin.: *Jatropha paraguayensis* Radcl.-
Sm. & Govaerts, *Jatropha ricinifolia* Pax,
hom. illeg.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ,
LRI, SAL, SJU, SDE, TUC). PRY(APY,
BOQ, CON, PHA).

Jatropha hippocastanifolia Croizat

Sin.: *Jatropha flavovirens* Pax & K.
Hoffm., *Jatropha fortunatoi* Fern. Casas
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE,
SJU, TUC). PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

Jatropha intermedia (Chodat &
Hassl.) Pax

Sin.: *Jatropha gossypifolia* L. f.
glabrata Chodat & Hassl., *Jatropha*
gossypifolia L. f. *latifolia* Chodat &
Hassl., *Jatropha gossypifolia* L. var.
intermedia Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA). PRY(CAU, CAA,
CAN, COA, ITA, SPE).

Jatropha isabelliae Müll. Arg. var.
antisiphilitica (Speg.) Pax

Sin.: *Jatropha antisiphilitica* Speg.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS).

Jatropha isabelliae Müll. Arg. var.
isabelliae

Sin.: *Jatropha antisiphilitica* Speg.,
Jatropha gossypifolia L. var. *grandifolia*
Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia*
L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl.,
Jatropha gossypifolia L. var. *palmata*
Chodat & Hassl., *Jatropha gossypifolia*
L. var. *rhombifolia* Chodat & Hassl.,
Jatropha gossypifolia L. var. *typica*
Chodat & Hassl., *Jatropha isabelliae*
Müll. Arg. var. *cuneifolia* Pax, *Jatropha*
isabelliae Müll. Arg. var. *grandifolia*
(Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha*
isabelliae Müll. Arg. var. *guaranitica*
(Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha*
isabelliae Müll. Arg. var. *palmata* (Chodat
& Hassl.) Pax, *Jatropha isabelliae* Müll.
Arg. var. *rhombifolia* (Chodat & Hassl.)
Pax, *Jatropha puncticulata* Pax & K.
Hoffm., *Jatropha rigidifolia* Pax & K.
Hoffm. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm.,
Jatropha rigidifolia Pax & K. Hoffm.
Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS,
SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, COA, MIE,
PAI, SPE).

Jatropha macrocarpa Griseb.

Sin.: *Jatropha multiflora* Pax & K.
Hoffm., *Jatropha papyrifera* Pax & K.
Hoffm.
Arbusto. Nativa. 100-1600 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, LRI, SAL,
SLU, SDE, TUC). PRY(APY).

Jatropha multifida L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: PRY(PAI).

Jatropha pedersenii Lourteig

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(ITA, MIE).

Jatropha peiranoi Lourteig & O'Donell

Sin.: *Jatropha chacoana* Fern. Casas
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Jatropha weddelliana Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAU, CON).

Mabea Aubl.**Mabea fistulifera** Mart. subsp. **robusta**

Arbusto. Nativa. 200-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Manihot Mill.**Manihot anisophylla** Müll. Arg.

Sin.: *Janipha anisophylla* (Griseb.) Müll. Arg., *Manihot carthagenensis* (Jacq.) Müll. Arg. var. *anisophylla* (Müll. Arg.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, PHA).

Manihot anomala Pohl subsp.

glabrata (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot glabrata* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Manihot langsdorfii* Müll. Arg. var. *glabrata* Chodat & Hassl., *Manihot multiflora* Pax & K. Hoffm., *Manihot pseudoheterophylla* Pax & K. Hoffm., *Manihot pubescens* Pohl f. *glabrata* Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(APY, AMA, CAN, CEN, COA, CON, PAI, PHA, SPE).

Manihot anomala Pohl subsp.

pavoniana (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot pavoniana* Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Manihot caeruleus Pohl emend.

D.J. Rogers & Appan subsp. **macrantha** (Pax & K. Hoffm.) D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot macrantha* Pax & K. Hoffm., *Manihot speciosa* Chodat & Hassl., nom. illeg.
Arbusto o árbol. Endémica. 100-700 m.
Países: PRY(APA, APY, AMA, CAN).

Manihot esculenta Crantz

Sin.: *Manihot flabellifolia* Pohl
Subarbusto. Introducida. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). PRY(AMA, GUA, PAI, PHA).

Manihot gracilis Pohl emend. D.J.

Rogers & Appan
Sin.: *Manihot depauperata* Pax
Subarbusto. Nativa. 200-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Manihot grahamii Hook.

Sin.: *Manihot enneaphylla* Pax & K. Hoffm., *Manihot lobata* (Chodat & Hassl.) Pax, *Manihot tweedieana* Müll. Arg., *Manihot tweedieana* Müll. Arg. var. *lobata* Chodat & Hassl., *Manihot tweedieana* Müll. Arg. f. *nana* Chodat & Hassl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA, MON, RIV, SAO, TAC, TYT).

Manihot guaranitica Chodat & Hassl.

Sin.: *Janipha violacea* Griseb., *Manihot anisitsii* Pax & K. Hoffm., *Manihot fiebrigii* Pax & K. Hoffm., *Manihot grandistipula* Pax & K. Hoffm., *Manihot recognita* Pax
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA, PHA).

Manihot hassleriana Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Manihot hunzikeriana Mart. Crov.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN).

Manihot inflata Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Manihot mirabilis Pax

Arbolito. Endémica. 200-700 m.
Países: PRY(AMA).

Manihot neusana Nassar

Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Manihot pentaphylla Pohl subsp.

graminifolia (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot graminifolia* Chodat & Hassl.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 100-700 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Manihot populifolia Pax

Sin.: *Manihot cordifolia* Pax
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON).

Manihot procumbens Müll. Arg.

Sin.: *Manihot meeboldii* Pax, *Manihot procumbens* Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN, SPE).

Manihot takape De Egea & Peña-Chocarro

Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Manihot tenella Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 600-700 m.
Países: PRY(AMA).

Manihot tripartita (Spreng.) Müll.

Arg. emend. D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot tripartita* (Spreng.) Müll.
Arg. var. *apaensis* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Nativa. 200-700 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Manihot variifolia Pax

Sin.: *Manihot katharinae* Pax
Arbusto. Endémica. 200-700 m.
Países: PRY(AMA).

Maprounea Aubl.**Maprounea brasiliensis** A. St.-Hil.

Sin.: *Stillingia brasiliensis* (A. St.-Hil.) Baill., *Stillingia hilariana* Baill.
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Maprounea guianensis Aubl.

Árbol. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR).

Mercurialis L.**Mercurialis annua** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MEN, TDF).
CHL(ANT, VAL).

Microstachys A. Juss.**Microstachys corniculata** (Vahl) Griseb.

Sin.: *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müll. Arg., *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müll. Arg. var. *hassleriana* Chodat, *Tragia corniculata* Vahl
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, ITA).

Microstachys dasycarpa Pscheidt,

Esser & Cordeiro
Subarbusto. Endémica.
Países: PRY(APY).

Microstachys hispida (Mart.)

Govaerts
Sin.: *Cnemidostachys hispida* Mart., *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müll. Arg. var. *paraguayensis* Chodat, *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax var. *aspera* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax var. *graciliramea* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax var. *paraguayensis* (Chodat) Pax, *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COR, COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CON, COA, ITA, PHA, SPE).

Microstachys nana M.J. Silva & Esser

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Microstachys serrulata (Mart.) Müll. Arg.

Sin.: *Cnemidostachys serrulata* Mart., *Sebastiania serrulata* (Mart.) Müll. Arg.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, ITA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Microstachys stipulacea (Müll. Arg.)

Esser & M.J. Silva
Sin.: *Gymnanthes stipulacea* Müll. Arg., *Sebastiania stipulacea* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Stillingia stipulacea* (Müll. Arg.) Baill.
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Ophthalmoblapton Allemão**Ophthalmoblapton crassipes** Müll. Arg.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Pachystroma Müll. Arg.**Pachystroma longifolium** (Nees) I.M.

Johnst.
Sin.: *Ilex longifolia* Nees, *Pachystroma ilicifolium* Müll. Arg., *Pachystroma ilicifolium* Müll. Arg. var. *ellipticum* Müll. Arg., *Pachystroma longifolium* (Nees) I.M. Johnst. var. *ellipticum* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & Downs
Árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pausandra Radlk.**Pausandra morisiana** (Casar.) Radlk.

Sin.: *Thouinia morisiana* Casar.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Philyra Klotzsch**Philyra brasiliensis** Klotzsch

Sin.: *Argythamnia brasiliensis* (Klotzsch) Müll. Arg., *Ditaxis brasiliensis* (Klotzsch) Baill.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI).

Ricinus L.**Ricinus communis** L.

Sin.: *Ricinus communis* L. var. *americanus* Müll. Arg.
Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI). URY(MON).

Romanoa Trevis.**Romanoa tamnoides** (A. Juss.) Radcl.-Sm.

Sin.: *Anabaena tamnoides* A. Juss., *Anabaenella tamnoides* (A. Juss.) Pax &

K. Hoffm. var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Anabaenella tamnoides* (A. Juss.) Pax & K. Hoffm.
Hierba voluble. Nativa. 200-700 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Sapium P. Browne**Sapium glandulosum** (L.) Morong

Sin.: *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. f. *oblongata* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. f. *obovata* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *glandulata* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *klotzschiana* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *montevidensis* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *petiolaris* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *serrata* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Hippomane biglandulosa* L., nom. illeg., *Hippomane glandulosa* L., *Omphalea glandulata* Vell., *Sapium aucuparium* Jacq. var. *petiolare* (Müll. Arg.) Griseb., *Sapium aucuparium* Jacq. var. *salicifolium* (Kunth) Griseb., *Sapium aucuparium* Jacq., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. f. *oblongatum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. f. *obovatum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *aucuparium* (Jacq.) Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *klotzschinaum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *serratum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg., p.p., *Sapium cremostachyum* (Baill.) I.M. Johnst., *Sapium fragile* Pax & K. Hoffm., *Sapium glandulatum* (Müll. Arg.) Pax, *Sapium haematospermum* Müll. Arg. var. *saltensis* O'Donnell & Lourteig, *Sapium klotzschianum* (Müll. Arg.) Huber, *Sapium montevidense* Klotzsch ex Baill., *Sapium muelleri* Hemsl., *Sapium paranaense* Pax & K. Hoffm., *Sapium salicifolium* Kunth, *Sapium saltense* (O'Donnell ex Lourteig) Jabl., nom. illeg., *Stillingia cremostachya* Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, ITA). URY(MON, ROC, SOR, TAC, TYT).

Sapium haematospermum Müll. Arg.

Sin.: *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *stenophylla* Müll. Arg., *Excoecaria haematosperma* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Sapium aucuparium* Jacq. var. *stenophyllum* (Müll. Arg.) Griseb., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. f. *longifolium* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *longifolium* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *stenophyllum* Müll. Arg., *Sapium gibertii* Hemsl., *Sapium haematospermum* Müll. Arg. f. *arborea* Chodat & Hassl., *Sapium linearifolium* Hemsl., *Sapium longifolium* (Müll. Arg.) Huber, *Sapium rojasi* H. Lév., *Sapium stenophyllum* (Müll. Arg.) Huber, *Stillingia sylvatica* L. var. *paraguayensis* Morong

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, PAY, RIV, SAO).

Sapium obovatum Klotzsch ex Müll. Arg.

Sin.: *Excoecaria obovata* (Klotzsch ex Müll. Arg.) Müll. Arg., *Sapium hasslerianum* Huber, nom. illeg., *Sapium marginatum* Müll. Arg. var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Sapium obovatum* Klotzsch ex Müll. Arg. var. *ellipticum* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 100-700 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Sebastiania Spreng.**Sebastiania argutidens** Pax & K. Hoffm.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Sebastiania brasiliensis Spreng.

Sin.: *Actinostemon anisandrus* (Griseb.) Pax, *Actinostemon luquense* Morong, *Dactylostemon anisandrus* Griseb., *Microstachys ramosissima* A. St.-Hil., *Sebastiania anisandra* (Griseb.) Lillo, *Sebastiania brasiliensis* Spreng. var. *genuina* Pax, nom. inval., *Sebastiania brasiliensis* Spreng. var. *ramosissima* (A. St.-Hil.) Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,

AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MAL, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).

Sebastiania commersoniana (Baill.)

L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Gymnanthes klotzschiana* Müll. Arg., *Gymnanthes marginata* Baill., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *brachyclada* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *trichoneura* Müll. Arg., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg., nom. superfl., *Stillingia commersoniana* Baill.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA, ÑEE, PAI). URY(COL, CLA, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Sebastiania longispicata Pax & K. Hoffm.

Arbusto o árbol. Endémica. 200-700 m.

Países: PRY(AMA).

Sebastiania pachyphylla Pax & K. Hoffm.

Arbusto o árbol. Endémica. 100-500 m.

Países: PRY(CAN).

Sebastiania pusilla Croizat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(ART, PAY, SAO).

Sebastiania schottiana (Müll. Arg.)

Müll. Arg.

Sin.: *Excoecaria hippophaiifolia* Griseb., *Gymnanthes angustifolia* Müll. Arg., *Gymnanthes schottiana* Müll. Arg., *Sebastiania hippophaiifolia* (Griseb.) Pax & K. Hoffm., *Sebastiania schottiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *angustifolia* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, PAI). URY(PAY, RIV, ROC, SAO, SOR).

Sebastiania serrata (Baill. ex Müll.)

Müll. Arg.

Sin.: *Gymnanthes serrata* Baill. ex Müll. Arg., *Sebastiania grandifolia* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Sebastiania serrata* (Baill. ex Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, PAI). URY(COL, RIV, SAO, TAC).

Sebastiania subsessilis (Müll. Arg.) Pax

Sin.: *Excoecaria subsessilis* Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(CAA, MIE).

Sebastiania subulata (Müll. Arg.) Pax

Sin.: *Excoecaria subulata* Müll. Arg., *Sapium subulatum* (Müll. Arg.) Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA, PAI).

Sebastiania ypanemensis (Müll. Arg.)

Müll. Arg.

Sin.: *Gymnanthes ypanemensis* Müll. Arg., *Stillingia ypanemensis* (Müll. Arg.) Baill.

Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(PAI).

Spegazziniophytum Esser**Spegazziniophytum patagonicum**

(Speg.) Esser

Sin.: *Stillingia patagonica* (Speg.) Pax & K. Hoffm., *Colliguaja patagonica* Speg., *Sapium patagonicum* (Speg.) D.J. Rogers

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Stillingia L.**Stillingia bodenbenderi** (Kuntze) D.J. Rogers

Sin.: *Excoecaria bodenbenderi* (Kuntze) K. Schum., *Sapium bodenbenderi* Kuntze, *Sapium subsessile* Hemsl., *Stillingia dusenii* Pax & K. Hoffm.

Arbusto o arbolito. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(COR). BRA(PAR).

Stillingia oppositifolia Baill. ex Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(RGS).

Stillingia salpingadenia (Müll. Arg.) Huber

Sin.: *Sapium cupuliferum* Hemsl., *Sapium salpingadenium* Müll. Arg. var. *salicina* Chodat & Hassl., *Sapium salpingadenium* Müll. Arg., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *cupulifera* (Hemsl.) Pax, *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *salicina* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). PRY(AMA, COA, GUA).

Stillingia scutellifera D.J. Rogers

Sin.: *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber subsp. *saxatilis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *angustior* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *elliptica* Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *grandifolia* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. f. *angustior* Chodat & Hassl., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. f. *latior* Chodat & Hassl., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. var. *salicifolia* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).

Stillingia tenella (Pax & K. Hoffm.) Esser

Sin.: *Sapium tenellum* Pax & K. Hoffm., *Stillingia yungasensis* Belgrano & Pozner Arbusto o arbolito. Nativa. 1200-2200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Tetrorchidium Poepp.**Tetrorchidium dusenii** Pax & K. Hoffm.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Tetrorchidium rubrivenium Poepp.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA).

Tragia L.**Tragia bahiensis** Müll. Arg.

Sin.: *Tragia bahiensis* Müll. Arg. var. *flexuosa* Pax & K. Hoffm., *Tragia depauperata* Pax & K. Hoffm., *Tragia emrichii* Herter, *Tragia lagoensis* Müll. Arg. Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, ERI, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CON). URY(RIV).

Tragia caperonioides Pax & K. Hoffm.

Hierba voluble. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Tragia chlorocaulon Baill.

Sin.: *Tragia adenophylla* Pax & K. Hoffm. var. *ferruginea* Pax & K. Hoffm.,

Tragia adenophylla Pax & K. Hoffm. var. *mollis* Pax & K. Hoffm., *Tragia tristis* Müll. Arg. f. *subvolubilis* Chodat & Hassl., *Tragia tristis* Müll. Arg. f. *volubilis* Chodat & Hassl.

Hierba voluble. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CEN, COA).

Tragia dodencandra Griseb.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, LRI, SDE, SLU).

Tragia friesii Pax & K. Hoffm.

Hierba voluble. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Tragia geraniifolia Klotzsch ex Baill.

Sin.: *Tragia geraniifolia* Klotzsch ex Baill. var. *multifida* Griseb. Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SJU, SLU). BRA(RGS). PRY(APY, ÑEE). URY(ART, COL, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SJO).

Tragia giardelli M.M. Gut. & Múlgura

Hierba voluble. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

Tragia hassleriana Chodat

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(CAN).

Tragia hieronymii Pax & K. Hoffm.

Sin.: *Tragia oligantha* Pax & K. Hoffm., *Tragia tenella* Pax & K. Hoffm. Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

Tragia incana Klotzsch ex Baill.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MON, RIV, ROC, TAC).

Tragia melochioides Griseb.

Sin.: *Tragia bangii* Rusby, *Tragia micrococca* Pax & K. Hoffm., *Tragia pseudomelochioides* Pax & K. Hoffm. Subarbusto. Nativa. 0-2600 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN, CON, GUA, PAI, SPE). URY(RNO, SOR).

Tragia paxii Lourteig & O'Donell

Hierba voluble. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(GUA, PAI).

Tragia pinnata (Poir.) A. Juss.

Sin.: *Acalypha pinnata* Poir. Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, FLA, MAL, MON, SOR).

Tragia polyandra Vell.

Sin.: *Leptorhachis hastata* Klotzsch, *Tragia emilii* Pax & K. Hoffm., *Tragia hastata* (Klotzsch) Müll. Arg. Hierba voluble. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA, GUA).

Tragia uberabana Müll. Arg. var.

discolor Chodat & Hassl. Sin.: *Tragia bahiensis* Müll. Arg. var. *subsessilis* Chodat & Hassl., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *canescens* Pax & K. Hoffm., p.p., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *discolor* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *subsessilis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Tragia websterii* Allem & Waetcher Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, PAI, SPE).

Tragia uberabana Müll. Arg. var. **uberabana**

Sin.: *Tragia arechavaletae* Herter ex Arechav., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *canescens* Pax & K. Hoffm., p.p., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *macrophylla* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Tragia uberabana* Müll. Arg. var. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Tragia wingei* Allem & Waetcher Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CON, MIE, PAI). URY(CLA, LAV, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Tragia volubilis L.

Sin.: *Tragia volubilis* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl. Hierba voluble. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CON, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RIV, TYT).

Vernicia Lour.

Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw
Sin.: *Aleurites fordii* Hemsl.
Árbol. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(MIS).

FABACEAE

Abarema Pittier

Abarema brachystachya (DC.)
Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Inga brachystachya* DC.
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Abarema langsdorffii (Benth.)
Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Pithecellobium langsdorffii* Benth.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Abrus Adans.

Abrus precatorius L.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acaciella Britton & Rose

Acaciella angustissima (Mill.) Britton
& Rose
Sin.: *Acacia angustissima* (Mill.)
Kuntze, *Acacia boliviana* Rusby, *Mimosa
angustissima* Mill.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Acosmium Schott

Acosmium cardenasii H.S. Irwin &
Arroyo
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Acosmium subelegans (Mohlenbr.)
Yakovlev
Sin.: *Sweetia elegans* (Vogel) Benth.
f. oblongifolia Chodat & Hassl., *Sweetia
elegans* (Vogel) Benth. *f. ovatifolia*
Chodat & Hassl., *Sweetia elegans* (Vogel)
Benth., *Sweetia subelegans* Mohlenbr.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CON, COA,
PAI, SPE).

Adenocarpus DC.

Adenocarpus complicatus (L.) A. Gray
Sin.: *Spartium complicatum* L.
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: URY(RIV).

Adesmia DC., nom. cons.

Adesmia aconcaguensis Burkart
Hierba. Endémica. 3200-4800 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Adesmia acuta Burkart
Sin.: *Adesmia acuta* Burkart f.
choiquesica Burkart
Subarbusto. Endémica. 1700-2800 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Adesmia adrianii M.N. Correa
Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE).

Adesmia aegiceras Phil.
Sin.: *Adesmia glanduligera* I.M.
Johnst., *Adesmia remyana* Phil., *Adesmia
subumbellata* Phil., *Adesmia trijuga*
Gillies ex Hook. & Arn. var. *remyana*
(Phil.) Burkart, *Adesmia trijuga* Gillies
ex Hook. & Arn. var. *robustior* Hook.
& Arn., *Patagonium aegiceras* (Phil.)
Kuntze, *Patagonium aegiceras* (Phil.)
Reiche, comb. superfl., *Patagonium
trijugum* (Gillies ex Hook. & Arn.)
Kuntze var. *remyanum* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémica. 1500-4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).
CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, RME).

Adesmia ameghinoi Speg.
Sin.: *Patagonium ameghinoi* (Speg.) Speg.
Subarbusto. Endémica. 200-900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Adesmia aphanantha Speg.
Sin.: *Patagonium aphananthum* (Speg.) Speg.
Hierba. Endémica. 200-1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Adesmia aphylla Clos
Sin.: *Patagonium aphyllum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia arachnipes Clos
Sin.: *Adesmia oresigena* Phil.,
Patagonium arachnipes (Clos) Kuntze,
Patagonium oresigenum (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 1600-3500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Adesmia araucana Phil.
Sin.: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 800-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA).

Adesmia araujoii Burkart
Hierba. Endémica. 700-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adesmia arenicola (R.E. Fr.) Burkart
Sin.: *Patagonium arenicola* R.E. Fr.
Arbusto. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Adesmia argentea Meyen
Sin.: *Adesmia cinerea* Clos, *Patagonium
argenteum* (Meyen) Kuntze, *Patagonium
cinereum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(TAR, ATA, COQ, VAL).

Adesmia argyrophylla Phil.
Sin.: *Adesmia divaricata* (Phil. ex
Reiche) Dyer, *Adesmia furcata* Phil.,
Adesmia kingii Phil., *Adesmia sessiliflora*
Phil., *Patagonium argyrophyllum* (Phil.)
Kuntze, *Patagonium kingii* (Phil.)
Kuntze, *Patagonium sessiliflorum* (Phil.)
Kuntze
Arbusto. Endémica. 200-2800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia arillata Miotto
Hierba subleñosa. Endémica. 900-
1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Adesmia aromatica Burkart
Arbusto. Endémica. 1100-1300 m.
Países: CHL(COQ).

Adesmia aspera Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Patagonium asperum* (Gillies
ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium
mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var.
asperum (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Adesmia atacamensis Phil.
Sin.: *Adesmia glandulosa* Phil.,
Patagonium atacamense (Phil.) Kuntze,
Patagonium glandulosum (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 2000-4000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Adesmia aueri Burkart
Subarbusto. Endémica. 200-1500 m.
Países: ARG(RNE, SCR).

Adesmia aurantiaca (Dusén) Burkart

Sin.: *Adesmia pumila* Hook. f. var. *aurantiaca* Dusén

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Adesmia australis Ulibarri & B.B.

Simpson

Subarbusto. Endémica. 600-800 m.

Países: ARG(SCR).

Adesmia balsamica Bertero ex Colla

Sin.: *Patagonium balsamicum* (Bertero ex Colla) Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(VAL, BIO, RME).

Adesmia bedwellii Skottsbo.

Arbusto. Endémica. 200-700 m.

Países: CHL(COQ, RME).

Adesmia bicolor (Poir.) DC.

Sin.: *Adesmia glabriuscula* Vogel, *Adesmia pendula* Poir., *Adesmia radicans* Clos, *Hedysarum bicolorum* Poir., *Hedysarum pendulum* Poir., *Patagonium bicolor* (Poir.) Kuntze, *Patagonium glabriusculum* (Vogel) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, RNE, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO, ARA, RME). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

Adesmia bijuga Phil.

Sin.: *Patagonium bijugum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(MAU).

Adesmia boelckeana Burkart

Subarbusto. Endémica. 1200-1500 m.

Países: ARG(NEU).

Adesmia bonariensis Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(LAV).

Adesmia boronioides Hook. f.

Sin.: *Patagonium boronioides* (Hook. f.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Adesmia brachysemeon Phil.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Adesmia bracteata Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium bracteatum* (Hook. & Arn.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 1200-2600 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Adesmia brevivexillata Burkart

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: CHL(VAL, BIO, ARA, RME).

Adesmia burkartii M.N. Correa

Hierba. Endémica. 1200-1500 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Adesmia calycicomosa Burkart

Arbusto. Endémica. 1100-1400 m.

Países: CHL(COQ).

Adesmia candida Hook. f. var.

cabreræ (Burkart) Ulibarri & Burkart

Sin.: *Adesmia cabreræ* Burkart

Subarbusto. Endémica. 1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Adesmia candida Hook. f. var.

candida

Sin.: *Adesmia canescens* (A. Gray) Speg., *Patagonium candidum* (Hook. f.) Macloskie, *Streptodesmia canescens* A. Gray

Subarbusto. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Adesmia capitellata (Clos) Hauman

Sin.: *Adesmia oligophylla* Phil., *Lotus capitellatus* Clos, *Hosackia capitellata* (Clos) Brand, *Patagonium oligophyllum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 2300-4200 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Adesmia ciliata Vogel

Sin.: *Adesmia ciliata* Vogel var. *graminetorum* Burkart, *Patagonium ciliatum* (Vogel) Kuntze

Hierba. Endémica. 700-1700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adesmia colinensis (Phil. ex Reiche)

Martic.

Sin.: *Patagonium colinense* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Adesmia coluteoides Gillies ex

Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 1500-1900 m.

Países: ARG(MEN, SAL).

Adesmia concinna Phil.

Arbusto. Endémica. 200-1400 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Adesmia conferta Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia brachycarpa* Phil., *Adesmia izquierdi* Phil. ex Reiche, *Adesmia stipulacea* Clos, *Adesmia venosa* Phil., *Patagonium brachycarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium confertum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium stipulaceum* (Clos) Kuntze, *Patagonium venosum* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 100-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Adesmia confusa Ulibarri

Sin.: *Adesmia arborea* Bertero ex Clos, hom. illeg., *Adesmia berteroniana* Steud., nom. nud., *Patagonium arboreum* (Bertero ex Clos) Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Adesmia coquimbensis Burkart

Arbusto. Endémica. 1900 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia cordobensis Burkart var.

appendiculata Ulibarri & Burkart

Subarbusto. Endémica. 900-1100 m.

Países: ARG(SLU).

Adesmia cordobensis Burkart var.

cordobensis

Sin.: *Adesmia comechingona* C.A.

Bianco & Weberling

Subarbusto. Endémica. 900-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, SAL).

Adesmia coronilloides Gillies ex

Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia atuelensis* Burkart, *Adesmia codonocalyx* G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Adesmia germainii* Phil., *Adesmia glauca* Phil., *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *glaucum* (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl., *Patagonium germainii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium germainii* (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Patagonium glaucum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 2200-3000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(MAU, RME).

Adesmia corymbosa Clos var.**corymbosa**

Sin.: *Adesmia aucaensis* Burkart, *Adesmia dubia* M.N. Correa, *Adesmia fernandezii* Phil., *Adesmia glandulifera* (Rendle) Rowlee, *Adesmia palenae* Phil., *Adesmia subsericea* (Chodat & Wilczek) Hauman var. *nigropunctata* Hauman, *Adesmia subsericea* (Chodat & Wilczek) Hauman, *Adesmia tenuis* Phil., *Adesmia vallis-pulchrae* Phil., nom. nud., *Patagonium corymbosum* (Clos) Kuntze, *Patagonium glanduliferum* Rendle, *Patagonium palenae* (Phil.) Reiche, *Patagonium subsericeum* Chodat & Wilczek, *Patagonium vallis-pulchrae* Reiche
Hierba. Endémica. 200-3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, ARA, AIS, MAG).

Adesmia corymbosa Clos var.**sinepenna** Ulibarri & Burkart

Hierba. Endémica. 800-3500 m.
Países: ARG(SCR).

Adesmia crassicaulis Phil.

Sin.: *Patagonium crassicaule* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Adesmia cuneata Meyen ex Vogel

Sin.: *Patagonium cuneatum* (Meyen ex Vogel) Kuntze
Hierba. Endémica. 2100-2800 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Adesmia curvifolia Clos

Sin.: *Patagonium curvifolium* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia cytisoides Griseb.

Sin.: *Adesmia caragana* Griseb., *Adesmia cytisoides* Griseb. var. *oleae* Burkart, *Adesmia cytisoides* Griseb. var. *pugionata* (Griseb.) Burkart, *Adesmia pugionata* Griseb., *Patagonium cytisoides* (Griseb.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Adesmia darapskyana (Phil. ex Reiche) Martic.

Sin.: *Patagonium darapskyanum* Phil. ex Reiche
Hierba o subarbusto. Endémica. 2300-2800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Adesmia davilae Phil.

Sin.: *Patagonium davilae* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Adesmia denticulata Clos

Sin.: *Patagonium denticulatum* (Clos) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-1600 m.
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA).

Adesmia denudata Phil.

Sin.: *Patagonium denudatum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2300 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia dessaueri (Phil. ex Reiche)

Ulibarri
Sin.: *Patagonium dessaueri* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA, LBO).

Adesmia dichotoma Clos

Sin.: *Patagonium cinereum* (Clos) Kuntze var. *dichotomum* (Clos) Reiche, *Patagonium dichotomum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 900-2800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Adesmia digitata Burkart

Subarbusto. Endémica. 2800-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Adesmia disperma Phil.

Sin.: *Patagonium dispermum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Adesmia dumosa Phil.

Sin.: *Patagonium dumosum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ, RME).

Adesmia echinus C. Presl

Sin.: *Adesmia gayana* Phil., *Patagonium echinus* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium gyanum* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 2800-4400 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
CHL(ANT, ATA, COQ, MAU).

Adesmia elata Clos

Sin.: *Patagonium elatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elatum* (Clos) Reiche, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *macrostachyum* Phil. ex Reiche
Hierba. Endémica. 700-1300 m.
Países: CHL(ATA, COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, AIS).

Adesmia elegans Clos

Sin.: *Patagonium elegans* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, MAU).

Adesmia emarginata Clos

Sin.: *Patagonium emarginatum* (Clos) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 200-2700 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ATA, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).

Adesmia eremophila Phil.

Sin.: *Adesmia latistipula* Phil. ex Reiche, *Patagonium eremophilum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium latistipula* Phil. ex Reiche
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Adesmia erinacea Phil.

Sin.: *Adesmia senticula* Phil., *Patagonium erinaceum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium erinaceum* (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Patagonium senticulum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 2500-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
CHL(TAR, ANT, ATA, MAU).

Adesmia exilis Clos

Sin.: *Adesmia berteroi* Phil. ex Kuntze, nom. nud., *Adesmia decumbens* Phil. var. *berteroi* Phil. ex G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Adesmia decumbens* Phil., *Adesmia humifusa* Phil., *Adesmia inconspicua* Phil., *Adesmia tristis* (Chodat & Wilczek) Hauman, *Adesmia valdesia* Clos, *Patagonium berteroi* (Kuntze) Speg., comb. superfl., *Patagonium confertum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *berteroi* Kuntze, *Patagonium decumbens* (Phil.) Kuntze, *Patagonium exile* (Clos) Kuntze, *Patagonium humifusum* Kuntze, *Patagonium inconspicuum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium triste* Chodat & Wilczek, *Patagonium valdesium* (Clos) Kuntze
Hierba. Endémica. 1400-3300 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Adesmia filicaulis Phil.

Sin.: *Patagonium filicaule* (Phil.) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze var. *filicaule* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Adesmia filifolia Clos

Sin.: *Patagonium filifolium* (Clos) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Adesmia filipes A. Gray

Sin.: *Adesmia filipes* A. Gray var. *obcordata* Hicken, *Adesmia filipes* A. Gray var. *obtusifolia* Speg., *Patagonium filipes* (A. Gray) Speg.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR).

Adesmia friesii Burkart ex Ulibarri

Arbusto. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Adesmia frigida Phil.

Sin.: *Adesmia adenophora* Phil., *Patagonium adenophorum* (Phil.) Reiche, *Patagonium frigidum* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 1900-4500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Adesmia fuentesii G.F. Grandjot

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Adesmia glandulifolia Steibel & Ulibarri

Arbusto. Endémica. 1200-1700 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Adesmia glaucescens Phil.

Sin.: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze var. *glaucescens* (Phil.) Reiche, *Patagonium glaucescens* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Adesmia globosa Davyt & Izag.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(ERI, MIS). URY(ART, SAO).

Adesmia glomerula Clos var.

australior Burkart
Hierba. Endémica. 1700-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Adesmia glomerula Clos var.

glomerula
Sin.: *Adesmia compacta* Phil., *Adesmia humilis* Phil., *Patagonium compactum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium glomerulum* (Clos) Kuntze, *Patagonium humile* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU).
CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Adesmia glutinosa Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium glutinosum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 700-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Adesmia godoyae (Phil. ex Reiche) Martic.

Sin.: *Patagonium godoyae* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: CHL(ATA, RME).

Adesmia gracilis Meyen ex Vogel

Sin.: *Patagonium gracile* (Meyen ex Vogel) Kuntze
Arbusto. Endémica. 200-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).
CHL(COQ, MAU, RME).

Adesmia gracillima I.M. Johnst.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT, RME).

Adesmia graminidea Speg.

Sin.: *Patagonium graminideum* (Speg.) Speg.
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Adesmia grandiflora Gillies ex Hook.

& Arn.
Sin.: *Adesmia calocarpa* Phil., *Adesmia grandiflora* Gillies ex Hook. & Arn. var. *calocarpa* (Phil.) Kurtz, *Adesmia grandiflora* Gillies ex Hook. & Arn. var. *gracilis* Kurtz, *Patagonium calocarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium grandiflorum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Hierba. Endémica. 1500-1900 m.
Países: ARG(LPA, MEN, SJU).

Adesmia guttulifera Sandwith

Arbusto. Endémica. 100-1600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Adesmia hemisphaerica Hauman

Subarbusto. Endémica. 3200-3600 m.
Países: ARG(MEN). CHL(TAR, ANT, COQ, RME).

Adesmia hirsuta Phil.

Sin.: *Patagonium hirsutum* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

Adesmia horrida Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia capricornica* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Adesmia horridiuscula* Burkart, *Adesmia horridiuscula* Burkart f. *sericea* Burkart, *Adesmia leucopogon* Phil., *Adesmia pyramidata* Burkart, *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium leucopogon* (Phil.) Kuntze, *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *minor* Reiche
Arbusto. Nativa. 2800-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Adesmia hunzikeri Burkart

Hierba. Endémica. 2200-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Adesmia hystrix Phil.

Sin.: *Adesmia sentis* Phil., *Adesmia villanuevae* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium hystrix* (Phil.) Kuntze, *Patagonium sentis* (Phil.) Reiche, *Patagonium villanuevae* Reiche
Arbusto. Endémica. 2000-4100 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Adesmia incana Vogel var. **grisea**

(Hook. f.) Burkart
Sin.: *Adesmia grisea* Hook. f., *Patagonium griseum* (Hook. f.) Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, RNE, SFE). URY(COL, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO).

Adesmia incana Vogel var. **incana**

Sin.: *Adesmia angulata* Hook. f., *Adesmia incana* Vogel var. *heterotricha* Burkart, *Patagonium incanum* (Vogel) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MIS, SAL, SLU). BRA(RGS). URY(CLA, COL, DUR, FLA, PAY, RNO, SAO, TAC).

Adesmia incana Vogel var. **oblata**

Davyt & Izag.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: URY(LAV, MAL, RIV, SOR, TYT).

Adesmia inflexa Griseb.

Sin.: *Adesmia tucumanensis* Burkart
Arbusto. Endémica. 1800-3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Adesmia jilesiana Burkart

Hierba. Endémica. 3000-4200 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

Adesmia karraikensis Speg.

Sin.: *Adesmia negeri* Dusén, *Patagonium karraikense* (Speg.) Speg., *Patagonium negeri* (Dusén) Macloskie
Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: ARG(SCR).

Adesmia lanata Hook. f.

Sin.: *Patagonium lanatum* (Hook. f.) Kuntze
Hierba. Endémica. 100-900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(ARA, MAG).

Adesmia landbecki Phil.

Sin.: *Patagonium landbecki* (Phil.) Kuntze, *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze var. *landbeckii* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Adesmia latifolia (Spreng.) Vogel

Sin.: *Aeschynomene latifolia* Spreng., *Patagonium latifolium* (Spreng.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI).
BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Adesmia laxa Clos

Sin.: *Patagonium laxum* (Clos) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Adesmia leiocarpa Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia psilocarpa* Phil., *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium psilocarpum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Adesmia leptobotrys Burkart

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Adesmia lihuelensis Burkart

Hierba. Endémica. 300-500 m.
Países: ARG(LPA).

Adesmia littoralis Burkart

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia longipes Phil.

Sin.: *Adesmia glareosa* (Chodat & Wilczek) Hauman, *Patagonium glareosum* Chodat & Wilczek, *Patagonium longipes* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 1300-3200 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Adesmia longiseta DC.

Sin.: *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2000-3200 m.
Países: CHL(COQ, LBO, BIO, ARA, RME).

Adesmia lotoides Hook. f.

Sin.: *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *brachypoda* Speg., *Adesmia lotoides* Hook.

f. f. *elata* Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *normalis* Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *petiolulata* Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *tipica* Speg., nom. inval., *Adesmia lotoides* Hook. f. var. *vaginata* Hook. f., *Adesmia unifoliolata* Skottsbl., *Patagonium lotoides* (Hook. f.) Kuntze, *Patagonium lotoides* (Hook. f.) Reiche, comb. superfl.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Adesmia loudonia Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl.
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Adesmia macrostachya Benth.

Sin.: *Patagonium macrostachyum* (Benth.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, SLU, SFE).

Adesmia medinae (Phil. ex Reiche)

Ulibarri
Sin.: *Patagonium medinae* Phil. ex Reiche
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Adesmia melanocaulos Phil.

Sin.: *Adesmia diaziana* I.M. Johnst., *Patagonium melanocaulon* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Adesmia melanthes Phil.

Sin.: *Patagonium melanthes* (Phil.) Reiche
Arbusto. Nativa. 3700-4200 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Adesmia mendozana Ulibarri

Arbusto. Endémica. 1700-2400 m.
Países: ARG(MEN).

Adesmia micrantha Phil.

Sin.: *Patagonium micranthum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *micranthum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Adesmia microcalyx Phil. var.

calvescens Burkart
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Adesmia microcalyx Phil. var. **microcalyx**

Sin.: *Patagonium microcalyx* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Adesmia microphylla Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia spinosa* A. Lesson, *Patagonium microphyllum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Adesmia minor (Hook. & Arn.)

Burkart var. **caespitosa** (Phil.) Ulibarri & Burkart
Sin.: *Adesmia caespitosa* Phil., *Patagonium caespitosum* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémica. 3800-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(ANT).

Adesmia minor (Hook. & Arn.)

Burkart var. **minor**
Sin.: *Adesmia caespitosa* Gillies ex Hook., nom. nud., *Adesmia horrida* Gillies ex Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., *Adesmia subterranea* Clos var. *glabriuscula* Phil., nom. nud.
Subarbusto. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(MEN).

Adesmia minor (Hook. & Arn.)

Burkart var. **riojana** (Burkart) Ulibarri
Sin.: *Adesmia riojana* Burkart
Subarbusto. Endémica. 3500-3800 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

Adesmia miraflorensis J. Remy

Sin.: *Adesmia clarenii* (R.E. Fr.) Burkart, *Adesmia nordenskioldii* (R.E. Fr.) Burkart, *Adesmia polyacantha* Wedd., *Adesmia vicina* J.F. Macbr., *Patagonium clarenii* R.E. Fr., *Patagonium miraflorensis* (J. Remy) Rusby, *Patagonium nordenskioldii* R.E. Fr.
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Adesmia monosperma Clos

Sin.: *Adesmia calycosa* Phil., *Patagonium calycosum* (Phil.) Reiche, *Patagonium monospermum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 200-2600 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia montana Phil.

Sin.: *Patagonium montanum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2100-2800 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Adesmia mucronata Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia closii* Phil., *Patagonium closii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Adesmia multicuspis Clos

Sin.: *Adesmia melanocarpa* (Phil. ex Reiche) Dyer, *Adesmia oxalidophylla* Phil., *Patagonium multicuspe* (Clos) Kuntze, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze var. *melanocarpum* Phil. ex Reiche
Hierba. Endémica. 1100-2300 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia muricata (Jacq.) DC. var.**affinis** (Hook. f.) Burkart

Sin.: *Adesmia affinis* Hook. f., *Patagonium affine* (Hook. f.) Macloskie
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(COL, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC).

Adesmia muricata (Jacq.) DC. var.**dentata** (Lag.) Benth.

Sin.: *Adesmia dentata* (Lag.) DC., *Adesmia muricata* (Jacq.) DC. var. *pimpinellifolia* (Poir.) Burkart, *Aeschynomene dentata* Lag., *Hedysarum pimpinellifolium* Poir., *Patagonium dentatum* (Lag.) Kuntze, *Patagonium grandidentatum* Rusby
Hierba. Nativa. 300-2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).

Adesmia muricata (Jacq.) DC. var.**gilliesii** (Hook. & Arn.) Burkart

Sin.: *Adesmia gilliesii* Hook. & Arn., *Patagonium gilliesii* (Hook. & Arn.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SFE, SLU).

Adesmia muricata (Jacq.) DC. var.**muricata**

Sin.: *Adesmia hedysaroides* (Schrank) Hauman, *Hedysarum muricatum* Jacq., *Patagonium hedysaroides* Schrank, *Patagonium muricatum* (Jacq.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(CAS, MON, SJO, SOR).

Adesmia muricata (Jacq.) DC. var.**rionegrensis** Burkart

Hierba. Endémica.
Países: ARG(RNE).

Adesmia nanolignea Burkart

Subarbusto. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Adesmia neglecta M.N. Correa

Subarbusto. Endémica. 1200-1300 m.
Países: ARG(CHU).

Adesmia neuquenensis Burkart

Hierba. Endémica. 1100-1700 m.
Países: ARG(NEU).

Adesmia obcordata Clos

Sin.: *Adesmia karraikensis* Speg. f. *relaxata* Hicken, *Patagonium obcordatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 200-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, RME).

Adesmia obovata Clos

Sin.: *Adesmia leptacantha* Phil., *Patagonium leptacanthum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 200-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Adesmia obscura Clos

Sin.: *Adesmia graveolens* Phil., *Adesmia serrazziana* Speg., *Adesmia villosa* Phil., hom. illeg., *Patagonium graveolens* (Phil.) Kuntze, *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze, *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze var. *graveolens* (Phil.) Reiche, *Patagonium serrazzianum* (Speg.) Speg., *Patagonium villosum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 2000-3400 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia occulta (R.E. Fr.) Burkart

Sin.: *Adesmia patancana* Ulbr., *Patagonium occultum* R.E. Fr., *Patagonium patancanum* (Ulbr.) Rusby
Subarbusto. Nativa. 3000-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Adesmia odontophylla Phil.

Sin.: *Patagonium odontophyllum* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Adesmia ovalensis Ulibarri

Arbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(COQ).

Adesmia pampeana Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Adesmia papposa (Lag.) DC. var. **papposa**

Sin.: *Adesmia arvensis* Phil., *Adesmia chillanensis* Phil., *Adesmia elongata* Phil., *Aeschynomene papposa* Lag., *Patagonium arvense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium chillanense* (Phil.) Reiche, *Patagonium elongatum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elongatum* (Phil.) Reiche, *Patagonium papposum* (Lag.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Adesmia papposa (Lag.) DC. var.**radicifolia** (Clos) M.N. Correa

Sin.: *Adesmia radicifolia* Clos, *Patagonium radicifolium* (Clos) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-3100 m.
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Adesmia paranensis Burkart

Sin.: *Adesmia psoraleoides* Vogel var. *glabrata* Benth.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Adesmia parviflora Clos

Sin.: *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *diffusum* Bertero ex Reiche
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAG, RME).

Adesmia parvifolia Phil.

Sin.: *Adesmia axillaris* Phil., *Adesmia parvifolia* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Reiche, *Patagonium axillare* (Phil.) Kuntze, *Patagonium lanatum* (Hook. f.) Kuntze var. *axillaris* (Phil.) Speg., *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche, *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche var. *axillare* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Adesmia patagonica Speg.

Sin.: *Adesmia patagonica* Speg. var. *nana* Speg., *Patagonium patagonicum* (Speg.) Speg.

Subarbusto. Endémica. 1100-1500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE, SCR).

Adesmia pauciflora Vogel

Sin.: *Patagonium pauciflorum* (Vogel) Kuntze

Arbusto. Endémica.
Países: CHL(RME).

Adesmia pearcei Phil.

Sin.: *Patagonium pearcei* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Adesmia pedicellata Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia calopogon* Phil., *Adesmia deserticola* Phil., *Adesmia genistoides* C. Presl, *Adesmia ulicina* C. Presl, *Patagonium calopogon* Phil. ex Reiche, *Patagonium deserticum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Reiche, comb. superfl., *Patagonium pedicellatum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium ulicinum* (C. Presl) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-2800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia pentaphylla Phil.

Sin.: *Patagonium pentaphyllum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 2200-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Adesmia peraltae (Phil. ex Reiche)

Ulibarri
Sin.: *Patagonium peraltae* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ).

Adesmia phylloidea Clos

Sin.: *Adesmia virgata* Bertero ex Steud., nom. nud., *Patagonium phylloideum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 100-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Adesmia pinifolia Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Patagonium pinifolium* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.
Arbusto. Endémica. 1500-3700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(RME).

Adesmia pirionii I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 100-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Adesmia polyphylla Phil.

Sin.: *Patagonium polyphyllum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 3200-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Adesmia propinqua Clos

Sin.: *Adesmia dendroides* Phil., *Patagonium dendroides* (Phil.) Kuntze, *Patagonium propinquum* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 100-1500 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Adesmia prostrata Clos var.

eglandulosa Burkart
Sin.: *Adesmia coluteoides* Phil., *Patagonium coluteoides* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, RME).

Adesmia prostrata Clos var.

prostrata
Sin.: *Adesmia meyeniana* Phil., *Patagonium meyenianum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium prostratum* (Clos) Kuntze
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Adesmia pseudogrisea Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Adesmia pseudoincana Burkart

Hierba. Endémica. 1200-1700 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Adesmia psoraleoides Vogel

Sin.: *Patagonium psoralodes* (Vogel) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 700-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adesmia pumahuasiana Ulibarri

Arbusto. Nativa. 3400-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Adesmia pumila Hook. f.

Sin.: *Adesmia leptopoda* Speg., *Patagonium leptopodum* (Speg.) Speg., *Patagonium pumilum* (Hook. f.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Adesmia punctata (Poir.) DC. var. **punctata**

Sin.: *Adesmia calycina* Vogel, *Adesmia glutinosa* Arechav., hom. illeg., *Adesmia herteri* Looser, *Adesmia punctata* (Poir.) DC. var. *hilariana* Benth., *Adesmia uruguayana* Arechav., *Adesmia viciifolia* Herter, *Hedysarum punctatum* Poir.
Hierba. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Adesmia punctata (Poir.) DC. var.

sessiliflora Davyt & Izag.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(PAY, SJO, SOR, TAC).

Adesmia pungens Clos

Sin.: *Adesmia intricata* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium intricatum* Phil., *Patagonium pungens* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-2100 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Adesmia pusilla Phil.

Sin.: *Patagonium pusillum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 100-600 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Adesmia quadripinnata (Hicken)

Burkart
Sin.: *Adesmia oligophylla* Phil.
var. *quadripinnata* Hicken, *Adesmia quadripinnata* (Hicken) Burkart f. *punctata* Burkart, *Adesmia quadripinnata* (Hicken) Burkart var. *pygmaea* Burkart
Hierba. Endémica. 800-2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU). CHL(MAU).

Adesmia ragonesei Burkart

Arbusto. Endémica. 1700-1800 m.
Países: ARG(NEU).

Adesmia rahmeri Phil.

Sin.: *Patagonium rahmeri* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 2600-4400 m.
Países: ARG(CAT, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA).

Adesmia ramosissima Phil.

Sin.: *Patagonium ramosissimum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(COQ, LBO).

Adesmia reclinata Muñoz

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ).

Adesmia reitziana Burkart

Subarbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: BRA(SCA).

Adesmia renjifoana (Phil. ex Reiche)

Ulibarri

Sin.: *Adesmia renjifoana* Phil., nom. nud., *Patagonium renjifoanum* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémica. 1500-2600 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO).

Adesmia resinosa (Phil. ex Reiche)

Martic.

Sin.: *Patagonium resinum* Phil. ex Reiche

Arbolito. Endémica. 1700-2000 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Adesmia retrofracta Hook. & Arn.

Sin.: *Adesmia polygaloides* (Chodat & Wilczek) Burkart, *Adesmia rafaelsensis* (Chodat & Wilczek) Hicken, *Adesmia retrofracta* Hook. & Arn. var. *rectirostris* (Chodat & Wilczek) Burkart, *Patagonium polygaloides* Chodat & Wilczek, *Patagonium rafaelsense* Chodat & Wilczek, *Patagonium retrofractum* Chodat & Wilczek var. *rectirostris* Chodat & Wilczek

Hierba. Endémica. 1000-1800 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

Adesmia retusa Griseb.

Sin.: *Adesmia grisebachii* Phil., *Adesmia neuquenensis* Speg. ex Autran, nom. nud., *Patagonium retusum* (Griseb.) Kuntze, *Patagonium retusum* (Griseb.) Kuntze var. *grisebachii* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(ARA, LLA).

Adesmia riograndensis Miotto

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Adesmia rocinhensis Burkart

Hierba. Endémica. 100-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adesmia rubroviridis Burkart

Arbusto. Endémica. 2200-2600 m.
Países: CHL(COQ).

Adesmia ruiz-lealii Burkart ex M.N.

Correa

Hierba. Endémica. 1600-2000 m.
Países: ARG(SCR).

Adesmia salamancensis Burkart

Arbusto. Endémica.
Países: ARG(CHU).

Adesmia salicornioides Speg.

Sin.: *Adesmia carnosus* Dusén, *Patagonium carnosum* (Dusén) Speg., *Patagonium salicornioides* (Speg.) Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Adesmia sandwichii Burkart

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(NEU).

Adesmia sanjuanensis Burkart

Arbusto o subarbusto. Endémica. 2300-3000 m.
Países: ARG(SJU).

Adesmia schickendantzii Griseb.

Sin.: *Adesmia amblysepala* Solms

Subarbusto. Nativa. 2900-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Adesmia schneideri Phil.

Sin.: *Adesmia rigida* Skottsbl., *Patagonium schneideri* (Phil.) Kuntze, *Patagonium schneideri* (Phil.) Reiche, comb. superfl.

Arbusto. Endémica. 200-3300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).
CHL(ATA, LBO, RME).

Adesmia securigerifolia Herter

Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).
URY(CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, PAY, SAO, TAC, TYT).

Adesmia serrana M.N. Correa

Subarbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: ARG(CHU, RNE).

Adesmia sessilifolia Iganci & Miotto

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Adesmia silvestrii (Speg.) Burkart

Sin.: *Patagonium silvestrii* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Adesmia smithiae DC.

Sin.: *Patagonium smithiae* (DC.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, RNE, SCR).

Adesmia spinosissima Meyen

Sin.: *Adesmia alcornutum* Rusby, *Adesmia rupicola* Wedd., *Patagonium alcornutum* Rusby, *Patagonium spinosissimum* (Meyen) Kuntze

Arbusto. Nativa. 2700-4300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Adesmia spuma Werderm. ex Burkart

Hierba. Endémica. 2000-4600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
CHL(ATA, COQ).

Adesmia stenocaulon Hauman

Sin.: *Adesmia fabrisii* Burkart

Hierba. Endémica. 2700-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Adesmia subterranea Clos

Sin.: *Patagonium subterraneum* (Clos) Kuntze

Subarbusto. Endémica. 1200-4300 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL).

Adesmia suffocata Hook. f.

Sin.: *Patagonium suffocatum* (Hook. f.) Macloskie

Subarbusto. Endémica. 300-500 m.
Países: ARG(SCR).

Adesmia sulina Miotto

Hierba subleñosa. Endémica. 1000-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adesmia tehuelcha Speg.

Sin.: *Patagonium tehuelches* (Speg.) Speg.

Hierba. Endémica.
Países: ARG(CHU, SCR).

Adesmia tenella Hook. & Arn. var.

macrocarpa Ulibarri

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Adesmia tenella Hook. & Arn. var.

misera (Phil.) Skottsbl.

Sin.: *Adesmia smithiae* DC. var. *misera* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Adesmia tenella Hook. & Arn. var.

tenella

Sin.: *Adesmia angustifolia* Hook. & Arn., *Adesmia parvula* Phil., *Adesmia tenuicaulis* Phil., *Adesmia vesicaria* Bertero ex Colla, *Patagonium angustifolium* (Hook. & Arn.) Reiche,

comb. superfl., *Patagonium parvulum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium tenuicaule* (Phil.) Reiche, *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Kuntze, comb. superfl., *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Adesmia tomentosa Meyen

Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(VAL, MAU).

Adesmia torcaea Phil.

Sin.: *Patagonium torcaeum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 200-3200 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Adesmia trifoliata Phil.

Sin.: *Adesmia philippiana* (Hosseus) Burkart, *Patagonium philippianum* Hosseus, *Patagonium trifoliatum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium triphyllum* Speg.
Arbusto. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Adesmia trifoliolata Gillies ex Hook. & Arn. var. **epunctata** Burkart
Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Adesmia trifoliolata Gillies ex Hook. & Arn. var. **trifoliolata**
Sin.: *Patagonium trifoliolatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.
Hierba. Endémica. 200-2300 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(VAL, RME).

Adesmia trijuga Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia arnottiana* Gillies ex Hook., *Adesmia capricornu* Phil., *Adesmia cervicornis* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *brevisetosa* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *sericeophylla* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *tenuispina* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *viscidisepala* Burkart, *Patagonium trijugum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 900-3700 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC).

Adesmia tristis Vogel
Subarbusto. Endémica. 500-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Adesmia tunuianica Burkart
Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(MEN).

Adesmia uspallatensis Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Patagonium uspallatense* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 1900-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
CHL(VAL, RME).

Adesmia vallsii Miotto
Hierba subleñosa. Endémica. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Adesmia verrucosa Meyen
Arbusto. Nativa. 1700-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Adesmia villosa Hook. f.
Sin.: *Adesmia morenonis* Harms, *Adesmia villosa* Hook. f. var. *acutifolia* Speg., *Adesmia villosa* Hook. f. var. *glabrata* (Speg.) Burkart, *Patagonium morenonis* (Harms) Kuntze, *Patagonium villosum* (Hook. f.) Speg. var. *glabratum* Speg.
Hierba. Endémica. 0-2400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAG).

Adesmia viscida Bertero ex Colla
Sin.: *Adesmia aprica* Phil., *Adesmia simonsi* Phil., *Patagonium apricum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *apricum* (Phil.) Reiche, *Patagonium simonsii* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Adesmia viscidissima I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 700-800 m.
Países: CHL(ANT).

Adesmia viscosa Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia pulchra* Phil., *Patagonium pulchrum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium viscosum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 300-800 m.
Países: CHL(LBO, MAU, ARA).

Adesmia volckmannii Phil.
Sin.: *Adesmia quadrijuga* Phil., *Adesmia campestris* (Rendle) Rowlee, *Patagonium campestre* Rendle, *Patagonium quadrijugum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Reiche, comb. superfl.
Arbusto. Endémica. 200-2200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Adesmia zoellneri Ulibarri
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL).

Aeschynomene L.

Aeschynomene americana L.
Sin.: *Aeschynomene americana* L. var. *glandulosa* (Poir.) Rudd, *Aeschynomene americana* L. var. *depila* Millsp., *Aeschynomene glandulosa* Poir.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SFE).
BRA(PAR).
PRY(CON, COA, GUA, PHA).

Aeschynomene brasiliana (Poir.) DC.
Sin.: *Hedysarum brasilianum* Poir.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
PRY(APY).

Aeschynomene denticulata Rudd
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS).
PRY(APY, BOQ, CHO, COA, GUA, ÑEE).
URY(ART, RNO, SAO).

Aeschynomene elegans Schltld. & Cham.
Sin.: *Aeschynomene arenicola* Brandegee, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. f. *glabrior* Kuntze, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *elegans* (Schltld. & Cham.) Kuntze, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *plurijuga* Benth., *Aeschynomene gracilis* Vogel, *Aeschynomene tecta* Vogel
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Aeschynomene evenia C. Wright var. **evenia**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR).

Aeschynomene evenia C. Wright var. **serrulata** Rudd
Arbusto, subarbusto o hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Aeschynomene falcata (Poir.) DC. var. **falcata**
Sin.: *Aeschynomene apoloana* Rusby, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *paucijuga* Benth., *Hedysarum diffusum* Vell., *Hedysarum falcatum* Poir.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Aeschynomene falcata (Poir.) DC. var. **hassleri** Rudd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Aeschynomene fluminensis Vell.
Sin.: *Aeschynomene scoparia* Splitg.
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Aeschynomene fructipendula
Abruzzi de Oliveira
Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Aeschynomene histrix Poir. var. **apana** Rudd
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Aeschynomene histrix Poir. var. **densiflora** (Benth.) Rudd
Sin.: *Aeschynomene densiflora* Benth.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Aeschynomene histrix Poir. var. **histrix**
Sin.: *Aeschynomene conferta* Benth., *Aeschynomene histrix* Poir. var. *mucronulata* (Benth.) Benth., *Aeschynomene mucronulata* Benth., *Secula hystrix* (Poir.) Small
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(RGS). PRY(CON, PAI, PHA).

Aeschynomene histrix Poir. var. **incana** (Vogel) Benth.
Sin.: *Aeschynomene incana* Vogel, *Aeschynomene puberula* DC.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, CON, COA). URY(ART, COL, MON, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).

Aeschynomene histrix Poir. var. **multijuga** (Chodat & Hassl.) Rudd
Sin.: *Aeschynomene brasiliensis* (Poir.) DC. f. *multijuga* Chodat & Hassl., *Aeschynomene echinus* Vogel
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAA, CAN, CON).

Aeschynomene indica L.
Sin.: *Aeschynomene cachemiriana* Cambess., *Aeschynomene diffusa* Klein ex Willd., *Aeschynomene glaberrima* Poir.,

Aeschynomene indica L. var. *punctata* Pers., *Aeschynomene indica* L. var. *viscosa* Miq., *Aeschynomene macropoda* DC., *Aeschynomene montana* Span., *Aeschynomene oligantha* Welw. ex Baker, *Aeschynomene pumila* L., *Aeschynomene punctata* Steud., *Aeschynomene quadrata* Schumach. & Thonn., *Aeschynomene roxburgii* Spreng., *Aeschynomene subviscosa* DC., *Hedysarum alpinum* Lour., *Hedysarum neli-tali* Roxb., *Hedysarum virginicum* Lour.
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Aeschynomene lorentziana
Bacigalupo & Vanni
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). URY(ART, SAO).

Aeschynomene magna Rudd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Aeschynomene mollicula Kunth
Sin.: *Aeschynomene pauciflora* Vogel
Subarbusto. Nativa. 300-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON, PHA).

Aeschynomene montevidensis Vogel
Sin.: *Aeschynomene montevidensis* Vogel var. *microphylla* Chodat & Hassl., *Macromiscus brasiliensis* Turcz.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, COL, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Aeschynomene paniculata Willd. ex Vogel
Sin.: *Aeschynomene gracilis* Miq., hom. illeg., *Aeschynomene hedysaroides* M. Martens & Galeotti, *Aeschynomene laevis* M. Martens & Galeotti
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON).

Aeschynomene paraguayensis Rudd
Sin.: *Aeschynomene selloi* Vogel f. *scabra* Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA, PAI).

Aeschynomene parviflora Micheli
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, PAI).

Aeschynomene pratensis Small var. **caribaea** Rudd
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(SPE).

Aeschynomene rudis Benth.
Sin.: *Aeschynomene bonariensis* Speg., *Aeschynomene natans* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CEN, PHA, SPE). URY(SOR).

Aeschynomene selloi Vogel
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Aeschynomene sensitiva Sw.
Sin.: *Aeschynomene sensitiva* P. Beauv., nom. superfl., *Aeschynomene sensitiva* Sw. var. *paucifoliolata* Chodat & Hassl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Aeschynomene viscidula Michx.
Sin.: *Aeschynomene eriocarpa* Standl. & Steyerl., *Aeschynomene prostrata* Poir., *Secula viscidula* (Michx.) Small
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

Albizia Durazz.

Albizia burkartiana Barneby & J.W. Grimes
Árbol. Endémica. 600-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Albizia edwallii (Hoehne) Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Albizia austrobrasiliensis* Burkart, *Pithecellobium edwallii* Hoehne
Árbol. Nativa. 200-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Acacia inundata* Mart., *Acacia polyantha* Spreng., *Albizia polyantha* (A. Spreng.) G.P. Lewis, *Arthrosamanea polyantha* (A. Spreng.) Burkart, *Arthrosamanea polycephala* (Griseb.)

Burkart, *Cathormion polyanthum* (A. Spreng.) Burkart, *Cathormion polycephalum* (Griseb.) Burkart, hom. illeg., *Enterolobium polycephalum* Griseb., *Feuilleea polycephala* (Griseb.) Kuntze, *Pithecellobium multiflorum* (Kunth) Benth. var. *brevipedunculata* Chodat & Hassl., *Pithecellobium pendulum* Lindm.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CAA, CEN, CON, COA, PHA). URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR).

Albizia julibrissin Durazz.

Árbol. Introducida.

Países: ARG(COR, SFE).

Albizia lophantha (Willd.) Benth.

Sin.: *Acacia lophantha* Willd., *Albizia distachya* (Vent.) J.F. Macbr., *Feuilleea distachya* (Vent.) Kuntze, *Mimosa distachya* Vent., *Mimosa lophantha* (Willd.) Pers., *Paraserianthes lophantha* (Willd.) I.C. Nielsen

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, RME, JFE).

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.)

Burkart

Sin.: *Acacia guacamayo* (Britton & Killip) Standl., *Albizia caribaea* (Urb.) Britton & Rose, *Albizia guacamayo* (Britton & Killip) L. Cardenas, *Albizia hassleri* (Chodat) Burkart, *Albizia richardiana* King & Prain, *Feuilleea niopoides* (Spruce ex Benth.) Kuntze, *Pithecellobium caribaeum* Urb., *Pithecellobium hassleri* Chodat, *Pithecellobium niopoides* Spruce ex Benth., *Senegalia guacamayo* Britton & Killip, *Senegalia liebmännii* Britton & Rose

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, PAI).

Albizia pedicellaris (DC.) L. Rico

Sin.: *Inga pedicellaris* DC.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record

Sin.: *Pithecellobium polycephalum* Benth.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Alysicarpus Neck. ex Desv.

Alysicarpus ovalifolius (Schumach.)

J. Léonard

Sin.: *Hedysarum ovalifolium* Schumach.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, SCA).

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

Sin.: *Hedysarum vaginae* L.

Hierba o subarbusto. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Amburana Schwacke & Taub.

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm.

Sin.: *Torresea cearensis* Allemão

Árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

Amicia Kunth

Amicia andicola (Griseb.) Harms

Sin.: *Zornia andicola* Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-3400 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Amicia fimbriata Harms

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Amicia medicaginea Griseb.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Amorpha L.

Amorpha fruticosa L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, MEN, SFE, TUC). URY(CLA, FLA, MON).

Anadenanthera Speg.

Anadenanthera colubrina (Vell.)

Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul

Sin.: *Acacia cebil* Griseb.,

Anadenanthera macrocarpa (Benth.)

Brenan, *Piptadenia cebil* (Griseb.)

Griseb., *Piptadenia hassleriana*

Chodat var. *fruticosa* Chodat &

Hassl., *Piptadenia hassleriana* Chodat,

Piptadenia macrocarpa Benth. f.

microcarpa Chodat & Hassl., *Piptadenia*

macrocarpa Benth. f. *puberula* Chodat

& Hassl., *Piptadenia macrocarpa*

Benth. f. *rupestris* Chodat & Hassl.,

Piptadenia macrocarpa Benth. var. *cebil*

(Griseb.) Chodat & Hassl., *Piptadenia*

macrocarpa Benth. var. *vestita* Chodat

& Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth., *Piptochaetium macrocarpa* Benth. var. *plurifoliata* Hoehne

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE).

Anadenanthera colubrina (Vell.)

Brenan var. **colubrina**

Sin.: *Mimosa colubrina* Vell., *Piptadenia colubrina* (Vell.) Benth.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR).

Anadenanthera peregrina (L.) Speg.

Sin.: *Acacia angustiloba* DC., *Acacia microphylla* Willd., *Acacia niopo* (Humb.

& Bonpl. ex Willd.) Kunth, *Acacia*

peregrina (L.) Willd., *Anadenanthera*

falcata (Benth.) Speg., *Anadenanthera*

peregrina (L.) Speg. var. *falcata* (Benth.)

Altschul, *Mimosa acacioides* Benth.,

Mimosa niopo (Humb. & Bonpl. ex

Willd.) Poir., *Mimosa parvifolia* Poir.,

Mimosa peregrina L., *Niopa peregrina*

(L.) Britton & Rose, *Piptadenia falcata*

Benth., *Piptadenia niopo* (Humb. &

Bonpl. ex Willd.) Spruce, *Piptadenia*

peregrina (L.) Benth. var. *falcata* (Benth.)

Chodat & Hassl., *Piptadenia peregrina*

(L.) Benth.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, ÑEE, PAI).

Anarthrophyllum Benth.

Anarthrophyllum andicolum (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.

Sin.: *Anarthrophyllum andicolum*

(Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.

var. *bridgesii* Chodat & Wilcz.,

Anarthrophyllum juniperinum (Meyen) F.

Phil., *Genista andicola* Gillies ex Hook. &

Arn., *Genista juniperina* Meyen

Arbusto. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Anarthrophyllum burkartii Sorarú

Subarbusto. Endémica. 1400-2100 m.

Países: ARG(NEU).

Anarthrophyllum capitatum Sorarú

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU).

Anarthrophyllum catamarcense

Sorarú

Arbusto. Endémica. 2700-3000 m.

Países: ARG(CAT).

Anarthrophyllum cumingii (Hook. & Arn.) F. Phil.Sin.: *Anarthrophyllum cumingii* (Hook. & Arn.) F. Phil. var. *angustifolia* Chodat & Wilcz., *Genista cumingii* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. **desideratum**Sin.: *Anarthrophyllum beaufilsii* Kuntze, *Anarthrophyllum bergii* Hieron., *Anarthrophyllum desideratum* (DC.) Benth. var. *bergii* (Hieron.) Speg., *Anarthrophyllum desideratum* Neger, nom. illeg., *Anarthrophyllum prichardii* Rendle, *Genista desiderata* DC.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. **morenonis** (Kuntze) Speg.Sin.: *Anarthrophyllum morenonis* Kuntze

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. **mustersii** Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Anarthrophyllum elegans (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.Sin.: *Genista elegans* Gillies ex Hook. & Arn., *Anarthrophyllum pungens* Chodat

Arbusto. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(VAL).

Anarthrophyllum gayanum (A. Gray) B.D. Jacks.Sin.: *Anarthrophyllum umbellatum* (Clos) F. Phil., *Genista gayana* A. Gray, *Genista umbellata* Clos

Subarbusto. Endémica. 2000-3700 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, RME).

Anarthrophyllum macrophyllum

Sorarú

Arbusto. Endémica.

Países: ARG(MEN, NEU).

Anarthrophyllum ornithopodum

Sandwith

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, NEU).

Anarthrophyllum patagonicum Speg.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Anarthrophyllum pedicellatum

Sorarú

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN).

Anarthrophyllum rigidum (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.Sin.: *Anarthrophyllum brevistipula* Phil., *Anarthrophyllum negerii* Chodat & Wilczek, *Anarthrophyllum rigidum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron. var. *toninii* (Kuntze) Speg., *Anarthrophyllum toninii* Kuntze, *Genista rigida* Gillies ex Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 200-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, MAG).

Anarthrophyllum strigulipetalum

Sorarú

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Anarthrophyllum subandinum Speg.Sin.: *Anarthrophyllum subandinum* Speg. var. *nahuelhuapensis* Speg.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Ancistrotropis A. DelgadoSin.: *Ancistrotropis clitorioides* (Mart. ex Benth.) A. DelgadoSin.: *Phaseolus clitorioides* Mart. ex Benth. var. *modestus* Benth., *Phaseolus clitorioides* Mart. ex Benth., *Phaseolus modestus* Mart. ex Benth., *Phaseolus oblongifolius* Micheli, *Phaseolus peduncularis* Kunth f. *oblongifolius* (Micheli) Hassl., *Phaseolus peduncularis* Kunth f. *pious* (Mart. ex Benth.) Hassl., *Phaseolus peduncularis* Kunth f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus peduncularis* Kunth var. *clitorioides* (Mart. ex Benth.) Hassl., *Phaseolus pious* Mart. ex Benth., *Vigna peduncularis* (Kunth) Fawc. & Rendle var. *clitorioides* (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, ITA, MIE, SPE). URY(CLA, RIV, TAC).

Ancistrotropis firmula (Mart. ex Benth.) A. DelgadoSin.: *Phaseolus crassifolius* Mart. ex Benth., *Phaseolus firmulus* Mart. ex Benth., *Phaseolus firmulus* Mart. ex Benth. var. *crassifolius* (Mart. ex Benth.) Hassl., *Vigna firmula* (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA, GUA).

Ancistrotropis peduncularis (Fawc. & Rendle) A. DelgadoSin.: *Phaseolus pascuorum* Mart. ex Benth., *Phaseolus peduncularis* Kunth, *Vigna peduncularis* (Kunth) Fawc. & Rendle var. *peduncularis*, *Phaseolus spixianus* Mart. ex Benth.

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAN).

Ancistrotropis serrana Snak, J.L.A. Moreira & A.M.G. Azevedo

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Andira Lam., nom. cons.Sin.: *Andira stipulacea* Vell., *Lumbricida anthelmia* Vell.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Andira anthelmia (Vell.) J.F. Macbr.Sin.: *Andira stipulacea* Vell., *Lumbricida anthelmia* Vell.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Andira fraxinifolia Benth.Sin.: *Andira anthelmia* (Vell.) J.F. Macbr. var. *gracilis* N.F. Mattos, *Andira bahiensis* N.F. Mattos, *Andira fraxinifolia* Benth. var. *lanceolata* N.F. Mattos, *Andira fraxinifolia* Benth. var. *latifoliolata* N.F. Mattos, *Andira fraxinifolia* Benth. var. *rosea* (Mart. ex Benth.) Benth., *Andira handroana* N.F. Mattos, *Andira micans* Taub. ex Glaz., *Andira parvifolia* Mart. ex Benth., *Andira pernambucensis* N.F. Mattos, *Andira pisonis* Mart. ex Benth. var. *emarginata* N.F. Mattos, *Andira pisonis* Mart. ex Benth. var. *puberula* N.F. Mattos, *Andira pisonis* Mart. ex Benth., *Andira rosea* Mart. ex Benth., *Vouacapoua fraxinifolia* (Benth.) Kuntze, *Vouacapoua parvifolia* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Vouacapoua pisonis* (Mart. ex Benth.) Kuntze

Arbusto, arbolito o árbol. Nativa.

0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Andira humilis Mart. ex Benth.

Sin.: *Andira humilis* Mart. ex Benth. var. *cordata* N.F. Mattos, *Andira laurifolia* Benth., *Andira pauciflora* Benth., *Vouacapoua humilis* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Vouacapoua laurifolia* (Benth.) Kuntze

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Andira inermis (W. Wright) DC.

Sin.: *Andira excelsa* Kunth, *Andira inermis* (W. Wright) DC. var. *riedelii* Benth., *Andira riparia* Kunth, *Geoffroea inermis* W. Wright, *Glycyrrhiza undulata* Ruiz & Pav., *Vouacapoua inermis* (W. Wright) Lyon

Árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(MIE).

Apuleia Mart., nom. cons.**Apuleia leiocarpa** (Vogel) J.F. Macbr.

Sin.: *Apuleia molaris* Spruce ex Benth., *Apuleia praecox* Mart., *Leptolobium leiocarpum* Vogel, *Platymiscium ellipticum* Rusby

Árbol. Nativa. 100-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, COA, ITA, PAI).

Apurimacia Harms**Apurimacia dolichocarpa** (Griseb.)

Burkart

Sin.: *Tephrosia dolichocarpa* Griseb.
Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.
Países: ARG(COR).

Arachis L.**Arachis batizocoi** Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis batizocae* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: PRY(APY).

Arachis burkartii Handro

Sin.: *Arachis marginata* Gardner f. *submarginata* Hoehne, p.p.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, PAY, RIV, SAO, TAC).

Arachis cardenasii Krapov. & W.C.

Greg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Arachis correntina (Burkart) Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis villosa* Benth. var. *correntina* Burkart
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(CEN, PAI, PHA).

Arachis diogoi Hoehne

Sin.: *Arachis chacoense* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud., *Arachis villosa* Benth. subsp. *diogoi* (Hoehne) A. Chev.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, PAI, PHA).

Arachis duranensis Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis argentinensis* Speg. ex Hoehne, nom. nud., *Arachis duranensis* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud., *Arachis spegazzinii* M.P. Greg. & W.C. Greg., nom. nud.
Hierba. Nativa. 200-1300 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY).

Arachis glabrata Benth. var. **glabrata**

Sin.: *Arachis argentinensis* Speg. ex Hoehne, nom. nud., *Arachis duranensis* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud., *Arachis glabrata* Benth. f. *major* Hoehne, nom. nud., *Arachis glabrata* Benth. f. *minor* Hoehne, nom. nud., *Arachis glabrata* Benth. var. *membranifolia* Benth. ex A. Chev., *Arachis prostrata* Benth. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Arachis prostrata* Benth. var. *pseudomarginata* Chodat & Hassl., *Arachis spegazzinii* M.P. Greg. & W.C. Greg., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART).

Arachis glabrata Benth. var. **hagenbeckii**

(Harms ex Kuntze) E.J. Herm.
Sin.: *Arachis angustifolia* (Chodat & Hassl.) Killip ex Hoehne, *Arachis hagenbeckii* Harms ex Kuntze, *Arachis marginata* Gardner subsp. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) A. Chev., *Arachis prostrata* Benth. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Arachis prostrata* Benth. f. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) Hoehne, *Arachis prostrata* Benth. subsp. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) Hoehne, *Arachis prostrata* Benth. var. *angustifolia* Chodat & Hassl. ex Hoehne
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Arachis guaranitica Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Arachis hassleri Krapov., Valls & C.E. Simpson

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON, PHA).

Arachis hoehnei Krapov. & W.C. Greg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Arachis lignosa (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis marginata* Gardner var. *lignosa* (Chodat & Hassl.) A. Chev., *Arachis prostrata* Benth. f. *lignosa* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(CON, PHA).

Arachis major Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis diogoi* Hoehne subsp. *major* Hoehne, nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Arachis monticola Krapov. & Rigoni

Hierba. Endémica. 1200-1600 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Arachis nitida Valls, Krapov. & C.E. Simpson

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Arachis paraguariensis Chodat & Hassl.

Sin.: *Arachis diogoi* Hoehne f. *submarginata* Hoehne, p.p., *Arachis prostrata* Benth. var. *intermedia* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, COA, PAI).

Arachis Pflugeae C.E. Simpson, Krapov. & Valls

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Arachis pintoii Krapov. & W.C. Greg.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS, SCA).

Arachis pseudovillosa (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C. Greg.

Sin.: *Arachis prostrata* Benth. var. *pseudovillosa* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Arachis repens Handro

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Arachis schininii Krapov., Valls & C.E. Simpson

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Arachis stenophylla Krapov. & W.C. Greg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Arachis stenosperma Krapov. & W.C. Greg.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Arachis villosa Benth.

Sin.: *Arachis prostrata* Benth. var. *villosa* (Benth.) A. Chev.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Arquita E. Gagnon, G.P. Lewis & C.E. Hughes

Arquita mimosifolia (Griseb.) E. Gagnon, G.P. Lewis & C.E. Hughes
Sin.: *Caesalpinia mimosifolia* Griseb.
Arbusto. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Arquita trichocarpa (Griseb.) E. Gagnon, G.P. Lewis & C.E. Hughes
Sin.: *Caesalpinia trichocarpa* Griseb.
Arbusto. Nativa. 1500-3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Astragalus L.

Astragalus amatus Clos
Sin.: *Astragalus brachypterus* (Phil.) Reiche, *Astragalus chilensis* E. Sheld., *Astragalus ferrugineus* Clos, *Astragalus*

leucomallus Phil., *Astragalus litoreus* Phil., *Astragalus procumbens* Hook. & Arn., *Astragalus subandinus* Speg., *Astragalus tricolor* (Clos) Reiche, *Phaca brachyptera* Phil., *Phaca tricolor* Clos, *Tragacantha brevilata* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Astragalus ameghinoi Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Astragalus anni-novi Burkart
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Astragalus arequipensis Vogel
Sin.: *Astragalus bolivianus* Phil., *Astragalus drepanophorus* Griseb., *Astragalus orbignyanus* Wedd., *Astragalus sinocarpus* Rusby
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Astragalus argentinus Manganaro
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Astragalus arnottianus (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Sin.: *Astragalus nanus* (Phil.) Reiche, *Astragalus philippi* Speg., *Astragalus reedii* (Phil.) Hauman, *Phaca arnottiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Phaca nana* Phil., *Phaca reedi* Phil., *Phaca uspallatensis* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-4500 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Astragalus asplundii I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 1000-4800 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SJU).

Astragalus austroargentinus Gómez-Sosa
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Astragalus bellus (Kuntze) R.E. Fr.
Sin.: *Astragalus pulchellus* (Clos) Reiche, *Phaca pulchella* Clos, *Tragacantha bella* Kuntze
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ).

Astragalus bergii Hieron.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SLU).

Astragalus berterii Colla

Sin.: *Astragalus alberjilla* Steud., *Astragalus cauquenensis* Phil., *Astragalus concinnus* (Phil.) Reiche, *Astragalus elongatus* (Phil.) Reiche, *Astragalus filifolius* Clos, *Astragalus gratus* (Clos) Reiche, *Astragalus penganus* Phil., *Astragalus prostratus* Hook. & Arn., *Astragalus rhudolphi* Speg., *Phaca concinna* Phil., *Phaca elongata* Phil., *Phaca grata* Clos, *Tragacantha longior* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Astragalus berterianus (Moris) Reiche
Sin.: *Astragalus aconcaguensis* Speg. *Astragalus canescens* (Hook. & Arn.) Gray, nom. illeg., *Astragalus dolichostachys* (Phil.) Reiche, *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche var. *dissitiflora* (Phil.) Reiche, *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche, *Astragalus oblongifolius* Clos, *Astragalus placens* Clos var. *oblongifolius* (Clos) Reiche, *Astragalus sphaerocarpus* Clos, *Phaca berteriana* Moris, *Phaca canescens* Hook. & Arn., *Phaca dissitiflora* Phil., *Phaca dolichostachya* Phil., *Phaca laxiflora* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Astragalus boelckei Gómez-Sosa
Hierba. Endémica. 3500-4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Astragalus bonariensis Gómez-Sosa
Sin.: *Astragalus distans* Gray var. *beta* Gray
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE).

Astragalus burkartii I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 3000-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Astragalus bustillosii Clos
Sin.: *Astragalus atacamensis* (Kuntze) R.E. Fr., *Astragalus brachycalyx* Phil., *Astragalus depauperatus* (Phil.) Reiche, *Astragalus tarapacanus* Speg., *Phaca depauperata* Phil., *Phaca saxifraga* Phil., *Tragacantha atacamensis* Kuntze
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Astragalus cachinalensis Phil.
Sin.: *Tragacantha cachinalensis* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Astragalus carinatus (Hook. & Arn.)

Reiche

Sin.: *Phaca carinata* Hook. & Arn.,
Phaca andicola Gillies ex Hook. & Arn.
 Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
 Países: ARG(COR, MEN, SAL, TUC).

Astragalus chamissonis (Vogel)

Reiche

Sin.: *Astragalus araucanus* (F. Phil.)
 Reiche, *Astragalus chilensis* (Nees)
 Reiche, hom. illeg., *Astragalus laetevirens*
 Phil., *Astragalus monospermus* Phil.,
Astragalus ochroleucus (Hook. & Arn.)
 Gray, nom. illeg., *Astragalus ovalensis*
 Clos, *Astragalus placens* Clos, *Astragalus*
volckmannii Phil., *Phaca araucana* F. Phil.,
Phaca chamissonis Vogel, *Phaca chilensis*
 Nees, *Phaca ochroleuca* Hook. & Arn.
 Hierba. Endémica. 0-2300 m.
 Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
 CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
 ARA, RME).

Astragalus chubutensis Speg.

Hierba. Endémica. 300-3300 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, SAL, SCR).

Astragalus colhuensis Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHU).

Astragalus complicatus Gillies

Hierba. Endémica. 2700-2900 m.
 Países: ARG(MEN).

Astragalus confinis I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.
 Países: CHL(TAR).

Astragalus coquimbensis (Hook. & Arn.) Reiche

Sin.: *Astragalus vasticola* I.M.
 Johnst., *Phaca atacamensis* Phil., *Phaca*
carrizalensis Phil., *Phaca coquimbensis*
 Hook. & Arn.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Astragalus cruckshanksii (Hook. & Arn.) Griseb.

Sin.: *Astragalus amunategui* Phil.,
Astragalus landbeckii (Phil.) Reiche, *Phaca*
cruckshanksii Hook. & Arn., *Phaca landbeckii*
 Phil., *Tragacantha cruckshanksii* (Hook. &
 Arn.) Kuntze var. *glabrescens* Kuntze
 Hierba. Endémica. 800-3600 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
 SCR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
 MAU, MAG, RME).

Astragalus crymophilus I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 3500-4200 m.
 Países: ARG(JUJ).

Astragalus cryptanthus Wedd.

Sin.: *Phaca clandestina* Phil.
 Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
 Países: CHL(AYP, TAR).

Astragalus crypticus I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3000-4500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC).

Astragalus cryptobotrys I.M. Johnst.

Sin.: *Astragalus clandestinus* (Phil.)
 Hieron., *Astragalus clandestinus* (Phil.)
 Hieron. var. *flossdorfii* Hicken, *Phaca*
cryptantha Phil.
 Hierba. Endémica. 3700-4700 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
 TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Astragalus curvicaulis (Clos) Reiche

Sin.: *Astragalus elatus* (Hook. & Arn.)
 Reiche, comb. superfl., *Phaca curvicaulis*
 Clos, *Phaca elata* Hook. & Arn.,
Tragacantha curvicaulis (Clos) Kuntze
 Hierba. Endémica. 1000-2400 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Astragalus cuyanus Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(MEN, SJU).

Astragalus darumbium (Bertero ex Colla) Clos

Sin.: *Astragalus atuelii* Chodat &
 Wilczek, *Astragalus macrophysus* (Phil.)
 Reiche var. *robustus* (Phil.) Reiche,
Astragalus macrophysus (Phil.) Reiche,
Phaca macrophysa Phil., *Phaca robusta*
 Phil., *Sutherlandia darumbium* Bertero ex
 Colla, *Tragacantha firma* Kuntze
 Hierba. Endémica. 1500-2700 m.
 Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, RME).

Astragalus darwinianus Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 100-200 m.
 Países: ARG(SCR).

Astragalus diminutivus (Phil.)

Gómez-Sosa var. *dielsii* (J.F. Macbr.)
 Gómez-Sosa
 Sin.: *Astragalus dielsii* J.F. Macbr.
 Hierba. Nativa. 3600-4400 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Astragalus diminutivus (Phil.)

Gómez-Sosa var. *diminutivus*
 Sin.: *Astragalus deminutivus* I.M.
 Johnst., *Phaca diminutiva* Phil.
 Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR).

Astragalus distinens Macloskie

Sin.: *Astragalus distans* Gray
 Hierba. Endémica. 0-4200 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ,
 LPA, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).
 URY(COL, MON, RNO, SJO, SOR).

Astragalus dodtii Phil.

Sin.: *Astragalus melanogonatus* I.M.
 Johnst., *Astragalus rengifoii* Phil.,
Tragacantha dodtii (Phil.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Astragalus domeykoanus (Phil.) Reiche

Sin.: *Astragalus orites* (Phil.) Reiche,
Phaca domeykoana Phil., *Phaca orites*
 Phil., *Tragacantha procumbens* (Hook. &
 Arn.) Kuntze var. *glabrescens* Kunze
 Hierba. Endémica. 0-2500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, SCR).
 CHL(MAU, BIO, ARA).

Astragalus edmonstonei (Hook.)

B.L. Rob.

Sin.: *Astragalus affinis* Steud.,
Astragalus chrysanthus (Moris) Reiche,
 nom. illeg., *Astragalus flavus* (Hook. &
 Arn.) E. Sheld., *Astragalus hohenacheri*
 Speg., *Phaca acutidens* Phil., *Phaca*
chrysantha Moris, *Phaca edmonstonei*
 Hook., *Phaca flava* Hook. & Arn., *Phaca*
podocarpa Phil., *Tragacantha chrysantha*
 (Moris) Kuntze, *Tragacantha flava*
 (Hook. & Arn.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU).

Astragalus fabrisii Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 4300-4700 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Astragalus famatinae I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 3000-3200 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

Astragalus flavocreatus I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 3600-4600 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Astragalus garbancillo Cav.

Sin.: *Astragalus benthamianus* Gillies
 ex Hook. & Arn., *Astragalus minus* Clos,
Astragalus unifultus L'Hér., *Tragacantha*
benthamiana (Gillies ex Hook. & Arn.)
 Kuntze, *Tragacantha garbancillo* (Cav.)
 Kuntze, *Tragacantha minor* (Clos) Kuntze
 Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
 SAL, SJU, TUC).

Astragalus germainii Phil.

Sin.: *Astragalus alfalfalis* Phil.,
Astragalus azureus Phil. ex Reiche,
Astragalus closianus Phil., *Astragalus*
dessaueri Phil., *Astragalus dilectus* Phil.,
Astragalus germaini Phil. var. *azureus*
 Phil. ex Fr., *Astragalus segethi* Phil.,
Tragacantha closiana (Phil.) Kuntze,
Tragacantha dilecta (Phil.) Kuntze,
Tragacantha germaini (Phil.) Kuntze,
Tragacantha segethii (Phil.) Kuntze
 Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Astragalus hickenii Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(MEN, RNE).

Astragalus hypsogenus I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
 Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Astragalus illinii I.M. Johnst.

Sin.: *Astragalus moyanoi* Speg. var.
villosula Speg.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHU, RNE).

Astragalus joergensenii I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Astragalus johnstonii Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 1000-1400 m.
 Países: CHL(VAL, RME).

Astragalus limariensis Muñoz

Hierba. Endémica. 0-600 m.
 Países: CHL(ANT, COQ).

Astragalus looseri I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 1600-3500 m.
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,
 VAL, LBO, MAU, RME).

Astragalus magellanicus Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(SCR). CHL(AIS, MAG).

Astragalus maulensis Speg.

Sin.: *Astragalus brachytrypis*
 (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Phaca*
brachytrypis Phil., hom. illeg.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(MAU).

Astragalus mendocinus Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
 Países: ARG(MEN).

Astragalus micranthellus Wedd.

Sin.: *Astragalus capitellus* Britton,
Astragalus patancanus Ulbr., *Tragacantha*
arequibensis Kuntze var. *minima* Kuntze,
Tragacantha arequibensis Kuntze
 var. *tenuifolia* Kuntze, *Tragacantha*
micranthella (Wedd.) Kuntze
 Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
 CHL(AYP, TAR, ANT).

Astragalus minimus Vogel

Hierba. Nativa. 3000-4600 m.
 Países: ARG(JUU). CHL(AYP).

Astragalus minutissimus Wedd.

Sin.: *Tragacantha minutissima* (Wedd.)
 Kuntze
 Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
 Países: CHL(AYP, TAR).

Astragalus monteroi I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: CHL(ARA).

Astragalus monticola Phil.

Sin.: *Astragalus barceloi* Phil.,
Tragacantha monticola (Phil.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
 Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
 CHL(RME).

Astragalus moyanoi Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU).

Astragalus nelidae Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
 Países: ARG(SJU).

Astragalus neoburkartianus

Gómez-Sosa
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHU, SCR).

Astragalus neocarpus Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 800-1000 m.
 Países: ARG(CHU).

Astragalus neuquenensis Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU).

Astragalus nicorae Gómez-Sosa

Endémica. 3200-3600 m.
 Países: ARG(SJU).

Astragalus nivicola Gómez-Sosa

Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
 CHL(MAG).

Astragalus nudus Clos

Sin.: *Tragacantha nuda* (Clos) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Astragalus orthocarpus I.M. Johnst.

Sin.: *Astragalus oliganthus* (Phil.)
 Reiche, nom. illeg., *Phaca oligantha* Phil.,
Tragacantha oligantha (Phil.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: CHL(LBO).

Astragalus palenae (Phil.) Reiche var.
grandiflora Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Astragalus palenae (Phil.) Reiche var.
palenae

Sin.: *Astragalus brevicaulis* Dusén,
 nom. illeg., *Astragalus duseni* Macloskie,
Astragalus palenae (Phil.) Reiche var.
dusenii (Macloskie) I.M. Johnst.,
Astragalus pallens Reiche, *Astragalus*
rahmeri (Phil.) Reiche, *Phaca oreophila*
 Phil., *Phaca palenae* Phil., *Phaca rahmeri*
 Phil., *Tragacantha oreophila* (Phil.) Kuntze
 Hierba. Endémica. 500-2000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
 TDF). CHL(MAU, ARA, LLA, AIS, MAG).

Astragalus paposanus I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 200-2600 m.
 Países: CHL(ANT, COQ).

Astragalus parodii I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
 Países: ARG(COR).

Astragalus patagonicus (Phil.) Speg.

Sin.: *Phaca patagonica* Phil.
 Hierba. Endémica. 0-2100 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
 SCR). CHL(AIS, MAG).

Astragalus pauranthus I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 200-3000 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR).

Astragalus pehuenches Niederl.

Sin.: *Astragalus grandis* (Kuntze)
 Speg., *Astragalus inflatus* (Gillies ex
 Hook. & Arn.) Steud., *Astragalus*
macrocarpus (Phil.) Reiche var. *petiolatus*
 Hauman, *Astragalus macrocarpus*
 (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Astragalus*
megalocarpus Speg., *Astragalus striatus*
 (Clos) Reiche, *Phaca inflata* Gillies ex
 Hook. & Arn., *Phaca macrocarpa* Phil.,
Phaca striata Clos, *Tragacantha bisinflata*

Kuntze, *Tragacantha grandis* Kuntze,
Tragacantha striata (Clos) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-2300 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE,
SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Astragalus peruvianus Vogel
Hierba. Nativa. 3000-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Astragalus pissisii (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Astragalus canescens* (Hook. &
Arn.) Reiche var. *pissisii* (Phil.) Reiche,
Phaca pissisii Phil., *Tragacantha pissisii*
(Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Astragalus pulviniformis I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(SJU).

Astragalus punae I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUJ).

Astragalus pusillus Vogel
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Astragalus reichei Speg.
Sin.: *Astragalus compactus* (Phil.)
Reiche, *Phaca compacta* Phil.
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Astragalus ruiz-lealii I.M. Johnst.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(MEN).

Astragalus sanctae-crucis Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR).

Astragalus schinetorum Barneby
Hierba. Endémica. 2800 m.
Países: CHL(COQ).

Astragalus spagazzinii I.M. Johnst.
Sin.: *Astragalus rengifoii* Phil. var.
lejocarpa Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(NEU, RNE).

Astragalus tacorensis Gómez-Sosa
Hierba. Endémica. 3700-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR).

Astragalus tarijensis Wedd.
Sin.: *Astragalus hieronymi* Ulbr.,
Tragacantha tarijensis (Wedd.) Kuntze
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Astragalus tehuelches Speg.
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).

Astragalus triflorus (DC.) A. Gray
Sin.: *Astragalus viciiformis* Ulbr., *Phaca*
triflora DC., *Tragacantha triflora* (DC.)
Kuntze
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Astragalus trifoliatus Phil.
Sin.: *Astragalus valparadisiensis* Speg.,
Tragacantha trifoliata (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(VAL).

Astragalus uniflorus DC.
Sin.: *Astragalus herzogii* Ulbr.,
Tragacantha uniflora (DC.) Kuntze
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Astragalus urbanianus Ulbr.
Hierba. Nativa. 2800-3700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Astragalus vagus (Clos) Reiche
Sin.: *Astragalus echegarayi* Hieron.,
Astragalus san-romani (Phil.) Reiche,
Astragalus striatus (Clos) Reiche var.
echegarayi (Hieron.) Hosseus, *Phaca*
san-romani Phil., *Phaca vaga* Clos,
Tragacantha vaga (Clos) Kuntze
Hierba. Endémica. 2700-4000 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Astragalus valerianensis I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(ATA).

Astragalus venturii I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 3000-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Astragalus verticillatus (Phil.) Reiche
Sin.: *Phaca verticillata* Phil.
Hierba. Endémica. 200-1800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

Astragalus vesiculosus Clos
Sin.: *Astragalus meyenianus* Speg.,
Astragalus meyenianus Speg. var.
paucifoliolata Hicken, *Astragalus*

nubigenus (Meyen ex Vogel) Taub.,
Astragalus rupestris Reiche *Phaca*
bustilloi Phil., *Phaca nubigena* Meyen ex
Vogel, *Tragacantha andina* Kuntze
Hierba. Endémica. 2300-4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Astragalus weddellianus (Kuntze)
I.M. Johnst.
Sin.: *Astragalus modestus* Wedd.,
nom. illeg., *Astragalus pilgeri* J.F.
Macbr., *Astragalus punensis* J.F. Macbr.
Tragacantha weddelliana Kuntze
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Astragalus werdermannii I.M.
Johnst.
Hierba. Endémica. 4000-4700 m.
Países: ARG(JUJ, TUC). CHL(TAR).

Ateleia (DC.) Benth.

Ateleia glazioviana Baill.
Árbol. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).
PRY(CAN, CON).

Balsamocarpon Clos

Balsamocarpon brevifolium Clos
Sin.: *Caesalpinia brevifolia* (Clos) Benth.
Arbusto. Endémica. 0-1900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Bauhinia L.

Bauhinia acuruana Moric.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CAN).

Bauhinia affinis Vogel
Sin.: *Pauletia affinis* (Vogel) A. Schmitz
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Bauhinia amambayensis Fortunato
Sin.: *Bauhinia uniflora* Hassl., hom. illeg.
Arbusto o subarbusto. Endémica.
0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Bauhinia argentinensis Burkart var.
argentinensis
Arbusto o subarbusto. Endémica.
0-500 m.
Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY,
BOQ, CEN, CON, GUA, PHA).

Bauhinia argentinensis Burkart var. **megasiphon** (Burkart) Fortunato
Sin.: *Bauhinia megasiphon* Burkart
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL).

Bauhinia bauhinioides (Mart.) J.F. Macbr.
Sin.: *Bauhinia microphylla* Vogel, *Pauletia bauhinioides* (Mart.) A. Schmitz, *Perlebia bauhinioides* Mart.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE).

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Sin.: *Bauhinia aromatica* Ducke, *Pauletia cheilantha* Bong.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON).

Bauhinia estrellensis Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: PRY(AMA).

Bauhinia forficata Link subsp. **forficata**
Árbol. Nativo.
Países: BRA(PAR, SCA).

Bauhinia forficata Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin
Sin.: *Bauhinia candicans* Benth., *Bauhinia forficata* Link var. *candicans* (Benth.) Hassl. ex Latzina, *Bauhinia forficata* Link var. *pruinosa* (Vogel) Hassl., *Bauhinia pruinosa* Vogel, *Pauletia candicans* (Benth.) A. Schmitz, *Pauletia pruinosa* (Vogel) A. Schmitz
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, COA, ITA). URY(MON, PAY, ROC, SAO).

Bauhinia hagenbeckii Harms
Sin.: *Bauhinia hassleriana* Chodat, *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *acuminata* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat var. *marginata* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Bauhinia holophylla (Bong.) Steud.
Sin.: *Bauhinia cordata* Vogel, *Bauhinia dodecandra* (Bong.) Steud., *Bauhinia rufa* (Bong.) Steud. var. *cordata* (Vogel) Benth., *Bauhinia rufa* (Bong.) Steud. var. *dodecandra* (Bong.) Benth., *Pauletia dodecandra* Bong., *Pauletia holophylla* Bong., *Pauletia rufa* Bong. var. *cordata* (Vogel) A. Schmitz, *Pauletia rufa* Bong. var. *dodecandra* (Bong.) A. Schmitz
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Bauhinia kleiniana Burkart
Sin.: *Binaria kleiniana* (Burkart) A. Schmitz
Liana. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.
Sin.: *Bauhinia geminata* Vogel, *Bauhinia obtusata* Vogel, *Bauhinia recurva* R.S. Cowan, *Pauletia longifolia* Bong.,
Arbusto o arbolito. Nativa.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Bauhinia mollis (Bong.) D. Dietr. var. **mollis**
Sin.: *Bauhinia appendiculata* Hassl., *Bauhinia corumbensis* S. Moore, *Bauhinia mollis* (Bong.) Walp. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Bauhinia mollis* (Bong.) Walp. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Pauletia mollis* Bong.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON, COA, SPE).

Bauhinia mollis (Bong.) D. Dietr. var. **notophila** (Griseb.) Fortunato
Sin.: *Bauhinia notophila* Griseb.
Arbusto o árbol. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Bauhinia unguolata L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz
Sin.: *Bauhinia angulicaulis* Harms, *Bauhinia cataholo* Hoehne, *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) D. Dietr., hom. illeg., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud. f. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud. f. *vestita* Chodat & Hassl., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud. var. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.)

Walp., hom. illeg., *Bauhinia hiemalis* Malme, *Pauletia cuiabensis* Bong.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, GUA).

Bauhinia unguolata L. var. **ungulata**
Sin.: *Bauhinia benthamiana* Taub., *Bauhinia macrostachya* Benth., *Bauhinia macrostachya* Benth. var. *tenuifolia* Ducke, *Cansenia unguolata* (L.) Raf., *Pauletia unguolata* (L.) A. Schmitz
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Bauhinia uruguayensis Benth.
Sin.: *Bauhinia guaranitica* Lindm., *Bauhinia hermesiana* N.F. Mattos, *Bauhinia venturii* Lillo, *Binaria uruguayensis* (Benth.) A. Schmitz
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Bauhinia variegata L. var. **candida** Voigt
Sin.: *Bauhinia candida* Roxb., nom. inval.
Arbusto o arbolito. Introducida. 1000-2500 m.
Países: ARG(SAL).

Bowdichia Kunth

Bowdichia virgilioides Kunth f. **major** (Mart.) Yakovlev
Sin.: *Bowdichia densiflora* Benth., *Bowdichia major* (Mart.) Mart. ex Benth., *Bowdichia virgilioides* Kunth var. *glabrata* Benth., *Sebipira major* Mart.
Arbusto o arbolito. Nativa. 100-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Bowdichia virgilioides Kunth f. **virgilioides**
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Caesalpinia L., emend. E. Gagnon & G.P. Lewis

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
Sin.: *Caesalpinia sepiaria* Roxb., *Reichardia decapetala* Roth
Arbusto. Introducida. 100-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

Sin.: *Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw. var. *flava* L.H. Bailey & Rehder, *Poinciana bijuga* Lour., *Poinciana elata* Lour., *Poinciana pulcherrima* L.
Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA). PRY(COA).

Cajanus L.**Cajanus cajan** (L.) Millsp.

Sin.: *Cajanus bicolor* DC., *Cajanus flavus* DC., *Cajanus indicus* Spreng., *Cytisus cajan* L., *Cytisus pseudocajan* Jacq.
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI).

Calliandra Benth.**Calliandra brevicaulis** Micheli var. **brevicaulis**

Sin.: *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *hirsutula* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *intermedia* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *robusta* (Hassl.) Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *robusta* Chodat & Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *puberula* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *pubescens* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *tomentosa* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 200-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, MIE).

Calliandra brevicaulis Micheli var. **glabra** Chodat & Hassl.

Sin.: *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *grandiflora* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *parviflora* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *roseiflora* Chodat & Hassl., *Calliandra glabra* Hassl.

Subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU, COA, ITA, PAI, SPE).

Calliandra brevipes Benth.

Sin.: *Acacia selloi* Spreng., *Anneslia brevipes* (Benth.) Lindm., *Calliandra selloi* (Spreng.) J.F. Macbr., *Calliandra yucunensis* Mattos, *Feuillea brevipes* (Benth.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CLA, MON, RIV).

Calliandra chilensis Benth.

Sin.: *Acacia nigra* Clos, *Feuillea chilensis* (Benth.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 1100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Calliandra dysantha Benth. var.

macrocephala (Benth.) Barneby
Sin.: *Calliandra macrocephala* Benth.
Arbusto. Nativa. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Calliandra dysantha Benth. var.

opulenta Barneby
Arbusto. Nativa. 400-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Calliandra foliolosa Benth.

Sin.: *Calliandra sancti-pauli* Hassk., *Calliandra tweedii* Benth. var. *sancti-pauli* (Hassk.) Benth., *Feuillea foliolosa* (Benth.) Kuntze
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI).

Calliandra harrisii (Lindl.) Benth.

Sin.: *Calliandra cylindrocarpa* Benth., *Clelia ornata* Casar., *Feuillea harrisii* (Lindl.) Kuntze, *Inga harrisii* Lindl.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Calliandra longipes Benth.

Sin.: *Calliandra longipes* Benth. var. *nana* Chodat & Hassl., *Calliandra longipes* Benth. var. *valenzuelensis* Chodat & Hassl., *Calliandra pyrophila* Fern.Casas & Schinini, *Feuillea longipes* (Benth.) Kuntze
Arbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, COA, MIE).

Calliandra parviflora Benth.

Sin.: *Acacia pachyloma* Mart., nom. nud., *Feuillea pachyloma* Kuntze
Arbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON, COA, SPE).

Calliandra parvifolia (Hook. f. & Arn.) Speg.

Sin.: *Anneslia parvifolia* (Hook. & Arn.) Britton, *Calliandra bicolor* Benth., *Calliandra diademata* Lem., *Calliandra falcifera* Ducke, *Calliandra microcalyx*

Harms, *Calliandra microphylla* Benth., *Calliandra myriophylla* Benth., *Calliandra peckoltii* Benth., *Feuillea bicolor* (Benth.) Kuntze, *Feuillea multifoliolata* Kuntze, *Feuillea myriophylla* (Benth.) Kuntze, *Feuillea peckoltii* (Benth.) Kuntze, *Inga parvifolia* Hook. f. & Arn.

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, PAI). URY(ART, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

Calliandra tweedii Benth.

Sin.: *Feuillea tweedii* (Benth.) Kuntze, *Inga pulcherrima* Cerv. ex Sweet, nom. nud., *Inga pulcherrima* Sweet ex Paxton, *Mimosa yaguaronensis* Larrañaga, *Anneslia tweediei* (Benth.) Lindm.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(ART, CLA, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Calopogonium Desv.**Calopogonium caeruleum** (Benth.) C. Wright ex Sauv.

Sin.: *Calopogonium caeruleum* (Benth.) Britton, nom. illeg., *Calopogonium caeruleum* (Benth.) C. Wright ex Sauv. var. *glabrescens* (Benth.) Malme, *Calopogonium caeruleum* (Benth.) Hemsl., nom. illeg., *Stenolobium caeruleum* Benth. var. *glabrescens* Benth., *Stenolobium caeruleum* Benth. var. *villosior* Benth., *Stenolobium glabrum* Benth., *Stenolobium tomentosum* Benth.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON).

Calopogonium sericeum (Benth.) Chodat & Hassl.

Sin.: *Calopogonium sericeum* (Benth.) Chodat & Hassl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Calopogonium sericeum* (Benth.) Chodat & Hassl. var. *villicalyx* Chodat & Hassl., *Stenolobium caeruleum* Benth. var. *sericeum* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, SPE).

Calopogonium velutinum (Benth.) Amshoff

Sin.: *Stenolobium velutinum* Benth.
Liana. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Camptosema Hook. & Arn.**Camptosema ellipticum** (Desv.)

Burkart

Sin.: *Rudolphia elliptica* Desv.

Arbusto o liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Camptosema praeandinum Burkart

Enredadera. Nativa. 1000-1700 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Camptosema rubicundum Hook. & Arn.Sin.: *Camptosema rubicundum* Hook.& Arn. f. *angustifolia* Chodat & Hassl.,*Kennedia ovata* Hort, *Kennedia splendens*

Meisn.

Liana. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(RGS). PRY(APA, CEN). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Camptosema scarlatinum (Mart. ex

Benth.) Burkart

Sin.: *Camptosema scarlatinum* (Mart.ex Benth.) Burkart var. *pohliianum*(Benth.) Burkart, *Collaea scarlatina*Mart. ex Benth. var. *calycina* Benth.,*Collaea scarlatina* Mart. ex Benth. var.*latifolia* Benth., *Collaea scarlatina* Mart.ex Benth. var. *oblongifolia* Benth.,*Collaea scarlatina* Mart. ex Benth. var.*pohliana* Benth., *Collaea scarlatina* Mart.ex Benth., *Galactia scarlatina* (Mart.ex Benth.) Taub. var. *brevibracteolata*Hassl., *Galactia scarlatina* (Mart. ex

Benth.) Taub.

Enredadera. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, PAI).

Canavalia DC.**Canavalia bonariensis** Lindl.Sin.: *Canavalia cryptodon* Meisn.,*Canavalia monodon* E. Mey., *Canavalia**paranensis* Hook. & Arn., *Canavalia**tortilis* Frapp. ex Cordem.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA). URY(ART, CAS, CLA, COL, MON, RNO, SJO, TAC).

Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth.Sin.: *Canavalia anomala* Piper,*Canavalia campylocarpa* Piper, *Canavalia**caribaea* Urb., *Canavalia fendleri* Piper,*Canavalia leptophylla* Piper, *Canavalia**mexicana* Piper, *Canavalia panamensis*Piper, *Canavalia paraguayensis* Piper,*Canavalia prolifera* Piper ex Ricker

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, CON).

Canavalia ensiformis (L.) DC.Sin.: *Canavalia ensiformis* (Jacq.) DC.var. *truncata* Ricker *Canavalia ensiformis*(L.) DC. var. *albida* DC., *Canavalia**gladiata* (Jacq.) DC. f. *leucocarpa* Taub.ex Glaz., nom. nud., *Canavalia gladiata*(Jacq.) DC. var. *leucosperma* Voigt,*Dolichos acinaciformis* Jacq., *Dolichos**ensiformis* L., *Dolichos pugioniformis*Raeusch., *Malochia ensiformis* (L.) Savi

Liana. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto).

URY(MON).

Canavalia mattogrossensis (Barb.

Rodr.) Malme

Sin.: *Canavalia lasiocalyx* Kuntze,*Mucuna mattogrossensis* Barb. Rodr.,*Wenderothia mattogrossensis* (Barb.

Rodr.) Piper

Enredadera o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, COA, GUA, PAI, SPE).

Canavalia picta Mart. ex Benth.Sin.: *Canavalia lenta* Benth., *Wenderothia**lenta* (Benth.) Piper, *Wenderothia picta*

(Mart. ex Benth.) Piper

Enredadera o liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Canavalia piperi Killip & J.F. Macbr.

Liana. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Canavalia rosea (Sw.) DC.Sin.: *Canavalia apiculata* Piper,*Canavalia arenicola* Piper, *Canavalia**baueriana* Endl., *Canavalia emarginata*(Jacq.) G. Don, *Canavalia maritima*(Aubl.) Urb., nom. illeg., *Canavalia**maritima* Thouars, *Canavalia miniata*(Kunth) DC., *Canavalia obtusifolia* DC.var. *emarginatus* (Jacq.) DC., *Canavalia**obtusifolia* DC. var. *insularis* Ridl.,*Canavalia obtusifolia* DC., *Dolichos**emarginatus* Jacq., *Dolichos littoralis*Vell., *Dolichos maritimus* Aubl., *Dolichos**miniatus* Kunth, *Dolichos roseus* Sw.

Enredadera o liana. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cascaronia Griseb.**Cascaronia astragalina** Griseb.

Árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Cassia L.**Cassia fastuosa** Willd. ex Benth.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. exDC. var. **ferruginea**Sin.: *Bactrylibium ferrugineum* Schrad.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Cassia ferruginea (Schrad.) DC. var.**velloziana** H.S. Irwin & Barneby

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Cassia grandis L.f.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Cassia leptophylla Vogel

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cenostigma Tul., emended E.

Gagnon & G.P. Lewis

Cenostigma macrophyllum Tul.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cenostigma marginatum (Tul.) E.

Gagnon & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia marginata* Tul.,*Cenostigma sclerophyllum* Malme

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CHO, CON).

Cenostigma pluviosum (DC.) E.

Gagnon & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia floribunda* Tul.,*Caesalpinia pluviosa* DC., *Caesalpinia**taubertiana* S. Moore, *Poincianella**pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Árbol. Nativa. 400-1300 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAN, CON).

Centrolobium Mart. ex Benth.**Centrolobium microchaete** (Mart. ex Benth.) H.C. Lima

Sin.: *Centrolobium robustum* (Vell.) Mart. ex Benth. var. *microchaete* Mart. ex Benth.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Centrosema (DC.) Benth.**Centrosema angustifolium** (Kunth) Benth.

Sin.: *Bradburya angustifolia* (Kunth) Kuntze, *Centrosema brasilianum* (L.)

Benth. var. *angustifolium* (Benth.)

Amshoff, comb. illeg., *Clitoria angustifolia* Kunth

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Centrosema arenarium Benth.

Sin.: *Bradburya arenaria* (Benth.)

Kuntze, *Centrosema brachypodum* Benth., *Centrosema rigidulum* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Centrosema bracteosum Benth.

Sin.: *Bradburya bracteosa* (Benth.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Centrosema brasilianum (L.) Benth.

Sin.: *Bradburya brasiliana* (L.) Kuntze, *Bradburya insulana* (Vell.) Kuntze, *Centrosema insulanum* (Vell.) Steud., *Clitoria brasiliana* L., *Clitoria formosa* Kunth, *Clitoria insulana* Arráb., hom. illeg., *Clitoria insulana* Vell., *Vexillaria brasiliana* (L.) Hoffmanns.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, SPE).

Centrosema kermesi Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR).

Centrosema pascuorum Mart. ex Benth.

Sin.: *Bradburya pascuorum* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Centrosema sinuatum* (Desv.) Benth., *Clitoria sinuata* Desv., *Bradburya virginiana* (L.) Kuntze f. *pascuorum* (Mart. ex Benth.) Lindm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth.

Sin.: *Bradburya plumieri* (Turpin ex Pers.) Kuntze, *Clitoria plumieri* Turpin ex Pers., *Cruminium giganteum* Desv.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, CEN, COA, GUA, PAI).

Centrosema pubescens Benth.

Sin.: *Centrosema molle* Mart. ex Benth.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Centrosema sagittatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegees ex L. Riley

Sin.: *Bradburya dubia* (Kunth) Kuntze, *Bradburya sagittata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rose, *Centrosema dubium* (Kunth) Benth., *Centrosema hastatum* Benth., *Centrosema sagittatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Malme, nom. illeg., *Glycine sagittata* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Rudolphia dubia* Kunth

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, GUA, ITA, PAI).

Centrosema variifolium Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SAL).

Centrosema virginianum (L.) Benth.

Sin.: *Bradburya biflora* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Bradburya conjugata* (Lehm.) Kuntze, *Bradburya decumbens* (Mart.) Kuntze, *Bradburya virginiana* (L.) Kuntze, *Centrosema biflorum* Mart. ex Benth., *Centrosema decumbens* Mart. ex Benth., *Centrosema micranthum* Steud., *Centrosema scabriusculum* Hassk., *Centrosema virginianum* (L.) Benth. var. *angustifolium* Griseb., *Clitoria alabamensis* Bertol., *Clitoria amoena* Roth, *Clitoria gemina* Vell., *Clitoria virginiana* L., *Cruminium virginianum* (L.) Britton, *Glycine pugiunculus* Desv., *Steganotropis conjugata* Lehm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CEN, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, MAL, MON, RIV, ROC, SOR, TAC).

Chamaecrista Moench**Chamaecrista absus** (L.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia absus* L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

Chamaecrista amambaya (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia amambaya* H.S. Irwin & Barneby, *Cassia cathartica* Mart. subsp.

floribunda Hassl.

Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.

Países: PRY(AMA).

Chamaecrista arachiphylla Barneby

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY).

Chamaecrista cardiostegia H.S. Irwin & Barneby

Subarbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Chamaecrista calycioides (DC. ex Collad.) Greene

Sin.: *Cassia aristellata* (Pennell) Cory ex Cory & Parks, *Cassia calycioides* DC. ex Collad., *Cassia pedersenii* Burkart, *Chamaecrista aristellata* Pennell

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, SDE). PRY(CAU, CON).

Chamaecrista campestris H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia camporum* Benth., *Cassia hispidula* Vahl var. *oblongifolia* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 400-800 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Chamaecrista cathartica (Mart.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia cathartica* Mart.

Hierba o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Chamaecrista cordistipula (Mart.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia cordistipula* Mart., *Cassia psammophila* Benth., *Cassia schlimii* Benth., *Chamaecrista schlimii* (Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: PRY(COA, PAI).

Chamaecrista crommyotricha

(Harms) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia crommyotricha* Harms

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Chamaecrista desvauxii (Collad.)Killip var. **brevipes** (Benth.) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia brevipes* DC. ex Collad., *Cassia desvauxii* (Collad.) Killip var. *stipulacea* Pilg., *Cassia desvauxii* Collad. var. *brevipes* Benth., *Cassia tetrphylla* Martyn var. *brevipes* (Benth.) H.S. Irwin, *Chamaecrista brevipes* (DC. ex Collad.) Greene

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Chamaecrista desvauxii (Collad.)Killip var. **desvauxii**Sin.: *Cassia adscendens* Mart. ex Colla, *Cassia desvauxii* Collad., *Cassia langsdorffii* Kunth ex Vogel var. *longipedicellata* H.S. Irwin, *Cassia tetrphylla* Martyn var. *littoralis* H.S. Irwin, *Cassia uniflora* Mill. var. *glaucescens* Vogel

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chamaecrista desvauxii (Collad.)Killip var. **latistipula** (Benth.) G.P. LewisSin.: *Cassia arlindo-andradei* Hoehne var. *major* Hoehne, *Cassia arlindo-andradei* Hoehne, *Cassia latistipulata* Benth., *Cassia latistipulata* Benth. var. *glauca* Hassl., *Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip var. *glauca* (Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-1600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA).

Chamaecrista desvauxii (Collad.)Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia barlettii* Standl., *Cassia desvauxii* Collad. var. *mollissima* Benth., *Cassia lanceolata* Pers., *Cassia madrensis* (Rose ex Britton & Rose) Irwin, *Cassia persoonii* Collad., *Cassia pulchra* Kunth, *Cassia tecta* Vogel, *Cassia tetrphylla* Martyn var. *colombiana* H.S. Irwin, *Cassia tetrphylla* Martyn var. *longifolia* Amshoff, *Cassia tetrphylla* Martyn var. *mollissima* (Benth.) H.S. Irwin, *Chamaecrista madrensis* Rose ex Britton& Rose, *Chamaecrista persoonii* (Collad.)Greene, *Chamaecrista pulchra* (Kunth)

Britton & Killip

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

PRY(APY, AMA, CAU, COA, SPE).

Chamaecrista desvauxii (Collad.)Killip var. **piribebuiensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia piribebuiensis* Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 200-400 m.

Países: PRY(CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Chamaecrista flexuosa (L.) GreeneSin.: *Cassia arenaria* Kunth, *Cassia flexuosa* L. var. *euyabensis* Pilg., *Cassia flexuosa* L. var. *pubescens* Benth., *Cassia flexuosa* L., *Cassia picachensis* Brandege, *Chamaecrista amplistipulata* Rose

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PAI). URY(COL, RNO, SAO).

Chamaecrista glandulosa (L.) Greenevar. **brasiliensis** (Vogel) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia chamaecrista* L. var. *brasiliensis* Vogel

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Chamaecrista glandulosa (L.) Greenevar. **glandulosa**Sin.: *Cassia glandulosa* L.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Chamaecrista gonoclada (Benth.)

H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia gonoclada* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR).

PRY(AMA).

Chamaecrista hassleri (H.S. Irwin & Barneby)H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia hassleri* H.S. Irwin & Barneby, *Cassia trachycarpa* Vogel subsp. *macrophylla* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Chamaecrista incana (Vogel) H.S.

Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia incana* Vogel

Arbusto o subarbusto. Nativa. 1000-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Chamaecrista langsdorffii (Kunth ex Vogel) Britton ex PittierSin.: *Cassia borbonioides* Vogel, *Cassia chartacea* H.S. Irwin, *Cassia langsdorffii* Kunth ex Vogel, *Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip var. *langsdorffii* (Kunth ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, PAI).

Chamaecrista nictitans (L.) Moench subsp. **brachypoda** (Benth.) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia brachypoda* Benth.

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(COA, PHA).

Chamaecrista nictitans (L.) Moench subsp. **disadena** (Steud.) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia disadena* Steud., *Chamaecrista stenocarpa* (Vogel) Standl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA).

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & BarnebySin.: *Cassia broughtonii* Fawc. & Rendle, *Cassia leptadenia* Greenm. var. *jaliscensis* Greenm., *Cassia nicoyana* (Britton ex Britton & Rose) Standl., *Cassia riparia* Kunth, *Cassia wilsonii* (Britton & Rose) Standl., *Chamaecrista leptadenia* (Greenm.) Cockerell var. *jaliscensis* Greenm. *Chamaecrista longicona* Britton & Rose, *Chamaecrista nicoyana* Britton ex Britton & Rose, *Chamaecrista riparia* (Kunth) Britton, *Chamaecrista wilsonii* Britton & Rose

Hierba. Nativa.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.)

H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia browniana* (Britton & Rose) Philipson, nom. illeg., *Cassia chamaecrista* L. var. *hypnotica* (Vell.) N.F. Mattos, *Cassia flavicomma* Humb., Bonpl. & Kunth var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Cassia gemina* Vell., *Cassia hypnotica* Vell., *Cassia pennelliana* Amshoff, *Cassia simplex* (Standl.) Standl., nom. nud., *Chamaecrista browniana* Britton & Rose, *Chamaecrista simplex* Standl., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAA, CAN, COA).

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi

Sin.: *Cassia biglandulosa* Bertol., *Cassia patellaria* DC. ex Collad., *Cassia patellaria* DC. ex Collad. var. *longifolia* Benth., *Cassia patellaria* DC. ex Collad. var. *ramosa* Vogel, *Cassia villosissima* (Britton & Rose) Lundell, *Chamaecrista patellaria* (DC. ex Collad.) Greene, *Chamaecrista villosissima* Britton & Rose

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, ÑEE).

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia comayaguana* (Britton & Rose) Lundell, *Cassia erecta* Willd. ex Steud., *Cassia fenixensis* (Britton & Rose) Lundell, *Cassia mayana* Lundell, *Cassia propinqua* Kunth, *Cassia riparia* Kunth var. *pilosa* Benth., *Cassia stenocarpa* Vogel var. *stenocarpoides* (Britton) Schery, *Cassia stenocarpoides* (Britton) Lundell, *Chamaecrista comayaguana* Britton & Rose, *Chamaecrista konzattii* Britton & Rose, *Chamaecrista riparia* (Kunth) Britton var. *pilosa* Benth., *Chamaecrista salvadorensis* Britton, *Chamaecrista stenocarpoides* Britton, *Chamaecrista tonduzii* Britton & Rose

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(AMA).

Chamaecrista punctata (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia punctata* Vogel
Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **parvifoliola** (H.S. Irwin) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia langsdorffii* Kunth ex Vogel var. *parvifoliola* H.S. Irwin
Subarbusto. Nativa. 600-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **ramosa**

Sin.: *Cassia ramosa* Vogel
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chamaecrista repens (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia apaensis* Chodat & Hassl., *Cassia repens* Vogel

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, ITA, MIE). URY(ART, PAY, RIV, SAO).

Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia bauhiniifolia* Kunth, *Cassia bifoliola* Pers. ex R. Knuth, *Cassia filipes* Benth., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *bauhiniifolia* (Kunth) Benth., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *grandiflora* Benth., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *grandiflora* Micheli, nom. nud., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *longepedicellata* Chodat & Hassl., nom. nud., *Chamaecrista bauhiniifolia* (Kunth) Gleason

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene var. **rotundifolia**

Sin.: *Cassia bifoliolata* DC. ex Collad. var. *pentandra* (Raddi) Desv., *Cassia bifoliolata* DC. ex Collad. var. *rotundifolia* (Pers.) Desv., comb. illeg., *Cassia bifoliolata* DC. ex Collad., *Cassia fabaginifolia* Kunth, *Cassia monophylla* Vell., *Cassia pentandra* Raddi, *Cassia pentandria* Larrañaga, hom. illeg., *Cassia rotundifolia* Pers., *Cassia tenuivenosa* A.P.D. Jones, *Chamaecrista bifoliolata* (DC. ex Collad.) Greene

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA). URY(COL, PAY, RNO, TAC).

Chamaecrista serpens (L.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia serpens* L. var. *grandiflora* Benth., *Cassia tenella* Kunth, *Chamaecrista tenella* (Kunth) Pittier
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA). URY(RNO).

Chamaecrista serpens (L.) Greene var. **serpens**

Sin.: *Cassia flexuosa* Mill., hom. illeg., *Cassia prostrata* Kunth, *Cassia serpens* L., *Ophiocaulon serpens* (L.) Raf.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Chamaecrista trachycarpa (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia trachycarpa* Vogel
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chamaecrista venturiana H.S. Irwin & Barneby

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(COR, SAL, TUC). PRY(CAU, ITA).

Chamaecrista vestita (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia vestita* Vogel
Hierba o subarbusto. Nativa. 600-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Chamaecrista viscosa (Kunth) H.S. Irwin & Barneby var. **paraguayensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia barbata* Nees & Mart. var. *paraguayensis* Chodat & Hassl., *Cassia paraguayensis* Micheli, *Cassia viscosa* (Kunth) H.S. Irwin & Barneby var. *paraguayensis* (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(CAN, COA).

Chloroleucon Britton & Rose

Chloroleucon chacoense (Burkart) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Pithecellobium chacoense* Burkart
Arbusto o arbolito. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

Chloroleucon foliolosum (Benth.) G.P. Lewis

Sin.: *Calliandra aristulata* Rizzini, *Calliandra grisebachiana* (Harms) Speg., *Pithecellobium foliolosum* Benth., *Pithecellobium grisebachianum* Harms, *Pithecellobium myriophyllum* Malme, hom. illeg., *Pithecellobium oligandrum* Rizzini
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Calliandra brachyandra* Speg., *Feuillea scalaris* (Griseb.) Kuntze, *Pithecellobium anajuliae* Rizzini, *Pithecellobium scalare* Griseb. f. *parvifolium* Chodat & Hassl., *Pithecellobium scalare* Griseb. var. *hirsutum* Chodat & Hassl., *Pithecellobium*

scalare Griseb., *Pithecellobium tenuiflorum* Benth., *Pithecellobium tortum* Mart. f. *scalare* (Griseb.) Hassl., *Pithecellobium tortum* Mart. var. *pubescens* Benth.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Cleobulia Mart. ex Benth.

Cleobulia multiflora Mart. ex Benth.

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Clitoria L.

Clitoria cordobensis Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica.
0-500 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, SFE).

Clitoria densiflora (Benth.) Benth.

Sin.: *Clitoria burkartii* Rizzini, *Clitoria densiflora* (Benth.) Benth. var. *mucronata* Hassl., *Neurocarpum densiflorum* Benth., *Ternatea densiflora* (Benth.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Clitoria epetiolata Burkart var.

angustissima Fantz
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Clitoria epetiolata Burkart var.

epetiolata
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

Clitoria epetiolata Burkart var.

latiuscula Burkart
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Clitoria fairchildiana R.A. Howard

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Clitoria falcata Lam. var. **aurantiaca**

(Benth.) Fantz
Sin.: *Clitoria glycinoides* DC. var. *aurantiaca* Benth.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Clitoria falcata Lam. var. **falcata**

Sin.: *Clitoria glycinoides* DC., *Clitoria rubiginosa* Juss. ex Pers., *Clitoria tetragona* Poir. ex DC., nom. nud., *Martia physodes* Leandro, *Martiusia physalodes* Schult., *Neurocarpum falcatum* (Lam.) DC., *Ternatea rubiginosa* (Juss. ex Pers.) Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, SPE).

Clitoria guianensis (Aubl.) Benth.

Sin.: *Clitoria guayanensis* Benth., *Clitoria guianensis* (Aubl.) Standl., nom. illeg., *Crotalaria guianensis* Aubl., *Ternatea guianensis* (Aubl.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Clitoria laurifolia Poir.

Arbusto o hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Clitoria nana Benth.

Sin.: *Ternatea nana* (Benth.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(RIV, TAC).

Clitoria rufescens (Benth.) Benth.

Sin.: *Neurocarpum rufescens* Benth.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cochliasanthus Trew

Cochliasanthus caracalla (L.) Trew

Sin.: *Caracalla pulcherrima* Tod., *Phaseolus bertonii* Franceschi ex Benth., *Phaseolus caracalla* L., *Phaseolus caracallensis* (St.-Hil.) Lag., *Phaseolus cochleatus* Vell., *Phaseolus longirostratus* Ducke, *Vigna caracalla* (L.) Verdc.
Enredadera. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(MON).

Collaea DC.

Collaea argentina Griseb.

Sin.: *Collaea formosa* Griseb., *Galactia argentina* (Griseb.) Kuntze, *Galactia formosa* (Griseb.) Stuck., *Galactia speciosa* (Loisel.) Britton f. *argentina* (Griseb.) Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC).

Collaea aschersoniana (Taub.)

Burkart
Sin.: *Galactia aschersoniana* Taub.
Arbusto. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(PAR).

Collaea paraguariensis (Hassl.) R. García

Sin.: *Galactia speciosa* (Loisel.) Britton f. *paraguariensis* Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA, CAU).

Collaea riparia Abruzzi de Oliveira

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Collaea speciosa (Loisel.) DC.

Sin.: *Collaea velutina* Benth., *Cytisus speciosus* Loisel., *Galactia speciosa* (Loisel.) Britton
Subarbusto. Endémica. 1000-3400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Collaea stenophylla (Hook. & Arn.) Benth.

Sin.: *Collaea virgata* Benth., *Galactia hassleriana* Chodat, *Galactia stenophylla* Hook. & Arn., *Galactia stenophylla* Hook. & Arn. var. *hassleriana* (Chodat) Hassl., *Galactia stenophylla* Hook. & Arn. var. *virgata* (Benth.) Hassl., *Galactia virgata* (Benth.) Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, SPE). URY(CLA, COL, MON, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).

Cologania Kunth

Cologania broussonetii (Balb.) DC.

Sin.: *Amphicarpaea ovalifolia* (Kunth) Seckt, *Amphicarpaea pulchella* (Kunth) Taub., *Clitoria broussonetii* Balb., *Cologania affinis* M. Martens & Galeotti, *Cologania australis* Griseb., *Cologania congesta* Rose, *Cologania glabrior* Rose, *Cologania jaliscana* S. Watson, *Cologania lozani* Rose, *Cologania ovalifolia* Kunth, *Cologania pulchella* Kunth, *Cologania rufescens* Rose, *Cologania tenuis* Rose, *Galactia lorentzii* Griseb.
Subarbusto. Nativa. 1500-3400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Colutea L.**Colutea arborescens** L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(LPA).

Condylostylis Piper**Condylostylis candida** (Vell.) A. Delgado

Sin.: *Phaseolus amplus* Benth., *Phaseolus appendiculatus* Benth., *Phaseolus candidus* Vell. f. *appendiculatus* (Benth.) Hassl., *Phaseolus candidus* Vell. f. *obliquaefolius* (Benth.) Hassl., *Phaseolus candidus* Vell. f. *sublobatus* (Micheli) Hassl., *Phaseolus candidus* Vell. var. *genuinus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus candidus* Vell. var. *membranaceus* (Benth.) Hassl., *Phaseolus candidus* Vell., *Phaseolus maritimus* Salzm., nom. nud., *Phaseolus membranaceus* Benth., *Phaseolus obliquaefolius* Mart. ex Benth., *Vigna candida* (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, PAI). URY(SAO).

Copaifera L.**Copaifera laevis** Dwyer

Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Copaifera langsdorffii Desf. var.**glabra** (Vogel) Benth.

Sin.: *Copaifera glabra* Vogel
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (PAR, RGS). PRY(AMA, PAI).

Copaifera langsdorffii Desf. var.**grandifolia** Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA).

Copaifera langsdorffii Desf. var. **laxa**

(Hayne) Benth.

Sin.: *Copaifera langsdorffii* Desf. var. *rupestris* Hassl., *Copaifera laxa* Hayne
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, COA).

Copaifera langsdorffii Desf. var. **langsdorffii**

Sin.: *Copaiba langsdorffii* (Desf.) Kuntze, *Copaifera nitida* Mart. ex Hayne, *Copaifera sellowii* Hayne

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Copaifera trapezifolia Hayne

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Coronilla L.**Coronilla varia** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, SFE).

Coursetia DC.**Coursetia brachyrhachis** Harms

Sin.: *Tephrosia craccoides* Lillo
Arbusto o árbol. Nativa. 500-2600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Coursetia hassleri Chodat

Sin.: *Benthamaantha caribaea* (Jacq.) Kuntze var. *dubia* Kuntze, *Benthamaantha glabrescens* (Benth.) Burkart, comb. superfl., *Coursetia guaranitica* Chodat, *Cracca corumbae* Hoehne
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN).

Cratylia Mart. ex Benth.**Cratylia intermedia** (Hassl.) L.P.

Queiroz & R. Monteiro
Sin.: *Cratylia floribunda* Benth. var. *intermedia* Hassl., *Cratylia intermedia* (Hassl.) L.P. Queiroz & Coradin, comb. illeg.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Crotalaria L.**Crotalaria balansae** Micheli

Sin.: *Crotalaria pohliana* Benth. var. *balansae* (Micheli) Chodat & Hassl., *Crotalaria stipularia* Desv. var. *balansae* (Micheli) Hassl., *Crotalaria velutina* Benth. var. *sellowii* Taub.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

Crotalaria breviflora DC.

Sin.: *Crotalaria breviflora* DC. var. *pohliana* (Benth.) Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria breviflora* DC. var. *riedellii* Taub., *Crotalaria divergens* Benth., *Crotalaria pohliana* Benth., *Crotalaria regnellii* Benth.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Crotalaria chaco-serranensis H.

Bach & Fortunato
Sin.: *Crotalaria incana* L. var. *australis* Griseb.
Subarbusto. Nativa. 500-900 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Crotalaria grahamiana Wight & Arn.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(IPA).

Crotalaria hilariana Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Crotalaria incana L.

Sin.: *Chrysocalyx schimperii* Hochst. ex A. Rich., *Crotalaria affinis* DC., *Crotalaria criocaula* S. Schauer, *Crotalaria cubensis* DC., *Crotalaria diffusa* Vell., hom. illeg., *Crotalaria eriocaula* Schauer, *Crotalaria glabrescens* Andersson, hom. illeg., *Crotalaria herbacea* Schweigg., *Crotalaria hirta* Lag., hom. illeg., *Crotalaria incana* L. f. *microphylla* Chodat & Hassl., *Crotalaria megapotamica* Burkart, *Crotalaria montana* A. Rich., *Crotalaria picensis* Phil., *Crotalaria pubescens* Moench, *Crotalaria purpurascens* Lam., *Crotalaria radiata* Merr., *Crotalaria setifera* DC., *Lupinus rotundifolius* Sessé & Moç.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ANT). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(SAO).

Crotalaria juncea L.

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

Crotalaria lanceolata E. Mey.

Sin.: *Crotalaria mossambicensis* Klotzsch
Subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Crotalaria martiana Benth. subsp. **mohlenbrockii** (Windler & S.G. Skinner) Planchuelo

Sin.: *Crotalaria bellii* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria foliosa* Benth., hom. illeg., *Crotalaria hatschbachii* Windler & S.G. Skinner var. *sericea* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria hatschbachii* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria mohlenbrockii* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria paraguayensis* Windler & S.G. Skinner

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CON, COA, GUA, PAI).

Crotalaria maypurensis Kunth

Sin.: *Crotalaria depauperata* Mart. ex Benth., *Crotalaria leptophylla* Benth., *Crotalaria maypurensis* Kunth var. *depauperata* (Benth.) Windler & S.G. Skinner

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3400 m.
Países: ARG(COS, JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON).

Crotalaria micans Link

Sin.: *Crotalaria anagyroides* Kunth, *Crotalaria brachystachys* Benth., *Crotalaria dombeyana* DC., *Crotalaria stipulata* Vell., *Crotalaria triphylla* Vell.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, ÑEE, SPE). URY(COL, SOR).

Crotalaria ochroleuca G. Don

Subarbusto. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Crotalaria pallida Aiton

Sin.: *Crotalaria mucronata* Desv., *Crotalaria striata* DC.

Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).

Crotalaria pilosa Mill.

Sin.: *Crotalaria genistella* DC., nom. illeg., *Crotalaria genistella* Kunth, *Crotalaria hexaptera* Schrank, *Crotalaria pilosa* Mill. var. *skutchii* Senn, *Crotalaria pterocaula* Desv. var. *genistella* (Kunth) Benth., *Crotalaria pterocaula* Desv.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Crotalaria pumila Ortega

Sin.: *Crotalaria lupulina* Kunth
Hierba. Nativa. 400-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Crotalaria retusa L.

Subarbusto. Introducida. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Crotalaria sagittalis L.

Sin.: *Crotalaria belizensis* Lundell, *Crotalaria fruticosa* Mill., *Crotalaria lunulata* Raf., *Crotalaria matthewsana* Benth., *Crotalaria parviflora* Roth, *Crotalaria pilosa* Raf., hom. illeg., *Crotalaria platycarpa* Link, *Crotalaria pringlei* A. Gray, *Crotalaria sagittalis* L. var. *blumeriana* H.Senn, *Crotalaria sagittalis* L. var. *fruticosa* (Mill.) Fawc. & Rendle, *Crotalaria sagittalis* L. var. *oblonga* Michx., *Crotalaria sagittatas* Hill, *Crotalaria tuerckheimii* Senn

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU).

Crotalaria spectabilis Roth

Hierba o arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Crotalaria stipularia Desv.

Sin.: *Crotalaria espadilla* Kunth, *Crotalaria sagittalis* Vell., hom. illeg., *Crotalaria serpyllifolia* Lamb. ex DC., nom. nud., *Crotalaria stipularia* Desv. f. *elliptica* Chodat & Hassl., *Crotalaria stipularia* Desv. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(CAN, CEN).

Crotalaria subdecurrens Mart. ex Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Crotalaria trichotoma Bojer

Subarbusto. Introducida. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Crotalaria tweediana Benth.

Hierba o arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Crotalaria vespertilio Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Crotalaria virgulata Klotzsch

Sin.: *Crotalaria grantiana* Harv., *Crotalaria shamvaensis* Verd., *Crotalaria virgulata* Klotzsch subsp. *grantiana* (Harv.) Polhill

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Crotalaria vitellina Ker Gawl.

Sin.: *Crotalaria brasila* Schrank, *Crotalaria cajanifolia* Kunth, *Crotalaria guatemalensis* Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyclolobium Benth.

Cyclolobium brasiliense Benth.

Sin.: *Cyclolobium blanchetianum* Tul., *Cyclolobium claussenii* Benth.
Árbol. Nativa. 100-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CON, COA, GUA, PAI).

Cynometra L.

Cynometra bauhiniifolia Benth. var. **bauhiniifolia**

Sin.: *Cynometra bauhiniifolia* Benth. var. *grandiflora* Dwyer, *Cynometra microflora* R.S. Cowan

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, PAI).

Cynometra bauhiniifolia Benth. var. **meridiana** Dwyer

Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).

Cytisus Desf.

Cytisus scoparius (L.) Link

Sin.: *Sarothamnus scoparius* (L.) Koch, *Spartium scoparium* L.
Arbusto. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Cytisus striatus (Hill) Rothm.

Sin.: *Genista striata* Hill
Arbusto. Introducida. 0-1000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Dahlstedtia Malme

Dahlstedtia burkartii M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(MIS).

Dahlstedtia floribunda (Vogel) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
Sin.: *Lonchocarpus subglaucescens* Mart. ex Benth., *Sphinctolobium floribundum* Vogel
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dahlstedtia lewisiana M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
Árbol. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(SCA).

Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
Sin.: *Derris muehlbergianus* (Hassl.) N.F. Mattos, *Lonchocarpus muehlbergianus* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, SPE).

Dahlstedtia pentaphylla (Taub.) Burkart
Sin.: *Camptosema pentaphyllum* Taub.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dalbergia L. f.

Dalbergia brasiliensis Vogel
Sin.: *Amerimnon brasiliense* (Vogel) Kuntze
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Sin.: *Amerimnon ecastaphyllum* (L.) Standl., *Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub. f. *obtusifoliota* Hoehne
Ecastaphyllum brownei Pers., *Ecastaphyllum ecastaphyllum* (L.) Britton, nom. illeg., *Ecastaphyllum molle* Miq., *Hedysarum ecastaphyllum* L., *Pterocarpus ecastaphyllum* (L.) L.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dalbergia ernest-ulei Hoehne
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Dalbergia foliolosa Benth.
Sin.: *Miscolobium polyphyllum* Benth.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton var. **frutescens**
Sin.: *Dalbergia variabilis* Vogel, *Pterocarpus frutescens* Vell., *Triptolemea glabra* Benth., *Triptolemea latifolia* Benth., *Triptolemea montana* Mart. ex Benth., *Triptolemea ovata* Mart. ex Benth., *Triptolemea pauciflora* Mart. ex Benth., *Triptolemea platycarpa* Benth.
Liana. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART).

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton var. **tomentosa** (Vogel) Benth.
Sin.: *Dalbergia tomentosa* Vogel
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dalbergia lateriflora Benth.
Sin.: *Amerimnon lateriflorum* (Benth.) Kuntze, *Dalbergia rosei* Hoehne
Arbusto o liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dalbergia miscolobium Benth.
Sin.: *Dalbergia violacea* (Vogel) Malme, nom. illeg., *Miscolobium nigrum* Mart., nom. nud., *Miscolobium violaceum* Vogel
Arbusto. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.
Sin.: *Pterocarpus niger* Vell.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dalea L., nom. cons.

Dalea azurea (Phil.) Reiche
Sin.: *Lotodes azureum* (Phil.) Kuntze, *Parosela azurea* (Phil.) J.F. Macbr., *Psoralea azurea* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT).

Dalea boliviana Britton
Sin.: *Dalea boliviana* Britton var. *herrerae* (J.F. Macbr.) J.F. Macbr., *Dalea calliantha* Ulbr., *Dalea hofstenii* R.E. Fr., *Dalea retusifolia* Harms ex Kuntze, *Parosela boliviana* (Britton) J.F. Macbr. var. *herrerae* J.F. Macbr., *Parosela*

boliviana (Britton) J.F. Macbr., *Parosela calliantha* (Ulbr.) J.F. Macbr., *Parosela hofstenii* (R.E. Fr.) J.F. Macbr.
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Dalea elegans Gillies ex Hook. & Arn. var. **elegans**
Sin.: *Dalea stenophylla* Griseb., *Parosela elegans* (Gillies ex Hook. & Arn.) J.F. Macbr.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU).

Dalea elegans Gillies ex Hook. & Arn. var. **onobrychioides** (Griseb.) Barneby
Sin.: *Dalea onobrychioides* Griseb., *Dalea eosina* (J.F. Macbr.) J.F. Macbr., *Parosela eosina* J.F. Macbr., *Parosela onobrychioides* (Griseb.) J.F. Macbr.
Hierba. Introducida. 1800-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Dalea leporina (Aiton) Bullock
Sin.: *Dalea alba* Michx. ex Roem., *Dalea alopecuroides* Willd., *Dalea annua* Kuntze var. *ebracteata* Kuntze, *Dalea bigelovii* (Rydb.) B.L. Turner, *Dalea lagopus* (Cav.) Willd., *Dalea leporina* (Aiton) Bullock var. *alba* (Michx. ex Roem.) H.D. Harr., *Dalea leporina* (Aiton) Kearney & Peebles, comb. superfl., *Dalea linnaei* Michx., *Dalea oreophila* (Cory) Cory, *Parosela leporina* (Aiton) Rydb., *Psoralea leporina* Aiton
Hierba. Nativa. 2200-2900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Dalea moquehuana J.F. Macbr.
Hierba. Nativa. 1900-2700 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Dalea pennellii (J.F. Macbr.) J.F. Macbr. var. **chilensis** Barneby
Subarbusto. Endémica. 2500-3300 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Denisophytum R. Vig., emend. E. Gagnon & G.P. Lewis

Denisophytum stuckertii (Hassl.) E. Gagnon & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia herzogii* Harms, *Caesalpinia stuckerti* Hassl., *Caesalpinia stuckerti* Hassl. var. *robusta* Hassl.
Arbusto. Endémica. 200-700 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, NAS).

Desmanthus Willd.**Desmanthus acuminatus** Benth.

Sin.: *Acuan acuminatum* (Benth.) Kuntze, *Desmanthus depressus* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *acuminatus* (Benth.) Burkart, *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *acuminatus* (Benth.) Isely
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, SAL, SDE, SFE). PRY(MIE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TYT).

Desmanthus hexapetalus (Micheli)

J.F. Macbr.
Sin.: *Desmanthus micheli* Hassl., *Desmanthus micheli* Hassl. f. *procumbens* Hassl., *Desmanthus micheli* Hassl. var. *hexapetala* (Micheli) Hassl., nom. superfl., *Neptunia hexapetala* Micheli
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(CAU).

Desmanthus paspalaceus (Lindm.)

Burkart
Sin.: *Acuan virgatum* (L.) Medik. f. *paspalacea* Lindm., *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *santaniensis* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(COL, FLA).

Desmanthus pernambucanus (L.) Thell.

Sin.: *Acuan bahamense* Britton & Rose, *Desmanthus diffusus* Willd., *Desmanthus strictus* Bertol., *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *strictus* (Bertol.) Griseb., *Mimosa pernambucana* L.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). URY(MON).

Desmanthus tathuyensis Hoehne var.

brevipes (B.L. Turner) Luckow
Sin.: *Desmanthus chacoensis* Burkart, *Desmanthus brevipes* B.L. Turner
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SDE, SFE, TUC). PRY(PHA).

Desmanthus tathuyensis Hoehne var. **tathuyensis**

Sin.: *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. f. *roseiflora* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, MIE, PAI). URY(LAV, MAL, MON, RIV, SJO).

Desmanthus virgatus (L.) Willd.

Sin.: *Acacia angustisiliqua* (Lam.) Desf., *Acacia virgata* (L.) Gaertn., *Acuan depressum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze, *Acuan tracyi* Britton & Rose, *Desmanthus depressus* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Desmanthus pratorum* Macfad., *Desmanthus tenellus* DC., *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *depressus* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) B.L. Turner, *Mimosa angustisiliqua* Lam., nom. superfl., *Mimosa depressa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir., *Mimosa virgata* L.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP). PRY(APY, BOQ, CHO, GUA, ÑEE, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Desmodium Desv., nom. cons.**Desmodium adscendens** (Sw.) DC.

Sin.: *Desmodium adscendens* (Sw.) DC. var. *caeruleum* (Lindl.) DC., *Desmodium arinense* Hoehne, *Desmodium caeruleum* (Lindl.) G. Don, *Desmodium caespitosum* (Poir.) DC., *Desmodium obovatum* Vogel, *Desmodium vogelii* Steud., *Hedysarum adscendens* Sw. var. *caeruleum* Lindl., *Hedysarum adscendens* Sw., *Hedysarum caespitosum* Poir., *Meibomia adscendens* (Sw.) Kuntze var. *obovata* (Vogel) Kuntze, *Meibomia adscendens* (Sw.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Desmodium affine Schltld.

Sin.: *Desmodium albiflorum* Salzm. ex Benth., *Desmodium albiflorum* Salzm. ex Benth. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Meibomia affinis* (Schltld.) Kuntze, *Meibomia albiflora* (Salzm.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CEN, GUA, PAI). URY(ART, CAS, PAY, RIV, TAC, TYT).

Desmodium album (Schindl.) J.F. Macbr.

Sin.: *Meibomia alba* Schindl.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR). BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

Desmodium arechavaletae Burkart

Sin.: *Desmodium asperum* (Poir.) Desv. f. *lanata* Chodat & Hassl., *Desmodium asperum* (Poir.) Desv. f. *longipetiolata* Chodat & Hassl., *Desmodium ramosissimum* Arechav., nom. inval., *Meibomia ramosissima* (Arechav.) Schindl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, GUA, SPE). URY(CLA, PAY, RIV, TAC).

Desmodium barbatum (L.) Benth.

Sin.: *Desmodium coeruleo-violaceum* (G. Mey.) DC., *Desmodium villosum* (Cham. & Schltld.) Hemsl., nom. illeg., *Desmodium villosum* (Mill.) DC., *Hedysarum barbatum* L., *Hedysarum coeruleo-violaceum* G. Mey., *Hedysarum villosum* Mill., *Meibomia barbata* (L.) Kuntze, *Meibomia villosa* (Mill.) Kuntze, *Nicolsonia barbata* (L.) DC., *Nicolsonia villosa* Cham. & Schltld.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA).

Desmodium bridgesii (Schindl.)

Burkart
Sin.: *Desmodium longiarticulatum* (Rusby) Burkart, *Meibomia bridgesii* Schindl., *Meibomia longiarticulatum* Rusby
Arbusto. Nativa. 500-1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Desmodium burkartii L.C.P. Lima & Vanni

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS).

Desmodium cajanifolium (Kunth) DC.

Sin.: *Hedysarum cajanifolium* Kunth, *Meibomia cajanifolia* (Kunth) Kuntze
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Desmodium craspediferum Tozzi &

M. de L.A.A. de Oliveira
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Desmodium cuneatum Hook. & Arn.

Sin.: *Desmodium brevipes* Vogel, *Meibomia brevipes* (Vogel) Kuntze, *Meibomia cuneata* (Hook. & Arn.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, PAY, SAO).

Desmodium distortum (Aubl.) J.F. Macbr.

Sin.: *Desmodium asperatum* (Poir.) Desv., *Desmodium asperum* (Poir.) Desv., *Desmodium elatum* Kunth, *Desmodium hirsutum* M. Martens & Galeotti, *Desmodium pabulare* (Hoehne) Malme, *Desmodium rubiginosum* Benth., *Hedysarum asperum* Poir., *Hedysarum distortum* Aubl., *Meibomia aspera* (Poir.) Kuntze, *Meibomia distorta* (Aubl.) Schindl., *Meibomia pabularis* Hoehne
Hierba. Nativa. 100-300 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, CEN).

Desmodium glabrum (Mill.) DC.

Sin.: *Desmodium campestre* Brandegee, *Desmodium molle* (Vahl) DC., *Hedysarum glabrum* Mill., *Hedysarum molle* Vahl, *Meibomia glabra* (Mill.) Kuntze, *Meibomia mollis* (Vahl) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Desmodium guaraniticum (Chodat & Hassl.) Malme

Sin.: *Desmodium asperum* (Poir.) Desv. var. *guaraniticum* Chodat & Hassl., *Meibomia guaranítica* (Chodat & Hassl.) Schindl.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Desmodium hassleri (Schindl.) Burkart

Sin.: *Meibomia hassleri* Schindl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, MIE, PAI, SPE).

Desmodium incanum DC.

Sin.: *Desmodium canum* Schinz & Thell., *Desmodium frutescens* Schindl., *Desmodium incanum* DC. var. *supinum* (Sw.) Hook. & Arn., nom. illeg., *Desmodium incanum* f. *minor* Chodat & Hassl., *Desmodium supinum* (Sw.) DC., *Hedysarum canescens* Mill., hom. illeg., *Hedysarum canum* J.F. Gmel., nom. illeg., *Hedysarum frutescens* Jacq., nom. illeg., *Hedysarum incanum* Sw., hom. illeg., *Hedysarum racemosum* Aubl., *Hedysarum supinum* Sw., hom. illeg., *Meibomia adscendens* (Sw.) Kuntze var. *incana* (DC.) Kuntze, *Meibomia cana* S.F. Blake, nom. illeg., *Meibomia incana* (DC.) Vail, *Meibomia incana* (Sw.) Hoehne, nom. illeg., *Meibomia incana* (Sw.) O.F. Cook & G.N. Collins, nom. illeg., *Meibomia ovalis* Rusby, *Meibomia supina* (Sw.) Britton, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, ITA, MIE, NEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, MON, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).

Desmodium intermedium Burkart
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(CHA, FOR).

Desmodium leiocarpum (Spreng.) G. Don

Sin.: *Hedysarum leiocarpum* Spreng., *Meibomia leiocarpa* (Spreng.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA).

Desmodium membranifolium L.C.P.

Lima, Tozzi & L.P. Queiroz
Sin.: *Meibomia guaranítica* (Chodat & Hassl.) Schindl. var. *microcarpa* Schindl.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Desmodium microcarpum (Rusby)

L.C.P. Lima, Tozzi & L.P. Queiroz
Sin.: *Desmodium hickenianum* Burkart, *Desmodium hickenianum* Burkart var. *major* Burkart, *Desmodium pachyrrhizum* Vogel var. *latifolium* Micheli
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(AMA, COA, SPE). URY(COL).

Desmodium pachyrrhizum Vogel

Sin.: *Desmodium pachyrrhizum* Vogel f. *intermedium* Chodat & Hassl., *Meibomia pachyrrhiza* (Vogel) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CAN, SPE). URY(ART, MON, RIV, TAC).

Desmodium polygaloides Chodat & Hassl.

Sin.: *Desmodium dutrae* Malme, *Desmodium pachyrrhizum* Vogel var. *subsimplax* Benth., *Desmodium polygaloides* Chodat & Hassl. var. *dutrae* (Malme) Malme, *Desmodium subsimplax* (Benth.) Malme, *Meibomia polygaloides* (Chodat & Hassl.) Schindl., *Meibomia subsimplax* (Benth.) Schindl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, ITA, MIE). URY(RIV, TAC).

Desmodium procumbens (Mill.)

Hitchc.
Sin.: *Desmodium bigelovii* A. Gray, *Desmodium humile* (Schindl.) Burkart, *Desmodium lilloanum* (Schindl.) Burkart, *Desmodium neomexicanum* A. Gray var. *bigelovii* (A. Gray) S. Watson, *Desmodium neomexicanum* A. Gray, *Desmodium parvum* (Schindl.) Standl., *Desmodium spirale* (Sw.) DC. var. *bigelovii* (A. Gray) Rob. & Greenm., nom. illeg., *Desmodium spirale* (Sw.) DC., nom. illeg., *Hedysarum procumbens* Mill., *Hedysarum spirale* Sw., nom. superfl., *Meibomia bigelovii* (A. Gray) Kuntze, *Meibomia humilis* Schindl., *Meibomia lilloana* Schindl., *Meibomia neomexicana* (A. Gray) Kuntze, *Meibomia parva* Schindl., *Meibomia procumbens* (Mill.) Schindl., *Meibomia spiralis* (Sw.) Kuntze, nom. illeg.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, SDE, TUC). BRA(PAR).

Desmodium riedelii (Schindl.) Burkart

Sin.: *Meibomia riedelii* Schindl.
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Desmodium subsecundum Vogel

Sin.: *Desmodium discolor* Vogel, *Desmodium leiocarpum* (Spreng.) D. Don var. β Vogel, nom. inval., *Meibomia discolor* (Vogel) Kuntze, *Meibomia leiocarpa* (Spreng.) Kuntze var. *subsecunda* (Vogel) Schindl., *Meibomia subsecunda* (Vogel) Kuntze
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Desmodium subsericeum Malme

Sin.: *Meibomia malmei* Schindl., *Meibomia subsericea* (Malme) Schindl.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Desmodium tortuosum (Sw.) DC.

Sin.: *Desmodium purpureum* (Mill.) Fawc. & Rendle, hom. illeg., *Hedysarum purpureum* Mill., *Hedysarum tortuosum* Sw., *Meibomia purpurea* (Mill.) Vail ex Small, *Meibomia tortuosa* (Sw.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CON, ITA).

Desmodium triarticulatum Malme
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Desmodium triflorum (L.) DC.
Sin.: *Hedysarum triflorum* L., *Meibomia triflora* (L.) Kuntze
Subarbusto. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Desmodium uncinatum (Jacq.) DC.
Sin.: *Desmodium uncinatum* (Jacq.)
DC. var. *gracilis* Burkart, *Hedysarum uncinatum* Jacq., *Meibomia uncinata* (Jacq.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, COA, GUA). URY(CLA, COL, LAV, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Desmodium venosum Vogel
Sin.: *Meibomia venosa* (Vogel) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Dimorphandra Schott

Dimorphandra mollis Benth.
Árbol. Nativa. 500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Dioclea Kunth

Dioclea burkartii R.H. Maxwell
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APY).

Dioclea violacea Mart. ex Benth.
Sin.: *Dioclea paraguariensis* Hassl., *Dolichos altissimus* Vell., nom. illeg.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA, GUA).

Dioclea virgata (Rich.) Amshoff
Sin.: *Canavalia peruviana* Piper, *Dioclea lasiocarpa* Mart. ex Benth., *Dolichos virgatus* Rich., *Mucuna virgata* (Rich.) Desv.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Dioclea wilsonii Standl.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dipogon Liebm.

Dipogon lignosus (L.) Verdc.
Sin.: *Dolichos lignosus* L., *Verdcourtia lignosa* (L.) R. Wilczek
Arbusto. Introducida. 200-500 m.
Países: CHL(TAR).

Dipteryx Schreb.

Dipteryx alata Vogel
Sin.: *Coumarouna alata* (Vogel) Taub., *Cumaruna alata* (Vogel) Kuntze
Árbol o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Diptychandra Tul.

Diptychandra aurantiaca Tul.
Sin.: *Diptychandra epunctata* Tul.
subsp. *rojasii* Hassl., *Diptychandra glabra* Benth.
Árbol o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Discolobium Benth.

Discolobium junceum Micheli
Sin.: *Discolobium leptophyllum* Benth. var. *junceum* (Micheli) Hassl., *Discolobium leptophyllum* Benth. f. *glandiflora* Hassl., *Discolobium leptophyllum* Benth. f. *parviflora* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(MIE, PHA).

Discolobium psoraleaefolium Benth.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). URY(ART).

Discolobium pulchellum Benth.
Sin.: *Discolobium elongatum* Benth., *Discolobium pauciyugum* Harms ex Kuntze, *Discolobium pulchellum* Benth. var. *viscosissimum* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, MIE, ÑEE, PHA).

Dolichopsis Hassl.

Dolichopsis ligulata (Piper) A. Delgado
Sin.: *Phaseolus dolichicarpus* Burkart, *Phaseolus ligulatus* Piper
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA, SPE).

Dolichopsis paraguariensis (Benth.) Hassl.

Sin.: *Vigna paraguariensis* Benth.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CAA, ÑEE, PHA).

Enterolobium Mart.

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Sin.: *Acacia melalobiata* Rojas Acosta, *Calliandra pacara* Griseb., *Enterolobium glaucescens* Mart., *Feuillea pacara* (Griseb.) Kuntze, *Mimosa contortisiliqua* Vell.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(CLA, MON, PAY, RNO, ROC).

Enterolobium timbouva Mart.

Sin.: *Enterolobium guaraniticum* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Enterolobium tamboril* Mart., *Enterolobium timbouva* Mart. f. *minor* Hoehne, *Enterolobium timbouva* Mart. var. *canescens* Benth., *Pithecellobium guaraniticum* Chodat & Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, CON).

Eriosema (DC.) Rchb.

Eriosema boelckei Fortunato
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Eriosema campestre Benth. var. **campestre**

Sin.: *Eriosema lagoense* Micheli
Hierba o subarbusto. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, SPE).

Eriosema campestre Benth. var. **delicatula** Fortunato
Subarbusto. Nativa. 200-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS). PRY(CAU, CAN, COA, SPE).

Eriosema campestre Benth. var. **macrophyllum** (Grear) Fortunato
Sin.: *Eriosema crinitum* (Kunth) G. Don var. *macrophyllum* Grear
Subarbusto. Nativa. 800-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eriosema crinitum (Kunth) G. Don var. **crinitum**
Sin.: *Glycine crinita* Kunth, *Eriosema adumbratum* Pittier, *Eriosema barbata* Desv., *Eriosema conwayi* Rusby, *Eriosema pinetorum* Standl., *Rhynchosia crinita* (Kunth) DC.
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eriosema crinitum (Kunth) G. Don var. **discolor** Fortunato
Subarbusto. Nativa. 600-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eriosema crinitum (Kunth) G. Don var. **pulchellum** Benth.
Sin.: *Eriosema crinitum* (Kunth) G. Don var. *fusiformis* (Rusby) Grear, *Eriosema fusiformis* Rusby
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, COA, SPE).

Eriosema glabrum Mart. ex Benth.
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Eriosema hasslerianum Chodat
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

Eriosema heterophyllum Benth.
Hierba. Nativa. 600-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eriosema longiflorum Benth.
Arbusto, subarbusto o hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eriosema longifolium Benth.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).

Eriosema obovatum Benth.
Hierba. Nativa. 300-1700 m.
Países: BRA(PAR).

Eriosema platycarpon Micheli
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Eriosema rufum (Kunth) G. Don var. **macrostachyum** (DC.) G. Don
Sin.: *Eriosema campestre* Benth. f. *pilosa* Chodat & Hassl., *Eriosema campestre* Benth. f. *pubescens* Chodat & Hassl., *Eriosema campestre* Benth. var. *pubescens* (Chodat & Hassl.) Grear, *Eriosema rufum* (Kunth) G. Don var. *flexuosum* Kuntze, *Eriosema yerbalium* Chodat & Hassl. f. *longifolia* Chodat & Hassl., *Eriosema yerbalium* Chodat & Hassl. f. *puberulum* Chodat & Hassl., *Eriosema yerbalium* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Nativa. 200-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Eriosema rufum (Kunth) G. Don var. **rufum**
Sin.: *Glycine rufa* Kunth
Arbusto, subarbusto o hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eriosema simplicifolium (Kunth) G. Don
Sin.: *Eriosema lanceolatum* Benth., *Eriosema simplicifolium* (Kunth) G. Don var. *micranthum* Grear, *Glycine simplicifolia* Kunth, *Neurocarpum barbatum* Desv., *Rhynchosia simplicifolia* (Kunth) DC.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA). BRA(PAR). PRY(AMA).

Eriosema strictum Benth.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, GUA).

Eriosema tacuareboense Arechav.
Sin.: *Eriosema longifolium* Benth. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Eriosema longifolium* Benth. var. *pedunculatum* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 200-1100 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Eriosema violaceum (Aubl.) G. Don
Sin.: *Cytisus violaceus* Aubl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Errazurizia Phil.

Errazurizia multifoliolata (Clos) I.M. Johnst.
Sin.: *Dalea multifoliolata* (Clos) Reiche, *Errazurizia glandulifera* Phil., *Parosela multifoliolata* (Clos) J.F. Macbr., *Psoralea multifoliolata* Clos
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Erythrina L.

Erythrina crista-galli L. var. **crista-galli**

Sin.: *Coladendron crista-galli* (L.) Kuntze, *Erythrina fasciculata* Benth., *Erythrina laurifolia* Jacq., *Erythrina pulcherrima* Tod., *Erythrina speciosa* Tod., *Micropteryx crista-galli* (L.) Walp., *Micropteryx fasciculata* (Benth.) Walp., *Micropteryx laurifolia* (Jacq.) Walp.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, ITA, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, DUR, MON, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Erythrina crista-galli L. var. **leucochloa** Lombardo
Árbol. Endémica. 0-300 m.
Países: URY(TYT).

Erythrina crista-galli L. var. **longiflora** M.A. Zapater & E.C. Lozano
Árbol. Endémica. 200-1300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).

Erythrina falcata Benth.

Sin.: *Coraliodendron falcatum* (Benth.) Kuntze, *Erythrina crista-galli* L. var. *inermis* Speg., nom. nud., *Erythrina martii* Colla
Árbol. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Erythrina mulungu Mart.

Sin.: *Erythrina chacoensis* Speg., nom. nud., *Erythrina dominguezii* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAN, ÑEE).

Erythrina similis Krukoff

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

Erythrina speciosa Andrews

Sin.: *Coraliodendron reticulatum* (C. Presl) Kuntze, *Erythrina poianthes* Brot., *Erythrina poianthes* Brot. var. *subinermis* Lindl., *Erythrina reticulata* C. Presl
Arbolito. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Erythrostemon Klotzsch

Erythrostemon angulatus (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia angulata* (Hook. & Arn.) Baill., *Caesalpinia angulicaulis* Clos, *Sophora angulata* (Hook. & Arn.) Ravenna, *Zuccagnia angulata* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 0-1900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Erythrostemon argentinus (Burkart)

E. Gagnon & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia argentina* Burkart, *Caesalpinia coulterioides* Griseb., p.p.
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ).

Erythrostemon coluteifolius

(Griseb.) E. Gagnon & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia coluteifolia* Griseb.
Arbusto. Nativa. 200-1700 m.
Países: ARG(SAL, SDE, TUC).
PRY(APY, BOQ, NAS).

Erythrostemon coulterioides

(Griseb. emend. Burkart) E. Gagnon & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia coulterioides* Griseb. emend. Burkart, *Caesalpinia coulterioides* Griseb., p.p.
Arbusto. Nativa. 1400-2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Erythrostemon exilifolius (Griseb.)

E. Gagnon & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia exilifolia* Griseb.
Arbusto. Endémica. 1600-2000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Erythrostemon fimbriatus (Tul.) E.

Gagnon & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia bangii* Rusby, *Caesalpinia cromantha* Burkart, *Caesalpinia fimbriata* Tul.
Arbusto. Nativa. 1300-3200 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Erythrostemon gilliesii (Hook.) Klotzsch

var. **burkartiana** (Ruíz Leal) Roger
Sin.: *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr. var. *burkartiana* Ruíz Leal
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(MEN, SDE).

Erythrostemon gilliesii (Wall. ex Hook.) Klotzsch var. **gilliesii**

Sin.: *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) Benth., nom. illeg., *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) D. Dietr., *Poinciana gilliesii* Wall. ex Hook.
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). URY(COL, MON, PAY, SAO).

Exostyles Schott

Exostyles godoyensis Soares-Silva & Mansano
Árbol. Endémica. 400-600 m.
Países: BRA(PAR).

Galactia P. Browne

Galactia australis (Malme) Ceolin & Miotto
Sin.: *Galactia neesii* DC. var. *australis* Malme
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CLA, LAV, MAL, PAY, RIV, TAC, TYT).

Galactia benthamiana Micheli

Sin.: *Galactia decumbens* (Benth.) Hassl. var. *benthamiana* (Micheli) Hassl., *Galactia immarginata* Dusén
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, COA, GUA, PAI). URY(RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Galactia boavista (Vell.) Burkart

Sin.: *Collaea macrophylla* Benth., *Cytisus boavista* Vell., *Galactia macrophylla* (Benth.) Taub., *Galactia macrophylla* (Benth.) Taub. var. *ovalifolia* Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN).

Galactia burkartii Fortunato

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: PRY(AMA, CAA).

Galactia dimorphophylla Fortunato,

S. Sede & Luckow
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

Galactia dubia DC.

Sin.: *Galactia montana* Britton
Hierba o subarbusto. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Galactia eriosematoides Harms

Sin.: *Collaea tomentosa* Benth.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA). URY(RIV, TAC).

Galactia fiebrigiana Burkart var. **correntina** Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Galactia fiebrigiana Burkart var. **fiebrigiana**

Hierba o subarbusto. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Galactia fiebrigiana Burkart var. **sericophylla** Burkart

Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(SAL).

Galactia glaucescens Kunth

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, ITA).

Galactia glaucophylla Harms

Sin.: *Rhynchosia sericea* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 600-1400 m.
Países: ARG(COR, SDE, SFE, SLU).

Galactia gracillima Benth.

Sin.: *Galactia linearifolia* Hoehne
Hierba, subarbusto o enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(CLA, FLA, MON, PAY, TAC).

Galactia grewiaefolia (Benth.) Taub.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

Galactia latisiliqua Desv.

Sin.: *Galactia colombiana* Killip ex L.A. Bermúdez García, nom. nud., *Galactia flaviflora* (Griseb.) Micheli, *Galactia jussiaeana* Kunth var. *velutina* (Benth.) Griseb., *Galactia latisiliqua* Desv. var.

chacoensis Burkart, *Galactia latisiliqua* Desv. var. *orbicularis* Burkart, *Galactia neesii* DC. var. *flaviflora* Griseb., *Galactia obovata* Malme, *Galactia tenuiflora* Wight & Arn. var. *flaviflora* (Micheli) Hassl., *Galactia velutina* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, CON, PHA). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO).

Galactia longifolia (Jacq.) Benth.

Sin.: *Galactia tenuiflora* (Willd.) Wight & Arn. var. *eriocarpa* Benth. f. *angustifoliolata* Benth., *Galega longifolia* Jacq., *Sweetia longifolia* (Jacq.) DC., *Tephrosia longifolia* (Jacq.) Pers.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, SDE, SFE). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

Galactia marginalis Benth. var. **marginalis**

Sin.: *Cologania heterophylla* Gillies ex Hook. & Arn., *Galactia heterophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Vail, hom. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Galactia marginalis Benth. var. **colombiana** Burkart

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, ROC).

Galactia martioides Burkart

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). URY(RIV).

Galactia neesii DC.

Sin.: *Galactia macropoda* R.S. Cowan, *Galactia martii* DC. var. *acuta* Burkart, *Galactia neesii* DC. var. *macropoda* (R.S. Cowan) Burkart

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, COA, MIE, PAI).

Galactia paraguariensis Chodat & Hassl.

Sin.: *Camptosema paraguariense* (Chodat & Hassl.) Hassl. var. *paraguariense*, *Camptosema paraguariense* (Chodat & Hassl.) Hassl. var. *parviflorum* Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, CON, PHA).

Galactia pretiosa Burkart var. **pretiosa**

Sin.: *Galactia marginalis* Benth. subsp. *longepedunculata* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Galactia marginalis* Benth. var. *longepedunculata* Chodat & Hassl., *Galactia marginalis* Benth. var. *trifoliolata* Hassl., *Galactia marginalis* Benth. var. *unifoliolata* Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA). URY(RIV, SJO).

Galactia pretiosa Burkart var. **trifoliolata** (Hassl.) Burkart

Sin.: *Galactia marginalis* Benth. var. *trifoliolata* Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA, SPE).

Galactia striata (Jacq.) Urb. var.

crassirachis Burkart
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(TUC).

Galactia striata (Jacq.) Urb. var. **striata**

Sin.: *Galactia filiformis* (Jacq.) Wall., *Galactia striata* (Jacq.) Urb. var. *tenuiflora* (Klein ex Willd.) Burkart, *Galactia striata* (Jacq.) Urb. var. *tomentosa* (Bertol.) Urb., *Galactia tenuiflora* (Klein ex Willd.) Wight & Arn., *Galactia tenuiflora* Wight & Arn., p.p., *Glycine striata* Jacq., *Glycine tenuiflora* Klein ex Willd., *Odonia tomentosa* Bertol., *Teramnus tenuiflorus* (Klein ex Willd.) Spreng.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, PAY, RIV, SAO).

Galactia texana (Scheele) A. Gray var. **degasperii** Burkart

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR).

Galactia texana (Scheele) A. Gray var. **texana**

Sin.: *Lablab texanus* Scheele
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).

Galega L.

Galega officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, MEN, NEU, RNE). CHL(ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(CAS, FLA, MON).

Genista L.

Genista monspessulana (L.) L.A.S.

Johnson
Sin.: *Cytisus monspessulanus* L., *Teline monspessulana* (L.) K. Koch
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(MAL, RIV, ROC).

Genista tinctoria L.

Arbusto. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Geoffroea Jacq.

Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart

Sin.: *Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart var. *subtropicalis* (Lillo) Burkart, *Geoffroea subtropicalis* (Lillo) Martínez Carretero, *Geoffroya spinosa* (Molina) M. de Moussy, nom. illeg., *Gourliea chilensis* Clos, *Gourliea decorticans* Gillies ex Hook. & Arn. var. *subtropicalis* Lillo, *Gourliea decorticans* Gillies ex Hook. & Arn., *Gourliea decorticata* Walp., nom. illeg., *Gourliea spinosa* (Molina) Skeels, *Lucuma spinosa* Molina

Árbol. Nativa. 100-2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ). PRY(APY, PHA). URY(COL, MON, PAY, RNO, SOR).

Geoffroea spinosa Jacq.

Sin.: *Geoffroea bredemeyeri* Kunth, *Geoffroea striata* (Willd.) J.F. Macbr., comb. superfl., *Geoffroea striata* (Willd.) Morong, *Geoffroya superba* Humb. & Bonpl., *Robinia striata* Willd.
Árbol. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Gleditsia L.

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
var. **amorphoides**

Sin.: *Garugandra amorphoides* Griseb.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI). URY(ART, PAY, SAO).

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
var. **anacantha** Burkart

Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, MIS). URY(ART, MON).

Gleditsia triacanthos L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SAL, SFE). URY(CAS, MON, PAY, SAO).

Glycyrrhiza L.

Glycyrrhiza astragalina Gillies ex Hook. & Arn.

Subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TUC). CHL(VAL, BIO).

Guibourtia A.W. Benn.

Guibourtia hymenaeifolia (Moric.) J. Léonard

Sin.: *Copaifera chodatiana* Hassl., *Copaifera chodatiana* Hassl. var. *fruticosa* Hassl., *Guibourtia chodatiana* (Hassl.) J. Léonard, *Guibourtia chodatiana* (Hassl.) J. Léonard var. *fruticosa* (Hassl.) J. Léonard
Árbol o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON).

Helicotropis A. Delgado

Helicotropis hookeri (Verdc.) A. Delgado

Sin.: *Phaseolus lobatus* Hook., *Vigna hookeri* Verdc.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(SAO, SJO, TAC).

Hoffmannseggia Cav., nom. cons.

Hoffmannseggia aphylla (Phil.) G.P. Lewis & Sotuyo

Sin.: *Caesalpinia aphylla* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-3200 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Hoffmannseggia doellii Phil. subsp. **argentina** Ulibarri

Hierba. Endémica. 500-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Hoffmannseggia doellii Phil. subsp. **doellii**

Hierba. Endémica. 2300-3500 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Hoffmannseggia erecta Phil.

Sin.: *Hoffmannseggia falcaria* Cav. var. *andicola* Hook. & Arn., *Hoffmannseggia nana* Chodat & Wilczek, *Hoffmannseggia patagonica* Speg.

Hierba. Endémica. 100-3200 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU).

Hoffmannseggia eremophila (Phil.)

Burkart ex Ulibarri
Sin.: *Hoffmannseggia andina* Miers, nom. nud., *Hoffmannseggia andina* Phil., *Hoffmannseggia andina* Miers var. *eremophila* (Phil.) Reiche, *Hoffmannseggia philippiana* Hosseus, *Zuccagnia eremophila* Phil.
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SAL). CHL(ANT, ATA).

Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert

Sin.: *Caesalpinia chicamana* Killip & J.F. Macbr., *Caesalpinia falcaria* (Cav.) L. Fisher, *Caesalpinia glauca* (Ortega) Kunth, *Hoffmannseggia chicamana* (Killip & J.F. Macbr.) Eifert, *Hoffmannseggia densiflora* Benth. ex A. Gray, *Hoffmannseggia falcaria* Cav., nom. illeg., *Hoffmannseggia stricta* Benth. ex A. Gray, *Larrea densiflora* (Benth. ex A. Gray) Britton, *Larrea glauca* Ortega
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Hoffmannseggia minor (Phil.)

Ulibarri
Sin.: *Hoffmannseggia doellii* Phil. var. *minor* Phil.
Hierba. Nativa. 800-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Hoffmannseggia prostrata Lag. ex DC.

Sin.: *Caesalpinia prostrata* (Lag. ex DC.) J.F. Macbr., *Hoffmannseggia gracilis* (Ruiz & Pav.) Hook. & Arn., *Larrea*

gracilis Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Hoffmannseggia pumilio (Griseb.)

B.B. Simpson
Sin.: *Caesalpinia pumilio* Griseb., *Caesalpinia pumilio* Griseb. var. *riojana* (Kurtz ex Hosseus) Burkart, *Caesalpinia riojana* Kurtz ex Hosseus
Arbusto. Endémica. 1500-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SJU).

Hoffmannseggia trifoliata Cav.

Sin.: *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. f. *microphylla* Speg., *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. f. *normalis* Speg., *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. var. *glandulosa* Speg., *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. var. *microphylla* Speg.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).

Hoffmannseggia viscosa (Ruiz & Pav.) Hook.

Sin.: *Caesalpinia ternata* (Phil.) J.F. Macbr., *Caesalpinia viscosa* (Ruiz & Pav.) Fisch., *Hoffmannseggia falcaria* Cav. var. *glandulosa* Hook. & Arn., nom. illeg., *Hoffmannseggia ternata* Phil., *Larrea viscosa* Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. 1500-3000 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Hoffmannseggia yaviensis Ulibarri

Hierba. Nativa. 3400-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Holocalyx Micheli

Holocalyx balansae Micheli

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Hymenaea L.

Hymenaea courbaril L.

Sin.: *Hymenaea confertifolia* Hayne, *Hymenaea courbaril* L. var. *stilbocarpa* (Hayne) Y.T. Lee & Langenh., *Hymenaea splendida* Vogel, *Hymenaea stilbocarpa* Hayne
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Hymenaea martiana Hayne

Sin.: *Cynometra martiana* (Hayne) Baill., *Hymenaea sellowiana* Hayne
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne var. **pubescens** Benth.

Sin.: *Hymenaea correana* Barb. Rodr., *Hymenaea olfersiana* Hayne, *Hymenaea rotunda* Hayne
Árbol o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne var. **stigonocarpa**

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, COA, PAI).

Indigofera L.**Indigofera asperifolia** Bong. ex Benth.

Sin.: *Anila asperifolia* (Bong. ex Benth.) Kuntze, *Indigofera asperifolia* Hochst. ex Baker, nom. illeg., *Indigofera retrusa* N.E. Br.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, CAN, GUA, MIE, ÑEE). URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Indigofera bongardiana (Kuntze)

Burkart var. **bongardiana**
Sin.: *Anila bongardiana* Kuntze, *Indigofera gracilis* Benth.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, ITA, SPE).

Indigofera bongardiana (Kuntze)

Burkart var. **graminoides** (Chodat & Hassl.) Burkart
Sin.: *Indigofera gracilis* Benth. var. *graminoides* Chodat & Hassl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(GUA, SPE).

Indigofera campestris Bong. ex Benth.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, GUA, ITA, PHA). URY(ART, PAY, RNO, TAC).

Indigofera guaranitica Hassl.

Sin.: *Indigofera elongata* Michx., nom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, SPE).

Indigofera hirsuta L.

Hierba o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Indigofera kurtzii Harms

Sin.: *Anila kurtzii* (Harms) Kuntze, *Indigofera anil* L. var. *angustifolia* Griseb.
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR).

Indigofera latifolia Micheli

Sin.: *Indigofera campestris* Bong. ex Benth. f. *bifoliolata* Hassl., *Indigofera campestris* Bong. ex Benth. f. *unifoliolata* Hassl., *Indigofera campestris* Bong. ex Benth. var. *latifolia* (Micheli) Hassl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CAU, GUA, ITA).

Indigofera lespedezioides Kunth

Sin.: *Anila lespedezoides* (Kunth) Kuntze, *Anila pascuorum* (Benth.) Kuntze, *Indigofera lespedezioides* Kunth var. *pascuorum* (Benth.) Hassl., *Indigofera lespedezioides* Kunth var. *typica* Hassl., nom. inval.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON).

Indigofera parodiana Burkart

Sin.: *Indigofera campestris* Kurtz, nom. illeg., *Indigofera humilis* Kuntze, nom. illeg., *Indigofera pascuorum* Griseb., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(COR, COS, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Indigofera pascuorum Benth.

Arbusto, subarbusto o hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Indigofera sabulicola Benth.

Sin.: *Anila sabulicola* (Benth.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, ÑEE). URY(ART, PAY).

Indigofera suffruticosa Mill.

Sin.: *Anila tinctoria* (L.) Kuntze var. *brachycarpa* (DC.) Kuntze, *Anila tinctoria* (L.) Kuntze var. *vera* Kuntze, *Indigofera anil* L. var. *polyphylla* DC., *Indigofera anil*

L., *Indigofera drepanocarpa* Bergman, *Indigofera tinctoria* Mill. var. *brachycarpa* DC., *Indigofera tinctoria* Mill., nom. illeg.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CON, COA, GUA). URY(COL, MAL, RNO, SJO).

Indigofera truxillensis Kunth

Hierba. Nativa.
Países: CHL(TAR).

Inga Mill.**Inga affinis** DC.

Sin.: *Feuilleea affinis* (DC.) Kuntze, *Inga acutifolia* Benth., *Inga arrabideae* Steud., *Inga dulces* Mart., nom. illeg., *Inga velloziana* Mart., *Inga vera* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn., *Mimosa dulcis* Vell., *Mimosa umbellata* Vell.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI).

Inga barbata Benth.

Sin.: *Feuilleea barbata* (Benth.) Kuntze
Arbolito. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Inga edulis Mart.

Sin.: *Feuilleea conferta* (Benth.) Kuntze, *Feuilleea scabriuscula* (Benth.) Kuntze, *Inga conferta* Benth., *Inga edulis* Mart. var. *parviflora* Benth., *Inga scabriuscula* Benth. var. *villosior* Benth., *Inga scabriuscula* Benth., *Inga uncinata* Spruce ex Benth., *Inga vera* Kunth, hom. illeg., *Mimosa inga* L.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA).

Inga edwallii (Harms) T.D. Penn.

Sin.: *Affonsea dusenii* Harms, *Affonsea edwallii* Harms, *Affonsea hirsuta* Harms, *Affonsea schwebeliana* Harms
Arbolito. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Inga globularis T.D. Penn.

Sin.: *Affonsea comosa* Benth., *Affonsea juglandifolia* A. St.-Hil., *Inga comosa* (Benth.) F. Muell., *Inga juglandifolia* (A. St.-Hil.) F. Muell., hom. illeg.
Arbolito. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Inga heterophylla Willd.

Sin.: *Feuilleea heterophylla* (Willd.) Kuntze, *Inga mapirensis* Pittier, *Inga protracta* Steud., *Inga stenocarpa* Spruce ex Benth., nom. nud., *Inga umbellata* G. Don, *Inga vouapaefolia* Spruce ex Benth., nom. nud., *Mimosa heterophylla* (Willd.) Roxb., *Mimosa parae* Poir.
Árbol. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Inga laurina (Sw.) Willd.

Sin.: *Feuilleea laurina* (Sw.) Kuntze, *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. f. *pedicellaris* Hassl., *Inga tetraphylla* (Vell.) Mart., p.p., *Mimosa fagifolia* L., *Mimosa laurina* Sw., *Mimosa tetraphylla* Vell.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(CON).

Inga lentiscifolia Benth.

Sin.: *Feuilleea lentiscifolia* (Benth.) Kuntze
Árbol. Endémica. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Inga marginata Willd.

Sin.: *Feuilleea marginata* (Willd.) Kuntze, *Inga exelsa* Poepp., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. f. *genuina* Hassl., nom. inval., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. f. *pedicellaris* Hassl., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. var. *intermedia* Hassl., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. var. *marginata* (Willd.) Hassl., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth., *Inga guayaquilensis* G. Don, *Inga leptostachya* Spruce ex Benth., *Inga marginata* Willd. var. *itayensis* J.F. Macbr., *Inga microcoma* Harms, *Inga odorata* G. Don, *Inga puberula* Benth., *Inga pycnostachya* Benth., *Inga sapida* Kunth, *Inga semialata* (Vell.) Mart. var. *latifolia* Benth., *Inga semialata* (Vell.) Mart., *Inga tysonii* T.S. Elias, *Mimosa semialata* Vell.
Árbol. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Inga saltensis Burkart

Sin.: *Inga brevityba* T.S. Elias
Árbol. Nativa. 700-2200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Inga sellowiana Benth.

Sin.: *Feuilleea sellowiana* (Benth.) Kuntze
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Inga sessilis (Vell.) Mart.

Sin.: *Feuilleea sessilis* (Vell.) Kuntze, *Inga calycina* Benth., *Mimosa sessilis* Vell.
Árbol. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Inga striata Benth.

Sin.: *Feuilleea catharinae* (Benth.) Kuntze, *Feuilleea nuda* (Salzm. ex Benth.) Kuntze, *Feuilleea salzmanniana* (Benth.) Kuntze, *Inga canminensis* Rusby, *Inga catharinae* Benth., *Inga dulcis* (Vell.) Mart., *Inga nuda* Salzm. ex Benth. var. *longiflora* Benth., *Inga nuda* Salzm. ex Benth., *Inga salzmanniana* Benth.
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Inga subnuda Salzm. ex Benth. subsp. **luschnathiana** (Benth.) T.D. Penn.

Sin.: *Feuilleea luschnathiana* (Benth.) Kuntze, *Inga eriantha* Benth., *Inga luschnathiana* Benth.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Inga subnuda Salzm. ex Benth. subsp. **subnuda**

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Inga uraguensis Hook. & Arn.

Sin.: *Feuilleea uraguensis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Inga uraguensis* Hook. & Arn. f. *tomentulosa* Chodat & Hassl., *Inga uraguensis* Hook. & Arn. var. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Inga vera* Willd. subsp. *uraguensis* (DC.) T.D. Penn.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI). URY(ART, COL, PAY, RNO, SAO, SOR).

Inga vera Willd.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Inga virescens Benth.

Sin.: *Feuilleea virescens* (Benth.) Kuntze
Arbolito. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(Desconocida).

Inga vulpina Mart. ex Benth.

Sin.: *Feuilleea vulpina* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Feuilleea guillemianiana* (Benth.) Kuntze, *Inga guillemianiana* Benth.
Arbolito. Nativa. 600-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Kummerowia Schindl.**Kummerowia striata** (Thunb.) Schindl.

Sin.: *Hedysarum striatum* Thunb.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Lablab Adans.**Lablab purpureus** (L.) Sweet

Sin.: *Dolichos purpureus* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). CHL(IPA). URY(MON).

Laburnum Fabr.**Laburnum anagyroides** Medik.

Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Lachesiodendron P.G. Ribeiro, L.P. Queiroz & Luckow**Lachesiodendron viridiflorum**

(Kunth) P.G. Ribeiro, L.P. Queiroz & Luckow

Sin.: *Acacia subtilifolia* Kunth, *Acacia viridiflora* Kunth, *Piptadenia subtilifolia* (Kunth) Benth., *Piptadenia viridiflora* (Kunth) Benth., *Pityrocarpa viridiflora* (Kunth) Brenan

Arbusto o árbol. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Lathyrus L.**Lathyrus berterioanus** Colla ex Savi

Sin.: *Lathyrus debilis* Vogel var. *berterioanus* (Colla ex Savi) Reiche, *Lathyrus gracilis* Phil.

Enredadera. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Lathyrus cabrerianus Burkart

Sin.: *Lathyrus dumetorum* Burkart, hom. illeg., *Lathyrus pubescens* Clos, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

Lathyrus campestris Phil.

Sin.: *Lathyrus debilis* Vogel var. *campestris* (Phil.) Reiche, *Lathyrus gracillimus* Reiche
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU). CHL(MAU, LLA).

Lathyrus cicera L.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(VAL).

Lathyrus crassipes Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
CHL(BIO, LLA, RME).

Lathyrus cryophilus Chodat & Wilcz.

Hierba. Endémica.
Países: ARG(MEN).

Lathyrus elegans Vogel

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Lathyrus hasslerianus Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lathyrus hirsutus L. var. **ecirrhusus** Schur

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Lathyrus hirsutus L. var. **hirsutus**

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(MON).

Lathyrus hookeri G. Don

Sin.: *Lathyrus chilensis* Steud., *Lathyrus epetiolaris* Clos, *Lathyrus heterocirrus* Phil., *Lathyrus hookeri* G. Don f. *albiflora* (Kuntze) Burkart, *Lathyrus hookeri* G. Don var. *trichocalyx* (Phil.) Burkart, *Lathyrus litoralis* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. f. *albiflorus* Kuntze, *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *araucanus* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *heterocirrus* (Phil.) Reiche, *Lathyrus ovalifolius* Phil., *Lathyrus philippianus* Speg., *Lathyrus pisaster* Clos, *Lathyrus roseus* Phil., *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn. f. *trichocalyx* (Phil.) Burkart, *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn., *Lathyrus trichocalyx* Phil.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SLU). BRA(RGS). CHL(LBO, BIO, RME). URY(COL, PAY, SOR).

Lathyrus ibicuiensis Abruzzi de

Oliveira
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Lathyrus japonicus Willd. var.

aleuticus (Greene) Fernald
Sin.: *Lathyrus maritimus* (L.) Bigelow var. *aleuticus* Greene
Hierba. Introducida. 0-400 m.
Países: CHL(AIS).

Lathyrus japonicus Willd. var. **japonicus**

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Lathyrus latifolius L.

Sin.: *Lathyrus laevigatus* Arechav., *Lathyrus silvester* L. var. *latifolius* (L.) Fiori
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, LPA, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL). URY(FLA, MON).

Lathyrus linearifolius Vogel

Enredadera. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lathyrus lomanus I.M. Johnst.

Enredadera. Endémica.
Países: CHL(ANT).

Lathyrus macropus Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Lathyrus linearifolius* Griseb., nom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SAL, SJU, SLU). CHL(VAL, ARA, RME).

Lathyrus macrostachys Vogel

Sin.: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *subsessilifolius* Kuntze
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(PHA). URY(CLA, FLA, MAL, RNO, SJO, TAC).

Lathyrus magellanicus Lam. var. **gladiatus** (Hook.) Kuntze

Sin.: *Lathyrus gladiatus* Hook.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(ARA).

Lathyrus magellanicus Lam. var.

glaucescens Speg.
Sin.: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *campestris* Dusén, *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *oxyphylla* Speg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Lathyrus magellanicus Lam. var.

longipes (Phil.) Burkart
Sin.: *Lathyrus dumetorum* Phil. var. *longipes* (Phil.) Reiche, *Lathyrus longipes* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2400 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, RME).

Lathyrus magellanicus Lam. var. **magellanicus**

Sin.: *Lathyrus magellanicus* D. Don, nom. illeg., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *subsessilifolius* Kuntze, *Lathyrus patagonicus* Hauman, *Lathyrus pterocaulos* Phil.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

Lathyrus magellanicus Lam. var.

tucumanensis Burkart
Hierba. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(LLA). URY(CAS, CLA, SJO).

Lathyrus multiceps Clos

Sin.: *Lathyrus ecirrhusus* Phil., *Lathyrus eurypetalus* Phil., *Lathyrus multiceps* Clos var. *normalis* Burkart, *Lathyrus multiceps* Clos var. *setiger* (Phil.) Acevedo, *Lathyrus setiger* Phil. var. *eurypetalus* (Phil.) Reiche, *Lathyrus setiger* Phil.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SLU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Lathyrus nervosus Lam.

Sin.: *Lathyrus armitageanus* Knowles & Westc., nom. illeg., *Lathyrus nervosus* Boiss., nom. illeg., *Lathyrus ovalifolius* Phil. var. *mucronatus* Phil., *Lathyrus trigonus* Vogel
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MIS, RNE, SAL, SCR). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA, AIS, MAG). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TYT).

Lathyrus nigrivalvis Burkart

Sin.: *Lathyrus magellanicus* Lam. f. *longepetiolatus* Hassl., *Lathyrus nigrivalvis* Burkart f. *puberula* Burkart
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(PHA).

Lathyrus nitens Vogel

Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, RNO, RIV, SAO, TAC).

Lathyrus paraguariensis Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA).

Lathyrus paranensis Burkart

Sin.: *Lathyrus paranensis* Burkart f.
albiflorus Burkart
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA,
FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC,
SJO, SOR, TYT).

Lathyrus parodii Burkart var.

brevipetiolata Burkart ex Izag. &
Beyhaut
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

Lathyrus parodii Burkart var. **parodii**

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS).
URY(CLA, MON, RNO, RIV, SJO).

Lathyrus pastorei (Burkart) Rossow

Sin.: *Lathyrus multiceps* Clos var.
pastorei Burkart
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(NEU, RNE).

Lathyrus pubescens Hook. & Arn. var.

monticola Burkart
Sin.: *Lathyrus pubescens* Hook. & Arn.
var. *acutifolius* Griseb.
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Lathyrus pubescens Hook. & Arn. var. **pubescens**

Sin.: *Lathyrus acutifolius* Vogel,
Lathyrus andicolus Gand., *Lathyrus*
dumetorum Phil., *Lathyrus petiolaris*
Vogel, *Lathyrus purpureo-coeruleus*
Knowles & Westc.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
COS, ERI, LPA, RNE, SAL, SCR, SLU,
TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL,
BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(ART,
CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON,
PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

Lathyrus pusillus Elliott

Sin.: *Lathyrus arvensis* Phil., *Lathyrus*
cicera L. var. *patagonica* Speg., *Lathyrus*
crassipes Phil., nom. illeg., *Lathyrus*
debilis Vogel var. *arvensis* (Phil.) Reiche,
Lathyrus dicirrhous Clos, *Lathyrus*
engelmanni Bisch., *Lathyrus guaraniticus*

Hassl., *Lathyrus montevidensis* Vogel,
Lathyrus stipularis J. Presl var.
patagonica (Speg.) Speg. *Lathyrus*
stipularis J. Presl

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,
COS, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE, SFE).
BRA(RGS, SCA). CHL(LLA). PRY(ITA).
URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA,
LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO,
SOR, TAC, TYT).

Lathyrus sativus L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).
URY(MON).

Lathyrus subandinus Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Lathyrus subulatus Lam.

Sin.: *Lathyrus debilis* Vogel, *Lathyrus*
missionum Hassl., *Lathyrus subulatus*
Lam. var. *longifolius* Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS,
SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS,
CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL,
MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO,
SOR, TAC).

Lathyrus tomentosus Lam.

Sin.: *Lathyrus sericeus* Lam.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, SFE).
URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO).

Lathyrus tropicalandinus Burkart

Enredadera. Nativa. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Lecointea Ducke

Lecointea hatschbachii Barneby
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Leptospron (Benth.) A. Delgado

Leptospron adenanthum (G. Mey.) A.
Delgado

Sin.: *Phaseolus adenanthus* G. Mey.
var. *caeduorum* (Mart.) Hassl., *Phaseolus*
adenanthus G. Mey. var. *genuinus* Hassl.,
nom. inval. *Phaseolus adenanthus* G. Mey.
var. *radicans* (Benth.) Hassl., *Phaseolus*
adenanthus G. Mey. var. *truxillensis*

(Kunth) Hassl., *Phaseolus adenanthus*
G. Mey., *Phaseolus amoenus* Macfad.,
Phaseolus barbatus Benth., *Phaseolus*
brevipes Benth., *Phaseolus caeduorum*
Mart., *Phaseolus cirrhosus* Kunth,
Phaseolus cuernavacanus Rose, *Phaseolus*
cumingii Benth., *Phaseolus macfadyenii*
Steud., *Phaseolus occidentalis* Rose,
Phaseolus radicans Benth., *Phaseolus*
senegalensis Guill. & Perr., *Phaseolus*
subtortus Benth., *Phaseolus truxillensis*
Kunth, *Vigna adenantha* (G. Mey.)
Maréchal, Mascherpa & Stainier
Enredadera. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR,
JUU, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS).
PRY(CEN, COA, GUA, PAD). URY(ART,
CAS, COL, MAL, MON, SAO, SJO).

Leucaena Benth.

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
subsp. **glabrata** (Rose) Zárate
Sin.: *Leucaena glabrata* Rose
Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(JUU).

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
subsp. **leucocephala**

Sin.: *Mimosa leucocephala* Lam.
Arbolito. Introducida.
Países: BRA(PAR). CHL(IPA).

Leucochloron Barneby & J.W. Grimes

Leucochloron incuriale (Vell.)

Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Mimosa incurialis* Vell.
Árbol. Nativa. 700-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Libidibia (DC.) Schldl., emend.
E. Gagnon & G.P. Lewis

Libidibia paraguariensis (D. Parodi)
G.P. Lewis

Sin.: *Acacia paraguariensis* D. Parodi,
Caesalpinia coriaria Micheli, hom.
illeg., *Caesalpinia melanocarpa* Griseb.,
Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi)
Burkart
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR,
JUU, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC).
PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, ÑEE,
NAS, PHA, SPE).

Lonchocarpus Kunth**Lonchocarpus cultratus** (Vell.) Tozzi & H.C. Lima

Sin.: *Pterocarpus cultratus* Vell.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lonchocarpus lilloi (Hassl.) Burkart

Sin.: *Lonchocarpus nitidus* (Vogel)
Benth. var. *lilloi* Hassl.
Árbol. Endémica.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth.

Sin.: *Derris nitidus* (Vogel) N.F.
Mattos, *Sphinctolobium nitidum* Vogel
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CON, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR).

Lonchocarpus pluvialis Rusby

Sin.: *Lonchocarpus sericeus* (Poir.)
Kunth subsp. *paraguariensis* Hassl.
Árbol. Nativa.
Países: PRY(PAI).

Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.

Sin.: *Robinia sericea* Poir.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Lophocarpinia Burkart**Lophocarpinia aculeatifolia**

(Burkart) Burkart
Sin.: *Cenostigma aculeatifolium*
Burkart
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL).
PRY(APY).

Lotus L.**Lotus angustissimus** L.

Sin.: *Lotus gracilis* Waldst. & Kit. ex Willd.
Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(DUR, TYT).

Lotus corniculatus L.

Sin.: *Lotus caucasicus* Kuprian., *Lotus major* Scop.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, LPA). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME). URY(MON, TAC).

Lotus ornithopodioides L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(MON, SOR).

Lotus pedunculatus Cav.

Sin.: *Lotus uliginosus* Schkuhr
Hierba. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, ERI, NEU, RNE, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, IPA). URY(MON, TAC).

Lotus suaveolens Pers.

Sin.: *Lotus hispidus* Desf. ex DC.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, NEU).
BRA(RGS). URY(CLA, DUR, FLA, MAL, MON, TAC, TYT).

Lotus subpinnatus Lag.

Sin.: *Hosackia subpinnata* (Lag.) Torr. & A. Gray
Hierba. Endémica. 0-2300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.

Sin.: *Lotus corniculatus* L. var. *tenuifolius* L., *Lotus glaber* Mill., *Lotus tenuifolius* (L.) Rchb.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, RME). URY(MON, ROC, SJO).

Luetzelburgia Harms**Luetzelburgia guaissara** Toledo

Sin.: *Luetzelburgia reitzii* Burkart
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lupinus L.**Lupinus albescens** Hook. & Arn.

Sin.: *Lupinus incanus* Graham, *Lupinus parodianus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA). URY(ART, COL, RIV, SJO, SOR, TAC).

Lupinus albus L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Lupinus alivillosus C.P. Sm.

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(TUC).

Lupinus andicola Gillies

Sin.: *Lupinus praedictus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Lupinus angustifolius L.

Sin.: *Lupinus canaliculatus* Sweet
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(ERI). CHL(BIO).
URY(FLA, MAL).

Lupinus arboreus Sims

Sin.: *Lupinus barilochensis* C.P. Sm.
Arbusto. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE).

Lupinus aureonitens Gillies

Sin.: *Lupinus multiflorus* Desr.
var. *paucifoliolatus* Benth., *Lupinus purolanatus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Lupinus austrorientalis C.P. Sm.

Subarbusto. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).

Lupinus bracteolaris Desr. var. **bracteolaris**

Sin.: *Lupinus bracteolaris* Desr. var. *czermakii* (Micheli) Burkart, *Lupinus czermakii* Micheli
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI).
BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Lupinus bracteolaris Desr. var. **leptophyllus** (Benth.) Benth.

Sin.: *Lupinus leptophyllus* Benth.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). URY(MON, PAY, RIV, TAC, TYT).

Lupinus bracteolaris Desr. var. **tenuifolius** (Arechav.) C.P. Sm.

Sin.: *Lupinus tenuifolius* Arechav.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(CLA, TAC).

Lupinus buchtienii Rusby

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Lupinus burkartianus C.P. Sm.

Sin.: *Lupinus amnis-churquis* C.P. Sm., *Lupinus campestri-florum* C.P. Sm.,

Lupinus divorsus C.P. Sm., *Lupinus hiulcus* C.P. Sm., *Lupinus pavorum* C.P. Sm., *Lupinus solitarius* C.P. Sm., *Lupinus venturianus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Lupinus erectifolius C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Lupinus gibertianus C.P. Sm. var. **berroanus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Sin.: *Lupinus berroanus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). URY(COL, SAO).

Lupinus gibertianus C.P. Sm. var. **gibertianus**
Sin.: *Cytisus heptaphyllus* Vell., *Lupinus aspersus* C.P. Sm., *Lupinus bonplandianus* C.P. Sm., *Lupinus hassleranus* C.P. Sm., *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl. f. *hilarianus* Benth., *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl. f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl., *Lupinus hilarianus* Benth., nom. superfl., *Lupinus propedubius* C.P. Sm., *Lupinus sanctae-anae* C.P. Sm., *Lupinus subumbellatus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(ITA, ÑEE). URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Lupinus gibertianus C.P. Sm. var. **reineckianus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Sin.: *Lupinus hilarianus* Benth. var. *reineckianus* C.P. Sm., *Lupinus niederlenianus* C.P. Sm., *Lupinus palmarum* C.P. Sm., *Lupinus reineckianus* (C.P. Sm.) C.P. Sm., *Lupinus rubidus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(COL).

Lupinus grisebachianus C.P. Sm.
Sin.: *Lupinus brevicaulis* Griseb.
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Lupinus guaraniticus (Hassl.) C.P. Sm.
Sin.: *Lupinus attenuatus* Gardner var. *guaraniticus* Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Lupinus hieronymi C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(LRI).

Lupinus honoratus C.P. Sm.
Sin.: *Lupinus lilloanus* C.P. Sm., *Lupinus monetianus* C.P. Sm., *Lupinus schreiteranus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC).

Lupinus ignobilis C.P. Sm.
Sin.: *Lupinus bailettianus* C.P. Sm., *Lupinus inferior* C.P. Sm., *Lupinus resimus* C.P. Sm.
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Lupinus intortus C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Lupinus jujuyensis C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUJ).

Lupinus lanatus Benth.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). URY(ART, RIV).

Lupinus linearis Desr.
Sin.: *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl. f. *pseudolinearis* Hassl., *Lupinus hilarianus* Benth. var. *pseudolinearis* (Hassl.) C.P. Sm., *Lupinus pseudolinearis* (Hassl.) C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(ITA). URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SOR, TYT).

Lupinus luteus L.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(VAL).

Lupinus magnistipulatus Planchuelo & D.B. Dunn
Sin.: *Lupinus setifolius* Planchuelo & D.B. Dunn
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Lupinus microcarpus Sims
Sin.: *Lupinus comberanus* C.P. Sm., *Lupinus fischeranus* C.P. Sm., *Lupinus verticillatus* C.P. Sm.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Lupinus multiflorus Desr.
Sin.: *Lupinus multiflorus* Desr. var. *grandiflorus* Benth.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO).

Lupinus opertospicus C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Lupinus oreophilus Phil.
Sin.: *Lupinus oreophilus* Greene, nom. illeg.
Hierba. Endémica. 2700-4400 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Lupinus paraguariensis Chodat & Hassl.
Sin.: *Lupinus missionum* (Hassl.) C.P. Sm., *Lupinus paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *missionum* Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, COA, SPE). URY(PAY).

Lupinus paranensis C.P. Sm.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lupinus polyphyllus Lindl.
Hierba. Introducida. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Lupinus reitzii Burkart ex Pinheiro & Miotto
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lupinus rubriflorus Planchuelo
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Lupinus sellowianus Harms
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Lupinus subacaulis Griseb.
Sin.: *Lupinus chilensis* C.P. Sm.
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Lupinus subinflatus C.P. Sm.
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Lupinus tafiensis C.P. Sm.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(TUC).

Lupinus tarapacensis C.P. Sm.

Árbusto. Nativa.
Países: CHL(AYP, TAR).

Lupinus tomentosus DC.

Árbusto. Nativa. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Lupinus tucumanensis C.P. Sm.

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(LRI, TUC).

Lupinus uleanus C.P. Sm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Lupinus ultramontanus C.P. Sm.

Subarbusto. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(CAT, SAL).

Lupinus umidicola C.P. Sm.

Sin.: *Lupinus cafayatensis* C.P. Sm.,
Lupinus castillonanus C.P. Sm., *Lupinus*
catamarcensis C.P. Sm., *Lupinus*
jorgenseanus C.P. Sm., *Lupinus sierra-zentae*
C.P. Sm., *Lupinus tilcanicus* C.P. Sm.
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, SAL, TUC).

Lupinus velutinus Benth.

Árbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Lupinus werdermannianus C.P. Sm.

Árbusto. Endémica.
Países: CHL(TAR).

Machaerium Pers.**Machaerium acutifolium** Vogel

Sin.: *Machaerium acutifolium*
Benth. var. *muticum* (Benth.) Benth.,
Machaerium muticum Benth.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA,
CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Machaerium brasiliense Vogel

Sin.: *Machaerium ciliatum* Benth.,
Machaerium luschnathianum J. Presl,
Machaerium vestitum Vogel
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Machaerium debile (Vell.) Stellfeld

Sin.: *Nissolia debile* Vell., *Machaerium*
dimorphandrum Hoehne
Árbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Machaerium eriocarpum Benth.

Sin.: *Machaerium eriocarpum* Benth.
f. *mucronulata* Chodat & Hassl.,
Machaerium eriocarpum Benth. f.
tomentella Chodat & Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CEN, CON).

Machaerium glabrum Vogel

Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).

Machaerium hatschbachii Rudd

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld

Sin.: *Machaerium angustifolium* Vogel,
Machaerium angustifolium Vogel f. *glauca*
Chodat & Hassl., *Nissolia hirta* Vell.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APY, AMA, CAN, CON, GUA, PAI,
PHA, SPE).

Machaerium lanceolatum (Vell.) J.F. Macbr.

Sin.: *Nissolia lanceolata* Vell.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.

Sin.: *Nissolia nyctitans* Vell.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

Machaerium paraguariense Hassl.

Sin.: *Machaerium paraguariense* Hassl.
var. *cuspidatum* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN,
COA, PAI).

Machaerium ruddianum C.V. Mend.

& Tozzi
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Machaerium scleroxylon Tul.

Sin.: *Machaerium nyctitans* (Vell.)
Benth. var. *scleroxylon* (Tul.) Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel

Sin.: *Machaerium minutiflorum* Tul.,
Nissolia stipitata DC.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAN, COA, PAI).

Machaerium uncinatum (Vell.) Benth.

Sin.: *Nissolia uncinata* Vell.
Árbusto o liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Machaerium villosum Vogel

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Macroptilium (Benth.) Urb.**Macroptilium arenarium**

(Bacigalupo) S.I. Drewes & R.A. Palacios
Sin.: *Macroptilium prostratum* (Benth.)
Urb. var. *arenarium* Bacigalupo
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE).

Macroptilium atropurpureum (Moq.

& Sessé ex DC.) Urb.
Sin.: *Phaseolus atropurpureus* Moq. &
Sessé ex DC.
Enredadera. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CEN).

Macroptilium bracteatum (Nees & C.

Mart.) Maréchal & Baudet
Sin.: *Phaseolus bracteatus* Nees &
C. Mart., *Phaseolus bracteatus* Nees
& C. Mart. f. *panduriformis* Hassl.,
Phaseolus bracteatus Nees & C. Mart. f.
rhomboidalis Hassl., *Phaseolus decipiens*
Salzm. ex Benth.
Enredadera. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CEN,
CON, COA, PAI, PHA, SPE).

Macroptilium chacoensis (Hassl.) S.I.

Drewes & R.A. Palacios
Sin.: *Phaseolus chacoensis* Hassl., *Phaseolus*
chacoensis Hassl. f. *elatus* Hassl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Macroptilium erythroloma (Mart. ex

Benth.) Urb.
Sin.: *Phaseolus erythroloma* Mart. ex
Benth., *Phaseolus monophyllus* Benth.
var. *rufus* (Micheli) Hassl., *Phaseolus*
rubidus Piper, *Phaseolus rufus* Micheli,
hom. illeg.
Enredadera. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE,
PAI, PHA, SPE). URY(RNO).

Macroptilium gibbosifolium (Ortega)

A. Delgado

Sin.: *Macroptilium fraternum* (Piper) Juárez, *Phaseolus fraternus* Piper, *Phaseolus gibbosifolius* Ortega, *Phaseolus panduratus* C. Mart. ex Benth. var. *tuberosus* Hicken

Hierba. Nativa. 500-2800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR).

Macroptilium lathyroides (L.) Urb.

Sin.: *Lotus maritimus* Vell., hom. illeg., *Phaseolus crotalarioides* Mart. ex Benth., *Phaseolus hastifolius* C. Mart. ex Benth., *Phaseolus lathyroides* L. f. *chacoensis* Hassl., *Phaseolus lathyroides* L. f. *hirsutus* Hassl., *Phaseolus lathyroides* L. f. *reapandus* Hassl., *Phaseolus lathyroides* L. f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus lathyroides* L. var. *genuinus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus lathyroides* L. var. *semierectus* (L.) Hassl., *Phaseolus lathyroides* L., *Phaseolus maritimus* (Vell.) Benth., *Phaseolus psoraleoides* Wight & Arn., *Phaseolus semierectus* L. var. *angustifolius* Benth., *Phaseolus semierectus* L. var. *nanus* Benth., *Phaseolus semierectus* L. var. *subhastatus* Benth., *Phaseolus semierectus* L., *Phaseolus strictus* Braun & Bouché

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, ITA, ÑEE, PHA). URY(ART).

Notas: Introducida en Isla de Pascua, Chile.

Macroptilium longepedunculatum (C. Mart. ex Benth.) Urb.

Sin.: *Phaseolus longepedunculatus* C. Mart. ex Benth., *Phaseolus longepedunculatus* C. Mart. ex Benth. var. *angustifolius* Benth., *Phaseolus longepedunculatus* C. Mart. ex Benth. var. *latifolius* Benth., *Phaseolus longepedunculatus* C. Mart. ex Benth. var. *subcoriaceus* Benth.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, COA, PHA, SPE).

Macroptilium martii (Benth.)

Maréchal & Baudet

Sin.: *Phaseolus martii* Benth.

Enredadera. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

Macroptilium monophyllum (Benth.)

Maréchal & Baudet

Sin.: *Phaseolus monophyllum* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, GUA).

Macroptilium panduratum (C. Mart. ex Benth.) Maréchal & Baudet

Sin.: *Macroptilium geophilum* (Burkart) Debouck, Juárez & Pérez, *Phaseolus geophilus* Burkart, *Phaseolus panduratus* C. Mart. ex Benth., *Phaseolus panduratus* C. Mart. ex Benth. f. *eupanduratus* Hassl., nom. inval.

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN).

Macroptilium prostratum (Benth.) Urb.

Sin.: *Phaseolus prostratus* Benth., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *hirsutus* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *linearifoliolatus* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *macrophyllus* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *pseudo-ovatifolius* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. var. *angustifolius* Benth., *Phaseolus prostratus* Benth. var. *ovatifolius* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, COA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CLA, DUR, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

Macroptilium psammodes (Lindm.)

S.I. Drewes & R.A. Palacios

Sin.: *Phaseolus panduratus* C. Mart. ex Benth. f. *ovatifolius* Hassl., *Phaseolus panduratus* C. Mart. ex Benth. f. *psammodes* (Lindm.) Hassl., *Phaseolus psammodes* Lindm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, CAS, MAL, MON, RIV, ROC).

Macroptilium sabaraense (Hoehne)

V.P. Barbosa

Sin.: *Macroptilium brachycalix* (Hassl.) Maréchal & Baudet, *Phaseolus brachycalix* Hassl., *Phaseolus sabaraensis* Hoehne

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Medicago L.**Medicago arabica** (L.) Huds.

Sin.: *Medicago arabica* (L.) All., comb. superfl., *Medicago denticulata* Willd. var.

brevispina Benth., *Medicago maculata* H. Sibth., *Medicago polymorpha* L. var. *arabica* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE, TDF). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RNO).

Medicago arborea L.

Sin.: *Medicago arborea* Aubl., nom. illeg.

Arbusto. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(MAU, RME). URY(MON).

Medicago falcata L.

Hierba o subarbusto. Introducida.

0-500 m.

Países: ARG(SCR).

Medicago intertexta Mill.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: URY(FLA, MON).

Medicago lupulina L.

Sin.: *Medica lupulina* (L.) Scop.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, SJO).

Medicago minima (L.) Bartal. var.**brevispina** Benth.

Sin.: *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *pulchella* Lowe

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA).

URY(RNO).

Medicago minima (L.) Bartal. var.**minima**

Sin.: *Medicago minima* (L.) Grufberg, comb. illeg., *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *canescens* Ser. ex DC., *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *recta* (Desf.) Burnat, *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *vulgaris* Urb., *Medicago polymorpha* L. var. *minima* L., *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *mollissima* (Spreng.) Koch

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, ARA, MAG, RME). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).

Medicago polymorpha L. var.**brevispina** (Benth.) Heyn

Sin.: *Medicago apiculata* Willd., *Medicago denticulata* Willd. var. *brevispina* Benth., *Medicago hispida* Gaertn. var. *apiculata* (Willd.) Burnat, comb. superfl., *Medicago hispida* Gaertn. var. *apiculata* (Willd.) Urb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE, SFE). URY(MON).

Medicago polymorpha L. var.**confinis** (Koch) Ooststr. & B. Reichg.

Sin.: *Medicago apiculata* Willd. var. *confinis* Koch, *Medicago berteriana* Moris, *Medicago hispida* Gartner var. *confinis* (Koch) Burnat, *Medicago hispida* Gaertn. var. *confinis* (Koch) Asch. & Graebn., comb. superfl., *Medicago tuberculata* Reiche

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, RNE, SCR).

CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, JFE). URY(COL, FLA, LAV, MON, RNO, SOR).

Medicago polymorpha L. var.**polymorpha**

Sin.: *Medicago denticulata* Willd., *Medicago hispida* Gaertn. var. *polymorpha* Urb., *Medicago hispida* Gaertn., *Medicago lappacea* Desr., *Medicago nigra* (L.) Krock., *Medicago polymorpha* L. subsp. *hispida* (Gaertn.) Ponert, *Medicago polymorpha* L. var. *nigra* L., *Medicago reticulata* Benth.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LRI). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, COL, FLO, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Medicago polymorpha L. var.**vulgaris** (Benth.) Shinnars

Sin.: *Medicago denticulata* Willd. var. *vulgaris* Benth., *Medicago hispida* Gaertn. var. *denticulata* (Willd.) Asch. & Graebn.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, LPA, RNE, SCR, SFE). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, RME, JFE). URY(MON).

Medicago sativa L.

Sin.: *Medica sativa* (L.) Lam., *Medicago sativa* L. f. *alba* Benke

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,

ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, COL, MON, SJO).

Medicago scutellata (L.) Mill.

Sin.: *Medicago polymorpha* L. var. *scutellata* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(FLA, MON, SOR).

Medicago truncatula Gaertn.

Sin.: *Medicago tribuloides* Desr., *Medicago truncatula* Gaertn. subsp. *longiaculeata* (Urb.) Ponert, *Medicago truncatula* Gaertn. var. *longiaculeata* Urb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, RNE). URY(MAL, MON, RNO).

Melilotus Mill.**Melilotus albus** Desr.

Sin.: *Melilotus albus* Medik., nom. nud., *Melilotus leucanthus* Koch, *Melilotus melanospermus* Ser., *Sertula alba* (Desv.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, AIS, MAG, RME). PRY(APY). URY(CAS, MAL, MON, PAY, RNO).

Melilotus indicus (L.) All.

Sin.: *Melilotus parviflorus* Desf., *Sertula indica* (L.) Kuntze, *Trifolium indicus* L.

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Melilotus messanensis (L.) All.

Sin.: *Melilotus siculus* (Turra) Vitman ex B.D. Jacks., *Sertula messanensis* (All.) Kuntze, *Trifolium messanense* L.

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(MON, SJO).

Melilotus officinalis (L.) Lam.

Sin.: *Melilotus arvensis* Wallr., *Melilotus officinalis* (L.) Pall., comb. illeg., *Melilotus pallidus* Ser., *Sertula officinalis* (L.) Kuntze, *Trifolium officinalis* L.

Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE). CHL(VAL, LBO, MAG, RME). URY(MON).

Microlobius C. Presl**Microlobius foetidus** (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. **paraguensis**

(Benth.) M. Sousa & G. Andrade

Sin.: *Goldmania paraguensis* (Benth.) Brenan, *Piptadenia paraguensis* (Benth.) Lindm., *Piptadenia quadrifolia* N.E. Br., *Pithecellobium paraguense* Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Mimosa L.**Mimosa adpressa** Hook. & Arn.

Sin.: *Mimosa denhardtii* L.H. Bailey, nom. superfl.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

Mimosa alleniana Morong

Sin.: *Mimosa hirsutissima* Mart. f. *decumbens* Chodat & Hassl., nom. superfl., *Mimosa hirsutissima* Mart. f. *erecta* Chodat & Hassl., *Mimosa hirsutissima* Mart. var. *pseudodistans* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

Mimosa altoparanensis Burkart

Sin.: *Mimosa regnellii* Benth. f. *rectispina* Chodat & Hassl., *Mimosa regnellii* Benth. var. *aculeata* Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 300-400 m.

Países: PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA).

Mimosa amphigena Burkart var. **amphigena**

Sin.: *Mimosa amphigena* Burkart var. *typica* Burkart, nom. inval.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, TAC).

Mimosa amphigena Burkart var. **inermis** Burkart

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(PAY, RIV, SAO, TAC).

Mimosa amphigena Burkart var. **trachycarpoides** Burkart

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(FLA, LAV, MAL, PAY, ROC, SAO).

Mimosa asperoides Izag. & Beyhaut

Hierba. Endémica.
Países: URY(LAV, RIV, TYT).

Mimosa atlantica Barneby

Arbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa aureliana Barneby & Fortunato

Arbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: PRY(AMA).

Mimosa australis Izag. & Beyhaut

Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(ART, LAV, MAL, RIV).

Mimosa axillarioides Izag. & Beyhaut

Hierba. Endémica.
Países: URY(MAL, ROC, SAO, TAC).

Mimosa axillaris Benth.

Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).

Mimosa balansae Micheli

Sin.: *Mimosa balansae* Micheli var. *robusta* Chodat & Hassl., *Mimosa balansae* Micheli var. *rojasiana* Hassl., *Mimosa brevipetiolata* Burkart var. *rojasiana* (Hassl.) Barneby
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

Mimosa baldunii Burkart

Arbusto. Endémica. 100-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Mimosa barnebiana Fortunato & Tressens

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(ITA).

Mimosa bathyrrhena Barneby

Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa berroi Burkart

Arbusto o subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(LAV, RNO, RIV, SJO, TAC).

Mimosa bifurca Benth. var. **bifurca**

Sin.: *Mimosa hassleriana* Chodat var. *multijuga* Hassl., *Mimosa hassleriana* Chodat var. *virgata* Hassl., *Mimosa rosariensis* Mattos
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(GUA, PAI, SPE). URY(TYT).

Mimosa bifurca Benth. var.

desmanthoides (Hoehne) Barneby
Sin.: *Mimosa desmanthoides* Hoehne
Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Mimosa bifurca Benth. var.

hassleriana (Chodat) Barneby
Sin.: *Mimosa hassleriana* Chodat, *Mimosa hassleriana* Chodat f. *intermedia* Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA, PAI). URY(TAC).

Mimosa bifurca Benth. var. **reducta** (Hassl.) Barneby

Sin.: *Mimosa hassleriana* Chodat var. *reducta* Hassl.
Arbusto. Nativa. 500 m.
Países: BRA (PAR). PRY(AMA).

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze var. **adenocarpa** Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(APY, AMA).

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze var. **bimucronata**

Sin.: *Acacia bimucronata* DC., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze subsp. *sepiaria* (Benth.) Hassl., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze var. *trichocarpa* Hassl., *Mimosa sepiaria* Benth., *Mimosa stuhlmannii* Harms,

Mimosa thyrsooides Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, GUA, ITA, PAI). URY(ART, RIV, SAO).

Mimosa bonplandii (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth.

Sin.: *Acacia bonplandii* Gillies ex Hook. & Arn., *Acacia lepidota* Hook. & Arn., *Mimosa bonplandii* (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth. var. *minor* Benth.
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS). URY(TAC).

Mimosa bracteolaris Benth.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Mimosa brevipes Benth.

Sin.: *Mimosa vernonioides* Hassl., nom. nud.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAA, CAN, COA).

Mimosa brevipetiolata Burkart var. **brevipetiolata**

Hierba o subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: ARG(MIS).

Mimosa brevipetiolata Burkart var. **hirtula** (Burkart) Barneby

Sin.: *Mimosa brevipetiolata* Burkart var. *pilosula* (Burkart) Barneby, *Mimosa oligophylla* Micheli var. *pilosula* Burkart, *Mimosa petraea* Chodat & Hassl. var. *hirtula* Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 100-400 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(PAI).

Mimosa burkartii Marchesi

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MAL, MON).

Mimosa caaguazüensis Barneby

Sin.: *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *macrophylla* Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(CAU, CAN, COA, MIE, ÑEE).

Mimosa caesalpiniifolia Benth.

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa cainguensis Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 300-400 m.
Países: ARG(MIS). PRY(ITA, MIE).

Mimosa callidryas Barneby

Subarbusto. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa candelabrum Hassl.

Sin.: *Mimosa candelabrum* Hassl. var. *joergensenii* Burkart
Subarbusto. Endémica. 300-500 m.
Países: PRY(CAU, CAN).

Mimosa candollei R. Grether

Sin.: *Leptoglottis leptocarpa* (DC.) Standl., *Mimosa quadrivalvis* var. *leptocarpa* (DC.) Barneby, *Schrankia argentinensis* Burkart, *Schrankia leptocarpa* DC.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CEN, GUA).

Mimosa castanoclada Barneby &

Fortunato
Arbusto. Nativa. 200-500 m.
Países: PRY(APY).

Mimosa catharinensis Burkart

Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Mimosa centurionis Barneby

Sin.: *Mimosa argillicola* Hassl. subsp. *major* Hassl., *Mimosa argillicola* Hassl. var. *intermedia* Hassl.
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: PRY(CON).

Mimosa ceratonia L. var. **pseudo-
obovata** (Taub.) Barneby

Sin.: *Mimosa pseudo-obovata* Taub., *Mimosa pungentissima* Ducke
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Mimosa cerifera Schmidt-Silveira &

Miotto
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Mimosa chacoensis Barneby &

Fortunato
Subarbusto. Nativa. 200-400 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).

Mimosa chaetosphaera Barneby

Sin.: *Mimosa ramosissima* Benth. var. *ulei* Burkart
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Mimosa chartostegia Barneby

Arbusto. Endémica. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa chelata Izag. & Beyhaut

Hierba. Endémica.
Países: URY(LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, TAC).

Mimosa chodatii Hassl.

Subarbusto. Endémica. 600-700 m.
Países: PRY(AMA).

Mimosa congestifolia Burkart

Arbusto. Endémica. 1200-1700 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa coniflora Burkart

Arbusto. Endémica. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa cordobensis Ariza

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR).

Mimosa cruenta Benth. var. **cruenta**

Sin.: *Mimosa amphigena* var. *eglandulosa*, *Mimosa amphigena* var. *glabrescens* Burkart, *Mimosa daleoides* Benth. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CLA, DUR, FLO, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Mimosa cruenta Benth. var. **glabra**

Burkart
Sin.: *Mimosa sanguinolenta* Barneby
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV, TAC).

Mimosa cubatanensis Hoehne

Árbol. Nativa. 700-900 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa custodis Barneby

Subarbusto. Endémica. 400-600 m.
Países: PRY(AMA).

Mimosa daleoides Benth.

Sin.: *Mimosa daleoides* Benth. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Mimosa daleoides* Benth. f. *psammophila* Burkart, *Mimosa daleoides* Benth. var. *paraguariensis* (Chodat & Hassl.) Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(DUR, LAV, RIV, TAC).

Mimosa dalyi Barneby

Subarbusto. Nativa.
Países: PRY(AMA).

Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex

Willd. var. **angusta** (Benth.) M. Morales & Fortunato

Sin.: *Mimosa angusta* Benth., *Mimosa nuda* Benth. var. *angusta* (Benth.) Barneby
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex

Willd. var. **debilis**

Sin.: *Mimosa adhaerens* Kunth, *Mimosa argentinensis* Burkart var. *saltensis* Burkart, *Mimosa argentinensis* Burkart, *Mimosa debilis* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *panamensis* Benth., *Mimosa fervida* Mart., *Mimosa glaucescens* Benth., hom. illeg., *Mimosa gracilipes* Harms f. *armata* Hassl., *Mimosa gracilipes* Harms f. *inermis* Hassl., nom. superfl., *Mimosa gracilipes* Harms, *Mimosa hostmanii* Benth., *Mimosa notata* Steud., *Mimosa nuda* Benth. f. *minor* Chodat & Hassl., *Mimosa nuda* Benth. var. *glaberrima* Chodat & Hassl., *Mimosa nuda* Benth. var. *gracilipes* (Harms) Barneby, *Mimosa obtusifolia* Willd., *Mimosa panamensis* (Benth.) Standl., *Mimosa pauciseta* Benth., *Mimosa rixosa* Mart., *Mimosa velloziana* Mart. f. *acutifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. f. *hispidula* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *atrostipulata* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *glaberrima* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *malmeana* Chodat & Hassl., *Mimosa viscosa* Mart. f. *glabrifolia* Chodat, *Mimosa viscosa* Mart. var. *inermis* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, NAS, PAI, PHA, SPE).

Mimosa deceptrix Barneby

Arbusto o subarbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa detinens Benth.

Sin.: *Mimosa lorentzii* Griseb.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Mimosa diffusa Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle

Sin.: *Mimosa diplotricha* C. Wright ex Sauvalle var. *inermis* (Adelb.) Verdc., *Mimosa invisita* Mart. ex Colla f. *inermis* Adelb., *Mimosa invisita* Mart. ex Colla var. *echinocarpa* Chodat & Hassl., *Mimosa invisita* Mart., nom. illeg., *Mimosa ixiamensis* Rusby, *Mimosa longisiliqua* Lam., nom. inval., *Morongia pilosa* Standl., *Schrankia brachycarpa* Benth., *Schrankia pilosa* (Sternb.) J.F. Macbr.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CEN, GUA, PAI).

Mimosa distans Benth. var. **distans**

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa distans Benth. var.

paraguariensis Barneby
Sin.: *Mimosa elongata* Benth. var. *paraguariensis* Hassl., nom. nud.
Hierba o subarbusto. Endémica. 300-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU).

Mimosa diversipila Micheli var.

diversipila
Hierba o subarbusto. Nativa. 100-400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Mimosa diversipila Micheli var.

subglabriseta Barneby & Fortunato
Hierba o subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI).

Mimosa dolens Vell. subsp. **acerba**

(Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa acerba* Benth., *Mimosa acerba* Benth. var. *minor* Benth.
Subarbusto. Nativa. 700-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAA, SPE).

Mimosa dolens Vell. subsp. **callosa**

(Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa callosa* Benth., *Mimosa callosa* Benth. var. *microphylla* Chodat & Hassl., *Mimosa setipes* Benth.
Hierba o subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, COA, SPE).

Mimosa dolens Vell. subsp. **eriphylla**

(Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa eriphylla* Benth., *Mimosa eriphyllodes* Hoehne, *Mimosa eriphyllodes* Hoehne var. *lanosa* Hoehne
Subarbusto. Nativa. 400-600 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa dolens Vell. subsp. **rigida**

(Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa rigida* Benth.
Subarbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(RIV, TAC).

Mimosa dolens Vell. var. **anisitsii**

(Lindm.) Barneby
Sin.: *Mimosa dolens* Vell. var. *anisitsii* Lindm., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *ovalifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa rigidicaulis* Burkart, *Mimosa rigidicaulis* Burkart var. *ciliata* Burkart
Subarbusto. Nativa. 200-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, COA). URY(RIV).

Mimosa dolens Vell. var. **deterior**

Barneby
Subarbusto. Endémica. 600-700 m.
Países: PRY(AMA).

Mimosa dolens Vell. var. **dolens**

Sin.: *Mimosa trachycephala* Benth.
Subarbusto. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa dolens Vell. var. **foliolosa**

(Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa meticulosa* Mart. f. *glaberrima* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *pubescens* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. var. *microphylla* Benth., nom. superfl., *Mimosa rigescens* Benth.

var. *foliolosa* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CAN, COA, PAI).

Mimosa dolens Vell. var. **latifolia**

(Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa acerba* Benth. var. *asperrimoides* Burkart, *Mimosa acerba* Benth. var. *latifolia* Benth., *Mimosa acerba* Benth. var. *strigosa* (Griseb.) Burkart, *Mimosa conferta* Benth. f. *brevipila* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth. f. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Mimosa conferta* Benth. f. *longepedunculata* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth. var. *multifoliolata* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth., *Mimosa marginata* Lindl. var. *strigosa* Griseb.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN). URY(RIV, TAC).

Mimosa dolens Vell. var. **pangloea** Barneby

Subarbusto. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa dolens Vell. var.

pseudorigida Barneby
Subarbusto. Endémica. 300 m.
Países: PRY(CAN).

Mimosa dolens Vell. var. **pubescens**

(Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa meticulosa* Mart. var. *pubescens* Benth.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(RIV).

Mimosa dolens Vell. var. **rigescens**

(Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa rigescens* Benth.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ITA).

Mimosa dolens Vell. var. **rudis**

(Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa asperrima* Benth., *Mimosa rudis* Benth., *Mimosa rudis* Benth. var. *asperrima* (Benth.) Hassl., *Mimosa rudis* Benth. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Mimosa rudis* Benth. f. *intermedia* Hassl., *Mimosa rudis* Benth. f. *latifoliolata* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Mimosa dolens Vell. var. **uncta** Barneby
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Mimosa dryandroides Taub. var.
extratropica Barneby
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Mimosa dutrae Malme var. **dutrae**
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MAL,
ROC, SJO).

Mimosa dutrae Malme var. **major**
Izag. & Beyhaut
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(LAV, MAL, ROC).

Mimosa ephedroides (Gillies ex Hook.
& Arn.) Benth.
Sin.: *Prosopis ephedroides* Gillies ex
Hook. & Arn.
Arbusto o subarbusto. Endémica.
1100-1300 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

Mimosa equisetum Barneby
Sin.: *Mimosa heterophylla* Hassl., nom. illeg.
Hierba. Endémica. 400-500 m.
Países: PRY(CAU).

Mimosa eriocarpa Benth.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Mimosa eurystegia Barneby ex M.
Morales, O.S. Ribas & J. Santos-Silva
Subarbusto. Endémica. 1500-1700 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa excedentis Izag. & Beyhaut
Hierba. Endémica.
Países: URY(ART, LAV, RIV, ROC).

Mimosa fachinalensis Burkart
Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Mimosa farinosa Griseb.
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SDE, TUC).

Mimosa fernandez-casasii Barneby &
Fortunato
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CAN).

Mimosa fiebrigii Hassl.
Arbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Mimosa filipetiola Burkart
Hierba. Endémica. 800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa flagellaris Benth.
Sin.: *Mimosa flagellaris* Benth. var.
hirsuta Benth.
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-300 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).
PRY(AMA, CAU, CON, COA, GUA, PAI).
URY(ART, CLA, RIV, SAO, TAC).

Mimosa flocculosa Burkart
Sin.: *Mimosa incana* (Spreng.) Benth.
var. *robusta* J.F. Macbr.
Arbusto. Nativa. 200-400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA,
AMA, CAU, CAN, COA).

Mimosa furfuracea Benth.
Sin.: *Mimosa furfuracea* Benth. var.
catharinensis Burkart, *Mimosa furfuracea*
Benth. var. *paranaensis* Burkart
Arbusto. Nativa. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa glabra Benth.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Mimosa glandulisetia Burkart
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). PRY(APA).

Mimosa glutinosa Chodat & Hassl.
Sin.: *Mimosa apodocarpa* Benth. var.
intermedia Hassl., hom. illeg., *Mimosa*
macrostachya Poir. var. *glaberrima*
(Chodat & Hassl.) J.F. Macbr., *Mimosa*
millefoliata Scheele var. *glaberrima*
Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

Mimosa glycyrrhizoides Barneby
Arbusto. Endémica. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Mimosa gracilis Benth. var. **leiocarpa**
(Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa graminiformis* Chodat &
Hassl., *Mimosa selloi* (Benth.) Benth. var.
leiocarpa Burkart
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS,
SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, ITA,
MIE, PAI).

Mimosa gracilis Benth. subsp.
capillipes (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa capillipes* Benth.,
Mimosa capillipes Benth. var. *brevifolia*
Benth., *Mimosa capillipes* Benth. var.
microphylla Benth.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS). PRY(CAA, SPE).

Mimosa gracilis Benth. subsp. **gracilis**
Sin.: *Mimosa gracilis* Benth. f. *glabrifolia*
(Chodat & Hassl.) Hassl., *Mimosa gracilis*
Benth. f. *hirsutissima* Hassl., nom. superfl.,
Mimosa gracilis Benth. f. *longepedunculata*
Hassl., *Mimosa gracilis* Benth. var. *genuina*
Hassl., nom. inval., *Mimosa gracilis* Benth.
var. *intermedia* Hassl., *Mimosa serpens*
Chodat & Hassl. var. *glabrifolia* Chodat &
Hassl., *Mimosa serpens* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 500-
1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CAU, COA, SPE).

Mimosa guaranitica Chodat & Hassl.
Sin.: *Mimosa guaranitica* Chodat &
Hassl. f. *heterotricha* Burkart
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA,
CEN, COA, ÑEE, PAI, SPE).

Mimosa gymnas Barneby
Subarbusto. Nativa. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa hatschbachii Barneby
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa hexandra Micheli
Sin.: *Mimosa acanthophora* Harms,
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze f.
micheliana Hassl., *Mimosa bimucronata*
(DC.) Kuntze f. *vepres* (Lindm.) Hassl.,
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze
subsp. *hexandra* (Micheli) Hassl.,
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze
var. *gymnocarpa* Hassl., *Mimosa*
bimucronata (DC.) Kuntze var. *hexandra*
(Micheli) J.F. Macbr., *Mimosa coroncoro*
Killip & Dugand, *Mimosa fascifolia*
Rizzini, *Mimosa hexandra* Micheli var.
tropica S. Moore, *Mimosa hexandra*
Micheli var. *vepres* (Lindm.) Chodat &
Hassl., *Mimosa vepres* Lindm.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(Fuera
del área del proyecto). PRY(APY, CEN,
CON, ÑEE, PAI, PHA).

Mimosa hilariana Barneby

Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa hirsutissima Mart.

Sin.: *Mimosa dispersa* Benth., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *alboffiana* Burkart, *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *longipila* Benth., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *missionum* Burkart, *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *villosissima* Benth., *Mimosa sturtiana* Huber, *Mimosa tomentosa* Humb. & Bonpl. ex Willd., nom. illeg.
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, SPE).

Mimosa implexa Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).

Mimosa incana (Spreng.) Benth.

Sin.: *Acacia incana* Spreng., *Acacia sprengelii* Hook. & Arn., *Mimosa crassipes* Arechav.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, DUR, RIV, TAC).

Mimosa insignis (Hassl.) Barneby

Sin.: *Schrankiastrum insigne* Hassl.
Arbusto. Nativa. 200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Mimosa intricata Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).

Mimosa invis Mart. ex Colla var. **invisa**

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN, CEN, PAI, PHA).

Mimosa invis Mart. ex Colla var.

macrostachya (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa calistachya* C. Presl, *Mimosa macrostachya* (Benth.) J.F. Macbr., nom. illeg., *Schrankia macrostachya* Benth.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Mimosa involucrata Benth.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mimosa iperoensis Hoehne var. **iperoensis**

Sin.: *Mimosa adenocarpa* Benth. f. *paraguariensis* Hassl., *Mimosa adenocarpa* Benth. var. *multiglandulosa* Hassl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-600 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU).

Mimosa iperoensis Hoehne var. **paradenia** Barneby

Sin.: *Mimosa adenocarpa* Benth. f. *inermis* Hassl.
Arbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: PRY(CAN).

Mimosa kermesina Otto & A. Dietr.

Sin.: *Mimosa lucidula* Benth.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Mimosa kuhniesteroides Barneby

Subarbusto. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa lanata Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa lasiocephala Benth.

Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Mimosa leimonias Barneby & Fortunato

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Mimosa lepidorepens Burkart

Subarbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(SCA).

Mimosa longiracemosa (Burkart) Barneby

Sin.: *Mimosa callosa* Benth. var. *longiracemosa* Burkart
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: ARG(MIS).

Mimosa luciana Barneby

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(CAS, FLA, MAL, ROC).

Mimosa lupinoides Chodat & Hassl.

Sin.: *Mimosa lupinoides* Chodat & Hassl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. f. *ferruginea* Hassl., nom. superfl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. f. *glabrescens* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. f. *hirsuta* Hassl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var.

lupinoides (Chodat & Hassl.) Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-400 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Mimosa macrocalyx Micheli var. **macrocalyx**

Arbusto o subarbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, GUA, PAI).

Mimosa macrocalyx Micheli var. **pectinata** Burkart

Arbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Mimosa magentea Izag. & Beyhaut

Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(LAV, MAL).

Mimosa maracayuensis Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN).

Mimosa micropteris Benth. var. **micropteris**

Arbusto. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa micropteris Benth. var. **pungens** (Burkart) Barneby

Sin.: *Mimosa regnellii* Benth. var. *pungens* Burkart
Arbusto. Endémica. 400-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa monadelpha Chodat & Hassl. var. **glabrata** (Hassl.) Barneby

Sin.: *Mimosa amambayensis* Hassl. var. *glabrata* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Mimosa monadelpha Chodat & Hassl. var. **monadelpha**

Sin.: *Mimosa amambayensis* Hassl., *Mimosa monadelpha* Chodat & Hassl. var. *hirsuto-puberula* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Mimosa morongii Britton

Sin.: *Mimosa argillicola* Hassl.
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: PRY(CEN).

Mimosa murex Barneby

Arbusto. Endémica. 1000-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Mimosa myriophylla Bong. ex Benth.
Sin.: *Mimosa pluriracemosa* Burkart
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(MIE, PAI).

Mimosa niederleinii Burkart
Sin.: *Mimosa niederleinii* Burkart var. *riograndensis* Burkart
Hierba o subarbusto. Endémica. 400-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mimosa nitidula Barneby
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Mimosa oblonga Benth. var. **oblonga**
Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa oblonga Benth. var. **pinetorum** Barneby
Arbusto o subarbusto. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa obstrigosa Burkart
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(PAY).

Mimosa oligophylla Micheli
Hierba o subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, COA, GUA, PAI).

Mimosa orthacantha Benth.
Sin.: *Mimosa botucatuana* Hoehne
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa ostenii Speg. ex Burkart
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(ERI). URY(PAY, SAO).

Mimosa paludosa Benth.
Sin.: *Mimosa setosa* Benth. subsp. *paludosa* (Benth.) Barneby
Subarbusto. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Mimosa paraguayana Micheli var. **multiglandulosa** (Hassl.) Barneby
Sin.: *Mimosa cordistipula* Benth. var. *multiglandulosa* Hassl., *Mimosa cordistipula* Benth. var. *pubescens* Hassl.
Subarbusto. Endémica. 300-400 m.
Países: PRY(CAU).

Mimosa paraguayana Micheli var. **paraguayana**
Sin.: *Mimosa paraguayana* Micheli f. *induta* Hassl., *Mimosa paraguayana* Micheli var. *chacoensis* Hassl., *Mimosa paraguayana* Micheli var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Mimosa paraguayana* Micheli var. *induta* (Hassl.) J.F. Macbr., *Mimosa trachycarpa* Benth. var. *inermis* Burkart
Arbusto. Endémica. 100-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, ITA, PHA, SPE).

Mimosa paraguayana Micheli var. **tomentosa** (Hassl.) Barneby
Sin.: *Mimosa cordistipula* Benth. var. *tomentosa* Hassl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Mimosa paranapiacabae Barneby
Arbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa parvipinna Benth.
Subarbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). PRY(CAU). URY(FLA, RIV, TAC).

Mimosa paupera Benth. var. **dives** Barneby
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Mimosa paupera Benth. var. **paupera**
Sin.: *Mimosa paupera* Benth. var. *longepedunculata* Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, GUA, ITA). URY(ART, MAL, PAY, SAO).

Mimosa pauperoides (Burkart) Fortunato
Sin.: *Mimosa balansae* Micheli var. *pauperoides* Burkart, *Mimosa brevipetiolata* Burkart var. *pauperoides* (Burkart) Barneby
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(SAO).

Mimosa pedersenii Barneby
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN). URY(ART, MON, TAC, TYT).

Mimosa pedunculosa Micheli
Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: PRY(CAU, CAA, CAN, MIS, SPE).

Mimosa per-dusenii Burkart
Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mimosa petraea Chodat & Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAA, COA, GUA, PAI).

Mimosa pigra L. var. **dehiscens** (Barneby) Glazier & Mackinder
Sin.: *Mimosa pellita* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *dehiscens* Barneby
Arbusto. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CON, COA, PHA).

Mimosa pigra L. var. **pigra**
Sin.: *Mimosa asperata* L. f. *armata* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *aspera* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *glabrescens* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *inermis* Hassl., hom. illeg., *Mimosa asperata* L. f. *inermis* Lindm., *Mimosa asperata* L. f. *longepedunculata* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *mollis* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *pubescens* (Benth.) Hassl., *Mimosa asperata* L. var. *laevior* DC., nom. illeg., *Mimosa asperata* L. var. *pigra* (L.) Willd., comb. illeg., *Mimosa asperata* L. var. *scandens* Ducke, *Mimosa asperata* L., *Mimosa bellatrix* Hoffmanns. ex Steud., nom. nud., *Mimosa canescens* Willd., *Mimosa ciliata* Willd., *Mimosa cinerea* Benth. var. *pubescens* Benth., *Mimosa habbas* Delile, nom. superfl., *Mimosa pellita* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Mimosa polyacantha* Willd., *Mimosa procumbens* Schumach., *Mimosa sicaria* Hoffmanns., *Mimosa vellosiella* Herter var. *pubescens* (Benth.) Burkart
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(COL, SJO, SOR).

Mimosa pilulifera Benth. var. **pilulifera**
Sin.: *Mimosa pilulifera* Benth. f. *calvescens* Malme, *Mimosa tacuarembensis* Arechav.
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CLA, COL, DUR, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

- Mimosa pilulifera** Benth. var. **pseudincana** (Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa aparadensis* Burkart, *Mimosa pilulifera* Benth. var. *discolor* Burkart, *Mimosa pseudincana* Burkart, *Mimosa simulans* Burkart
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CLA, MON, PAY, RNO, SJO, TAC).
- Mimosa plumosa** Micheli
Arbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: PRY(AMA, CAU, COA, PAI).
- Mimosa polycarpa** Kunth var. **polycarpa**
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Mimosa polycarpa** Kunth var. **spgazzini** (Pirotta ex Hook. f.) Burkart
Sin.: *Mimosa pachecensis* S. Moore, *Mimosa polychaeta* Malme, *Mimosa spgazzini* Pirotta ex Hook. f.
Arbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
- Mimosa polycarpa** Kunth var. **subandina** Barneby
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Mimosa prionopus** Barneby
Subarbusto. Endémica. 1200 m.
Países: BRA(PAR).
- Mimosa pseudocallosa** Burkart
Subarbusto. Endémica. 1300 m.
Países: BRA(SCA).
- Mimosa pseudolepidota** (Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa niederleinii* Burkart var. *pseudolepidota* Burkart
Subarbusto. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(SCA).
- Mimosa pseudopetiolaris** Barneby
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, PAI).
- Mimosa pseudotrachycarpa** Barneby
Arbusto. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Mimosa pudica** L. var. **hispida** Brenan
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Mimosa pudica** L. var. **tetrandra** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) DC.
Sin.: *Mimosa tetrandra* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Hierba o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Mimosa ramboi** Burkart
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, CAS, PAY).
- Mimosa ramentacea** Burkart
Arbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: BRA(SCA).
- Mimosa ramosissima** Benth.
Arbusto. Nativa. 800-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Mimosa ramulosa** Benth.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TYT).
- Mimosa reduviosa** Barneby
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Mimosa regnellii** Benth. var. **exuta** Barneby
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
- Mimosa regnellii** Benth. var. **grossiseta** Barneby
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Mimosa regnellii** Benth. var. **regnellii**
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Mimosa regnellii** Benth. var. **supersetosa** (Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa supersetosa* Burkart, *Mimosa supersetosa* Burkart var. *rufohispidula* Burkart
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Mimosa reptans** Benth.
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). URY(DUR, LAV, MAL, RNO, RIV, TAC).
- Mimosa riverensis** Izag. & Beyhaut
Hierba. Endémica.
Países: URY(RIV).
- Mimosa rocae** Lorentz & Niederl.
Subarbusto. Endémica. 200-700 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, PAY).
- Mimosa rojasii** Hassl.
Subarbusto. Endémica. 300-800 m.
Países: PRY(AMA).
- Mimosa rupestris** Benth.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(LAV, RIV).
- Mimosa scabrella** Benth.
Sin.: *Mimosa bracaatinga* Hoehne, *Mimosa bracaatinga* Hoehne f. *paucijuga* Hoehne, *Mimosa bracaatinga* Hoehne var. *aspericarpa* Hoehne, *Mimosa scabrella* Benth. var. *aspericarpa* (Hoehne) Burkart, *Mimosa secunda* Hoehne ex Angely, nom. nud.
Árbol. Nativa. 700-1900 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Mimosa sceptrum** Barneby
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).
- Mimosa schininii** M. Morales, Grohar & Fortunato
Arbusto o subarbusto. Endémica.
Países: PRY(AMA).
- Mimosa schleidenii** Herter
Sin.: *Mimosa lindleyi* Burkart, *Mimosa marginata* Lindl., hom. illeg., *Mimosa prostrata* Schleid. & Vogel, nom. nud.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, TAC, TYT).
- Mimosa selloi** (Benth.) Benth.
Sin.: *Schrankia selloi* Benth.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Mimosa sensibilis** Griseb. var. **aquidabani** Barneby
Arbusto. Nativa. 300-400 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).
- Mimosa sensibilis** Griseb. var. **sensibilis**
Sin.: *Mimosa sensibilis* Griseb. var. *urucumensis* Barneby, *Mimosa velloziana* Mart. f. *moorei* Hoehne
Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CHO, CON).
- Mimosa sensitiva** L.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Mimosa serra Burkart

Subarbusto. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Mimosa sobralii Grings & O.S. Ribas

Árbol. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(RGS).

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **lasiocarpa** (Benth.)

Barneby

Sin.: *Mimosa acutiflora* Benth., *Mimosa lasiocarpa* Benth., *Mimosa lasiocarpa* Benth. f. *glabriflora* Hassl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**

Sin.: *Mimosa articulata* Duch., nom. nud., *Mimosa palpitans* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Mimosa podocarpa* Benth., *Mimosa quadrijuga* Salzm. ex Benth., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. f. *viscida* Chodat & Hassl., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *glandulosa* Griseb., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *podocarpa* (Benth.) Niederl., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *quadrijuga* (Benth.) Niederl., *Mimosa somniculosa* Kunth, *Mimosa tobagensis* Urb., *Mimosa vialis* Benth., nom. nud.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA).

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **viscida** (Willd.) Barneby

Sin.: *Mimosa trijuga* Benth., *Mimosa viscida* Willd.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CON).

Mimosa sparsa Benth.

Arbusto. Endémica. 500-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mimosa sparsiformis Barneby

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Mimosa sprengelii DC.

Sin.: *Mimosa alegretense* Marchiori, *Mimosa ciliata* Spreng., hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, COL, DUR, LAV, MAL, RIV, ROC, SAO, TAC).

Mimosa strigillosa Torr. & A. Gray

Sin.: *Mimosa dolichocephala* Harms, *Mimosa dolichocephala* Harms var. *sabulicola* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Mimosa sabulicola* Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE). URY(CLA, FLO, RNO, SOR, TAC).

Mimosa strobiliflora Burkart

Arbusto. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(PAR).

Mimosa subinermis Benth.

Arbolito. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Mimosa subsericea Benth.

Sin.: *Mimosa loeseneriana* Glaz., nom. nud., *Mimosa stipularis* Bong. ex Benth., *Mimosa subsericea* Benth. f. *acerosa* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. f. *minor* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *hirsuto-strigosa* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *oblonga* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *strigosa* Chodat & Hassl., *Mimosa xanthocentra* Mart. subsp. *subsericea* (Benth.) Barneby

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Mimosa taimbensis Burkart

Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Mimosa tandilensis Speg.

Arbusto. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(LAV, MAL).

Mimosa tarda Barneby

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Mimosa tenuipendula Burkart

Arbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: PRY(APY).

Mimosa terribilis Marchiori & Sobral ex Schmidt-Silveira & Miotto

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Mimosa tobatiensis Barneby & Fortunato

Arbusto. Nativa. 200 m.
Países: PRY(CEN, COA).

Mimosa trachycarpa Benth.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, TYT).

Mimosa troncosoae Fortunato & Barneby

Árbol. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(APY).

Mimosa tucumensis Barneby ex O.S. Ribas, M. Morales & J. Santos-Silva

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Mimosa tweedieana Barneby ex Glazier & Mackinder

Sin.: *Mimosa asperata* L. var. *glabrior* Hook. & Arn., *Mimosa tweedieana* Barneby, nom. nud., *Mimosa vellosiana* Herter, nom. nud., *Mimosa vellosiella* Herter

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, SPE). URY(SJO).

Mimosa uliginosa Chodat & Hassl.

Arbusto o arbolito. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAN, COA).

Mimosa uninervis (Chodat & Hassl.) Hassl.

Sin.: *Mimosa papposa* Benth. var. *uininervis* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 300-400 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, SPE).

Mimosa uraguensis Hook. & Arn.

Sin.: *Mimosa uruguayensis* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, FLA, MON, PAY, RNO, SAO).

Mimosa urticaria Barneby

Sin.: *Mimosa parasordida* Burkart, nom. nud.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Mimosa velloziana Mart.

Sin.: *Mimosa heterocarpa* C. Presl, *Mimosa jiramenensis* H. Karst., *Mimosa velloziana* Mart. var. *glabra* Wawra, *Mimosa velloziana* Mart. var. *jiramenensis* (H. Karst.) Benth., *Mimosa velloziana* Mart. var. *oranensis* Burkart, *Mimosa viva* Vell., hom. illeg.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(ITA).

Mimosa weddelliana Benth.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Mimosa xanthocentra Mart. var. **mansii** (Mart.) Barneby

Sin.: *Mimosa mansii* Mart., *Mimosa polycarpa* Kunth var. *subglabrata* Hoehne, *Mimosa subsericea* Benth. f. *armata* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *strigoso-aculeata* Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, GUA, PAI).

Mimosa xanthocentra Mart. var. **xanthocentra**

Sin.: *Mimosa longipinna* Benth., *Mimosa stenoptera* Benth., *Mimosa killipii* Britton & Rose ex Britton & Killip, *Mimosa subsericea* Benth. f. *acerosa* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. f. *armata* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *strigoso-aculeata* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 200-2300 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL).
BRA(SCA). PRY(APY, CEN, CON, PHA).

Mimozyanthus Burkart**Mimozyanthus carinatus** (Griseb.) Burkart

Sin.: *Mimosa carinata* Griseb., *Mimosa carinata* Griseb. ex Lorentz, nom. nud.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
PRY(APY, PHA).

Mucuna Adans.**Mucuna pruriens** (L.) DC.

Sin.: *Dolichos pruriens* L.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mucuna sloanei Fawc. & Rendle

Sin.: *Dolichos urens* Jacq., hom. illeg.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Mucuna urens (L.) Medik.

Sin.: *Dolichos urens* L., *Mucuna urens* (L.) DC., hom. illeg.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Muellera L. f.**Muellera campestris** (Mart. ex Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Sin.: *Derris leucanthus* (Burkart) N.F. Mattos, *Lonchocarpus albiflorus* Hassl., *Lonchocarpus campestris* Mart. ex Benth., *Lonchocarpus leucanthus* Burkart, *Lonchocarpus mollis* Benth.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA).

Muellera fluvialis (Lindm.) Burkart

Sin.: *Couplandia fluvialis* Lindm., *Lonchocarpus fluvialis* (Lindm.) Fortunato & Palese, *Lonchocarpus fluvialis* (Lindm.) Gómez-Sosa, comb. superfl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SFE).
PRY(APY, BOQ, CEN, CON, PHA).

Muellera graciliflora (M.J. Silva A.M.G. Azevedo G.P. Lewis) A.M.G. Azevedo

Sin.: *Lonchocarpus graciliflorus* M.J. Silva A.M.G. Azevedo G.P. Lewis
Árbol. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Muellera grazielae (M.J. Silva & A.M.G. Azevedo) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Sin.: *Lonchocarpus grazielae* M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
Árbol. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Muellera nudiflora (Burkart) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Sin.: *Lonchocarpus nudiflorens* Burkart
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

Muellera sericea (Micheli) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Sin.: *Bergeronia sericea* Micheli
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL).
PRY(CEN, CON, PHA).

Muellera torrensii (N.F. Mattos) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Sin.: *Derris torrensii* (N.F. Mattos) N.F. Mattos, *Lonchocarpus torrensii* N.F. Mattos
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Myrocarpus Allemão**Myrocarpus frondosus** Allemão

Sin.: *Leptolobium punctatum* Benth., *Myrocarpus frondosus* Allemão f. *paraguariensis* (Hallier f.) Hassl., *Myrocarpus paraguariensis* Hallier f.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI).

Myroxylon L. f., nom. cons.**Myroxylon peruiferum** L. f.

Sin.: *Myrospermum pedicellatum* Lam.
Árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).

Neonotonia Lackey**Neonotonia wightii** (Graham ex Wight & Arn.) Lackey

Sin.: *Glycine bujacia* Benth., *Glycine wightii* (Graham ex Wight & Arn.) Verdc., *Johnia wightii* (Graham ex Wight & Arn.) Wight & Arn., hom. illeg., *Notonia wightii* Graham ex Wight & Arn.
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Neptunia Lour.**Neptunia plena** (L.) Benth.

Sin.: *Acacia lycopodioides* (Desf.) Desv., *Acacia punctata* (L.) Desv., *Desmanthus comosus* A. Rich., *Desmanthus plenus* (L.) Willd., *Desmanthus polyphyllus* DC., *Desmanthus punctatus* (L.) Willd., *Mimosa lycopodioides* Desf., *Mimosa plena* L., *Mimosa punctata* L., *Neptunia polyphylla* (DC.) Benth.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON, PHA).

Neptunia pubescens Benth.

Sin.: *Neptunia floridana* Small, *Neptunia lindheimeri* Rob., *Neptunia mazatlana* Britton & Rose, *Neptunia pubescens* Benth. var. *floridana* (Small) B.L. Turner, *Neptunia pubescens* Benth. var. *lindheimeri* (Rob.) B.L. Turner
Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS).
PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA).
URY(ART, CLA, DUR, RNO).

Nissolia Jacq., nom. cons.**Nissolia brasiliensis** (Vogel) T.M.

Moura & Fort.-Perez

Sin.: *Chaetocalyx belizensis* Standl.,
Chaetocalyx brasiliensis (Vogel) Benth.,
Chaetocalyx ilheoticus Taub., *Chaetocalyx*
latifolia Benth. var. *setulifera* Burkart,
Chaetocalyx latifolius Benth. var.*latifolius*, *Chaetocalyx matudai* Lundell,
Rhadinocarpus brasiliensis Vogel

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA,
CEN, CON, COA, GUA, PHA).**Nissolia chacoensis** (Vanni) T.M.

Moura & Fort.-Perez

Sin.: *Chaetocalyx chacoensis* Vanni

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(APY, BOQ).

Nissolia fruticosa Jacq. var.**guatemalensis** (Rose) RuddSin.: *Nissolia guatemalensis* Rose,
Pseudomachaerium rojasianum Hassl.

Enredadera. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL,
TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APA, CAU, CEN, GUA, PAI, SPE).**Nissolia longiflora** (Benth. ex A. Gray)

T.M. Moura & Fort.-Perez

Sin.: *Chaetocalyx glaziovii* Taub.,
Chaetocalyx hebecarpus Benth.,
Chaetocalyx hebecarpus Benth. var. *mollis*
Benth., *Chaetocalyx hebecarpus* Benth.
var. *oblongifolius* Benth., *Chaetocalyx*
longiflorus Benth. ex A. Gray

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR). PRY(APA, COA).**Nissolia nigricans** (Burkart) T.M.

Moura & Fort.-Perez

Sin.: *Chaetocalyx nigricans* Burkart
Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR,
SCA). PRY(APA). URY(ART, SAO).**Nissolia vincentina** (Ker Gawl.) T.M.

Moura & Fort.-Perez

Sin.: *Chaetocalyx pubescens* DC.,
Chaetocalyx scandens (L.) Urb. var.
pubescens (DC.) Rudd, *Chaetocalyx*
scandens (L.) Urb., *Coronilla scandens* L.,
Glycine vincentina Ker Gawl.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ononis L.**Ononis mitissima** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: URY(MON).

Ormosia Jacks.**Ormosia arborea** (Vell.) HarmsSin.: *Abrus arboreus* Vell., *Ormosia*
acuta Vogel

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ormosia fastigiata Tul.Sin.: *Ormosia escragnoilliana* Glaz.,
Ormosia glazioviana Harms

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR).

Ornithopus L.**Ornithopus compressus** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(BIO).

Ornithopus micranthus (Benth.)

Arechav.

Sin.: *Arthrolobium micranthum* Benth.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). URY(CAS, CLA, DUR, FLA,
MAL, MON, ROC, SJO, TAC, TYT).**Ornithopus pinnatus** (Mill.) Druce

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(BIO).

Ornithopus sativus Brot.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(BIO).

Otholobium C.H. Stirt.**Otholobium glandulosum** (L.) J.W.

Grimes

Sin.: *Hoita glandulosa* (L.) Rydb.,*Lotodes glandulosum* (L.) Kuntze,*Psoralea glandulosa* L.

Arbusto o árbol. Endémica. 600-1400 m.

Países: CHL(AYP, TAR, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).**Otholobium higuierilla** (Gillies ex

Hook.) J.W. Grimes

Sin.: *Psoralea higuierilla* Gillies ex
Hook., *Psoralea monosperma* (Griseb.)J.F. Macbr., *Rhynchosia monosperma*
Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Otholobium pubescens (Poir.) J.W.

Grimes

Sin.: *Hoita hirsuta* Rusby, *Hoita*
versicolor Rusby, *Psoralea lasiostachys*
Vogel, *Psoralea pubescens* Poir. var.
lasiostachys (Vogel) J.F. Macbr., *Psoralea*
pubescens Poir., *Psoralea remotiflora* J.F.
Macbr.

Arbusto. Nativa. 2000-3000 m.

Países: CHL(TAR).

Pachyrhizus Rich. ex DC.**Pachyrhizus ahipa** (Wedd.) ParodiSin.: *Dolichos ahipa* Wedd., *Pachyrhizus*
ahipa (Wedd.) Parodi var. *albiflora*Parodi, *Pachyrhizus ahipa* (Wedd.) Parodi
var. *violacea* Parodi

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ).

Parapiptadenia Brenan**Parapiptadenia excelsa** (Griseb.)

Burkart

Sin.: *Piptadenia communis* Benth. var.
excelsa Griseb., *Piptadenia excelsa* (Griseb.)
Lillo, *Piptadenia excelsa* (Griseb.) Lillo
f. *jujuensis* Griseb., *Piptadenia excelsa*
(Griseb.) Lillo f. *tucumanensis* Lillo, *Prosopis*
herzogii Harms

Árbol. Nativa. 600-2900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC). BRA(PAR). PRY(CEN, COA).**Parapiptadenia rigida** (Benth.) BrenanSin.: *Acacia angico* Mart., *Piptadenia*
rigida Benth., *Piptadenia rigida* Benth.
var. *grandis* Lindm.

Árbol. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA,
AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA,
GUA, ITA, PAI). URY(ART, CLA, MON,
RIV, ROC, SAO).**Parasenegalia** Seigler & Ebinger**Parasenegalia visco** (Lorentz ex

Griseb.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia concinna* Phil., hom. illeg.,
Acacia platensis Manganaro, *Acacia*
polyphylla Clos, hom. illeg., *Acacia visco*

Lorentz ex Griseb., *Lysiloma polyphylla* (Clos) Benth., *Manganaroa platensis* (Manganaro) Speg., *Manganaroa subsericea* Speg., *Senegalia visco* (Lorentz ex Griseb.) Seigler & Ebinger

Árbol. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Parkinsonia L.

Parkinsonia aculeata L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, SAL, SDE, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, TAC).

Parkinsonia andicola (Griseb.) Varjão & Mansano

Sin.: *Cercidium andicola* Griseb., *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms var. *andicola* (Griseb.) Hosseus
Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(JUU, TUC).

Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins

Sin.: *Caesalpinia praecox* Ruiz & Pav. ex Hook., *Cercidium australe* I.M. Johnst., *Cercidium plurifoliolatum* Micheli, *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. *glaucum* (Cav.) Burkart & Carter, *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms, *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hauman, nom. illeg., *Cercidium spinosum* Tul., *Pomaria glauca* Cav.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, AMA, BOQ, PHA).

Paubrasilia E. Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis

Paubrasilia echinata (Lam.) E.

Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia echinata* Lam.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Peltophorum (Vogel) Benth.

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.

Sin.: *Brasilettia dubia* (Spreng.)

Kuntze, *Caesalpinia dubia* Spreng., *Peltophorum vogelianum* Benth. f. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Peltophorum vogelianum* Benth. f. *glabrata* Chodat & Hassl., *Peltophorum vogelianum* Benth. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Peltophorum vogelianum* Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, MON, RNO, SAO).

Periandra Mart. ex Benth.

Periandra mediterranea (Vell.) Taub.

Sin.: *Glycinopsis mediterranea* (Vell.) Kuntze, *Glycirrhis mediterranea* Vell., *Periandra angulata* Benth., *Periandra dulcis* Mart. ex Benth., *Periandra mediterranea* (Vell.) Taub. var. *linearifoliolata* N.F. Mattos & F. Oliveira, *Periandra mediterranea* (Vell.) Taub. var. *microphylla* N.F. Mattos & F. Oliveira, *Periandra mediterranea* (Vell.) Taub. var. *mucronata* (Benth.) Burkart ex N.F. Mattos & F. Oliveira, *Periandra mucronata* Benth., *Periandra racemosa* Benth.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Phaseolus L.

Phaseolus augusti Harms

Sin.: *Phaseolus bolivianus* Piper
Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Phaseolus lunatus L. var. **lunatus**

Liana. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS).

Phaseolus lunatus L. var. **sylvester** Baudet

Enredadera. Nativa. 300-1600 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL).

Phaseolus vulgaris L. var.

aborigineus (Burkart) Baudet
Sin.: *Phaseolus aborigineus* Burkart, *Phaseolus vulgaris* L. subsp. *aborigineus* (Burkart) Burkart
Enredadera. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Piptadenia Benth.

Piptadenia adiantoides (Spreng.) J.F. Macbr.

Sin.: *Acacia adiantoides* Spreng.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Piptadenia affinis Burkart

Liana. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(SCA).

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. var. **gonoacantha**

Sin.: *Acacia gonoacantha* Mart., *Piptadenia communis* Benth., *Pityrocarpa gonoacantha* (Mart.) Brenan
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON).

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. var. **inermis** Burkart

Árbol. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piptadenia paniculata Benth. var. **aculeata** Burkart

Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(SCA).

Piptadenia paniculata Benth. var. **paniculata**

Sin.: *Pityrocarpa paniculata* (Benth.) Brenan
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piptadeniopsis Burkart

Piptadeniopsis lomentifera Burkart

Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Plathymenia Benth.

Plathymenia reticulata Benth.

Sin.: *Pirotantha modesta* Speg., *Plathymenia foliolosa* Benth., *Plathymenia foliolosa* Benth. var. *paraguayensis* Chodat & Hassl., *Plathymenia modesta* (Speg.) Burkart, *Plathymenia reticulata* Benth. var. *paraguayensis* (Chodat & Hassl.) Malmé
Árbol. Nativa. 300-1100 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Platycyamus Benth.**Platycyamus regnelli** Benth.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Platymiscium Vogel**Platymiscium floribundum** Vogel var. **floribundum**

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Platymiscium floribundum Vogel var. **latifolium** (Benth.) Benth.

Sin.: *Platymiscium cordatum* Taub., *Platymiscium floribundum* Vogel var. *majus* Benth., *Platymiscium latifolium* Benth.

Árbol. Nativa. 200-300 m.

Países: BRA(PAR).

Platypodium Vogel**Platypodium elegans** Vogel

Sin.: *Platypodium elegans* Vogel var. *major* Benth.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).

Poecilanthe Benth.**Poecilanthe parviflora** Benth.

Sin.: *Poecilanthe parviflora* Benth. var. *floribunda* Hassl.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA). URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

Poiretia Vent.**Poiretia angustifolia** Vogel

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Poiretia latifolia Vogel

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA).

Poiretia longipes Harms

Sin.: *Poiretia longipetiolata* Hoehne

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Poiretia tetraphylla (Poir.) Burkart

Sin.: *Poiretia psoraloides* DC., *Psoralea tetraphylla* Poir.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).

Poissonia Baill.**Poissonia heterantha** (Griseb.) Lavin

Sin.: *Coursetia heterantha* (Griseb.) Lavin *Neocracca heterantha* (Griseb.) Speg. var. *minor* (R.E. Fr.) Burkart, *Neocracca heterantha* (Griseb.) Speg., *Neocracca kuntzei* (Harms ex Kuntze) Kuntze var. *minor* R.E. Fr., *Tephrosia heterantha* Griseb.

Hierba. Nativa. 500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Poissonia hypoleuca (Speg.) Lillo

Sin.: *Chiovendaea hypoleuca* Speg., *Coursetia hypoleuca* (Speg.) Lavin, *Poissonia hypoleuca* (Speg.) Hauman, hom. illeg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Pomaria Cav.**Pomaria parviflora** (Micheli) B.B.

Simpson & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia balansae* Ulibarri, *Hoffmannseggia parviflora* Micheli
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Pomaria pilosa (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia epunctata* (Vogel) Benth., *Caesalpinia modesta* Arechav., *Caesalpinia pilosa* (Vogel) Benth., *Cladotrichium epunctatum* Vogel, *Cladotrichium pilosum* Vogel
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(COA). URY(CLA, RNO, RIV, TAC, TYT).

Pomaria rubicunda (Vogel) B.B.

Simpson & G.P. Lewis var. **hauthalii** (Harms) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia dictamnoides* Chodat & Hassl. f. *punctata* Chodat & Hassl., *Caesalpinia dictamnoides* Chodat & Hassl., *Caesalpinia hauthalii* Harms, *Caesalpinia rubicunda* (Vogel) Benth. var. *hauthalii*

(Vogel) Hassl., *Caesalpinia rubicunda* (Vogel) Benth. var. *intermedia* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA).

Pomaria rubicunda (Vogel) B.B.

Simpson & G.P. Lewis var. **rubicunda**

Sin.: *Caesalpinia rubicunda* (Vogel) Benth., *Caesalpinia rubicunda* (Vogel) Benth. f. *subobtusata* Chodat & Hassl., *Caesalpinia rubicunda* (Vogel) Benth. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Cladotrichium rubicundum* Vogel
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, SPE). URY(ART, MON, SAO).

Pomaria stipularis (Vogel) B.B.

Simpson & G.P. Lewis

Sin.: *Caesalpinia stipularis* (Vogel) Benth., *Cladotrichium stipulare* Vogel
Arbusto. Nativa. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Prosopidastrum Burkart**Prosopidastrum angusticarpum** R.A.

Palacios & Hoc

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE, SLU).

Prosopidastrum benthami (Chodat & Hassl.) R.A. Palacios & Hoc

Sin.: *Prosopis benthami* Chodat & Wilczek

Arbusto. Endémica. 800-1800 m.
Países: ARG(MEN).

Prosopidastrum dehiscens R.A.

Palacios & Hoc

Arbusto. Endémica. 1400-2200 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Prosopidastrum globosum (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart

Sin.: *Mimosa gilliesii* Benth., *Mimosa globosa* (Gillies ex Hook. & Arn.) J.F. Macbr., *Prosopis globosa* Gillies ex Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CAT, LPA, MEN, TUC).

Prosopidastrum gracile R.A. Palacios & Hoc

Arbusto. Endémica.

Países: ARG(CAT, MEN, SJU).

Prosopidastrum striatum (Benth.)

R.A. Palacios & Hoc

Sin.: *Mimosa striata* (Benth.) Speg.,
Prosopis striata Benth.Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU,
RNE, SCR).**Prosopis L.****Prosopis abbreviata** Benth.Sin.: *Strombocarpa abbreviata* (Benth.)
Hutch.Arbolito. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, SDE,
SJU, SLU).**Prosopis affinis** Spreng.Sin.: *Prosopis algarrobilla* Griseb.,
Prosopis algarrobilla Griseb. var.
ñandubay (Lorentz ex Griseb.) Hassl.,
Prosopis nandubey Lorentz ex Griseb.Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, SDE, SFE). BRA(RGS).
PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI).
URY(ART, CLA, COL, MON, PAY, RNO,
RIV, SAO, SOR).**Prosopis alba** Griseb. var. **alba**Sin.: *Prosopis atacamensis* Phil.,
Prosopis siliquastrum (Cav. ex Lag.) DC.
var. *longisiliqua* Phil.Árbol. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA). PRY(APY,
CEN, ÑEE, PHA).**Prosopis alba** Griseb. var. **panta** Griseb.Sin.: *Prosopis panta* (Griseb.) Hieron.
Árbol. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
JUJ, SAL, SFE, SLU, TUC). PRY(APY).**Prosopis alpataco** Phil. f. **alpataco**Sin.: *Prosopis stenoloba* Phil.
Arbusto. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI,
MEN, NEU, RNE, SJU).**Prosopis alpataco** Phil. f. **rubra** F.A. RoigArbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(MEN).**Prosopis alpataco** Phil. var. **lamaro**F.A. Roig
Árbol. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(LPA, MEN).**Prosopis argentina** BurkartArbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).**Prosopis burkartii** MuñozArbusto. Endémica.
Países: CHL(TAR).**Prosopis caldenia** BurkartSin.: *Prosopis calden* Monticelli, nom. nud.
Árbol. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN,
RNE, SLU).**Prosopis calingastana** BurkartArbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(SJU).**Prosopis campestris** Griseb.Arbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(COR, SLU).**Prosopis castellanosi** BurkartArbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU).**Prosopis chilensis** (Molina) Stuntz
emend. Burkart var. **catamarcana**Burkart
Árbol. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, TUC).**Prosopis chilensis** (Molina) Stuntz
emend. Burkart var. **chilensis**Sin.: *Acacia siliquastrum* Cav. ex Lag.,
Ceratonía chilensis Molina, *Prosopis*
schinopoma Stuck., *Prosopis siliquastrum*
(Cav. ex Lag.) DC.Árbol. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,
SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR,
ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).
PRY(APY).**Prosopis chilensis** (Molina) Stuntz
emend. Burkart var. **riojana** BurkartÁrbol. Endémica. 1900-2100 m.
Países: ARG(CAT, LRI).**Prosopis denudans** Benth. var.
denudansArbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).**Prosopis denudans** Benth. var.
patagonica (Speg.) Burkart
Sin.: *Prosopis patagonica* Speg.
Arbusto. Endémica. 800-1100 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR).**Prosopis denudans** Benth. var.
stenocarpa BurkartArbusto. Endémica.
Países: ARG(CHU, LPA, SCR).**Prosopis elata** (Burkart) BurkartSin.: *Prosopis campestris* Griseb. var.
elata Burkart
Arbusto o árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, LRI,
SAL, SDE, SFE). PRY(APY, PHA).**Prosopis ferox** Griseb.Arbusto o árbol. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).**Prosopis fiebrigii** HarmsÁrbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, PHA).**Prosopis flexuosa** DC. f. **flexuosa**Sin.: *Acacia flexuosa* Lag., nom. illeg.,
Prosopis alba Griseb. f. *arborescens*
Monticelli, nom. nud., *Prosopis juliflora*
(Sw.) DC. f. *arborescens* Hauman, nom. nud.
Árbol. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA,
LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).
CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).**Prosopis flexuosa** DC. f. **subinermis**
BurkartÁrbol. Endémica.
Países: ARG(BAI, LPA, SAL, SJU, TUC).**Prosopis flexuosa** DC. var. **depressa**
F.A. RoigSin.: *Prosopis alba* Griseb. f. *fruticosa*
(Hauman) Monticelli, *Prosopis juliflora*
(Sw.) DC. f. *fruticosa* Hauman
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU,
RNE, SJU).**Prosopis flexuosa** DC. var. **fruticosa**
(Meyen) F.A. RoigSin.: *Prosopis fruticosa* Meyen
Arbusto. Nativa. 100-800 m.
Países: ARG(LPA, RNE). CHL(AYP,
TAR, ATA, COQ).**Prosopis hassleri** Harms var. **hassleri**Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SFE).
PRY(APY, CEN, CON, PHA).**Prosopis hassleri** Harms var.**nigroides** Burkart
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SFE).

Prosopis humilis Gillies ex Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SLU).

Prosopis kuntzei Harms
Sin.: *Prosopis barbatigradis* Stuck.,
Prosopis casadensis Penz.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, LRI, SAL, SDE, SFE). PRY(APY,
CON, PHA).

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. var.
longispina Burkart
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS).

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. var.
nigra
Sin.: *Prosopis algarrobilla* Griseb. var.
nigra Griseb., *Prosopis dulcis* Kunth var.
australis Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE,
SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS).
PRY(APY, CEN, MIE, ÑEE, PAI, PHA).
URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR).

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. var.
ragonesei Burkart
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SFE).

Prosopis nuda Schinini
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Prosopis pugionata Burkart
Árbol. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,
SJU, SLU).

Prosopis reptans Benth.
Sin.: *Prosopis abbreviata* Benth. var.
argentina Griseb., *Strombocarpa reptans*
(Benth.) A. Gray
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR, LRI, RNE, SDE,
SFE, SJU, TUC).

Prosopis rojasiana Burkart
Sin.: *Prosopis striata* Fiebrig & Rojas
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Prosopis rubiflora Hassl.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

Prosopis ruizleali Burkart
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU).

Prosopis ruscifolia Griseb.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL,
SDE, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, CON, PHA).

Prosopis sericantha Gillies ex Hook.
& Arn.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,
LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,
TUC). PRY(APY).

Prosopis strombulifera (Lam.) Benth.
var. **ruiziana** Burkart
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(MEN).

Prosopis strombulifera (Lam.) Benth.
var. **strombulifera**
Sin.: *Acacia strombulifera* (Lam.)
Willd., *Mimosa circinalis* Cav., nom. illeg.,
Mimosa strombulifera Lam., *Prosopis*
reptans Benth. var. *chilensis* Zoellner,
Spirolobium australe Orb., *Strombocarpa*
strombulifera (Lam.) A. Gray
Arbusto. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA,
LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).
CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO).

Prosopis tamarugo Phil.
Árbol. Endémica.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC.
Sin.: *Acacia torquata* Cav. ex Lag.,
Prosopis adesmioides Griseb., *Strombocarpa*
torquata (Cav. ex Lag.) Hutch.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN,
SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Prosopis vinalillo Stuck.
Árbol. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL,
SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Pseudopiptadenia Rauschert

Pseudopiptadenia warmingii
(Benth.) G.P. Lewis & M.P. Lima
Sin.: *Mimosa warmingii* Benth.,
Newtonia glaziovii (Harms) Burkart,

Newtonia warmingii (Benth.) G.P. Lewis,
Piptadenia glaziovii Harms
Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psophocarpus Neck. ex DC.

Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
Sin.: *Dolichos tetragonolobus* L.
Liana. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Psoralea L.

Psoralea pinnata L. var. **speciosa** Harv.
Arbusto. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(MON, ROC).

Pterocarpus Jacq.

Pterocarpus rohrii Vahl
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC.
Sin.: *Pterocarpus michelii* Britton,
Pterocarpus grandis R.S. Cowan,
Pterocarpus amazonicus Huber
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). PRY(APY,
CEN, CON).

Pterogyne Tul.

Pterogyne nitens Tul.
Sin.: *Machaerium pseudotipa* Griseb.,
Pterogyne nitens Tul. f. *parvifolia* Chodat
& Hassl.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN,
COA, ÑEE, NAS, PAI). URY(SAO).

Pueraria DC.

Pueraria montana (Lour.) Merr. var.
lobata (Willd.) Maesen & S.M. Almeida
ex Sanjappa & Predeep
Sin.: *Dolichos lobatus* Willd.
Enredadera o liana. Introducida.
0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Racosperma Mart.

Racosperma dealbatum (Link) Pedley
Sin.: *Acacia dealbata* Link

Arbusto o árbol. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(COR). BRA(RGS).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA, RME, JFE, IPA). URY(LAV, MAL,
MON, SJO).

Racosperma longifolium (Andrews)
Pedley

Sin.: *Acacia longifolia* (Andrews)
Willd., *Mimosa longifolia* Andrews
Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(RME). URY(CAS, COL,
MAL, MON, ROC).

Ejemplar de: ARG[Boelcke, O. 8730
(MVFA)]. BRA[Wassum, R. A. 8626
(NY)]. URY[Boelcke, O. 2177 (BAA,
MVFA)].

Racosperma melanoxydon (R. Br.)
Pedley

Sin.: *Acacia melanoxydon* R. Br.
Árbol. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
RME, JFE, IPA). URY(MAL, MON, SJO).

Racosperma paradoxum (DC.) Pedley
Sin.: *Acacia armata* R. Br., *Acacia
paradoxa* DC.

Arbusto. Introducida.
Países: CHL(VAL).

Ramorinoa Speg.

Ramorinoa girolae Speg.
Arbusto. Endémica. 1400-2600 m.
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

Rhynchosia Lour.

Rhynchosia arenicola Hassl.

Sin.: *Rhynchosia arenicola* Hassl. var.
mayor Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(CAU, ITA).

Rhynchosia balansae Micheli var.
balansae

Sin.: *Dolicholus balansae* (Micheli)
Kuntze, *Rhynchosia hagenbeckii*
Harms, *Rhynchosia hassleriana* Chodat,
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. f.
balansae (Micheli) Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera
del área del proyecto). PRY(AMA,
CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
URY(MON).

Rhynchosia balansae Micheli var.
psilantha Fortunato

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(CEN, ITA).

Rhynchosia bicentrica B.L. Turner
Sin.: *Rhynchosia diversifolia* Micheli
var. *prostrata* Burkart

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, LPA, SLU, SFE). BRA(RGS).
URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, MAL,
MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO,
SJO, TAC).

Rhynchosia burkartii Fortunato

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL).
PRY(APY, PHA).

Rhynchosia caaguazuensis Hassl.

Hierba o subarbusto. Endémica.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Rhynchosia claussenii Benth.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CAN, SPE).

Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth.

Sin.: *Rhynchosia corylifolia* Mart. ex
Benth. f. *glabrior* Chodat & Hassl.,
Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth.
var. *discolor* Chodat & Hassl., *Rhynchosia
corylifolia* Mart. ex Benth. var. *erecta*
Micheli, *Rhynchosia corylifolia* Mart.
ex Benth. var. *orbiculata* Chodat &
Hassl., *Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC. f.
oblongifolia Chodat & Hassl., *Rhynchosia
reticulata* (Sw.) DC. f. *ovalifolia* Chodat &
Hassl., *Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC. f.
subumbellata Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA,
SPE). URY(ART, CLA, MAL, MON, RIV,
TAC, TYT).

Rhynchosia diversifolia Micheli

Sin.: *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook.
emend. Griseb., *Rhynchosia senna* Gillies
ex Hook. f. *genuina* Hassl., nom. inval.,
Rhynchosia senna Gillies ex Hook. f.
glabrata Hassl., *Rhynchosia senna* Gillies
ex Hook. var. *diversifolia* (Micheli) Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, MIE,
PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA,
LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC,
SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Rhynchosia edensis Izag. & Beyhaut

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(MAL, TAC).

Rhynchosia edulis Griseb.

Sin.: *Dolicholus apoloensis* Rusby,
Dolicholus melanostictus (Griseb.)
Kuntze, *Eriosema edule* (Griseb.)
Burkart, *Eriosema volubile* Micheli f.
pube-densiore Chodat & Hassl., *Eriosema
volubile* Micheli, *Rhynchosia apoloensis*
(Rusby) J.F. Macbr., *Rhynchosia
melanosticta* Griseb., *Rhynchosia
pinetorum* Standl.

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU,
CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

Rhynchosia hauthalii Harms ex Kuntze

Sin.: *Dolicholus hauthalii* (Harms)
Kuntze, *Eriosema rotundifolium*
Micheli, *Eriosema rotundifolium*
var. *macrophyllum* Chodat & Hassl.,
Rhynchosia uruguayana Arechav.
Hierba. Nativa. 400-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAN,
COA, GUA, MIE, PAI). URY(RIV, TAC).

Rhynchosia lateritia Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(PAI). URY(CLA).

Rhynchosia leucophylla (Benth.) Benth.

Sin.: *Arcyphyllum leucophyllum*
Benth., *Rhynchosia leucophylla* (Benth.)
Benth. f. *elliptica* Chodat & Hassl.,
Rhynchosia leucophylla (Benth.) Benth.
f. *laxifolia* Chodat & Hassl., *Rhynchosia
leucophylla* (Benth.) Benth. f. *pubescens*
Chodat & Hassl.

Hierba, subarbusto o enredadera. Nativa.

Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,
CAN, CON).

Rhynchosia lineata Benth.

Hierba o subarbusto. Endémica.
0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS, SCA). PRY(APA). URY(ART,
CLA, DUR, PAY, RNO, RIV, TAC).

Rhynchosia melanocarpa Grear

Sin.: *Rhynchosia phaseoloides* (Sw.) DC.
var. *erecta* Micheli

Enredadera. Nativa. 200-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAU, COA, GUA, PAI, SPE).

Rhynchosia minima (L.) DC.

Sin.: *Dolicholus minimus* L., *Glycine lamarkii* Kunth, *Glycine littoralis* Vahl ex DC., *Glycine reflexa* Nutt., *Rhynchosia mexicana* Hook. & Arn., *Rhynchosia minima* (L.) DC. var. *pauciflora* Kuntze, *Rhynchosia punctata* DC.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR).
CHL(AYP). PRY(APY, CON, PHA).

Rhynchosia nainceckensis Fortunato

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL).
PRY(AMA, CEN, PAI, SPE).

Rhynchosia pallida Micheli

Sin.: *Rhynchosia schomburgkii* Benth. f. *pallida* (Micheli) Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(PAI).

Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC.

Sin.: *Dolicholus phaseoloides* (Sw.) Kuntze, *Glycine phaseoloides* Sw.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN, PAI, SPE).

Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. var.**kuntzei** (Harms ex Kuntze) Grear

Sin.: *Dolicholus kuntzei* Harms ex Kuntze
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. var.**reticulata**

Sin.: *Dolicholus reticulatus* (Sw.) Millsp., *Glycine reticulata* Sw.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). URY(MON).

Rhynchosia rojasii Hassl.

Sin.: *Rhynchosia ituana* Hoehne
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, GUA, ÑEE).

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. var. **senna**

Sin.: *Dolicholus senna* (Gillies ex Hook.) Kuntze, *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. f. *minor* Griseb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). URY(ART, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. var. **texana** (Torr. & A. Gray) M.C. Johnst.

Sin.: *Dolicholus angustifolius* (A. Gray) Kuntze, *Rhynchosia angustifolia* A. Gray, *Rhynchosia senna* Gillies & Hook. var. *angustifolia* (A. Gray) Grear, *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. var. *cordobensis* (Griseb.) Burkart, *Rhynchosia texana* Torr. & A. Gray f. *cordobensis* Griseb., *Rhynchosia texana* Torr. & A. Gray var. *microphylla* Hassl., *Rhynchosia texana* Torr. & A. Gray

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY). URY(CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Riedeliella Harms**Riedeliella graciliflora** Harms

Sin.: *Riedeliella hassleri* (Chodat) Harms, *Riedeliella hassleri* (Chodat) Harms var. *glabrescens* (Chodat) Harms, *Sweetiopsis hassleri* Chodat, *Sweetiopsis hassleri* Chodat var. *glabrescens* Chodat
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Robinia L.**Robinia pseudoacacia** L.

Árbol. Introducida. 0-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE, IPA). URY(CAS, MAL, MON).

Samanea Merr.**Samanea tubulosa** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Calliandra tubulosa* Benth.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL). PRY(AMA, CON, COA).

Schizolobium Vogel**Schizolobium parahyba** (Vell.) Blake

Sin.: *Cassia parahyba* Vell., *Schizolobium excelsum* Vogel
Árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Schnella Raddi**Schnella angulosa** (Vogel) Wunderlin

Sin.: *Bauhinia angulosa* Vogel, *Phanera angulosa* (Vogel) Vaz
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Schnella microstachya Raddi

Sin.: *Bauhinia bahiensis* Bong., *Bauhinia lagesiana* Harms, *Bauhinia langsdorffiana* Bong. var. *bahiensis* (Bong.) Benth., *Bauhinia langsdorffiana* Bong., *Bauhinia microstachya* (Raddi) J.F. Macbr. var. *bahiensis* (Bong.) J.F. Macbr., *Bauhinia microstachya* (Raddi) J.F. Macbr., *Bauhinia scandens* Vell., *Bauhinia spicata* Vogel, *Bauhinia tomentosa* Vell., *Bauhinia vogeliana* Steud., *Schnella microstachya* Raddi var. *bahiensis* (Bong.) A. Schmitz, *Schnella spicata* (Vogel) A. Schmitz

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, SPE).

Sellocharis Taub.**Sellocharis paradoxa** Taub.

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Senegalia Raf.**Senegalia bonariensis** (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, MIE, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).

Senegalia catharinensis (Burkart) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia catharinensis* Burkart
Arbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: BRA(SCA).

Senegalia emilioana (Fortunato & Ciald.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia emilioana* Fortunato & Ciald.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: PRY(APY, BOQ).

Senegalia etilis (Speg.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia etilis* Speg.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, BOQ).

Senegalia fiebrigii (Hassl.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia fiebrigii* Hassl.
Arbusto. Nativa. 600-1300 m.
Países: PRY(CAN).

Senegalia gilliesii (Steud.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia gilliesii* Steud., *Acacia furcata* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Acacia furcatispina* Burkart, *Manganaroa furcata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CAA).

Senegalia grandistipula (Benth.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia grandistipula* Benth.
Arbusto. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR).

Senegalia harleyi Seigler, Ebinger & P. G. Ribeiro

Arbusto o árbol. Nativa. 500-2200 m.
Países: BRA(PAR).

Senegalia hatschbachii Seigler, Ebinger & P. G. Ribeiro

Arbusto o árbol. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(PAR).

Senegalia hoehnei Seigler, M.P. Morim, M.J.F. Barros & Ebinger

Arbusto o liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senegalia lacerans (Benth.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia lacerans* Benth.
Arbusto. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senegalia lowei (L. Rico) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia lowei* L. Rico, *Acacia plumosa* Lowe
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senegalia magnibracteosa (Burkart) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia magnibracteosa* Burkart
Arbusto. Endémica. 900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Senegalia martii (Benth.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia martii* Benth., *Acacia paniculata* Willd. var. *incana* Chodat & Hassl., *Acacia paniculata* Willd. var. *martii* (Benth.) Hassl., *Manganaroa martii* (Benth.) Speg., *Manganaroa paniculata* (Willd.) Speg. var. *paraguayensis* Speg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(CON, PHA).

Senegalia martiusiana (Steud.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia martiusiana* (Steud.) Burkart, *Mimosa martiusiana* Steud.
Arbusto o liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senegalia monacantha (Willd.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia monacantha* Willd., *Acacia monacantha* Willd. f. *schulziana* Burkart, *Acacia rojasii* Hassl., *Acacia velutina* Benth., hom. illeg., *Manganaroa monacantha* (Willd.) Speg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, PHA).

Senegalia multipinnata (Ducke) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia multipinnata* Ducke, *Acacia paniculata* Willd., *Senegalia paniculata* (Willd.) Killip
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Senegalia nitidifolia (Speg.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia nitidifolia* Speg.
Arbusto. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, MIE).

Senegalia parviceps (Speg.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia adhaerens* Benth. var. *parviceps* Speg., *Acacia parviceps* (Speg.) Burkart
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN).

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose ex Britton & Killip

Sin.: *Acacia amambayensis* Hassl., *Acacia glomerosa* Benth., *Acacia polyphylla* DC., *Acacia riparia* Bertero ex

Spreng., nom. illeg.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON).

Senegalia praecox (Griseb.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia hassleri* Chodat, *Acacia praecox* Griseb., *Acacia praecox* Griseb. f. *hassleri* (Chodat) Burkart
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CON, PAI, PHA). URY(ART, PAY, SAO).

Senegalia rafinesqueana Terra & Garcia

Liana. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Senegalia recurva (Benth.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia recurva* Benth.
Arbusto. Nativa. 200-1200 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, ITA, PHA).

Senegalia riparia (Kunth) Britton

Sin.: *Acacia pseudoadhaerens* Hassl., *Acacia riparia* Kunth, *Acacia riparia* Kunth f. *intermedia* Hassl., *Acacia riparia* Kunth var. *angustifolia* Kuntze, *Acacia riparia* Kunth var. *pseudoadhaerens* (Hassl.) Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, COA, GUA, PAI).

Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose

Sin.: *Acacia tenuifolia* (L.) Willd., *Mimosa tenuifolia* L.
Arbusto o liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senegalia tucumanensis (Griseb.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia riparia* Kunth var. *argentiniensis* Speg., *Acacia riparia* Kunth var. *subscandens* (Griseb.) Griseb., *Acacia riparia* Kunth var. *tucumanensis* Griseb., *Acacia tucumanensis* Griseb. var. *subscandens* Griseb., *Acacia tucumanensis* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART).

Senegalia velutina (DC.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia velutina* Bertol., nom. illeg., *Acacia velutina* DC., *Acacia velutina* DC. f. *ferox* Hassl., *Acacia velutina* DC. f. *subinermis* Hassl., *Acacia velutina* DC. var. *glabrescens* (Speg.) Burkart, *Acacia velutina* DC. var. *monadena* Hassl., *Manganaroa velutina* (DC.) Speg. var. *glabrescens* Speg., *Manganaroa velutina* (DC.) Speg.

Arbusto. Nativa. 100-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA, ITA).

Senna Mill.

Senna acanthoclada (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia acanthoclada* Griseb.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU, SLU).

Senna aculeata (Pohl ex Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia aculeata* Pohl ex Benth., *Chamaesenna aculeata* (Pohl ex Benth.) Pittier
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PHA).

Senna alata (L.) Roxb.

Sin.: *Cassia alata* L., *Cassia alata* L. var. *perennis* Pamp., *Cassia alata* L. var. *rumphiana* DC., *Cassia bracteata* L. f., *Cassia herpetica* Jacq., nom. superfl., *Herpetica alata* (L.) Raf.
Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Senna angulata (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **miscadena** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia angulata* Vogel var. *miscadena* Vogel
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senna aphylla (Cav.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia aphylla* Cav., *Cassia aphylla* Cav. var. *rigida* Hieron., *Cassia*

aphylla Cav. var. *trichosepala* Chodat & Wilczek, *Cassia aphylla* Cav. var. *virgata* Burkart, *Cassia fabrisii* L. Bravo, *Cassia rigida* (Hieron.) Burkart var. *inermis* L. Bravo, *Cassia rigida* (Hieron.) Burkart, *Cassia trichosepala* (Chodat & Wilczek) L. Bravo, *Senna fabrisii* (L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby, *Senna rigida* (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby var. *inermis* (L. Bravo) L. Bravo, *Senna rigida* (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby, *Senna trichosepala* (Chodat & Wilczek) H.S. Irwin & Barneby

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU).

Senna araucarietorum H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Endémica. 500-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senna arnottiana (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia andina* Phil., *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook., *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook. var. *andina* (Phil.) Reiche, *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook. var. *sericea* Burkart *Cassia lorentzii* Niederl. ex Lorentz & Niederl.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 800-2800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Senna birostris (Dombey ex Vogel)

H.S. Irwin & Barneby var. **arequipensis** (Meyen ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia arequipensis* Meyen ex Vogel, *Cassia tarapacana* Phil.
Arbusto. Nativa. 2200-3900 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Senna birostris (Dombey ex Vogel)

H.S. Irwin & Barneby var. **hookeriana** (Hook.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia hookeriana* Hook.
Arbusto. Nativa. 1100-3100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Senna birostris (Dombey ex Vogel)

H.S. Irwin & Barneby var. **jallaguensis** Laporta & R.A. Palacios
Arbusto. Nativa. 2000-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Senna brongniartii (Gaudich.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia brongniartii* Gaudich.,

Cassia conjugata Ruiz & Pav. ex Benth., *Cassia misera* Phil.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1100 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Senna burkartiana (Villa) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia burkartiana* Villa
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Senna candolleana (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia bicapsularis* L. var. *chilensis* Benth., *Cassia candolleana* Vogel, *Cassia closiana* Phil., *Cassia emarginata* Clos, nom. illeg., *Cassia obtusa* Clos
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Senna cernua (Balb.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia cernua* Balb., *Cassia macrocarpa* Micheli, *Cassia sulcata* DC.
Subarbusto. Nativa. 300-1500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, COA, GUA, PAI).

Senna chloroclada (Harms) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia chloroclada* Harms
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SFE). PRY(APY, PHA).

Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Adipera corymbosa* (Lam.) Britton & Rose *Cassia corymbosa* Lam., *Cassia crassifolia* Ortega, *Cassia falcata* Dum. Cours., nom. superfl., *Chamaefistula corymbosa* (Lam.) G. Don
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Senna crassiramea (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia crassiramea* Benth., *Cassia rigidicaulis* Burkart ex L. Bravo, *Senna rigidicaulis* (Burkart ex L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby
Arbusto o subarbusto. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Senna crassiramea (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia crassiramea* Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Senna cruckshanksii (Hook. & Arn.)

H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia campanae* Phil., *Cassia confusa* Phil. var. *campanae* (Phil.)

Reiche, *Cassia cruckshanksii* Hook.

& Arn., *Cassia stipulacea* Aiton var.

tenuistipula Bertero ex Vogel

Arbusto. Endémica. 400-600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S.

Irwin & Barneby var. **alcaparra** (Phil.)

H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia alcaparra* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S.

Irwin & Barneby var. **coquimbensis**

(Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia coquimbensis* Vogel, *Cassia flaccida* Clos

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S.

Irwin & Barneby var. **cumingii**

Sin.: *Cassia cumingii* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S.

Irwin & Barneby var. **eremobia** (Phil.)

H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia eremobia* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ANT).

Senna hilariana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia hilariana* Benth.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin &

Barneby var. **hirta** H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia leptocarpa* Benth, var. *hirsuta* Benth.

Arbusto, subarbusto o hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin &

Barneby var. **leptocarpa** (Benth.) H.S.

Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia leptocarpa* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-700 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN).

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin &

Barneby var. **puberula** H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia longisiliqua* Blanco, *Cassia occidentalis* L. f. *ovato-lanceolata* Chodat & Hassl., *Cassia pubescens* Jacq., *Cassia sulcata* Blanco, hom. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(CEN, COA).

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin &

Barneby var. **streptocarpa** H.S. Irwin & Barneby

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV).

Senna huidobriana (Phil.) Zoellner & San Martin

Sin.: *Cassia huidobriana* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(COQ).

Senna kurtzii (Harms) H.S. Irwin &

Barneby

Sin.: *Cassia egregia* Sandwith, *Cassia kurtzii* Harms

Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Senna leiophylla (Vogel) H.S. Irwin &

Barneby

Sin.: *Cassia leiophylla* Vogel

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-300 m.

Países: BRA(RGS). PRY(GUA).

Senna macranthera (DC. ex Collad.)

H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia macranthera* DC. ex Collad.

Árbol. Introducida. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAU, CAN, SPE).

Senna morongii (Britton) H.S. Irwin &

Barneby

Sin.: *Cassia acinaciarapa* Rusby, *Cassia cochabambae* Herzog, *Cassia morongii* Britton, *Cassia rojasiana* Hassl., *Cassia*

tomentosa L. f. var. *paucijuga* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU).

PRY(APY, CON, MIE, PHA).

Senna mucronifera (Mart. ex Benth.)

H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia mucronifera* Mart. ex

Benth.

Hierba. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA).

Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin &

Barneby var. **peregrinatrix** H.S. Irwin & Barneby

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin &

Barneby subsp. **lindleyana** (Gardner) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia lindleyana* Gardner, *Cassia multijuga* Rich. var. *lindleyana* (Gardner)

Benth.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senna nana (Benth.) H.S. Irwin &

Barneby

Sin.: *Cassia nana* Benth.

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS). URY(ART, DUR, PAY, SAO, SOR, TAC, TYT).

Senna neglecta (Vogel) H.S. Irwin &

Barneby

Sin.: *Cassia neglecta* Vogel

Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Senna nudicaulis (Burkart) H.S. Irwin &

Barneby

Sin.: *Cassia nudicaulis* Burkart

Arbusto o subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(MEN, NEU).

Senna oblongifolia (Vogel) H.S. Irwin &

Barneby

Sin.: *Cassia oblongifolia* Vogel

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). URY(MON, RIV, TAC).

Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin &

Barneby

Sin.: *Cassia humilis* (Pers.) Collad.,

Cassia obtusifolia L., *Cassia tora* L. var.

humilis Pers., *Cassia toroides* Raf., *Cassia toroides* Roxb., nom. nud., *Diallobus falcatus* Raf., nom. illeg., *Diallobus uniflorus* Raf., *Emelista tora* (L.) Britton & Rose, *Senna toroides* Roxb.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

Senna occidentalis (L.) Link

Sin.: *Cassia caroliniana* Walter, *Cassia ciliata* Raf., *Cassia falcata* L., *Cassia foetida* Pers., nom. illeg., *Cassia macradena* Collad., *Cassia obliquifolia* Schrank, *Cassia occidentalis* L. var. *aristata* Collad., *Cassia occidentalis* L., *Cassia planisiliqua* L., *Cassia planisiliqua* Lam., hom. illeg., *Cassia plumieri* DC., *Ditremexa occidentalis* (L.) Britton & Rose ex Britton & Wilson, *Senna occidentalis* (L.) Roxb., comb. superfl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

Senna organensis (Harms) H.S. Irwin & Barneby var. **extratropica** H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Nativa. 1100-2300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Senna pachyrrhiza (L. Bravo) H.S.

Irwin & Barneby var. **pachyrrhiza**

Sin.: *Cassia aphylla* Cav. subsp. *divaricata* (Hieron.) L. Bravo, *Cassia aphylla* Cav. var. *divaricata* Hieron., *Cassia pachyrrhiza* L. Bravo, *Senna aphylla* (Cav.) H.S. Irwin & Barneby subsp. *divaricata* (Hieron.) L. Bravo

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

Senna pachyrrhiza (L. Bravo) H.S.

Irwin & Barneby var. **pendula** (Robbiati & Fortunato) Robbiati & Fortunato

Sin.: *Senna aphylla* (Cav.) H.S. Irwin & Barneby var. *pendula* Robbiati & Fortunato

Arbusto o subarbusto. Endémica.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Senna paposana (Phil.) Zoellner & San Martin

Sin.: *Cassia paposana* Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(ANT).

Senna paradictyon (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia paradictyon* Vogel

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, SPE).

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **eriocarpa** (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia bicapsularis* L. var.

eriocarpa Griseb., *Cassia pendula* Willd. var. *eriocarpa* (Griseb.) Lass.

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **glabrata** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia indecora* Kunth var. *glabrata* Vogel

Arbusto. Nativa. 400-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **missionum** H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(COS, MIS).

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **paludicola** H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia bicapsularis* L. f. *pilosa* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, MON).

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **recondita** H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Senna pilifera (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **pilifera**

Sin.: *Cassia ignorata* Hoehne, *Cassia pilifera* Vogel f. *pilosa* Chodat & Hassl., *Cassia pilifera* Vogel f. *sericea* Chodat & Hassl., *Cassia pilifera* Vogel, *Cassia tora*

L. f. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Emelista pilifera* (Vogel) Pittier, comb. illeg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN).

Senna pilifera (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **subglabra** (S. Moore) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia pilifera* Vogel var. *subglabra* S. Moore

Liana o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Senna pilifera (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **tubata** H.S. Irwin & Barneby

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-400 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Senna rugosa (G. Don) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia rugosa* G. Don

Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

Senna scabriuscula (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia neglecta* Vogel var. *entreriana* Griseb., *Cassia occidentalis* L. var. *entreriana* (Griseb.) Burkart, *Cassia occidentalis* L. var. *scabriuscula* Vogel

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, PAI). URY(MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR).

Senna septemtrionalis (Viv.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia septemtrionalis* Viv.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA). CHL(LBO).

Notas: Introducida en Chile.

Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia siamea* Lam.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(RGS, SCA).

Senna silvestris (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **guaranitica** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Sin.: *Cassia guaranitica* Chodat & Hassl., *Cassia guaranitica* Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 200-600 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

Senna silvestris (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **silvestris**
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Senna silvestris (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **unifaria** H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia silvestris* (Vell.) H.S. Irwin & Barneby f. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Cassia silvestris* (Vell.) H.S. Irwin & Barneby f. *olivacea* Chodat & Hassl.
Árbusto, arbolito o árbol. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia amazonica* Ducke, *Cassia carnaval* Speg., *Cassia edulis* Posada-Ar., *Cassia excelsa* Schrad. var. *acutifolia* Hassl., *Cassia humboldtiana* DC., *Cassia speciosa* Kunth, *Cassia spectabilis* DC., *Cassia totonaca* Sessé & Moç., *Cassia trinitatis* Rchb. ex DC., *Cathartocarpus speciosus* (DC.) G. Don, *Cathartocarpus trinitatis* (DC.) G. Don, *Pseudocassia spectabilis* (DC.) Britton & Rose
Árbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, COA).

Senna spiniflora (Burkart) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia aphylla* Cav. var. *robusta* Burkart, *Cassia chacoensis* L. Bravo, *Cassia rigida* (Hieron.) Burkart var. *robusta* Burkart, *Cassia spiniflora* Burkart, *Senna chacoensis* (L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby
Árbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Senna splendida (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia splendida* Vogel
Árbusto o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CON).

Senna stipulacea (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. **anglorum** H.S. Irwin & Barneby
Árbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

Senna stipulacea (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. **stipulacea**
Sin.: *Cassia foetida* Ruiz & Pav. ex G.

Don, *Cassia myrtifolia* Phil. ex Reiche, *Cassia pencana* Phil. ex sched., *Cassia stipulacea* Aiton, *Cassia stipulacea* Willd., nom. illeg.
Árbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Senna subulata (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia subulata* Griseb.
Árbusto. Endémica. 400-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Senna tenuifolia (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia tenuifolia* Vogel
Árbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Senna tropica (Vell.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia tropica* Vell.
Árbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Senna urmenetae (Phil.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia glaucescens* Benth., *Cassia oreades* Phil., *Cassia urmenetae* Phil.
Árbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, RME).

Senna velutina (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia velutina* Vogel
Árbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Sesbania Scop.

Sesbania bispinosa (Jacq.) W. Wight
Sin.: *Aeschynomene bispinosa* Jacq., *Coronilla aculeata* Willd., *Sesbania bispinosa* (Jacq.) W. Wight var. *micrantha* (Chiov.) J. Gillet
Hierba. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Sesbania exasperata Kunth
Sin.: *Emerus exasperatus* (Kunth) Kuntze, *Lotus palustris* Vell., nom. illeg., *Sesbania exasperata* Kunth f. *robustior* Chodat & Hassl.
Árbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).

Sesbania macroptera Micheli
Árbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(APY, COA, PAI).

Sesbania punicea (Cav.) Benth.
Sin.: *Daubentonia punicea* (Cav.) DC., *Emerus puniceus* (Cav.) Kuntze, *Piscidia punicea* Cav., *Sesbania tripertii* F.T. Hubb.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ITA). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR).

Sesbania sesban (L.) Merr. var. **bicolor** (Wight & Arn.) F.W. Andrews
Sin.: *Sesbania aegyptiaca* Poir. var. *bicolor* Wight & Arn.
Árbusto. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Sesbania sesban (L.) Merr. var. **sesban**
Sin.: *Aeschynomene sesban* L., *Sesbania aegyptiaca* Poir.
Árbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Sesbania virgata (Cav.) Pers.
Sin.: *Aeschynomene virgata* Cav., *Coronilla virgata* (Cav.) Willd., *Coursetia virgata* (Cav.) DC., *Sesbania marginata* Benth.
Árbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, DUR, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

Sigmoidotropis (Piper) A. Delgado

Sigmoidotropis speciosa (Kunth) A. Delgado
Sin.: *Phaseolus speciosus* Kunth, *Vigna speciosa* (Kunth) Verdc.
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Sophora L.

Sophora cassioides (Phil.) Sparre
Sin.: *Edwardsia cassioides* Phil., *Edwardsia eximia* Gand., *Edwardsia macnabiana* Graham, *Sophora macnabiana* (Graham) Skottsbr.
Árbol. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Sophora fernandeziana (Phil.)Skotts. var. **fernandeziana**

Sin.: *Sophora tetraptera* J.S. Muell.
 subsp. *fernandeziana* Skotts.
 Árbol. Endémica.
 Países: CHL(JFE).

Sophora fernandeziana (Phil.)Skotts. var. **reediana** (Phil.) Skotts.

Sin.: *Edwardsia reediana* Phil., *Sophora reediana* (Phil.) Yakovlev
 Árbol. Endémica.
 Países: CHL(JFE).

Sophora linearifolia Griseb.

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.
 Países: ARG(COR, SLU).

Sophora macrocarpa Sm.

Sin.: *Sophora donihuensis* Ravenna
 Árbol. Endémica. 1200-1500 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Sophora masafuerana (Phil.) Skotts.

Sin.: *Edwardsia masafuerana* Phil.
 Árbol. Endémica.
 Países: CHL(JFE).

Sophora rhynchocarpa Griseb.

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.
 Países: ARG(SAL, TUC).

Sophora tomentosa L. subsp.

littoralis (Schr.) Yakovlev
 Sin.: *Sophora littoralis* Schrad.
 Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sophora tomentosa L. subsp.

tomentosa
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(SCA).

Spartium L.**Spartium junceum** L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, ERI, LPA). CHL(AYP, ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). URY(CAS, MON, SOR).

Sphaerophysa DC.**Sphaerophysa salsula** (Pall.) DC.

Sin.: *Astragalus violaceus* R.P. St. John, *Phaca salsula* Pall., *Swainsona salsula* (Pall.) Taub.
 Subarbusto. Introducida.
 Países: ARG(MEN).

Stenodrepanum Harms**Stenodrepanum bergii** Harms

Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU).

Stryphnodendron Mart.**Stryphnodendron adstringens**

(Mart.) Coville
 Sin.: *Acacia adstringens* Mart., *Mimosa barbadetiman* Vell., *Stryphnodendron barbadetiman* (Vell.) Mart.
 Arbusto o arbolito. Nativa. 700-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Stryphnodendron rotundifolium Mart.

Sin.: *Stryphnodendron obovatum* Benth., *Stryphnodendron rotundifolium* Mart. f. *retusa* Chodat & Hassl.
 Arbolito. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Stylosanthes Sw.**Stylosanthes bracteata** Vogel

Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Stylosanthes campestris M.B.

Ferreira & Sousa Costa
 Subarbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Stylosanthes capitata Vogel

Subarbusto. Nativa. 300-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.

var. **gracilis** (Kunth) Vogel
 Sin.: *Astylosanthes gracilis* (Kunth) Herter, *Stylosanthes acuminata* M.B. Ferreira & Sousa Costa, *Stylosanthes gracilis* Kunth var. *vulgaris* Burkart, *Stylosanthes gracilis* Kunth, *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *marginata* Hassl., *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *robusta* 't Mannetje
 Hierba. Nativa. 100-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.

var. **guianensis**
 Sin.: *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. f. *esetosa* Hassl., *Stylosanthes*

guianensis (Aubl.) Sw. f. *viscosissima* Hassl., *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *subviscosa* Benth., *Stylosanthes nunoi* Brandão, *Trifolium guianense* Aubl.
 Hierba. Nativa. 0-1400 m.
 Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Stylosanthes hippocampoides

Mohlenbr.

Sin.: *Astylosanthes intermedia* (Vogel) Herter, *Stylosanthes gracilis* Kunth var. *subviscosa* (Benth.) Burkart, *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *intermedia* (Vogel) Hassl., *Stylosanthes montevidensis* Vogel var. *intermedia* Vogel
 Hierba. Nativa. 500-1200 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC).

Stylosanthes leiocarpa Vogel

Sin.: *Astylosanthes leiocarpa* (Vogel) Herter
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).

Stylosanthes linearifolia M.B.

Ferreira & Sousa Costa
 Subarbusto. Nativa. 800-900 m.
 Países: BRA(PAR).

Stylosanthes longiseta Micheli

Sin.: *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *longiseta* (Micheli) Hassl.
 Hierba. Endémica.
 Países: BRA(PAR). PRY(CAU, CAN).

Stylosanthes macrosoma S.F. Blake

Sin.: *Stylosanthes montevidensis* Vogel f. *arenosa* Hassl.
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, PAI).

Stylosanthes montevidensis Vogel

Sin.: *Astylosanthes montevidensis* (Vogel) Herter, *Stylosanthes juncea* Micheli, *Stylosanthes juncea* Micheli var. *setosa* Chodat & Hassl., *Stylosanthes montevidensis* Vogel f. *glabrata* Hassl.,

Stylosanthes montevidensis Vogel f. *setosa* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Stylosanthes montevidensis* Vogel var. *heterophylla* Burkart, *Stylosanthes montevidensis* Vogel var. *juncea* (Micheli) Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

Stylosanthes nervosa J.F. Macbr.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, SAL). PRY(CON).

Stylosanthes recta Vanni

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY, PHA).

Stylosanthes rostrata (Burkart) Vanni

Sin.: *Stylosanthes gracilis* Kunth var. *rostrata* Burkart

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(COL).

Stylosanthes scabra Vogel

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CON, PHA).

Stylosanthes vallsii Sousa Costa & C.

Berg

Subarbusto. Endémica. 1000-1100 m.

Países: BRA(PAR)

Stylosanthes viscosa (L.) Sw.

Sin.: *Astypsanthes viscosa* (L.) Herter, *Hedysarum hamatum* L., *Hedysarum hamatum* L. var. *viscosum* L., *Stylosanthes glutinosa* Kunth, *Stylosanthes viscosa* (L.) Sw. var. *acutifolia* Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).

Swartzia Schreb.

Swartzia multijuga Vogel

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Swartzia oblata R.S. Cowan

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Swartzia submarginata (Benth.)

Mansano

Sin.: *Swartzia acutifolia* Vogel var. *submarginata* Benth.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Sweetia Spreng., nom. cons.

Sweetia atrata Mohlenbr.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(CAU).

Sweetia fruticosa Spreng.

Sin.: *Ferreirea spectabilis* Allemão f. *fruticosa* Chodat & Hassl., *Ferreirea spectabilis* Allemão var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Ferreirea spectabilis* Allemão, *Sweetia fruticosa* Spreng. var. *hassleri* Yakovlev, *Sweetia fruticosa* Spreng. var. *paraguariensis* (Chodat & Hassl.) Yakovlev

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI).

Tachigali Aubl.

Tachigali aurea Tul.

Sin.: *Sclerolobium aureum* (Tul.) Benth., *Sclerolobium aureum* (Tul.) Benth. var. *polyphyllum* Hassl., *Sclerolobium aureum* (Tul.) Benth. var. *velutinum* Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Tachigali denudata (Vogel) Oliveira-Filho

Sin.: *Sclerolobium denudatum* Vogel

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR).

Tachigali paratyensis (Vell.) H.C. Lima

Sin.: *Cassia paratyensis* Vell.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Tara Molina, emended. E.

Gagnon & G.P. Lewis

Tara spinosa (Molina) Britton & Rose

Sin.: *Caesalpinia chilensis* DC., *Caesalpinia pectinata* Cav., *Caesalpinia spinosa* (Molina) Kuntze, *Caesalpinia tara* Ruiz & Pav., *Caesalpinia tinctoria* (Kunth) Benth. ex Reiche, *Caesalpinia*

tinctoria Dombey ex DC., nom. nud., *Coulteria tinctoria* Kunth, *Poinciana spinosa* Molina

Árbol. Nativa. 0-3000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, COQ, VAL).

Tephrosia Pers.

Tephrosia adunca Benth.

Sin.: *Cracca adunca* (Benth.) Kuntze, *Tephrosia adunca* Benth. var. *rufescens* (Benth.) Hassl., *Tephrosia rufescens* Benth.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, ITA). URY(RIV).

Tephrosia cinerea (L.) Pers.

Sin.: *Cracca cinerea* (L.) Morong, *Galega cinerea* L., *Tephrosia cinerea* Malme ex Hassl., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, COA, MIE, PAI, PHA). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SJO, SJO, TAC).

Tephrosia fertilis R.T. Queiroz &

A.M.G. Azevedo

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Tephrosia guaranitica Chodat & Hassl.

Sin.: *Tephrosia adunca* Benth. var. *guaranitica* (Chodat & Hassl.) Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(SPE).

Tephrosia hassleri Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(COA).

Tephrosia marginata Hassl.

Sin.: *Tephrosia marginata* Hassl. var. *pseudorufescens* Hassl., *Tephrosia nervosa* Chodat & Hassl., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). PRY(APY, CON). URY(ART, MON, PAY, SAO).

Teramnus P. Browne

Teramnus uncinatus (L.) Sw.

Sin.: *Dolichos uncinatus* L.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Tipuana (Benth.) Benth.**Tipuana tipu** (Benth.) Kuntze

Sin.: *Machaerium fertile* Griseb., *Machaerium tipu* Benth., *Tipuana speciosa* Benth., *Tipuana tipa* Lillo
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI, JUJ, SAL, TUC).
BRA(RGS). URY(CAS, MON).

Trifolium L.**Trifolium amabile** Kunth var. **amabile**

Sin.: *Lupinaster amabilis* (Kunth) C. Presl, *Trifolium bolivianum* C. Presl, *Trifolium humboldtii* Spreng., *Trifolium lozani* House, *Trifolium mathewsii* A. Gray, *Trifolium pauciflorum* Willd. ex Steud., *Trifolium reflexum* Schltld. & Cham., hom. illeg., *Trifolium schiedeanum* S. Watson
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Trifolium amabile Kunth var.

hemsleyi (Lojac.) D. Heller & Zohary
Sin.: *Trifolium hemsleyi* Lojac., *Trifolium macrorhizum* Ulbr.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COR, JUJ).

Trifolium angustifolium L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). URY(CAS).

Trifolium antucoense D. Heller

Sin.: *Lupinaster circumdatus* (Kunze) C. Presl, *Trifolium circumdatum* Kunze, nom. illeg., *Trifolium inconspicuum* Poepp. ex D. Heller, nom. nud.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO, BIO, LLA).

Trifolium arvense L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG). URY(FLA, MON).

Trifolium aureum Pollich

Sin.: *Trifolium strepens* Crantz, nom. illeg.
Hierba. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAG).

Trifolium campestre Schreb.

Sin.: *Trifolium procumbens* L., nom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-1600 m.

Países: ARG(NEU, RNE). BRA(PAR, RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE). URY(CAS, CLA, FLA, MON).

Trifolium cernuum Brot.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(LBO, MAU).

Trifolium chilense Hook. & Arn.

Sin.: *Lupinaster ochreatus* (Kunze ex Steud.) C. Presl, *Trifolium ochreatum* Kunze ex Steud.
Hierba. Endémica. 600-900 m.
Países: CHL(VAL, BIO, LLA, RME).

Trifolium depauperatum Desv.

Sin.: *Lupinaster depauperatus* (Desv.) C. Presl
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Trifolium dubium Sibth.

Sin.: *Amareneus flavus* C. Presl, *Trifolium filiforme* L. subsp. *dubium* (Sibth.) Gams, *Trifolium filiforme* L. var. *dubium* (Sibth.) Fiori & Paol., *Trifolium filiforme* L., hom. illeg., *Trifolium flavum* C. Presl, *Trifolium luteolum* Schur, *Trifolium minus* Sm., *Trifolium parviflorum* Bunge ex Nyman, *Trifolium procumbens* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(FLO, MON, SOR, TAC).

Trifolium fragiferum L. subsp.

bonanni (C. Presl) Soják
Sin.: *Amoria bonannii* (C. Presl) Roskov, *Galearia bonannii* (C. Presl) C. Presl, *Trifolium bonanni* C. Presl, *Trifolium neglectum* C.A. Mey.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(COL, MON).

Trifolium fragiferum L. subsp. **fragiferum**

Sin.: *Amoria fragifera* (L.) Roskov, *Galearia fragifera* (L.) Bobrov, nom. illeg., *Galearia fragifera* (L.) C. Presl, *Trifolium congestum* Link, hom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE).
CHL(MAG).

Trifolium glomeratum L.

Sin.: *Micrantheum glomeratum* (L.) C. Presl, *Trifolium axillare* Phil., *Trifolium duodecimnerve* Willk. & Lange
Hierba. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).
URY(TYT).

Trifolium hatschbachii Vincent & Butterworth

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).
PRY(CAU, GUA).

Trifolium hybridum L. var.

anatolicum (Boiss.) Boiss.
Sin.: *Trifolium anatolicum* Boiss., *Trifolium parvulum* Beck ex Stapf
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).

Trifolium hybridum L. var. **hybridum**

Sin.: *Amoria hybrida* (L.) C. Presl, *Trifolium fistulosum* Gilib.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, LLA, MAG). URY(FLA, MON, SOR).

Trifolium incarnatum L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Trifolium lappaceum L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(CLA, FLA, MON, TAC).

Trifolium macraei Hook. & Arn.

Sin.: *Trifolium bicephalum* Elmer, *Trifolium catalinae* S. Watson, *Trifolium mercedense* P.B. Kenn, *Trifolium traskae* P.B. Kenn
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Trifolium microdon Hook. & Arn.

Sin.: *Trifolium chrysanthum* Hook. & Arn., *Trifolium lechleri* Phil., *Trifolium microdon* Hook. & Arn. var. *pilosum* Eastw., *Trifolium tricuspdatum* Bertero ex Steud.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA, RME).

Trifolium pallidum Waldst. & Kit.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(DUR, FLA).

Trifolium physanthum Hook. & Arn.

Sin.: *Trifolium valdivianum* Phil. ex D. Heller & Zohary, nom. nud.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, LLA).

Trifolium polymorphum Poir. var.**grandiflorum** Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI). CHL(MAU, BIO, RME). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, RNO, SJO, SOR, TYT).

Trifolium polymorphum Poir. var.**neuquenense** Rossow

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU).

Trifolium polymorphum Poir. var.**polymorphum**

Sin.: *Amoria obcordata* (Desv.) C. Presl, *Amoria polymorpha* (Poir.) C. Presl, *Trifolium amphianthum* Torr. & A. Gray, *Trifolium ampicarpum* Phil., *Trifolium argentinense* Speg., *Trifolium brevipes* Phil., *Trifolium concinum* Phil., *Trifolium crosnieri* Clos, *Trifolium grandiflorum* Hook. & Arn., *Trifolium indecorum* Clos, *Trifolium megalanthum* Steud., *Trifolium obcordatum* Desv., *Trifolium reflexum* Rowntree ex Scheele, *Trifolium rivale* Clos, hom. illeg., *Trifolium rivale* Steud., *Trifolium roemerianum* Scheele, *Trifolium rubrum* Larrañaga, *Trifolium simplex* Clos

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, RNE, SFE). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CAU, GUA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Trifolium pratense L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(COL, MON).

Trifolium repens L.

Sin.: *Amoria repens* (L.) C. Presl, *Lotodes repens* (L.) Kuntze, *Trifolium limonium* Phil., *Trifolium repens* L. f. *riparia* Hauman, *Trifolium repens* L. subsp. *giganteum* (Lagr.-Foss.) Ponert *Trifolium repens* L. var. *giganteum* Lagr.-Foss., *Trifolium stipitatum* Clos

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CLA, MAL, MON, PAY).

Trifolium resupinatum L.

Sin.: *Amoria resupinata* (L.) Roskov, *Galearia resupinata* (L.) C. Presl, *Trifolium resupinatum* L. subsp. *suaveolens* (Willd.) Ponert, *Trifolium suaveolens* Willd.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). URY(FLA, MON).

Trifolium riograndense Burkart subsp. **pseudocalyculatum** Del Puerto

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(CLA, TYT).

Trifolium riograndense Burkartsubsp. **riograndense**

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, SOR).

Trifolium spadiceum L.

Sin.: *Amareneus spadiceus* (L.) C. Presl, *Trifolium litigiosum* Desv., *Trifolium montanum* L., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Trifolium squamosum L.

Sin.: *Trifolium maritimum* Huds., *Trifolium rigidum* Savi, *Trifolium xatardii* DC.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: URY(FLA, MON).

Trifolium striatum L.

Sin.: *Trifolium incanum* C. Presl

Hierba. Introducida.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Trifolium subterraneum L.

Sin.: *Calycomorphum subterraneum* (L.) C. Presl

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR).

CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA). URY(MON, SOR).

Trifolium suffocatum L.

Sin.: *Amoria suffocata* (L.) R.M. Burton, *Amoria suffocata* (L.) Soják, nom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: CHL(LBO, RME).

Trifolium tomentosum L.

Sin.: *Trifolium resupinatum* L. subsp. *tomentosum* (L.) Gibelli & Belli

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

Trifolium triaristatum Bertero ex

Colla

Hierba. Nativa.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, LLA).

Trifolium vernum Phil.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(VAL, LBO).

Trifolium vestitum D. Heller &

Zohary

Sin.: *Trifolium volekmanni* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: CHL(COQ, RME).

Trigonella L.**Trigonella monspeliaca** L.

Sin.: *Medicago monspeliaca* (L.) Trautv., *Trigonella monspeliaca* L. subsp. *subacaulis* Feinbrun

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, RME).

Ulex L.**Ulex europaeus** L.

Sin.: *Ulex opositholepis* Webb

Arbusto. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG). URY(CAS, MON, ROC, SJO).

Vachellia Wight & Arn.**Vachellia albicorticata** (Burkart)

Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia albicorticata* Burkart

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Vachellia aroma (Gillies ex Hook. &

Arn.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn. var. *cochlearis* Griseb., *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn. var. *moniliformis* (Griseb.) Hieron., *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn., *Acacia lutea* (Mill.) Britton var. *aroma* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acacia lutea* (Mill.) Britton

var. *moniliformis* (Griseb.) Kuntze, *Acacia michelii* Rusby, *Acacia moniliformis* Griseb., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *aroma* (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *leptocarpa* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *moniliformis* (Griseb.) Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *oocephala* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *pachycarpa* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *thlipsacantha* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. var. *moniliformis* (Griseb.) Speg.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m. Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

Vachellia astringens (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg.

Sin.: *Acacia astringens* (Gillies) Speg., *Acacia atramentaria* Benth., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *atramentaria* (Benth.) Kuntze, *Acacia prosopoma* A. Schnyd., *Prosopis astringens* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). URY(PAY).

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia adenopa* Hook. & Arn., *Acacia caven* (Molina) Molina var. *caven*, *Acacia caven* (Molina) Molina var. *dehiscens* Burkart ex Ciald., *Acacia caven* (Molina) Molina var. *macrocarpa* Aronson, *Acacia caven* (Molina) Molina var. *microcarpa* (Speg.) Burkart ex Ciald., *Acacia caven* (Molina) Molina var. *sphaerocarpa* Burkart ex Aronson, *Acacia caven* (Molina) Molina var. *stenocarpa* (Speg.) Burkart ex Ciald., *Acacia cavenia* (Molina) Hook. & Arn., *Acacia cavenia* Colla, hom. illeg., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. f. *cavenia* (Molina) E.C. Clos, *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *brachicarpa* Kuntze, *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *cavenia* (Molina) Arechav., comb. superfl., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *cavenia* (Molina) Kuntze, *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *heterocarpa* Kuntze, *Mimosa caven* Molina, *Mimosa cavenia* Molina, *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *brachypoda* Speg., *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *cavenia* (Molina) Speg., *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *microcarpa* Speg.,

Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. f. *stenocarpa* Speg.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-3000 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(APY, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

Vachellia curvifruca (Burkart)

Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia curvifruca* Burkart
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE). PRY(APY, BOQ, PHA).

Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.

Sin.: *Acacia acicularis* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia edulis* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia farnesiana* (L.) Willd., *Acacia ferox* M. Martens & Galeotti, *Mimosa farnesiana* L.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COR, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAN, PAI, PHA). URY(CAS, MON, SAO).

Vachellia horrida (L.) Kyal. & Boatwr.

Sin.: *Acacia horrida* (L.) Willd., *Mimosa horrida* L.

Árbol. Introducida. 0-900 m.

Países: CHL(ATA, RME). URY(MON).

Vachellia ibirocayensis (Marchiori)

Deble & Marchiori

Sin.: *Acacia ibirocayensis* Marchiori
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso

Sin.: *Acacia karroo* Hayne
Arbusto o arbolito. Introducida.
Países: ARG(MEN). CHL(TAR, RME).

Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger

Sin.: *Acacia macracantha* Humb. & Bonpl. ex Willd.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-100 m. Países: ARG(FOR, JUJ). CHL(AYP, TAR).

Vatairea Aubl.

Vatairea heteroptera (Allemão) Ducke

Sin.: *Machaerium heteropterum* Allemão
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Vicia L.

Vicia andicola Kunth

Sin.: *Vicia andicola* Phil., nom. illeg., *Vicia andicola* Kunth var. *galbina* J.F. Macbr., *Vicia andicola* Kunth var. *mathewsii* (A. Gray) J.F. Macbr., *Vicia mathewsii* A. Gray

Hierba. Nativa. 1200-2300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Vicia araucana Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU, BIO).

Vicia benghalensis L.

Sin.: *Vicia atropurpurea* Desf., *Vicia atropurpurea* Desf. f. *alba* B.V. Rainha, *Vicia benghalensis* L. var. *atropurpurea* (Desf.) Nègre

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, MAG, RME). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, SJO, SOR).

Vicia berteroa Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO, RME).

Vicia bijuga Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Lathyrus anomalus* Phil., *Vicia saffordii* Phil., *Vicia sericella* Speg., *Vicia sericella* Speg. var. *glabrata* Speg., *Vicia solisii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, LLA, AIS, MAG, RME).

Vicia coquimbensis Martic.

Sin.: *Vicia truncata* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Vicia cracca L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Vicia disperma DC.

Sin.: *Cracca disperma* (DC.) Godr. & Gren.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU). URY(COL, MON).

Vicia diversifolia Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LLA).

Vicia epetiolaris Burkart var.**epetiolaris**

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(MIE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

Vicia epetiolaris Burkart var.**microcarpa** Vanni & D. Kurtz

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(RGS).

Vicia faba L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). BRA(SCA). URY(SOR).

Vicia graminea Sm. var. **graminea**

Sin.: *Vicia bidentanta* Hook., *Vicia graminea* Sm. var. *heterophylla* Kuntze, *Vicia graminea* Sm. var. *multiflora* Hook. & Arn., *Vicia grata* Phil., *Vicia selloi* Vogel
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, RNE, SCR, SFE). BRA(RGS). CHL(AIS, MAG, RME). PRY(MIE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

Vicia graminea Sm. var. **nigricarpa**

N.R. Bastos & Miotto

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Vicia graminea Sm. var. **transiens**

Burkart

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, SFE). URY(CLA, COL, FLO, LAV, PAY, ROC, SJO, SOR).

Vicia hatschbachii Burkart ex Vanni & D. Kurtz

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Vicia hirsuta (L.) Gray

Sin.: *Cracca hirsuta* (L.) Gennari, *Ervum hirsutum* L.

Hierba. Introducida. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU). BRA(RGS). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

Vicia hybrida L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(MON).

Vicia inconspicua Phil.

Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(ARA, LLA).

Vicia lanceolata Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Vicia linearifolia Hook. & Arn.

Sin.: *Vicia hookeri* G. Don, *Vicia linearifolia* Larrañaga, nom. illeg., *Vicia micrantha* Hook. & Arn.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO, ARA, LLA, AIS). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

Vicia magellanica Hook. f. var.**dianthes** (Phil.) Reiche

Sin.: *Vicia dianthes* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ARA).

Vicia magellanica Hook. f. var. **magellanica**

Sin.: *Vicia depauperata* Clos, *Vicia kingii* Hook. f., *Vicia morenonis* Harms ex Kuntze var. *burmeisterii* Kuntze, *Vicia morenonis* Harms ex Kuntze, *Vicia patagonica* Hook. f. var. *depauperata* (Clos) Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Vicia modesta Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT, VAL).

Vicia montevidensis Vogel

Sin.: *Vicia montevidensis* Benth., nom. nud., *Vicia montevidensis* Vogel f. *oblonga* Burkart, *Vicia obscura* Vogel
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, SJO, TAC).

Vicia mucronata Clos

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, RME).

Vicia nana Vogel

Sin.: *Vicia dentata* Gillies ex Hook. & Arn., *Vicia leptantha* Phil., *Vicia nana* Kellogg, nom. illeg., *Vicia valdiviana* Phil.

Enredadera. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). CHL(BIO, LLA). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, TYT).

Vicia nigricans Hook. & Arn.

Sin.: *Vicia andina* Phil., *Vicia apiculata* Phil. var. *parvifolia* Phil., *Vicia apiculata* Phil., *Vicia commutata* Phil., *Vicia coxii* Phil., *Vicia darapskiana* Phil., *Vicia fodinarum* Phil., *Vicia leyboldii* Phil., *Vicia macraei* Hook. & Arn., *Vicia magnifolia* Clos, *Vicia moorei* Phil., *Vicia speciosa* Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Vicia pallida Hook. & Arn.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Vicia pampicola Burkart var.**burkartii** Giangualani

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR). URY(CAS, FLA, MON, SJO).

Vicia pampicola Burkart var. **pampicola**

Sin.: *Vicia stenophylla* Vogel var. *martinezii* Burkart

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS). URY(MON, RNO, SJO).

Vicia parviflora Cav.

Sin.: *Ervum gracile* (Loisel.) DC., *Ervum tenuissimum* M. Bieb., *Vicia gayi* Phil., *Vicia gracilis* Loisel., *Vicia parviflora* Hook. & Arn., nom. illeg., *Vicia tenuissima* (M. Bieb.) Schinz & Thell.
Enredadera. Introducida.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC). CHL(ARA).

Vicia platensis Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). URY(MAL, MON, PAY, SJO).

Vicia sativa L. subsp. **cordata** (Wulfen ex Hoppe) Asch. & Graebn.

Sin.: *Vicia angustifolia* L. var. *cordata* (Wulfen ex Hoppe) Boiss., *Vicia cordata* Wulfen ex Hoppe
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, MEN, NEU).

Vicia sativa L. subsp. **nigra** (L.) Ehrh.

Sin.: *Vicia angustifolia* L., *Vicia sativa* L. subsp. *angustifolia* (L.) Asch. & Graebn., *Vicia sativa* L. var. *nigra* L., *Vicia sativa* L. var. *angustifolia* L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, NEU, RNE). BRA(PAR, RGS). CHL(BIO, ARA, LLA, RME). URY(COL, LAV, MON, TYT).

Vicia sativa L. subsp. **sativa**

Sin.: *Vicia sativa* L. var. *obovata* Ser.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, NEU, RNE, SFE). BRA(SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). URY(MON, SOR).

Vicia sessiliflora Clos

Hierba. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Vicia setifolia Kunth var. **bonariensis**

Burkart
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Vicia setifolia Kunth var. **setifolia**

Sin.: *Vicia acerosa* Clos, *Vicia acerosa* Clos var. *angustifolia* (Clos) Reiche, *Vicia angustifolia* Clos, hom. illeg., *Vicia graminea* Sm. var. *setifolia* (Kunth) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, NEU, SAL, SLU, SFE, TUC). CHL(BIO, LLA, RME). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON, PAY, SAO, SJO).

Vicia stenophylla Vogel

Sin.: *Vicia macrograminea* Burkart, *Vicia montevidensis* Vogel var. *macrocarpa* Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI, PHA). URY(MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

Vicia subserrata Phil.

Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Vicia tephrosoides Vogel

Enredadera. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(ITA).

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

Sin.: *Ervum tetraspermum* L.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, VAL, LBO, MAU, AIS, MAG, RME).

Vicia vicina Clos

Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Vicia villosa Roth subsp. **eriocarpa**

(Hausskn.) P.W. Ball
Sin.: *Vicia eriocarpa* (Hausskn.)
Halácsy, *Vicia villosa* Roth var. *eriocarpa* Hausskn.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, COL, MON, PAY, SOR).

Vicia villosa Roth subsp. **varia** (Host) Corb.

Sin.: *Vicia dasycarpa* Ten., *Vicia varia* Host, *Vicia villosa* Roth subsp. *dasycarpa* (Ten.) Cavill.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: URY(MON, PAY).

Vicia villosa Roth subsp. **villosa**

Sin.: *Cracca villosa* (Roth) Godr. & Gren.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SAL, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Vigna Savi**Vigna lasiocarpa** (Mart. ex Benth.) Verdc.

Sin.: *Phaseolus balansae* Micheli, *Phaseolus hirsutus* Mart. ex Benth., *Phaseolus lasiocarpus* Mart. ex Benth., *Phaseolus lasiocarpus* Mart. ex Benth. var. *balansae* (Micheli) Chodat & Hassl., *Phaseolus lasiocarpus* Mart. ex Benth. var. *igatimianus* Chodat & Hassl., *Phaseolus pilosus* Kunth var. *lasiocarpus* (Mart.) Hassl., *Phaseolus pilosus* Kunth, nom. illeg.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAU, PAI).

Vigna linearis (Kunth) Maréchal,

Mascherpa & Stainier
Sin.: *Phaseolus asper* Benth., *Phaseolus coriaceus* Desv., *Phaseolus elongatus* Rose, *Phaseolus grandiflorus* Steud., *Phaseolus linearis* Kunth, *Phaseolus linearis* Kunth var. *coriaceus* (Desv.) Chodat & Hassl., *Phaseolus linearis* Kunth var. *latifolius* Benth., *Phaseolus linearis* Kunth var. *violaceus* (Vell.) Hassl., *Phaseolus violaceus* Vell., *Vigna linearis* (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier var. *latifolia* (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Hierba, subarbusto o enredadera.
Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, GUA).

Vigna longifolia (Benth.) Verdc.

Sin.: *Phaseolus longifolius* Benth., *Phaseolus ovatus* Benth., *Phaseolus productus* Ducke, *Phaseolus schottii* Benth. f. *ovatus* (Benth.) Hassl., *Phaseolus schottii* Benth. var. *genuinus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus schottii* Benth. var. *longifolius* (Benth.) Hassl., *Phaseolus schottii* Benth.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CHO, MIE, ÑEE, PHA). URY(CAS, MAL, MON, RIV, ROC, SJO).

Vigna luteola (Jacq.) Benth.

Sin.: *Dolichos gangeticus* Roxb., *Dolichos luteolus* Jacq., *Dolichos niloticus* Delile, *Dolichos repens* L., *Phaseolus luteolus* (Jacq.) Gagnep., *Scytalis helicopus* E. Mey., *Vigna brachystachyus* Benth., *Vigna bukonesis* Harms, *Vigna glabra* Savi, *Vigna helicopus* (E. Mey.) Walp., *Vigna nigenica* A. Chev., *Vigna nilotica* (Delile) Hook. f., *Vigna repens* (L.) Kuntze, nom. illeg., *Vigna villosa* Savi
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Vigna vexillata (L.) Rich.

Sin.: *Phaseolus vexillatus* L.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Weberbauerella Ulbr.**Weberbauerella chilensis** Faúndez & Saldívia

Hierba. Endémica. 2500-3600 m.
Países: CHL(TAR, ATA).

Zapoteca H.M. Hern.**Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.

Sin.: *Acacia formosa* Kunth, *Acacia gracilis* M. Martens & Galeotti, *Anneslia chapaderoana* Britton & Rose, *Anneslia cookii* Britton & Rose, *Anneslia formosa* (Kunth) Britton & Millsp., *Anneslia marginata* (Griseb. ex R.O. Williams)

Moldenke, *Anneslia penduliflora* (Rose) Britton & Rose, *Calliandra capillata* Benth., *Calliandra formosa* (Kunth) Benth., *Calliandra gentryi* Standl., *Calliandra gracilis* Griseb., *Calliandra malacophylla* Benth., *Calliandra marginata* Griseb. ex R.O. Williams, *Calliandra penduliflora* Rose, *Calliandra viridiflora* Benth., *Feuilleea formosa* (Kunth) Kuntze, *Feuilleea malacophylla* (Benth.) Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).

BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, AMA, CON, PHA).

Zapoteca portoricensis (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.

Sin.: *Acacia alba* Colla, *Acacia hamiltonii* Desv. ex Ham., *Acacia linearis* Desv. ex Ham., nom. illeg., *Acacia portoricensis* (Jacq.) Willd., *Acacia unguolata* Desv., *Acacia venusta* Willd., *Acacia vespertina* Macfad., *Anneslia portoricensis* (Jacq.) Donn. Sm., *Calliandra portoricensis* (Jacq.) Benth., *Feuilleea portoricensis* (Jacq.) Kuntze, *Lysiloma marchiana* Griseb., *Mimosa guineensis* Schumach. & Thonn., *Mimosa portoricensis* Jacq.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Zollernia Mart.

Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel

Sin.: *Coquebertia ilicifolia* Brongn., *Zollernia houlettiana* Tul., *Zollernia securidacifolia* Benth., *Zollernia vogelii* Tul.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zollernia splendens Maximilian & Nees

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Zornia J.F. Gmel.

Zornia burkartii Vanni

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU).

Zornia contorta Mohlenbr.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, SAO, TAC).

Zornia crinita (Mohlenbr.) Vanni

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *sericea* Chodat & Hassl., *Zornia pardina* Mohlenbr. var. *crinita* Mohlenbr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, SAL).

BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, SPE).

Zornia cryptantha Arechav.

Sin.: *Zornia cryptantha* Arechav. var. *lactibracteata* Vanni, *Zornia lanata* Mohlenbr., *Zornia latifolia* DC. var. *cryptantha* (Arechav.) Burkart, *Zornia latifolia* DC. var. *villosa* Malme, *Zornia villosa* (Malme) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, COA). URY(CLA, RIV, TAC).

Zornia curvata Mohlenbr.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *diversifolia* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Zornia fimbriata Mohlenbr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Zornia glabra Desv.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *elatior* Benth., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *perforata* (Vogel) Kuntze, *Zornia perforata* Vogel

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Zornia latifolia Sm.

Sin.: *Hedysarum gemellum* Willd., *Zornia diphylla* (L.) Pers. subsp. *gracilis* (DC.) Malme, *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *bernardinensis* Chodat & Hassl., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *gracilis* (DC.) Benth., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *pubescens* (Kunth) Benth., *Zornia gemella* (Willd.) Vogel, *Zornia gracilis* DC., *Zornia latifolia* Sm. var. *bernardinensis* (Chodat & Hassl.) Mohlenbr., *Zornia pubescens* Kunth, *Zornia surinamensis* Miq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(ART, CLA, PAY, RIV, SAO).

Zornia multinervosa Burkart ex Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR).
BRA(RGS). PRY(MIE, ÑEE). URY(ART, CLA, SAO).

Zornia orbiculata Mohlenbr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(RGS). PRY(PAI). URY(ART, DUR, PAY, RNO, SAO).

Zornia pardina Mohlenbr.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *microphylla* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN). URY(ART, CLA, LAV, SAO).

Zornia ramboiana Mohlenbr.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Zornia reticulata Sm.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *ciliata* Chodat & Hassl., *Zornia diphylla* (L.) Pers. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *reticulata* (Sm.) Benth., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *rupestris* Chodat & Hassl., *Zornia echinata* Mohlenbr., *Zornia ovata* Vogel

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, AMA, CAN, COA, GUA, SPE).

Zornia sericea Moric.

Sin.: *Zornia diphylla* (L.) Pers. subsp. *latifolia* (DC.) Malme, *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *latifolia* (DC.) Benth., *Zornia latifolia* DC., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, PAI). URY(RIV).

Zornia trachycarpa Vogel

Sin.: *Zornia brachycarpa* Walp., *Zornia diphylla* (L.) Pers. var. *trachycarpa* (Vogel) Benth., *Zornia linearifoliolata* N.F. Mattos

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS).
PRY(MIE). URY(ART, CLA, COL, CLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Zuccagnia Cav., nom. cons.

Zuccagnia punctata Cav.

Arbusto. Endémica. 700-2700 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Zygia P. Browne

Zygia cataractae (Kunth) L. Rico

Sin.: *Calliandra schwackeana* Taub., *Feuillea cataractae* (Kunth) Kuntze, *Feuillea divaricata* (Benth.) Kuntze, *Inga cataractae* Kunth, *Inga glomerata* DC., *Inga ramiflora* G. Don, *Pithecellobium cataractae* (Kunth) Benth., *Pithecellobium cauliflorum* (Willd.) Mart. f. *nivea* Lindm., *Pithecellobium divaricatum* Benth., *Pithecellobium glomeratum* (DC.) Benth., *Zygia divaricata* (Benth.) Pittier, *Zygia glomerata* (DC.) Pittier
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(CEN).

Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle var. **glabrata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Pithecellobium glabratum* Mart.
Arbusto o arbolito. Nativa.
Países: BRA(PAR). PRY(APA).

Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle var. **latifolia**

Sin.: *Mimosa latifolia* L.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Zygia morongii Barneby & J.W. Grimes

Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(CEN, ÑEE, PHA).

Zygia pithecolobioides (Harms ex Kuntze) Barneby & J.W. Grimes

Sin.: *Feuillea pithecolobioides* (Harms ex Kuntze) Kuntze, *Inga pithecolobioides* Harms ex Kuntze, *Pithecellobium pithecolobioides* (Harms ex Kuntze) Hassl. var. *harmsii* Hassl., nom. superfl., *Pithecellobium pithecolobioides* (Harms ex Kuntze) Hassl., *Pithecellobium pithecolobioides* (Harms ex Kuntze) Hassl. var. *reductum* (Malme) Hassl., *Pithecellobium reductum* Malme, *Zygia reducta* (Malme) L. Rico, comb. illeg.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, CON, PHA).

FAGACEAE

Quercus L.

Quercus robur L.

Árbol. Introducida.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, JFE).

FRANCOACEAE

Araeoandra Lefor

Araeoandra tenuicaulis (Barnéoud) Lefor

Sin.: *Viviania tenuicaulis* Barnéoud
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ).

Balbisia Cav., nom. cons.

Balbisia aphanifolia (Griseb.) Hunz. & Ariza

Sin.: *Wendtia aphanifolia* Griseb.
Subarbusto. Endémica. 1600-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).

Balbisia calycina (Griseb.) Hunz. & Ariza

Sin.: *Viviania calycina* Griseb., *Wendtia argentea* Griseb., *Wendtia calycina* (Griseb.) Griseb., *Wendtia calycina* (Griseb.) Griseb. var. *argentea* (Griseb.) Hieron.

Subarbusto. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Balbisia gracilis (Meyen) Hunz. & Ariza

Sin.: *Wendtia gracilis* Meyen, *Wendtia gracilis* Meyen var. *typica* Knuth, nom. inval., *Wendtia reynoldsii* Endl. ex Walp., *Wendtia trigyna* (Kunze) Kuntze, *Wendtia trigyna* (Kunze) Kuntze var. *poepigiana* Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Balbisia integrifolia R. Knuth

Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Balbisia meyeniana Klotzsch

Sin.: *Dematophyllum salsoloides* Griseb., *Ledocarpon meyenianum* (Klotzsch) Steud.
Subarbusto. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Balbisia microphylla (Phil.) Reiche

Sin.: *Ledocarpon microphylla* Phil.
Subarbusto. Endémica. 3000-3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ATA).

Balbisia miniata (I.M. Johnst.)

Descole & O'Donell & Lourteig var.

anomala Ariza & Novara

Hierba. Endémica. 900-2400 m.
Países: ARG(SAL).

Balbisia miniata (I.M. Johnst.)

Descole & O'Donell & Lourteig var.

miniata

Sin.: *Wendtia miniata* I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).

Balbisia peduncularis (Lindl.) D. Don

Sin.: *Cruckshanksia cistiflora* Hook. & Arn., *Ledocarpon cistiflorum* Meyen, nom. nud., *Ledocarpon pedunculare* Lindl.
Subarbusto. Nativa. 200-500 m.
Países: CHL(AYP, ANT, ATA, COQ).

Balbisia stitchkinii Ricardi

Subarbusto. Endémica. 3800-4000 m.
Países: CHL(AYP).

Caesarea Cambess.

Caesarea albiflora Cambess.

Sin.: *Caesarea montevidensis* Klotzsch, *Viviania paranensis* Knuth, *Caesarea petiolata* Klotzsch, *Viviania albiflora* (Cambess.) Reiche, *Viviania montevidensis* (Klotzsch) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, TAC).

Cissarobryon Kunze ex Poepp.

Cissarobryon elegans Kunze ex Poepp.

Sin.: *Cissarobryon aristulatum* Phil., *Cissarobryon macrophyllum* Phil., *Cissarobryon parvifolium* Phil.
Hierba o arbusto. Endémica. 200-2500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Francoa Cav.**Francoa appendiculata** Cav. var. **appendiculata**

Hierba. Endémica. 800-1500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Francoa appendiculata Cav. var. **ramosa** (D. Don) Rolfe

Sin.: *Francoa ramosa* D. Don
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Francoa appendiculata Cav. var. **sonchifolia** (Cav.) Rolfe

Sin.: *Francoa sonchifolia* Cav.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Tetilla DC.**Tetilla hydrocotylifolia** DC.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME).

Viviania Cav.**Viviania crenata** (Hook.) G. Don

Sin.: *Macraea crenata* Hook.
Arbusto. Endémica. 0-2300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Viviania linostigma R. Knuth

Hierba. Endémica. 1400-1600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Viviania marifolia Cav.

Sin.: *Macraea rosea* Lindl., *Viviania brevipedunculata* Phil., *Viviania laxa* Phil., *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch
Arbusto. Endémica. 3200-4000 m.
Países: ARG(NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Viviania ovata Phil.

Sin.: *Viviania bernalisii* Phil., *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch var. *ovata* (Phil.) Reiche, *Viviania viridis* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

FRANKENIACEAE

Frankenia L.**Frankenia chilensis** C. Presl

Sin.: *Coldenia glabra* Phil., *Frankenia aspera* Phil., *Frankenia campestris* Schauer, *Frankenia chilensis* C. Presl var. *aspera* (Phil.) I.M. Johnst., *Frankenia chilensis* C. Presl var. *campestris* (Schauer) Gunckel, *Frankenia erecta* Gay, *Frankenia farinosa* J. Remy, *Frankenia florida* Phil., *Frankenia glabrata* Phil., *Frankenia nicolletiana* Gay var. *florida* (Phil.) Reiche, *Frankenia nicolletiana* Gay
Arbusto. Nativa.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

Frankenia chubutensis Speg.

Sin.: *Niederleinia chubutensis* (Speg.) Nied.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Frankenia fischeri Hicken

Arbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: ARG(LPA, NEU, RNE).

Frankenia juniperoides (Hieron.)

M.N. Correa
Sin.: *Frankenia microphylla* Cav. var. *juniperina* (Hieron.) Speg., *Niederleinia juniperoides* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE).

Frankenia microphylla Cav.

Sin.: *Franca microphylla* (Cav.) Vis., *Frankenia microphylla* Cav. var. *relaxata* Speg., *Niederleinia microphylla* (Cav.) Hieron. ex Nied.
Subarbusto. Endémica. 0-400 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Frankenia patagonica Speg.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Frankenia pulverulenta L.

Sin.: *Frankenia pampeana* Speg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SFE).

Frankenia salina (Molina) I.M. Johnst.

Sin.: *Frankenia berteroa* Gay, *Frankenia micrantha* Gay, *Frankenia salina* (Molina) I.M. Johnst. var. *micrantha* (Gay) Gunckel
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Frankenia triandra J. Remy

Sin.: *Anthobryum aretioides* Phil., *Anthobryum clarenii* (R.E. Fr.) Cabrera, *Anthobryum tetragonum* Phil., *Anthobryum triandrum* (J. Remy) Surgis, *Frankenia clarenii* R.E. Fr., *Pycnophyllum sulcatum* Griseb.
Subarbusto. Nativa. 3300-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Frankenia vidalii F. Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(IDE).

GENTIANACEAE

Blackstonia Huds.**Blackstonia perfoliata** (L.) Huds.

Sin.: *Chlora perfoliata* L., *Gentiana perfoliata* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, MEN). URY(CAS, MAL, MON).

Calolisianthus (Griseb.) Gilg

Calolisianthus amplissimus (Mart.) Gilg
Sin.: *Helia amplissima* (Mart.) Kuntze, *Irlbachia amplissima* (Mart.) Maas, *Lisianthus amplissimus* Mart.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Calolisianthus pedunculatus (Cham. & Schltdl.) Gilg

Sin.: *Irlbachia pedunculata* (Cham. & Schltdl.) Maas, *Lisianthus elegans* Mart., *Lisianthus elegans* Mart. var. *pedunculatus* (Cham. & Schltdl.) Progel, *Lisianthus pedunculatus* Cham. & Schltdl.
Hierba. Nativa. 800-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Calolisianthus pendulus (Mart.) Gilg

Sin.: *Helia pendula* (Mart.) Kuntze,
Irlbachia pendula (Mart.) Maas,
Lisianthus pendulus Mart.
Hierba. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR).

Calolisianthus speciosus (Cham. & Schltld.) Gilg

Sin.: *Helia speciosa* (Cham. & Schltld.)
Kuntze, *Irlbachia speciosa* (Cham. &
Schltld.) Maas, *Lisianthus speciosus*
Cham. & Schltld.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Centaurium Hill**Centaurium ameghinoi** (Speg.) Druce

Sin.: *Erythraea ameghinoi* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Centaurium cathanlahuen (Molina)

B.L. Rob.

Sin.: *Centaurium chilense* (Willd.)
Druce, nom. illeg., *Chironia chilensis*
Willd., nom. illeg., *Erythraea chilensis*
(Willd.) Pers. var. *humilis* Phil. ex
Reiche, *Erythraea chilensis* (Willd.)
Pers., *Erythraea quitensis* Kunth,
Gentiana cathanlahuen Molina, *Gentiana*
peruviana Lam.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

Centaurium erythraea Rafn

Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE). BRA(RGS).
CHL(LLA, AIS).

Centaurium littorale (Turner)

Gilmour

Sin.: *Centaurium vulgare* Raf., nom.
superfl., *Chironia littoralis* Turner,
Erythraea centaurium L. subsp. *littoralis*
(Turner) Hook., *Erythraea littoralis*
(Turner) Fr., *Gentiana centaurium* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). CHL(ARA, LLA, AIS).

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce

Sin.: *Gentiana pulchella* Sw.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,
SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS).
CHL(LRI, LLA). URY(ART, MON).

Chelonanthus Gilb.**Chelonanthus grandiflorus** (Aubl.)

Chodat & Hassl.
Sin.: *Lisianthus grandiflorus* Aubl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Chelonanthus purpurascens (Aubl.)

Struwe, S. Nilsson & V.A. Albert
Sin.: *Lisianthus purpurascens* Aubl.
Hierba a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chelonanthus viridiflorus (Mart.) Gilg

Sin.: *Helia viridifolia* (Mart.) Kuntze,
Irlbachia alata (Aubl.) Maas subsp.
viridiflora (Mart.) J. Perss. & Maas,
Lisianthus viridifolius Mart.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, CAU, CAN, ITA, SPE).

Cicendia Adans.**Cicendia quadrangularis** (Lam.) Griseb.

Sin.: *Exacum chilense* Bertero, nom.
nud., *Exacum inflatum* Hook. & Arn.,
Exacum quadrangulare (Lam.) Willd.,
Gentiana flava Larrañaga, *Gentiana*
quadrangularis Lam., *Microcala*
quadrangularis (Dombey ex Lam.)
Griseb.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, NEU).
CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, RME). URY(ART, COL,
FLO, MON, SJO).

Curtia Cham. & Schltld.**Curtia conferta** (Mart.) Knobl.

Sin.: *Curtia confusa* Grothe & Maas,
Schuebleria conferta Mart.
Hierba. Nativa. 100-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Curtia tenuifolia (Aubl.) Knobl.

Sin.: *Apophragma tenuifolium* (Aubl.)
Griseb., *Curtia malmeana* Gilg, *Curtia*
montevicensis Arechav., *Exacum*
tenuifolium Aubl., *Schuebleria patula*
Mart. var. *selloana* Progel, *Schuebleria*
tenuifolia (Aubl.) G. Don
Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN).
URY(CAS).

Deianira Cham. & Schltld.**Deianira nervosa** Cham. & Schltld.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Gentiana L.**Gentiana gayi** Griseb. subsp. **gayi**

Sin.: *Gentiana minima* Phil., nom.
illeg., *Gentiana podocarpa* (Phil.) Griseb.,
Gentiana prostrata Haenke f. *imbricata*
Kusn., *Gentiana prostrata* Haenke f.
intermedia Kusn., *Gentiana prostrata*
Haenke var. *podocarpa* (Phil.) Kusn.,
Gentiana ramosissima Phil., nom. illeg.,
Varasia podocarpa Phil., *Varasia sessilis* Phil.
Hierba. Nativa.
Países: CHL(COQ, RME).

Gentiana gayi Griseb. subsp.

magellanica (Kusn.) S. Pfanzelt & K.B.
Hagen

Sin.: *Gentiana prostrata* Haenke f.
magellanica Kusn.
Hierba. Endémica. 500-1100 m.
Países: CHL(MAG).

Gentiana prostrata Haenke

Sin.: *Gentiana prostrata* Haenke var.
americana Engelm., *Gentiana prostrata*
Haenke var. *typica* Hauman, nom. inval.,
Gentiana sedifolia Kunth, *Gentiana*
sedifolia Kunth var. *compacta* Griseb.,
Gentiana sedifolia Kunth var. *elongata*
Griseb., *Gentiana sedifolia* Kunth var.
imbricata Griseb., *Gentiana sedifolia*
Kunth var. *lineata* Phil., *Gentiana*
sedifolia Kunth var. *micrantha* Wedd.

Hierba. Nativa. 1800-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI,
MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,
LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

Gentianella Moench, nom. cons.**Gentianella benedictae** (Gilg) Fabris

Sin.: *Gentiana benedictae* Gilg
Hierba. Nativa. 2900 m.
Países: ARG(SAL).

Gentianella bromifolia (Griseb.) T.N.

Ho & S.W. Liu

Sin.: *Gentiana bromifolia* Griseb.
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Gentianella cabreræ (Fabris) Fabris
Sin.: *Gentiana cabreræ* Fabris
Hierba. Endémica. 3100-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella claytonioides (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu
Sin.: *Gentiana claytonioides* Gilg
Hierba. Endémica. 2900-3400 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Gentianella coquimbensis (Briq.) Martic. & Quezada
Sin.: *Gentiana coquimbensis* Briq., *Gentianella coquimbensis* (Briq.) T.N. Ho & S.W. Liu, comb. superfl.
Hierba. Endémica. 1600-3500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Gentianella cosmantha (Griseb.) J.S. Pringle
Sin.: *Gentiana cosmantha* Griseb., *Gentianella cosmantha* (Griseb.) J.S. Pringle f. *violacea* Fabris
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gentianella erythrochrysea (Gilg) Fabris
Sin.: *Gentiana erythrochrysea* Gilg
Hierba. Nativa. 3900-4000 m.
Países: ARG(SAL).

Gentianella fabrisii Filippa & Barboza
Hierba. Endémica. 3600 m.
Países: ARG(TUC).

Gentianella fiebrigii (Gilg) Holub
Sin.: *Gentiana fiebrigii* Gilg, *Gentiana gynophora* Gilg
Hierba. Nativa. 3500-4900 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Gentianella florida (Griseb.) Holub
Sin.: *Gentiana florida* Griseb., *Gentiana torensis* Gilg
Hierba. Nativa. 200-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gentianella gageoides (Gilg) Fabris
Sin.: *Gentiana campanuloides* Gilg, hom. illeg., *Gentiana gageoides* Gilg, *Gentianella cupiformis* T.N. Ho & S.W. Liu
Hierba. Nativa. 1500-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella helianthemoides (Gilg) Fabris
Sin.: *Gentiana helianthemoides* Gilg, *Gentianella helianthemoides* (Gilg) J.S. Pringle, comb. superfl.
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella hieronymi (Gilg) Fabris
Sin.: *Gentiana hieronymi* Gilg
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella imberbis (Griseb.) Filippa & Barboza
Sin.: *Gentiana imberbis* Griseb.
Hierba. Nativa. 2600-2700 m.
Países: ARG(CAT).

Gentianella kurtzii (Gilg) Fabris
Sin.: *Gentiana kurtzii* Gilg
Hierba. Endémica. 3200-4400 m.
Países: ARG(CAT, LRI, TUC).

Gentianella magellanica (Gaudich.) Fabris ex D.M. Moore
Sin.: *Gentiana araucana* Phil., *Gentiana lactea* Phil., *Gentiana magellanica* Gaudich. f. *albiflora* Speg., *Gentiana magellanica* Gaudich. f. *cyanescens* Speg., *Gentiana magellanica* Gaudich. f. *pumila* (Albov) Speg., *Gentiana magellanica* Gaudich. var. *darwinii* (Griseb.) Speg., *Gentiana magellanica* Gaudich., *Gentiana modesta* Phil., *Gentiana patagonica* Griseb. f. *pumila-uniflora* Albov, *Gentiana patagonica* Griseb. var. *darwinii* Griseb., *Gentiana patagonica* Griseb., *Gentiana pearcei* Phil. f. *nana* Hauman, *Gentiana pearcei* Phil., *Gentiana valdiviana* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Gentianella meyeniana (Griseb.) Fabris
Sin.: *Gentiana meyeniana* Griseb.
Hierba. Nativa. 4000-4600 m.
Países: ARG(JUU).

Gentianella multicaulis (Gillies ex Griseb.) Fabris
Sin.: *Gentiana achalensis* Hieron. ex Gilg, *Gentiana coerulescens* Gillies ex Griseb., *Gentiana diffusa* Vahl var. *mendozensis* Griseb., *Gentiana gilliesii* Gilg, nom. superfl., *Gentiana mendocina* Gilg, *Gentiana multicaulis* Gillies ex Griseb., *Gentiana stuckertii* Briq., *Gentianella achalensis* (Hieron. ex Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu, *Gentianella gilliesii* (Gilg) Martic. & Arroyo, nom. illeg., *Gentianella mendocina* (Gilg) J.S. Pringle
Hierba. Endémica. 1500-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU). CHL(ATA, COQ).

Gentianella multiflora (Griseb.) Fabris
Sin.: *Gentiana multiflora* Griseb.
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella myriantha (Gilg) Holub
Sin.: *Gentiana jujuyensis* Fabris, *Gentiana myriantha* Gilg, *Gentianella myriantha* (Gilg) Fabris, comb. superfl.
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella oranensis (Fabris) Filippa & Barboza
Sin.: *Gentiana oranensis* Fabris
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella ottonis (Phil.) Muñoz
Sin.: *Gentiana hexamera* Phil., *Gentiana ottonis* Phil., *Gentiana ottonis* Phil. var. *hexamera* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 2400-3300 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Gentianella parviflora (Griseb.) T.N. Ho
Sin.: *Gentiana coerulescens* Gillies ex Griseb. var. *parviflora* Griseb., *Gentiana galanderi* Hieron., nom. nud., *Gentiana parviflora* (Griseb.) Gilg
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(COR).

Gentianella pseudocrassula (Gilg) Fabris
Sin.: *Gentiana clarenii* Gilg, *Gentiana pseudocrassula* Gilg, *Gentianella clarenii* (Gilg) Fabris
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUU, LRI, SAL).

Gentianella pulla (Griseb.) T.N. Ho & S.W. Liu
Sin.: *Gentiana pulla* Griseb.
Hierba. Endémica. 2200-4100 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Gentianella punensis (Fabris) Fabris
Sin.: *Gentiana punensis* Fabris
Hierba. Endémica. 4000-4200 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Gentianella riojae (Gilg) Fabris ex J.S. Pringle
Sin.: *Gentiana riojae* Gilg
Hierba. Endémica. 2100-2400 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Gentianella silenoides (Gilg) Fabris
var. **silenoides**

Sin.: *Gentiana silenoides* Gilg
Hierba. Nativa. 2500-2800 m.
Países: ARG(SAL).

Gentianella silenoides (Gilg) Fabris
var. **striaticalyx** (Gilg) T.N. Ho
Sin.: *Gentiana anthosphaera* Gilg,
Gentiana herzogii Gilg, *Gentiana striaticalyx*
Gilg, *Gentianella anthosphaera* (Gilg) Fabris,
comb. superfl., *Gentianella anthosphaera*
(Gilg) Holub

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(SAL).

Gentianella tarapacana (Gilg) T.N.
Ho & S.W. Liu

Sin.: *Gentiana tarapacana* Gilg
Hierba. Endémica. 3800 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Gentianella thiosphaera (Gilg) Holub
Sin.: *Gentiana meyeri* Fabris, *Gentiana*
thiosphaera Gilg

Hierba. Nativa. 2500-3300 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Gentianella tubulosa (Gilg) Fabris
Sin.: *Gentiana tubulosa* Gilg
Hierba. Endémica. 2500-3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Halenia Borkh., nom. cons.**Halenia hieronymi** Gilg
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Helia Mart.**Helia brevifolia** Cham.
Sin.: *Lisianthus brevifolius* (Cham.)
Griseb.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Helia oblongifolia Mart.
Sin.: *Helia micrantha* Gilg
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA,
ITA, PAI, SPE).
Irlbachia Mart.**Irlbachia alata** (Aubl.) Maas subsp.
angustifolia (Kunth) J. Persoon & Maas
Sin.: *Lisianthus angustifolius* Kunth
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).
Macrocarpaea (Griseb.) Gilg**Macrocarpaea rubra** Malme
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Schenkia Griseb.**Schenkia spicata** (L.) G. Mans.
Sin.: *Centaurium spicatum* (L.) Fritsch
ex Janch., *Gentiana spicata* L.
Hierba. Nativa.
Países: CHL(IPA).
Schultesia Mart., nom. cons.**Schultesia australis** Griseb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU,
CEN, GUA). URY(RIV).
Schultesia guianensis (Aubl.) Malme
Sin.: *Exacum guianense* Aubl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(COA).
Schultesia heterophylla Miq.
Sin.: *Schultesia hassleriana* Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).
Tetrapollinia Maguire & B.M.
Boom**Tetrapollinia caerulescens** (Aubl.)
Maguire & B.M. Boom
Sin.: *Lisianthus caerulescens* Aubl.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Voyria Aubl.**Voyria aphylla** (Jacq.) Pers.
Sin.: *Gentiana aphylla* Jacq.,
Leiphaimos aphylla (Jacq.) Gilg, *Voyria*
uniflora Pers.
Saprófita. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(CEN).
Voyria tenella Hook.
Saprófita. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(SCA).
Zygostigma Griseb.**Zygostigma australe** (Cham. &
Schltdl.) Griseb.
Sin.: *Erythraea uniflora* Hook. & Arn.,
Gentiana rubra Larrañaga, *Sabatia*
australis Cham. & Schltdl., *Zygostigma*
uniflora (Hook. & Arn.) Griseb.
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).
URY(COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV).

GERANIACEAE

Erodium L'Hér. ex Aiton**Erodium botrys** (Cav.) Bertol.
Sin.: *Geranium botrys* Cav.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA,
LRI, RME).
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton
Sin.: *Erodium chaerophyllum* (Cav.)
Steud., *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér.
ex Aiton f. *chaerophyllum* (Cav.) DC.,
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton
f. *hirsutum* (Jord.) Brumh., *Erodium*
cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton var.
arenicola (Steud.) Speg., *Erodium*
cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton var.
triviale (Jord.) Trautv., *Erodium triviale*
Jord., *Geranium arenicola* Steud.,
Geranium chaerophyllum Cav., *Geranium*
cicutarium L.

Hierba. Introducida. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU,
RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, MAG, RME, JFE). URY(PAY, SOR).

Erodium geoides A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA).
BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, ARA).
URY(COL, ROC).
Erodium malacoides (L.) L'Hér. ex
Aiton var. **malacoides**
Sin.: *Geranium malacoides* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SDE,
SFE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).
URY(MON).

Erodium malacoides (L.) L'Hér. ex Aiton var. **ribifolium** (Jacq.) DC.
Sin.: *Erodium ribifolium* Jacq.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton
Sin.: *Geranium cicutarium* L. var. *moschatum* L., *Geranium moschatum* (L.) L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MON).

Geranium L.

Geranium albicans A. St.-Hil.
Sin.: *Geranium rotundifolium* L. var. *americanum* A. St.-Hil., *Geranium selloi* Aedo & Muñoz Garm., *Geranium senecioides* R. Knuth, nom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, RNE, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLO, LAV, MAL, MON, SOR).

Geranium arachnoideum A. St.-Hil.
Hierba. Endémica. 500-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Geranium bertereanum Colla
Sin.: *Geranium andinum* Phil., *Geranium apricum* Phil., *Geranium bertereanum* Colla var. *apricum* (Phil.) Reiche, *Geranium bertereanum* Colla var. *caespitosum* Reiche, *Geranium bertereanum* Colla var. *hispidum* Reiche, *Geranium caespitosum* Phil., hom. illeg., *Geranium chilense* Aedo & Muñoz Garm., *Geranium collae* Aedo, Muñoz Garm. & Pando, *Geranium dissectum* L. var. *patagonica* (Hook. f.) Speg., *Geranium hispidum* Phil., hom. illeg., *Geranium intermedium* Colla, hom. illeg., *Geranium neohispidum* Aedo & Muñoz Garm., *Geranium patagonicum* Hook. f., *Geranium proximum* Steud., *Geranium submolle* Steud.
Hierba. Endémica. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Geranium carolinianum L.
Hierba. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, MIE, PAI). URY(RIV).

Geranium core-core Steud.
Sin.: *Geranium argentinum* R. Knuth, *Geranium commutatum* Steud. var. *oschsenii* (Phil.) Reiche, *Geranium commutatum* Steud., *Geranium melanopotamicum* Speg., *Geranium moorei* Phil., *Geranium ochsenii* Phil., *Geranium rapulum* A. St.-Hil. & Naudin, *Geranium squamosum* Phil., *Geranium subsericeum* R. Knuth
Hierba. Endémica. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TDF). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Geranium dissectum L.
Sin.: *Geranium dissectum* L. var. *typicum* R. Knuth, nom. inval.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(FLA, SJO, SOR).

Geranium fallax Steud.
Hierba. Nativa. 1200-3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Geranium glanduligerum R. Knuth
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(FOR). BRA(RGS, SCA).

Geranium leucanthum Griseb.
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Geranium magellanicum Hook. f.
Sin.: *Geranium magellanicum* Hook. f. var. *typicum* R. Knuth, nom. inval.
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Geranium molle L.
Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI, LPA, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME). URY(MON).

Geranium parodii I.M. Johnst.
Sin.: *Geranium magellanicum* Hook. f. var. *multifoliosum* R. Knuth, *Geranium magellanicum* Hook. f. var. *pumilum* R. Knuth, *Geranium sessiliflorum* Cav. var. *glabriusculum* Kuntze
Hierba. Endémica. 1800-2600 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Geranium planum Halloy
Hierba. Endémica. 4000-4600 m.
Países: ARG(TUC).

Geranium purpureum Vill.
Sin.: *Geranium robertianum* L. var. *incisa* A. St.-Hil.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI). URY(MON, PAY).

Geranium pusillum L.
Sin.: *Geranium pusillum* Burm. f., hom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN). CHL(MAU, AIS, MAG, RME).

Geranium robertianum L.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, JFE). URY(FLO, FLA).

Geranium rotundifolium L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Geranium sessiliflorum Cav.
Sin.: *Geranium santacruzense* R. Knuth, *Geranium sessiliflorum* Cav. f. *albiflorum* Kuntze, nom. nud., *Geranium sessiliflorum* Cav. var. *typicum* R. Knuth, nom. inval., *Geranium tucumanum* R. Knuth
Hierba. Nativa. 0-4800 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, COQ, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Geranium skottsbergii R. Knuth
Sin.: *Geranium bertereanum* Colla var. *ciliatum* Reiche, *Geranium bertereanum* Colla var. *philippi* (J.F. Macbr.) L.E. Navas, *Geranium ciliatum* Phil., hom. illeg., *Geranium philippii* J.F. Macbr.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, AIS, RME).

Geranium tafiense Aedo & Muñoz Garm.
Sin.: *Geranium delphinifolium* R. Knuth, nom. illeg.
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Geranium venturianum R. Knuth
Hierba. Nativa. 500-3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Hypseocharis J. Remy**Hypseocharis pimpinellifolia** J. Remy

Sin.: *Hypseocharis corydalifolia* R. Knuth
Hierba. Nativa. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Hypseocharis tridentata Griseb.

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

GESNERIACEAE

Asteranthera Klotzsch & Hanst.**Asteranthera ovata** (Cav.) Hanst.

Sin.: *Asteranthera chilensis* Klotzsch & Hanst., nom. nud., *Columnnea ovata* Cav.
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Besleria L.**Besleria selloana** Klotzsch & Hanst.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Codonanthe (Mart.) Hanst., nom. cons.**Codonanthe cordifolia** Chautems

Subarbusto. Nativa. 400-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Codonanthe devosiana Lem.

Sin.: *Coccanthera devosiana* (Lem.) C. Koch & Hanst.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Codonanthe gracilis (Mart.) Hanst.

Sin.: *Columnnea gracilis* (Mart.) Kuntze, *Codonanthe ventricosa* (Vell.) Hoehne, *Hypocyrtia gracilis* Mart., *Orobancha ventricosa* Vell.
Subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gloxinia L'Hér.**Gloxinia erinoides** (DC.) Roalson & Boggan

Sin.: *Achimenes argyrostigma* Hook., *Achimenes erinoides* DC., *Koellikeria argyrostigma* (Hook.) Regel, *Koellikeria erinoides* (DC.) Mansf.

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Gloxinia perennis (L.) Fritsch

Sin.: *Martynia perennis* L.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mitraria Cav.**Mitraria coccinea** Cav.

Sin.: *Gesneria chilensis* Feuillée ex Molina
Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Napeanthus Gardner**Napeanthus primulifolius** (Raddi)

Sandwith
Sin.: *Oxalis primulifolia* Raddi
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Napeanthus reitzii (L.B. Sm.) B.L.

Burt & Leeuwenb.
Sin.: *Hatschbachia reitzii* L.B. Sm.
Hierba. Endémica. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Nematanthus Schrad.**Nematanthus australis** Chautems

Subarbusto. Endémica. 200-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nematanthus fissus (Vell.) L.E. Skog

Sin.: *Hypocyrtia fissa* (Vell.) Handro & L.B. Sm., *Hypocyrtia selloana* Klotzsch & Hanst., *Nematanthus selloanus* (Klotzsch & Hanst.) H. E. Moore, *Orobancha fissa* Vell.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nematanthus jolyanus (Handro)

Chautems
Sin.: *Hypocyrtia jolyana* Handro
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Nematanthus maculatus (Fritsch)

Wiehler
Sin.: *Hypocyrtia maculata* Fritsch
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Nematanthus tessmanii (Hoehne)

Chautems
Sin.: *Hypocyrtia tessmanii* Hoehne
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nematanthus wettsteinii (Fritsch) H.

E. Moore
Sin.: *Hypocyrtia wettsteinii* Fritsch, *Hypocyrtia dusenii* Malme
Subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Sarmienta Ruiz & Pav.**Sarmienta scandens** (J.D. Brandis ex Molina) Pers.

Sin.: *Sarmienta repens* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Urceolaria chilensis* Molina, *Urceolaria scandens* J.D. Brandis ex Molina
Subarbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Seemannia Regel, nom. cons.**Seemannia gymnostoma** (Griseb.)

Toursark.
Sin.: *Achimenes gymnostoma* (Griseb.) Fritsch, *Fiebrigia digitaliflora* Fritsch, *Gloxinia gymnostoma* Griseb.
Hierba. Nativa. 1200-1700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Seemannia nematanthodes

(Kuntze) K. Schum.
Sin.: *Achimenes gracilis* Britton ex Rusby, *Fritschiantha nematanthodes* Kuntze, *Gloxinia nematanthodes* (Kuntze) Wiehler
Hierba. Nativa. 1600-1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Seemannia sylvatica (Kunth) Hanst.

Sin.: *Gesneria sylvatica* Kunth, *Gloxinia sylvatica* (Kunth) Wiehler
Hierba. Nativa. 200-900 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Sinningia Nees**Sinningia aggregata** (Ker Gawl.) Wiehler

Sin.: *Gesnera aggregata* Ker Gawl., *Rechsteineria aggregata* (Lindl.) Kuntze f. *litoralis* Hoehne
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, COA, PAI).

Sinningia allagophylla (Mart.)

Wiehler

Sin.: *Corytholoma allagophyllum* (Mart.) Fritsch, *Gesneria allagophylla* Mart., *Rechsteineria allagophylla* (Mart.) Regel, *Rechsteineria montevidensis* Decne., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

Sinningia amambayensis Chautems

Hierba. Nativa. 200-400 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Sinningia bullata Chautems & M.

Peixoto

Hierba. Endémica. 300-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Sinningia calcaria (Dusén ex Malme)

Chautems

Sin.: *Corytholoma calcarium* Dusén ex Malme, *Corytholoma oliganthum* Dusén ex Malme, *Rechsteineria calcaria* (Dusén ex Malme) Hoehne f. *macrophylla* Hoehne, *Rechsteineria oligantha* (Dusén ex Malme) Hoehne

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Sinningia canescens (Mart.) Wiehler

Sin.: *Corytholoma canescens* (Mart.)

Fritsch, *Gesneria canescens* Mart., *Rechsteineria canescens* (Mart.) Kuntze

Hierba. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Sinningia conspicua (Seem.) G.

Nicholson

Sin.: *Biglandularia conspicua* Seem., *Rosanowia conspicua* (Seem.) Regel, *Sinningia caulina* Malme

Hierba. Endémica. 300-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Sinningia cooperi (Paxton) Wiehler

Sin.: *Corytholoma cooperi* (Paxton)

Fritsch, *Gesneria cooperi* Paxton, *Rechsteineria cooperi* (Paxton) Kuntze

Hierba epífita. Nativa. 500-1700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Sinningia curtiflora (Malme)

Chautems

Sin.: *Corytholoma curtiflorum* Malme, *Rechsteineria curtiflora* (Malme) Hoehne

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sinningia douglasii (Lindl.) Chautems

Sin.: *Corytholoma confertifolium*

(Hanst.) Fritsch, *Corytholoma douglasii* (Lindl.) Voss var. *verticillatum* (Hook.)

Toursark., *Corytholoma douglasii* (Lindl.) Voss, *Corytholoma polyanthum* (DC.)

Fritsch, *Gesneria confertifolia* Hanst.,

Gesneria douglasii Lindl. var. *verticillata*

Hook., *Gesneria douglasii* Lindl., *Gesneria polyantha* DC., *Gesneria verticillata*

Hook., nom. illeg., *Rechsteineria*

confertifolia (Hanst.) Kuntze,

Rechsteineria douglasii (Lindl.) Kuntze,

Rechsteineria polyantha (DC.) Kuntze

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sinningia elatior (Kunth) Chautems

Sin.: *Corytholoma igneum* (Mart.) Fritsch,

Corytholoma sceptrum (Mart.) Decne. var.

igneum (Mart.) Molfino, *Corytholoma strictum* (Hook. & Arn.) Decne., *Gesneria elatior*

Kunth, *Gesneria sceptrum* Mart. var. *igneum*

Mart., *Gesneria stricta* Hook. & Arn.,

Rechsteineria stricta (Hook. & Arn.) Kuntze,

Sinningia stricta (Hook. & Arn.) Wiehler

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,

CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE,

ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, RNO).

Sinningia eumorpha H. E. Moore

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Sinningia gerdtiana Chautems

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(PAR).

Sinningia hatschbachii Chautems

Hierba. Nativa. 700-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Sinningia leopoldii (Scheidw. ex

Planch.) Chautems

Sin.: *Gesneria leopoldii* Scheidw. ex

Planch., *Rechsteineria leopoldii* (Scheidw.

ex Planch.) Kuntze, *Rechsteineria*

oligantha (Dusén ex Malme) Hoehne f.

rupestris Hoehne

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Sinningia leucotricha (Hoehne) H. E.

Moore

Sin.: *Rechsteineria leucotricha* Hoehne

Hierba. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Sinningia lineata (Hjelmq.) Chautems

Sin.: *Rechsteineria lineata* Hjelmq.

Hierba. Endémica. 500-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Sinningia lutea Buzatto & R.B. Singer

Hierba. Endémica. 100-300 m.

Países: BRA(RGS).

Sinningia macropoda (Sprague) H. E.

Moore

Sin.: *Corytholoma macropodum* Sprague,

Rechsteineria cyclophylla Hjelmq.

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).

Sinningia macrostachya (Lindl.)

Chautems

Sin.: *Corytholoma latifolia* (Mart.)

Fritsch, *Gesneria latifolia* Mart., *Gesneria*

macrostachya Lindl., *Rechsteineria*

latifolia (Mart.) Kuntze, *Rechsteineria*

macrostachya (Lindl.) L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA).

Sinningia mauroana Chautems

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Sinningia nivalis Chautems

Hierba. Endémica. 800-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Sinningia polyantha (DC.) Wiehler

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Sinningia ramboi G.E. Ferreira,

Waechter & Chautems

Hierba. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(RGS).

Sinningia reitzii (Hoehne) L.E. Skog

Sin.: *Rechsteineria reitzii* Hoehne

Arbusto. Endémica. 400-800 m.

Países: BRA(SCA).

Sinningia sellowii (Mart.) Wiehler

Sin.: *Corytholoma sellowii* (Mart.)

Kuntze, *Gesneria coccinea* Rojas, *Gesneria*

sellowii Mart., *Rechsteineria ramboi*

Hoehne

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-600 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN,

CON, GUA, PAI). URY(RIV).

Sinningia tubiflora (Hook.) FritschSin.: *Achimenes tubiflora* (Hook.)Britton, *Dolichodeira tubiflora* (Hook.)Hanst, *Gesneria tubiflora* (Hook.)Griseb., *Gloxinia tubiflora* Hook.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE). PRY(CAA, CEN, ÑEE, PHA, SPE). URY(PAY, RNO, SAO).

Sinningia warmingii (Hiern)

Chautems

Sin.: *Corytholoma sceptrum* (Mart.)Decne. var. *arenosa* Chodat & Hassl.,*Corytholoma warmingii* (Hiern)Toursark., *Gesneria warmingii* Hiern,*Rechsteineria lindleyi* (Hook.) Fritschvar. *macrophylla* Hoehne, *Rechsteineria**multiflora* Fritsch, *Rechsteineria**schlickmannii* Hoehne, *Rechsteineria**warmingii* (Hiern) Hjelmq.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

Sinningia x vacariensis G.E. Ferreira,

Waechter & Chautems

Hierba. Endémica. 600-800 m.

Países: BRA(RGS).

GOMORTEGACEAE

Gomortega Ruiz & Pav.**Gomortega keule** (Molina) Baill.Sin.: *Adenostemum nitidum* (Ruiz & Pav.) Pers., *Gomortega nitida* Ruiz & Pav., *Keulia chilensis* Molina, *Lucuma keule* Molina

Árbol. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

GOODENIACEAE

Scaevola L.**Scaevola plumierii** (L.) VahlSin.: *Lobelia plumierii* L.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Selliera Cav.**Selliera radicans** Cav.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

GRISELINIACEAE

Griselinia J.R. Forst. & G. Forst.**Griselinia carlomunozii** M.O. Dillon

& M. Muñoz

Arbusto. Endémica. 200-500 m.

Países: CHL(ANT).

Griselinia jodinifolia (Griseb.) Taub.Sin.: *Decostea jodinifolia* Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Griselinia racemosa (Phil.) Taub.Sin.: *Decostea racemosa* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS).

Griselinia ruscifolia (Clos) Ball var.**itaitiaiae** (Wawra) Taub.Sin.: *Maytenus itaitiaiae* Wawra

Arbusto. Nativa. 400-2700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Griselinia ruscifolia (Clos) Ball var. **ruscifolia**Sin.: *Decostea ruscifolia* Clos, *Griselinia**ruscifolia* (Clos) Taub., comb. superfl.

Arbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CHU, RNE). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Griselinia scandens (Ruiz & Pav.) Taub.Sin.: *Decostea scandens* Ruiz & Pav.,*Griselinia alata* Ball

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS).

GROSSULARIACEAE

Ribes L.**Ribes bicolor** Phil.Sin.: *Ribes glandulosum* Ruiz & Pav., hom. illeg., *Ribes ruizii* Rehder

Arbusto. Endémica. 1700 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, RME).

Ribes catamarcanum Jancz.

Arbusto. Nativa. 2500-3000 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Ribes cucullatum Hook. & Arn.Sin.: *Ribes chubutense* Gand., *Ribes lacarense* Phil., *Ribes montanum* Phil., *Ribes nebularum* Phil., *Ribes nubigenum* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Ribes densiflorum Phil.Sin.: *Ribes cucullatum* Hook. & Arn.var. *densiflorum* (Phil.) Sparre, *Ribes nitidissima* Neger

Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(BIO, ARA, LLA).

Ribes integrifolium Phil.

Arbusto. Endémica. 1100-1400 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Ribes magellanicum Poir. subsp. **magellanicum**Sin.: *Ribes brachystachyum* Phil., *Ribes ovallei* Phil., *Ribes parvifolium* Phil., *Ribes spegazzini* Jancz.

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(RNE, SCR, TDF).

CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Ribes magellanicum Poir. subsp. **parviflorum** (Phil.) SparreSin.: *Ribes parviflorum* Phil., *Ribes ahrendsii* Phil., *Ribes palenae* Phil., *Ribes micranthum* Phil., *Ribes filiforme* Poepp.

Arbusto. Endémica. 500-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Ribes nemorosum Phil.Sin.: *Ribes polyanthes* Phil., *Ribes rupicola* Phil., *Ribes stolpi* Phil.

Arbusto. Endémica. 1400-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Ribes punctatum Ruiz & Pav.Sin.: *Rebis alpinoides* Spach, *Rebis ebracteolata* Spach, *Rebis punctata* (Ruiz & Pav.) Spach, *Ribes berterioanum* Phil., *Ribes collinum* Phil., *Ribes ebracteolatum* (Spach) Gay, *Ribes georgianum* Phil., *Ribes heterophyllum* Phil., *Ribes sublobatum* Phil.

Arbusto. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(MEN, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Ribes trilobum Meyen

Sin.: *Ribes gayanum* (Spach) Reiche, *Ribes molle* Poepp., *Ribes villosum* Gay
Arbusto. Endémica. 0-2400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Ribes valdivianum Phil.

Sin.: *Ribes pfisteri* Sparre ex sched., *Ribes valdivianum* Phil. var. *sessiliflorum* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

GUNNERACEAE

Gunnera L.**Gunnera apiculata** Schindl.

Sin.: *Gunnera chilensis* A. DC., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 1800-3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Gunnera berteroi Phil.

Sin.: *Gunnera laxiflora* Phil.
Hierba. Nativa. 2700-3100 m.
Países: ARG(JUJ). CHL(LBO, MAU).

Gunnera bracteata Steud. ex G. Benn.

Sin.: *Gunnera glabra* Phil., *Gunnera insularis* Phil., *Gunnera pyramidalis* Schindl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Gunnera herteri Mattf.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ROC).

Gunnera lobata Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Gunnera magellanica Lam.

Sin.: *Dysemone integrifolia* Banks & Sol. ex Forst., *Gunnera falklandica* Hook. f., *Gunnera plicata* Vahl, *Gunnera reichei* Schindl., *Misandra magellanica* (Lam.) J.F. Gmel.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Gunnera manicata Lindl.

Sin.: *Gunnera brasiliensis* Schindl.
Hierba. Endémica. 600-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gunnera masafuerae Skottsbo.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Gunnera peltata Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Gunnera schindleri L.E. Mora

Hierba. Nativa. 2500-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. var. **meyerii** (L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González

Sin.: *Gunnera chilensis* Lam. var. *meyerii* L.E. Mora
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. var. **tinctoria**

Sin.: *Gunnera chilensis* Lam., *Gunnera rheifolia* Schindl., *Gunnera scabra* Ruiz & Pav., *Panke tinctoria* Molina
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE).

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. var. **valdiviensis** (L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González

Sin.: *Gunnera chilensis* Lam. var. *valdiviensis* L.E. Mora
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LLA).

HALOPHYTACEAE

Halophytum Speg.**Halophytum ameghinoi** (Speg.) Speg.

Sin.: *Tetragonia ameghinoi* Speg.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU).

HALORAGACEAE

Haloragis J.R. Forst. & G. Forst.**Haloragis masafuerana** Skottsbo. var. **asperima** (Skottsbo.) Orchard

Sin.: *Haloragis asperima* Skottsbo.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(JFE).

Haloragis masafuerana Skottsbo. var. **masafuerana**

Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(JFE).

Haloragis masatierrana Skottsbo. var. **applanata** Danton

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(JFE).

Haloragis masatierrana Skottsbo. var. **masatierrana**

Sin.: *Haloragis alata* Jacq.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(JFE).

Haloragis masatierrana Skottsbo. var. **scabrida** Danton & C. Perrier

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: CHL(JFE).

Laurembergia Bergius**Laurembergia tetrandra** (Schott) Kanitz

Sin.: *Haloragis tetrandra* Schott, *Serpicula brasiliensis* Cambess.
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA). URY(CAS).

Myriophyllum L.**Myriophyllum aquaticum** (Vell.) Verdc.

Sin.: *Erydria aquatica* Vell., *Myriophyllum brasiliense* Cambess., *Myriophyllum proserpinacoides* Gillies ex Hook. & Arn.
Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). PRY(APY, CEN, CHO, COA, GUA, ÑEE). URY(DUR, MON, SJO).

Myriophyllum quitense Kunth

Sin.: *Myriophyllum elatinoides* Gaudich., *Myriophyllum elatinoides* Gaudich. var. *ternatum* (Gaudich.) Reiche, *Myriophyllum ternatum* Gaudich., *Myriophyllum ternatum* Gaudich. var. *tetraphyllum* Hook. & Arn.
Hierba acuática. Nativa. 0-4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON, SJO).

Proserpinaca L.**Proserpinaca palustris** L.

Sin.: *Proserpinaca palustris* var. *australis* Fassett

Hierba acuática. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(MON).

HELICONIACEAE**Heliconia** L., nom. cons.**Heliconia brasiliensis** Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(SCA).
PRY(AMA).

Heliconia farinosa Raddi

Sin.: *Heliconia velloziana* Emydio
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heliconia hirsuta L. f.

Sin.: *Heliconia cannoidea* Rich. var. *villosa* Petersen

Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAU, CON, SPE).

Heliconia psittacorum L. f.

Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Heliconia subulata Ruiz & Pav. subsp. **gracilis** (Petersen) L. Andersson

Sin.: *Heliconia psittacorum* L. f. var. *gracilis* Petersen
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).
PRY(CAN).

HUMIRIACEAE**Vantanea** Aubl.**Vantanea compacta** (Schnizl.)

Cuatrec.
Sin.: *Humirium compactum* Schnizl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

HYDRANGEACEAE**Hydrangea** Gronov. ex L.**Hydrangea serratifolia** (Hook. & Arn.) F. Phil.

Sin.: *Cornidia integerrima* Hook. & Arn., *Cornidia serratifolia* Hook. & Arn., *Hydrangea integerrima* (Hook. & Arn.) Engl., *Hydrangea scandens* Poepp.

Liana. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

HYDROCHARITACEAE**Apalanthe** Planch.**Apalanthe granatensis** (Humb. & Bonpl.) Planch.

Sin.: *Elodea granatensis* Humb. & Bonpl.
Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Egeria Planch.**Egeria densa** Planch.

Sin.: *Anacharis densa* (Planch.) Vict., *Elodea densa* (Planch.) Casp., *Philotria densa* (Planch.) Small
Hierba acuática. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(VAL, BIO, LRI, LLA, RME).
URY(CAS, FLO, FLA, MON, ROC).

Egeria najas Planch.

Sin.: *Anacharis najas* (Planch.) Vict., *Elodea guianensis* Rich. f. *longifolia* Chodat & Hassl., *Elodea kochii* Herter, *Elodea najas* (Planch.) Casp., *Elodea paraguayensis* Herter, nom. illeg
Hierba acuática. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI).
BRA(PAR). PRY(COA, ITA, ÑEE, SPE).
URY(TAC).

Elodea Michx.**Elodea callitrichoides** (Rich.) Casp.

Sin.: *Anacharis callitrichoides* Rich., *Elodea ernstae* H. St. John, *Elodea richardii* H. St. John

Hierba acuática. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, RNE, SFE). URY(MON).

Elodea potamogeton (Bertero)

Espinosa
Sin.: *Anacharis chilensis* Planch., *Anacharis potamogeton* (Bertero) Vict., *Diplandra potamogeton* Bertero, *Egeria chilensis* (Planch.) Benth. & Hook., *Elodea chilensis* (Planch.) Casp.

Hierba acuática. Nativa. 0-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Limnobium Rich.**Limnobium laevigatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine

Sin.: *Hydrocharis stolonifera* (G. Mey.) Kuntze, *Hydromystria laevigata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hunz., *Hydromystria laevigata* (Willd.) Díaz-Mir. & Philcox, comb. superfl., *Hydromystria sinclairi* (Benth.) Hauman, *Hydromystria stolonifera* G. Mey., *Limnobium spongia* (Bosc) Steud. subsp. *laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden, *Limnobium stoloniferum* (G. Mey.) Griseb., *Salvinia laevigata* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Limnobium sinclairi* Benth.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(VAL, BIO, RME). PRY(ÑEE, PHA). URY(ROC).

Najas L.**Najas conferta** (A. Braun) A. Braun

Sin.: *Najas arguta* Kunth var. *conferta* A. Braun
Hierba acuática. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus

Sin.: *Caulinia guadalupensis* Spreng., *Najas arcana* Subils & Hunz., *Najas microdon* A. Braun
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR, COS, SAL, SLU).
BRA(RGS).

Najas marina L.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MEN, SLU).
BRA(Fuera del área del proyecto).

Najas microcarpa K. Schum.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(Desconocida).

Ottelia Pers.**Ottelia brasiliensis** (Planch.) Walp.

Sin.: *Benedictaea brasiliensis* (Planch.)
Toledo, *Damasonium brasiliensis* Planch
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN).

HYDROLEACEAE

Hydrolea L., nom. cons.**Hydrolea elatior** Schott

Sin.: *Hydrolea albiflora* (Chodat &
Hassl.) Brand var. *depressa* Brand,
Hydrolea albiflora (Chodat & Hassl.)
Brand, *Hydrolea cryptantha* Brand var.
meridionalis Hassl., *Hydrolea cryptantha*
Brand, *Hydrolea glabra* Schumach. &
Thonn. f. *albiflora* Chodat & Hassl.,
Hydrolea glabra Schumach. & Thonn.
var. *spinosa* Chodat & Hassl., *Hydrolea*
multiflora Mart. ex Choisy
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,
SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAU,
ÑEE, PHA). URY(FLA).

Hydrolea spinosa L. var.**paraguayensis** (Chodat) Davenp.

Sin.: *Hydrolea megapotamica* Spreng.,
Hydrolea mollis Chodat, *Hydrolea*
paraguayensis Chodat f. *grandifolia* Chodat
& Hassl., *Hydrolea paraguayensis* Chodat
var. *inermis* Chodat & Hassl., *Hydrolea*
paraguayensis Chodat, *Hydrolea spinosa* L.
var. *megapotamica* (Spreng.) Brand, *Nama*
megapotamica (Spreng.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,
CAA, CEN, COA, ÑEE, PAI, SPE).

Hydrolea spinosa L. var. **spinosa**

Sin.: *Nama spinosa* (L.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU,
CEN, COA, PAI, PHA).

HYPERICACEAE

Hypericum L.**Hypericum androsaemum** L.

Hierba. Introducida. 0-400 m.
Países: CHL(LBO, MAU, LRI, LLA).

Hypericum austrobrasiliense Vog.

Ely, Boldrini & Bordignon
Endémica. 900-1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Hypericum bordignonii Vog. Ely &

Boldrini
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).

Hypericum brasiliense Choisy

Sin.: *Hypericum anceps* Larrañaga,
Hypericum brasiliense Choisy var.
angustifolium Reichardt, *Hypericum*
brasiliense Choisy var. *latifolium*
Reichardt, *Hypericum brasiliense*
Choisy var. *punctulatum* (A. St.-Hil.)
R. Keller, *Hypericum laxiusculum* A.
St.-Hil., *Hypericum punctulatum* A. St.-
Hil., *Receveura graveolens* Vell. *Sarothra*
brasiliensis (Choisy) Y. Kimura
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,
AMA, CAA, CAN, COA). URY(ART,
MON, RNO, RIV, TYT).

Hypericum brevistylum Choisy

Hierba. Nativa. 3200-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Hypericum caespitosum Cham. &
Schltdl.

Sin.: *Hypericum chilense* Gay var.
muscoides (Phil.) Reiche, *Hypericum*
chilense Gay, *Hypericum muscoides*
Phil., *Hypericum uliginosum* Kunth var.
prostratum R. Keller
Hierba. Endémica. 100-1500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Hypericum campestre Cham. &
Schltdl. subsp. **campestre**

Hierba o subarbusto. Endémica.
0-300 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN, COA).
URY(RIV).

Hypericum campestre Cham. &
Schltdl. subsp. **pauciflorum** N. Robson
Subarbusto. Endémica. 100-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypericum campestre Cham. &
Schltdl. subsp. **tenuis** N. Robson
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, MIS). PRY(CAU,
CAN, CON, MIE).

Hypericum caprifolium Cham. &
Schltdl.

Hierba o subarbusto. Endémica.
0-700 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA).

Hypericum carinatum Griseb.

Sin.: *Hypericum altissimum* R. Keller,
Hypericum megapotamicum Malme,
Hypericum paraguayense R. Keller
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, CON, GUA,
MIE, SPE). URY(CLA, RIV, ROC, TYT).

Hypericum cavernicola L.B. Sm.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(TAC).

Hypericum connatum Lam.

Sin.: *Brathys connata* (Lam.) Spach,
Hypericum chlorifolium A. St.-Hil.,
Hypericum connatum Lam. var.
chlorifolium (A. St.-Hil.) Reichardt,
Hypericum connatum Lam. var. *fiebrigii*
Briq., *Hypericum connatum* Lam. var.
obscurum Briq., *Hypericum connatum*
Lam. var. *paraguariense* Briq., *Hypericum*
cyathifolium Larrañaga, *Sarothra connata*
(Lam.) Y. Kimura
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CAU, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CAS,
COL, LAV, MAL, RIV, ROC, TYT).

Hypericum cordatum (Vell.) N.
Robson subsp. **cordatum**

Sin.: *Hypericum cordiforme* A. St.-Hil.,
Hypericum cordiforme A. St.-Hil. var.
genuinum Briq., *Receveura cordata* Vell.
Hierba o subarbusto. Nativa. 800-
1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypericum cordatum (Vell.) N. Robson subsp. **kleinii** N. Robson
Hierba o subarbusto. Endémica. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hypericum denudatum A. St.-Hil.
Sin.: *Hypericum rigidum* A. St.-Hil. var. *humile* Reichardt
Arbusto o subarbusto. Endémica. 700-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypericum gentianoides (L.) Britton, Stern & Poggenb.
Sin.: *Hypericum sarothra* Michx., *Sarothra gentianoides* L.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). PRY(COA, PAI).

Hypericum humifusum L.
Hierba. Introducida. 800-900 m.
Países: ARG(NEU).

Hypericum legrandii L.B. Sm.
Sin.: *Hypericum ericoides* Arechav.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(RIV).

Hypericum linoides A. St.-Hil.
Sin.: *Hypericum brasiliense* Choisy var. *linoides* (A. St.-Hil.) C. Rodr. Jim.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(FLO, FLA, TAC).

Hypericum lorentzianum Gilg ex R. Keller
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CON, GUA). URY(ART, CAS, MON, ROC).

Hypericum microlicioides L.B. Sm.
Hierba o subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hypericum mutilum L.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE). URY(RIV).

Hypericum myrianthum Cham. & Schltld. subsp. **myrianthum**
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Hypericum myrianthum Cham. & Schltld. subsp. **tamariscinum** (Cham. & Schltld.) N. Robson
Sin.: *Hypericum brigittae* Herter, nom. nud., *Hypericum notiale* L.B. Sm., *Hypericum parviflorum* A. St.-Hil., *Hypericum pelleterianum* A. St.-Hil. var. *tamariscinum* (Cham. & Schltld.) Arechav., *Hypericum pelleterianum* A. St.-Hil., *Hypericum tamariscinum* Cham. & Schltld.
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, MON, SOR).

Hypericum pedersenii N. Robson
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).

Hypericum perforatum L.
Hierba. Introducida. 0-1900 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU, RNE). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(MON).

Hypericum piriai Arechav.
Sin.: *Hypericum hilaireanum* L.B. Sm., *Hypericum tenuifolium* A. St.-Hil.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, ROC).

Hypericum polyanthemum Klotzsch ex Reichardt
Sin.: *Hypericum rivulare* Arechav.
Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA). URY(CLA, TAC).

Hypericum rigidum A. St.-Hil. subsp. **bracteatum** N. Robson
Arbusto o subarbusto. Endémica. 700-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Hypericum rigidum A. St.-Hil. subsp. **meridionale** (L.B. Sm.) N. Robson
Sin.: *Hypericum meridionale* L.B. Sm., *Hypericum rufescens* Klotzsch ex Reichardt
Arbusto o subarbusto. Nativa. 700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hypericum rigidum A. St.-Hil. subsp. **rigidum**
Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypericum rigidum A. St.-Hil. subsp. **sellowianum** (R. Keller) N. Robson
Sin.: *Hypericum sellowianum* R. Keller
Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypericum robsonii H.A. Keller & S. Crockett
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Hypericum salvadorensis N. Robson
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Hypericum silenoides Juss.
Sin.: *Hypericum bonariense* Griseb., *Hypericum dichotomum* Phil., hom. illeg., *Hypericum indecorum* Kunth, *Hypericum multiflorum* Kunth, *Hypericum paposum* I.M. Johnst., *Hypericum tarquense* Kunth
Hierba. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). CHL(ANT, ARA, LRI).

Hypericum teretiusculum A. St.-Hil.
Sin.: *Hypericum subliberum* L.B. Sm., *Sarothra teretiuscula* (A. St.-Hil.) Y. Kimura
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Hypericum ternum A. St.-Hil.
Subarbusto. Nativa. 800-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

HYPOXIDACEAE

Curculigo Gaertn.

Curculigo scorzonerifolia (Lam.) Baker
Sin.: *Heliacme scorzonerifolia* (Lam.) Ravenna, *Hypoxis scorzonerifolia* Lam.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CON, NAS).

Hypoxis L.

Hypoxis atlantica Funez, Hassemer & J.P.R. Ferreira
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Hypoxis catamarcensis Brackett
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT).

Hypoxis decumbens L.

Sin.: *Hypoxis decumbens* L. var. *major* Seub.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE). URY(RNO, ROC).

Hypoxis humilis Kunth

Hierba. Nativa.
Países: ARG(COR).

Molineria Colla**Molineria capitulata** (Lour.) Herb.

Sin.: *Curculigo capitulata* (Lour.)
Kuntze, *Curculigo recurvata* Dryand.,
Leucojum capitulatum Lour.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(DFE).

ICACINACEAE

Casimirella Hassl.**Casimirella guaranitica** Hassl.

Sin.: *Casimirella guaranitica* Hassl.
f. *calvata* Hassl., *Dichapetalum prancei*
Fern. Casas
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-300 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

IRIDACEAE

Belamcanda Adans.**Belamcanda chinensis** (L.) A. DC.

Sin.: *Ixia chinensis* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: PRY(PAI).

Calydorea Herb.**Calydorea alba** Roitman & A. Castillo

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART).

Calydorea amabilis (Ravenna)

Goldblatt & Henrich
Sin.: *Catila amabilis* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).
URY(ART, PAY, RNO).

Calydorea approximata R.C. Foster

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, CAA, GUA, ITA, MIE, SPE).

Calydorea azurea Klatt

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).
URY(PAY, SAO, TYT).

Calydorea basaltica Ravenna

Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Calydorea bifida Ravenna

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(MAU).

Calydorea campestris (Klatt) Baker

Sin.: *Roterbe campestris* Klatt
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN, GUA).

Calydorea charruana Deble

Hierba. Endémica.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(CLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

Calydorea crocoides Ravenna

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Calydorea gardneri Baker

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(COA).

Calydorea longipes Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Calydorea luteola (Klatt) Baker

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV).

Calydorea minima Roitman & A. Castillo

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(CAA).

Calydorea minuana Deble & F.S. Alves

Hierba. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV).

Calydorea nuda (Herb.) Baker

Sin.: *Gelasine nuda* Herb., *Roterbe nuda*
(Herb.) Klatt
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, MON).

Calydorea pallens Griseb.

Sin.: *Tamia pallens* (Griseb.) Ravenna
Hierba. Endémica. 800-2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC).

Calydorea riograndensis Deble

Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Calydorea undulata Ravenna

Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Calydorea xiphioides (Poepp.)

Espinosa
Sin.: *Calydorea speciosa* (Hook.)
Herb., *Sisyrinchium grandiflorum*
Poepp., *Sisyrinchium speciosum* Hook.,
Sisyrinchium xiphioides Poepp.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO).

Cardenanthus R.C. Foster**Cardenanthus venturi** R.C. Foster

Hierba. Endémica. 3500-4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Chasmanthe N.E. Br.**Chasmanthe floribunda** (Salisb.) N.E. Br.

Sin.: *Antholyza floribunda* Salisb.
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

Cipura Aubl.**Cipura paludosa** Aubl. subsp.

boliviensis Ravenna
Hierba. Nativa. 0-400 m.
Países: PRY(APY, AMA, CAA, CON, COA, GUA, ÑEE, SPE).

Crocsmia Planch.**Crocsmia crocosmiiflora** (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E. Br.

Sin.: *Montbretia crocosmiiflora*
Lemoine ex Burbidge & Dean
Hierba. Introducida. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). CHL(VAL, ARA, LLA, JFE).

Cypella Herb.

Cypella alonsoana Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(RIV, TAC).

Cypella aquatilis Ravenna
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Cypella armosa Ravenna
Sin.: *Cypella gracilis* (Herb.) Klatt f.
humilis Baker ex Chodat & Hassl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Cypella aurinegra Deble & A. González
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: URY(CLA).

Cypella brasiliensis (Baker) Roitman & A. Castillo
Sin.: *Alophia brasiliensis* (Baker) Kuntze, *Herbertia brasiliensis* Baker, *Kelissa brasiliensis* (Baker) Ravenna, *Trifurcia brasiliensis* (Baker) Goldblatt
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Cypella charruana Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV).

Cypella coelestis (Lehm.) Diels
Sin.: *Cypella plumbea* Lindl., *Marica coelestis* Lehm., *Phalocallis coelestis* (Lehm.) Ravenna, *Phalocallis plumbea* (Lindl.) Ravenna, *Tigridia coelestis* Lehm.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, PAI, SPE). URY(RIV, ROC).

Cypella curuzupensis Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(GUA).

Cypella discolor Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Cypella elegans Speg.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ).

Cypella exilis Ravenna
Sin.: *Cypella amplimaculata* Chauveau & L. Eggers, *Cypella gracilis* (Klatt) Baker, nom. illeg., *Polia gracilis* Klatt
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ART, CLA, CLA, FLA, RIV, ROC, TAC, TYT).

Cypella fucata Ravenna
Sin.: *Cypella osteniana* Beauverd subsp. *aurantiaca* Roitman & A. Castillo
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CLA, MAL, SAO).

Cypella geniculata (Klatt) Ravenna
Sin.: *Alophia geniculata* Klatt, *Sisyrrinchium coeruleum* Vell.
Hierba. Nativa. 1100-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cypella gloriana Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Cypella guttata Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, RIV).

Cypella hauthalii (Kuntze) R.C. Foster subsp. **hauthalii**
Sin.: *Alophia hauthalii* Kuntze, *Herbertia hauthalii* (Kuntze) K. Schum.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(ITA, PAI).

Cypella hauthalii (Kuntze) R.C. Foster subsp. **opalina** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Cypella hauthalii R.C. Foster subsp. **minuticristata** Chauveau & L. Eggers
Hierba. Endémica. 200-600 m.
Países: BRA(RGS).

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **brevicristata** Ravenna
Sin.: *Cypella catharinensis* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA). URY(ART).

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**
Sin.: *Cypella bonariensis* (Ten.) Niederl., *Moraea herbertii* Lindl., *Polia bonariensis* Ten., *Tigridia herbertii* (Lindl.) Herb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PHA). URY(ART, SJO).

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **wolffhuegeli** (Hauman) Ravenna
Sin.: *Cypella wolffhuegeli* Hauman
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Cypella laeta Ravenna
Sin.: *Cypella yatayphila* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). URY(SAO).

Cypella lapidosa Ravenna
Sin.: *Cypella altouruguaya* Chauveau & L. Eggers
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Cypella laxa Ravenna
Hierba. Nativa. 700-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Cypella lilacea Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Cypella linearis (Kunth) Baker
Sin.: *Larentia linearis* (Kunth) Klatt, *Moraea linearis* Kunth
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Cypella luteogibbosa Deble
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Cypella magnicristata Deble
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Cypella oreophila Speg.
Sin.: *Phalocallis oreophila* (Speg.) Ravenna
Hierba. Nativa. 200-2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, CAA).

Cypella osteniana Beauverd
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CAS, CLA, LAV).

Cypella pabstiana Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

Cypella parviflora Ravenna ex Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Cypella pusilla (Link, Klotzsch & Baker) Benth. & Hook. f.
Sin.: *Ferraria pusilla* Link, Klotzsch & Otto
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Cypella ravenniana Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Cypella rivularis Chauveau & L. Eggers
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS).

Cypella suffusa Ravenna
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS).

Cypella trimontina Ravenna
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(COS).

Cypella uliginosa Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Eleutherine Herb., nom. cons.

Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb.
Sin.: *Eleutherine plicata* (Sw.) Herb.,
Galatea americana (Aubl.) Kuntze,
Galatea bulbosa (Mill.) Britton, *Ixia*
americana Aubl., *Marica plicata* (Sw.) Ker
Gawl., *Moraea plicata* Sw., *Sisyrinchium*
bulbosum Mill.
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR). PRY(PHA).

Eleutherine latifolia (Standl. & L.O.
Williams) Ravenna
Sin.: *Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb.
subsp. *citriodora* Ravenna, *Eleutherine*
citriodora (Ravenna) Ravenna
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Ennealophus N.E. Br.

Ennealophus euryandrus (Griseb.)
Ravenna subsp. **euryandrus**
Sin.: *Alophia euryandra* (Griseb.)
Lillo, *Herbertia euryandra* Griseb.,
Sphenostigma euryandra (Griseb.) Baker
Hierba. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ennealophus euryandrus (Griseb.)
Ravenna subsp. **oxydandrus** Ravenna
Hierba. Endémica. 3700 m.
Países: ARG(CAT).

Ennealophus fimbriatus Ravenna
Hierba. Endémica. 1600-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Ennealophus simplex (Ravenna)
Roitman & A. Castillo
Sin.: *Tucma simplex* Ravenna
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Ennealophus tucumanensis Huaylla
Hierba. Nativa. 2300-2700 m.
Países: ARG(TUC).

Freesia Klatt

Freesia alba (G.L. Mey.) Gumbel.
Sin.: *Freesia refracta* (Jacq.) Klatt var.
alba G.L. Mey.
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt & J.C.
Manning
Sin.: *Gladiolus laxus* Thunb.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Gelasine Herb.

Gelasine caerulea (Vell.) Ravenna
Sin.: *Sphenostigma sellowiana*
(Klatt) Baker, *Alophia sellowiana* Klatt,
Sisyrinchium caeruleum Vell.
Hierba. Nativa. 0-2600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAU).

Gelasine elongata (Graham) Ravenna
Sin.: *Alophia stricta* (Griseb.) Kuntze,
Ferraria elongata Graham, *Gelasine*
azurea Herb., *Herbertia stricta* Griseb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI).
BRA(RGS, SCA). URY(PAY).

Gelasine paranaensis Ravenna
Hierba. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Gelasine uruguayensis Ravenna
subsp. **orientalis** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CLA).

Gelasine uruguayensis Ravenna
subsp. **uruguayensis**
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(DUR).

Gladiolus L.

Gladiolus communis L.
Sin.: *Gladiolus byzantinus* Mill.
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

Gladiolus dalenii Van Geel
Hierba. Introducida.
Países: ARG(MIS).

Gladiolus tristis L.
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI).

Herbertia Sweet

Herbertia amabilis Deble & F.S. Alves
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Herbertia crosae Roitman & A.
Castillo
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(COS). URY(ART).

Herbertia darwinii Roitman & A.
Castillo
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Herbertia furcata (Klatt) Ravenna
Sin.: *Nemastylis furcata* Klatt
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Herbertia lahue (Molina) Goldblatt
subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt
Sin.: *Alophia amoena* (Griseb.) Kuntze,
Alophia lahue (Molina) Espinosa subsp.
amoena (Griseb.) Ravenna, *Calydorea*
furcata (Klatt) Baker, *Herbertia amoena*
Griseb., *Nemastylis furcata* Klatt,
Trifurcia lahue (Molina) Goldblatt subsp.
amoena (Griseb.) Goldblatt
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, SAL, SFE). BRA(RGS, SCA).
PRY(ITA, MIE, ÑEE). URY(MON).

Herbertia lahue (Molina) Goldblatt
subsp. **lahue**
Sin.: *Alophia lahue* (Molina) Espinosa,
Ferraria lahue Molina, *Trifurcia lahue*
(Molina) Goldblatt subsp. *lahue*
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: ARG(RNE). CHL(VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE).

Herbertia pulchella Sweet

Sin.: *Alophia pulchella* (Sweet) Kuntze,
Herbertia amatorum C.H. Wright,
Trifurcia pulchella (Sweet) Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(LAV).

Herbertia quareimana Ravenna

Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS).
URY(ART).

Herbertia tigridioides (Hicken)

Goldblatt
Sin.: *Alophia tigridioides* Hicken,
Trifurcia tigridioides (Hicken) Goldblatt
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Herbertia zebrina Deble

Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Iris L.**Iris germanica** L.

Hierba. Introducida.
Países: ARG(COR). CHL(JFE).

Iris orientalis Mill.

Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA).

Iris pseudacorus L.

Sin.: *Iris acoriformis* Boreau, *Iris
bastardii* Boreau, *Iris curtopetala* D.
Delaroché ex Redouté, *Iris lutea* Lam.,
Iris paludosa Pers.
Hierba palustre. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). CHL(LLA).
URY(CAS, MON, ROC, SJO, TYT).

Iris unguicularis Poir.

Hierba. Introducida. 800-900 m.
Países: ARG(COR).

Libertia Spreng., nom. cons.**Libertia chilensis** (Molina) Gunckel

Sin.: *Choeradodia chilensis* Herb.,
Libertia chilensis Klotzsch ex Baker,
nom. nud., *Libertia crassa* Graham,
Libertia elegans Poepp., *Libertia formosa*
Graham var. *crassa* (Graham) Baker,
Libertia formosa Graham var. *grandiflora*
(Phil.) Johow, *Libertia formosa* Graham,
Libertia grandiflora Phil., *Libertia
umbellata* Ravenna, *Libertia insignis*

Ravenna, *Roterbe elegans* Steud.
ex Baker, nom. nud., *Sisyrinchium
fernandezianum* Steud. & Hochst., nom.
nud., *Strumarium chilensis* Molina
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Libertia sessiliflora (Poepp.) Skottsbo.

Sin.: *Libertia caerulea* Kunth &
Bouché, *Sisyrinchium caerulea* F.
Muell., *Sisyrinchium huismo* Dombey
ex Baker, nom. nud., *Sisyrinchium
sessiliflorum* Poepp.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA).

Libertia tricocca Phil.

Sin.: *Libertia falcata* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA).

Mastigostyla I.M. Johnst.**Mastigostyla brachiandra** Ravenna

Hierba. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(SAL).

Mastigostyla cabreræ R.C. Foster

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Mastigostyla coronata Pozner

Hierba. Endémica. 3900-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Mastigostyla cyrtophylla I.M. Johnst.

Sin.: *Cypella cyrtophylla* (I.M.
Johnst.) Diels
Hierba. Nativa. 2000-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Mastigostyla implicata Ravenna

Hierba. Endémica. 3500-3600 m.
Países: ARG(JUJ).

Mastigostyla johnstoni R.C. Foster

Hierba. Endémica. 3200-3600 m.
Países: ARG(TUC).

Mastigostyla mirabilis Ravenna

Hierba. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(TUC).

Mastigostyla spathacea (Griseb.)

Ravenna
Sin.: *Chlamydestylus spathaceus* (Griseb.)
Griseb., *Mastigostyla joergensii* R.C. Foster,
Nemastylis spathaceae Griseb.
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Neomarica Sprague**Neomarica caerulea** (Ker Gawl.)

Sprague
Sin.: *Marica caerulea* Ker Gawl.,
Trimezia caerulea (Ker Gawl.) Ravenna
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAN, COA).

Neomarica candida (Hassl.) Sprague

Sin.: *Marica candida* Hassl., *Trimezia
candida* (Hassl.) Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA,
COA, GUA, PAI, SPE).

Neomarica glauca (Seub. ex Klatt)

Sprague
Sin.: *Cypella glauca* Seub. ex Klatt,
Marica glauca (Seub. ex Klatt) Baker
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Neomarica gracilis (Herb.) Sprague

Sin.: *Cypella gracilis* (Herb.) Klatt,
Marica gracilis Herb.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN, COA, PAI).

Neomarica imbricata (Hand.-Mazz.)
Sprague

Sin.: *Marica imbricata* Hand.-Mazz.,
Trimezia bauensis Ravenna
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Neomarica latifolia (Ravenna) A. Gil

Sin.: *Trimezia latifolia*
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Neomarica northiana (Schneev.)

Sprague
Sin.: *Moraea northiana* Schneev.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Neomarica rotundata (Ravenna)

Chukr
Sin.: *Trimezia rotundata* Ravenna
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Neomarica speciosa (Liebm.) A. Gil & Bittrich

Sin.: *Galathea speciosa* Liebm.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Olsynium Raf.

Olsynium acaule (Klatt) Goldblatt

Sin.: *Sisyrinchium acaule* Klatt
Hierba. Endémica. 3600-4400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Olsynium biflorum (Thunb.) Goldblatt

Sin.: *Galaxia narcissoides* (Cav.)
Willd., *Gladiolus biflorus* Thunb.,
Phaiophleps biflora (Thunb.) R.C. Foster,
Phaiophleps odoratissimum (Lindl.)
Raf., *Phaiophleps patagonica* (Speg.)
R.C. Foster, *Sisyrinchium narcissoides*
Cav., *Sisyrinchium odoratissimum* Lindl.,
Solenomelus biflorus (Thunb.) Baker,
Symphystemon biflorus (Thunb.) Dusén,
Symphystemon narcissoides (Cav.) Miers
ex Klatt, *Symphystemon odoratissimum*
(Lindl.) Miers, *Symphystemon*
patagonicum Speg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Olsynium bodenbenderi (Kurtz)

Goldblatt

Sin.: *Chamelum bodenbenderi* Kurtz,
Chamelum rubellum Ravenna
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(MEN).

Olsynium chrysochromum J.M.

Watson & A.R. Flores

Sin.: *Chamelum luteum* Phil., hom.
Illeg., *Olsynium luteum* (Phil.) Goldblatt,
comb. illeg.

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Olsynium filifolium (Gaudich.)

Goldblatt

Sin.: *Sisyrinchium filifolium* Gaudich.,
Sisyrinchium junceum E. Mey. ex J. Presl
subsp. *filifolium* (Gaudich.) Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF).

Olsynium frigidum (Poepp.) Goldblatt

Sin.: *Chamelum andinum* (Phil.)
Benth. & Hook., *Chamelum frigidum*
(Poepp.) Ravenna, *Sisyrinchium andinum*
Phil., *Sisyrinchium frigidum* Poepp.,
Solenomelus andinus (Phil.) Baker,

Solenomelus frigidus (Poepp.) Klatt,
Susarium andinum (Phil.) Phil.

Hierba. Endémica. 1100-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Olsynium junceum (E. Mey. ex C.

Presl) Goldblatt subsp. **colchaguense**
(Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores

Sin.: *Sisyrinchium colchaguense* Phil.,
Sisyrinchium eleutherostemon Phil.,
Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl
subsp. *colchaguense* (Phil.) R. Rodr.,
Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl
var. *colchaguense* (Phil.) Baker
Hierba. Endémica. 1500-2600 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Olsynium junceum (E. Mey. ex C.

Presl) Goldblatt subsp. **depauperatum**
(Phil.) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrinchium depauperatum* Phil.,
Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C. Presl
subsp. *depauperatum* (Phil.) R. Rodr.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA).

Olsynium junceum (E. Mey. ex C.

Presl) Goldblatt subsp. **junceum**

Sin.: *Olsynium argentinense* (Hauman)
Ravenna, *Sisyrinchium argentinense*
Hauman, *Sisyrinchium junceum* E. Mey.
ex J. Presl, *Sisyrinchium junciforme*
Poepp., *Sisyrinchium middletoni*
Baker, *Sisyrinchium pauciflorum* Phil.,
Sisyrinchium roseum Herb.

Hierba. Nativa. 200-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ,
MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LLA, MAG, RME).

Olsynium lyckholmi (Dusén)

Goldblatt

Sin.: *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C.
Foster subsp. *lyckholmi* (Dusén) Goldblatt,
Symphystemon lyckholmi Dusén
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Olsynium nigricans (Phil.) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Phaiophleps nigricans* (Phil.) R.C.
Foster, *Sisyrinchium maulense* Ravenna,
Solenomelus nigricans (Phil.) Baker,
Susarium nigricans Phil., *Symphystemon*
nigricans (Phil.) Benth. ex Baker
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA).

Olsynium obscurum (Cav.) Goldblatt

Sin.: *Galaxia obscura* Cav., *Ona obscura*
(Cav.) Ravenna, *Tapeinia obscura* (Cav.)
D.M. Moore
Hierba. Endémica. 900 m.
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Olsynium philippii (Klatt) Goldblatt

subsp. **illapelinum** (Phil.) J.M. Watson
& A.R. Flores

Sin.: *Sisyrinchium illapelinum* Phil.,
Sisyrinchium philippii Klatt subsp.
illapelinum (Phil.) Rodr., *Sisyrinchium*
roseum Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1000-3200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Olsynium philippii (Klatt) Goldblatt
subsp. **philippii**

Sin.: *Sisyrinchium philippii* Klatt,
Sisyrinchium scabrum Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Olsynium scirpoideum (Poepp.)

Goldblatt subsp. **leucanthum** (Colla) R.
Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrinchium bifolium* Phil.,
Sisyrinchium filiforme Steud., nom.
inval., *Sisyrinchium leucanthum* Colla,
Sisyrinchium nuno Colla var. *leucanthum*
(Colla) Baker, *Sisyrinchium scirpoideum*
Poepp. subsp. *leucanthum* (Colla) R.
Rodr., *Sisyrinchium stenophyllum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

Olsynium scirpoideum (Poepp.)

Goldblatt subsp. **luridum** (Ravenna) R.
Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrinchium luridum* Ravenna,
Sisyrinchium scirpoideum Poepp. subsp.
luridum (Ravenna) R. Rodr.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO).

Olsynium scirpoideum (Poepp.)

Goldblatt subsp. **scirpeum** (Phil.) R.
Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp.
subsp. *scirpeum* (Phil.) R. Rodr.,
Sisyrinchium scirpeum Phil., *Sisyrinchium*
stenopetalum Phil.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(BIO).

Olsynium trinerve (Baker) R. Rodr. & Martic.

Sin.: *Sisyrrinchium trinerve* Baker
Hierba. Nativa. 2500-4100 m.
Países: CHL(TAR).

Onira Ravenna

Onira unguiculata Baker ex Ravenna

Sin.: *Cypella unguiculata* (Baker ex Ravenna) Roitman & A. Castillo,
Herbertia unguiculata Baker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA).

Orthrosanthus Sweet

Orthrosanthus occissapungus (Ruiz

ex Klatt) Diels, Engl. & Prantl
Sin.: *Orthrosanthus chimboracensis* (Kunth) Baker subsp. *tunariensis* (Kuntze) Ravenna, *Orthrosanthus nigrorhynchus* Rusby, *Orthrosanthus tunariensis* Kuntze, *Sisyrrinchium occissapungus* Ruiz ex Klatt
Hierba. Nativa. 3200-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Pseudotrimezia R.C. Foster

Pseudotrimezia juncifolia (Klatt)

Lovo & A. Gil
Sin.: *Trimezia juncifolia* (Klatt) Benth. & Hook. f.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Romulea Maratti

Romulea rosea (L.) Eckl.

Sin.: *Calydorea chilensis* M. Muñoz,
Ixia rosea L.
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(VAL, MAU, BIO).

Sisyrrinchium L.

Sisyrrinchium alatum Hook.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, TUC).
BRA(SCA). PRY(CAN, PAI).

Sisyrrinchium albilapidense Ravenna

Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Sisyrrinchium andinopatagonicum

Ravenna
Hierba. Endémica. 1500-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Sisyrrinchium annuum Ravenna

Sin.: *Sisyrrinchium annuum* Ravenna, nom. inval.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Sisyrrinchium antemeridianum Aita

& L. Eggers
Hierba. Endémica. 900-1400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Sisyrrinchium arenarium Poepp.

subsp. **adenostemon** (Phil.) Ravenna
Sin.: *Sisyrrinchium adenostemon* Phil.,
Sisyrrinchium pauperculum Phil.
Hierba. Endémica. 1000-3200 m.
Países: ARG(MEN, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Sisyrrinchium arenarium Poepp.

subsp. **arenarium**
Sin.: *Sisyrrinchium adenostemon* Phil. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrrinchium angustifolium* Phil., *Sisyrrinchium antucense* Ravenna, *Sisyrrinchium arenarium* Poepp. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrrinchium breviarium* Ravenna, *Sisyrrinchium flexuosum* Lindl., *Sisyrrinchium limarinum* Ravenna, *Sisyrrinchium microspathum* Phil., *Sisyrrinchium multiflorum* Phil., *Sisyrrinchium nervosum* Phil., *Sisyrrinchium oligostachyum* Phil., *Sisyrrinchium striatum* Sm. var. *microspathum* (Phil.) Speg.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHA, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Sisyrrinchium avenaceum Klatt

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SAL, TUC).
BRA(RGS). URY(MON, PAY).

Sisyrrinchium azureum Phil.

Hierba. Nativa.
Países: CHL(ANT, ATA).

Sisyrrinchium balansae Baker

Sin.: *Sisyrrinchium deflexum* R.C. Foster
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA). PRY(CAA, GUA).

Sisyrrinchium biflorum Griseb.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(TUC).

Sisyrrinchium brasiliense (Ravenna)

Ravenna
Sin.: *Sisyrrinchium spicatum* Seub. ex Klatt, hom. illeg., *Phaiophleps brasiliensis* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

Sisyrrinchium brevipes Baker

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Sisyrrinchium bromelioides R.C.

Foster subsp. **angustius** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

Sisyrrinchium bromelioides R.C.

Foster subsp. **bromelioides**
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sisyrrinchium caetanum Ravenna

Hierba. Nativa. 1200-1300 m.
Países: BRA(SCA).

Sisyrrinchium calathinum Ravenna

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CAN, SPE).

Sisyrrinchium chilense Hook. subsp. **chilense**

Sin.: *Sisyrrinchium arrayanicum* Ravenna, *Sisyrrinchium graminifolium* Bertero ex Steud., *Sisyrrinchium iridifolium* Kunth subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrrinchium metae* Herter, *Sisyrrinchium micranthum* Cav. subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrrinchium ramosum* Herb. var. *chilense* (Hook.) Herb., *Sisyrrinchium scabrum* Cham. & Schltdl. var. *exaltatum* Klatt, *Sisyrrinchium uniflorum* Gay ex Phil., *Sisyrrinchium valdivianum* Phil., *Sisyrrinchium vulgare* Herter
Hierba. Nativa. 0-3700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). PRY(CAA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, MON, TAC).

- Sisyrinchium chilense** Hook. subsp. **macranthum** (Griseb.) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium macranthum* Griseb.
Hierba. Endémica. 1500-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR).
- Sisyrinchium ciliolatum** (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium vaginatum* Spreng. subsp. *ciliolatum* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS, ERI).
- Sisyrinchium claritae** Herter
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(LAV, ROC).
- Sisyrinchium coalitum** Ravenna
Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(SCA).
- Sisyrinchium commutatum** Klatt
Sin.: *Sisyrinchium secundiflorum* Klatt
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CLA).
- Sisyrinchium congestum** Klatt
Sin.: *Sisyrinchium eserrulatum* I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium cuspidatum** Poepp.
Sin.: *Sisyrinchium adenocarpum* Steud., *Sisyrinchium convallium* Ravenna, *Sisyrinchium flexuosum* Phil., p.p., *Sisyrinchium longifolium* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Sisyrinchium cylindrocarpum** Herter
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(Desconocida).
- Sisyrinchium dasypathum** (Ravenna) Ravenna subsp. **dasypathum**
Sin.: *Sisyrinchium hirsutum* Baker ex Hassl. & Chodat subsp. *dasypathum* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA). PRY(ITA, PAI).
- Sisyrinchium dasypathum** (Ravenna) Ravenna subsp. **glabrum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS).
- Sisyrinchium decumbens** Ravenna
Hierba. Endémica. 1000-1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Sisyrinchium densiflorum** Ravenna
Hierba. Endémica. 900-1100 m.
Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium deseadense** Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CHU, SCR).
- Sisyrinchium diversicarpum** Inácio & L. Eggers
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium elegantulum** Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Sisyrinchium exilifolium** Ravenna
Hierba. Endémica. 1600-1700 m.
Países: ARG(MEN).
- Sisyrinchium fasciculatum** Klatt subsp. **fasciculatum**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CAA, CAN, COA, PAI, SPE).
- Sisyrinchium fasciculatum** Klatt subsp. **hoehnei** (I.M. Johnst.) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium hoehnei* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, MIE).
- Sisyrinchium fiebrigii** I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, CAN, COA, PAI).
- Sisyrinchium flabellatum** Aita & L. Eggers
Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(RGS).
- Sisyrinchium foliosum** I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, TUC). PRY(COA, PAI).
- Sisyrinchium glaziovii** Baker
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Sisyrinchium graminifolium** Lindl.
Sin.: *Echthronema graminifolium* (Lindl.) Herb., *Echthronema maculatum* (Hook.) Herb., *Echthronema pumilum* (Lindl.) Herb., *Sisyrinchium ascendens* Poepp., *Sisyrinchium dasycarpum* Phil., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. subsp. *luteum* (Bertero ex Steud.) R. Rodr., comb. illeg., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *ascendens* (Poepp.) Baker, *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *maculatum* (Hook.) Klatt, *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *pumilum* Lindl., *Sisyrinchium gratissimum* Ravenna, *Sisyrinchium guttatum* Moris, *Sisyrinchium luteum* Bertero ex Steud., nom. nud., *Sisyrinchium maculatum* Hook., *Sisyrinchium maipoanum* Ravenna, *Sisyrinchium majale* Link, *Sisyrinchium orbiculatum* Ravenna, *Sisyrinchium piligerum* Phil., *Sisyrinchium pymaeum* Klotzsch ex Klatt, nom. nud., *Sisyrinchium tenuifolium* Willd., *Sisyrinchium tingens* Steud., *Sisyrinchium tofoense* Ravenna, *Sisyrinchium valparadiseum* Ravenna, *Sisyrinchium vestitum* Ravenna, *Sisyrinchium volckmanni* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(RNE, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Sisyrinchium hasslerianum** Baker
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
- Sisyrinchium hirsutum** Baker ex Hassl. & Chodat
Sin.: *Sisyrinchium gilberti* Kraenzl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA). PRY(AMA, CAN, SPE).
- Sisyrinchium humahuacense** C.A. Zanotti
Hierba. Endémica. 3900-4200 m.
Países: ARG(JUJ).
- Sisyrinchium humidum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Sisyrinchium humile** Phil.
Sin.: *Sisyrinchium macrocarpum* Hieron. subsp. *laetum* Ravenna, *Sisyrinchium papillosum* R.C. Foster
Hierba. Endémica. 400-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
- Sisyrinchium hypophyllum** I.M. Johnst. ex R.C. Foster
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Sisyrinchium igatimiense Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Sisyrinchium incurvatum Gardner
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
URY(CLA, PAY, RIV, SJO).

Sisyrinchium jamesonii Baker
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, SAL).

Sisyrinchium latiusculum Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: ARG(MIS).

Sisyrinchium laxum Otto ex Sims
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,
JUJ, RNE, TUC). BRA(PAR, RGS).
PRY(COA, PAI). URY(CAS, CLA, COL,
FLO, FLA, MON, ROC, SOR).

Sisyrinchium luzula Klotzsch
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON,
COA, PAI, SPE).

Sisyrinchium macrocarpum Hieron.
Hierba. Endémica. 1800-2700 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN,
RNE, SJU).

Sisyrinchium marchioides Ravenna
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
PRY(APA, CAU, CAN, ITA, PAI, PHA).

Sisyrinchium megapotamicum Malme
Sin.: *Sisyrinchium gracile* Klotzsch
ex Baker, hom. illeg., *Sisyrinchium*
obconicum Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(ART, SOR).

Sisyrinchium micranthum Cav.
Hierba. Nativa. 0-2900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ,
MIS, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(CAA, CAN,
CEN, CON, GUA, ITA, PAI).

Sisyrinchium minus Engelm. & A.
Gray subsp. **everrucosum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SFE).

Sisyrinchium minus Engelm. & A.
Gray subsp. **minus**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI).
BRA(RGS, SCA). PRY(ITA). URY(PAY, SJO).

Sisyrinchium minutiflorum Klatt
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, LPA, MIS, SFE, SLU).
BRA(RGS, SCA). PRY(COA, PAI).
URY(CAS, MON).

Sisyrinchium nanum Phil.
Sin.: *Sisyrinchium graminifolium* Lindl.
subsp. *nanum* (Phil.) Ravenna
Hierba. Endémica. 700-2300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(LBO, MAU, LLA, AIS, MAG).

Sisyrinchium nembyense Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS). PRY(CEN, COA).

Sisyrinchium nidulare (Hand.-Mazz.)
I.M. Johnst.
Sin.: *Sisyrinchium palmifolium* L. var.
nidulare Hand.-Mazz.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Sisyrinchium oxyspathum Ravenna
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU, GUA).

Sisyrinchium pachyrhizum Baker f.
cyaneum Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, SLU).
PRY(CAA, CON, COA, PHA).

Sisyrinchium pachyrhizum Baker
subsp. **columellosum** Ravenna
Hierba. Nativa. 3000-3800 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Sisyrinchium pachyrhizum Baker
subsp. **pachyrhizum**
Sin.: *Sisyrinchium chilense* Hook. var.
exaltatum (Kuntze) Hicken, *Sisyrinchium*
exaltatum (Klatt) Herter, *Sisyrinchium*
glandulosum Kraenzl., *Sisyrinchium*
johnstonii Roseng.
Hierba. Nativa. 0-3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SAL, SDE,
SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS).
PRY(APY, CAA, CEN, CON, COA, GUA,
PAI, PHA). URY(CLA, FLO, FLA, MAL,
MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

Sisyrinchium pachyrhizum Baker
subsp. **pertenuae** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS).

Sisyrinchium pachyrhizum Baker
subsp. **procerum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI).

Sisyrinchium palmifolium L. subsp.
fuscoviride (Ravenna) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium macrocephalum*
Graham subsp. *fuscoviride* Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(PAR,
SCA). PRY(CAU).

Sisyrinchium palmifolium L. subsp.
palmifolium
Sin.: *Sisyrinchium altissimum* Ten.,
Sisyrinchium grande Baker ex Chodat
& Hassl., *Sisyrinchium macrocephalum*
Graham subsp. *giganteum* Ravenna,
Sisyrinchium macrocephalum Graham
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN,
COA, GUA, ITA, SPE). URY(CLA, FLA,
MAL, RNO, SJO).

Sisyrinchium pampeanum Inácio &
L. Eggers
Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART).

Sisyrinchium patagonicum Phil. ex Baker
Sin.: *Sisyrinchium inclinatum* Ravenna,
Sisyrinchium lechleri Phil., *Sisyrinchium*
nudicaule Phil., *Sisyrinchium palenae*
Phil., *Sisyrinchium rahmeri* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, MAG).

Sisyrinchium paucispathum Ravenna
Hierba. Endémica. 300-500 m.
Países: ARG(CHU, MIS, SCR).

Sisyrinchium pearcei Phil.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Sisyrinchium pendulum Ravenna
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

- Sisyrinchium pictum** Kraenzl.
Sin.: *Sisyrinchium laterale* Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN, COA, SPE).
- Sisyrinchium platense** I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, MIE). URY(CAS, CLA, MON, PAY, SJO, SOR).
- Sisyrinchium platycaule** Baker
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, CAU, CEN, GUA, PAI, PHA).
- Sisyrinchium plicatum** Ravenna
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).
- Sisyrinchium purpurellum** Ravenna subsp. **purpurellum**
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR).
- Sisyrinchium purpurellum** Ravenna subsp. **trichospathum** Ravenna
Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium rambonis** R.C. Foster
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium rectilineum** Ravenna
Hierba. Nativa. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Sisyrinchium reitzii** R.C. Foster
Hierba. Nativa. 200-1500 m.
Países: BRA(SCA). PRY(APA, CAN).
- Sisyrinchium restioides** Spreng.
Sin.: *Sisyrinchium vaginatum* Spreng. subsp. *restioides* Beauverd
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, SPE). URY(LAV, RIV).
- Sisyrinchium rigidifolium** Baker
Hierba. Endémica. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUJ).
- Sisyrinchium rosenfurtii** I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, FLA, MAL).
- Sisyrinchium scalarium** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS).
- Sisyrinchium scariosum** I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON, ROC).
- Sisyrinchium schottii** Herter
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(Desconocida).
- Sisyrinchium sectiandrum** Inácio & L. Eggers
Hierba. Endémica. 1100-1300 m.
Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium sellowianum** Klatt
Sin.: *Sisyrinchium ostenianum* Beauverd
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA). URY(DUR, MON, SJO).
- Sisyrinchium setaceum** Klatt
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, MIS, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium sinuosum** Ravenna
Hierba. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(CAN, CAU).
- Sisyrinchium soboliferum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).
- Sisyrinchium somuncurense** Ravenna
Hierba. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(RNE).
- Sisyrinchium striatum** Sm.
Sin.: *Bermudiana striata* (Sm.) Moench, *Marica striata* (Sm.) Ker Gawl., *Moraea sertata* Jacq., *Panegua striata* (Sm.) Raf., *Sisyrinchium bracteosum* Phil., *Sisyrinchium laevigatum* Ravenna, *Sisyrinchium libertoides* Steud., *Sisyrinchium lutescens* Lodd., *Sisyrinchium nigricans* Gay, *Sisyrinchium spicatum* Cav., *Spathirachis striata* (Sm.) Klotzsch ex Klatt.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Sisyrinchium subnudum** I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, PAI).
- Sisyrinchium subtile** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).
- Sisyrinchium tafiense** Ravenna
Hierba. Endémica.
Países: ARG(TUC).
- Sisyrinchium teleanthum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Sisyrinchium tinctorium** Kunth
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
- Sisyrinchium tucumanum** Ravenna
Hierba. Endémica. 500-1300 m.
Países: ARG(TUC).
- Sisyrinchium uliginosum** Ravenna
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Sisyrinchium unguiculatum** Griseb.
Sin.: *Sisyrinchium aurantiacum* Griseb., *Sisyrinchium clarazii* Baker, *Sisyrinchium monostachyum* Baker
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).
- Sisyrinchium vaginatum** Spreng. subsp. **marchio** (Vell.) Ravenna
Sin.: *Sisyrinchium marchio* Vell.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(RGS). PRY(CAN).
- Sisyrinchium vaginatum** Spreng. subsp. **vaginatum**
Sin.: *Sisyrinchium distantiflorum* Kraenzl., *Sisyrinchium parvifolium* Baker ex Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, MON).
- Sisyrinchium weirii** Baker
Hierba. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).
- Sisyrinchium wettsteinii** Hand.-Mazz.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, SPE).

Solenomelus Miers

Solenomelus pedunculatus (Gillies ex Hook.) Hochr.

Sin.: *Sisyrrinchium longistylum* Lem., *Sisyrrinchium pedunculatum* Gillies ex Hook., *Sisyrrinchium scabriusculum* Steud., *Solenomelus chilensis* Miers

Hierba. Endémica. 0-1900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Solenomelus segethii (Phil.) Kuntze

Sin.: *Lechera sisyrinchium* Griseb. ex Lechl., nom. nud., *Sisyrrinchium segethi* Phil., *Solenomelus lechleri* Baker, *Solenomelus sisyrinchium* (Griseb.) Pax ex Diels, nom. illeg., *Susarium segethii* (Phil.) Phil., *Symphystemon segethii* (Phil.) Macloskie

Hierba. Endémica. 0-2700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Sparaxis Ker Gawl.

Sparaxis bulbifera (L.) Ker Gawl.

Sin.: *Ixia bulbifera* L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI).

Sparaxis tricolor (Schneev.) Ker Gawl.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI).

Tapeinia Comm. ex Juss.

Tapeinia pumila (G. Forst.) Baill.

Sin.: *Ixia magellanica* Lam., *Ixia pumila* G. Forst., *Moraea magellanica* (Lam.) Willd., *Sisyrrinchium pumilum* (G. Forst.) Hook., *Tapeinia magellanica* (Lam.) Ker Gawl., *Witsenia magellanica* (Lam.) Pers., *Witsenia pumila* (G. Forst.) Vahl

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Tigridia Juss.

Tigridia philippiana I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Trimezia Salisb. ex Herb.

Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb.

Sin.: *Iris martinicensis* Jacq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Trimezia spathata (Klatt) Baker

subsp. **grandis** (Kraenzl.) Ravenna

Sin.: *Anomalostylus grandis* (Kraenzl.)

R.C. Foster, *Cypella grandis* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Trimezia spathata (Klatt) Baker

subsp. **martii** (Baker) Ravenna

Sin.: *Anomalostylus coriifolius* (Baker ex Chodat & Hassl.) R.C. Foster, *Anomalostylus crateriformis* R.C. Foster, *Cypella coriifolia* Baker ex Chodat & Hassl., *Marica martii* Baker, *Neomarica martii* (Baker) Sprague, *Trimezia martii* (Baker) R.C. Foster

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, PAI, SPE).

Watsonia Mill.

Watsonia borbonica (Pourr.) Goldblatt

subsp. **ardernei** (Sander) Goldblatt

Sin.: *Watsonia ardernei* Sander

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI).

JUGLANDACEAE

Carya Nutt., nom. cons.

Carya illinoensis (Wangenh.) C. Koch

Sin.: *Juglans illinoensis* Wangenh.

Árbol. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(BAI, MIS).

Juglans L.

Juglans australis Griseb.

Sin.: *Juglans brasiliensis* Dode

Árbol. Nativa. 600-1900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

JUNCACEAE

Distichia Nees & Meyen

Distichia filamentosa Buchenau

Sin.: *Agapatea filamentosa* Buchenau, nom. nud., *Distichia filamentosa* (Buchenau) Griseb., nom. inval.

Hierba. Nativa. 3500-4700 m.

Países: CHL(AYP).

Distichia muscoides Nees & Meyen

Hierba. Nativa. 3600-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

CHL(AYP, TAR, ANT).

Juncus L.

Juncus acuminatus Michx.

Sin.: *Juncus acuminatus* Michx. var. *multiceps* (Kunze ex Kunth) Barros, *Juncus multiceps* Kuntze ex Kunth

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Juncus acutus L. var. **decompositus** Guss.

Hierba. Endémica. 600 m.

Países: CHL(ANT, COQ).

Juncus acutus L. subsp. **leopoldii**

(Parl.) Snogerup

Sin.: *Juncus acutus* L. var. *leopoldii* (Parl.) Buchenau, *Juncus leopoldii* Parl.

Hierba. Nativa. 900-2400 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LLA, RME). URY(MON).

Juncus andersonii Buchenau

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: URY(MON).

Juncus austrobrasiliensis Balslev

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Juncus balticus Willd. subsp. **andicola**

(Hook.) Snogerup

Sin.: *Juncus andicola* Hook., *Juncus arcticus* Willd. var. *andicola* (Hook.)

Balslev, *Juncus balticus* Willd. var. *pictus* (Phil.) Griseb., *Juncus conceptionis* Steud., *Juncus deserticola* Phil., *Juncus pictus* Phil.

Hierba. Nativa. 0-4100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, BIO, LRI, LLA, RME).

Juncus balticus Willd. subsp. **mexicanus** (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner

Sin.: *Juncus arcticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Balslev, *Juncus balticus* Willd. var. *columnaris* Buchenau, *Juncus balticus* Willd. var. *crassiculmis* Buchenau ex Griseb., *Juncus balticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd.) Kuntze, *Juncus crassiculmis* (Buchenau) Herter, *Juncus mexicanus* Willd. ex Schult. & Schult. f.

Hierba. Nativa. 0-3900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Juncus brasiliensis Breistr.

Sin.: *Juncus ustulatus* Buchenau, hom. illeg.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Juncus bufonius L. var. **bufonius**

Sin.: *Juncus bufonius* L. var. *genuinus* Cout., nom. inval., *Juncus bufonius* L. var. *pumilio* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-4100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, MON).

Juncus bufonius L. var.

condensatus Cout.
Sin.: *Juncus bufonius* L. var. *halophilus* Fernald & Buchenau
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, SCR, TUC). URY(MON).

Juncus bulbosus L.

Sin.: *Juncus supinus* Moench
Hierba. Introducida. 100-300 m.
Países: CHL(LLA).

Juncus burkartii Barros

Hierba. Endémica.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Juncus capillaceus Lam.

Sin.: *Juncus capillaceus* Lam. var. *montevidensis* Buchenau, *Juncus tenuifolius* Steud.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LRI, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE). URY(COL, FLA, MON).

Juncus capitatus Weigel

Hierba. Introducida. 200 m.
Países: BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA). URY(MAL, ROC, TYT).

Juncus conglomeratus L.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS, SCA).

Juncus cordobensis Barros

Sin.: *Juncus arequipensis* Balslev, *Juncus cordobensis* Barros, nom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, TUC). BRA(RGS).

Juncus cyperoides Laharpe

Sin.: *Juncus graminifolius* E. Mey., *Juncus rivularis* Poepp. ex Steud.
Hierba. Nativa. 0-3600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Juncus debilis A. Gray

Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: BRA(SCA).

Juncus densiflorus Kunth

Sin.: *Juncus densiflorus* Kunth var. *pohlii* (Steud.) Buchenau, *Juncus pohlii* Steud.
Hierba palustre. Nativa. 0-2700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(FLA).

Juncus dichotomus Elliot

Sin.: *Juncus cognatus* Kunth, *Juncus tenuis* A. Gray, hom. illeg., *Juncus tenuis* Willd. var. *dichotomus* (Elliott) Wood
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, NEU, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). PRY(GUA). URY(MON).

Juncus diemii Barros

Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, LLA).

Juncus effusus L. var. **effusus**

Sin.: *Juncus bogotensis* Kunth
Hierba. Nativa. 0-3700 m.
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, RNE, SAL, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS). URY(CLA).

Juncus effusus L. var. **subglomeratus** DC.

Sin.: *Juncus effusus* L. var. *compactus* Lej. & Courtois
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: CHL(LLA, AIS).

Juncus ernesti-barrosii Barros

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO).

Juncus filiformis L.

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Juncus homalocaulis F. Muell. ex Benth.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(IPA).

Juncus imbricatus Laharpe

Sin.: *Juncus capillaceus* Lam. var. *chilensis* Buchenau, *Juncus chamissonis* Kunth f. *pusillus* Buchenau, *Juncus chamissonis* Kunth, *Juncus collinus* Steud., *Juncus imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau, *Juncus imbricatus* Laharpe var. *lechleri* (Steud.) Buchenau, *Juncus lechleri* Steud., *Juncus multiflorus* Bertero ex Steud., *Juncus spanianthus* Steud.
Juncus urvillei Steud.
Hierba. Nativa. 0-3800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(COL, FLA, MON, SOR).

Juncus involucratus Steud. ex

Buchenau
Hierba. Nativa.
Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(MAU, BIO, LLA, AIS).

Juncus kleinii Barros

Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Juncus kraussii Hochst.

Sin.: *Juncus austerus* Buchenau,
Juncus kraussii Hochst. subsp. *austerus*
 (Buchenau) Snogerup
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(Desconocida). BRA(RGS,
 SCA). CHL(LLA). URY(MON).

Juncus ilanquihuensis Barros

Sin.: *Juncus mendocinus* Barros
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHU, MEN). CHL(LLA).

Juncus marginatus Rostk.

Sin.: *Juncus aristulatus* Michx., *Juncus buchenau* Sved., *Juncus canaliculatus* Liebm., *Juncus marginatus* Rostk. var. *aristulatus* (Michx.) Coville, *Luzula juncooides* Poir.
 Hierba. Nativa. 0-2000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, PAI, SPE). URY(MAL, MON, SJO).

Juncus micranthus Schrad. ex E. Mey.

Sin.: *Juncus scirpoides* Lam. var. *macrostemon* Gay, *Juncus scirpoides* Lam. var. *meridionalis* Buchenau, *Juncus meridionalis* (Buchenau) Herter
 Hierba. Nativa. 0-2100 m.
 Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, MIE, PAI). URY(FLA, ROC).

Juncus microcephalus Kunth

Sin.: *Juncus floribundus* Kunth, *Juncus luzuloxiphium* Griseb., *Juncus microcephalus* Kunth f. *conglobatus* Barros, *Juncus microcephalus* Kunth var. *floribundus* (Kunth) Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *intermedius* Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *Juncus microcephalus* Kunth var. *virens* Griseb., *Juncus rudis* Kunth, *Juncus sellowianus* Kunth, *Juncus timotensis* Barros, *Juncus floribundus* Phil., nom. illeg.
 Hierba. Nativa. 0-3000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). PRY(CAU, CEN, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR, TYT).

Juncus pallescens Lam. var.

achalensis (Barros) Novara
 Sin.: *Juncus achalensis* Barros, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *achalensis* (Barros) Novara, *Juncus pallescens* Lam. var. *achalensis* (Barros) Novara, comb. superfl.
 Hierba. Nativa.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Juncus pallescens Lam. var.

pallescens
 Sin.: *Juncus commixtus* Steud., *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *elatus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *pycnanthus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *typicus* Buchenau, nom. inval., *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe, *Juncus fernandezianus* Steud., *Juncus longifolius* Steud., *Juncus megakoleos* Steud., *Juncus proximus* Steud.
 Hierba. Nativa. 0-2000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE). PRY(CEN). URY(FLO, FLA, PAY, ROC).

Juncus planifolius R. Br.

Sin.: *Juncus demissus* Steud., *Juncus homalophyllus* Steud., *Juncus planifolius* R. Br. var. *demissus* (Steud.) Buchenau, *Juncus xantholepis* Steud.
 Hierba. Introducida. 0-1300 m.
 Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE).

Juncus procerus E. Mey.

Sin.: *Juncus valdiviae* Steud.
 Hierba. Nativa. 0-1100 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Juncus ramboi Barros

Sin.: *Juncus ramboi* Barros f. *explicatus* Barros
 Hierba. Endémica. 900-1600 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Juncus scheuchzerioides Gaudich.

Sin.: *Juncus capillaceus* Hook., hom. illeg., *Juncus exiguus* Gaudich. ex Hook. f., *Juncus inconspicuus* d'Urv., *Juncus scheuchzerioides* Gaudich. var. *inconspicuus* (d'Urv.) Hook.
 Hierba. Nativa. 0-2100 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Juncus stipulatus Nees & Meyen

Sin.: *Juncus biflorus* Phil., *Juncus chilensis* Gay, *Juncus corralensis* Phil., *Juncus depauperatus* Phil., *Juncus gayanus* Steud., *Juncus mandonii* Buchenau, *Juncus microcephalus* Kunth var. *pusillus* E. Mey., *Juncus oliganthus* Phil., *Juncus stipulatus* Nees & Meyen var. *corralensis* (Phil.) Buchenau
 Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
 Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TDF, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Juncus tenuis Willd. var. **congestus**

Engelm. ex Buchenau
 Sin.: *Juncus occidentalis* Wiegand, *Juncus tenuis* Willd. var. *occidentalis* (Wiegand) Coville
 Hierba. Nativa.
 Países: ARG(COR, SFE, SLU). CHL(MAU, RME).

Juncus tenuis Willd. var. **tenuis**

Sin.: *Juncus smithii* Kunth, *Juncus subtenuis* Herter, *Juncus tenuis* Willd. var. *multicornis* E. Mey., *Juncus tenuis* Willd. var. *williamsii* Fernald
 Hierba. Nativa. 0-3000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, LLA). PRY(CEN, ITA, ÑEE). URY(Desconocida).

Juncus uruguensis Griseb.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
 Países: ARG(BAI, ERI, SAL, SFE). URY(FLA, MON).

Juncus venturianus Castillón

Hierba. Endémica. 0-1400 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN). URY(MON).

Luzula DC., nom. cons.**Luzula alopecurus** Desv.

Sin.: *Juncodes alopecurus* (Desv.) Kuntze, *Juncoides alopecurus* (Desv.) Macloskie, *Luzula villosa* Wikstr.
 Hierba. Endémica. 0-1600 m.
 Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Luzula antarctica Hook. f.

Sin.: *Juncodes antarcticus* (Hook. f.) Kuntze, *Juncoides antarcticum* (Hook. f.) Macloskie

Hierba. Endémica. 300-1000 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Luzula brachyphylla Phil.

Sin.: *Juncoides patagonicum* (Speg.) Macloskie, *Luzula chilensis* Nees & Meyen ex Kunth f. *frequentior* Barros, *Luzula correae* Barros, *Luzula patagonica* Speg., *Luzula racemosa* Desv. f. *brachyphylla* (Phil.) Fuentes

Hierba. Endémica.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Luzula campestris (L.) DC.

Sin.: *Juncodes campestre* (L.) Kuntze, *Juncus campestris* L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAU, BIO, LLA, MAG).

Luzula chilensis Nees & Meyen ex Kunth

Sin.: *Juncodes chilense* (Nees & Meyen ex Kunth) Kuntze, *Luzula chilensis* Nees & Meyen ex Kunth f. *longifolia* Barros, *Luzula chilensis* Nees & Meyen ex Kunth f. *rigida* (Phil.) Fuentes, *Luzula rigida* Phil.

Hierba. Endémica. 400-3300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Luzula excelsa Buchenau

Sin.: *Juncodes excelsum* (Buchenau) Kuntze, *Juncodes hieronymi* (Buchenau & Griseb.) Kuntze, *Luzula castellanosii* Barros, *Luzula hieronymi* Buchenau & Griseb. f. *bonariensis* Barros, *Luzula hieronymi* Buchenau & Griseb. f. *pusilla* (Castillón) Novara, *Luzula hieronymi* Buchenau & Griseb. var. *pusilla* Castillón, *Luzula hieronymi* Buchenau & Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SLU, TUC). CHL(MAU, ARA, AIS, MAG).

Luzula leiboldii Buchenau

Sin.: *Juncodes leiboldii* (Buchenau) Kuntze

Hierba. Endémica. 100-1200 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, MAU, BIO, RME).

Luzula masafuerana Skottsbl.

Hierba. Endémica. 900-1400 m.

Países: CHL(JFE).

Luzula mendocina Barros

Hierba. Endémica. 600-3000 m.

Países: ARG(BAI, COR, MEN, SLU).

Luzula ostenii (Mattf.) Herter

Sin.: *Luzula campestris* (L.) DC. var. *ostenii* Mattf.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(FLA, LAV, MAL).

Luzula parvula Barros

Hierba. Endémica. 3300-3400 m.

Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Luzula peruviana Desv.

Sin.: *Juncodes boliviensis* (Buchenau) Kuntze, *Juncoides peruviana* (Desv.) Kuntze, *Luzula boliviensis* Buchenau, *Luzula peruviana* Desv. var. *longispica* Barros

Hierba. Nativa. 3600-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Luzula pumila Hook. f.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(TDF).

Luzula racemosa Desv.

Sin.: *Juncodes macusaniensis* (Buchenau) Kuntze, *Juncodes racemosum* (Desv.) Kuntze, *Luzula humilis* Buchenau, *Luzula macusaniensis* Steud. ex Buchenau, *Luzula racemosa* Cruchet, hom. illeg., *Luzula racemosa* Desv. f. *humilis* (Buchenau) Buchenau, *Luzula racemosa* Desv. var. *humilis* (Buchenau) R.E. Fr., *Luzula racemosa* Desv. var. *traversii* Buchenau, *Luzula racemosa* Desv. var. *typica* Buchenau

Hierba. Nativa. 1500-4700 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Luzula ruiz-lealii Barros

Hierba. Endémica. 3000-3200 m.

Países: ARG(CHU, MEN).

Luzula tristachya Desv.

Sin.: *Luzula campestris* (L.) DC. var. *tristachya* (Desv.) Buchenau, *Luzula pauciflora* Phil.

Hierba. Endémica. 100-600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA).

Luzula ulei Buchenau

Sin.: *Luzula campestris* (L.) DC. var. *ulei* (Buchenau) Barros

Hierba. Nativa. 1200-2200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Marsippospermum Desv.**Marsippospermum grandiflorum** (L. f.) Hook. f.

Sin.: *Juncus grandiflorus* L. f., *Marsippospermum calyculatum* Desv., hom. illeg., *Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Marsippospermum philippii

(Buchenau) Hauman

Sin.: *Marsippospermum grandiflorum* (L. f.) Hook. f. var. *philippii* Buchenau, *Rostkovia gracilis* Phil., hom. illeg., *Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f. var. *philippii* (Buchenau) Hosseus

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Marsippospermum reichei Buchenau

Sin.: *Rostkovia reichei* (Buchenau) Hosseus

Hierba. Endémica. 500-1100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Oxychloe Phil.**Oxychloe andina** Phil.

Sin.: *Distichia andina* (Phil.) Benth. & Hook.

Hierba. Nativa. 3200-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

Oxychloe bisexualis Kuntze

Sin.: *Andesia bisexualis* (Kuntze) Hauman

Hierba. Endémica. 2800-4400 m.

Países: ARG(MEN, SAL, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Oxychloe castellanosii Barros

Sin.: *Oxychloe simulans* Barros

Hierba. Endémica. 3000-4000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Oxychloe haumaniana (Barros) Barros

Sin.: *Andesia haumaniana* Barros

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA, COQ).

Oxychloe mendocina Barros

Sin.: *Oxychloe mendocina* Barros, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 2800-3500 m.

Países: ARG(MEN).

Patosia Buchenau**Patosia clandestina** (Phil.) Buchenau

Sin.: *Distichia clandestina* (Phil.)
 Buchenau, *Oxychloe brevifolia* (Phil.)
 Buchenau, *Oxychloe clandestina* (Phil.)
 Hauman, *Patosia clandestina* (Phil.)
 Buchenau var. *tucumanensis* (Castillón)
 Barros, *Patosia tucumanensis* Castillón,
Rostkovia brevifolia Phil., *Rostkovia*
clandestina Phil.

Hierba. Nativa. 2700-4500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, NEU,
 SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ,
 VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Rostkovia Desv.**Rostkovia magellanica** (Lam.) Hook. f.

Sin.: *Juncus magellanicus* Lam., *Rostkovia*
magellanica (Lam.) Hook. f. f. *pumila*
 Albov, *Rostkovia sphaerocarpa* Desv.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
 CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

JUNCAGINACEAE

Tetroncium Willd.**Tetroncium magellanicum** Willd.

Sin.: *Triglochin magellanica* Vahl ex
 Kunth, nom. inval., *Triglochin reflexa*
 Vahl ex Kunth, nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.
 Países: ARG(NEU, SCR, TDF).
 CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Triglochin L.**Triglochin concinna** Burttt Davy

Sin.: *Triglochin maritima* L. var.
altoandina Cabrera, *Triglochin maritima*
 L. var. *deserticola* Phil., *Triglochin*
maritima L. var. *deserticola* Buchenau,
 hom. illeg., *Triglochin monanthos* Speng.

Hierba. Cosmopolita. 3500-4000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ,
 LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TDF).
 CHL(TAR, ANT, ATA, VAL, MAG).

Triglochin maritima L.

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
 Países: ARG(MEN, NEU, SCR).

Triglochin palustris L.

Sin.: *Triglochin andinum* Phil.,
Triglochin fonticola Phil.

Hierba. Cosmopolita. 0-3900 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, MEN, RNE,
 SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(ANT,
 ATA, COQ, MAU, LLA, MAG, RME).

Triglochin scilloides (Poir.) Mering & Kadereit

Sin.: *Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman,
Lilaea subulata Humb. & Bonpl.,
Phalangium scilloides Poir.
 Hierba. Nativa. 0-4100 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS,
 ERI, LRI, RNE, SAL). BRA(RGS).
 CHL(MAU, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).
 URY(CAS, FLA, MAL, MON, SJO, SJO).

Triglochin striata Ruiz & Pav.

Sin.: *Triglochin lechleri* Steud.,
Triglochin litoreum Phil., *Triglochin*
montevicensis Spreng., *Triglochin striata*
 Ruiz & Pav. var. *filifolia* Buchenau,
Triglochin striata Ruiz & Pav. var.
montevicensis (Spreng.) Buchenau,
Triglochin volckmanni Phil.

Hierba. Cosmopolita. 0-3400 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, MEN,
 RNE, SJU, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS,
 SCA). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ,
 VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).
 URY(CAS, COL, FLA, MON, ROC).

KRAMERIACEAE

Krameria L. ex Loeff.**Krameria cistoidea** Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Krameria grandiflora A. St.-Hil.

Sin.: *Krameria didymandra* Turcz.,
Krameria latifolia Moric, *Krameria*
ruscifolia A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 100-200 m.
 Países: BRA(Fuera del área del
 proyecto). PRY(AMA).

Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson

Sin.: *Krameria iluca* Phil., *Krameria*
pentapetala Ruiz & Pav., *Krameria*
triandra Ruiz & Pav. var. *humboldtiana*
 Chodat, *Landia lappacea* Dombey
 Arbusto. Nativa. 300-4500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU,
 TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

LACISTEMATACEAE

Lacistema Sw.**Lacistema hasslerianum** Chodat

Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(PAR).
 PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).

Lacistema lucidum Schnizl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR).

LAMIACEAE

Aegiphila Jacq.**Aegiphila australis** Moldenke

Arbusto. Endémica.
 Países: BRA(SCA).

Aegiphila brachiata Vell.

Sin.: *Aegiphila brasiliensis* Moldenke,
Aegiphila hassleri Briq., *Aegiphila triantha*
 Schauer

Arbusto o árbol. Nativa. 100-1400 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAU, CAA,
 CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI,
 SPE). URY(CLA, RIV, TAC).

Aegiphila fluminensis Vell.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR).

Aegiphila graveolens Mart. & Schauer

Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks.

Sin.: *Aegiphila arborescens* Vahl,
Aegiphila sellowiana Cham., *Callicarpa*
integrifolia Jacq.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2300 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(APA, CAN).

Aegiphila luschnathii Schauer

Arbusto o árbol. Nativa.
 Países: BRA(SCA).

Aegiphila mediterranea Vell.

Sin.: *Aegiphila cestrifolia* Gardner,
Aegiphila hirta Casar., *Aegiphila*
paranensis Moldenke
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

Aegiphila obducta Vell.

Árbol. Nativa. 0-2300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aegiphila riedeliana Schauer

Arbusto o árbol. Nativa. 800-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aegiphila saltensis Legname

Arbusto. Nativa. 600-1400 m.
Países: ARG(SAL).

Aegiphila verticillata Vell.

Sin.: *Aegiphila crenata* Moldenke,
Aegiphila lhotzkiana Cham., *Aegiphila*
paraguariensis Briq., *Aegiphila splendens*
Schauer, *Aegiphila tomentosa* Cham.
Subarbusto. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, APA,
AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Aegiphila vitelliniflora Klotzsch ex Walp.

Sin.: *Aegiphila candelabrum* Briq. ex
Chodat & Hassl., *Aegiphila chrysantha*
Hayek var. *glabra* Moldenke, *Aegiphila*
chrysantha Hayek, *Aegiphila cuspidata*
Mart. ex Schauer f. *grandiflora*
Schauer, *Aegiphila cuspidata* Mart.
ex Schauer f. *parviflora* Schauer,
Aegiphila cuspidata Mart. ex Schauer,
Aegiphila densiflora Rusby, *Aegiphila*
ferruginea Glaz., *Aegiphila lanceolata*
Moldenke, *Aegiphila mattogrossensis*
Moldenke, *Aegiphila platyphylla* Briq.,
Aegiphila setiformis Rusby, *Aegiphila*
vitelliniflora Klotzsch ex Walp. var.
egleri Moldenke
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAN,
CON, MIE, PHA, SPE).

Amasonia L. f.**Amasonia hirta** Benth.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Ballota L.**Ballota nigra** L. subsp. **foetida** Hayek

Sin.: *Ballota foetida* Lam., *Ballota nigra*
L. var. *foetida* Vis.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Ballota nigra L. subsp. **nigra**

Sin.: *Marrubium nigrum* (L.) Garsault,
nom. nud., *Stachys ballota* (L.) Kuntze
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(CAS, MON).

Ballota nigra L. subsp. **velutina**

(Posp.) Patzak
Sin.: *Ballota nigra* L. var. *velutina*
(Posp.) Fiori, *Ballota velutina* Posp.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE).

Cantinoa Harley & J.F.B. Pastore**Cantinoa althaeifolia** (Pohl ex Benth.)

Harley & J.F.B. Pastore
Sin.: *Cantinoa x sylvularum* (A. St.-Hil.
ex Benth.) Harley, *Hyptis althaeifolia*
Pohl ex Benth., *Hyptis sylvularum* A. St.-
Hil. ex Benth., *Hyptis vestita* Benth. var.
tomentosa J.A. Schmidt, *Hyptis vestita*
Benth., *Mesosphaerum althaeaeifolium*
(Pohl ex Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum*
sylvularum (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze,
Mesosphaerum vestitum (Benth.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN,
COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Cantinoa heterodon (Epling) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis heterodon* Epling
Hierba. Nativa. 300-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis arvensis* Poepp. ex Benth.,
Hyptis aspera M. Martens & Galeotti,
Hyptis canaminensis Rusby, *Hyptis*
canescens Kunth var. *arvensis* (Poepp. ex
Benth.) Urb., *Hyptis canescens* Kunth,
Hyptis kerberi Gand., *Hyptis micrantha*
Pohl ex Benth., *Hyptis mutabilis* (Rich.)
Briq. var. *canescens* (Kunth) Briq.,
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. var.
micrantha (Pohl ex Benth.) H.S. Irwin
& Barneby, *Hyptis mutabilis* (Rich.)
Briq. var. *polystachya* (Kunth) Briq.,
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. var. *spicata*
(Poit.) Rusby, *Hyptis mutabilis* (Rich.)

Briq., *Hyptis polystachya* Kunth, *Hyptis*
rostrata Salzm. ex Benth., *Hyptis spicata*
Poit. var. *micrantha* (Pohl ex Benth.)
H.S. Irwin & Barneby, *Hyptis spicata*
Poit. var. *rostrata* (Salzm. ex Benth.)
Kuntze, *Hyptis spicata* Poit., *Hyptis*
tenuiflora Benth., *Hyptis trichocalyx* Briq.
ex Micheli, *Mesosphaerum canescens*
(Kunth) Kuntze, *Mesosphaerum mutabile*
(Rich.) Kuntze var. *polystachyum*
(Kunth) Kuntze, *Mesosphaerum*
mutabile (Rich.) Kuntze var. *spicata*
(Poit.) Kuntze, *Mesosphaerum mutabile*
(Rich.) Kuntze, *Mesosphaerum spicatum*
(Poit.) Rusby, *Mesosphaerum yungasense*
Britton ex Rusby, *Nepeta mutabilis* Rich.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,
SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, CAA, COA, ITA, MIE,
PAI, PHA).

Cantinoa plectranthoides (Benth.)

Harley & J.F.B. Pastore
Sin.: *Hyptis plectranthoides* Benth.,
Mesosphaerum plectranthoides (Benth.)
Kuntze
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cantinoa stricta (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis stricta* Benth.,
Mesosphaerum strictum (Benth.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CLA).

Clerodendrum L.**Clerodendrum bungei** Steud.

Arbusto. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb.

Sin.: *Clerodendrum fragrans* (Vent.) R.
Br., *Clerodendrum philippinum* Schauer,
Cryptanthus chinensis Osbeck
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(SAL, TUC). PRY(CEN).

Clerodendrum ekmani Moldenke

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).
PRY(COA).

Clerodendrum thomsoniae Balf.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CEN).

Clinopodium L.**Clinopodium bolivianum** (Benth.)Kuntze subsp. **bolivianum**

Sin.: *Clinopodium kuntzeanum* (Briq.) Kuntze, *Micromeria boliviana* Benth. var. *angustifolia* Wedd., *Micromeria boliviana* Benth., *Satureja boliviana* (Benth.) Briq., *Satureja kuntzeana* Briq., *Satureja simulans* Epling, *Xenopoma bolivianum* (Benth.) Griseb.

Arbusto. Nativa. 1200-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SLU, TUC).

Clinopodium bolivianum (Benth.)Kuntze subsp. **tarijense** (Griseb.)

J.R.I. Wood

Sin.: *Satureja boliviana* (Benth.) Briq. var. *tarijensis* (Wedd.) Epling, *Xenopoma bolivianum* (Benth.) Griseb. var. *tarijense* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1200-2300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze

Sin.: *Micromeria brownei* (Sw.) Benth., *Satureja boliviana* (Benth.) Briq. var. *tarijensis* (Wedd.) Epling, *Satureja brownei* (Sw.) Briq. subsp. *eubrownei* Epling, nom. inval., *Satureja brownei* (Sw.) Briq., *Thymus brownei* Sw.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).

BRA(RGS, SCA). PRY(PAI). URY(ART, RIV).

Clinopodium darwinii (Benth.) Kuntze

Sin.: *Clinopodium darwinii* (Benth.) Kuntze var. *pusilla* (Phil.) Epling, *Micromeria darwinii* Benth. var. *imbricatifolia* Speg., *Micromeria darwinii* Benth. var. *pallida* Speg., *Micromeria darwinii* Benth. var. *pusilla* (Phil.) Speg., *Micromeria darwinii* Benth. var. *typica* Speg., nom. inval., *Micromeria darwinii* Benth. var. *virescens* Speg., *Micromeria darwinii* Benth., *Micromeria pusilla* Phil., *Satureja darwinii* (Benth.) Briq., *Satureja pusilla* (Phil.) Macloskie

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze

Sin.: *Bystropogon minutus* Briq., *Micromeria eugenioides* (Griseb.) Hieron., *Micromeria gilliesii* Benth., *Oreosphacus parvifolia* Phil., *Satureja eugenioides* (Griseb.) Loes., *Satureja oligantha* Briq., *Satureja parvifolia* (Phil.) Epling, *Xenopoma eugenioides* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1200-4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

CHL(AYP, TAR, ANT).

Clinopodium odorum (Griseb.) Harley

Sin.: *Ceratominthe achalensis* Briq., *Ceratominthe kuntzeana* Briq., *Ceratominthe odora* (Griseb.) Hauman, *Micromeria odora* (Griseb.) Hieron., *Satureja odora* (Griseb.) Epling, *Xenopoma odorum* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Clinopodium vulgare L.Sin.: *Satureja vulgaris* (L.) Fritsch

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Condea Adans.**Condea elegans** (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Eriope elegans* Briq., *Hyptis elegans* (Briq.) Briq. ex Micheli var. *pascuicola* Briq. ex Micheli, *Hyptis elegans* (Briq.) Briq. ex Micheli, *Hyptis gracilipes* Britton

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, MIE, PAI).

Condea fastigiata (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis diaphora* Briq., *Hyptis fasciculata* Benth. subsp. *fastigiata* (Benth.) Harley, *Hyptis fasciculata* Benth. var. *fastigiata* (Benth.) J.A. Schmidt, *Hyptis fasciculata* Benth., *Hyptis fastigiata* Benth., *Mesosphaerum diaphorum* (Briq.) Briq., *Mesosphaerum fasciculatum* (Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum fastigiatum* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, ITA). URY(CAS, MON, SJO, SJO).

Condea floribunda (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis elegans* (Briq.) Briq. ex Micheli var. *campicola* Briq., *Hyptis floribunda* Briq. ex Micheli, *Mesosphaerum floribundum* Briq.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, COA, PAI). URY(FLO, MON).

Condea thyrsoflora (Epling) Harley & J.F.B. PastoreSin.: *Hyptis thyrsoflora* Epling

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Condea undulata (Schrank) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis fasciculata* Benth. var. *tomentella* Benth., *Hyptis undulata* Schrank, *Lepechinia anomala* Epling, *Mesosphaerum undulatum* (Schrank) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(CAS, CLA, MON, SJO, TAC).

Cuminia Colla**Cuminia eriantha** (Benth.) Benth.

Sin.: *Bystropogon erianthus* Benth., *Cuminia brevidens* Benth., *Cuminia eriantha* (Benth.) Benth. var. *fernandezia* (Colla) Harley, *Cuminia fernandezia* Colla, *Johowia fernandezia* (Colla) Epling & Looser, *Skottsbergiella fernandezia* (Colla) Epling

Arbusto. Endémica. 200-900 m.

Países: CHL(JFE).

Cunila D. Royen ex L.**Cunila angustifolia** Benth.Sin.: *Hedyosmos angustifolius*

(Benth.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 200-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cunila fasciculata Benth.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS).

Cunila galioides Benth.

Arbusto. Nativa. 400-2500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Cunila incana Benth.Sin.: *Hedyosmos incanus* (Benth.) Kuntze

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV).

Cunila incisa Benth.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Cunila mentiformis Epling

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

Cunila menthoides Benth.

Sin.: *Cunila arechavaletae* Briq.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MON).

Cunila microcephala Benth.

Sin.: *Hedyosmos microcephalus*
(Benth.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLO,
FLA, MON, RIV, SOR, TYT).

Cunila platyphylla Epling

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cunila spicata Benth.

Sin.: *Hedeoma hassleri* Briq.,
Hedyosmos spicatus (Benth.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAU). URY(ROC, SAO, TYT).

Cunila tenuifolia Epling

Subarbusto. Endémica. 900-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Cyanocephalus (Pohl ex Benth.)
Harley & J.F.B. Pastore**Cyanocephalus apertiflorus** (Epling)
Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis apertiflora* Epling
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Cyanocephalus polioides (Briq.)

Harley & J.F.B. Pastore
Sin.: *Hyptis polioides* Briq. ex Micheli,
Mesosphaerum polioides (Briq. ex Micheli) Briq.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: PRY(COA, SPE).

Cyanocephalus tripartitus (Briq.)

Harley & J.F.B. Pastore
Sin.: *Hyptis tripartita* Briq.,
Mesosphaerum tripartitum (Briq.) Briq.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del
proyecto). PRY(CAU).

Eriope Kunth ex Benth.**Eriope crassipes** Benth. subsp.
crassipes

Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: BRA(PAR).

Eriope crassipes Benth. subsp.

trichopoda (Briq.) Harley
Sin.: *Eriope trichopoda* Briq.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Eriope macrostachya Mart. ex Benth.

var. **hypoleuca** Benth.
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, CAN, CON, PHA).

Eriope macrostachya Mart. ex Benth.

var. **macrostachya**
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Galeopsis L.**Galeopsis tetrahit** L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(LLA).

Gardoquia Ruiz & Pav.**Gardoquia gilliesii** Graham

Sin.: *Clinopodium chilense* (Benth.)
Govaerts, *Gardoquia chilensis* Benth.,
Satureja chilensis (Benth.) Briq., *Satureja*
gilliesii (Graham) Briq.
Arbusto Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Gardoquia multiflora Ruiz & Pav.

Sin.: *Clinopodium multiflorum* (Ruiz &
Pav.) Kuntze, *Satureja multiflora* (Ruiz &
Pav.) Briq.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Glechoma L., nom. cons.**Glechoma hederacea** L.

Sin.: *Nepeta hederacea* (L.) Trevir.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE,
TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, MAG).

Glechon Spreng.**Glechon ciliata** Benth.

Sin.: *Glechon affinis* Briq., *Glechon*
hassleri Briq., *Glechon paraguariensis*
Briq., *Glechon rigidula* Briq., *Glechon*
squarrosa Benth.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAA,
CAN, CEN, COA, ITA, MIE, SPE).
URY(MON).

Glechon discolor Epling

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Glechon elliptica C. Pereira & Hatschbach

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Glechon marifolia Benth.

Sin.: *Glechon candida* Benth., nom.
nud., *Glechon canescens* A. St.-Hil. ex
Benth., *Glechon marifolia* Benth. f.
canescens (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze,
Glechon marifolia f. *serpyllifolia* (A.
St.-Hil. ex Benth.) Kuntze, *Glechon*
serpyllifolia A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, GUA). URY(FLA,
LAV, MAL, MON, RIV, ROC).

Glechon thymoides Spreng.

Sin.: *Glechon spathulata* Benth.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY(CLA, TAC).

Gymneia (Benth.) Harley &
J.F.B. Pastore**Gymneia virgata** (Benth.) Harley &
J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis velascana* Briq., *Hyptis*
virgata Benth., *Mesosphaerum*
velascanum (Benth.) Briq.,
Mesosphaerum virgatum (Benth.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CAN).

Hedeoma Pers.**Hedeoma mandoniana** Wedd.

Sin.: *Hedeoma adscendens* Rusby,
Hedeoma breviflorum Griseb.
Hierba. Nativa. 2700-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Hedeoma medium Epling

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). URY(PAY, SOR).

Hedeoma multiflora Benth.

Sin.: *Hedeoma gilliesii* Benth., *Micromeria bonariensis* Fisch. & C.A. Mey., *Satureja bonariensis* (Fisch. & C.A. Mey.) Briq., *Satureja gilliesii* (Benth.) Briq.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU, SDE). BRA(RGS). URY(PAY).

Hedeoma polygalaefolium Benth.

Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Hedeoma teyucuaensis H.A. Keller & Tressens

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(MIS).

Hedyosmum Sw.**Hedyosmum brasiliense** Miq.

Sin.: *Hedyosmum acutifolium* Cordem., *Hedyosmum grandifolium* Occhioni, *Hedyosmum weddellianum* Cordem., *Tafallaea brasiliensis* (Miq.) Kuntze, *Tafallaea weddelliana* (Cordem.) Kuntze
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Hesperozygis Epling**Hesperozygis dimidiata** Epling & Mathias

Hierba o arbusto. Endémica. 1000-1300 m.
Países: BRA(SCA).

Hesperozygis kleinii Epling & Játiva

Arbusto. Endémica. 1500 m.
Países: BRA(SCA).

Hesperozygis nitida (Benth.) Epling

Sin.: *Keithia nitida* Benth.
Hierba o arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hesperozygis rhododon Epling

Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hesperozygis ringens (Benth.) Epling

Sin.: *Glechon ringens* Benth.
Hierba o arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Hesperozygis spathulata Epling

Hierba o arbusto. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hoehnea Epling**Hoehnea epilobioides** (Epling) Epling

Sin.: *Keithia epilobioides* Epling
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Hoehnea grandiflora Funez & Hassemer

Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(SCA).

Hoehnea minima (J.A. Schmidt) Epling

Sin.: *Keithia minima* J.A. Schmidt
Hierba. Nativa. 900-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hoehnea parvula (Epling) Epling

Sin.: *Keithia parvula* Epling
Hierba. Endémica. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hoehnea scutellarioides (Benth.) Epling

Sin.: *Hedeoma scutellarioides* (Benth.) Briq., *Keithia pilosa* Benth., *Keithia scutellarioides* Benth.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hypenia (Mart. ex Benth.) Harley**Hypenia glauca** (A. St.-Hil. ex Benth.) Harley

Sin.: *Hyptis glauca* A. St.-Hil. ex Benth., *Mesosphaerum glaucum* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Hypenia macrantha (A. St.-Hil. ex Benth.) Harley

Sin.: *Hyptis macrantha* A. St.-Hil. ex Benth.
Hierba a subarbusto. Nativa
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

Hypenia reticulata (Mart. ex Benth.) Harley

Sin.: *Hyptis reticulata* Mart. ex Benth.
Hierba a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Hyptis Jacq.**Hyptis alata** (Raf.) Shinnars subsp. **rugosula** (Briq.) Harley

Sin.: *Hyptis rugosula* Briq.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, SPE).

Hyptis albicoma Epling

Sin.: *Hyptis incana* Briq., hom. illeg., *Mesosphaerum incanum* (Briq.) Briq., comb. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, GUA).

Hyptis angulosa Schott ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum angulosum* (Schott ex Benth.) Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).

Hyptis australis Epling

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Hyptis balansae Briq.

Sin.: *Hyptis mollis* Pohl ex Benth. var. *leptoclada* Briq., *Hyptis mollis* Pohl ex Benth. var. *vulgaris* Briq., *Hyptis paranensis* Epling
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, GUA, PAI).

Hyptis brevipes Poit.

Sin.: *Hyptis acuta* Benth., *Hyptis brevipes* Poit. var. *serrata* Briq., *Hyptis brevipes* Poit. var. *vulgaris* Briq., *Mesosphaerum brevipes* (Poit.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(RIV).

Hyptis caespitosa A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Hyptis caespitosa* A. St.-Hil. ex Benth. var. *elliptica* (Briq. ex Micheli) Briq., *Hyptis caespitosa* A. St.-Hil. ex Benth. var. *mirabilis* (Briq. ex Micheli) Briq., *Hyptis elliptica* Briq. ex Micheli, *Hyptis mirabilis* Briq., *Mesosphaerum caespitosum* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum mirabile* (Briq.) Briq.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, SPE).

Hyptis campestris Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Peltodon tomentosus* Pohl
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Hyptis comaroides (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Peltodon comaroides* Briq., *Peltodon longipes* A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Hyptis dumetorum Morong

Sin.: *Hyptis cyrtostoma* Briq., *Hyptis dumetorum* Morong var. *genuina* Briq., nom. inval., *Hyptis dumetorum* Morong var. *inconcinna* Briq., *Hyptis dyscheres* Briq., *Hyptis gymnodonta* Briq., *Mesosphaerum dyscheres* (Briq.) Briq., *Mesosphaerum gymnodontum* (Briq.) Briq.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(FOR). PRY(APY, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Hyptis hassleri Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAU, CAN, SPE).

Hyptis hirsuta Kunth

Sin.: *Hyptis siderotricha* Briq., *Mesosphaerum hirsutum* (Kunth) Kuntze, *Mesosphaerum siderotrichum* (Briq.) Briq.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, ITA, PAI).

Hyptis homalophylla Pohl ex Benth.

Hierba. Nativa. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

Hyptis inodora Schrank

Sin.: *Hyptis gaudichaudii* Benth., *Mesosphaerum inodorum* (Schrank) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hyptis lacustris A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum lacustre* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hyptis lagenaria A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum lagenarium* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hyptis lanceolata Poir.

Hierba a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Hyptis lappacea Benth.

Sin.: *Hyptis cinerea* Morong var. *genuina* Briq., nom. inval., *Hyptis cinerea* Morong var. *stenophylla* Briq., *Hyptis cinerea* Morong, *Hyptis michelii* Briq. ex Micheli, *Hyptis trichoneura* Briq. ex Micheli, *Mesosphaerum cinereum* (Morong) Briq., *Mesosphaerum lappaceum* (Benth.) Kuntze, *Mesosphaerum trichoneurum* (Briq. ex Micheli) Briq.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(SAO, TAC).

Hyptis lappulacea Mart. ex Benth.

Sin.: *Hyptis lappacea* Benth. var. *hirsuta* Benth., *Hyptis marrubiaea* Benth., *Hyptis marrubiastra* Pohl ex Benth., *Hyptis reineckii* Briq., *Mesosphaerum lappulaceum* (Mart. ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 800-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Hyptis lorentziana O. Hoffm.

Sin.: *Hyptis barbarensis* Briq. ex Micheli, *Hyptis czermakii* Briq., *Hyptis paraguayensis* Briq. ex Micheli, *Mesosphaerum barbarensis* (Briq. ex Micheli) Briq., *Mesosphaerum lorentzianum* (O. Hoffm.) Kuntze, *Mesosphaerum paraguayense* (Briq. ex Micheli) Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, PAI). URY(ART, COL, RNO, SAO, TAC, TYT).

Hyptis lutescens Pohl ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum lutescens* (Pohl ex Benth.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Hyptis marrubioides Epling ex Hoehne

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Hyptis meridionalis Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Peltodon rugosus* Tolm.

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Hyptis microphylla Pohl ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum microphyllum* (Pohl ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Hyptis muelleri Briq.

Sin.: *Mesosphaerum muelleri* (Briq.) Briq.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(RIV).

Hyptis pachyarthra Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON).

Hyptis pulchella Briq.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Hyptis radicans (Pohl) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Peltodon radicans* Pohl

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hyptis recurvata Poit.

Sin.: *Hyptis imitans* Epling, *Mesosphaerum recurvatum* (Poir.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

Hyptis tetracephala Bordignon

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Hyptis tetragona Pohl ex Benth.

Sin.: *Hyptis sterochaulos* Briq., *Mesosphaerum sterochaulos* (Briq. ex Micheli) Briq., *Mesosphaerum tetragonum* (Pohl ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, GUA).

Hyptis tweedii Benth.

Sin.: *Mesosphaerum tweedii* (Benth.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Hyptis uliginosa A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Mesosphaerum uliginosum* (A. St.-Hil. ex Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hyptis umbrosa Salzm. ex Benth.

Sin.: *Hyptis graveolens* Salzm. ex Benth., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hyptis villosa Pohl

Sin.: *Mesosphaerum villosum* (Pohl) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Kurzamra Kuntze**Kurzamra pulchella** (Clos) Kuntze

Sin.: *Micromeria pulchella* (Clos) Wedd., *Soliera pulchella* Clos
Hierba. Endémica. 3500-4300 m.
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA, COQ).

Lamium L.**Lamium amplexicaule** L.

Hierba. Introducida. 100-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, LRI, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME). URY(MON, SOR).

Lamium purpureum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, TDF). CHL(MAG).

Leonotis (Pers.) R. Br.**Leonotis nepetifolia** (L.) R. Br.

Sin.: *Phlomis nepetifolia* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI). URY(ART, PAY).

Leonurus L.**Leonurus cardiaca** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR).

Leonurus japonicus Houtt.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, PAI). URY(ART, CLA, PAY, RNO).

Lepechinia Willd.**Lepechinia chilensis** (Molina) R.

Morales
Sin.: *Alguelagum chilense* Kuntze, *Dracocephalum chamaedryoides* Balb., *Lepechinia chamaedryoides* (Balb.) Epling, *Phytoxis acidissima* Molina, *Phytoxis sidertifolia* Molina, *Rosmarinus chilensis* Molina, *Sphacele campanulata* Benth., *Sphacele chamaedryoides*
Arbusto. Endémica. 0-1600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Lepechinia floribunda (Benth.) Epling

Sin.: *Alguelagum floribundum* (Benth.) Kuntze, *Alguelagum grisebachii* Kuntze, *Alguelagum hieronymi* (Briq.) Briq., *Lepechinia sagittata* Epling, *Sphacele floribunda* Benth., *Sphacele grisebachii* Kurtz, *Sphacele hastata* Griseb., hom. illeg., *Sphacele hieronymi* Briq., *Sphacele pampeana* Speg.

Subarbusto. Nativa. 500-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Lepechinia meyenii (Walp.) Epling

Sin.: *Alguelagum clinopodioides* (Griseb.) Kuntze, *Alguelagum tenuiflorum* (Benth.) Kuntze, *Sphacele clinopodioides* Griseb., *Sphacele meyenii* (Walp.) Klatt, *Sphacele tenuiflora* Benth., *Stachys meyenii* Walp.

Hierba. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Lepechinia salviae (Lindl.) Epling

Sin.: *Alguelagum salviae* (Lindl.) Kuntze, *Gardoquia salviaefolia* Colla, *Sphacele lindleyi* Benth., *Sphacele salviae* (Lindl.) Briq., *Stachys salviae* Lindl.
Arbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Lepechinia subhastata (Benth.) Epling

Sin.: *Alguelagum subhastatum* (Benth.) Kuntze, *Sphacele subhastata* Benth.
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(VAL).

Lepechinia vesiculosa (Benth.) Epling

Sin.: *Alguelagum acuminatum* (Griseb.) Kuntze, *Astemon graveolens* Regel, *Hyptis vesiculosa* Benth., *Lepechinia graveolens* (Regel) Epling, *Sphacele acuminata* Griseb., *Sphacele vesiculosa* (Benth.) J.F. Macbr.
Arbusto o arbolito. Nativa. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Leucas R.Br.**Leucas martinicensis** (Jacq.) R. Br.

Sin.: *Clinopodium martinicense* Jacq.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lycopus L.**Lycopus europaeus** L.

Hierba. Introducida. 100 m.
Países: CHL(LRI, LLA).

Marrubium L.**Marrubium vulgare** L.

Sin.: *Marrubium hamatum* Kunth
Hierba. Introducida. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, AIS, RME, JFE, IPA). URY(CAS, CLA, DUR, MON, PAY, RNO, SOR).

Marsypianthes Mart. ex Benth.**Marsypianthes chamaedrys** (Vahl)

Kuntze
Sin.: *Clinopodium chamaedrys* Vahl, *Hyptis chamaedrys* (Vahl) Willd., *Marsypianthes chamaedrys* (Vahl) R. Br.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Marsypianthes hassleri Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, ITA, MIE, SPE).

Medusantha Harley & J.B.

Pastore

Medusantha eriophylla (Pohl ex

Benth.) Harley & J.F.B. Pastore var. **coriifolia** (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Sin.: *Hyptis eriophylla* Pohl ex Benth. var. *coriifolia* Benth.

Arbusto a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Melissa L.**Melissa officinalis L.**

Hierba. Introducida. 1000-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(CLA, MON).

Mentha L.**Mentha aquatica L.**

Sin.: *Mentha hirsuta* Huds.
Hierba. Introducida. 0-3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, MEN, TUC). BRA(PAR). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). URY(CAS, MON).

Mentha piperita L.

Hierba. Introducida.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, TDF, TUC). CHL(TAR, VAL, LLA, RME, JFE).

Mentha pulegium L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(MON, TAC).

Mentha spicata L. var. rotundifolia L.

Sin.: *Mentha x rotundifolia* (L.) Huds.,
Mentha rotundifolia Huds.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, MEN, NEU, SJU, SLU).

Mentha spicata L. var. spicata

Hierba. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mentha suaveolens Ehrh.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(CEN).

Mesosphaerum P. Browne**Mesosphaerum pectinatum (L.)**

Kuntze
Sin.: *Hyptis pectinata* (L.) Poit., *Nepeta pectinata* L.
Hierba o subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mesosphaerum sidifolium (L'Hér.)

Harley & J.F.B. Pastore
Sin.: *Bystropogon sidifolium* L'Hér.
Hierba a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze

Sin.: *Ballota suaveolens* L.
Hierba a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Minthostachys (Benth.) Speg.**Minthostachys elongata Schmidt**

Hierba. Nativa. 2100-2200 m.
Países: ARG(SAL).

Minthostachys verticillata (Griseb.)

Epling
Sin.: *Bystropogon kuntzeanus* Briq.,
Minthostachys verticillata (Griseb.)
Epling var. *eupatorioides* Epling,
Xenopoma verticillatum Griseb.
Hierba. Endémica. 700-2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Molucella L.**Molucella laevis L.**

Hierba. Introducida. 500-2000 m.
Países: ARG(BAI). CHL(VAL).

Nepeta L.**Nepeta cataria L.**

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MIS, NEU, RNE, SLU).

Ocimum L.**Ocimum americanum L.**

Hierba a subarbusto. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Ocimum campechianum Mill.

Sin.: *Ocimum flexuosum* Thunb.,
Ocimum guatemalense Gand., *Ocimum micranthum* Willd.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CAU, CHO, CON, COA, PHA).

Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex Benth

Sin.: *Lumnitzera carnososa* Spreng.,
Ocimum graveolens Larrañaga, nom. illeg.,
Ocimum montevideanum Larrañaga, nom. illeg.,
Ocimum selloi Benth. f. *serratum* Briq.,
Ocimum selloi Benth. f. *subintegrefolium* Briq.,
Ocimum selloi Benth. var. *angustifolium* Briq.,
Ocimum selloi Benth. var. *carnosum* (Spreng.) Briq.,
Ocimum selloi Benth. var. *genuinum* Briq.,
Ocimum selloi Benth. var. *tweedianum* (Benth.) Briq.,
Ocimum selloi Benth. var. *tweedianum* (Benth.) Briq.,
Ocimum selloi Benth.,
Ocimum sellowii Benth.,
Ocimum tweedianum Benth.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO).

Ocimum gratissimum L.

Arbusto a subarbusto. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ocimum nudicaule Benth.

Sin.: *Eriope nudicaulis* Briq.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, COA, GUA).

Ocimum ovatum Benth.

Sin.: *Ocimum balansae* Briq.,
Ocimum hassleri Briq.,
Ocimum hassleri var. *acutatum* Briq.,
Ocimum hassleri Briq. var. *obtusifolium* Briq.,
Ocimum neurophyllum Briq.,
Ocimum procurrans Epling
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, ÑEE, PHA, SPE).

Ocephalus (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore**Ocephalus oppositiflorus (Schrank)**

Harley & J.F.B. Pastore
Sin.: *Hyptis oppositiflorus* Schrank
Hierba a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Origanum L.**Origanum x majoricum Cambess.**

Hierba. Introducida.
Países: CHL(TAR, JFE).

Prunella L.**Prunella laciniata** (L.) L.

Sin.: *Prunella vulgaris* L. var. *laciniata* L.

Hierba. Introducida. 600-700 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LLA).

Prunella vulgaris L.

Hierba. Introducida. 200-1200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, FLA).

Rhabdocalyon (Benth.) Epling**Rhabdocalyon denudatum** (Benth.)

Epling

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Rhabdocalyon erythrostachys Epling

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhabdocalyon gracilis (Benth.) Epling

Sin.: *Hedeoma gracilis* (Benth.) Briq.,

Keithia gracilis Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhabdocalyon lavanduloides

(Benth.) Epling

Sin.: *Keithia lavanduloides* Benth.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhabdocalyon stenodontus (Briq.)

Epling

Sin.: *Hedeoma stenodonta* Briq.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, CAN, CON).

Rhabdocalyon strictus (Benth.) Epling

Sin.: *Cunila stricta* Benth., *Hedyosmos strictus* (Benth.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(ÑEE).

URY(CLA, PAY).

Salvia L.**Salvia aliciae** E.P. Santos

Subarbusto. Nativa. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Salvia arenaria A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Salvia australis* Epling, *Salvia rhombifolia* Ruiz & Pav. var. *ovata*

Griseb., *Salvia rypara* Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Salvia aridicola Briq.

Sin.: *Salvia dumeticola* Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN, ÑEE).

Salvia atrocyanea Epling

Sin.: *Salvia meyeri* Legname

Subarbusto. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Salvia brevipes Benth.

Subarbusto. Nativa. 900-1200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(MIE).

Salvia caaguazuensis Briq.

Subarbusto. Endémica. 400-500 m.

Países: PRY(APA, CAU, CAN).

Salvia calolophos Epling

Hierba. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SJU).

Salvia campicola Briq.

Subarbusto. Endémica. 400 m.

Países: PRY(AMA, ITA, PAI).

Salvia cardiophylla Benth.

Sin.: *Salvia approximata* Briq. var.

kuntzeana Briq., *Salvia approximata* Briq., *Salvia cinerarioides* Briq., *Salvia rojasii* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA). URY(SAO).

Salvia coccinea Etl.

Sin.: *Horminum coccineum* Moench, *Salvia ciliata* Benth., hom. illeg.,

Salvia coccinea Etl. f. *pseudococcinea*

(Jacq.) Vilm., *Salvia coccinea* Etl.

var. *minima* Fernald, *Salvia coccinea*

Etl. var. *pseudococcinea* (Jacq.) A.H.

Gentry, *Salvia galeottii* M. Martens &

Galeotti, *Salvia glaucescens* Pohl, *Salvia*

mollissima M. Martens & Galeotti, *Salvia*

pseudococcinea Jacq., *Salvia rosea* Vahl

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia congestiflora Epling

Sin.: *Salvia reitzii* Epling

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Salvia consimilis Epling

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia cordata Benth.

Subarbusto. Endémica. 100-400 m.

Países: BRA(RGS).

Salvia curta Epling

Hierba. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia cuspidata Ruiz & Pav. subsp.

gilliesii (Benth.) J.R.I. Wood

Sin.: *Salvia gilliesii* Benth., *Salvia gilliesii* Benth. var. *glandulosa* Griseb.,

Salvia lorentzii Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, ANT).

Salvia exserta Griseb.

Sin.: *Salvia praeclara* Epling

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Salvia guaranitica A. St.-Hil. ex

Benth.

Sin.: *Salvia ambigens* Briq., *Salvia coerulea* Benth. var. *regnellii* Benth., *Salvia coerulea* Benth., *Salvia melanocalyx* Briq.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,

ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

CAU, CAA, CAN, GUA, PAI). URY(MON,

PAY, SAO).

Salvia hilarii Benth.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Salvia lachnostachys Benth.

Hierba. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Salvia melissiflora Benth.

Sin.: *Salvia arenaria* A. St.-Hil. ex

Benth. var. *sellowiana* Benth., *Salvia*

paranensis Dusén, *Salvia platyfrons*

Epling & Játiva

Hierba. Nativa. 300-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia microphylla Kunth

Sin.: *Salvia grahami* Benth., *Salvia grahamii* Benth., *Salvia lemmonii* A. Gray, *Salvia obtusa* M. Martens & Galeotti, *Salvia odoratissima* Sessé & Moç.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, MIS, SAL, TUC).

Salvia minarum Briq.

Subarbusto. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Salvia nervosa Benth.

Sin.: *Salvia borjensis* E.P. Santos, *Salvia hassleri* Briq., *Salvia lucida* Briq., *Salvia rigida* Benth. f. *lucida* (Briq.) Briq., *Salvia rigida* Benth. var. *lucida* (Briq.) Briq., *Salvia rigida* Benth., hom. illeg. var. *cryptocaulos* Briq., *Salvia rigida* Benth., hom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Salvia officinalis L.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA). BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia ovalifolia A. St.-Hil. ex Benth. var. **nitidula** (Briq.) E.P. Santos

Sin.: *Salvia isabellei* Briq., *Salvia nitidula* Briq.

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(MIE).

Salvia ovalifolia A. St.-Hil. ex Benth. var. **ovalifolia**

Sin.: *Salvia durifolia* Epling

Subarbusto. Endémica. 200-300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CAA, ITA).

Salvia ovalifolia A. St.-Hil. ex Benth. var. **villosa** Benth.

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(ERI). BRA(RGS). URY(ART, CLA, DUR, FLO, FLA, PAY, RNO, RIV, SOR).

Salvia pachypoda Briq.

Subarbusto. Endémica. 400 m.

Países: PRY(CAU, MIE, SPE).

Salvia pallida Benth.

Sin.: *Salvia balansae* Briq., hom. illeg., *Salvia canescens* Benth., *Salvia rouyana* Briq., *Salvia serrata* Benth., *Salvia uruguayensis* A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(COA, PHA). URY(SAO).

Salvia paraguariensis Briq.

Subarbusto. Endémica. 400 m.

Países: PRY(CAU).

Salvia personata Epling

Sin.: *Salvia alba* J.R.I. Wood

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Salvia procurrens Benth.

Sin.: *Salvia hederacea* Larrañaga, *Teucrium rotundifolium* Schreb.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RIV, SJO).

Salvia propinqua Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Salvia reflexa Hornem.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Salvia regnelliana Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia rhombifolia Ruiz & Pav.

Sin.: *Salvia foliosa* Benth., *Salvia paposana* Phil., *Salvia pilosa* Vahl, *Salvia tafallae* Benth.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Salvia rosmarinoides A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CAN, MIE). URY(SAO).

Salvia scoparia Epling

Arbusto. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Salvia segtinophylla Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Salvia splendens Sellow ex Nees

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, DFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Salvia stachydifolia Benth.

Sin.: *Salvia matico* Griseb. var. *cuneata* Griseb., *Salvia matico* Griseb., *Salvia rhinosina* Griseb. var. *arborescens* Griseb., *Salvia rhinosina* Griseb.

Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Salvia subrotunda A. St.-Hil. ex Benth.

Sin.: *Salvia micheliana* Briq. ex Micheli

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, PAI).

Salvia tenuiflora Epling

Arbusto. Endémica. 600-1800 m.

Países: BRA(SCA).

Salvia tubiflora Sm.

Sin.: *Salvia biflora* Ruiz & Pav. var. *glabrata* Benth., *Salvia biflora* Ruiz & Pav., *Salvia excisa* Ruiz & Pav., *Salvia scrobiculata* Meyen

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Salvia uliginosa Benth.

Sin.: *Salvia lanceolata* Larrañaga

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, MIS, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLA, MON, SAO, SJO).

Salvia verbenaca L.

Sin.: *Horminum verbenacum* (L.) Mill., *Larnastyrta verbenaca* (L.) Raf.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, SLU). CHL(RME). URY(MON).

Satureja L.**Satureja hortensis** L.

Hierba. Introducida. 1000 m.

Países: CHL(BIO, RME).

Scutellaria L.**Scutellaria eplingii** Legname

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(SAL).

Scutellaria nummulariifolia Hook. f.

Sin.: *Cruzia serpyllacea* Phil.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF).
CHL(AIS, MAG).

Scutellaria platensis Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS).
BRA(RGS, SCA). URY(COL, SAO, SJO).

Scutellaria purpurascens Sw.

Sin.: *Scutellaria breviflora* Benth.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).
BRA(SCA).

Scutellaria racemosa Pers.

Sin.: *Scutellaria bonariensis* Willd. ex
Benth., *Scutellaria hastata* Larrañaga,
nom. illeg., *Scutellaria heterophylla*
Willd. ex Benth., *Scutellaria rojasii* Briq.,
Scutellaria rumicifolia Kunth
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL,
SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA, RME). PRY(APY, CAU, CAN, CEN,
CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).
URY(ART, CAS, CLA, FLA).

Scutellaria uliginosa A. St.-Hil. ex
Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAN, CEN, PAI).

Scutellaria valdiviana (Clos) Epling

Sin.: *Theresa valdiviana* Clos
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(MAU, BIO, LRI).

Scutellaria woodii J.M. Mercado

Hierba. Nativa. 2600-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Stachys L.**Stachys albicaulis** Lindl.

Sin.: *Stachys eriophylla* Briq., *Stachys*
sidertidoides Gillies ex Benth.
Hierba. Nativa. 1000-2200 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Stachys arvensis (L.) L.

Sin.: *Glechoma arvensis* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, MIS, NEU, SAL,
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(VAL, LLA, JFE, IPA). PRY(ITA).
URY(MON).

Stachys bridgesii Benth.

Hierba. Endémica. 0-2300 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO,
LRI, RME).

Stachys eremicola Epling

Sin.: *Stachys crenata* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Stachys gilliesii Benth.

Sin.: *Stachys boliviana* Briq., *Stachys*
galanderi Briq., *Stachys lorentzii* Briq.,
Stachys micheliana Briq. ex Micheli,
Stachys micrantha Griseb., nom.
illeg., *Stachys petiolosa* Briq., *Stachys*
tucumanensis Briq.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN,
MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, RME). PRY(APY,
PHA). URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV,
PAY, RIV, SAO, SOR, TYT).

Stachys grandidentata Lindl.

Sin.: *Stachys brevidens* Phil., *Stachys*
closi Phil., *Stachys serrata* Clos, *Stachys*
toronjicillo Phil.
Hierba. Endémica. 0-2900 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Stachys macraei Benth.

Sin.: *Stachys chonotica* Hook. f.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Stachys ochroleuca Phil.

Sin.: *Stachys araucana* Phil., *Stachys*
dubia Briq., *Stachys litoralis* Phil., *Stachys*
meyeniana Phil., *Stachys rupestris* Phil.,
Stachys volkmanni Phil.
Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA).

Stachys pannosa Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
MAU, BIO).

Stachys philippiana Vatke

Sin.: *Stachys andina* Phil., *Stachys*
elliptica Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1200-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Stachys sericea Cav.

Sin.: *Stachys candidissima* Phil., *Stachys*
glabrata Phil.
Hierba. Endémica. 500-2500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LLA, RME).

Stachys truncata Kunze ex Benth.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, AIS).

Teucrium L.**Teucrium bicolor** Sm.

Sin.: *Teucrium cavanilliesii* Bertero
ex Steud., nom. nud., *Teucrium chilense*
Desf. ex Steud., nom. nud., *Teucrium*
heterophyllum Cav., *Teucrium orchideum*
Lindl.
Arbusto. Endémica. 0-2100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Teucrium cubense Jacq.

Sin.: *Melosmon cubense* (Jacq.) Small,
Melosmon laevigatum (Vahl) Small,
Teucrium chamaedrifolium Mill., *Teucrium*
cubense Jacq. subsp. *chamaedrifolium*
(Mill.) Epling, *Teucrium cubense* Jacq.
subsp. *cordobense* Epling, *Teucrium cubense*
Jacq. subsp. *laevigatum* (Vahl) E.M.
McClint., *Teucrium grisebachii* Hieron.,
nom. nud. *Teucrium laevigatum* Vahl
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, LRI, MEN, MIS, SLU, SFE,
SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(ART,
CAS, CLA, FLO, MON, RNO).

Teucrium nudicaule Hook.

Sin.: *Teucrium leucanthum* Phil.,
Teucrium nudicaule Hook. var.
leucanthum (Phil.) Epling, *Teucrium*
tripartitum Meyen
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-2100 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Teucrium scorodonia L.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(LLA).

Teucrium vesicarium Mill.

Sin.: *Teucrium carthaginense* Lange, *Teucrium hirtum* Willd. ex Spreng., hom. illeg., *Teucrium inflatum* Sw., *Teucrium mollifolium* Larrañaga, nom. illeg., *Teucrium palustre* Kunth, nom. illeg., *Teucrium picardae* Krug & Urb., *Teucrium tenuipes* Epling, *Teucrium vesicarium* Mill. var. *palustre* Epling

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, SOR).

Vitex L.**Vitex cymosa** Bertero ex Spreng.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CEN, CON, COA, PAI).

Vitex flavens Kunth

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Vitex megapotamica (Spreng.)

Moldenke

Sin.: *Bignonia megapotamica* Spreng.,

Vitex montevidensis Cham.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA). URY(ROC, TAC, TYT).

Vitex mexiae Moldenke

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Vitex polygama Cham. var. **bakeri**

Moldenke

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Vitex polygama Cham. var. **dusenii**

Moldenke

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Vitex polygama Cham. var. **polygama**

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Vitex sellowiana Cham.

Árbol o arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Vitex vauthieri DC. ex Schauer

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

LARDIZABALACEAE

Boquila Decne.**Boquila trifoliolata** (DC.) Decne.

Sin.: *Boissiera trifoliata* Dombey ex DC., nom. nud., *Boquila discolor* Decne., *Cogylla ternata* Molina, *Dolichos funarius* Molina, *Lardizabala discolor* Kunze ex Poepp. & Endl., *Lardizabala funaria* (Molina) Looser, *Lardizabala trifoliolata* DC.

Liana. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Lardizabala Ruiz & Pav.**Lardizabala biternata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Boissiera triternata* Dombey ex DC., nom. nud., *Cogylla biternata* (Ruiz & Pav.) Molina, *Cogylla triternata* (Ruiz & Pav.) Molina, *Lardizabala infusiana* Miers, *Lardizabala silvicola* Miers, *Lardizabala triternata* Ruiz & Pav.

Arbusto o liana. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, JFE).

LAURACEAE

Aiouea Aubl.**Aiouea acarodomatifera** Kosterm.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aiouea amoena (Nees & Mart.) R. Rohde

Sin.: *Cinnamomum amoenum* (Nees) Vattimo, comb. superfl., *Cinnamomum amoenum* (Nees & Mart.) Kosterm., *Cinnamomum vesiculosum* (Nees & Mart.) Kosterm., *Ocotea amoena* (Nees & Mart.) Herter, *Oreodaphne amoena* Nees & Mart., *Oreodaphne vesiculosa* Nees & Mart., *Phoebe amoena* (Nees & Mart.) Mez, *Phoebe vesiculosa* (Nees & Mart.) Kosterm.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Aiouea glaziovii (Mez) R. Rohde

Sin.: *Cinnamomum glaziovii* (Mez)

Kosterm., *Cinnamomum glaziovii* (Mez)

Vattimo, comb. superfl., *Phoebe glaziovii* Mez

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aiouea hatschbachii (Vattimo-Gil) R.

Rohde

Sin.: *Cinnamomum hatschbachii* Vattimo

Árbol. Endémica. 800-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aiouea pseudoglaziovii Lorea-Hern.

Árbol. Endémica. 200-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Aiouea saligna Meisn.

Sin.: *Aiouea gaudichaudii* Mez

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aiouea sellowiana (Nees & Mart.) R.

Rohde

Sin.: *Cinnamomum sellowianum* (Nees & Mart. ex Nees) Kosterm., *Persea sellowiana* Nees & Mart. ex Nees, *Phoebe sellowiana* (Nees & Mart. ex Nees) Meisn. ex Mez, *Phoebe sellowii* Meisn.

Árbol. Nativa. 400-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aiouea trinervis Meisn.

Sin.: *Aiouea hassleri* Mez ex Chodat, *Aiouea marginata* Mez

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).

Aniba Aubl.**Aniba firmula** (Nees & Mart.) Mez

Sin.: *Aniba laevigata* (Meisn.) Mez, *Aydendron firmulum* Nees & Mart., *Aydendron laevigatum* Meisn., *Aydendron sellowii* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Beilschmiedia Nees**Beilschmiedia berteroana** (Gay)

Kosterm.

Sin.: *Adenostemum nitidum* Bertero, hom. illeg., *Bellota nitida* Phil., *Bellota pauciflora* Phil., *Boldu chilianum* Nees ex Meisn., p.p., *Boldu nitidum* (Phil.) Meisn., *Cryptocarya berteroana* Gay, *Cryptocarya nitida* Phil.

Árbol. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Beilschmiedia miersii (Gay) Kosterm.

Sin.: *Bellota miersii* Gay, *Boldu chilianum* Nees, p.p.

Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, RME).

Cassytha L.**Cassytha filiformis** L.

Liana hemiparásita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Cinnamomum Schaeff.**Cinnamomum glanduliferum** (Wall.) Meisn.

Sin.: *Laurus glandulifera* Wall.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE).

Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm.

Sin.: *Aiouea montana* (Sw.) R. Rohde, *Cinnamomum australe* Vattimo, *Cinnamomum paraguariense* (Hassl.) Kosterm., *Laurus montana* Sw., *Laurus triplinervis* Ruiz & Pav., *Phoebe paraguariensis* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, SPE).

Cinnamomum verum J. Presl

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Cryptocarya R. Br.**Cryptocarya alba** (Molina) Looser

Sin.: *Cryptocarya laxiflora* Phil., *Cryptocarya mammosa* (Molina) Kosterm., *Cryptocarya peumo* (Dombey ex Lam.) Kosterm., *Cryptocarya peumus* Nees var. *laxiflora* Phil. ex Mez,, *Cryptocarya peumus* Nees var. *stenantha* (Phil.) Mez, *Cryptocarya peumus* Nees, *Cryptocarya rubra* (Molina) Skeels, *Cryptocarya stenantha* Phil., *Icosandra rufescens* Phil., *Laurus peumo* Dombey ex Lam., *Laurus peumus* Molina, *Peumus alba* Molina, *Peumus mammosa* Molina, *Peumus rubra* Molina

Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Cryptocarya aschersoniana Mez

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cryptocarya mandioccana Meisn.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cryptocarya moschata Nees & Mart. ex Nees

Sin.: *Cryptocarya mandioccana* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Endlicheria Nees, nom. cons.**Endlicheria paniculata** (Spreng.) J.F. Macbr.

Sin.: *Citrosma paniculata* Spreng., *Cryptocarya hirsuta* Schott, *Endlicheria hirsuta* (Schott) Nees, *Goepertia cantagallana* Meisn., *Nectandra lucida* Nees

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, SPE).

Licaria Aubl.**Licaria armeniaca** (Nees) Kosterm.

Sin.: *Licaria reitzkleiniana* Vattimo

Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nectandra Rol. ex Rottb., nom. cons.**Nectandra angusta** Rohwer

Árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Nectandra angustifolia (Schrad.)

Nees & Mart.

Sin.: *Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart. var. *falcifolia* Nees, *Nectandra falcifolia* (Nees) J.A. Castigl. ex Mart. Crov. & Piccinini, *Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez, *Nectandra membranacea* (Sw.) Hassl. f. *floribunda* Hassl., *Nectandra membranacea* (Sw.) Hassl. var. *falcifolia* (Nees) Hassl., *Nectandra membranacea* (Sw.) Hassl. var. *saligna* (Nees & Mart.) Hassl., *Nectandra membranacea* Hassl., hom. illeg., *Nectandra saligna* Nees & Mart. var. *obscura* Meisn., *Nectandra saligna* Nees & Mart., *Nectandra tweediei* (Meisn.) Mez, *Ocotea angustifolia* Schrad., *Oreodaphne tweediei* Meisn., *Tetranthera megapotamica* Spreng.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, CLA, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Nectandra briquetii Hassl.

Árbol. Endémica.

Países: PRY(AMA).

Nectandra cissiflora Nees

Sin.: *Nectandra myriantha* Meisn., *Nectandra myriantha* Meisn. var. *attenuata* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nectandra cuspidata Nees & Mart. ex Nees

Sin.: *Nectandra pichurim* (Kunth) Mez var. *cuprea* Mez

Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Nectandra globosa (Aubl.) Mez

Sin.: *Laurus globosa* Aubl.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Nectandra grandiflora Nees

Árbol. Nativa. 600-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nectandra hihua (Ruiz & Pav.) Rohwer

Sin.: *Laurus hihua* Ruiz & Pav.

Árbol. Nativa. 200-700 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Nectandra lanceolata Nees & Mart.

Sin.: *Nectandra lanceolata* Nees & Mart. var. *grandifolia* Mez, *Nectandra lanceolata* Nees & Mart. var. *paraguariensis* Hassl., nom. superfl., *Nectandra lanceolata* Nees & Mart. var. *parvifolia* Mez

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA).

Nectandra leucantha Nees

Árbol. Nativa. 100-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Nectandra megaphylla Hassl.

Árbol. Endémica.

Países: PRY(AMA).

Nectandra membranacea (Sw.) Hassl.

Sin.: *Laurus membranacea* Sw.

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Nectandra nitidula Nees & Mart. ex Nees
Árbusto o árbol. Nativa. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR).

Nectandra oppositifolia Nees
Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nectandra paranaensis Coe-Teix.
Árbol. Nativa. 200-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Nectandra puberula (Schott) Nees
Sin.: *Nectandra amara* Meisn. var. *australis* Meisn., *Nectandra amara* Meisn., *Persea puberula* Schott
Árbol. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAA).

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez
Sin.: *Laurus reticulata* Ruiz & Pav.
Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Ocotea Aubl.

Ocotea aciphylla (Nees & Mart. ex Nees) Mez
Sin.: *Nectandra regnellii* Meisn., *Oreodaphne aciphylla* Nees & Mart. ex Nees
Árbol. Nativa. 200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea acutifolia (Nees) Mez
Sin.: *Oreodaphne acutifolia* Nees, *Oreodaphne acutifolia* Ness var. *latifolia* Ness, *Oreodaphne acutifolia* Nees var. *prolifera* Nees
Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, ITA, ÑEE, PAI). URY(MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

Ocotea bicolor Vattimo-Gil
Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea brachybotra (Meisn.) Mez
Sin.: *Oreodaphne brachybotra* Meisn., *Oreodaphne lucida* Meisn.
Árbusto o árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Ocotea catharinensis Mez
Sin.: *Nectandra dubia* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez
Sin.: *Mespilodaphne corymbosa* Meisn., *Mespilodaphne organensis* Meisn., *Ocotea gurgelii* Vattimo, *Ocotea organensis* (Meisn.) Mez
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAA, COA, PAI).

Ocotea daphnifolia (Meisn.) Mez
Sin.: *Oreodaphne daphnifolia* Meisn.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ocotea densiflora (Meisn.) Mez
Sin.: *Persea densiflora* Meisn., *Ocotea confusa* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, PAI, SPE).

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez
Sin.: *Ocotea pseudocorymbosa* Hassl., *Ocotea suaveolens* (Meisn.) Benth. & Hook. ex Hieron. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Ocotea suaveolens* (Meisn.) Benth. & Hook. ex Hieron. var. *robusta* Hassl., *Ocotea suaveolens* (Meisn.) Benth. & Hook. ex Hieron., *Oreodaphne diospyrifolia* Meisn., *Oreodaphne suaveolens* Meisn., *Strychnodaphne suaveolens* Griseb.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Ocotea dispersa (Nees & Mart. ex Nees) Mez
Sin.: *Ocotea hoehnei* Vattimo, *Ocotea rubiginosa* Mez, *Oreodaphne dispersa* Nees & Mart. ex Nees
Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea elegans Mez
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

Ocotea floribunda (Sw.) Mez
Sin.: *Laurus floribunda* Sw., *Ocotea lanceolata* (Nees) Nees f. *latifolia* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Ocotea glaziovii Mez
Árbol. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea gracilipes Mez
Sin.: *Ocotea lanceolata* (Nees) Nees var. *gracilipes* Hassl.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU).

Ocotea indecora (Schott) Mez
Sin.: *Mespilodaphne leucophloea* Nees, *Ocotea indecora* Schott ex Meisn., hom. illeg., *Oreodaphne indecora* (Schott) Nees, *Persea indecora* Schott
Árbusto o árbol. Nativa. 700-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea lanata (Nees & Mart. ex Nees) Mez
Sin.: *Oreodaphne lanata* Nees & Mart. ex Nees
Árbusto o árbol. Nativa. 800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea lancifolia (Schott) Mez
Sin.: *Ocotea lanceolata* (Nees) Nees var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Ocotea lanceolata* (Nees) Nees, comb. illeg., *Ocotea pulchra* Vattimo-Gil, *Oreodaphne lancifolia* (Schott) Nees, *Persea lancifolia* Schott, *Strychnodaphne lanceolata* Nees
Árbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN).

Ocotea laxa (Nees) Mez
Sin.: *Camphoromoea laxa* Nees, *Ocotea teleiandra* (Meisn.) Mez, *Oreodaphne teleiandra* Meisn., *Teleiandra glauca* Nees
Árbolito. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea lobbii (Meisn.) Rohwer
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea mandioccana A. Quinet
Cinnamomum riedelianum Kosterm.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea marumbiensis Brotto & Baitello
Árbol. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea minarum (Nees & Mart. ex Nees) Mez
Sin.: *Gymnobalanus minarum* Nees & Mart. ex Nees
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, COA).

Ocotea nectandrifolia Mez

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea notata (Nees & C. Mart. ex Nees) MezSin.: *Oreodaphne notata* Nees & C.

Mart. ex Nees

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Ocotea nunesiana (Vattimo-Gil)

Baitello

Sin.: *Phoebe nunesiana* Vattimo

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea nutans (Nees) MezSin.: *Oreodaphne nutans* Nees

Árbol. Nativa. 1000-1600 m.

Países: BRA(PAR).

Ocotea odorifera (Vell.) RohwerSin.: *Mespilodaphne pretiosa* Nees & Mart. ex Nees, *Ocotea pretiosa* (Nees & Mart. ex Nees) Benth. & Hook.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea paranaensis Brotto, Baitello,

Cervi & E.P. Santos

Árbol. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Ocotea porosa (Nees & Mart. ex Nees)

Barroso

Sin.: *Cinnamomum porosum* (Nees & Mart. ex Nees) Kosterm., *Nectandra speciosa* Chanc., nom. nud., *Oreodaphne porosa* Nees & Mart. ex Nees, *Phoebe porosa* (Nees & Mart. ex Nees) Mez

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA).

Ocotea porphyria (Griseb.) van der

Werff

Sin.: *Cinnamomum porphyrium* (Griseb.) Kosterm., *Nectandra porphyria* Griseb., *Phoebe porphyria* (Griseb.) Mez

Árbol. Nativa. 700-1700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ocotea prolifera (Nees & Mart.) MezSin.: *Mespilodaphne prolifera* Nees & Mart.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ocotea puberula (Rich.) NeesSin.: *Laurus puberula* Rich., *Ocotea macropoda* (Kunth) Mez, *Persea macropoda* Kunth, *Strychnodaphne puberula* (Rich.) Nees & Mart.

Árbol. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, RIV, SOR, TAC, TYT).

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) MezSin.: *Mespilodaphne pulchella* (Nees & Mart.) Meisn., *Mespilodaphne vaccinioides* Meisn., *Ocotea pulchella* (Nees) Mez var. *vaccinioides* (Meisn.) Hassl., *Oreodaphne pulchella* Nees & Mart.

Árbol. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, COA, PAI, SPE). URY(CLA).

Ocotea silvestris Vattimo

Árbol. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea spectabilis (Meisn.) MezSin.: *Oreodaphne spectabilis* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CEN, COA, ÑEE).

Ocotea teleiandra (Meisn.) MezSin.: *Oreodaphne teleiandra* Meisn.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea tristis (Nees & Mart. ex Nees) MezSin.: *Mespilodaphne cordata* Meisn., *Mespilodaphne tristis* (Nees & Mart. ex Nees) Meisn., *Ocotea cordata* (Meisn.) Mez, *Oreodaphne tristis* Nees & Mart. ex Nees

Arbolito. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocotea urbaniana MezSin.: *Ocotea kuhlmannii* Vattimo

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Ocotea vaccinioides (Meisn.) MezSin.: *Oreodaphne vaccinioides* Meisn.

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ocotea velloziana (Meisn.) MezSin.: *Oreodaphne velloziana* Meisn.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ocotea velutina (Nees) RohwerSin.: *Oreodaphne velutina* Nees

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Persea Mill., nom. cons.**Persea alba** Nees & Mart. ex Nees

Árbol. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Persea americana Mill.Sin.: *Laurus persea* L., *Persea edulis* Raf., nom. illeg., *Persea persea* (L.)

Cockerell, nom. inval.

Árbol. Introducida. 1500-1800 m.

Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Persea fulva L.E. Kopp

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Persea lingue (Ruiz & Pav.) NeesSin.: *Laurus lingue* Ruiz & Pav., *Laurus linguy* Miers ex Bertero, *Nothaphoebe lingue* (Ruiz & Pav.) Baeza, *Nothaphoebe meyeniana* Baeza, *Persea intermedia* Phil., *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees var. *canescens* Nees, *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees var. *palustris* Nees, *Persea meyeniana* Nees

Árbol. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO,

MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Persea major (Meisn.) L.E. KoppSin.: *Persea pyriformis* Nees & Mart. ex Nees var. *betha* Nees

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Persea pyriformis Nees & Mart. ex Nees

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Persea venosa Nees & Mart.Sin.: *Persea hypoglauca* Nees & Mart. ex Nees

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Persea willdenovii Kosterm.Sin.: *Persea pyriformis* Nees & C. Mart., hom. illeg.

Árbol. Nativa. 1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rhodostemonodaphne Rohwer & Kubitzki**Rhodostemonodaphne macrocalyx**

(Meisn.) Rohwer ex Madriñán

Sin.: *Goepertia macrocalyx* Meisn.,*Ocotea macrocalyx* (Meisn.) Mez

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

LECYTHIDACEAE

Cariniana Casar.**Cariniana estrellensis** (Raddi) KuntzeSin.: *Cariniana excelsa* Casar. var.*puberula* Chodat & Hassl., *Cariniana**excelsa* Casar., *Couratari estrellensis*Raddi, *Couratari glaziovii* Taub. ex Glaz., nom. nud.

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN, CON).

Cariniana legalis (Mart.) KuntzeSin.: *Couratari legalis* Mart.

Árbol. Nativa.

Países: BRA

LENTIBULARIACEAE

Genlisea A. St.-Hil.**Genlisea aurea** A. St.-Hil.Sin.: *Genlisea minor* A. St.-Hil.,*Genlisea ornata* Mart. ex Benj.

Hierba. Nativa. 1300-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Genlisea repens Benj.Sin.: *Genlisea pulchella* Tutin, *Genlisea pusilla* Warm.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, SPE).

Pinguicula L.**Pinguicula antarctica** VahlSin.: *Pinguicula magellanica* Comm. ex Franch., *Pinguicula obtusa* Benj.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Pinguicula australandina Gluch

Hierba. Endémica. 1400-2300 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, ARA).

Pinguicula chilensis GaySin.: *Pinguicula antarctica* Donat, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Pinguicula nahuelbutensis Gluch

Hierba. Endémica. 1100-1300 m.

Países: CHL(ARA).

Utricularia L.**Utricularia breviscapa** C. Wright ex Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, CON).

Utricularia cucullata A. St.-Hil. & Girard

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Utricularia erectiflora A. St.-Hil. & GirardSin.: *Utricularia spicata* Sylvén

Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Utricularia foliosa L.Sin.: *Utricularia oligosperma* A. St.-Hil., *Utricularia oligosperma* A. St.-Hil. var. *beta* A. St.-Hil.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA). URY(ROC).

Utricularia gibba L.Sin.: *Utricularia gayana* A.DC., *Utricularia longirostris* Leconte ex Elliott, *Utricularia obtusa* Sw., *Utricularia pallens* A. St.-Hil. & Girard, *Utricularia tenuis* Cav. var. *poepigii* A. DC., *Utricularia tenuis* Cav.

Hierba acuática. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, MAU, BIO, ARA, LRI). PRY(APY, CEN, CON, COA, ITA, PHA). URY(COL, ROC).

Utricularia hydrocarpa Vahl

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Utricularia laxa A. St.-Hil. & GirardSin.: *Utricularia colorata* Benj., *Utricularia laxa* A. St.-Hil. & Girard var. *gaudichaudii* A. St.-Hil. & Girard

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, PAI). URY(RNO).

Utricularia myriocista A. St.-Hil. & Girard

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Utricularia nana A. St.-Hil. & Girard

Hierba acuática. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(Desconocida).

Utricularia nervosa G. Weber ex Benj.

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV).

Utricularia nigrescens Sylvén

Hierba acuática. Nativa. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Utricularia olivacea C. Wright ex Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(RGS).

Utricularia platensis Speg.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, RNE, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU). URY(CAS, COL, ROC).

Utricularia poconensis FrommSin.: *Utricularia luetzelburgii* Merl ex Luetzelb., nom. nud.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Utricularia praelonga A. St.-Hil. & GirardSin.: *Calpidisca lundii* (A. DC.)Moldenke, *Utricularia lundii* A.DC.,*Utricularia polyschista* Benj.

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Utricularia pusilla VahlSin.: *Utricularia leptantha* Benj.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, COA, MIE).

Utricularia reniformis A. St.-Hil.

Sin.: *Utricularia janthina* Hook.,
Utricularia maxima G. Weber ex Benj.
Hierba acuática. Nativa. 700-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Utricularia simulans Pilg.

Hierba acuática. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CON).

Utricularia subulata L.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(SPE). URY(CAS).

Utricularia tricolor A. St.-Hil.

Sin.: *Utricularia fontana* A. St.-Hil. &
Girard, *Utricularia globulariifolia* Mart.
ex Benj., *Utricularia monantha* Benj.
Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, COA, GUA,
SPE). URY(RIV).

Utricularia tridentata Sylvén

Sin.: *Utricularia ostenii* Hicken,
Utricularia rubra Larrañaga, *Utricularia
ternata* Sylvén
Hierba acuática. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). URY(CAS, MON, SJO).

Utricularia triloba Benj.

Sin.: *Utricularia nervosa* G. Weber ex
Benj. var. *capillaris* Benj.
Hierba acuática. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).
PRY(AMA, COA).

LILIACEAE

Lilium L.**Lilium regale** E.H. Wilson

Hierba. Introducida. 700-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

LINACEAE

Cliococca Bab.**Cliococca selaginoides** (Lam.) C.M.

Rogers & Mildner
Sin.: *Cliococca tenuifolia* Bab., *Linum
babingtonii* Planch., nom. superfl., *Linum
microphyllum* Larrañaga, nom. illeg.,
Linum selaginoides Lam. var. *chilense*
Planch., *Linum selaginoides* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
LPA, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI).
PRY(APY). URY(MON, ROC).

Linum L.**Linum bienne** Mill.

Sin.: *Linum angustifolium* Huds., *Linum
usitatissimum* L. subsp. *angustifolium*
(Huds.) Thell., *Linum usitatissimum* L.
subsp. *bienne* (Mill.) Thell.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS). CHL(ANT,
ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, RME).

Linum brevifolium A. St.-Hil. &

Naudin

Sin.: *Linum brevifolium* A. St.-Hil. &
Naudin f. *majus* Urb., *Linum brevifolium*
A. St.-Hil. & Naudin var. *squamifolium*
(Schiede) Urb., *Linum oligophyllum* Willd.
ex Schult. var. *squamifolium* Schiede
Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(RIV).

Linum burkartii Mildner

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).
URY(FLA).

Linum carneum A. St.-Hil.

Sin.: *Linum formosum* Urb.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI, FOR). BRA(RGS).
URY(COL, FLA).

Linum catharticum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Linum chamissonis Schiede

Sin.: *Linum aquilinum* Molina var.
grandiflorum Hook. & Arn., *Linum
oligophyllum* Hook. & Arn., hom. illeg.,
Linum macraei Benth. var. *cumingii* Urb.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Linum cremnophilum I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Linum erigeroides A. St.-Hil.

Sin.: *Linum littorale* A. St.-Hil. var.
corymbosum Urb.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI).
BRA(RGS). URY(Desconocida).

Linum littorale A. St.-Hil. var.
littorale

Sin.: *Linum junceum* A. St.-Hil.,
Linum littorale A. St.-Hil. var. *bahiense*
Urb., *Linum littorale* A. St.-Hil. var.
glandulosum A. St.-Hil., *Linum littorale*
A. St.-Hil. var. *glomeratum* Urb., *Linum
littorale* A. St.-Hil. var. *paniculatum* Urb.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(FLA, RIV).

Linum littorale A. St.-Hil. var.**oblongifolium** (Urb.) C.M. Rogers

Sin.: *Linum junceum* A. St.-Hil. var.
oblongifolium Urb.
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Linum macraei Benth. var. **macraei**

Sin.: *Linum aquilinum* Molina, *Linum
chironioides* Griseb., *Linum macraei*
Benth. var. *olygophyllum* (Hook. & Arn.)
Reiche, *Mesynium chilense* Raf.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME).

Linum macraei Benth. var.**marticorenae** Mildner

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO).

Linum prostratum Dombey ex Lam.

Sin.: *Linum paposanum* Phil.
Hierba. Nativa. 200-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Linum ramosissimum Gay

Sin.: *Linum chamissonis* Schiede
var. *obtusifolium* (Phil.) Reiche, *Linum
chamissonis* Schiede var. *ramosissimum*
(Gay) Reiche, *Linum obtusifolium* Phil.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ).

Linum scoparium Griseb.

Hierba. Nativa. 1000-1600 m.
Países: ARG(COR, TUC). URY(LAV, TYT).

Linum smithii Mildner

Hierba. Endémica. 1400-1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Linum usitatissimum L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ,
MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE,
TUC). CHL(ATA, VAL, BIO, ARA, JFE).
URY(MON).

LINDERNIACEAE

Lindernia All.**Lindernia dubia** (L.) Pennell

Sin.: *Gratiola anagallidea* Michx., *Capraria gratioides* L., nom. superfl., *Gratiola dubia* L., *Ilysanthes dubia* (L.) Barnhart var. *inundata* Pennell, *Ilysanthes dubia* (L.) Barnhart, *Ilysanthes gratioides* (L.) Benth., *Lindernia anagallidea* (Michx.) Pennell, *Lindernia dubia* (L.) Pennell var. *anagallidea* (Michx.) Cooperr., *Lindernia dubia* (L.) Pennell var. *inundata* (Pennell) Pennell

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, RME). PRY(ITA). URY(ART, DUR, ROC, SOR, TYT).

Lindernia rotundifolia (L.) Alston

Sin.: *Gratiola rotundifolia* L., *Lindernia microcalyx* Pennell & Stehlé

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Micranthemum Michx., nom. cons.**Micranthemum umbrosum** (J.F. Gmel.) S.F. Blake

Sin.: *Anonymos umbrosa* Walter, nom. inval., *Globifera umbrosa* J.F. Gmel., *Micranthemum emarginatum* Elliot, *Micranthemum orbiculatum* Michx. var. *emarginatum* (Elliot) Benth., *Micranthemum orbiculatum* Michx. var. *tweediei* (Benth.) J.A. Schmidt, *Micranthemum orbiculatum* Michx., nom. illeg., *Micranthemum tweediei* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ). URY(COL, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO, TYT).

Torenia L.**Torenia thouarsii** (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Sin.: *Lindernia thouarsii* (Cham. & Schltdl.) Edwin, *Nortenia thouarsii* Cham. & Schltdl., *Torenia nortenia* Steud.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

LOASACEAE

Blumenbachia Schrad., nom. cons.**Blumenbachia catharinensis** Urb. & Gilg

Hierba voluble. Endémica. 1300-1400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Blumenbachia dissecta (Hook. & Arn.) Weigend & J. Grau

Sin.: *Blumenbachia espigneira* Gay, *Caiophora dissecta* (Hook. & Arn.) Urb. & Gilg, *Caiophora espigneira* (Gay) Urb. & Gilg, *Caiophora kurtzii* Urb. & Gilg, *Caiophora patagonica* Urb. & Gilg, *Loasa dissecta* Hook. & Arn., *Loasa microcalyx* Phil., *Loasa patagonica* Speg., nom. illeg., *Loasa spegazzinii* Macloskie

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Blumenbachia eichleri Urb.

Sin.: *Blumenbachia aspera* (Vell.) Urb., *Caiophora eichleri* (Urb.) Urb. & Gilg, *Caiophora scabra* (Miers) Urb. & Gilg var. *schenkiana* (Urb.) Urb. & Gilg, *Mentzelia aspera* Vell., hom. illeg.

Hierba voluble. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Blumenbachia exalata Weigend

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Blumenbachia hieronymi Urb.

Sin.: *Blumenbachia multifida* Griseb., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 1900-2500 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Blumenbachia insignis Schrad.

Sin.: *Blumenbachia multifida* Ball, hom. illeg., *Blumenbachia multifida* Hook. f., *Blumenbachia palmata* (Spreng.) Cambess., *Blumenbachia parviflora* Gillies ex Hook., nom. nud., *Loasa muralis* Griseb., *Loasa palmata* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(COL, LAV, MON, ROC, SJO).

Blumenbachia latifolia Cambess.

Sin.: *Blumenbachia urens* (Vell.) Urb., *Loasa urens* Vell., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, GUA, MIE). URY(ART, COL, LAV, MAL, RNO).

Blumenbachia prietea Gay

Sin.: *Caiophora prietea* (Gay) Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Blumenbachia scabra (Miers) Urb.

Sin.: *Blumenbachia scabra* (Miers) Urb. var. *schenkiana* Urb., *Caiophora scabra* (Miers) Urb. & Gilg, *Gripidea asperata* Miers, *Gripidea scabra* Miers

Hierba voluble. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Blumenbachia silvestris Poepp.

Sin.: *Blumenbachia domeykoana* Phil., *Blumenbachia mitis* Phil., *Blumenbachia nemorosa* Phil., *Blumenbachia scandens* Meyen, *Blumenbachia silvestris* Poepp. var. *australis* Urb. & Gilg, *Blumenbachia silvestris* Poepp. var. *leptocarpa* Speg., *Caiophora scandens* Meyen & Klotzsch ex Walp. var. *orientalis* Urb. & Gilg ex Kuntze, *Caiophora scandens* Meyen & Klotzsch ex Walp., *Caiophora silvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg var. *leptocarpa* Urb. & Gilg, *Caiophora silvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Caiophora silvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Caiophora tomentosula* Urb. & Gilg, *Loasa ochagaviae* Phil., *Loasa scandens* Meyen, *Loasa volckmanni* Phil.

Hierba. Endémica. 500-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Caiophora C. Presl**Caiophora aconquijae** Sleumer

Hierba voluble. Endémica. 1500-3200 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Caiophora arechavaletae (Urb.) Urb. & Gilg

Sin.: *Blumenbachia arechavaletae* Urb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(MON).

Caiophora boliviana Urb. & Gilg

Hierba. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(SAL).

Caiophora canarinoides (Lenné & K. Koch) Urb. & Gilg

Sin.: *Caiophora macrophylla* Rusby, *Illairea canarinoides* Lenné & K. Koch, *Loasa canarinoides* (Lenné & K. Koch) Britton

Hierba. Nativa. 2900-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Caiophora cernua (Griseb.) Urb. & Gilg ex Kurtz

Sin.: *Blumenbachia cernua* Griseb., *Caiophora joergensenii* I.M. Johnst., *Caiophora saltensis* Urb. & Gilg
Hierba. Endémica. 900-2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Caiophora chuquitensis (Meyen) Urb. & Gilg

Sin.: *Blumenbachia chuquitensis* (Meyen) Hook. f., *Caiophora albiflora* (Griseb.) Urb. & Gilg, *Caiophora angustisecta* Urb. & Gilg, *Caiophora fiebrigii* Urb. & Gilg, *Caiophora heptamera* (Wedd.) Urb. & Gilg var. *albiflora* Griseb., *Caiophora heptamera* (Wedd.) Urb. & Gilg, *Caiophora horrida* Urb. & Gilg, *Caiophora lorentziana* Urb. & Gilg, *Caiophora macrocarpa* Urb. & Gilg, *Caiophora orbignyana* Urb. & Gilg, *Caiophora sphaerocarpa* Urb. & Gilg, *Caiophora superba* Phil., *Loasa chuquitensis* Griseb., hom. illeg., *Loasa chuquitensis* Meyen, *Loasa heptamera* Wedd. var. *albiflora* Griseb., *Loasa heptamera* Wedd.

Hierba o subarbusto. Nativa. 3000-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Caiophora cirsiifolia C. Presl

Sin.: *Blumenbachia sepiaria* Ruiz & Pav. ex G. Don, *Caiophora preslii* Urb. & Gilg, *Caiophora sepiaria* (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr.

Hierba voluble. Nativa. 3500 m
Países: CHL(AYP, TAR).

Caiophora clavata Urb. & Gilg

Sin.: *Blumenbachia contorta* Griseb., hom. illeg., *Caiophora tucumana* Urb. & Gilg
Hierba. Endémica. 1900-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Caiophora coronata (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn.

Sin.: *Blumenbachia coronata* (Gillies ex Arn.) Hieron., *Caiophora absinthiifolia* C.

Presl, *Caiophora pycnophylla* Urb. & Gilg, *Loasa coronata* Gillies ex Arn.

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Caiophora deserticola Weigend & M. Ackermann

Hierba o subarbusto. Nativa. 2900-3700 m.
Países: CHL(TAR).

Caiophora dumetorum Urb. & Gilg

Sin.: *Caiophora clavata* Urb. & Gilg var. *dumetorum* (Urb. & Gilg) Sleumer
Hierba voluble. Nativa. 2500-3700 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).

Caiophora hibiscifolia (Griseb.) Urb. & Gilg

Sin.: *Loasa hibiscifolia* Griseb.
Hierba. Nativa. 200-2700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Caiophora lateritia Klotzsch

Sin.: *Blumenbachia lateritia* (Hook.) Griseb., *Caiophora platyphylla* Urb. & Gilg, *Loasa coccinea* Loudon, nom. nud., *Loasa lateritia* Hook., nom. illeg., *Raphisanthe lateritia* (Hook.) Lilja
Hierba voluble. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, NEU, SAL, SDE, TUC).

Caiophora mollis (Griseb.) Urb. & Gilg

Sin.: *Caiophora heptamera* (Wedd.) Urb. & Gilg var. *mollis* Griseb., *Loasa heptamera* Wedd. var. *mollis* Griseb.
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

Caiophora nivalis Lillo

Hierba. Endémica. 2500-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Caiophora pulchella Urb. & Gilg

Sin.: *Loasa pulchella* (Urb. & Gilg) R.L. Pérez-Mor. & Crespo
Hierba. Endémica. 2200-3800 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Caiophora rosulata (Wedd.) Urb. & Gilg subsp. **rosulata**

Sin.: *Caiophora anemonoides* Urb. & Gilg, *Caiophora rahmeri* Phil., *Loasa rosulata* Wedd.
Hierba. Nativa. 3500-4300 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Caiophora rosulata (Wedd.) Urb. & Gilg subsp. **taraxacoides** (Killip) Weigend & M. Ackermann

Sin.: *Caiophora acanthoides* Urb. & Gilg, *Caiophora taraxacoides* Killip
Hierba. Nativa. 3600-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Caiophora sleumerii Slanis, Perea & A. Grau

Hierba. Endémica. 2700-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Caiophora spgazzinii Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 2500-3200 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Grausa Weigend & R.H. Acuña

Grausa gayana (Urb. & Gilg) Weigend & R. Acuña

Sin.: *Loasa gayana* Urb. & Gilg
Hierba voluble. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ARA, LRI, LLA).

Grausa lateritia (Gillies ex Arn.)

Weigend & R.H. Acuña
Sin.: *Blumenbachia acaulis* Phil., *Loasa acaulis* (Phil.) Urb. & Gilg, *Loasa lateritia* Gillies ex Arn.
Hierba. Endémica. 1300-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA).

Grausa martini (Phil.) Weigend & R.H. Acuña

Sin.: *Loasa martinii* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ARA, LRI, LLA).

Grausa micrantha (Poepp.) Weigend & R. Acuña

Sin.: *Loasa micrantha* Poepp., *Loasa remyi* Gay
Hierba. Endémica. 200-800 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Grausa sagittata (Hook. & Arn.)

Weigend & R. Acuña
Sin.: *Loasa sagittata* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Huidobria Gay

Huidobria chilensis Gay

Sin.: *Loasa chilensis* (Gay) Urb. & Gilg
Arbusto. Endémica. 0-1900 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Huidobria fruticosa Phil.

Sin.: *Loasa fruticosa* (Phil.) Urb. & Gilg
Arbusto. Endémica. 0-3700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Loasa Adans.**Loasa acanthifolia** Desr.

Sin.: *Loasa punicea* Phil.
Hierba. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA).

Loasa acerifolia Dombey ex Juss.

Sin.: *Loasa furcata* Phil., *Loasa solaniifolia* Gay, *Loasa williamsi* F. Phil.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ,
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Loasa argentina Urb. & Gilg

Sin.: *Loasa patagonica* Urb. & Gilg,
nom. nud., *Loasa pinnatifida* Gillies ex
Arn. var. *gracilis* Speg.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR). CHL(AIS, MAG).

Loasa arnottiana Gay

Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(COQ).

Loasa caespitosa Phil.

Hierba. Endémica. 2900-3500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Loasa elongata Hook. & Arn.

Sin.: *Loasa bertrandii* Phil., *Loasa urmenetae* Phil.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Loasa floribunda Hook. & Arn.

Sin.: *Loasa floribunda* Hook. & Arn.
var. *brachysepala* Urb. & Gilg
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Loasa heterophylla Hook. & Arn.

Sin.: *Loasa aphanantha* Urb. & Gilg,
Loasa barneoudii Gay, *Loasa elongata*
Phil., nom. nud., *Loasa insons* Poepp.
var. *prostrata* Poepp., *Loasa parviflora*
Phil., hom. illeg., *Loasa subandina* F. Phil.
Hierba. Endémica. 1700-2600 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,
MAU, RME).

Loasa humilis F. Phil.

Hierba. Endémica. 3000 m.
Países: CHL(MAU).

Loasa illapelina Phil.

Sin.: *Loasa illapelina* Phil. var. *laciniata*
(Phil.) Urb. & Gilg, *Loasa leucantha* Phil.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Loasa incurva Crespo & R.L. Pérez-Mor.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Loasa insons Poepp.

Sin.: *Loasa intricata* Gay, *Loasa meyeniana* Walp., *Loasa tricolor* Ker
Gawl. var. *insons* (Poepp.) Urb. & Gilg,
Loasa tricolor Ker Gawl. var. *mendocina*
Urb. & Gilg
Hierba. Endémica. 1200-2300 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,
LBO, MAU, RME).

Loasa longiseta Phil.

Subarbusto. Endémica. 200-2300 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Loasa mollensis Muñoz-Schick &

Trenquallye
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(VAL).

Loasa multifida Gay

Hierba. Endémica. 300-1100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Loasa nitida Desr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Loasa pallida Gillies ex Arn.

Sin.: *Loasa aldunatea* Gay
Subarbusto. Endémica. 1400-3200 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Loasa paradoxa Urb. & Gilg

Hierba. Endémica. 2900-3500 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Loasa placei Lindl.

Sin.: *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *placei*
(Lindl.) Urb. & Gilg
Hierba. Endémica. 300-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, RME).

Loasa prostrata Gillies ex Arn.

Sin.: *Loasa alba* D. Don, *Loasa prostrata*
Gillies ex Arn. var. *cumingii* Hook. & Arn.,
Loasa tricolor Ker Gawl. var. *prostrata* (Gillies
ex Arn.) Urb. & Gilg
Hierba. Endémica. 900-2500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Loasa sclareifolia Juss.

Sin.: *Loasa nemoralis* Phil., *Loasa sclareifolia* Juss. var. *brachycarpa* Urb. & Gilg, *Loasa sclareifolia* Juss. var. *inermis* Urb. & Gilg, *Loasa sclareifolia* Juss. var. *nemoralis* (Phil.) Urb. & Gilg
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ATA, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Loasa sigmoidea Urb. & Gilg

Sin.: *Loasa kurtzii* Urb. & Gilg
Hierba. Endémica. 2000-3300 m.
Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ,
VAL, MAU, RME).

Loasa tricolor Ker Gawl.

Sin.: *Loasa bryoniaefolia* Schrad. ex DC.,
Loasa heterophylla Hicken, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Loasa triloba Dombey ex Juss.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Mentzelia L.**Mentzelia albescens** (Gillies ex Arn.) Griseb.

Sin.: *Bartonia albescens* Gillies ex
Arn., *Bartonia sinuata* C. Presl, *Nuttallia
albescens* (Gillies ex Arn.) Standl.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA,
LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).
CHL(ATA, COQ, VAL, RME). URY(SOR).

Mentzelia aspera L.

Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, MEN, SAL, TUC).
PRY(APY).

Mentzelia bartonioides (C. Presl)

Urb. & Gilg
Sin.: *Acrolasia bartonioides* C. Presl,
Acrolasia bartonioides Gay, hom. illeg.,
Acrolasia pinnatifida Phil., *Acrolasia
solieri* Gay, *Mentzelia andina* I.M.
Johnst., hom. illeg., *Mentzelia andina*
Urb. & Gilg, *Mentzelia citrina* Urb.
& Gilg, *Mentzelia haenkei* A. Gray,
Mentzelia pinnatifida (Phil.) Urb. & Gilg,
Mentzelia pinnatifida Sleumer, hom.
illeg., *Mentzelia pinnatifida* (Phil.) Urb. &
Gilg var. *uniseriata* Hauman, *Mentzelia
solieri* (Gay) Urb. & Gilg ex Urb.
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
CHL(ATA, COQ).

Mentzelia parvifolia Urb. & Gilg ex Kurtz

Sin.: *Acolasia elata* Phil., *Mentzelia grisebachii* Urb. & Gilg, *Mentzelia jujuyensis* Sleumer, *Mentzelia parviflora* Monticelli, *Mentzelia parvifolia* Urb. & Gilg ex Kurtz var. *transiens* Sleumer
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Mentzelia scabra Kunth subsp. **atacamensis** (Urb. & Gilg) Weigend
Sin.: *Mentzelia chilensis* Gay var. *atacamensis* Urb. & Gilg
Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(AYP, ANT, COQ).

Mentzelia scabra Kunth subsp. **chilensis** (Gay) Weigend
Sin.: *Loasa ignea* Phil., *Mentzelia chilensis* Gay, *Mentzelia fendleriana* Urb. & Gilg, *Mentzelia ignea* (Phil.) Urb. & Gilg
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Mentzelia scabra Kunth subsp. **cordobensis** (Urb. & Gilg ex Kurtz) Weigend
Sin.: *Mentzelia chilensis* Griseb., hom. illeg., *Mentzelia cordobensis* Urb. & Gilg ex Kurtz
Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Nasa Weigend

Nasa urens (Jacq.) Weigend
Sin.: *Loasa urens* Jacq.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: CHL(ANT).

Pinnasa Weigend & R.H. Acuña

Pinnasa bergii (Hieron.) Weigend & R.H. Acuña
Sin.: *Loasa asterias* Dusén, *Loasa bergii* Hieron., *Loasa karraikensis* Macloskie, *Loasa petrophila* Urb., nom. nud., *Loasa urbanii* A. Soriano, *Scyphanthus stenocarpus* Hicken, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Pinnasa nana (Phil.) Weigend & R.H. Acuña
Sin.: *Loasa nana* Phil.
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, RME).

Pinnasa pinnatifida (Gillies ex Arn.) Weigend & R.H. Acuña
Sin.: *Loasa acutiloba* Urb. & Gilg, *Loasa bridgesii* Urb. & Gilg, *Loasa chillana* Urb. & Gilg, *Loasa filicifolia* Poepp., *Loasa pinnatifida* Gillies ex Arn., *Loasa poeppigiana* Urb. & Gilg, *Loasa tripartita* Urb. & Gilg
Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Pinnasa volubilis (Dombey ex Juss.) Weigend & R.H. Acuña
Sin.: *Loasa amabilis* Urb. & Gilg, *Loasa alpina* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Loasa artemisiifolia* Poepp. ex Urb. & Gilg, *Loasa volubilis* Dombey ex Juss., *Loasa volubilis* Dombey ex Juss. var. *alpina* Poepp.
Hierba. Endémica. 100-2600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Presliophytum (Urb. & Gilg) Weigend

Presliophytum malesherbioides (Phil.) R.H. Acuña & Weigend
Sin.: *Loasa malesherbioides* Phil.
Hierba. Endémica. 1400-3500 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

Presliophytum sessiliflorum (Phil.) R.H. Acuña & Weigend
Sin.: *Loasa sessiliflora* Phil.
Subarbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: CHL(ATA).

Scyphanthus Sweet

Scyphanthus elegans Sweet
Sin.: *Grammatocarpus cumingii* C. Presl, *Grammatocarpus volubilis* C. Presl, *Scyphanthus stenocarpus* (Poepp.) Urb. & Gilg
Hierba voluble. Endémica. 800-1600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

LOGANIACEAE

Spigelia L.

Spigelia andina Fern. Casas
Hierba. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Spigelia beccabungoides Kraenzl.
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Spigelia beyrichiana Cham. & Schltdl.
Sin.: *Spigelia dusenii* L.B. Sm.
Hierba o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Spigelia blanchetiana A. DC.
Sin.: *Spigelia blanchetiana* A. DC. var. *hatschbachii* L.B. Sm.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Spigelia caaguazuensis Kraenzl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

Spigelia catarinensis E.F. Guim. & Fontella
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).

Spigelia flemmingiana Cham. & Schltdl.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Spigelia hatschbachii Fern. Casas
Sin.: *Spigelia kleinii* L.B. Sm. var. *paranaensis* E.F. Guim. & Fontella
Hierba o subarbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).

Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl.
Sin.: *Spigelia australis* L.B. Sm., *Spigelia chamaedryoides* Kraenzl., *Spigelia humboldtiana* Cham. & Schltdl. var. *obtusifolia* Progel, *Spigelia humboldtiana* Cham. & Schltdl. var. *pubescens* Progel, *Spigelia intermedia* Arechav., *Spigelia rubelliana* Arechav., *Spigelia scabra* Cham. & Schltdl. var. *angustata* Progel, *Spigelia scabra* Cham. & Schltdl., *Spigelia uruguayana* Arechav.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, COA, GUA, PAI). URY(RIV, SJO, TAC).

Spigelia insignis Progel
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(MIE).

Spigelia kleinii L.B. Sm.

Hierba o subarbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

Spigelia martiana Cham. & Schltdl.

Sin.: *Spigelia riparia* L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, PAI). URY(ART, SJO, SOR, TYT).

Spigelia nicotianaeflora Chodat & Hassl.

Sin.: *Spigelia nicotianaeflora* Chodat & Hassl. var. *capibarensis* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(CAN).

Spigelia paraguariensis Chodat

Sin.: *Spigelia epilobioides* Kraenzl.,

Spigelia paraguariensis Chodat f.

subscandens Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, MIE, PAI).

Spigelia pusilla Mart.

Sin.: *Spigelia pauciflora* A. DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Spigelia ramosa L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(PAI).

Spigelia riedeliana (Progel) E.F. Guim. & Fontella

Sin.: *Spigelia blanchetiana* A. DC. var.

riedeliana Progel

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

Spigelia rojasiana Kraenzl.

Sin.: *Spigelia reitzii* L.B. Sm.

Hierba. Nativa. 2000-2500 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

Spigelia scabra Cham. & Schltdl.

Sin.: *Spigelia breviflora* (Chodat & Hassl.) Hurley ex Fern. Casas, *Spigelia humboldtiana* Cham. & Schltdl. var. *breviflora* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON).

Spigelia stenophylla Progel

Sin.: *Spigelia araucariensis* E.F. Guim. & Fontella

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, PAY, RNO, RIV, TAC).

Spigelia tetraptera Taub. emend. L.B. Sm.

Subarbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Spigelia valenzuelae Chodat & Hassl.

Sin.: *Spigelia valenzuelae* Chodat & Hassl. var. *major* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA).

Spigelia vestita L.B. Sm.

Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Strychnos L.**Strychnos brasiliensis** (Spreng.) Mart.

Sin.: *Geniostoma brasiliense* Spreng., *Strychnos niederleinii* Gilg, *Strychnos oligoneura* Gilg, *Strychnos sellowiana* Gilg

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CON, COA, GUA). URY(ART).

Strychnos fulvotomentosa Gilg

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Strychnos nigricans Progel

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Strychnos parvifolia A. DC.

Sin.: *Strychnos parvifolia* A. DC. var. *acutifolia* Hassl., nom. nud., *Strychnos parvifolia* A. DC. var. *rupestris* Hassl., nom. nud.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

Strychnos pseudoquina A. St.-Hil.

Sin.: *Strychnos pseudoquina* A. St.-Hil. var. *longiflora* Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Strychnos rubiginosa A. DC.

Liana. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Strychnos trinervis (Vell.) Mart.

Sin.: *Gardenia trinervis* Vell., *Strychnos blumenaviensis* Gilg

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

LORANTHACEAE

Desmaria Tiegh.**Desmaria mutabilis** (Poepp. & Endl.)

Tiegh. ex T. Durand & B.D. Jacks.

Sin.: *Loranthus mutabilis* Poepp. & Endl., *Phrygilanthus mutabilis* (Poepp. & Endl.) Eichl.

Arbusto parásito. Endémica. 0-1700 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Ligaria Tiegh.**Ligaria cuneifolia** (Ruiz & Pav.) Tiegh.

Sin.: *Ligaria coronata* Tiegh., *Ligaria emarginata* Tiegh., *Ligaria lanceolata* Tiegh., *Ligaria orbignyana* Tiegh., *Ligaria viscoides* (Poepp.) Tiegh., *Loranthus cuneifolius* Ruiz & Pav., *Loranthus montevidensis* Spreng., *Loranthus obmunitus* Spreng., *Loranthus viscoideus* Eichler, *Phrygilanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Psittacanthus coronatus* (Tiegh.) Engl., *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) Blume subsp. *coronatus* (Tiegh.) Engl., *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) Blume var. *flava* Abbiatti, *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) Blume, *Psittacanthus cuneifolius* (Ruiz & Pav.) G. Don, comb. superfl., *Psittacanthus hortonii* Standl. & F.A. Barkley, *Psittacanthus ninhidrinae* Capurro & Escudero

Arbusto parásito. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME). URY(CAS, COL, MAL, RNO, SAO, TAC, TYT).

Notanthera (DC.) G. Don**Notanthera heterophylla** (Ruiz & Pav.) G. Don

Sin.: *Loranthus buxifolius* Cham. & Schltdl., *Loranthus eschscholzianus* Mart. ex Schult. f., *Loranthus heterophyllus* Ruiz & Pav., *Loranthus valdivianus* Miq., *Phrygilanthus berteroi* (Hook. & Arn.) Eichler

Arbusto parásito. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

Psittacanthus Mart.

Psittacanthus cordatus (Hoffmanns. ex Schult. f.) Blume

Sin.: *Arthraxon cordatus* (Hoffmanns. ex Schult. f.) Tiegh., *Loranthus cordatus* Hoffmanns. ex Schult. f., *Psittacanthus cordatus* (Hoffmanns. ex Schult. f.) Blume f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Psittacanthus cordatus* (Hoffmanns. ex Schult. f.) G. Don, comb. superfl.

Parásita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CHO, PHA, SPE).

Psittacanthus dichroos (Mart.) Mart.

Sin.: *Loranthus dichroos* Mart.

Hierba hemiparásita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Struthanthus Mart., nom. cons.

Struthanthus acuminatus (Ruiz & Pav.) Blume

Sin.: *Loranthus acuminatus* Ruiz & Pav., *Notanthera acuminata* (Ruiz & Pav.) G. Don

Parásita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY, PHA).

Struthanthus martianus Dettke & Waechter

Sin.: *Struthanthus vulgaris* Mart. ex Eichler, nom. illeg.

Hierba hemiparásita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Struthanthus polyrrhizos (Mart. ex Roem. & Schult.) Mart. ex G. Don

Sin.: *Loranthus polyrrhizos* Mart. ex Roem. & Schult.

Hierba hemiparásita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Struthanthus sessiliflorus Kuijt

Parásita. Endémica. 400-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Struthanthus uraguensis (Hook. & Arn.) G. Don

Sin.: *Loranthus uraguensis* Hook. & Arn. var. *angustifolius* Griseb., *Loranthus uraguensis* Hook. & Arn. var. *complexus* Kuntze, *Loranthus uraguensis* Hook. & Arn., *Struthanthus angustifolius* (Griseb.) Hauman, *Struthanthus complexus* Eichler, *Struthanthus llanensis* Ruiz Leal, *Struthanthus rojasianus* Rizzini

Arbusto parásito. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON, PHA). URY(PAY, SAO, TYT).

Tripodanthus (Eichler) Tiegh.

Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh.

Sin.: *Loranthus acutifolius* Ruiz & Pav., *Loranthus eugenioides* Kunth, *Loranthus ligustrifolius* Willd. ex Roem. & Schult., *Phrygilanthus acutifolius* (Ruiz & Pav.) Eichler var. *eugenioides* (Kunth) Rizzini, *Phrygilanthus acutifolius* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Phrygilanthus eugenioides* (Kunth) Eichler, *Phrygilanthus repens* Pacz., *Tripodanthus eugenioides* (Kunth) Tiegh., *Tripodanthus ligustrinus* (Willd.) Tiegh., *Tripodanthus suaveolens* (Kunth) Tiegh.

Arbusto parásito. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY). URY(ART, DUR, RIV, ROC, TAC).

Tripodanthus flagellaris (Cham. & Schltdl.) Tiegh.

Sin.: *Loranthus flagellaris* Cham. & Schltdl., *Phrygilanthus flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Eichler, *Psittacanthus flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Mart.

Arbusto parásito. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, LRI, SDE, SLU). URY(RNO).

Tristerix Mart.

Tristerix aphyllus (Miers ex DC.) Barlow & Wiens

Sin.: *Loranthus aphyllus* Miers ex DC., *Loranthus cactorum* Hook. & Arn., *Loranthus pumilus* Miers ex Schult. f., *Phrygilanthus aphyllus* (Miers ex DC.) Eichler f. *luteus* Follmann, *Phrygilanthus aphyllus* (Miers ex DC.) Eichler

Arbusto parásito. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Tristerix corymbosus (L.) Kuijt

Sin.: *Froelichia violacea* Spreng., nom. superfl., *Lonicera corymbosa* L., *Loranthus corymbosus* (L.) Desr., *Loranthus tetrandus* Ruiz & Pav., *Loranthus utui* Molina, *Phrygilanthus tetrandus* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Scurrula umbellata* Raf., nom. superfl., *Tristerix*

tetrandrus (Ruiz & Pav.) Mart.

Arbusto parásito. Endémica. 0-2400 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE).

Tristerix verticillatus (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens

Sin.: *Loranthus poeppigii* DC., *Loranthus sternbergianus* Schult. f., *Loranthus verticillatus* Ruiz & Pav., *Metastachys verticillata* (Ruiz & Pav.) Tiegh., *Notanthera poeppigii* (DC.) G. Don, *Notanthera sternbergiana* (Schult. f.) G. Don, *Notanthera verticillata* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Phrygilanthus sternbergianus* (Schult. f.) Reiche, *Phrygilanthus verticillatus* (Ruiz & Pav.) Eichler var. *flava-citrina* Ruiz & Pav., *Phrygilanthus verticillatus* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Psittacanthus sternbergianus* (Schult. f.) Blume

Arbusto parásito. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

LYTHRACEAE

Adenaria Kunth

Adenaria floribunda Kunth

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). PRY(AMA, CON).

Ammannia L.

Ammannia auriculata Willd.

Sin.: *Ammannia arenaria* Kunth, *Ammannia auriculata* Willd. var. *arenaria* (Kunth) Koehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CON, PHA). URY(ART, SAO).

Ammannia coccinea Rottb.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(ERI). CHL(MAU).

Ammannia latifolia L.

Sin.: *Ammannia friesii* Koehne

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COS, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(MAU).

Ammannia robusta Heer & Regel
Sin.: *Ammannia coccinea* Rottb. subsp. *robusta* (Heer & Regel) Koehne
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA).

Cuphea P. Browne

Cuphea acinifolia A. St.-Hil.
Hierba o subarbusto. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cuphea aperta Koehne
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Cuphea bonplandii Lourteig
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(SCA). PRY(COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI).

Cuphea calophylla Cham. & Schltdl. subsp. **calophylla**
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, PAI).

Cuphea calophylla Cham. & Schltdl. subsp. **mesostemon** (Koehne) Lourteig
Sin.: *Cuphea mesostemon* Koehne, *Cuphea mesostemon* Koehne var. *missionera* Lourteig, *Cuphea mesostemon* Koehne var. *ovalifolia* Chodat, *Cuphea ovalifolia* (Chodat) Koehne
Hierba. Nativa. 0-2400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI).

Cuphea campylocentra Griseb.
Sin.: *Cuphea grata* Koehne
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(TYT).

Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.
Sin.: *Cuphea balsamona* Cham. & Schltdl., *Lythrum carthagenense* Jacq.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, RIV, TYT).

Cuphea confertiflora A. St.-Hil.
Sin.: *Cuphea tuberosiformis* Koehne ex Bacig.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA).

Cuphea cordata Ruiz & Pav.
Sin.: *Cuphea ianthina* Koehne
Subarbusto. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Cuphea corisperma Koehne subsp. **corisperma**
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CAU, CEN, GUA, MIE, PAI).

Cuphea corisperma Koehne subsp. **hexasperma** (Koehne) Duré & Molero
Sin.: *Cuphea hexasperma* Koehne
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

Cuphea fruticosa Spreng.
Sin.: *Cuphea bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn., *Cuphea commersoniana* (A. St.-Hil.) Koehne, *Cuphea glabra* Gillies ex Hook. & Arn., *Cuphea ligustrina* Cham. & Schltdl. var. *commersoniana* A. St.-Hil., *Cuphea ligustrina* Cham. & Schltdl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ITA). URY(COL, MON, PAY, RNO).

Cuphea glaziovii Koehne
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl.
Sin.: *Cuphea hyssopifolia* Kunth var. *brachyphylla* Griseb., *Cuphea thymoides* Griseb., hom. illeg.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CLA, COL, DUR, MAL, MON, PAY, ROC).

Cuphea hatschbachii Lourteig
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Cuphea hirsutissima Lourteig
Subarbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

Cuphea inaequalifolia Koehne
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Cuphea ingrata Cham. & Schltdl.
Sin.: *Cuphea obliqua* Bacig.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, MIS, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA). URY(CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC).

Cuphea laeviuscula Bacig.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE).

Cuphea linarioides Cham. & Schltdl.
Sin.: *Cuphea guelichii* Speg., *Lythrum calcaratum* Vell.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA, PAI).

Cuphea lindmaniana Koehne ex Bacig.
Hierba. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cuphea linifolia (A. St.-Hil.) Koehne
Sin.: *Cuphea ericoides* Cham. & Schltdl. var. *linifolia* A. St.-Hil.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS).

Cuphea lutescens Koehne
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cuphea lysimachioides Cham. & Schltdl.
Sin.: *Cuphea hassleri* Koehne, *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl. f. *brevipes* Koehne, *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl. var. *crassifolia* Chodat, *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl. var. *dubia* Koehne, *Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltdl. var. *villosa* Koehne
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV).

Cuphea melvilla Lindl.
Sin.: *Cuphea speciosa* (A. Anderson) Kuntze, *Melvilla speciosa* A. Anderson
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, ITA).

Cuphea micrantha Kunth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Cuphea niederleinii Koehne

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(ITA).

Cuphea origanifolia Cham. & Schltld.

Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).

Cuphea paranensis Bacig.

Hierba. Endémica. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Cuphea persistens Koehne

Sin.: *Cuphea persistens* Koehne var. *formosana* Lourteig
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CON, COA, SPE).

Cuphea polymorpha A. St.-Hil. var. **polymorpha**

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAN, CON, SPE).

Cuphea polymorpha A. St.-Hil. var. **vincoides** A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, CAU).

Cuphea pterosperma Koehne

Sin.: *Cuphea pterosperma* Koehne var. *cuneata* Koehne
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Cuphea punctulata Koehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(Desconocida).

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. var. **palustris** Lourteig

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SCR, SFE). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, FLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO).

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. var.

ramosior (Koehne) Duré & Molero
Sin.: *Cuphea correntina* Lourteig, *Cuphea hirticaulis* Koehne, *Cuphea origanifolia* Cham. & Schltld. var. *ramosior* Koehne, *Cuphea racemosa* (L. f.) Spreng. subsp. *hirticaulis* (Koehne) Lourteig
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. subsp. **longiflora** (Koehne) Duré & Molero

Sin.: *Cuphea longiflora* Koehne
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, CAA, CEN, COA, ITA, PAI).

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. subsp. **racemosa**

Sin.: *Cuphea obtusifolia* Koehne ex Bacig., *Cuphea origanifolia* Cham. & Schltld., *Cuphea racemosa* (L. f.) Spreng. var. *discolor* Lourteig, *Lythrum racemosum* L. f.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Cuphea reitzii Lourteig

Hierba. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(SCA).

Cuphea rusbyi Lourteig

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON).

Cuphea sessiliflora A. St.-Hil.

Sin.: *Cuphea costata* Koehne, *Cuphea rojasii* Koehne, *Cuphea talaverensis* Koehne
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, PHA, SPE).

Cuphea sessilifolia Mart.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN).

Cuphea stenopetala Koehne

Hierba. Endémica. 100-400 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, SPE).

Cuphea strigulosa Kunth

Sin.: *Cuphea fiebrigii* Koehne
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Cuphea thymoides Cham. & Schltld. var. **saturejoides** A. St.-Hil.

Sin.: *Cuphea chodatiana* Koehne, *Cuphea mesostemon* Koehne f. *angustifolia* Chodat, *Cuphea phoenix* Koehne
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE, PAI).

Cuphea thymoides Cham. & Schltld. var. **thymoides**

Sin.: *Cuphea thymoides* Cham. & Schltld. var. *argentina* A. St.-Hil., *Cuphea thymoides* Cham. & Schltld. var. *levis* A. St.-Hil., *Cuphea thymoides* Cham. & Schltld. var. *pseudoerica* A. St.-Hil.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cuphea tuberosa Cham. & Schltld.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, MIE). URY(MON, RIV, TAC, TYT).

Cuphea urbaniana Koehne var.

uleana (Koehne) Lourteig
Sin.: *Cuphea urbaniana* Koehne f. *uleana* Koehne
Hierba o subarbusto. Endémica. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cuphea urbaniana Koehne var. **urbaniana**

Sin.: *Cuphea carunculata* Koehne, *Cuphea dusenii* Koehne
Hierba o subarbusto. Nativa. 700-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cuphea varia Koehne ex Bacig.

Hierba. Nativa. 500-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, TAC).

Heimia Link & Otto**Heimia apetala** (Spreng.) S.A. Graham & Gandhi

Sin.: *Heimia myrtifolia* Cham. & Schltld., nom. illeg., *Lythrum apetalum* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA). URY(ART, CLA, MAL, ROC, TAC, TYT).

Heimia montana (Griseb.) Lillo
Sin.: *Heimia salicifolia* (Kunth) Link
var. *montana* (Griseb.) Koehne, *Nesaea salicifolia* Kunth var. *montana* Griseb.
Arbusto. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Heimia salicifolia (Kunth) Link
Sin.: *Nesaea salicifolia* Kunth
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, COL, FLA, MAL, RNO, ROC, TAC).

Lafoensia Vand.

Lafoensia nummularifolia A. St.-Hil.
Arbusto o arbolito. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Lafoensia pacari A. St.-Hil.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl.
Sin.: *Lafoensia pacari* A. St.-Hil. f. *angustifolia* Koehne, *Lafoensia pacari* A. St.-Hil. f. *latifolia* Koehne, *Lafoensia pacari* A. St.-Hil. subsp. *petiolata* Koehne, *Lafoensia pacari* A. St.-Hil. var. *campanulata* Koehne
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).

Lythrum L.

Lythrum hyssopifolium L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LPA, NEU, RNE, SFE, SJU). BRA(RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON).

Lythrum junceum Banks & Sol.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Lythrum maritimum Kunth
Sin.: *Lythrum albicaule* Bertero,
Lythrum campestre Griseb.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, VAL, RME, JFE). URY(CLA, MON).

Lythrum portula (L.) D.A. Webb
Sin.: *Peplis portula* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(ARA, LLA).

Lythrum salicaria L.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(CHU). CHL(LLA, RME).

Pleurophora D. Don

Pleurophora patagonica Speg.
Sin.: *Pleurophora lignosa* L.B. Sm.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Pleurophora polyandra Hook. & Arn.
Sin.: *Pleurophora polyandra* Hook. & Arn. f. *squarrosa* (Steud.) Koehne, *Pleurophora uncinata* Phil.
Hierba. Endémica. 200-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Pleurophora pungens D. Don
Sin.: *Pleurophora pungens* D. Don f. *imbricata* Koehne
Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Pleurophora pusilla Hook. & Arn.
Sin.: *Pleurophora pilosiuscula* Gay var. *glabra* Phil., *Pleurophora pusilla* Hook. & Arn. f. *vestita* Koehne
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Pleurophora saccocarpa Koehne
Sin.: *Pleurophora annulosa* Koehne, *Pleurophora saccocarpa* Koehne var. *fiebrigii* Koehne, *Pleurophora saccocarpa* Koehne var. *glabrescens* Koehne, *Pleurophora saccocarpa* Koehne var. *hirtella* Koehne, *Pleurophora saccocarpa* Koehne var. *velutina* Koehne
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CHO, CON, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Rotala L.

Rotala mexicana Cham. & Schltdl.
Sin.: *Hypobrichia spruceana* Benth., *Rotala apetala* F. Muell., *Rotala mexicana* Cham. & Schltdl. var. *apetala* (F. Muell.) Lourteig, *Rotala mexicana* Cham. & Schltdl. var. *spruceana* (Benth.) Koehne
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON, COA, PHA).

Rotala ramosior (L.) Koehne
Sin.: *Ammannia ramosior* L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, COA).

MAGNOLIACEAE

Magnolia L.

Magnolia ovata (A. St.-Hil.) Spreng.
Sin.: *Magnolia paranaensis* A. Vázquez, *Talauma ovata* A. St.-Hil.
Árbol. Nativa. 600-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

MALESHERBIACEAE

Malesherbia Ruiz & Pav.

Malesherbia auristipulata Ricardi
Subarbusto. Endémica. 1800-2100 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Malesherbia campanulata Ricardi
Hierba. Endémica. 3300-4000 m.
Países: CHL(COQ).

Malesherbia corallina M. Muñoz & R. Pinto
Subarbusto. Endémica. 2700-2800 m.
Países: CHL(TAR).

Malesherbia densiflora Phil.
Hierba. Endémica. 2500-3100 m.
Países: CHL(ATA).

Malesherbia deserticola Phil.
Sin.: *Malesherbia borchersi* Phil.
Subarbusto. Endémica. 3400-3500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Malesherbia fasciculata D. Don var. **fasciculata**

Sin.: *Gynopleura fascicula* (D. Don) Roem., *Malesherbia thyrsoides* Bertero ex Steud.
Subarbusto. Endémica. 400-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Malesherbia fasciculata D. Don var. **glandulosa** Ricardi

Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Malesherbia humilis Poepp. var. **gabrielae** (Ricardi) Gengler

Sin.: *Malesherbia gabrielae* Ricardi
Hierba. Endémica. 700-2600 m.
Países: CHL(COQ).

Malesherbia humilis Poepp. var. **humilis**

Sin.: *Gynopleura dilatata* Walp., *Gynopleura humilis* (D. Don) Roem., *Malesherbia dilatata* (Walp.) F. Phil., *Malesherbia humilis* D. Don, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Malesherbia humilis Poepp. var. **parviflora** (Phil.) Ricardi

Sin.: *Malesherbia multiflora* Ricardi, *Malesherbia parviflora* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2900 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Malesherbia humilis Poepp. var. **propinqua** (Gay) Ricardi

Sin.: *Malesherbia humilis* D. Don var. *propinqua* (Gay) Reiche, *Malesherbia propinqua* Gay
Hierba. Endémica. 600-2000 m.
Países: CHL(COQ).

Malesherbia humilis Poepp. var. **taltalina** (Ricardi) Gengler

Sin.: *Malesherbia taltalina* Ricardi
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT).

Malesherbia lactea Phil.

Sin.: *Malesherbia rosulata* Werderm.
Hierba. Endémica. 2500-3900 m.
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ANT, ATA).

Malesherbia lanceolata Ricardi

Hierba. Endémica. 2900-3300 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Malesherbia linearifolia (Cav.) Pers.

Sin.: *Gynopleura coronata* (D. Don) Roem., *Gynopleura linearifolia* Cav., *Malesherbia coronata* D. Don, *Malesherbia linearifolia* (Cav.) Poir., comb. superfl., *Malesherbia subalpina* Poepp. ex Walp.
Subarbusto. Endémica. 400-3200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Malesherbia lirana Gay var. **bracteata** (Phil.) Ricardi

Sin.: *Malesherbia bracteata* Phil.
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Malesherbia lirana Gay var. **lirana**

Sin.: *Malesherbia cuneata* Phil., *Malesherbia hieronymi* Harms, *Malesherbia incana* Werderm., *Malesherbia lirana* Gay var. *hieronymi* (Harms) Ricardi, *Malesherbia lirana* Gay var. *serpyllifolia* (Phil.) Reiche, *Malesherbia lirana* Gay var. *subtomentosa* Kuntze, *Malesherbia lirana* Gay var. *tomentosa* Kuntze, *Malesherbia serpyllifolia* Phil.
Hierba. Endémica. 3100-3700 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Malesherbia lirana Gay var. **subglabrifolia** Kuntze

Sin.: *Malesherbia mendocina* Sleumer
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Malesherbia obtusa Phil. var. **johnstonii** (Werderm.) Ricardi

Sin.: *Malesherbia johnstonii* Werderm.
Subarbusto. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(ATA).

Malesherbia obtusa Phil. var. **obtusa**

Sin.: *Malesherbia breviflora* Phil.
Subarbusto. Endémica. 500 m.
Países: CHL(ATA).

Malesherbia paniculata D. Don

Sin.: *Gynopleura coerulea* J. Presl, *Malesherbia linearifolia* (Cav.) Pers. var. *paniculata* (D. Don) Reiche
Subarbusto. Endémica. 400-2500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Malesherbia rugosa Gay var.

pseudopulverulenta Ricardi
Hierba. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(ATA).

Malesherbia rugosa Gay var. **rugosa**

Sin.: *Malesherbia brevipedunculata* Werderm., *Malesherbia foliosa* Phil., *Malesherbia glandulifera* Werderm., *Malesherbia oblongifolia* Phil., *Malesherbia ovata* Phil., *Malesherbia prolifera* Phil., *Malesherbia serrata* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: CHL(ATA).

Malesherbia tenuifolia D. Don

Sin.: *Gynopleura tenuifolia* (D. Don) Roem., *Malesherbia pulchra* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(TAR).

Malesherbia tocopillana Ricardi

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT).

MALPIGHIACEAE

Alicia W.R. Anderson**Alicia anisopetala** (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Hiraea anisopetala* A. Juss., *Hiraea macrocarpa* Chodat, *Mascagnia anisopetala* (A. Juss.) Griseb.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Amorimia W.R. Anderson**Amorimia exotropica** (Griseb.) W.R. Anderson

Sin.: *Mascagnia exotropica* Griseb.
Liana. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Aspicarpa Rich.**Aspicarpa pulchella** (Griseb.)

O'Donell & Lourteig
Sin.: *Aspicarpa sericea* (A. St.-Hil.) Nied., nom. illeg., *Camarea pulchella* Griseb., *Cryptolappa pulchella* (Griseb.) Kuntze var. *latifolia* Kuntze, *Cryptolappa pulchella* (Griseb.) Kuntze, *Gaudichaudia sericea* A. St.-Hil., *Janusia sericea* (A. St.-Hil.) A. Juss.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, SPE). URY(ART, CLA, RIV).

Aspicarpa salicifolia (Chodat) Nied.

Sin.: *Camarea salicifolia* Chodat, *Cryptolappa salicifolia* (Chodat) Kuntze, *Gaudichaudia salicifolia* (Chodat) Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(PAI).

Aspicarpa schininii W.R. Anderson

Sin.: *Aspicarpa lanata* (Chodat) Nied., nom. illeg., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl. var. *fiebrigii* (Chodat) Hassl., nom. superfl., *Camarea lanata* Chodat, *Cryptolappa lanata* (Chodat) Kuntze, *Gaudichaudia lanata* (Chodat) Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *fiebrigii* Chodat
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, PAI).

Aspicarpa sericea Griseb.

Sin.: *Aspicarpa argentea* (Griseb.) Nied. var. *robusta* (Chodat) Nied., *Aspicarpa argentea* (Griseb.) Nied. var. *sericea* (Griseb.) Nied., *Aspicarpa argentea* (Griseb.) Nied., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl. var. *sericea* (Griseb.) Hassl., nom. superfl., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl., nom. superfl., *Camarea robusta* Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *sericea* (Griseb.) Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Aspicarpa uruguayensis Nied.

Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: URY(TAC).

Banisteriopsis C.B. Rob.**Banisteriopsis acerosa** (Nied.) B. Gates

Sin.: *Banisteria acerosa* Nied.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Banisteriopsis adenopoda (A. Juss.)

B. Gates
Sin.: *Banisteria adenopoda* A. Juss.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis argyrophylla (A.

Juss.) B. Gates
Sin.: *Banisteria argyrophylla* A. Juss., *Banisteria nitens* Griseb.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) C.V. Morton

Sin.: *Banisteria caapi* Spruce ex Griseb., *Banisteria inebrians* (C.V. Morton) J.F. Macbr., *Banisteria quitensis* Nied., *Banisteriopsis inebrians* C.V. Morton, *Banisteriopsis quitensis* (Nied.) C.V. Morton
Enredadera. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Banisteriopsis campestris (A.

Juss.) Little
Sin.: *Banisteria campestris* A. Juss.
Arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis confusa B. Gates

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA, PAI).

Banisteriopsis ferruginea (Cav.) B.

Gates
Sin.: *Banisteria ferruginea* Cav., *Triopteris brasiliensis* Poir.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis laevifolia (A. Juss.) B.

Gates
Sin.: *Banisteria laevifolia* A. Juss.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.) B. Gates

Sin.: *Malpighia malifolia* Nees & Mart.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.

Sin.: *Banisteria acanthocarpa* A. Juss., *Banisteria argentea* (Kunth) Spreng., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *falcata* Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *sericea* Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *subrotunda* Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss., *Banisteria muricata* Cav., *Banisteriopsis argentea* (Kunth) C.B. Rob., *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donell & Lourteig var. *sericea* (Nied.) O'Donell & Lourteig, *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donell & Lourteig var. *subrotunda* (Nied.) O'Donell & Lourteig, *Heteropterys argentea* Kunth, *Heteropterys pirayuensis* Morong, *Banisteria illustris* (Rusby

Nied., *Banisteriopsis illustris* Rusby, *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.)

O'Donell & Lourteig
Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR). PRY(CAN, GUA, PAI).

Banisteriopsis nummifera (A. Juss.)

B. Gates
Sin.: *Banisteria nummifera* A. Juss.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis oxyclada (A. Juss.) B.

Gates
Sin.: *Banisteria oxyclada* A. Juss.
Liana. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Banisteriopsis paraguariensis B.

Gates
Enredadera. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Banisteriopsis parviflora (A. Juss.)

B. Gates
Sin.: *Banisteria parviflora* A. Juss.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Banisteriopsis pseudojanusia (Nied.)

B. Gates
Sin.: *Banisteria pseudojanusia* Nied.
Liana. Endémica. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Banisteriopsis pulchra B. Gates

Liana. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Banisteriopsis variabilis B. Gates

Arbolito. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Bunchosia Rich. ex Kunth

Bunchosia maritima (Vell.) J.F. Macbr.
Sin.: *Malpighia maritima* Vell.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Bunchosia pallescens Skottsb.

Sin.: *Bunchosia missionum* Eskuche
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, CON).

Bunchosia paraguariensis Nied.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Byrsonima Rich. ex Kunth

Byrsonima brachybotrya Nied.
Arbusto. Endémica. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Byrsonima coccolobifolia Kunth
Arbusto. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
Sin.: *Byrsonima crassifolia* (L.) Kunth f. *kunthiana* Nied., *Malpighia crassifolia* L.
Arbusto. Nativa. 200-900 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Byrsonima intermedia A. Juss.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Byrsonima ligustrifolia A. Juss.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Byrsonima myricifolia Griseb.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Byrsonima niedenzuiana Skottsbo.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Byrsonima paulista A. Juss.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Byrsonima psilandra Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON).

Byrsonima subterranea Brade & Markgr.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Byrsonima umbellata Mart. ex A. Juss.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Byrsonima verbascifolia (L.) DC.
Sin.: *Malpighia verbascifolia* L.
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Callaeum Small

Callaeum psilophyllum (A. Juss.) D.M. Johnson
Sin.: *Hiraea platyptera* Griseb., *Hiraea psilophylla* A. Juss., *Mascagnia pachyptera* Rusby, *Mascagnia psilophylla* (A. Juss.) Griseb.
Enredadera o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA). URY(ART, SAO, SOR).

Camarea A. St.-Hil.

Camarea affinis A. St.-Hil.
Sin.: *Aspicarpa affinis* (A. St.-Hil.) Hassl., *Gaudichaudia affinis* (A. St.-Hil.) Chodat
Arbolito. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Carolus W.R. Anderson

Carolus chlorocarpus (A. Juss.) W.R. Anderson
Sin.: *Heladena hassleriana* Nied., *Hiraea chlorocarpa* A. Juss., *Mascagnia chlorocarpa* (A. Juss.) Griseb.
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Christianella W.R. Anderson

Christianella multiglandulosa (Nied.) W.R. Anderson
Sin.: *Mascagnia multiglandulosa* Nied.
Arbusto o liana. Nativa. 0-800 m.
Países: PRY(AMA, SPE).

Cordobia Nied.

Cordobia argentea (Griseb.) Nied.
Sin.: *Cryptolappa argentea* (Griseb.) Kuntze, *Gaudichaudia argentea* (Griseb.) Chodat, *Janusia argentea* (Griseb.) Griseb., *Mionandra argentea* Griseb., *Peixotoa cordobensis* Kuntze
Enredadera. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

Dicella Griseb.

Dicella bracteosa (A. Juss.) Griseb.
Sin.: *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *holosericea* (A. Juss.) Nied., *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *subglabra* Nied., nom. superfl., *Dicella holosericea* A. Juss., *Dicella holosericea* A. Juss. var. *argentea* A. Juss.
Liana. Nativa. 100-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dicella nucifera Chodat

Sin.: *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *minutiflora* Chodat, *Dicella nucifera* Chodat f. *lancifolia* Nied., *Dicella nucifera* Chodat f. *ovatifolia* Nied., *Dicella tricarpa* Nied.
Liana. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Dinemagonum A. Juss.

Dinemagonum gayanum A. Juss.
Sin.: *Dinemagonum albicaule* Phil., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. f. *glanduloso-bracteolata* Nied., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. var. *parvifolium* Nied., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss., *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *albicaule* (Phil.) Reiche, *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *bridgesianum* (A. Juss.) Reiche, *Dinemagonum maculigerum* Phil.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-2600 m.
Países: CHL(TAR, ATA, COQ, VAL).

Dinemandra A. Juss.

Dinemandra ericoides A. Juss.
Sin.: *Dinemandra ericoides* A. Juss. var. *triandra* Nied., *Dinemandra glaberrima* A. Juss., *Dinemandra glauca* Baill., *Dinemandra ramosissima* Phil., *Dinemandra strigosa* Phil., *Dinemandra subaptera* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-2800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Diplopterys A. Juss.

Diplopterys lutea (Griseb.) W.R. Anderson & C. Davis
Sin.: *Banisteria hassleriana* Chodat, *Banisteria hispida* Nied., *Banisteria lutea* Griseb., *Banisteria nitrosiodora* Griseb.,

Banisteriopsis lutea (Griseb.) Cuatrec.,
Banisteriopsis nitrosiodora (Griseb.)
 O'Donell & Lourteig, *Jubistylis mollis*
 Rusby
 Enredadera. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
 BRA(Fuera del área del proyecto).
 PRY(CEN, CON, PAI).

Diplopterys pubipetala (A. Juss.)
 W.R. Anderson & C. Cav. Davis
 Sin.: *Banisteria pubipetala* A. Juss.,
Banisteria pubipetala A. Juss. f. *cordata*
 Nied., *Banisteriopsis pubipetala* (A. Juss.)
 Cuatrec.
 Arbusto o liana. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Gallardoa Hicken

Gallardoa fischeri Hicken
 Sin.: *Cordobia fischeri* (Hicken) Nied.
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SLU).

Galphimia Cav.

Galphimia amambayensis C.E.
 Anderson
 Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
 Países: PRY(AMA).

Galphimia australis Chodat
 Sin.: *Galphimia australis* Chodat
 f. *angustifolia* Chodat, *Galphimia*
brasiliensis (L.) A. Juss. f. *angustifolia*
 (Chodat) Nied., *Galphimia brasiliensis*
 (L.) A. Juss. var. *australis* (Chodat)
 Chodat, *Galphimia brasiliensis* (L.) A.
 Juss. var. *pubescens* A. Juss.
 Subarbusto. Nativa. 0-900 m.
 Países: ARG(COS, ERI, MIS).
 BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,
 AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, ITA,
 MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(PAY).

Galphimia platyphylla Chodat
 Sin.: *Galphimia brasiliensis* (L.) A.
 Juss. var. *platyphylla* (Chodat) Nied.,
Galphimia brasiliensis (L.) A. Juss. f.
platyphylla (Chodat) Nied.
 Subarbusto. Nativa. 300-400 m.
 Países: BRA(Fuera del área del
 proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN).

Heladena A. Juss.

Heladena multiflora (Hook. & Arn.) Nied.
 Sin.: *Bunchosia multiflora* Hook. & Arn.,
Heladena australis A. Juss., nom. superfl.,

Malpighiantha volubilis Rojas
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera
 del área del proyecto). PRY(CAU, CAN,
 GUA, PAI, SPE). URY(SAO).

Heteropterys Kunth, nom. cons.

Heteropterys aenea Griseb.
 Liana. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heteropterys amplexicaulis Morong
 Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).

Heteropterys argyrophaea A. Juss.
 Sin.: *Banisteria argyrophaea* (A. Juss.) C.V.
 Morton, *Clonodia biglandulosa* Chodat
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
 PRY(CAU, CON, COA, GUA, MIE, PAI).
 URY(SAO).

Heteropterys bicolor A. Juss.
 Sin.: *Heteropterys bicolor* A. Juss. var.
elliptica Nied., *Heteropterys bicolor* A.
 Juss. var. *major* A. Juss., *Heteropterys*
bicolor A. Juss. var. *lanceolata* Nied.
 Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
 PRY(APA).

Heteropterys byrsonimifolia A. Juss.
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Heteropterys chrysophylla (Lam.) DC.
 Sin.: *Banisteria chrysophylla* Lam.
 Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Heteropterys cochleosperma A. Juss.
 Sin.: *Heteropterys hassleriana* Nied. f.
acrobasis Nied., *Heteropterys hassleriana*
 Nied. f. *amblyobasis* Nied., *Heteropterys*
hassleriana Nied. var. *eglandulosa* Nied.,
Heteropterys hassleriana Nied. var.
glandulifera Nied., *Heteropterys hassleriana*
 Nied., *Heteropterys trichanthera* A. Juss.
 var. *cuyabensis* Nied.
 Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).
 PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA,
 PAI, SPE).

Heteropterys crenulata Mart. ex Griseb.
 Liana. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Heteropterys cultriformis Chodat
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(APY, CEN, CON, GUA).

Heteropterys dumetorum (Griseb.) Nied.
 Sin.: *Banisteria dumetorum* (Griseb.)
 C.V. Morton, *Heteropterys paraguariensis*
 Nied., *Heteropterys praecox* Nied.,
Mascagnia dumetorum Griseb.
 Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
 Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, LRI, SAL,
 SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY,
 CEN, GUA).

Heteropterys dusenii Nied.
 Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS).

Heteropterys glabra Hook. & Arn.
 Sin.: *Banisteria tenuis* Lindl.,
Heteropterys angustifolia Griseb. f.
angustissima Nied., *Heteropterys*
angustifolia Griseb. f. *lanceolata* Nied.,
Heteropterys angustifolia Griseb.,
Heteropterys lanceolata (Nied.) Herter,
Heteropterys pseudoangustifolia Chodat
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
 MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CEN, CON,
 COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
 URY(ART, RNO).

Heteropterys hypericifolia A. Juss.
 Sin.: *Heteropterys angustifolia* Griseb.
 f. *sinuata* Nied.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
 FOR, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(RGS).
 PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Heteropterys intermedia (A. Juss.)
 Griseb.
 Sin.: *Heteropterys aceroides* Griseb.,
Heteropterys diversifolia A. Juss.,
Heteropterys hiraoides A. Juss., nom.
 superfl., *Heteropterys laurifolia* Gardner,
 nom. illeg., *Heteropterys venosa* Griseb.,
Hiraea floribunda A. Juss., *Hiraea*
intermedia A. Juss.
 Liana. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
 SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA,
 PAI, SPE).

Heteropterys leschenaultiana A. Juss.
 Arbusto o liana. Nativa.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera
 del área del proyecto).

- Heteropterys microcarpa** Skottsbl.
Liana. Endémica. 400-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Heteropterys mollis** (Nied.) Nied.
Sin.: *Clonodia mollis* Nied.
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ).
- Heteropterys mulgurae** W.R. Anderson
Liana. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
- Heteropterys nervosa** A. Juss.
Sin.: *Banisteria nervosa* (A. Juss.) R.O. Williams
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(Desconocida).
- Heteropterys nitida** (Lam.) DC.
Sin.: *Banisteria nitida* Lam.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Heteropterys pauciflora** A. Juss.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Heteropterys pteropetala** A. Juss.
Sin.: *Heteropterys pteropetala* A. Juss. f. *orbicularis* Skottsbl.
Arbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).
- Heteropterys rhopalifolia** A. Juss.
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN).
- Heteropterys schulziana** W.R. Anderson
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL).
- Heteropterys sylvatica** A. Juss.
Sin.: *Clonodia tenuifolia* Nied., *Heteropterys tenuifolia* (Nied.) Nied.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).
- Heteropterys syringifolia** Griseb.
Sin.: *Heteropterys australis* A. Juss., *Heteropterys martiana* A. Juss.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CON, SPE).
- Heteropterys tomentosa** A. Juss.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, COA, PAI, SPE).
- Heteropterys umbellata** A. Juss.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, CON, ÑEE).
- Hiraea** Jacq.
- Hiraea cuneata** Griseb.
Enredadera. Nativa. 0-4500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Hiraea fagifolia** (DC.) A. Juss.
Sin.: *Banisteria fagifolia* DC., *Hiraea bahiensis* Moric. var. *paraguariensis* Nied., *Hiraea bahiensis* Moric., *Hiraea salzmänniana* A. Juss. var. *glandulifera* Chodat, hom. illeg., *Hiraea salzmänniana* A. Juss. var. *glandulifera* Griseb., *Hiraea salzmänniana* A. Juss.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
- Hiraea hatschbachii** C.E. Anderson
Liana. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Hiraea reitzii** C.E. Anderson
Liana. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Hiraea wiedeana** A. Juss.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Janusia** A. Juss.
- Janusia guaranítica** (A. St.-Hil.) A. Juss.
Sin.: *Aspicarpa guaranítica* (A. St.-Hil.) Hassl., *Gaudichaudia barbeyi* (Chodat) Chodat, *Gaudichaudia guaranítica* A. St.-Hil., *Janusia barbeyi* Chodat, *Janusia guaranítica* (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *cordifolia* Nied., nom. superfl., *Janusia guaranítica* (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *glabrata* Nied., *Janusia guaranítica* (A. St.-Hil.) A. Juss. var. *barbeyi* (Chodat) Kuntze, *Janusia proluxa* Arechav.
Enredadera. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(LAV, MAL).
- Janusia linearifolia** (A. St.-Hil.) A. Juss.
Sin.: *Aspicarpa linearifolia* (A. St.-Hil.) Nied., *Camarea juncea* Griseb., *Gaudichaudia linearifolia* A. St.-Hil., *Peregrina linearifolia* (A. St.-Hil.) W.R. Anderson
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).
- Janusia mediterranea** (Vell.) W.R. Anderson
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).
- Janusia occhionii** W.R. Anderson
Liana. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).
- Mascagnia** (Bertero ex DC.) Colla
- Mascagnia australis** C.E. Anderson
Sin.: *Hiraea sepium* A. Juss. var. *nitens* S. Moore, *Mascagnia cordifolia* (A. Juss.) Griseb. var. *holosericea* Skottsbl., *Mascagnia sepium* (A. Juss.) Griseb. var. *mediterranea* Nied., nom. superfl.
Liana. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(CEN, COA, PAI).
- Mascagnia brevifolia** Griseb.
Sin.: *Hiraea brevifolia* (Griseb.) Niederl., *Mascagnia brevifolia* Griseb. var. *malmeana* (Skottsbl.) Nied., *Mascagnia brevifolia* Griseb. var. *paniculata* Nied., *Mascagnia laurifolia* Nied., *Mascagnia malmeana* Skottsbl.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY, CON, PHA).
- Mascagnia divaricata** (Kunth) Nied.
Sin.: *Hiraea divaricata* Kunth, *Hiraea elegans* A. Juss., *Hiraea pulcherrima* Morong, *Mascagnia elegans* (A. Juss.) Griseb., *Mascagnia ixiamensis* Rusby, *Mascagnia pulcherrima* (Morong) Skottsbl.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
- Mascagnia sepium** (A. Juss.) Griseb.
Sin.: *Hiraea sepium* A. Juss.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mionandra Griseb.**Mionandra camareoides** Griseb.

Sin.: *Brittonella pilosa* Rusby,
Mionandra camareoides Griseb. f.
prostrata Nied.

Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA,
SAL, SDE, SLU, TUC).

Mionandra paraguariensis Chodat

Sin.: *Mionandra camareoides* Griseb.
var. *paraguariensis* Nied.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Niedenzuella W.R. Anderson**Niedenzuella acutifolia** (Cav.) W.R. Anderson

Sin.: *Tetrapteryx acutifolia* Cav.
Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Niedenzuella lucida (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Hiraea multiflora* Griseb.,
Tetrapteryx lucida A. Juss., *Tetrapteryx*
multiflora (Griseb.) A. Juss.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Niedenzuella multiglandulosa (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Tetrapteryx multiglandulosa* A. Juss.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA).

Niedenzuella sericea (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Hiraea laurifolia* A. Juss., *Hiraea*
sericea A. Juss., *Tetrapteryx chalcophylla*
A. Juss., *Tetrapteryx glandulosa* Griseb.,
Tetrapteryx laurifolia (A. Juss.) Griseb.,
Tetrapteryx ligustrifolia Nied., nom. illeg.,
Tetrapteryx sericea (A. Juss.) A. Juss.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(ITA).

Niedenzuella stannea (Griseb.) W.R. Anderson

Sin.: *Heteropteryx stannea* Griseb.,
Mascagnia sericans Nied., *Mascagnia*
stannea (Griseb.) Nied.
Liana. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Niedenzuella suaveolens (A. Juss.)

W.R. Anderson
Sin.: *Tetrapteryx suaveolens* A. Juss.
Liana. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(COA).

Peixotoa A. Juss.**Peixotoa catarinensis** C.E. Anderson

Arbusto. Endémica. 100 m.
Países: BRA(SCA).

Peixotoa floribunda C.E. Anderson

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Peixotoa jussieuana A. Juss.

Sin.: *Peixotoa jussieuana* A. Juss. var.
velutina Nied.
Arbusto o liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Peixotoa parviflora A. Juss.

Sin.: *Peixotoa discolor* Griseb.
Arbusto o liana. Nativa. 700-800 m.
Países: BRA(PAR).

Peixotoa reticulata Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA,
CAU, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

Ptilochaeta Turcz., nom. cons.**Ptilochaeta densiflora** Nied.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY).

Ptilochaeta nudipes Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

Stigmaphyllon A. Juss.**Stigmaphyllon arenicola** C.E.

Anderson
Sin.: *Stigmaphyllon martianum* A. Juss.
var. *variabile* Nied.
Liana. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR).

Stigmaphyllon bonariense (Hook. & Arn.) C. E. Anderson

Sin.: *Banisteria bonariensis* Hook.
& Arn., *Stigmaphyllon heterophyllum*

Hook., *Stigmaphyllon littorale* A. Juss.,
Stigmaphyllon littorale A. Juss. var.
trilobum Nied.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, APA, ITA, MIE, ÑEE).
URY(COL, MON, RNO).

Stigmaphyllon calcaratum N.E. Br.

Sin.: *Stigmaphyllon hasslerianum* Nied.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
SFE). BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, CEN, CON, PHA).

Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A. Juss.

Sin.: *Banisteria ciliata* Lam.
Liana. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(MON).

Stigmaphyllon jatrophifolium A. Juss.

Sin.: *Stigmaphyllon jatrophifolium* A.
Juss. f. *gracile* Nied.
Liana. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY,
CAU, CAA, CON, COA, GUA, ITA, MIE,
PAI, PHA, SPE). URY(MON, SAO).

Stigmaphyllon tomentosum A. Juss.

Liana. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tetrapteryx Cav., nom. cons.**Tetrapteryx ambigua** (A. Juss.) Nied.

Sin.: *Hiraea ambigua* A. Juss.,
Mascagnia ambigua (A. Juss.) Griseb. f.
paraguayensis (Nied.) Nied., *Mascagnia*
ambigua (A. Juss.) Griseb., *Mascagnia*
paraguayensis Nied., *Tetrapteryx ambigua*
(A. Juss.) Nied. var. *paraguayensis*
(Nied.) Nied., *Tetrapteryx paraguariensis*
Nied., *Tetrapteryx pilifera* S. Moore
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, SPE).

Tetrapteryx crispa A. Juss.

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Tetrapteryx hassleriana Nied.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Tetrapterys jussieuana Nied.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Tetrapterys mollis Griseb.Sin.: *Tetrapterys cinerea* Griseb.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Tetrapterys mucronata Cav.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.Sin.: *Malpighia phlomoides* Spreng.

Enredadera. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Tetrapterys salicifolia (A. Juss.) Nied.Sin.: *Hiraea salicifolia* A. Juss.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(GUA).

Tetrapterys xylosteifolia A. Juss.

Enredadera. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Thryallis Mart., nom. cons.**Thryallis brachystachys** Lindl.Sin.: *Hemsleya brachystachys* (Lindl.)Kuntze, *Thryallis brachystachys* Lindl. var.*obtusa* Nied., *Thryallis latifolia* Mart. var.*ovatifolia* (Nied.) Nied., *Thryallis ovatifolia*Nied., *Thryallis rotundifolia* A. Gray

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CON).

Thryallis laburnum S. MooreSin.: *Thryallis brachystachys* Lindl. var.*acuminata* Nied., nom. superfl., *Thryallis**laburnum* S. Moore var. *minor* S. Moore,*Thryallis latifolia* Mart. f. *laburnum* (S.

Moore) Nied.

Arbusto o liana. Nativa. 100-300 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Tricomaria Hook. & Arn.**Tricomaria usillo** Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

MALVACEAE

Abutilon Mill.**Abutilon affine** (Spreng.) G. DonSin.: *Abutilon rivulare* A. St.-Hil., *Sida affinis* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(MAL, ROC, TAC).

Abutilon costicalyx K. Schum. ex

Takeuchi & G.L. Esteves

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Abutilon grandifolium (Willd.) SweetSin.: *Abutilon arnottianum* (Hook. & Arn.) Walp., *Abutilon molle* (Ortega)Sweet, *Abutilon sordidum* K. Schum.,*Sida arnottiana* Gillies ex Hook. &Arn., *Sida grandifolia* Willd., *Sida mollis*

Ortega, hom. illeg.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ANT). PRY(PAI, PHA). URY(MAL, MON, TAC).

Abutilon herzogianum R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(SAL). PRY(APY).

Abutilon malachroides A. St.-Hil. &

Naudin

Sin.: *Abutilon flueckigerianum* K.Schum., *Abutilon tacuarembense*

Arechav.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS). URY(MON, RIV).

Abutilon megapotamicum (Spreng.)

A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Abutilon inflatum* Garcke & K.Schum., *Sida megapotamica* Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Abutilon ramiflorum A. St.-Hil.Sin.: *Sida ramiflora* (A. St.-Hil.) D.Dietr., *Wissadula hassleriana* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(CAA, CEN, COA, PAI).

Abutilon terminale (Cav.) A. St.-Hil.Sin.: *Sida terminalis* Cav.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SFE, SLU). BRA(RGS). URY(FLA, LAV, MAL, RIV).

Abutilon thyrsoendron Griseb.Sin.: *Abutilon lilloi* Hassl.

Arbusto. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Abutilon umbelliflorum A. St.-Hil.Sin.: *Abutilon umbelliflorum* A. St.-Hil.subsp. *occidentale* R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA). URY(ROC, TAC).

Abutilon vexillarium E. Morren

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Acaulimalva Krapov.**Acaulimalva nubigena** (Walp.) Krapov.Sin.: *Malva nubigena* Walp., *Malva paranassiiifolia* (Hook.) Wedd. var.*lobulata* Wedd., *Malvastrum buchtienii*Pax, *Malvastrum fiebrigii* Ulbr.,*Malvastrum nubigena* (Walp.) Bakerf., *Malvastrum nubigena* (Walp.)Baker f. var. *bipinnatifidum* R.E. Fr.,*Malvastrum parnassiaefolium* (Hook.) A.Gray var. *lobulata* Wedd., *Malvastrum**tuberculatum* A. W. Hill, *Malveopsis**acaulis* (Cav.) Kuntze var. *boliviensis*Kuntze, *Nototriche incisa* Turcz, *Sida**nubigena* Walp., *Sida parnassiaefolia*Hook. var. *lobulata* (Wedd.) Griseb.,

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Alcea L.**Alcea rosea** L.

Hierba. Introducida. 1500 m.

Países: ARG(SJU).

Andeimalva J.A. Tate**Andeimalva chilensis** (Gay) J.A. TateSin.: *Malacothamnus chilensis* (Gay)Krapov., *Sphaeralcea capitata* Phil.,*Sphaeralcea chilensis* Gay, *Sphaeralcea**glabrata* Phil., *Sphaeralcea grandifolia*

Phil., *Sphaeralcea peteroana* Phil., *Sphaeralcea viridis* Phil., *Sphaeroma chilense* (Gay) Kuntze, *Sphaeroma glabratum* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 300-3000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Anoda Cav.

Anoda cristata (L.) Schltldl.

Sin.: *Anoda brachyantha* Rchb., *Anoda cristata* (L.) Schltldl. var. *brachyantha* (Rchb.) Hochr., *Anoda fernandeziana* Steud., *Sida populifolia* Phil., *Sida cristata* L.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).
BRA(RGS). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).
URY(MON).

Anoda hastata Cav.

Sin.: *Anoda acerifolia* (Zuccagni) DC., hom. illeg., *Anoda acerifolia* Cav., *Anoda zuccagnii* (Spreng.) Fryxell, *Sida acerifolia* Zuccagni, hom. illeg., *Sida zuccagnii* Spreng.

Hierba. Nativa. 400-2500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC). CHL(TAR).

Ayenia L.

Ayenia acalyphifolia Griseb.

Sin.: *Lorentzia saltenia* Hieron.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(SAL, SDE, TUC).
PRY(APY).

Ayenia aprica Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(AMA, CAU, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(TAC).

Ayenia cordobensis (Hieron.) Hieron.

Sin.: *Lorentzia cordobensis* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SDE, SJU, SLU).

Ayenia eliae Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 400-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).
PRY(APY, PHA).

Ayenia krapovickasii Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Ayenia lingulata Griseb.

Sin.: *Lorentzia saltenia* Hieron. var. *angustifolia* Hieron.
Subarbusto. Endémica. 700-1600 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Ayenia magna L.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Ayenia mansfeldiana (Herter) Herter ex Cristóbal

Sin.: *Ayenia ekmanii* Cristóbal, *Ayenia pusilla* L. var. *glabra* K. Schum., *Tragia mansfeldiana* Herter
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(CEN, CON, COA, PAI, SPE). URY(ART, MON, RIV, SAO, TAC).

Ayenia nummularia Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(APA, AMA).

Ayenia odonellii Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 100-800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, AMA, CON, COA, PHA, SPE).

Ayenia praecipua Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, GUA, ITA).

Ayenia spinulosa R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Ayenia subtilis Cristóbal

Arbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: ARG(SAL).

Ayenia tomentosa L.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Bastardia Kunth

Bastardia bivalvis (Cav.) Kunth ex Griseb.

Sin.: *Bastardia rojasii* Hassl. var. *argentina* Hassl., nom. nud., *Sida bivalvis* Cav.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY).

Bastardia viscosa (L.) Kunth

Sin.: *Sida viscosa* L.
Subarbusto. Nativa. 100-700 m.
Países: ARG(SAL). PRY(APY).

Bastardiopsis (K. Schum.) Hassl.

Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl.

Sin.: *Abutilon densiflorum* (Hook. & Arn.) Walp., *Bastardia densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl. var. *paraguariensis* Hassl., *Bastardia densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl., *Bastardiopsis densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl. var. *paraguariensis* (Hassl.) Hassl., *Sida densiflora* Hook. & Arn.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CAA, CEN, GUA, ITA, PAI).

Bordasia Krapov.

Bordasia bicornis Krapov.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(APY).

Briquetia Hochr.

Briquetia denudata (Nees & Mart.) Chodat & Hassl.

Sin.: *Anoda denudata* (Nees & Mart.) K. Schum., *Briquetia ancyclocarpa* Hochr., *Sida bihamata* A. St.-Hil. & Naudin, *Sida denudata* Nees & Mart., *Wissadula balansae* Baker f.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAA, CAN, GUA, PHA).

Byttneria Loefl., nom. cons.

Byttneria acalyphifolia (Griseb.) Ariza

Sin.: *Argythamnia acalyphifolia* (Griseb.) Kuntze, *Byttneria hirsuta* Ruiz & Pav. var. *parvifolia* Kuntze, *Byttneria tucumanensis* Cristóbal, *Caperonia acalyphifolia* Griseb.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, SAL, TUC).

Byttneria australis A. St.-Hil.

Sin.: *Solanum brevipes* Dunal
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Byttneria catalpifolia Jacq. subsp. **sidifolia** (A. St.-Hil.) Cristóbal

Sin.: *Byttneria sidifolia* A. St.-Hil.
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
 PRY(APA, AMA, CAU, CEN, GUA).

Byttneria dentata Pohl

Sin.: *Ayenia echinococca* K. Schum.
 ex Kuntze, *Byttneria campicola* Taub.,
Byttneria hassleri K. Schum.
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Byttneria divaricata Benth. var.

guaranitica K. Schum. & Hassl.
 Sin.: *Byttneria arborescens* K. Schum.
 ex R.E. Fr.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON, SPE).

Byttneria filipes Mart. ex K. Schum.

Sin.: *Byttneria filipes* Mart. ex K. Schum.
 f. *spinis-majoribus* Chodat & Hassl., *Byttneria filipes* Mart. ex K. Schum.
 var. *puberula* Hassl., *Byttneria paraguayensis* (Britton) Chodat,
Chaetaea paraguayensis Britton
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, MIE, PHA).

Byttneria gracilipes Decne. ex Baill.

Sin.: *Byttneria urticifolia* K. Schum. f. *transiens* Ekman, nom. nud., *Byttneria urticifolia* K. Schum. var. *transiens* Hassl., nom. nud.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, GUA).

Byttneria hatschbachii Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 300-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Byttneria implacabilis Cristóbal

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Byttneria oblongata Pohl

Sin.: *Byttneria scalpellata* Pohl var. *glabrescens* Hassl.
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Byttneria oranensis Cristóbal

Liana. Nativa. 500-600 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL).

Byttneria ostenii Cristóbal

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS). PRY(COA, PAI).

Byttneria palustris Cristóbal

Arbusto. Nativa. 100-500 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Byttneria pedersenii Cristóbal

Sin.: *Byttneria scalpellata* Pohl f. *glabra* (Ekman) Hassl., *Byttneria scalpellata* Pohl f. *scabra* (Ekman) Hassl., *Byttneria scalpellata* Pohl subsp. *rigida* Ekman
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
 PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CON, GUA, ITA, MIE).

Byttneria ramosissima Pohl

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Byttneria rhamnifolia Benth.

Sin.: *Byttneria campestris* S. Moore,
Byttneria charagmocarpa S. Moore
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(ÑEE).

Byttneria rojasii Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, CAA, ITA, SPE).

Byttneria scabra L.

Sin.: *Byttneria scabra* L. var. *dentata* A. St.-Hil., *Byttneria scabra* L. var. *serrata* K. Schum.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RNO, SAO, SJO, SOR).

Byttneria stenophylla Cristóbal

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Byttneria subsessilis Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto).
 PRY(APA, AMA, CAU, CAN, SPE).

Byttneria triadenia Cristóbal

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Byttneria urticifolia K. Schum.

Sin.: *Byttneria urticifolia* K. Schum.
 var. *genuina* Arechav., nom. inval.,
Byttneria urticifolia K. Schum. var. *subglabra* Arechav.
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE).
 BRA(RGS). PRY(CAN, GUA, PAI). URY(CLA, COL, LAV, MAL, SJO, TAC, TYT).

Callianthe Donnell**Callianthe amoena** (K. Schum.)

Donnell
 Sin.: *Abutilon amoenum* K. Schum.,
Abutilon eriocarpum Speg. ex Stuck.,
 nom. nud.
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
 PRY(ITA).

Callianthe bedfordiana (Hook.)

Donnell
 Sin.: *Abutilon bedfordianum* A. St.-Hil.
 & Naudin subsp. *discolor* (K. Schum.)
 R.E. Fr., *Abutilon bedfordianum* A. St.-
 Hil. & Naudin var. *discolor* K. Schum.
 Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Callianthe cyclonervosa (Hochr.)

Donnell
 Sin.: *Abutilon bakeri* Rusby, hom. illeg.,
Abutilon cyclonervosum Hochr.
 Arbusto. Nativa. 500-2000 m.
 Países: ARG(SAL).

Callianthe darwinii (Hook. f.) Donnell

Sin.: *Abutilon darwinii* Hook. f.
 Arbusto. Endémica.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Callianthe fluviatilis (Vell.) Donnell

Sin.: *Abutilon fluviatile* (Vell.) K.
 Schum., *Sida fluviatilis* Vell.
 Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Callianthe jujuiensis (Hassl.) Donnell
Sin.: *Abutilon jujuyense* Hassl.
Arbusto. Nativa. 800-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Callianthe muelleri-friderici (Gürke & K. Schum.) Donnell
Sin.: *Abutilon muelleri-friderici* Gürke & K. Schum.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Callianthe nivea (Griseb.) Dorr
Sin.: *Abutilon niveum* Griseb.
Arbusto. Nativa. 200-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Callianthe pauciflora (A. St.-Hil.) Dorr
Sin.: *Abutilon pauciflorum* A. St.-Hil., *Abutilon pauciflorum* A. St.-Hil. var. *canotomentosum* Hassl., *Abutilon pauciflorum* A. St.-Hil. f. *longe-corniculatum* Hassl., *Abutilon rugosulum* Hochr. ex Chodat & Hassl., *Abutilon melanocarpum* A. St.-Hil. & Naudin
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ROC).

Callianthe picta (Gillies ex Hook. & Arn.) Donnell
Sin.: *Abutilon pictum* (Hook. & Arn.) Walp., *Abutilon striatum* Dicks. ex Lindl. f. *palmatifidum* Ekman, *Sida picta* Hook. & Arn.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(COA). URY(ART, CAS, SAO).

Callianthe rufinerva (A. St.-Hil.) Donnell
Sin.: *Abutilon rufinerve* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Callianthe sellowiana (Klotzsch) Donnell
Sin.: *Abutilon sellowianum* (Klotzsch) Regel, *Sida sellowiana* Klotzsch
Arbusto. Nativa. 700-800 m.
Países: BRA(SCA).

Callianthe striata (Dicks. ex Lindl.) Donnell
Sin.: *Abutilon striatum* Dicks. ex Lindl.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Calyculogygas Krapov.

Calyculogygas serrana Grings
Arbusto o liana. Endémica. 300-500 m.
Países: BRA(RGS).

Calyculogygas uruguayensis Krapov.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA). URY(CAS, LAV, SJO).

Calyptraemalva Krapov.

Calyptraemalva catharinensis Krapov.
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(SCA).

Ceiba Mill.

Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna
Sin.: *Chorisia chodatii* Hassl., *Chorisia insignis* Kunth var. *chodatii* (Hassl.) Hassl.
Árbol. Nativa. 400-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CEN, PHA).

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **glabriflora** Hassl.
Sin.: *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K. Schum. f. *transiens* Hassl.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **pubiflora**
Sin.: *Ceiba fiebrigii* Hochr., *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K. Schum. f. *coetanea* Hassl., *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K. Schum. f. *praecox* Hassl., *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Chorisia pubiflora* (A. St.-Hil.) G. Dawson, *Eriodendron pubiflorum* A. St.-Hil.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(COA, GUA, PAI, SPE).

Ceiba samauma (Mart.) K. Schum.
Sin.: *Eriodendron samauma* Mart.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna
Sin.: *Bombax aculeatum* Vell., *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. var. *paraguayensis* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA).

Cienfuegosia Cav.

Cienfuegosia affinis (Kunth) Hochr.
Sin.: *Hibiscus affinis* Kunth
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Cienfuegosia argentina Gürke
Sin.: *Fugosia argentina* (Gürke) Hochr., *Hibiscus argentinus* (Gürke) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

Cienfuegosia conciliata Krapov.
Subarbusto. Endémica. 400-500 m.
Países: PRY(APY).

Cienfuegosia drummondii (A. Gray) Lewton
Sin.: *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke var. *drummondii* (A. Gray) Hochr., *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke var. *glabra* Gürke, *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke var. *major* Hassl., *Fuegosia drummondii* A. Gray
Fugosia drummondii A. Gray, *Fugosia pulverulenta* (Griseb.) Hochr., *Fugosia sulphurea* A. St.-Hil. var. *trifida* Griseb. ex Rodrigo, nom. nud., *Hibiscus drummondii* (A. Gray) Kuntze, *Hibiscus pulverulentus* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Cienfuegosia hasslerana Hochr. ex Chodat & Hassl.
Sin.: *Cienfuegosia argentina* Gürke var. *hasslerana* (Hochr. ex Chodat & Hassl.) Hassl., *Cienfuegosia argentina* Gürke f. *escholtzioides* (Hochr. ex Chodat & Hassl.) Hassl., *Cienfuegosia escholtzioides* Hochr. ex Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(AMA, CON).

Cienfuegosia hispida R.E. Fr.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(SAL, SDE, SFE, TUC).

Cienfuegosia integrifolia (Chodat & Hassl.) FryxellSin.: *Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.) Garcke var. *integrifolia* Chodat & Hassl., *Cienfuegosia subprostrata* Hochr. var. *vera* Hassl.

Hierba. Endémica. 200-600 m.

Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Cienfuegosia lanceolata (A. St.-Hil.)

Krapov.

Sin.: *Fugosia lanceolata* A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 200-800 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Cienfuegosia saraviae Krapov.

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(SAL).

Cienfuegosia schulzii Krapov.

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Países: ARG(FOR).

Cienfuegosia subprostrata Hochr.

Hierba. Endémica. 100-700 m.

Países: PRY(CAN, SPE).

Cienfuegosia subternata (Hassl.)

Fryxell

Sin.: *Cienfuegosia heterophylla* (Vent.)Garcke subsp. *subternata* Hassl.

Hierba. Nativa. 200-800 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

Cienfuegosia sulphurea (A. St.-Hil.)

Garcke

Sin.: *Cienfuegosia drummondii* (A.Gray) Lewton var. *pubescens* Hassl.,nom. nud., *Cienfuegosia sulphurea* (A.St.-Hil.) Garcke var. *genuina* Gürke,*Cienfuegosia sulphurea* (A. St.-Hil.)Garcke var. *trifida* Griseb. ex Seckt, nom.nud., *Fugosia sulphurea* A. St.-Hil.*Hibiscus jussieu* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). PRY(CON, ÑEE). URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR).

Cienfuegosia ulmifolia Fryxell

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CON, ÑEE, PHA).

Corchorus L.**Corchorus argutus** KunthSin.: *Corchorus argutus* Kunth var.*longicarpus* Kuntze, *Corchorus argutus*Kunth var. *prismatocarpus* K. Schum.,*Corchorus hirtus* L. var. *argentinensis*Rodrigo, *Corchorus prismatocarpus* A.

St.-Hil., A. Juss. & Cambess.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,

MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN,

CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

URY(ART).

Corchorus hirtus L.Sin.: *Corchorus hirtus* L. var. *cuyabensis* K.Schum., *Corchorus hirtus* L. var. *orinocensis*(Kunth) K. Schum., *Corchorus orinocensis*Kunth, *Corchorus pilolobus* Link

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA).

PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON,

COA, ÑEE, PHA, SPE).

Corynabutilon (K. Schum.)

Kearney

Corynabutilon bicolor (Phil. ex K.

Schum.) Kearney

Sin.: *Abutilon bicolor* Phil. ex K. Schum.

Arbusto. Endémica. 200-2200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

CHL(COQ, RME).

Corynabutilon ceratocarpum (Hook.

& Arn.) Kearney

Sin.: *Abutilon ceratocarpum* (Hook. &Arn.) Gay, *Sida ceratocarpa* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 700-2400 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Corynabutilon hirsutum (Phil.) A.

Martic.

Sin.: *Anoda hirsuta* Phil., *Abutilon**hirsutum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémica. 300-500 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Corynabutilon ochsenii (Phil.)

Kearney

Sin.: *Anoda ochsenii* Phil., *Abutilon**ochsenii* (Phil.) Phil. ex F. Phil., *Abutilon**ochsenii* (Phil.) Phil. ex F. Phil. var.*stellaris* Reiche

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ARA, LRI).

Corynabutilon salicifolium (Reiche)

Krapov.

Sin.: *Abutilon salicifolium* Reiche

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Corynabutilon viride (Phil.) A. Martic.Sin.: *Abutilon viride* Phil.

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Corynabutilon vitifolium (Cav.)

Kearney

Sin.: *Abutilon garcke* Baker, *Abutilon**vitifolium* (Cav.) D. Don, *Sida vitifolia*Cav., *Sidalcea triloba* Turcz.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA).

Cristaria Cav., nom. cons.**Cristaria adenophora** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 2400-3300 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Cristaria andicola Gay

Hierba. Endémica. 2000-4700 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU).

CHL(ANT, ATA, COQ).

Cristaria argyliifolia Phil.Sin.: *Cristaria aspera* Gay var. *pilosa*(Phil.) Reiche, *Cristaria pilosa* Phil.

Hierba. Endémica. 300-700 m.

Países: CHL(ATA).

Cristaria aspera Gay var. **aspera**Sin.: *Cristaria intermedia* Gay, *Cristaria**lata* Turcz., *Cristaria urmenetae* Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cristaria aspera Gay var. **formosula**

(I.M. Johnst.) M. Muñoz

Sin.: *Cristaria formosula* I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Cristaria aspera Gay var. **sadae** (Phil.)

M. Muñoz

Sin.: *Cristaria sadae* Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Cristaria calderana M. Muñoz

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(ATA).

Cristaria cordato-rotundifolia Gay

Hierba. Endémica. 1300-2500 m.

Países: CHL(ATA).

Cristaria cyanea Phil. ex Baker f.
Hierba. Endémica. 1000-2400 m.
Países: CHL(TAR, ATA, COQ).

Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. **dissecta**

Sin.: *Cristaria flexuosa* Phil., nom. illeg., *Cristaria ovallea* Gay, *Cristaria univittata* Hochr., *Lecanophora dissecta* (Hook. & Arn.) Speg.

Hierba. Endémica. 100-3700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SAL, SJU).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. **glandulosa** (Phil.) M. Muñoz
Sin.: *Cristaria glandulosa* Phil., *Cristaria glomerulata* I.M. Johnst., *Cristaria saniculaefolia* Phil. ex Baker f.
Hierba. Endémica. 300-2800 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ).

Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. **inconspicua** (F. Phil.) M. Muñoz
Sin.: *Cristaria inconspicua* F. Phil.
Hierba. Endémica. 2700-3500 m.
Países: ARG(SJU). CHL(COQ).

Cristaria fuentesiana I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 100-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Cristaria glaucophylla Cav. var. **eriantha** (Hook. & Arn.) M. Muñoz
Sin.: *Cristaria australis* Phil., *Cristaria eriantha* Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Cristaria glaucophylla Cav. var. **glaucophylla**
Sin.: *Cristaria betonicaefolia* Pers., *Cristaria carrizalensis* Phil., *Cristaria glaucophylla* Cav. var. *simplex* Reiche, *Cristaria haenkeana* C. Presl, *Cristaria hirsuta* C. Presl, *Cristaria hispida* Phil., hom. illeg., *Cristaria pannosa* Phil. ex Reiche, *Cristaria trichocaula* Phil., *Lecanophora glaucophylla* (Cav.) Speg.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Cristaria gracilis Gay
Sin.: *Cristaria divaricata* Phil. ex Baker f., *Cristaria divaricata* Phil. var. *hirsuta* Phil., *Cristaria divaricata* Phil., hom. illeg., *Cristaria humilis* Phil., *Cristaria patens* Phil., *Cristaria ranunculifolia* Phil. ex Baker f.
Hierba. Endémica. 1000-4200 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Cristaria insularis F. Phil. var. **insularis**
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(IDE).

Cristaria insularis F. Phil. var. **johowii** (Skotts.) M. Muñoz
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(IDE).

Cristaria integerrima Phil. var. **integerrima**
Sin.: *Cristaria borchersii* Phil., *Cristaria diaziana* I.M. Johnst., *Cristaria foliosa* Phil., *Cristaria grandidentata* Phil. ex Baker f., *Cristaria intonsa* I.M. Johnst., *Cristaria larrañaga* Phil., *Cristaria oxyptera* Phil., *Cristaria paposana* I.M. Johnst., *Cristaria rotundifolia* Phil., *Cristaria setosa* Phil.
Hierba, subarbusto o arbusto.
Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Cristaria integerrima Phil. var. **lobulata** (Phil.) M. Muñoz
Sin.: *Cristaria lobulata* Phil.
Hierba, subarbusto o arbusto.
Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Cristaria leucantha I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ANT).

Cristaria molinae Gay
Sin.: *Cristaria diversifolia* Phil., *Cristaria diversifolia* Phil. f. *parvula* (Phil.) I.M. Johnst., *Cristaria grandiflora* Turcz., *Cristaria heterophylla* Phil., hom. illeg., *Cristaria parvula* Phil., *Cristaria trifida* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cristaria multiflora Gay
Sin.: *Cristaria glabrata* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2200 m.
Países: CHL(TAR, ATA, COQ, VAL).

Cristaria ovata M. Muñoz
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cristaria tenuissima M. Muñoz
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Cristaria viridiluteola Gay var. **pinnata** (Phil.) M. Muñoz
Sin.: *Cristaria pinnata* Phil., *Cristaria thinophila* I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Cristaria viridiluteola Gay var. **viridiluteola**

Sin.: *Cristaria bipinnata* Phil., *Cristaria bipinnatifida* Phil., *Cristaria seselifolia* Turcz., *Cristaria viridiluteola* Gay var. *geraniifolia* (C. Presl) Reiche
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Dirhamphis Krapov.

Dirhamphis balansae Krapov.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, CON).

Eriotheca Schott & Endl.

Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns
Sin.: *Bombax crenulatum* K. Schum., *Bombax crenulatum* K. Schum. var. *lobata* Hassl., *Bombax crenulatum* K. Schum. var. *subintegra* Hassl., *Bombax gracilipes* K. Schum., *Eriotheca hassleri* A. Robyns
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Eriotheca roseorum (Cuatrec.) A. Robyns
Sin.: *Bombax roseorum* Cuatrec., *Tartagalía roseorum* (Cuatrec.) T. Mey., *Tartagalía rubra* Capurro
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL).

Gaya Humb., Bonpl. & Kunth

Gaya albiflora Krapov.
Subarbusto. Nativa. 1500 m.
Países: ARG(SAL).

Gaya bordasii Krapov.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Gaya domingensis Urb.
Arbusto a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Gaya gracilipes K. Schum.
Sin.: *Gaya gracilipes* K. Schum. var. *multicarpidiata* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

Gaya kelleri Krapov.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(MIS).

Gaya matutina Krapov.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, PHA).

Gaya meridionalis Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

Gaya parviflora (Phil.) Krapov.

Sin.: *Cristaria corchorifolia* Griseb., nom. illeg., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. f. *australis* Hassl., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. f. *intermedia* Hassl., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. f. *viscidula* Hassl., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. var. *catamarquensis* Hassl., *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. var. *hirsutula* Hassl., *Philippimalva parviflora* (Phil.) Kuntze, *Tetraptera parviflora* Phil.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY). URY(SOR).

Gaya pilosa K. Schum.

Sin.: *Gaya pilosa* K. Schum. var. *microphylla* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA).

Gaya purpurea Krapov.

Subarbusto. Endémica. 1900-2700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Gaya tarijensis R.E. Fr.

Sin.: *Gaya gaudichaudiana* A. St.-Hil. var. *tarijensis* (R.E. Fr.) Hassl.

Hierba. Nativa. 100-2000 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, CON, PHA).

Gossypium L.**Gossypium barbadense** L.

Sin.: *Gossypium multiglandulosum* Phil. Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, IPA).

Gossypium herbaceum L.

Arbusto. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Gossypium hirsutum L.

Arbusto o subarbusto. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Guazuma Mill.**Guazuma ulmifolia** Lam. var.**tomentella** K. Schum.

Sin.: *Guazuma ulmifolia* Lam. var. *glabra* K. Schum.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Guazuma ulmifolia Lam. var.**ulmifolia**

Sin.: *Guazuma tomentosa* Kunth, *Guazuma ulmifolia* Lam. var. *tomentosa* (Kunth) K. Schum.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Helicteres L.**Helicteres brevispira** A. St.-Hil.

Sin.: *Helicteres ovata* Lam. subsp. *hybantoides* Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

Helicteres gardneriana A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Helicteres guazumifolia* Kunth var. *gardneriana* (A. St.-Hil. & Naudin) R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CON, PHA, SPE).

Helicteres lhotzkyana (Schott & Endl.) K. Schum. var. **lhotzkyana**

Sin.: *Orthothecium lhotzkyana* Schott & Endl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

Helicteres lhotzkyana (Schott & Endl.) K. Schum. var. **pubinervis** Kuntze

Sin.: *Helicteres amplifolia* Rusby, *Helicteres rusby* Britton

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(SAL).

Heliocarpus L.**Heliocarpus popayanensis** Kunth

Sin.: *Heliocarpus americanus* L. var. *popayanensis* (Kunth) K. Schum.,

Heliocarpus australis E. Watson

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Herissantia Medik.**Herissantia crispa** (L.) Brizicky

Sin.: *Abutilon crispum* (L.) Medik., *Bogenhardia crispa* (L.) Kearney, *Gayoides crispa* (L.) Small, *Pseudobastardia crispa* (L.) Hassl., *Sida crispa* L.

Hierba. Nativa. 100-1400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Herissantia intermedia (Hassl.) Krapov.

Sin.: *Abutilon tiubae* K. Schum. f. *annuum* Hassl., *Abutilon tiubae* K. Schum. f. *perenne* Hassl., *Abutilon tiubae* K. Schum. var. *parviflorum* Hassl., *Bogenhardia tiubae* (K. Schum.) Monteiro f. *perennis* (Hassl.) Monteiro, *Bogenhardia tiubae* (K. Schum.) Monteiro var. *intermedia* (Hassl.) Monteiro, *Bogenhardia tiubae* (K. Schum.) Monteiro var. *parviflora* (Hassl.) Monteiro, *Pseudobastardia tiubae* (K. Schum.) Hassl. f. *annua* Hassl., *Pseudobastardia tiubae* (K. Schum.) Hassl. f. *perennis* Hassl., *Pseudobastardia tiubae* (K. Schum.) Hassl. var. *intermedia* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Herissantia nemoralis (A. St.-Hil.) Brizicky

Sin.: *Bastardia nemoralis* A. St.-Hil., *Bogenhardia nemoralis* (A. St.-Hil.) Monteiro, *Pseudobastardia nemoralis* (A. St.-Hil.) Hassl., *Sida nemoralis* (A. St.-Hil.) G. Don

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(PAI).

Hibiscus L.**Hibiscus acetosella** Welw. ex Hiern

Hierba. Introducida. 100-500 m.
Países: PRY(AMA).

Hibiscus amambayensis Krapov. & Fryxell

Sin.: *Hibiscus cucurbitaceus* A. St.-Hil.
var. *acuminatus* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Hibiscus bifurcatus Cav.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA).

Hibiscus diversifolius Jacq. subsp.
rivularis (Bremek. & Oberm.) Exell

Sin.: *Hibiscus rivularis* Bremek. & Oberm.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hibiscus furcellatus Desr.

Sin.: *Hibiscus diodon* DC., *Hibiscus dominicus* Hochr., *Hibiscus furcellatus* Desr. var. *dominicus* (Hochr.) Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PHA, SPE).

Hibiscus hasslerianus Hochr.

Subarbusto. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CAN).

Hibiscus radiatus Cav.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área
del proyecto). PRY(AMA).

Hibiscus sororius L.

Sin.: *Hibiscus crenatus* Splitg. ex de Vriese
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(CEN).

Hibiscus striatus Cav.

Sin.: *Abelmoschus angustifolius* (Hook. & Arn.) Walp., *Abelmoschus cisplatinus* (A. St.-Hil.) Walp., *ibiscus amoenus* Link & Otto, *Hibiscus angustifolius* Hook. & Arn., *Hibiscus argentinus* Speg., hom. illeg., *Hibiscus cisplatinus* A. St.-Hil., *Hibiscus domingensis* Jacq. var. *striatus* (Cav.) Willd., *Hibiscus lambertianus* Kunth var. *angustifolius* (Hook. & Arn.) Hochr., *Hibiscus lambertianus* Kunth var. *glaber* Gürke, *Hibiscus lambertianus* Kunth var. *lobata* Chodat & Hassl., *Hibiscus lambertianus* Kunth, *Hibiscus lindmanii* Gürke, *Hibiscus linearis* A. St.-Hil. & Naudin, *Hibiscus submaritimus* Larrañaga

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, DUR, PAY, ROC, SJO, TAC).

Hibiscus trionum L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(RNE). CHL(MAU, BIO).
URY(MON, SOR).

Hibiscus urticifolium A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Hibiscus selloi* Gürke var.
paraguariensis Chodat & Hassl., *Hibiscus selloi* Gürke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, SPE).

Hochreutinera Krapov.**Hochreutinera hasslerana** (Hochr.) Krapov.

Sin.: *Abutilon hassleranum* Hochr., *Abutilon hassleranum* Hochr. f. *johnsonii* (Ekman) Hassl., *Abutilon hassleranum* Hochr. f. *pilcomayensis* Hassl., *Abutilon johnsonii* Ekman
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Krapovickasia Fryxell**Krapovickasia flavescens** (Cav.) Fryxell

Sin.: *Physaliastrum flavescens* (Cav.) Monteiro, *Physaliastrum prostratum* (Cav.) Monteiro, *Sida compressicaulis* Larrañaga, *Sida flavescens* Cav., *Sida intermedia* A. St.-Hil., *Sida macrodon* DC. var. *intermedia* (A. St.-Hil.) Griseb., *Sida prostrata* Cav., *Sida prostrata* Cav. var. *flavescens* (Cav.) Baker f.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(ITA). URY(ART, CAS, COL, FLO, FLA, MON, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Krapovickasia macrodon (DC.) Fryxell

Sin.: *Physaliastrum macrodon* (DC.) Monteiro, *Sida cymbalaria* Hochr., *Sida macrodon* DC., *Sida macrodon* DC. var. *cymbalaria* (Hochr.) Hassl.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, PAI).

Krapovickasia urticifolia (A. St.-Hil.) Fryxell

Sin.: *Physaliastrum urticifolium* (A. St.-Hil.) Monteiro, *Sida hilariana* Walp., *Sida urticifolia* A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, GUA, SPE). URY(RIV).

Lecanophora Speg.**Lecanophora ameghinoi** (Speg.) Speg.

Sin.: *Cristaria eburnea* Sandwith, *Cristaria kuntzei* Speg., *Cristaria mutica* Hochr., *Cristaria patagonica* Kuntze, hom. illeg., *Cristaria patagonica* Phil., *Lecanophora patagonica* (Kuntze) Speg., *Plarodrigoa ameghinoi* (Speg.) Looser, *Plarodrigoa patagonica* (Kuntze) Looser, *Sida ameghinoi* Speg. var. *appendiculata* Hicken, *Sida ameghinoi* Speg.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).

Lecanophora chubutensis (Speg.)

Rodrigo
Sin.: *Cristaria chubutensis* (Speg.) Hochr., *Plarodrigoa chubutensis* (Speg.) Looser, *Sida chubutensis* Speg.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Lecanophora ecristata (A. Gray)

Krapov.
Sin.: *Cristaria ecristata* A. Gray, *Cristaria linooides* (Hieron.) Speg., *Lecanophora linooides* (Hieron.) Speg., *Malvastrum linooides* Hieron., *Sida linooides* (Hieron.) Speg.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU).

Lecanophora heterophylla (Cav.)

Krapov.
Sin.: *Cristaria hastata* Phil., *Cristaria heterophylla* (Cav.) Hook. & Arn. var. *loasaefolia* (Phil.) Reiche, *Cristaria heterophylla* (Cav.) Hook. & Arn., *Cristaria hispida* Gillies ex Hook. & Arn., *Cristaria loasaefolia* Phil., *Cristaria mendocina* Phil., *Cristaria wilczekii* Hochr., *Sida heterophylla* Cav.
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).

Lecanophora jarae (Phil.) Krapov.
Sin.: *Cristaria jarae* Phil.
Hierba. Endémica. 3500-4000 m.
Países: ARG(CAT).

Lecanophora ruiz-lealii Krapov.
Hierba. Endémica. 1400-1500 m.
Países: ARG(RNE).

Lecanophora subacaulis Krapov.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Luehea Willd.

Luehea candicans Mart.
Sin.: *Luehea uniflora* A. St.-Hil.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR).
PRY(APY, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Luehea conwentzii K. Schum.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(PAR).

Luehea divaricata Mart.
Sin.: *Thespesia brasiliensis* Spreng.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).
URY(ART, CLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

Luehea fiebrigii Burret
Arbolito o árbol. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Luehea grandiflora Mart.
Sin.: *Luehea densiflora* A. St.-Hil.,
Luehea laxiflora A. St.-Hil., *Luehea rufescens* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CON).

Luehea microcarpa R.E. Fr. var. **microcarpa**
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Luehea microcarpa R.E. Fr. var. **polymorpha** Hassl.
Árbol. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(CON).

Luehea paniculata Mart.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).
PRY(AMA, COA).

Malachra L.

Malachra radiata (L.) L.
Sin.: *Sida radiata* L.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

Malva L.

Malva assurgentiflora (Kellogg) M.F. Ray
Sin.: *Lavatera assurgentiflora* Kellogg
Arbusto. Introducida. 0-400 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, JFE).

Malva dendromorpha M.F. Ray
Sin.: *Lavatera arborea* L., *Lavatera ericalyx* Steud.
Subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, SFE). CHL(AYP, TAR, ANT, VAL, LBO, MAU, LLA).

Malva moschata L.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(LLA, AIS).

Malva neglecta Wallr.
Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). BRA(RGS). CHL(VAL, ARA, RME).

Malva nicaeensis All.
Sin.: *Malva cordistipula* Steud.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, NEU, RNE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, JFE).
URY(MON).

Malva parviflora L.
Hierba. Introducida. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, IDE, JFE). PRY(CEN).
URY(MON, SOR).

Malva sylvestris L.
Sin.: *Malva simpliuscula* Steud.
Hierba. Introducida. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, JUJ, NEU, RNE). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT, VAL, AIS, RME). URY(MON, SJO).

Malva verticillata L.
Arbusto. Introducida.
Países: CHL(ANT).

Malvastrum A. Gray, nom. cons.

Malvastrum amblyphyllum R.E. Fr.
Sin.: *Malvastrum scabrum* (Cav.) Garcke var. *amblyphyllum* (R.E. Fr.) Hassl., *Malvastrum scabrum* (Cav.) Garcke var. *paraguariense* Hassl., *Malvastrum scabrum* (Cav.) Garcke var. *tucumanense* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).
PRY(APY, BOQ, CEN, CON, PHA).

Malvastrum americanum (L.) Torr.
Sin.: *Malva americana* L., *Malva betulina* Desr., *Malva curassavica* Desr., *Malva fluminensis* Vell., *Malva ovata* Cav., *Malva polystachia* Cav., *Malva spicata* L. var. *foliis subcordatis* DC., *Malva spicata* L., *Malva sublobata* Desr., *Malva timorensis* DC., *Malvastrum spicatum* (L.) A. Gray, *Malveopsis americana* (L.) Kuntze, *Malveopsis spicata* (L.) Kuntze, *Melochia spicata* (L.) Fryxell, *Sphaeralcea americana* (L.) Metz
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA, PHA).

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke var. **congestum** R.E. Fr.
Sin.: *Malvastrum tricuspidatum* (Aiton) A. Gray var. *congestum* (R.E. Fr.) Stuck.
Subarbusto. Nativa. 200-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke subsp. **capitatospicatum** (Kuntze) S.R. Hill
Sin.: *Malvastrum tricuspidatum* (Aiton) A. Gray var. *capitatospicatum* (Kuntze) Stuck., *Malveopsis coromandeliana* (L.) Morong var. *capitatospicata* Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke subsp. **coromandelianum**
Sin.: *Malva coromandeliana* L., *Malva tricuspidata* Aiton, *Malvastrum*

carpinifolium A. Gray, *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke f. *breviaristata* Hassl., *Malvastrum tricuspidatum* (Aiton) A. Gray, *Malveopsis coromandeliana* (L.) Morong Subarbusto. Nativa. 0-2000 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, RME, IPA). PRY(APY, CAU, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

Malvastrum cristobalianum Krapov. Arbusto. Nativa. 300-400 m. Países: PRY(APY).

Malvastrum interruptum K. Schum. Subarbusto. Nativa. 500-2500 m. Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Malvastrum ionthacarpum Krapov. Hierba. Nativa. 200-400 m. Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY).

Malvastrum multicuspidatum Krapov. Hierba. Endémica. 1400-1500 m. Países: ARG(LRI).

Malvastrum spiciflorum (Hassl.) Krapov. Sin.: *Malvastrum pentandrum* K. Schum. subsp. *spiciflorum* Hassl. Hierba o subarbusto. Nativa. 1500-3000 m. Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).

Malvastrum tomentosum (L.) S.R. Hill Sin.: *Malvastrum guaraniticum* Hassl., *Malva tomentosa* L. Hierba o subarbusto. Nativa. 200-500 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Malvastrum uniapiculatum Krapov. Arbusto. Endémica. 100-200 m. Países: ARG(MIS).

Malvella Jaub. & Spach

Malvella leprosa (Ortega) Krapov. Sin.: *Disella hederacea* (Douglas ex Hook.) Greene, *Malva albifolia* Larrañaga, *Malva hederacea* Douglas ex Hook., *Malva leprosa* Ortega, *Malva sulphurea* Gillies ex Hook. & Arn., *Malvastrum sulphureum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb., *Sida*

hederacea (Douglas) Torr. var. *sulphurea* (Gillies ex Hook. & Arn.) Baker f., *Sida hederacea* (Douglas) Torr., *Sida leprosa* (Ortega) K. Schum. var. *sulphurea* (Hook. & Arn.) Hochr., *Sida leprosa* (Ortega) K. Schum., *Sida sulphurea* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray Hierba. Nativa. 0-2000 m. Países: ARG(BAI, CHA, CHU, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). URY(CAS, MON, PAY).

Melochia L.

Melochia anomala Griseb. Subarbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC).

Melochia arenosa Benth. Sin.: *Melochia cinerea* A. St.-Hil. & Naudin var. *discolor* Hassl., nom. nud. Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(PAR). PRY(APY, CON, COA, ÑEE).

Melochia argentina R.E. Fr. Sin.: *Malvastrum casabambense* Stuck., *Melochia argentina* R.E. Fr. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Melochia argentina* R.E. Fr. var. *lanceolata* Hassl., *Melochia argentina* Hassl., hom. illeg. Subarbusto. Nativa. 600-1700 m. Países: ARG(COR, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(PAI).

Melochia canescens Cristóbal Subarbusto. Nativa. 0-2000 m. Países: ARG(CHA, FOR, SAL). PRY(APY, BOQ, ÑEE).

Melochia chamaedrys A. St.-Hil. var. **chamaedrys** Sin.: *Melochia chamaedrys* A. St.-Hil. var. *typica* Ekman, nom. inval., *Melochia chamaedrys* A. St.-Hil. var. *loretensis* Hassl., nom. nud. Subarbusto. Nativa. 0-800 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, ITA). URY(ART, RIV, SAO, SJO, TAC).

Melochia chamaedrys A. St.-Hil. var. **decumbens** (R.E. Fr.) Goldberg Sin.: *Melochia chamaedrys* A. St.-Hil. f. *decumbens* (R.E. Fr.) Ekman, *Melochia chamaedrys* A. St.-Hil. var. *viscidula* Hassl., nom. nud., *Melochia decumbens* R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CON). URY(RIV, SAO, TAC).

Melochia goldbergii Cristóbal Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). PRY(APY).

Melochia graminifolia A. St.-Hil. Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Melochia hassleriana Chodat Sin.: *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil. f. *albovillosa* R.E. Fr., *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil. f. *brevipedunculata* K. Schum. & Hassl., *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil. f. *hassleriana* (Chodat) K. Schum. & Hassl., *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil. f. *sericea* K. Schum. & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-700 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Melochia hermannioides A. St.-Hil. Sin.: *Melochia hermannioides* A. St.-Hil. f. *heterophylla* Hassl., *Melochia hermannioides* A. St.-Hil. f. *typica* Hassl., nom. inval., *Melochia hermannioides* A. St.-Hil. var. *lacinulata* (K. Schum. & Hassl.) Hassl., *Melochia hermannioides* A. St.-Hil. var. *lanceolata* Hassl., *Melochia lacinulata* K. Schum. & Hassl., *Melochia parvifolia* Kunth f. *roseiflora* K. Schum. & Hassl., p.p. Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Melochia ministella Cristóbal Subarbusto. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, CON, PHA).

Melochia morongii Britton Sin.: *Melochia morongii* Britton var. *denudata* R.E. Fr., *Melochia parvifolia* Kunth f. *intermedia* Hassl., *Melochia parvifolia* Kunth f. *tomentosa* Hassl., *Melochia parvifolia* Kunth var. *morongii* (Britton) Hassl. Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Melochia parvifolia Kunth var. **fasciculata** (Benth.) Hassl.

Sin.: *Melochia fasciculata* Benth., *Melochia parvifolia* Kunth f. *albiflora* K. Schum. & Hassl., *Melochia parvifolia* Kunth f. *microphylla* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, PHA).

Melochia parvifolia Kunth var. **parvifolia**

Sin.: *Melochia parvifolia* Kunth var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Melochia parvifolia* Kunth f. *induta* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAN, PHA).

Melochia pilosa (Mill.) Fawc. & Rendle

Sin.: *Melochia ulmarioides* A. St.-Hil., *Melochia venosa* Sw., *Sida pilosa* Mill.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV).

Melochia pyramidata L.

Sin.: *Melochia pyramidata* L. f. *intermedia* Hassl., *Melochia pyramidata* L. f. *transitoria* K. Schum. & Hassl., *Melochia pyramidata* L. var. *hieronymi* K. Schum., *Melochia pyramidata* L. var. *pseudotomentosa* Hassl., *Melochia tomentosa* L. var. *mattogrossensis* R.E. Fr.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, SJO).

Melochia simplex A. St.-Hil.

Sin.: *Melochia missionum* Ekman, *Melochia sorocabensis* K. Schum., *Melochia stricta* K. Schum., *Melochia stricta* K. Schum. f. *missionum* (Ekman) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, ITA, SPE).

Melochia thymifolia (C. Presl)

Goldberg
Sin.: *Riedleia thymifolia* C. Presl
Subarbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Melochia villosa (Mill.) Fawc. & Rendle var. **tomentosa** (K. Schum.) Goldberg

Sin.: *Melochia hirsuta* Cav. f. *albiflora* K. Schum. & Hassl., *Melochia hirsuta* Cav. f. *ferruginea* K. Schum. & Hassl., *Melochia hirsuta* Cav. f. *minus-induta* K. Schum. & Hassl., *Melochia hirsuta* Cav. var. *calophylla* K. Schum., *Melochia hirsuta* Cav. var. *macrophylla* K. Schum., *Melochia hirsuta* Cav. var. *tomentosa* K. Schum., *Melochia subcordata* Morong
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Melochia villosa (Mill.) Fawc. & Rendle var. **villosa**

Sin.: *Melochia hirsuta* Cav., *Melochia hirsuta* Cav. var. *paraguayensis* Chodat, *Sida villosa* Mill.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(APA).

Melochia werdermannii Goldberg

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

Modiola Moench

Modiola caroliniana (L.) G. Don
Sin.: *Abutilodes caroliniana* (L.) Kuntze, *Malva caroliniana* L., *Malva eriocarpa* DC., *Malva prostrata* Cav., *Malva radicans* Larrañaga, *Malva urticifolia* Kunth, *Modanthos caroliniana* (L.) Alef., *Modanthos decumbens* (Willd.) Alef., *Modanthos eriocarpa* (DC.) Alef., *Modanthos prostrata* (Cav.) Alef., *Modanthos reptans* (A. St.-Hil.) Alef., *Modanthos urticifolia* (Kunth) Alef., *Modiola caroliniana* (L.) G. Don var. *brevipes* Griseb., *Modiola eriocarpa* (DC.) G. Don, *Modiola jaeggiana* (K. Schum.) K. Schum., *Modiola multifida* Moench, nom. illeg., *Modiola multifida* Moench var. *brevipes* Griseb., *Modiola prostrata* (Cav.) A. St.-Hil., *Modiola reptans* A. St.-Hil., *Modiolastrum jaeggianum* K. Schum.
Hierba. Nativa. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(APA, CEN, SPE). URY(CLA, MON, RIV, ROC, TAC).

Modiolastrum K. Schum.**Modiolastrum australe** Krapov.

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, SFE).

Modiolastrum gilliesii (Steud.)

Krapov.
Sin.: *Malva geranioides* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Malva gilliesii* Steud., *Malvastrum gilliesii* (Steud.) Baker f., *Modanthos geranioides* (Gillies ex Hook.) Alef., *Modiola geranioides* (Gillies) Walp., *Modiolastrum geranioides* (Gillies) Baker f.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, SDE, SFE). PRY(ITA). URY(FLO).

Modiolastrum lateritium (Hook.)

Krapov.
Sin.: *Malva lasiocarpa* A. St.-Hil. & Naudin, *Malva lateritia* Hook., *Malva peduncularis* Hook. & Arn., *Malvastrum lasiocarpum* (A. St.-Hil. & Naudin) Griseb., *Malvastrum lateritium* (Hook.) G. Nicholson, *Malveopsis lateritia* (Hook.) Morong, *Modiola lateritia* (Hook.) K. Schum.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(CAA, ITA). URY(PAY, RIV).

Modiolastrum malvifolium (Griseb.) K. Schum.

Sin.: *Malvastrum modioliforme* (Kuntze) K. Schum., *Malvastrum tweediei* Baker f., *Malveopsis modioliformis* Kuntze, *Modiola malvifolia* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART).

Modiolastrum palustre (Ekman)

Krapov.
Sin.: *Malvastrum palustre* Ekman
Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Monteiroa Krapov.**Monteiroa bullata** (Ekman) Krapov.

Sin.: *Malvastrum bullatum* Ekman
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Monteiroa catharinensis Krapov.
Arbusto. Endémica. 1000-1700 m.
Países: BRA(SCA).

Monteiroa dusenii (Ekman) Krapov.
Sin.: *Malvastrum dusenii* Ekman
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Monteiroa glomerata (Hook. & Arn.) Krapov.
Sin.: *Malva concinna* Knowles & Westc., *Malva glomerata* Hook. & Arn., *Malvastrum conglomeratum* Griseb. ex K. Schum., nom. nud., *Malvastrum garckeanum* K. Schum., *Malvastrum garckeanum* K. Schum. var. *paranensis* K. Schum., *Malvastrum glomeratum* (Hook. & Arn.) Griseb.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MAL, SJO).

Monteiroa hatschbachii Krapov.
Arbusto. Endémica. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Monteiroa ptarmicaefolia (A. St.-Hil. & Naudin) Krapov.
Sin.: *Malva ptarmicaefolia* A. St.-Hil. & Naudin
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Monteiroa reitzii Krapov.
Arbusto. Endémica. 900-1900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Monteiroa smithii Krapov.
Arbusto. Endémica. 900-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Monteiroa triangularifolia Krapov.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Neobaclea Hochr.

Neobaclea crispifolia (Cav.) Krapov.
Sin.: *Abutilon crispifolium* (Cav.) Dusén, *Abutilon vidalii* (Phil.) Speg., *Cristaria vidali* Phil., *Neobaclea spirostegia* Hochr., *Sida crispifolia* Cav., *Sphaeralcea crispifolia* (Cav.) Baker f.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Nototriche Turcz.

Nototriche alternata A.W. Hill
Sin.: *Nototriche sajamensis* (Hieron.) A.W. Hill, *Malvastrum sajamense* Hieron.
Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
Países: CHL(AYP).

Nototriche anthemidifolia (J. Remy) A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum anthemidifolium* (J. Remy) A. Gray, *Malvastrum hirtipes* Speg., *Malvastrum saltense* Hieron. ex R.E. Fr., *Malveopsis saltensis* Kuntze, nom. nud., *Nototriche cheilantifolia* Turcz., *Nototriche discolor* Turcz., *Nototriche hirtipes* (Speg.) B.L. Burt & A.W. Hill, *Nototriche pseudoglabra* A.W. Hill, *Nototriche saltensis* A.W. Hill, *Sida anthemidifolia* J. Remy
Hierba. Nativa. 3500-4800 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR).

Nototriche argentea A.W. Hill
Hierba. Nativa. 3300-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Nototriche auricoma (Phil.) A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum auricomum* Phil.
Hierba. Endémica. 4200-4700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Nototriche borussica (Meyen) A.W. Hill
Sin.: *Sida borussica* Meyen
Hierba. Nativa. 4600-4700 m.
Países: CHL(TAR).

Nototriche cabreræ Krapov.
Hierba. Endémica. 4500-4600 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Nototriche caesia A. W. Hill
Sin.: *Nototriche rosulata* A.W. Hill
Hierba. Endémica. 3700-4500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Nototriche cajonensis Krapov.
Hierba. Endémica. 4100-4300 m.
Países: ARG(CAT, SAL).

Nototriche calchaquensis Krapov.
Hierba. Endémica. 5400 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Nototriche castillonii B.L. Burt & A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Nototriche chaniensis C.A. Zanotti & J.C. Ospina
Hierba. Endémica. 4600-4700 m.
Países: ARG(JUU).

Nototriche chuculaensis Krapov.
Hierba. Endémica. 4500 m.
Países: ARG(CAT).

Nototriche clandestina (Phil.) A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum clandestinum* (Phil.) Baker f., *Sida clandestina* Phil.
Hierba. Endémica. 3000-5100 m.
Países: ARG(CAT). CHL(ANT, ATA).

Nototriche compacta (A. Gray) A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum compactum* A. Gray, *Malvastrum megalorrhizum* (Phil.) Baker f., *Nototriche holosericea* A.W. Hill, *Nototriche megalorrhiza* (Phil.) A.W. Hill, *Nototriche transandina* A.W. Hill, *Sida compacta* Gay, hom. illeg., *Sida macrorrhiza* Phil. ex Baker f., nom. nud., *Sida megalorrhiza* Phil.
Hierba. Endémica. 1900-4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Nototriche copon Krapov.
Hierba. Endémica. 3500-4500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Nototriche diminutiva (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Malva diminutiva* Phil.
Hierba. Endémica. 3800-4000 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Nototriche estipulata A.W. Hill ex B.L. Burt
Hierba. Endémica. 3000-4700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Nototriche famatinensis A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum famatinense* Hieron, nom. nud. pro syn.
Hierba. Endémica. 3500-5000 m.
Países: ARG(LRI).

Nototriche friesii A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-5700 m.
Países: ARG(JUU).

Nototriche glabra Krapov.
Hierba. Endémica. 4000 m.
Países: ARG(LRI).

Nototriche glauca A.W. Hill
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

- Nototriche hieronymi** A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(LRI).
- Nototriche hillii** Krapov.
Hierba. Nativa. 4000-4700 m.
Países: ARG(LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ATA).
- Nototriche hunzikeri** Krapov.
Hierba. Endémica. 3900-4100 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
- Nototriche kurtzii** Krapov.
Hierba. Endémica. 4500 m.
Países: ARG(LRI).
- Nototriche leucosphaera** A.W. Hill
Hierba. Nativa. 4300-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Nototriche lorentzii** A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).
- Nototriche macrotuba** Krapov.
Hierba. Endémica. 4700 m.
Países: ARG(JUU).
- Nototriche meyenii** Ulbr.
Hierba. Nativa. 4000-4800 m.
Países: CHL(AYP).
- Nototriche nana** A.W. Hill
Hierba. Endémica. 3700-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Nototriche niederleinii** A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(LRI).
- Nototriche obcuneata** (Baker f.) A.W. Hill var. **cinerea** A.W. Hill
Hierba. Nativa. 4400-4900 m.
Países: CHL(AYP).
- Nototriche obcuneata** (Baker f.) A.W. Hill var. **obcuneata**
Sin.: *Malvastrum obcuneatum* Baker f.
Hierba. Nativa. 4000-4400 m.
Países: CHL(AYP).
- Nototriche orbignyana** (Wedd.) A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum orbignyanum* Wedd.
Hierba. Nativa. 4400-4500 m.
Países: CHL(AYP).
- Nototriche ovata** Krapov.
Hierba. Endémica. 3800-4100 m.
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA).
- Nototriche parviflora** (Phil.) A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum parviflorum* Phil.
Hierba. Nativa. 4100-5000 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Nototriche pediculariifolia** (Meyen) A.W. Hill
Sin.: *Nototriche incana* Turcz., *Sida pediculariifolia* Meyen
Hierba. Nativa. 4200 m.
Países: CHL(TAR).
- Nototriche philippii** A.W. Hill
Hierba. Nativa. 3200-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SJU).
CHL(AYP, ANT, ATA).
- Nototriche pulverulenta** B.L. Burtt & A.W. Hill
Hierba. Nativa. 4200-4500 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR).
- Nototriche pulvilla** A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(LRI).
- Nototriche pulvinata** A.W. Hill
Hierba. Endémica. 4000-4900 m.
Países: CHL(AYP).
- Nototriche pusilla** A.W. Hill
Hierba. Nativa. 3800-4800 m.
Países: ARG(JUU, LRI, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).
- Nototriche pygmaea** (J. Remy) A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum pygmaeum* (J. Remy) A. Gray, *Nototriche sarmentosa* A.W. Hill, *Nototriche werdermannii* Ulbr., *Sida pygmaea* J. Remy
Hierba. Nativa. 3500-4600 m.
Países: ARG(JUU, LRI, TUC).
CHL(AYP, TAR).
- Nototriche rohmederi** Krapov.
Hierba. Endémica. 4500-5200 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
- Nototriche rugosa** (Phil.) A.W. Hill
Sin.: *Malvastrum pedicularifolium* (Meyen) A. Gray var. *rugosum* (Phil.) Reiche, *Malvastrum rugosum* Phil.
Hierba. Endémica. 1900-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SJU).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).
- Nototriche sleumeri** Krapov.
Hierba. Endémica. 4700-4900 m.
Países: ARG(JUU).
- Nototriche stipularis** (Phil.) A. Martic.
Sin.: *Malvastrum stipulare* Phil.
Hierba. Endémica. 3200-4400 m.
Países: CHL(TAR, ANT).
- Nototriche tucumana** Krapov.
Hierba. Endémica. 4100-4200 m.
Países: ARG(JUU, TUC).
- Nototriche turritella** A.W. Hill
Hierba. Nativa. 3600-4600 m.
Países: CHL(AYP, TAR).
- Nototriche viridula** Krapov.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT).
- Pachira Aubl.**
- Pachira glabra** Pasq.
Árbol. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Palaua Cav.**
- Palaua concinna** (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Sida concinna* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT).
- Palaua dissecta** Benth.
Sin.: *Palaua bipinnatifida* Reiche, *Palaua flexuosa* Mast.
Hierba. Nativa. 100-400 m.
Países: CHL(TAR, ANT).
- Palaua inconspicua** I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: CHL(ANT).
- Palaua modesta** (Phil.) Reiche
Sin.: *Sida modesta* Phil.
Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(ANT).
- Pavonia Cav.**
- Pavonia angustipetala** Krapov. & Cristóbal
Sin.: *Pavonia schrankii* Spreng. var. *angustifolia* R.E. Fr.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pavonia apiculata** R.E. Fr.
Sin.: *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. var. *apiculata* (R.E. Fr.) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Pavonia argentina Gürke

Sin.: *Asterochlaena argentina* (Gürke) Stuck., *Lassa argentina* (Gürke) Kuntze, *Pavonia campestris* R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC), PRY(APY).

Pavonia aspera Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Pavonia aurelii Fryxell

Arbusto. Endémica. 200-500 m.
Países: PRY(AMA).

Pavonia aurigloba Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Pavonia hastata* Cav. f. *longifolia* Gürke, p.p.
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, SLU), BRA(RGS), URY(CLA, COL, MAL, MON, RIV, SJO, TAC).

Pavonia balansae Gürke

Sin.: *Asterochlaena balansae* (Gürke) Hassl. f. *intermedia* Hassl., *Asterochlaena balansae* (Gürke) Hassl. f. *longipetiolata* Hassl., *Asterochlaena balansae* (Gürke) Hassl. subsp. *tenax* (Hassl.) Hassl., *Asterochlaena balansae* (Gürke) Hassl., *Asterochlaena sidifolia* (Kunth) Hassl. f. *crenata* Hassl., *Pseudopavonia tenax* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto), PRY(APY, CON, PAI).

Pavonia belophylla Hochr.

Sin.: *Pavonia hastata* Cav. f. *belophylla* (Hochr.) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS), PRY(AMA, CAU, CAN).

Pavonia betonicaefolia C. Presl

Sin.: *Pavonia consobrina* N.E. Br., *Pavonia hastata* Cav. var. *consobrina* (N.E. Br.) Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE), BRA(RGS), PRY(APY, PHA), URY(CAS, CLA, MON, PAY, SJO, TAC).

Pavonia biflora Fryxell

Arbusto. Nativa. 200-300 m.
Países: BRA(PAR).

Pavonia bullulata Hochr. ex Chodat & Hassl.

Sin.: *Pavonia hastata* Cav. f. *bullulata* (Hochr.) Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS), BRA(SCA), PRY(CAU, COA).

Pavonia cancellata (L.) Cav.

Sin.: *Hibiscus cancellatus* L., *Pavonia cancellata* (L.) Cav. var. *cordata* Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto), PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Pavonia communis A. St.-Hil.

Sin.: *Pavonia arechavaletana* Krapov. & Fryxell, *Pavonia ramosissima* (Arechav.) Fryxell & Krapov., *Pavonia sepium* A. St.-Hil. var. *ramosissimum* Arechav., *Pavonia spinifex* (L.) Cav. var. *communis* (A. St.-Hil.) Gürke, *Pavonia urticifolia* Arechav., hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(COS, MIS), BRA(PAR, RGS, SCA), PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI), URY(RIV, TAC).

Pavonia commutata Garcke

Sin.: *Pavonia engleriana* Gürke, *Pavonia exserta* Krapov. & Cristóbal, *Pavonia gamophylla* Krapov. & Cristóbal
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia cryptica Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, SFE), BRA(RGS), URY(COL).

Pavonia cymbalaria A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Pavonia hastata* Cav. f. *cymbalaria* (A. St.-Hil. & Naudin) Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COR), URY(MAL, TYT).

Pavonia distinguenda A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Pavonia urbaniana* Gürke, *Pavonia urbaniana* Gürke var. *tomentosa-velutina* Gürke, *Pavonia malmeana* R.E. Fr., *Pavonia urbaniana* Gürke var. *macrantha* R.E. Fr., *Pavonia pedersenii* Fryxell
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS), BRA(PAR, RGS, SCA), URY(CAS, RIV, SJO).

Pavonia dusenii Krapov.

Subarbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia eurychlamys Ulbr.

Arbusto. Nativa. 1500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Pavonia exasperata Grings & Boldrini

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Pavonia flavispina Miq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS), BRA(RGS, SCA).

Pavonia formosa Fryxell

Arbusto o subarbusto. Nativa. 800-2500 m.
Países: ARG(SAL).

Pavonia friesii Krapov.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA), URY(CLA, MON, TAC).

Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle

Sin.: *Pavonia typhalaea* (L.) Cav., *Sida fruticosa* Mill., *Urena typhalaea* L.
Arbusto. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR), PRY(CAN).

Pavonia glechomoides A. St.-Hil.

Sin.: *Lassa glechomoides* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Pavonia hirta* Spreng., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, SAL, SLU, TUC), BRA(RGS), URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SJO, TAC).

Pavonia glutinosa Krapov. & Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS), BRA(RGS), URY(SJO).

Pavonia gracilis R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto), PRY(AMA).

Pavonia guerkeana R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS), BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia hassleriana Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, COA, PAI).

Pavonia hastata Cav.

Sin.: *Greevesia cleisocalyx* F. Muell., *Lassa hastata* (Cav.) Kuntze, *Pavonia hastata* Cav. f. *brevifolia* Gürke, p.p., *Pavonia hastata* Cav. var. *pubescens* Gürke, *Sida bonariensis* Willd.
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, TAC).

Pavonia hatschbacii Krapov.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). URY(MON).

Pavonia hexaphylla (S. Moore) Krapov.
Sin.: *Pavonia mutisii* Kunth var. *hexaphylla* S. Moore
Subarbusto. Nativa. 100-800 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CEN, COA).

Pavonia hieronymi Gürke
Sin.: *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. f. *angustiphylla* Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. subsp. *brevipila* Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. var. *grandiflora* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. var. *montana* Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl. var. *pseudoapiculata* Hassl., *Asterochlaena hieronymi* (Gürke) Hassl., *Asterochlaena morongii* (S. Moore) Hassl., *Lassa hieronymi* (Gürke) Kuntze, *Pavonia geminiflora* Moric. var. *grandiflora* Chodat & Hassl., *Pavonia hieronymi* Gürke subsp. *tomentella* R.E. Fr., *Pavonia morongii* S. Moore, *Pavonia sidifolia* Kunth f. *morongii* (S. Moore) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 100-2800 m.
Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).

Pavonia hoehnei Baker f.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). URY(SJO).

Pavonia horrida Krapov.
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Pavonia immaculata R.E. Fr.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Pavonia kleinii Krapov. & Cristóbal
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Pavonia lanata R.E. Fr.
Subarbusto. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia laxifolia A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 200-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Pavonia mattogrossensis R.E. Fr.
Sin.: *Pavonia mattogrossensis* R.E. Fr. var. *lobata* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Pavonia missionum Ekman
Arbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA).

Pavonia nana R.E. Fr.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(DUR, RIV, SAO, TAC).

Pavonia narcissi Krapov.
Sin.: *Pavonia communis* A. St.-Hil. var. *balansae* (Gürke) Hassl., *Pavonia sepium* A. St.-Hil. var. *balansae* Gürke
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI).

Pavonia neei Fryxell
Sin.: *Asterochlaena morongii* (S. Moore) Hassl. var. *intermedia* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(FOR). PRY(PHA).

Pavonia nemoralis A. St.-Hil. & Naudin
Sin.: *Pavonia brachycephala* A. St.-Hil. & Naudin
Subarbusto. Nativa. 200-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA).

Pavonia opulifolia S. Moore
Arbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, COA).

Pavonia orientalis Krapov.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(LAV, MAL, ROC, SJO).

Pavonia pabstii Krapov. & Cristóbal
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(FOR). BRA(SCA).

Pavonia patuliloba Chodat & Hassl.
Sin.: *Pavonia subhastata* Triana & Planch. f. *patuliloba* (Hochr.) Hassl., *Pavonia subhastata* Triana & Planch. f. *quinqueloba* Hassl., *Pavonia subhastata* Triana & Planch. subsp. *paludosa* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, CHO, CON, ÑEE, PHA).

Pavonia platyloba R.E. Fr.
Sin.: *Asterochlaena platyloba* (R.E. Fr.) Hassl., *Asterochlaena platyloba* (R.E. Fr.) Hassl. var. *grandiflora* Hassl., *Asterochlaena platyloba* (R.E. Fr.) Hassl. var. *hirsutula* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

Pavonia psilophylla Ekman
Sin.: *Pavonia hastata* Cav. var. *glabriuscula* Gürke
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Pavonia pulchra Hochr.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Pavonia ramboi Krapov. & Cristóbal
Arbusto. Endémica. 800 m.
Países: BRA(RGS).

Pavonia reitzii Krapov. & Cristóbal
Arbusto. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(SCA).

Pavonia renifolia Krapov.
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Pavonia restiaria Bertoni
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA).

Pavonia reticulata Garcke
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TAC).

Pavonia revoluta Krapov. & Cristóbal
Sin.: *Althaea grandidentata* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LRI, SAL, SJU, SLU). URY(MON).

Pavonia rhodantha Hochr.

Sin.: *Pavonia rhodantha* Hochr. var. *discolor* Hassl., *Pavonia rhodantha* Hochr. var. *pusilla* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Pavonia rojasii Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Pavonia rosenfurtii Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(CLA, ROC, SJO).

Pavonia rubra Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Endémica. 100-300 m.

Países: ARG(COS, MIS).

Pavonia rupestris (Hassl.) Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Asterochlaena sidifolia* (Kunth) Hassl. var. *rupestris* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, CEN, COA, PHA).

Pavonia sagittata A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Pavonia salmonea Grings & Boldrini

Arbusto o subarbusto. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Pavonia sapucayensis Hassl.

Sin.: *Pavonia mattogrossensis* R.E. Fr. var. *minor* Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR). PRY(GUA, PAI).

Pavonia schiedeana Steud.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAN).

Pavonia schininii Krapov. & Cristóbal

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

Pavonia schrankii Spreng.

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pavonia secreta Grings & Krapov.

Arbusto. Endémica. 300-400 m.

Países: BRA(RGS).

Pavonia sepium A. St.-Hil.

Sin.: *Hibiscus hexaphyllus* Larrañaga, *Lassa sepium* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Pavonia flava* Spring, *Pavonia malvacea* (Vell.) Krapov. & Cristóbal, *Pavonia sepium* A. St.-Hil. var. *silvatica* Arechav., *Sida malvacea* Vell.

Arbusto. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(FLO, FLA, MAL, MON, TYT).

Pavonia sidifolia Kunth

Sin.: *Asterochlaena sidifolia* (Kunth)

Hassl. subsp. *diuretica* (A. St.-Hil.)

Hassl., *Asterochlaena sidifolia* (Kunth)

Hassl. var. *paraguayensis* Hassl.,

Asterochlaena sidifolia (Kunth) Hassl.,

Pavonia diuretica A. St.-Hil.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CEN,

CON, COA, PAI, PHA, SPE).

Pavonia stenopetala Krapov.

Hierba. Endémica. 200-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pavonia subrotunda A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Asterochlaena orbicularis*

(Ulbr.) Hassl. var. *decumbens* Hassl.,

Asterochlaena orbicularis (Ulbr.) Hassl.

var. *ekmanii* Hassl., *Asterochlaena*

orbicularis (Ulbr.) Hassl., *Pavonia*

orbicularis Ulbr.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

PRY(CAA, CEN, ITA, SPE).

Pavonia vannii Fryxell

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, COA).

Pavonia vitifolia Hochr. ex Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 100-600 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CON, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

Pavonia xanthogloea Ekman

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(RGS). PRY(APA). URY(COL, TAC).

edouardii (Hochr.) Krapov. & Cristóbal f. *fruticosa erecta* Hochr.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAU, CON, SPE).

Peltaea lasiantha Krapov. & Cristóbal

Hierba. Nativa. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Peltaea obsita (Mart. ex Colla) Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Pavonia sessiliflora* Kunth f.

ecostata Hassl., *Pavonia sessiliflora* Kunth

var. *acutifolia* Gürke, *Peltaea acutifolia*

(Gürke) Krapov. & Cristóbal, *Sida obsita*

Mart. ex Colla

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Peltaea polymorpha (A. St.-Hil.)

Krapov. & Cristóbal

Sin.: *Pavonia polymorpha* A. St.-

Hil., *Pavonia speciosa* Kunth subsp.

polymorpha (A. St.-Hil.) Gürke

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Peltaea speciosa (Kunth) Standl.

Sin.: *Pavonia speciosa* Kunth

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Pseudabutilon R.E. Fr.**Pseudabutilon aristulosum** (K.

Schum.) Krapov.

Sin.: *Abutilon aristulosum* K. Schum.,

Wissadula aristulosa (K. Schum.)

Monteiro

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(AMA).

Pseudabutilon balansae (Hassl.) H.A.

Keller

Sin.: *Abutilon balansae* Hassl.,

Wissadula balansae Hassl., hom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). PRY(CEN, GUA, PAI).

Pseudabutilon benense (Britton)

Fryxell

Sin.: *Abutilon benense* (Britton) Baker

f., *Sida benensis* Britton

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(AMA).

Pseudabutilon callimorphum(Hochr.) R.E. Fr. var. **callimorphum**

Sin.: *Sida callimorpha* Hochr.,
Wissadula callimorpha (Hochr.) Hassl.
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR,
 JUJ, LRI, SAL). PRY(APY, CON, PHA).

Pseudabutilon callimorphum(Hochr.) R.E. Fr. var. **intermedium**

Hassl.
 Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(FOR). PRY(PHA).

Pseudabutilon cinereum (Griseb.)

Krapov.

Sin.: *Abutilon cinereum* Griseb.,
Pseudabutilon longepilosum R.E. Fr.
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL,
 SDE, SJU).

Pseudabutilon pedunculatum (R.E.

Fr.) Krapov.

Sin.: *Pseudabutilon callimorphum* (Hochr.)
 R.E. Fr. var. *friesii* (Hassl.) R.E. Fr.,
Pseudabutilon stuckertii R.E. Fr., *Wissadula*
callimorpha (Hochr.) Hassl. var. *friesii*
 Hassl., *Wissadula pedunculata* R.E. Fr.
 Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
 ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE,
 SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

Pseudabutilon virgatum (Cav.)

Fryxell

Sin.: *Abutilon grevilleanum* (Hook.
 & Arn.) Walp., *Abutilon mendocinum*
 Phil., *Abutilon paranthemoides* Griseb.,
Abutilon saltense Hassl., *Abutilon*
virgatum (Cav.) Sweet var. *tomentosum*
 K. Schum., *Abutilon virgatum* (Cav.)
 Sweet, *Sida grevilleana* Gillies ex Hook.
 & Arn., *Sida sessiliflora* Hook., *Sida*
virgata Cav.
 Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,
 SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
 BRA(Fuera del área del proyecto).
 PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, PHA).

Pseudobombax Dugand**Pseudobombax argentinum** (R.E. Fr.)

A. Robyns

Sin.: *Bombax argentinum* R.E. Fr.,
Bombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss.
 & Cambess.) K. Schum. f. *argentinum*

(R.E. Fr.) Hassl., *Bombax marginatum* (A.
 St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum.
 f. *rupestre* Hassl., *Bombax marginatum*
 (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K.
 Schum. f. *paraguayense* (R.E. Fr.) Hassl.,
Bombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss.
 & Cambess.) K. Schum. f. *fibrigii* Hassl.,
Bombax marginatum (A. St.-Hil., A.
 Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *apaense*
 Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil.,
 A. Juss. & Cambess.) K. Schum. var.
intermedium Hassl., *Bombax marginatum*
 (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K.
 Schum. var. *cuspidatum* Hassl., *Bombax*
paraguayense R.E. Fr., *Pachira marginata*
 A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. f.
arborea Chodat & Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera
 del área del proyecto). PRY(APY, AMA,
 CON, COA, PAI).

Pseudobombax grandiflorum (Cav.)

A. Robyns

Sin.: *Bombax album* (Lodd.)
 Bakh., *Bombax cyathophorum* (Casar.)
 K. Schum., *Bombax grandiflorum* Cav.,
Carolinea alba Lodd., *Pachira commersonii*
 Planch., *Pachira cyathophora* Casar.
 Árbol. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A. Robyns

Sin.: *Bombax cyathophorum* (Casar.)
 K. Schum. var. *latifolium* Hassl.,
Bombax cyathophorum (Casar.) K.
 Schum. var. *longipes* Hassl., *Bombax*
longiflorum (Mart. & Zucc.) K. Schum.
 f. *elegans* (R.E. Fr.) Hassl., *Bombax*
longiflorum (Mart. & Zucc.) K. Schum.
 f. *multifolium* Hassk., *Bombax*
longiflorum (Mart. & Zucc.) K. Schum.,
Carolinea longiflora Mart. & Zucc.,
Pachira longiflora (Mart. & Zucc.) Decne.,
Pachira macrantha A. St.-Hil.
 Árbol. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA).

Pseudobombax majus (A. Robyns)

Carv.-Sobr.

Sin.: *Pseudobombax grandiflorum* (Cav.)
 A. Robyns var. *majus* A. Robyns
 Árbol. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR).

Pseudobombax marginatum (A. St.-

Hil., A. Juss. & Cambess.) A. Robyns

Sin.: *Bombax marginatum* (A. St.-Hil.,
 A. Juss. & Cambess.) K. Schum. subsp.
genuinum Hassl., nom. inval., *Bombax*
marginatum (A. St.-Hil., A. Juss. &

Cambess.) K. Schum., *Pachira marginata*
 A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. f. *fruticosa*
 Chodat & Hassl., p.p., *Pachira marginata*
 A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess., *Pachira*
rufescens A. St.-Hil. & Naudin
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Pseudobombax tomentosum (Mart. & Zucc.) A. Robyns

Sin.: *Bombax martianum* K. Schum.,
Bombax martianum K. Schum. subsp.
guaraniticum Hassl., *Carolinea tomentosa*
 Mart. & Zucc.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del
 proyecto). PRY(APY, AMA, CON, COA).

Rhynchosida Fryxell**Rhynchosida physocalyx** (A. Gray) Fryxell

Sin.: *Physaliastrum physocalyx* (A.
 Gray) Monteiro, *Sida hastata* A. St.-
 Hil., hom. illeg., *Sida hastata* Willd. var.
glabriuscula R.E. Fr., *Sida hastata* Willd.
 var. *tomentosa* R.E. Fr., *Sida inflata*
 Larrañaga, *Sida physocalyx* A. Gray
 Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,
 SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS).
 PRY(APY, BOQ, CON, PHA). URY(COL,
 DUR, MAL, PAY, SOR).

Sida L.**Sida adrianopolitana** Krapov.

Subarbusto. Endémica.
 Países: BRA(PAR).

Sida albiflora (Chodat & Hassl.) Krapov.

Sin.: *Sida anonala* A. St.-Hil. f. *albiflora*
 Chodat & Hassl.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(COA, PAI).

Sida ambatense Krapov.

Subarbusto. Nativa. 900-1200 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Sida anomala A. St.-Hil.

Sin.: *Sida ciliaris* L. var. *anomala* (A.
 St.-Hil.) K. Schum., *Sida ciliaris* L. f.
rubra Kuntze
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
 FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY,
 BOQ, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PHA,
 SPE). URY(PAY).

Sida argentina K. Schum. var. **argentina**

Sin.: *Sida lilloana* Rodrigo
 Hierba. Nativa. 0-2500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(PAI).

Sida argentina K. Schum. var. **tucumanensis** (Lillo) Hassl. ex Rodrigo

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

Sida ascendens A. St.-Hil.

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

Sida bordasiana Krapov.

Arbusto. Endémica.
 Países: PRY(APY).

Sida cabreriana Krapov.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Sida calchaquiensis Rodrigo

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
 Países: ARG(COS, LRI, SAL, SJU, TUC).

Sida caudata A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Sida margaritensis* Hassl., *Sida melanocaulon* Hassl., *Sida tomentella* Miq.
 Nativa. 500-1500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, COA, GUA).

Sida centuriata Clement

Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CAU, CON).

Sida cerradoensis Krapov.

Sin.: *Sida elata* (Hassl.) Hassl., *Sida potentilloides* A. St.-Hil. subsp. *elata* Hassl.
 Hierba. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON, SPE).

Sida charpinii Krapov.

Hierba o subarbusto. Nativa.
 Países: PRY(APY).

Sida ciliaris L.

Hierba. Nativa.
 Países: PRY(APY).

Sida confusa Hassl.

Sin.: *Sida argentina* K. Schum. var. *paraguayensis* Ulbr., *Sida martiana* A. St.-

Hil. f. *latifolia* Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU).

Sida cordifolia L.

Sin.: *Malvastrum cordifolium* Rojas
 Acosta, *Sida altheifolia* Sw., *Sida cordifolia* L. var. *breviaristata* Monteiro, *Sida rotundifolia* Lam.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(PAY, SAO, SJO).

Sida cristobaliana Krapov.

Hierba. Nativa.
 Países: PRY(APY, PHA).

Sida dictyocarpa Griseb. ex K. Schum.

Subarbusto. Nativa. 0-1600 m.
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, PHA). URY(CAS, RIV).

Sida dubia A. St.-Hil. & Naudin

Sin.: *Sida multicrena* Hochr. var. *longearistata* (Hassl.) Hochr.
 Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(CEN). URY(SAO, TAC).

Sida dureana Krapov.

Hierba. Nativa.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

Sida elliotti Torrey & Gray

Subarbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Sida emilei Hochr.

Sin.: *Sida chacoensis* Hassl.
 Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, PAI).

Sida esperanzae R.E. Fr.

Sin.: *Sida dictyocarpa* Griseb. ex K. Schum. var. *esperanzae* (R.E. Fr.) Rodrigo, *Sida glutinosa* Cav. var. *longearistata* Monteiro
 Hierba. Nativa. 0-1600 m.
 Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

Sida farroupilhensis Krapov.

Hierba. Endémica. 800-800 m.
 Países: BRA(RGS).

Sida ferrucciana Krapov.

Hierba. Nativa.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CON, GUA, PAI, SPE).

Sida glaziovii K. Schum.

Subarbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Sida glomerata Cav.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CEN, COA, PAI, SPE).

Sida gracillima Hassl.

Hierba. Endémica. 200 m.
 Países: PRY(CON).

Sida hassleri Hochr.

Sin.: *Sida hassleri* Hochr. var. *brevis* Hochr., *Sida linifolia* Juss. ex Cav. var. *brevis* (Hochr.) Clement, *Sida linifolia* Juss. ex Cav. var. *hassleri* (Hochr.) Hassl.
 Subarbusto. Nativa. 100-500 m.
 Países: PRY(AMA, CAA, CAN, CON).

Sida hatschbachii Krapov.

Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Sida honoriana Krapov.

Subarbusto. Nativa. 100-800 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Sida ignaciana Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS).

Sida jussieana DC.

Sin.: *Anoda decumbens* (A. St.-Hil. & Naudin) Hochr., *Physaliastrum stoloniferum* (Salzm. ex Turcz.) Monteiro, *Sida decumbens* A. St.-Hil. & Naudin, *Sida stolonifera* Salzm. ex Turcz.
 Hierba. Nativa. 300-600 m.
 Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Sida kelleri Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). PRY(AMA).

Sida kranzii Krapov. & R.M. Bueno

Subarbusto. Endémica.
 Países: BRA(PAR).

Sida liliana Krapov.

Subarbusto. Nativa.
 Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Sida linearifolia A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Sida linifolia Juss. ex Cav.

Sin.: *Sida fiebrigii* Ulbr., *Sida linifolia*
Juss. ex Cav. f. *flaviflora* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN,
CON, COA, GUA, PAI).

Sida lonchitis A. St.-Hil. & Naudin

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sida loreтана Krapov.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Sida monteiroi Krapov.

Sin.: *Sida ciliaris* L. f. *flava* Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
SFE). BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, CON, PAI, PHA).

Sida multicrena Hochr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(SOR).

Sida nemorensis Mart. ex Colla

Sin.: *Sida tomentella* Miq. var.
brevicalyx K. Schum.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sida palustris Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Sida paradoxa Rodrigo

Hierba o subarbusto. Endémica.
0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS).

Sida parva Krapov.

Hierba. Endémica. 1200-1300 m.
Países: BRA(SCA).

Sida pedersenii Krapov.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY).

Sida pindapoyensis Krapov.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(MIS).

Sida planicaulis Cav.

Sin.: *Sida acuta* Burm. f. var.

carpinifolia (L. f.) K. Schum., *Sida*

carpinifolia L. f., hom. illeg.

Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sida poeppigiana (K. Schum.) Fryxell

Sin.: *Sida rhombifolia* L. var.
poeppigiana K. Schum.
Subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, LRI, MIS,
SAL, TUC).

Sida potentilloides A. St.-Hil.

Sin.: *Sida anarthra* Ekman, *Sida*
cordifolia L. var. *potentilloides* (A. St.-
Hil.) Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS). PRY(AMA, CEN, PAI). URY(CLA).

Sida pseudocymbalaria (Hassl.) Hassl.

Sin.: *Sida pseudocymbalaria* (Hassl.)
Hassl. var. *parviflora* Hassl., *Sida rubifolia*
A. St.-Hil. subsp. *pseudocymbalaria* Hassl.
Hierba. Endémica. 100-400 m.
Países: PRY(COA, CON).

Sida pseudopotentilloides Monteiro

var. **manresana** Leite & Monteiro
Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Sida pseudorubiflora Krapov. & R.M.

Bueno
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Sida ramoniana Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Sida regnellii R.E. Fr.

Sin.: *Sida cordifolia* L. f. *regnellii* (R.E.
Fr.) Hassl., *Sida multicrena* Hochr. var.
regnellii (R.E. Fr.) Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS). PRY(ITA, PAI).

Sida reitzii Krapov.

Subarbusto. Endémica. 300-500 m.
Países: BRA(SCA).

Sida rhizomatosa Krapov.

Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(MIS).

Sida rhombifolia L.

Sin.: *Sida rhombifolia* L. var. *canariensis*
(Willd.) Griseb., *Sida rhombifolia* L.

var. *rhomboidea* (Roxb.) Mast., *Sida*
rhomboidea Roxb., *Sida subrhombiformis*
Larrañaga

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL,
SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(COQ, IPA). PRY(APY,
BOQ, CON, COA, ÑEE, PHA).
URY(MON, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).

Sida riedelii K. Schum.

Sin.: *Sida spinosa* L. var. *riedelii* (K.
Schum.) Rodrigo
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SDE). BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, GUA, PHA).

Sida rodrigoi Monteiro

Arbusto. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
SAL). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA,
ÑEE, PAI, PHA).

Sida rufescens A. St.-Hil.

Sin.: *Sida urens* L. var. *aurea* Hassl.,
Sida urens L. var. *rufescens* (A. St.-Hil.)
Baker f., *Sida urens* L. f. *warmingiana*
Monteiro
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CON, PAI, SPE).

Sida rupicola Hassl.

Sin.: *Sida rupicola* Hassl. var.
grandiflora Hassl.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR).
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, COA,
PAI, PHA).

Sida salviaefolia C. Presl var.

submutica J.T. Howell
Hierba. Nativa. 200-1000 m.
Países: ARG(SAL).

Sida santaremensis Monteiro

Sin.: *Sida rhombifolia* L. var.
subtomentosa K. Schum., *Sida*
santaremensis Monteiro var.
krapovickasiana Monteiro
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, CAU,
CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Sida saraviae Krapov.

Arbusto. Nativa. 800-2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Sida schumanniana Krapov.

Sin.: *Sida urens* L. var. *grandiflora* K. Schum.

Subarbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Sida setosa Mart. ex Colla

Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Sida spinosa L.

Sin.: *Sida angustifolia* Lam., hom. illeg., *Sida escobilla* Larrañaga, *Sida spinosa* L. var. *angustifolia* (Lam.) Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(AYP, IPA). PRY(APY, COA, GUA, PHA). URY(CAS, MON).

Sida tapiraguensis Krapov.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, SPE).

Sida tressensiae Krapov.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Sida tuberculata R.E. Fr. var. **pseudorhombifolia** Monteiro

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA). URY(SAO).

Sida tuberculata R.E. Fr. var. **tuberculata**

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(PHA).

Sida urens L.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

Sida variegata (Griseb.) Krapov.

Sin.: *Sida cordifolia* L. var. *variegata* Griseb., *Sida montana* K. Schum., hom. illeg.
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ, PHA). URY(SJO).

Sida vespertina Ekman

Sin.: *Sida multicrena* Hochr. var. *vespertina* (Ekman) Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(ITA).

Sida viarum A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Sidastrum Baker f.**Sidastrum micranthum** (A. St.-Hil.)

Fryxell
Sin.: *Sida micrantha* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Sidastrum multiflorum (Jacq.) Fryxell

Sin.: *Sida acuminata* DC., *Sida acuminata* DC. var. *grandiflora* Hassl., *Sida acuminata* DC. var. *rojasii* (Hassl.) Hassl., *Sida candolleana* Monteiro, *Sida multiflora* Jacq., *Sida paniculata* L. var. *compacta* Baker f., *Sida rojasii* Hassl., *Sidastrum acuminatum* (DC.) Fryxell
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, PHA).

Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell

Sin.: *Sida paniculata* L.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR).
PRY(APY, BOQ, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Sphaeralcea A. St.-Hil.**Sphaeralcea australis** Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, RNE).

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb.

Sin.: *Malva bonariensis* Cav., *Malva incana* Godr., hom. illeg., *Malvastrum incanum* (Godr.) Thell., *Sphaeralcea cisplatina* A. St.-Hil. var. *quercifolia* A. St.-Hil., *Sphaeralcea cisplatina* A. St.-Hil. var. *vulgaris* A. St.-Hil., *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *cisplatina* (A. St.-Hil.) K. Schum., *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *rhombifolia* (Griseb.) K. Schum., *Sphaeralcea rhombifolia* Griseb.,

Sphaeroma bonariensis (Cav.) Kuntze var. *cisplatina* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Sphaeroma bonariensis* (Cav.) Kuntze, *Malva bonaerensis* Larrañaga
Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
BRA(RGS). PRY(APY, PHA). URY(COL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Sphaeralcea brevipes (Phil.) Krapov.

Sin.: *Malva brevipes* Phil., *Malva violacea* Phil., *Malvastrum violaceum* (Phil.) Hieron., *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *violacea* (Phil.) Ulbr.
Subarbusto. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).

Sphaeralcea chenopodifolia Rodrigo

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE).

Sphaeralcea cordobensis Krapov.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR, SDE, SLU).

Sphaeralcea crispa Hook. & Baker f.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, LRI, MEN, RNE, SLU).

Sphaeralcea decipiens (A. St.-Hil. & Naudin) Krapov.

Sin.: *Malvastrum nudum* K. Schum., *Sida decipiens* A. St.-Hil. & Naudin, *Malvastrum decipiens* (A. St.-Hil. & Naudin) K. Schum.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CAS, MON).

Sphaeralcea laciniata (K. Schum.) Krapov.

Sin.: *Sphaeralcea bonariensis* (Cav.) Griseb. var. *laciniata* K. Schum.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, SLU, SFE, SDE, TUC).

Sphaeralcea mendocina Phil.

Sin.: *Malva patagonica* Niederl., *Malvastrum wilczekii* Hochr. var. *macrocarpum* Hochr., *Malvastrum wilczekii* Hochr., *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *mendocina* (Phil.) K. Schum., *Sphaeralcea patagonica* (Niederl.) Speg. var. *argentea* Speg., *Sphaeralcea patagonica* (Niederl.) Speg. var. *cinerascens* Speg., *Sphaeralcea*

patagonica (Niederl.) Speg. var. *oxyodonta* Speg., *Sphaeralcea patagonica* (Niederl.) Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).

Sphaeralcea miniata (Cav.) Spach

Sin.: *Malva erodiifolia* C. Presl, *Malva giliiesii* Phil., hom. illeg., *Malva mendocina* Phil., *Malva miniata* Cav., *Malvastrum erodiifolium* (C. Presl) Baker f. ex S.R. Hill, *Sphaeralcea miniata* (Cav.) Spach var. *schickendantzii* Ulbr., *Sphaeroma bonariensis* (Cav.) Kuntze var. *miniatum* (Cav.) Kuntze, *Sphaeroma miniatum* (Cav.) Garcke

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, RNE, SDE, SJU, SLU, TUC).

Sphaeralcea obtusiloba (Hook.) G. Don

Sin.: *Malva asterocarpa* Steud., *Malva berteroniana* Steud., *Malva obtusiloba* Hook., *Sphaeralcea arenaria* Phil., *Sphaeralcea berteroniana* Phil., *Sphaeralcea circinata* Phil., *Sphaeralcea collina* Phil., *Sphaeralcea coquimbana* Phil., *Sphaeralcea floribunda* Phil., *Sphaeralcea gayana* Phil., *Sphaeralcea rupestris* Phil., *Sphaeralcea valparadisea* Phil., *Sphaeralcea vidali* Phil., *Sphaeroma berteroniana* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma collinum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma coquimbarum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma gayanum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma obtusilobum* (Gay) Kuntze, *Sphaeroma rupestre* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma valparadiseum* (Phil.) Kuntze

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, ARA, RME).

Sphaeralcea philippiana Krapov.

Sin.: *Malva prostrata* Phil., hom. illeg., *Malvastrum prostratum* (Phil.) Hieron.
Hierba. Endémica. 2000-3400 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Sphaeralcea purpurata (Lindl.)

Krapov.
Sin.: *Malva belloa* Gay, *Malva campanulata* Paxton, *Malva laeta* Phil., *Malva macropoda* Steud., *Malva polyantha* Steud., *Malva purpurata* Lindl., *Malva purpurea* Gay, *Malva tenuifolia* Hook. & Arn., *Malvastrum belloum* (Gay) A. Gray, *Malvastrum campanulatum* (Paxton) G. Nicholson, *Malvastrum purpuratum* (Lindl.) G. Nicholson,

Malvastrum tenuifolium (Hook. & Arn.) Baker f.

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(BAI). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA).

Sphaeralcea tehuelches (Speg.)

Krapov.
Sin.: *Lecanophora tehuelches* (Speg.) Speg., *Plarodrigoa tehuelches* (Speg.) Looser, *Sida tehuelches* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Spirotheca Ulbr.

Spirotheca rivieri (Decne.) Ulbr. var. **passifloroides** (Cuatrec.) P.E. Gibbs & W.S. Alverson

Sin.: *Spirotheca passifloroides* Cuatrec.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Spirotheca rivieri (Decne.) Ulbr. var. **rivieri**

Sin.: *Ceiba rivierii* (Decne.) K. Schum., *Eriodendron rivierii* Decne., *Xylon rivierii* (Decne.) Kuntze
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Sterculia L.

Sterculia striata A. St.-Hil. & Naudin
Árbol. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA).

Talipariti Fryxell

Talipariti pernambucense (Arruda)

Bovini
Sin.: *Hibiscus pernambucensis* Arruda, *Hibiscus pernambucensis* Bertoni, nom. nud., *Hibiscus tiliaceus* L. subsp. *pernambucensis* (Arruda) A. Cast., *Hibiscus tiliaceus* L. var. *pernambucensis* (Bertoni) I.M. Johnst., comb. illeg., *Talipariti tiliaceum* (L.) Fryxell subsp. *pernambucense* (Arruda) Fryxell
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tarasa Phil.

Tarasa albertii Phil.

Sin.: *Malvastrum alberti* (Phil.) Reiche,

Malvastrum corymbosum Sandwith
Subarbusto. Endémica. 500-2100 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Tarasa antofagastana (Phil.) Krapov.

Sin.: *Malva antofagastana* Phil., *Malvastrum antofagastanum* (Phil.) Baker f., *Malvastrum geranioides* (Cham. & Schltdl.) Hemsl. var. *galanderi* (Kuntze) Seckt, *Malvastrum geranioides* (Cham. & Schltdl.) Hemsl. var. *subsessile* (Kuntze) Seckt, *Malvastrum peruvianum* (L.) A. Gray var. *capitatum* Kurtz ex Kuntze, nom. nud., *Malveopsis antofagastana* (Phil.) Kuntze
Hierba. Nativa. 1500-3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ANT, ATA).

Tarasa capitata (Cav.) D.M. Bates

Sin.: *Malva capitata* Cav., *Malvastrum capitatum* (Cav.) Griseb., *Malvastrum jorgensenii* I.M. Johnst., *Malveopsis capitatum* (Cav.) Kuntze, *Tarasa jorgensenii* (I.M. Johnst.) Krapov.
Arbusto. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Tarasa congestiflora (I.M. Johnst.)

Krapov.
Sin.: *Malvastrum congestiflorum* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 2000-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Tarasa heterophylla (Griseb.) Krapov.

Sin.: *Malvastrum bolivianum* Baker f., *Malvastrum heterophyllum* Griseb., *Malveopsis heterophylla* (Griseb.) Kuntze, *Sphaeralcea heterophylla* (Griseb.) Baker f.
Hierba. Nativa. 1800-3400 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Tarasa humilis (Gillies ex Hook. &

Arn.) Krapov.
Sin.: *Malva humilis* Gillies ex Hook. & Arn., *Malva subacaulis* Phil., *Malvastrum humile* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray, *Malvastrum humile* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray var. *subacaulis* (Phil.) Reiche, *Malvastrum subacaulis* (Phil.) Baker f.
Hierba. Endémica. 900-3300 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Tarasa latearistata Krapov.

Hierba. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(JUU).

Tarasa martiniana Krapov.
Hierba. Endémica. 3000 m.
Países: CHL(ANT).

Tarasa meyeri Krapov.
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Tarasa odonellii Krapov.
Hierba. Nativa. 2600-3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Tarasa operculata (Cav.) Krapov.
Sin.: *Malva operculata* Cav., *Malva plumosa* C. Presl, *Malvastrum operculatum* (Cav.) Hochr., *Malvastrum plumosum* (C. Presl) A. Gray var. *atacamensis* Baker f., *Malvastrum plumosum* (C. Presl) A. Gray, *Tarasa plumosa* (Cav.) Kearney, *Tarasa rahmeri* Phil. var. *atacamensis* (Baker f.) Bruns, *Tarasa rahmeri* Phil.
Subarbusto. Nativa. 1500-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Tarasa pediculata Krapov.
Hierba. Endémica. 1800-3700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Tarasa reichei (Phil.) Krapov.
Sin.: *Malva reichei* Phil., *Sida reichei* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Tarasa tarapacana (Phil.) Krapov.
Sin.: *Malva tarapacana* Phil., *Malvastrum tarapacanum* (Phil.) Baker f.
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Tarasa tenella (Cav.) Krapov.
Sin.: *Malva tenella* Cav., *Malvastrum micranthum* Rusby, hom. illeg., *Malvastrum multicaule* Britton, *Malvastrum pygmaeum* Griseb., hom. illeg., *Malvastrum tenellum* (Cav.) Hieron.
Hierba. Nativa. 2500-3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Tarasa trisecta (Griseb.) Krapov.
Sin.: *Malvastrum peruvianum* (L.) A. Gray var. *trisectum* Griseb.
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Tarasa umbellata Krapov.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(VAL, MAU).

Tarasa urbaniana (Ulbr.) Krapov.
Sin.: *Malvastrum urbanianum* Ulbr.
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(TUC).

Thespesia Sol. ex Corrêa

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa
Sin.: *Hibiscus populneus* L.
Árbol. Nativa.
Países: CHL(IPA).

Luehea Willd.

Luehea candicans Mart.
Sin.: *Luehea uniflora* A. St.-Hil.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR).
PRY(APY, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Luehea conwentzii K. Schum.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(PAR).

Luehea divaricata Mart.
Sin.: *Thespesia brasiliensis* Spreng.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).
URY(ART, CLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

Luehea fiebrigii Burret
Arbolito o árbol. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Luehea grandiflora Mart.
Sin.: *Luehea densiflora* A. St.-Hil., *Luehea laxiflora* A. St.-Hil., *Luehea rufescens* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CON).

Luehea microcarpa R.E. Fr. var. **microcarpa**
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Luehea microcarpa R.E. Fr. var. **polymorpha** Hassl.
Árbol. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(CON).

Luehea paniculata Mart.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).
PRY(AMA, COA).

Tropidococcus Krapov.

Tropidococcus pinnatipartitus (A. St.-Hil. & Naudin) Krapov.
Sin.: *Malva pinnatipartita* A. St.-Hil. & Naudin
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Urena L.

Urena lobata L.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Urocarpidium Ulbr.

Urocarpidium albiflorum Ulbr.
Hierba. Nativa. 2600 m.
Países: CHL(AYP).

Urocarpidium chilensis (A. Braun & C.D. Bouché) Krapov.
Sin.: *Fuertesimalva chilensis* (A. Braun & C.D. Bouché) Fryxell, *Malva chilensis* A. Braun & C.D. Bouché, *Malva scorpioides* Turcz., *Malvastrum hinkleyorum* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 400-2200 m.
Países: CHL(AYP, ANT, ATA, COQ).

Urocarpidium echinatum (C. Presl) Krapov. & Fryxell
Sin.: *Fuertesimalva echinata* (C. Presl) Fryxell, *Malva echinata* C. Presl, *Malvastrum shepardae* I.M. Johnst., *Urocarpidium shepardae* (I.M. Johnst.) Krapov.
Hierba. Nativa. 2000-3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Urocarpidium mathewsii (Turcz.) Krapov.
Sin.: *Malva mathewsii* Turcz.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Urocarpidium pentacoccum Krapov.
Sin.: *Fuertesimalva pentacoca* (Krapov.) Fryxell
Hierba. Nativa. 2900-3100 m.
Países: ARG(CAT).

Urocarpidium pentandrum (K. Schum.) Krapov.
Sin.: *Fuertesimalva pentandra* (K. Schum.) Fryxell, *Malvastrum catamarcense* I.M. Johnston., *Malvastrum pentandrum* K. Schum.
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Urocarpidium peruvianum (L.) Krapov.
Sin.: *Fuertesimalva peruviana* (L.) Fryxell, *Malva peruviana* L., *Malvastrum peruvianum* (L.) A. Gray
Hierba. Nativa. 100-2300 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

Urocarpidium sanambrosianum
D.M. Bates
Sin.: *Fuertesimalva sanambrosiana* (D.M. Bates) Fryxell
Hierba. Endémica. 200-500 m.
Países: CHL(IDE).

Waltheria L.

Waltheria albicans Turcz.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL, SDE). PRY(APY, AMA, PHA).

Waltheria carmensarae J. G. Saunders
Subarbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(COS). PRY(ITA, ÑEE).

Waltheria carpinifolia A. St.-Hil. & Naudin
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Waltheria communis A. St.-Hil.
Sin.: *Waltheria douradinha* A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV).

Waltheria indica L.
Sin.: *Waltheria americana* L., *Waltheria americana* L. var. *indica* (L.) K. Schum.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, IPA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Waltheria macrophylla Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU).

Waltheria operculata Rose
Sin.: *Waltheria excelsa* Turcz. var. *hirsuta* Hassl., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: PRY(APY, CON).

Waltheria ovata Cav.
Arbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: CHL(TAR).

Waltheria procumbens J. G. Saunders & Soria
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(AMA).

Waltheria viscosissima A. St.-Hil.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Wissadula Medik.

Wissadula contravta (Link) R.E. Fr.
Sin.: *Sida contracta* Link
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Wissadula decora S. Moore
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). PRY(PHA).

Wissadula densiflora R.E. Fr. var. **densiflora**
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Wissadula densiflora R.E. Fr. var. **schulzii** R.E. Fr.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA).

Wissadula excelsior (Cav.) C. Presl
Sin.: *Abutilon patens* A. St.-Hil., *Sida excelsior* Cav., *Wissadula patens* (A. St.-Hil.) Garcke
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Wissadula glechomaefolia (A. St.-Hil.) R.E. Fr.

Sin.: *Abutilon glechomoefolium* A. St.-Hil., *Sida glechomoefolia* (A. St.-Hil.) D. Dietr.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(CAS, PAY).

Wissadula gymnanthemum (Griseb.) K. Schum.

Sin.: *Abutilon gymnanthemum* Griseb., *Wissadula conjungens* R.E. Fr., *Wissadula gymnanthemum* (Griseb.) K. Schum. var. *subtomentosa* R.E. Fr.
Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Wissadula hernandioides (L'Hér.) Garcke
Sin.: *Abutilon amplissimum* (L.)

Kuntze var. *subpeltatum* Kuntze, *Sida hernandioides* L'Hér., *Wissadula periplocifolia* (L.) C. Presl ex Griseb. f. *cordata* Chodat & Hassl., *Wissadula periplocifolia* (L.) C. Presl ex Thwaites f. *suborbiculata* Chodat & Hassl., *Wissadula subpeltata* (Kuntze) R.E. Fr.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Wissadula indivisa R.E. Fr.
Arbusto. Nativa.
Países: PRY(CON).

Wissadula krapovickasiana Bovini
Subarbusto. Nativa.
Países: PRY(APY, CON, COA).

Wissadula macrantha R.E. Fr. var. **brevipedunculata** R.E. Fr.
Sin.: *Wissadula grandifolia* Baker f. var. *brevipedunculata* (R.E. Fr.) Shinnery
Arbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: PRY(PAI).

Wissadula macrantha R.E. Fr. var. **macrantha**

Sin.: *Wissadula grandifolia* Baker f. var. *macrantha* (R.E. Fr.) Shinnery
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON, PHA).

Wissadula paraguariensis Chodat

Sin.: *Wissadula oligomera* Chodat, *Wissadula periplocifolia* Griseb. f. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Wissadula periplocifolia* C. Presl var. *genuina* Hochr., *Wissadula periplocifolia* C. Presl f. *transiens* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA).

Wissadula parviflora (A. St.-Hil.) R.E. Fr.

Sin.: *Abutilon parviflorum* A. St.-Hil.,
Abutilon parviflorum A. St.-Hil. var. *lutea*
A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Wissadula periplocifolia (L.) C. Presl

Sin.: *Sida periplocifolia* L.
Subarbusto. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Wissadula setifera Krapov.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(APY).

Wissadula tucumanensis R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SDE, TUC).

Wissadula wissadifolia (Griseb.)

Krapov.
Sin.: *Abutilon wissadifolium* Griseb.,
Wissadula grisebachii R.E. Fr.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

MARANTACEAE

Ctenanthe Eichler**Ctenanthe casupoides** Petersen

Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ctenanthe compressa (A. Dietr.) Eichler

Sin.: *Maranta compressa* A. Dietr.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ctenanthe glabra (Körn.) Eichler

Sin.: *Maranta glabra* Körn.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ctenanthe lanceolata Petersen

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ctenanthe lubbersiana (E. Morren)

Eichler ex Petersen
Sin.: *Stromanthe lubbersiana* E. Morren
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ctenanthe luschnathiana (Regel & Körn.) Eichler

Sin.: *Maranta luschnathiana* Regel & Körn.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ctenanthe marantifolia (Vell.) J.M.A.

Braga & H. Gomes
Sin.: *Thalia marantifolia* Vell.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ctenanthe muelleri Petersen

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAA).

Ctenanthe oppenheimiana (E.

Morren) K. Schum.
Sin.: *Calathea oppenheimiana* E. Morren
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ctenanthe setosa Eichler

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Goepertia Ness**Goepertia aemula** (Körn.) Borchs. & S. Suárez

Sin.: *Calathea aemula* Körn.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Goepertia cylindrica (Roscoe)

Borchs. & S. Suárez
Sin.: *Phrynium cylindricum* Roscoe
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Goepertia eichleri (Petersen) Borchs. & S. Suárez

Sin.: *Calathea eichleri* Petersen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(CAN).

Goepertia flavescens (Lindl.) Borchs. & S. Suárez

Sin.: *Calathea grandiflora* (Roscoe)
K.Schum., *Calathea flavescens* Lindl.,
Phrynium grandiflorum Roscoe
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Goepertia joffilyana (J.M.A. Braga)

Borchs. & S. Suárez
Sin.: *Calathea joffilyana* J.M.A. Braga
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Goepertia longibracteata (Sweet)

Borchs. & S. Suárez
Sin.: *Calathea longibracteata* (Sweet)
Lindl., *Phrynium longibracteata* Sweet
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Goepertia monophylla (Vell.)

Borchs. & S. Suárez
Sin.: *Calathea communis* Wand. & S.
Vieira, *Calathea monophylla* (Vell.) Körn.,
Maranta monophylla Vell.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Goepertia prolifera (Vell.) Borchs. & S. Suárez

Sin.: *Maranta prolifera* Vell.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Goepertia sellowii (Körn.) Borchs. & S. Suárez

Sin.: *Calathea sellowii* Körn.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR)

Goepertia zebrina (Sims) Nees

Sin.: *Calathea zebrina* (Sims) Lindl.,
Maranta zebrina Sims
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ischnosiphon Körn.**Ischnosiphon ovatus** Körn.

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Maranta L.**Maranta arundinacea** L.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Maranta divaricata Roscoe

Sin.: *Maranta arundinacea* L. var.
divaricata (Roscoe) Hauman, *Maranta*
divaricata Roscoe var. *genuina* Körn., nom.
inval., *Maranta divaricata* Roscoe var.
purpurascens (Link ex A. Dietr.) Körn.,
Maranta purpurascens Link ex A. Dietr.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, PAI, SPE).

Maranta sobolifera L. Andersson

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE,
PAI, SPE).

Saranthe (Regel & Körn.)
Eichler**Saranthe eichleri** Petersen

Sin.: *Ctenanthe casupoides* Petersen
var. *subtropicalis* Hauman
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, CAN).

Saranthe leptostachya (Regel &
Körn.) Eichler

Sin.: *Maranta leptostachya* Regel & Körn.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Saranthe ustulata Petersen

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(SCA).

Stromanthe Sond.**Stromanthe boliviana** K. Schum.

Hierba. Nativa. 300-1400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Stromanthe glabra Yosh.-Arns

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Stromanthe papillosa Petersen

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Stromanthe thalia (Vell.) J.M.A. Braga

Sin.: *Heliconia thalia* Vell.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler

Sin.: *Maranta tonckat* Aubl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Thalia L.**Thalia geniculata** L.

Sin.: *Maranta geniculata* (L.) Lam.,
Thalia geniculata L. var. *pubescens* Körn.,
Thalia trichocalyx Gagnep.
Hierba palustre. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN,
CHO, CON, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(ART, CLA, RIV, SAO, SOR).

Thalia multiflora Horkel ex Körn.

Sin.: *Calathea macrostachya* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ,
PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, ROC,
SAO, TYT).

MARCGRAVIACEAE

Marcgravia L.

Marcgravia polyantha Delpino
Liana. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Norantea Aubl.**Norantea goyazensis** Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Norantea guianensis Aubl. subsp.
guianensis

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Norantea guianensis Aubl. subsp.
japurensis (Mart.) Bedell

Sin.: *Norantea japurensis* Mart.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Schwartzia Vell.**Schwartzia brasiliensis** (Choisy)

Bedell ex Giraldo-Cañas
Sin.: *Norantea brasiliensis* Choisy
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

MARTYNIACEAE

Craniolaria L.**Craniolaria integrifolia** Cham.

Sin.: *Craniolaria argentina* Speg.,
Craniolaria integrifolia Cham. f. *longiflora*
Chodat & Hassl., *Martynia integrifolia*
(Cham.) Steud.
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(CAT, COS, ERI, FOR,
JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE,
TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, BOQ, CEN, COA, PAI, PHA).
URY(RNO).

Ibicella (Stapf) Veldkamp**Ibicella lutea** (Lindl.) Van Eselt.

Sin.: *Martynia lutea* Lindl., *Martynia*
montevidensis Cham., *Proboscidea lutea*
(Lindl.) Stapf
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU,
SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA).
PRY(APY, GUA). URY(ART, MON, SJO).

Ibicella parodii Abbiatti

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ,
LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

MAYACACEAE

Mayaca Aubl.**Mayaca fluviatilis** Aubl. f.

Sin.: *Mayaca aubletii* Michx., *Mayaca*
caroliniana Gand., *Mayaca vandellii*
Schott & Endl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR,
SCA). PRY(CAU, CAN, CON, GUA, MIE,
ÑEE, PAI).

Mayaca kunthii Seub.

Sin.: *Mayaca fluviatilis* Aubl. f. *kunthii*
(Seub.) Lourteig
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(RIV).

Mayaca sellowiana Kunth

Sin.: *Mayaca boliviana* Rusby
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI,
SPE). URY(RIV, TAC).

MAZACEAE

Mazus Lour.**Mazus japonicus** (Thunb.) Kuntze

Sin.: *Lindernia japonica* Thunb.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(BAI, TUC). BRA(PAR, SCA).

MELASTOMATACEAE

Aciotis D. Don

Aciotis paludosa (Mart. ex DC.) Triana
Sin.: *Rhexia herbacea* Raddi, *Spennera paludosa* Mart. ex DC.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Acisanthera P. Browne

Acisanthera alata Cogn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Acisanthera alsinaefolia (DC.) Triana
Sin.: *Acisanthera alsinaefolia* (DC.) Triana var. *glazioviana* Cogn., *Acisanthera alsinaefolia* (DC.) Triana var. *parvifolia* Cogn., *Microlicia alsinaefolia* DC., *Uranthera alsinaefolia* (DC.) Naudin
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Acisanthera paraguayensis (Hook. f.) Cogn.
Sin.: *Cambessedesia paraguayensis* Hook. f.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, PAI).

Acisanthera uniflora (Vahl) Gleason
Sin.: *Rhexia uniflora* Vahl
Hierba o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Acisanthera variabilis (DC.) Triana
Sin.: *Microlicia variabilis* DC., *Uranthera variabilis* (DC.) Naudin
Subarbusto. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Behuria Cham.

Behuria insignis Cham.
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Bertolonia Raddi, nom. cons.

Bertolonia acuminata Gardner
Sin.: *Bertolonia raulinoi* Brade
Subarbusto. Nativa. 200-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Bertolonia leuzeana (Bonpl.) DC.
Sin.: *Rhexia leuzeana* Bonpl.
Arbusto. Nativa. 1000-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Bertolonia mosenii Cogn.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Bertolonia paranaensis (Wurdack) Baumgratz
Sin.: *Bertolonia acuminata* Gardner subsp. *paranaensis* Wurdack
Subarbusto. Endémica. 100-700 m.
Países: BRA(PAR).

Brachyotum (A. DC.) Triana

Brachyotum microdon (Naudin) Triana
Sin.: *Chaetogastra microdon* Naudin, *Persicaria paraguayensis* (Wedd.) S.T. Kim & Donoghue
Arbusto. Nativa. 1500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Cambessedesia DC., nom. cons.

Cambessedesia espora (A. St.-Hil. ex Bonpl.) DC. subsp. **espora**
Sin.: *Rhexia espora* A. St.-Hil. ex Bonpl.
Hierba o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cambessedesia espora DC. subsp. **ilicifolia** (Schrank & Mart. ex DC.) A.B. Martins
Sin.: *Cambessedesia espora* DC. var. *ilicifolia* Schrank & Mart. ex DC.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cambessedesia hilariana (Kunth) DC.
Sin.: *Rhexia hilariana* Kunth
Subarbusto. Nativa. 800 m.
Países: BRA(PAR).

Chaetogastra DC.

Chaetogastra cordeiroi F.S. Mey. & R. Goldenb.
Subarbusto. Endémica. 800-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Chaetogastra crassifolia F.S. Mey. & R. Goldenb.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Chaetogastra cristaensis F.S. Mey. & R. Goldenb.
Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Chaetogastra debilis Cham.
Sin.: *Pleroma debile* (Cham.) Triana, *Tibouchina debilis* (Cham.) Cogn.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS).

Chaetogastra gracilis (Bonpl.) DC.
Sin.: *Chaetogastra fraterna* DC., *Chaetogastra hirsuta* DC., *Lasiandra gracilis* (Bonpl.) Naudin, *Lasiandra hirsuta* (DC.) Naudin, *Pleroma gracile* (Bonpl.) A. Gray, *Pleroma pulchellum* Griseb., *Pleroma pulchrum* Griseb., hom. illeg., *Rhexia agrostemma* Mart. & Schrad. ex DC., nom. nud., *Rhexia gracilis* Bonpl., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *australis* Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *chamissonana* Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *paucisetosa* Cogn., *Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn. var. *robusta* Cogn.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(CLA, TAC, TYT).

Chaetogastra riograndensis F.S. Mey.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Chaetostoma DC.

Chaetostoma armatum (Spreng.) Cogn.
Sin.: *Chaetostoma pungens* DC., *Rhexia armata* Spreng.
Subarbusto. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR).

Clidemia D. Don

Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don
Sin.: *Clidemia neglecta* D. Don, *Clidemia neglecta* D. Don var. *angustifolia* Cogn., *Melastoma capitellata* Bonpl.
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Clidemia hirta (L.) D. Don
Sin.: *Melastoma hirta* L.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, COA).

Desmoscelis Naudin**Desmoscelis villosa** (Aubl.) NaudinSin.: *Melastoma villosum* Aubl.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Países: PRY(AMA).

Henriettea DC.**Henriettea glabra** (Vell.) Penneys,

Michelangeli, Judd & Almeda

Sin.: *Melastoma glabrum* Vell.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Heterocentron Hook. & Arn.**Heterocentron subtriplinervium**

(Link & Otto) A. Braun & C.D. Bouché

Sin.: *Melastoma subtriplinervium* Link

& Otto

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Huberia DC.**Huberia semiserrata** DC.

Subarbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lavoisiera DC.**Lavoisiera imbricata** DC.Sin.: *Lavoisiera phyllocalycina* Cogn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Lavoisiera pulchella Cham.

Subarbusto. Nativa. 800-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Leandra Raddi**Leandra angustifolia** DC.Sin.: *Leandra corcovadensis* Raddi,*Ossaea angustifolia* (DC.) Triana

Arbusto. Nativa. 200-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra cordigera (Triana) Cogn. var.**transiens** Wurdack

Arbusto. Endémica. 1200 m.

Países: BRA(SCA).

Leandra eriocalyx Cogn.Sin.: *Leandra laxa* Cogn.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Leandra humilis (Cogn.) WurdackSin.: *Leandra humilis* (Cogn.) Wurdackvar. *glabrata* (Cogn.) Wurdack, *Ossaea**humilis* Cogn. var. *glabrata* Cogn., *Ossaea**humilis* Cogn.

Arbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Leandra miconiastrum (Naudin) Cogn.Sin.: *Clidemia miconiastrum* Naudin

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Leandra salicina (DC.) Cogn.Sin.: *Leandra parvifolia* Cogn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 700-800 m.

Países: BRA(PAR).

Leandra strigilliflora (Naudin) Cogn.var. **australis** Cogn.

Arbusto. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Leandra strigilliflora (Naudin) Cogn.var. **strigilliflora**Sin.: *Clidemia strigilliflora* Naudin

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Leandra ulaei Cogn.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Macairea DC.**Macairea adenostemon** DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, PAI).

Marcetia DC.**Marcetia taxifolia** (A. St.-Hil.) DC.Sin.: *Rhexia taxifolia* A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Miconia Ruiz & Pav., nom. cons.**Miconia acutiflora** (Naudin) R.

Goldenb.

Sin.: *Clidemia acutiflora* Naudin,*Clidemia pickeringii* A. Gray, *Leandra**acutiflora* (Naudin) Cogn., *Leandra**membranifolia* Cogn., *Leandra nutans*Cogn. var. *robertii* Brade, *Oxymeris**pickeringii* (A. Gray) Triana, *Oxymeris**widgrenii* Triana

Arbusto. Nativa. 200-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia albicans (Sw.) Steud.Sin.: *Melastoma albicans* Sw.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, PAI).

Miconia alterninervia (Cogn.) R.

Goldenb.

Sin.: *Leandra alterninervia* Cogn.,*Leandra balduinii* Brade, *Leandra**pustulata* Cogn., *Leandra regnellii*(Triana) Cogn., *Leandra schenckii* Cogn.,*Oxymeris regnellii* Triana

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia amambayensis Kraenzl.

Arbusto. Endémica. 200-500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Miconia amygdaloides (DC.) R.

Goldenb.

Sin.: *Clidemia amygdaloides* DC.,*Clidemia brachystachya* DC., *Ossaea**amygdaloides* (DC.) Triana, *Ossaea**brachystachya* (DC.) Triana

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Miconia auricoma (Spring ex Mart.) R.

Goldenb.

Sin.: *Clidemia aurea* Cham., *Leandra**aurea* (Cham.) Cogn., *Leandra auricoma*

Spring ex Mart.

Arbusto. Nativa. 500-1700 m.

Países: BRA(PAR).

Miconia australis (Cham.) R. Goldenb.Sin.: *Clidemia australis* Cham.,*Oxymeris australis* (Cham.) Triana,*Clidemia phaeotricha* Naudin, *Leandra**atropurpurea* Cogn., *Leandra australis*(Cham.) Cogn., *Leandra australis*(Cham.) Cogn. var. *angustifolia* Cogn.,*Leandra australis* (Cham.) Cogn. var.*phaeotricha* (Naudin) Cogn.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA). URY(ART, CLA).

- Miconia balansae** (Cogn.) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra balansae* Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(SCA).
PRY(APA, CAU, CAA, CEN, PAI).
- Miconia biserrata** (DC.) Michelangeli
Sin.: *Clidemia biserrata* DC.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA).
- Miconia blepharodes** (DC.) R. Goldenb.
Sin.: *Adelobotrys lindenii* Naudin,
Clidemia blepharodes DC., *Clidemia scandens* Gardner, *Melastoma coccinea* Vell., *Pleiochiton blepharodes* (DC.) R. Goldenb. & Baumgratz, *Staphidium blepharodes* (DC.) Wawra
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia brasiliensis** (Spreng.) Triana
Sin.: *Melastoma brasiliense* Spreng.
Arbolito. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).
- Miconia brunnea** DC.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia budlejoides** Triana
Árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia bullosa** (DC.) Michelangeli
Sin.: *Clidemia bullosa* DC.
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
- Miconia cabucu** Hoehne
Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia calvescens** DC.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CON, COA, PAI).
- Miconia camporum** (Brade) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra camporum* Brade
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).
- Miconia catharinensis** (Cogn.) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra catharinensis* Cogn.,
Ossaea ramboi Brade
Arbusto. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Miconia chaetodonta** R. Goldenb. & Michelangeli
Sin.: *Clidemia chaetodon* (DC.) Naudin,
Leandra chaetodon (DC.) Cogn., *Spennera chaetodon* DC.
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(AMA).
- Miconia chamissois** Naudin
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR).
PRY(CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).
- Miconia chartacea** Triana
Sin.: *Miconia chartacea* Triana var.
miqueliana Cogn.
Arbolito. Nativa. 400-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia ciliolata** (Cogn.) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra ciliolata* Cogn., *Leandra laevigata* (Triana) Cogn., *Oxymeris laevigata* Triana
Arbolito. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Miconia cinerascens** Miq.
Sin.: *Miconia cinerascens* Miq. var.
robusta Wurdack, *Miconia paulensis* Naudin
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, PAI).
- Miconia cinnamomifolia** (DC.) Naudin
Sin.: *Cremanium cinnamomifolium* DC.,
Miconia candolleana Triana, hom. illeg.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia collatata** Wurdack
Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, COA, GUA).
- Miconia cordigera** (Triana) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra cordigera* (Triana) Cogn.
var. *cordigera*, *Oxymeris cordigera* Triana
Arbusto. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia cubatanensis** Hoehne
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Miconia dasytricha** (A. Gray) R. Goldenb.
Sin.: *Clidemia dasytricha* A. Gray,
Leandra dasytricha (A. Gray) Cogn.,
Leandra variabilis Raddi
Arbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Miconia discolor** DC.
Sin.: *Miconia discolor* DC. var.
subconcolor Cogn., *Miconia kleinii* Brade
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, APY, CAA, CAN).
- Miconia dodecandra** (Desr.) Cogn.
Sin.: *Melastoma dodecandra* Desr.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Miconia dolichostachya** (Naudin) R. Goldenb.
Sin.: *Clidemia dolichostachya* Naudin,
Leandra glabrata (Bunbury) Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Miconia dubia** (DC.) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra bergiana* Cogn., *Leandra dubia* DC., *Leandra hirta* Raddi, *Oxymeris dubia* (DC.) Triana
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia dusenii** (Cogn.) R. Goldenb.
Sin.: *Leandra dusenii* Brade, *Leandra microphylla* Cogn.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Miconia ebracteata** (Triana) R. Goldenb.
Sin.: *Pleiochiton ebracteatum* Triana
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia eichleri** Cogn.
Arbolito. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Miconia erostrata** (DC.) R. Goldenb.
Sin.: *Clidemia erostrata* DC., *Oxymeris erostrata* (DC.) Triana, *Clidemia weddellii* Naudin, *Leandra erostrata* (DC.) Cogn.
var. *erostrata*, *Leandra erostrata* (DC.) Cogn. var. *minor* Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).
- Miconia fasciculata** Gardner
Sin.: *Miconia fasciculata* Gardner
subsp. *catharinensis* Wurdack
Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia fastigiata (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra fastigiata* Cogn.
Subarbusto. Nativa. 600-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Miconia flammea Casar.

Sin.: *Miconia flammea* Casar. var. *major* Cogn.
Árbol. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(SCA).

Miconia hatschbachii (Brade) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra hatschbachii* Brade
Arbolito. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Miconia herincquiana (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra herincquiana* Cogn.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU).

Miconia horrida (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra horrida* Cogn., *Leandra horrida* Cogn. var. *reitzii* Brade
Subarbusto. Endémica. 300-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia hyemalis A. St.-Hil. & Naudin

Árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(ART, RIV).

Miconia ibaguensis (Bonpl.) Triana

Sin.: *Melastoma ibaguense* Bonpl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(SPE).

Miconia inaequidens Naudin

Sin.: *Cremanium inaequidens* DC.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Miconia inconspicua Miq.

Sin.: *Miconia excelsa* A. St.-Hil. ex Triana
Arbusto o árbol. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia ioneura Griseb.

Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Miconia ionopogon (Mart.) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia renggeri* Steud., *Leandra ionopogon* (Mart.) Cogn., *Tschudya ionopogon* Mart.
Arbolito. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia itatiaiae (Wawra) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra itatiaiae* (Wawra) Cogn.,
Oxymeris itatiaiae Wawra
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia jucunda (DC.) Triana

Sin.: *Jucunda olfersiana* Cham.,
Miconia jucunda (DC.) Triana var.
olfersiana (Cham.) Cogn., *Osbeckia jucunda* DC.
Arbolito. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia lacunosa (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra lacunosa* Cogn.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(COA).

Miconia lagunensis Ule

Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Miconia latecrenata (DC.) Naudin

Sin.: *Cremanium latecrenatum* DC.
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Miconia leacalvescens R. Goldenb.

Sin.: *Leandra calvescens* Cogn.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia leaconfusa R. Goldenb.

Sin.: *Leandra confusa* Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Miconia leacordifolia R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia cordifolia* Naudin,
Leandra cardiophylla Cogn., *Leandra cordifolia* (Naudin) Cogn., *Leandra urbaniana* Cogn.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia leacrenata R. Goldenb. &

Michelangeli
Sin.: *Clidemia crenata* D. Don, *Clidemia lambertiana* DC., *Clidemia lutescens* Naudin, *Leandra crenata* (D. Don) Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, COA, PAI).

Miconia leacuneata R. Goldenb.

Sin.: *Ossaea cuneata* Cogn.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Miconia leadebilis R. Goldenb.

Sin.: *Leandra debilis* (Triana) Cogn.,
Oxymeris debilis Triana
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia leadispar R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia dispar* Gardner, *Leandra dispar* (Gardner) Cogn.
Subarbusto. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Miconia leaechinata R. Goldenb.

Sin.: *Leandra echinata* Cogn.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia leaeichleri R. Goldenb.

Sin.: *Leandra eichleri* Cogn.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Miconia leafallax R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia fallax* Cham., *Leandra fallax* (Cham.) Cogn., *Oxymeris fallax* (Cham.) Triana
Arbusto. Nativa. 200-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia leafoveolata R. Goldenb.

Sin.: *Leandra foveolata* (DC.) Cogn.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Miconia leafragilis R. Goldenb.

Sin.: *Ossaea fragilis* Cogn., *Ossaea kleinii* Brade
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Miconia leagracilis R. Goldenb.

Sin.: *Leandra gracilis* Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia leahirtella R. Goldenb.

Sin.: *Leandra hirtella* Cogn.
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia leamarginata R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia marginata* (Desr.) DC., *Melastoma marginata* Desr., *Ossaea marginata* (Desr.) Triana, *Ossaea sanguinea* Cogn. var. *viridifolia* Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

Miconia leapallida R. Goldenb.

Sin.: *Leandra pallida* Cogn. var. *brevifolia* Cogn., *Leandra pallida* Cogn. var. *pallida*

Subarbusto. Nativa. 1400-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia learamboi R. Goldenb.

Sin.: *Leandra ramboi* Brade
Arbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Miconia leasanguinea R. Goldenb.

Sin.: *Ossaea sanguinea* Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia ligustroides (DC.) Naudin

Sin.: *Cremanium ligustroides* DC.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia longicuspis Cogn.

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia luctatoris (Wurdack) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra luctatoris* Wurdack
Arbolito. Endémica. 1200-1600 m.
Países: BRA(SCA).

Miconia lymanii Wurdack

Arbolito. Nativa. 300-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia macropora (Triana) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra macropora* Cogn.
Subarbusto. Endémica. 1500 m.
Países: BRA(SCA).

Miconia melastomoides (Raddi) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra fragilis* Cogn., *Leandra melastomoides* Raddi, *Leandra scabra* DC.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia meridionalis (Souza) R. Goldenb.

Sin.: *Ossaea meridionalis* Souza
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Miconia microstachya (Naudin) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia microstachya* Naudin, *Clidemia purpurascens* DC., *Leandra purpurascens* (DC.) Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia molybdaea Naudin

Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Miconia neglecta (Brade) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra neglecta* Brade
Arbusto o subarbusto. Endémica.
0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia neourceolata Michelangeli

Sin.: *Clidemia urceolata* DC.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia niederleinii (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra niederleinii* Cogn.
Hierba. Endémica. 300-500 m.
Países: ARG(MIS).

Miconia oocarpa (A. Gray) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia multiplinervis* Cogn., *Clidemia oocarpa* A. Gray, *Leandra longisetosa* Cogn., *Leandra multiplinervis* (Naudin) Cogn.
Arbusto. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR).

Miconia opaca (Brade) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra opaca* Brade
Arbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(RGS).

Miconia paniculata (DC.) Naudin

Sin.: *Cremanium paniculatum* DC., *Miconia doriana* Cogn.
Arbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia paraguayensis Cogn.

Sin.: *Miconia paraguayensis* Cogn. var. *angustifolia* Cogn.
Arbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Miconia paucidens DC.

Sin.: *Miconia langsdorffii* Cogn.
Arbusto o árbol. Nativa. 200-400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, SPE).

Miconia pectinata (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra amplexicaulis* DC., *Leandra longistyla* Cogn., *Leandra pectinata* Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia petropolitana Cogn.

Sin.: *Miconia inconspicua* Miq. var. *glabrata* Wurdack
Arbusto o árbol. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Miconia pilonensis (Wurdack) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra pilonensis* Wurdack
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia planifilamentosa (Brade) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra kleinii* Brade, *Leandra planifilamentosa* Brade
Arbusto o arbolito. Endémica. 600-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia pleioglazioviana R. Goldenb.

Sin.: *Pleiochiton glaziovianum* Cogn.
Arbolito. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia polystachya (Naudin) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia polystachya* Naudin, *Leandra polystachya* (Naudin) Cogn., *Oxymeris polystachya* (Naudin) Triana
Arbusto o subarbusto. Nativa. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia prasina (Sw.) DC.

Sin.: *Melastoma prasina* Sw., *Miconia attenuata* DC., *Miconia prasina* (Sw.) DC. var. *attenuata* (DC.) Cogn.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Miconia pubistyla (Wurdack) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra glazioviana* Cogn., *Leandra melastomoides* Raddi var. *paulina* Cogn., *Leandra pubistyla* Wurdack, *Leandra scabra* DC. var. *luederwaldtii* Hoehne
Arbusto. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia purpureovillosa (Hoehne) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra navicularis* Brade, *Leandra purpureovillosa* Hoehne
Arbusto. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin

Sin.: *Cremanium pusilliflorum* DC.,
Melastoma hymenonervia Raddi,
Miconia gardneriana Naudin, *Miconia*
hymenonervia (Raddi) Cogn., *Miconia*
rigidiuscula Cogn.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA).

Miconia quinquedentata (DC.) R.

Goldenb.
Sin.: *Clidemia quinquedentata* (DC.)
Naudin, *Leandra quinquedentata* (DC.)
Cogn., *Oxymeris quinquedentata* DC.
Arbusto. Nativa. 900-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia racemifera (DC.) Triana

Sin.: *Leandra racemifera* DC.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Miconia raddii R. Goldenb.

Sin.: *Leandra sericea* DC.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Miconia ramboi Brade

Arbolito. Endémica. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia refracta (Cogn.) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra refracta* Cogn.
Arbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia reitzii (Wurdack) R. Goldenb.

Sin.: *Leandra reitzii* Wurdack
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,
CEN, COA, PAI).

Miconia reversa (DC.) G. Ocampo & Almeda

Sin.: *Clidemia reversa* DC., *Leandra*
reversa (DC.) Cogn.
Arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia riograndensis (Brade) R.

Goldenb.
Sin.: *Leandra riograndensis* (Brade)
Wurdack, *Ossaea riograndensis* Brade
Arbusto. Endémica. 300-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia rubella (Raddi) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia althaeoides* Naudin,
Clidemia confertiflora DC., *Ossaea*

confertiflora (DC.) Triana, *Leandra*
rubella Raddi

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia sabiaensis (Brade) R.

Goldenb.
Sin.: *Leandra sabiaensis* Brade
Arbusto. Endémica. 600-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia sellowiana Naudin

Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia simplicicaulis (Naudin) R.

Goldenb.
Sin.: *Clidemia simplicicaulis* Naudin,
Leandra simplicicaulis (Naudin) Cogn.
Hierba. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia splendens (Sw.) Griseb.

Sin.: *Melastoma splendens* Sw.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Miconia staminea (Desr.) DC.

Sin.: *Melastoma staminea* Desr.,
Miconia staminea (Desr.) DC. var.
parviflora Cogn.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del
área del proyecto). PRY(APY, CAN, CEN,
GUA, PAI, SPE).

Miconia stenostachya DC.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Miconia sublanata (Cogn.) R.

Goldenb.
Sin.: *Leandra carassana* (DC.) Cogn.,
Leandra sublanata Cogn.
Arbolito. Nativa. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miconia sulfurea (Naudin) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia sulfurea* Naudin,
Leandra sulfurea (Naudin) Cogn.
Arbolito. Nativa. 1200-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia tetraquetra (Cham.) R.

Goldenb.
Sin.: *Leandra tetraquetra* (Cham.) Cogn.
Arbusto o arbolito. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia theizans (Bonpl.) Cogn.

Sin.: *Melastoma theizans* Bonpl.,
Miconia theizans (Bonpl.) Cogn. subsp.
flavescens Cogn.
Arbusto. Nativa. 100-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,
CAN, PAI).

Miconia trauninensis (Cogn.) R.

Goldenb.
Sin.: *Leandra barbinervis* (Cham. ex
Triana) Cogn., *Leandra trauninensis* Cogn.,
Oxymeris barbinervis Cham. ex Triana
Arbolito. Nativa. 600-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia tristis Spring

Sin.: *Miconia tristis* Spring subsp.
australis Wurdack
Arbolito. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Miconia valtheri Naudin

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Miconia willdenowii Naudin

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Miconia xanthocoma (Naudin) R. Goldenb.

Sin.: *Clidemia xanthocoma* Naudin,
Leandra erinacea Cogn., *Leandra*
xanthocoma (Naudin) Cogn. var.
grandifolia Cogn., *Leandra xanthocoma*
(Naudin) Cogn., *Oxymeris xanthocoma*
(Naudin) Triana
Arbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAN).

Miconia xanthostachya (Cogn.) R.

Goldenb.
Sin.: *Leandra xanthostachya* Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Microlicia D. Don**Microlicia myrtoidea** Cham.

Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Mouriri Aubl.**Mouriri brevipes** Hook.

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mouriri chamissoana Cogn.
Arbolito. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ossaea DC.

Ossaea flaccida Brade
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Pleroma D. Don

Pleroma caissara F.S. Mey.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pleroma guartelaensis F.S. Mey. & R.
Goldenb.
Arbusto. Nativa. 900-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Pleroma oleifolia (DC.) R. Romero &
Versiane
Sin.: *Microlepis oleifolia* (DC.) Triana
Arbusto a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Pleroma setosociliatum (Cogn.) F.S.
Mey. & F.B. Matos
Sin.: *Tibouchina setosociliata* Cogn.
Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pterolepis (DC.) Miq., nom. cons.

Pterolepis buraeavii Cogn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(PAI).

Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq.
Sin.: *Arthrostemma brachyandrum*
Cham., *Pterolepis glomerata* (Rottb.)
Miq. var. *brachyandra* (Cham.) Cogn.,
Rhexia glomerata Rottb.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, PHA).

Pterolepis repanda (DC.) Triana
Sin.: *Chaetogastra repanda* (DC.)
Mart., *Osbeckia repanda* DC., *Pterolepis*
balansaei Cogn. var. *elatior* Cogn.,
Pterolepis balansaei Cogn. var. *latifolia*
Cogn., *Pterolepis balansaei* Cogn.,
Pterolepis herincquiiana Cogn.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(Fuera
del área del proyecto). PRY(AMA, CAU,
CAN, COA, PAI, PHA).

Rhynchanthera DC., nom. cons.

Rhynchanthera brachyrhyncha
Cham.
Sin.: *Rhynchanthera brachyrhyncha*
Cham. var. *catharinensis* Brade,
Rhynchanthera kleinii Brade,
Rhynchanthera reitzii Brade
Subarbusto. Nativa. 700-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rhynchanthera cordata DC.
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

Rhynchanthera dichotoma (Desr.) DC.
Sin.: *Melastoma dichotoma* Desr.
Subarbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Rhynchanthera hassleriana Kraenzl.
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(AMA).

Rhynchanthera novemnervia DC.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, COA, PAI).

Rhynchanthera rosea Cogn.
Subarbusto. Endémica. 100-200 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAA, CAN,
CEN, COA, GUA, MIE).

Rhynchanthera secundiflora Naudin
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(Desconocida).

Rhynchanthera ternata Cogn.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU).

Rhynchanthera verbenoides Cham.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera
del área del proyecto). PRY(CAA, CAN,
CEN, COA, GUA, MIE, PAI).

Salpinga Mart. ex DC.

Salpinga margaritacea (Naudin) Triana
Sin.: *Bertolonia margaritacea* Naudin,
Bertolonia ulaei Cogn.
Subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Siphanthera Pohl ex DC.

Siphanthera cordata Pohl ex DC.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina Aubl.

Tibouchina alpestris Cogn.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-
1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Tibouchina asperior (Cham.) Cogn.
Sin.: *Lasiandra asperior* Cham.,
Pleroma asperior (Cham.) Triana
Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Tibouchina cerastifolia (Naudin) Cogn.
Sin.: *Arthrostemma cerastifolium*
DC. ex Naudin, nom. nud., *Pterolepis*
cerastifolia (Naudin) Triana, *Tetrameris*
ceratifolia Naudin
Subarbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(RNO, SOR).

Tibouchina chamissoana Cogn.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina cisplatensis Cogn.
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Tibouchina clavata (Pers.) Wurdack
Sin.: *Melastoma clavata* Pers.
Arbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tibouchina clinopodifolia (DC.) Cogn.
Sin.: *Chaetogastra clinopodifolia* DC.,
Micranthella clinopodifolia (DC.) Naudin,
Pleroma clinopodifolium (DC.) Triana
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tibouchina dubia (Cham.) Cogn.
Sin.: *Lasiandra dubia* Cham.,
Tibouchina hieronymi Cogn., *Tibouchina*
glazioviana Cogn.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tibouchina dusenii Cogn.
Sin.: *Tibouchina catharinensis* Brade
Arbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tibouchina floribunda Cogn.
Subarbusto. Nativa. 1200 m.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina frigidula (DC.) Cogn.
Sin.: *Lasiandra frigidula* DC.
Subarbusto. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina goldenbergii F.S. Mey.,
P.J.F. Guim. & Kozera
Arbusto. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.
Sin.: *Melastoma granulosa* Desr.
Árbol. Nativa. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina hassleri Cogn.
Sin.: *Tibouchina guimaraensis* Brade
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Tibouchina hassleri Cogn.
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(CAN).

Tibouchina hatschbachii Wurdack
Sin.: *Tibouchina marumbiensis*
Wurdack
Arbusto. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina herbacea (DC.) Cogn.
Sin.: *Arthrostemma herbaceum* DC.,
Arthrostemma hirsutissimum DC., *Pterolepis*
herbacea (DC.) Triana, *Rhexia herbacea*
Schrad. & Mart. ex DC., nom. nud.
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA,
GUA, PAI, SPE). URY(CLA).

Tibouchina herincquiana Cogn.
Subarbusto. Nativa. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina hospita (DC.) Cogn.
Sin.: *Lasiandra albiflora* (Gardner)
Naudin, *Lasiandra hospita* DC., *Pleroma*
albiflorum Gardner, *Purplella albiflora*
(Gardner) Triana, *Rhexia hospita*
Schrad., nom. nud.
Arbusto. Nativa. 0-1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tibouchina kleinii Wurdack
Subarbusto. Endémica. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tibouchina longipilosa Cogn.
Subarbusto. Endémica. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA).

Tibouchina martialis (Cham.) Cogn.
Sin.: *Lasiandra martialis* Cham.
Subarbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina martiusiana (DC.) Cogn.
Sin.: *Lasiandra martiusiana* DC.
Subarbusto. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina multiflora (Gardner) Cogn.
Sin.: *Lasiandra multiflora* (Gardner)
Naudin, *Pleroma multiflorum* Gardner
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Tibouchina mutabilis Cogn.
Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(SCA).

Tibouchina nitida (Graham) Cogn.
Sin.: *Arthrostemma nitidum* Graham,
Comolia platensis Speg., *Pterolepis nitida*
(Graham) Triana, *Tetrameris nitida*
(Graham) Naudin
Hierba o arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON,
SPE). URY(COL).

Tibouchina ovata Cogn.
Subarbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina paratropica (Griseb.) Cogn.
Sin.: *Pleroma paratropica* Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ,
MIS, SAL, TUC). BRA(SCA).

Tibouchina parviflora Cogn.
Hierba o subarbusto. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Tibouchina pilosa Cogn. var.
glandulosa Wurdack
Arbolito. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Tibouchina pilosa Cogn. var. **pilosa**
Arbolito. Endémica. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tibouchina pulchra (Cham.) Cogn.
Sin.: *Lasiandra pulchra* Cham., *Pleroma*
pulchrum (Cham.) Triana
Árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tibouchina ramboi Brade
Arbolito. Endémica. 1000-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Tibouchina regnellii Cogn.
Arbolito o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina reitzii Brade
Arbusto. Nativa. 600-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tibouchina riedeliana Cogn.
Arbusto. Nativa. 700-800 m.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina rojasii Cogn. var. **robusta**
Cogn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Tibouchina rojasii Cogn. var. **rojasii**
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, AMA).

Tibouchina rupestris Cogn.
Hierba o subarbusto. Endémica. 900-
1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tibouchina saxicola F.S. Mey., P.J.F.
Guim. & R. Goldenb.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina sebastianopolitana Cogn.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn.
Sin.: *Lasiandra sellowiana* Cham.,
Pleroma raddianum (DC.) Triana, p.p.,
Tibouchina ulaei Cogn.
Arbolito. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tibouchina semidecandra (Mart. &
Schrank ex DC.) Cogn.
Sin.: *Lasiandra semidecandra* Mart. &
Schrank ex DC.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Tibouchina simplicicaulis (Naudin)
Cogn.
Sin.: *Pterolepis simplicicaulis* (Naudin)
Triana, *Tetrameris simplicicaulis* Naudin
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Tibouchina trichopoda (DC.) Baill.
Sin.: *Lasiandra multiceps* Naudin,
Lasiandra tibouchinoides DC., *Lasiandra*
trichopoda (DC.) Naudin, *Pleroma*
trichopodum DC., *Rhexia tibouchinoides*
Schrad. & Mart. ex DC., nom. nud.,
Tibouchina multiceps (Naudin) Cogn.,
Tibouchina trichopoda (DC.) Baill. var.
tibouchinoides (DC.) Cogn.
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tibouchina urbanii Cogn.

Hierba o subarbusto. Nativa. 1400-1900 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Tibouchina ursina (Cham.) Cogn.

Sin.: *Lasiandra ursina* Cham., *Lasiandra villosa* Naudin, *Pleroma ursinum* (Cham.) Triana

Subarbusto. Nativa. 700-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.

var. **glandulifera** Wurdack

Arbolito. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.

var. **urvilleana**

Sin.: *Lasiandra urvilleana* DC., *Pleroma vimineum* D. Don

Arbolito. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tibouchina versicolor (Lindl.) Cogn.

Sin.: *Arthrostemma versicolor* (Lindl.) DC., *Pterolepis versicolor* (Lindl.) Triana, *Rhexia versicolor* Lindl., *Tetrameris isanthera* Naudin, *Tetrameris versicolor* (Lindl.) Naudin

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tibouchina violacea Cogn.

Subarbusto. Endémica. 100-500 m.

Países: PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, MIE, PAI).

Trembleya DC.**Trembleya parviflora** (D. Don) Cogn.

Sin.: *Meriania parviflora* D. Don

Subarbusto. Nativa. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Trembleya phlogiformis DC.

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

MELIACEAE

Cabralea A. Juss.**Cabralea canjerana** (Vell.) Mart.

Sin.: *Cabralea brachystachya* C. DC., *Cabralea glaberrima* A. Juss., *Cabralea*

multijuga C. DC., *Cabralea oblongifolia* C. DC., *Cabralea rojasii* C. DC., *Trichilia canjerana* Vell.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA).

Cedrela P. Browne**Cedrela angustifolia** DC.

Sin.: *Cedrela boliviana* Rusby, *Cedrela lilloi* C. DC., *Cedrela steinbachii* Harms

Árbol. Nativa. 1100-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Cedrela balansae C. DC.

Árbol. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(COA).

Cedrela fissilis Vell.

Sin.: *Cedrela brasiliensis* A. Juss. var. *australis* A. Juss., *Cedrela brasiliensis* A. Juss., *Cedrela fissilis* Vell. var. *macrocarpa* C. DC., *Cedrela hirsuta* C. DC., *Cedrela tubiflora* Bertoni f. *angustifolia* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni f. *grandifolia* (Bertoni) M. Buchinger & Falcone, *Cedrela tubiflora* Bertoni f. *parvifoliola* M. Buchinger & Falcone, *Cedrela tubiflora* Bertoni subsp. *bertoniensis* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni var. *grandifolia* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni var. *intermedia* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni var. *lagenaria* Bertoni, *Cedrela tubiflora* Bertoni var. *parvifoliola* M. Buchinger & Falcone, *Cedrela tubiflora* Bertoni

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Cedrela odorata L.

Sin.: *Cedrela paraguariensis* Mart., *Cedrela hassleri* (C. DC.) C. DC., *Cedrela mexicana* M. Roem., *Cedrela paraguariensis* Mart. var. *brachystachya* C. DC., *Cedrela paraguariensis* Mart. var. *hassleri* C. DC., *Cedrela paraguariensis* Mart. var. *multijuga* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(CAN, CEN, COA, PAI).

Cedrela saltensis Zapater & del Castillo

Árbol. Endémica. 700-1100 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Guarea F. Allam. ex L.**Guarea guidonia** (L.) Sleumer

Sin.: *Guarea campestris* C. DC., *Guarea francavillana* C. DC., *Guarea rubescens* C. DC., *Guarea trichiloides* L., *Samyda guidonia* L.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, PAI).

Guarea kunthiana A. Juss.

Sin.: *Guarea pohlii* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Guarea macrophylla Vahl subsp.**pachycarpa** (C. DC.) T.D. Penn.

Sin.: *Guarea trichiloides* L. var.

pachycarpa C. DC.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Guarea macrophylla Vahl subsp.**spiciflora** (A. Juss.) T.D. Penn.

Sin.: *Guarea angustifolia* C. DC., *Guarea balansae* C. DC., *Guarea diversifolia* C. DC., *Guarea dumetorum* C. DC., *Guarea fiebrigii* C. DC., *Guarea frutescens* C. DC., *Guarea hassleri* C. DC. var. *esulcata* C. DC., *Guarea hassleri* C. DC., *Guarea leucantha* C. DC., *Guarea nemorensis* C. DC., *Guarea parvifoliola* C. DC., *Guarea ripicola* C. DC., *Guarea silvicola* C. DC., *Guarea spiciflora* A. Juss., *Guarea subnudipetala* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, SAO).

Guarea macrophylla Vahl subsp.**tuberculata** (Vell.) T.D. Penn.

Sin.: *Guarea coriacea* C. DC., *Guarea tuberculata* Vell., *Guarea lessoniana* A. Juss., *Guarea muelleri* C. DC.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Melia L.**Melia azedarach** L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE). BRA(PAR, RGS). CHL(IPA). PRY(PAI). URY(PAY, RNO).

Trichilia P. Browne**Trichilia casaretti** C. DC.

Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Trichilia catigua A. Juss.

Sin.: *Trichilia affinis* A. Juss., *Trichilia alba* Rojas Acosta, nom. nud., *Trichilia catigua* A. Juss. var. *longifolia* C. DC., *Trichilia catigua* A. Juss. var. *pallens* C. DC., *Trichilia polyclada* C. DC.

Árbol. Nativa. 100-600 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Trichilia clausenii C. DC.

Sin.: *Trichilia bradei* Harms, *Trichilia clausenii* C. DC. var. *microcarpa* C. DC., *Trichilia hieronymi* Griseb., *Trichilia lagoensis* C. DC. var. *pubescens* C. DC., *Trichilia lagoensis* C. DC., *Trichilia tartagalensis* C. DC., *Trichilia triphyllaria* C. DC., *Trichilia velutina* C. DC.

Árbol. Nativa. 200-1500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CON).

Trichilia elegans A. Juss.

Sin.: *Trichilia alba* C. DC., *Trichilia elegans* A. Juss. var. *latifolia* C. DC., *Trichilia graciliflora* Harms, *Trichilia hassleri* C. DC., *Trichilia hirsuta* C. DC., *Trichilia warmingii* C. DC. var. *macrophylla* C. DC., *Trichilia warmingii* C. DC.

Árbol. Nativa. 100-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, SOR).

Trichilia hirta L.

Sin.: *Trichilia cathartica* Mart. var. *glabior* C. DC.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, PAI).

Trichilia lepidota Mart. subsp.**lepidota**

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Trichilia lepidota Mart. subsp. **schumanniana** (Harms) T.D. Penn.

Sin.: *Trichilia angustior* Harms,

Trichilia schumanniana Harms, *Trichilia toledoana* Handro

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Trichilia pallens C. DC.

Sin.: *Trichilia selloi* C. DC.
Árbol. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN).

Trichilia pallida Sw.

Sin.: *Trichilia mollis* C. DC., *Trichilia pauciflora* Rusby, *Trichilia weddellii* C. DC.
Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI).

Trichilia pseudostipularis (A. Juss.) C. DC.

Sin.: *Moschoxylum pseudostipulare* A. Juss., *Trichilia pseudostipularis* (A. Juss.) C. DC. var. *sanctae-catharinae* C. DC.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Trichilia silvatica C. DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Trichilia stellato-tomentosa Kuntze

Sin.: *Trichilia stellipila* C. DC.
Árbol. Nativa. 200-700 m.
Países: PRY(AMA, CON).

Trichilia tetrapetala C. DC.

Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR).

MENISPERMACEAE

Abuta Aubl.**Abuta selloana** Eichler

Liana. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Anomospermum Miers**Anomospermum reticulatum** (Mart.)

Eichler subsp. **nitidum** (Miers) Krukoff & Barneby

Sin.: *Anomospermum nitidum* Miers
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Anomospermum reticulatum (Mart.)

Eichler subsp. **reticulatum**

Sin.: *Cocculus reticulatus* Mart.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cissampelos L.**Cissampelos andromorpha** DC.

Enredadera. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cissampelos arenicola M. Nee & R. Ortiz

Enredadera o liana. Nativa. 300-500 m.
Países: ARG(SAL). PRY(APY, PHA).

Cissampelos glaberrima A. St.-Hil.

Sin.: *Cissampelos glaberrima* A. St.-Hil. var. *orbicularis* Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Cissampelos laxiflora Moldenke

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, GUA).

Cissampelos ovalifolia DC.

Sin.: *Cissampelos communis* A. St.-Hil., *Cissampelos ovalifolia* DC. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Cissampelos ovalifolia* DC. f. *ovato-mucronata* Chodat & Hassl., *Cissampelos ovalifolia* DC. f. *reniformis* Chodat & Hassl., *Cissampelos ovalifolia* DC. var. *longepetiolata* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CON, SPE).

Cissampelos pareira L.

Sin.: *Cissampelos auriculata* Miers, *Cissampelos australis* A. St.-Hil., *Cissampelos caapeba* L., *Cissampelos hederacea* Miers, *Cissampelos litoralis* A. St.-Hil., *Cissampelos monoica* A. St.-Hil., *Cissampelos pareira* L. f. *emarginato-mucronata* Chodat & Hassl., *Cissampelos pareira* L. f. *reniformis* Chodat & Hassl., *Cissampelos pareira* L. var. *australis* (A. St.-Hil.) Diels, *Cissampelos pareira* L. var. *caapeba* (L.) Eichler, *Cissampelos pareira* L. var. *gardneri* Diels, *Cissampelos pareira* L. var. *monoica* (A. St.-Hil.) Eichler, *Cissampelos pareira* L. var. *tamoides* (Willd.) Diels
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(RNO).

Cissampelos tropaeolifolia DC.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAN, PAI).

Disciphania Eichler

Disciphania contraversa Barneby

Liana. Endémica. 300-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Disciphania ernstii Eichler var.

glaziovii (Taub. ex Diels) Barneby
Sin.: *Disciphania glaziovii* Taub. ex Diels, *Disciphania hassleri* Chodat
Subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Hyperbaena Miers ex Benth.

Hyperbaena domingensis (DC.) Benth.

Sin.: *Cocculus domingensis* DC., *Hyperbaena tweedii* Miers, nom. nud., *Pachygone domingensis* (DC.) Eichler
Enredadera. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hyperbaena hassleri Diels

Sin.: *Abuta parvifolia* Rusby ex Moldenke, nom. nud., *Hyperbaena ovalifolia* Chodat & Hassl. ex Moldenke, nom. nud.
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, CON, GUA, ÑEE).

Hyperbaena oblongifolia (Mart.)

Chodat & Hassl.
Sin.: *Cocculus oblongifolia* Mart., *Pachygone oblongifolia* Eichler
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA). PRY(APA, COA, PAI).

Odontocarya Miers

Odontocarya acuparata Miers

Liana o epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Odontocarya asarifolia Barneby

Liana o epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SAL, TUC). PRY(APY, PAI, PHA).

Odontocarya tamoides (DC.) Miers

var. **canescens** (Miers) Barneby
Sin.: *Odontocarya hederaefolia* Miers
var. *canescens* Miers, *Odontocarya tamoides* (DC.) Miers var. *paupera* (Griseb.) Hassl.
Liana. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

MENYANTHACEAE

Nymphoides Ség.

Nymphoides indica (L.) Kuntze

Sin.: *Limnanthemum humboldtianum* (Kunth) Griseb., *Menyanthes indica* L., *Nymphoides humboldtiana* (Kunth) Kuntze, *Villarsia humboldtiana* Kunth
Hierba acuática. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MAL, ROC).

Nymphoides verrucosa (R.E. Fr.) A.

Galán & G. Navarro
Sin.: *Limnanthemum verrucosum* R.E. Fr.
Hierba acuática. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(COS). PRY(CON, COA).

MICROTEACEAE

Microtea Sw.

Microtea celosioides (Spreng.) Moq. ex Sennikov & Sukhor.

Sin.: *Galenia celosioides* Spreng., *Microtea paniculata* Moq. var. *paniculata*
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, SPE).

Microtea debilis Sw.

Sin.: *Schollera debilis* (Sw.) Rohr
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(PHA).

Microtea maypurensis (Kunth) G. Don

Sin.: *Ancistrocarpus maypurensis* Kunth, *Microtea glochidiata* Moq. f. *lanceolata* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CON, COA, SPE).

Microtea scabrida Urb.

Sin.: *Microtea foliosa* Chodat, *Microtea paniculata* Moq. var. *linifolia* Moq.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(ART, PAY, RNO).

Microtea sulcicaulis Chodat

Sin.: *Microtea sulcicaulis* Chodat var. *fremontii* Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, SPE).

MISODENDRACEAE

Misodendrum Banks ex DC.

Misodendrum angulatum Phil.

Subarbusto parásito. Endémica. 500-1300 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Misodendrum brachystachium DC.

Sin.: *Archiphyllum brachystachium* (DC.) Tiegh., *Archiphyllum macrophyllum* (Phil.) Tiegh., *Misodendrum macrophyllum* Phil.

Subarbusto parásito. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Misodendrum gayanum Tiegh.

Sin.: *Misodendrum antarcticum* Gand., p.p., *Misodendrum diemii* E. N. Ruiz, *Misodendrum imbricatum* Hook. f., hom. illeg., *Misodendrum patagonicum* Speng.
Subarbusto parásito. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Misodendrum linearifolium DC.

Sin.: *Angelopogon linearifolium* (DC.) Poepp. ex Tiegh., *Misodendrum brachystachium* Macloskie, hom. illeg., *Misodendrum contractum* (Skotts.) Orfila, *Misodendrum densifolium* Orfila, *Misodendrum linearifolium* DC. f. *monoica* Skotts., *Misodendrum linearifolium* DC. var. *contractum* Skotts., *Misodendrum microphyllum* Hook. & Arn., *Misodendrum reflexum* Orfila, *Misodendrum reflexum* Orfila var. *brevisetaceum* Orfila

Subarbusto parásito. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Misodendrum macrolepis Phil.

Subarbusto parásito. Endémica. 900-900 m.

Países: CHL(LLA, AIS).

Misodendrum oblongifolium DC.

Sin.: *Archiphyllum oblongifolium* (DC.) Tiegh., *Misodendrum oblongifolium* DC. var. *lilacinum* Orfila

Subarbusto parásito. Nativa. 0-2000 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Misodendrum punctulatum DC.

Sin.: *Misodendrum antarcticum* Gand., p.p., *Misodendrum commersonii* Tiegh., *Misodendrum imbricatum* Poepp. & Endl., *Misodendrum punctulatum* Banks ex J.R.Forst., nom. nud., *Misodendrum punctulatum* DC. var. *magellanicum* DC., *Misodendrum punctulatum* DC. var. *subumbellatum* DC., *Misodendrum recurvum* Tiegh., *Misodendrum rioquinoense* Kuntze

Subarbusto parásito. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Misodendrum quadriflorum DC.

Sin.: *Telophyllum quadriflorum* (DC.) Tiegh. Subarbusto parásito. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

MOLLUGINACEAE

Glinus L.**Glinus lotoides** L.

Hierba. Introducida. 0-100 m. Países: ARG(BAI).

Glinus radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb.

Sin.: *Mollugo radiata* Ruiz & Pav. Hierba. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(APY, CEN, COA). URY(TAC).

Mollugo L.**Mollugo pentaphylla** L.

Hierba. Introducida. Países: BRA(SCA).

Mollugo verticillata L.

Sin.: *Mollugo arenaria* Kunth Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CAA, CEN, COA, PAI, PHA). URY(MON, PAY).

MONIMIACEAE

Hennecartia J. Poiss.**Hennecartia omphalandra** J. Poiss.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, SPE).

Laurelia Juss., nom. cons.**Laurelia sempervirens** (Ruiz & Pav.) Tul.

Sin.: *Pavonia sempervirens* Ruiz & Pav., *Laurelia serrata* Bertero, *Laurelia aromatica* Juss. ex Poir., *Atherosperma sempervirens* (Ruiz & Pav.) Baill., *Thiga chilensis* Molina

Árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Mollinedia Ruiz & Pav.**Mollinedia argyrogyna** Perkins

Arbolito. Nativa. 0-1300 m. Países: BRA(PAR).

Mollinedia boracensis Peixoto

Árbol. Nativa. Países: BRA(PAR).

Mollinedia blumenaviana Perkins

Sin.: *Mollinedia pfitzeriana* Perkins Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Mollinedia calodonta Perkins

Arbusto o árbol. Nativa. 300-500 m. Países: BRA(RGS, SCA).

Mollinedia clavigera Tul.

Arbusto. Nativa. 0-1100 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Mollinedia elegans Tul.

Sin.: *Mollinedia hatschbachii* Peixoto Arbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mollinedia eugeniifolia Perkins

Arbusto o árbol. Endémica. 0-300 m. Países: BRA(SCA).

Mollinedia fruticulosa Perkins

Arbusto. Nativa. 300-1300 m. Países: BRA(SCA).

Mollinedia howeana Perkins

Arbolito. Endémica. 0-200 m. Países: BRA(SCA).

Mollinedia luizae Peixoto

Arbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR).

Mollinedia ovata Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Nativa. Países: BRA(PAR).

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins

Sin.: *Citrosma schottiana* Spreng., *Mollinedia chrysolana* Perkins, *Mollinedia floribunda* Tul. Arbusto o árbol. Nativa. 0-400 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins

Sin.: *Citrosma schottiana* Spreng. Arbusto o árbol. Nativa. 0-400 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mollinedia triflora (Spreng.) Tul.

Sin.: *Mollinedia chrysophylla* Perkins, *Citrosma triflora* Spreng., *Citrosma triflora* Spreng.

Arbolito. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mollinedia uleana Perkins

Sin.: *Mollinedia iomalla* Perkins

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mollinedia widgrenii A. DC.

Sin.: *Mollinedia warmingii* Perkins

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Peumus Molina, nom. cons.**Peumus boldus** Molina

Sin.: *Boldea boldus* (Molina) Looser, *Boldea fragrans* (Ruiz & Pav.) Gay, *Boldu chilianum* Nees, p.p.

Boldus chilensis Molina, *Peumus fragrans* (Ruiz & Pav.) Pers., *Ruizia fragrans* Ruiz & Pav.

Arbolito o árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

MONTIACEAE

Calandrinia Kunth, nom. cons.**Calandrinia acaulis** Kunth

Sin.: *Calandrinia megarhiza* Hemsl., *Calandrinia saltensis* Hauman, *Claytonia megarhiza* (Hemsl.) Kuntze, nom. illeg., *Lewisia megarhiza* (Hemsl.) MacBryde, *Oreobroma mexicanum* Rydb., *Oreobroma megarhizum* (Hemsl.) Standl. & Steyererm.

Hierba. Nativa. 2500-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ATA).

Calandrinia affinis Gillies ex Arn.

Hierba. Endémica. 1500-4500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Calandrinia caespitosa Gillies ex Arn.

Sin.: *Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn. var. *skottsbergii* (Gand.) Añon, *Calandrinia densa* Phil., nom. illeg., *Calandrinia densa* Reiche ex Peralta & D.I. Ford, nom. illeg., *Calandrinia densiflora* Phil., hom. illeg., *Calandrinia*

diffusa Gillies ex Arn., *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *glomerata* Reiche, *Calandrinia rupestris* Barnéoud var. *skottsbergii* (Gand.) Skottsberg., *Calandrinia rupestris* Barnéoud, *Claytonia caespitosa* (Gillies ex Arn.) Kuntze, *Claytonia diffusa* (Gillies & Hook.) Kuntze, *Claytonia rupestris* (Barnéoud) Kuntze

Hierba. Endémica. 300-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, ARA, MAG, RME).

Calandrinia carolinii Hershkovitz & D.I. Ford

Sin.: *Baitaria acaulis* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 2900-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Calandrinia bonariensis*

Hauman, *Calandrinia caulescens* Kunth, *Calandrinia feltonii* Skottsberg.

Talinum ciliatum Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, SAL, TDF, TUC). CHL(VAL, LBO, BIO, LLA, RME).

Calandrinia colchaguensis Barnéoud

Hierba. Endémica. 900-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Calandrinia compacta Barnéoud

Sin.: *Calandrinia armeriifolia* Phil.,

Calandrinia occulta Phil.

Hierba. Nativa. 500-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

Calandrinia compressa Schrad. ex DC.

Sin.: *Calandrinia gaudichaudii*

Barnéoud, *Calandrinia macilenta*

Barnéoud, *Calandrinia procumbens*

Moris, *Calandrinia tenella* Hook. & Arn., *Calandrinia virgata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Calandrinia fuegiana Gand.

Sin.: *Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn. var. *australis* Skottsberg.

Hierba. Endémica. 600-1200 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Calandrinia graminifolia Phil.

Sin.: *Calandrinia affinis* Gillies ex Arn.

var. *graminifolia* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 1800-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Calandrinia monandra (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Corrigiola deltoidea* Hook. &

Arn., *Monocosmia corrigioloides* Fenzl, *Monocosmia monandra* (Ruiz & Pav.)

Baill., *Talinum monandrum* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Calandrinia nitida (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Calandrinia axilliflora* Barnéoud,

Calandrinia multicaulis Phil., *Talinum diffusum* Colla, *Talinum nitidum* Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, LRI, RME).

Calandrinia ranunculina J.M.

Watson, A.R. Flores & Elvebakk

Hierba. Endémica. 600-700 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Calandrinia skottsbergii Gand.

Hierba. Endémica. 1200-2300 m.

Países: ARG(NEU, SCR). CHL(ARA, AIS).

Cistanthe Spach**Cistanthe aegitalis** (F. Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia aegilitis* F. Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Cistanthe amarantoides (Phil.)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Philippiamra amarantoides*

(Phil.) Kuntze, *Silvaea amarantoides*

Phil., *Silvaea corrigioloides* Phil.

Hierba. Endémica. 0-3300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Cistanthe arancioana Peralta

Sin.: *Philippiamra arancioana* (Peralta)

Hershkovitz

Hierba. Endémica. 1100-1200 m.

Países: CHL(ANT).

Cistanthe cabreræ (Añon) Peralta

Sin.: *Calandrinia cabreræ* Añon

Hierba. Endémica. 1800-2500 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ANT).

Cistanthe cachinalensis (Phil.)

Peralta & D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia cachinalensis* Phil.,
Calandrinia taltalensis I.M. Johnst.
 Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cistanthe calycina (Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia borchesii* Phil.,
 nom. inval., *Calandrinia calycina* Phil.,
Philippiamra calycina (Phil.) Hershkovitz
 Hierba. Endémica. 0-1400 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cistanthe celosioides (Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Philippiamra celosioides* (Phil.)
 Kuntze, *Philippiamra fastigiata*
 (Phil.) Pax & K. Hoffm., *Philippiamra*
pachyphylla (Phil.) Kuntze, *Silvaea*
capitata Phil., *Silvaea celosioides*
 Phil., *Silvaea fastigiata* Phil., *Silvaea*
pachyphylla Phil.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.
 - Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Cistanthe cephalophora (I.M. Johnst.) Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia cephalophora* I.M. Johnst.
 Hierba. Endémica. 0-800 m.
 Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Cistanthe chamissoi (Barnéoud)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia arenaria* Cham.
 var. *chamissoi* (Barnéoud) Reiche,
Calandrinia arenaria Cham. var.
subverticillata (Phil.) Reiche, *Calandrinia*
arenaria Cham., *Calandrinia chamissoi*
 Barnéoud, *Calandrinia nana* Phil.,
Calandrinia solisii Phil., *Calandrinia*
subverticillata Phil., *Calandrinia venulosa*
 Hook. & Arn., *Cistanthe arenaria*
 (Cham.) Carolin ex Hershkovitz
 Hierba. Endémica. 0-1500 m.
 Países: ARG(RNE). CHL(ATA, COQ,
 VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Cistanthe chrysantha (I.M. Johnst.)

Peralta & D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia chrysantha* I.M.
 Johnst.
 Hierba. Endémica. 0-200 m.
 Países: CHL(ANT).

Cistanthe coquimbensis (Barnéoud)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia coquimbensis*
 Barnéoud
 Hierba. Endémica. 0-800 m.
 Países: CHL(ATA, COQ).

Cistanthe crassifolia (Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia crassifolia* Phil.
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(ATA).

Cistanthe cymosa (Phil.) Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia cymosa* Phil.
 Hierba. Endémica. 0-1100 m.
 Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cistanthe densiflora (Barnéoud)

Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia barneoudii* Phil.,
Calandrinia densiflora Barnéoud,
Calandrinia fasciculata Phil., *Calandrinia*
spicata Phil., *Calandrinia viridis* Phil.,
Philippiamra densiflora (Barnéoud)
 Hershkovitz
 Hierba. Endémica. 1000-3400 m.
 Países: ARG(MEN, SAL, SJU).
 CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Cistanthe fenzlii (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia fenzlii* Barnéoud,
Calandrinia lancifolia Phil., *Calandrinia*
sanguinea Phil.
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(LBO, BIO, ARA).

Cistanthe frigida (Barnéoud) Peralta

Sin.: *Calandrinia frigida* Barnéoud,
Cistanthe macrocalyx (Hauman) Carolin
 ex Hershkovitz, *Calandrinia macrocalyx*
 Hauman, *Cistanthe picta* (Gillies ex
 Arn.) Carolin ex Hershkovitz var. *frigida*
 (Barnéoud) Hershkovitz, *Calandrinia*
picta Gillies ex Arn. var. *frigida*
 (Barnéoud) Reiche

Hierba. Endémica. 3000-5000 m.
 Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA,
 COQ, VAL, RME).

Cistanthe grandiflora (Lindl.) Schltld.

Sin.: *Calandrinia discolor* Schrad.,
Calandrinia glauca Schrad., *Calandrinia*
grandiflora Lindl., *Calandrinia speciosa*
 Lehm., *Calandrinia spectabilis* Otto &
 Dietr., *Cistanthe discolor* (Schrad.) Spach,
Cistanthe grandiflora (Lindl.) Carolin ex
 Hershkovitz, comb. superfl., *Cistanthe*
speciosa (Lehm.) Lilja

Hierba. Endémica. 0-2200 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
 LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Cistanthe humilis (Phil.) Peralta

Sin.: *Calandrinia humilis* Phil.,
Calandrinia oblongifolia Barnéoud var.
humilis (Phil.) Reiche
 Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
 Países: ARG(SJU). CHL(ATA, COQ).

Cistanthe lamprosperma (I.M. Johnst.) Peralta & D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia lamprosperma* I.M.
 Johnst.
 Hierba. Endémica. 0-800 m.
 Países: CHL(ANT).

Cistanthe laxiflora (Phil.) Peralta & D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia aegilitis* F. Phil.,
Calandrinia laxiflora Phil.
 Hierba suculenta. Endémica. 0-200 m.
 Países: CHL(VAL).

Cistanthe longiscapa (Barnéoud)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia litoralis* Phil.,
Calandrinia longiscapa Barnéoud
 Hierba. Endémica. 0-3800 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cistanthe minuscula (Añon) Peralta

Sin.: *Calandrinia minuscula* Añon,
Philippiamra minuscula (Añon)
 Hershkovitz

Hierba. Endémica. 2500-4500 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
 CHL(TAR, ANT, ATA).

Cistanthe mucronulata (Meyen)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia mucronulata* Meyen
 Hierba. Endémica.
 Países: CHL(LBO).

Cistanthe philhershkovitziana

Hershkovitz

Hierba. Endémica. 0-100 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Cistanthe picta (Gillies ex Arn.)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia picta* Gillies ex Arn.,
Calandrinia picta Gillies ex Arn. var.
portulacifolia (Phil.) Hicken, *Calandrinia*
portulacifolia Phil., *Calandrinia*
villanuevae Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4200 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU,
 SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
 LBO, RME).

Cistanthe salsoloides (Barnéoud)

Carolin ex Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia salsoloides* Barnéoud,
Calandrinia calocephala Phil., *Calandrinia*
spicigera Phil., *Calandrinia acuminata*
 Phil., *Philippiamra salsoloides* (Barnéoud)
 Hershkovitz
 Hierba. Endémica. 900-3200 m.
 Países: ARG(CAT, SAL, SJU).
 CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Cistanthe stricta (Phil.) PeraltaSin.: *Calandrinia stricta* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ATA).

Cistanthe subspeciosa Hershkovitz

Hierba. Endémica. 700 m.

Países: CHL(ATA).

Cistanthe thyrsoides (Reiche) Peralta

& D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia thyrsoides* Reiche

Hierba. Endémica. 0-2900 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA, COQ).

Cistanthe trigona (Colla) HershkovitzSin.: *Claytonia trigona* (Colla) Kuntze,
Talinum trigonum Colla

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO).

Cistanthe vicina (Phil.) Carolin ex

Hershkovitz

Sin.: *Calandrinia arenaria* Cham. var.*vicina* (Phil.) Reiche, *Calandrinia vicina* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME)

Claytonia L.**Claytonia perfoliata** Donn ex Willd.Sin.: *Montia perfoliata* (Donn ex Willd.) Howell

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(NEU, RNE, TDF).

Lenzia Phil.**Lenzia chamaepitys** Phil.

Hierba. Endémica. 3600-4400 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SJU).

CHL(ANT, ATA, COQ).

Montia L.**Montia fontana** L.Sin.: *Calandrinia cerratei* Añon, *Calandrinia pusilla* Barnéoud, *Claytonia chamissonis* Eschsch. var. *tenerrima* A. Gray, *Claytonia hallii* A. Gray, *Monocosmia verrucosa* Phil., *Montia alsine-facie* Gilib., *Montia arvensis* Wallr., *Montia chaberti* Gand., *Montia decumbens* (St.-Hil.) Lag., *Montia dipetala* Suksd., *Montia erecta* Steud., *Montia fontana* L. subsp. *amporitana* Sennen, *Montia fontana* L. subsp.*chondrosperma* (Fenzl) Walters, *Montia fontana* L. subsp. *intermedia* (Beeby) Walters, *Montia fontana* L. subsp. *lamprosperma* (Cham.) Lindb., *Montia fontana* L. subsp. *variabilis* Walters, *Montia fontana* L. var. *boreorivularis* Lindb., *Montia fontana* L. var. *chondrosperma* Fenzl, *Montia fontana* L. var. *intermedia* Beeby, *Montia fontana* L. var. *tenerrima* Fernald & Wiegand, *Montia funstonii* Rydb., *Montia minina* Rydb., *Montia hallii* (A. Gray) Greene, *Montia lamprosperma* Cham., *Montia limosa* Decker, *Montia linearifolia* d'Urv., *Montia lusitanica* Samp., *Montia major* Steud., *Montia minor* C.C. Gmel., nom. illeg., *Montia pentandra* Willd. ex Cham., *Montia rivularis* C.C. Gmel. f. *aquatica* Glück, *Montia rivularis* C.C. Gmel. f. *terrestris* Glück, *Montia rivularis* C.C. Gmel., *Montia stenophylla* Rydb., *Montia tenella* Steud., *Montia terrestris* Dumort., *Montia verna* Neck., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME). URY(SJO).

Montiopsis Kuntze**Montiopsis andicola** (Gillies) D.I. FordSin.: *Calandrinia andicola* Gillies var. *denticulata* (Gillies) Hicken, *Calandrinia andicola* Gillies, *Calandrinia denticulata* Gillies var. *andicola* (Gillies) Reiche, *Calandrinia denticulata* Gillies var. *echinata* Barnéoud, *Calandrinia denticulata* Gillies, *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *lanceolata* Hauman, *Calandrinia oligantha* Phil., *Calandrinia saxifraga* Barnéoud var. *oligantha* (Phil.) Reiche, *Calandrinia saxifraga* Barnéoud, *Calandrinia tricolor* Phil.

Hierba. Endémica. 900-4000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Montiopsis berteroa (Phil.) D.I. FordSin.: *Calandrinia berteroa* Phil., *Calandrinia floribunda* Phil., *Calandrinia rosea* Phil.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Montiopsis capitata (Hook. & Arn.)

D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia capitata* Hook.& Arn., *Calandrinia capituligera* Phil., *Calandrinia erithrichioides* Phil., *Calandrinia erythrocoma* Phil., *Calandrinia petiolata* Phil., *Calandrinia prostrata* Phil.

Hierba. Endémica. 800-3000 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(AYP, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, RME).

Montiopsis cistiflora (Gillies ex Arn.)

D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia dianthoides* Phil., *Calandrinia cistiflora* Gillies ex Arn., *Calandrinia splendens* Barnéoud, *Calandrinia splendens* Barnéoud var. *dianthoides* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 1100-3500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Montiopsis copiapina (Phil.) D.I. FordSin.: *Calandrinia copiapina* Phil., *Calandrinia polia* Phil.

Hierba. Endémica. 1900-4300 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

Montiopsis cumingii (Hook. & Arn.)

D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia cumingii* Hook. & Arn., *Montiopsis boliviana* Kuntze

Hierba. Nativa. 2000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, MAU, RME).

Montiopsis demissa (Phil.) D.I. FordSin.: *Calandrinia demissa* Phil., *Calandrinia depressa* Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, RME).

Montiopsis gayana (Barnéoud) D.I.

Ford

Sin.: *Calandrinia acutisepala* Añon, *Calandrinia calycotricha* Phil., *Calandrinia conferta* Gillies ex Arn., *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *hirtella* (Phil.) Reiche, *Calandrinia gayana* Barnéoud, *Calandrinia glandulifera* Phil., *Calandrinia hirtella* Phil., *Calandrinia multibracteata* Hauman, *Calandrinia patagonica* Spæg., *Calandrinia rahmeri* Phil., *Calandrinia tenuifolia* Phil., *Calandrinia vidali* Phil.

Hierba. Endémica. 500-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Montiopsis gilliesii (Hook. & Arn.)

D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia canescens* Phil., *Calandrinia gilliesii* Hook. & Arn., *Calandrinia leucotricha* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *sessiliflora* (Phil.) Hauman, *Calandrinia sessiliflora* Phil., *Calandrinia setosa* Phil. var. *longifolia* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4200 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Montiopsis glomerata (Phil.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia callithrix* Phil., *Calandrinia glomerata* Phil., *Calandrinia leucocephala* Phil.

Hierba. Endémica. 2700-4000 m.

Países: ARG(MEN, SAL, SJU).
CHL(ATA, COQ).

Montiopsis modesta (Phil.) D.I. FordSin.: *Calandrinia modesta* Phil.

Hierba. Endémica. 1900-4000 m.

Países: ARG(LRI, SAL, SJU).
CHL(ANT, ATA, COQ).

Montiopsis parviflora (Phil.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia bandurriae* Phil., *Calandrinia parviflora* Phil.

Hierba. Endémica. 500-2600 m.

Países: CHL(AYP, ATA, COQ).

Montiopsis polycarpoides (Phil.)

Peralta

Sin.: *Calandrinia polycarpoides* Phil., *Calandrinopsis polycarpoides* (Phil.) R. Franz

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
CHL(ANT, VAL).

Montiopsis potentilloides

(Barnéoud) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia nivalis* Phil., *Calandrinia potentilloides* Barnéoud, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *uspallatensis* (Phil.) Reiche, *Calandrinia setosa* Phil., *Calandrinia uspallatensis* Phil., *Montiopsis uspallatensis* (Phil.) D.I. Ford

Hierba. Endémica. 2500-4200 m.

Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Montiopsis ramosissima (Hook. & Arn.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia landbeckii* Phil., *Calandrinia poeppigiana* Walp., *Calandrinia ramosissima* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Montiopsis sericea (Hook. & Arn.) D.I.

Ford

Sin.: *Calandrinia argentea* Phil., *Calandrinia ferruginea* Barnéoud, *Calandrinia potentilloides* Barnéoud var. *minor* Barnéoud, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn., *Calandrinopsis sericea* (Hook. & Arn.) R. Franz, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *longipes* Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 1500-3700 m.

Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Montiopsis trifida (Hook. & Arn.) D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia aurea* Barnéoud, *Calandrinia capitata* Hook. & Arn. var. *prolifera* (Phil.) Reiche, *Calandrinia caulescens* Phil., hom. illeg., *Calandrinia involuocrata* Phil., *Calandrinia leucopogon* Phil., *Calandrinia montana* Phil., *Calandrinia prolifera* Phil., *Calandrinia trifida* Hook. & Arn., *Calandrinopsis montana* (Phil.) R. Franz

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Montiopsis umbellata (Ruiz & Pav.)

D.I. Ford

Sin.: *Calandrinia chubutensis* Speg., *Calandrinia hispida* Phil., *Calandrinia phalacra* Phil., *Calandrinia sanfurgi* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *aequipipes* Hook. & Arn., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *phalacra* (Phil.) Reiche, *Calandrinia umbellata* (Ruiz & Pav.) DC., *Calandrinopsis umbellata* (Ruiz & Pav.) R. Franz, *Talinum umbellatum* Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 700-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Phemeranthus Raf.**Phemeranthus punae** (R.E. Fr.) Egli & Nyffeler

Sin.: *Calandrinia punae* R.E. Fr., *Talinum punae* (R.E. Fr.) Carolin

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Schreiteria Carolin**Schreiteria macrocarpa** (Speg.)

Carolin

Sin.: *Calandrinia macrocarpa* Speg.
Subarbusto. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(TUC).

MORACEAE

Artocarpus J.R. Forst. & G. Forst.**Artocarpus heterophyllus** Lam.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Brosimum Sw., nom. cons.**Brosimum gaudichaudii** Trécul

Sin.: *Brosimum gaudichaudii* Trécul f. *macrophyllum* Hassl., *Brosimum pusillum* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Brosimum glaziovii Taub.Sin.: *Alicastrum glaziovii* (Taub.) Taub.

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. BergSin.: *Brosimopsis lactescens* S. Moore

Árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Broussonetia L'Hér. ex Vent., nom. cons.**Broussonetia papyrifera** (L.) Vent.Sin.: *Morus papyrifera* L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE). CHL(IPA).

Dorstenia Plum. ex L.**Dorstenia brasiliensis** Lam.

Sin.: *Dorstenia brasiliensis* Lam. f. *balansae* Chodat, *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *guaranitica* Chodat, hom. illeg., *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *major* Chodat & Hassl., *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *palustris* Hassl., *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *tomentosa* (Fisch. & C.A. Mey.) Hassl., *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *tubicina* (Ruiz & Pav.) Chodat & Vischer, *Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *typica* Hassl., nom. inval., *Dorstenia montevidensis* Field & Gardner, *Dorstenia*

schulzii Carauta, C. Valente & Dunn de Araujo, *Dorstenia tomentosa* Fisch. & C.A. Mey., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. f. *major* Hassl., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. f. *subexcentrica* Hassl., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. f. *typica* Hassl., nom. inval., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav. var. *opifera* (Mart.) Hassl., *Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CHO, COA, GUA, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, RIV, SAO, TAC).

Dorstenia carautae C.C. Berg
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dorstenia cayapia Vell. subsp. **paraguariensis** (Hassl.) C.C. Berg
Sin.: *Dorstenia cayapia* Vell. f. *paraguariensis* Hassl., *Dorstenia paraguariensis* (Hassl.) Carauta
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, COA, SPE).

Dorstenia hirta Desv.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR).

Dorstenia morifolia Fisch. & C.A. Mey.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Dorstenia tenuis Bonpl. ex Bureau
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Dorstenia urceolata Schott
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Dorstenia vitifolia Gardner
Sin.: *Dorstenia bryoniifolia* Mart. ex Miq., *Dorstenia cayapia* Vell. subsp. *vitifolia* (Gardner) C.C. Berg
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Ficus L.

Ficus adhatodifolia Schott
Sin.: *Ficus anthelmintica* Mart., *Ficus*

anthelmintica Mart. var. *missionum* Hauman, *Ficus guapoi* D. Parodi, *Ficus morongii* Hassl., *Pharmacosycea adhatodifolia* (Schott) Miq., *Pharmacosycea anthelmintica* (C. Mart.) Miq.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Ficus arpazusa Casar.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ficus calyptroceras (Miq.) Miq.
Sin.: *Ficus elliotiana* S. Moore, *Ficus rojasii* Hassl., hom. illeg., *Urostigma calyptroceras* Miq., *Ficus calyptroceras* (Miq.) Miq. var. *elliottiana* (S. Moore) Chodat
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

Ficus carica L.
Árbol. Introducida.
Países: CHL(ANT, JFE).

Ficus castelviana Dugand
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ficus cestrifolia Schott
Sin.: *Ficus pohiana* (Miq.) Miq., *Ficus tweediana* Miq., *Urostigma organense* Miq., *Urostigma tweedianum* Miq.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

Ficus citrifolia Mill.
Sin.: *Ficus eximia* Schott f. *paraguariensis* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, SPE).

Ficus clusiifolia Schott
Árbol. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ficus crocata (Miq.) Miq.
Sin.: *Urostigma crocatum* Miq.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Miq.
Sin.: *Urostigma enorme* Mart. ex Miq.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ficus ernanii Carauta, Pederneiras, P.P. de Souza, A.F.P. Machado, M.D.M. Vianna Fil
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Ficus eximia Schott
Sin.: *Ficus glabra* Vell.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Ficus gomelleria Kunth & C.D. Bouché
Sin.: *Ficus acarouaniensis* Benoist, *Ficus doliaria* (Miq.) Miq., *Urostigma doliarium* Miq., *Urostigma gomelleira* (Kunth & C.D. Bouché) Miq.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ficus guaranitica Chodat
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ficus lagoensis C.C. Berg & Carauta
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.
Sin.: *Ficus diabolica* Herter, *Ficus diabolica* Herter f. *laurina* Herter, *Ficus diabolica* Herter f. *major* Herter, *Ficus diabolica* Herter f. *minor* Herter, *Ficus horquetensis* Chodat & Vischer, *Ficus ibapohi* Orb. ex Rojas Acosta, *Ficus monckii* Hassl., *Ficus monckii* Hassl. var. *sanmartiniana* Parodi, *Ficus monckii* Hassl. f. *subcuneata* Hassl., *Ficus speciosa* Rojas Acosta, *Urostigma luschnathianum* Miq.
Árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, RIV, ROC, TAC, TYT).

Ficus maroma A. Cast.
Sin.: *Ficus rojasii* H. Lévy.
Árbol. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

Ficus obtusifolia Kunth
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ficus obtusiuscula (Miq.) Miq.
Sin.: *Ficus mima* Standl., *Ficus officinalis* L.B. Sm., *Ficus perforata* (Miq.) Miq.,

comb. illeg., *Pharmacosycea obtusiuscula* Miq., *Pharmacosycea perforata* Miq., *Pharmacosycea perforata* Miq. f. *angustifolia* Miq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CON, COA, PAI).

Ficus organensis Miq.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ficus pertusa L. f.

Sin.: *Ficus prinoides* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *subtriplinervia* (C. Mart.) Kuntze, *Ficus subtriplinervia* C. Mart., *Ficus elliptica* (Herzog) Herter, comb. illeg.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CON).

Ficus pulchella Schott

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Ficus tomentella (Miq.) Miq.

Sin.: *Urostigma tomentellum* Miq.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ficus trigona L. f.

Sin.: *Urostigma trigonum* (L. f.) Miq.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Maclura Nutt., nom. cons.

Maclura tinctoria (L.) Steud. subsp. **mora** (Griseb.) Vázq. Avila

Sin.: *Chlorophora mora* (Griseb.) Lillo, *Chlorophora reticulata* Herzog, *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. subsp. *mora* (Griseb.) Hassl., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. var. *mora* (Griseb.) Lillo, *Ioxylon mora* (Griseb.) Kuntze, *Maclura mora* Griseb., *Maclura trilobata* Rojas Acosta
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, ÑEE, PHA).

Maclura tinctoria (L.) Steud. subsp. **tinctoria**

Sin.: *Broussonetia tinctoria* Kunth, *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. f. *niqueliana* Hassl., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. f. *tataiba* Hassl., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. var. *polyneura* (Miq.) Bureau, *Chlorophora*

tinctoria (L.) Gaudich. var. *xanthoxylon* (L.) Hassl., *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich., *Fusticus tinctorius* (L.) Raf., *Maclura polyneura* Miq., *Morus tinctoria* L., *Morus zanthoxylon* L.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Morus L.

Morus alba L.

Sin.: *Morus tatarica* L.
Árbol. Introducida. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(CEN, GUA).
URY(PAY, RNO).

Morus insignis Bureau

Sin.: *Morus marmolii* Legname, *Morus peruviana* Planch. ex Koidz., *Morus trianae* Leroy
Árbol. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Pseudolmedia Trécul

Pseudolmedia hirtula Kuhlmann

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pseudolmedia laevigata Trécul

Sin.: *Pseudolmedia guaranitica* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Sorocea A. St.-Hil.

Sorocea bonplandii (Baill.)

W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer
Sin.: *Pseudosorocea bonplandii* Baill., *Sorocea ilicifolia* Miq. f. *laxiflora* Hassl., *Sorocea sylvicola* Chodat, *Sorocea sylvicola* Chodat var. *caaguazuensis* Chodat
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Sorocea hilarii Gaudich.

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Sorocea jureiana Romaniuc

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. subsp. **saxicola** (Hassl.) C.C. Berg

Sin.: *Maclura brasiliensis* (Mart.) Endl. var. *reticulata* Chodat, *Pseudosorocea sprucei* Baill., *Sorocea saxicola* Hassl. f. *subrepanda* Hassl., *Sorocea saxicola* Hassl. var. *dentata* Hassl., *Sorocea saxicola* Hassl., *Trophisomia edulis* Rojas Acosta
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

MUNTINGIACEAE

Muntingia L.

Muntingia calabura L.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

MUSACEAE

Musa L.

Musa ornata Roxb.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

Musa velutina H. Wendl. & Drude

Hierba. Introducida
Países: BRA(SCA).

MYRICACEAE

Morella Lour.

Morella chevalieri Parra-Os.

Sin.: *Myrica pubescens* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *glabrata* A. Chev.
Arbusto o árbol. Nativa. 1600-1900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Morella pavonis (C. DC.) Parra-O

Sin.: *Myrica pavonis* C. DC.
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-3200 m.
Países: CHL(APY, TAR).

MYRISTICACEAE

Virola Aubl.**Virola bicuhyba** (Schott) Warb.

Sin.: *Myristica bicuhyba* Schott
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

MYRTACEAE

Acca O. Berg**Acca sellowiana** (O. Berg) Burret

Sin.: *Feijoa obovata* (O. Berg) O. Berg, *Feijoa schenkiana* Kiaersk., *Feijoa sellowiana* (O. Berg) O. Berg, *Orthostemon obovatus* O. Berg, *Orthostemon sellowianus* O. Berg
Arbusto o árbol. Endémica. 500-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, PAY, RIV, TAC, TYT).

Amomyrtella Kausel**Amomyrtella güili** (Speg.) Kausel

Sin.: *Eugenia güili* Speg., *Myrtus güili* (Speg.) D. Legrand, *Pseudocaryophyllus güili* (Speg.) Burret
Árbol. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Amomyrtus (Burret) D. Legrand & Kausel**Amomyrtus luma** (Molina) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia darwinii* Hook. f., *Myrcia lechleriana* Miq., *Myrtus darwinii* (Hook. f.) Barnéoud, *Myrtus luma* Molina, *Myrtus multiflora* Juss. ex J. St.-Hil., *Myrtus valdiviana* Phil., *Pseudocaryophyllus darwinii* (Hook. f.) Burret

Arbusto o árbol. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Amomyrtus meli (Phil.) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Myrtus meli* Phil., *Pseudocaryophyllus meli* (Phil.) Burret
Árbol. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Blepharocalyx O. Berg**Blepharocalyx cruckshanksii** (Hook. & Arn.) Nied.

Sin.: *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *obovatus* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *ovalis* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *pauciflorus* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied., *Eugenia cruckshanksii* Hook. & Arn., *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *obovata* O. Berg, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *ovalis* O. Berg, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *pauciflora* O. Berg, *Eugenia divaricatum* O. Berg, *Eugenia elliptica* Phil., hom. illeg., *Luma cruckshanksii* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Temu divaricatum* (O. Berg) O. Berg
Arbusto o árbol. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg

Sin.: *Blepharocalyx amarus* O. Berg, *Blepharocalyx angustifolius* O. Berg, *Blepharocalyx angustissimus* O. Berg, *Blepharocalyx brunneus* O. Berg, *Blepharocalyx depauperatus* (Cambess.) O. Berg, *Blepharocalyx gigantea* Lillo var. *montana* Lillo, *Blepharocalyx gigantea* Lillo, *Blepharocalyx lanceolatus* O. Berg var. *arborescens* O. Berg, *Blepharocalyx lanceolatus* O. Berg var. *frutescens* O. Berg, *Blepharocalyx minutiflorus* Mattos & D. Legrand, *Blepharocalyx montanus* Lillo, *Blepharocalyx myrcianthoides* Mattos, *Blepharocalyx picrocarpus* O. Berg, *Blepharocalyx pilosus* O. Berg, *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg f. *catharinae* D. Legrand, *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg var. *longipes* (O. Berg) D. Legrand, *Blepharocalyx salicifolius* (Kunth) O. Berg var. *tweediei* (Hook. & Arn.) D. Legrand, *Blepharocalyx strictus* O. Berg, *Blepharocalyx suaveolens* (Cambess.) Burret var. *abrupticulmen* D. Legrand, *Blepharocalyx suaveolens* (Cambess.) Burret var. *cuneatus* D. Legrand, *Blepharocalyx suaveolens* (Cambess.) Burret, *Blepharocalyx tweediei* (Hook. & Arn.) O. Berg f. *catharinae* (D. Legrand) Mattos, *Blepharocalyx tweediei* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *angustifolia* (O.

Berg) D. Legrand, *Blepharocalyx tweediei* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *setentrionalis* Mattos, *Blepharocalyx tweediei* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Blepharocalyx umbilicata* (Cambess.) Burret var. *paranaensis* Mattos, *Eugenia depauperata* Cambess., *Eugenia ipehuensis* Barb. Rodr., nom. nud., *Eugenia salicifolia* (Kunth) DC., *Eugenia suaveolens* Cambess., *Eugenia tweediei* Hook. & Arn., *Myrcianthes cisplantensis* (Cambess.) O. Berg var. *brevipedunculata* O. Berg, *Myrciaria dichotoma* D. Legrand, *Myrtus salicifolia* Kunth

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Campomanesia Ruiz & Pav.**Campomanesia adamantium**

(Cambess.) O. Berg
Sin.: *Campomanesia cambessedeano* O. Berg, *Campomanesia lancifolia* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Campomanesia paraguayensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Campomanesia resinosa* Barb. Rodr., *Psidium adamantium* Cambess.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN).

Campomanesia aurea O. Berg

Sin.: *Campomanesia aurea* O. Berg var. *hatschbachii* (Mattos) D. Legrand, *Campomanesia cyanea* O. Berg, *Campomanesia cyanea* O. Berg var. *ovata* O. Berg, *Campomanesia gracilis* Kausel, *Campomanesia maracayuensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(RIV).

Campomanesia eugenioides

(Cambess.) D. Legrand
Sin.: *Campomanesia montana* D. Legrand, *Psidium eugenioides* Cambess.
Arbusto o arbolito. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Campomanesia guaviroba (DC.)

Kiaersk.

Sin.: *Campomanesia guaviroba* (DC.)
Kiaersk. var. *insulae* D. Legrand,
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.
var. *itatiaiae* D. Legrand, *Psidium*
guaviroba DC.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, PAI).**Campomanesia guazumifolia**

(Cambess.) O. Berg

Sin.: *Abbevillea rugosa* O. Berg, *Britoa*
guazumifolia (Cambess.) D. Legrand,
Britoa hassleriana Barb. Rodr. ex Chodat
& Hassl., nom. nud., *Britoa sellowiana* O.
Berg, *Psidium guazumifolium* Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN,
GUA, MIE, PAI, SPE).**Campomanesia littoralis** D. Legrand

Sin.: *Campomanesia xanthocarpa* O.
Berg var. *littoralis* (D. Legrand) Landrum
Arbusto o árbol. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Campomanesia neriiflora (O. Berg) Nied.

Sin.: *Abbevillea neriiflora* O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Campomanesia pubescens (DC.) O. Berg

Sin.: *Campomanesia affinis* O. Berg,
Campomanesia australis O. Berg,
Campomanesia campestris O. Berg,
Campomanesia diversifolia Barb.
Rodr., *Campomanesia hassleri* Barb.
Rodr., *Campomanesia obversa* (Miq.)
O. Berg, *Campomanesia paranensis*,
Campomanesia trichosepala Barb.
Rodr., *Psidium obversum* Miq., *Psidium*
pubescens DC.

Arbusto. Nativa. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, APA,
CAU, CAA, CAN, CON, PAI, SPE).**Campomanesia reitziana** D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Campomanesia schlechtendaliana

(O. Berg) Nied.

Sin.: *Abbevillea schlechtendaliana* O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Campomanesia sessiliflora (O. Berg)

Mattos

Sin.: *Abbevillea bullata* Barb. Rodr.,
Campomanesia apaensis Barb. Rodr.
ex Chodat & Hassl., *Campomanesia*
bullata (Barb. Rodr.) Chodat & Hassl.,
Campomanesia mollicarpa Barb. Rodr.
ex Chodat & Hassl., *Campomanesia*
nitidifolia Barb. Rodr. ex Chodat &
Hassl., nom. nud., *Campomanesia rugosa*
O. Berg var. *lanuginosa* Barb. Rodr.
ex Chodat & Hassl., *Campomanesia*
sessiliflora (O. Berg) Mattos var. *bullata*
(Barb. Rodr.) Landrum, *Campomanesia*
sessiliflora (O. Berg) Mattos var.
lanuginosa (Barb. Rodr. ex Chodat &
Hassl.) Landrum

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU,
CAA, CAN, CON, SPE).**Campomanesia thea** (Seem.) Gilg & StraussSin.: *Citrosma thea* Seem.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Campomanesia xanthocarpa O. Berg

var. **littoralis** (D. Legrand) Landrum
Sin.: *Campomanesia littoralis* D.
Legrand
Arbusto o árbol. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Campomanesia xanthocarpa O. Berg
var. **xanthocarpa**

Sin.: *Campomanesia crenata* O.
Berg, *Campomanesia dusenii* Kausel,
Campomanesia malifolia O. Berg,
Campomanesia rhombea O. Berg,
Campomanesia rhombea O. Berg var.
grandifolia O. Berg, *Campomanesia*
rhombea O. Berg var. *kleinii* D. Legrand,
Campomanesia xanthocarpa O. Berg var.
malifolia (O. Berg) D. Legrand
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN,
CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI).

Curitiba Salywon & Landrum**Curitiba prismatica** (D. Legrand)

Salywon & Landrum

Sin.: *Eugenia prismatica* D. Legrand,
Mosiera prismatica (D. Legrand)
Landrum
Arbusto o árbol. Endémica. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eucalyptus L'Hér.**Eucalyptus camaldulensis** Dehnh.

Árbol. Introducida.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Benth.

Árbol. Introducida. 400-1400 m.

Países: ARG(COR).

Eucalyptus globulus Labill.

Árbol. Introducida.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, JFE, IPA).**Eucalyptus grandis** W. Hill ex Maiden

Árbol. Introducida. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ).

Eucalyptus quadrangulata H. Deane
& Maiden

Árbol. Introducida. 1000-1500 m.

Países: ARG(JUJ).

Eucalyptus sideroxydon A. Cunn. & Woolls

Árbol. Introducida. 400-500 m.

Países: ARG(COR).

Eucalyptus tereticornis Sm.

Árbol. Introducida. 400-500 m.

Países: ARG(COR).

Eugenia L.**Eugenia acutata** Miq.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Eugenia adenantha O. Berg

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(COA, PHA).

Eugenia angelyana Mattos

Árbol. Endémica. 700 m.

Países: BRA(SCA).

Eugenia angustissima O. Berg

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(RGS). PRY(CAN).

Eugenia anomala D. LegrandSin.: *Eugenia humilis* (O. Berg)

Benth. ex Niederl., hom. illeg., *Eugenia*
myrcianthes Nied. var. *nana* D. Legrand,
Eugenia vallsiana Mattos, *Hexachlamys*
anomala (D. Legrand) D. Legrand,
Hexachlamys humilis O. Berg
Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS). PRY(COA). URY(ART, TAC).

Eugenia arenosa Mattos

Sin.: *Eugenia hagelundii* Mattos
Subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(PAI).

Eugenia astrigens Cambess.

Sin.: *Eugenia umbelliflora* O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia aurata O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Eugenia bacopari D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia beaurepaireana (Kiaersk.) D. Legrand

Sin.: *Myrtus beaurepaireana* Kiaersk.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia bimarginata DC.

Sin.: *Eugenia maracayuensis* Barb.
Rodr., *Eugenia pleurantha* O. Berg,
Eugenia umbellata Spreng., *Myrciaria*
atiraensis Barb. Rodr. ex Chodat &
Hassl., nom. nud.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Eugenia bocainensis Mattos

Sin.: *Phyllocalyx ligustrinus* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Eugenia brasiliensis Lam.

Arbusto o árbol. Nativa. 100-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia brevistila D. Legrand

Sin.: *Calycorectes australis* D. Legrand
var. *impresso-venosa* D. Legrand,
Calycorectes australis D. Legrand,
Calycorectes duarteanus D. Legrand,
Eugenia falkenbergiana Mattos, *Eugenia*
neoaustralis Sobral var. *impresso-*
venosa (D. Legrand) Mattos, *Eugenia*
neoaustralis Sobral var. *neoaustralis*
Árbol. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia brunneopubescens Mazine

Árbol. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Eugenia bunchosiifolia Nied.

Sin.: *Phyllocalyx grandifolius* O. Berg
Arbusto. Endémica. 400 m.
Países: BRA(PAR).

Eugenia burkartiana (D. Legrand) D. Legrand

Sin.: *Pseudocaryophyllus burkartianus*
D. Legrand
Árbol. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
SCA). PRY(APA, COA).

Eugenia candolleana DC.

Nativa. Árbol.
Países: BRA(PAR).

Eugenia capitulifera O. Berg

Árbol. Nativa. 1000-1400 m.
Países: BRA(PAR).

Eugenia catharinae O. Berg

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia catharinensis D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia cerasiflora Miq.

Sin.: *Eugenia lucida* Cambess., *Luma*
lucidissima (Cambess.) Herter, *Eugenia*
itacolumensis O. Berg
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia cereja D. Legrand

Sin.: *Eugenia paranaguensis* Mattos &
D. Legrand
Árbol. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia chlorophylla O. Berg

Sin.: *Eugenia multiovulata* Mattos & D.
Legrand
Árbol. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR).

Eugenia coetanea O. Berg

Árbol. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Eugenia copacabanensis Kiaersk.

Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR).

Eugenia corrientina Barb. Rodr.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, CAU, CAN).

Árbol. Endémica. 600 m.
Países: BRA(RGS).

Eugenia dimorpha O. Berg

Sin.: *Eugenia dimorpha* O. Berg var.

australis Mattos, *Luma dimorpha* (O.
Berg) Herter

Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).

Eugenia dodonaeifolia Cambess.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eugenia egensis DC.

Sin.: *Eugenia parodiana* Morong
Árbol o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(PAR). PRY(APY,
AMA, CAA, CEN, COA, PHA, SPE).

Eugenia excelsa O. Berg

Sin.: *Eugenia cuspidata* O. Berg, hom.
illeg., *Eugenia obovata* O. Berg, *Eugenia*
rostratofalcata Mattos & D. Legrand
Árbol. Nativa. 700-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia expansa Spring ex Mart.

Sin.: *Eugenia cuprea* (O. Berg) Mattos,
Eugenia grandisepala Mattos, *Phyllocalyx*
cupreus O. Berg
Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Eugenia florida DC.

Sin.: *Eugenia gardneriana* O. Berg,
Eugenia moraviana O. Berg var.
gardneriana (O. Berg) Mattos
Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,
CAN, COA, ÑEE, PAI).

Eugenia fusca O. Berg

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eugenia gracillima Kiaersk.

Sin.: *Eugenia klappenbachiana* Mattos
& D. Legrand, *Eugenia multipunctata*
Mattos & D. Legrand, hom. illeg.,
Eugenia neomultipunctata Sobral
Árbol. Nativa. 400-500 m.
Países: BRA(PAR).

Eugenia hamiltonii (Mattos) Mattos

Sin.: *Eugenia meridionalis* Mattos,
Eugenia sehnemiana (Mattos) Mattos,
Hexachlamys hamiltoni Mattos var.
sehnemiana Mattos, *Hexachlamys*
hamiltonii Mattos, *Hexachlamys*
sehnemiana (Mattos) Mattos
Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).

Eugenia handroana D. Legrand

Sin.: *Eugenia lepida* Mattos & D. Legrand
 Árbol. Nativa. 0-900 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia handroi (Mattos) Mattos

Sin.: *Hexachlamys handroi* Mattos, *Hexachlamys itatiaiensis* Mattos var. *kleinii* D. Legrand, *Hexachlamys kleinii* (D. Legrand) Mattos
 Árbol. Nativa. 900-1500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia herbacea O. Berg

Sin.: *Eugenia leptophylla* Barb. Rodr., *Myrciaria leptophylla* (Barb. Rodr.) Chodat & Hassl.
 Hierba. Nativa. 0-400 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA).

Eugenia hyemalis Cambess. var. **hyemalis**

Sin.: *Eugenia cycliantha* D. Legrand, *Myrciaria itacurubiensis* Barb. Rodr., nom. nud.
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(CAA, ÑEE, PAI).

Eugenia hyemalis Cambess. var. **marginata** (O. Berg) D. Legrand

Sin.: *Eugenia polycarpa* O. Berg var. *marginata* O. Berg
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(COA, PAI).

Eugenia ilhensis O. Berg

Árbol. Nativa. 100-500 m.
 Países: PRY(CON, PHA).

Eugenia imaruiensis D. Legrand

Arbusto. Endémica. 400-500 m.
 Países: BRA(SCA).

Eugenia involucrata DC.

Sin.: *Eugenia aemilii* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Eugenia calycina* Cambess. var. *herbaceus* Mattos, *Eugenia chodatii* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Eugenia incertissima* Sobral, *Eugenia involucrata* DC. var. *minutifolia* Mattos & D. Legrand, *Eugenia jaguariaivensis* Mattos var. *brevipedunculata* Mattos, *Eugenia minutifolia* (Mattos & D. Legrand) Mattos, *Eugenia obtusa* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Eugenia paraguayensis* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Eugenia stricta*

(O. Berg) Kiaersk., *Phyllocalyx herbaceus*

O. Berg, *Phyllocalyx involucratus* (DC.) O. Berg, *Phyllocalyx laevigatus* O. Berg, *Phyllocalyx strictus* O. Berg, *Stenocalyx involucratus* (DC.) Kausel
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, COA, GUA). URY(PAY).

Eugenia janeirensis O. Berg

Árbol. Nativa. 900 m.
 Países: BRA(PAR).

Eugenia joenssonii Kausel

Sin.: *Eugenia lanosa* Mattos & D. Legrand
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-100 m.
 Países: BRA(SCA).

Eugenia kleinii D. Legrand var. **aristata** D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 900 m.
 Países: BRA(PAR).

Eugenia kleinii D. Legrand var. **kleinii**

Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia krapovickasiana Mattos

Árbol. Endémica.
 Países: BRA(SCA).

Eugenia leptoclada O. Berg

Árbol. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Eugenia ligustrina (Sw.) Willd.

Sin.: *Myrtus ligustrina* Sw.
 Árbol. Nativa. 800-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia lilloana D. Legrand

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS).

Eugenia longipedunculata Nied.

Sin.: *Eugenia blasthantha* (O. Berg) D. Legrand, *Stenocalyx blasthantha* O. Berg, *Stenocalyx longipes* O. Berg
 Arbusto o árbol. Nativa. 900-1300 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia macrobracteolata Mattos

Árbol. Endémica. 100-200 m.
 Países: BRA(PAR).

Eugenia magnibracteolata Mattos & D. Legrand

Árbol. Endémica. 100 m.
 Países: BRA(PAR).

Eugenia malacantha D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-100 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia masoni O. Berg

Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, ERI, MIS).
 BRA(RGS, SCA). PRY(APA, APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI). URY(PAY).

Eugenia mattsosii D. Legrand

Arbusto. Endémica. 0-100 m.
 Países: BRA(SCA).

Eugenia melanogyna (D. Legrand)

Sobral
 Sin.: *Eugenia stictosepala* Kiaersk. var. *melanogyna* D. Legrand
 Árbol. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia membranifolia Nied.

Árbol. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Eugenia microcarpa O. Berg

Árbol. Nativa. 0-600 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia modesta DC.

Sin.: *Eugenia racemulosa* O. Berg
 Árbol. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia moraviana O. Berg

Sin.: *Eugenia moraviana* O. Berg var. *impunctata* O. Berg
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Eugenia mosenii (Kausel) Sobral

Sin.: *Myrceugenia mosenii* Kausel
 Árbol. Nativa. 0-200 m.
 Países: BRA(PAR).

Eugenia multicostata D. Legrand var. **multicostata**

Árbol. Endémica. 0-700 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Eugenia multicostata D. Legrand var. **octocostata** D. Legrand

Árbol. Endémica. 100 m.
 Países: BRA(SCA).

Eugenia myrcianthes Nied.

Sin.: *Eugenia edulis* Benth. & Hook. f. ex Griseb., hom. illeg., *Eugenia*

montevidensis Mattos, *Hexachlamys edulis* (O. Berg) Kausel & D. Legrand, *Hexachlamys excelsa* (Cambess.) Mattos, *Myrcia gemmiflora* O. Berg, *Myrcia sparsifolia* Barb. Rodr., *Myrcianthes edulis* O. Berg, *Myrtus excelsa* Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

Eugenia myrciariifolia Soares-Silva & Sobral

Arbusto. Endémica. 600 m.

Países: BRA(PAR).

Eugenia neoglomerata Sobral

Sin.: *Eugenia glomerata* Spring ex Mart.

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR).

Eugenia neomyrtifolia Sobral

Sin.: *Eugenia myrtifolia* Cambess.,

Eugenia paranapitanguensis Mattos

Árbol. Nativa. 400-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia neosilvestris Sobral

Sin.: *Stenocalyx silvestris* O. Berg

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

Eugenia neotristis Sobral

Sin.: *Eugenia tristis* D. Legrand, hom. illeg.

Árbol. Endémica. 100-300 m.

Países: BRA(SCA).

Eugenia neoverrucosa Sobral

Sin.: *Eugenia verrucosa* D. Legrand, hom. illeg.

Árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia nutans O. Berg

Sin.: *Eugenia eurysepala* Kiaersk., *Eugenia schadrackiana* D. Legrand

Árbol. Nativa. 800-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia oblongata O. Berg

Sin.: *Eugenia striata* Mattos & D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(PAR).

Eugenia oeidocarpa O. Berg

Sin.: *Eugenia dimorpha* O. Berg var. *oeidocarpa* (O. Berg) Mattos

Arbusto. Endémica. 1100 m.

Países: BRA(RGS).

Eugenia ophthalmantha Kiaersk.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Eugenia pachyclada D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia pantagensis O. Berg

Arbusto. Nativa. 600-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Eugenia paracatuana O. Berg

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia piloensis Cambess.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Eugenia piresiana Cambess.

Árbol. Endémica. 400 m.

Países: BRA(PAR).

Eugenia pitanga (O. Berg) Kiaersk.

Sin.: *Eugenia camporum* Morong, *Eugenia montigena* Barb. Rodr., *Eugenia pitanga* (O. Berg) Kiaersk. var. *camporum* (Morong)

Mattos, *Stenocalyx pitanga* O. Berg

Arbusto. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, GUA, MIE, PAI).

Eugenia platysema O. Berg

Sin.: *Eugenia floscellus* D. Legrand, *Eugenia oblongata* Mattos & D. Legrand, hom. illeg., *Eugenia pinhaesensis* Mattos

Árbol. Nativa. 900-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia pluriflora DC.

Sin.: *Eugenia bresolinii* D. Legrand, *Eugenia osoriana* Mattos & D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(COA).

Eugenia prasima O. Berg

Sin.: *Eugenia stictosepala* Kiaersk.

Árbol. Endémica. 300 m.

Países: BRA(PAR).

Eugenia pruinosa D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

Eugenia pseudomalacantha D.

Legrand

Árbol. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Eugenia puniceifolia (Kunth) DC.

Sin.: *Eugenia chacoensis* (D. Legrand) Kausel, *Eugenia decorticans* O. Berg, *Eugenia diantha* O. Berg, *Eugenia flava* O. Berg, *Eugenia kunthiana* DC., *Eugenia ovalifolia* Cambess. var. *chacoensis* D. Legrand, *Eugenia ovalifolia* Cambess., *Eugenia rubrescens* Mattos & D. Legrand, *Eugenia triphylla* O. Berg, *Myrtus puniceifolia* Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Eugenia pyriformis Cambess. var.

argentea Mattos & D. Legrand

Árbol. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Eugenia pyriformis Cambess. var. **pyriformis**

Sin.: *Eugenia dumicola* Barb. Rodr., *Eugenia hassleriana* Barb. Rodr., *Eugenia pyriformis* Cambess. f. *ponhi* D. Legrand, *Eugenia pyriformis* Cambess. var. *uvalha* (Cambess.) D. Legrand, *Eugenia turbinata* O. Berg, *Eugenia uvalha* Cambess., *Myrciaria dumicola* (Barb. Rodr.) Chodat & Hassl., *Pseudomyrcianthes pyriformis* (Cambess.) Kausel

Árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(SAO).

Eugenia ramboi D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Eugenia reitziana D. Legrand

Subarbusto. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(SCA).

Eugenia repanda O. Berg

Sin.: *Luma repanda* (O. Berg) Herter
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CEN). URY(ART, RNO, SOR).

Eugenia rojasiana (D. Legrand)

Mattos

Sin.: *Hexachlamys anomala* (D. Legrand) D. Legrand var. *rojasiana* D.

Legrand, *Hexachlamys rojasiana* (D.

Legrand) D. Legrand

Arbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(ITA, PAI, SPE).

Eugenia rostrifolia D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Eugenia rotundicosta D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(SCA).

Eugenia schüchiana O. Berg

Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eugenia sclerocalyx D. Legrand var.**campajuvensis** D. Legrand

Árbol. Endémica. 1200 m.
Países: BRA(SCA).

Eugenia sclerocalyx D. Legrand var.**sclerocalyx**

Árbol. Endémica. 800-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Eugenia sonderiana O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eugenia speciosa Cambess.

Sin.: *Phyllocalyx retusus* O. Berg
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAA, COA). URY(PAY).

Eugenia squamiflora Mattos

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eugenia stigmatica DC.

Sin.: *Eugenia stigmatica* DC. var.
acutata O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

Eugenia subavenia O. Berg

Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia suberosa Cambess.

Sin.: *Eugenia atrata* Mattos & D.
Legrand
Árbol. Nativa. 400-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Eugenia subterminalis DC.

Sin.: *Calycorectes paraguayensis*
Mattos, *Calycorectes paranaensis*
Mattos, *Calycorectes psidiiflorus* (O.
Berg) Sobral var. *schultzianus* (Mattos)
Mattos, *Calycorectes psidiiflorus* (O. Berg)
Sobral var. *triflora* Mattos, *Calycorectes*
riedelianus O. Berg, *Calycorectes*

schultzianus Mattos, *Calycorectes*
striatulus Mattos, *Eugenia paranaensis*
(Mattos) Mattos, *Eugenia psidiiflora* O.
Berg var. *psidiiflora*, *Eugenia psidiiflora*
O. Berg var. *riedeliana* (O. Berg)
Mattos, *Eugenia psidiiflora* O. Berg var.
schultziana (Mattos) Mattos, *Eugenia*
psidiiflora O. Berg var. *triflora* (Mattos)
Mattos

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(COA).

Eugenia suffrutescens Nied.

Sin.: *Eugenia jaguarivaensis* Mattos
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Eugenia sulcata Spring ex Mart.

Sin.: *Stenocalyx sulcatus* (Spring ex
Mart.) O. Berg
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia supraaxillaris Spring

Sin.: *Eugenia convexinervia* D. Legrand
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eugenia uniflora L.

Sin.: *Eugenia micheli* Lam., *Stenocalyx*
micheli (Lam.) O. Berg, *Stenocalyx*
nhampiri Barb. Rodr.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,
CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA,
ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(DUR, PAY,
RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Eugenia uruguayensis Cambess.

Sin.: *Eugenia guabiju* O. Berg, *Eugenia*
maschalantha O. Berg, *Eugenia opaca*
O. Berg, *Eugenia opaca* O. Berg var.
brasiliensis O. Berg, *Eugenia opaca* O.
Berg var. *montevideensis* O. Berg, *Eugenia*
uruguayensis Cambess. var. *opaca* (O.
Berg) D. Legrand, *Luma uruguayensis*
(Cambess.) Herter
Árbol. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(DUR,
PAY, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Eugenia verticillata (Vell.) Angely

Sin.: *Eugenia riedeliana* O. Berg
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Eugenia viridiflora Cambess.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Legrandia Kausel**Legrandia concinna** (Phil.) Kausel

Sin.: *Eugenia concinna* Phil.
Árbol. Endémica. 500-1000 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Luma A. Gray**Luma apiculata** (DC.) Burret

Sin.: *Eugenia affinis* Gillies ex Hook.
& Arn., *Eugenia apiculata* DC. var.
arnyan Hook. f., *Eugenia apiculata* DC.,
Eugenia barneoudii O. Berg, *Eugenia*
cuspidata Phil., *Eugenia ebracteata* F.
Phil., *Eugenia gilliesi* Hook. & Arn.,
Eugenia hookeri Steud., *Eugenia modesta*
Phil., hom. illeg., *Eugenia mucronata*
Phil., *Eugenia palenae* Phil., *Eugenia*
proba O. Berg, *Eugenia spectabilis* Phil.,
Luma gilliesi (Hook. & Arn.) Burret,
Luma hookeri (Steud.) Burret, *Luma*
spectabilis (Phil.) Burret, *Myrceugenella*
apiculata (DC.) Kausel var. *australis*
Kausel, *Myrceugenella apiculata* (DC.)
Kausel var. *genuina* Kausel, nom. inval.,
Myrceugenella apiculata (DC.) Kausel var.
nahuelhuapensis Kausel, *Myrceugenella*
apiculata (DC.) Kausel var. *spectabilis*
(Phil.) Kausel, *Myrceugenella apiculata*
(DC.) Kausel, *Myrceugenella grandjotii*
Kausel, *Myrceugenella apiculata* (DC.)
Nied., *Myrtus chequenilla* Kuntze
Arbusto o árbol. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, RME).

Luma chequen (Molina) A. Gray

Sin.: *Eugenia bella* Phil., hom.
illeg., *Eugenia chequen* Molina,
Eugenia gayana Barnéoud, *Eugenia*
myrtomimeta Diels, *Eugenia pulchra* O.
Berg, *Luma gayana* (Barnéoud) Burret,
Myrceugenella chequen (Molina) Kausel
var. *myrtomimeta* (Diels) Kausel,
Myrceugenella chequen (Molina) Kausel,
Myrceugenella gayana (Barnéoud)
Kausel, *Myrceugenella langerfeldtii*
Kausel, *Myrtus chequen* (Molina)
Spreng., *Myrtus gayana* (Barnéoud) O.
Berg, *Myrtus uliginosa* Miq. f. *major*
Miq., *Myrtus uliginosa* Miq.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Marlierea Cambess.**Marlierea krapovickae** D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Marlierea obscura O. Berg

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Marlierea riedeliana (O. Berg) D.

Legrand

Sin.: *Eugeniopsis riedeliana* O. Berg

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Metrosideros Banks ex Gaertn.**Metrosideros stipularis** (Hook. &

Arn.) Hook. f.

Sin.: *Myrtus stipularis* Hook. & Arn.,*Tepualia patagonica* Phil., *Tepualia**philippiana* Griseb., *Tepualia stipularis*(Hook. & Arn.) Griseb., *Tepualia**stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. var.*patagonica* (Phil.) Reiche, *Tepualia**stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. var.*philippiana* (Griseb.) Speg.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Myrceugenia O. Berg**Myrceugenia acutata** D. LegrandSin.: *Myrceugenia ovata* (Hook. & Arn.) O. Berg var *acutata* (D. Legrand)

Landrum

Arbusto o árbol. Endémica. 200-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia acutiflora (Kiaersk.) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia acutiflora* Kiaersk., *Luma acutiflora* (Kiaersk.) Burret

Arbusto o árbol. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia alpigena (DC.) LandrumSin.: *Eugenia alpigena* DC., *Eugenia fuligena* O. Berg *Eugenia fuliginea* O. Berg var. *rufa* O. Berg, *Luma alpigena* (DC.) Burret, *Myrceugenia alpigena* (DC.) Landrum var. *fuligena* (O. Berg) Landrum, *Myrceugenia alpigena* (DC.) Landrum var. *rufa* (O. Berg) Landrum, *Myrceugenia bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kausel var.*alpigena* (DC.) D. Legrand, *Myrceugenia**bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kauselvar. *australis* D. Legrand, *Myrceugenia**bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kausel var.*fuliginea* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia**bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kauselvar. *guaratubensis* Mattos, *Myrceugenia**catharinae* D. Legrand, *Myrceugenia**leptorhyncha* D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 900-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia bocaiuensis Mattos

Arbusto o árbol. Endémica. 800-900 m.

Países: BRA(PAR).

Myrceugenia bracteosa (DC.) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia bracteosa* DC.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia brevipedicellata

(Burret) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Luma brevipedicellata* Burret

Árbol. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Myrceugenia camargoana Mattos

Árbol. Endémica. 100-400 m.

Países: BRA(RGS).

Myrceugenia campestris (DC.) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia campestris* DC., *Eugenia distans* O. Berg, *Luma campestris* (DC.)Burret, *Luma distans* (O. Berg) Burret,*Myrceugenia campestris* (DC.) D. Legrand& Kausel var. *distans* (O. Berg) D.Legrand, *Myrceugenia distans* (O. Berg)

D. Legrand & Kausel

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia chrysocarpa (O. Berg)

Kausel

Sin.: *Eugenia buxifolia* Phil., *Eugenia chrysocarpa* O. Berg, *Eugenia patagonica*Phil. var. *macrophylla* Phil., *Eugenia**patagonica* Phil. var. *microphylla* Phil.,*Eugenia patagonica* Phil., *Eugenia**petiolata* Phil., *Eugenia philippii* O. Berg,*Luma chrysocarpa* (O. Berg) Burret, *Luma**philippii* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia**buxifolia* (Phil.) Reiche

Arbusto o árbol. Endémica. 500-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Myrceugenia colchaguensis (Phil.)

L.E. Navas

Sin.: *Eugenia colchaguensis* Phil.,*Myrceugenia malvillana* Kausel

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Myrceugenia correifolia (Hook. & Arn.) O. BergSin.: *Eugenia correifolia* Hook. & Arn.,*Eugenia maritima* Barnéoud, *Eugenia**thalassaia* O. Berg, *Luma correifolia*(Hook. & Arn.) A. Gray, *Myrceugenia**johowi* Gusinde, *Myrceugenia maritima*(Barnéoud) Kausel, *Myrceugenia**thalassaia* (O. Berg) Gusinde ex Fuentes

Arbusto o árbol. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU).

Myrceugenia cucullata D. Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia euosma (O. Berg) D.

Legrand

Sin.: *Eugenia aprica* O. Berg, *Eugenia**euosma* O. Berg var. *lutescens* O. Berg,*Eugenia euosma* O. Berg var. *rufescens* O. Berg,*Eugenia euosma* O. Berg, *Eugenia**nana* O. Berg var. *congesta* O. Berg,*Eugenia nana* O. Berg var. *effusa* O. Berg,*Eugenia nana* O. Berg, *Luma aprica* (O. Berg)Burret, *Luma cinerea* Burret, *Luma**euosma* (O. Berg) Burret, *Luma nana* (O. Berg)Burret, *Myrceugenia euosma* (O. Berg)D. Legrand var. *oblongata* Mattos

Arbusto o árbol. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(CAU, GUA, PAI). URY(CLA,

RIV, TAC, TYT).

Myrceugenia exsucca (DC.) O. BergSin.: *Eugenia corralensis* Phil., *Eugenia**exsucca* DC. var. *apiculata* O. Berg, *Eugenia**exsucca* DC. var. *patagua* O. Berg, *Eugenia**exsucca* DC. var. *peruviana* O. Berg, nom.inval., *Eugenia exsucca* DC. var. *temu*(Hook. & Arn.) O. Berg, *Eugenia exsucca*DC., *Eugenia multiflora* Hook. & Arn.,hom. illeg., *Eugenia pitra* O. Berg, *Eugenia**temu* Hook. & Arn., *Luma corralensis*(Phil.) Burret, *Luma exsucca* (DC.) Burret,*Luma pitra* (O. Berg) Burret, *Luma**temu* (Hook. & Arn.) Gray, *Myrceugenia**camphorata* O. Berg, *Myrceugenia**lechleriana* O. Berg, *Myrceugenia multiflora*

(Hook. & Arn.) Kausel

Árbol. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,

LRI, LLA, AIS, RME).

Myrceugenia fernandeziana (Hook. & Arn.) Johow

Sin.: *Eugenia fernandeziana* (Hook. & Arn.) Barnéoud, *Eugenia lumilla* Phil., *Luma fernandeziana* (Hook. & Arn.) Burret, *Myrceugenia luma* O. Berg, *Myrtus fernandeziana* Hook. & Arn., *Nothomyrcia fernandeziana* (Hook. & Arn.) Kausel

Árbol. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(JFE).

Myrceugenia foveolata (O. Berg)

Sobral

Sin.: *Eugenia foveolata* O. Berg, *Myrceugenia leptocalyx* D. Legrand var. *coriacea* Mattos, *Myrceugenia leptocalyx* D. Legrand

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Myrceugenia franciscensis (O. Berg)

Landrum

Sin.: *Eugenia franciscensis* O. Berg, *Myrceugenia bracteosa* (DC.) D. Legrand & Kausel var. *franciscensis* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia longipedunculata* Mattos & D. Legrand

Arbusto. Nativa. 500-900 m.

Países: BRA(PAR).

Myrceugenia gertii Landrum

Sin.: *Calyptrogenia hatschbachii* D.

Legrand

Arbusto o árbol. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Myrceugenia glaucescens (Cambess.)

D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia araujoana* O. Berg, *Eugenia bagensis* O. Berg, *Eugenia bagensis* O. Berg var. *angustifolia* O. Berg, *Eugenia bagensis* O. Berg var. *avenia* O. Berg, *Eugenia bagensis* O. Berg var. *latifolia* O. Berg, *Eugenia cambessedeano* O. Berg, *Eugenia canelonensis* O. Berg, *Eugenia elegans* O. Berg, *Eugenia glaucescens* Cambess., *Eugenia pallida* O. Berg, *Eugenia ribeireana* O. Berg, *Luma angustior* Burret, *Luma araujoana* (O. Berg) Burret, *Luma bagensis* (O. Berg) Burret, *Luma canelonensis* (O. Berg) Burret, *Luma elegans* (O. Berg) Burret, *Luma glaucescens* (Cambess.) Burret, *Luma latior* Burret, *Luma pallida* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel f. *catharinensis* D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel f. *debilis* D. Legrand

& Klein, *Myrceugenia glaucescens*

(Cambess.) D. Legrand & Kausel f.

pallida (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel var. *latior* (Burret) D. Legrand, *Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D. Legrand & Kausel var. *pallida* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *pallida* (O. Berg) Kausel, *Myrceugenia grisea* D. Legrand, *Myrceugenia latior* (Burret) D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia pallida* (O. Berg) D. Legrand & Kausel

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).

URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TYT).

Myrceugenia hamoniana (Mattos)

Sobral

Sin.: *Myrceugenia smithii* Landrum,

Eugenia hamoniana Mattos

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Myrceugenia hatschbachii Landrum

Arbusto. Endémica. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Myrceugenia hoehnei (Burret) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Luma hoehnei* Burret

Arbusto. Nativa. 1000-1300 m.

Países: BRA(SCA).

Myrceugenia kleinii D. Legrand &

Kausel

Árbol. Endémica. 200-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia lanceolata (Juss. ex J.

St.-Hil.) Kausel

Sin.: *Eugenia dombeyana* DC., *Eugenia gudilla* (Colla) Barnéoud, *Eugenia stenophylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* Hook. ex O. Berg, *Eugenia stenophylla* Hook. & Arn., *Luma dombeyana* (DC.) Burret, *Luma stenophylla* (Hook. & Arn.) Gray, *Myrceugenia stenophylla* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Myrtus gudilla* Colla, *Myrtus lanceolata* Juss. ex J. St.-Hil.

Arbusto. Endémica. 200-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Myrceugenia leptocalyx D. Legrand

Sin.: *Myrceugenia leptocalyx* D. Legrand var. *coriacea* Mattos

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(RGS).

Myrceugenia leptospermoides (DC.)

Kausel

Sin.: *Eugenia leptospermoides* DC., *Eugenia leptospermoides* DC. var. *microphylla* O. Berg, *Eugenia leptospermoides* DC. var. *latifolia* O. Berg, *Eugenia leptospermoides* DC. var. *longifolia* O. Berg, *Eugenia thymifolia* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Myrceugenia mesomischa (Burret) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Luma mesomischa* Burret

Árbol. Endémica. 400-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Myrceugenia miersiana (Gardner) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia miersiana* Gardner var.

costata O. Berg, nom. inval., *Eugenia*

miersiana Gardner, *Luma brevipes*

Burret, *Luma fuscovelutina* Burret, *Luma*

miersiana (Gardner) Burret, *Myrceugenia*

brevipes (Burret) D. Legrand & Kausel,

Myrceugenia fuscovelutina (Burret)

D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia*

miersiana (Gardner) D. Legrand &

Kausel var. *venosa* (O. Berg) D. Legrand

& Klein, *Myrceugenia nothorufa* D.

Legrand var. *venosa* D. Legrand

Arbusto o árbol. Nativa. 300-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia miersiana (Gardner) D.

Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia miersiana* Gardner, *Eugenia*

miersiana Gardner var. *costata* O. Berg,

nom. inval., *Luma miersiana* (Gardner)

Burret, *Luma fuscovelutina* Burret,

Myrceugenia fuscovelutina (Burret) D.

Legrand & Kausel, *Myrceugenia nothorufa*

D. Legrand var. *venosa* D. Legrand,

Myrceugenia miersiana (Gardner) D.

Legrand & Kausel var. *venosa* (O. Berg) D.

Legrand & Klein

Arbusto o árbol. Nativa. 300-1600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia myrcioides (Cambess.)

O. Berg

Sin.: *Eugenia acrophylla* O. Berg,

Eugenia estrellensis O. Berg, *Eugenia*

myrcioides Cambess., *Luma acrophylla*

(O. Berg) Burret, *Luma estrellensis*

(O. Berg) Burret, *Luma myrcioides*

(Cambess.) Burret, *Luma ulei* Burret,

Myrceugenia acrophylla (O. Berg) D.

Legrand var. *ulei* (Burret) D. Legrand,

Myrceugenia acrophylla (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia estrellensis* (O. Berg) D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia ferreira-limana* Klein & D. Legrand, *Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O. Berg, var. *acrophylla* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O. Berg var. *hypericifolia* (Gardner) D. Legrand, *Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O. Berg var. *paranensis* D. Legrand, *Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O. Berg var. *ulei* (Burret) D. Legrand, *Myrceugenia paranaguensis* Mattos
Árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia myrtoides O. Berg
Sin.: *Luma cinnamomeotomentosa* Burret, *Luma myrtoides* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia camargoana* Mattos, *Myrceugenia montevidensis* O. Berg var. *sellowiana* (O. Berg) Mattos, *Myrceugenia montevidensis* O. Berg, *Myrceugenia myrtoides* O. Berg var. *conferta* O. Berg, *Myrceugenia myrtoides* O. Berg var. *stricta* O. Berg, *Myrceugenia sellowiana* O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, TAC).

Myrceugenia obtusa (DC.) O. Berg
Sin.: *Eugenia obtusa* DC., *Eugenia polyantha* Phil., *Eugenia raran* (Colla) Barnéoud, *Luma obtusa* (DC.) A. Gray, *Myrceugenia chilensis* O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *berteroana* O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *polyantha* (Phil.) O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *raran* (Colla) O. Berg, *Myrtus raran* Colla
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Myrceugenia ovalifolia (O. Berg) Landrum
Sin.: *Mitranthes maria-emiliae* D. Legrand, *Mitranthes ovalifolium* O. Berg, *Mitropsidium ovalifolium* (O. Berg) Burret
Arbusto o árbol. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Myrceugenia ovata (Hook. & Arn.) O. Berg var. *acutata* (D. Legrand) Landrum
Sin.: *Myrceugenia acutata* D. Legrand
Arbusto o árbol. Endémica. 200-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia ovata (Hook. & Arn.) O. Berg var. *nannophylla* (Burret) Landrum

Sin.: *Luma nannophylla* Burret, *Myrceugenia montana* Kausel, *Myrceugenia nannophylla* (Burret) Kausel, *Myrceugenia valientei* Kausel
Arbusto o árbol. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Myrceugenia ovata (Hook. & Arn.) O. Berg var. *ovata*
Sin.: *Eugenia cumingii* Hook. & Arn., *Eugenia ovata* Hook. & Arn., *Eugenia trichocarpa* Phil., *Luma cumingii* (Hook. & Arn.) Burret, *Luma ovata* (Hook. & Arn.) Burret
Arbusto o árbol. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Myrceugenia oxyssepala (Burret) D. Legrand & Kausel
Sin.: *Luma macrosepala* Burret, *Luma oxyssepala* Burret, *Myrceugenia macrosepala* (Burret) D. Legrand & Kausel
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia parvifolia (DC.) Kausel
Sin.: *Eugenia parvifolia* DC., *Luma baeckeoides* Griseb.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Myrceugenia pilotantha (Kiaersk.) Landrum
Sin.: *Eugenia pilotantha* Kiaersk., *Luma pilotantha* (Kiaersk.) Burret, *Myrceugenia nothorufa* D. Legrand var. *major* D. Legrand, *Myrceugenia nothorufa* D. Legrand, *Myrceugenia pilotantha* (Kiaersk.) Landrum var. *major* (D. Legrand) Landrum, *Myrceugenia pilotantha* (Kiaersk.) Landrum var. *nothorufa* (D. Legrand) Landrum, *Myrceugenia ramboi* D. Legrand
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Myrceugenia pinifolia (F. Phil.) Kausel
Sin.: *Eugenia pinifolia* F. Phil., *Myrceugenia stenophylla* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *pinifolia* (F. Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Myrceugenia planipes (Hook. & Arn.) O. Berg
Sin.: *Eugenia distoma* O. Berg, *Eugenia planipes* Hook. & Arn. var. *genuina* O. Berg, nom. inval., *Eugenia*

planipes Hook. & Arn. var. *grandifolia* O. Berg, *Eugenia planipes* Hook. & Arn., *Myrceugenia distoma* (O. Berg) Kausel, *Myrcia planipes* (Hook. & Arn.) Kiaersk.
Árbol. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Myrceugenia regnelliana (O. Berg) D. Legrand & Kausel
Sin.: *Eugenia itatiaiensis* Kiaersk., *Eugenia regnelliana* O. Berg, *Eugenia xanthochlora* O. Berg, *Luma gracilis* Burret, *Luma regnelliana* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia itatiaiensis* (Kiaersk.) D. Legrand & Kausel, *Myrceugenia ovata* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *gracilis* (Burret) Landrum, *Myrceugenia ovata* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *regnelliana* (O. Berg) Landrum, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel f. *itatiaiensis* (Kiaersk.) D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel f. *xanthochlora* (O. Berg) D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *capillaris* D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *coriaceae* D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *gracilis* (Burret) D. Legrand, *Myrceugenia regnelliana* (O. Berg) D. Legrand & Kausel var. *leptophylla* D. Legrand
Arbusto o árbol. Nativa. 500-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrceugenia reitzii D. Legrand & Kausel
Arbusto o árbol. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia rufa (Colla) Skottsbo. ex Kausel
Sin.: *Eugenia ferruginea* Hook. & Arn., *Eugenia rufa* (Colla) Barnéoud, *Luma ferruginea* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Luma rufa* (Colla) Burret, *Myrceugenia ferruginea* (Hook. & Arn.) Reiche, *Myrtus rufa* Colla
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Myrceugenia rufescens (DC.) D. Legrand & Kausel
Sin.: *Eugenia poeppigiana* O. Berg, *Eugenia rufescens* DC., *Luma rufescens* (O. Berg) Burret, *Myrceugenia jonssonii* Kausel, *Myrceugenia rufescens* (DC.) D. Legrand & Kausel var. *alegrensis* D. Legrand
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia schulzei Johow

Sin.: *Luma schulzei* (Johow) Burret
Árbol. Endémica. 400 m.
Países: CHL(JFE).

Myrceugenia scutellata D. Legrand

Árbol. Nativa. 600-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia seriatoramosa

(Kiaersk.) D. Legrand & Kausel

Sin.: *Eugenia seriato-ramosa* Kiaersk.,
Luma seriato-ramosa (Kiaersk.) Burret
Árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrceugenia venosa D. Legrand

Sin.: *Myrceugenia miersiana* (Gardner)
D. Legrand & Kausel var. *lanceolata* D.
Legrand
Arbusto o árbol. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia DC. ex Guill.**Myrcia aethusa** (O. Berg) N. Silveira

Sin.: *Aulomyrcia aethusa* O. Berg,
Myrcia richardiana O. Berg. var.
richardiana
Árbol. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia amazonica DC.

Sin.: *Myrcia leptoclada* DC.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia anacardiifolia Gardner

Sin.: *Gomidesia anacardiifolia*
(Gardner) O. Berg
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia anomala Cambess.

Sin.: *Myrcia alpestris* Barb. Rodr. ex
Chodat & Hassl., nom. nud., *Myrcia*
anomala Cambess. var. *multiceps* O. Berg,
Myrcia cotonosa Barb. Rodr. ex Chodat &
Hassl., nom. nud.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CON,
COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

Myrcia atropilosa (O. Berg) N. Silveira

Sin.: *Aulomyrcia atropilosa* (O. Berg) N.
Silveira
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Myrcia barituensis (Legname) B. Holst

Sin.: *Gomidesia barituensis* Legname
Árbol. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Myrcia bella Cambess.

Sin.: *Aulomyrcia bella* (Cambess.) O.
Berg, *Myrcia dasiblasta* O. Berg
Arbusto. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON, COA).

Myrcia bicarinata (O. Berg) D.

Legrand
Sin.: *Aulomyrcia bicarinata* O. Berg
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia brasiliensis Kiaersk.

Sin.: *Gomidesia schaueriana* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia catharinensis (D. Legrand)

NicLugh.
Sin.: *Gomidesia affinis* (Cambess.) D.
Legrand var. *catharinensis* D. Legrand
Árbol. Endémica. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia costeira M.F. Santos

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia cruciflora A.R. Lourenço & E.

Lucas
Sin.: *Calypttranthes concinna* DC.,
Calypttranthes concinna DC. var.
glomerata (Cambess.) D. Legrand,
Calypttranthes concinna DC. var.
paulistana D. Legrand, nom. illeg.,
Calypttranthes glomerata Cambess.,
Calypttranthes kleinii D. Legrand,
Calypttranthes paraguayensis Barb. Rodr.,
Calypttranthes reitziana D. Legrand,
Calypttranthes variabilis O. Berg var.
oblongata O. Berg, *Calypttranthes*
variabilis O. Berg var. *pulchella* O. Berg,
Calypttranthes variabilis O. Berg var.
riparia O. Berg, *Calypttranthes variabilis*
O. Berg var. *stricta* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA,
GUA, PAI). URY(RIV, SAO, TAC, TYT).

Myrcia diaphana (O. Berg) N. Silveira

Sin.: *Aulomyrcia diaphana* O. Berg
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia dichrophylla D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia dictyophleba (O. Berg) D.

Legrand
Sin.: *Aulomyrcia dictyophleba* O. Berg
Arbusto. Nativa. 700-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia eugeniopsoides (D. Legrand & Kausel) Mazine

Sin.: *Calypttranthes eugeniopsoides*
D. Legrand & Kausel, *Marlierea*
eugeniopsoides (D. Legrand & Kausel) D.
Legrand
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia excoriata (Mart.) E. Lucas & C.E. Wilson

Sin.: *Marlierea excoriata* Mart.,
Marlierea parviflora O. Berg var.
parviflora
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia ferruginosa Mazine

Sin.: *Eugenia sylvatica* Gardner, hom.
illeg., *Eugeniopsis sylvatica* O. Berg,
Marlierea sylvatica (O. Berg) Kiaersk.
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia flagellaris (D. Legrand) Mattos

Sin.: *Gomidesia flagellaris* D. Legrand
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia freyreissiana (O. Berg) Kiaersk.

Sin.: *Gomidesia freyreissiana* O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Myrcia glabra (O. Berg) D. Legrand

Sin.: *Aulomyrcia glabra* O. Berg,
Myrcia citrifolia D. Legrand, nom. illeg.,
Aulomyrcia acrantha O. Berg
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

Sin.: *Aulomyrcia alternifolia* O. Berg,
Aulomyrcia fragilis O. Berg, *Aulomyrcia*
maritima O. Berg, *Aulomyrcia obscura* O.
Berg, *Aulomyrcia obtecta* O. Berg, *Aulomyrcia*
scrobiculata O. Berg, *Eugenia guianensis*
Aubl., *Myrcia alternifolia* Miq., *Myrcia incisa*
D. Legrand, *Myrcia obtecta* (O. Berg) Kiaersk.
var. *alternifolia* (O. Berg) D. Legrand,

Myrcia obtecta (O. Berg) Kiaersk., *Myrcia scrobiculata* (O. Berg) O. Berg, *Myrcia stemmeriana* D. Legrand
Arbusto. Nativa. 200-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAN, SPE).

Myrcia grandifolia O. Berg
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Myrcia hartwegiana (O. Berg) Kiaersk.
Sin.: *Gomidesia hartwegiana* O. Berg, *Gomidesia sellowiana* O. Berg
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia hatschbachii D. Legrand
Árbol. Endémica. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia hebetata DC.
Sin.: *Gomidesia affinis* (Cambess.)
D. Legrand var. *pohlana* (O. Berg) D.
Legrand, *Gomidesia candolleana* O. Berg,
Gomidesia pohlana O. Berg, *Myrcia candolleana* (O. Berg) Kiaersk.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Myrcia heringii D. Legrand
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia hexasticha Kiaersk.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Myrcia ilheoensis Kiaersk.
Sin.: *Gomidesia fenzliana* O. Berg
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia insularis Gardner
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Myrcia isaiana G.M. Barroso & Peixoto
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Myrcia legrandii A.R. Lourenço & E. Lucas
Sin.: *Calyptanthes hatschbachii* D.
Legrand, *Calyptanthes obovata* Kiaersk.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Myrcia lonchophylla A.R. Lourenço & E. Lucas
Sin.: *Calyptanthes lanceolata* O. Berg,
Calyptanthes lanceolata O. Berg var.
catharinensis D. Legrand
Arbusto o árbol. Nativa. 300-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia multiflora (Lam.) DC.
Sin.: *Aulomyrcia glaucescens* O. Berg,
Aulomyrcia ovalifolia O. Berg, *Eugenia multiflora*
multiflora Lam., *Myrcia multiflora*
(Lam.) DC. var. *glaucescens* (O. Berg) D.
Legrand, *Myrcia multiflora* (Lam.) DC.
f. *ovalifolia* (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia ovalifolia* (O. Berg) Kiaersk.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, ÑEE,
PAI, SPE).

Myrcia multipunctata Mazine
Sin.: *Eugenia laevigata* DC., *Eugeniopsis laevigata* (DC.) O. Berg, *Marlierea laevigata* (DC.) Kiaersk.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Myrcia neobrasiliensis A.R. Lourenço & E. Lucas
Sin.: *Calyptanthes brasiliensis* Spreng.,
Calyptanthes brasiliensis Spreng.
var. *mutabilis* (O. Berg) D. Legrand,
Calyptanthes grandifolia O. Berg var.
grandifolia, *Calyptanthes grandifolia*
O. Berg var. *macrantha* D. Legrand,
Calyptanthes grandifolia O. Berg var.
rufa (O. Berg) D. Legrand, *Calyptanthes loranthifolia* DC., *Calyptanthes loranthifolia* DC. var. *mutabilis* (O. Berg)
D. Legrand, *Calyptanthes mutabilis* O.
Berg, *Calyptanthes rufa* O. Berg
Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia neolucida A.R. Lourenço & E. Lucas
Sin.: *Calyptanthes lucida* Mart. ex DC.
f. *hilariana*, *Calyptanthes lucida* Mart.
ex DC. var. *lucida*, *Calyptanthes lucida*
Mart. ex DC. var. *polyantha* (O. Berg) D.
Legrand, *Calyptanthes polyantha* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia neoregeliana E. Lucas & C.E. Wilson
Sin.: *Marlierea regeliana* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Myrcia neoriedeliana E. Lucas & C.E. Wilson
Sin.: *Eugeniopsis neoriedeliana* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia neosuaveolens E. Lucas & C.E. Wilson
Sin.: *Marlierea suaveolens* Cambess.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia neotomentosa E. Lucas & C.E. Wilson
Sin.: *Marlierea spathulata* O. Berg,
Marlierea tomentosa Cambess.
Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia oblongata DC.
Sin.: *Aulomyrcia bombycina* O. Berg,
Myrcia bombycina (O. Berg) Kiaersk.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, PAI).

Myrcia oligantha O. Berg
Sin.: *Aulomyrcia fenzliana* O. Berg,
Myrcia kauseliana D. Legrand, *Myrcia richardiana* O. Berg var. *fenzliana* (O. Berg) D. Legrand
Árbol. Nativa. 100-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia palustris DC.
Sin.: *Gomidesia bergiana* D. Legrand,
nom. nud., *Gomidesia garopabensis*
(Cambess.) D. Legrand, *Gomidesia palustris* (DC.) Kausel, *Gomidesia palustris* (DC.) D. Legrand, comb. illeg., *Gomidesia palustris* (DC.) D. Legrand
var. *angustifolia* (O. Berg) Mattos *Myrcia palustris* DC. var. *angustifolia* O. Berg,
Myrcia palustris DC. var. *bracteata*
O. Berg, *Myrcia palustris* DC. var.
stictophylla O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CAN, CEN,
COA, GUA, MIE, PAI). URY(RIV, TAC).

Myrcia pileata (D. Legrand) A.R. Lourenço & E. Lucas
Sin.: *Calyptanthes dusenii* Kausel,
Calyptanthes pileata D. Legrand var.
pileata, *Calyptanthes pileata* D. Legrand
var. *riograndensis* D. Legrand
Árbol. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia plusiantha Kiaersk.
Árbol. Nativa. 600-900 m.
Países: BRA(PAR).

Myrcia pubiflora DC.
Sin.: *Aulomyrcia pohliana* O. Berg,
Myrcia calumbaensis Kiaersk.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Myrcia pubipetala Miq. var.
magnifolia D. Legrand
Árbol. Endémica. 300 m.
Países: BRA(SCA).

Myrcia pubipetala Miq. var.
pubipetala
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia racemosa (O. Berg) Kiaersk.
Sin.: *Aulomyrcia gaudichaudiana* O.
Berg, *Aulomyrcia racemosa* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia reitzii (D. Legrand) Mazine
Sin.: *Marlierea reitzii* D. Legrand
Árbol. Nativa. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia retorta Cambess.
Sin.: *Myrcia arborescens* O. Berg
Árbol. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia rostrata DC. f. **flexuosa**
Soares-Silva
Árbol. Endémica. 600-700 m.
Países: BRA(PAR).

Myrcia rostrata DC. f. **gracilis** (O.
Berg) D. Legrand
Sin.: *Myrcia gracilis* O. Berg, *Myrcia*
gracilis O. Berg var. *opaca* O. Berg, *Myrcia*
pellucida O. Berg,
Árbol. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia rostrata DC. f. **rostrata**
Sin.: *Myrcia catharinae* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAN).

Myrcia rubella (O. Berg) A.R. Lourenço
& E. Lucas
Sin.: *Calyptanthes rubella* (O. Berg) D.
Legrand, *Calyptanthes variabilis* O. Berg
var. *rubella* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia rupicola D. Legrand
Árbol. Endémica. 800-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia selloi (Spreng.) N. Silveira
Sin.: *Aulomyrcia assumptionis*
(Morong) Kausel, *Aulomyrcia laruooteana*
(Cambess.) O. Berg var. *paraguayensis*
O. Berg, *Aulomyrcia ramulosa* (DC.)
O. Berg, *Aulomyrcia selloi* (Spreng.)
Kausel, *Aulomyrcia undulata* O. Berg,
Myrcia assumptionis Morong, *Myrcia*
corrientinensis Barb. Rodr. ex Chodat &
Hassl., nom. nud., *Myrcia dealbata* Barb.
Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud.,
Myrcia hassleriana Barb. Rodr., *Myrcia*
lajeara D. Legrand, *Myrcia laruooteana*
Cambess. var. *australis* D. Legrand,
Myrcia laruooteana Cambess. var.
laruooteana, *Myrcia laruooteana* Cambess.
var. *paraguayensis* (O. Berg) D. Legrand,
Myrcia microsiphonata D. Legrand,
Myrcia perobimi Barb. Rodr. ex Chodat &
Hassl., nom. nud., *Myrcia ramulosa* DC.
var. *megapotamica* D. Legrand, *Myrcia*
ramulosa DC. var. *microsiphonata* (D.
Legrand) D. Legrand, *Myrcia ramulosa*
DC., *Myrcia selloi* (Spreng.) N. Silveira
var. *megapotamica* (D. Legrand) N.
Silveira, *Myrcia selloi* (Spreng.) N.
Silveira var. *microsiphonata* (D. Legrand)
N. Silveira, *Myrcia smithii* D. Legrand,
Myrcia selloi Spreng.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(ART, RIV, SAO).

Myrcia spectabilis DC.
Sin.: *Gomidesia browniana* (Gardner)
O. Berg, *Gomidesia spectabilis* (DC.) O.
Berg, *Myrcia browniana* Gardner
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia splendens (Sw.) DC.
Sin.: *Myrcia splendens* Sw.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Myrcia squamata (Mattos & D.
Legrand) Mattos
Sin.: *Gomidesia squamata* Mattos & D.
Legrand
Arbolito. Endémica. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia strigosa A.R. Lourenço & E.
Lucas
Sin.: *Calyptanthes strigipes* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia subcordata DC.
Sin.: *Aulomyrcia breviamis* O. Berg.,
Myrcia breviamis (O. Berg) D. Legrand,
Myrcia jaguariaivenis Mattos & D.
Legrand
Arbusto o árbol. Nativa. 700-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia tenuivenosa Kiaersk.
Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrcia tijucensis Kiaersk.
Sin.: *Gomidesia tijucensis* (Kiaersk.) D.
Legrand
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.
Sin.: *Eugenia tomentosa* Aubl.
Árbol. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Myrcia tortuosa (O. Berg) N. Silveira
Sin.: *Aulomyrcia pachyclada* O. Berg,
Aulomyrcia tortuosa O. Berg
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Myrcia tricona (D. Legrand) A.R.
Lourenço & E. Lucas
Sin.: *Calyptanthes iraiensis* Mattos,
Calyptanthes tricona D. Legrand
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Myrcia undulata O. Berg
Sin.: *Myrcia sosias* D. Legrand
Árbol. Nativa. 700-1100 m.
Países: BRA (PAR, SCA).

Myrcia vellozoi Mazine
Sin.: *Marlierea racemosa* (Vell.)
Kiaersk., *Myrcia racemosa* Vell.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Myrcia venulosa DC. var. **dives** (O.
Berg) Soares-Silva
Sin.: *Aulomyrcia reticulata* O. Berg var.
dives O. Berg
Árbol. Endémica. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Myrcia venulosa DC. var. **venulosa**

Sin.: *Aulomyrcia castrensis* O. Berg, *Aulomyrcia laureola* O. Berg, *Aulomyrcia reticulata* O. Berg var. *pauciflora* O. Berg, *Myrcia castrensis* (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia dictyophleba* (O. Berg) D. Legrand, *Myrcia laureola* (O. Berg) Kiaersk.
Árbol. Nativa. 300-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrcia verticillaris O. Berg

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV, TAC).

Myrcianthes O. Berg**Myrcianthes callicoma** McVaugh

Árbol. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(TUC).

Myrcianthes cisplatensis (Cambess.)

O. Berg
Sin.: *Blepharocalyx ellipticus* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Eugenia apiculata* (O. Berg) Nied., comb. illeg., *Eugenia cisplatensis* Cambess., *Eugenia cisplatina* Arechav., *Eugenia elliptica* Hook. & Arn., *Luma cisplatensis* (Cambess.) Herter, *Myrcianthes apiculata* O. Berg
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(COL, DUR, MAL, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

Myrcianthes coquimbensis

(Barnéoud) Landrum & Grifo
Sin.: *Aspidogenia coquimbensis* (Barnéoud) Burret, *Reichea coquimbensis* (Barnéoud) Kausel, *Myrtus coquimbensis* Barnéoud
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ).

Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D.

Legrand
Sin.: *Eugenia cisplatensis* Cambess. var. *gigantea* D. Legrand
Árbol. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, TYT).

Myrcianthes mato (Griseb.) McVaugh

Sin.: *Acreugenia mato* (Griseb.) Kausel, *Eugenia mato* Griseb.
Árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Myrcianthes minimifolia (McVaugh)

McVaugh
Sin.: *Eugenia minimifolia* McVaugh
Árbol. Nativa. 2000-2300 m.
Países: ARG(JUJ).

Myrcianthes pedersenii D. Legrand

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: PRY(APA, GUA, MIE).

Myrcianthes pseudomato (D.

Legrand) McVaugh
Sin.: *Eugenia pseudomato* D. Legrand, *Pseudomyrcianthes pseudomato* (D. Legrand) Kausel
Árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Myrcianthes pungens (O. Berg) D.

Legrand
Sin.: *Acreugenia pungens* (O. Berg) Kausel, *Eugenia pungens* O. Berg
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, CEN, GUA, ÑEE, PAI). URY(CLA, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).

Myrcianthes riparia Sobral, Grippa &

T.B. Guimarães
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).

Myrciaria O. Berg**Myrciaria cuspidata** O. Berg

Sin.: *Eugenia alegrensis* Kiaersk., *Myrciaria apiculata* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Myrciaria recurvipetala* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Myrciaria delicatula (DC.) O. Berg

Sin.: *Eugenia delicatula* DC., *Myrciaria linearifolia* O. Berg, *Myrciaria micrantha* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Paramyrciaria delicatula* (DC.) Kausel var. *argentinensis* Kausel, *Paramyrciaria delicatula* (DC.) Kausel var. *delicatula*, *Paramyrciaria delicatula* (DC.) Kausel var. *linearifolia* (O. Berg) Kausel
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, COA, ITA, PAI).

Myrciaria floribunda (West ex Willd.)

O. Berg
Sin.: *Eugenia ciliolata* Cambess., *Eugenia floribunda* West ex Willd., *Myrciaria arborea* D. Legrand, *Myrciaria axillaris* O. Berg, *Myrciaria ciliolata* (Cambess.) O. Berg, *Myrciaria leucophloea* O. Berg, *Myrciaria tolypantha* O. Berg
Paramyrciaria ciliolata (Cambess.) Rotman
Arbusto o árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, PAI, SPE).

Myrciaria glazoviana (Kiaersk.) G.M.

Barroso ex Sobral
Sin.: *Eugenia cabelludo* Kiaersk. var. *glazioviana* Kiaersk., *Paramyrciaria glazioviana* (Kiaersk.) Sobral
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Myrciaria plinioides D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Myrciaria tapiraguayensis Barb.

Rodr. ex Chodat & Hassl.
Sin.: *Myrciaria rojasii* D. Legrand, *Paramyrciaria tapiraguayensis* (Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl.) Sobral
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CEN, COA, PAI, SPE).

Myrciaria tenella (DC.) O. Berg

Sin.: *Eugenia tenella* DC., *Myrciaria undulata* O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(CLA, TAC).

Myrrhinium Schott**Myrrhinium atropurpureum** Schott

Sin.: *Myrrhinium atropurpureum* Schott var. *octandrum* Benth., *Myrrhinium loranthoides* (Hook. & Arn.) Burret, *Myrrhinium rubriflorum* O. Berg, *Myrrhinium salicinum* Gand., *Myrrhinium sarcopetalum* Lem., *Tetrastemon loranthoides* Hook. & Arn.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(DUR, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Myrteola O. Berg, nom. cons.**Myrteola nummularia** (Poir.) O. Berg

Sin.: *Eugenia humifusa* Phil., *Eugenia humilis* Phil., *Myrteola barneoudii* (O. Berg) O. Berg var. *humifusa* (Phil.) Reiche, *Myrteola barneoudii* (O. Berg) O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg var. *pentamera* O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg var. *tetramera* O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg, *Myrteola humifusa* (Phil.) O. Berg, *Myrteola leucomyrtillus* (Griseb.) Reiche, *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg var. *barneoudii* (O. Berg) Kausel, *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg var. *repens* (Phil.) Reiche, *Myrteola repens* (Phil.) O. Berg, *Myrtus barneoudii* O. Berg, *Myrtus leucomyrtillus* Griseb., *Myrtus nummularia* Poir., *Myrtus nummularia* Poir. var. *major* Hook. f., *Myrtus repens* Phil.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Neomitranthes (Kausel) D. Legrand**Neomitranthes cordifolia** (D. Legrand) D. Legrand

Sin.: *Mitranthes cordifolia* D. Legrand
Árbol. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Neomitranthes gemballae (D. Legrand) D. Legrand

Sin.: *Mitranthes gemballae* D. Legrand
Árbol. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Neomitranthes glomerata (D. Legrand) D. Legrand

Sin.: *Calyptanthes ranulphii* D. Legrand, *Mitranthes glomerata* D. Legrand
Árbol. Endémica. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Neomitranthes gracilis (Burret) N. Silveira

Sin.: *Mitranthes gracilis* Burret
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Neomitranthes obscura (DC.) N. Silveira

Sin.: *Calyptanthes obscura* DC.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Neomitranthes warmingiana

(Kiaersk.) Mattos
Sin.: *Calyptanthes warmingiana* Kiaersk., *Mitranthes dusenii* Kausel, *Mitranthes hoehnei* Burret
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Pimenta Lindl.**Pimenta pseudocaryophyllus** (B.A. Gomes) Landrum var. **hoehnei** (Burret) Landrum

Sin.: *Pseudocaryophyllus hoehnei* Burret
Arbusto o árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

Pimenta pseudocaryophyllus

(B.A. Gomes) Landrum var. **pseudocaryophyllus**
Sin.: *Myrtus pseudocaryophyllus* B.A. Gomes, *Pseudocaryophyllus acuminatus* (Link) Burret, *Eugenia acuminata* Link
Arbusto o árbol. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Plinia L.

Plinia complanata M.L. Kawas. & B. Holst
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Plinia cordifolia (D. Legrand) Sobral

Sin.: *Myrciaria cordifolia* D. Legrand
Arbolito. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plinia edulis (Vell.) Sobral

Sin.: *Eugenia edulis* Vell.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plinia hatschbachii (Mattos) Sobral

Sin.: *Myrciaria hatschbachii* Mattos
Árbol. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Plinia peruviana (Poir.) Govaerts

Sin.: *Eugenia cauliflora* Miq., hom. illeg., *Eugenia guapurium* DC., *Guapurium peruvianum* Poir., *Myrciaria guapurium* (DC.) O. Berg, *Myrciaria peruviana* (Poir.) Mattos, *Myrciaria peruviana* (Poir.) Mattos var. *trunciflora* (O. Berg) Mattos, *Myrciaria trunciflora* O. Berg, *Plinia trunciflora* (O. Berg) Kausel
Árbol. Nativa. 1000-1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI).

Plinia pseudodichasiantha (Kiaersk.)

G.M. Barroso ex Sobral
Sin.: *Eugenia pseudodichasiantha* Kiaersk., *Marlierea parviflora* Berg var. *brachybotrya* D. Legrand, *Plinia brachybotrya* (D. Legrand) Sobral
Árbol. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman

Sin.: *Eugenia rivularis* Cambess., *Myrciaria baporeti* D. Legrand, *Myrciaria rivularis* (Cambess.) O. Berg var. *baporeti* (D. Legrand) D. Legrand, *Myrciaria rivularis* (Cambess.) O. Berg, *Myrciariopsis baporeti* (D. Legrand) Kausel, *Plinia baporeti* (D. Legrand) Rotman, *Siphoneugena baporeti* (D. Legrand) Kausel
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

Psidium L.

Psidium araucanum Soares-Silva & Proença
Árbol. Nativa. 700-800 m.
Países: BRA(PAR).

Psidium australe Cambess. var.

argenteum (O. Berg) Landrum
Sin.: *Psidium argenteum* O. Berg, *Psidium cuneatum* Cambess., *Guajava argentea* (O. Berg) Kuntze
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1100 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(CAN).

Psidium australe Cambess. var. **australe**

Sin.: *Psidium mucronatum* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium piribebuiense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium triphyllum* Barb. Rodr.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, ITA, MIE, PAI).

Psidium australe Cambess. var.

suffruticosum (O. Berg) Landrum
Sin.: *Guajava suffruticosa* (O. Berg) Kuntze, *Psidium suffruticosum* O. Berg
Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Psidium bergianum (Nied.) Burret

Sin.: *Myrtus bergiana* Nied.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Psidium cattleianum Sabine

Sin.: *Psidium littorale* Raddi, *Psidium variabile* O. Berg
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CLA, ROC, TYT).

Psidium grandifolium DC.

Sin.: *Guajava cinerea* (DC.) Kuntze, *Guajava grandifolia* (DC.) Kuntze, *Guajava incanescens* (DC.) Kuntze, *Psidium apaense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium cinereum* Mart. ex DC. var. *incanescens* (Mart. ex DC.) D. Legrand, *Psidium cinereum* Mart. ex DC. var. *paraguayana* D. Legrand, *Psidium cinereum* Mart. ex DC., *Psidium eriophyllum* Barb. Rodr., *Psidium grandifolium* DC. var. *intermedium* O. Berg, *Psidium incanescens* Mart. ex DC. var. *rotundifolium* O. Berg, *Psidium incanescens* Mart. ex DC., *Psidium lanatum* Barb. Rodr., *Psidium paraguayense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium psychophyllum* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., *Psidium spodophyllum* Barb. Rodr., *Psidium yacaense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Psidium guajava L.

Sin.: *Psidium guava* Raddi ex Griseb., *Psidium guayaba* Raddi, *Psidium igatemyense* Barb. Rodr., *Psidium pyriferum* L.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Psidium guineense Sw.

Sin.: *Guajava guineensis* (Sw.) Kuntze, *Psidium araca* Raddi, *Psidium hasslerianum* Barb. Rodr.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI).

Psidium hians Mart. ex DC.

Sin.: *Psidium nutans* O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA, ÑEE).

Psidium laruotteanum Cambess.

Sin.: *Myrtus formosa* Barb. Rodr., *Psidium capibaryense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Psidium formosum* (Barb. Rodr.) Burret, *Psidium glaucescens* O. Berg, *Psidium quinqueidentatum* Amshoff
Arbusto. Nativa. 300-900 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Psidium longipetiolatum D. Legrand

Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psidium missionum D. Legrand

Arbusto o subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(CAA, GUA, ITA, PAI).

Psidium myrtoides O. Berg

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Psidium ooideum O. Berg

Sin.: *Guajava ooidea* (O. Berg) Kuntze
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(PAI).

Psidium ovale (Spreng.) Burret

Sin.: *Myrtus ovalis* Spreng., *Psidium hatschbachii* D. Legrand, *Psidium imaruinense* Mattos, *Psidium spathulatum* Mattos
Arbusto. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psidium reptans (D. Legrand) Soares-Silva & Proença

Sin.: *Myrcianthes reptans* D. Legrand
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Psidium rufum Mart. ex DC. var. **rufum**

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Psidium rufum Mart. ex DC. var.

widgrenianum (O. Berg) Proença
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Psidium salutare (Humb., Bonpl. & Kunth) O. Berg var. **decussatum** (DC.) Landrum

Sin.: *Psidium decussatum* DC.
Subarbusto. Nativa. 1000-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Psidium salutare (Humb., Bonpl. & Kunth) O. Berg var. **mucronatum** (Cambess.) Landrum

Sin.: *Myrtus acutata* O. Berg, *Myrtus cuspidata* O. Berg var. *pentamera* O. Berg, *Myrtus cuspidata* O. Berg var. *tetramera* O. Berg, *Myrtus cuspidata* O. Berg, *Myrtus lurida* Spreng., *Myrtus mucronata* Cambess. var. *opaca* O. Berg, *Myrtus mucronata* Cambess. var. *thea* (Griseb.) Griseb., *Myrtus mucronata* Cambess., *Myrtus ovalis* O. Berg, hom. Illeg., *Myrtus pauciflora* Cambess., *Myrtus suffruticosa* O. Berg var. *angustifolia* O. Berg, *Myrtus suffruticosa* O. Berg var. *latifolia* O. Berg, *Myrtus suffruticosa* O. Berg, *Psidium acutatum* (O. Berg) Burret, *Psidium luridum* (Spreng.) Burret var. *cinereum* Mattos, *Psidium luridum* (Spreng.) Burret, *Psidium pubifolium* Burret f. *nanum* Rotman, *Psidium pubifolium* Burret, *Psidium thea* Griseb.
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Psidium salutare (Humb., Bonpl. & Kunth) O. Berg var. **sericeum** (Cambess.) Landrum

Sin.: *Myrtus incana* O. Berg, *Myrtus nivea* O. Berg, *Myrtus sericea* Cambess., *Myrtus sericea* O. Berg var. *fruticosa* O. Berg, *Psidium incanum* (O. Berg) Burret, *Psidium niveum* (O. Berg) Herter, *Psidium thea* Griseb. var. *incanum* Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, MIE, PAI). URY(CLA, DUR, MON, PAY, RIV, SJO, TAC).

Psidium salutare (Kunth) O. Berg var. **salutare**

Sin.: *Myrtus salutaris* Kunth, *Psidium deltosepalum* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud., *Psidium valenzuelense* Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl., nom. nud.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CAU).

Psidium sartorianum (O. Berg) Nied.

Sin.: *Mitranthes sartoriana* O. Berg
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Psidium striatum Mart. ex DC.

Sin.: *Psidium kennedyanum* Morong, *Psidium paranense* O. Berg, *Psidium persicifolium* O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, CAU, CON, GUA, PHA).

Siphoneugena O. Berg**Siphoneugena crassifolia** (DC.)

Proença & Sobral

Sin.: *Calycorectes widgrenianus* (O. Berg) Nied., *Eugenia crassifolia* DC., *Eugenia widgreniana* (O. Berg) Kiaersk., *Mitranthes widgraniana* (O. Berg) Burret, *Siphoneugena widgreniana* O. Berg
Árbol. Nativa. 600-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Siphoneugena guilfoyleiana Proença

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Siphoneugena occidentalis D.

Legrand

Árbol. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(SAL).

Siphoneugena reitzii D. Legrand

Sin.: *Siphoneugena boraceiensis* Mattos & Silveira, *Siphoneugena dusenii* Kausel, *Siphoneugena gomesiana* Mattos

Árbol. Nativa. 700-1500 m.

Países: BRA(PAR), RGS, SCA).

Syzygium Gaertn., nom. cons.**Syzygium cumini** (L.) SkeelsSin.: *Myrtus cumini* L.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(PAR), RGS, SCA).

Syzygium jambos (L.) Alston

Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR), RGS, SCA). CHL(IPA).

Ugni Turcz.**Ugni candollei** (Barnéoud) O. Berg

Sin.: *Myrtus candollei* Barnéoud, *Myrtus krausei* Phil., *Ugni candollei* (Barnéoud) O. Berg f. *litoralis* Kausel, *Ugni candollei* (Barnéoud) O. Berg f. *monticola* Kausel, *Ugni krausei* (Phil.) O. Berg

Árbusto. Endémica. 100-800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Ugni molinae Turcz.

Sin.: *Eugenia ugni* (Molina) Hook. & Arn., *Myrtus molinae* Barnéoud, *Myrtus ugni* Molina, *Ugni myrtus* Macloskie, *Ugni philippii* O. Berg, *Ugni poeppigii* O. Berg, *Ugni ugni* (Molina) Macloskie, nom. inval.

Árbusto. Endémica. 700-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE).

Ugni selkirkii (Hook. & Arn.) O. Berg

Sin.: *Eugenia selkirkii* Hook. & Arn., *Myrtus berteroi* Phil., *Ugni berteroi* (Phil.) F. Phil.

Árbusto. Endémica. 400-800 m.

Países: CHL(JFE).

NANODEACEAE

Nanodea Banks ex Gaertn.**Nanodea muscosa** Banks ex Gaertn.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

CHL(LLA, AIS, MAG).

NOTHOFAGACEAE

Nothofagus Blume**Nothofagus alessandri** Espinosa

Sin.: *Fuscospora alessandri* (Espinosa) Heenan & Smissen

Árbol. Endémica. 100-500 m.

Países: CHL(MAU).

Nothofagus alpina (Poepp. & Endl.) Oerst.

Sin.: *Fagus alpina* Poepp. & Endl., *Fagus nervosa* Phil., *Fagus procera* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Lophozonia alpina* (Poepp. & Endl.) Heenan & Smissen, *Nothofagus nervosa* (Phil.) Dimitri & Milano, comb. superfl., *Nothofagus nervosa* (Phil.) Krasser, *Nothofagus procera* (Poepp. & Endl.) Oerst., comb. illeg., *Nothofagus procera* Oerst.

Árbol. Endémica. 200-1400 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst.

Sin.: *Calucechinus antarctica* (G. Forst.) Hombr. & Jacq. ex Decne., *Calucechinus montagni* Hombr. & Jacq., *Fagus antarctica* G. Forst., *Fagus antarctica* G. Forst. f. *latifolia* Kurtz ex Albov, *Fagus antarctica* G. Forst. var. *microphylla* Phil., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *palustris* Albov, *Fagus antarctica* G. Forst. var. *subalpina* Albov, *Fagus antarctica*

G. Forst. var. *sublobata* A. DC., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *uliginosa* A.DC., *Fagus uliginosa* Phil., *Nothofagus montagnei* Hombr. & Jacq.

Árbol. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst.

Sin.: *Betula antarctica* G. Forst. ex Willd., *Betula antarctica* G. Forst., nom. nud., *Calusparassus betuloides* Hombr. & Jacq., *Calusparassus forsteri* Hombr. & Jacq., *Fagus betuloides* Mirb., *Fagus dubia* Mirb., *Fagus forsteri* Hook., *Nothofagus betuloides* (Mirb.) Blume, comb. illeg., *Nothofagus patagonica* Gand.

Árbol. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst.

Sin.: *Fagus dombeyi* Mirb., *Fagus dombeyi* Mirb. var. *microphylla* Phil., *Nothofagus dombeyi* (Mirb.) Blume, comb. illeg.

Árbol. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Nothofagus glauca (Phil.) Krasser

Sin.: *Fagus glauca* Phil., *Lophozonia glauca* (Phil.) Heenan & Smissen, *Nothofagus megalocarpa* Reiche, *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *glauca* (Phil.) Reiche

Árbol. Endémica. 100-1500 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Nothofagus macrocarpa (A. DC.) F.M.

Vázquez & R. Rodr.

Sin.: *Fagus obliqua* Mirb. var. *macrocarpa* A. DC., *Fagus procera* Phil., hom. illeg., *Lophozonia macrocarpa* (A. DC.) Heenan & Smissen, *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *macrocarpa* (A. DC.) Reiche

Árbol. Endémica. 800-2200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Nothofagus nitida (Phil.) KrasserSin.: *Fagus nitida* Phil.

Árbol. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst.

Sin.: *Fagus obliqua* Mirb., *Fagus obliqua* Mirb. var. *dentatosquamata* Kuntze, *Fagus obliqua* Mirb. var.

integrissquamata Kuntze, *Fagus obliqua* Mirb. var. *macranthera* A. DC., *Fagus obliqua* Mirb. var. *valdiviana* A. DC., *Fagus valdiviana* Phil., *Lophozonia heterocarpa* Turcz., *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan & Smitsen subsp. *andina* (F.M. Vázquez & R. Rodr.) Heenan & Smitsen, *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan & Smitsen subsp. *obliqua*, *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan & Smitsen subsp. *valdiviana* (Phil.) Heenan & Smitsen, *Nothofagus leoni* Espinosa, *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Blume, comb. illeg., *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. subsp. *andina* F.M. Vázquez & R. Rodr., *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. subsp. *valdiviana* (Phil.) F.M. Vázquez & R. Rodr.

Árbol. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser

Sin.: *Calusparassus pumilio* Hombr. & Jacq., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *bicrenata* A. DC., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *pumilio* (Poepp. & Endl.) Kunze, *Fagus pumilio* Poepp. & Endl., *Nothofagus pumilio* (Poepp. & Endl.) Reiche, comb. illeg.

Árbol. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

NYCTAGINACEAE

Allionia L.

Allionia choisyi Standl.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Allionia incarnata L.

Sin.: *Allionia bandurriae* Phil., *Allionia jarae* Phil., *Allionia mendocina* Phil., *Allionia puberula* Phil., *Wedelia incarnata* (L.) Kuntze, *Wedeliella incarnata* (L.) Cockerell

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA). URY(PAY).

Boerhavia L.

Boerhavia coccinea Mill.

Sin.: *Boerhavia adscendens* Willd., *Boerhavia decumbens* Vahl
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Boerhavia cordobensis Kuntze

Sin.: *Boerhavia paniculata* Rich. var. *cordobensis* (Kuntze) Heimerl
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SDE, SLU).

Boerhavia diffusa L. var. *diffusa*

Sin.: *Boerhavia coccinea* Mill. var. *paniculata* (Rich.) Moscoso, *Boerhavia paniculata* Rich.
Hierba. Introducida. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, IPA). PRY(APY, CAA, CEN, GUA, PHA). URY(MON).

Boerhavia diffusa L. var. *leiocarpa* (Heimerl) C.D. Adams

Sin.: *Boerhavia ciliato-bracteata* Heimerl, *Boerhavia coccinea* Mill. var. *leiocarpa* (Heimerl) Standl., *Boerhavia diffusa* L. var. *paniculata* D. Parodi, nom. nud., *Boerhavia friesii* Heimerl, *Boerhavia paniculata* Rich. var. *guaranitica* Heimerl, *Boerhavia paniculata* Rich. var. *leiocarpa* (Heimerl) Heimerl, *Boerhavia paniculata* Rich. f. *leiocarpa* Heimerl
Hierba. Introducida. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(PHA).

Boerhavia pulchella Griseb.

Sin.: *Oxybaphus cretaceus* Chodat & Wilczek
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, LRI, MEN, RNE, SDE, SJU, SLU).

Boerhavia spicata Choisy

Hierba. Introducida. 800-900 m.
Países: ARG(CAT).

Bougainvillea Comm. ex Juss.

Bougainvillea campanulata Heimerl

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

Bougainvillea glabra Choisy var. *glabra*

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bougainvillea glabra Choisy var. *graciliflora* Heimerl

Arbusto o liana. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Bougainvillea infesta Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL). PRY(APY, BOQ, NAS, PHA).

Bougainvillea praecox Griseb.

Sin.: *Bougainvillea praecox* Griseb. var. *spinosa* Chodat & Hassl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY, BOQ, PHA).

Bougainvillea spectabilis Willd.

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Bougainvillea spinosa (Cav.) Heimerl

Sin.: *Bougainvillea patagonica* Decne., *Bougainvillea spinosa* (Cav.) Heimerl f. *eubracteata* Heimerl, *Bougainvillea spinosa* (Cav.) Heimerl f. *microbracteata* Heimerl, *Bougainvillea spinosa* (Cav.) Heimerl f. *parvifolia* (Phil.) Heimerl, *Tricycla spinosa* Cav.
Arbusto. Nativa. 0-3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU). PRY(APY).

Bougainvillea stipitata Griseb.

Sin.: *Bougainvillea frondosa* Griseb., *Bougainvillea longispinosa* Rusby, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *febrigii* Heimerl, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *grisebachiana* Heimerl, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *kuntzeana* Heimerl, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *longispinosa* (Rusby) Heimerl, *Bougainvillea stipitata* Griseb. var. *stuckertiana* Heimerl
Arbusto o árbol. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

Colignonia Endl.

Colignonia glomerata Griseb.

Sin.: *Colignonia glomerata* Griseb. var. *boliviana* Heimerl, *Colignonia glomerata* Griseb. var. *typica* Heimerl, nom. inval.
Hierba. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Guapira Aubl.**Guapira areolata** (Heimerl) Lundell

Sin.: *Guapira luteovirens* (Heimerl) Lundell, *Guapira paraguayensis* (Heimerl) Lundell, *Pisonia areolata* Heimerl, *Pisonia luteovirens* Heimerl, *Pisonia paraguayensis* Heimerl
 Árbol. Nativa 0-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Guapira hassleriana (Heimerl)

Lundell
 Sin.: *Pisonia hassleriana* Heimerl, *Torrubia hassleriana* (Heimerl) Standl.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(APY, CON).

Guapira hirsuta (Choisy) Lundell

Sin.: *Guapira asperula* (Standl.) Lundell, *Guapira opposita* (Vell.) Reitz var. *warmingii* (Heimerl) Reitz, *Guapira warmingii* (Heimerl) Lundell, *Pisonia hirsuta* Choisy, *Pisonia olfersiana* Link, Klotzsch & Otto var. *warmingii* (Heimerl) Heimerl, *Pisonia warmingii* Heimerl, *Torrubia asperula* Standl., *Torrubia hirsuta* (Choisy) Standl., *Torrubia olfersiana* (Link, Klotzsch & Otto) Standl. var. *warmingii* (Heimerl) Reitz, *Torrubia warmingii* (Heimerl) Standl.
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Guapira nitida (J.A. Schmidt) Lundell

Sin.: *Pisonia nitida* J.A. Schmidt
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS).

Guapira obtusata (Jacq.) Little

Sin.: *Pisonia obtusata* Jacq.
 Arbusto o árbol. Nativa.
 Países: BRA(SCA).

Guapira opposita (Vell.) Reitz

Sin.: *Torrubia opposita* Vell.
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Mirabilis L.**Mirabilis acuta** (Reiche) Heimerl

Sin.: *Oxybaphus ovatus* (Ruiz & Pav.) Vahl var. *acutus* Reiche
 Hierba. Endémica. 500-2900 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Mirabilis bracteosa (Griseb.) Heimerl var. **bracteosa**

Sin.: *Allionia bracteosa* (Griseb.) Kuntze, *Oxybaphus bracteosus* Griseb.
 Hierba. Nativa. 2000-5000 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Mirabilis bracteosa (Griseb.) Heimerl var. **micrantha** Toursark.

Hierba. Nativa.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).

Mirabilis cordifolia (Kunze ex Choisy) Heimerl

Sin.: *Oxybaphus cordifolius* Kunze ex Choisy
 Hierba. Endémica. 0-900 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Mirabilis elegans (Choisy) Heimerl

Sin.: *Allionia elegans* (Choisy) Kuntze, *Oxybaphus elegans* Choisy
 Hierba. Nativa. 0-3000 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Mirabilis expansa (Ruiz & Pav.)

Standl.
 Sin.: *Allionia expansa* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Calyxhymenia expansa* Ruiz & Pav., *Oxybaphus expansa* (Ruiz & Pav.) Vahl
 Hierba. Nativa. 100-3600 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, VAL).

Mirabilis jalapa L.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, BIO, JFE, IPA). PRY(PAI). URY(Desconocida).

Mirabilis ovata (Ruiz & Pav.) F. Meigen

Sin.: *Allionia ovata* (Ruiz & Pav.) Standl., *Allionia ovata* (Ruiz & Pav.) Standl. var. *toscae* (Lorentz) Hauman, *Calyxhymenia ovata* Ruiz & Pav., *Mirabilis campestris* (Griseb.) I.M. Johnst., *Mirabilis ovata* (Ruiz & Pav.) F. Meigen f. *glabriuscula* Stuck. & Heimerl, *Mirabilis ovata* (Ruiz & Pav.) F. Meigen f. *pantothrix* Stuck. & Heimerl, *Mirabilis tosciae* (Lorentz) Macloskie, *Oxybaphus campestris* Griseb., *Oxybaphus chilensis* Steud., *Oxybaphus ovatus* (Ruiz & Pav.) Vahl, *Oxybaphus tosciae* Lorentz
 Hierba. Nativa. 0-3200 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Mirabilis prostrata (Ruiz & Pav.) Heimerl

Sin.: *Allionia micrantha* (Choisy) Molfino, *Calyxhymenia prostrata* Ruiz & Pav., *Oxybaphus micranthus* Choisy, *Oxybaphus prostratus* (Ruiz & Pav.) Vahl
 Hierba. Nativa. 0-1400 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Mirabilis trollii Heimerl

Hierba. Endémica. 2200 m.
 Países: CHL(TAR).

Neea Ruiz & Pav.**Neea hermaphrodita** S. Moore

Arbusto. Nativa. 100-500 m.
 Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CON).

Neea pendulina Heimerl

Sin.: *Neea schwackeana* Heimerl
 Arbusto. Endémica. 0-300 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

Pisonia L.**Pisonia aculeata** L.

Sin.: *Pisonia aculeata* L. var. *guaranitica* Chodat, *Pisonia yaguapinda* D. Parodi
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Pisonia ambigua Heimerl

Árbol. Nativa.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Pisonia zapallo Griseb. var.

guaranitica Toursark.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE). PRY(CEN).

Pisonia zapallo Griseb. var. **zapallo**

Sin.: *Pisonia aculeata* L. f. *inermis* Kuntze, *Pisonia ambigua* Heimerl var. *lilloana* Heimerl
 Árbol. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CON, PHA).

Pisoniella (Heimerl) Standl.**Pisoniella glabrata** (Heimerl) Standl.

Sin.: *Pisoniella arborescens* (Lag. & Rodr.) Standl. var. *glabrata* (Heimerl) Heimerl, *Pisonia hirtella* Humb., Bonpl. & Kunth f. *glabrata* Heimerl
Arbusto. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Reichenbachia Spreng.**Reichenbachia paraguayensis** (D.

Parodi) Dugand & Daniel

Sin.: *Elaeagnus paraguayensis* D. Parodi, *Reichenbachia hirsuta* Hook., hom. illeg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN).

NYMPHAEACEAE

Nelumbo Adans.**Nelumbo nucifera** Gaertn.

Hierba acuática. Introducida. 0-500 m.
Países: PRY(CEN).

Nymphaea L. nom. cons.**Nymphaea alba** L.

Sin.: *Castalia alba* (L.) Wood, *Castalia alba* (L.) Green, comb. illeg.
Hierba acuática. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. subsp. **amazonum**

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. subsp. **pedersenii** Wiersema

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS). BRA(Fuera del área del proyecto). URY(ART, TYT).

Nymphaea caerulea Savigny

Hierba acuática. Introducida. 200-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Nymphaea gardneriana Planch.

Sin.: *Leuconymphaea gardneriana* (Planch.) Kuntze
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, ÑEE, PAI, SPE).

Nymphaea jamesoniana Planch.

Sin.: *Castalia gibertii* Morong, *Castalia jamesoniana* (Planch.) Britton & P. Wilson, *Leuconymphaea jamesoniana* (Planch.) Kuntze, *Nymphaea gibertii* (Morong) Conard
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, PHA).

Nymphaea oxypetala Planch.

Hierba acuática. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(PHA).

Nymphaea prolifera Wiersema

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, COA, ÑEE, PAI). URY(ART).

Nymphaea rudgeana G. Mey.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Victoria Lindl.**Victoria cruziana** Orb.

Sin.: *Victoria argentina* Burmeister, nom. nud.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(CEN, ÑEE, PHA).

OCHNACEAE

Ouratea Aubl.

Ouratea claudei G.S. Salvador, E.P. Santos & Cervi
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ouratea paraguayensis Hassl. ex Sastre & Offroy

Arbusto. Nativa. 100-1900 m.
Países: PRY(AMA, CON, SPE).

Ouratea multiflora Engl.

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Ouratea parviflora (DC.) Baill.

Sin.: *Gomphia parviflora* DC.
Arbolito. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ouratea salicifolia (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.

Sin.: *Gomphia salicifolia* A. St.-Hil. & Tul.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ouratea sellowii (Planch.) Engl.

Sin.: *Gomphia sellowii* Planch.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ouratea spectabilis (Mart. ex Engl.) Engl.

Sin.: *Gomphia spectabilis* Mart. ex Engl.
Árbol. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Ouratea vaccinioides (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.

Sin.: *Gomphia vaccinioides* A.St.-Hil. & Tul.
Árbol. Nativa. 1200-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sauvagesia L.**Sauvagesia capillaris** (A.St.-Hil.)

Sastre

Sin.: *Lavradia capillaris* A. St.-Hil.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Sauvagesia erecta L.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PHA, SPE).

Sauvagesia racemosa A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, SPE).

Sauvagesia vellozii (Vell. ex A. St.-Hil.) Sastre

Sin.: *Lavradia vellozii* Vell. ex A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

OLACACEAE

Heisteria Jacq., nom. cons.**Heisteria salicifolia** Engl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Heisteria silvianii Schwacke

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Tetrastylidium Engl.**Tetrastylidium grandifolium** (Baill.)

Sleumer

Sin.: *Schoepfia grandifolia* Baill.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ximenia L.**Ximenia americana** L. var. **americana**

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA).

Ximenia americana L. var.**argentiniensis** De Filippis

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, PHA).

Ximenia intermedia (Chodat &

Hassl.) De Filippis

Sin.: *Ximenia coriacea* Engl. var.*intermedia* Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

OLEACEAE

Chionanthus L.**Chionanthus crassifolius** (Mart.) P.S.

Green

Sin.: *Linociera crassifolia* Mart.,*Mayepea crassifolia* (Mart.) Kuntze

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Chionanthus filiformis (Vell.) P.S. GreenSin.: *Bonamica filiformis* Vell.

Árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chionanthus trichotomus (Vell.) P.S.

Green

Sin.: *Linociera arborea* Eichler,*Linociera glomerata* Pohl, *Minuta**trichotoma* Vell., *Mayepea arborea*(Eichler) Kuntze, *Mayepea pohliana*

Kuntze

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

Fraxinus L.**Fraxinus excelsior** L.Sin.: *Fraxinus apetalata* Lam.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA). CHL(BIO).

Fraxinus ornus L.Sin.: *Fraxinus paniculata* Mill.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA).

Fraxinus pennsylvanica MarshallSin.: *Fraxinus michauxii* Britton,*Fraxinus pennsylvanica* Marshall var.*austinii* Fernald, *Fraxinus pennsylvanica*Marshall var. *subintegerrima* (Vahl)Fernald, *Fraxinus pubescens* Lam.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, RNE, TUC). URY(PAY, RNO).

Fraxinus velutina Torr.Sin.: *Fraxinus pennsylvanica* Marshallsubsp. *velutina* (Torr.) G. N. Mill.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA).

Jasminum L.**Jasminum mesnyi** Hance

Subarbusto. Introducida. 800-900 m.

Países: ARG(COR).

Ligustrum L.**Ligustrum lucidum** W.T. Aiton

Árbol. Introducida. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SAL, SFE, TUC). URY(PAY, RNO, SJO).

Ligustrum ovalifolium Hassk.

Arbusto o arbolito. Introducida.

Países: CHL(JFE).

Ligustrum sinense Lour.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC). URY(COL, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR).

Ligustrum vulgare L.

Árbol. Introducida.

Países: BRA(SCA).

Menodora Bonpl.**Menodora decemfida** (Gillies ex Hook.

& Arn.) A. Gray

Sin.: *Bolivaria decemfida* Gillies ex

Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativa. 1000-2700 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, TUC).

Menodora integrifolia (Cham. &

Schltdl.) Steud.

Sin.: *Bolivaria integrifolia* Cham.& Schltdl., *Bolivaria trifida* Cham. &Schltdl., *Menodora hassleriana* Chodat,*Menodora integrifolia* (Cham. &Schltdl.) Steud. var. *odonelliana* T. Mey.,*Menodora integrifolia* (Cham. & Schltdl.)Steud. var. *pinnatisecta* (Steyerm.)Burkart, *Menodora integrifolia* (Cham.& Schltdl.) Steud. var. *trifida* (Cham.

& Schltdl.) Steyerm., comb. superfl.,

Menodora integrifolia (Cham. & Schltdl.)Steud. var. *trifida* (Cham. & Schltdl.)Kuntze, *Menodora pinnatisecta* Steyerm.,*Menodora pinnatisecta* Steyerm. var.*missionum* T. Mey., *Menodora trifida*

(Cham. & Schltdl.) Steud.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,

COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,

MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU,

SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(AMA,

CEN, GUA, PAI). URY(FLA, TAC).

Menodora linoides Phil.

Arbusto. Endémica. 1200-1800 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Menodora pulchella Markgr.

Arbusto. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(JUJ).

Menodora robusta (Benth.) A. GraySin.: *Bolivaria robusta* Benth.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Priogymnanthus P.S. Green**Priogymnanthus hasslerianus**

(Chodat) P.S. Green

Sin.: *Linociera hassleriana* (Chodat)Hassl., *Mayepea hassleriana* Chodat

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Syringa L.**Syringa vulgaris** L.

Arbusto. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(RNE).

ONAGRACEAE

Camissonia Link

Camissonia dentata (Cav.) Reiche subsp. **dentata**

Sin.: *Camissonia acuminata* (Phil.) Reiche, *Camissonia flava* Link, *Camissonia paradoxa* (Spach) Reiche var. *divaricata* (Gay) Reiche, *Camissonia tenuifolia* (Spach) Reiche, *Holostigma argutum* Spach, *Holostigma heterophyllum* Spach, *Holostigma tenuifolium* Spach, hom. illeg., *Oenothera chamissonis* Link, *Oenothera chilensis* D. Dietr., hom. illeg., *Oenothera contorta* Douglas var. *divaricata* (Gay) Munz, *Oenothera dentata* Cav., *Oenothera heterophylla* (Spach) Steud., hom. illeg., *Oenothera micrantha* Spreng. var. *acuminata* (Phil.) Munz, *Oenothera minutiflora* D. Dietr., *Oenothera torulosa* H. Lév. f. *chilensis* (D. Dietr.) H. Lév., *Sphaerostigma chamissonis* (Link) Fisch. & C.A. Mey., *Sphaerostigma dentatum* (Cav.) Gay, *Sphaerostigma divaricatum* Gay, *Sphaerostigma heterophylla* (Spach) Gay, *Sphaerostigma ramosissimum* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Camissonia dentata (Cav.) Reiche subsp. **littoralis** P.H. Raven & D.M. Moore

Sin.: *Sphaerostigma acuminatum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

Clarkia Pursh

Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr.

Sin.: *Oenothera amoena* Lehm.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE).

Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. **ambigua** (Phil.) D.M. Moore & F.H. Lewis ex Martic.

Sin.: *Clarkia tenella* (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. *ambigua* (Phil.) D.M. Moore & F.H. Lewis, comb. illeg., *Godetia ambigua* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(BIO, ARA).

Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. **araucana** D.M. Moore & F.H. Lewis

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. **tenella**

Sin.: *Godetia cavanillesii* Spach, *Godetia dasycarpa* Phil., *Godetia quadrivulnera* (Douglas) Spach var. *tenella* Jeps., *Godetia tenella* (Cav.) Steud., *Godetia tenella* (Cav.) Steud. var. *dasycarpa* (Phil.) Munz, *Oenothera auricula* H. Lév. var. *tenella* (Cav.) H. Lév., *Oenothera prismatica* H. Lév. var. *dasycarpa* H. Lév. *Oenothera quadrivulnera* Douglas var. *dasycarpa* (Cav.) Thell. ex Probst, *Oenothera tenella* Cav.

Hierba. Endémica. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. **tenuifolia** (Cav.) D.M. Moore & F.H. Lewis

Sin.: *Godetia gayana* Spach, *Godetia tenuifolia* (Cav.) Spach, *Oenothera gayana* (Spach) Steud., *Oenothera prismatica* H. Lév. var. *tenuifolia* (Cav.) H. Lév., *Oenothera tenella* Cav. var. *tenuifolia* (Cav.) Lindl., *Oenothera tenuifolia* Cav.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Epilobium L.

Epilobium australe Poepp. & Hausskn. ex Hausskn.

Sin.: *Epilobium antarcticum* (Hook. f.) Kuntze, *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *andinum* (Phil.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *lechleri* (Phil. & Hausskn. ex Hausskn.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *interruptum* (Sam.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *pumilum* Sam., *Epilobium interruptum* Sam., *Epilobium deflexum* Sam., *Epilobium lechleri* Phil. & Hausskn. ex Hausskn., *Epilobium lechleri* Phil. & Hausskn. ex Hausskn. var. *antarcticum* Macloskie, hom. illeg., *Epilobium tetragonum* L. var. *antarcticum* Hook. f., *Epilobium transandinum* Sam.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Epilobium barbeyanum H. Lév.

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Epilobium brachycarpum C. Presl

Sin.: *Epilobium paniculatum* Nutt. ex Torr. & A. Gray

Hierba. Introducida.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO).

Epilobium campestre (Jeps.) Hoch & W.L. Wagner

Sin.: *Boisduvalia campestris* Jeps., *Boisduvalia glabella* (Nutt.) Walp., *Boisduvalia glabella* (Nutt.) Walp. var. *typica* Munz, nom. inval., *Boisduvalia pygmaea* (Speg.) Munz, *Epilobium pygmaeum* (Speg.) Hoch & P.H. Raven, *Oenothera glabella* Nutt., *Oenothera pygmaea* Speg.

Hierba. Nativa.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

CHL(RME).

Epilobium ciliatum Raf.

Sin.: *Epilobium aconaguinum* Phil., *Epilobium albiflorum* Phil., *Epilobium argentinum* Sam., *Epilobium caesiiovirens* Sam., *Epilobium chilense* Hausskn., *Epilobium chilense* Hausskn. var. *latifolium* Sam., *Epilobium chilense* Hausskn. var. *macrum* Sam., *Epilobium constrictum* Sam., *Epilobium cunninghami* Hausskn., *Epilobium hookerianum* Hausskn. ex Skottsb., *Epilobium leiophyton* Sam., *Epilobium longipes* Sam., *Epilobium magellanicum* Phil. & Hausskn. ex Hausskn., *Epilobium pedicellare* J. Presl var. *latifolium* Walp., *Epilobium santacruzense* Dusén, *Epilobium valdiviense* Hausskn., *Epilobium valdiviense* Hausskn. var. *alboffii* Macloskie

Hierba. Nativa. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Epilobium conjugens Skottsb.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Epilobium densifolium Hausskn.

Sin.: *Epilobium lignosum* F. Phil., *Epilobium nivale* Meyen var. *lignosum* (F. Phil.) Hosseus, *Epilobium pauciflorum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 500-3300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, MAG, RME).

Epilobium denticulatum Ruiz & Pav.

Sin.: *Epilobium andicolum* Hausskn., *Epilobium caesium* Hausskn.

Hierba. Nativa. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, BIO).

Epilobium fragile Sam.

Hierba. Nativa. 3300-4200 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Epilobium glaucum Phil.

Sin.: *Epilobium glaucum* Phil. var. *stenophyllum* Macloskie & Dusén, *Epilobium nubigenum* Phil., *Epilobium patagonicum* Rendle, *Epilobium ramosum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Epilobium hirsutum L.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(RNE).

Epilobium hirtigerum A. Cunn.

Sin.: *Epilobium arechavaletae* H. Lév., *Epilobium brasiliense* Hausskn., *Epilobium junceum* Spreng. var. *hirtigerum* (A. Cunn.) Curtiss

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, ROC, SJO).

Epilobium nivale Meyen

Sin.: *Epilobium andinum* Phil.

Hierba. Nativa. 300-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Epilobium obscurum Schreb.

Hierba. Introducida. 0-1200 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Epilobium puberulum Hook. & Arn.

Sin.: *Epilobium gracile* Phil., hom. illeg., *Epilobium pedunculatum* Phil.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Epilobium subdentatum (Meyen)

Lievens & Hoch

Sin.: *Boisduvalia concinna* (D. Don) Spach, *Boisduvalia subulata* (Ruiz & Pav.) Raim., *Boisduvalia tocornalii* Gay, *Boisduvalia volckmannii* Phil., *Cratericarpium argyrophyllum* Spach, *Epilobium concinnum* (D. Don) Hoch & P.H. Raven, *Nierembergia subdentata* Meyen, *Oenothera concinna* D. Don, *Oenothera gauroides* Kuntze, *Oenothera subulata* Ruiz & Pav., *Oenothera uniflora* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Epilobium tetragonum L. subsp.

lamyi (F.W. Schultz) Nyman

Sin.: *Epilobium lamyi* F.W. Schultz

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Fuchsia L.**Fuchsia boliviana** Carrière

Sin.: *Fuchsia boliviana* Carrière f. *puberulenta* Munz

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Fuchsia brevilobis P.E. Berry

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

Fuchsia hatschbachii P.E. Berry

Arbusto o subarbusto. Endémica. 900-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Fuchsia lycioides Andrews

Sin.: *Fuchsia rosea* Ruiz & Pav.

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Fuchsia magellanica Lam.

Sin.: *Dorvalla eucharis* Comm. ex Lam., *Fuchsia araucana* F. Phil., *Fuchsia chonotica* Phil., *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *chonotica* (Phil.) Reiche, *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Hook., *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *robustior* Hook. f., *Fuchsia conica* Lindl., *Fuchsia discolor* Lindl., *Fuchsia*

gracilis Lindl., *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Lindl., *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *multiflora* Lindau, *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *tenella* Lindl., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *conica* (Lindl.) Sweet, *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Lindl.) Sweet, *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *grandiflora* Hook., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *tenella* (Lindl.) DC., *Fuchsia magellanica* Lam. var. *conica* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *discolor* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *eburnea* Pisano, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *gracilis* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Munz, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *molinae* Espinosa, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *typica* Munz, nom. inval., *Thilcum tinctorium* Molina

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Fuchsia regia (Vell.) Munz subsp.

reitzii P.E. Berry

Sin.: *Fuchsia pubescens* Cambess.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 800-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Fuchsia regia (Vell.) Munz subsp.

serrae P.E. Berry

Sin.: *Fuchsia affinis* Cambess.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gayophytum A. Juss.**Gayophytum humile** A. Juss.

Sin.: *Gayophytum densifolium* Phil., *Gayophytum humile* A. Juss. var. *densifolium* (Phil.) Reiche, *Gayophytum humile* A. Juss. var. *robustum* (Phil.) Reiche, *Gayophytum minutum* Phil., *Gayophytum nuttallii* Torr. & A. Gray

Hierba. Endémica. 500-3600 m.

Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ, LBO, MAU, RME).

Gayophytum micranthum Hook. & Arn.

Sin.: *Camissonia paradoxa* (Spach) Reiche, *Gayophytum gracile* Phil., *Gayophytum humile* A. Juss. var. *gracile* (Phil.) Reiche, *Gayophytum robustum*

Phil., *Holostigma paradoxum* Spach,
Oenothera gracilis (Phil.) H. Lév.
Oenothera micrantha J. Presl, hom. illeg.,
Sphaerostigma paradoxum (Spach) Gay
Hierba. Nativa. 1200-4300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR,
SJU, SLU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, RME).

Ludwigia L.

Ludwigia bonariensis (Micheli) H. Hara
Sin.: *Jussiaea bonariensis* Micheli
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, FOR,
SAL, SFE, TUC). PRY(APY, COA, GUA,
PHA). URY(ART, RNO, SAO, SJO, SOR).

Ludwigia bullata (Hassl.) H. Hara
Sin.: *Jussiaea bullata* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Ludwigia caparosa (Cambess.) H. Hara
Sin.: *Jussiaea caparosa* Cambess.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(GUA). URY(ROC).

Ludwigia decurrens Walter
Sin.: *Jussiaea bertonii* H. Lév., *Jussiaea
decurrens* (Walter) DC.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAA, CEN,
COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).
URY(ART, SAO).

Ludwigia elegans (Cambess.) H. Hara
Sin.: *Jussiaea elegans* Cambess.,
Jussiaea elegans Cambess. f. *australis*
Malme, *Jussiaea elegans* Cambess. f.
macrophylla Chodat & Hassl., *Jussiaea
elegans* Cambess. var. *intermedia* Hassl.,
Jussiaea elegans Cambess. var. *typica*
Munz, nom. inval., *Jussiaea octofila* DC.
var. *elegans* (Cambess.) H. Lév.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, ITA, SPE).
URY(COL, SJO).

Ludwigia erecta (L.) H. Hara
Sin.: *Jussiaea erecta* L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(GUA).

Ludwigia filiformis (Micheli)
Ramamoorthy
Sin.: *Jussiaea filiformis* Micheli,
Jussiaea longifolia DC. subsp. *filiformis*
(Micheli) Hassl., *Jussiaea longifolia* DC.
var. *warmingii* Hassl., nom. superfl.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Ludwigia grandiflora (Michx.)
Greuter & Burdet subsp. **grandiflora**
Sin.: *Jussiaea grandiflora* Michx.,
Jussiaea repens L. f. *intermedia* Hassl.,
Jussiaea repens L. var. *grandiflora*
(Michx.) Hassl., *Jussiaea repens* L. var.
hispida Hauman, *Jussiaea repens* L. var.
major Hassl.
Jussiaea repens L. var. *uruguayensis*
(Cambess.) Hassl., *Jussiaea stenophylla*
Gillies ex Hook., *Jussiaea stuckertii* H.
Lév., *Jussiaea uruguayensis* Cambess.
var. *genuina* Munz, nom. inval., *Jussiaea
uruguayensis* Cambess., *Ludwigia
grandiflora* (Michx.) Zardini, H. Gu
& P.H. Raven, hom. illeg., *Ludwigia
uruguayensis* (Cambess.) H. Hara
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, LPA, MEN, SAL, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA,
GUA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA,
FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SAO,
SOR, TAC).

Ludwigia grandiflora (Michx.)
Greuter & Burdet subsp. **hexapetala**
(Hook. & Arn.) G.L. Nesom & Kartesz
Sin.: *Jussiaea hexapetala* Hook. & Arn.,
Jussiaea uruguayensis Cambess. f. *major*
(Hassl.) Munz, *Ludwigia hexapetala*
(Hook. & Arn.) Zardini, A.G. Gu & P.H.
Raven, *Ludwigia uruguayensis* (Cambess.)
H. Hara var. *major* (Hassl.) Munz
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, NEU,
RNE, SLU, SFE). BRA(RGS). CHL(LBO,
MAU, BIO, RME). PRY(CEN, PHA).

Ludwigia hassleriana (Chodat)
Ramamoorthy
Sin.: *Jussiaea hassleriana* Chodat,
Jussiaea myrtifolia Cambess. f. *brevifolia*
Hassl., *Jussiaea myrtifolia* Cambess. f.
hassleriana (Chodat) Hassl.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

Ludwigia helminthorrhiza (Mart.)
H. Hara
Sin.: *Jussiaea helminthorrhiza* Mart.,
Jussiaea natans Kunth, *Jussiaea natans*
Kunth f. *latifolia* Hassl., *Jussiaea natans*
Kunth var. *emersa* Hassl., *Jussiaea natans*
Kunth var. *genuina* Hassl., nom. inval.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, CEN, CHO, CON, PHA).

Ludwigia hookeri (Micheli) H. Hara
Sin.: *Jussiaea hookeri* Micheli
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MON).

Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell
Sin.: *Jussiaea hyssopifolia* G. Don
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ludwigia irwinii Ramamoorthy
Sin.: *Jussiaea lanceolata* Cambess.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(CAA, ÑEE, PAI).

Ludwigia lagunae (Morong) H. Hara
Sin.: *Jussiaea brachycarpa* Micheli,
hom. illeg., *Jussiaea brachycarpa* Lam.
subsp. *epilobioides* (Chodat & Hassl.)
Hassl., *Jussiaea brachycarpa* Lam. var.
genuina Hassl., nom. inval., *Jussiaea
brachycarpa* Lam. var. *grandiflora*
Hassl., *Jussiaea brachycarpa* Lam.
var. *paraguayensis* (Chodat) Hassl.,
Jussiaea brachycarpa Lam. var. *parviflora*
(Chodat & Hassl.) Hassl., *Jussiaea
brachycarpa* Lam. var. *puberula* Hassl.,
Jussiaea epilobioides Chodat & Hassl.,
Jussiaea epilobioides Chodat & Hassl.
var. *parviflora* Chodat & Hassl.,
Jussiaea lagunae Morong, *Jussiaea
lagunae* Morong var. *paraguayensis*
(Chodat) Munz, *Jussiaea lagunae*
Morong var. *typica* Munz, nom. inval.,
Jussiaea leveilleana Bertoni, *Jussiaea
paraguayensis* Chodat, *Jussiaea
suffruticosa* L. var. *epilobioides* (Chodat
& Hassl.) Bertoni, *Jussiaea suffruticosa*
L. var. *paraguayensis* (Chodat) Bertoni,
Jussiaea suffruticosa L. var. *parviflora*
(Chodat & Hassl.) Bertoni
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR,
SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY,
CEN, COA, GUA, ÑEE, PHA, SPE).

Ludwigia laruotteana (Cambess.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea laruotteana* Cambess., *Jussiaea laruotteana* Cambess. var. *obtusifolia* Hoehne, *Jussiaea laruotteana* Cambess. var. *pubescens* Micheli
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea leptocarpa* Nutt., *Jussiaea leptocarpa* Nutt. f. *biacuminata* (Rusby) Munz, *Jussiaea leptocarpa* Nutt. var. *genuina* Munz, nom. inval., *Jussiaea pilosa* Kunth var. *pterocarpa* Hassl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, PHA). URY(CLA, ROC).

Ludwigia litoranea Cocco & Boldrini

Hierba o subarbusto. Endémica.
0-100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Ludwigia longifolia (DC.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea longifolia* DC., *Jussiaea longifolia* DC. var. *minor* Micheli, nom. superfl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *typica* Hassl., nom. inval., *Jussiaea octofila* DC. f. *longifolia* (DC.) H. Lév., *Jussiaea peruviana* L. var. *longifolia* (DC.) H. Lév.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA). URY(CAS, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR).

Ludwigia major (Micheli)

Ramamoorthy

Sin.: *Jussiaea longifolia* DC. f. *filifolia* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *apaensis* Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *major* Micheli, *Jussiaea longifolia* DC. var. *vulgaris* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea pseudonarcissus* Chodat & Hassl. f. *filifolia* Chodat & Hassl., *Jussiaea pseudonarcissus* Chodat & Hassl. var. *leptophylla* Chodat & Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, FLO, PAY, RNO).

Ludwigia martii (Micheli)

Ramamoorthy

Sin.: *Jussiaea martii* Micheli, *Jussiaea myrtifolia* Cambess. f. *foliosa* Hassl.,

Jussiaea myrtifolia Cambess. f. *pohlana* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea nervosa* Poir. f. *microphylla* Chodat & Hassl., *Jussiaea nervosa* Poir. var. *microphylla* (Chodat & Hassl.) Bertoni, *Jussiaea sericea* Cambess. var. *villosissima* Micheli
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, COA, ÑEE).

Ludwigia multinervia (Hook. & Arn.)

Ramamoorthy

Sin.: *Jussiaea multinervia* Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ROC).

Ludwigia myrtifolia (Cambess.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea myrtifolia* Cambess.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ludwigia neograndiflora (Munz)

H. Hara

Sin.: *Jussiaea neograndiflora* Munz
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

Ludwigia nervosa (Poir.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea nervosa* Poir., *Jussiaea nervosa* Poir. f. *foliosa* Chodat & Hassl., *Jussiaea nervosa* Poir. var. *pubescens* Micheli
Arbusto o árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA).

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven

Sin.: *Jussiaea macropoda* C. Presl, *Jussiaea octonervia* Lam., *Ludwigia octovalvis* (Jacq.) P.H. Raven subsp. *macropoda* (C. Presl) P.H. Raven, *Jussiaea suffruticosa* L. f. *linearifolia* (Hassl.) Munz, *Jussiaea suffruticosa* L. var. *ligustrifolia* (Kunth) Griseb. f. *linearifolia* (Hassl.) Munz, *Jussiaea suffruticosa* L. var. *ligustrifolia* (Kunth) Griseb., *Jussiaea suffruticosa* L. var. *linearifolia* Hassl., *Jussiaea suffruticosa* L. var. *macropoda* (C. Presl) Munz, *Jussiaea suffruticosa* L. var. *sessiliflora* (Micheli) Hassl., *Oenothera octovalvis* Jacq.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, SCA). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, AMA, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven subsp. **montevidensis** (Spreng.) P.H. Raven

Sin.: *Jussiaea glandulosa* Larrañaga, *Jussiaea montevidensis* Spreng., *Jussiaea repens* L. var. *montevidensis* (Spreng.) Munz, *Jussiaea repens* L., *Ludwigia adscendens* (L.) H. Hara var. *montevidensis* (Spreng.) H. Hara
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MEN, SJU). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(CAS, COL, FLA, MON, ROC, SAO, SOR).

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.

Raven subsp. **peploides**

Sin.: *Jussiaea peploides* Kunth, *Jussiaea repens* L. var. *peploides* (Kunth) Griseb., *Jussiaea repens* L. var. *ramulosa* Hassl., *Jussiaea swartziana* DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PHA). URY(CAS, COL, PAY, SAO, SOR).

Ludwigia peruviana (L.) H. Hara

Sin.: *Jussiaea peruviana* L., *Jussiaea peruviana* L. var. *typica* Munz, nom. inval., *Jussiaea peruviana* L. f. *hirsuta* Hassl., *Jussiaea peruviana* L. f. *tomentosa* Hassl.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, BIO). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA). URY(CAS, COL, PAY).

Ludwigia pseudonarcissus (Chodat & Hassl.) Ramamoorthy

Sin.: *Jussiaea lithospermifolia* Micheli var. *meridionalis* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea longifolia* DC. f. *grandiflora* Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. f. *parviflora* Hassl., nom. superfl., *Jussiaea longifolia* DC. subsp. *pseudonarcissus* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Jussiaea longifolia* DC. var. *intermedia* Hassl., *Jussiaea nervosa* Poir. f. *salicina* Chodat & Hassl., *Jussiaea pseudonarcissus* Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Endémica.
0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

Ludwigia quadrangularis (Micheli)

H. Hara

Sin.: *Jussiaea quadrangularis* Micheli.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ludwigia sedoides (Humb. & Bonpl.)

H. Hara

Sin.: *Jussiaea sedoides* Humb. & Bonpl.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Ludwigia sericea (Cambess.) H. HaraSin.: *Jussiaea myrtifolia* Cambess.f. *brasiliensis* Hassl., nom. superfl.,*Jussiaea myrtifolia* Cambess. f.*paraguayensis* Hassl., *Jussiaea myrtifolia*Cambess. var. *sericea* (Cambess.) Hassl.,*Jussiaea sericea* Cambess., *Jussiaea**sericea* Cambess. var. *genuina* Munz,

nom. inval.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, SAO).

Ludwigia torulosa (Arn.) H. HaraSin.: *Jussiaea torulosa* Arn.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Oenothera L.**Oenothera acaulis** Cav.Sin.: *Lavauxia mutica* Spach, *Oenothera**mutica* (Spach) Gay

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Oenothera affinis Cambess.Sin.: *Oenothera berteriana* Spach,*Oenothera chilensis* Fisch. & C.A. Mey.,*Raimannia berteriana* (Spach) Sprague

& Riley

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, RME, JFE). PRY(APA). URY(MON, ROC).

Oenothera arequipensis Munz & I.M.

Johnst.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: CHL(ANT).

Oenothera bahia-blancae W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU).

Oenothera biennis L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(DFE, MEN). BRA(PAR). CHL(VAL).

Oenothera catharinensis Cambess.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Oenothera centaurifolia (Spach) Steud.Sin.: *Lavauxia centaurifolia* Spach

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SDE, SFE). BRA(PAR). URY(CAS).

Oenothera coquimbensis GaySin.: *Oenothera coquimbensis* Gay var.*grandidentata* (Phil.) Reiche, *Oenothera**grandidentata* Phil.

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Oenothera curtiflora W.L. Wagner & HochSin.: *Gaura australis* Griseb., *Gaura**parviflora* Douglas ex Hook.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Oenothera elongata RusbySin.: *Oenothera serratifolia* Krause

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT).

Oenothera glazioviana MicheliSin.: *Oenothera erythrosepala* Borbás

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, SFE). BRA(PAR). CHL(LBO, LLA). URY(MON).

Oenothera grisea W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(VAL).

Oenothera indecora Cambess.Sin.: *Oenothera argentinae* H. Lév.& Thell., *Oenothera argentinae* H. Lév.& Thell. var. *longipila* Kloos & Thell.,*Oenothera indecora* Cambess. subsp.*bonariensis* W. Dietr.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, GUA, ITA).

URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, RIV, SAO, SJO, TYT).

Oenothera laciniata Hill

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COR, SLU).

Oenothera lasiocarpa Griseb.

Hierba. Endémica. 1500-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Oenothera longiflora L. subsp.**grandiflora** W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI).

Oenothera longiflora L. subsp.**longiflora**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(COL, MON, RNO, ROC, SJO).

Oenothera longituba W. Dietr.

Hierba. Endémica. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Oenothera magellanica Phil.Sin.: *Oenothera hirsuta* F. Meigen, hom. illeg., *Oenothera magellanica* Phil.var. *chubutensis* Macloskie, *Oenothera**polymorpha* H. Lév. var. *magellanica*

(Phil.) H. Lév.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU). CHL(AIS, MAG).

Oenothera mendocinensis Gillies ex Hook. & Arn.Sin.: *Oenothera argentinae* H. Lév. & Thell. var. *camptotricha* Kloos & Thell.,*Raimannia mendocinensis* (Gillies ex

Hook. & Arn.) Sprague & Riley

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR).

Oenothera mollissima L.Sin.: *Oenothera mollissima* L. var.*genuina* Hassl., nom. inval., *Oenothera**mollissima* L. var. *villosa* Spreng., *Onagra**mollissima* (L.) Moench, *Raimannia**mollissima* (L.) Sprague & Riley

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, ROC, SJO).

Oenothera montevidensis W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(CAS, MON).

Oenothera nana Griseb.

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT).

Oenothera odorata Jacq.

Sin.: *Oenothera ibarii* Phil., *Oenothera mollissima* L. subsp. *odorata* (Jacq.) Thell., *Oenothera odorata* Jacq. f. *glabrescens* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. var. *glaucescens* Ser., *Oenothera odorata* Jacq. f. *media* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. f. *undulata* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. var. *virescens* Ser., *Oenothera odoratissima* Tausch, *Oenothera undulata* Aiton, *Onagra undulata* Moench, *Raimannia odorata* (Jacq.) Sprague & Riley
Hierba. Endémica. 0-2800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(AIS, MAG).

Oenothera parodiana Munz

Sin.: *Oenothera argentinae* H. Lévl. & Thell. var. *heterotricha* Kloos & Thell., *Oenothera parodiana* Munz subsp. *brasiliensis* W. Dietr., *Oenothera parodiana* Munz subsp. *strigulosa* W. Dietr., *Oenothera pseudolongiflora* W. Dietr., *Oenothera ravenii* W. Dietr. subsp. *argentinae* W. Dietr., *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link subsp. *argentinae* W. Dietr.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).

Oenothera pedunculifolia W. Dietr.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Oenothera peruana W. Dietr.

Hierba. Nativa. 2500-3300 m.
Países: CHL(TAR).

Oenothera picensis Phil. subsp.

bonariensis W. Dietr.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SLU).

Oenothera picensis Phil. subsp.

cordobensis W. Dietr.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, SLU, TUC).

Oenothera picensis Phil. subsp.

picensis
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, RME, JFE).

Oenothera punae Kuntze

Sin.: *Oenothera kuntziana* H. Lévl., *Raimannia punae* (Kuntze) Sprague & Riley
Hierba. Nativa. 2000-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Oenothera ravenii W. Dietr. subsp.

chilensis W. Dietr.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA).

Oenothera ravenii W. Dietr. subsp.

ravenii
Sin.: *Oenothera mollissima* L. var. *paraguayensis* Chodat
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, PAI). URY(CLA, LAV, MON, ROC, SAO).

Oenothera rivadaviae W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, SCR).

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton

Sin.: *Godetia heucki* Phil.
Hierba. Introducida. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, MEN, SAL, SFE, TUC). CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE, IPA). URY(MON).

Oenothera sandiana Hassk.

Sin.: *Oenothera rubida* Rusby
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Oenothera santarii W. Dietr.

Sin.: *Oenothera odorata* Jacq. var. *brachycarpa* Hauman
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(COR, MEN, SJU, SLU).

Oenothera scabra Krause

Sin.: *Oenothera burkartiana* Bartlett
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Oenothera siambonensis W. Dietr.

Sin.: *Oenothera acuticarpa* W. Dietr., *Oenothera cordobensis* W. Dietr., *Oenothera hechtii* W. Dietr., *Oenothera tucumanensis* W. Dietr.
Hierba. Endémica. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Oenothera stricta Ledeb. ex Link

subsp. **altissima** W. Dietr.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Oenothera stricta Ledeb. ex Link subsp. **stricta**

Sin.: *Oenothera arguta* Greene, *Oenothera brachysepala* Spach, *Oenothera bracteata* Phil., *Oenothera bracteata* Phil. var. *glabrescens* (Phil.) Reiche, *Oenothera glabrescens* Phil., *Oenothera mollissima* L. subsp. *propinqua* (Spach) Thell., *Oenothera mollissima* L. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Oenothera propinqua* Spach, *Oenothera propinqua* Spach var. *sparsiflora* Phil., *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link var. *propinqua* (Spach) Reiche, *Oenothera valdiviana* Phil., *Onagra arguta* (Greene) Small
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE, SFE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, IPA).

Oenothera suffrutescens (Ser.) W.L.

Wagner & Hoch
Sin.: *Gaura coccinea* Pursh
Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS).

Oenothera tafiensis W. Dietr. subsp.

parviflora W. Dietr.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(TUC).

Oenothera tafiensis W. Dietr. subsp.

tafiensis
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Oenothera versicolor Lehm.

Sin.: *Oenothera campylocalyx* C. Koch & Bouché
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Oenothera villaricae W. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, LRI, LLA).

Oenothera villosa Thunb.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, MEN, SJU).

OPILIACEAE

Agonandra Miers ex Hook. f.

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

Agonandra excelsa Griseb.

Sin.: *Agonandra spegazzini* Molfino
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA).

ORCHIDACEAE

Aa Juss.**Aa achalensis** Schltr.

Sin.: *Aa lorentzii* Schltr., *Aa schickendantzii* Schltr.
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Aa fiebrigii (Schltr.) Schltr.

Sin.: *Altensteinia fiebrigii* Schltr.
Hierba. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Aa hieronymi (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Altensteinia hieronymi* Cogn., *Altensteinia lorentzii* Schltr., *Altensteinia schickendantzii* Schltr.
Hierba. Endémica. 1000-2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SLU, TUC).

Aa weddelliana (Rchb. f.) Schltr.

Sin.: *Altensteinia weddelliana* Rchb. f.
Hierba terrestre. Nativa. 1700-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Acianthera Scheidw.**Acianthera acuminatipetala** (A.

Samp.) Luer
Sin.: *Pleurothallis acuminatipetala* A. Samp.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Acianthera adirii (Brade) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis adirii* Brade, *Specklinia adirii* (Brade) Luer
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Acianthera alborosea (Kraenzl.) Luer

Sin.: *Octomeria albo-rosea* Kraenzl., *Pleurothallis albo-rosea* (Kraenzl.) Brade
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera apthosa (Lindl.)

Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis apthosa* Lindl., *Pleurothallis foetens* Lindl., *Pleurothallis macrophyta* Barb. Rodr., *Pleurothallis pelioxantha* Barb. Rodr., *Specklinia apthosa* (Lindl.) F. Barros
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, PAI).

Acianthera atropurpurea (Barb.

Rodr.) Chiron & Van den Berg
Sin.: *Pleurobotryum atropurpureum* Barb. Rodr., *Pleurothallis teretifolia* Rolfe
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Acianthera aurantio-lateritia (Speg.)

Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis aurantio-lateritia* Speg.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

Acianthera bicarinata (Lindl.)

Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Acianthera binotii* (Regel) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis bicarinata* Lindl., *Pleurothallis binotii* Regel
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Acianthera bidentula (Barb. Rodr.)

Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis bidentula* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA (PAR, RGS, SCA).

Acianthera boliviana (Rchb. f.)

Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Humboldtia boliviana* (Rchb. f.) Kuntze, *Pleurothallis boliviana* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 1000-1200 m.
Países: ARG(SAL).

Acianthera brachiloba (Hoehne)

Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis brachiloba* Hoehne, *Specklinia brachiloba* (Hoehne) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera bragrae (Ruschi) F. Barros

Sin.: *Acianthera sarracenia* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, *Phloeophila pubescens* (Barb. Rodr.) Garay, *Physosiphon bragrae* Ruschi, *Physosiphon pubescens* Barb. Rodr., *Pleurothallis*

sarracenia Luer, *Sarracenia pubescens* (Barb. Rodr.) Luer
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera calopedilon Toscano & Luer

Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Acianthera capanemae (Barb. Rodr.)

Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis capanemae* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Acianthera crepiniana (Cogn.) Chiron & Van den Berg

Sin.: *Pleurobotryum albopurpurea* (Kraenzl.) Garay, *Pleurobotryum crepinianum* (Cogn.) Hoehne, *Pleurothallis albopurpurea* Kraenzl., *Pleurothallis crepiniana* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera crinita (Barb. Rodr.)

Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Lepanthes crinita* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Pleurothallis crinita* Barb. Rodr., *Specklinia crinita* (Barb. Rodr.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).

Acianthera cryptantha (Barb. Rodr.)

Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Acianthera juergensii* (Schltr.) F. Barros, *Acianthera langeana* (Kraenzl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera neojuergensii* (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, *Cryptophoranthus cryptantha* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Cryptophoranthus dusenii* Schltr., *Cryptophoranthus juergensii* Schltr., *Cryptophoranthus langeanus* (Kraenzl.) Garay, *Pleurothallis cryptantha* Barb. Rodr., *Pleurothallis langeana* Kraenzl., *Pleurothallis neojuergensii* Luer
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Acianthera dutrai (Pabst) C.N.

Gonçalves & J.L. Waechter
Sin.: *Pleurothallis dutrai* Pabst, *Specklinia dutrai* (Pabst) Luer
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: BRA(RGS).

Acianthera echinosa Luer & Toscano

Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Acianthera exarticulata (Barb. Rodr.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis exarticulata* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera fenestrata (Barb. Rodr.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Acianthera spicata*
(Dutra) Pridgeon & M.W. Chase,
Cryptophoranthus fenestratus (Barb.
Rodr.) Barb. Rodr., *Cryptophoranthus*
spicatus Dutra, *Pleurothallis fenestrata*
Barb. Rodr., *Pleurothallis fenestrata* Barb.
Rodr. var. *angustifolius* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera glanduligera (Lindl.) Luer
Sin.: *Acianthera cearensis* (Schltr.)
Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera*
cryptoceras (Rchb. f.) F. Barros,
Acianthera iguapensis (Schltr.) F.
Barros, *Anathallis iguapensis* (Schltr.)
Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis*
altoserrana Hoehne, *Pleurothallis*
cearensis Schltr., *Pleurothallis cryptoceras*
Rchb. f., *Pleurothallis glanduligera* Lindl.,
Pleurothallis iguapensis Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera glumacea (Lindl.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Humboldtia glumacea* (Lindl.)
Kuntze, *Pleurothallis crocea* Barb. Rodr.,
Pleurothallis glaziovii Cogn., *Pleurothallis*
glumacea Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera gouveiae (A. Samp.) F.
Barros & L. Guimarães
Sin.: *Pleurothallis gouveiae* A. Samp.
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Acianthera gracilispala (Brade) Luer
Sin.: *Acianthera antennata* (Garay)
Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis*
antennata Garay, *Pleurothallis*
gracilispala Brade
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Acianthera guimaraensis (Brade) F.
Barros
Sin.: *Pleurothallis guimaraensis* Brade,
Specklinia guimaraensis (Brade) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Acianthera hatschbachii (Schltr.)
Chiron & C. Berg
Sin.: *Pleurobotryum hatschbachii*
(Schltr.) Hoehne, *Pleurothallis*
hatschbachii Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 300-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera hoffmannseggiana
(Rchb. f.) Luer
Sin.: *Acianthera ophiantha* (Cogn.)
Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis*
hoffmannseggiana Rchb. f., *Pleurothallis*
loefgrenii Cogn., *Pleurothallis ophiantha*
Cogn., *Pleurothallis ophicephala* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera hygrophila (Barb. Rodr.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Acianthera barbacenensis*
(Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase,
Arthrosia hygrophila (Barb. Rodr.)
Luer, *Pleurothallis barbacenensis* Barb.
Rodr., *Pleurothallis barbacenensis* Barb.
Rodr. var. *angustifolia* (Pabst) Pabst,
Pleurothallis hygrophila Barb. Rodr.,
Pleurothallis hygrophila Barb. Rodr.
var. *elongata* Hauman, *Pleurothallis*
hygrophila Barb. Rodr. var. *longicaulis*
Dutra ex Pabst, *Pleurothallis platysemos*
Rchb. f. var. *angustifolia* Pabst,
Pleurothallis platysemos Rchb. f. var.
platysemos, *Specklinia barbacenensis*
(Barb. Rodr.) Luer, *Specklinia hygrophila*
(Barb. Rodr.) Luer, *Stelis hygrophila*
(Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY(CLA).

Acianthera hystrix (Kraenzl.) F. Barros
Sin.: *Acianthera raduliglossa* (Pabst)
Pridgeon & M.W. Chase, *Apoda*
prorepentia raduliglossa (Pabst) Luer,
Cryptophoranthus hystrix (Kraenzl.)
Garay, *Cryptophoranthus similis*
Schltr., *Phloeophila hystrix* (Kraenzl.)
Garay, *Phloeophila similis* (Schltr.)
Garay, *Physosiphon hystrix* Kraenzl.,
Pleurothallis raduliglossa Pabst, *Specklinia*
hystrix (Kraenzl.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera karlii (Pabst) C.N.
Gonçalves & J.L. Waechter
Sin.: *Apoda prorepentia karlii* (Pabst)
Luer, *Pleurothallis karlii* Pabst
Hierba epífita. Endémica. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Acianthera klingelfusii Luer, Toscano
& D.H. Baptista
Hierba epífita. Endémica. 300-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Acianthera klotzscheana (Rchb. f.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Humboldtia klotzschiana* (Rchb. f.)
Kuntze, *Pleurothallis klotzschiana* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA).

Acianthera leptotifolia (Barb. Rodr.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pabstiella leptotifolia* (Barb.
Rodr.) Luer, *Pleurothallis leptotifolia*
Barb. Rodr., *Specklinia leptotifolia* (Barb.
Rodr.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Acianthera luteola (Lindl.) Pridgeon
& M.W. Chase
Sin.: *Acianthera rodriguesii* (Cogn.)
Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis*
caespitosa Barb. Rodr. var. *platycaulis*
(Rchb. f. ex Cogn.) Pabst, *Pleurothallis*
caespitosa Barb. Rodr., *Pleurothallis*
luteola Lindl., *Pleurothallis platycaulis*
Rchb. f. ex Cogn., *Pleurothallis rodriguesii*
Cogn., *Pleurothallis subcordifolia* Cogn.,
Specklinia luteola (Lindl.) F. Barros
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera macropoda (Barb. Rodr.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis macropoda* Barb.
Rodr., *Pleurothallis macropoda* Barb.
Rodr. var. *laevis* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera macuconensis (Barb.
Rodr.) F. Barros
Sin.: *Pleurothallis gonzalezii* Pabst,
Pleurothallis macuconensis Barb. Rodr.,
Specklinia gonzalezii (Pabst) Luer
Hierba epífita. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

Acianthera mantiquyrana (Barb.
Rodr.) V.T. Rodrigues & F. Barros
Sin.: *Pleurobotryum mantiquyranum*
(Barb. Rodr.) Hoehne, *Pleurothallis*
mantiquyrana Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera marumbyana (Garay) Luer
Sin.: *Pleurothallis marumbyana* Garay
Hierba epífita. Endémica. 200-500 m.
Países: BRA(PAR).

Acianthera murexoides (Pabst)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis murexoides* Pabst,
Specklinia murexoides (Pabst) Luer
Hierba epífita. Endémica. 1000-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Acianthera muscosa (Barb. Rodr.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Arthrosia muscosa* (Barb. Rodr.)
Luer, *Pleurothallis muscosa* Barb. Rodr.,
Pleurothallis muscosa Barb. Rodr. var.
parvifolia Hoehne, *Specklinia muscosa*
(Barb. Rodr.) Luer, *Specklinia muscosa*
(Barb. Rodr.) Luer var. *parviflora*
(Hoehne) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Acianthera nemorosa (Barb. Rodr.) F.
Barros
Sin.: *Acianthera farinosa* (Pabst) Luer,
Acianthera nemorosa (Barb. Rodr.) Luer,
comb. superfl., *Pleurothallis farinosa*
Pabst, *Pleurothallis nemorosa* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Acianthera oligantha (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis oligantha* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera panduripetala (Barb.
Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis panduripetala* Barb.
Rodr.
Hierba epífita. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera papillosa (Lindl.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis papillosa* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Acianthera pardipes (Rchb. f.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis pardipes* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera pectinata (Lindl.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis pectinata* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).

Acianthera pubescens (Lindl.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis riograndensis* Barb.
Rodr., *Pleurothallis riograndensis* Barb.
Rodr. var. *longicaulis* Cogn., *Pleurothallis*
riograndensis Barb. Rodr. var. *viridicata*
Barb. Rodr., *Pleurothallis smithiana*
Lindl., *Pleurothallis porphyrantha*
Kraenzl., *Pleurothallis pubescens* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, GUA,
PAI). URY(CLA).

Acianthera ramosa (Barb. Rodr.) F.
Barros
Sin.: *Acianthera ramosa* (Barb. Rodr.)
Luer, comb. superfl., *Pleurothallis ramosa*
Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Acianthera recurva (Lindl.) Pridgeon
& M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis bistuberculata*
Barb. Rodr., *Pleurothallis curitybensis*
Kraenzl., *Pleurothallis lamproglossa*
Schltr., *Pleurothallis leucorhoda* Schltr.,
Pleurothallis lilacina Barb. Rodr. var.
microphylla Barb. Rodr., *Pleurothallis*
recurva Lindl., *Pleurothallis recurva* Lindl.
var. *microphylla* (Barb. Rodr.) Garay,
Specklinia recurva (Lindl.) F. Barros
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, ÑEE).

Acianthera renipetala (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes renipetala* Barb. Rodr.,
Pleurothallis per-dusenii Hoehne
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera rhabdosepala (Schltr.)
Chiron & C. Berg
Sin.: *Pleurobotryum rhabdosepalum*
(Schltr.) Hoehne, *Pleurothallis*
rhabdosepala Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).

Acianthera saundersiana (Rchb. f.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis butantanensis*
Hoehne & Schltr., *Pleurothallis felislingua*
Barb. Rodr., *Pleurothallis josephensis*
Barb. Rodr., *Pleurothallis josephensis*
Barb. Rodr. var. *pillifera* (Hoehne)
Hoehne, *Pleurothallis juergensii* Schltr.,
Pleurothallis repens Rolfe, hom. illeg.,

Pleurothallis saundersiana Rchb. f.,
Specklinia saundersiana (Rchb. f.) F.
Barros, *Pleurothallis ascendens* Garay
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, SPE).

Acianthera saurocephala (Lodd.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Humboldtia saurocephala* (Lodd.)
Kuntze, *Pleurothallis saurocephala* Lodd.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acianthera serpentula (Barb. Rodr.)
F. Barros
Sin.: *Pleurothallis punctata* Barb. Rodr.,
hom. illeg., *Pleurothallis serpentula* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA (PAR, RGS, SCA).

Acianthera sonderana (Rchb. f.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis sonderana* Rchb.
f., *Pleurothallis sonderana* Rchb. f. var.
longicaulis Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, SPE). URY(CLA).

Acianthera spilantha (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Myoxanthus spilanthus* (Barb. Rodr.)
Luer, *Pleurothallis spilantha* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

Acianthera strupifolia (Lindl.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis strupifolia* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera translucida (Barb. Rodr.)
Luer
Sin.: *Pleurothallis translucida* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Acianthera tricarinata (Poepp. &
Endl.) Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis platystachys* Regel,
Pleurothallis trialata Cogn., *Pleurothallis*
tricarinata Poepp. & Endl.
Hierba epífita. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Acianthera tristis (Barb. Rodr.)
Pridgeon & M.W. Chase
Sin.: *Pleurothallis tristis* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS).

Acianthera violaceomaculata

(Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis violaceomaculata* Hoehne, *Specklinia violaceomaculata* (Hoehne) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Acianthera wagneriana (Klotzsch)

Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis convexifolia* Barb. Rodr., *Pleurothallis xylobiochila* Kraenzl., *Pleurothallis wagneriana* Klotzsch

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Acronia C. Presl**Acronia aloplex** (Luer) LuerSin.: *Pleurothallis aloplex* Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.

Países: PRY(APA).

Anathallis Barb. Rodr.**Anathallis adenochila** (Loefgr.) F.

Barros

Sin.: *Anathallis aquinoi* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Panmorphia adenochila* (Loefgr.) Luer, *Pleurothallis adenochila* Loefgr., *Pleurothallis aquinoi* Schltr., *Specklinia adenochila* (Loefgr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis aristulata (Lindl.) LuerSin.: *Anathallis crebrifolia* (Barb. Rodr.)Luer, *Lepanthes crebifolia* Barb. Rodr.,*Pleurothallis crebifolia* (Barb. Rodr.)Cogn., *Pleurothallis aristulata* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 100-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis bertonensis (Hauman)

Luer

Sin.: *Pleurothallis bertonensis*Hauman, *Specklinia bertonensis*(Hauman) Luer, *Stelis bertonensis*

(Hauman) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Endémica. 300-500 m.

Países: PRY(APA).

Anathallis bleyensis (Pabst) F. BarrosSin.: *Anathallis bleyensis* (Pabst)Luer, comb. illeg., *Panmorphia bleyensis*(Pabst) Luer, *Pleurothallis bleyensis*Pabst, *Specklinia bleyensis* (Pabst) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anathallis bocainensis (Porto &

Brade) F. Barros & Barberena

Sin.: *Pleurothallis bocainensis* Porto& Brade, *Pleurothallis pfisteri* Braem & Braas

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Anathallis brevipes (H. Focke)

Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Panmorphia brevipes* (H. Focke)Luer, *Pleurothallis brevipes* H. Focke

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Anathallis caroli (Schltr.) F. Barros &

Barberena

Sin.: *Pleurothallis caroli* Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(RGS).

Anathallis ciliolata (Schltr.) Pridgeon

& M.W. Chase

Sin.: *Panmorphia ciliolata* (Schltr.)Luer, *Pleurothallis ciliolata* Schltr.,*Specklinia ciliolata* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Anathallis citrina (Schltr.) Pridgeon &

M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis angustilabia* Schltr.,*Pleurothallis citrina* Schltr., *Specklinia**citrina* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Anathallis corticicola (Schltr. ex

Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Anathallis kleinii* (Pabst) Luer,*Panmorphia corticicola* (Schltr. ex Hoehne)Luer, *Pleurothallis corticicola* Schltr.ex Hoehne, *Pleurothallis kleinii* Pabst,*Specklinia corticicola* (Schltr. ex Hoehne)Luer, *Specklinia kleinii* (Pabst) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis dryadum (Schltr.) F. BarrosSin.: *Pabstiella dryadum* (Schltr.)Luer, *Pleurothallis dryadum* Schltr.,*Pleurothallis maculosa* Garay, *Specklinia**dryadum* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis ferdinandiana (Barb.

Rodr.) Luer

Sin.: *Anathallis ypirangae* (Kraenzl.)Pridgeon & M.W. Chase, *Lepanthes**ferdinandiana* Barb. Rodr., *Pleurothallis**ferdinandiana* (Barb. Rodr.) Cogn.,*Pleurothallis ypirangae* Kraenzl.,*Specklinia ypirangae* (Kraenzl.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Anathallis gert-hatschbachii

(Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Anathallis pabstii* (Garay) Pridgeon &M.W. Chase, *Pleurothallis gert-hatschbachii*Hoehne, *Pleurothallis pabstii* Garay,*Specklinia gert-hatschbachii* (Hoehne) Luer,*Specklinia pabstii* (Garay) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis globifera (Pabst) F. Barros

& Barberena

Sin.: *Pleurothallis globifera* Pabst

Hierba epífita. Endémica. 0-200 m.

Países: BRA(SCA).

Anathallis heloisae F.J. de Jesus, M.R.Miranda & Chiron f. **camboriensis** A.S.

Medeiros, W. Campos & Pegoraro

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Anathallis heterophylla Barb. Rodr.Sin.: *Acianthera heterophylla* Barb.Rodr., *Anathallis liparanges* (Rchb. f.)Luer, *Pleurothallis heterophylla* (Barb.Rodr.) Cogn., *Pleurothallis hoehnei*Schltr., *Pleurothallis liparanges* Rchb. f.,*Specklinia heterophylla* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anathallis imbricata (Barb. Rodr.) F.

Barros & F. Pinheiro

Sin.: *Anathallis imbricata* (Barb. Rodr.)Luer, comb. illeg., *Pabstiella imbricata*(Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis**imbricata* Barb. Rodr., *Specklinia**imbricata* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Anathallis ipyrangana (Schltr.) LuerSin.: *Pleurothallis ipyrangana* Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

Anathallis johnsonii Luer & Toscano

Hierba epífita. Endémica.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Anathallis klingelfusii Luer &

Toscano

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Anathallis laciniata (Barb. Rodr.) F.

Barros & Barberena

Sin.: *Lepanthes laciniata* (Barb. Rodr.)Barb. Rodr., *Panmorphia laciniata*(Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis**laciniata* Barb. Rodr., *Specklinia**laciniata* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.

Países: BRA(RGS).

Anathallis linearifolia (Cogn.)

Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Anathallis margaritifera* (Schltr.)Pridgeon & M.W. Chase, *Anathallis**rigidula* (Cogn.) Luer, *Pleurothallis**convallium* Kraenzl., *Pleurothallis**convergens* R.C.J. Gerard, *Pleurothallis**depauperata* Cogn., *Pleurothallis**eugenii* Pabst, *Pleurothallis**glossochila* Kraenzl., *Pleurothallis**linearifolia*Cogn., *Pleurothallis**margaritifera*Schltr., *Pleurothallis**rigidula* Cogn., *Specklinia**depauperata* (Cogn.) Luer, *Specklinia**linearifolia* (Cogn.) Luer, *Specklinia**rigidula* (Cogn.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis malmeana (Dutra ex Pabst)

Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis malmeana* Dutra exPabst, *Specklinia malmeana* (Dutra ex

Pabst) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS).

Anathallis marginata (Barb. Rodr.) F.

Barros & Barberena

Sin.: *Lepanthes marginata* Barb.Rodr., *Panmorphia limbata* (Cogn.) Luer,*Pleurothallis limbata* Cogn., *Specklinia**limbata* (Cogn.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Anathallis microphyta (Barb. Rodr.)

C.O. Azevedo & C. Berg

Sin.: *Anathallis microgemma* (Schltr.)Pridgeon & M.W. Chase, *Anathallis**microphyta* (Barb. Rodr.) Luer, comb.illeg., *Anathallis paranaensis* (Schltr.)Pridgeon & M.W. Chase, *Lepanthes**microphyta* Barb. Rodr., *Panmorphia**microgemma* (Schltr.) Luer, *Panmorphia**paranaensis* (Schltr.) Luer, *Pleurothallis**microgemma* Schltr., *Pleurothallis**microphyta* (Barb. Rodr.) Cogn. var.*missionum* Hauman, *Pleurothallis**microphyta* (Barb. Rodr.) Cogn.,*Pleurothallis paranaensis* Schltr.,*Specklinia microphyta* (Barb. Rodr.) Luer,*Specklinia paranaensis* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis modesta (Barb. Rodr.)

Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Anathallis microblephara* (Schltr.)Pridgeon & M.W. Chase, *Lepanthes**modesta* Barb. Rodr., *Panmorphia**microblephara* (Schltr.) Luer, *Panmorphia**modesta* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis**microblephara* Schltr., *Pleurothallis**modesta* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia**microblephara* (Schltr.) Luer, *Specklinia**modesta* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Anathallis muscoidea (Lindl.) F.

Barros & Barberena

Sin.: *Pleurothallis muscoidea* Lindl.,*Specklinia muscoidea* (Lindl.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 100-500 m.

Países: BRA(SCA).

Anathallis obovata (Lindl.) Pridgeon

& M.W. Chase

Sin.: *Anathallis densiflora* Barb.Rodr., *Anathallis fasciculata* Barb.Rodr., *Anathallis micrantha* Barb.Rodr., *Humboldtia obovata* (Lindl.)Kuntze, *Pleurothallis albida* Lindl.,*Pleurothallis citrina* Schltr. var. *elliptica*C. Schweinf., *Pleurothallis densiflora*(Barb. Rodr.) Cogn. var. *parvifolia* Garay,*Pleurothallis densiflora* (Barb. Rodr.)Cogn., *Pleurothallis fasciculata* (Barb.Rodr.) Cogn., *Pleurothallis minutiflora*Cogn., *Pleurothallis modestiflora*Schltr., *Pleurothallis obovata* (Lindl.)Lindl., *Specklinia obovata* Lindl., *Stelis**fasciculata* Regel

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Anathallis petersiana (Schltr.)

Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Pleurothallis petersiana* Schldtl.,*Specklinia petersiana* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR).

Anathallis piratiningana (Hoehne) F.

Barros

Sin.: *Pleurothallis piratiningana* Hoehne,*Specklinia piratiningana* (Hoehne) F.Barros, *Specklinia piratiningana* (Hoehne)

Luer, comb. superfl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Anathallis rubens (Lindl.) Pridgeon &

M.W. Chase,

Sin.: *Pleurothallis montserrati* Porsch,*Pleurothallis rubens* Lindl., *Specklinia rubens*(Lindl.) F. Barros, *Stelis neorubens* Chiron

Hierba epífita. Nativa. 300-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Anathallis rubrolimbata (Hoehne) F.

Barros & Barberena

Sin.: *Panmorphia rubrolimbata*(Hoehne) Luer, *Pleurothallis rubrolimbata*Hoehne, *Specklinia rubrolimbata*

(Hoehne) Luer

Hierba epífita. Nativa. 800- m.

Países: BRA(RGS).

Anathallis rudolfii (Pabst) Pridgeon &

M.W. Chase

Sin.: *Panmorphia rudolfii* (Pabst) Luer,*Pleurothallis rudolfii* Pabst, *Specklinia**rudolfii* (Pabst) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Anathallis sclerophylla (Lindl.)

Pridgeon & M.W. Chase

Sin.: *Anathallis racemosa* Barb.Rodr., *Anathallis secunda* Barb.Rodr., *Pleurothallis listrostachys*Rchb. f., *Pleurothallis ottonis* Schltr.,*Pleurothallis racemosa* (Barb. Rodr.)Cogn., *Pleurothallis sclerophylla* Lindl.,*Pleurothallis stenopetala* Lodd. ex Lindl.,*Pleurothallis triura* Schltr., *Specklinia**sclerophylla* (Lindl.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anathallis seidelii Luer, Toscano &

D.H. Baptista

Hierba epífita. Endémica.

Países: BRA(SCA).

Anathallis sororcula (Schltr.) LuerSin.: *Pleurothallis sororcula* Schltr.,*Specklinia sororcula* (Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Anathallis vitorinoi (Luer & Toscano)

Luer & Toscano

Sin.: *Pleurothallis vitorinoi* Luer & Toscano

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Arthroisia Luer**Arthroisia auriculata** (Lindl.) LuerSin.: *Acianthera auriculata* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis anthoxantha* Rchb. f., *Pleurothallis auriculata* Lindl., *Pleurothallis compressiflora* Barb. Rodr., *Specklinia auriculata* (Lindl.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Arthroisia caldensis (Hoehne & Schltr.) LuerSin.: *Pleurothallis caldensis* Hoehne & Schltr., *Specklinia caldensis* (Hoehne & Schltr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Arthroisia floribunda (Lindl.) LuerSin.: *Acianthera capillaris* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Acianthera longicaulis* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Humboldtia capillaris* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis capillaris* Lindl., *Pleurothallis longicaulis* Lindl., *Pleurothallis montana* Barb. Rodr., *Specklinia capillaris* (Lindl.) Luer, *Specklinia floribunda* Lindl., *Specklinia longicaulis* (Lindl.) Luer, *Specklinia montana* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Arthroisia malachantha (Rchb. f.) LuerSin.: *Pleurothallis malachantha* Rchb. f., *Specklinia malachantha* (Rchb. f.) Luer

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Arthroisia myrticola (Barb. Rodr.) LuerSin.: *Pleurothallis myrticola* Barb. Rodr., *Specklinia myrticola* (Barb. Rodr.) Luer

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS).

Aspasia Lindl.**Aspasia lunata** Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aspidogyne Garay**Aspidogyne argentea** (Vell.) GaraySin.: *Ophrys argentea* Vell., *Physurus callodictyus* Kraenzl., *Physurus pictus* Lindl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAU, CAN, CON, COA, PAI).

Aspidogyne bicolor (Barb. Rodr.) GaraySin.: *Erythrodes bicolor* (Barb. Rodr.) Ames, *Physurus bicolor* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APY, CAN).

Aspidogyne bidentifera (Schltr.) GaraySin.: *Erythrodes bidentifera* (Schltr.) Garay, *Physurus bidentiferus* Schltr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

Aspidogyne bruxellii (Pabst) GaraySin.: *Aspidogyne bruxellii* Pabst var. *acutiloba* Pabst, *Erythrodes bruxellii* Pabst

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Aspidogyne commelinoides (Barb. Rodr.) GaraySin.: *Erythrodes commelinoides* (Barb. Rodr.) Ames, *Physurus commelinoides* Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aspidogyne debilis (Lindl.)

Meneguzzo

Sin.: *Physurus debilis* Lindl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN).

Aspidogyne fimbriaris (Buyss.) GaraySin.: *Erythrodes nobilis* (Rchb. f.) Pabst, *Erythrodes picta* (Lindl.) Ames, *Physurus fimbriaris* Buyss., *Physurus nobilis* Rchb. f. var. *argyrocentrus* Hoehne, *Physurus nobilis* Rchb. f.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aspidogyne foliosa (Poepp. & Endl.) GaraySin.: *Erythrodes densiflora* (Lindl.) Ames, *Erythrodes foliosa* (Poepp. & Endl.) Ames, *Pelexia foliosa* Poepp. & Endl., *Physurus densiflorus* Lindl., *Physurus foliosus* (Poepp. & Endl.) Lindl.

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Aspidogyne kuczynskii (Porsch) GaraySin.: *Erythrodes dichopetala* (Kraenzl.)L.O. Williams, *Erythrodes kuczynskii* (Porsch) Garay, *Physurus dichopetalus* Kraenzl., *Physurus kuczynskii* Porsch

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, GUA, SPE).

Aspidogyne lindleyana (Cogn.) GaraySin.: *Erythrodes lindleyana* (Cogn.)Ames, *Physurus lindleyanus* Cogn.,*Physurus lindmanii* Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Aspidogyne longicornu (Cogn.) GaraySin.: *Erythrodes longicornu* (Cogn.)Ames, *Physurus longicalcaratus* Schltr.,*Physurus longicornu* Cogn.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aspidogyne malmei (Kraenzl.) GaraySin.: *Erythrodes malmei* (Kraenzl.)Pabst, *Physurus malmei* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Aspidogyne metallescens (Barb. Rodr.) GaraySin.: *Physurus metallescens* Barb. Rodr.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Aspidogyne serripetala (Garay) GaraySin.: *Erythrodes serripetala* Garay

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Barbosella Schltr.**Barbosella australis** (Cogn.) Schltr.Sin.: *Barbosella australis* (Cogn.) Schltr. var. *genuina* Hoehne, *Restrepia australis* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Barbosella cogniauxiana (Speg. & Kraenzl.) Schltr.Sin.: *Barbosella handroi* Hoehne, *Barbosella porschiana* (Kraenzl.) Schltr., *Barbosella riograndensis* Dutra ex Pabst, nom. nud., *Pleurothallis hamburgensis* Kraenzl., *Pleurothallis spegazziana* L.O. Williams, *Restrepia cogniauxiana* Speg. & Kraenzl., *Restrepia porschiana* Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

- Barbosella crassifolia** (Edwall) Schltr.
Sin.: *Barbosella crassifolia* (Edwall)
Schltr. var. *hamburgensis* (Kraenzl.)
Garay, *Barbosella hamburgensis* (Kraenzl.)
Hoehne, *Restrepia crassifolia* Edwall
Hierba epífita. Nativa. 800-1500 m.
Países: BRA(RGS).
- Barbosella dusenii** (A. Samp.) Schltr.
Sin.: *Barbosella gardneri* (Lindl.)
Schltr. var. *dusenii* (A. Samp.) Hoehne,
Restrepia dusenii A. Samp.
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Barbosella gardneri** (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Barbosella microphylla* (Barb.
Rodr.) Schltr., *Pleurothallis gardneri* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Barbosella miersii** (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Barbrodia miersii* (Lindl.) Luer,
Pleurothallis miersii Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR).
- Barbosella trilobata** Pabst
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).
- Baskervilla** Lindl.
- Baskervilla paranaensis** (Kraenzl.)
Schltr.
Sin.: *Ponthieva paranaensis* Kraenzl.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Beloglottis** Schltr.
- Beloglottis boliviensis** Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500 m.
Países: ARG(SAL).
- Bifrenaria** Lindl.
- Bifrenaria aureo-fulva** (Hook.) Lindl.
Sin.: *Adipec aureo-fulva* (Hook.) M. Wolff,
Bifrenaria secunda (Vell.) Pabst, *Maxillaria*
aureo-fulva Hook., *Maxillaria stenopetala*
Knowles & Westc., *Stenocoryne aureo-fulva*
(Hook.) Kraenzl., *Stenocoryne secunda*
(Vell.) Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bifrenaria harrisoniae** (Hook.) Rchb.
f. var. **grandiflora** Hort
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Bifrenaria harrisoniae** (Hook.) Rchb.
f. var. **harrisoniae**
Sin.: *Bifrenaria aurea* Barb. Rodr.,
Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb.
f. var. *alba* Kraenzl., *Dendrobium*
harrisoniae Hook.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bifrenaria harrisoniae** (Hook.) Rchb.
f. var. **pubifera** Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Bifrenaria inodora** Lindl.
Sin.: *Bifrenaria inodora* Lindl. var.
violacea Rchb. f., *Bifrenaria inodora* Lindl.
var. *xanthina* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bifrenaria racemosa** (Hook.) Lindl.
Sin.: *Maxillaria racemosa* Hook.,
Stenocoryne racemosa (Hook.) Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 200-1500 m.
Países: BRA(PAR).
- Bifrenaria stefanae** V.P. Castro
Hierba epífita. Nativa. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR).
- Bifrenaria tetragona** (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Bifrenaria calcarata* (Vell.) V.P.
Castro, nom. illeg., *Bifrenaria tetragona*
(Lindl.) Schltr. var. *umbrophylla* Hoehne,
Epidendrum calcarata Vell.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bipinnula** Comm. ex Juss.
- Bipinnula biplumata** (L. f.) Rchb. f.
Sin.: *Arethusa biplumata* L. f., *Bipinnula*
bonariensis Spreng., hom. illeg., *Bipinnula*
commersonii Lindl., nom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS).
URY(MAL, MON).
- Bipinnula fimbriata** (Poepp.) I.M. Johnst.
Sin.: *Bipinnula mystacina* Lindl.,
Chloraea fimbriata Poepp.
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).
- Bipinnula gabriel** P.A. Bravo & G.M.
Baeza
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(MAU).
- Bipinnula gibertii** Rchb. f.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(DUR, LAV,
MAL, MON, RIV, SJO).
- Bipinnula montana** Arechav.
Sin.: *Bipinnula canisii* Dutra ex Pabst
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV,
MAL, MON, RIV).
- Bipinnula penicillata** (Rchb. f.)
Cisternas & Salazar
Sin.: *Asarca arechavaletae* (Kraenzl.)
Kuntze, *Chloraea arechavaletae*
Kraenzl., *Chloraea bergii* Hieron.,
Chloraea pennicillata Rchb. f., *Chloraea*
teixeirana (Barb. Rodr.) Cogn., *Geoblasta*
arechavaletae (Kraenzl.) Szlach. &
Margónska, *Geoblasta bergii* (Hieron.)
Szlach. & Margónska, *Geoblasta*
penicillata (Rchb. f.) Hoehne ex M.N.
Correa, *Geoblasta teixeirana* Barb. Rodr.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY(COL, MON, SJO, TAC).
- Bipinnula plumosa** Lindl.
Sin.: *Bipinnula philipporum* Kraenzl.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).
- Bipinnula polysyca** Kraenzl.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(CAS, CLA, COL,
LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
- Bipinnula taltalensis** I.M. Johnst.
Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.
Países: CHL(ANT).
- Bipinnula volckmannii** Kraenzl.
Hierba epífita. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA).
- Bletia** Ruiz & Pav.
- Bletia catenulata** Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área
del proyecto). PRY(AMA).

Bletia wagnerii Rchb. f.
Hierba. Nativa. 800-1200 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Brachionidium Lindl.

Brachionidium restrepioides

(Hoehne) Pabst

Sin.: *Brachionidium dungsii* Pabst,
Yolanda restrepioides Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 100-800 m.
Países: BRA(PAR).

Brachystele Schltr.

Brachystele arechavaletae (Kraenzl.)
Schltr.

Sin.: *Diskiphogyne arechavaletae*
(Kraenzl.) Szlach. & R. González,
Spiranthes arechavaletae Kraenzl.
Hierba parásita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, MAL,
ROC, TAC).

Brachystele bicrinita Szlach.

Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(SCA).

Brachystele bracteosa (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes bracteosa* Lindl.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(PAI).

Brachystele burkartii M.N. Correa

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Brachystele camporum (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes camporum* Lindl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CEN,
COA, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, COL,
LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC,
SOR, TAC, TYT).

Brachystele cyclochila (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Brachystele cycloglossa* (Kraenzl.)
Schltr., *Spiranthes cyclochila* Kraenzl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, SCA). PRY(AMA). URY(LAV,
MAL, RNO, SAO, SOR).

Brachystele delicatula (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes delicatula* Kraenzl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY (APA) URY (Desconocida).

Brachystele dilatata (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Brachystele hoehnei* Pabst,
Brachystele ulaei (Cogn.) Schltr.,
Spiranthes dilatata Lindl., *Spiranthes*
ulaei Cogn.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS,
SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(PAI). URY(CAS, COL, LAV, MAL,
MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Brachystele icmadophila (Barb.

Rodr.) Schltr. ex Pabst

Sin.: *Cyclopogon icmadophilus* (Barb.
Rodr.) Schltr., *Spiranthes icmadophila*
(Barb. Rodr.) Barb. Rodr., *Stenorrhynchos*
icmadophilus Barb. Rodr.

Hierba. Endémica. 300-500 m.
Países: BRA(RGS).

Brachystele pappulosa Szlach.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(MON).

Brachystele scabrilingua Szlach.

Sin.: *Diskiphogyne scabrilingua*
(Szlach.) Szlach. & R. González
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(SCA).

Brachystele subfiliformis (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes subfiliformis* Cogn.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Brachystele unilateralis (Poir.) Schltr.

Sin.: *Odontorrhynchus chilensis*
(A. Rich.) Garay, *Odontorrhynchus*
domeykoanus Szlach., *Odontorrhynchus*
erosus Szlach., *Odontorrhynchus*
variabilis Garay, *Ophrys unilateralis* Poir.,
Spiranthes chilensis A. Rich., *Spiranthes*
diuretica Lindl.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(CHU, RNE). CHL(COQ,
VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Brachystele waldemarii Szlach.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(LAV).

Brachystele widgreni (Rchb. f.) Schltr.

Sin.: *Acraea widgreni* Rchb. f.,
Brachystele atramentaria (Kraenzl.)
Schltr., *Spiranthes atramentaria* Kraenzl.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS).

Brasiliorchis R.B. Singer, S.
Koehler & Carnevali

Brasiliorchis chrysantha (Barb.
Rodr.) R.B. Singer, S. Koehler &
Carnevali

Sin.: *Maxillaria chrysantha* Barb.
Rodr., *Maxillaria chrysantha* Barb. Rodr.
var. *curtifolia* Regnell & Barb. Rodr.,
Maxillaria chrysantha Barb. Rodr. var.
pallidiflora Hoehne, *Maxillaria chrysantha*
Barb. Rodr. var. *typica* Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Brasiliorchis picta (Hook.) R.B.
Singer, S. Koehler & Carnevali

Sin.: *Maxillaria picta* Hook., *Maxillaria*
rupestris Barb. Rodr., *Epidendrum*
uniflorum Vell., *Maxillaria leucocheila*
Hoffm., *Maxillaria kreysigii* Kuntze ex
Rchb. f., *Maxillaria monoceros* Rchb. f.,
Maxillaria picta Hook. var. *brunnea* Rchb.
f., *Maxillaria picta* Hook. var. *rupestris*
(Barb. Rodr.) Cogn., *Maxillaria rupestris*
Barb. Rodr. var. *brevis* Hoehne & Schltr.,
Maxillaria rupestris Barb. Rodr. var.
minor Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA).

Brassavola R. Br., nom. cons.

Brassavola cebolleta Rchb. f.

Sin.: *Brassavola chacoensis* Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(GUA, ÑEE).

Brassavola tuberculata Hook.

Sin.: *Brassavola fragans* Barb. Rodr.,
Brassavola perrinii Lindl. var. *pluriflora*
Hauman, *Brassavola revoluta* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN,
GUA, ÑEE, SPE).

Buchtienia Schltr.

Buchtienia boliviensis Schltr.

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(APY).

Bulbophyllum Thouars

Bulbophyllum atropurpureum Barb.
Rodr.

Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

- Bulbophyllum chloroglossum** Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).
- Bulbophyllum dusenii** Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum epiphytum** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum gladiatum** Lindl.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Bulbophyllum glutinosum** (Barb. Rodr.) Cogn.
Sin.: *Didactyle glutinosa* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bulbophyllum granulosum** Barb. Rodr.
Sin.: *Didactyle granulosa* (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Bulbophyllum laciniatum** (Barb. Rodr.) Cogn. var. **janeirensis** Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Bulbophyllum laciniatum** (Barb. Rodr.) Cogn. var. **laciniatum**
Sin.: *Didactyle laciniata* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum luederwaldtii** Hoehne & Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Bulbophyllum malachadenia** Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 100-900 m.
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum mentosum** Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).
- Bulbophyllum meridense** Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).
- Bulbophyllum micranthum** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum napelli** Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bulbophyllum paranaense** Schltr.
Sin.: *Bulbophyllum paranaense* Schltr.
var. *pauloense* Hoehne & Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 800 m.
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum perii** Schltr.
Sin.: *Bulbophyllum proencai* Leite
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum plumosum** (Barb. Rodr.) Cogn.
Sin.: *Didactyle plumosum* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum punctatum** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Bulbophyllum regnellii** Rchb. f.
Sin.: *Bulbophyllum napelloides* Kraenzl.,
Bulbophyllum sturmhoefelii Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 700-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Bulbophyllum rupicolum** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(CAN).
- Bulbophyllum teresense** Ruschi
Hierba epífita. Nativa. 200-900 m.
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum tessenianum** Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 200-900 m.
Países: BRA(PAR).
- Bulbophyllum tripetalum** Lindl.
Sin.: *Bulbophyllum jaguariahyaevae*
Kraenzl., *Bulbophyllum rojasii* L.O. Williams
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CAU).
- Bulbophyllum warmingianum** Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(SCA).
- Bulbophyllum x guartelae** Mancinelli & E.C. Smidt
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Campylocentrum** Benth.
- Campylocentrum brachycarpum** Cogn.
Sin.: *Campylocentrum aromaticum*
Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(RGS).
- Campylocentrum crassirhizum** Hoehne
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Campylocentrum densiflorum** Cogn.
Sin.: *Campylocentrum dutraei* Schltr.,
Campylocentrum hasslerianum Hoehne,
Campylocentrum hatschbachii Schltr.,
Campylocentrum rhomboglossum
Hoehne & Schltr., *Campylocentrum trachycarpum* Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA, PAI). URY(TYT).
- Campylocentrum grisebachii** Cogn.
Sin.: *Aeranthus filiformis* Griseb.,
Campylocentrum burchellii Cogn.,
Campylocentrum filiformis (Griseb.)
Cogn. ex Griseb.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).
- Campylocentrum hirtellum** Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(SCA).
- Campylocentrum iglesiasii** Brade
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Campylocentrum insulare** C.E. Siqueira & E. Pessoa
Hierba epífita. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(SCA).
- Campylocentrum kuntzei** Cogn. ex Kuntze
Hierba epífita. Nativa. 200-700 m.
Países: PRY(GUA).
- Campylocentrum lansbergii** (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Angraecum lansbergii* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Campylocentrum micranthum

(Lindl.) Rolfe

Sin.: *Angraecum micranthum* Lindl.
 Hierba epífita. Nativa. 200-500 m.
 Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

Campylocentrum neglectum (Rchb. f. & Warm.) Cogn.

Sin.: *Aeranthus neglectum* Rchb. f. & Warm., *Campylocentrum acutilobum* Cogn., *Campylocentrum neglectum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn. var. *angustifolium* Cogn.
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Campylocentrum organensis (Rchb. f.) Rolfe

Sin.: *Aeranthus organensis* Rchb. f.
 Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Campylocentrum ornithorrhynchum (Lindl.) Rolfe

Sin.: *Angraecum ornithorrhynchus* Lindl.
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(MIE).

Campylocentrum parahybunense (Barb. Rodr.) Rolfe

Sin.: *Aeranthus parahybunensis* Barb. Rodr., *Campylocentrum parahybunense* (Barb. Rodr.) Rolfe var. *gracilis* Cogn.
 Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Campylocentrum pauloense Hoehne & Schltr.

Sin.: *Campylocentrum linearifolium* Schltr. ex Mansf.
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Campylocentrum poeppigii (Rchb. f.) Rolfe

Sin.: *Angraecum poeppigii* Rchb. f.
 Hierba epífita. Nativa. 700-900 m.
 Países: BRA(SCA).

Campylocentrum robustum Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
 Países: BRA(PAR).

Campylocentrum schlechterianum

E. Pessoa & M.V. Alves
 Hierba epífita. Endémica. 500-700 m.
 Países: BRA(SCA).

Campylocentrum sellowii (Rchb. f.) Rolfe

Sin.: *Angraecum sellowii* Rchb. f.
 Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Campylocentrum spannagelii

Hoehne ex Hoehne
 Sin.: *Campylocentrum spannagelii*
 Hoehne, nom. nud.
 Hierba epífita. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Campylocentrum ulaei Cogn.

Sin.: *Campylocentrum gracile* Cogn.
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Capanemia Barb. Rodr.**Capanemia adelaidae** Brade

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Capanemia brachycion (Griseb.) Schltr.

Sin.: *Sigmatostalyx brachycion* Griseb.
 Hierba epífita. Endémica. 300-1200 m.
 Países: ARG(JUJ).

Capanemia gehrtii Hoehne

Sin.: *Capanemia ensata* Pabst
 Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Capanemia micromera Barb. Rodr.

Sin.: *Capanemia angustilabia* Schltr., *Capanemia australis* (Kraenzl.) Schltr., *Capanemia riograndensis* Pabst, *Capanemia spathuliglossa* Pabst, *Quekettia australis* Kraenzl., *Quekettia micromera* (Barb. Rodr.) Cogn., *Quekettia microscopica* Lindl. var. *naboulettiana* Hauman

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAA, GUA, PHA, SPE). URY(TAC, TYT).

Capanemia paranaensis Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR).

Capanemia superflua (Rchb. f.) Garay var. **rosea** Izag.

Hierba epífita. Endémica.
 Países: URY(CLA).

Capanemia superflua (Rchb. f.) Garay var. **superflua**

Sin.: *Capanemia juergensiana* (Kraenzl.) Schltr., *Capanemia uliginosa* Barb. Rodr., *Oncidium superfluum* Rchb. f., *Rodriguezia anomala* Rolfe, *Rodriguezia juergensiana* Kraenzl., *Rodriguezia uliginosa* (Barb. Rodr.) Cogn.
 Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

Capanemia thereziae Barb. Rodr.

Sin.: *Capanemia duseniana* (Kraenzl.) Brade, *Capanemia hatschbachii* Schltr., *Quekettia duseniana* Kraenzl., *Quekettia thereziae* (Barb. Rodr.) Cogn.
 Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Catasetum Rich. ex Kunth**Catasetum atratum** Lindl.

Sin.: *Catasetum mentosum* Lem.
 Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Catasetum cernuum (Lindl.) Rchb. f. var. **cernuum**

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
 Países: BRA(SCA).

Catasetum cernuum (Lindl.) Rchb. f. var. **rodigasianum** (Rolfe) Mansf.

Sin.: *Catasetum rodigasianum* Rolfe
 Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
 Países: BRA(SCA).

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton subsp. **fimbriatum**

Sin.: *Myanthus fimbriatum* C. Morren
 Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, PHA, SPE).

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton subsp. **fissum** Rchb. f.

Sin.: *Catasetum fimbriatum* (C. Morren) Lindl. & Paxton var. *subtropicale* Hauman
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA). BRA(PAR).
 PRY(GUA).

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton var. **micranthum** Mansf.

Nativa. 0-100 m.
 Países: BRA(PAR).

Catasetum fimbriatum (C. Morren)
Lindl. & Paxton var. **morrenianum** Mansf.
Sin.: *Catasetum pflanzii* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, SPE).

Catasetum fimbriatum (C.
Morren) Lindl. & Paxton var.
ornytorrhynchum (Porsch) Mansf.
Sin.: *Catasetum ornytorrhynchum* Porsch
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Catasetum micranthum Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Catasetum rohrii Pabst
Hierba epífita. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(SCA).

Catasetum triodon Rchb. f. var.
guttulatum Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Catasetum triodon Rchb. f. var.
triodon
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Catasetum trulla Lindl.
Sin.: *Catasetum socco* (Vell.) Hoehne
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cattleya Lindl.

Cattleya cernua (Lindl.) C. Berg
Sin.: *Epidendrum humile* Vell.,
Sophronia cernua (Lindl.) Lindl.,
Sophronitis cernua Lindl., *Sophronitis*
hoffmannseggii Rchb. f., *Sophronitis*
isopetala Hoffm., *Sophronitis modesta*
Lindl., *Sophronitis nutans* Hoffm.,
Sophronitis pterocarpa Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(COA).

Cattleya coccinea Lindl.
Sin.: *Hadrolaelia coccinea* (Lindl.) Chiron
& V.P. Castro, *Sophronitis coccinea* (Lindl.)
Rchb. f., *Sophronitis grandiflora* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Cattleya forbesii Lindl.
Sin.: *Cattleya pauper* (Vell.) Stellfeld,
Epidendrum forbesii Rchb. f., *Epidendrum*
pauper Vell.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cattleya guttata Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Cattleya intermedia Graham
Sin.: *Cattleya intermedia* Graham var.
macrochila Barb. Rodr., *Epidendrum*
intermedium Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cattleya loddigesii Lindl.
Sin.: *Epidendrum loddigesii* Rchb. f.,
Epidendrum violaceum Lodd.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Cattleya lundii (Rchb.f. & Warm.)Van
den Berg
Sin.: *Laelia lundii* Rchb. f. & Warm.
ex Rchb. f., *Laelia regnelli* Barb. Rodr.,
Laelia reichenbachiana H. Wendl. &
Kraenzl., *Microlaelia lundii* (Rchb. f. &
Warm. ex Rchb. f.) Chiron & V.P. Castro,
Sophronitis lundii (Rchb. f. & Warm. ex
Rchb. f.) C. Berg & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).
PRY(APA, GUA).

Cattleya porphyroglossa L. Linden &
Rchb. f.
Sin.: *Epidendrum porphyroglossum* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cattleya purpurata (Lindl. & Paxton)
Van den Berg
Sin.: *Brasilaelia purpurata* (Lindl. &
Paxton) Campacci, *Hadrolaelia purpurata*
(Lindl. & Paxton) Chiron & V.P. Castro,
Laelia purpurata Lindl. & Paxton,
Sophronitis purpurata (Lindl. & Paxton)
C. Berg & M.W. Chase
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Cattleya tigrina A. Rich.
Sin.: *Cattleya guttata* Lindl. var.
leopardina Linden, *Cattleya guttata*
Lindl. var. *russelliana* Hook., *Cattleya*
leopoldii Verschaff. ex Lem., *Cattleya*
leopoldii Verschaff. ex Lem. var.
leopardina (L. Linden & Rodigas) Fowlie
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Chloraea Lindl.

Chloraea alpina Poepp.
Sin.: *Asarca alpina* (Poepp.) Kuntze,
Chloraea cholilensis Kraenzl., *Chloraea*
ferruginea Kraenzl., *Chloraea hookeriana*
Kraenzl., *Chloraea perez-moreau* Garay,
Chloraea xerophila Kraenzl.
Hierba. Endémica. 400-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Chloraea apinnula (Gosewijn) Szlach.
Sin.: *Bipinnula apinnula* Gosewijn,
Ulantha apinnula (Gosewijn) Szlach.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU).

Chloraea barbata Lindl.
Sin.: *Asarca aurea* (Phil.) Kuntze,
Asarca barbata (Lindl.) Kuntze, *Chloraea*
aurea Phil.
Hierba. Endémica. 800-2200 m.
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, MAU,
BIO, ARA, RME).

Chloraea bella Hauman
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).

Chloraea bidentata (Poepp. & Endl.)
M.N. Correa
Sin.: *Asarca bidentata* Poepp. & Endl.,
Chloraea bicallosa Phil.
Hierba. Endémica. 800-2500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Chloraea biserialis Griseb.
Sin.: *Chloraea ignea* Kraenzl.
Hierba. Nativa. 800-1200 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Chloraea bletioides Lindl.
Sin.: *Chloraea grandis* Kraenzl.,
Chloraea ulantha Rolfe, *Chloraea*
ulanthoides Lindl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Chloraea boliviana (Rchb. f.) Kraenzl.
Sin.: *Bieneria boliviana* Rchb. f.
Hierba. Nativa. 2100-2200 m.
Países: ARG(TUC).

Chloraea castillonii Hauman
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Chloraea chrysantha Poepp.

Sin.: *Asarca aurantiaca* Lindl., *Asarca chrysantha* (Poepp.) Kuntze, *Asarca crocata* (Phil.) Kuntze, *Asarca speciosa* Lindl., *Chloraea aurantiaca* (Lindl.) Lindl., *Chloraea crocata* Phil., *Chloraea pavoni* Lindl.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Chloraea chrysochlora Phil.

Sin.: *Asarca lechleri* (Lindl. ex Kraenzl.) Kuntze, *Chloraea collicensis* Kraenzl., *Chloraea hemichloris* Kraenzl., *Chloraea lechleri* Lindl. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 800-2800 m.

Países: ARG(CHU, NEU). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

Chloraea cogniauxii Hauman

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUJ).

Chloraea crispa Lindl.

Sin.: *Asarca crispa* (Lindl.) Kuntze, *Asarca cygnea* (Phil.) Kuntze, *Chloraea cygnea* Phil., *Chloraea spectabilis* Phil.

Hierba. Endémica. 800-2800 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

Chloraea cristata Lindl.

Sin.: *Asarca dasypogon* (Phil.) Kuntze, *Asarca pogonata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea dasypogon* Phil., *Chloraea pogonata* Phil.

Hierba. Endémica. 1200-2800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, LLA).

Chloraea cuneata Lindl.

Sin.: *Asarca cuneata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca obovata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea nervosa* Kraenzl., *Chloraea obovata* Phil.

Hierba. Endémica. 1200-2800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Chloraea curicana Ravenna

Hierba. Endémica.

Países: CHL(MAU).

Chloraea cylindrostachya Poepp.

Sin.: *Asarca cylindrostachya* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea densiflora* Rolfe, *Chloraea leptopetala* Reiche, *Chloraea major* Ravenna, *Chloraea papillosa* Phil., *Correorchis cylindrostachya* (Poepp.) Szlach.

Hierba. Endémica. 300-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Chloraea deflexa Ravenna

Hierba. Endémica. 1000-1200 m.

Países: CHL(COQ).

Chloraea disoides Lindl.

Sin.: *Asarca disoides* (Lindl.) Kuntze, *Chileorchis disoides* (Lindl.) Szlach., *Chloraea disoides* Lindl. var. *picta* (Phil. ex Kraenzl.) M.N. Correa, *Chloraea macrostachya* Kraenzl., *Chloraea picta* Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 200-500 m.

Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Chloraea elegans M.N. Correa

Hierba. Endémica. 800-1200 m.

Países: ARG(SAL).

Chloraea galeata Lindl.

Sin.: *Asarca alaris* (Lindl.) Lindl., *Asarca besserii* (Rchb. f.) Kuntze, *Asarca maculosa* Poepp., *Asarca parviflora* Poepp., *Asarca rypaloglossa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca secunda* (Phil.) Kuntze, *Asarca suaveolens* (Phil.) Kuntze, *Chloraea alaris* Lindl., *Chloraea berteriana* Kraenzl., *Chloraea besserii* Rchb. f., *Chloraea reflexa* Phil., *Chloraea rypaloglossa* A. Rich., *Chloraea secunda* Phil., *Chloraea suaveolens* Phil.

Hierba. Endémica. 1000-1300 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Chloraea gaudichaudii Brongn.

Sin.: *Arethusa lutea* Gaudich., *Asarca fonkii* (Phil.) Kuntze, *Asarca gaudichaudii* (Brongn.) Kuntze, *Asarca inconspicua* (Phil.) Kuntze, *Chloraea falklandica* Kraenzl., *Chloraea fonckii* Phil., *Chloraea inconspicua* Phil.

Hierba. Endémica. 600-900 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Chloraea gavilu Lindl.

Sin.: *Asarca sceptrum* (Rchb. f.) Kuntze, *Asarca virescens* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea lindleyii* Poepp., *Chloraea lotensis* Rolfe, *Chloraea sceptrum* Rchb. f., *Chloraea semitensis* Phil. ex Kraenzl., *Cymbidium luteum* Willd.

Hierba. Endémica. 400-1200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Chloraea grandiflora Poepp.

Sin.: *Asarca grandiflora* (Poepp.) Kuntze, *Ulantha grandiflora* (Poepp.) Szlach.

Hierba. Endémica. 1500-1700 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Chloraea heteroglossa Rchb. f.

Sin.: *Asarca heteroglossa* (Rchb. f.) Kuntze

Hierba. Endémica. 200-300 m.

Países: CHL(VAL).

Chloraea lamellata Lindl.

Sin.: *Asarca lamellata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca pearcei* (Phil.) Kuntze, *Asarca semibarbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea decipiens* Poepp., *Chloraea pearcei* Phil., *Chloraea semibarbata* Lindl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(LBO, BIO, ARA, LRI, LLA).

Chloraea laxiflora Hauman

Hierba. Nativa. 1800-3200 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Chloraea longipetala Lindl.

Sin.: *Asarca affinis* (Lindl.) Kuntze, *Asarca longipetala* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea affinis* Lindl., *Chloraea liliacea* Kraenzl., *Chloraea multilamellata* Kraenzl., *Chloraea panduriformis* Kraenzl., *Chloraea reicheana* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 600-800 m.

Países: CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

Chloraea magellanica Hook. f.

Sin.: *Asarca magellanica* (Hook. f.) Kuntze, *Chloraea bouganvilleana* Franch., *Chloraea histrix* Speg., *Chloraea kraenzliniana* Hoehne, *Chloraea leontoglossa* Kraenzl. & Speg., *Chloraea spegazziniana* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 200-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Chloraea membranacea Lindl.

Sin.: *Chloraea membranacea* Lindl. var. *paranensis* Schltr.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).

Chloraea multiflora Lindl.

Sin.: *Asarca campestris* (Poepp.) Kuntze, *Asarca densa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca multiflora* (Lindl.) Kuntze, *Asarca poeppigiana* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea campestris* Poepp., *Chloraea densa* A. Rich., *Chloraea poeppigiana* A. Rich., *Chloraea pseudocampestris* Kraenzl., *Chloraea stenantha* Kraenzl.

Hierba. Endémica. 800-1800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Chloraea nudilabia Poepp.

Sin.: *Asarca homopetala* (Phil.) Kuntze,
Asarca nudilabia (Poepp.) Kuntze,
Chloraea homopetala Phil., *Chloraea leucojiflora* Kraenzl.
Hierba. Endémica. 800-2800 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Chloraea philippii Rchb. f.

Sin.: *Asarca philippii* (Rchb. f.) Kuntze,
Chloraea lagunae-pactis Kraenzl.,
Chloraea lineata Phil. & Kraenzl.,
Chloraea modesta Kraenzl.
Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

Chloraea phoenicea Speg.

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Chloraea praecincta Speg. & Kraenzl.

Sin.: *Chloraea praecincta* Speg. &
Kraenzl. var. *intermedia* Hauman
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Chloraea prodigiosa Rchb. f.

Sin.: *Asarca calopogon* (Phil.) Kuntze,
Asarca prodigiosa (Rchb. f.) Kuntze,
Chloraea calopogon Phil.
Hierba. Endémica. 1200-1500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, LLA).

Chloraea reticulata Schltr.

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Chloraea riojana A. Sobral & Novoa

Hierba. Endémica.
Países: ARG(LRI).

Chloraea speciosa Poepp.

Sin.: *Asarca gayana* (A. Rich.) Kuntze,
Chloraea gayana A. Rich., *Chloraea speciosa* Poepp. f. *sterilis* Kraenzl.
Hierba. Endémica. 500-800 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(BIO, ARA, LLA).

Chloraea subpandurata Hauman

Hierba. Endémica. 2000-2700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Chloraea tectata Ravenna

Hierba. Endémica. 1800-2000 m.
Países: CHL(COQ).

Chloraea virescens (Willd.) Lindl.

Sin.: *Asarca chlorosticta* (Phil.)
Kuntze, *Asarca fimbriata* (Phil.) Kuntze,
Asarca incisa (Poepp.) Kuntze, *Asarca odontoglossa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca patagonica* (Phil.) Kuntze, *Asarca unguis-cati* (Rchb. f.) Kuntze, *Chloraea chlorosticta* Phil., *Chloraea fimbriata* Phil., nom. illeg., *Chloraea incisa* Poepp., *Chloraea odontoglossa* A. Rich., *Chloraea patagonica* Phil., *Chloraea pigichen* Kuntze, *Chloraea piquichen* Lindl., *Chloraea pleistodactyla* Kraenzl. & Speg., *Chloraea unguis-cati* Rchb. f., *Cymbidium virescens* Willd.
Hierba. Endémica. 1200-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA).

Chloraea viridiflora Poepp.

Sin.: *Asarca viridiflora* (Poepp.)
Kuntze, *Chloraea leontoglossa* Kraenzl.,
hom. illeg., *Chloraea viridiflora* Poepp.
var. *reticulata* Reiche
Hierba. Endémica. 1200-1400 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO).

Chloraea volkmannii Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 2000-2800 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).

Cirrhaea Lindl.**Cirrhaea dependens** Rchb. var.

ornata Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Cirrhaea dependens Rchb. f. var.

dependens
Sin.: *Cirrhaea hoffmannseggii*
Heynh., *Cirrhaea tristis* Lindl.,
Cirrhaea violacea Hoffm., *Cirrhaea viridi-purpurea* (Hook.) Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cirrhaea fuscolutea Lindl.

Sin.: *Cirrhaea sacata* Lindl., *Cirrhaea seidelii* Pabst
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cirrhaea loddigesii Lindl.

Sin.: *Cirrhaea dependens* Rchb. var.
trigina Porsch, *Cirrhaea loddigesii* Lindl.
var. *trigina* Porsch
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cirrhaea longiracemosa Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Cleistis Rich. ex Lindl.**Cleistis aphylla** (Barb. Rodr.) Hoehne

Sin.: *Pogonia aphylla* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR).

Cleistis australis Schltr.

Hierba. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(RGS).

Cleistis exilis Hoehne

Sin.: *Cleistis cipoana* Hoehne
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Cleistis gracilis (Barb. Rodr.) Schltr.

Sin.: *Pogonia gracilis* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Cleistis libonii (Rchb. f.) Schltr.

Sin.: *Cleistis fragrans* (Schltr.) Schltr.,
Cleistis humidicola (Schltr.) Schltr.,
Cleistis macrantha (Barb. Rodr.) Schltr.,
Cleistis magnifica (Schltr.) Schltr.,
Cleistis revoluta (Barb. Rodr.) Schltr. var.
macrantha (Barb. Rodr.) Schltr., *Cleistis vinosa* (Barb. Rodr.) Schltr., *Pogonia fragrans* Schltr., *Pogonia humidicola* Schltr., *Pogonia libonii* Rchb. f., *Pogonia macrantha* Barb. Rodr., *Pogonia magnifica* Schltr., *Pogonia vinosa* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cleistis mantiqueirae Rchb. f. & Warm.

Sin.: *Cleistis itatiaiae* Pabst
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Cleistis montana (Rchb. f.) Gardner

Sin.: *Cleistis brasiliensis* (Barb. Rodr.)
Schltr., *Cleistis quadricallosa* (Barb.
Rodr.) Schltr., *Pogonia brasiliensis* Barb.
Rodr., *Pogonia montana* Rchb. f., *Pogonia quadricallosa* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 700-900 m.
Países: BRA(PAR).

Cleistis moritzii (Rchb. f.) Garay & Dunst.

Sin.: *Cleistis pluriflora* (Barb. Rodr.)
Schltr., *Pogonia pluriflora* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Cleisthes pallida Funez & Pansarin
Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(SCA).

Cleisthes paranaensis (Barb. Rodr.)
Schltr.
Sin.: *Pogonia paranaensis* Barb. Rodr.,
Pogonia paranaensis Barb. Rodr. var.
major Schltr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAN).

Cleisthes ramboi Pabst
Sin.: *Cleisthes uliginosa* Pabst
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Cleisthes rosea Lindl.
Sin.: *Cleisthes castaneoides* Hoehne,
Cleisthes catharinensis (Cogn.) Hoehne,
Pogonia catharinensis Cogn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cleisthes tenuis (Rchb. f. ex Griseb.)
Schltr.
Sin.: *Cleisthes gerthatschbachiana* Hoehne,
Pogonia tenuis Rchb. f. ex Griseb.
Hierba. Nativa. 600-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Codonorchis Lindl.

Codonorchis canisioi Mansf.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl.
Sin.: *Calopogon lessonii* Brongn.,
Codonorchis lessonii (Brongn.)
Lindl. var. *poeppegii* (Lindl.) Reiche,
Codonorchis lessonii (Brongn.)
Lindl. var. *skottsbergii* (Kraenzl.)
Reiche, *Codonorchis poeppegii* Lindl.,
Codonorchis skottsbergii Kraenzl.,
Codonorchis tetraphylla (Poepp.
& Endl.) L.O. Williams, *Pogonia*
tetraphylla Poepp. & Endl.
Hierba. Endémica. 100-600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, MAG).

Cohniella Pfitzer

Cohniella cepula (Hoffmanns.)
Carnevali & G. A. Romero
Sin.: *Cohniella osteniana* (Schltr.)
Christenson, *Oncidium cepula*

Hoffmanns., *Oncidium ostenianum*
Schltr., *Stilifolium ostenianum* (Schltr.)
Königer & Pongratz, *Trichocentrum*
cepula (Hoffmanns.) J.M.H. Shaw,
Trichocentrum ostenianum (Schltr.) M.W.
Chase & N.H. Williams
Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(Fuera
del área del proyecto). PRY(CON, COA,
GUA, SPE).

Cohniella jonesiana (Rchb. f.)
Christenson
Sin.: *Oncidium jonesianum* Rchb.
f., *Oncidium jonesianum* Rchb. f. var.
flavens Rchb. f., *Oncidium jonesianum*
Rchb. f. var. *phaeanthum* Sander,
Stilifolium jonesianum (Rchb. f.) Königer
& Pongratz, *Trichocentrum jonesianum*
(Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA,
GUA, PAI).

Compartmentia Poepp. & Endl.

Compartmentia coccinea Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Constantia Barb. Rodr.

Constantia australis (Cogn.) Porto
& Brade
Sin.: *Sophranitis australis* Cogn.
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(SCA).

Constantia rupestris Barb. Rodr.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Corymborkis Thouars

Corymborkis flava (Sw.) Kuntze
Sin.: *Chloidia decumbens* Lindl.,
Corymborkis decumbens (Lindl.) L.O.
Williams, *Corymbis decumbens* (Lindl.)
Cogn., *Serapias flava* Sw.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAA).

Cranichis Sw.

Cranichis candida (Barb. Rodr.) Cogn.
Sin.: *Cranichis micrantha* Griseb., hom.
illeg., *Cranichis parviflora* L.O. Williams,

Cyrtochilum candidum Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Cranichis castellanosi L.O. Williams
Hierba. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Cranichis ciliata (Kunth) Kunth
Sin.: *Aa mandoni* (Rchb. f.) Schltr., *Cranichis*
mandonii Schltr., *Ophrys ciliata* Kunth
Hierba. Nativa. 1700 m.
Países: ARG(JUJ).

Cranichis hassleri Cogn.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Cranichis muscosa Sw.
Sin.: *Cranichis bradei* Schltr.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Cyanaeorchis Barb. Rodr.

Cyanaeorchis arundinae (Rchb. f.)
Barb. Rodr.
Sin.: *Eulophia arundinae* Rchb. f.
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, MIE).

Cyanaeorchis minor Schltr.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyclopogon C. Presl

Cyclopogon alexandrae (Kraenzl.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes alexandrae* Kraenzl.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Cyclopogon apricus (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Beadlea aprica* (Lindl.) Garay,
Beadlea diversifolia (Cogn.) Garay,
Cyclopogon diversifolius (Cogn.) Schltr.,
Cyclopogon paludosus (Cogn.) Schltr.,
Cyclopogon platyunguis Schltr., *Spiranthes*
amblysepala Kraenzl., *Spiranthes aprica*
Lindl., *Spiranthes diversifolia* Cogn.,
Spiranthes paludosa Cogn.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS,
CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, RIV,
ROC, TAC, TYT).

- Cyclopogon argyriifolius** Barb. Rodr.
Sin.: *Beadlea argyriifolia* (Barb. Rodr.) Garay
Hierba. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Cyclopogon bicolor** (Ker Gawl.) Schltr.
Sin.: *Beadlea bicolor* (Ker Gawl.) Garay, *Cyclopogon bicolor* (Ker Gawl.) Schltr. var. *minor* Hoehne, *Neottia bicolor* Ker Gawl.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(FLA).
- Cyclopogon calophyllus** (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Sin.: *Beadlea calophylla* (Barb. Rodr.) Garay, *Spiranthes calophylla* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).
- Cyclopogon congestus** (Vell.) Hoehne
Sin.: *Beadlea congesta* (Vell.) Garay, *Cyclopogon alpestris* (Barb. Rodr.) Schltr., *Cyclopogon langei* Schltr., *Serapias congesta* Vell., *Spiranthes alpestris* Barb. Rodr. var. *bidentata* Barb. Rodr., *Spiranthes alpestris* Barb. Rodr.
Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(LAV, MAL, ROC).
- Cyclopogon deminkiorum** Burns-Bal. & M.S.Foster
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
Países: PRY(ITA).
- Cyclopogon dusenii** Schltr.
Sin.: *Beadlea dusenii* (Schltr.) Garay
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Cyclopogon dutraei** Schltr.
Sin.: *Beadlea dutraei* (Schltr.) Garay
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). URY(COL, LAV, MAL, SJO).
- Cyclopogon elatus** (Sw.) Schltr.
Sin.: *Beadlea elata* (Sw.) Small, *Cyclopogon elatus* (Sw.) Schltr. var. *ovatus* (Cogn.) Hoehne, *Satyrium elatum* Sw., *Spiranthes elata* (Sw.) Rich. var. *ovata* Cogn., *Spiranthes elata* (Sw.) Rich.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, SPE). URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
- Cyclopogon elegans** Hoehne
Sin.: *Beadlea elegans* (Hoehne) Garay
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS).
- Cyclopogon graciliscapus** Schltr.
Sin.: *Beadlea graciliscapa* (Schltr.) Garay
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Cyclopogon hatschbachii** Schltr.
Sin.: *Beadlea hatschbachii* (Schltr.) Garay
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Cyclopogon iguapensis** Schltr.
Sin.: *Beadlea iguapensis* (Schltr.) Garay
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Cyclopogon itatiaiensis** (Kraenzl.) Hoehne
Sin.: *Beadlea itatiaiensis* (Kraenzl.) Garay, *Spiranthes itatiaiensis* Kraenzl.
Hierba. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Cyclopogon longibracteatus** (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Beadlea longibracteata* Barb. Rodr., *Spiranthes longibracteata* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos rodriguesii* Cogn.
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Cyclopogon multiflorus** Schltr.
Sin.: *Beadlea multiflora* (Schltr.) Garay
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Cyclopogon oliganthus** (Hoehne) Hoehne & Schltr.
Sin.: *Beadlea oligantha* (Hoehne) Garay, *Spiranthes oligantha* Hoehne
Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, MON, RIV, ROC).
- Cyclopogon polyaden** (Vell.) F.S. Rocha & J.L. Waechter
Sin.: *Cyclopogon chloroleucus* (Barb. Rodr.) Schltr., *Serapias polyaden* Vell., *Spiranthes chloroleuca* Barb. Rodr., *Stigmatosema polyaden* (Vell.) Garay
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). URY(ART, RIV, TAC).
- Cyclopogon subalpestris** Schltr.
Sin.: *Beadlea subalpestris* (Schltr.) Garay
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
- Cyclopogon taquaremboensis** (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Beadlea taquaremboensis* (Barb. Rodr.) Garay, *Stenorrhynchos taquaremboense* Barb. Rodr.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: URY(LAV).
- Cyclopogon trifasciatus** Schltr.
Sin.: *Beadlea trifasciata* (Schltr.) Garay
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Cyclopogon variegatus** Barb. Rodr.
Sin.: *Beadlea variegata* (Barb. Rodr.) Garay, *Cyclopogon bradei* Schltr., *Spiranthes variegata* (Barb. Rodr.) Cogn.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
- Cyclopogon vittatus** Dutra ex Pabst
Sin.: *Beadlea vittata* (Dutra ex Pabst) Garay
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Cyclopogon warmingii** (Rchb. f.) Schltr.
Sin.: *Beadlea warmingii* (Rchb. f.) Schltr., *Spiranthes warmingii* Rchb. f.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Cyrtopodium** R. Br.
- Cyrtopodium andersonii** (Lam. ex Andrews) R. Br.
Sin.: *Cymbidium andersonii* Lam. ex Andrews
Hierba epífita. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Cyrtopodium brandonianum** Barb. Rodr. subsp. **brandonianum**
Sin.: *Cyrtopodium purpureum* Rchb. f. & Warm.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA). URY(RIV).

Cyrtopodium brandonianum Barb.
Rodr. subsp. **lageanum** J.A.N. Bat. &
Bianchetti
Hierba terrestre. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Cyrtopodium dusenii Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Cyrtopodium eugenii Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Cyrtopodium flavum Link & Otto ex Rchb.
Sin.: *Epidendrum polyphyllum* Vell.,
Cyrtopodium paranaense Schltr.,
Cyrtopodium polyphyllum (Vell.) Pabst ex
F. Barros
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyrtopodium gigas (Vell.) Hoehne
Sin.: *Epidendrum gigas* Vell.
Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cyrtopodium hatschbachii Pabst
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera
del área del proyecto). PRY(CAU).

Cyrtopodium kleinii J.A.N. Bat. &
Bianchetti
Hierba terrestre. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cyrtopodium pallidum Rchb. f. &
Warm.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Cyrtopodium palmifrons Rchb. f. &
Warm.
Sin.: *Cyrtopodium palmifrons* Rchb. f.
var. *longifolia* Rchb. f.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA).

Cyrtopodium paludicolum Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Cyrtopodium paniculatum (Ruiz &
Pav.) Garay
Sin.: *Maxillaria paniculata* Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. 1100-1400 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Cyrtopodium parviflorum Lindl.
Sin.: *Cyrtopodium falcilobium* Hoehne
& Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Cyrtopodium pflanzii Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG (CAT, CHA, FOR, JUJ,
SAL, TUC). BRA (PAR). PRY (APY, CEN,
CON, PHA).

Cyrtopodium saintlegerianum Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del
proyecto). PRY (Desconocida).

Cyrtopodium virescens Rchb. f. & Warm.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, COA, GUA, PAI).

Cyrtopodium witeckii L.C. Menezes
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Dichaea Lindl.

Dichaea anchorifera Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dichaea australis Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dichaea brevicaulis Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Dichaea bryophyla Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Dichaea cogniauxiana Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dichaea pendula (Aubl.) Cogn.
Sin.: *Limodorum pendulum* Aubl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dichaea trulla Rchb. f.
Sin.: *Dichaea coriacea* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dryadella Luer

Dryadella aviceps (Rchb. f.) Luer
Sin.: *Dryadella obrieniana* (Rolfe) Luer,
Masdevallia aviceps Rchb. f., *Masdevallia
obrieniana* Rolfe, *Pleurothallis aviceps*
(Rchb. f.) Rchb. f.,
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dryadella edwallii (Cogn.) Luer
Sin.: *Masdevallia edwalii* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dryadella liliputiana (Cogn.) Luer
Sin.: *Dryadella paranaensis* (Schltr.)
Luer, *Masdevallia liliputana* Cogn.,
Masdevallia paranaensis Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dryadella zebrina (Porsch) Luer
Sin.: *Masdevallia zebrina* Porsch
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elleanthus C. Presl

Elleanthus brasiliensis Rchb. f.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Elleanthus linifolius C. Presl
Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(PAR).

Eltroplectris Raf.

Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay &
Sweet
Sin.: *Notylia calcarata* Sw., *Pelexia
setacea* Lindl.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA (SCA). PRY(COA, PAI).

Eltroplectris schlechteriana (Porto
& Brade) Pabst
Sin.: *Centrogenium schlechterianum*
Porto & Brade
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA).

Eltroplectris travassosii (Rolfe) Garay
Sin.: *Pelexia travassosii* Rolfe
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst

Sin.: *Centrogenium trilobum* (Lindl.) Schltr., *Pelexia triloba* Lindl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, TUC).
BRA(RGS). PRY(COA, PAI).

Encyclia Hook.**Encyclia argentinensis** (R. Speg.)

Hoehne

Sin.: *Encyclia burlemarxii* Pabst,
Encyclia piracanjubensis L.C. Menezes,
Encyclia saltensis Hoehne, *Epidendrum argentinense* R. Speg.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR).

Encyclia linearifolioides (Kraenzl.)

Hoehne

Sin.: *Epidendrum linearifolioides* Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR). PRY(SPE).

Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Encyclia cardini* Pabst,
Epidendrum longifolium Barb. Rodr.,
Epidendrum oncidioides Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(PHA).

Encyclia osmantha (Barb. Rodr.) Schltr.

Sin.: *Epidendrum osmanthum* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Encyclia patens Hook. var. **patens**

Sin.: *Encyclia flava* (Lindl.) M.L. Porto
& Brade, *Encyclia odoratissima* (Lindl.)
Schltr., *Epidendrum flavum* Lindl.,
Epidendrum odoratissimum Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Encyclia patens Hook. var.

serroniana (Barb. Rodr.) Romanini &
F. Barros

Sin.: *Encyclia serroniana* (Barb.
Rodr.) Hoehne, *Epidendrum serronianum* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Encyclia pauciflora (Barb. Rodr.) Porto

Sin.: *Encyclia dutrae* Pabst, *Epidendrum dutrae* (Pabst) Hawkes, *Epidendrum pauciflorum* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Epidendrum L., nom. cons.**Epidendrum anceps** Jacq.

Sin.: *Epidendrum viridipurpureum*
Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum andres-johnsonii

Hágsater & E. Santiago

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Epidendrum armeniacum Lindl.

Sin.: *Amblostoma armeniacum* (Lindl.)
Brieger ex Pabst

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum avicula Lindl.

Sin.: *Lanium avicula* (Lindl.) Benth.,
Lanium berkeleyi Rolfe

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum bermejoense Muruaga

& Parrado

Hierba rupícola o epífita. Nativa. 500-
1300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Epidendrum caldense Barb. Rodr.

Sin.: *Epidendrum hatschbachii* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum coronatum Ruiz & Pav.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Epidendrum crassinervium Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 600-1100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Epidendrum cristatum Ruiz & Pav.

Sin.: *Epidendrum alexandrii* Schltr.,
Epidendrum calliferum Lem., *Epidendrum longovarium* Barb. Rodr., *Epidendrum raniferum* Lindl. var. *loefgrenii* Cogn.,
Epidendrum raniferum Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum dendrobioides Thunb.

Sin.: *Epidendrum aquaticum* Lindl.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa.
0-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Epidendrum densiflorum Hook.

Sin.: *Epidendrum brachythyrus*
Kraenzl., *Epidendrum floribundum* Kunth
Hierba epífita. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Epidendrum fulgens Brongn.

Sin.: *Epidendrum moseni* Rchb. f.,
Epidendrum planiceps Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum geniculatum Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Epidendrum hassleri Cogn.

Sin.: *Epidendrum noackii* Cogn.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa.
0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, APA).

Epidendrum henschenii Barb. Rodr.

Sin.: *Epidendrum brevicolle* Kraenzl.
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum latilabre Lindl.

Sin.: *Epidendrum arachnoideum* Barb.
Rodr., *Epidendrum raddiatum* Hoffm.,
Neolehmannia latilabris (Lindl.) Pabst
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum loefgrenii Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(PAR).

Epidendrum nocturnum Jacq.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Epidendrum obergii Hawkes

Hierba epífita. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Epidendrum parahybunense Barb. Rodr.

Sin.: *Epidendrum corymbosum* Lindl.,
hom. illeg., *Epidendrum ecostatum* Pabst
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Epidendrum paranaense Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Epidendrum proligerum Barb. Rodr.

Sin.: *Epidendrum burgeri* Schltr.,
Epidendrum ochrochlorum Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 100-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum pseudavicula Kraenzl.
Hierba epífita. Endémica. 500-900 m.
Países: BRA(PAR).

Epidendrum pseudodiforme Hoehne & Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum puniceoluteum F. Pinheiro & F. Barros
Hierba terrestre. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum purpureum Barb. Rodr.
Sin.: *Epidendrum denticulatum* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum ramosum Jacq.
Sin.: *Epidendrum pedale* Schltr.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum rigidum Jacq.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUU, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum rojasii Cogn.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Epidendrum samaipatense Dodson & R. Vásquez
Hierba epífita. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Epidendrum saxatile Lindl.
Sin.: *Epidendrum weddellii* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto).PRY(APA, CAN).

Epidendrum saximontanum Pabst
Hierba epífita. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Epidendrum secundum Jacq. f. **albescens** (Pabst) F. Barros
Sin.: *Epidendrum crassifolium* Lindl. var. *albescens* Pabst, *Epidendrum secundum* Jacq. var. *albescens* (Pabst) F. Barros
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Epidendrum secundum Jacq. f. **secundum**
Sin.: *Epidendrum ansiferum* Rchb. f., *Epidendrum ellipticum* Graham ex Hook., *Epidendrum elongatum* Jacq., *Epidendrum versicolor*
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Epidendrum strobiliferum Rchb. f.
Sin.: *Epidendrum rodriguesii* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum tridactylum Lindl.
Sin.: *Amblostoma dusenii* Kraenzl., *Amblostoma cernuum* Scheidw., *Amblostoma tridactylum* (Lindl.) Rchb. f., *Amblostoma tridactylum* (Lindl.) Rchb. f. var. *dusenii* (Kraenzl.) Garay, *Amblostoma tridactylum* (Lindl.) Rchb. f. var. *pallidum* (Knowles & Westc.) Garay, *Epidendrum amblostoma* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epidendrum vesicatum Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Epistephium Kunth

Epistephium lucidum Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Epistephium sclerophyllum Lindl.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAA).

Eulophia R. Br., nom. cons.

Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle
Sin.: *Cyrtoperia longiflora* Rchb. f., *Cyrtoperia vellosiana* Barb. Rodr., *Dendrobium longifolium* Kunth, *Eulophia longifolia* Schltr. var. *flavescens* Schltr., *Eulophia longifolia* Schltr., *Eulophia woodfordii* Rolfe, *Limodorum altum* L.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, PAI).

Eurystyles Wawra

Eurystyles actinosophila (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes actinosophila* Barb. Rodr., *Stenoptera actinosophila* (Barb. Rodr.) Cogn., *Synanthes bertonii* Burns-Bal., H. Rob. & M.S.Foster, *Trachelosiphon actinosophila* (Barb. Rodr.) Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Eurystyles cogniauxii (Kraenzl.) Pabst
Sin.: *Pseudoeurystyles cogniauxii* (Kraenzl.) Hoehne, *Pseudoeurystyles gardneri* (Lindl.) Hoehne, *Spiranthes gardneri* Lindl., *Stenorrhynchos cogniauxii* Kraenzl., *Trachelosiphon cogniauxii* (Kraenzl.) Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eurystyles cotyledon Wawra
Sin.: *Eurystyles paranaensis* (Schltr.) Schltr., *Stenoptera ananassocomos* Rchb. f., *Trachelosiphon paranense* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eurystyles lorenzii (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Pseudoeurystyles lorenzii* (Cogn.) Hoehne, *Stenoptera lorenzii* Cogn., *Trachelosiphon lorenzii* (Cogn.) Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Galeandra Lindl.

Galeandra beyrichii Rchb. f.
Sin.: *Galeandra hysterantha* Barb. Rodr.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, PAI, SPE). URY(ART, RIV).

Galeandra junceoides Barb. Rodr.
Hierba terrestre. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CON).

Galeandra paraguayensis Cogn.
Sin.: *Galeandra paranaensis* Schltr.
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Galeandra stylomisantha (Vell.) Hoehne
Sin.: *Galeandra juncea* Lindl., *Orchis stylomisantha* Vell.
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, ÑEE, PHA).

Galeandra xerophila Hoehne

Hierba terrestre. Nativa. 300-500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Gavilea Poepp.**Gavilea araucana** (Phil.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca araucana* Phil., *Asarca araucana* Phil. var. *incisa* Hauman, *Gavilea araucana* (Phil.) M.N. Correa var. *incisa* Hauman

Hierba terrestre. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Gavilea australis (Skotts.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca australis* Skotts., *Asarca enigmatica* Hauman

Hierba terrestre. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Gavilea cardioglossa (Reiche) Martic.

Sin.: *Asarca cardioglossa* Reiche, *Gavilea cardioglossa* (Reiche) M.N. Correa, comb. illeg.

Hierba terrestre. Endémica. 500-1200 m.
Países: CHL(ARA, LRI, LLA).

Gavilea chica (Speg. & Kraenzl.)

Chemisquy

Sin.: *Chloraea chica* Speg. & Kraenzl., *Chloraea kruegeri* F. Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Gavilea gladysiae Chemisquy

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Gavilea glandulifera (Poepp.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca appendiculata* Phil. ex Kraenzl., *Asarca glandulifera* Poepp., *Chloraea albo-rosea* Kraenzl. & Speg., *Chloraea volucris* Lindl., *Gavilea auriculata* Ravenna

Hierba terrestre. Endémica. 800-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Gavilea insularis M.N. Correa

Hierba terrestre. Endémica. 500-1500 m.
Países: CHL(JFE).

Gavilea kingii (Hook. f.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca kingii* Hook. f.

Hierba terrestre. Endémica. 500-1500 m.
Países: CHL(LLA, MAG).

Gavilea litoralis (Phil.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca littoralis* (Phil.) Reiche, *Asarca macroptera* Kraenzl., *Chloraea litoralis* Phil., *Gavilea macroptera* (Kraenzl.) M.N. Correa

Hierba terrestre. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Gavilea longibracteata (Lindl.) Sparre ex L.E. Navas

Sin.: *Asarca berterii* Rchb. f., *Asarca longibracteata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca longibracteata* (Lindl.) Skotts., comb. illeg., *Asarca sinuata* Lindl., nom. illeg., *Asarca spectabilis* Phil., *Asarca verrucosa* A. Rich., *Chloraea longibracteata* Lindl.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Gavilea lutea (Pers.) M.N. Correa

Sin.: *Asarca acutiflora* Poepp. & Endl., *Asarca brachychila* Phil., *Asarca commersonii* (Brongn.) Hook., *Asarca lutea* (Pers.) Skotts., *Asarca tenuiflora* Rolfe, *Asarca thermanun* Phil. & Kraenzl., *Chloraea commersonii* Brongn., *Serapias lutea* Pers.

Hierba terrestre. Endémica. 500-1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Gavilea odoratissima Poepp.

Sin.: *Asarca chrysostachya* Phil., *Asarca odoratissima* (Poepp.) Poepp. & Endl., *Asarca sulphurea* Phil., *Asarca ventanae* Hauman, *Chloraea odoratissima* (Poepp.) Macloskie

Hierba terrestre. Endémica. 100-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Gavilea platyantha (Rchb. f.) Ormd.

Sin.: *Asarca glandulifera* Poepp. var. *illapelina* Reiche, *Asarca platyantha* Rchb. f., *Gavilea glandulifera* (Poepp.) M.N. Correa var. *illapelina* (Reiche) Novoa, J. Espejo, Cisternas, M. Rubi6 & Erwin Domínguez

Hierba terrestre. Endémica. 900-1300 m.
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA, RME).

Gavilea supralabellata M.N. Correa

Hierba terrestre. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Gavilea trullata Ormd.

Sin.: *Asarca cardioglossa* Reiche var. *patagonica* Garay, *Gavilea cardioglossa* (Reiche) M.N. Correa var. *patagonica* (Garay) M.N. Correa

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Gavilea venosa (Lam.) Garay & Ormd.

Sin.: *Asarca feuilleana* Kraenzl., *Asarca leucantha* (Poepp.) Poepp. & Endl., comb. illeg., *Gavilea feuilleana* (Kraenzl.) Lehnebach, *Gavilea leucantha* Poepp., nom. illeg., *Limodorum venosum* Lam.

Hierba terrestre. Endémica. 1200-2500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, LRI, LLA, RME).

Gavilea wittei (Hicken) Ormd.

Sin.: *Asarca patagonica* Skotts., hom. illeg., *Chloraea wittei* Hicken, *Gavilea patagonica* (Skotts.) M.N. Correa, comb. illeg.

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR). CHL(AIS, MAG).

Gomesa R. Br.**Gomesa albinoi** (Schltr.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium albinoi* Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa barbaciae (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium barbaciae* Lindl., *Oncidium montanum* Barb. Rodr., *Oncidium uliginosum* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa barbata (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Alatiglossum barbatum* (Lindl.) D.H. Baptista, *Oncidium barbatum* Lindl., *Oncidium microglossum* Klotzsch

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). URY(CLA).

Gomesa bifolia (Sims) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium bifolium* Sims, *Oncidium bifolium* Sims var. *majus* Hort

Hierba epífita. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).
URY(ART, CLA, COL, CLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SJO, TAC, TYT).

Gomesa ciliata (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Alatiglossum ciliatum* (Lindl.) D.H. Baptista, *Alatiglossum micropogon* (Rchb. f.) D.H. Baptista, *Oncidium ciliatum* Lindl., *Oncidium micropogon* Rchb. f., *Oncidium reisi* Hoehne & Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa cogniauxiana (Schltr.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium cogniauxianum* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa concolor (Hook.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium concolor* Hook., *Oncidium concolor* Hook. var. *ottonis* (Schltr.) Pabst, *Oncidium ottonis* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa cornigera (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium chrysorapis* Rchb. f., *Oncidium cornigerum* Lindl., *Oncidium cruciatum* Rchb. f., *Oncidium fimbriatum* Lindl., *Oncidium godseffianum* Kraenzl., *Oncidium hecatanthum* Kraenzl., *Oncidium pubes* Lindl. var. *flavescens* Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, GUA, PAI, SPE).

Gomesa crispa (Lindl.) Klotzsch ex Rchb. f.

Sin.: *Rodriguezia crispa* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY).

Gomesa curta (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium curtum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 500-700 m.
Países: BRA(PAR).

Gomesa discifera (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium disciferum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 1000-1100 m.
Países: ARG(TUC).

Gomesa divaricata Hoffmanns. ex Schltr.

Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa doniana (Bateman ex Baxter) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium donianum* Bateman ex Baxter, *Oncidium mixtum* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa duseniana Kraenzl.

Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa eleutherosepala (Barb.

Rodr.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Rodriguezia eleutherosepala* Barb. Rodr., *Rodriguezopsis eleutherosepala* (Barb. Rodr.) Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa fischeri Regel

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa flexuosa (Sims) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium flexuosum* Sims, *Oncidium flexuosum* Sims var. *radiatum* Rchb. f., *Oncidium haematochrysum* Rchb. f., *Oncidium haematoxanthum* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA).

Gomesa foliosa (Hook.) Klotzsch ex Rchb. f.

Sin.: *Pleurothallis foliosa* Hook.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Gomesa fuscans (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium fuscans* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa gardneri (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium elegantissimum* Rchb. f., *Oncidium gardneri* Lindl., *Oncidium gardnerianum* Hort
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Gomesa glaziovii Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa gomezoides (Barb. Rodr.) Pabst

Sin.: *Gomesa theodorea* (Barb. Rodr.) Cogn., *Rodriguezia gomezoides* (Barb. Rodr.) Pabst, *Theodorea gomezoides* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa gravesiana (Rolfe) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium gravesianum* Rolfe
Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa handroi (Hoehne) Pabst

Sin.: *Rodriguezia handroi* (Hoehne) Pabst, *Theodorea handroi* Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Gomesa herzogii (Schltr.) Lückel

Sin.: *Alatiglossum herzogii* (Schltr.) Docha Neto, *Oncidium herzogii* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Gomesa hookeri (Rolfe) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium hookeri* Rolfe f. *hookeri*
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Gomesa hydrophila (Barb. Rodr.)

M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium hydrophilum* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN).

Gomesa imperatoris-maximiliani

(Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium crispum* Lodd., *Oncidium crispum* Lodd. var. *rodriguesii* Cogn., *Oncidium imperatoris-maximiliani* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Gomesa laxiflora (Lindl.) Klotzsch ex Rchb. f.

Sin.: *Rodriguezia recurva* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 900-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gomesa leinigii (Pabst) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium leinigii* Pabst
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Gomesa lietzei (Regel) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Oncidium lietzei* Regel
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

- Gomesa loefgrenii** (Cogn.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium loefgrenii* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa longicornu** (Mutel) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium gautieri* Regel, *Oncidium longicornu* Mutel, *Oncidium monoceras* Hook., *Oncidium unicorne* Lindl., *Oncidium unicornutum* Knowles & Westc.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa longipes** (Lindl. & Paxton) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium biflorum* Barb. Rodr., *Oncidium hassleri* Cogn., *Oncidium janeirensis* Rchb. f., *Oncidium longipes* Lindl. var. *monophyllum* Regel, *Oncidium longipes* Lindl., *Oncidium oxyacanthosum* Lem., *Oncidium uniflorum* Booth ex Lindl. var. *longipes* (Lindl.) Teusch., *Oncidium uniflorum* Booth ex Lindl. var. *robustum* Regel
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU). URY(CLA, MON, TYT).
- Gomesa macronyx** (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium macronyx* Rchb.
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa macropetala** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Alatiglossum emilii* (Schltr.) D.H. Baptista, *Alatiglossum macropetalum* (Lindl.) D.H. Baptista, *Gomesa emilii* (Schltr.) M.W. Chase & N.H. Williams, *Oncidium emilii* Schltr., *Oncidium macropetalum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(SCA). PRY(APY).
- Gomesa martiana** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium martianum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Gomesa paranaensoides** M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Gomesa paranaensis* (Kraenzl.) M.W. Chase & N.H. Williams *Oncidium hatschbachii* Schltr., *Oncidium paranaense* Kraenzl., *Oncidium schadei* L.O. Williams
Hierba epífita. Nativa. 800-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa pectoralis** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium pectorale* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Gomesa praetexta** (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium praetextum* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa psyche** (Schltr.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Alatiglossum chrysopteranthum* (Lückel) D.H. Baptista, *Oncidium chrysopteranthum* Lückel, *Oncidium micropogon* Rchb. f. var. *chrysopterum* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Gomesa pubes** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Baptistonia pubes* (Lindl.) Chiron & V.P. Castro, *Oncidium amictum* Lindl., *Oncidium pubes* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA).
- Gomesa radicans** (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Ornithophora quadricolor* Barb. Rodr., *Ornithophora radicans* (Rchb. f.) Garay & Pabst, *Sigmatostalyx radicans* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa ramosa** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Gomesa blanchetii* (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams, *Oncidium batemannianum* Parm. ex Knowles & Westc., *Oncidium blancheti* Rchb. f. var. *blancheti*, *Oncidium blancheti* Rchb. f. var. *mixtum* Schltr., *Oncidium pontagrossense* Campacci
Hierba epífita. Nativa. 500-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Gomesa ranifera** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams f. **albescens** (Pabst) Meneguzzo
Sin.: *Oncidium hookeri* Rolfe f. *albescens* (Pabst) F. Barros & J.A.N. Bat., *Oncidium hookeri* Rolfe var. *albescens* Pabst, *Menezesiella paranaensis* Chiron & V.P. Castro
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa ranifera** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams f. **ranifera**
Sin.: *Oncidium raniferum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa recurva** R. Br.
Sin.: *Gomesa barkeri* (Hook.) Rolfe, *Gomesa planifolia* Klotzsch & Rchb. f., *Gomesa reclinata* Hoffmanns., *Odontoglossum recurvum* Rchb. f., *Rodriguezia barkeri* Hook., *Rodriguezia planifolia* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).
- Gomesa riograndensis** (Cogn.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Baptistonia riograndense* (Cogn.) V.P. Castro & Chiron, *Leiochilus spegazzinianus* Kraenzl., *Oncidium riograndense* Cogn.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Gomesa sarcodes** (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium sarcodes* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Gomesa varicosa** (Lindl. & Paxton) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium euxanthum* Rchb. f., *Oncidium geraense* Barb. Rodr., *Oncidium rogersii* Bateman, *Oncidium rogersii* Hort ex Bateman, *Oncidium varicosum* Lindl. & Paxton var. *rogersii* (Bateman) Rchb. f., *Oncidium varicosum* Lindl. & Paxton var. *varicosum*, *Oncidium varicosum* Lindl. & Paxton var. *vexillarium* (Rchb. f.) Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(COA).
- Gomesa venusta** (Drapiez) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium dimorphum* Regel, *Oncidium trulliferum* Lindl., *Oncidium venustum* Drap.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Gomesa viperina (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium viperinum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
PRY(COA).

Gomesa widgreni (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams
Sin.: *Oncidium brienianum* Rchb. f.
var. *rufida* Rchb. f., *Oncidium brienianum*
Rchb. f., *Oncidium odontochilum* Barb.
Rodr., *Oncidium widgrenii* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Gongora Ruiz & Pav.

Gongora bufonia Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Gongora quinquenervis Ruiz & Pav.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Govenia Lindl.

Govenia utriculata (Sw.) Lindl.
Sin.: *Govenia boliviensis* Rolfe, *Govenia*
gardneri Hook., *Govenia sulphurea* Rchb.
f., *Govenia tingens* Poepp. & Endl.,
Limodorum utriculatum Sw.
Hierba. Nativa. 600-800 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Grandiphyllum Docha Neto

Grandiphyllum divaricatum (Lindl.)
Docha Neto
Sin.: *Oncidium divaricatum* Lindl.,
Oncidium divaricatum Lindl. var. *cupreum*
Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Grandiphyllum edwallii (Cogn.)
Docha Neto
Sin.: *Oncidium edwallii* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(GUA).

Grandiphyllum hians (Lindl.) Docha
Neto
Sin.: *Oncidium hians* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Grandiphyllum pulvinatum (Lindl.)
Docha Neto
Sin.: *Oncidium pulvinatum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
SCA). PRY(APA, SPE).

Grandiphyllum sphegiferum (Lindl.)
Docha Neto
Sin.: *Oncidium sphegiferum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Grobya Lindl.

Grobya amherstiae Lindl.
Hierba palustre. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Grobya fascifera Rchb. f.
Sin.: *Grobya bibrachiata* Hoehne,
Grobya bibrachiata Hoehne var.
riograndensis Pabst, *Grobya fascifera*
Rchb. f. f. *bibrachiata* (Hoehne) Pabst
Hierba epífita. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Grobya galeata Lindl.
Hierba palustre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Grobya guieselii F. Barros & R.
Lourenço
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Habenaria Willd.

Habenaria achalensis Kraenzl.
Sin.: *Habenaria achalensis* Kraenzl.
var. *angustifolia* Kraenzl., *Habenaria*
angustiloba Lillo & Hauman
Hierba terrestre. Nativa.
Países: ARG(COR, MIS, TUC).
BRA(RGS, SCA).

Habenaria alpestris Cogn.
Sin.: *Habenaria melanopoda* Hoehne
& Schltr.
Hierba terrestre. Nativa. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CAS).

Habenaria amambayensis Schltr.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CEN).

Habenaria anisitsii Kraenzl.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Habenaria araneiflora Barb. Rodr.
Hierba rupícola. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Habenaria armata Rchb. f.
Sin.: *Habenaria elegantula* Hoehne
Hierba palustre. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria australis J.A.N. Bat., A.A.
Vale & Menini
Hierba. Endémica. 1100-1200 m.
Países: BRA(RGS).

Habenaria balansae Cogn.
Sin.: *Habenaria buttantanensis* Hoehne
& Schltr., *Habenaria nigripes* Kraenzl.,
Habenaria retusa Barb. Rodr.
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAU).

Habenaria bractescens Lindl.
Sin.: *Habenaria hauman-merckii*
Hicken, *Habenaria kleyi* Schltr.,
Habenaria pontagrossensis Kraenzl.,
Habenaria sartor Lindl. f. *minor* Cogn.,
Kusibabella bractescens (Lindl.) Szlach.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).
URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, MON,
RIV).

Habenaria crassipes Schltr.
Hierba terrestre. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Habenaria distans Griseb.
Sin.: *Habenaria glaucophylla* Barb. Rodr.
Hierba terrestre. Nativa. 1500-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Habenaria dusenii Schltr.
Sin.: *Habenaria sylvicutrix* Lindl.
Hierba terrestre. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Habenaria dutraei Schltr.
Sin.: *Habenaria schnittmeyeri* Schltr.
Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Habenaria edwallii Cogn.

Sin.: *Habenaria adenosephala* Kraenzl., *Habenaria oligophylla* Schltr., *Habenaria physophora* Kraenzl.

Hierba terrestre. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Habenaria ekmaniana Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(SPE).

Habenaria exaltata Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria sceptrum* Schltr.
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(TAC).

Habenaria gourlieana Gillies ex Lindl.

Sin.: *Habenaria burkartiana* Hoehne, *Habenaria fastor* Warm. ex Hoehne, *Habenaria spagazziniana* Kraenzl., *Kusibabella burkartiana* (Hoehne) Szlach., *Kusibabella gourlieana* (Gillies ex Lindl.) Szlach., *Macrocentrum mendocinum* Phil.

Hierba palustre. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ÑEE, SPE). URY(CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Habenaria graciliscapa Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 100-2000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). URY(CAS, SAO).

Habenaria guentheriana Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(SAL).

Habenaria guilleminii Rchb. f.

Sin.: *Habenaria ourobranquensis* Hoehne

Hierba terrestre. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA).

Habenaria gustavi-edwallii Hoehne

Hierba terrestre o saxícola. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Habenaria habenarioides (Hoehne)

R.E. Nogueira & R.J.V. Alves
Sin.: *Itaculumia habenarioides* Hoehne
Hierba terrestre. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Habenaria hassleriana Cogn.

Sin.: *Habenaria fiebrigii* Schltr.
Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, PAI).

Habenaria heleogena Schltr.

Sin.: *Habenaria trapezoidea* Hoehne & Schltr.
Hierba terrestre. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Habenaria henscheniana Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria henscheniana* Barb.
Rodr. var. *densiflora* Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Habenaria hexaptera Lindl.

Sin.: *Habenaria hieronymi* Kraenzl. var. *saltensis* Hauman
Hierba terrestre. Nativa. 200-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Habenaria hieronymi Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR). BRA(RGS).

Habenaria humilis Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 500-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria imbricata Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Habenaria inconspicua Cogn.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CAS).

Habenaria integripetala Cogn.

Hierba terrestre. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(AMA, CAU, SPE).

Habenaria jaguariahyaevae Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Habenaria johannensis Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria vaupelli* Rchb. f. & Warm.
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, ÑEE).

Habenaria josephensis Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria foliosissima* Kraenzl., *Habenaria heterophylla* Schltr.
Hierba terrestre. Nativa. 300-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Habenaria kleinii Menini & J.A.N. Bat.

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS).

Habenaria leprieurii Rchb. f.

Sin.: *Habenaria amazonica* Schltr., *Habenaria platydactyla* Kraenzl., *Habenaria schwackei* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN, ITA).

Habenaria leucosantha Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria berroana* Barb. Rodr., *Habenaria leucosantha* Barb. Rodr. var. *berroana* (Barb. Rodr.) Pabst, *Habenaria leucosantha* Barb. Rodr. var. *riograndensis* Pabst
Hierba terrestre. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA). URY(RIV).

Habenaria macrodactyla Kraenzl.

Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Habenaria macronectar (Vell.)

Hoehne
Sin.: *Habenaria juergensii* Schltr., *Habenaria sartor* Lindl., *Habenaria sartoroides* Schltr., *Kusibabella macronectar* (Vell.) Szlach., *Kusibabella sartor* (Lindl.) Szlach., *Orchis macronectar* Vell.
Hierba terrestre. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(GUA). URY(RNO, SJO).

Habenaria megapotamensis Hoehne

Hierba terrestre. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Habenaria montevidensis Spreng.

Sin.: *Habenaria arechavaletae* Kraenzl., *Habenaria arechavaletae* Kraenzl. var. *elata* Cogn., *Habenaria arechavaletae* Kraenzl. var. *obovatipetala* (Schltr.) Pabst, *Habenaria obovatipetala* Schltr.
Hierba terrestre. Endémica. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CLA, LAV, MON, SJO, TAC).

Habenaria montiswilhelminae Renz

Hierba terrestre. Nativa. 400-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Habenaria nemorosa Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria nuda Lindl.

Sin.: *Habenaria nuda* Lindl. var. *pygmaea* Hoehne, *Habenaria trichoceras* Barb. Rodr.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria obtusa Lindl.

Sin.: *Habenaria ornithoides* Barb. Rodr., *Habenaria megaceras* Barb. Rodr.
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Habenaria paivaeana Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). URY(CLA, LAV, MAL, MON, SJO, TAC).

Habenaria paranaensis Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria campos-portoi* Schltr., *Habenaria janeirensis* Kraenzl.
Hierba terrestre. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(PAI, SPE).

Habenaria parviflora Lindl.

Sin.: *Habenaria brachyphyton* Schltr. ex Mansf., *Habenaria caaguazuensis* Cogn., *Habenaria montevidensis* Lindl., hom. illeg., *Habenaria montevidensis* Spreng. f. *nana* (Schltr.) Pabst, *Habenaria montevidensis* Spreng. f. *parviflora* (Lindl.) Pabst, *Habenaria montevidensis* Spreng. f. *reichenbachiana* (Barb. Rodr.) Pabst, *Habenaria montevidensis* Spreng. var. *tucumanensis* Griseb., *Habenaria nana* Schltdl., hom. illeg., *Habenaria paulensis* Porsch, *Habenaria reichenbachiana* Barb. Rodr., *Habenaria uruguayensis* Garay
Hierba. Endémica. 0-3400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA, MIE). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

Habenaria pentadactyla Lindl.

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Habenaria petalodes Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
BRA(Fuera del área del proyecto).

Habenaria piraquarensis Hoehne

Hierba terrestre. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Habenaria platanthera Rchb. f.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (RGS, SCA). URY(CLA, MAL).

Habenaria pleiophylla Hoehne & Schltr.

Sin.: *Habenaria bradeana* Kraenzl., *Habenaria paranaguaensis* Hoehne
Hierba palustre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Habenaria pumila Poepp.

Sin.: *Habenaria brachyceros* Phil., *Habenaria germainii* Phil., *Habenaria paucifolia* Lindl., *Habenaria pumila* Poepp. & Endl., nom. illeg., *Habenaria uliginosa* Phil., hom. illeg.
Hierba terrestre. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Habenaria regnellii Cogn.

Sin.: *Habenaria flaccida* Kraenzl., *Habenaria poissoniana* Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Habenaria repens Nutt.

Sin.: *Habenaria aranifera* Lindl., *Habenaria paucifolia* Lindl. var. *stolonifera* M.N. Correa, *Habenaria polygonoides* Schltr., *Habenaria repens* Nutt. var. *gracilis* Lüderw. & Hoehne
Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA). URY(CAS, MAL, MON, SJO).

Habenaria rodeiensis Barb. Rodr.

Sin.: *Habenaria corcovadensis* Kraenzl.
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CON).

Habenaria rolfeana Schltr.

Hierba rupícola. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria schenckii Cogn.

Sin.: *Habenaria lindmaniana* Kraenzl.
Hierba terrestre. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

Habenaria secundiflora Barb. Rodr.

Hierba palustre. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(PAR).

Habenaria sobraliana J.A.N. Bat., A.A. Vale & Menini

Hierba. Endémica. 1100-1300 m.
Países: BRA(RGS).

Habenaria subfiliformis Cogn.

Sin.: *Habenaria mitomorpha* Kraenzl., *Habenaria rudolfi-schlechteri* Hoehne
Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAU).

Habenaria subviridis Hoehne & Schltr.

Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria tamanduensis Schltr.

Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Habenaria taubertiana Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Habenaria trifida Kunth

Sin.: *Habenaria flexa* Rchb. f. ex Kraenzl., *Habenaria pauciflora* (Lindl.) Rchb. f. var. *pluriflora* Cogn.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

Habenaria ulaei Cogn.

Hierba terrestre. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Habenaria umbraticola Barb. Rodr.

Hierba palustre. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Habenaria warmingii Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 2000-2200 m.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Hapalorchis Schltr.**Hapalorchis lineata** (Lindl.) Schltr.

Sin.: *Cyclopogon lineatus* (Lindl.) Pabst, *Spiranthes lineata* Lindl.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hapalorchis micrantha (Barb. Rodr.) Hoehne

Sin.: *Cyclopogon candidus* (Kraenzl.) Pabst, *Cyclopogon micranthus* (Barb. Rodr.) Schltr., *Hapalorchis candidus* (Kraenzl.) Schltr., *Sauroglossum candidum* Kraenzl., *Spiranthes micrantha* Barb. Rodr.
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hapalorchis pauciflora Porto & Brade
Sin.: *Cyclopogon pauciflorus* (Porto & Brade) Pabst

Hierba terrestre. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Hapalorchis stellaris Szlach.
Hierba terrestre. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS).

Hoehneella Ruschi

Hoehneella gehrtiana (Hoehne)
Ruschi
Sin.: *Chaubardia gehrtiana* (Hoehne)
Garay, *Warscewiczella gehrtiana* Hoehne
Hierba epífita. Endémica. 500-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Homalopetalum Rolfe

Homalopetalum joinvillense
Mancinelli & E.C. Smidt
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Houlletia Brongn.

Houlletia brocklehurstiana Lindl.
Hierba terrestre o rupícola. Nativa.
0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Huntleya Bateman ex Lindl.

Huntleya meleagris Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ionopsis Kunth

Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl.
Sin.: *Epidendrum utricularioides* Sw.,
Ionopsis gardneri Lindl., *Ionopsis burchellii*
Rchb. f., *Ionopsis paniculata* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,
CAN, CON, SPE).

Isabelia Barb. Rodr.

Isabelia pulchella (Kraenzl.) C. Berg &
M.W. Chase
Sin.: *Isabelia pulchella* (Kraenzl.)
Senghas & Teusch., nom. illeg.,
Neolauchea pulchella Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Isabelia violacea (Lindl.) C. Berg &
M.W. Chase

Sin.: *Sophronia violacea* (Lindl.)
Kuntze, *Sophronitella violacea* (Lindl.)
Schltr., *Sophronitis violacea* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Isabelia virginalis Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Isabelia x pabstii (Leinig) C. Berg &
M.W. Chase

Sin.: *Isanitella pabstii* Leinig
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Isochilus R. Br.

Isochilus brasiliensis Schltr.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA (PAR, RGS, SCA).

Isochilus linearis (Jacq.) R. Br.

Sin.: *Epidendrum lineare* Jacq.,
Isochilus brasiliensis Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL,
TUC). PRY(APA, GUA).

Jacquinella Schltr.

Jacquinella globosa (Jacq.) Schltr.
Sin.: *Epidendrum globosum* Jacq.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lankesterella Ames

Lankesterella caespitosa (Lindl.) Hoehne
Sin.: *Cladobium epiphytum* (Barb.
Rodr.) Schltr., *Lankesterella epiphyta*
(Barb. Rodr.) Brade ex Hoehne, comb.
superfl., *Lankesterella epiphyta* (Barb.
Rodr.) Mansf., *Lankesterella salehi* Pabst,
Spiranthes epiphyta Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lankesterella ceracifolia (Barb.
Rodr.) Ames
Sin.: *Cladobium ceracifolium*
(Barb. Rodr.) Schltr., *Lankesterella*

majus (Hoehne & Schltr.) Hoehne,
Lankesterella mentiensi Hoehne,
Lankesterella oligantha (Hoehne &
Schltr.) Hoehne, *Stenorhynchos*
ceracifolium Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA).

Lepanthopsis (Cogn.) Ames

Lepanthopsis floripecten (Rchb. f.) Ames
Sin.: *Pleurothallis floripecten* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leptotes Lindl.

Leptotes bicolor Lindl.
Sin.: *Leptotes bicolor* Lindl. var.
glaucophylla Hook., *Leptotes glaucophylla*
Hoffmanns., *Leptotes serrulata*
Lindl., *Tetramicra bicolor* (Lindl.) G.
Rolfe, *Tetramicra serrulata* (Lindl.) G.
Nicholson
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(ITA).

Leptotes tenuis Rchb. f.

Sin.: *Leptotes minuta* (Rolfe) Rolfe,
Tetramicra minuta Rolfe
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Leptotes unicolor Barb. Rodr.

Sin.: *Leptotes paranaensis* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, SPE).

Ligeophila Garay

Ligeophila juruenensis (Hoehne) Garay
Sin.: *Erythrodes juruenensis* (Hoehne)
Garay, *Physurus juruenensis* Hoehne
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Ligeophila rosea (Lindl.) Garay
Sin.: *Erythrodes rosea* (Lindl.) Ames,
Physurus roseus Lindl.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA).

Liparis Rich., nom. cons.**Liparis nervosa** (Thunb.) Lindl.

Sin.: *Epidendrum nervosum* Thunb.,
Liparis elata Lindl., *Liparis elata* Lindl. var.
longifolia Cogn., *Ophrys nervosa* Thunb.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa.
0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, COA).

Liparis vexillifera (La Llave ex Lex.) Cogn.

Sin.: *Cymbidium vexilliferum* La Llave
& Lex., *Liparis vexillifera* (La Llave ex
Lex.) Cogn. var. *galeottiana* (A. Rich.)
Ames & Correll, *Liparis vexillifera* (La
Llave ex Lex.) Cogn. var. *latifolia* Cogn.,
Malaxis elliptica A. Rich. & Galeotti,
Malaxis galeottiana A. Rich.

Hierba terrestre. Nativa. 2000-2700 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Lockhartia Hook.**Lockhartia ludibunda** Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lockhartia lunifera (Lindl.) Rchb. f.

Sin.: *Fernandezia lunifera* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Loefgrenianthus Hoehne**Loefgrenianthus blanche-amesii**

(Loefgr.) Hoehne
Sin.: *Leptotes blanche-amesii* Loefgr.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Lyroglossa Schltr.**Lyroglossa grisebachii** (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Lyroglossa euglossa* (Kraenzl.)
Hoehne & Schltr., *Spiranthes euglossa*
Kraenzl., *Spiranthes grisebachii* Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Macradenia R. Br.**Macradenia paraensis** Barb. Rodr.

Sin.: *Macradenia multiflora* (Kraenzl.) Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APA).

Malaxis Sol. ex Sw.**Malaxis cogniauxiana** (Schltr.) Pabst

Sin.: *Microstylis cogniauxiana* Schltr.,
Microstylis gracilis Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Malaxis cordilabia Portalet

Hierba terrestre. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(RGS).

Malaxis excavata (Lindl.) Kuntze

Sin.: *Cheopterocephalus sertulifera*
Barb. Rodr., *Malaxis hastilabia* (Rchb.
f.) Kuntze, *Malaxis sertulifera* (Barb.
Rodr.) Pabst, *Microstylis excavata* Lindl.,
Microstylis hastilabia Rchb. f., *Microstylis
muelleri* Schltr., *Microstylis paranaensis*
Schltr., *Microstylis sertulifera* (Barb.
Rodr.) Schltr., *Pycnantha orchioides*
Ravenna

Hierba terrestre. Nativa. 600-1900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Malaxis hieronymi (Cogn.) L.O. Williams

Sin.: *Microstylis hieronymi* Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 1500-3300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR).

Malaxis histionantha (Link, Klotzsch & Otto, asp.) Garay & Dunst.

Sin.: *Malaxis ovatifolia* Schltr.,
Microstylis histionantha Link, Klotzsch
& Otto

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Malaxis irmae Radins & Salazar

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS, MIS). URY(FLA).

Malaxis jaraguae (Hoehne & Schltr.)

Pabst
Sin.: *Microstylis jaraguae* Hoehne & Schltr.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Malaxis pabstii (Schltr.) Pabst

Sin.: *Microstylis pabstii* Schltr.
Hierba terrestre. Endémica. 500-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Malaxis padillana L.O. Williams

Hierba terrestre. Endémica. 1200-
1800 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Malaxis parthoni C. Morren

Sin.: *Malaxis argentinensis* L.O.
Williams, *Microstylis ovatilabia* Schltr.,
Microstylis parthoni (C. Morren)
Klotzsch
Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

Malaxis pubescens (Lindl.) Kuntze

Sin.: *Microstylis pubescens* Lindl.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Malaxis spicata Sol. ex Sw.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: URY(FLA).

Malaxis warmingii (Rchb. f.) Kuntze

Sin.: *Microstylis warmingii* Rchb. f.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Masdevallia Ruiz & Pav.**Masdevallia infracta** Lindl.

Sin.: *Masdevallia infracta* Lindl. var.
purpurea (Rchb. f.) Cogn.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Maxillaria Ruiz & Pav.**Maxillaria bradei** Schltr. ex Hoehne

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria brasiliensis Brieger & Illg

Sin.: *Heterotaxis brasiliensis* (Brieger &
Illg) F. Barros
Hierba saxícola. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria cerifera Barb. Rodr.

Sin.: *Maxillaria divaricata* (Barb.
Rodr.) Cogn., *Maxillaria nervosa* Rolfe,
Ornithidium ceriferum (Barb. Rodr.)
Barb. Rodr., *Ornithidium divaricatum*
Barb. Rodr., *Ornithidium flavoviridum*
(Barb. Rodr.) Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria chlorantha Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria cleistogama Brieger & Illg

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

- Maxillaria consanguinea** Hoehne var. **pallida** Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria crassifolia** (Lindl.) Rchb. f.
Sin.: *Heterotaxis crassifolia* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria desvauxiana** Rchb. f.
Sin.: *Maxillaria coriacea* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria discolor** (G. Lodd. ex Lindl.) Rchb. f.
Sin.: *Dicrypta discolor* G. Lodd. ex Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria echinophyta** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria ferdinandiana** Barb. Rodr.
Sin.: *Maxillaria ferdinandiana* Barb. Rodr. var. *virescens* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Maxillaria gracilis** Lodd.
Sin.: *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *angustifolia* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *intermedia* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *macrantha* Hoehne, *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *minor* Hoehne, *Maxillaria queirogana* Barb. Rodr., *Maxillaria gracilis* Lodd. var. *queirogana* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Maxillaria pallidiflora* Rchb. f., *Maxillaria penduliflora* Fenzl ex Van Houtte
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Maxillaria guareimensis** Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria imbricata** Barb. Rodr.
Sin.: *Camaridium carinatum* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Camaridium hoehnei* Pabst var. *carinatum* (Barb. Rodr.) Pabst, *Camaridium hoehnei* Pabst var. *iguapense* (Hoehne & Schltr.) Pabst, *Camaridium hoehnei* Pabst, *Camaridium imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne var. *carinatum* (Barb. Rodr.) Pabst, *Camaridium imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne var. *iguapense* (Hoehne & Schltr.) Hoehne,
- Camaridium imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Maxillaria carinata* Barb. Rodr., *Maxillaria iguapensis* Hoehne & Schltr., *Maxillaria imbricata* Barb. Rodr. var. *carinata* (Barb. Rodr.) Pabst, *Maxillaria jensichiana* (Rchb. f.) C. Schweinf. var. *iguapensis* (Hoehne & Schltr.) Pabst
Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria johannis** Pabst
Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria juergensii** Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Maxillaria kautskyi** Pabst
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria leucaimata** Barb. Rodr. var. **leucaimata**
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria leucaimata** Barb. Rodr. var. **longifolia** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria lindleyana** Schltr.
Sin.: *Maxillaria crocea* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Maxillaria madida** Lindl.
Sin.: *Maxillaria cepula* Rchb. f., *Maxillaria echinochila* Kraenzl., *Maxillaria hatschbachii* Schltr., *Maxillaria madida* Lindl. var. *cepula* (Rchb. f.) Hoehne, *Maxillaria mosenii* Kraenzl. var. *echinochila* (Kraenzl.) Hoehne, *Maxillaria mosenii* Kraenzl. var. *hatschbachii* (Schltr.) Hoehne, *Maxillaria mosenii* Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Maxillaria marginata** Fenzl
Sin.: *Maxillaria crassipes* Kraenzl., *Maxillaria murilliana* Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Maxillaria minuta** Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria neuwiedii** Rchb. f.
Sin.: *Maxillaria neuwiedii* Rchb. f. var. *longifolia* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria notylioglossa** Rchb. f.
Sin.: *Rhetinantha notylioglossa* (Rchb. f.) M.A. Blanco
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria ochroleuca** Lodd. ex Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria pachyphylla** Schltr. ex Hoehne
Sin.: *Maxillaria pachyphylla* Schltr. ex Hoehne var. *bruneo-fusca* Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Maxillaria parahybunensis** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria paranaensis** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria parviflora** (Poepp. & Endl.) Garay
Sin.: *Camaridium purpureum* Spreng., *Maxillaria chloroleuca* (Barb. Rodr.) Hoehne, *Maxillaria conferta* (Griseb.) C. Schweinf. ex León, *Maxillaria purpurea* (Spreng.) Ames & Correll, *Ornithidium chloroleucum* Barb. Rodr., *Ornithidium confertum* Griseb., *Ornithidium parviflorum* (Poepp. & Endl.) Rchb. f., *Pseudomaxillaria chloroleuca* (Rchb. f.) Hoehne, *Scaphyglottis parviflora* Poepp. & Endl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria paulistana** Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria phoenicanthera** Barb. Rodr.
Sin.: *Maxillaria punctata* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).
- Maxillaria plebeja** Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria porphyrostele Rchb. f.

Sin.: *Maxillaria porphyrostele*
Rchb. f. var. *chrysanthoides* Hoehne,
Maxillaria porphyrostele Rchb. f. var.
minutipunctulata Hoehne, *Maxillaria*
porphyrostele Rchb. f. var. *submarginata*
Hoehne

Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria porrecta Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Maxillaria pumila Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Maxillaria rigida Barb. Rodr.

Sin.: *Camaridium rigidum* (Barb.
Rodr.) Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Maxillaria serotina Regnell & Barb. Rodr.

Sin.: *Maxillaria serotina* Hoehne,
hom. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Maxillaria spgazziniana Kraenzl.

Sin.: *Maxillaria cogniauxiana* Hoehne,
Maxillaria cogniauxiana Hoehne
var. *intermedia* Hoehne, *Maxillaria*
cogniauxiana Hoehne var. *longifolia*
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Maxillaria subulata Lindl.

Sin.: *Maxillaria acicularis* Herb. ex Lindl.
var. *brevifolia* Cogn., *Maxillaria acicularis*
Herb., *Maxillaria heterophylla* Hoehne
var. *acicularifolia* Hoehne, *Maxillaria*
heterophylla Hoehne var. *intermedia*
Hoehne, *Maxillaria heterophylla* Hoehne
var. *longifolia* Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Maxillaria ubatubana Hoehne var.
mantiqueirana Hoehne

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria ubatubana Hoehne var.
ubatubana

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Maxillaria valenzuelana (A. Rich.) Nash

Sin.: *Dicrypta iridifolia* Bateman ex
Rchb. f., *Dicrypta irisiphyta* Barb. Rodr.,
Marsupiarina valenzuelana (A. Rich.)
Garay, *Maxillaria iridifolia* (Bateman ex
Rchb. f.) Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Maxillaria vernicosa Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Maxillaria vitelliniflora Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mesadenella Pabst & Garay**Mesadenella atroviridis** (Barb. Rodr.)

Garay
Sin.: *Cyclopogon atroviridis* Barb.
Rodr., *Garaya atroviridis* (Barb. Rodr.)
Szlach., *Spiranthes atroviridis* (Barb.
Rodr.) Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay

Sin.: *Cyclopogon albo-punctata*
Barb. Rodr., *Mesadenella esmeralda*
(Lindl. & Rchb. f.) Pabst & Garay,
Spiranthes cuspidata Lindl., *Spiranthes*
esmeralda Lindl. & Rchb. f., *Spiranthes*
margaritifera Lindl. & Rchb. f.,
Stenorrhynchos esmeraldae (Lindl. &
Rchb. f.) Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAN, COA).
URY(Desconocida).

Microchilus C. Presl**Microchilus arietinus** (Rchb. f. &
Warm.) Ormd.

Sin.: *Erythrodes arietina* (Rchb. f. &
Warm.) Ames, *Physurus arietinus* Rchb. f.
& Warm., *Physurus micranthus* Kraenzl.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Microchilus austrobrasiliensis

(Porsch) Ormd.
Sin.: *Erythrodes austrobrasiliensis*
(Porsch) Pabst, *Ligeophila*
austrobrasiliensis (Porsch) Garay,
Physurus austrobrasiliensis Porsch
Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Microchilus pedrojuanensis Ormd.

Sin.: *Microchilus rojasii* Ormd.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Miltonia Lindl., nom. cons.**Miltonia flavescens** Lindl.

Sin.: *Cyrtochilum flavescens* Lindl.,
Cyrtochilum stellatum Lindl., *Miltonia*
flavescens Lindl. var. *stellata* Regel,
Miltonia loddigesii Regel, *Miltonia stellata*
(Lindl.) Lindl., *Oncidium flavescens*
(Lindl.) Rchb. f., *Oncidium stellatum*
(Lindl.) Beer
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA,
GUA, SPE).

Miltonia phymatochila (Lindl.) N.H.

Williams & M.W. Chase
Sin.: *Oncidium phymatochilum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Hierba epífita. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(SCA).

Miltonia regnellii Rchb. f.

Sin.: *Miltonia cereola* Lem., *Miltonia*
regnellii Rchb. f. var. *citrina* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Miltonia russelliana Lindl.

Sin.: *Miltonia quadrijuga* Dusén &
Kraenzl., *Oncidium russellianum* Lindl.,
Anneliesia russelliana (Lindl.) Senghas &
Lückel
Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myoxanthus Poepp. & Endl.**Myoxanthus exasperatus** (Lindl.) Luer

Sin.: *Myoxanthus parahybunensis*
(Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis*
exasperata Lindl., *Pleurothallis macropus*
Schltr., *Pleurothallis peduncularis* Lindl.,
hom. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrosmodes Rchb. f.**Myrosmodes gymandra** (Rchb. f.)

C.A. Vargas
Sin.: *Altensteinia gymandra* Rchb. f.
Hierba. Nativa. 3500-3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).

- Myrosmodes nervosa** (Kraenzl.)
Novoa, C. Vargas & Cisternas
Sin.: *Aa nervosa* (Kraenzl.) Schltr.,
Altensteinia nervosa Kraenzl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).
- Myrosmodes paludosa** (Rchb. f.) P.
Ortiz
Sin.: *Aa paludosa* (Rchb. f.) Schltr.,
Altensteinia paludosa Rchb. f.,
Myrosmodes paludosa (Rchb. f.) C.A.
Vargas, nom. illeg.
Hierba. Nativa. 3200-4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Nemaconia** Knowles & Westc.
- Nemaconia striata** (Lindl.) Van den
Berg, Salazar & Soto Arenas
Sin.: *Ponera australis* Cogn., *Ponera
striata* Lindl.
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Notylia** Lindl.
- Notylia hemitricha** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Notylia lyrata** S. Moore
Sin.: *Notylia lyrata* S. Moore var.
major Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CEN, CON, GUA).
- Notylia pubescens** Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria** R. Br.
- Octomeria alexandri** Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Octomeria anceps** Porto & Brade
Sin.: *Octomeria crassilabia* Pabst,
Octomeria reitzii Pabst
Hierba epífita. Nativa. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria caetensis** Pabst
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Octomeria chamaeleptotes** Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 400-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria chloidophylla** (Rchb. f.)
Garay
Sin.: *Octomeria dusenii* Schltr.,
Pleurothallis chloidophylla Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(SCA).
- Octomeria concolor** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria crassifolia** Lindl.
Sin.: *Octomeria alpina* Barb. Rodr.,
Octomeria densiflora Barb. Rodr.,
Octomeria ementosa Barb. Rodr.,
Octomeria gehrtii Hoehne & Schltr.,
Octomeria gracilicaulis Schltr., *Octomeria
serrana* Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 300-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).
- Octomeria cucullata** Porto & Brade
Hierba epífita. Nativa. 1900-2000 m.
Países: BRA(PAR).
- Octomeria decumbens** Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 500-700 m.
Países: BRA(PAR).
- Octomeria diaphana** Lindl.
Sin.: *Octomeria albopurpurea* Barb.
Rodr., *Octomeria glazioviana* Regel,
Octomeria fialhoensis Dutra ex Pabst
Hierba epífita. Nativa. 200-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria fibrifera** Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria flabellifera** Pabst
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria gracilis** Lodd. ex Lindl. var.
gracilis
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria gracilis** Lodd. ex Lindl. var.
pauloensis Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Octomeria grandiflora** Lindl.
Sin.: *Octomeria grandiflora* Lindl.
- var. *robusta* (Barb. Rodr.) Cogn.,
Octomeria ruthiana Hoehne, *Octomeria
seegeriana* Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria hatschbachii** Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria irroarata** Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria juncifolia** Barb. Rodr.
Sin.: *Octomeria juncifolia* Barb. Rodr.
var. *revoluta* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria lichenicola** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Octomeria liliputana** W. Forst., F.
Barros & V.C. Souza
Hierba epífita. Endémica. 600-700 m.
Países: BRA(PAR).
- Octomeria linearifolia** Barb. Rodr.
Sin.: *Octomeria bradei* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).
- Octomeria lithophila** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).
- Octomeria micrantha** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria ochroleuca** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria octomeriantha**
(Hoehne) Pabst
Sin.: *Octomeria elobata* Pabst,
Pleurothallis octomeriantha Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria palmyrabellae** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria praestans** Barb. Rodr.
Sin.: *Octomeria paulensis* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

- Octomeria pusilla** Lindl.
Sin.: *Octomeria umbonulata* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria rigida** Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Octomeria riograndensis** Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Octomeria robusta** Rchb. f. & Warm.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Octomeria rodriguezii** Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria rohrii** Pabst
Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).
- Octomeria rotundiglossa** Hoehne
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Octomeria sancti-angeli** Kraenzl.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Octomeria stellaris** Barb. Rodr.
Sin.: *Octomeria lacerata* Hoehne & Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Octomeria tricolor** Rchb. f.
Sin.: *Octomeria albina* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).
- Octomeria unguiculata** Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).
- Octomeria warmingii** Rchb. f.
Sin.: *Octomeria iguapensis* Schltr.,
Octomeria oxychela Barb. Rodr. var.
gracilis Cogn., *Octomeria oxychela* Barb.
Rodr. var. *oxychela*, *Octomeria pinicola*
Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
- Odontorrhynchus** M.N. Correa
- Odontorrhynchus castillonii**
(Hauman) M.N. Correa
Sin.: *Spiranthes castillonii* (Hauman)
- L.O. Williams, *Stenorrhynchus castillonii*
Hauman
Hierba. Nativa. 1200-2700 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC).
- Odontorrhynchus chlorops** (Rchb. f.)
Garay
Sin.: *Brachystele chlorops* (Rech. f.)
Schltr., *Spiranthes chlorops* Rchb. f.
Hierba. Nativa. 2800-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Oeceoclades** Lindl.
- Oeceoclades maculata** (Lindl.) Lindl.
Sin.: *Angraecum maculatum* Lindl.,
Eulophia maculata (Lindl.) Rchb. f.,
Eulophidium maculatum (Lindl.) Pfitzer
var. *pterocarpum* Hauman, *Eulophidium*
maculatum (Lindl.) Pfitzer, *Oeceoclades*
maculata (Lindl.) Lindl. var. *pterocarpa*
(Hauman) Garay & P. Taylor
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, ÑEE,
PAI, PHA, SPE).
- Oncidium** Sw., nom. cons.
- Oncidium emaculatum** Ravenna
Hierba epífita. Endémica. 1200 m.
Países: BRA(SCA).
- Oncidium fuchsii** Königer
Sin.: *Rhinocidium fuchsii* (Königer)
Docha Neto
Hierba epífita. Endémica. 200-1400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
PRY(CEN).
- Oncidium maculosum** Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área
del proyecto).
- Oncidium verrucosissimum** Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR). PRY(APA, GUA).
- Ornithocephalus** Hook.
- Ornithocephalus brachystachyus** Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(RGS).
- Ornithocephalus myrticola** Lindl.
Sin.: *Ornithocephalus pygmaeus* Rchb.
- f. & Warm., *Ornithocephalus reitzii* Pabst
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Orthochilus** Hochst. ex A. Rich.
- Orthochilus ruwenzoriensis** (Rendle)
Bytebier
Sin.: *Cyrtopodium galeandroides*
Cogn., *Eulophia argentina* (Rolfe)
Schltr., *Eulophia ruwenzoriensis* Rendle,
Pteroglossaspis argentina Rolfe
Hierba epífita. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, SFE). BRA(PAR,
SCA). PRY(AMA). URY(MAL, RNO).
- Pabstia** Garay
- Pabstia jugosa** (Lindl.) Garay
Sin.: *Colax jugosus* (Lindl.) Lindl.,
Lycaste jugosa (Lindl.) Nichols,
Maxillaria jugosa Lindl., *Zygopetalum*
jugosum (Lindl.) Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pabstia viridis** (Lindl.) Garay
Sin.: *Colax puydtii* Lindl. & André,
Colax viridis (Lindl.) Lindl., *Colax viridis*
(Lindl.) Lindl. var. *parviflorus* Hoehne,
Lycaste puydtii (Lindl. & André) Nichols,
Lycaste viridis (Lindl.) Benth., *Maxillaria*
placantha Hook., *Maxillaria viridis*
Lindl., *Zygopetalum viridis* (Lindl.)
Schltr., *Pabstia viridis* (Lindl.) Garay var.
parviflora (Hoehne) Garay
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).
- Pabstiella** Brieger & Senghas
- Pabstiella alligatorifera** (Rchb. f.) Luer
Sin.: *Acianthera alligatorifera* (Rchb.
f.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis*
alligatorifera Rchb. f., *Pleurobotryum*
blumenavii (Barb. Rodr.) Cogn., *Lepanthes*
blumenavii Barb. Rodr., *Pleurothallis*
blumenavii (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia*
alligatorifera (Rchb. f.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pabstiella arcuata** (Lindl.) Luer
Sin.: *Humboldtia arcuata* (Lindl.)
Kuntze, *Pleurothallis arcuata* Lindl.,
Pleurothallis ocellata Porsch, *Specklinia*
arcuata (Lindl.) Luer, *Stelis arcuata*
(Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella armeniaca (Barb. Rodr.) L. Kollmann

Sin.: *Lepanthes armeniaca* Barb. Rodr., *Pleurothallis armeniaca* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia armeniaca* (Barb. Rodr.) F. Barros & V.T. Rodrigues
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA (PAR).

Pabstiella aveniformis (Hoehne) Luer

Sin.: *Acianthera aveniformis* (Hoehne) C.N. Gonçalves & J.L. Waechter, *Pleurothallis aveniformis* Hoehne, *Specklinia aveniformis* (Hoehne) Luer, comb. illeg.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella bacillaris (Pabst) Luer

Sin.: *Pleurothallis bacillaris* Pabst, *Specklinia bacillaris* (Pabst) Luer
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Pabstiella bicolor (Barb. Rodr.) Luer & Toscano

Sin.: *Lepanthes bicolor* Barb. Rodr., *Lepanthes quadridentata* Barb. Rodr., *Pabstiella quadridentata* (Barb. Rodr.) Luer, *Pleurothallis bicolor* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis mouraei* Cogn., *Pleurothallis palmeirensis* Pabst, *Pleurothallis quadridentata* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia quadridentata* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx bicolor* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx quadridentata* (Barb. Rodr.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella bradei (Schltr.) Luer

Sin.: *Pleurothallis bradei* Schltr., *Specklinia bradei* (Schltr.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella calcarata (Cogn.) Luer

Sin.: *Pabstiella mentigera* (Kraenzl.) L. Kollmann, *Pleurothallis calcarata* Cogn., *Pleurothallis magnicalcarata* Loefgr., *Pleurothallis mentigera* Kraenzl., *Specklinia mentigera* (Kraenzl.) F. Barros & Barberena
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA (PAR, SCA).

Pabstiella campestris (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Pleurothallis campestris* Barb. Rodr., *Pleurothallis mouraeoides* Hoehne, *Specklinia campestris* (Barb. Rodr.)

Luer, *Specklinia mouraeoides* (Hoehne) F. Barros, *Trichosalpinx mouraeoides* (Hoehne) Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA).

Pabstiella carinifera (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Lepanthes carinifera* Barb. Rodr., *Pleurothallis carinifera* (Barb. Rodr.) Cogn., *Trichosalpinx carinifera* (Barb. Rodr.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella colorata (Pabst) Luer & Toscano

Sin.: *Pleurothallis colorata* Pabst, *Specklinia colorata* (Pabst) F. Barros & V.T. Rodrigues
Hierba epífita. Nativa
Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella fusca (Lindl.) Chiron & Xim. Bols.

Sin.: *Humboldtia hypnicola* (Lindl.) Kuntze, *Pabstiella hypnicola* (Lindl.) Luer, *Pabstiella sparsiflora* (Schltr.) Luer, *Pleurothallis fusca* Lindl., *Pleurothallis hypnicola* Lindl., *Pleurothallis sparsiflora* Schltr., *Specklinia hypnicola* (Lindl.) F. Barros, comb. illeg., *Specklinia hypnicola* (Lindl.) Luer, *Specklinia sparsiflora* (Schltr.) Luer, *Stelis hypnicola* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella hians (Lindl.) Luer

Sin.: *Pleurothallis hians* Lindl., *Specklinia hians* (Lindl.) Luer, *Stelis hians* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Pabstiella intraptila Chiron & Xim. Bols.

Hierba epífita. Endémica
Países: BRA(PAR).

Pabstiella matinhensis (Hoehne) Luer

Sin.: *Pleurothallis matinhensis* Hoehne, *Specklinia matinhensis* (Hoehne) Luer, *Trichosalpinx matinhensis* (Hoehne) Luer
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella miniatolineolata

(Hoehne) Luer
Sin.: *Pleurothallis miniatolineolata* Hoehne, *Specklinia miniatolineolata*

(Hoehne) F. Barros
Hierba epífita. Nativa
Países: BRA(PAR).

Pabstiella mirabilis (Schltr.) Brieger & Senghas

Sin.: *Anthereon mirabilis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis longicornu* Kraenzl., *Pleurothallis mirabilis* Schltr., *Specklinia mirabilis* (Schltr.) Luer
Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pabstiella miragliae (Leite) Luer

Sin.: *Pleurothallis miragliae* Leite, *Specklinia miragliae* (Leite) Luer
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella parvifolia (Lindl.) Luer

Sin.: *Acianthera parvifolia* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, *Humboldtia parvifolia* (Lindl.) Kuntze, *Lepanthes cryptophyta* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis parvifolia* Lindl., *Pleurothallis succedanea* Hoehne & Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella pellifeloides (Barb. Rodr.) Luer

Sin.: *Lepanthes pellifeloides* Barb. Rodr., *Pleurothallis pellifeloides* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia pellifeloides* (Barb. Rodr.) Luer, *Stelis pellifeloides* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Pabstiella piraquarensis (Hoehne) Luer

Sin.: *Pleurothallis piraquarensis* Hoehne, *Specklinia piraquarensis* (Hoehne) Luer, *Stelis piraquarensis* (Hoehne) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Pabstiella pleurothalloides (Cogn.) Luer

Sin.: *Pleurothallis edwallii* Dusén & Schltr., *Pleurothallis pleurothalloides* (Cogn.) Handro, *Restrepia pleurothalloides* Cogn., *Specklinia pleurothalloides* (Cogn.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pabstiella podoglossa (Hoehne) Luer

Sin.: *Pleurothallis podoglossa* Hoehne, *Specklinia podoglossa* (Hoehne) Luer, *Trichosalpinx podoglossa* (Hoehne) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

- Pabstiella pristeoglossa** (Rchb. f. & Warm.) Luer
Sin.: *Pleurothallis pristeoglossa* Rchb. f. & Warm., *Specklinia pristeoglossa* (Rchb. f. & Warm.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Pabstiella pterophora** (Cogn.) Chiron
Sin.: *Pleurothallis pterophora* Cogn., *Trichosalpinx pterophora* (Cogn.) Luer
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).
- Pabstiella punctatifolia** (Barb. Rodr.) Chiron
Sin.: *Lepanthes punctatifolia* Barb. Rodr., *Pabstiella punctatifolia* (Barb. Rodr.) Luer, comb. illeg., *Pleurothallis punctatifolia* (Barb. Rodr.) Pabst, *Specklinia punctatifolia* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx punctatifolia* (Barb. Rodr.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pabstiella recurviloba** Toscano & Luer
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Pabstiella rubrolineata** (Hoehne) Luer
Sin.: *Pleurothallis rubrolineata* Hoehne, *Specklinia rubrolineata* (Hoehne) F. Barros
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).
- Pabstiella sarcopetala** (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes sarcopetala* Barb. Rodr., *Pleurothallis sarcopetala* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia sarcopetala* (Barb. Rodr.) Luer, *Stelis sarcopetala* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(SCA).
- Pabstiella seriata** (Lindl.) Luer & Toscano
Sin.: *Anathallis seriata* (Lindl.) Luer & Toscano, *Humboldtia seriata* (Lindl.) Kuntze, *Panmorphia seriata* (Lindl.) Luer, *Pleurothallis seriata* Lindl., *Pleurothallis sphaeroglossa* Hoehne, *Specklinia seriata* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pabstiella sordida** (Kraenzl.) Luer
Sin.: *Pleurothallis sordida* Kraenzl., *Specklinia sordida* (Kraenzl.) Luer, *Trichosalpinx sordida* (Kraenzl.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Pabstiella stictophylla** (Schltr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis stictophylla* Schltr., *Specklinia stictophylla* (Schltr.) Luer
Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Pabstiella tenera** (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes tenera* Barb. Rodr., *Pleurothallis tenera* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia tenera* (Barb. Rodr.) Luer, *Trichosalpinx tenera* (Barb. Rodr.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(RGS).
- Pabstiella tricolor** (Barb. Rodr.) Luer
Sin.: *Lepanthes tricolor* Barb. Rodr., *Pleurothallis tricolor* (Barb. Rodr.) Cogn., *Specklinia tricolor* (Barb. Rodr.) Luer, *Stelis tricolor* (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Pabstiella trifida** (Lindl.) Luer
Sin.: *Pleurothallis bicristata* Cogn., *Pleurothallis curtii* Schltr., *Pleurothallis trifida* Lindl., *Specklinia trifida* (Lindl.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 500-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Pabstiella tripterantha** (Rchb. f.) F. Barros
Sin.: *Anthereon tripteranthus* (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, *Pleurothallis procumbens* Lindl., *Pleurothallis tripterantha* Rchb. f., *Specklinia tripterantha* (Rchb. f.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS), BRA(PAR, SCA).
- Pabstiella uniflora** (Lindl.) Luer
Sin.: *Pleurothallis uniflora* Lindl., *Specklinia leontoglossa* (Rchb. f.) Luer, *Specklinia uniflora* (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Pabstiella varellae** Toscano, Luer & J. Klein
Sin.: *Pleurothallis mouraeoides* Hoehne var. *riograndensis* Pabst
Hierba epífita. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(RGS).
- Pabstiella vellozoana** (Schltr.) Luer
Sin.: *Pleurothallis vellozoana* Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 100-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Pabstiella wackettii** (Handro & Pabst) Luer
Sin.: *Pleurothallis wackettii* Handro & Pabst, *Specklinia wackettii* (Handro & Pabst) Luer
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Pabstiella wawraeana** (Barb. Rodr.) Chiron & Xim. Bols.
Sin.: *Lepanthes wawraeana* Barb. Rodr., *Pleurothallis cuneifolia* Cogn.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Paradisanthus** Rchb. f.
- Paradisanthus micranthus** (Barb. Rodr.) Schltr.
Sin.: *Paradisanthus paranaensis* Barb. Rodr., *Zygopetalum micranthum* Barb. Rodr.
Hierba terrestre. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Paradisanthus mosonii** Rchb. f.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Pelexia** Poit. ex Lindl., nom. cons.
- Pelexia albicans** (Cogn.) Schltr.
Sin.: *Stenorrhynchos albicans* Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(CAU).
- Pelexia arechavaletae** (Mytnik, Szlach. & Górniak) J.M.H. Shaw
Sin.: *Pachygenium arechavaletae* Mytnik, Szlach. & Górniak
Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MON).
- Pelexia bonariensis** (Lindl.) Schltr.
Sin.: *Gyrostachys bonariensis* (Lindl.) Kuntze, *Pachygenium bonariensis* (Lindl.) Szlach., R. González & Rutk., *Pachygenium callosum* (M.N. Correa) Mytnik, Szlach. & Górniak, *Pelexia bonariensis* (Lindl.) Schltr. var. *bombylifera* Rchb. f. & Warm., *Pelexia bonariensis* (Lindl.) Schltr. var. *robusta* Cogn., *Pelexia saltensis* (Griseb.) Schltr., *Spiranthes bonariensis* Lindl., *Spiranthes saltensis* Griseb., *Stenorrhynchos bonariense* (Lindl.) Cogn., *Stenorrhynchos saltensis* (Griseb.) Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC), BRA(PAR, RGS, SCA), PRY(CEN, GUA, PAI), URY(MAL, MON, ROC, SJO, TAC).

Pelexia burgeri Schltr.Sin.: *Pachygenium burgeri* (Schltr.)

Szlach., R. González & Rutkowski

Hierba terrestre. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(RGS).

Pelexia collocaliae Szlach.

Hierba terrestre. Endémica. 0-200 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Pelexia ekmanii (Kraenzl.) Schltr.Sin.: *Spiranthes ekmanii* (Kraenzl.)Hauman, *Stenorrhynchos ekmanii*

Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(RGS). PRY(AMA, CEN).

Pelexia goyazensis (Cogn.) GaraySin.: *Cyclopogon aphyllus* Schltr.,*Spiranthes goyazensis* Cogn.

Hierba. Nativa. 300-800 m.

Países: BRA(PAR).

Pelexia gracilis Schltr.

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Pelexia hysterantha (Barb. Rodr.) Schltr.Sin.: *Pachygenium hysteranthum*

(Barb. Rodr.) Szlach., R. González &

Rutkowski, *Spiranthes hysterantha* Barb.Rodr., *Stenorrhynchos hysteranthum*

(Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(Fuera del área del

proyecto). PRY(AMA).

Pelexia incurvidens Schltr.

Hierba terrestre. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(RGS).

Pelexia itatiaiae Schltr.Sin.: *Pachygenium itatiaiae* (Schltr.)

Szlach., R. González & Rutkowski

Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(RGS).

Pelexia laminata Schltr.Sin.: *Pachygenium laminatum* (Schltr.)

Szlach., R. González & Rutkowski

Hierba terrestre. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA)

Pelexia laxa (Poepp. & Endl.) Lindl.Sin.: *Stenorrhynchos laxum* Poepp. & Endl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Pelexia lindmaniana (Kraenzl.) Schltr.Sin.: *Stenorrhynchos lindmanianum*

Kraenzl.

Hierba terrestre. Endémica. 300-800 m.

Países: ARG(CHA). BRA(PAR, RGS).

Pelexia lindmanii Kraenzl.Sin.: *Pelexia stictophylla* Schltr.

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS). PRY(SPE).

Pelexia loefgrenii (Porsch) Schltr.Sin.: *Stenorrhynchos loefgrenii* Porsch

Hierba terrestre. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(SCA).

Pelexia macropoda (Barb. Rodr.) Schltr.Sin.: *Spiranthes macropoda* Barb. Rodr.,*Stenorrhynchos macropodum* (Barb.

Rodr.) Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pelexia novofriburgensis (Rchb. f.)

Garay

Sin.: *Pelexia hypnophila* (Barb. Rodr.)Schltr., *Pelexia polyantha* Schltr.,*Spiranthes hypnophila* Barb. Rodr.,*Stenorrhynchos hypnophilum* Barb. Rodr.,*Stenorrhynchos novofriburgense* Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(JUU, MIS, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA).

Pelexia oestrifera (Rchb. f. & Warm.)

Schltr.

Sin.: *Gyrostachys oestrifera* (Rchb. f.& Warm.) Kuntze, *Spiranthes oestrifera*Rchb. f. & Warm., *Stenorrhynchos**oestriferum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn.,*Stenorrhynchos oestriferum* (Rchb. f. &Warm.) Cogn. var. *minor* Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Pelexia orobanchoides (Kraenzl.) Schltr.Sin.: *Spiranthes orobanchoides*Kraenzl., *Stenorrhynchos orobanchoides*

Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

Pelexia orthosepala (Rchb. f. &

Warm.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes orthosepala* Rchb. f. &

Warm.

Hierba terrestre. Nativa. 500-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Pelexia ovatifolia M.N. Correa

Hierba terrestre. Endémica. 500-600 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Pelexia paludosa M.N. Correa

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS).

Pelexia paraguayensis GaraySin.: *Pachygenium paraguayensis*

(Garay) Szlach., R. González &

Rutkowski, *Pelexia vaginata* (Cogn.)Schltr., *Pelexia vaginata* (Cogn.) Schltr.var. *pauciflorus* Cogn., *Stenorrhynchos**vaginatum* Cogn.

Hierba terrestre. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(CAU, CEN, PAI).

Pelexia parva (Cogn.) Schltr.Sin.: *Pachygenium parvum* (Cogn.)

Szlach., R. González & Rutkowski,

Stenorrhynchos parvum Cogn.

Hierba terrestre. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Pelexia pterygantha (Rchb. f. &

Warm.) Schltr.

Sin.: *Pelexia dolichorhiza* Schltr.,*Spiranthes pterygantha* Rchb. f. & Warm.,*Stenorrhynchos pteryganthum* (Rchb. f. &

Warm.) Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pelexia robusta (Kraenzl.) HoehneSin.: *Stenorrhynchos robustum* Kraenzl.

Hierba terrestre. Endémica. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Pelexia sancta (Rchb. f. & Warm.)

Garay

Sin.: *Pelexia magdalenensis* Brade &Pabst, *Sarcoglottis magdalenensis* (Brade& Pabst) Pabst, *Sarcoglottis sancta* (Rchb.f. & Warm.) Schltr., *Spiranthes sancta*

Rchb. f. & Warm.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera

del área del proyecto).

Pelexia sceptrum Schltr.Sin.: *Pachygenium sceptrum* (Schltr.)

Szlach., R. González & Rutkowski

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Pelexia schmidtiana (Mytnik, Szlach.

& Górniak) J.M. H. Shaw

Sin.: *Pachygenium schmidtianum*

Mytnik, Szlach. & Górniak

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(GUA).

Pelexia tamanduensis (Kraenzl.) Schltr.

Sin.: *Stenorrhynchos holosericeum*
Kraenzl., *Stenorrhynchos tamanduense*
Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Pelexia tenuior Schltr.

Sin.: *Pachygenium tenuior* (Schltr.)
Szlach., R. González & Rutkowski
Hierba terrestre. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pelexia ventricosa (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Stenorrhynchos ventricosum* Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CAN).

Pelexia viridis (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Stenorrhynchos viride* Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Phloeophila Hoehne & Schltr.**Phloeophila nummularia** (Rchb. f.)

Garay
Sin.: *Pabstiella nummularia* (Rchb. f.)
Chiron, *Phloeophila echinantha* (Barb.
Rodr.) Garay, *Phloeophila echinantha*
(Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase,
comb. superfl., *Phloeophila paulensis*
Hoehne & Schltr., *Physosiphon*
echinanthus (Barb. Rodr.) Cogn.,
Pleurothallis echinantha Barb. Rodr.,
Pleurothallis nummularia Rchb. f.,
Pleurothallis paulensis (Hoehne &
Schltr.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(SCA).

Phloeophila similis (Schltr.) Garay

Sin.: *Acianthera similis* (Schltr.)
Karremans, Chiron & C. Berg,
Cryptophoranthus similis Schltr.,
Pleurothallis similis (Schltr.) Luer
Hierba epífita. Nativa.
Países: BAR(PAR).

Phymatidium Lindl.

Phymatidium aquinoi Schltld.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Phymatidium delicatulum Lindl. var. **curvicepalum** Toscano

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phymatidium delicatulum Lindl. var. **delicatulum**

Sin.: *Phymatidium denticulatum*
Steud., *Phymatidium myrtophilum*
Barb. Rodr., *Phymatidium paranaense*
A. Samp., nom. nud.
Hierba epífita. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA).

Phymatidium falcifolium Lindl.

Sin.: *Phymatidium tillandsioides* Barb.
Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phymatidium hysternanthum Barb.

Rodr.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phymatidium microphyllum (Barb.

Rodr.) Toscano var. **microphyllum**
Sin.: *Ornithocephalus microphyllus*
Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Phymatidium microphyllum Barb.

Rodr. var. **herteri** (Schltr.) Toscano
Sin.: *Phymatidium herteri* Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Platyrrhiza Barb. Rodr.**Platyrrhiza quadricolor** Barb. Rodr.

Sin.: *Platyrrhiza juergensii* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Platystele Schltr.**Platystele oxyglossa** (Schltr.) Garay

Sin.: *Platystele brasiliensis* Brade,
Pleurothallis oxyglossa Schltr., *Platystele*
pygmaea (Hoehne) Pabst, *Pleurothallis*
pygmaea Hoehne
Hierba terrestre. Nativa. 800-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Platythelys Garay**Platythelys pedicellata** (Cogn.)

Szlach.
Sin.: *Aspidogyne pedicellata* (Cogn.)
Meneguzzo, *Brachystele pedicellata*

(Cogn.) Garay, *Erythrodes paranaensis*
(Kraenzl.) Pabst, *Physurus paranaensis*
(Kraenzl.) Schltr., *Platythelys paranaensis*
(Kraenzl.) Garay, *Spiranthes pedicellata*
Cogn. *Wullschlaegelia paranaensis*
Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Platythelys platensis (Hauman)

Garay
Sin.: *Erythrodes platensis* (Hauman)
L.O. Williams, *Physurus platensis*
Hauman
Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). PRY(PAI).

Platythelys schlechteriana (Hoehne)

Garay
Sin.: *Erythrodes schlechteriana* (Hoehne)
Pabst, *Physurus schlechterianus* Hoehne
Hierba terrestre o epífita. Nativa.
300-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pogoniopsis Rchb. f.**Pogoniopsis schenckii** Cogn.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Polystachya Hook., nom. cons.**Polystachya bradei** Schltr. ex Mansf.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Polystachya caespitosa Barb. Rodr.

Sin.: *Polystachya juergensii* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet

Sin.: *Epidendrum concretum* Jacq.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA,
GUA, SPE).

Polystachya estrellensis Rchb. f.

Sin.: *Dendrorchis estrellensis* (Rchb. f.)
Kuntze
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f.

Sin.: *Polystachya edwallii* Hoehne & Schltr., *Polystachya nana* Rchb. f., *Stelis foliosa* Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Polystachya micrantha Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(RGS).

Polystachya pinicola Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Ponthieva R. Br.**Ponthieva hassleri** Schltr.

Hierba terrestre. Endémica. 0-300 m.
Países: PRY(AMA).

Ponthieva mandonii Rchb. f. var.**bilobipetala** Hoehne

Hierba terrestre. Nativa. 300-500 m.
Países: ARG(TUC).

Ponthieva mandonii Rchb. f. var. **mandonii**

Sin.: *Ponthieva parvilabris* Griseb.
Hierba. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Prescottia Lindl.**Prescottia densiflora** (Brongn.) Lindl.

Sin.: *Decaisnea densiflora* Brongn.
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prescottia lancifolia Lindl.

Sin.: *Prescottia epiphyta* Barb. Rodr.,
Prescottia octopollinica Barb. Rodr.,
Prescottia truncicola Schltr.
Hierba terrestre. Nativa. 400-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Prescottia montana Barb. Rodr.

Sin.: *Prescottia serrana* M.N. Correa,
nom. nud.
Hierba terrestre. Nativa. 700-2700 m.
Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, RGS, SCA).

Prescottia oligantha (Sw.) Lindl.

Sin.: *Cranichis micrantha* Spreng.,
Cranichis oligantha Sw., *Prescottia filiformis* Schltr., *Prescottia gracilis* Schltr., *Prescottia micrantha* Lindl.,

Prescottia microrhiza Barb. Rodr.,
Prescottia myosurus Rchb. f., *Prescottia nivalis* Barb. Rodr., *Prescottia panamensis* Schltr., *Prescottia pubescens* Barb. Rodr.,
Prescottia tenuis Lindl., *Prescottia viacola* Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-2900 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN).
URY(CAS).

Prescottia ostenii Pabst

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS).

Prescottia phleoides Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Prescottia plantaginifolia Lindl. ex

Hook.

Sin.: *Prescottia plantaginea* Hook.
var. *macrostachya* Hoehne, *Prescottia plantaginea* Hook., *Prescottia rodeiensis* Barb. Rodr., *Prescottia stricta* Schltr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl.

Sin.: *Cranichis stachyodes* Sw., *Prescottia colorans* Lindl., *Prescottia longipetiolata* Barb. Rodr., *Prescottia paulensis* Cogn.,
Prescottia petiolaris Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-3600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Promenaea Lindl.**Promenaea guttata** Rchb. f.

Sin.: *Promenaea acuminata* Schltr.,
Promenaea catharinensis Schltr.,
Zygopetalum guttatum (Rchb. f.) Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Promenaea rollisonii (Rchb. f.) Lindl.

Sin.: *Promenaea albescens* Schltr.,
Promenaea paranaensis Schltr. var.
albescens (Schltr.) Hoehne, *Promenaea riograndensis* Schltr., *Zygopetalum rollisonii* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Promenaea stapelioides (Klotzsch ex Rchb. f.) Lindl.

Sin.: *Promenaea dusenii* Schltr.,
Zygopetalum stapelioides Klotzsch ex Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Promenaea xanthina Lindl.

Sin.: *Promenaea fuerstenbergiana* Schltr., *Promenaea paranaensis* Schltr.
Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosthechea Knowles & Westc.**Prosthechea aemula** (Lindl.) W.E.

Higgins

Sin.: *Epidendrum aemulum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Prosthechea bulbosa (Vell.) W.E.

Higgins

Sin.: *Encyclia bulbosa* (Vell.) Pabst,
Encyclia inversa (Lindl.) Pabst,
Epidendrum bulbosum Vell., *Epidendrum inversum* Lindl., *Prosthechea inversa* (Lindl.) W.E. Higgins

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosthechea fausta (Rchb. f. ex Cogn.) W.E. Higgins

Sin.: *Anacheilium faustum* (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst, Moutinho & A.V. Pinto,
Encyclia fausta (Rchb. f. ex Cogn.) Pabst,
Epidendrum faustum Rchb. f. ex Cogn.

Hierba epífita. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosthechea fragrans (Sw.) W.E.

Higgins

Sin.: *Anacheilium fragrans* (Sw.) Acuña,
Encyclia fragrans (Sw.) Lemée,
Epidendrum fragrans Sw.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosthechea glumacea (Lindl.) W.E.

Higgins

Sin.: *Anacheilium glumaceum* (Lindl.) Pabst,
Encyclia glumacea (Lindl.) Pabst,
Epidendrum glumaceum Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosthechea papilio (Vell.) W.E.

Higgins

Sin.: *Encyclia papilio* (Vell.) Pabst,
Epidendrum papilio Vell., *Epidendrum widgrenii* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Prosthechea punctifera (Rchb. f.)

W.E. Higgins

Sin.: *Encyclia punctifera* (Rchb. f.)Pabst, *Epidendrum punctiferum* Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosthechea pygmaea (Hook.) W.E.

Higgins

Sin.: *Encyclia pygmaea* (Hook.)Dressler, *Epidendrum pygmaeum* Hook.,*Hormidium tripterum* (Brongn.) Cogn.

Hierba epífita o epipétrica. Nativa.

0-300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prosthechea vespa (Vell.) W.E.

Higgins

Sin.: *Encyclia vespa* (Vell.) Dressler,*Epidendrum variegatum* Hook., hom.illeg., *Epidendrum vespa* Vell.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Psilochilus Barb. Rodr.**Psilochilus dusenianus** Kraenzl. ex

Garay & Dunst.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Psilochilus modestus Barb. Rodr.Sin.: *Pogonia modesta* (Barb. Rodr.) Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pterichis Lindl.**Pterichis boliviana** Schltr.Sin.: *Stenoptera aspidistrifolia* Hauman

Hierba terrestre. Nativa. 1200-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Pterichis multiflora (Lindl.) Schltr.Sin.: *Acraea multiflora* Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 2000-3400 m.

Países: ARG(SAL).

Pteroglossa Schltr.**Pteroglossa glazioviana** (Cogn.)

Garay

Sin.: *Cogniauxiocharis glazioviana*(Cogn.) Hoehne, *Pelexia glazioviana*Cogn., *Pelexia glazioviana* Cogn. var. *paraguayensis* Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAA).

Pteroglossa lurida (M.N. Correa)

Garay

Sin.: *Centrogenium luridum* M.N. Correa,*Eltroplectris lurida* (M.N. Correa) Pabst

Hierba saxícola. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, SAL). BRA(SCA).

PRY(PHA).

Pteroglossa luteola Garay

Hierba terrestre. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS).

Pteroglossa macrantha (Rchb. f.)

Schltr.

Sin.: *Pteroglossa regia* (Kraenzl.)Schltr., *Spiranthes macrantha* Rchb. f.,*Stenorrhynchos macranthum* (Rchb. f.)Cogn. f. *robustior* Cogn., *Stenorrhynchos**macranthum* (Rchb. f.) Cogn.,*Stenorrhynchos regius* Kraenzl.

Hierba terrestre. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

PRY(AMA).

Pteroglossa magnifica Szlach. ex Szlach.

Hierba epífita. Endémica. 0-300 m.

Países: PRY(AMA).

Pteroglossa rhombipetala Garay

Hierba terrestre. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SFE). PRY(GUA).

Pteroglossa roseoalba (Rchb. f.)

Salazar & M.W. Chase

Sin.: *Centrogenium roseo-album* (Rchb.f.) Schltr., *Eltroplectris roseoalba* (Rchb.f.) Hamer & Garay, *Pelexia roseo-alba*

Rchb. f.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL). BRA(Fuera del área del

proyecto).

Rodriguezia Ruiz & Pav.**Rodriguezia bracteata** (Vell.) HoehneSin.: *Epidendrum bracteatum* Vell.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rodriguezia decora (Lem.) Rchb. f.Sin.: *Burlingtonia amoena* Planch.,*Burlingtonia decora* Lem.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APA).

Rodriguezia obtusifolia (Lindl.) Rchb. f.Sin.: *Burlingtonia obtusifolia* Lindl.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Rodriguezia pubescens (Lindl.) Rchb. f.Sin.: *Burlingtonia pubescens* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Rodriguezia sticta M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Rudolfiella Hoehne**Rudolfiella lindmaniana** (Kraenzl.)

Hoehne

Sin.: *Bifrenaria lindmaniana* Kraenzl.

Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

Sacoila Raf.**Sacoila argentina** (Griseb.) GaraySin.: *Stenorrhynchos argentinum*Griseb., *Stenorrhynchos argentinum*Griseb. var. *minor* Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 100-4000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ,

LRI, MIS). PRY(APY).

Sacoila duseniana (Kraenzl.) GaraySin.: *Stenorrhynchos bradei* Schltr.,*Stenorrhynchos dusenianum* Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Sacoila hassleri (Cogn.) GaraySin.: *Stenorrhynchos hassleri* Cogn.,*Stenorrhynchos longifolium* Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

Sacoila lanceolata (Aubl.) GaraySin.: *Limodorum lanceolatum* Aubl.,*Sacoila apetala* (Kraenzl.) Garay,*Sacoila riograndensis* (Kraenzl.) Garay,*Sacoila secundiflora* (Lillo & Hauman)Garay, *Satyrium orchidioides* Sw.,*Skeptrostachys sancti-jacobi* (Kraenzl.)Garay, *Stenorrhynchos apetalum*Kraenzl., *Stenorrhynchos australe* Lindl.,*Stenorrhynchos lanceolatum* (Aubl.) Rich.ex Spreng., *Stenorrhynchos orchidioides*(Sw.) Rich. var. *australis* Cogn.,*Stenorrhynchos orchidioides* (Sw.) Rich.,*Stenorrhynchos riograndensis* Kraenzl.*Stenorrhynchos sancti-jacobi* Kraenzl.,*Stenorrhynchos secundiflorus* Lillo &Hauman, *Stenorrhynchos speciosus* Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Sacoila pedicellata (Cogn.) Garay

Sin.: *Stenorrhynchos pedicellatum*
Cogn., *Stenorrhynchos pedicellatum*
Cogn. var. *major* Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, SAL).
BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, SPE).

Sanderella Kuntze

Sanderella discolor (Barb. Rodr.) Cogn.

Sin.: *Parlatorea discolor* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR, RGS).

Sanderella riograndensis Dutra ex

Pabst
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Sarcoglottis C. Presl

Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr.

Sin.: *Neottia acaulis* Sm.
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Sarcoglottis alexandri Schltr. ex Mansf.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Sarcoglottis biflora (Vell.) Schltr.

Sin.: *Serapias biflora* Vell., *Spiranthes biflora* (Vell.) Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Sarcoglottis catharinensis Mancinelli

& E.C. Smidt
Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(SCA).

Sarcoglottis fasciculata (Vell.) Schltr.

Sin.: *Serapias fasciculata* Vell.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(GUA).

Sarcoglottis glaucescens Schltr.

Hierba terrestre. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Sarcoglottis grandiflora (Hook.)

Klotzsch
Sin.: *Neottia grandiflora* Hook.,
Spiranthes acaulis (Sm.) Cogn. var.
grandiflora (Hook.) Lindl., *Spiranthes grandiflora* (Hook.) Lindl., *Spiranthes picta* (Anders) Lindl. var. *grandiflora* (Hook.) L.O. Williams

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAA).

Sarcoglottis heringeri Pabst

Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Sarcoglottis homalogastra (Rchb. f.

& Warm.) Schltr.
Sin.: *Spiranthes homalogastra* Rchb. f. & Warm.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Sarcoglottis itararensis (Kraenzl.)

Hoehne
Sin.: *Spiranthes itararensis* Kraenzl.
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Sarcoglottis juergensii Schltr.

Hierba terrestre. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Sarcoglottis tirolensis Burns-Bal. &

M.S.Foster
Hierba terrestre. Endémica. 0-100 m.
Países: PRY(ITA).

Sarcoglottis uliginosa Barb. Rodr.

Sin.: *Spiranthes uliginosa* Barb. Rodr.
Hierba terrestre. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN).

Sarcoglottis ventricosa (Vell.)

Hoehne ex Pabst
Sin.: *Sarcoglottis rufescens* Klotzsch,
Serapias ventricosa Vell.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Sauroglossum Lindl.

Sauroglossum andinum (Hauman)

Garay
Sin.: *Schidorrhynchos andinum* (Hauman) Szlach., *Spiranthes nitida* (Vell.) Cogn. var. *andina* Hauman
Hierba terrestre. Nativa. 500-1200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Sauroglossum elatum Lindl.

Sin.: *Spiranthes pachychila* Kraenzl., *Spiranthes sauroglossum* G. Nicholson
Hierba terrícola. Nativa.
Países: ARG (CAT, LRI, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA)

Sauroglossum nitidum (Vell.) Schltr.

Sin.: *Serapias nitida* Vell., *Spiranthes excelsa* Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(CAT, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sauroglossum sellilabre (Griseb.) Schltr.

Sin.: *Spiranthes sellilabris* Griseb.
Hierba terrestre. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). PRY(COA).

Scaphyglottis Poepp. & Endl.

Scaphyglottis brasiliensis (Schltr.)

Dressler
Sin.: *Fractiunguis brasiliensis* Schltr.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Scaphyglottis emarginata (Garay)

Dressler
Sin.: *Reichenbachanthus emarginatus* Garay
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Scaphyglottis modesta (Rchb. f.) Schltr.

Sin.: *Tetragamestus modestus* Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Scuticaria Lindl.

Scuticaria hadwenii (Lindl.) Hoehne

Sin.: *Bifrenaria hadwenii* Lindl.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa.
800-1800 m.
Países: BRA(SCA).

Skeptrostachys Garay

Skeptrostachys arechavaletanii

(Barb. Rodr.) Garay
Sin.: *Stenorrhynchos arechavaletanii* Barb. Rodr., *Stenorrhynchos exaltatum* Kraenzl., *Stenorrhynchos lateritium* Kraenzl.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(MAL, RIV, TAC).

Skeptrostachys balanophorastachya

(Rchb. f. & Warm.) Garay

Sin.: *Spiranthes balanophorostachya*Rchb. f. & Warm., *Stenorrhynchos**balanophorostachyum* (Rchb. f. & Warm.)Cogn., *Stenorrhynchos stenophyllum* Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(MAL, SJO).

Skeptrostachys berroana (Kraenzl.)

Garay

Sin.: *Pelexia berroana* (Kraenzl.) Schltr.,*Stenorrhynchos berroanum* Kraenzl.

Hierba terrestre. Endémica. 200-400 m.

Países: URY(LAV).

Skeptrostachys congestiflora (Cogn.)

Garay

Sin.: *Stenorrhynchos congestiflorum* Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Skeptrostachys correana Szlach.

Hierba terrestre. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(COS).

Skeptrostachys disoides (Kraenzl.)

Garay

Sin.: *Spiranthes disoides* Kraenzl.,*Spiranthes paranahybae* Kraenzl.,*Stenorrhynchos densum* Hauman

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Skeptrostachys gigantea (Cogn.)

Garay

Sin.: *Stenorrhynchos giganteum* Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

PRY(APA). URY(MAL, TAC).

Skeptrostachys montevidensis

(Barb. Rodr.) Garay

Sin.: *Stenorrhynchos montevidense* Barb.Rodr., *Stenorrhynchos polyanthum* Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS). URY(MAL, MON).

Skeptrostachys paraguayensis

(Rchb. f.) Garay

Sin.: *Spiranthes paraguayensis* Rchb.f., *Stenorrhynchos paraguayense* (Rchb.

f.) Cogn.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, MIE). URY(MAL, RNO, ROC).

Skeptrostachys rupestris (Lindl.)

Garay

Sin.: *Spiranthes rupestris* Lindl.,*Stenorrhynchos rupestre* (Lindl.) Cogn.,*Stenorrhynchos rupestre* (Lindl.) Cogn.var. *minor* Hoehne

Hierba terrestre. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA).

Specklinia Lindl.**Specklinia fernandiana** (Hoehne) F.

Barros

Sin.: *Pleurothallis fernandiana* Hoehne,*Stelis fernandiana* (Hoehne) Pridgeon &

M.W. Chase

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.)

F. Barros

Sin.: *Humboldtia grobyi* (Bateman exLindl.) Kuntze, *Lepanthes marmorata*Barb. Rodr., *Pleurothallis grobyi* Batemanex Lindl., *Pleurothallis grobyi* Batemanex Lindl. var. *marmorata* (Barb. Rodr.)Garay, *Pleurothallis marmorata* (Barb.Rodr.) Cogn., *Pleurothallis perplexa* Rchb.f., *Specklinia grobyi* (Bateman ex Lindl.)

Pridgeon & M.W. Chase, nom. illeg.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Specklinia guimaraensii (Brade) LuerSin.: *Acianthera guimaraensii* (Brade) F.Barros, *Pleurothallis guimaraensii* Brade

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR).

Specklinia marginalis (Rchb. f.) F.

Barros

Sin.: *Humboldtia marginalis* (Rchb.f.) Kuntze, *Pleurothallis biglandulosa*Schltr., *Pleurothallis grobyi* Batemanex Lindl. var. *marginalis* (Rchb. f.)Pabst, *Pleurothallis marginalis* Rchb. f.,*Specklinia biglandulosa* (Schltr.) Pridgeon

& M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Specklinia subpicta (Schltr.) LuerSin.: *Pleurothallis subpicta* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 500 m.

Países: BRA(PAR).

Stanhopea Frost ex Hook.**Stanhopea insignis** Frost ex W. Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stanhopea lietzei (Regel) Schltr.Sin.: *Stanhopea graveolens* Lindl. var.*lietzei* Regel, *Stanhopea graveolens* Lindl.var. *straminea* Porsch

Hierba epífita o epipéfrica. Nativa.

0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stanhopea xytriphora Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(SAL).

Stelis Sw.**Stelis aprica** Lindl.Sin.: *Stelis herzogii* Schltr., *Stelis miersii*Lindl., *Stelis rodriguesii* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis aquinoana Schltr.

Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Stelis catharinensis Lindl.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Stelis deregularis Barb. Rodr.Sin.: *Physosiphon deregularis* (Barb.Rodr.) Cogn., *Physosiphon minutiflorus*Ames & Schweinf., *Physosiphon spiralis*Lindl., *Pleurothallis deregularis* (Barb.Rodr.) Luer, *Pseudostelis bradei* Schltr.,*Pseudostelis deregularis* (Barb. Rodr.)Schltr., *Pseudostelis spiralis* (Lindl.) Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis fraterna Lindl.Sin.: *Stelis diaphana* Schltr., *Stelis**guttifera* Porsch, *Stelis inaequisepala*Hoehne & Schltr., *Stelis penduliflora* Barb.Rodr., *Stelis vinosa* Barb. Rodr., *Stelis**vinosa* Barb. Rodr. var. *longifolia* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis intermedia Poepp. & Endl.Sin.: *Stelis drosophila* Barb. Rodr.,*Stelis dusenii* Garay, *Stelis petropolitana*

Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis leinigii Pabst

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA)

Stelis megantha Barb. Rodr.

Sin.: *Stelis macrochlamys* Hoehne & Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis papaquerensis Rchb. f.

Sin.: *Stelis epilithica* Garay, *Stelis juergensii* Schltr., *Stelis porschiana* Schltr., *Stelis pterostele* Hoehne & Schltr., *Stelis reflexisejala* Garay, *Stelis smaragdina* Barb. Rodr., *Stelis tweediana* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis parvifolia Garay

Sin.: *Stelis microphylla* Hoehne & Schltr., hom. illeg.

Hierba epífita. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Stelis pauciflora Lindl.

Sin.: *Stelis fragrans* Schltr., *Stelis mucronata* Porsch var. *atrorubra* Pabst, *Stelis mucronata* Porsch, *Stelis omalosantha* Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stelis pauloensis Hoehne & Schltr.

Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Stelis pumila Pridgeon & M.W. Chas

Sin.: *Pleurothallis microtis* Schltr., *Specklinia microtis* (Schltr.) Luer, *Stelis microtis* (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase, nom. illeg.

Hierba epífita. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(RGS).

Stelis reitzii Garay

Hierba epífita. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(SCA).

Stelis ruprechtiana Rchb. f.

Sin.: *Stelis hoehnei* Schltr.

Hierba epífita. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Stigmatosema Garay**Stigmatosema garayana** Szlach.

Hierba terrestre. Endémica. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Stigmatosema hatschbachii (Pabst)

Garay

Sin.: *Brachystele hatschbachii* Pabst
Hierba terrestre. Endémica. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Stigmatosema odileana Szlach.

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(COS). BRA(SCA).

Trichocentrum Poepp. & Endl.**Trichocentrum fuscum** Lindl.

Sin.: *Acoidium fuscum* Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Trichocentrum morenoi (Dodson & Luer) M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Lophiaris morenoi* (Dodson & Luer) Braem, *Oncidium morenoi* Dodson & Luer

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA).

Trichocentrum pumilum (Lindl.)

M.W. Chase & N.H. Williams

Sin.: *Epidendrum ligulatum* Vell., *Lophiaris pumila* (Lindl.) Braem, *Oncidium pumilum* Lindl. var. *laxum* Kraenzl., *Oncidium pumilum* Lindl. var. *angustifolium* Cogn., *Oncidium pumilum* Lindl. var. *robustum* Cogn., *Oncidium pumilum* Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(TYT).

Trichosalpinx Luer**Trichosalpinx montana** (Barb.

Rodr.) Luer

Sin.: *Lepanthes montana* Barb. Rodr., *Pleurothallis lepanthipoda* Hoehne & Schltr., *Pleurothallis quartzicola* Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Trichosalpinx violacea (Lem.) Luer

Sin.: *Pabstiella catharinensis* (Cogn.) Luer, *Pleurothallis catharinensis* Cogn., *Specklinia violacea* Lem.

Hierba epífita. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Trigonidium Lindl.**Trigonidium latifolium** Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Trigonidium macranthum Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Trigonidium obtusum Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Triphora Nutt.**Triphora hassleriana** (Cogn.) Schltr.

Sin.: *Pogonia hassleriana* Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL). PRY(PAI, SPE).

Triphora santamariensis Portalet

Hierba terrestre. Endémica. 100-200 m.
Países: BRA(RGS).

Trizeuxis Lindl.**Trizeuxis falcata** Lindl.

Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Uleiorchis Hoehne**Uleiorchis prataensis** M.E. Engels & E.C. Smidt

Hierba terrestre. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Uleiorchis ulaei (Cogn.) Handro

Sin.: *Uleiorchis cogniauxiana* Hoehne, *Wulfschlaegelia ulaei* Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vanilla Mill.**Vanilla angustipetala** Schltr.

Sin.: *Vanilla rojasiana* Hoehne
Hierba. Nativa. 300-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, SPE).

Vanilla bertonensis Bertoni

Hierba. Endémica. 100-200 m.
Países: PRY(APA, CEN).

Vanilla chamissonis Klotzsch

Sin.: *Vanilla argentina* Hicken, *Vanilla chamissonis* Klotzsch var. *brevifolia* Cogn., *Vanilla velozii* Rolfe
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).

Vanilla dietschiana Edwall

Sin.: *Dictyophyllaria dietschiana* (Edwall) Garay
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(SCA).

Vanilla edwallii Hoehne

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Vanilla organensis Rolfe

Hierba. Nativa. 300-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.)

Lindl.
Sin.: *Epidendrum palmarum* Salzm. ex Lindl.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Vanilla parvifolia Barb. Rodr.

Sin.: *Vanilla perexilis* Bertoni
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, GUA).

Vanilla verrucosa Hauman

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Veyretia Szlach.**Veyretia hassleri** (Cogn.) Szlach.

Sin.: *Sarcoglottis hassleri* (Cogn.) Schltr., *Spiranthes hassleri* Cogn.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, MIE).

Veyretia sagittata (Rchb. f. & Warm.) Szlach.

Sin.: *Sarcoglottis sagittata* (Rchb. f. & Warm.) Schltr., *Spiranthes sagittata* Rchb. f. & Warm.
Hierba terrestre. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Veyretia simplex (Griseb.) Szlach.

Sin.: *Sarcoglottis butantanensis* (Hoehne) Hoehne & Schltr., *Sarcoglottis neuroptera* (Rchb. f. & Warm.) Schltr., *Spiranthes butantanensis* Hoehne, *Spiranthes lindmaniana* Kraenzl., *Spiranthes neuroptera* Rchb. f. & Warm., *Spiranthes simplex* Griseb., *Veyretia neuroptera* (Rchb. f. & Warm.) Szlach., *Veyretia simplex* Griseb.
Hierba terrestre. Nativa.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

Veyretia undulata Szlach.

Hierba terrestre. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

Warmingia Rchb. f., nom. cons.**Warmingia eugenii** Rchb. f.

Sin.: *Warmingia loefgrenii* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Warrea Lindl.**Warrea warreana** (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.

Sin.: *Aganisia tricolor* (Lindl.) Boiss., *Koellensteinia tricolor* (Lindl.) Rchb. f., *Maxillaria warreana* Lodd. ex Lindl., *Warrea bidentata* Lindl., *Warrea speciosa* Schltr., *Warrea tricolor* Lindl., *Warrea unijugata* Regel, *Warrea warreana* (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf. var. *unijugata* (Regel) Rchb. f.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Wulschlaegelia Rchb. f.**Wulschlaegelia aphylla** (Sw.) Rchb. f.

Sin.: *Cranichis aphylla* Sw.
Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, GUA).

Xylobium Lindl.**Xylobium colleyi** (Bateman ex Lindl.)

Rolfe
Sin.: *Maxillaria colleyi* Bateman ex Lindl., *Xylobium brachystachyum* Kraenzl.
Hierba epífita. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xylobium undulatum (Ruiz & Pav.) Rolfe

Sin.: *Dendrobium squalens* Lindl., *Maxillaria undulata* Ruiz & Pav., *Xylobium dusenii* Kraenzl., *Xylobium scabriglume* Schltr., *Xylobium squalens* (Lindl.) Lindl.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Zeuxine Lindl.**Zeuxine strateumatica** (L.) Schltr.

Sin.: *Orchis strateumatica* L.
Hierba terrestre. Introducida.
Países: BRA(PAR).

Zootrophion Luer**Zootrophion atropurpureum** (Lindl.)

Luer
Sin.: *Cryptophoranthus atropurpureus* (Lindl.) Rolfe, *Cryptophoranthus schenckii* Cogn., *Pleurothallis atropurpurea* (Lindl.) Lindl., *Specklinia atropurpurea* Lindl., *Zootrophion schenckii* (Cogn.) Luer
Hierba epífita. Nativa. 400-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Zygopetalum Hook.**Zygopetalum brachypetalum** Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Zygopetalum crinitum Lodd.

Sin.: *Zygopetalum mackayi* Hook. var. *convexum* Mutel, *Zygopetalum mackayi* Hook. var. *crinitum* Lindl., *Zygopetalum pubescens* Hoffm., *Zygopetalum stenichilum* Lodd.
Hierba epífita o epipétrica. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zygopetalum maculatum (Kunth)

Garay
Sin.: *Dendrobium maculatum* Kunth, *Zygopetalum intermedium* Lodd., *Zygopetalum mackayi* Hook.
Hierba epífita. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zygopetalum maxillare Lodd.

Sin.: *Zygopetalum hasslerianum* Kraenzl., *Zygopetalum mandibulare* Rchb. f., *Zygopetalum maxillare* Lodd. var. *sanderianum* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Zygostates Lindl.**Zygostates alleniana** Kraenzl.

Sin.: *Dipteranthus lindmanii* Kraenzl., *Zygostates aquinoi* Schltr., *Zygostates lindmanii* (Kraenzl.) Schltr., *Zygostates papillosa* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Zygostates bradei (Schltr.) Garay

Sin.: *Dipteranthus bradei* Schltr., *Zygostates rotundiglossa* Pabst
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Zygostates cornuta Lindl.

Sin.: *Zygostates lunata* Lindl. var. *subintegripetala* Cogn.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Zygostates dasyrhiza (Kraenzl.)

Schltr.
Sin.: *Ornithocephalus dasyrhizus* Kraenzl., *Zygostates paranaensis* Schltr.
Hierba epífita. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zygostates lunata Lindl.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Zygostates multiflora (Rolfe) Schltr.

Sin.: *Ornithocephalus multiflorus* Rolfe
Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Zygostates pellucida Rchb. f.

Sin.: *Dipteranthus pellucidus* (Rchb. f.) Cogn., *Dipteranthus pseudobulbifer* Barb. Rodr., *Ornithocephalus pseudobulbifer* Barb. Rodr.
Hierba epífita. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Zygostates pustulata (Kraenzl.)

Schltr.
Sin.: *Dipteranthus pustulatus* (Kraenzl.) Pabst, *Ornithocephalus dusenianus* Kraenzl., *Ornithocephalus pustulatus* Kraenzl., *Zygostates duseniana* (Kraenzl.) Pabst
Hierba epífita. Endémica. 1000-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

OROBANCHACEAE

Agalinis Raf.

Agalinis communis (Cham. & Schltdl.)

D'Arcy
Sin.: *Gerardia communis* Cham. & Schltdl.
Subarbusto hemiparásito. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SJU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Agalinis digitalis (Benth.) Barringer

Sin.: *Gerardia digitalis* Benth.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(MAL).

Agalinis fiebrigii (Diels) D'Arcy

Sin.: *Gerardia fiebrigii* Diels
Subarbusto. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC).

Agalinis genistifolia (Cham. & Schltdl.) D'Arcy

Sin.: *Agalinis rigida* (Gillies ex Benth.) D'Arcy, *Gerardia genistifolia* Cham. & Schltdl., *Gerardia rigida* Gillies ex Benth.
Subarbusto hemiparásito. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA, CEN, CON, COA). URY(COL, PAY, RNO, RIV, TAC).

Agalinis linarioides (Cham. & Schltdl.) D'Arcy subsp. **linarioides**

Sin.: *Gerardia linarioides* Cham. & Schltdl.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ). URY(MAL, MON, RNO, SOR).

Agalinis linarioides (Cham. & Schltdl.) D'Arcy subsp. **rojasii** Barringer

Hierba o subarbusto. Endémica. 200-700 m.
Países: PRY(AMA, CON, PAI).

Agalinis meyeniana (Benth.)

Barringer
Sin.: *Gerardia rigida* Gillies ex Benth. var. *meyeniana* Benth.
Hierba. Endémica. 800-1300 m.
Países: CHL(ATA).

Agalinis ramulifera Barringer

Subarbusto parásito. Nativa. 400-800 m.
Países: BRA(PAR).

Bellardia All.

Bellardia trixago (L.) All.

Sin.: *Bartsia trixago* L., *Euphrasia trixago* (L.) Vis., *Trixago apula* Steven
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SFE). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, AIS). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SJO, TAC).

Bellardia viscosa (L.) Fisch. & C.A. Mey.

Sin.: *Bartsia viscosa* L., *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel
Hierba. Introducida. 0-1400 m.
Países: ARG(NEU, RNE). BRA(RGS). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). URY(CAS, COL, FLO, MAL, MON, SJO, SJO).

Buchnera L.

Buchnera amethystina Cham. & Schltdl.

Hierba parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Buchnera juncea Cham. & Schltdl.

Hierba parásita. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Buchnera lavandulacea Cham. & Schltdl.

Hierba parásita. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, GUA).

Buchnera longifolia Kunth

Sin.: *Buchnera elongata* Sw., nom. illeg., *Buchnera integrifolia* Larrañaga, *Buchnera macrocarpa* Kunth, *Buchnera pusilla* Kunth, *Buchnera rosea* Kunth var. *guaranitica* Chodat & Hassl.

Hierba parásita. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

Buchnera palustris (Aubl.) Spreng.

Sin.: *Piripea palustris* Aubl.
Hierba parásita. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Buchnera ternifolia Kunth

Sin.: *Buchnera elongata* Sw. f. *grandiflora* Chodat & Hassl., *Buchnera elongata* Sw. f. *virescens* Chodat & Hassl., *Buchnera lithospermifolia* Kunth, *Buchnera lobelioides* Cham. & Schltdl.
Hierba parásita. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, APA, COA, GUA, SPE). URY(MON).

Castilleja Mutis ex L.f.**Castilleja arvensis** Schltld. & Cham.

Sin.: *Castilleja arvensis* Schltld. & Cham.
var. *pastorei* (Hicken) J.M. Egger, *Castilleja communis* Benth., *Castilleja lithospermoides* Kunth var. *pastorei* Hicken

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RNO).

Castilleja attenuata (A. Gray) T.I.

Chuang & Heckard
Sin.: *Orthocarpus attenuatus* A. Gray
Hierba. Introducida.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Castilleja laciniata Hook. & Arn.

Sin.: *Orthocarpus australis* Benth.,
Orthocarpus laciniatus (Hook. & Arn.)
D.D. Keck
Hierba. Nativa. 300-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

Castilleja pumila (Benth.) Wedd. ex Herrera

Sin.: *Castilleja fissifolia* L. f. var. *pumila*
(Benth.) Wedd., *Castilleja fissifolia* L.
subsp. *pumila* (Benth.) Wedd., *Castilleja nubigena* Kunth var. *pumila* Benth.
Hierba parásita. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Escobedia Ruiz & Pav.**Escobedia grandiflora** (L. f.) Kuntze

Sin.: *Buchnera grandiflora* L. f.,
Escobedia curialis (Vell.) Pennell,
Escobedia foliolosa Pennell, *Escobedia longiflora* Pennell, *Escobedia parimensis* Pennell, *Escobedia parvifolia* Pennell, *Escobedia reticulata* Pennell, *Escobedia scabrifolia* Ruiz & Pav. var. *laevigata* J.A. Schmidt, *Escobedia scabrifolia* Ruiz & Pav., *Micalia grandiflora* (L. f.) Raf., *Silvia curialis* Vell.

Subarbusto parásito. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

Esterhazyia J.C. Mikan**Esterhazyia macrodonta** (Cham.) Benth.

Sin.: *Gerardia macrodonta* Cham.
Hierba o arbusto. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(PAR).

Esterhazyia splendida J.C. Mikan

Sin.: *Esterhazyia triflora* R.B. Moura & R.J.V. Alves, *Gerardia gnidioides* Cham. & Schltld., *Gerardia splendida* (J.C. Mikan) Kuntze

Subarbusto parásito. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA).

Euphrasia L.**Euphrasia adenonota** I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 2800-3200 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Euphrasia andicola Benth.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO, MAU, ARA).

Euphrasia antarctica Benth.

Sin.: *Euphrasia piossekii* Descole & Borsini
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(JUJ, NEU, SCR, SJU, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Euphrasia chrysantha Phil.

Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Euphrasia cockayniana Petrie

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: CHL(AIS, MAG).

Euphrasia flavicans Phil.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ARA, LRI, LLA, AIS).

Euphrasia formosissima Skottsbo.

subsp. **cucharensis** Danton & C. Perrier
Subarbusto. Endémica. 1000-1300 m.
Países: CHL(JFE).

Euphrasia formosissima Skottsbo.

subsp. **formosissima**
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Euphrasia intricata Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(BIO).

Euphrasia meiantha Clos

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Euphrasia muscosa Phil.

Hierba. Endémica. 1200 m.
Países: CHL(LLA, AIS).

Euphrasia perpusilla Phil.

Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(LLA).

Euphrasia philippii Wettst.

Sin.: *Euphrasia montana* Phil.,
Euphrasia picta Phil.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(BIO, ARA).

Euphrasia subexserta Benth.

Hierba. Endémica. 500-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Euphrasia trifida Poepp. ex Benth.

Sin.: *Euphrasia aurea* F. Phil., *Euphrasia caespitosa* Phil., *Euphrasia spectabilis* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2200 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Euphrasia villaricensis Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(LLA).

Melasma P.J. Bergius**Melasma melampyroides** (Rich.)

Pennell
Sin.: *Alectra aspera* (Cham. & Schltld.)
L.O. Williams, *Alectra brasiliensis*
Benth., *Alectra fluminensis* (Vell.)
Stearn, *Alectra melampyroides* (Rich.)
Kuntze, *Glossostylis aspera* Cham. &
Schltld., *Melasma brasiliensis* (Benth.)
Chodat & Hassl., *Melasma stricta*
(Benth.) Hassl. var. *uninerve* Hassl.,
Nigrina melampyroides (Rich.) Kuntze,
Pedicularis melampyroides Rich.,
Scrophularia fluminensis Vell.
Hierba parásita. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, MIE, PAI).

Melasma rhinanthoides (Cham.) Benth.

Sin.: *Nigrina rhinanthoides* (Cham.)
Kuntze, *Physocalyx rhinanthoides* Cham.
Hierba parásita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU,
COA, GUA). URY(RNO, ROC, TAC, TYT).

Melasma stricta (Benth.) Hassl.

Sin.: *Alectra stricta* Benth.
Hierba parásita. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área
del proyecto). PRY(AMA, CAU, SPE).

Neobartsia Uribe-Convers & Tank**Neobartsia australis** (Molau) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia australis* Molau
Hierba. Nativa. 2700-4300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Neobartsia chilensis (Benth.) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia chilensis* Benth.
Hierba. Endémica. 300-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Neobartsia crenoloba (Wedd.) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia crenoloba* Wedd.
Hierba. Nativa. 1200-4400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Neobartsia elongata (Wedd.) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia curtiflora* Edwin, *Bartsia elongata* Wedd., *Bartsia fiebrigii* Diels, *Bartsia simulans* Edwin, *Neobartsia fiebrigii* (Diels) Uribe-Convers & Tank
Hierba. Nativa. 1500-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU).

Neobartsia jujuyensis (Cabrera & Botta) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia jujuyensis* Cabrera & Botta
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Neobartsia mutica (Kunth) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia hispida* Benth., *Bartsia mutica* (Kunth) Benth., *Euphrasia mutica* Kunth
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Neobartsia pauciflora (Molau) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia pauciflora* Molau
Hierba. Nativa. 4600 m.
Países: ARG(SAL).

Neobartsia peruviana (Walp.) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia meyeniana* Benth., *Bartsia peruviana* Walp., *Bartsia subinclusa* Benth.
Hierba. Nativa. 1100-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP).

Neobartsia serrata (Molau) Uribe-Convers & Tank

Sin.: *Bartsia serrata* Molau
Subarbusto. Nativa. 2300-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Orobanche L.**Orobanche chilensis** (Phil.) Beck

Sin.: *Myzorrhiza chilensis* Phil.
Hierba parásita. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Orobanche minor Sm.

Hierba parásita. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Orobanche ramosa L.

Hierba parásita. Introducida. 0-900 m.
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, RME).

Orobanche tarapacana Phil.

Hierba parásita. Endémica. 0-2800 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Parentucellia Viv.**Parentucellia latifolia** (L.) Caruel

Sin.: *Euphrasia latifolia* L.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Velloziella Baill.**Velloziella westermanii** Dusén

Hierba. Endémica. 500-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

OXALIDACEAE

Oxalis L.**Oxalis adenophylla** Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Acetosella adenophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella bustillosii* (Phil.) Kuntze, *Oxalis bustillosii* Phil., *Oxalis bustillosii* Phil. var. *biflora* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Oxalis alstonii Lourteig

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxalis arbuscula Barnéoud

Sin.: *Acetosella arbuscula* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella fruticula* (Phil.) Kuntze, *Oxalis fruticula* Phil.
Subarbusto. Endémica. 600-1200 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Oxalis arenaria Bertero ex Colla

Sin.: *Oxalis araucana* Reiche, *Oxalis biglandulosa* Steud., *Oxalis hyalinorhiza* Poepp. ex R. Knuth
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Oxalis argentina R. Knuth

Sin.: *Oxalis bipartita* A. St.-Hil. var. *alpina* Griseb., *Oxalis catamarcensis* R. Knuth, *Oxalis lilloi* Hicken
Hierba. Nativa. 900-3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Oxalis articulata Savigny subsp. **articulata**

Sin.: *Acetosella articulata* (Savigny) Kuntze, *Acetosella platensis* (A. St.-Hil. & Naudin) Kuntze, *Oxalis articulata* Savigny subsp. *nodulosa* Beauverd & Felipp., *Oxalis articulata* Savigny var. *hirsuta* Progel, *Oxalis articulata* Savigny var. *sericea* Progel, *Oxalis canterai* Arechav., *Oxalis dumicola* Arechav., *Oxalis floribunda* Lehm. subsp. *floribunda*, *Oxalis guttata* Osten ex Arechav., *Oxalis halophila* Arechav., *Oxalis lasiopetala* Zucc. var. *pubescens* Progel, *Oxalis lasiophylla* A. St.-Hil. & Naudin, *Oxalis monticola* Arechav. var. *sericea* R. Knuth, *Oxalis platensis* A. St.-Hil. & Naudin, *Oxalis pseudostipulata* Arechav., *Oxalis rivalis* Arechav., *Oxalis sericea* (Progel) Arechav., comb. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, RME). PRY(COA, GUA, MIE, PAD). URY(CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

Oxalis articulata Savigny subsp.**rubra** (A. St.-Hil.) Lourteig

Sin.: *Acetosella rubra* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis rubra* A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, MON, SAO, SOR, TAC).

Oxalis atacamensis Reiche

Sin.: *Acetosella trichocalyx* (Phil.) Kuntze,
Oxalis trichocalyx Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Oxalis aureoflava Steud.

Sin.: *Acetosella aureoflava* (Steud.)
Kuntze, *Oxalis corniculata* L. var.
aureoflava (Steud.) Guncel, *Xanthoxalis*
aureoflava (Steud.) Holub
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS).

Oxalis barrelieri L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxalis benjaminii Lourteig

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, APY, CAU).

Oxalis bifrons Progel subsp. **bifrons**

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

Oxalis bifrons Progel subsp. **littoralis**

Lourteig
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Oxalis bipartita A. St.-Hil. subsp. **bipartita**

Sin.: *Oxalis biloba* Fredr., *Oxalis*
bipartita A. St.-Hil. f. *bulbifera* Arechav.,
Oxalis bipartita A. St.-Hil. f. *limnophila*
Arechav., *Oxalis bipartita* A. St.-Hil. f.
linearifolia Arechav., *Oxalis bipartita*
A. St.-Hil. f. *majorina* Arechav., *Oxalis*
bipartita A. St.-Hil. f. *minor* Arechav.,
Oxalis limnophila (Arechav.) Herter,
Oxalis tubaraensis R. Knuth
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(GUA, MIE). URY(TAC).

Oxalis bipartita A. St.-Hil. subsp. **pabstii** Lourteig

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

Oxalis bisecta Norlind

Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxalis bisfracta Turcz.

Sin.: *Oxalis breviramulosa* Rusby
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Oxalis brasiliensis Lodd., G. Lodd. & W. Lodd. ex Hildebr.

Sin.: *Oxalis macachin* Arechav., *Oxalis*
maldonadoensis R. Knuth, *Oxalis pudica*
R. Knuth
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). URY(CAS, COL, DUR, FLA,
LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO,
SJO, SOR, TAC, TYT).

Oxalis bulbocastanum Phil.

Sin.: *Oxalis breana* Phil., *Oxalis*
occidentalis R. Knuth, *Oxalis thyrsoides*
Reiche
Hierba. Nativa. 200-700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Oxalis caesia Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Oxalis calachaccensis R. Knuth

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Oxalis chachahuensis Alfonso, Prina & Muiño

Hierba. Endémica. 1300-1700 m.
Países: ARG(MEN).

Oxalis cinerea Zucc.

Sin.: *Acetosella lineata* (Gillies ex
Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella*
pearcei (Phil.) Kuntze, *Acetosella*
spodiophylla (Walp.) Kuntze, *Oxalis*
alfalfalis Phil., *Oxalis besseri* R.
Knuth, *Oxalis fernandensis* R. Knuth,
Oxalis gracilinvosa R. Knuth, *Oxalis*
lineata Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis*
niveiphylla R. Knuth, *Oxalis pearcei*
Phil., *Oxalis spodiophylla* Walp., *Oxalis*
spodiophylla Walp. var. *microphylla* Walp.
Subarbusto. Endémica. 1000-2700 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,
LBO, MAU, ARA, RME).

Oxalis clandestina Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LLA).

Oxalis colchaguensis Lourteig

Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, RME).

Oxalis compacta Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Acetosella berteroa* (Barnéoud)
Kuntze, *Acetosella compacta* (Gillies

ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella*
falconiana (Steud.) Kuntze, *Acetosella*
gayana (Phil.) Kuntze, *Acetosella*
pachyphylla (Phil.) Kuntze, *Acetosella*
platypila (Gillies ex Hook. & Arn.)
Kuntze, *Oxalis berteroa* Barnéoud,
Oxalis berteroa Barnéoud var. *uniflora*
Phil., *Oxalis chaetocalyx* Phil., *Oxalis*
compacta Gillies ex Hook. & Arn. subsp.
berteroa (Barnéoud) Lourteig, *Oxalis*
falconiana Steud., nom. inval., *Oxalis*
gayana Phil., *Oxalis gilliesii* Phil., *Oxalis*
josephii R. Knuth, *Oxalis landbeckii*
Phil., *Oxalis macrorrhiza* Gillies ex
Hook. & Arn., *Oxalis pachyphylla* Phil.,
Oxalis peraltae Phil., *Oxalis pastorei*
Hicken, *Oxalis platypila* Gillies ex
Hook. & Arn., *Oxalis pumila* Phil., hom.
illeg., *Oxalis reichei* R. Knuth, *Oxalis*
uspallatensis R. Knuth
Hierba. Endémica. 1600-4300 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU,
RNE, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Oxalis confertissima A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Oxalis conorrhiza Jacq.

Sin.: *Acetosella caespitosa* (A. St.-Hil.)
Kuntze, *Acetosella chrysantha* (Progel)
Kuntze, *Acetosella cineracea* (A. St.-
Hil.) Kuntze, *Acetosella commersonii*
(Pers.) Kuntze, *Acetosella conorrhiza*
(Jacq.) Kuntze, *Acetosella megapotamica*
(Spreng.) Kuntze, *Oxalis andicola* Gillies
ex Hook. & Arn., *Oxalis andicola* Gillies
ex Hook. & Arn. var. *wallichiana* Gillies
ex Hook. & Arn., *Oxalis brevipes* Fredr.,
Oxalis caespitosa A. St.-Hil., *Oxalis*
chrysantha Progel, *Oxalis chrysantha*
Progel var. *pusilla* Progel, *Oxalis*
cineracea A. St.-Hil., *Oxalis commersonii*
Pers., nom. superfl., *Oxalis conorrhiza*
Larrañaga, *Oxalis cordobensis* R. Knuth
var. *humilior* R. Knuth, *Oxalis cordobensis*
R. Knuth, *Oxalis corniculata* L. var.
serpens R. Knuth, *Oxalis hassleriana*
Chodat, *Oxalis linnaeiformis* R. Knuth,
Oxalis megapotamica Spreng., *Oxalis*
repens Thunb. f. *uniflora* Hieron. &
Lorentz ex R. Knuth, nom. nud., *Oxalis*
sexenata Savigny, *Xanthoxalis chrysantha*
(Progel) Holub, *Xanthoxalis commersonii*
(Pers.) Holub, *Xanthoxalis cordobensis* (R.
Knuth) Holub

Hierba. Nativa. 0-3600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN,

MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA,
AMA, CAU, CEN, CON, COA, MIE,
PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR,
FLO, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO,
SOR, TAC).

Oxalis corniculata L. var.
atropurpurea Planch.

Sin.: *Oxalis corniculata* L. var.
purpurascens Speg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MEN).
CHL(COQ, RME, JFE). URY(MON).

Oxalis corniculata L. var. **corniculata**

Sin.: *Acetosella corniculata* (L.)
Kuntze var. *repens* (Thunb.) Kuntze,
Acetosella corniculata (L.) Kuntze,
Oxalis steudeliana R. Knuth, *Xanthoxalis*
corniculata (L.) Small

Hierba. Cosmopolita. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU,
SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE, IPA).
PRY(APA, CEN, COA, GUA). URY(ART,
CLA, MAL, MON, PAY, SOR).

Oxalis cotagaitensis R. Knuth

Hierba. Nativa. 2200-3300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Oxalis cratensis Oliv. var. **cratensis**

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CON).

Oxalis cratensis Oliv. var.

paraguayensis (R. Knuth) Lourteig

Sin.: *Oxalis barrelieri* L. subsp.
paraguayensis R. Knuth, *Oxalis divaricata*
Mart. ex Zucc. f. *scandens* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, AMA, CAU, CON, SPE).

Oxalis cytisoides C. Mart. & Zucc.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxalis debilis Kunth

Sin.: *Acetosella debilis* (Kunth) Kuntze,
Acetosella martiana (Zucc.) Kuntze, *Ionoxalis*
martiana (Zucc.) Small, *Oxalis bulbifera*
Herter, *Oxalis corymbosa* DC., *Oxalis debilis*
Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig, *Oxalis*
macrophylla Kunth, *Oxalis martiana* Zucc.,
Oxalis urbica A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SJU,
SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(JFE). PRY(APA, CAA, CEN, GUA,
MIE). URY(DUR, MON, SJO).

Oxalis dumetorum Barnéoud

Sin.: *Acetosella dumetorum* (Barnéoud)
Kuntze, *Oxalis hookeriana* Pohl ex
Progel, *Oxalis lechleri* Steud., *Oxalis*
prorepens Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA).

Oxalis enneaphylla Cav.

Sin.: *Acetosella enneaphylla* (Cav.)
Kuntze, *Oxalis cunninghamii* R. Knuth,
Oxalis enneaphylla Cav. subsp. *ibari*
(Phil.) Lourteig, *Oxalis enneaphylla* Cav.
var. *patagonica* (Speg.) Skottsbo., *Oxalis*
enneaphylla Cav. var. *pumila* (d'Urv.)
Hook., *Oxalis frigida* R. Knuth, *Oxalis*
ibari Phil., *Oxalis patagonica* Speg.,
Oxalis pumila d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Oxalis eremobia Phil.

Sin.: *Oxalis inesitae* Phil.
Hierba. Endémica. 2100-3300 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Oxalis ericoides R. Knuth

Subarbusto. Endémica. 1500-3000 m.
Países: CHL(ANT).

Oxalis eriocarpa DC.

Sin.: *Acetosella amara* (A. St.-Hil.)
Kuntze, *Oxalis amara* A. St.-Hil. var.
grandiflora R. Knuth, *Oxalis amara* A.
St.-Hil., *Oxalis uruguaycola* Herter,
Trifolium magellanicum Poir., *Xanthoxalis*
amara (A. St.-Hil.) Holub

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(ITA). URY(CAS, CLA,
COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY,
RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

Oxalis eriolepis Wedd.

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Oxalis erosa R. Knuth f. **erosa**

Sin.: *Oxalis pinoensis* R. Knuth
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL,
SDE, TUC). BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, CON).

Oxalis erosa R. Knuth f. **rosea**

Lourteig
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CON).

Oxalis erythrorhiza Gillies ex Hook.
& Arn.

Sin.: *Acetosella bryoides* (Phil.) Kuntze,
Acetosella erythrorhiza (Gillies ex Hook.
& Arn.) Kuntze, *Oxalis bryoides* Phil.,
Oxalis guessfeldtii R. Knuth, *Oxalis*
hosseana R. Knuth, *Oxalis riojana*
Hieron. ex R. Knuth

Hierba. Endémica. 1500-4300 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN,
NEU, RNE, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ,
LBO, MAU, RME).

Oxalis famatinae R. Knuth subsp.
famatinae

Sin.: *Oxalis contracta* R. Knuth, *Oxalis*
hossei R. Knuth, *Oxalis schickendantzii* R.
Knuth

Hierba. Endémica. 3000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, NEU, SAL,
SJU, TUC).

Oxalis famatinae R. Knuth subsp.
sanjuaninae Lourteig

Sin.: *Oxalis frutescens* L. subsp.
pentantha (Jacq.) Lourteig
Hierba. Endémica. 1300-3000 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Oxalis floribunda Lehm. subsp.

ostenii (Arechav.) Lourteig
Sin.: *Acetosella praecox* (Progel) Kuntze,
Oxalis ostenii Arechav., *Oxalis praecox*
Progel, *Oxalis sorianensis* R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS,
SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, MIE).
URY(ART, MON, PAY, RIV, SAO, SOR,
TAC, TYT).

Oxalis frutescens L.

Sin.: *Acetosella frutescens* (L.) Kuntze,
Acetosella pentantha (Jacq.) Kuntze,
Lotoxalis frutescens (L.) Small, *Oxalis*
angustifolia Kunth, *Oxalis bahiensis* Progel,
Oxalis chacoensis R. Knuth, *Oxalis descolei*
R. Knuth, *Oxalis diffusa* Pohl ex Progel,
Oxalis distans A. St.-Hil., *Oxalis frutescens*
L. subsp. *angustifolia* (Kunth) Lourteig,
Oxalis glaucifolia R. Knuth, *Oxalis herzogii*
R. Knuth, *Oxalis hispida* Mart. ex Zucc.,
Oxalis pentantha Jacq.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ,
MIS, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, CON, PHA).

Oxalis geralensis R. Knuth

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxalis gigantea Barnéoud

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Oxalis grisea A. St.-Hil. var.

mattogrossensis (Fredr.) Lourteig

Sin.: *Oxalis hassleri* R. Knuth, *Oxalis mattogrossensis* Fredr.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CON).

Oxalis gyrorrhiza Bertero ex Colla

Sin.: *Acetosella gyrorrhiza* (Bertero ex Colla) Kuntze, *Oxalis autumnalis* Poepp. ex Progel, nom. illeg., *Oxalis radicans* Ruiz & Pav. ex R. Knuth
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Oxalis hedysarifolia Raddi

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA). PRY(AMA).

Oxalis hepatica Norlind

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Oxalis hispidula Zucc.

Sin.: *Acetosella hispidula* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis canelonesensis* R. Knuth, *Oxalis paraguayensis* Chodat, *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *alfa* Chodat, nom. inval., *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *beta* Chodat, nom. inval., *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *pauciflora* R. Knuth, *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *pluriflora* R. Knuth, nom. illeg., *Oxalis paraguayensis* Chodat var. *typica* R. Knuth, nom. inval., *Oxalis uruguayensis* Arechav., *Oxalis venustula* Arechav.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, MIE, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, SAO, SJO).

Oxalis holosericea Phil.

Sin.: *Acetosella holosericea* (Phil.) Kuntze, *Oxalis holosericea* Phil. f. *pedunculata* Chodat & Wilczek, *Oxalis pedunculata* (Chodat & Wilczek) Lourteig
Hierba. Endémica. 2500-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(LBO, MAU).

Oxalis hyalotricha Lourteig

Sin.: *Oxalis propinqua* R. Knuth, nom. illeg.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, MIS).
BRA(PAR). PRY(APA, AMA).

Oxalis hypsophila Phil.

Sin.: *Oxalis coyensis* R. Knuth, *Oxalis exigua* Phil., *Oxalis fluehmannii* Phil., *Oxalis leptocaulos* Phil., *Oxalis microphylla* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 2600-5000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Oxalis incana Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(RME).

Oxalis irreperta Lourteig

Hierba. Nativa. 600-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxalis johnstonii R. Knuth

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Oxalis laciniata Cav.

Sin.: *Acetosella laciniata* (Cav.) Kuntze, *Acetosella squamoso-radicosa* (Steud.) Kuntze, *Oxalis laciniata* Cav. var. *pubescens* (Skotts.) J.M.H. Shaw, *Oxalis prichardii* Rendle, *Oxalis squamoso-radicosa* Steud. var. *pubescens* Skotts., *Oxalis squamoso-radicosa* Steud.
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Oxalis lasiopetala Zucc.

Sin.: *Acetosella lasiopetala* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis darwinii* Ball, *Oxalis herteri* R. Knuth, *Oxalis gayi* Macloskie, *Oxalis gracillima* Arechav., *Oxalis hieronymi* Griseb., *Oxalis lasiopetala* Zucc. var. *angustiloba* Progel, *Oxalis melanopotamica* Speg., nom. nud., *Oxalis mercedensis* R. Knuth, *Oxalis pallens* R. Knuth, nom. illeg., *Oxalis pallida* Herter, *Oxalis rubra* A. St.-Hil. var. *patagonica* Hieron., *Oxalis stenophylla* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, TUC). BRA(RGS). PRY(MIE). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Oxalis latifolia Kunth subsp. **latifolia**

Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxalis latifolia Kunth subsp. **schraderiana** (Kunth) Lourteig

Sin.: *Oxalis schraderiana* Kunth
Nativa. 900-2000 m.
Países: ARG(SAL).

Oxalis laxa Hook. & Arn.

Sin.: *Acetosella cumingii* (Herb.) Kuntze, *Acetosella laxa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella micrantha* (Bertero ex Colla) Kuntze, *Acetosella platycaulis* (Steud.) Kuntze, *Acetosella puberula* (Phil.) Kuntze, *Acetosella pygmaea* (Phil.) Kuntze, comb. illeg., *Acetosella vinagrillo* (Steud.) Kuntze, *Oxalis adenocaulos* Phil., *Oxalis alsinoides* Walp., *Oxalis brevicaulis* Steud., *Oxalis campanensis* Lourteig, *Oxalis chosicensis* R. Knuth, *Oxalis cumingii* Herb., *Oxalis deflexa* Poepp. ex Progel, *Oxalis dichotomiflora* Steud., *Oxalis geranioides* R. Knuth, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *hispidissima* Barnéoud, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *major* R. Knuth, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *minor* Barnéoud, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *rigida* Barnéoud, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *violacea* R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Savi, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *alsinoides* (Walp.) R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *major* R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *purpurea* R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *setifera* R. Knuth, *Oxalis platycaulis* Steud., *Oxalis puberula* Phil., hom. illeg., *Oxalis pygmaea* Phil., hom. illeg., *Oxalis rigida* (Barnéoud) Lourteig, *Oxalis san-romani* Phil., *Oxalis torcana* Phil., *Oxalis umbellata* Kuntze ex R. Knuth, nom. nud., *Oxalis vinaqrillo* Steud., *Xanthoxalis laxa* (Hook. & Arn.) Holub, *Xanthoxalis micrantha* (Bertero ex Savi) Kuntze

Hierba. Nativa. 800-2700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Oxalis leucophylla Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA).

Oxalis lincarantha Lourteig

Sin.: *Acetosella liniflora* (Progel) Kuntze, comb. illeg., *Oxalis liniflora* Progel, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, PAI).

Oxalis lindneri R. Knuth

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COS, ERI, SFE).

Oxalis loricata Dusén

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Oxalis magellanica G. Forst.

Sin.: *Acetosella magellanica* (G. Forst.)
Kuntze, *Acetosella modesta* (Phil.)
Kuntze, *Oxalis carnososa* Molina, nom.
inval., *Oxalis cataractae* A. Cunn., *Oxalis*
lactea Hook., *Oxalis modesta* Phil., *Oxalis*
novae-zelandiae Gand.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).
CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Oxalis matancillae Lourteig

Hierba. Endémica. 100-400 m.
Países: CHL(ANT).

Oxalis megalorrhiza Jacq.

Sin.: *Oxalis borchersii* Phil., *Oxalis*
brevis Phil., *Oxalis carnososa* Molina var.
incana Reiche, *Oxalis darapskyi* Phil.
ex Reiche, *Oxalis illapelina* Phil., *Oxalis*
ornata Phil., *Oxalis paniculata* Reiche,
Oxalis paposana Phil. var. *hirta* R. Knuth,
Oxalis paposana Phil., *Oxalis reticulata*
Steud., *Oxalis succulenta* Barnéoud,
Oxalis tarapacana Phil.

Hierba. Nativa. 0-3200 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Oxalis mira Lourteig

Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: CHL(COQ).

Oxalis monticola Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MAL, MON).

Oxalis morenoensis Lourteig

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Oxalis morronei Alicia López & Múlgura

Hierba. Endémica. 2600 m.
Países: ARG(SCR).

Oxalis muscoides Phil.

Sin.: *Acetosella muscoides* (Phil.)
Kuntze, *Oxalis echegarayi* Hieron., *Oxalis*
mendozaensis R. Knuth, *Oxalis rosulata*
Hauman

Hierba. Endémica. 2800-3700 m.
Países: ARG(JUJ, MEN, SJU).

Oxalis myriophylla A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxalis nahuelhuapiensis Speg.

Sin.: *Oxalis comberi* R. Knuth
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(ARA, RME).

Oxalis neuwiedii Zucc. subsp.

pardoensis Lourteig
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Oxalis niederleiniana Hieron. ex R.

Knuth
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

Oxalis niederleinii R. Knuth

Sin.: *Oxalis amara* A. St.-Hil. var. *scabra*
Progel, *Oxalis refracta* A. St.-Hil. var.
debilis A. St.-Hil., *Oxalis refracta* A. St.-
Hil. var. *erecta* Arechav., *Oxalis refracta*
A. St.-Hil. var. *grandiflora* Briq., *Oxalis*
refracta A. St.-Hil. var. *hirsuta* Arechav.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CEN, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA,
COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY,
RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Oxalis novemfoliolata Heibl & Martic.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA).

Oxalis nubigena Walp.

Sin.: *Oxalis aetheria* J.F. Macbr.,
Oxalis leoncitisensis R. Knuth, *Oxalis*
pygmaea A. Gray, hom. illeg., *Oxalis*
yauliensis R. Knuth
Hierba. Nativa. 4000-4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Oxalis odonellii Lourteig

Subarbusto. Endémica. 1600-1700 m.
Países: BRA(SCA).

Oxalis ornithopus Phil.

Sin.: *Acetosella ornithopus* (Phil.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Oxalis ovalleana Phil.

Hierba suculenta. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Oxalis pachyrrhiza Wedd.

Hierba. Nativa. 3500-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL,
MAU, RME).

Oxalis paludosa A. St.-Hil.

Sin.: *Acetosella montevidensis* (Progel)
Kuntze, *Acetosella paludosa* (A. St.-
Hil.) Kuntze, *Oxalis corrientesensis* R.
Knuth, *Oxalis duricaulis* R. Knuth, *Oxalis*
montevidensis Progel
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS,
SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, ÑEE,
PAI). URY(ART, CLA, DUR, PAY, RNO,
ROC, SAO, SOR, TAC).

Oxalis paranaensis Lourteig

Subarbusto. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Oxalis penicillata Phil.

Hierba. Endémica. 2000-3700 m.
Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, RME).

Oxalis perdicaria (Molina) Bertero

Sin.: *Acetosella eriorrhiza* (Zucc.)
Kuntze, *Acetosella lobata* (Sims) Kuntze,
Acetosella mallobolba (Cav.) Kuntze,
Acetosella perdicaria (Molina) Kuntze,
Oxalis autumnalis A. St.-Hil., *Oxalis*
delicatula Phil., *Oxalis eriorrhiza* Zucc.,
Oxalis kurtziana Arechav., *Oxalis lobata*
Sims var. *intermedia* Herter, *Oxalis lobata*
Sims, *Oxalis mallobolba* Cav., *Oxalis tenera*
Spreng., *Sassia perdicaria* Molina
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MEN,
MIS, NEU, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
RME). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR,
FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV,
SJO, SOR).

Oxalis pes-caprae L.

Sin.: *Acetosella cernua* (Thunb.)
Kuntze, *Oxalis cernua* Thunb., *Oxalis*
grandiflora Arechav.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MEN, SJU).
BRA(Fuera del área del proyecto).
CHL(COQ, VAL, BIO, LLA, RME, JFE).
URY(MON).

Oxalis pingiculacea R. Knuth

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Oxalis platylepis Wedd.

Sin.: *Oxalis aphylla* Rusby
Hierba. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Oxalis potamophila Lourteig

Hierba. Endémica. 400-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxalis praetecta Progel

Hierba. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(PAR).

Oxalis pseudoviolacea R. Knuth

Hierba. Nativa. 2300-2600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Oxalis psoraleoides Mart. subsp. **insipida** (A. St.-Hil.) Lourteig

Sin.: *Oxalis candicans* R. Knuth, *Oxalis insipida* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Oxalis purpurea L.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(JFE).

Oxalis pycnophylla Wedd.

Sin.: *Oxalis hauthalii* R. Knuth
Hierba. Nativa. 2200-5000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT).

Oxalis refracta A. St.-Hil.

Sin.: *Acetosella amara* (A. St.-Hil.) Kuntze var. *glandulosa* Kuntze, *Acetosella refracta* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis amara* A. St.-Hil. var. *glandulosa* (Kuntze) R. Knuth, *Oxalis knuthii* Herter, *Oxalis kuntzeana* Norlind, *Oxalis subcorymbosa* Arechav., *Oxalis subcorymbosa* Arechav. var. *viscosissima* Norlind, *Oxalis uruguayensis* R. Knuth, nom. illeg., *Oxalis viscosissima* (Norlind) Cabrera, *Xanthoxalis refracta* (A. St.-Hil.) Holub
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(COL, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Oxalis renifolia R. Knuth

Sin.: *Oxalis cordifolia* R. Knuth, *Oxalis tristis* R. Knuth
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Oxalis rhombeo-ovata A. St.-Hil. subsp. **rhombeo-ovata**

Sin.: *Acetosella rhombeo-ovata* (A. St.-Hil.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA).

Oxalis rhombeo-ovata A. St.-Hil. subsp. **sustenta** Lourteig

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Oxalis ricardii Lourteig

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Oxalis riparia Norlind

Nativa. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Oxalis rosea Jacq.

Sin.: *Oxalis rosea* Jacq. var. *simplex* Reiche
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Oxalis rupestris A. St.-Hil.

Sin.: *Acetosella rupestris* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Acetosella strigulosa* (Progel) Kuntze, *Oxalis dusenii* Norlind, *Oxalis fontinalis* Osten ex Arechav., *Oxalis strigulosa* Progel
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, COA). URY(Desconocida).

Oxalis sarmentosa Zucc.

Hierba. Endémica. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Oxalis sellowiana Zucc. f. **alba** Herter

Sin.: *Oxalis sellowiana* Zucc. var. *alba* Múlgura
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, RIV, ROC, TYT).

Oxalis sellowiana Zucc. f. **sellowiana**

Sin.: *Acetosella sellowiana* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis intermedia* Herter, nom. nud., *Oxalis sellowiana* Zucc. var. *caulescens* Beauverd & Felipp., *Oxalis sellowiana* Zucc. var. *citrina* Herter, nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLO, FLA, MAL).

Oxalis sellowii Spreng. var. **alba** (Chodat) Lourteig

Sin.: *Oxalis linearis* Zucc. var. *alba* Chodat
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAN, COA, SPE).

Oxalis sellowii Spreng. var. **rosea** (Chodat) Lourteig

Sin.: *Oxalis linearis* Zucc. var. *rosea* Chodat
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Oxalis sellowii Spreng. var. **sellowii**

Sin.: *Oxalis anthyllidifolia* R. Knuth, *Oxalis linearis* Zucc. var. *graminifolia* Chodat, *Oxalis linearis* Zucc., hom. illeg. f. *graminifolia* Chodat & Hassl., *Oxalis linearis* Zucc., hom. illeg. f. *latifolia* Chodat, *Oxalis maracayuensis* R. Knuth, *Oxalis missionum* Norlind, *Oxalis nigricans* Pohl ex Progel var. *diversifolia* R. Knuth, *Oxalis pulchrifolia* R. Knuth, *Oxalis rodriguesii* R. Knuth, *Oxalis sellowii* Spreng. var. *diversifolia* R. Knuth, *Oxalis sellowii* Spreng. var. *graminifolia* (Chodat) R. Knuth, *Oxalis sellowii* Spreng. var. *latifolia* (Chodat) R. Knuth, *Oxalis tenuicalyculata* R. Knuth, *Oxalis zuccariniana* Steud.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Oxalis serpens A. St.-Hil. var. **catharinensis** Lourteig

Hierba. Endémica. 900-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Oxalis serpens A. St.-Hil. var. **serpens**

Hierba. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Oxalis sleumeri Lourteig

Hierba. Endémica. 4000-5000 m.
Países: ARG(CAT, SAL).

Oxalis spiralis Ruiz & Pav. ex G. Don subsp. **membranifolia** (R. Knuth) Lourteig

Sin.: *Oxalis membranifolia* R. Knuth
Hierba. Nativa. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Oxalis squamata Zucc.

Sin.: *Acetosella geminata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella macropus* (Phil.) Kuntze, *Acetosella polyantha* (Walp.) Kuntze, *Acetosella squamata* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis chilensis* R. Knuth, *Oxalis geminata* Hook. & Arn., *Oxalis hirthii* Phil., *Oxalis macropus* Phil., *Oxalis polyantha* Walp., *Oxalis trichocalyx* Steud., *Xanthoxalis polyantha* (Walp.) Holub
Hierba. Endémica. 1000-3200 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Oxalis squarrosa Barnéoud

Sin.: *Acetosella coquimbana* (Phil.) Kuntze, *Acetosella glutinosa* (Phil.) Kuntze, *Acetosella squarrosa* (Barnéoud) Kuntze, *Oxalis briquetii* R. Knuth, *Oxalis coquimbana* Phil., *Oxalis glutinosa* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1000-2800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Oxalis strictula Steud.

Sin.: *Oxalis aberrans* Reiche
Hierba. Endémica. 500-1200 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Oxalis subacaulis Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Oxalis llaletensis* R. Knuth, *Oxalis minutula* Ces., *Oxalis parva* R. Knuth, *Oxalis tenera* Phil.
Hierba. Endémica. 1600-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

Oxalis subvillosa Norlind

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Oxalis tacorensis B.L. Burt

Hierba. Nativa. 4200-5100 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Oxalis telmatica Lourteig

Hierba. Endémica. 1100-1300 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Oxalis tenerrima R. Knuth

Sin.: *Oxalis schwackei* R. Knuth
Hierba. Nativa. 0-1900 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Oxalis tortuosa Lindl.

Sin.: *Oxalis bridgesii* Bertero ex Colla, *Oxalis gaudichaudii* Barnéoud, *Oxalis glomerata* Hook. & Arn., *Oxalis maritima* Barnéoud, *Oxalis zonata* Liebm.
Hierba suculenta. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, JFE).

Oxalis triangularis A. St.-Hil. subsp. **papilionacea** (Hoffmanns. ex Zucc.) Lourteig

Sin.: *Acetosella papilionacea* (Hoffmanns. ex Zucc.) Kuntze, *Acetosella regnellii* (Miq.) Kuntze, *Oxalis catharinensis* N.E. Br., *Oxalis palustris* A. St.-Hil., *Oxalis papilionacea* Hoffmanns. ex Zucc., *Oxalis regnellii* Miq., *Oxalis regnellii* Miq. var. *catharinensis* (N.E. Br.) Norlind, *Oxalis triangularis* A. St.-Hil. f. *glabrifolia* Chodat, *Oxalis venturiana* R. Knuth, *Oxalis vernalis* Fredr. ex Norlind

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Oxalis triangularis A. St.-Hil. subsp. **triangularis**

Sin.: *Acetosella triangularis* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Oxalis delta* Vell., *Oxalis tenuis* R. Knuth
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SJU).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Oxalis trollii R. Knuth

Sin.: *Oxalis elegans* R. Knuth var. *subuniflora* Griseb., *Oxalis elegantula* R. Knuth, nom. illeg., *Oxalis pinguiculiflora* R. Knuth
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Oxalis tuberosa Molina

Sin.: *Acetosella tuberosa* (Molina) Kuntze, *Oxalis arracacha* G. Don, *Oxalis chichigastensis* R. Knuth, *Oxalis melilotoides* Zucc. var. *argentina* Griseb., *Xanthoxalis tuberosa* (Molina) Holub
Hierba suculenta. Nativa. 1200-2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Oxalis valdiviensis Barnéoud

Sin.: *Acetosella antucensis* (Phil.) Kuntze, *Acetosella hapalconidea* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella valdiviensis* (Barnéoud) Kuntze, *Oxalis antucensis* Phil., *Oxalis berningeri* R. Knuth, *Oxalis capillipes* R. Knuth, *Oxalis chubutensis* Speg. ex R. Knuth, *Oxalis hapalconidea* Barnéoud, *Oxalis illini* R. Knuth, *Oxalis negrensis* R. Knuth, *Oxalis tinctoria* Poepp. ex Progel, *Oxalis tolguacensis* R. Knuth, *Oxalis valdiviana* Vilm., *Oxalis valdiviensis* Barnéoud var. *antucensis* (Phil.) Reiche, *Oxalis valdiviensis* Barnéoud var. *humilis* Speg., *Xanthoxalis valdiviensis* (Barnéoud) Holub
Hierba. Endémica. 1000-1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Oxalis virgosa Molina

Sin.: *Acetosella subcarnosa* (Klotzsch ex Walp.) Kuntze, *Acetosella virgosa* (Molina) Kuntze, *Oxalis subcarnosa* Klotzsch ex Walp.
Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Oxalis yacutulensis R. Knuth

Sin.: *Oxalis elegans* R. Knuth var. *macrophylla* Griseb.
Hierba. Endémica. 500-1600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

PAPAVERACEAE

Argemone L.**Argemone crassifolia** G.B. Ownbey

Hierba. Endémica. 1300 m.
Países: CHL(ATA).

Argemone hunnemannii Otto & A. Dietr.

Sin.: *Argemone burkartii* Sorarú, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *chilensis* Prain, p.p., *Argemone platyceras* Link & Otto var. *hunnemannii* (Otto & A. Dietr.) Fedde
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(COR, LPA, MEN, SLU).
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Argemone rosea Hook.

Sin.: *Argemone mexicana* L. var. *rosea* (Hook.) Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *spinosa* Barnéoud ex Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *tomentosa* Barnéoud ex Reiche, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *chilensis* Prain, p.p., *Argemone platyceras* Link & Otto var. *hispido-rosea* Fedde
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Argemone subfusiformis G.B. Ownbey

Sin.: *Argemone mexicana* L. var. *glauca* Barnéoud ex Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *gynophora* (Fedde) J.F. Macbr., *Argemone mexicana* L. var. *subinermis* (Fedde) Sorarú, *Argemone subfusiformis* G.B. Ownbey subsp. *subinervis* (Fedde) G.B. Ownbey
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APY, CEN, PAI). URY(COL, MON, RNO).

Bocconia L.**Bocconia integrifolia** Bonpl.

Sin.: *Bocconia frutescens* L. var. *integrifolia* (Humb. & Bonpl.) Kuntze, *Bocconia macbrideana* Standl., *Bocconia pearcei* Hutch., *Bocconia pubibractea* Hutch. Arbolito. Nativa. 1000-3000 m. Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Chelidonium L.**Chelidonium majus** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE). BRA(SCA).

Eschscholzia Cham.**Eschscholzia californica** Cham.

Sin.: *Eschscholzia caespitosa* Benth., *Eschscholzia compacta* Steud., *Eschscholzia crocea* Benth., *Eschscholzia douglasii* Benth., hom. illeg., *Eschscholzia hypocoides* Benth., *Eschscholzia rosea* Hort., *Eschscholzia tenuifolia* Benth., *Eschscholzia tenuisecta* Greene Hierba. Introducida. 0-2500 m. Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, LPA, NEU, RNE, SLU, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Fumaria L.**Fumaria agraria** Lag.

Sin.: *Fumaria agraria* Lag. var. *chilensis* Parl. Hierba. Introducida. 0-1700 m. Países: ARG(BAI, COR, SDE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Fumaria bastardii Boreau

Sin.: *Fumaria media* Loisel., p.p. Hierba. Introducida. 0-500 m. Países: ARG(BAI, ERI).

Fumaria capreolata L.

Sin.: *Fumaria capreolata* L. f. *sciophila* Ruiz Leal Hierba. Introducida. 0-1800 m. Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA). URY(MON).

Fumaria densiflora DC.

Hierba. Introducida. 0-500 m. Países: ARG(COR, MEN, SJU). CHL(VAL).

Fumaria muralis Sond. ex W.D.J. Koch

Hierba. Introducida. 0-200 m. Países: CHL(VAL).

Fumaria officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m. Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MEN, RNE, SAL, SFE, SLU, TDF, TUC). CHL(VAL). URY(MON).

Fumaria parviflora Lam.

Hierba. Introducida. 0-1500 m. Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, RME).

Fumaria rostellata Knaf

Hierba. Introducida. . Países: CHL(VAL).

Glaucium Mill.**Glaucium corniculatum** (L.) Rudolph

Sin.: *Chelidonium corniculatum* L. Hierba. Introducida. 0-500 m. Países: ARG(COR, LPA, SLU).

Glaucium flavum Crantz

Hierba. Introducida. 500-1000 m. Países: ARG(CHU).

Papaver L.**Papaver dubium** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m. Países: ARG(BAI, MEN). CHL(MAG). URY(CAS, MON).

Papaver hybridum L.

Hierba. Introducida. 0-900 m. Países: ARG(BAI, LPA). CHL(VAL, RME).

Papaver nudicaule L.

Hierba. Introducida. 0-500 m. Países: ARG(TDF).

Papaver rhoeas L.

Hierba. Introducida. 0-900 m. Países: ARG(BAI, LPA, MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, LLA, RME). URY(CAS).

Papaver somniferum L.

Hierba. Introducida. 0-800 m. Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, NEU, RNE, TDF). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LRI, MAG, RME, JFE). URY(CAS, MON, PAY).

PASSIFLORACEAE**Passiflora L.****Passiflora actinia** Hook.

Sin.: *Passiflora paulensis* Killip Liana. Nativa. 700-1600 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Passiflora alata Curtis

Sin.: *Passiflora latifolia* DC. Liana. Nativa. 0-1600 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, COA).

Passiflora amethystina J.C. Mikan

Sin.: *Passiflora bangii* Mast. ex Rusby, *Passiflora laminensis* Barb. Rodr., *Passiflora lilacina* Roem., *Passiflora onychina* Lindl., *Passiflora violacea* Vell. Liana. Nativa. 0-2500 m. Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, GUA, ÑEE, PHA, SPE).

Passiflora caerulea L.

Sin.: *Passiflora caerulea* L. var. *angustifolia* Don, *Passiflora caerulea* L. var. *glauca* Mast., *Passiflora caerulea* L. var. *glaucophylla* Don, *Passiflora caerulea* L. var. *imbricata* Mast., *Passiflora caerulea* L. var. *regnellii* Mast. Liana. Nativa. 0-1400 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, RME). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC).

Passiflora campanulata Mast.

Enredadera. Nativa. 700-1600 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora capsularis L.

Sin.: *Passiflora hassleriana* Chodat, *Passiflora hassleriana* Chodat var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Passiflora hassleriana* Chodat var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Passiflora paraguayensis* Chodat, *Passiflora piligera* Gardner Enredadera. Nativa. 0-1800 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Passiflora catharinensis Sacco

Enredadera. Endémica. 1200-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora cervii Milward de Azevedo

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Passiflora chrysophylla Chodat

Sin.: *Passiflora australis* Chodat & Hassl., *Passiflora chrysophylla* Chodat f. *apaensis* Chodat & Hassl., *Passiflora chrysophylla* Chodat var. *concepcionis* Chodat & Hassl., *Passiflora chrysophylla* Chodat var. *hastata* Chodat, *Passiflora chrysophylla* Chodat var. *sericea* Chodat & Hassl., *Passiflora chrysophylla* Chodat f. *solanacea* Chodat & Hassl., *Passiflora foetida* L. var. *vitacea* Mast., *Passiflora foetida* L. var. *vitacea* Mast.

Liana. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON, RIV, SAO, TAC).

Passiflora cincinnata Mast.

Sin.: *Passiflora cincinnata* Mast. var. *imbricata* Chodat & Hassl.

Liana. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, NAS, PAI, PHA, SPE).

Passiflora edulis Sims

Sin.: *Passiflora pomifera* Roem.
Liana. Nativa. 200-700 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI).

Passiflora eichleriana Mast.

Sin.: *Passiflora violacea* Vell. f. *albiflora* Chodat & Hassl.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CON).

Passiflora elegans Mast.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS, SCA). URY(SAO).

Passiflora foetida L. var. **fluminensis** (M. Roem.) Killip

Sin.: *Dysosmia fluminensis* Roem.
Liana. Endémica. 100-800 m.
Países: BRA(SCA).

Passiflora foetida L. var. **foetida**

Sin.: *Passiflora foetida* L. var. *balansae* Chodat, *Passiflora foetida* L. var. *gardneri* Killip, *Passiflora foetida* L. var. *nigelliflora* (Hook.) Mast., *Passiflora foetida* L. var. *sericea* Chodat & Hassl., *Passiflora nigelliflora* Hook.

Liana. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

Passiflora giberti N.E. Br.

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Passiflora haematostigma Mart. ex Mast.

Liana. Nativa. 400-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora jilekii Wawra

Sin.: *Passiflora colorata* Mast.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora lepidota Mast.

Liana. Nativa. 100-1100 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Passiflora loefgrenii Vitta

Sin.: *Passiflora amethystina* J.C. Mikan var. *bolosii* Cervi
Liana. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora longilobis Hoehne

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Passiflora mendoncae Harms

Enredadera. Nativa. 700-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora miersii Mast.

Enredadera. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Passiflora misera Kunth

Sin.: *Passiflora laticaulis* Killip, *Passiflora maximiliana* Bory, *Passiflora maximiliana* Bory var. *acutiloba* Chodat, *Passiflora maximiliana* Bory var. *expansa* Chodat & Hassl., *Passiflora maximiliana* Bory var. *retusa* Chodat & Hassl.,

Passiflora microcarpa Mast., *Passiflora retusa* Hook., *Passiflora translinearis* Rusby

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(SAO).

Passiflora mooreana Hook. f.

Sin.: *Passiflora tweediana* Speg., nom. nud.
Liana. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

Passiflora morifolia Mast.

Sin.: *Passiflora dumetosa* Barb.
Rodr., *Passiflora erosa* Rusby, *Passiflora warmingii* Mast. subsp. *chacoensis* R.E. Fr., *Passiflora warmingii* Mast.
Liana. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI).

Passiflora oerstedii Mast.

Sin.: *Passiflora rojasii* Hassl. ex Harms
Enredadera. Nativa. 100-300 m.
Países: PRY(AMA, CAN).

Passiflora organensis Gardner

Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Passiflora palmatisecta Mast.

Enredadera. Nativa. 200-800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Passiflora pinnatistipula Cav.

Sin.: *Passiflora chilensis* Miers, *Tacsonia pinnatistipula* Juss., *Tacsonia purupuru* DC. ex Mast.
Liana. Nativa. 2500-3000 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Passiflora pohlii Mast.

Enredadera. Nativa. 100-400 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Passiflora reitzii Sacco

Enredadera. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(SCA).

Passiflora rotundifolia L.

Enredadera. Nativa. 0-300 m.
Países: PRY(CAN).

Passiflora setulosa Killip
Liana. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Passiflora suberosa L. subsp. **litoralis**
(Kunth) Port.-Utl. ex M.A.M. Azevedo,
Baumgratz & Gonç.-Estev.
Sin.: *Passiflora flexuosa* Gardner,
Passiflora littoralis Kunth
Liana. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,
APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA,
GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

Passiflora tenuifila Killip
Liana. Nativa. 200-2400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, JUJ,
MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA,
PAI, PHA, SPE).

Passiflora transversalis Milward de
Azevedo
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Passiflora tricuspis Mast.
Sin.: *Passiflora tricuspis* Mast. var.
brevifolia Chodat & Hassl.
Liana. Nativa. 200-400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).

Passiflora truncata Regel
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Passiflora tucumanensis Hook.
Sin.: *Passiflora naviculata* Griseb.,
Passiflora tucumanensis Hook. var.
naviculata (Griseb.) Hicken
Liana. Nativa. 200-2800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI,
MIS, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, PAI).

Passiflora umbilicata (Griseb.) Harms
Sin.: *Tacsonia umbilicata* Griseb.
Liana. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Passiflora urnifolia Rusby
Liana. Nativa. 200-2500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI).

Passiflora urubiciensis Cervi
Enredadera. Endémica. 400-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Passiflora villosa Vell.
Enredadera. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

PENTAPHYLACACEAE

Ternstroemia Mutis ex L.f.

Ternstroemia brasiliensis Cambess.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ternstroemia congestiflora Triana &
Planch.
Árbol. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(SAL).

PERACEAE

Pera Mutis

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Sin.: *Pera ferruginea* (Schott) Müll.
Arg., *Peridium glabratum* Schott,
Peridium ferrugineum Schott, *Peridium*
oblongifolium Benth.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pera obovata (Klotzsch) Baill.
Sin.: *Peridium obovatum* Klotzsch
Árbol. Nativa. 300-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

PHILESIACEAE

Lapageria Ruiz & Pav.

Lapageria rosea Ruiz & Pav.
Enredadera. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA).

Philesia Comm. ex Juss.

Philesia magellanica J.F. Gmel.
Sin.: *Philesia buxifolia* Lam.
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LRI,
LLA, AIS, MAG).

PHRYMACEAE

Erythranthe Spach

Erythranthe bridgesii (Benth.) G.L.
Nesom

Sin.: *Mimulus acutidens* Reiche,
Mimulus bridgesii (Benth.) Clos, *Mimulus*
bridgesii (Benth.) Clos var. *integrifolia*
Clos, *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos var.
stoloniformis Clos, *Mimulus crinitus* A.L.
Grant, *Mimulus longipes* Phil., *Mimulus*
parviflorus Lindl. var. *bridgesii* Benth.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU). CHL(VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Erythranthe depressa (Phil.) G.L.
Nesom var. **cimum** (C. Bohlen) J.M.
Watson & A.R. Flores
Sin.: *Mimulus depressus* Phil. var.
cimum C. Bohlen
Hierba. Endémica. 2900-3100 m.
Países: CHL(ATA).

Erythranthe depressa (Phil.) G.L.
Nesom var. **depressa**
Sin.: *Mimulus acaulis* Phil., *Mimulus*
depressus Phil. var. *acaulis* (Phil.) Reiche,
Mimulus depressus Phil. var. *depressus*,
Mimulus depressus Phil. var. *pissisi* (Phil.)
Reiche, *Mimulus pissisi* Phil.
Hierba. Endémica. 2000-4500 m.
Países: ARG(JUJ, MEN, SAL, SJU,
TUC). CHL(ANT, ATA, COQ).

Erythranthe glabrata (Kunth) G.L.
Nesom

Sin.: *Mimulus andicolus* Kunth,
Mimulus glabratus Kunth, *Mimulus*
glabratus Kunth var. *externus*
(Skotts.) Skotts., *Mimulus*
glabratus Kunth var. *parviflorus*
(Lindl.) Grant, *Mimulus kingii* Phil.,
Mimulus parviflorus Lindl. var.
externa Skotts., *Mimulus parviflorus*
Lindl. var. *nana* Wedd., *Mimulus*
propinquus Lindl., *Mimulus sylvaticus*
Phil., *Mimulus tener* Phil.
Hierba. Nativa. 0-4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ,
LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU,
SLU, SCR, SFE, TUC). CHL(AYP, TAR,
ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Erythranthe lutea (L.) G.L. Nesom
var. **lutea**

Sin.: *Erythranthe cuprea* (Dombrain) G.L. Nesom, *Erythranthe lacerata* (Pennell) G.L. Nesom, *Mimulus cupreus* Dombrain, *Mimulus glabratus* Kunth var. *micranthus* (Phil.) Boivin, *Mimulus laceratus* Pennell, *Mimulus luteus* L. f. *macrophyllus* Clos, *Mimulus luteus* L. var. *alpinus* Lindl., *Mimulus luteus* L. var. *cuprea* Hook., *Mimulus luteus* L. var. *luteus*, *Mimulus luteus* L. var. *micranthus* Phil., *Mimulus luteus* L. var. *nummularius* Clos, *Mimulus luteus* L. var. *rivularis* (Lodd.) Lindl., *Mimulus luteus* L. var. *younganus* Hook., *Mimulus punctatus* Miers ex Bertero, *Mimulus rivularis* Lodd.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Erythranthe lutea (L.) G.L. Nesom
var. **variegata** (Lodd.) G.L. Nesom

Sin.: *Erythranthe naiandina* (J.M. Watson & C. Bohlen) G.L. Nesom, *Mimulus luteus* L. var. *variegatus* (Lodd.) Hook., *Mimulus naiandinus* J.M. Watson & C. Bohlen, *Mimulus variegatus* Lodd.
Hierba. Endémica. 500-2700 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Erythranthe minima (C. Bohlen) J.M. Watson & A.R. Flores

Sin.: *Erythranthe acaulis* (Phil.) G.L. Nesom, p.p., *Mimulus depressus* Phil. var. *nanus* (Phil.) Reiche, *Mimulus minimus* C. Bohlen, *Mimulus nanus* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

PHYLLANTHACEAE

Hieronyma Allemão

Hieronyma alchorneoides Allemão

Sin.: *Hieronyma heterotricha* Pax & K. Hoffm., *Hieronyma mattogrossensis* Pax & K. Hoffm., *Hieronyma mollis* Müll. Arg.
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Margaritaria L. f.

Margaritaria nobilis L. f.

Sin.: *Phyllanthus nobilis* (L. f.) Müll. Arg.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, GUA, PAI, SPE).

Phyllanthus L.

Phyllanthus acuminatus Vahl

Arbusto o árbol. Nativa. 400-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Phyllanthus caroliniensis Walter
subsp. **caroliniensis**

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phyllanthus caroliniensis Walter
subsp. **guianensis** (Klotzsch) G.L. Webster

Sin.: *Phyllanthus guianensis* Klotzsch, *Phyllanthus montevidensis* Müll. Arg.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(COA).

Phyllanthus chacoensis Morong

Sin.: *Aporosella chacoensis* (Morong) Speg., *Aporosella chacoensis* (Morong) Pax & K. Hoffm., hom. illeg., *Aporosella hassleriana* Chodat
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). PRY(APY, CEN, CON, PHA).

Phyllanthus claussenii Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Phyllanthus eremitus Funez &

Hassemer
Subarbusto. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(SCA).

Phyllanthus fluitans Benth. ex Müll. Arg.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SFE). PRY(ÑEE, PHA).

Phyllanthus fraternus G.L. Webster

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Phyllanthus glaziovii Müll. Arg.

Subarbusto o arbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Phyllanthus hyssopifolioides Kunth

Hierba o arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phyllanthus lindbergii Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAU).

Phyllanthus niruri L.

Sin.: *Phyllanthus lathyroides* Kunth, *Phyllanthus lathyroides* Kunth f. *rosellus* Müll. Arg., *Phyllanthus microphyllus* Mart., hom. illeg., *Phyllanthus niruri* L. f. *microphyllus* (Müll. Arg.) G.L. Webster, *Phyllanthus niruri* L. subsp. *lathyroides* (Kunth) G.L. Webster, *Phyllanthus rosellus* (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Phyllanthus orbiculatus Rich.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).

Phyllanthus perpusillus Baill.

Hierba. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Phyllanthus pseudoguyanensis

Herter & Mansf.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(RIV).

Phyllanthus pulcherrimus Herter ex

Arechav.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(RNO).

Phyllanthus ramillosus Müll. Arg.

Sin.: *Diasperus cordobensis* Kuntze, *Phyllanthus cordobensis* (Kuntze) K. Schum.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(ROC).

Phyllanthus riedelianus Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phyllanthus sellowianus (Klotzsch) Müll. Arg.

Sin.: *Asterandra sellowiana* Klotzsch, *Diasperus sellowianus* (Klotzsch) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CON, ITA). URY(DUR, FLA, MON, PAY, ROC, SAO, SOR, TYT).

Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L.

Webster

Sin.: *Moeroris stipulata* Raf.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

Phyllanthus submarginatus Müll. Arg.

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Phyllanthus tenellus Roxb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA). URY(CAS, MON).

Phyllanthus timboensis Funez, J.P.R.

Ferreira & Hassemer

Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(SCA).

Phyllanthus urinaria L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Richeria Vahl

Richeria australis Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Savia Willd.

Savia dictyocarpa Müll. Arg.

Sin.: *Kleinodendron riosulense* L.B. Sm. & Downs

Arbusto o árbol. Nativa. 300-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

PHYTOLACCACEAE

Anisomeria D. Don

Anisomeria coriacea D. Don

Sin.: *Anisomeria drastica* (Bertero) Moq., *Phytolacca drastica* (Bertero)

Poepp. & Endl., *Pircunia drastica* Bertero

Hierba. Endémica. 500-2600 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Anisomeria littoralis (Poepp. &

Endl.) Moq.

Sin.: *Anisomeria chilensis* Miers ex H. Walter, *Phytolacca chilensis* Miers, nom.

nud., *Phytolacca littoralis* Poepp. & Endl.

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,

MAU, RME).

Ercilla A. Juss.

Ercilla spicata (Bertero) Moq.

Sin.: *Apodostachys densiflora* Turcz., *Bridgesia spicata* (Bertero) Hook. & Arn.,

Ercilla volubilis A. Juss., *Galvezia spicata*

Bertero, *Phytolacca volubilis* (A. Juss.)

Heimerl, *Suriana volubilis* (A. Juss.)

Dombey & Cav. ex D. Don

Liana. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, LRI, RME).

Ercilla syncarpellata Nowicke

Enredadera. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(MAU, LRI, LLA, AIS).

Gallesia Casar.

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms

Sin.: *Thouinia integrifolia* Spreng.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Hillieria Vell.

Hillieria latifolia (Lam.) H. Walter

Sin.: *Hillieria elastica* Vell., *Mohlana*

latifolia (Lam.) Moq., *Mohlana nemoralis* Mart., *Rivina latifolia* Lam.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Petiveria L.

Petiveria alliacea L. var. **alliacea**

Sin.: *Mapa graveolens* Vell., *Petiveria correntina* Rojas Acosta, *Petiveria*

paraguayensis D. Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, SAO).

Petiveria alliacea L. var. **tetrandra**

(B.A. Gomes) Hauman

Sin.: *Petiveria alliacea* L. var. *tetrandra* (B.A. Gomes) Nowicke, comb. superfl.,

Petiveria hexaglochis Fisch. & C.A. Mey.,

Petiveria tetrandra B.A. Gomes

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(COA, PAI, PHA).

Phytolacca L.

Phytolacca americana L.

Sin.: *Phytolacca decandra* L.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE). URY(CLA, TYT).

Phytolacca bogotensis Kunth

Sin.: *Phytolacca australis* Phil.,

Phytolacca bogotensis Kunth var. *australis* (Phil.) Hauman, comb. illeg., *Phytolacca*

micrantha H. Walter, *Phytolacca*

parviflora Hauman

Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(SCA). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA). PRY(APA, ITA).

Phytolacca chilensis (Miers ex Moq.)

H. Walter

Sin.: *Pircunia chilensis* Miers ex Moq.

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Phytolacca dioica L.

Sin.: *Phytolacca arborea* Moq., nom. nud., *Phytolacca dioica* L. var. *ovalifolia*

Chodat, *Phytolacca populifolia* Salisb.,

Pircunia dioica (L.) Moq., nom. illeg.,

Sarcoca dioica (L.) Raf.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

URY(MON).

Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto).

Phytolacca tetramera Hauman

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(BAI).

Phytolacca thysiflora Fenzl ex J.A.

Schmidt

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, ITA).

Rivina L.**Rivina humilis** L.

Sin.: *Rivina humilis* L. var. *glabra* L., *Rivina laevis* L., *Rivina laevis* L. var. *pubescens* Griseb., *Rivina paraguayensis* D. Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(Desconocida).

Schindleria H. Walter**Schindleria densiflora** (Kuntze) Monach.

Sin.: *Rivina densiflora* Kuntze

Árbol. Nativa. 200-500 m.

Países: PRY(CAN).

Seguieria Loeffl.**Seguieria aculeata** Jacq.

Sin.: *Albertokuntzea parvifolia* (Benth.) Kuntze, *Seguieria elliptica* R.E. Fr., hom. illeg., *Seguieria guaranítica* Speg., *Seguieria guaranítica* Speg. var. *microphylla* Heimerl, *Seguieria parvifolia* Benth., *Seguieria securigera* Heimerl, *Seguieria votshii* H. Walter

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Seguieria americana L.

Sin.: *Albertokuntzea americana* (L.) Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(Desconocida).

Seguieria langsdorffii Moq.

Sin.: *Albertokuntzea langsdorffii* (Moq.) Kuntze, *Seguieria glaziovii* Briq.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Seguieria paraguayensis Morong

Sin.: *Seguieria inermis* H. Walter

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, PAI).

Trichostigma A. Rich.**Trichostigma octandrum** (L.) H.

Walter

Sin.: *Rivina americana* Raf., *Rivina dodecandra* Jacq., *Rivina ehrenbergiana* Klotzsch ex Moq., nom. nud., *Rivina humilis* L. var. *scandens* L., *Rivina moritziana* Klotzsch ex Moq., nom. nud., *Rivina mutisii* Willd. ex Schult., *Rivina octandra* L., *Rivina octandra* L. var. *obtusifolia* Moq., *Rivina scandens* Mill., *Trichostigma rivinoides* A. Rich., *Villamilla octandra* (L.) Hook. f.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(SPE).

PICRAMNIACEAE

Alvaradoa Liebm.**Alvaradoa subovata** Cronquist

Sin.: *Alvaradoa amorphoides* Liebm. var. *puberulenta* Monach., *Alvaradoa puberulenta* (Monach.) Sleumer, *Alvaradoa subovata* Cronquist var. *puberulenta* (Monach.) Cronquist, *Alvaradoa subovata* Cronquist var. *typica* Cronquist, nom. illeg.

Arbolito. Nativa. 1000-1600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Picramnia Sw.**Picramnia camboita** Engl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Picramnia excelsa Kuhlman. ex Pirani

Arbolito o árbol. Endémica. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Picramnia parvifolia Engl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, PAI).

Picramnia ramiflora Planch.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Picramnia sellowii Planch.

Sin.: *Picramnia pendula* Tul., *Picramnia sellowii* Planch. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Picramnia sellowii* Planch.

f. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Picramnia sellowii* Planch. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Picramnia sellowii* Planch. var. *latifolia* Engl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

PICRODENDRACEAE

Parodiendron Hunz.**Parodiendron marginivillosum**

(Speg.) Hunz.

Sin.: *Phyllanthus marginivillosus* Speg.

Hierba o arbusto. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

PIPERACEAE

Manekia Trel.

Manekia obtusa (Miq.) T. Arias, Callejas & Bornst.

Sin.: *Artanthe obtusa* Miq., *Piper fluminense* C. DC., *Sarcorhachis obtusa* (Miq.) Trel., *Sarcorhachis obtusa* (Miq.) Trel. var. *cordata* Yunck.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia Ruiz & Pav.

Peperomia aceroana C. DC.

Sin.: *Peperomia malmeana* Dahlst., *Peperomia pseudoreflexa* C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). PRY(APY, ÑEE, PHA).

Peperomia alata Ruiz & Pav.

Sin.: *Peperomia alata* Ruiz & Pav. var. *angustifolia* C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Peperomia aldrinii Villa

Hierba. Endémica. 400-500 m.

Países: ARG(SAL).

Peperomia arifolia Miq.

Sin.: *Peperomia arifolia* Miq. var. *epeltata* C. DC., *Peperomia arifolioides* Yunck., *Peperomia misionense* Yunck.
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Peperomia armondii Yunck.

Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia armstrongii Villa

Hierba. Endémica. 1000-2400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Peperomia augescens Miq.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).

Peperomia balansana C. DC.

Hierba suculenta. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, GUA).

Peperomia barbarana C. DC.

Hierba suculenta. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN, GUA, MIE).

Peperomia berteroa Miq.

Sin.: *Peperomia berteroa* Miq. subsp. *tristanensis* (Christoph.) Valdeb., *Peperomia tristanensis* Christoph.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(JFE).

Peperomia blanda (Jacq.) Kunth var.**langsдорffii** (Miq.) Henschen

Sin.: *Micropiper langsdorffii* Miq., *Peperomia langsdorffii* (Miq.) Miq.
Hierba epífita o terrestre. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Peperomia brasiliensis (Miq.) Miq.

Sin.: *Verhuelia brasiliensis* Miq.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Peperomia calophylla Yunck.

Hierba suculenta. Endémica. 600-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Peperomia campinasana C. DC.

Hierba epífita o rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Peperomia castelosensis Yunck.

Hierba. Nativa. 1000-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia catharinae Miq.

Sin.: *Peperomia herteri* Trel., *Peperomia sellowiana* Miq., *Peperomia uruguayana* Trel.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, LAV, MAL, RIV, ROC, TYT).

Peperomia circinnata Link var. **circinnata**

Sin.: *Peperomia circularis* Henschen, *Peperomia cyclophylla* Miq. var. *parvifolia* C. DC., *Piper circinnatum* (Link) Schult., *Piper circulare* Desf. ex C. DC.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, GUA).

Peperomia circinnata Link var.**orbicularis** (C. DC.) Yunck.

Sin.: *Peperomia orbicularis* C. DC.
Hierba epífita. Nativa. 1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Peperomia clivicola Yunck.

Hierba. Nativa. 500-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia collinsii Villa

Hierba epífita. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Peperomia comarapana C. DC.

Sin.: *Peperomia comarapana* C. DC. f. *pubescens* Yunck.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, SFE). PRY(APY, BOQ). URY(ART, PAY, RNO).

Peperomia coquimbensis Skottsbo.

Hierba epífita. Endémica. 500 m.
Países: CHL(COQ).

Peperomia corcovadensis Gardner f. **corcovadensis**

Sin.: *Peperomia blumenauana* C. DC.
Hierba epífita. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia corcovadensis Gardner f.**latifolia** Yunck.

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).

Peperomia corcovadensis Gardner f.**longifolia** (Dahlst.) Yunck.

Sin.: *Peperomia distans* Miq. f. *longifolia* Dahlst.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia cordigera Dahlst.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Peperomia crinicaulis C. DC.

Hierba. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Peperomia crystallina Ruiz & Pav.

Sin.: *Piper crystallinum* (Ruiz & Pav.) Vahl, *Peperomia fortunatoi* Trel., *Peperomia mandonii* C. DC., *Peperomia mandonii* C. DC. var. *excelsis* C. DC., *Peperomia nonhispidula* Trel., *Peperomia umbelliformis* C. DC.
Hierba. Nativa. 0-3200 m.
Países: ARG(JUJ, TUC). BRA(RGS, SCA).

Peperomia dahlstedtii C. DC.

Hierba. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Peperomia delicatula Henschen

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia diaphanoides Dahlst.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Peperomia divaricata Yunck.

Hierba rupícola. Nativa.
Países: BRA(SCA).

Peperomia doellii Phil.

Hierba suculenta. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Peperomia duartei Yunck.

Hierba. Nativa. 500-600 m.
Países: BRA(PAR).

Peperomia elongata Kunth

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia emarginella (Sw.) C. DC.

Sin.: *Piper emarginellum* Sw.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Peperomia fernandeziana Miq.

Sin.: *Peperomia chilensis* C. DC., *Peperomia fernandeziana* Miq. f. *oblongifolia* Skottsbo.
Hierba epífita o terrestre. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LRI, LLA, JFE).

Peperomia galioides Kunth

Sin.: *Piper galioides* (Kunth) Poir.
Hierba epífita o terrestre. Nativa.
700-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. var. **glabella**

Sin.: *Peperomia caulilabris* Miq., *Piper glabellum* Sw.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. var. **nervulosa** (C. DC.) Yunck.

Sin.: *Peperomia glabella* (Sw.) A. Dietr. var. *catarinensis* C. DC., *Peperomia melanostigma* Miq. var. *nervulosa* C. DC.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. var. **nigropunctata** (Miq.) Dahlst.

Sin.: *Peperomia nigropunctata* Miq.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(SCA).

Peperomia glaziouii C. DC.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia gracilicaulis Yunck.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Peperomia hadrostachya Yunck.

Hierba. Endémica. 1200-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Peperomia hernandiifolia (Vahl) A. Dietr.

Sin.: *Piper hernandifolium* Vahl
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Peperomia hilariana Miq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia hispidula (Sw.) A. Dietr. var. **hispidula**

Sin.: *Piper hispidulum* Sw.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(TAC).

Peperomia hispidula (Sw.) A. Dietr. var. **sellowiana** (Miq.) Dahlst.

Sin.: *Acrocarpidium sellowianum* Miq.
Hierba. Nativa. 400-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(TAC).

Peperomia hispiduliformis Trel.

Hierba epífita o terrestre. Nativa.
1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Peperomia hydrocotyloides Miq.

Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Peperomia ibiramana Yunck.

Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia inaequalilimba C. DC.

Hierba. Endémica. 800-2500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Peperomia increscens Miq.

Sin.: *Peperomia blanda* (Jacq.) Kunth var. *pseudodindygulensis* (C. DC.) Yunck., *Peperomia pseudodindygulensis* C. DC., *Peperomia radicans* C. DC., *Peperomia rojasii* C. DC., *Peperomia saxigaudens* C. DC.
Hierba epífita. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, COA, GUA, ÑEE, PHA). URY(RIV).

Peperomia lorentzii C. DC. ex Kuntze

Hierba epífita. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Peperomia loxensis Kunth

Sin.: *Piper loxensis* (Kunth) Poir.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Peperomia lyman-smithii Yunck. var. **lyman-smithii**

Hierba. Endémica. 400-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Peperomia lyman-smithii Yunck. var. **macrophylla** Yunck.

Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(RGS).

Peperomia macrostachya (Vahl) A. Dietr.

Sin.: *Piper macrostachyon* Vahl
Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.
Países: BRA(PAR).

Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A. Dietr.

Sin.: *Piper magnoliifolium* Jacq.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Peperomia mandioccana Miq.

Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia margaritifera Bertero ex Hook.

Sin.: *Peperomia margaritifera* Bertero ex Hook. var. *umbraticola* Skottsb. ex Yunck.

Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: CHL(JFE).

Peperomia martiana Miq.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Peperomia megapotamica Dahlst.

Hierba. Nativa. 400-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Peperomia morungavana Yunck.

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Peperomia nitida Dahlst., nom. cons.

Hierba. Nativa. 500-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA).

Peperomia nudifolia C. DC.

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia nummularioides Griseb.

Sin.: *Peperomia australis* Phil., *Peperomia nummulariifolia* Kunth
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, LRI, LLA, AIS).

Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr.

Sin.: *Peperomia cuneata* Miq., *Peperomia obtusifolia* (L.) A. Dietr. var. *cuneata* (Miq.) Griseb., *Piper obtusifolium* L.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Peperomia parvifolia C. DC.

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Peperomia pellucida (L.) Kunth var. **argentina** Yunck.

Hierba suculenta. Endémica. 500-700 m.
Países: ARG(SAL).

Peperomia pellucida (L.) Kunth var. **pellucida**

Sin.: *Piper pellucidum* L.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA).

Peperomia pereirae Yunck.

Hierba epífita o rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR).

- Peperomia pereskiifolia** (Jacq.) Kunth
Sin.: *Piper pereskiifolium* Jacq.,
Peperomia rubricaulis (Nees) A. Dietr.
var. *parvifolia* Yunck.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN). URY(ROC).
- Peperomia perlongicaulis** Yunck.
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(PAR).
- Peperomia peruviana** Dahlst.
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
- Peperomia pilicaulis** C. DC.
Sin.: *Peperomia ouabianae* C. DC.
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia pseudobcordata** Yunck.
Hierba epífita. Endémica. 1600-1700 m.
Países: BRA(SCA).
- Peperomia pseudoestrellensis** C. DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia psilostachya** C. DC. var. **angustifolia** C. DC.
Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).
- Peperomia psilostachya** C. DC. var. **psilostachya**
Sin.: *Peperomia trapezoidalis* Yunck.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS).
PRY(CAN, GUA, PAI). URY(CLA, RIV).
- Peperomia punicea** Dahlst.
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Peperomia quadrifolia** (L.) Kunth
Sin.: *Piper quadrifolium* L.
Hierba epífita o rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Peperomia ramboi** Yunck.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Peperomia renifolia** Dahlst.
Sin.: *Peperomia ulei* C. DC.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia retivenulosa** Yunck.
Hierba. Endémica. 700 m.
Países: BRA(PAR).
- Peperomia rizzinii** Yunck.
Hierba. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(PAR).
- Peperomia rhombea** Ruiz & Pav.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Peperomia rotundifolia** (L.) Kunth
Sin.: *Acrocarpidium rotundifolium*
(L.) Miq., *Peperomia rotundifolia* (L.)
Kunth f. *obcordata* (Miq.) Dahlst., *Piper rotundifolium* L.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).
- Peperomia rubricaulis** (Nees) A. Dietr. var. **parvifolia** Yunck.
Hierba epífita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia rubricaulis** (Nees) A. Dietr. var. **rubricaulis**
Sin.: *Piper rubricaulis* Nees
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(CAN).
- Peperomia rupestris** Kunth var. **cordifolia** Wawra
Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).
- Peperomia rupestris** Kunth var. **rupestris**
Sin.: *Piper rupestre* (Kunth) Roem. & Schult.
Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia santaelisae** C. DC.
Sin.: *Peperomia lilloi* C. DC., *Peperomia sanpedritoi* Trel., *Peperomia stuckertii* C. DC.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(PHA).
- Peperomia schenkiana** Dahlst.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).
- Peperomia schwackei** C. DC.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia skottsbergii** C. DC.
Hierba. Endémica. 100-600 m.
Países: CHL(JFE).
- Peperomia stroemfeltii** Dahlst.
Hierba epífita.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia submarginata** Yunck.
Hierba epífita. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia subretusa** Yunck.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
- Peperomia subrubripica** C. DC.
Hierba rupícola. Nativa.
Países: BRA(PAR).
- Peperomia tenella** (Sw.) A. Dietr.
Sin.: *Acrocarpidium tenellum* (Sw.)
Miq., *Peperomia tenella* (Sw.) A. Dietr.
var. *glabra* C. DC., *Piper tenellum* Sw.
Hierba epífita. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Peperomia tetraphylla** Hook. & Arn. var. **americana** (Dahlst.) Yunck.
Sin.: *Peperomia americana* (Miq.)
Herter, *Peperomia reflexa* Kunth f. *americana* Miq., *Peperomia reflexa* Kunth var. *americana* Dahlst.
Hierba epífita. Nativa. 200-700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Peperomia tetraphylla** Hook. & Arn. var. **tenera** (Miq.) Yunck.
Sin.: *Peperomia reflexa* Kunth var. *tenera* Miq.
Hierba epífita. Nativa. 500-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Peperomia tetraphylla** Hook. & Arn. var. **tetraphylla**
Sin.: *Peperomia arechavaletae* C. DC. var. *minor* Herter, *Peperomia berroi* Trel., *Peperomia fiebrigii* C. DC. f. *glabrata* Yunck., *Peperomia reflexa* (L. f.) A. Dietr., nom. illeg., *Peperomia reflexa* (L. f.) A. Dietr., hom. illeg. f. *argentina* C. DC., *Peperomia reflexa* (L. f.) A. Dietr., hom. illeg. f. *robustior* C. DC., *Peperomia tacuariana* Trel., *Peperomia tetraphylla* Hook. & Arn. f. *protractifolia* Yunck., *Piper reflexum* L. f., *Piper tetraphyllum* G. Forst.
Hierba epífita. Nativa. 600-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA). URY(CLA, MAL, RIV, ROC, TYT).

Peperomia tetraphylla Hook. & Arn.
var. **valantoides** (Miq.) Yunck.

Sin.: *Peperomia reflexa* Kunth var.
valantoides (Miq.) C. DC., *Peperomia*
valantoides Miq.

Hierba epífita. Nativa. 700 m.

Países: BRA(SCA).

Peperomia theodori Trel.

Sin.: *Peperomia reflexa* (L. f.) A. Dietr.,
hom. illeg. f. *longilimba* C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 300-2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Peperomia tominana C. DC.

Sin.: *Peperomia fiebrigii* C. DC., *Peperomia*
tominana C. DC. f. *pubifolia* Yunck.

Hierba epífita. Nativa. 700-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Peperomia transperans Miq.

Hierba suculenta. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia trichocarpa Miq.

Hierba epífita. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Peperomia trinervis Ruiz & Pav. var.
minor C. DC.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(RGS).

Peperomia trineura Miq.

Hierba. Nativa. 600-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Peperomia trineuroides Dahlst.

Sin.: *Peperomia arechavaletae* C. DC.
var. *arechavaletae*

Hierba epífita. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(PHA). URY(CLA, RIV, ROC,
TAC, TYT).

Peperomia urocarpa Fisch. & C.A. Mey.

Sin.: *Acrocarpidium urocarpum*
(Fisch. & C.A. Mey) Miq., *Peperomia*
subpubistachya Yunck.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, MIE).

Peperomia velloziana Miq.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper L.

Piper abutiloides Kunth

Arbusto o subarbusto. Nativa

Países: BRA(PAR).

Piper aduncum L.

Sin.: *Artanthe adunca* (L.) Miq.,
Artanthe elongata (Vahl) Miq., *Piper*
aduncum L. var. *cordulatum* (C. DC.)
Yunck., *Piper angustifolium* Lam., *Piper*
angustifolium Ruiz & Pav., hom. illeg.,
Piper angustifolium Ruiz & Pav., nom.
illeg. var. *cordulatum* C. DC., *Piper*
cardenasii Trel., *Piper elongatum* Vahl,
Piper elongatum Vahl var. *cordulatum* (C.
DC.) C. DC., *Piper guanaianum* C. DC.,
Steffensia adunca (L.) Kunth, *Steffensia*
elongata (Vahl) Kunth

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA,
CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Piper aequale Vahl

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Piper alnoides Kunth

Sin.: *Artanthe alnoides* (Kunth) Miq.,
Steffensia alnoides (Kunth) Kunth

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper amalago L.

Sin.: *Artanthe plantaginea* (Lam.)
Miq., *Enckea plantaginea* (Lam.) Kunth,
Enckea sieberi Miq., *Piper amalago* L. var.
medium (Jacq.) Yunck., *Piper henshenii*
C. DC., *Piper medium* Jacq., *Piper*
plantagineum Lam., *Piper reticulatum*
Vell., hom. illeg., *Piper saururoides* Desv.
ex Ham., *Piper sieberi* (Miq.) C. DC.,
Piper syringaeifolium Balb. ex Kunth

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Piper amplum Kunth

Sin.: *Artanthe ampla* (Kunth) Miq.,
Piper lindbergii C. DC., *Steffensia ampla*
Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piper arboreum Aubl. var. **arboreum**

Sin.: *Piper geniculatum* Sw.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAN, COA).

Piper arboreum Aubl. var. **falcifolium**
(Trel.) Yunck.

Sin.: *Piper falcifolium* Trel.

Arbusto o arbolito. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Piper arboreum Aubl. var. **hirtellum**
Yunck.

Sin.: *Piper arboreum* Aubl. var.
latifolium (C. DC.) Yunck., *Piper*
geniculatum Sw. var. *latifolium* C. DC.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper asperilimum C. DC.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Piper boucheanum C. DC.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper bradei Yunck.

Arbusto. Nativa

Países: BRA(PAR).

Piper caldasianum (Miq.) Yunck.

Sin.: *Artanthe caldasiana* Miq.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Piper caldense C. DC.

Sin.: *Piper pardinum* C. DC., *Piper*
pseudolanceolatum C. DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper callosum Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Piper cernuum Vell.

Sin.: *Piper cernuum* Vell. var.

biformipilum Yunck., *Piper cernuum* Vell.
var. *glabricaulum* Yunck.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper corcovadensis (Miq.) C. DC. var.
corcovadensis

Sin.: *Otonia palhosana* Trel., *Otonia*
propinqua Kunth f. *propinqua*

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Piper corcovadensis (Miq.) C. DC. var.
longiracemosum (Yunck.) E.F. Guim.
& M. Carvalho-Silva

Sin.: *Otonia propinqua* Kunth f.
longiracemosum Yunck.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Piper crassinervium Kunth

Sin.: *Artanthe exserens* Miq., *Peltobryon exserens* (Miq.) Miq., *Piper exserens* (Miq.) C. DC., *Steffensia crassinervia* (Kunth) Kunth
 Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Piper dilatatum Rich.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(AMA).

Piper diospyrifolium Kunth

Sin.: *Artanthe diospyrifolia* (Kunth) Miq., *Steffensia diospyrifolium* (Kunth) Kunth
 Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Piper duartei E.F. Guim. & M.

Carvalho-Silva
 Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Piper flavicans C. DC.

Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Piper frutescens C. DC.

Sin.: *Ottonia frutescens* (C. DC.) Trel.
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Piper fuligineum Kunth

Sin.: *Artanthe amplexens* Miq., *Piper amplexens* (Miq.) C. DC.
 Arbusto. Nativa. 700-1000 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Piper glabratum Kunth

Sin.: *Artanthe glabrata* (Kunth) Miq., *Steffensia glabrata* (Kunth) Kunth
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Piper hassleri C. DC.

Arbolito. Endémica.
 Países: PRY(AMA, CAU, CAN).

Piper hatschbachii Yunck.

Arbusto. Endémica. 500-1100 m.
 Países: BRA(PAR).

Piper hemmendorffii C. DC.

Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Piper hieronymi C. DC.

Sin.: *Piper argentinum* (C. DC.)
 Trel., *Piper gaudichaudianum* Kunth f.

argentinum C. DC., *Piper gaudichaudianum*
 Kunth var. *argentinum* C. DC., *Piper hieronymi* C. DC. var. *glabrum* C. DC. ex
 Kuntze, *Piper venturii* Trel., *Piper venturii*
 Trel. var. *yesoanum* Trel.

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-2000 m.
 Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC).

Piper hispidum Sw.

Sin.: *Piper hispidum* Sw. var.
trachydermum (Trel.) Yunck., *Piper*
trachydermum Trel.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(CAA, CAN).

Piper hoffmannseggianum Roem. & Schult.

Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Piper kleinii Yunck.

Arbusto. Endémica. 900-1100 m.
 Países: BRA(SCA).

Piper laevigatum Kunth

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(PAI).

Piper lanceolatum Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(SCA).

Piper lepturum (Kunth) DC.

Sin.: *Artanthe leptura* (Kunth) Miq.,
Artanthe lucaeana (Kunth) Miq., *Piper*
lucaeana Kunth, *Schilleria leptura*
 Kunth, *Schilleria lucaeana* Kunth
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Piper lhotzkyanum Kunth

Sin.: *Artanthe lhotzkyana* (Kunth) Miq.,
Steffensia lhotzkyana (Kunth) Kunth
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Piper macedoi Yunck.

Arbusto o arbolito. Nativa. 700-1300 m.
 Países: BRA(PAR).

Piper malacophyllum (C. Presl) C. DC.

Sin.: *Artanthe malacophylla* C. Presl
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN).

Piper mapireense C. DC.

Sin.: *Piper mapireense* C. DC. var.
magnifolium C. DC., *Piper rectispicum*
 Trel., *Piper sanctae-crucis* C. DC. ex
 Kuntze

Arbusto. Nativa. 300-800 m.
 Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
 PRY(CAU, CAN).

Piper marginatum Jacq.

Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Piper mikanianum (Kunth) Steud. var. **mikanianum**

Sin.: *Artanthe mikaniana* (Kunth)
 Miq., *Piper debile* C. DC., *Piper*
mikanianum (Kunth) Steud. f. *clausum*
 Yunck., *Piper misionesanum* C. DC.,
Piper parthenium Mart. ex C. DC., *Piper*
parthenium Mart. ex C. DC. var. *pilosius*
 C. DC., *Schilleria mikaniana* Kunth
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(APA, CAA, GUA). URY(TAC).

Piper mikanianum (Kunth) Steud. var. **pilosius** C. DC.

Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(Fuera del área del
 proyecto). PRY(APA, GUA).

Piper miquelianum C. DC.

Sin.: *Ottonia apodostachya* Trel.,
Ottonia cordulatifolia Trel., nom. illeg.,
Ottonia cordulatifolia Trel. var. *hirtella*
 (C. DC.) Trel., *Ottonia dusenii* Trel.,
Ottonia dusenii Trel. var. *heterophylla*
 Trel., *Ottonia dusenii* Trel. var. *variifolia*
 Trel., *Ottonia martiana* Miq., *Ottonia*
martiana Miq. var. *latifolia* Yunck., *Piper*
ovatum Vahl var. *hirtellum* C. DC.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
 SCA). PRY(APA, CAU, CAN).

Piper mollicomum Kunth

Sin.: *Artanthe mollicoma* (Kunth) Miq.
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
 PRY(CAN).

Piper mosenii C. DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Piper ottonoides Yunck.

Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Piper peltatum L.

Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Piper permucronatum Yunck.

Arbusto. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Piper regnellii (Miq.) C. DC.

Sin.: *Artanthe regnellii* Miq., *Piper fulvescens* C. DC., *Piper fulvescens* C. DC. var. *subglabrum* C. DC., *Piper pallescens* C. DC., *Piper regnellii* (Miq.) C. DC. var. *pallescens* (C. DC.) Yunck.

Hierba o arbusto. Nativa. 100-200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, MIE, PAI, SPE).

Piper reitzii Yunck.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piper richardiifolium Kunth

Sin.: *Artanthe richardiifolia* (Kunth) Miq., *Steffensia richardiifolia* (Kunth) Kunth
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piper rivinoides Kunth f.

magnifolium Yunck.
Arbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(SCA).

Piper rivinoides Kunth f. **rivinoides**

Sin.: *Artanthe rivinoides* (Kunth) Miq., *Schilleria rivinoides* Kunth
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Piper solmsianum C. DC. var.

hilarianum (Kunth) Yunck.
Sin.: *Artanthe hilariana* (Kunth) Miq., *Piper hilarianum* (Kunth) C. DC., *Schilleria hilariana* Kunth
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piper solmsianum C. DC. var.

solmsianum
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piper subcinereum C. DC.

Sin.: *Piper piritubanum* Yunck.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piper tuberculatum Jacq.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Piper tucumanum C. DC.

Sin.: *Piper lorentzii* Trel.
Arbusto o arbolito. Endémica. 400-1400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Piper ulei C. DC.

Arbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(SCA).

Piper umbellatum L.

Sin.: *Pothomorphe umbellata* (L.) Miq.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piper viminifolium Trel.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Piper vicosanum Yunck.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Piper xylosteoides (Kunth) Steud.

Sin.: *Artanthe xylosteoides* (Kunth) Miq., *Piper pabstii* C. DC., *Schilleria xylosteoides* Kunth
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sarcorhachis Trel.**Sarcorhachis schwackei** Yunck.

Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

PITTOSPORACEAE

Pittosporum Banks ex Gaertn.**Pittosporum crassifolium** Banks &

Sol. ex A. Cunn.
Arbusto o arbolito. Introducida.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, JFE).

Pittosporum undulatum Vent.

Arbusto. Introducida.
Países: CHL(VAL).

PLANTAGINACEAE

Achetaria Cham. & Schltld.**Achetaria ocymoides** (Cham. & Schltld.) Wettst.

Sin.: *Beyrichia ocymoides* Cham. & Schltld.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Angelonia Bonpl.**Angelonia integerrima** Spreng.

Sin.: *Angelonia hassleriana* Chodat
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, CLA, RNO, RIV, SJO, TAC).

Angelonia salicariifolia Bonpl.

Sin.: *Angelonia evitae* Descole & Borsini, *Angelonia gardneri* Hook., *Angelonia hirta* Cham.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Antirrhinum L.**Antirrhinum majus** L.

Hierba o arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). URY(MON).

Bacopa Aubl., nom. cons.**Bacopa australis** V.C. Souza

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Bacopa congesta Chodat & Hassl.

Sin.: *Bacopa congesta* Chodat & Hassl. var. *hirsuta* Hassl., *Bacopa hirsuta* (Hassl.) Descole & Borsini, *Bacopa paraguayensis* (S. Moore) Hassl. subsp. *congesta* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Bacopa paraguayensis* (S. Moore) Hassl. var. *hirsuta* (Hassl.) Hassl.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAN, CEN, COA, PAI).

Bacopa dubia Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). PRY(ÑEE).

Bacopa gratioloides (Cham.) Edwall

Sin.: *Caconapea gratioloides* Cham., *Herpestis caconapea* (Cham.) Steud., *Herpestis gratioloides* (Cham.) Benth.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Bacopa lanigera (Cham. & Schltdl.)

Wettst.

Sin.: *Herpestis lanigera* Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 600-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Bacopa monnieri (L.) Wettst.Sin.: *Bacopa monnieri* (L.) Pennell, *Bramia indica* Lam., *Bramia monnieri* (L.) Drejer, *Bramia monnieri* (L.) Pennell, *Capraria monnieri* (L.) Roxb., *Gratiola monnieri* L., *Herpestis monnieri* (L.) Kunth, *Lysimachia monnieri* L.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU). PRY(CAA, CEN, PHA). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SJO).

Bacopa monnierioides (Cham.) B.L. Rob.Sin.: *Bacopa conferta* (Pennell) Standl., *Bacopa parviflora* Standl., *Bacopa ranaria* (Benth.) Chodat & Hassl., *Bacopa ranaria* (Benth.) Chodat & Hassl. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Caconapea appressa* Pennell, *Caconapea conferta* Pennell, *Herpestis ranaria* Benth., nom. superfl., *Monniera monnierioides* (Cham.) Kuntze, *Monniera ranaria* (Cham.) Fritsch, *Ranaria monnierioides* Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(COA).

Bacopa myriophylloides (Benth.) Wettst.Sin.: *Herpestis myriophylloides* Benth., *Monniera myriophylloides* (Benth.) Kuntze, *Naiadothrix myriophylloides* (Benth.) Pennell

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Bacopa paraguariensis (S. Moore) Hassl.Sin.: *Herpestis paraguariensis* S. Moore Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). PRY(GUA).**Bacopa repens** (Sw.) Wedd.Sin.: *Bacopa cladostyla* Chodat ex Eskuche, *Bacopa limosa* (Pennell) Standl., *Gratiola repens* Sw., *Herpestis repens* (Sw.) Schltr., *Macuillamia repens* (Sw.) Pennell, *Macuillamia limosa* Pennell

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, SFE).

Bacopa rotundifolia (Michx.) Wettst.Sin.: *Bacopa nobisiana* H. Rainer, *Bacopa simulans* Fernald, *Bacopa tweedii* (Benth.) Parodi, *Herpestis rotundifolia* (Michx.) Pursh, *Herpestis tweedii* Benth., *Macuillamia rotundifolia* (Michx.) Richardson, *Monniera rotundifolia* Michx., *Monniera tweedii* (Benth.) Kuntze, *Ranapalus rotundifolius* (Michx.) Pennell

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, SAL, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAA, CON, PHA).

Bacopa salzmännii (Benth.) Wettst. ex EdwallSin.: *Bacopa humilis* (Pennell) Standl., *Bacopa lilacina* (Pennell) Standl., *Bacopa violacea* (Pennell) Standl., *Herpestis salzmännii* Benth., *Monocardia humilis* Pennell, *Monocardia lilacina* Pennell, *Monocardia violacea* Pennell

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(CAN, COA, ÑEE).

Bacopa scabra (Benth.) Descole & Borsini var. **laxiflora** (Benth.) V.C. SouzaSin.: *Bacopa auriculata* (B.L. Rob.) Greenm., *Bacopa laxiflora* (Benth.) Wettst. ex Edwall, *Caconapea auriculata* (B.L. Rob.) Pennell, *Herpestis auriculata* B.L. Rob., *Herpestis laxiflora* Benth., *Herpestis parvula* S. Moore, *Mella laxiflora* (Benth.) Pennell

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CON, GUA, ÑEE).

Bacopa scabra (Benth.) Descole & Borsini var. **scabra**Sin.: *Bacopa hassleriana* Chodat, *Bacopa rojasii* Hassl., *Herpestis scabra* Benth., *Monniera scabra* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CAA, CAN).

Bacopa serpyllifolia (Benth.) PennellSin.: *Bacopa ciliata* (Pennell) Pennell, *Bacopa lanigera* (Cham. & Schltdl.) Wettst. var. *serpyllifolia* (Benth.) Edwall, *Herpestis ciliata* Pennell, *Herpestis lanigera* Cham. & Schltdl. var. *serpyllifolia* (Benth.) J.A. Schmidt, *Herpestis serpyllifolia* Benth., *Monocardia ciliata* Pennell

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(SPE).

Bacopa stricta (Schrad.) EdwallSin.: *Bacopa domingensis* (Spreng.) Pennell, *Bacopa elongata* (Benth.) Pennell, *Bacopa monosticta* (Schltdl.) Pennell, *Bacopa stricta* (Schrad.) B.L. Rob., nom. illeg., *Herpestis diffusa* J.A. Schmidt, *Herpestis domingensis* Spreng., *Herpestis elongata* Benth., *Herpestis monosticta* Schltdl., *Herpestis polyantha* Benth., *Herpestis stricta* Schrad., *Moniera stricta* (Schrad.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Bacopa verticillata (Pennell & Gleason) PennellSin.: *Bacopa pedersenii* Rossow, *Caconapea verticillata* Pennell & Gleason

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(SPE).

Basistemon Turcz.**Basistemon spinosus** (Chodat) MoldenkeSin.: *Basistemon violaceum* (Herzog) Baehni & J.F. Macbr., *Hassleropsis spinosa* Chodat, *Saccanthus violaceus* Herzog

Arbusto. Nativa. 700-1500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

Callitriche L.**Callitriche albomarginata** Fassett

Hierba. Endémica. 2700 m.

Países: CHL(RME).

Callitriche antarctica Engelm. ex Hegelm.

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

Callitriche deflexa A. Braun ex Hegelm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA). PRY(CEN). URY(MON).

Callitriche heterophylla Pursh

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI). CHL(BIO, ARA, LLA).

Callitriche heteropoda Engelm. ex Hegelm.

Hierba acuática. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(COR, TUC).

Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett

Sin.: *Callitriche berteriana* Steud.,
Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett
var. *berteroana* (Hegelm.) Fassett,
Callitriche marginata Torr. var. *lechleri*
Hegelm., *Callitriche marginata* Torr.
var. *berteroana* Hegelm., *Callitriche*
oblongicarpa Fassett

Hierba acuática. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI,
NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(LAV).

Callitriche rimosa Fassett

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SJU,
TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE).
URY(CAS, FLA, MON, ROC).

Callitriche stagnalis Scop.

Hierba. Introducida.
Países: ARG(TDF). CHL(BIO).

Callitriche terrestris Raf. subsp.

subsessilis (Fassett) Bacigalupo
Sin.: *Callitriche austinii* Engelm.,
Callitriche deflexa A. Braun ex
Hegelm. var. *austinii* (Engelm.)
Hegelm., *Callitriche deflexa* A. Braun ex
Hegelm. var. *subsessilis* Fassett
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE,
TUC). BRA(SCA). PRY(CEN, GUA, PAI).

Callitriche terrestris Raf. subsp.

turfosa (Bertero emend. Hegelm.)
Bacigalupo
Sin.: *Callitriche turfosa* Bertero emend.
Hegelm.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE,
TUC). CHL(ANT, VAL, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS, RME).

Callitriche truncata Guss.

Hierba acuática. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(ARA, MAG).

Conobea Aubl.**Conobea glechomoides** (Spreng.) V.C.

Souza
Sin.: *Geochorda cuneata* Cham.
& Schltdl., nom. illeg., *Geochorda*
glechomoides (Spreng.) Kuntze, *Herpestis*
glechomoides Spreng.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR).
BRA(Desconocida). URY(FLO, PAY,
SAO, SOR, TAC).

Conobea scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth.

Sin.: *Sphaerotherca scoparioides* Cham.
& Schltdl.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cymbalaria Hill**Cymbalaria muralis** C.F. Gaertn., G.

Mey. & Scherb.
Sin.: *Antirrhinum cymbalaria* L.,
Linaria cymbalaria (L.) Mill.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, MEN,
SAL, SFE, TUC). CHL(VAL, MAU, BIO,
RME, JFE). URY(CAS, MON, RNO).

Digitalis L.**Digitalis purpurea** L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, NEU, RNE,
TDF). BRA(SCA). CHL(ATA, VAL, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).
URY(ROC).

Fonkia Phil.**Fonkia uliginosa** Phil.

Sin.: *Braunblanquetia littoralis*
Eskuche, *Gratiola peruviana* L. var.
uliginosa (Phil.) Reiche, *Gratiola uliginosa*
(Phil.) F. Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ARA,
LRI, LLA).

Gratiola L.**Gratiola peruviana** L.

Sin.: *Gratiola bogotensis* Cornel.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, NEU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA). PRY(PAI). URY(CAS, CLA, COL,
FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV,
SJO, SOR, TAC, TYT).

Hebe Comm. ex Juss.**Hebe salicifolia** (G. Forst.) Pennell

Sin.: *Veronica salicifolia* G. Forst.,
Veronica fonki Phil.
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: CHL(LLA, AIS, MAG).

Hippuris L.**Hippuris vulgaris** L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR, TDF).
CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

Kickxia Dumort.**Kickxia elatine** (L.) Dumort.

Sin.: *Antirrhinum elatine* L., *Elatinoides*
elatine (L.) Wettst., *Linaria elatine* (L.) Mill.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(ERI). CHL(BIO, ARA, RME,
JFE). URY(CAS, MON, PAY, SJO, TAC).

Limosella L.**Limosella australis** R. Br.

Sin.: *Limosella americana* Glück,
Limosella americana Glück f. *natans*
Glück, *Limosella americana* Glück f.
summersa Glück, *Limosella americana*
Glück f. *terrestris* Glück, *Limosella*
aquatica L. var. *tenuifolia* (Nutt.) Hook.
f., *Limosella australis* R. Br. f. *natans*
Glück, *Limosella australis* R. Br. f.
submersa Glück, *Limosella australis* R.
Br. f. *terrestris* Glück, *Limosella lineata*
Glück, *Limosella tenuifolia* Nutt.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, JUJ, MEN, NEU, RNE,
SAL, SJU, SCR, SFE, TDF). BRA(RGS).
CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Linaria Mill.**Linaria genistifolia** (L.) Mill. subsp.

dalmatica (L.) Maire & Petitm.
Sin.: *Antirrhinum dalmaticum* L.,
Linaria dalmatica (L.) Mill.
Hierba. Introducida. 700-800 m.
Países: ARG(NEU, RNE).

Linaria purpurea (L.) Mill.

Sin.: *Antirrhinum purpureum* L.
Hierba. Introducida. 700-800 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR).

Linaria vulgaris Mill.

Sin.: *Antirrhinum linaria* L.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(MIS, NEU). CHL(VAL,
LBO, BIO, ARA, AIS).

Littorella P.J. Bergius

Littorella australis Griseb. ex Benth. & Hook. f.

Sin.: *Plantago araucana* Rahn
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(NEU, SCR, TDF).
CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Maurandya Ortega

Maurandya antirrhiniflora Humb. & Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Asarina antirrhiniflora* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pennell, *Maurandella antirrhiniflora* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rose

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE).

Maurandya barclayana Lindl.

Sin.: *Asarina barclayana* (Lindl.) Pabst
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Maurandya erubescens (D. Don) A. Gray

Sin.: *Lophospermum erubescens* D. Don
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Mecardonia Ruiz & Pav.

Mecardonia berroi Marchesi

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(ART, PAY).

Mecardonia grandiflora (Benth.) Pennell

Sin.: *Bacopa grandiflora* (Benth.)
Descole & Borsini, hom. illeg., *Herpestis grandiflora* Benth., *Monniera grandiflora* (Benth.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mecardonia kamogawae Greppi & J.C. Hagiw.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS).

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var. **caespitosa** (Cham.) V.C. Souza

Sin.: *Bacopa caespitosa* (Cham.) Edwall, *Herpestis caespitosa* Cham., *Mecardonia caespitosa* (Cham.) Pennell, *Monniera caespitosa* (Cham.) Kuntze

Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var. **flagellaris** (Cham. & Schltld.) V.C. Souza

Sin.: *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst. var. *flagellaris* (Cham. & Schltld.) Chodat & Hassl., *Bacopa flagellaris* (Cham. & Schltld.) Edwall, *Bacopa radicata* (Benth.) Descole & Borsini, *Bacopa veronicaefolia* (Cham. & Schltld.) Descole & Borsini, *Bacopa versicolor* Herter & Melch., *Herpestis flagellaris* Cham. & Schltld., *Herpestis flagellaris* Cham. & Schltld. var. *veronicaefolia* Cham. & Schltld., *Herpestis radicata* Benth., *Mecardonia flagellaris* (Cham. & Schltld.) Rossow, *Mecardonia flagellaris* (Cham. & Schltld.) Rossow subsp. *radicata* (Benth.) Rossow, *Mecardonia montevidensis* (Spreng.) Pennell var. *veronicaefolia* (Cham. & Schltld.) G. Dawson, *Mecardonia radicata* (Benth.) Pennell, *Monniera procumbens* (Mill.) Kuntze f. *albiflora* Kuntze, *Monniera flagellaris* (Cham. & Schltld.) Kuntze, *Monniera procumbens* (Mill.) Kuntze var. *flagellaris* (Cham. & Schltld.) Kuntze, *Monniera radicata* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, NEU, RNE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, MAU). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var. **herniarioides** (Cham.) V.C. Souza

Sin.: *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst. var. *microphylla* (J.A. Schmidt) Edwall, *Bacopa herniarioides* (Cham.) Edwall, *Herpestis chamaedryoides* Kunth var. *microphylla* J.A. Schmidt, *Herpestis herniarioides* Cham., *Mecardonia herniarioides* (Cham.) Pennell, *Mecardonia tenella* (Cham. & Schltld.) Pennell var. *microphylla* (J.A. Schmidt) Rossow, *Monniera herniarioides* (Cham.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, ÑEE). URY(COL).

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var. **procumbens**

Sin.: *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst., *Bacopa dianthera* (Sw.) Descole & Borsini, *Bacopa procumbens* (Mill.)

Greenm., *Erinus procumbens* Mill., *Herpestis chamaedryoides* Kunth, *Herpestis procumbens* (Mill.) Urb., *Lindernia dianthera* Sw., *Mecardonia dianthera* (Sw.) Pennell, *Monniera dianthera* (Sw.) Millsp., *Monniera procumbens* (Mill.) Kuntze, *Pagesia dianthera* (Sw.) Pennell, *Pagesia procumbens* (Mill.) Pohl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU).

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var. **tenella** (Cham. & Schltld.) V.C. Souza

Sin.: *Bacopa tenella* (Cham. & Schltld.) Edwall, *Bacopa uruguayensis* Herter & Melch., *Herpestis tenella* Cham. & Schltld., *Mecardonia tenella* (Cham. & Schltld.) Pennell, *Monniera tenella* (Cham. & Schltld.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, SOR, TAC, TYT).

Mecardonia pubescens Rossow

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Mecardonia reneeae Greppi & M.M. Sosa

Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE).

Mecardonia serpylloides (Cham. & Schltld.) Pennell

Sin.: *Bacopa serpylloides* (Cham. & Schltld.) Edwall, *Herpestis pusilla* (Mart.) D. Dietr., *Herpestis serpylloides* Cham. & Schltld., *Mecardonia pusilla* Mart., *Monniera serpylloides* (Cham. & Schltld.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Melosperma Benth.

Melosperma andicola Benth. var. **andicola**

Sin.: *Herpestis andicola* Gillies ex Benth., *Melosperma glabra* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2300-3900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Melosperma andicola Benth. var. **angustifolia** (Phil.) Rossow

Sin.: *Melosperma angustifolia* Phil.
Hierba. Endémica. 2500-4500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Misopates Raf.**Misopates orontium** (L.) Raf.

Sin.: *Antirrhinum orontium* L., *Orontium arvense* Pers.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(DFE, ERI, SFE, TUC). URY(SJO).

Monopera Barringer**Monopera perennis** (Chodat & Hassl.) Barringer

Sin.: *Angelonia micrantha* Benth. var. *perennis* Chodat & Hassl.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Monttea Gay**Monttea aphylla** (Miers) Benth. & Hook.

Sin.: *Monttea aphylla* (Miers) Benth. & Hook. var. *glandulifera* Rossow, *Oxycladus aphyllus* Miers
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

Monttea chilensis Gay var. **chilensis**

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Monttea chilensis Gay var. **taltalensis**

Reiche
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, COQ).

Monttea schickendantzii Griseb.

Arbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, TUC).

Nuttallanthus D.A. Simpson**Nuttallanthus canadensis** (L.) D.A. Webb

Sin.: *Antirrhinum canadense* L., *Linaria canadensis* (L.) Dum. Cours., *Linaria*

canadensis (L.) Dum. Cours. var. *texana* (Scheele) Pennell, *Linaria texana* Scheele
Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI). URY(CAS, COL, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, SJO, SJO).

Ourisia Comm. ex Juss.**Ourisia alpina** Poepp. & Endl.

Sin.: *Ourisia alpina* Poepp. & Endl. var. *glabra* Phil., *Ourisia alpina* Poepp. & Endl. var. *pallens* (Poepp. & Endl.) Benth., *Ourisia pallens* Poepp. & Endl., *Ourisia rancoana* Phil., *Ourisia rosea* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Ourisia breviflora Benth. subsp. **breviflora**

Sin.: *Ourisia antarctica* Hook. f.
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Ourisia breviflora Benth. subsp. **uniflora** (Phil.) Meudt

Sin.: *Ourisia breviflora* Benth. var. *uniflora* (Phil.) Reiche, *Ourisia uniflora* Phil.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(BIO, LLA).

Ourisia coccinea (Cav.) Pers. subsp. **coccinea**

Sin.: *Dichroma coccinea* Cav., *Ourisia pearcei* Phil., *Ourisia villosa* Molina, nom. superfl.
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Ourisia coccinea (Cav.) Pers. subsp. **elegans** (Phil.) Meudt

Sin.: *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. var. *minor* Benth., *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. var. *elegans* (Phil.) Reiche, *Ourisia elegans* Phil.
Hierba. Endémica. 100-2600 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI).

Ourisia fragrans Phil.

Hierba. Endémica. 1300-2200 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Ourisia fuegiana Skottsbo.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Ourisia microphylla Poepp. & Endl.

Subarbusto. Endémica. 800-2200 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO).

Ourisia muscosa Benth.

Hierba. Nativa. 3800-5000 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Ourisia polyantha Poepp. & Endl.

Sin.: *Ourisia diazii* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1300-2400 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Ourisia pulchella Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(SAL).

Ourisia pygmaea Phil.

Hierba. Endémica. 1400-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Ourisia ruellioides (L. f.) Kuntze

Sin.: *Chelone ruellioides* L. f., *Ourisia glabra* Molina, nom. superfl., *Ourisia magellanica* C.F. Gaertn., *Ourisia poeppigii* Benth., *Ourisia racemosa* Clos, *Ourisia ruellioides* (L. f.) Kuntze var. *poeppigii* (Benth.) H.S. Irwin
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Ourisia serpyllifolia Benth.

Sin.: *Ourisia melospermoides* Phil.
Subarbusto. Endémica. 1000-2200 m.
Países: CHL(VAL, MAU, RME).

Plantago L.**Plantago arenaria** Waldst. & Kit.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).

Plantago argentina Pilg.

Sin.: *Plantago argentina* Pilg. var. *glabra* Pilg., *Plantago oreades* Decne. var. *chamaestachys* Griseb.
Hierba. Endémica. 1500-2800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Plantago australis Lam. subsp. **australis**

Sin.: *Plantago accrescens* Pilg., *Plantago australis* Lam. subsp. *angustifolia* (Pilg.) Rahn, *Plantago australis* Lam. subsp. *macrostachys* (Decne.) Rahn, *Plantago bicallosa* Decne. var. *angustifolia* Pilg., *Plantago candollei* Rapin, *Plantago denudata* Pilg., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago gigantea* Decne., *Plantago hirtella* Kunth var. *glabrescens* (Schmidt) Pilg., *Plantago hirtella* Kunth var. *platensis* Pilg., *Plantago hypolasia* Pilg., *Plantago kurtzii* Pilg., *Plantago macropus* Pilg., *Plantago macrostachys* Decne., *Plantago macrostachys* Decne. f. *brachypus* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *accrescens* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *angustifolia* Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *brachypus* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *catamarcensis* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *denudata* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *gigantea* (Decne.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *platensis* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *stuckertii* (Pilg.) Pilg., *Plantago macrostachys* Decne. var. *typica* Pilg., nom. inval., *Plantago myosuroides* Lam. var. *latifolia* Speg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *hypolasia* (Pilg.) Pilg., *Plantago refracta* Pilg., *Plantago stuckertii* Pilg. subsp. *catamarcensis* Pilg., *Plantago stuckertii* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *hypolasia* (Pilg.) Pilg.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE). PRY(CAA, CEN, GUA, MIE). URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, ROC).

Plantago australis Lam. subsp. **cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Rahn

Sin.: *Plantago calbucana* Phil., *Plantago carrenleofuensis* Speg., *Plantago carrenleofuensis* Speg. var. *latifolia* Pilg., *Plantago cumingiana* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago cumingiana* Fisch. & C.A. Mey. var. *minor* Pilg., *Plantago foncki* Phil., *Plantago julietii* Phil., *Plantago laevigata* Phil., *Plantago macrostachys* Decne. var. *subandina* Speg., *Plantago ovata* Phil., hom. illeg., *Plantago pugae* Phil.,

Plantago tomentosa Lam. var. *foncki* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR). CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Plantago australis Lam. subsp.**hirtella** (Kunth) Rahn

Sin.: *Plantago bicallosa* Decne., *Plantago cantagallensis* Zahlbr., *Plantago hirtella* Kunth, *Plantago leptophylla* Decne., *Plantago virginica* L. var. *hirtella* (Kunth) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC).

Plantago barbata G. Forst. subsp. **barbata**

Sin.: *Plantago andicola* Decne. ex Barnéoud, *Plantago andicola* Gillies ex Hook. f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *eubarbata* Pilg., nom. inval., *Plantago barbata* G. Forst. var. *imberbis* Hook. f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *maxima* Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. var. *parva* Barnéoud, *Plantago barbata* G. Forst. var. *pauciflora* (Gay) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. var. *puberula* Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. var. *taraxacoides* (Speg.) Pilg., *Plantago imberbis* Hook. f., *Plantago pachyrrhiza* Phil., *Plantago pauciflora* Gay, hom. illeg., *Plantago pauciflora* Lam., hom. illeg., *Plantago pauciflora* Hook. f. var. *taraxacoides* Speg., *Plantago pauciflora* Lam. var. *major* Barnéoud

Hierba. Endémica. 500-3600 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Plantago barbata G. Forst. subsp. **gigantea** Rahn

Sin.: *Plantago barbata* G. Forst. var. *rigidula* Pilg.

Hierba. Endémica. 200-400 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Plantago berroi Pilg.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI). URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, SOR).

Plantago bismarckii Niederl.

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI).

Plantago brasiliensis Sims

Sin.: *Plantago bonariensis* Steud., *Plantago brasiliensis* Sims var. *chilensis* (Rapin) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *cinereovillosa* Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *cordobensis* Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *decaisnei* (Barnéoud) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *eubrasiliensis* Pilg., nom. inval., *Plantago brasiliensis* Sims var. *flavidohirsuta* Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *gayana* (Decne. ex Barnéoud) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *lasiothrix* (Decne.) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *obtusata* (Decne.) Pilg., *Plantago chilensis* Rapin, *Plantago coriacea* Cham. & Schltdl., *Plantago coriacea* Cham. & Schltdl. var. *glabriuscula* Kuntze, *Plantago decaisnei* Barnéoud, *Plantago dolichophylla* Phil., *Plantago gayana* Decne. ex Barnéoud, *Plantago lasiothrix* Kunze ex Decne., *Plantago obtusata* Decne., *Plantago sericea* Ruiz & Pav. var. *decaisnei* (Barnéoud) Wedd., *Plantago sericea* Ruiz & Pav. var. *obtusata* (Decne.) Wedd., *Plantago vidalii* Phil.

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, COR, COS, ERI, LRI, NEU, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, RIV, SAO).

Plantago buchtienii Pilg.

Sin.: *Plantago achalensis* Pilg. var. *hirtula* Pilg., *Plantago australis* Lam. subsp. *buchtienii* (Pilg.) Rahn

Hierba. Nativa. 1000-3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Plantago catharinaea Decne.

Sin.: *Plantago catharinaea* Decne. var. *spathulifolia* (Pilg.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *spathulifolia* Pilg.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plantago commersoniana Decne. & Barnéoud

Sin.: *Plantago bradei* Pilg., *Plantago selloi* J.A. Schmidt, *Plantago yhuensis* Hassl., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(LAV, MAL, MON, ROC).

Plantago coronopus L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.

Países: BRA(RGS). CHL(COQ, LBO, BIO, ARA). URY(MON).

Plantago corvensis Hassemer

Sin.: *Plantago aparadensis* D.B. Falkenb.
Hierba. Endémica. 800-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Plantago densa (Pilg.) Rahn

Sin.: *Plantago brasiliensis* Sims subsp.
densa (Pilg.) Rahn, *Plantago linearis*
Kunth var. *densa* Pilg.
Hierba. Endémica. 100-1800 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Plantago dielsiana Pilg.

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp.
dielsiana (Pilg.) Rahn
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS). URY(CAS,
MON, ROC).

Plantago fernandezia Bertero ex

Barnéoud
Sin.: *Robinsonia nervosa* Phil.
Arbusto. Endémica. 500-600 m.
Países: CHL(JFE).

Plantago firma Kunze ex Walp.

Sin.: *Plantago brachystachys* Walp.,
Plantago clausa Steud., *Plantago*
leonensis Steud., *Plantago marginata*
Steud., *Plantago skottsbergii* Pilg.,
Plantago truncata Cham. & Schltdl.
subsp. *firma* (Kuntze ex Walp.) Pilg.,
Plantago truncata Cham. & Schltdl.
subsp. *skottsbergii* (Pilg.) Pilg.,
Plantago truncata Cham. & Schltdl. var.
canohirsuta Pilg., *Plantago virginica* L.
var. *firma* (Walp.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LRI, RME, JFE).

Plantago grandiflora Meyen

Sin.: *Plantago frigida* Kunze ex Walp.,
hom. illeg., *Plantago macrantha* Decne.
ex Barnéoud, *Plantago macrantha* Decne.
ex Barnéoud var. *argentea* Phil., *Plantago*
macrantha Decne. ex Barnéoud var.
hirsuta Phil., *Plantago macrantha* Decne.
ex Barnéoud var. *nitidifolia* Barnéoud,
Plantago macrantha Decne. ex Barnéoud
var. *trichophylla* Phil., *Plantago*
platypetala Wallr. ex Walp.
Hierba. Endémica. 1300-2800 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,
LBO, MAU, BIO, RME).

Plantago guilleminiana Decne.

Hierba. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Plantago hatschbachiana Hassemer

Hierba. Endémica. 600-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Plantago heterophylla Nutt.

Sin.: *Plantago aquatilis* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,
ERI, LPA). BRA(RGS). PRY(COA).
URY(PAY).

Plantago hispidula Ruiz & Pav.

Sin.: *Plantago albida* Phil., *Plantago*
callosa Colla, *Plantago disticha* Phil.,
Plantago heterophylla Phil., nom. illeg.,
Plantago macrosperma Steud., *Plantago*
steinheilii Barnéoud, p.p., *Plantago*
stenopetala Phil., *Plantago stenopetala*
Phil. var. *stricta* Phil., *Plantago*
subtrinervis Phil., *Plantago tumida* Link
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Plantago humboldtiana Hassemer

Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Plantago johnstonii Pilg.

Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(ANT).

Plantago jujuyensis Rahn

Hierba. Endémica. 2500-3300 m.
Países: ARG(JUJ).

Plantago lanceolata L.

Hierba. Introducida. 0-2900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN,
MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR,
SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG,
RME, JFE, IPA). URY(CAS, MON, PAY,
RNO, ROC).

Plantago litorea Phil.

Sin.: *Plantago glabriuscula* Phil.,
Plantago oligantha Phil., *Plantago*
philippiana Vatte
Hierba. Endémica. 0-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
COQ, VAL).

Plantago lundborgii Sparre

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(IDE).

Plantago major L.

Sin.: *Plantago major* L. f. *rocae*
(Lorentz) Pilg., *Plantago rocae* Lorentz
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN,
MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR,
SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG,
RME, JFE, IPA). URY(CAS, MON).

Plantago maritima L.

Sin.: *Plantago juncoides* Lam., *Plantago*
juncoides Lam. subsp. *scabrior* Pilg.,
Plantago maritima L. subsp. *juncoides*
(Lam.) Hook. f., *Plantago maritima* L.
var. *juncoides* (Lam.) A. Gray, *Plantago*
maritima L. var. *macrophylla* Speg.,
Plantago maritima L. var. *pauciflora*
Speg., *Plantago maritima* L. var. *scabrior*
(Pilg.) Pilg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(MAG).

Plantago monanthos d'Urv. var. **monanthos**

Sin.: *Plantago barbata* G. Forst. f.
elongata Pilg., nom. illeg., *Plantago*
barbata G. Forst. f. *uncialis* (Decne.
ex Barnéoud) Pilg., *Plantago barbata*
G. Forst. subsp. *austroandina* Rahn,
Plantago barbata G. Forst. subsp.
monanthos (d'Urv.) Rahn, *Plantago*
barbata G. Forst. var. *caespitosa* (Phil.)
Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. var.
elongata Hook. f., *Plantago barbata* G.
Forst. var. *monanthos* (d'Urv.) Pilg.,
Plantago barbata G. Forst. var. *uncialis*
(Decne. ex Barnéoud) Pilg., *Plantago*
barbata G. Forst. var. *uncialis* Wedd.,
Plantago caespitosa Phil., *Plantago*
coelorhiza Morris & Macloskie, *Plantago*
correae Rahn, *Plantago oxyphylla* Speg.,
Plantago polymorpha Banks & Sol. ex
Hook. f., *Plantago pulvinata* Speg.,
Plantago uncialis Decne. ex Barnéoud,
Plantago uniflora Phil., hom. illeg.,
Plantago uniglumis Wallr. ex Walp.,
Plantago uniglumis Wallr. ex Walp. f.
maxima Pilg., *Plantago uniglumis* Wallr.
ex Walp. var. *brevicuspis* Pilg., *Plantago*
uniglumis Wallr. ex Walp. var. *oxyphylla*
(Speg.) Pilg.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU,
BIO, AIS, MAG, RME).

Plantago monanthos d'Urv. var. **muscooides** Hook. f.

Sin.: *Plantago barbata* G. Forst. f. *abbreviata* (Hook. f.) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. f. *muscooides* (Hook. f.) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. subsp. *muscooides* (Hook. f.) Rahn, *Plantago monanthos* d'Urv. var. *abbreviata* Hook. f. Hierba. Endémica. 0-200 m. Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Plantago monticola Decne.

Sin.: *Plantago monticola* Decne. subsp. *eumonticola* Pilg., nom. inval., *Plantago monticola* Decne. subsp. *sericans* Pilg., *Plantago sericea* Ruiz & Pav. subsp. *sericans* (Pilg.) Rahn Hierba. Nativa. 2900-4400 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP).

Plantago moorei Rahn

Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(TDF).

Plantago myosuroides Lam.

Sin.: *Plantago chubutensis* Pilg., *Plantago humilior* Pilg., *Plantago humilis* Decne., hom. illeg., *Plantago myosuroides* Lam. subsp. *humilior* (Pilg.) Rahn, *Plantago myosuroides* Lam. subsp. *nudiuscula* Pilg., *Plantago myosuroides* Lam. var. *angustifolia* Pilg., *Plantago myosuroides* Lam. var. *hirta* Speg., *Plantago myosuroides* Lam. var. *major* Pilg., *Plantago myosuroides* Lam. var. *nudiuscula* Pilg., *Plantago myosuroides* Lam. var. *parviflora* Pilg., *Plantago myosuroides* Lam. var. *taraxacoides* Speg., *Plantago nigrifolia* Pilg., *Plantago pseudomyosuroides* Pilg., *Plantago rojasii* Pilg., *Plantago taraxacoides* (Speg.) Pilg. Hierba. Nativa. 0-1800 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, DUR, FLA, MAL, MON, ROC).

Plantago napiformis (Rahn)

Hassemer

Sin.: *Plantago paralias* Decne. subsp. *napiformis* Rahn, *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *napiformis* (Rahn) Rahn Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, GUA, MIE, SPE).

Plantago nebularis Hassemer

Hierba. Endémica. 800-1200 m. Países: CHL(ANT).

Plantago nubicola (Decne.) Rahn

Sin.: *Bougueria nubicola* Decne. Hierba. Nativa. 3900-4500 m. Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Plantago orbignyana Steinh. ex

Decne. subsp. **niederleinii** (Pilg.) Rahn Sin.: *Plantago niederleinii* Pilg. Hierba. Endémica. 2500-3500 m. Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Plantago orbignyana Steinh. ex

Decne. subsp. **orbignyana** Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp. *orbignyana* (Steinh. ex Decne.) Rahn, *Plantago hirtella* Kunth var. *orbignyana* (Steinh. ex Decne.) A. Gray, *Plantago orbignyana* Steinh. ex Decne. var. *lasiantha* Pilg. Hierba. Nativa. 3500-4400 m. Países: ARG(JUU, SAL).

Plantago orbignyana Steinh. ex Decne.

subsp. **pseudomollior** (Rahn) Rahn Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp. *pseudomollior* Rahn Hierba. Nativa. 3100-3800 m. Países: ARG(JUU, SAL).

Plantago pachyneura Steud.

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp. *pachyneura* (Steud.) Rahn, *Plantago berteroi* Steinh. ex Decne., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *eupachyneura* (Pilg.) Pilg., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey. var. *hygrophila* (Steud.) Pilg., *Plantago hygrophila* Steud., *Plantago pachyneura* Steud. subsp. *eupachyneura* Pilg., nom. inval., *Plantago pachyneura* Steud. var. *hygrophila* (Steud.) Pilg., *Plantago pachystachys* Phil. Hierba. Endémica. 1300-2900 m. Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

Plantago patagonica Jacq.

Sin.: *Plantago gnaphaloides* Nutt., *Plantago patagonica* Jacq. f. *glabrescens* Pilg., *Plantago patagonica* Jacq. f. *vestita* Pilg., *Plantago patagonica* Jacq. var. *gracilescens* Speg., *Plantago patagonica* Jacq. var. *majuscula* Pilg., *Plantago patagonica* Jacq. var. *minuscula* Speg.,

Plantago patagonica Jacq. var. *typica* Speg., nom. inval., *Plantago purshii* Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-2000 m. Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF).

Plantago penantha Griseb.

Sin.: *Plantago kuntzei* Pilg. Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CAS, FLA, LAV, SJO).

Plantago pretoana (Rahn) Hassemer

Sin.: *Plantago australis* Lam. subsp. *pretoana* Rahn Hierba. Nativa. 700-900 m. Países: BRA(PAR).

Plantago rahniana Hassemer & R. Trevis.

Hierba. Endémica. 1500-1800 m. Países: BRA(SCA).

Plantago rancaguae Steud.

Sin.: *Plantago brachyantha* Phil., *Plantago bracteosa* Phil., *Plantago deserticola* Phil., *Plantago quillota* Vatke, *Plantago steinheilii* Barnéoud, p.p. Hierba. Endémica. 0-200 m. Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Plantago sempervivoides Dusén

Hierba. Endémica. 700-1600 m. Países: ARG(MEN, SCR). CHL(MAG).

Plantago sericea Ruiz & Pav. var.

lanuginosa Griseb. Sin.: *Plantago fiebrigii* Pilg., *Plantago lorentzii* Pilg., *Plantago tarijensis* Pilg. Hierba. Nativa. 2200-4200 m. Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Plantago sericea Ruiz & Pav. var.

sericea Hierba. Nativa. 3300-4300 m. Países: CHL(AYP, TAR).

Plantago tandilensis (Pilg.) Rahn

Sin.: *Plantago brasiliensis* Sims subsp. *tandilensis* (Pilg.) Rahn, *Plantago brasiliensis* Sims var. *tandilensis* Pilg., *Plantago coriacea* Cham. & Schltdl. var. *pilosula* Kuntze Arbusto. Endémica. 200-500 m. Países: ARG(BAI).

Plantago tehuelcha Speg.

Hierba. Endémica. 0-900 m. Países: ARG(CHU, NEU, SCR). CHL(BIO, MAG).

Plantago tomentosa Lam.

Sin.: *Plantago achalensis* Pilg., *Plantago achalensis* Pilg. f. *minor* Pilg., *Plantago affinis* Decne., *Plantago arechavaletai* Pilg., *Plantago bicallosa* Decne. var. *hirsutior* Pilg., *Plantago grisebachii* Hieron., *Plantago hypoleuca* Pilg., *Plantago oreades* Decne. var. *lanuginosa* Griseb., *Plantago paralias* Decne., *Plantago paralias* Decne. subsp. *affinis* (Decne.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *dasystachys* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *euparalias* Pilg., nom. inval., *Plantago paralias* Decne. subsp. *grisebachii* (Hieron.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *leiocalyx* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *petiolata* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *schlechtendaliana* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. subsp. *selloana* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *achalensis* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *brevifolia* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *cordobensis* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *glabrescens* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *lasiophylla* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *mollior* (Pilg.) Pilg., *Plantago paralias* Decne. var. *saxicola* (Pilg.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *affinis* (Decne.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *balansai* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *dasystachys* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *grisebachii* (Hieron.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *leiocalyx* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *paralias* (Decne.) Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *petiolata* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *schlechtendaliana* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *selloana* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *achalensis* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *brevifolia* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *cordobensis* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *glabrescens* Schmidt, *Plantago tomentosa* Lam. var. *lasiophylla* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *mollior* Pilg., *Plantago tomentosa* Lam. var. *saxicola* Pilg.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).

Plantago truncata Cham. & Schltdl.

Sin.: *Plantago amphibola* Phil., *Plantago angustifolia* Phil., *Plantago australis* Lam. subsp. *truncata* (Cham. & Schltdl.) Rahn, *Plantago berteroniana* Steud., *Plantago bridgesii* Decne., *Plantago obscura* Steud., *Plantago schscholtziana* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *angustifolia* (Phil.) Reiche, *Plantago truncata* Cham. & Schltdl. subsp. *escscholtziana* (Fisch. & C.A. Mey.) Pilg., *Plantago truncata* Cham. & Schltdl. var. *philippii* Pilg., *Plantago valparadisiaca* Decne.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Plantago tubulosa Decne.

Sin.: *Plantago tubulosa* Decne. f. *maxima* Pilg.

Hierba. Nativa. 2900-5000 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Plantago turficola Rahn

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Plantago ventanensis Pilg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI).

Plantago venturii Pilg.

Hierba. Endémica. 1200-2600 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Plantago weddelliana Decne.

Hierba. Nativa. 2300-3800 m.

Países: ARG(SAL).

Plantago zoellneriana Hassemer

Sin.: *Plantago sericea* Ruiz & Pav. subsp. *araucana* Rahn

Hierba. Endémica. 600-2000 m.

Países: CHL(MAU, BIO).

Scoparia L.**Scoparia aemilii** Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, DFE, MIS, SFE). PRY(APY, BOQ, COA, PHA).

Scoparia dulcis L.

Sin.: *Capraria dulcis* (L.) Kuntze, *Scoparia dulcis* L. var. *tenuifolia* Griseb., *Scoparia procumbens* Jacq., *Scoparia purpurea* Ridl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, SAO).

Scoparia elliptica Cham. & Schltdl.

Sin.: *Capraria elliptica* (Cham.) Kuntze

Hierba. Endémica. 500-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Scoparia ericacea Cham. & Schltdl.

Sin.: *Capraria ericacea* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(COA, PHA). URY(ART, RNO, RIV, SOR, TAC).

Scoparia hassleriana Chodat

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI).

Scoparia montevidensis (Spreng.)

R.E. Fr.

Sin.: *Capraria montevidensis* (Spreng.) Kuntze var. *intermedia* Kuntze, *Capraria montevidensis* (Spreng.) Kuntze, *Microcarpaea montevidensis* Spreng., *Scoparia annua* Cham. & Schltdl., *Scoparia excelsa* R.E. Fr., *Scoparia flava* Cham. & Schltdl., *Scoparia flava* Cham. & Schltdl. var. *glandulifera* Fritsch, *Scoparia glandulifera* (Fritsch) Descole & Borsini, *Scoparia grisebachii* Fritsch, *Scoparia macrantha* R.E. Fr., *Scoparia millefoliata* Fritsch, *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *flava* (Cham. & Schltdl.) Chodat, *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *glandulifera* (Fritsch) R.E. Fr., *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *grisebachii* (Fritsch) Chodat, *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *intermedia* (Kuntze) Chase, *Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E. Fr. var. *neglecta* (R.E. Fr.) Carolin, *Scoparia neglecta* R.E. Fr. var. *intermedia* (Kuntze) R.E. Fr., *Scoparia neglecta* R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, ÑEE, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Scoparia nudicaulis Chodat

Sin.: *Scoparia nudicaulis* Chodat subsp. *praedensa* R.E. Fr., *Scoparia praedensa* (R.E. Fr.) Cabrera

Subarbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC).

Scoparia pinnatifida Cham.

Sin.: *Scoparia multifida* G. Don
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, ÑEE).

Scoparia plebeja Cham. & Schltdl.

Sin.: *Scoparia divaricata* R.E. Fr.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC).

Sibthorpia L.**Sibthorpia conspicua** Diels

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Sibthorpia repens (L.) Kuntze

Sin.: *Sibthorpia americana* Sessé & Moç., *Sibthorpia nectarifera* Wedd., *Sibthorpia parvifolia* Mart. & Galeotti, *Sibthorpia pichinchensis* Kunth, *Sibthorpia retusa* Kunth, *Sibthorpia rotundifolia* (Ruiz & Pav.) Edwin, *Sibthorpia triandra* Suess., *Veronica rotundifolia* Ruiz & Pav., *Willichia repens* L.

Hierba. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Stemodia L., nom. cons.**Stemodia diplohyptoides** M.M. Sosa & Dematteis

Hierba. Endémica. 100-400 m.
Países: ARG(MIS).

Stemodia durantifolia (L.) Sw. var.

chilensis (Benth.) C.C. Cowan
Sin.: *Stemodia chilensis* Benth., *Stemodiakra chilensis* (Benth.) Kuntze
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(RNE). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Stemodia ericifolia (Kuntze) K. Schum.

Sin.: *Chodaphyton ericifolium* (Kuntze) Minod, *Stemodia ericifolia* (Kuntze) K. Schum. subsp. *vera* Hassl., *Stemodiakra ericifolia* Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE). PRY(APY, BOQ, PHA).

Stemodia hassleriana Chodat

Hierba. Nativa.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Stemodia hyptoides Cham. & Schltdl.

Sin.: *Scrophularia subhastata* Vell., *Stemodia hyptoides* Cham. & Schltdl. var. *auriculata* Chodat & Hassl., *Stemodia hyptoides* Cham. & Schltdl. var. *platensis* Benth., *Stemodia orbiculata* Minod, *Stemodia pilcomayensis* Minod, *Stemodia subhastata* (Vell.) Benth., *Stemodiakra hyptoides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAA, CEN, COA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Stemodia lanceolata Benth.

Sin.: *Stemodia lanceolata* Benth. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Stemodia lanceolata* Benth. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Stemodia lanceolata* Benth. f. *laxiflora* Chodat & Hassl., *Stemodia lanceolata* Benth. var. *angustifolia* (Chodat & Hassl.) Minod, *Stemodia lanceolata* Benth. var. *latifolia* (Chodat & Hassl.) Minod, *Stemodiakra lanceolata* (Benth.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE). URY(SJO, SOR).

Stemodia lobelioides Lehm.

Sin.: *Gratiola hookeri* Walp., *Gratiola tetragona* Hook., hom. illeg., *Stemodia tetragona* (Hook.) Minod, *Stemodiakra tetragona* (Hook.) Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, SFE). URY(COL, RNO, ROC, SJO).

Stemodia palustris A. St.-Hil.

Sin.: *Stemodia gratiolifolia* A. St.-Hil., *Stemodia linearifolia* (Morong) Conard var. *acutifolia* Chodat & Hassl., *Stemodia linearifolia* (Morong) Conard, *Stemodia palustris* A. St.-Hil. f. *salicifolia* Minod, *Stemodia palustris* A. St.-Hil. var. *simplex* J.A. Schmidt, *Stemodiakra gratiolifolia* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Stemodiakra linearifolia* Morong, *Stemodiakra palustris* (A. St.-Hil.) Kuntze

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Stemodia scoparioides Hassl.

Hierba. Endémica.
Países: ARG(COS). PRY(AMA).

Stemodia stricta Cham. & Schltdl.

Sin.: *Stemodia hyptoides* Cham. & Schltdl. var. *stricta* (Cham. & Schltdl.) G. Dawson, *Stemodia stricta* Cham. & Schltdl. f. *minor* Chodat & Hassl., *Stemodia stricta* Cham. & Schltdl. var. *multidentata* Minod, *Stemodia stricta* Cham. & Schltdl. var. *paucidentata* Minod, *Stemodiakra stricta* (Cham. & Schltdl.) Kuntze var. *glabriuscula* Kuntze, *Stemodiakra stricta* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(ART, PAY).

Stemodia trifoliata (Link) C. Rchb.

Sin.: *Columnnea trifoliata* Link, *Stemodia cruciflora* Casar.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Stemodia vandellioides (Benth.) V.C. Souza

Sin.: *Conobea vandellioides* Benth., *Lindernia vandellioides* (Benth.) Pennell & G.M. Barroso
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Stemodia verticillata (Mill.) Hassl.

Sin.: *Capraria humilis* Sol., *Erinus verticillatus* Mill., *Lendneria humilis* (Sol.) Minod, *Lendneria verticillata* (Mill.) Britton, *Stemodia arenaria* Kunth, *Stemodia humilis* (Sol.) G. Dawson, *Stemodia macrotricha* Colla, *Stemodia parviflora* W.T. Aiton, nom. superfl., *Stemodiakra verticillata* (Mill.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, COA, ÑEE). URY(ART, CLA, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC).

Veronica L.**Veronica anagallis-aquatica L.**Sin.: *Veronica lepida* Phil.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE). URY(CAS, MON).

Veronica arvensis L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE). URY(CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MON, PAY, SOR).

Veronica beccabunga L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(LLA).

Veronica chamaedrys L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL). CHL(LRI).

Veronica elliptica G. Forst.Sin.: *Hebe elliptica* (G. Forst.) Pennell, *Hebe magellanica* J.F. Gmel., *Veronica simpsoni* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Veronica officinalis L.

Hierba. Introducida. 0-1300 m.

Países: CHL(ARA, LRI).

Veronica peregrina L.Sin.: *Veronica chilensis* Kunth, *Veronica peregrina* L. f. *xalapensis* (Kunth) K. Koch, *Veronica peregrina* L. subsp. *xalapensis* (Kunth) Pennell, *Veronica peregrina* L. var. *laurentiana*, *Veronica peregrina* L. var. *xalapensis* (Kunth) Pennell, *Veronica romana* L., *Veronica xalapensis* Kunth

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, AIS, MAG, RME). URY(ART, CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, SJO, SJO, TAC).

Veronica persica Poir.Sin.: *Veronica buxbaumii* Ten.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(CAS, MON, SOR).

Veronica polita Fr.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, MON).

Veronica scutellata L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(LRI, LLA).

Veronica serpyllifolia L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

PLUMBAGINACEAE

Armeria Willd., nom. cons.**Armeria maritima (Mill.) Willd.**Sin.: *Armeria aegialea* Phil., *Armeria andina* Poepp. ex Boiss., *Armeria androsacea* Boiss., *Armeria bella* Albov, *Armeria brachyphylla* Boiss., *Armeria chilensis* Boiss., *Armeria chilensis* Boiss. subsp. *andina* (Poepp. ex Boiss.) Reiche, *Armeria chilensis* Boiss. subsp. *macloviana* (Cham.) Reiche, *Armeria chilensis* Boiss. var. *magellanica* Boiss., *Armeria curvifolia* Bertero, *Armeria delfinii* Phil., *Armeria elongata* (Hoffm.) C. Koch var. *macloviana* (Cham.) Skottsbo., *Armeria exaristata* Phil., *Armeria macloviana* Cham., *Armeria maritima* (Mill.) Willd. subsp. *andina* (Poepp. ex Boiss.) D.M. Moore & B. Yates, *Armeria maritima* (Mill.) Willd. var. *goodalliana* T.R. Dudley, *Armeria patagonica* Phil., *Armeria tenuifolia* Phil., *Statice maritima* Mill., *Statice punicea* Rendle

Hierba. Endémica. 0-3200 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Bakerolimon O.A. Lincz.**Bakerolimon plumosum (Phil.) O.A. Lincz.**Sin.: *Limonium plumosum* (Phil.)Kuntze, *Statice plumosa* Phil.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Ceratostigma Bunge**Ceratostigma plumbaginoides Bunge**

Hierba. Introducida 1200-1300 m.

Países: ARG(COR).

Limonium Mill., nom. cons.**Limonium brasiliense (Boiss.) Kuntze**Sin.: *Limonium brasiliense* (Boiss.)Kuntze var. *patagonicum* (Speg.)Burkart, *Statice brasiliense* Boiss., *Statice brasiliense* Boiss. var. *antarctica* Boiss., *Statice brasiliense* Boiss. var. *patagonica* (Speg.) Hicken, *Statice patagonica* Speg., *Statice brasiliense* Boiss. var. *uruguayensis* (Arechav.) Hauman, *Statice uruguayensis* Arechav.

Hierba o subarbusto. Endémica.

0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

Limonium guaicura (Molina) KuntzeSin.: *Plegorrhiza guaicura* Molina, *Statice chilensis* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Plumbago Tourn. ex L.**Plumbago caerulea Kunth**

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ).

Plumbago scandens L.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(SCA). PRY(APY, CEN, COA).

POACEAE

Aciachne Benth.**Aciachne acicularis Laegaard**

Hierba. Nativa. 3600-4200 m.

Países: ARG(CAT, SAL).

Acroceras Stapf**Acroceras excavatum** (Henrard)

Zuloaga & Morrone

Sin.: *Lasiacis excavata* (Henrard)Parodi, *Panicum excavatum* Henrard

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, GUA, MIE, PAI, SPE).

Acroceras zizanioides (Kunth) DandySin.: *Acroceras oryzoides* (Sw.) Stapf,*Panicum oryzoides* Sw., hom. illeg.,*Panicum zizanioides* Kunth

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, SAO).

Agenium Nees**Agenium leptocladum** (Hack.) ClaytonSin.: *Andropogon leptocladus* Hack. f.*simplex* Hack., *Andropogon leptocladus*Hack., *Heteropogon leptocladus* (Hack.)Parodi, hom. illeg., *Heteropogon leptocladus*(Hack.) Roberty var. *pilosus* Parodi,*Heteropogon leptocladus* (Hack.) Roberty,*Sorghum leptocladum* (Hack.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(COA, PAI).

Agenium majus Pilg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA).

Agenium villosum (Nees) Pilg.Sin.: *Agenium nutans* Nees,*Andropogon neesii* Kunth, hom. illeg.,*Andropogon villosus* (Nees) Ekman,comb. illeg., *Heteropogon villosus* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, COA, GUA). URY(CLA, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

Agropyron Gaertn.**Agropyron cristatum** (L.) Gaertn.Sin.: *Bromus cristatus* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(MAG).

Agrostis L., nom. cons.**Agrostis ambatoensis** Asteg.

Hierba. Endémica. 4300-4500 m.

Países: ARG(CAT).

Agrostis arvensis Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(BIO, LLA).

Agrostis brachyathera Steud.

Hierba. Endémica. 300-2200 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAU, BIO, AIS, MAG).

Agrostis breviculmis Hitchc.Sin.: *Agrostis nana* (J. Presl) Kunth,comb. superfl., *Trichodium nanum* J. Presl

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, SAL).

CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, RME).

Agrostis capillaris L.Sin.: *Agrostis capillaris* Huds., hom.Illeg., *Agrostis tenuis* Sibth., *Agrostis**vulgaris* With.

Hierba. Introducida. 900-1100 m.

Países: ARG(BAI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Agrostis gigantea RothSin.: *Agrostis campestris* Phil., *Agrostis**exarata* Trin. var. *mutica* Hicken

Hierba. Introducida. 0-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). URY(FLA, MON, SOR).

Agrostis glabra (J. Presl) Kunth var. **glabra**Sin.: *Agrostis andina* Phil., *Agrostis**gayana* E. Desv., *Agrostis pyrogea* Speg.,*Agrostis pyrogea* Speg. var. *mutica* Hack.,*Trichodium glabrum* J. Presl

Hierba. Endémica. 1500-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Agrostis glabra (J. Presl) Kunth var. **melanthes** (Phil.) Rúgolo & De PaulaSin.: *Agrostis melanthes* Phil.,*Calamagrostis laxiflora* Phil., *Deyeuxia**vidalii* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO, ARA, LLA, AIS).

Agrostis idahoensis Nash

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO, LLA, MAG).

Agrostis imberbis Phil.Sin.: *Agrostis moyanoi* Speg. var.*plicatifolia* Speg., *Agrostis pulchella*Kunth f. *purpurascens* (Kurtz) Stuck.,comb. illeg., *Agrostis pulchella* Kunth f.*virescens* (Kurtz) Stuck., comb. illeg.,*Agrostis scabra* F.W. Gray f. *purpurascens*Kurtz, nom. nud., *Agrostis scabra*F.W. Gray f. *virescens* Kurtz, nom.nud., *Agrostis scotanta* Phil., *Agrostis**stenophylla* Phil.

Hierba. Nativa. 1500-2500 m.

Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Agrostis inconspicua Kunze ex E. Desv.Sin.: *Agrostis airaeformis* Steud.,*Agrostis airoides* Franch. var. *flaccidifolia*Speg., *Agrostis umbellata* Colla var.*mutica* Hack. ex Macloskie & Dusén

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Agrostis insularis Rúgolo & A.M. Molina

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: CHL(LLA).

Agrostis lenis Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV).

Agrostis leptotricha E. Desv.Sin.: *Agrostis lechleri* Steud., *Agrostis**moyanoi* Speg., *Agrostis moyanoi* Speg.var. *major* Speg., *Agrostis moyanoi* Speg.var. *puberigluma* Speg.

Hierba. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Agrostis longiberbis Hack. ex L.B. Sm.

Sin.: *Agrostis longiberbis* Hack. ex Usteri, nom. nud., *Calamagrostis capillaris* Nees ex Steud.
Hierba. Nativa. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Agrostis masafuerana Pilg.

Hierba. Endémica. 800-1400 m.
Países: CHL(JFE).

Agrostis mertensii Trin.

Sin.: *Agrostis boliviana* Mez, *Agrostis compressa* Döll, hom. illeg., *Agrostis gelida* Trin., *Agrostis poeppigiana* Phil., *Agrostis williamsii* Phil.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, NEU, SAL, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Agrostis meyenii Trin.

Sin.: *Agrostis canina* L. f. *inclusa* Hack., *Agrostis canina* L. f. *mutica* Hack., hom. illeg., *Agrostis canina* L. var. *falklandica* (Hook. f.) Macloskie, *Agrostis canina* L. var. *falklandica* (Hook. f.) Hack. ex Skottsbl., hom. illeg., *Agrostis conferta* Nees & Meyen, *Agrostis conferta* Nees & Meyen var. *austropatagonica* Pilg., *Agrostis falklandica* Hook. f.
Hierba. Nativa. 1500-4200 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees f. **montevidensis**

Sin.: *Agrostis laxiflora* (Michx.) Richardson var. *aristata* Griseb., *Agrostis montevidensis* Spreng. ex Nees var. *aristata* Döll, nom. superfl.
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, GUA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees f. **submutica** (Döll) Kämpf

Sin.: *Agrostis montevidensis* Spreng. ex Nees var. *submutica* Döll
Hierba. Nativa.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA). PRY(COA, GUA).

Agrostis nebulosa Boiss. & Reut.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(BAI).

Agrostis perennans (Walter) Tuck.

Sin.: *Agrostis aberrans* Steud., *Agrostis canina* L. subsp. *grandiflora* Hack., *Agrostis exarata* Trin. var. *angustifolia* Hack. ex Dusén, *Agrostis flavidula* Steud., *Agrostis kufuim* Speg., *Agrostis pulchella* Kunth, nom. superfl., *Agrostis tenuifolia* Curtis var. *fretensis* Hook. f., *Agrostis violacea* Phil., hom. illeg., *Cornucopiae perennans* Walter, *Vilfa elegans* Kunth
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

Agrostis philippiana Rúgolo & De Paula

Sin.: *Agrostis clausa* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Agrostis platensis Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE). BRA(RGS).

Agrostis reuteri Boiss.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Agrostis scabra Willd.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Agrostis serranoi Phil.

Sin.: *Agrostis delfini* Phil., *Agrostis fuegiana* Hack., *Agrostis oligoclada* Phil., *Agrostis vaginata* Phil., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Agrostis stolonifera L. var. **palustris** (Huds.) Farw.

Sin.: *Agrostis palustris* Huds.
Hierba. Introducida. 0-400 m.
Países: ARG(BAI, DFE, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG). URY(CAS, MON).

Agrostis stolonifera L. var. **stolonifera**

Sin.: *Agrostis aristulata* Müll. Arg., *Agrostis caespitosa* Gaudich. ex Mirb., nom. nud., *Agrostis nemoralis* Phil., *Agrostis prostrata* Hook. f., *Sporobolus gaudichaudii* (Steud.) Albov
Hierba. Introducida. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, TDF). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA).

Agrostis tolucensis Kunth

Sin.: *Agrostis nana* (J. Presl) Kunth var. *aristata* Griseb., *Agrostis tolucensis* Kunth f. *viridiflora epaleata* Hack., nom. nud.
Hierba. Nativa. 1500-4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Agrostis uliginosa Phil.

Sin.: *Agrostis paucinodis* Hack.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Agrostis umbellata Colla

Sin.: *Agrostis canina* L. var. *umbellata* (Colla) Kuntze, *Agrostis chilensis* Trin., *Agrostis paradisiaca* Steud., *Agrostis patens* Trin., *Agrostis stricta* Trin., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Agrostis vidalii Phil.

Sin.: *Agrostis buchtienii* Hack.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LLA, AIS).

Agrostis vinealis Schreb.

Sin.: *Agrostis canina* L. var. *tenuifolia* (M. Bieb.) Boiss., *Agrostis tenuifolia* M. Bieb., hom. illeg.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(CHU). CHL(COQ).

Aira L., nom. cons.

Aira caryophyllea L.

Sin.: *Aspris caryophyllea* (L.) Nash
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

Aira cupaniana Guss.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: URY(LAV, MAL, MON).

Aira elegantissima Schur

Sin.: *Aira capillaris* Host, hom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, TUC). BRA(RGS).
CHL(VAL, ARA). URY(CLA, DUR, FLA,
LAV, MAL, PAY, RIV, SJO).

Aira praecox L.

Sin.: *Aspris praecox* (L.) Nash
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL, LLA,
AIS, MAG, JFE). URY(LAV, MON, SJO).

Alopecurus L.**Alopecurus aequalis** Sobol.

Sin.: *Alopecurus aequalis* Sobol. f.
fluitans Parodi, *Alopecurus aequalis*
Sobol. f. *foliosus* Parodi, *Alopecurus*
aequalis Sobol. f. *notacens* (Hack.)
Parodi, *Alopecurus aequalis* Sobol. f.
violaceus (Hack.) Parodi, *Alopecurus*
aequalis Sobol. var. *fluitans* (Parodi)
Mariano, *Alopecurus aequalis* Sobol. var.
violaceus (Hack.) Mariano, *Alopecurus*
aristulatus Michx., *Alopecurus fulvus* Sm.
f. *violaceus* Hack., *Alopecurus fulvus* Sm.,
Alopecurus geniculatus L. var. *aristulatus*
(Michx.) Torr.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Alopecurus bonariensis Parodi & Thell.

Sin.: *Alopecurus antarcticus* Vahl
var. *brachyatherus* Parodi, *Alopecurus*
magellanicus Lam. var. *brachyatherus*
(Parodi) Mariano
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI,
LPA, SFE). URY(CAS).

Alopecurus geniculatus L. var.
geniculatus

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR,
TDF). CHL(MAG).

Alopecurus geniculatus L. var.
patagonicus Parodi

Hierba. Endémica. 300-600 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(AIS, MAG).

Alopecurus heleochloides Hack.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(COQ, MAG, RME).

Alopecurus hitchcockii Parodi

Hierba. Nativa. 3700-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Alopecurus lechleri Steud.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(LRI, LLA).

Alopecurus magellanicus Lam. var.
bracteatus (Phil.) Mariano

Sin.: *Alopecurus antarcticus* Vahl var.
bracteatus (Phil.) Parodi, *Alopecurus*
bracteatus Phil.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(BIO, LRI, LLA, AIS, MAG).

Alopecurus magellanicus Lam. var.
magellanicus

Sin.: *Alopecurus alpinus* Sm., hom.
illeg., *Alopecurus alpinus* Sm. f. *antarctica*
(Vahl) Hack., *Alopecurus alpinus* Sm. var.
antarcticus (Vahl) Macloskie, *Alopecurus*
alpinus Sm. var. *aristatus* Hook. f.,
nom. nud., *Alopecurus antarcticus* Vahl,
Alopecurus variegatus Steud., *Alopecurus*
triceps Krause
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS, MAG).

Alopecurus myosuroides Huds.

Sin.: *Alopecurus agrestis* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, RNE).
CHL(MAG).

Alopecurus pratensis L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF).
CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Amelichloa Arriaga &
Barkworth**Amelichloa ambigua** (Speg.) Arriaga &
Barkworth

Sin.: *Jarava ambigua* (Speg.) Peñailillo,
Stipa ambigua Speg., *Stipa dusenii*
Hitchc.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI,
LPA, MIS, NEU, RNE, SLU, SCR).

Amelichloa brachychaeta (Godr.)

Arriaga & Barkworth
Sin.: *Achnatherum brachychaetum*
(Godr.) Barkworth, *Jarava brachychaeta*

(Godr.) Peñailillo, *Nassella brachychaeta*
(Godr.) Barkworth, *Stipa brachychaeta*
Godr. f. *minor* Speg., *Stipa brachychaeta*
Godr., *Stipa eminens* Cav. f. *viridis*
Kuntze, *Stipa lorentziana* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI,
LPA, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU,
TUC). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Amelichloa brevipes (E. Desv.)

Arriaga & Barkworth
Sin.: *Jarava brevipes* (E. Desv.)
Peñailillo, *Stipa brevipes* E. Desv., *Stipa*
hirtiflora Hack.
Hierba. Endémica. 200-2400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR). CHL(BIO, AIS, MAG, RME).

Amelichloa caudata (Trin.) Arriaga &
Barkworth

Sin.: *Achnatherum caudatum* (Trin.)
S.W.L. Jacobs & J. Everett, *Jarava*
bertrandii (Phil.) Peñailillo, *Jarava*
caudata (Trin.) Peñailillo, *Stipa*
amphicarpa Phil., *Stipa bertrandii* Phil.,
Stipa brachychaeta Godr. f. *major* Speg.,
Stipa caudata Trin., *Stipa litoralis* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI,
JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SFE).
CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA,
RME). URY(FLA, MON, SJO).

Ammophila Host**Ammophila arenaria** (L.) Link

Sin.: *Ammophila arundinacea* Host,
Arundo arenaria L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, SCR, TDF). CHL(COQ,
VAL, MAU, ARA, LLA, MAG).

Amphibromus Nees**Amphibromus quadridentulus** (Döll)
Swallen

Sin.: *Avena montevidensis* Hack.,
Avena quadridentula Döll, *Helictotrichon*
quadridentulum (Döll) Renvoize, *Uralepis*
quadridentata Döll
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). URY(CAS, MAL, MON,
ROC, SJO, TAC).

Anatherostipa (Hack. ex Kuntze) Peñailillo**Anatherostipa bomanii** (Hauman)

Peñailillo

Sin.: *Nicoraella bomanii* (Hauman)Torres, *Stipa bomanii* Hauman

Hierba. Nativa. 3200-4600 m.

Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR, ANT).

Anatherostipa brevis (Torres)

Peñailillo

Sin.: *Nicoraella brevis* Torres

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Anatherostipa hans-meyeri (Pilg.)

Peñailillo

Sin.: *Stipa hans-meyeri* Pilg.

Nativa. 4000-4200 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Anatherostipa henrardiana (Parodi)

Peñailillo

Sin.: *Nicoraella henrardiana* (Parodi)Torres, *Stipa henrardiana* Parodi

Hierba. Endémica. 4500-5000 m.

Países: ARG(JUJ).

Anatherostipa mucronata (Griseb.)

F. Rojas

Sin.: *Anatherostipa saltensis* (Kuntze)Peñailillo, *Oryzopsis mucronata* (Griseb.)
Parodi, *Nicoraella mucronata* (Griseb.)Torres, *Piptochaetium mucronatum*Griseb., *Stipa saltensis* Kuntze

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

CHL(TAR, ANT, ATA).

Anatherostipa obtusa (Nees &

Meyen) Peñailillo

Sin.: *Nicoraella obtusa* (Nees & Meyen)Torres, *Piptatherum obtusum* Nees &Meyen, *Stipa boliviensis* Hack., *Stipa**jujuyensis* Speg., *Stipa obtusa* (Nees &

Meyen) Hitchc.

Hierba. Nativa. 3600-4100 m.

Países: ARG(JUJ).

Anatherostipa rigidiseta (Pilg.)

Peñailillo

Sin.: *Nicoraella rigidiseta* (Pilg.) Torres,*Oryzopsis rigidiseta* Pilg., *Stipa rigidiseta*
(Pilg.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 3800-4200 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Anatherostipa venusta (Phil.)

Peñailillo

Sin.: *Nicoraella venusta* (Phil.) Torres,*Stipa venusta* Phil.

Hierba. Endémica. 3900-4300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Andropogon L., nom. cons.**Andropogon arenarius** Hack.Sin.: *Anatherum virginicum* (Desv.ex Ham.) Desv. var. *arenarium* (Hack.)Roberty, *Andropogon arenarius* Hack. f.*subcompletus* Hack. ex Lindm.

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(CAS, MAL, MON, ROC).

Andropogon barretoii Norrmann &

Quarín

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Andropogon bicornis L.Sin.: *Andropogon bicornis* L. var.*absconditus* Hack., *Andropogon bicornis* L.var. *burchellii* Hack., *Andropogon bicornis*L. var. *gracillimus* Hack., *Andropogon**bicornis* L. var. *virginicoides* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

CAN, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

Andropogon coloratus Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA).

Andropogon exaratus Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(CEN,

COA, GUA).

Andropogon gayanum Kunth

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Andropogon glaucophyllus Roseng.,

B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(CAS, MON, ROC).

Andropogon glaziovii Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(AMA, CON, COA, MIE, SPE).

Andropogon hypogynus Hack.Sin.: *Andropogon hypogynus* Hack. var.*anatherus* Hack., *Andropogon hypogynus*Hack. var. *conjugens* Hack., *Hypogynium**campestre* Nees

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS).

BRA(PAR). PRY(ITA).

Andropogon lateralis NeesSin.: *Andropogon brevis* Trin.,*Andropogon herzogii* Hack., *Andropogon**incanus* Hack. var. *lateralis* (Nees)Hack., *Andropogon incanus* Hack.var. *ramosissimus* Hack., *Andropogon**incanus* Hack. var. *trichocoleus* Hack.,*Andropogon incanus* Hack., *Andropogon**lateralis* Nees var. *incanus* (Hack.)Henrard, *Andropogon lateralis* Neesvar. *ramosissimus* (Hack.) Henrard,*Andropogon lateralis* Nees var.*trichocoleus* (Hack.) Henrard

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAU, ITA, ÑEE, PAI).

URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, MON,

RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Andropogon leucostachyus KunthSin.: *Anatherum domingense* Roem. &Schult., *Andropogon dominguense* (Roem.

& Schult.) Steud.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU,

CON, COA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Andropogon lindmanii Hack.

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(CAS, ROC).

Andropogon macrothrix Trin.Sin.: *Andropogon ternatus* (Spreng.)Nees subsp. *macrothrix* (Trin.) Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(GUA). URY(CLA, RIV, TAC).

Andropogon selloanus (Hack.) Hack.Sin.: *Andropogon leucostachyus* Kunthsubsp. *selloanus* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,

FOR, JUJ, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(AMA, CAU, CON, PAI, PHA).

URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON,

RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).

Andropogon subtilior (Hack.)

Norrmann

 Sin.: *Andropogon incanus* Hack. var. *subtilior* Hack.

Hierba. Nativa.

Países: PRY(PAI).

Andropogon ternatus (Spreng.) Nees

 Sin.: *Andropogon ternatus* (Spreng.) Nees subsp. *genuinus* Hack., nom. inval., *Saccharum ternatum* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SLU). BRA(RGS, SCA). PRY(AMA). URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Andropogon virgatus Desv. ex Ham.

 Sin.: *Andropogon spathiflorus* (Nees) Kunth, *Hypogynium spathiflorum* Nees, *Hypogynium virgatum* (Desv. ex Ham.) Dandy

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN). URY(RIV).

Anthaenantia P. Beauv.

Anthaenantia lanata (Kunth) Benth.

 Sin.: *Anthaenantia lanata* (Kunth) Benth. var. *mollis* (Nees) Arechav., *Leptocoryphium lanatum* (Kunth) Nees, *Leptocoryphium lanatum* (Kunth) Nees var. *molle* (Nees) Döll, *Leptocoryphium molle* Nees, *Milium juncooides* Speg., *Milium lanatum* (Kunth) Roem. & Schult., *Paspalum dentatosulcatum* Arechav., *Paspalum lanatum* Kunth

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TYT).

Anthaenantiaopsis Mez ex Pilg.

Anthaenantiaopsis fiebrigii Parodi

 Sin.: *Anthaenantiaopsis fiebrigii* Mez, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Anthaenantiaopsis perforata (Nees)

Parodi

 Sin.: *Panicum perforatum* Nees

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON).

Anthaenantiaopsis rojasiana Parodi

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(AMA, GUA).

Anthaenantiaopsis trachystachya

(Nees) Pilg.

 Sin.: *Panicum trachystachyum* Nees

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU).

Anthoxanthum L.

Anthoxanthum juncifolium (Hack.)

Veldkamp

 Sin.: *Hierochloe juncifolia* (Hack.)

 Parodi, *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *juncifolia* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1900 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(AIS, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Anthoxanthum moorei (De Paula) N.

Villalobos & Finot

 Sin.: *Hierochloe moorei* De Paula

Hierba. Endémica.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Anthoxanthum odoratum L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, NEU, RNE, TDF).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE). URY(CAS, MON).

Anthoxanthum pusillum (Hack. ex

Dusén) Veldkamp

 Sin.: *Hierochloe pusilla* Hack. ex Dusén

Hierba. Endémica. 100-900 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Anthoxanthum redolens (Vahl)

 P. Royen var. *gunckelii* (Parodi) N.

Villalobos & Finot

 Sin.: *Anthoxanthum gunckelii* (Parodi)

 Veldkamp, *Hierochloe gunckelii* Parodi

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(RNE). CHL(BIO, ARA,

LRI, LLA).

Anthoxanthum redolens (Vahl) P.

 Royen var. **redolens**

 Sin.: *Avena redolens* (Vahl) Pers., *Hierochloe antarctica* (Labill.) R. Br., *Hierochloe arenaria* Steud., *Hierochloe magellanica* (Desr.) Hook. f., *Hierochloe magellanica* Hook. f., nom. nud., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *magellanicum* (Hook. f.) Macloskie, *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *major* Speg., *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *micrantha* Parodi, *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. var. *typica* Parodi, nom. inval., *Hierochloe sorianoii* De Paula, *Holcus redolens* Vahl, *Melica magellanica* Desr., *Savastana antarctica* (Labill.) Speg.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG).

Anthoxanthum spicatum (Parodi)

Veldkamp

 Sin.: *Hierochloe spicata* Parodi

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: CHL(ARA, MAG).

Anthoxanthum utriculatum (Ruiz

& Pav.) Y. Schouten & Veldkamp var.

altissimum (Steud.) N. Villalobos &

Finot

 Sin.: *Anthoxanthum altissimum* (Steud.)

 Veldkamp, *Hierochloe altissima* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Anthoxanthum utriculatum (Ruiz

& Pav.) Y. Schouten & Veldkamp var.

utriculatum

 Sin.: *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth, *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *minor* Desv., *Torresia utriculata* Ruiz & Pav.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Apera Adans.

Apera interrupta (L.) P. Beauv.

 Sin.: *Agrostis interrupta* L.

Hierba. Introducida. 900-1700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(ARA, RME).

Apoclada McClure**Apoclada simplex** McClure & L.B. Sm.

Sin.: *Apoclada diversa* McClure & L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Nativa. 700-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aristida L.**Aristida achalensis** Mez

Sin.: *Aristida achalensis* Mez var.
elongata Henrard, *Aristida achalensis*
Mez var. *tucumana* (Henrard) Henrard,
Aristida decipiens Henrard, *Aristida*
mandoniana Henrard, *Aristida tucumana*
Henrard
Hierba. Nativa. 900-3300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SLU, TUC).

Aristida adscensionis L.

Sin.: *Aristida adscensionis* L. f.
modestina Hack., nom. nud., *Aristida*
adscensionis L. var. *brevisetata* Hack.,
Aristida adscensionis L. var. *bromoides*
(Kunth) Henrard, *Aristida adscensionis*
L. var. *condensata* (Hack.) Henrard,
Aristida adscensionis L. var. *humilis*
(Kunth) Kuntze, *Aristida adscensionis* L.
var. *modesta* Hack., *Aristida adscensionis*
L. var. *normalis* Kuntze, nom. inval.,
Aristida adscensionis L. var. *scabriflora*
Hack., *Aristida bromoides* Kunth,
Aristida coerulescens Desf., *Aristida*
dispersa Trin. & Rupr., *Aristida dispersa*
Trin. & Rupr. var. *nana* Trin. & Rupr.,
Aristida festucooides Steud. & Hochst.,
nom. nud., *Aristida flabellata* Caro,
Aristida flabellata Caro var. *glabriflora*
Caro, *Aristida humilis* Kunth, *Aristida*
interrupta Cav., *Aristida nana* Steud.,
nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,
MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL,
RME). PRY(APY, BOQ).

Aristida antoniana Steud. ex Döll

Sin.: *Aristida amplexifolia* Caro & E.A.
Sánchez, *Aristida enodis* Hack.
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Aristida asplundii Henrard var.
asplundii

Hierba. Nativa. 2400-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Aristida asplundii Henrard var.
pauciflora Sulekic

Hierba. Endémica. 2400-3100 m.
Países: ARG(SAL).

Aristida brasiliensis Longhi-Wagner

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aristida circinalis Lindm.

Sin.: *Aristida aristiglumis* Caro,
Aristida leptochaeta Hack., *Aristida*
misionum Mez, *Aristida rosacea* Mez,
Aristida acuminata Hack., *Aristida*
succedanea Henrard
Hierba. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, SAL,
SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN,
GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART,
CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV,
SAO, SJO, SOR, TAC).

Aristida condylifolia Caro

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR,
RGS). PRY(PAI).

Aristida constricta Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Aristida echinulata Roseng. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(ART, FLA,
PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Aristida ekmaniana Henrard

Sin.: *Aristida trinii* Henrard
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Aristida filifolia (Arechav.) Herter

Sin.: *Aristida pallens* Cav. f. *rubelliana*
Arechav., *Aristida pallens* Cav. var.
filifolia Arechav., *Aristida pallens* Cav.
var. *patula* Trin. & Rupr., *Aristida*
rubelliana (Arechav.) Herter
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(CLA,
COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY,
RNO, RIV, SJO, SJO, TYT).

Aristida flaccida Trin. & Rupr.

Sin.: *Aristida flaccida* Trin. & Rupr. var.
uniglumis Döll
Hierba. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(TYT).

Aristida friesii Hack. ex Henrard

Hierba. Nativa. 2900-3400 m.
Países: ARG(SAL).

Aristida glaziovii Hack. ex Henrard

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Aristida hackelii Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(LAV, RNO, SJO, SOR).

Aristida hassleri Hack.

Sin.: *Aristida longiramea* J. Presl var.
boliviana Henrard
Hierba. Nativa.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, COA).

Aristida jubata (Arechav.) Herter

Sin.: *Aristida pallens* Cav. f. *jubata*
Arechav., *Aristida pallens* Cav. var. *major*
Döll, nom. superfl., *Aristida pallens* Cav.
var. *tragopogon* Trin. & Rupr., *Aristida*
tragopogon (Trin. & Rupr.) Herter
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAU, COA, MIE, PAI).
URY(ART, CLA, MAL, RIV, TAC).

Aristida laevis (Nees) Kunth

Sin.: *Aristida adscensionis* L. var.
argentina Hack., *Aristida altissima*
Arechav., *Aristida complanata* Trin.,
Aristida helleriana M. Marchi, Mujica-
Sallés & R.L. Barbieri, *Aristida laevis*
(Nees) Kunth var. *argentina* (Hack.)
Henrard, *Aristida subinterrupta* Arechav.,
Aristida subinterrupta Arechav. var.
argentina (Hack.) Henrard, *Chaetaria*
laevis Nees
Hierba. Nativa. 0-3600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI,
JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE). BRA(PAR,
RGS, SCA). URY(CLA, COL, CLA, LAV,
MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).

Aristida laxa Cav. var. **longiramea** (J.
Presl) Henrard

Sin.: *Aristida longiramea* J. Presl
Hierba. Nativa. 1300-1600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Aristida macrantha Hack.

Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(AMA).

Aristida macrophylla Hack.

Sin.: *Aristida endomelas* Mez, *Aristida hassleri* Hack. var. *aculeolata* Hack., *Aristida kleinii* L.B. Sm., *Aristida subarticulata* Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Aristida megapotamica Spreng. var. **brevipes**

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, PAI).

Aristida megapotamica Spreng. var. **longipes** Henrard

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CON).

Aristida megapotamica Spreng. var. **megapotamica**

Sin.: *Aristida implexa* Trin., *Aristida paraguayensis* Lindm., *Aristida sellowii* Mez

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PAI). URY(RIV, TAC).

Aristida mendocina Phil.

Sin.: *Aristida cordobensis* Hack., *Aristida inversa* Hack., *Aristida inversa* Hack. f. *macrantha* Parodi, *Aristida mendocina* Phil. var. *macrantha* (Parodi) Henrard

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

Aristida minutiflora Caro var. **glabriflora** Caro

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Aristida minutiflora Caro var. **minutiflora**

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, MEN, SLU, SDE).

Aristida multiramea Hack.

Sin.: *Aristida adscensionis* L. var. *laevis* Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Aristida murina Cav.

Sin.: *Aristida pallens* Cav. var. *murina* (Cav.) Trin. & Rupr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TYT).

Aristida nicorae Sulekic

Hierba. Endémica. 800-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Aristida oligospira (Hack.) Henrard

Sin.: *Aristida riparia* Trin. var. *oligospira* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Aristida pallens Cav.

Sin.: *Aristida glaberrima* Steud., *Aristida niederleini* Mez, *Aristida pallens* Cav. var. *geminata* Caro, *Aristida pallens* Cav. var. *genuina* Trin. & Rupr., nom. inval., *Aristida pallens* Cav. var. *intermedia* Trin. & Rupr., *Aristida pallens* Cav. var. *macrochaeta* Hack., *Chaetaria pallens* (Cav.) P. Beauv.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, RNE, SLU, SFE). BRA(PAR, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). URY(ART, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, SJO).

Aristida parodii Henrard

Hierba. Nativa. 500-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Aristida pedroensis Henrard

Hierba. Endémica. 600 m.

Países: ARG(JUJ).

Aristida pubescens Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 3000-3600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Aristida recurvata Kunth

Sin.: *Aristida neesiana* Trin. & Rupr., *Aristida riedeliana* Trin. & Rupr., *Chaetaria recurvata* (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 100-1400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Aristida riograndensis Severo & Boldrini

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS). BRA(RGS).

Aristida riparia Trin.

Sin.: *Aristida implexa* Trin. var. *aequa* Trin. & Rupr., *Aristida planifolia* Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Aristida sayapensis Caro

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SLU).

Aristida spegazzinii Arechav.

Sin.: *Aristida pallens* Cav. var. *tenuicula* Hack., p.p., *Aristida pampeana* Speg., *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *abbreviata* Hack., *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *genuina* Hack., nom. inval., *Aristida spegazzinii* Arechav. var. *pallescens* Hack., *Aristida spegazzinii* Arechav. f. *colorata* Hack., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA). URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

Aristida subulata Henrard

Hierba. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, RNE, SLU, TUC).

Aristida teretifolia Arechav.

Sin.: *Aristida arechavaletae* Henrard, *Aristida chaseana* Herter, *Aristida intermedia* Arechav., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). URY(ART, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO).

Aristida trachyantha Henrard

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE).

Aristida uruguayensis Henrard var. **laevis** Caro

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI). BRA(RGS). URY(RNO, SAO, SOR, TAC).

Aristida uruguayensis Henrard var. **uruguayensis**

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SDE). BRA(RGS). URY(ART, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SJO, TAC).

Aristida valida Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Aristida venustula Arechav. var. **scabrifolia** Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA).

Aristida venustula Arechav. var. **venustula**

Sin.: *Aristida pallens* Cav. f. *breviaristata* Hack., *Aristida pallens* Cav. var. *tenuicula* Hack., p.p., *Aristida pallens* Cav. var. *tenuifolia* Nees ex Trin. & Rupr., *Chaetaria pallens* (Cav.) P. Beauv. var. *tenuifolia* Nees

Hierba. Nativa. 0-2600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(CAU, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Aristida venustula Arechav. var. **venustuloides** (Caro) Longhi-Wagner

Sin.: *Aristida venustuloides* Caro
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).

Aristida vexativa Henrard
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SFE).**Aristida victoriana** Sulekic
Hierba. Endémica. 2900-3500 m.
Países: ARG(SAL).**Arrhenatherum** P. Beauv.**Arrhenatherum elatius** (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. **bulbosum** (Willd.) Spenn.

Sin.: *Arrhenatherum bulbosum* (Willd.) Link, comb. superfl., *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübl. & G. Martens, *Avena bulbosa* Willd.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(NEU, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl var. **elatius**
Sin.: *Arrhenatherum avenaceum* (Scop.) P. Beauv., *Avena elatior* L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF). BRA(RGS). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(RNO).

Arthropogon Nees**Arthropogon villosus** Nees
Hierba. Nativa. 400-1200 m.
Países: BRA(PAR).**Arthropogon xerachne** Ekman
Hierba. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR).**Arundinella** Raddi**Arundinella berteroniana** (Schult.) Hitchc. & Chase
Sin.: *Trichochloa berteroniana* Schult.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI, FOR, SAL). BRA(PAR).**Arundinella hispida** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze
Sin.: *Andropogon hispidus* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Arundinella brasiliensis* Raddi

Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, PAY, RNO, RIV).

Arundo L.**Arundo donax** L.
Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, IPA).**Athroostachys** Benth.**Athroostachys capitata** (Hook.) Benth.
Sin.: *Merostachys capitata* Hook.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).**Aulonemia** Goudot**Aulonemia aristulata** (Döll) McClure
Sin.: *Arundinaria aristulata* Döll, *Sieglingia aristulata* (Döll) Kuntze
Hierba subleñosa. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).**Aulonemia cincta** P.L. Viana & Filg.
Liana. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(PAR).**Aulonemia effusa** (Hack.) McClure
Sin.: *Arthrostylidium effusum* (Hack.) McClure, *Arundinaria effusa* Hack.
Hierba subleñosa. Nativa. 1300 m.
Países: BRA(PAR).**Aulonemia lanciflora** McClure & L.B. Sm.
Sin.: *Colantheria lanciflora* (McClure & L.B. Sm.) McClure, *Chusquea effusa* Renvoize

Hierba subleñosa. Endémica. 800-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aulonemia radiata (Rupr.) McClure & L.B. Sm.

Sin.: *Arthrostylidium effusum* (Hack.) McClure, *Arundinaria radiata* Rupr., *Aulonemia fimbriatifolia* L.G. Clark
Hierba subleñosa. Endémica. 800-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Austrostipa S.W.L. Jacobs & J. Everett**Austrostipa plumigera** (Hughes) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Sin.: *Stipa gracilis* (Speg.) Speg., nom. illeg., *Stipa plumigera* Hughes
Hierba. Introducida.
Países: ARG(SAL).**Austrostipa scabra** (Lindl.) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Sin.: *Stipa scabra* Lindl.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(IPA).**Avena** L.**Avena barbata** Pott ex Link
Sin.: *Avena hirsuta* Moench, *Avena hirsuta* (Roth) Mathieu, hom. illeg., *Avena strigosa* Schreb. subsp. *barbata* (Pott ex Link) Thell.
Hierba. Introducida. 0-2300 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE, TUC). BRA(RGS). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(CAS, FLA, LAV, MON, SJO, SOR).**Avena byzantina** K. Koch var. **biaristata** (Hack. ex Trab.) Parodi
Sin.: *Avena sativa* L. var. *biaristata* Hack. ex Trab.
Hierba. Introducida. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, ERI, LPA, NEU, RNE, SJU, SLU, TDF).

Avena byzantina K. Koch var. **byzantina**

Sin.: *Avena sterilis* L. subsp. *byzantina* (K. Koch) Thell.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, TDF). URY(MON).

Avena byzantina K. Koch var. **hipomelanathera** (Thell.) Parodi

Sin.: *Avena sterilis* L. f. *hipomelanathera* Thell.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Avena fatua L.

Sin.: *Avena fatua* L. var. *glabrata* Peterm., *Avena fatua* L. var. *intermedia* (T. Lestib.) Lej. & Courtois, *Avena fatua* L. var. *pilosissima* (Gray) Malzev, *Avena fatua* L. var. *vilis* (Wallr.) Hausskn., *Avena intermedia* T. Lestib., *Avena ludoviciana* Durieu var. *glabrescens* Durieu ex Gren. & Godr., *Avena vilis* Wallr.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, IPA). URY(COL, MAL, MON, SOR).

Avena sativa L. var. **chinensis** Döll

Hierba. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR).

Avena sativa L. var. **macrathera**

(Thell.) Parodi

Sin.: *Avena fatua* L. f. *macrathera* Thell.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

Avena sativa L. var. **montana** Alef.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, SDE, SLU).

Avena sativa L. var. **pilosa** (Koeler)

Tab.Morais

Sin.: *Avena fatua* L. var. *transiens* Hausskn.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Países: ARG(BAI, DFE, LPA, RNE).

Avena sativa L. var. **sativa**

Sin.: *Avena fatua* L. f. *glaberrima* Thell., *Avena fatua* L. subsp. *sativa* (L.) Thell., *Avena sativa* L. var. *glaberrima* (Thell.) Parodi

Hierba. Introducida. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, MAG).

Avena sativa L. var. **setulosa** (Thell.)

Parodi

Sin.: *Avena fatua* L. f. *setulosa* Thell.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA).

Avena sativa L. var. **subuniflora**

(Trab.) E. Morren

Sin.: *Avena fatua* L. var. *subuniflora* Trab.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA).

Avena sterilis L. subsp. **ludoviciana**

(Durieu) Nyman

Sin.: *Avena ludoviciana* Durieu, *Avena sterilis* L. var. *ludoviciana* (Durieu) Gillet & Magne

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, SFE, SLU). URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).

Avena sterilis L. subsp. **sterilis**

Sin.: *Avena algeriensis* Trab., *Avena ludoviciana* Durieu var. *psilathera* Thell., *Avena macrocarpa* Moench, *Avena sterilis* L. subsp. *macrocarpa* (Moench) Briq.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, SJU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(RME). URY(COL, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).

Avena strigosa Schreb.

Sin.: *Avena strigosa* Schreb. subsp. *glabrescens* Marquand, *Avena strigosa* Schreb. var. *glabrescens* (Marquand) Thell.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE). BRA(RGS). CHL(BIO, LLA).

Avenella M.J. Bluff ex Drejer

Avenella flexuosa (L.) Drejer

Sin.: *Aira flexuosa* L., *Aira flexuosa* L. var. *montana* Brongn., hom. illeg., *Aira versicolor* Roem. & Schult., *Aira vestita* Steud., *Avenella flexuosa* (L.) Parl., comb. illeg., *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin., *Deschampsia flexuosa* (L.) Nees, comb. illeg., *Deschampsia macloviana* Gand., *Deschampsia martinii* Phil., *Deschampsia philippii* Macloskie, *Deschampsia tenella* Phil., hom. illeg., *Deschampsia vestita*

(Steud.) Hauman & Parodi, *Lerchenfeldia flexuosa* (L.) Schur, *Podionapus flexuosus* (L.) Dulac, *Salmasia flexuosa* (L.) Bubani

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

CHL(BIO, LLA, AIS, MAG).

Axonopus P. Beauv.

Axonopus argentinus Parodi

Sin.: *Axonopus argentinus* Parodi f. *hirsutus* Parodi, *Axonopus argentinus* Parodi subsp. *glabripes* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Axonopus argentinus* Parodi subsp. *pubiflorus* (Parodi) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Axonopus argentinus* Parodi var. *glabriflorus* Parodi, *Axonopus argentinus* Parodi var. *glabripes* Parodi, *Axonopus hagenbeckianus* (Kuntze) Parodi var. *pratensis* G.A. Black, *Axonopus paraguayensis* G.A. Black, *Axonopus ramboi* G.A. Black, *Axonopus suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.)

Parodi var. *pubiflorus* Parodi

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CLA, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

Axonopus aureus P. Beauv.

Hierba. Nativa. 100-2200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Axonopus brasiliensis (Spreng.) Kuhlmann

Sin.: *Axonopus bijugus* (Steud.) A. Camus, *Axonopus dissitiflorus* (Trin.) Chase, *Eriochloa brasiliensis* Spreng., *Lappagopsis bijuga* Steud., *Paspalum brasiliense* (Spreng.) Hack., *Paspalum dissitiflorum* Trin.

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(AMA, CON, SPE).

Axonopus capillaris (Lam.) Chase

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR).

Axonopus chrysoblepharis (Lag.) Chase

Sin.: *Cabrera chrysoblepharis* Lag.

Hierba. Nativa. 100-1500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Axonopus comans (Trin. ex Döll) Kuhlmann

Sin.: *Paspalum comans* Trin. ex Döll

Hierba. Nativa. 200-1200 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, GUA).

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.

Sin.: *Axonopus jesuiticus* (Araujo) Valls, *Agrostis compressa* (Sw.) Poir., hom. illeg., *Anastrophus compressus* Schltr. ex Döll, nom. inval., *Anastrophus platycaulis* (Poir.) Nash ex Small, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *affinis* (Chase) Henderson, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *australis* G.A. Black, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *jesuiticus* Araujo, *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. var. *macropodius* (Steud.) G.A. Black, *Digitaria platycaulis* (Poir.) Desv., *Milium compressum* Sw., *Paspalum compressum* (Sw.) Nees, comb. superfl., *Paspalum compressum* (Sw.) Raspail, *Paspalum depressum* Steud., *Paspalum filostachyum* A. Rich. ex Steud., *Paspalum furcatum* Flügge var. *parviflorum* Döll, *Paspalum macropodium* Steud., *Paspalum tristachyon* Lam., *Paspalum uniflorum* Salzm. ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CAS, LAV, MON, RIV, SAO, TAC, TYT).

Axonopus equitans Hitchc. & Chase

Sin.: *Axonopus oteroi* G.A. Black

Hierba. Nativa. 100-400 m.

Países: BRA(PAR).

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm.

Sin.: *Axonopus affinis* Chase, *Axonopus fissifolius* (Raddi) Chase, comb. superfl., *Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhlm. var. *coronatus* G.A. Black, *Axonopus stragulus* Chase, *Paspalum compressum* (Sw.) Raspail var. *arenarium* Bertoni, *Paspalum fissifolium* Raddi

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Axonopus leptostachyus (Flügge)

Hitchc.

Sin.: *Axonopus paranaensis* Parodi, *Axonopus paranaensis* Parodi ex G.A. Black, hom. illeg., *Paspalum leptostachyum* Flügge

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(ITA).

Axonopus marginatus (Trin.) Chase

Sin.: *Axonopus longecilius* (Hack.) Parodi, *Axonopus marginatus* (Trin.) Kuhlm., comb. illeg., *Paspalum marginatum* Trin., *Paspalum marginatum* Trin. var. *longecilius* Hack.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Axonopus obtusifolius (Raddi) Chase

Sin.: *Anastrophus obtusifolius* (Raddi) Nash, *Axonopus chaseanus* Herter, nom. illeg., *Paspalum furcatum* Flügge var. *grandiflorum* Döll, *Paspalum obtusifolium* Raddi

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Axonopus pellitus (Nees ex Trin.)

Hitchc. & A. Chase

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Axonopus polystachyus G.A. Black

Sin.: *Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhlm. var. *polystachyus* (G.A. Black) L.B. Sm. & Wassh.

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Axonopus pressus (Steud.) Parodi

Sin.: *Axonopus derbyanus* G.A. Black, *Paspalum pressum* Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 200-1300 m.

Países: BRA(RGS, PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, ITA, SPE).

Axonopus purpusii (Mez) Chase

Sin.: *Axonopus anomalus* Swallen, *Axonopus flexilis* (Mez) Henrard, *Paspalum flexile* Mez, *Paspalum platycaulon* Poir. var. *gracilius* Döll, *Paspalum platycaulon* Poir. var. *parviflorum* Döll, *Paspalum purpusii* Mez

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON, COA). URY(CLA).

Axonopus rosengurttii G.A. Black

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, DFE). URY(COL, MON, PAY, SAO, SOR).

Axonopus scoparius (Flügge) Kuhlm.

Sin.: *Panicum columbiense* Kuntze, *Paspalum giganteum* Kuntze, *Paspalum*

scoparium Flügge, *Paspalum tripinnatum* Mez

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Axonopus siccus (Nees) Kuhlm.

Sin.: *Axonopus barbatus* (Nees) Kuhlm., nom. inval., *Axonopus barbatus* Chase ex Parodi, hom. illeg., *Axonopus barbigerus* (Kunth) Hitchc. var. *venturii* G.A. Black, *Axonopus barbigerus* (Kunth) Hitchc., *Axonopus rojasii* G.A. Black, *Axonopus siccus* (Nees) Kuhlm. var. *laxior* (Döll) G.A. Black, *Axonopus siccus* (Nees) Kuhlm. var. *scaber* (Pilg.) G.A. Black, *Axonopus ulei* (Hack.) Dedecca, *Axonopus malmei* G.A. Black, *Paspalum barbatum* Nees ex Trin. var. *glabrum* Döll, *Paspalum barbatum* Nees ex Trin. var. *laxius* Döll, *Paspalum barbatum* Nees ex Trin. var. *scabrum* Pilg., *Paspalum barbatum* Nees ex Trin., hom. illeg., *Paspalum barbigerum* Kunth, *Paspalum pellitum* Nees ex Trin., *Paspalum siccum* Nees, *Paspalum ulei* Hack.

Hierba. Nativa. 100-2000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CLA, RIV, TAC).

Axonopus succulentus G.A. Black

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, PAI).

Axonopus suffultus (J.C. Mikan ex Trin.) Parodi

Sin.: *Anthaeantia hagenbeckiana* (Kuntze) K. Schum., *Axonopus chloridiformis* Herter, *Axonopus hagenbeckianus* (Kuntze) Parodi var. *iridaceus* (Mez) G.A. Black, *Axonopus hagenbeckianus* (Kuntze) Parodi, *Axonopus iridaceus* (Mez) Herter, comb. superfl., *Axonopus iridaceus* (Mez) Hitchc. & Chase ex Rojas, *Axonopus pseudochloris* Herter, nom. nud., *Axonopus scoparius* (Flügge) Kuhlm. var. *suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.) Herter, *Axonopus suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.) Henrard, comb. superfl., *Panicum hagenbeckianum* Kuntze, *Panicum suffultus* (J.C. Mikan ex Trin.) Kuntze, *Paspalum iridaceum* Mez, *Paspalum suffultum* J.C. Mikan ex Trin.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).

Axonopus uninodis (Hack.) G.A. Black

Sin.: *Axonopus kleinii* L.B. Sm. & Washh., *Axonopus plumosus* (Henrard) Henrard, *Paspalum plumosum* Henrard, *Paspalum uninode* Hack.
 Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(SCA). PRY(AMA, GUA).

Blepharidachne Hack.**Blepharidachne benthamiana** (Hack. ex Kurtz) Hitchc.

Sin.: *Munroa benthamiana* Hack. ex Kurtz
 Hierba. Endémica. 400-1000 m.
 Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

Blepharidachne hitchcockii Lahitte

Hierba. Endémica. 600-1000 m.
 Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

Bothriochloa Kuntze**Bothriochloa alta** (Hitchc.) Henrard

Sin.: *Andropogon altus* Hitchc., *Bothriochloa alta* (Hitchc.) Cabrera, comb. superfl.
 Hierba. Nativa. 0-2900 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE).

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

Sin.: *Amphilophis barbinodis* (Lag.) Nash, *Andropogon barbinodis* Lag., *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *leucopogon* (Nees) Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *barbinodis* (Lag.) Hack., *Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Henrard, comb. superfl., *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck. var. *barbinodis* (DC.) Stuck.
 Hierba. Nativa. 0-3000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR). PRY(APY). URY(COL).

Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T. Blake

Sin.: *Andropogon bladhii* Retz.
 Hierba. Introducida. 0-500 m.
 Países: ARG(LPA).

Bothriochloa catharinensis E.

Dalmolim & A. Zanin
 Hierba. Endémica.
 Países: BRA(SCA).

Bothriochloa edwardsiana (Gould)

Parodi
 Sin.: *Andropogon edwardsianus* Gould
 Hierba. Nativa. 0-1700 m.
 Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, SAL, SFE). URY(CAS, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

Bothriochloa eurylemma M. Marchi & Longhi-Wagner

Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

Bothriochloa exaristata (Nash)

Henrard
 Sin.: *Amphilophis exaristatus* Nash, *Andropogon exaristatus* (Nash) Hitchc., *Andropogon hassleri* Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *submuticus* Vasey ex Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *hassleri* (Hack.) Ekman, *Bothriochloa hassleri* (Hack.) Henrard, *Bothriochloa hassleri* (Hack.) Cabrera, comb. superfl.
 Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE, SDE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Bothriochloa imperatoides (Hack.)

Herter
 Sin.: *Andropogon imperatoides* (Hack.) Lillo, *Andropogon saccharoides* Sw. var. *impratoides* Hack., *Bothriochloa springfieldii* (Gould) Parodi var. *australis* de Wet
 Hierba. Endémica. 0-100 m.
 Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

Sin.: *Andropogon ischaemum* L.
 Hierba. Introducida.
 Países: CHL(IPA).

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter

Sin.: *Andropogon laguriformis* Griseb., *Andropogon laguroides* DC., *Andropogon laguroides* Lag., nom. illeg., *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *laguroides* (DC.) Hack., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *laguroides* (DC.) Hack., *Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter subsp. *laguroides*, *Bothriochloa laguroides* (DC.) Pilg., comb. superfl., *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *laguroides* (DC.) Beetle, *Deyeuxia megapotamica* Spreng., *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck. var. *laguroides*

(DC.) Hack., *Sorghum saccharoides* (Sw.) Kuntze var. *laguroides* (DC.) Kuntze, *Trachypogon laguroides* (DC.) Nees
 Hierba. Nativa. 0-2600 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA). PRY(CEN, GUA). URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Bothriochloa longipaniculata (Gould) Allred & Gould

Sin.: *Andropogon saccharoides* Sw. var. *longipaniculatus* Gould, *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. var. *longipaniculata* (Gould) Gould
 Hierba. Nativa. 100-2300 m.
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SDE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, PHA).

Bothriochloa meridionalis M. Marchi & Longhi-Wagner

Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(RGS).

Bothriochloa perforata (Trin. ex E.

Fourn.) Herter
 Sin.: *Amphilophis perforatus* (Trin. ex E. Fourn.) Nash, *Andropogon perforatus* Trin. ex E. Fourn., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *perforatus* (Trin. ex E. Fourn.) Hack. ex L. H. Dewey, *Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter var. *perforata* (Trin. ex E. Fourn.) Gould, *Holcus saccharoides* (Sw.) Stuck. var. *perforatus* (Trin. ex E. Fourn.) Stuck.
 Hierba. Nativa. 600-2100 m.
 Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SLU).

Bothriochloa saccharoides (Sw.)

Rydb. subsp. *australis* Scrivanti
 Hemiepífita. Endémica. 100-2600 m.
 Países: ARG(COR). CHL(VAL).

Bothriochloa saccharoides (Sw.)

Rydb. var. *parvispicula* (Hitchc.) Tovar
 Sin.: *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *parvispiculus* Hitchc., *Andropogon saccharoides* Sw. var. *parvispiculus* (Hitchc.) Standl., *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. subsp. *parvispicula* (Hitchc.) Davidse
 Hierba. Nativa. 600-3900 m.
 Países: ARG(SAL).

Bothriochloa saccharoides (Sw.)

Rydb. var. *saccharoides*
 Sin.: *Amphilophis saccharoides* (Sw.) Nash, *Andropogon argenteus* DC.,

Andropogon berteronianus Steud.,
Andropogon saccharoides Sw., *Andropogon saccharoides* Sw. subsp. *genuinus* Hack.,
 nom. inval., *Andropogon saccharoides*
 Sw. var. *genuinus* Hack., nom. inval.,
Andropogon saccharoides Sw. var.
typicus Hack., nom. inval., *Dichanthium*
saccharoides (Sw.) Roberty, *Holcus*
saccharoides (Sw.) Stuck., *Sorghum*
saccharoides (Sw.) Kuntze
 Hierba. Nativa. 100-2600 m.
 Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI,
 JUJ, LPA, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR,
 RGS). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA).
 PRY(COA). URY(ART, MAL, SOR).

Bothriochloa springfieldii (Gould)

Parodi

Sin.: *Andropogon springfieldii* Gould
 Hierba. Nativa. 200-2100 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI,
 MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Bothriochloa torreyana (Steud.)

Scrivanti & Anton

Sin.: *Amphilophis torreyanus* (Steud.)
 Nash, *Andropogon hassleri* Hack.
 var. *aristatus* Hack., *Andropogon*
saccharoides Sw. var. *torreyanus* (Steud.)
 Hack., *Andropogon torreyanus* Steud.,
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter
 subsp. *torreyana* (Steud.) Allred &
 Gould, *Bothriochloa laguroides* (DC.)
 Herter var. *torreyana* (Steud.) M.
 Marchi & Longhi-Wagner, *Bothriochloa*
saccharoides (Sw.) Rydb. var. *torreyana*
 (Steud.) Gould

Hierba. Nativa. 300-1900 m.
 Países: ARG(COS, FOR, MIS).
 BRA(RGS, SCA). URY(MAL).

Bothriochloa velutina M. Marchi &
 Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Bouteloua Lag.

Bouteloua aristidoides (Kunth)
 Griseb.

Sin.: *Bouteloua ciliata* Griseb.,
Bouteloua gracilis Vasey, hom. illeg.,
Dinebra aristidoides Kunth

Hierba. Nativa. 0-2300 m.
 Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ,
 LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).
 BRA(Fuera del área del proyecto).
 PRY(Desconocida).

Bouteloua barbata Lag.

Sin.: *Chondrosium barbatum* (Lag.) Clayton
 Hierba. Nativa. 400-4000 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI,
 MEN, SJU, SLU).

Bouteloua curtipendula (Michx.)

Torr. var. **caespitosa** Gould & Kapadia
 Sin.: *Atheropogon acuminatus* E.
 Fourn., *Bouteloua racemosa* Lag.
 Hierba. Nativa. 400-2500 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA,
 LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).
 URY(PAY).

Bouteloua media (E. Fourn.) Gould &
 Kapadia

Sin.: *Atheropogon medius* E. Fourn.,
Bouteloua brasiliensis Ekman
 Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(Fuera del área del
 proyecto). PRY(AMA). URY(PAY, SOR).

Bouteloua megapotamica (Spreng.)

Kuntze

Sin.: *Bouteloua multisetata* (Nees)
 Griseb., *Bouteloua multisetata* (Nees)
 Griseb. var. *pallida* Hack., *Eutriana*
multisetata Nees, *Pappophorum*
eutrianoide Trin. ex Nees, *Pappophorum*
megapotamicum Spreng.
 Hierba. Nativa. 0-2500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
 COS, ERI, LPA, MIS, SLU, SFE, SDE,
 TUC). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA,
 DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO,
 SOR, TAC).

Bouteloua simplex Lag.

Sin.: *Bouteloua brachyanthera* Phil.,
Bouteloua humilis (Kunth) Hieron.,
Bouteloua rahmeri Phil., *Bouteloua*
simplex Lag. var. *rahmeri* (Phil.) Henrard,
Bouteloua tenuis (P. Beauv. ex Kunth)
 Griseb., *Bouteloua tenuis* (P. Beauv. ex
 Kunth) Griseb. var. *humilis* Griseb.,
Chondrosium simplex (Lag.) Kunth
 Hierba. Nativa. 1000-4600 m.
 Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
 MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP,
 TAR, ANT, VAL).

Brachypodium P. Beauv.

Brachypodium distachyon (L.) P.
 Beauv.

Sin.: *Bromus distachyos* L., *Trachynia*
distachya (L.) Link
 Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI).
 CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, JFE).
 URY(ART, CAS, MON, TAC).

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.
 Beauv.

Sin.: *Festuca sylvatica* Huds.
 Hierba. Introducida. 0-100 m.
 Países: ARG(DFE). URY(MON).

Briza L.

Briza maxima L.

Hierba. Introducida. 0-400 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI,
 SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA,
 VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
 MAG, RME, JFE). URY(CAS, CLA, COL,
 DUR, FLA, MAL, MON, SOR).

Briza media L.

Hierba. Introducida. 500-1000 m.
 Países: ARG(NEU, RNE).

Briza minor L.

Sin.: *Briza virens* L.
 Hierba. Introducida. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
 ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL,
 SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,
 SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
 BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA).
 URY(CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL,
 MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

Bromidium Nees & Meyen

Bromidium anomalum (Trin.) Döll

Sin.: *Agrostis anomala* (Trin.) Herter,
Agrostis koelerioides Desv., *Aira anomala*
 Trin., *Bromidium hygrometricum* (Nees)
 Nees & Meyen var. *anomalum* (Trin.)
 Kuntze, *Deyeuxia anomala* (Trin.) Benth.
 & Hook. f., *Didymochaeta chilensis* Steud.,
Koeleria chilensis Steud., nom. nud.
 Hierba. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHU, NEU).
 CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
 ARA, LRI, LLA, RME).

Bromidium hygrometricum (Nees)
 Nees & Meyen

Sin.: *Agrostis hygrometrica* Nees,
Agrostis juergensii Hack.
 Hierba. Nativa. 0-1600 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).
 BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA,
 FLA, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO,
 SOR, TAC).

Bromidium ramboi (Parodi) Rúgolo

var. **pubescens** (Kämpf) Rúgolo

Sin.: *Agrostis ramboi* Parodi var.

pubescens Kämpf

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(SCA).

Bromidium ramboi (Parodi) Rúgolo

var. **ramboi**

Sin.: *Agrostis ramboi* Parodi

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Bromidium tandilense (Kuntze)

Rúgolo

Sin.: *Agrostis hygrometrica* Nees var. *tandilensis* (Kuntze) L.B. Sm. & Wassh., *Agrostis kennedyana* Beetle, *Agrostis koelerioides* Desv. var. *pampeana* Parodi, *Agrostis tandilensis* (Kuntze) Parodi, *Bromidium hygrometricum* (Nees) Nees & Meyen var. *tandilense* Kuntze, *Deyeuxia hygrometrica* (Nees) Speg. var. *tandilensis* (Kuntze) Speg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(ITA). URY(ART, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

Bromidium trisetoides (Steud.)

Rúgolo

Sin.: *Agrostis trisetoides* Steud.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Bromus L., nom. cons.

Bromus araucanus Phil.

Sin.: *Bromus alpestris* Steud., nom.

nud., *Bromus araucanus* Phil. var.

obtusiflorus (Hack.) J.A. Cámara, *Bromus obtusiflorus* Hack.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(ARA, LLA, MAG).

Bromus arvensis L.

Sin.: *Bromus erectus* Huds. var. *arvensis*

(L.) Huds., *Forasaccus arvensis* (L.) Bubani,

Serrafalcus arvensis (L.) Godr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Bromus auleticus Trin. ex Nees

Sin.: *Bromopsis auletica* (Trin. ex

Nees) Herter, *Bromus erectus* Huds. var.

auleticus (Trin. ex Nees) Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Bromus berterioanus Colla

Sin.: *Avena paupercula* Phil., *Bromus*

barbatoides Beal, *Bromus bicuspis* Nees

ex Steud., *Bromus leyboldti* Phil., *Bromus*

trinii E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv.

var. *effusa* E. Desv., *Bromus trinii* E.

Desv. var. *manicata* E. Desv., *Bromus*

trinii E. Desv. var. *micranthera* E. Desv.,

Bromus trinii E. Desv. var. *pallidiflorus*

E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var.

stricta E. Desv., *Danthonia pseudospicata*

Müll. Hal., nom. superfl., *Trisetobromus*

hirtus (Trin.) Nevski, *Trisetum barbatum*

Steud., hom. illeg., *Trisetum hirtum*

Trin., *Trisetum litorale* Phil., *Trisetum*

trinii (Trin.) Louis-Marie, *Trisetum*

trinii (Trin.) Louis-Marie var. *effusum*

(E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii*

(Trin.) Louis-Marie var. *litorale* (Phil.)

Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.)

Louis-Marie var. *manicatum* (E. Desv.)

Louis-Marie, *Trisetum trinii* (Trin.)

Louis-Marie var. *micrantherum* (E.

Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii*

(Trin.) Louis-Marie var. *pallidiflora*

(E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii*

(Trin.) Louis-Marie var. *strictum* (E.

Desv.) Louis-Marie

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).

CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO,

MAU, BIO, ARA, AIS, RME, JFE).

Bromus bonariensis Parodi & J.A.

Cámara

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, LPA, SFE).

Bromus brachyanthera Döll var.

brachyanthera

Sin.: *Bromus uruguayensis* Arechav.

var. *glabrescens* Arechav., *Bromus*

uruguayensis Arechav. var. *robustior*

Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Bromus brachyanthera Döll var.

uruguayensis (Arechav.) J.A. Cámara

Sin.: *Bromopsis uruguayensis* (Arechav.)

Herter, *Bromus brachyanthera* Döll subsp. *uruguayensis* (Arechav.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Bromus uruguayensis* Arechav., *Bromus uruguayensis* Arechav. var. *genuinus* Arechav., nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS).

URY(ART, CAS, CLA, LAV, MAL, SAO, TAC).

Bromus catharticus Vahl var.

catharticus

Sin.: *Bromus angustatus* Pilg., *Bromus brevistaratus* (Hook.) Thurb., hom.

illeg., *Bromus brogniartii* Kunth, *Bromus*

haenkeanus (J. Presl) Kunth, *Bromus*

preslii Kunth, *Bromus strictus* Brongn.,

hom. illeg., *Bromus uniolooides* (Willd.)

Raspail, hom. illeg., *Bromus uniolooides*

Kunth f. *chasmogama* Hack., *Bromus*

uniolooides Kunth f. *cleistogama* Hack.,

nom. inval., *Bromus uniolooides* Kunth f.

subf. achalensis Hack., *Bromus uniolooides*

Kunth var. *glaucescens* Nees, *Bromus*

uniolooides Kunth var. *haenkeanus* (J.

Presl) Shear, *Bromus uniolooides* Kunth

var. *humilis* Speg., hom. illeg., *Bromus*

uniolooides Kunth var. *micrantha*

Speg., *Bromus uniolooides* Kunth var.

montanus Hack., *Bromus uniolooides*

Kunth var. *sanjuaninus* Hieron., *Bromus*

uniolooides Kunth, *Bromus willdenowii*

Kunth, *Bromus willdenowii* Kunth var.

haenkeanus (J. Presl) Shear, *Ceratochloa*

brevistarata Hook., *Ceratochloa*

cathartica (Vahl) Henrard, comb.

illeg., *Ceratochloa cathartica* (Vahl)

Herter, *Ceratochloa haenkeana* J. Presl,

Ceratochloa haenkeana J. Presl var.

patens Nees, nom. nud., *Ceratochloa*

haenkeana J. Presl var. *subspicata*

Nees, nom. nud., *Ceratochloa secunda*

J. Presl, *Ceratochloa uniolooides* (Willd.)

P. Beauv., *Festuca uniolooides* Willd.,

Forasaccus brevistaratus (Hook.) Lunell,

Schedonorus uniolooides (Kunth) Roem.

& Schult., *Tragus uniolooides* (Willd.)

Panz ex B.D. Jacks., nom. nud., *Zerna*

uniolooides (Kunth) Lindm.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,

COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,

LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU,

SLU, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR,

RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,

COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,

LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA).

PRY(CEN, PAI, SPE). URY(CAS, CLA,

COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY,

RNO, RIV, SJO, SOR).

Bromus catharticus Vahl var. **elata**
(E. Desv.) Planchuelo

Sin.: *Bromus catharticus* Vahl subsp. *stamineus* (E. Desv.) A.N. Massa, *Bromus cebadilla* Steud., *Bromus stamineus* E. Desv., *Bromus uniolooides* Kunth f. *elatus* (E. Desv.) Allen & Thell. ex Kloos, *Bromus uniolooides* Kunth var. *elata* E. Desv., *Bromus valdivianus* Phil., *Ceratochloa staminea* (E. Desv.) Stace, *Ceratochloa valdiviana* (Phil.) Holub
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Bromus catharticus Vahl var. **rupestris** (Speg.) Planchuelo & P.M. Peterson

Sin.: *Bromus brevis* Nees ex Steud. subsp. *festucarioides* Covas & Millot, *Bromus brevis* Nees ex Steud., *Bromus uniolooides* Kunth f. *brevis* (Nees ex Steud.) Kloos, *Bromus uniolooides* Kunth var. *brevis* (Nees ex Steud.) Hack., *Bromus uniolooides* Kunth var. *rupestris* Speg., *Ceratochloa brevis* Nees ex B.D. Jacks., nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TUC).

Bromus coloratus Steud.

Sin.: *Bromus coloratus* Steud.
var. *vivipara* Speg., *Bromus hackelii* Macloskie, *Bromus patagonicus* Hack., hom. illeg., *Bromus patagonicus* Phil., *Bromus uniolooides* (Willd.) Raspail var. *coloratus* (Steud.) Pilg., *Ceratochloa colorata* (Steud.) Holub
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Bromus commutatus Schrad.

Sin.: *Serrafalcus commutatus* (Schrad.) Bab.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO, SOR).

Bromus erectus Huds.

Sin.: *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., *Bromus collinus* Phil., *Bromus dolichostachys* Phil.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, SAL, SFE). CHL(BIO, MAG).

Bromus flexuosus Planchuelo var. **famatinensis** Planchuelo

Hierba. Endémica. 3000-3400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI).

Bromus flexuosus Planchuelo var. **flexuosus**

Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Bromus gunckelii Matthei

Hierba. Endémica. 3100-3800 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Bromus hordeaceus L.

Sin.: *Bromus megapotamicus* Spreng., *Bromus mollis* L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).

Bromus inermis Leyss.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE). URY(COL, SOR).

Bromus japonicus Hoult.

Sin.: *Bromus japonicus* Thunb., nom. superfl., *Bromus patulus* Mert. & W.D.J. Koch, *Serrafalcus patulus* (Mert. & W.D.J. Koch) Parl.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, RNE).

Bromus lanatus Kunth

Sin.: *Bromus oliganthus* Pilg., *Bromus pflanzii* Pilg., *Festuca mollis* Kunth, nom. illeg., *Schenodorus lanatus* (Kunth) Roem. & Schult.
Hierba. Nativa. 3000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR).

Bromus lanceolatus Roth

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(MAU). URY(MAL, PAY, RNO).

Bromus lithobius Trin.

Sin.: *Bromus andinus* Phil., *Bromus andinus* Phil. var. *scabrivalva* Speg., *Bromus chilensis* Trin., *Bromus fonkii* Phil., *Bromus scaber* Phil., *Bromus uniolooides* Kunth f. *humilis* (E. Desv.) Kloos, *Bromus uniolooides* Kunth var. *humilis* E. Desv., *Bromus uniolooides* Kunth var. *pubescens* Hack.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Bromus madritensis L.

Sin.: *Anisantha madritensis* (L.) Nevski, *Festuca madritensis* (L.) Desf.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, NEU). CHL(COQ, VAL, MAU, ARA). URY(MAL).

Bromus mango E. Desv.

Sin.: *Bromus burkartii* Muñoz, *Ceratochloa mango* (E. Desv.) Holuby
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA, AIS, RME).

Bromus modestus Renvoize

Sin.: *Bromus frigidus* Ball, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 3300-4500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

Bromus parodii Covas & Itria

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(LPA).

Bromus pellitus Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Bromus racemosus L.

Sin.: *Serrafalcus racemosus* (L.) Parl.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, DFE, NEU, SCR). CHL(LLA, MAG).

Bromus rigidus Roth

Sin.: *Anisantha rigida* (Roth) Hyl., *Bromus diandrus* Roth var. *rigidus* (Roth) F. Sales, *Bromus madritensis* L. var. *rigidus* (Roth) Bab. ex Syme, *Bromus maximus* Desf., *Bromus villosus* Forssk. var. *rigidus* (Roth) Asch. & Graebn.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CHA, LPA, MIS, NEU, RNE, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

Bromus rubens L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, MEN, NEU).

Bromus scoparius L.

Sin.: *Bromus scoparius* L. var. *villiglumis* Maire & Weiller
Hierba. Introducida. 0-1300 m.
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

Bromus secalinus L.

Sin.: *Avena secalina* (L.) Salisb., *Bromus mollis* L. var. *secalinus* (L.) Huds.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Bromus setifolius J. Presl var.**brevifolius** Nees

Sin.: *Bromus macranthos* Meyen, nom. nud., *Bromus macranthos* Meyen ex E. Desv. var. *macrantha* E. Desv., nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Bromus setifolius J. Presl var. **pictus** (Hook. f.) Skottsb.

Sin.: *Bromus macranthos* Meyen ex E. Desv. var. *minor* E. Desv., nom. superfl., *Bromus pictus* Hook. f., *Bromus setifolius* J. Presl var. *pictus* (Hook. f.) J.A. Cámara, comb. superfl.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SJU, SCR). CHL(MAG, RME).

Bromus setifolius J. Presl var.**setifolius**

Sin.: *Bromus macranthos* E. Desv. var. *setifolius* (J. Presl) E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, AIS, MAG, RME).

Bromus squarrosus L.

Hierba. Introducida. 2000 m.
Países: CHL(BIO, LLA, RME).

Bromus sterilis L.

Sin.: *Anisantha sterilis* (L.) Nevski
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, DFE, NEU, RNE, SFE). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Bromus tectorum L.

Sin.: *Anisantha tectorum* (L.) Nevski
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, MAU, ARA, LLA).

Bromus tunicatus Phil.

Sin.: *Bromus culmineus* Phil., *Bromus unioides* Kunth var. *hirsuta* Speg.
Hierba. Endémica. 0-3600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Cambajuva P.L. Viana, L.G. Clark & Filg.**Cambajuva ulei** (Hack.) P.L. Viana, L.G. Clark & Filg.

Sin.: *Aulonemia ulei* (Hack.) McClure & L.B. Sm., *Arundinaria ulei* Hack.

Hierba subleñosa. Endémica. 900-2000 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Canastra Morrone, Zuloaga, Filg. & Davidse**Canastra aristella** (Döll) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum aristellum* Döll

Hierba. Nativa. 700-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Catabrosa P. Beauv.**Catabrosa aquatica** (L.) P. Beauv.

Sin.: *Aira aquatica* L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Catabrosa werdermannii (Pilg.)

Nicora & Rúgolo

Sin.: *Catabrosa latifolia* Phil., nom. nud., *Panicularia latifolia* (Phil.) Kuntze, *Phippsia werdermannii* Pilg., *Phippsia werdermannii* Pilg. f. *major* Pilg., *Phippsia werdermannii* Pilg. f. *minor* Pilg.

Hierba. Nativa. 1900-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Catapodium Link**Catapodium rigidum** (L.) C.E. Hubb.

Sin.: *Desmazeria rigida* (L.) Tutin, *Glyceria rigida* (L.) Sm., *Poa rigida* L., *Scleropoa rigida* (L.) Griseb.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SLU, SFE). BRA(RGS). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, SOR).

Cenchropsis Nash**Cenchropsis myosuroides** (Kunth)

Nash var. **longiseta** (Caro & E.A.

Sánchez) J.K. Wipff & R.B. Shaw

Sin.: *Cenchropsis myosuroides* (Kunth)

Nash, *Cenchrus myosuroides* Kunth var. *longisetus* Caro & E.A. Sánchez, *Cenchrus myosuroides* Kunth, *Cenchrus scabridus* Arechav., *Pennisetum myosuroides* (Kunth) Spreng.

Hierba. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ATA, MAU). PRY(APY, COA, GUA, ÑEE, NAS, PAI). URY(COL, MON, PAY, RNO, SAO).

Cenchrus L.**Cenchrus americanus** (L.) Morrone

Sin.: *Panicum americanum* L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(RGS, SCA).

Cenchrus chilensis (E. Desv.) Morrone

Sin.: *Gymnotrix chilensis* E. Desv., *Pennisetum chilense* (E. Desv.) B.D. Jacks.

ex R.E. Fr., *Pennisetum chilense* Hack. ex Buchtien, nom. nud., *Pennisetum chilense* (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.E. Fr. var. *macrophyllum* Parodi, *Pennisetum chilense* Hack. ex Buchtien, nom. nud. var. *planifolia* Hack., nom. nud.

Hierba. Nativa. 400-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, RME).

Cenchrus ciliaris L.

Sin.: *Pennisetum cenchroides* Rich. ex Pers., nom. illeg., *Pennisetum ciliare* (L.) Link

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CHO, GUA, NAS, PHA).

Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone

Sin.: *Kikuyuochloa clandestina* (Hochst. ex Chiov.) H. Scholz, *Pennisetum clandestinum* Hochst. ex Chiov.,

Pennisetum longistylum Hochst. ex A. Rich. var. *clandestinum* (Hochst. ex Chiov.) Chiov., hom. Illeg., *Pennisetum longistylum* Hochst. ex A. Rich. var. *clandestinum* (Hochst. ex Chiov.) Leeke

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS). BRA(PAR, RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME, IPA). PRY(CEN). URY(MON).

Cenchrus echinatus L.

Sin.: *Cenchrus crinitus* Mez, *Cenchrus echinatus* Cav., nom. inval.

Hierba. Cosmopolita. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, MAU, LRI, LLA, IPA). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV, SAO).

Cenchrus latifolius (Spreng.) Morrone

Sin.: *Gymnotrix latifolia* (Spreng.) Schult., *Pennisetum latifolium* Spreng., *Pennisetum lechleri* Steud. ex Lechler, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, ITA). URY(CLA, MON, RIV, ROC, SAO).

Cenchrus longisetus M.C. Johnst.

Sin.: *Cenchrus villosus* (R. Br. ex Fresen.) Kuntze, hom. illeg., *Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen.

Hierba. Introducida. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, DFE, FOR, JUJ, MEN, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(RME). URY(MON).

Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald

Sin.: *Cenchrus echinatus* L. f. *longispina* Hack., *Cenchrus pauciflorus* Benth. var. *longispinus* (Hack.) Jansen & Wacht.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COR, ERI, LRI, SAL).

Cenchrus mutilatus Kuntze

Sin.: *Hymenachne montana* Griseb., *Panicum montanum* (Griseb.) B.D. Jacks. ex Lillo, nom. illeg., *Pennisetum montanum* (Griseb.) Hack., *Pennisetum mutilatum* (Kuntze) Leeke, *Pennisetum mutilatum* Hack. ex Kuntze, nom. inval.

Hierba. Nativa. 1500-2400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Cenchrus nervosus (Nees) Kuntze

Sin.: *Cenchrus nervosus* (Nees) Kuntze var. *ramosus* Kuntze, *Gymnotrix nervosa* Nees, *Pennisetum nervosum* (Nees) Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE). BRA(PAR). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, COA, ITA, PHA, SPE). URY(MON).

Cenchrus pilcomayensis (Mez) Morrone

Sin.: *Gymnotrix rigida* Griseb. var. *longiseta* Griseb., *Pennisetum frutescens* Leeke, *Pennisetum nervosum* (Nees) Trin. var. *laxiusculum* Hack., *Pennisetum rigidum* (Griseb.) Hack. var. *longisetum* Griseb. ex Hack.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Cenchrus polystachios (L.) Morrone

Sin.: *Panicum polystachion* L., *Pennisetum polystachion* (L.) Schult.

Hierba. Introducida. 1100-0 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR). BRA(RGS, SCA).

Cenchrus purpureus (Schumach.)

Morrone

Sin.: *Pennisetum purpureum* Schumach.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, DFE, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAN, CEN, PAI). URY(ART).

Cenchrus rigidus (Griseb.) Morrone

Sin.: *Gymnotrix rigida* Griseb., *Pennisetum rigidum* (Griseb.) Hack.

Hierba. Endémica. 100-800 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Cenchrus spinifex Cav.

Sin.: *Cenchrus incertus* M.A. Curtis, *Cenchrus muricatus* Phil., hom. illeg., *Cenchrus pauciflorus* Benth. var. *muricatus* Caro & E.A. Sánchez, *Cenchrus pauciflorus* Benth.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, MAU). PRY(CEN). URY(CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO, TAC, TYT).

Cenchrus tribuloides L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cenchrus tristachyus (Kunth) Kuntze

Sin.: *Gymnotrix tristachya* Kunth, *Pennisetum tristachyum* (Kunth) Spreng., *Pennisetum tristachyum* (Kunth) Spreng. subsp. *boliviense* Chase

Hierba. Nativa. 500-1900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Chascolytrum Desv.**Chascolytrum ambiguum** (Hack.)

Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies
Sin.: *Briza ambigua* Hack., *Poidium ambiguum* (Hack.) Matthei

Hierba. Nativa. 500-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Chascolytrum bidentatum (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza bidentata* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Eragrostis monandra* Hack., *Rhombolytrum monandrum* (Hack.) Nicora & Rùgolo

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(RIV, TYT).

Chascolytrum brachychaetum

(Ekman) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza brachychaeta* Ekman, *Microbriza brachychaete* (Ekman) Parodi ex Nicora & Rùgolo, *Poidium brachychaetum* (Ekman) Matthei

Hierba. Endémica. 500-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chascolytrum brasiliense (Nees ex Steud.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza brasiliensis* (Nees ex Steud.) Ekman, *Poa poidium* Döll, *Poidium brasiliensis* Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Chascolytrum brizoides (Lam.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza brizoides* (Lam.) Kuntze, *Briza elegans* (P. Beauv.) Döll, *Briza patula* Phil., *Briza tandilensis* Parodi, *Bromus brizoides* Lam., *Calotheca brizoides* (Lam.) Desv., *Calotheca elegans* P. Beauv.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(RGS).

CHL(LBO, MAU, BIO, ARA). URY(CAS, CLA, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SJO, TAC).

Chascolytrum bulbosum (Parodi)

Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies
Sin.: *Erianthecium bulbosum* Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(CLA, LAV, MAL, ROC).

Chascolytrum calotheca (Trin.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza calotheca* (Trin.) Hack., *Briza neesii* Döll, *Briza poa* Nees ex Steud., *Briza scabra* Nees ex Steud., nom. nud., *Eragrostis calotheca* Trin., *Eragrostis crassa* Jedwabn., *Poa calotheca* (Trin.) Kunth, *Poidium calotheca* (Trin.) Matthei

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(FLA, MON, RIV, SJO, TAC).

Chascolytrum itatiaiae (Ekman) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza itatiaiae* Ekman

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: BRA(SCA).

Chascolytrum juergensii (Hack.)

Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner var. **angustilemma** Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner

Hierba. Nativa.

Países: BRA(RGS, SCA).

Chascolytrum juergensii (Hack.)

Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner var. **juergensii**

Sin.: *Briza juergensii* Hack., *Poidium juergensii* (Hack.) Matthei

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chascolytrum koelerioides (Trin.)

Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Gymnachne jaffuelii* Parodi, *Gymnachne koelerioides* (Trin.) Parodi, *Poa koelerioides* Trin., *Poa philippii* Steud., *Poa tenuiculmis* Steud., *Rhombolytrum berterioanum* E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Chascolytrum lamarckianum (Nees) Matthei

Sin.: *Briza fusca* (Parodi) Parodi, *Briza lamarckiana* Nees, *Briza lindmanii* Ekman, *Briza subaristata* Lam. var. *fusca* Parodi

Hierba. Endémica. 100-1200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SJO, TAC, TYT).

Chascolytrum latifolium Essi, Souza-Chies & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 800-1600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Chascolytrum monandrum (Hack.)

Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza lilloi* Parodi, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard var. *herzogiana* Henrard, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard var. *tuberculata* Henrard, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard var. *vallegrandensis* Henrard, *Briza mandoniana* (Griseb.) Henrard, *Briza monandra* (Hack.) Pilg., *Briza stricta* (Hook. & Arn.) Steud. var. *mandoniana* (Griseb.) Hauman, *Calotheca stricta* Hook. & Arn. var. *mandoniana* Griseb., *Poa monandra* Hack., *Poidium monandrum* (Hack.) Matthei

Hierba. Nativa. 1000-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

BRA(PAR, SCA).

Chascolytrum paleopiliferum

(Parodi) Matthei

Sin.: *Briza paleopilifera* Parodi

Hierba. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SLU).

Chascolytrum parodianum (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Matthei

Sin.: *Briza parodiana* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(LAV, MAL).

Chascolytrum poomorphum (J. Presl)

Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza hackelii* (Lindm.) Ekman f. *pseudisachne* Ekman, *Briza hackelii* (Lindm.) Ekman, *Briza poamorphum* (J. Presl) Henrard, *Isachne hackelii* Lindm., *Isachne poamorphum* (J. Presl) Mez ex Ekman, nom. inval., *Microbriza poimorpha* (J. Presl) Parodi ex Nicora & Rúgolo, *Panicum poamorphum* J. Presl, *Poidium poimorpha* (J. Presl) Matthei

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(CLA, COL, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, SJO, TAC, TYT).

Chascolytrum rhomboideum (Link)

Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Poa tumidula* Steud., *Rhombolytrum rhomboideum* Link, *Rhombolytrum quinquenervium* Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Chascolytrum rufum J. Presl var. **rufum**

Sin.: *Briza glomerata* Arechav., *Briza glomerata* Kuntze, hom. illeg., *Briza rufa* (J. Presl) Steud., *Lombardochloa rufa* (J. Presl) Roseng. & B.R. Arrill., *Poidium rufum* (J. Presl) Matthei

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLO, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TYT).

Chascolytrum rufum J. Presl var.

sparsipilosum (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza rufa* (J. Presl) Steud. var. *sparsipilosa* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Lombardochloa rufa* (J. Presl) Roseng. & B.R. Arrill. var. *sparsepilosa* (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 200-1000 m.

Países: ARG(COR). BRA(PAR, RGS, SCA).

Chascolytrum scabrum (Nees ex Steud.) Matthei

Sin.: *Briza scabra* (Nees ex Steud.) Ekman, *Chondrachyrum scabrum* Nees ex Steud.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Chascolytrum subaristatum (Lam.) Desv.

Sin.: *Briza berteroniana* Steud., *Briza erecta* Lam., *Briza macrostachya* (J. Presl) Steud., *Briza montevidensis* Trin. ex Steud., nom. nud., *Briza nutans* Lindl. ex Steud., *Briza poiformis* (Spreng.) Kuntze, *Briza reniformis* (J. Presl) Steud., *Briza rotundata* (Kunth) Steud., *Briza sellowii* Nees ex Steud., *Briza stricta* (Hook. & Arn.) Steud., *Briza subaristata* Lam. var. *interrupta* (Hack. ex Stuck.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Briza subaristata* Lam., *Briza triloba* Nees f. *pumila* Hack. ex Kneuck., *Briza triloba* Nees f. *violascens* Hack., *Briza triloba* Nees var. *grandiflora* Döll, *Briza triloba* Nees var. *interrupta* Hack., *Briza triloba* Nees var. *typica* Parodi, nom. inval., *Briza triloba* Nees, *Briza violascens* Steud., *Bromus rotundatus* Kunth, *Calotheca dilatata* Link, *Calotheca macrostachya* J. Presl, *Calotheca microstachya* J. Presl, *Calotheca montevidensis* Spreng. ex Steud., nom. nud., *Calotheca poiformis* Spreng., *Calotheca reniformis* J. Presl, *Calotheca rotundata* (Kunth) Roem. & Schult.,

Calotheca stricta Hook. & Arn., *Calotheca triloba* (Nees) Kunth, *Chascolytrum coarctatum* Phil., *Chascolytrum erectum* (Lam.) Desv., *Chascolytrum nutans* Lindl. & Nees, *Chascolytrum rotundatum* (Kunth) Kunth, *Chascolytrum strictum* (Hook. & Arn.) E. Desv., *Chascolytrum trilobum* (Nees) E. Desv., *Festuca brizoides* Spreng., *Festuca commersonii* Spreng., nom. superfl. *Festuca erecta* (Lam.) Spreng. ex Kunth, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, NEU, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(CAU, CON, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

Chascolytrum uniolae (Nees) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Sin.: *Briza flava* Desv., *Briza spicigera* (J. Presl) Steud., *Briza uniolae* (Nees) Nees ex Steud. var. *modestior* Döll, *Briza uniolae* (Nees) Nees ex Steud. var. *robustior* Döll, *Briza uniolae* (Nees) Nees ex Steud., *Chascolytrum spicigerum* J. Presl, *Eragrostis uniolae* Nees, *Poa anomala* Kunth, *Poidium uniolae* (Nees) Matthei

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TYT).

Chloris Sw.

Chloris affinis Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica.

Países: ARG(TUC).

Chloris barbata Sw.

Sin.: *Andropogon barbatus* L., hom. Illeg., *Chloris inflata* Link, *Chloris paraguayensis* Steud.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.

Países: ARG(BAI, FOR, MIS, SLU, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(PHA).

Chloris castilloniana Lillo & Parodi var. **castilloniana**

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

Chloris castilloniana Lillo & Parodi var. **pubescens** Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Nativa. 300-800 m.

Países: ARG(FOR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU). PRY(APY).

Chloris ciliata Sw. f. **breviseta** Hack.

Sin.: *Chloris brachyathera* (Hack. ex Parodi) Herter, *Chloris ciliata* Sw. var. *brachyathera* Hack. ex Parodi, *Chloris ciliata* Sw. var. *brachyathera* Hack. in Kurtz, nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). PRY(APY).

Chloris ciliata Sw. f. **ciliata**

Sin.: *Chloris ciliata* Sw. var. *texana* Vasey

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).

Chloris ciliata Sw. f. **reptans** A.M.

Molina & Rúgolo

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL).

Chloris gayana Kunth

Sin.: *Chloris guaranitica* Parodi

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(IPA). PRY(APY).

Chloris halophila Parodi var.

halophila

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).

Chloris halophila Parodi var. **humilis**

Christ

Hierba. Nativa. 1000-3500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).

Chloris orthonoton Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Chloris pycnothrix Trin.

Sin.: *Chloris beyrichiana* Kunth, *Chloris radiata* (L.) Sw. var. *beyrichiana* (Kunth) Hack., *Gymnopogon beyrichianus* (Kunth) Parodi, *Gymnopogon haumanii* Parodi, *Gymnopogon radiatus* (L.) Parodi var. *beyrichiana* (Kunth) Parodi

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, COA, GUA, PAI).

Chloris radiata (L.) Sw.

Sin.: *Agrostis radiata* L., *Gymnopogon radiatus* (L.) Parodi

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: BRA(RGS). CHL(AYP, TAR).

Chloris sesquiflora Burkart

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS, ERI). PRY(APY).

Chloris truncata R. Br.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: ARG(SFE).

Chloris virgata Sw.

Sin.: *Chloris compressa* DC., *Chloris elegans* Kunth

Hierba. Nativa. 200-2800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(AYP, TAR). PRY(APY).

Chrysopogon Trin., nom. cons.

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty

Sin.: *Holcus zizanioides* (L.) Kuntze ex Stuck., *Phalaris zizanioides* L., *Vetiveria zizanioides* (L.) Nash

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COS, MIS).

PRY(CEN, PAI).

Chusquea Kunth

Chusquea anelytra Nees

Sin.: *Dendragrostis anelytra* Munro, nom. nud.

Hierba subleñosa. Nativa. 700-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chusquea anelytroides Rupr. ex Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR).

- Chusquea argentina** Parodi
Hierba subleñosa. Endémica. 400-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(LLA).
- Chusquea bambusoides** (Raddi) Hack.
var. **bambusoides**
Sin.: *Chusquea gaudichaudii* Kunth,
Nastus brunneus Desv., *Rettbergia*
bambusoides Raddi
Hierba subleñosa. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea bambusoides** (Raddi) Hack.
var. **minor** McClure
Hierba subleñosa. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).
- Chusquea capitata** Nees
Sin.: *Rettbergia capitata* Döll, nom. inval.
Hierba subleñosa. Nativa. 600-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chusquea capituliflora** Trin. var.
capituliflora
Hierba subleñosa. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea capituliflora** Trin. var.
pubescens McClure & L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea ciliata** Phil.
Hierba subleñosa. Endémica.
Países: CHL(VAL, RME).
- Chusquea culeou** E. Desv.
Sin.: *Chusquea andina* Phil., *Chusquea*
breviglumis Phil., *Chusquea culeou* E.
Desv. f. *longiramea* Parodi
Hierba subleñosa. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS).
- Chusquea cumingii** Nees
Hierba subleñosa. Endémica. 0-1600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).
- Chusquea deficiens** Parodi
Hierba subleñosa. Nativa. 1000-1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
- Chusquea egluma** Guerreiro & Rúgolo
Hierba subleñosa. Endémica. 2100-
2200 m.
Países: ARG(SAL).
- Chusquea fernandeziana** Phil.
Sin.: *Chusquea ligulata* Munro, p.p.
Hierba subleñosa. Endémica. 400-900 m.
Países: CHL(VAL, JFE).
- Chusquea floribunda** Guerreiro &
Rúgolo
Hierba subleñosa. Nativa. 2100-2200 m.
Países: ARG(SAL).
- Chusquea gracilis** McClure & L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Endémica. 700-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea hatschbachii** L.G. Clark &
A. Blong
Hierba subleñosa. Endémica. 1800-
2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chusquea ibiramae** McClure & L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Endémica. 300-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chusquea juergensii** Hack.
Sin.: *Chusquea swallenii* McClure &
L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Nativa. 400-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY(MAL, RIV, TYT).
- Chusquea kleinii** A.C. Mota, R.P.
Oliveira & L.G. Clark
Sin.: *Chusquea capituliflora* Trin. var.
pubescens McClure & L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Nativa. 500-1300 m.
Países: BRA(SCA).
- Chusquea leptophylla** Nees
Sin.: *Arthrostylidium leptophyllum*
(Nees) Döll
Hierba subleñosa. Nativa. 700-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea lorentziana** Griseb.
Hierba subleñosa. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
- Chusquea macrostachya** Phil.
Hierba subleñosa. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(LRI, LLA, AIS).
- Chusquea meyeriana** Rupr. ex Döll
Hierba subleñosa. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea mimosa** McClure & L.B. Sm.
subsp. **australis** L.G. Clark
Hierba subleñosa. Endémica. 900-
1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
- Chusquea mimosa** McClure & L.B. Sm.
subsp. **mimosa**
Sin.: *Chusquea elegans* Renvoize
Hierba subleñosa. Endémica. 200-
1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Chusquea montana** Phil. f. **montana**
Hierba subleñosa. Endémica. 500-
1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO,
LRI, LLA, AIS).
- Chusquea montana** Phil. f. **nigricans**
(Phil.) Matthei
Sin.: *Chusquea nigricans* Phil.
Hierba subleñosa. Endémica. 500-
1000 m.
Países: CHL(LRI, LLA, AIS).
- Chusquea nudiramea** L.G. Clark
Hierba subleñosa. Endémica. 200 m.
Países: BRA(SCA).
- Chusquea oligophylla** Rupr.
Sin.: *Chusquea discolor* Hack.,
Chusquea wettsteinii Hack.
Hierba subleñosa. Nativa. 700-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chusquea oxylepis** (Hack.) Ekman
Sin.: *Chusquea bambusoides* (Raddi)
Hack. subsp. *oxylepis* Hack.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chusquea pinifolia** (Nees) Nees
Sin.: *Arundinaria pinifolia* Nees,
Ludolphia pinifolia (Nees) A. Dietr.
Hierba subleñosa. Nativa. 700-2300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
- Chusquea quila** Kunth
Sin.: *Arundo quila* Molina, *Chusquea*
parvifolia Phil., *Chusquea quila* Kunth
var. *laxiflora* E. Desv., *Chusquea quila*
Kunth var. *longipila* E.G. Camus,
Coliquea quila (Molina) Steud. ex Bibra,
comb. illeg., *Cortaderia quila* (Molina)
Stapf, *Moorea quila* (Molina) Stapf,
Nastus productus (Pilg.) Holtum,
Oreostachys producta Pilg.
Hierba subleñosa. Endémica. 0-1600 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS).
- Chusquea ramosissima** Lindm.
Sin.: *Chusquea affinis* Munro ex A.
Camus, *Chusquea phacellophora* Pilg.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAN, GUA, ITA, ÑEE,
PAI). URY(ART, MAL, RIV, TAC, TYT).
- Chusquea sellowii** Rupr.
Hierba subleñosa. Nativa. 1000-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chusquea tenella Nees

Sin.: *Chusquea tenella* Nees var.
latifolia Dutra, *Chusquea uruguayensis*
Arechav.

Hierba subleñosa. Nativa. 200-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(CLA, LAV, MAL, RIV, TAC, TYT).

Chusquea tenuiglumis Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Chusquea uliginosa Phil.

Sin.: *Chusquea tenuiflora* Phil.
Hierba subleñosa. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(LRI, LLA, AIS).

Chusquea urelytra Hack.

Hierba subleñosa. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Chusquea valdiviensis E. Desv.

Sin.: *Chusquea intermedia* Steud., nom.
nud., *Chusquea palenae* Phil.
Hierba subleñosa. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA,
LRI, LLA).

Chusquea windischii L.G. Clark

Hierba subleñosa. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Coix L.**Coix lacryma-jobi** L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(COR, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(AMA).

Colanthesia McClure & E.W. Smith**Colanthesia cingulata** (McClure &

L.B. Sm.) McClure
Sin.: *Aulonemia cingulata* McClure &
L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Colanthesia intermedia (McClure &

L.B. Sm.) McClure
Sin.: *Aulonemia intermedia* McClure &
L.B. Sm.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Colanthesia rhizantha (Hack.)

McClure
Sin.: *Arundinaria rhizantha* Hack.
Hierba subleñosa. Endémica. 100-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).

Coleataenia Griseb.**Coleataenia prionitis** (Nees) Soreng

Sin.: *Coleataenia gynerioides* Griseb.,
Panicum gynerioides (Griseb.) Pilg.,
Panicum prionitis Nees, *Panicum*
prionitis Nees subsp. *gynerioides*
(Griseb.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.,
Panicum prionitis Nees var. *pallidum*
Kuntze, *Panicum prionitis* Nees var.
varium Kuntze

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS).
PRY(APA, CAU, CEN, CON, COA, GUA,
ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, FLA, TAC).

Cortaderia Stapf, nom. cons.**Cortaderia araucana** Stapf

Sin.: *Cortaderia araucana* Stapf
var. *fuenzalidae* Acevedo, *Cortaderia*
araucana Stapf var. *skottsbergii* Acevedo,
Cortaderia argentea (Nees) Stapf,
Cortaderia dioeca (Spreng.) Speg.,
Cortaderia longicauda Hack., *Cortaderia*
quila (Nees & Meyen) Stapf var.
patagonica Speg.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, RME).

Cortaderia egmontiana (Roem. &

Schult.) M. Lyle ex Connor
Sin.: *Ampelodesmos australis* Brongn.
ex Duperrey, *Arundo egmontiana*
Roem. & Schult., *Arundo pilosa*
d'Urv., *Calamagrostis patula* Steud.,
Calamagrostis scirpiformis Phil.,
Cortaderia minima Conert, *Cortaderia*
pilosa (d'Urv.) Hack., *Cortaderia pilosa*
(d'Urv.) Hack. var. *minima* (Conert)
Nicora, *Gynerium nanum* Phil., *Gynerium*
pilosum (d'Urv.) Macloskie, *Phragmites*
egmontianus (Roem. & Schult.) Trin. ex
Steud., *Poa phragmites* Phil.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA,
AIS, MAG, RME).

Cortaderia hieronymi (Kuntze) N.P.

Barker & H.P. Linder
Sin.: *Danthonia hieronymi* (Kuntze)
Hack., *Danthonia hieronymi* (Kuntze)
Hack. var. *pyramidata* Pilg. ex Rojas,
nom. nud., *Danthonia hieronymi*
(Kuntze) Hack. var. *ticta* Pilg. ex Rojas,

nom. nud., *Lamprothyrsus hieronymi*
(Kuntze) Pilg., *Lamprothyrsus hieronymi*
(Kuntze) Pilg. var. *jujuyensis* Pilg.,
Lamprothyrsus hieronymi (Kuntze)
Pilg. var. *nervosus* Pilg., *Lamprothyrsus*
hieronymi (Kuntze) Pilg. var. *pyramidatus*
Pilg., *Lamprothyrsus hieronymi* (Kuntze)
Pilg. var. *tinctus* Pilg., *Lamprothyrsus*
venturii Conert, *Triraphis hieronymi*
Kuntze var. *jujuyensis* Kuntze, *Triraphis*
hieronymi Kuntze

Hierba. Nativa. 700-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Cortaderia modesta (Döll) Hack. ex

Dusén
Sin.: *Gynerium modestum* Döll
Hierba. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.

f.) Asch. & Graebn. subsp. **jubata**
(Lemoine) Testoni & Villamil
Sin.: *Cortaderia jubata* (Lemoine)
Stapf, *Gynerium jubatum* Lemoine
Hierba. Nativa. 1000-3700 m.
Países: ARG(SAL, TUC). CHL(AYP,
TAR, ANT, ATA, COQ).

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.

f.) Asch. & Graebn. subsp. **selloana**
Sin.: *Arundo dioica* Spreng., hom.
illeg., *Arundo selloana* Schult. & Schult.
f., *Cortaderia dioeca* (Spreng.) Speg.,
Gynerium argenteum Nees, *Moorea*
araucana (Stapf) Stapf

Hierba. Nativa. 0-1900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN,
NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR,
ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA,
LLA, AIS, MAG, RME, IPA). URY(CAS,
MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR).

Cortaderia speciosa (Nees & Meyen)

Stapf
Sin.: *Cortaderia atacamensis*
(Phil.) Pilg., *Cortaderia quila* (Nees &
Meyen) Stapf, *Cortaderia rudiusscula*
Stapf, *Gynerium argenteum* Nees
var. *parviflorum* E. Desv., *Gynerium*
argenteum Nees var. *strictum* E. Desv.,
Gynerium atacamense Phil., *Gynerium*
quila Nees & Meyen, *Gynerium*
rudiussculum (Stapf) Kuntze ex Hack.,
Gynerium speciosum Nees & Meyen
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN,
SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ,
VAL, LBO, BIO, ARA, RME, IPA).

Cortaderia vaginata Swallen
Hierba. Endémica. 2000 m.
Países: BRA(SCA).

Corynephorus P. Beauv., nom. cons.

Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.
Sin.: *Aira divaricata* Pourr.
Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: CHL(BIO).

Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reut.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Cottea Kunth

Cottea pappophoroides Kunth
Hierba. Nativa. 900-2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Ctenium Panz

Ctenium brachystachyum (Nees) Kunth
Sin.: *Campulosus brachystachyus* Nees
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Ctenium brevispicatum J.G. Sm.
Sin.: *Ctenium trinii* Ekman
Hierba. Nativa. 1100-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Ctenium cirrosum (Nees) Kunth
Sin.: *Campulosus cirrosus* Nees
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Ctenium polystachyum Balansa
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Cymbopogon Spreng.

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
Sin.: *Andropogon citratus* DC.
Hierba. Introducida. 0-2700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). CHL(TAR).

Cymbopogon densiflorus (Steud.) Stapf
Sin.: *Andropogon densiflorus* Steud.
Hierba. Introducida.
Países: BRA(RGS).

Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Cynodon Rich., nom. cons.

Cynodon affinis Caro & E.A. Sánchez
Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *affinis* (Caro & E.A. Sánchez) Romero Zarco
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, BIO, RME). URY(SJO).

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **biflorum** Merino
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, ERI, JUJ, SDE, TUC). BRA(RGS).

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **dactylon**
Sin.: *Capriola dactylon* (L.) Kuntze, *Cynodon aristiglumis* Caro & E.A. Sánchez, *Cynodon aristulatus* Caro & E.A. Sánchez, *Cynodon erectus* J. Presl, *Cynodon pascuus* Nees, *Panicum dactylon* L.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, IPA). PRY(COA, GUA). URY(MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR).

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **longiglumis** Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, LPA, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(ITA). URY(MAL, MON, SAO).

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **pilosus** Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SDE). BRA(PAR, RGS).

Cynodon distichioides Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CAS, MAL, MON).

Cynodon hirsutissimus (Litard. & Maire) Caro & E.A. Sánchez
Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var.

hirsutissimus (Litard. & Maire) Maire, *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *subvar. hirsutissima* Litard. & Maire
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, SFE). URY(MON).

Cynodon incompletus Nees var. **hirsutus** (Stent) de Wet & J.R. Harlan
Sin.: *Cynodon hirsutus* Stent, *Cynodon hirsutus* Stent var. *sesquiflorus* Parodi
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, SLU, SFE, SDE, TUC).

Cynodon laeviglumis Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(LPA).

Cynodon maritimus Kunth var. **breviglumis** Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Cynodon maritimus Kunth var. **grandispiculus** Caro & E.A. Sánchez
Sin.: *Cynodon grandispiculus* Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LRI, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, MON, SJO).

Cynodon maritimus Kunth var. **maritimus**
Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *maritimus* (Kunth) Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(Desconocida).

Cynodon mucronatus Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Cynodon nitidus Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Cynodon nlemfuensis Vanderyst
Sin.: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *sarmentosus* Parodi, *Cynodon parodii* Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TUC). BRA(PAR, RGS).

Cynodon pedicellatus Caro
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MON).

Cynodon plectostachyus (K. Schum.) Pilg.

Sin.: *Leptochloa plectostachya* K. Schum.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). PRY(APY).

Cynosurus L.**Cynosurus cristatus** L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, MEN, NEU, RNE, SLU, TDF). CHL(VAL, BIO, AIS, MAG).

Cynosurus echinatus L.

Hierba. Introducida. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE). URY(COL, MAL, MON, SJO, SOR).

Dactylis L.**Dactylis glomerata** L.

Sin.: *Bromus glomeratus* (L.) Scop.,
Festuca glomerata (L.) All.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(MON).

Dactyloctenium Willd.**Dactyloctenium aegyptium** (L.) Willd.

Sin.: *Cynosurus aegyptius* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(PHA). URY(MON).

Danthonia DC., nom. cons.**Danthonia annableae** P.M. Peterson & Rúgolo

Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Danthonia araucana Phil.

Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Danthonia californica Bol. var. **americana** (Scribn.) Hitchc.

Sin.: *Danthonia americana* Scribn.,
Danthonia grandiflora Phil., nom. illeg.
Hierba. Introducida. 100-500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Danthonia chilensis E. Desv. var. **aureofulva** (E. Desv.) Baeza

Sin.: *Danthonia aureofulva* E. Desv.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Danthonia chilensis E. Desv. var. **chilensis**

Sin.: *Avena ariguensis* Steud.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

Danthonia chilensis E. Desv. var. **glabriflora** Nicora

Sin.: *Danthonia calva* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Danthonia cirrata Hack. & Arechav.

Sin.: *Danthonia tandilensis* Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, COR, RNE, SLU).
BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Danthonia decumbens (L.) DC.

Sin.: *Festuca decumbens* L.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(LLA).

Danthonia malacantha (Steud.) Pilg.

Sin.: *Danthonia collina* Phil., *Danthonia octoflora* Phil., *Danthonia oresigena* Phil.,
Trisetum malacanthum Steud.
Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

Danthonia melanathera (Hack.) G. Bernardello

Sin.: *Danthonia cirrata* Hack. & Arechav. var. *melanathera* Hack.
Hierba. Endémica. 1200 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Danthonia montevidensis Hack. & Arechav.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COR). BRA(PAR,

RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Danthonia rhizomata Swallen

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, LAV, MAL, ROC, TYT).

Danthonia rugoloana Sulekic

Hierba. Endémica. 3200-3300 m.
Países: ARG(SAL).

Danthonia secundiflora J. Presl subsp. **charruana** (Swallen) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Sin.: *Danthonia charruana* Swallen,
Danthonia dusenii Ekman var. *charruana* (Swallen) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(FLO, RIV, ROC).

Danthonia secundiflora J. Presl subsp. **mattheii** Baeza

Hierba. Nativa. 1300-2400 m.
Países: BRA(PAR).

Danthonia secundiflora J. Presl subsp. **secundiflora**

Sin.: *Danthonia dusenii* Ekman,
Danthonia filifolia C.E. Hubb., *Danthonia montana* Döll, *Danthonia quinquinervata* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Hierba. Nativa. 0-3400 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TYT).

Deschampsia P. Beauv.**Deschampsia airiformis** (Steud.) Benth. & Hook. f.

Sin.: *Agrostis desvauuxii* Phil., *Deschampsia airiformis* (Steud.) Parodi, comb. Superfl.,
Trisetum airiformis Steud.
Hierba. Endémica. 0-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Deschampsia antarctica E. Desv.

Sin.: *Aira antarctica* Hook. f., hom. illeg., *Airidium elegantulum* Steud.,
Deschampsia elegantula (Steud.) Parodi,
Deschampsia fuegina Phil.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, ARA, MAG, RME).

Deschampsia berteriana (Kunth) Trin.

Sin.: *Deschampsia berteriana* (Kunth) Trin. var. *parvispicula* Parodi, *Deschampsia desvauxii* Pilg., *Monandriaira berteriana* (Kunth) E. Desv., *Trisetum berterianum* Kunth

Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, MAG, RME).

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. var. **caespitosa**

Sin.: *Aira caespitosa* L., *Deschampsia andina* Phil.

Hierba. Nativa. 0-4200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. var. **pulchra** (Nees & Meyen) Nicora

Sin.: *Aira pulchra* (Nees & Meyen) Steud., *Deschampsia pulchra* Nees & Meyen, *Deyeuxia grata* Phil.

Hierba. Endémica. 1600-4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU). CHL(LBO, MAU, BIO).

Deschampsia chrysantha (J. Presl) Saarela var. **chrysantha**

Sin.: *Calamagrostis chrysantha* (J. Presl) Steud., *Calamagrostis mutica* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Calamagrostis nitida* Hack., *Deyeuxia chrysantha* J. Presl var. *chrysantha*, *Deyeuxia leiopoda* Wedd., *Stylagrostis chrysantha* (J. Presl) Mez

Hierba. Nativa. 3500-5000 m.
Países: ARG(JUU). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

Deschampsia chrysantha (J. Presl) Saarela var. **phalaroides** (Wedd.) Saarela

Sin.: *Calamagrostis chrysantha* (J. Presl) Steud. var. *phalaroides* (Wedd.) Sorong, *Deyeuxia chrysantha* J. Presl var. *phalaroides* (Wedd.) Villav., *Deyeuxia phalaroides* Wedd.

Hierba. Nativa. 4100-5000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Deschampsia cordillerarum Hauman

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, RME).

Deschampsia danthonioides (Trin.) Munro ex Benth.

Sin.: *Aira danthonioides* Trin.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, LBO).

Deschampsia elongata (Hook.)

Munro

Sin.: *Aira aciphylla* Franch. var. *pumila* Franch., *Aira aciphylla* Franch., *Aira elongata* Hook., *Deschampsia aciphylla* (Franch.) Speg.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, TDF). CHL(COQ, ARA, AIS, MAG, RME).

Deschampsia eminens (J. Presl)

Saarela var. **eminens**

Sin.: *Agrostis eminens* (J. Presl) Griseb., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *sordida* Kuntze, *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *tunariensis* Kuntze, *Calamagrostis robusta* (Phil.) Phil., hom. illeg., *Deyeuxia arundinacea* Phil., *Deyeuxia eminens* J. Presl var. *eminens*, *Deyeuxia robusta* Phil.

Hierba. Nativa. 2900-4800 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Deschampsia eminens (J. Presl)

Saarela var. **fulva** (Griseb.) Saarela

Sin.: *Agrostis fulva* Griseb., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. f. *brevipila* Hack. ex Stuck., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *fulva* (Griseb.) Sorong, *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *grisebachiana* Kuntze, *Calamagrostis fulva* (Griseb.) Kuntze, *Calamagrostis grata* Phil., *Deyeuxia eminens* J. Presl f. *brevipila* (Hack.) Türpe, *Deyeuxia eminens* J. Presl var. *fulva* (Griseb.) Rúgolo, *Deyeuxia fulva* (Griseb.) Parodi, *Deyeuxia laxiflora* Phil.

Hierba. Endémica. 3200-4200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Deschampsia eminens (J. Presl)

Saarela var. **inclusa** (Rúgolo) Saarela

Sin.: *Deyeuxia eminens* J. Presl var. *inclusa* Rúgolo
Hierba. Endémica. 3200-4600 m.
Países: ARG(JUU, LRI, SAL, SJU).

Deschampsia hackelii (Lillo) Saarela

Sin.: *Calamagrostis hackelii* Lillo, *Deyeuxia hackelii* (Lillo) Parodi

Hierba. Nativa. 3800-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(ANT).

Deschampsia kingii (Hook. f.) E. Desv.

Sin.: *Aira elatior* Steud., *Aira grandiflora* Nees ex Steud., hom. illeg., *Aira kingii* Hook. f., *Deschampsia grandiflora* Macloskie, hom. illeg., *Deschampsia kingii* (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

Deschampsia laxa Phil.

Sin.: *Calamagrostis hirthii* Phil., *Trisetum dozei* Franch.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU). CHL(LLA, AIS, MAG).

Deschampsia looseriana Parodi var. **looseriana**

Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Deschampsia looseriana Parodi var. **triandra** Parodi

Hierba. Endémica. 500 m.
Países: CHL(RME).

Deschampsia mendocina Parodi

Hierba. Endémica. 1700 m.
Países: ARG(MEN).

Deschampsia micrantha Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Deschampsia monandra Parodi

Sin.: *Deschampsia glauca* (E. Desv.) Parodi, hom. illeg., *Monandriaira glauca* E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, ARA, RME).

Deschampsia parvula (Hook. f.) E. Desv.

Sin.: *Aira parvula* Hook. f., *Deschampsia parvula* (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg., *Trisetum parvulum* (Hook. f.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Deschampsia patula (Phil.) Pilg. ex Skottsdb.

Sin.: *Deschampsia elegantula* (Steud.) Parodi var. *patula* (Phil.) Parodi, *Monandriaira patula* Phil.

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG, RME).

Deschampsia setacea (Huds.) Hack.

Sin.: *Aira montana* L. var. *setacea*
(Huds.) Huds., *Aira setacea* Huds.,
Aristavena setacea (Huds.) F. Albers &
Butzin
Hierba. Introducida. 3400-3600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Deschampsia venustula Parodi

Hierba. Endémica. 900-3400 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU,
MAG, RME).

Deyeuxia Clarion ex P. Beauv.**Deyeuxia alba** J. Presl subsp. **alba**

Sin.: *Calamagrostis alba* (J. Presl)
Steud., *Calamagrostis armata* (Döll)
Parodi, *Calamagrostis armata* (Döll)
Parodi var. *subaristata* Parodi,
Calamagrostis armata (Döll) Parodi var.
subcontracta (Döll) Parodi, *Calamagrostis*
montevicensis Nees var. *armata* Döll,
Calamagrostis montevicensis Nees var.
subcontracta Döll, *Deyeuxia armata* (Döll)
Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS). BRA(RGS,
SCA). PRY(SPE). URY(CAS, CLA, DUR,
FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV,
ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Deyeuxia alba J. Presl subsp.**breviaristata** Rúgolo

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).
URY(MAL).

Deyeuxia alba J. Presl subsp.**tricholemma** (Roseng., B.R. Arrill. &
Izag.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis alba* (J. Presl)
Steud. subsp. *tricholemma* Roseng., B.R.
Arrill. & Izag.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS).
URY(MAL, PAY, SOR).

Deyeuxia breviaristata Wedd.

Sin.: *Calamagrostis breviaristata*
(Wedd.) Pilg., *Calamagrostis variegata*
(Phil.) Kuntze, hom. illeg., *Deyeuxia*
mutica Wedd., *Deyeuxia variegata* Phil.
Hierba. Nativa. 3300-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, RME).

Deyeuxia brevifolia J. Presl var.**brevifolia**

Sin.: *Calamagrostis brevifolia* (J. Presl) Steud.
Hierba. Nativa. 3000-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Deyeuxia brevifolia J. Presl var.

expansa Rúgolo & Villav.
Sin.: *Calamagrostis brevifolia* (J. Presl) Steud.
var. *expansa* (Rúgolo & Villav.) Soreng
Hierba. Nativa. 3200-3400 m.
Países: CHL(TAR).

Deyeuxia cabreræ (Parodi) Parodi var.

aristulata Rúgolo & Villav.
Sin.: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var.
aristulata (Rúgolo & Villav.) Soreng
Hierba. Nativa. 3200-4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(ANT, ATA).

Deyeuxia cabreræ (Parodi) Parodi var.

cabreræ
Sin.: *Calamagrostis cabreræ* Parodi
Hierba. Endémica. 3500-4200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(ANT).

Deyeuxia cabreræ (Parodi) Parodi var.

maxima Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var.
maxima (Rúgolo) Soreng
Hierba. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Deyeuxia cabreræ (Parodi) Parodi var.

trichopoda Parodi ex Rúgolo
Sin.: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var.
trichopoda (Parodi ex Rúgolo) Soreng
Hierba. Nativa. 3700-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
CHL(ANT, ATA).

Deyeuxia calderillensis (Pilg.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis calderillensis* Pilg.
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Deyeuxia chrysophylla Phil.

Sin.: *Calamagrostis chrysophylla* (Phil.)
Govaerts
Hierba. Nativa. 3700-5300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC). CHL(TAR, ANT, ATA).

Deyeuxia chrysostachya E. Desv.

Sin.: *Calamagrostis chrysostachya*
(E. Desv.) Kuntze, *Calamagrostis*
chrysostachya (E. Desv.) V.N. Vassil.,
comb. superfl.
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, MEN, SAL, SJU).
CHL(ANT, COQ, VAL, RME).

Deyeuxia colorata Beetle

Sin.: *Agrostis rosea* Griseb., *Calamagrostis*
rosea (Griseb.) Hack., *Calamagrostis rosea*
(Griseb.) Hack. f. *typica* Hack., nom. inval.,
Calamagrostis rosea (Griseb.) Hack. var.
viridula Hack., *Deyeuxia rosea* (Griseb.)
Turpe, comb. superfl.
Hierba. Nativa. 1700-4400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Deyeuxia crispa Rúgolo & Villav.

Sin.: *Calamagrostis crispa* (Rúgolo &
Villav.) Govaerts
Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Deyeuxia cryptolopha Wedd.

Sin.: *Calamagrostis cryptolopha*
(Wedd.) Hitchc.
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Deyeuxia curta Wedd.

Sin.: *Calamagrostis curta* (Wedd.) Pilg.,
Calamagrostis curta (Wedd.) Hitchc.,
comb. superfl.
Hierba. Nativa. 4200-5000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Deyeuxia curvula Wedd.

Sin.: *Calamagrostis curvula* (Wedd.)
Pilg., *Calamagrostis tenuifolia* (Phil.) R.E.
Fr., hom. illeg., *Deyeuxia tenuifolia* Phil.
Hierba. Nativa. 2600-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Deyeuxia deserticola Phil. var.

breviaristata Rúgolo & Villav.
Sin.: *Calamagrostis deserticola* (Phil.)
Phil. var. *breviaristata* (Rúgolo & Villav.)
Soreng
Hierba. Nativa. 3400-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Deyeuxia deserticola Phil. var.

deserticola
Sin.: *Agrostis canescens* Griseb., hom.
illeg., *Calamagrostis deserticola* (Phil.)
Phil., *Deyeuxia trisetoides* Phil.
Hierba. Nativa. 2800-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Deyeuxia diemii Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis diemii* (Rúgolo) Soreng
Hierba. Endémica. 1200-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU).

Deyeuxia eminens J. Presl var.

discreta Rúgolo & Villav.

Sin.: *Calamagrostis eminens* (J. Presl)

Steud. var. *discreta* (Rúgolo & Villav.)

Soreng, *Deyeuxia leiopoda* Wedd. var.

discreta Wedd., nom. nud.

Hierba. Nativa. 3900-4500 m.

Países: CHL(TAR, ANT).

Deyeuxia erythrostachya E. Desv.

var. **erythrostachya**

Sin.: *Aira gayana* Steud., *Calamagrostis*

erythrostachya (E. Desv.) Hack.,

Calamagrostis gayana (Steud.) Soreng,

Calamagrostis stipitata Hitchc., *Stylagrostis*

erythrostachya (E. Desv.) Mez

Hierba. Endémica. 500-4100 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,

SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,

BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Deyeuxia erythrostachya E. Desv.

var. **neuquenensis** Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis gayana* (Steud.)

Soreng var. *neuquenensis* (Rúgolo)

Soreng

Hierba. Endémica. 1700-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

CHL(LBO, MAU, BIO, LLA, MAG, RME).

Deyeuxia fiebrigii (Pilg.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis fiebrigii* Pilg.,

Deyeuxia nardifolia (Griseb.) Phil. var.

elatior Turpe

Hierba. Nativa. 2600-4300 m.

Países: ARG(JUU, TUC).

Deyeuxia filifolia Wedd.

Sin.: *Calamagrostis amoena* (Pilg.)

Pilg., *Calamagrostis filifolia* (Wedd.) Pilg.,

hom. illeg., *Calamagrostis trichophylla*

Pilg., *Deyeuxia amoena* Pilg.

Hierba. Nativa. 2700-5200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

CHL(ANT).

Deyeuxia heterophylla Wedd.

Sin.: *Calamagrostis heterophylla*

(Wedd.) Pilg.

Hierba. Nativa. 3000-4800 m.

Países: ARG(JUU, LRI, SAL).

CHL(AYP, TAR).

Deyeuxia hieronymi (Hack.) Turpe

Sin.: *Calamagrostis hieronymi* Hack.

Hierba. Nativa. 1100-4500 m.

Países: ARG(COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Deyeuxia lagurus Wedd.

Sin.: *Calamagrostis cephalantha* Pilg.,

Calamagrostis lagurus (Wedd.) Pilg.,

hom. illeg., *Deyeuxia curta* Wedd. var.

longearistata Turpe

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Deyeuxia malamalensis (Hack.) Parodi

Sin.: *Calamagrostis malamalensis* Hack.

Hierba. Nativa. 2700-4600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Deyeuxia minima (Pilg.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis minima* (Pilg.)

Tovar, *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.)

Pilg. var. *minima* Pilg.

Hierba. Nativa. 4000-4900 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Deyeuxia orbignyana Wedd.

Sin.: *Calamagrostis nematophylla*

(Wedd.) Pilg., *Calamagrostis orbignyana*

(Wedd.) Pilg., *Deyeuxia nematophylla*

Wedd.

Hierba. Nativa. 1200-4300 m.

Países: ARG(JUU).

Deyeuxia patagonica Speg.

Sin.: *Calamagrostis patagonica* (Speg.)

Macloskie

Hierba. Endémica. 1500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(ARA).

Deyeuxia poaeoides (Steud.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis ameghinoi* (Speg.)

Hauman, *Calamagrostis fuegiana*

Speg., *Calamagrostis hookeri* (Syme)

Druce, *Calamagrostis magellanica* Phil.,

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn.,

comb. superfl., *Calamagrostis neglecta*

(Ehrh.) Gaertn. var. *poaeoides* (Steud.)

Hack., *Calamagrostis poaeoides* Steud.,

Calamagrostis stricta (Timm) Koeler,

Deyeuxia ameghinoi Speg., *Deyeuxia*

hookeri (Syme) Druce, *Deyeuxia neglecta*

(Ehrh.) Kunth, comb. superfl.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF).

CHL(AIS, MAG).

Deyeuxia polygama (Griseb.) Parodi

Sin.: *Calamagrostis lilloi* Hack.,

Calamagrostis lilloi Hack. f. *grandiflora*

Hack., *Calamagrostis polygama* (Griseb.)

Parodi, *Cinnagrostis polygama* Griseb.

Hierba. Endémica. 1800-3200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Deyeuxia recta Kunth

Sin.: *Calamagrostis humboldtiana*

Steud., *Calamagrostis recta* (Kunth) Trin.

ex Steud., *Deyeuxia stricta* Kunth

Hierba. Nativa. 3800-4200 m.

Países: ARG(JUU).

Deyeuxia reitzii (Swallen) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis reitzii* Swallen

Hierba. Endémica. 1900 m.

Países: BRA(SCA).

Deyeuxia rigescens (J. Presl) Turpe

Sin.: *Agrostis bromidioides* Griseb.,

Agrostis rigescens J. Presl, *Bromidium*

rigescens (J. Presl) Nees & Meyen,

Calamagrostis cajatambensis Pilg.,

Calamagrostis rigescens (J. Presl) Scribn.,

Bromidium hygrometricum (Nees) Nees &

Meyen var. *spectabilis* (Nees & Meyen)

Kuntze, *Bromidium hygrometricum*

(Nees) Nees & Meyen var. *rigescens* (J.

Presl) Kuntze, *Deyeuxia imberbis* Wedd.

Hierba. Nativa. 2400-4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,

TUC). CHL(AYP, TAR, ATA).

Deyeuxia rigida Kunth

Sin.: *Agrostis antoniana* Griseb.,

Arundo rigida (Kunth) Poir.,

Calamagrostis antoniana (Griseb.)

D.M. Moore, hom. illeg., *Calamagrostis*

antoniana (Griseb.) Steud. ex Hitchc.,

Calamagrostis antoniana Steud. ex Lechl.,

nom. nud., *Calamagrostis gusindei* Pilg.

ex Skotts., *Calamagrostis rigida* (Kunth)

Trin. ex Steud., *Deyeuxia antoniana*

(Griseb.) Parodi, *Deyeuxia gracilis* Wedd.,

Deyeuxia gusindei (Pilg. ex Skotts.)

Parodi, *Deyeuxia sulcata* Wedd.

Hierba. Nativa. 3400-5000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, SCR, TDF).

CHL(AYP, TAR, ANT, AIS, MAG).

Deyeuxia rupestris (Trin.) Rúgolo f.

pilosa (Kämpf) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis longearistata*

(Wedd.) Hack. ex Sodiro f. *pilosa* Kämpf

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Deyeuxia rupestris (Trin.) Rúgolo var.

minor (Kämpf) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis longearistata*

(Wedd.) Hack. ex Sodiro f. *minor* Kämpf

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Deyeuxia rupestris (Trin.) Rúgolo var. **rupestris**

Sin.: *Calamagrostis beyrichiana* Nees ex Döll, *Calamagrostis longearistata* (Wedd.) Hack. ex Sodiro, *Calamagrostis montevidensis* Nees var. *linearis* Hack., *Calamagrostis rupestris* Trin., *Deyeuxia beyrichiana* (Nees ex Döll) Sodiro, *Deyeuxia heterophylla* Wedd. var. *elator* Wedd., *Deyeuxia longearistata* Wedd.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).

Deyeuxia sclerantha (Hack.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis sclerantha* Hack., *Calamagrostis spiciformis* Hack., *Deyeuxia spiciformis* (Hack.) Turpe

Hierba. Nativa. 2500-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Deyeuxia setiflora Wedd.

Sin.: *Calamagrostis setiflora* (Wedd.) Pilg.
Hierba. Nativa. 3600-5000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Deyeuxia spicigera J. Presl var.**cephalotes** (Wedd.) Rúgolo & Villav.

Sin.: *Calamagrostis spicigera* (J. Presl) Steud. var. *cephalotes* (Wedd.) Soreng, *Deyeuxia cephalotes* Wedd.

Hierba. Nativa. 3700-4700 m.
Países: ARG(LRI). CHL(TAR).

Deyeuxia spicigera J. Presl var.**spicigera**

Sin.: *Calamagrostis spicigera* (J. Presl) Steud., *Deyeuxia obtusata* Wedd., *Deyeuxia subsimilis* Wedd.

Hierba. Nativa. 3600-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP).

Deyeuxia suka (Speg.) Parodi

Sin.: *Calamagrostis suka* Speg.

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Deyeuxia tarmensis (Pilg.) Sodiro var.**macrochaeta** (Hack.) Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis rosea* (Griseb.) Hack. var. *macrochaeta* Hack., *Calamagrostis tarijensis* Pilg., *Calamagrostis tarmensis* Pilg. var. *macrochaeta* (Hack.) Soreng, *Deyeuxia tarmensis* (Pilg.) Sodiro var. *tarijensis* (Pilg.) Villav.

Hierba. Nativa. 2400-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Deyeuxia trichodonta Wedd. var.**hirsuta** Rúgolo

Hierba. Endémica. 3100-3300 m.
Países: ARG(SAL).

Deyeuxia trichodonta Wedd. var.**trichodonta**

Sin.: *Calamagrostis trichodonta* (Wedd.) Soreng

Hierba. Nativa. 2600-4300 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Deyeuxia velutina Nees & Meyen var.**nardifolia** (Griseb.) Rúgolo

Sin.: *Agrostis nardifolia* Griseb., *Calamagrostis nardifolia* (Griseb.) Hack., *Deyeuxia nardifolia* (Griseb.) Phil., *Deyeuxia scabriuscula* Wedd.

Hierba. Nativa. 3800-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Deyeuxia velutina Nees & Meyen var.**velutina**

Sin.: *Calamagrostis chilensis* (Desv.) R.E. Fr., *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Steud., *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Hauman, hom. illeg., *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Steud. var. *breviculmis* Hauman, *Deyeuxia agrostidea* Phil., *Deyeuxia chilensis* E. Desv.

Hierba. Endémica. 2300-4900 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, LLA, RME).

Deyeuxia vicunarum Wedd.

Sin.: *Calamagrostis pentapogonodes* Kuntze, *Calamagrostis pulvinata* Hack., *Calamagrostis spiciformis* Hack. var. *acutiflora* Hack. ex Buchtien, nom. nud., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *abscondita* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *elator* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *humilior* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *setulosa* Pilg., *Calamagrostis vicunarum* (Wedd.) Pilg. var. *tenuior* Pilg., *Deyeuxia pulvinata* (Hack.) Turpe, *Deyeuxia vicunarum* Wedd. var. *major* Wedd., nom. nud., *Deyeuxia vicunarum* Wedd. var. *tenuifolia* Wedd.

Hierba. Nativa. 3200-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Deyeuxia violacea Wedd. var.**puberula** Rúgolo & Villav.

Sin.: *Calamagrostis violacea* (Wedd.) Hitchc. var. *puberula* (Rúgolo & Villav.) Soreng, *Deyeuxia violacea* Wedd. var. *puberula* Wedd., nom. nud.

Hierba. Nativa. 3200-5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Deyeuxia violacea Wedd. var.**violacea**

Sin.: *Calamagrostis violacea* (Wedd.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 4000-4900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Deyeuxia viridiflavescens (Poir.)Kunth var. **montevidensis** (Nees)

Cabrera & Rúgolo

Sin.: *Calamagrostis montevidensis* Nees, *Calamagrostis viridiflavescens* (Poir.)

Steud. var. *montevidensis* (Nees) Kämpf, *Deyeuxia flavescens* Clarion ex Spreng., nom. illeg., *Deyeuxia splendens* Brongn.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, LRI). PRY(APA, APY, BOQ, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Deyeuxia viridiflavescens (Poir.)Kunth var. **viridiflavescens**

Sin.: *Arundo viridiflavescens* Poir., *Calamagrostis montevidensis* Nees var. *ampliflora* Döll, *Calamagrostis viridiflavescens* (Poir.) Steud., *Donax viridiflavescens* (Poir.) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, LRI). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, MIE, PAI). URY(COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, ROC, TAC).

Deyeuxia viridis Phil.

Sin.: *Calamagrostis nemoralis* Phil., hom. illeg., *Calamagrostis nemoralis* Kuntze, hom. illeg., *Calamagrostis viridis* (Phil.) Soreng

Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

Dichanthelium (Hitchc. & Chase) Gould**Dichanthelium hebotos** (Trin.)

Zuloaga

Sin.: *Panicum hebotos* Trin., *Panicum subtpaniculatum* Renvoize, nom. nud., *Panicum subtiliracemosum* Renvoize
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dichanthelium sabulorum (Lam.)Gould & C.A. Clark var. **cordatum**

(Zuloaga & Morrone) Zuloaga

Sin.: *Panicum sabulorum* Lam. var. *cordatum* Zuloaga & Morrone
Hierba. Endémica. 300-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Dichanthelium sabulorum (Lam.)Gould & C.A. Clark var. **polycladum**

(Ekman) Zuloaga

Sin.: *Panicum deltae* Parodi ex Burkart, *Panicum demissum* Trin., *Panicum pencanum* Phil., *Panicum polycladum* Ekman, *Panicum ramosissimum* Trin., *Panicum sabulorum* Lam. var. *polycladum* (Ekman) R.A. Palacios
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO). PRY(CAU, CAA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Dichanthelium sabulorum (Lam.)Gould & C.A. Clark var. **sabulorum**

Sin.: *Panicum acutatum* Steud., *Panicum fultum* Hack., *Panicum latiglume* Döll, *Panicum latiglume* Döll var. *decalvatum* Döll, *Panicum sabulorum* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). PRY(COA, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC).

Dichanthelium sciurotoides (Zuloaga

& Morrone) Davidse

Sin.: *Panicum sciurotoides* Zuloaga & Morrone
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dichanthelium stigosum (Trin.)

Zuloaga

Sin.: *Panicum stigosum* Trin.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Dichanthelium superatum (Hack.)

Zuloaga

Sin.: *Panicum superatum* Hack.
Hierba. Nativa. 700-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dichanthelium surrectum (Chase ex

Zuloaga & Morrone) Zuloaga

Sin.: *Panicum missionum* Mez, hom. illeg., *Panicum surrectum* Chase ex Zuloaga & Morrone
Hierba. Nativa. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU).

Dichanthium Willemet**Dichanthium annulatum** (Forssk.)

Stapf

Sin.: *Andropogon annulatus* Forssk.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(SFE).

Dichanthium aristatum (Poir.) C.E.

Hubb.

Sin.: *Andropogon aristatus* Poir.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(PHA).

Dichelachne Endl.**Dichelachne crinita** (L. f.) Hook. f.

Sin.: *Anthoxanthum crinitum* L. f.
Hierba. Nativa.
Países: CHL(IPA).

Dichelachne micrantha (Cav.) Domin

Sin.: *Stipa micrantha* Cav.
Hierba. Nativa.
Países: CHL(IPA).

Digitaria Haller, nom. cons.**Digitaria aequiglumis** (Hack. &

Arechav.) Parodi var. **aequiglumis**
Sin.: *Panicum aequiglume* Hack. & Arechav., *Panicum debile* Phil., nom. illeg., *Panicum debile* Desf. var. *aequiglume* (Hack. & Arechav.) Hack., *Panicum ramosum* Arechav., hom. Illeg., *Panicum tridactylum* Phil., *Syntherisma aequiglumis* (Hack. & Arechav.) Hitchc., *Digitaria campestris* Henrard, *Digitaria chillanensis* Phil. ex Henrard, nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA). PRY(APA, CEN, ITA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).

Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi var. **laetevirens** (Mez) Henrard

Sin.: *Digitaria laetevirens* Mez
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(PHA). URY(CAS, CLA, MON, ROC, SJO).

Digitaria balansae Henrard

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.

Sin.: *Panicum bicorne* (Lam.) Kunth, *Panicum glaucescens* Nees, hom. illeg., *Paspalum bicorne* Lam.
Hierba. Introducida. 100-1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, PHA). URY(MON).

Digitaria californica (Benth.)Henrard var. **californica**

Sin.: *Eriachne rigida* Phil., *Panicum californicum* Benth., *Panicum friesii* Hack. ex R.E. Fr., *Trichachne californica* (Benth.) Chase
Hierba. Nativa. 0-2900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY). URY(MON, SAO, SOR).

Digitaria californica (Benth.) Henrard var. **villosissima** Henrard

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ, CHO, COA, NAS).

Digitaria catamarcensis Rúgolo

Sin.: *Trichachne catamarcensis* (Rúgolo) Wipff & R.B. Shaw
Hierba. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(CAT).

Digitaria chacoensis (Parodi) Henrard

Sin.: *Digitaria phaeotrix* (Trin.) Parodi var. *chacoensis* Parodi
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA).

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

Sin.: *Digitaria abortiva* Reeder, *Digitaria adscendens* (Kunth) Henrard, *Digitaria marginata* Link, *Digitaria tarapacana* Phil., *Panicum adscendes* Kunth, *Panicum ciliare* Retz., *Panicum sanguinale* L. var. *ciliare* (Retz.) Vasey

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, IPA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SOR, TAC).

Digitaria connivens (Trin.) Henrard var. **connivens**

Sin.: *Panicum connivens* Trin.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Digitaria connivens (Trin.) Henrard var. **pilosa** Canto-Dorow & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).

Digitaria corynotricha (Hack.)

Henrard

Sin.: *Digitaria bonplandii* Henrard, *Digitaria mattogrossensis* (Pilg.) Henrard, *Panicum adustum* Nees var. *mattogrossense* Pilg., *Panicum corynotrichum* Hack., *Panicum gerdessii* Hack. f. *pleostachyum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, COA, PAI).

Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi

Sin.: *Digitaria lanuginosa* (Nees) Henrard var. *cuyabensis* (Trin.) Henrard, *Panicum cuyabense* Trin., *Syntherisma cuyabensis* (Trin.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SDE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(ART, CLA, RIV, SAO).

Digitaria enodis (Hack. ex Arechav.)

Parodi

Sin.: *Paspalum enode* Hack. ex Arechav.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Digitaria eriantha Steud.

Sin.: *Digitaria decumbens* Stent, *Digitaria eriantha* Steud. subsp. *pentzii* (Stent) Kok, *Digitaria pentzii* Stent

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, JUJ, LPA, MIS, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, MIE, PAI, PHA).

Digitaria eriostachya Mez

Sin.: *Digitaria fallens* Parodi
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(ART, RIV, TAC).

Digitaria fiebrigii (Hack.) A. Camus

Sin.: *Panicum fiebrigii* Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CON, PAI).

Digitaria filiformis (L.) Koeler

Sin.: *Panicum filiforme* L., *Paspalum filiforme* (L.) Flügge, hom. illeg., *Syntherisma filiformis* (L.) Nash
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA).

Digitaria fuscescens (J. Presl)

Henrard

Sin.: *Paspalum fuscescens* J. Presl
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA).

Digitaria gerdessii (Hack.) Parodi

Sin.: *Panicum gerdessii* Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

Digitaria horizontalis Willd.

Sin.: *Panicum horizontale* (Willd.) G. Mey., *Paspalum oxyanthum* Steud., *Panicum sanguinale* L. var. *horizontale* (Willd.) Schweinf.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PHA, SPE).

Digitaria insularis (L.) Fedde

Sin.: *Acicarpa sacchariflora* Raddi, nom. illeg., *Andropogon insulare* L., *Digitaria insularis* (L.) Mez ex Ekman, comb. superfl., *Milium villosum* Sw., nom. superfl., *Panicum insulare* (L.) G. Mey., *Panicum insulare* (L.) G.L.Mey. var. *typicum* Hack., nom. inval., *Panicum*

lanatum Rottb., nom. superfl., *Panicum leucophaeum* Kunth, *Syntherisma insularis* (L.) Millsp., *Trichachne insularis* (L.) Nees, *Tricholaena insularis* (L.) Griseb., *Valota insularis* (L.) Chase

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Schreb. ex Muhl.

Sin.: *Panicum ischaemum* Schreb.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). CHL(BIO, LLA).

Digitaria lanuginosa (Nees) Henrard

Sin.: *Paspalum lanuginosum* Nees
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Digitaria laxa (Rchb.) Parodi

Sin.: *Panicum recalvum* (Nees) Kunth, *Reimaria laxa* Rchb., *Trichachne recalva* Nees, *Valota laxa* (Rchb.) Hitchc. & Chase
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, MIS, SFE). BRA(PAR). PRY(CEN, CON, ÑEE, PHA).

Digitaria lehmanniana Henrard var.**dasyantha** Rúgolo

Sin.: *Digitaria nervalis* Henrard
Hierba. Nativa. 1000-1700 m.
Países: ARG(SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

Digitaria leiantha (Hack.) Parodi

Sin.: *Digitaria adusta* (Nees) Griseb. var. *leiantha* (Hack.) Parodi, *Panicum adustum* Nees var. *leianthum* Hack., *Syntherisma leianthum* (Hack.) Hitchc.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). PRY(AMA, CON, PAI, PHA).

Digitaria longiflora (Retz.) Pers.

Sin.: *Paspalum longiflorum* Retz.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Digitaria myriostachya (Hack.)

Henrard

Sin.: *Panicum myriostachyum* Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Digitaria nuda Schumach.

Sin.: *Panicum sanguinale* L. var. *digitatum* (Sw.) Hack. ex Urb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, SPE).

Digitaria paraguayensis Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). PRY(COA, PAI).

Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. **adusta** (Nees) Rúgolo

Sin.: *Digitaria adusta* (Nees) Griseb., *Digitaria adusta* (Nees) Griseb. var. *leucotricha* (Hack.) Parodi, *Digitaria leiantha* (Hack.) Parodi var. *leucotricha* (Hack.) Henrard, *Panicum adustum* Nees, *Panicum adustum* Nees var. *leucotrichum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(AMA, CON, COA, ITA, PAI, SPE). URY(RNO, RIV).

Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. **hackelii** (Arechav.) Henrard

Sin.: *Anthenantia hackelii* Arechav., *Digitaria adusta* (Nees) Griseb. var. *hackelii* (Arechav.) Henrard, *Digitaria arechavaletae* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Panicum hackelii* (Arechav.) Arechav., *Syntherisma hackelii* (Hack.) Chase

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR). BRA(RGS, SCA). URY(FLA, RIV, TAC).

Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. **phaeotrix**

Sin.: *Panicum adustum* Nees var. *phaeotrix* (Trin.) Hack., *Panicum ferrugineum* (Nees) Kunth, hom. illeg., *Panicum phaeotrix* Trin., *Trichachne ferruginea* Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLA, LAV, ROC, SOR).

Digitaria phaeotrix (Trin.) Parodi var. **saltensis** (Henrard) Rúgolo

Sin.: *Digitaria saltensis* Henrard
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(ART, MON, PAY, SAO).

Digitaria purpurea Swallen

Sin.: *Digitaria dusenii* Chase ex Renvoize
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Digitaria queenslandica Henrard

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY).

Digitaria sacchariflora (Nees)

Henrard
Sin.: *Leptocoryphium penicilligerum* Speg., *Panicum insulare* (L.) G.L.Mey. var. *sacchariflorum* (Nees) Hack., *Panicum penicilligerum* (Speg.) Hack., *Panicum sacchariflorum* (Nees) Steud., *Trichachne penicilligera* (Speg.) Parodi, *Trichachne sacchariflora* Nees, *Valota penicilligera* (Speg.) Chase ex Parodi

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CEN, GUA, MIE, SPE). URY(ART, TAC).

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Sin.: *Digitaria plebeia* Phil., *Panicum sanguinale* L., *Panicum sanguinale* L. var. *vulgare* (Schrad.) Döll

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(APY, APA). URY(CAS, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).

Digitaria sellowii (Müll. Hal.) Henrard

Sin.: *Trichachne sellowii* Müll. Hal.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Digitaria setigera Roth ex Roem. & Schult.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(IPA).

Digitaria similis Beetle ex Gould

Sin.: *Trichachne affinis* Swallen
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON, COA, ÑEE).

Digitaria singularis Mez

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(COA).

Digitaria swalleniana Henrard

Sin.: *Trichachne sericea* Swallen, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SLU, SFE,

SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA, PHA). URY(CAS, COL, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).

Digitaria ternata (A. Rich.) Stapf

Sin.: *Cynodon ternatus* A. Rich., *Digitaria argyrostachya* (Steud.) Fernald, *Digitaria argyrostachya* (Steud.) Fernald var. *hirticulmis* Henrard, *Panicum argyrostachyum* Steud., *Paspalum ternatum* (A. Rich.) Hook. f., *Syntherisma ternata* (A. Rich.) Newbold

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS).

Digitaria violascens Link

Sin.: *Panicum violascens* (Link) Kunth, *Paspalum chinense* Nees, *Paspalum filiculme* Nees ex Miq., *Paspalum minutiflorum* Steud., hom. illeg., *Syntherisma chinensis* (Nees) Hitchc., *Syntherisma violascens* (Link) Nash

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, IPA). PRY(COA).

Dinebra Jacq.**Dinebra scabra** (Nees) P.M. Peterson & N. Snow

Sin.: *Diplachne scabra* (Nees) Nicora, *Leptochloa scabra* Nees
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, PHA).

Diplachne P. Beauv.

Diplachne fusca (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. subsp. **uninervia** (J. Presl) P.M. Peterson & N. Snow
Sin.: *Atropis carinata* Griseb., *Diplachne carinata* (Griseb.) Hack., *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. var. *macrotricha* Hack., *Diplachne procumbens* Arechav., *Diplachne tarapacana* Phil., *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi, *Diplachne uninervia* (J. Presl) Hitchc., comb. superfl., *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi f. *abbreviata* Parodi, *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi var. *procumbens* (Arechav.) Parodi, *Eragrostis uninervia* (J. Presl) Steud., *Leptochloa fusca* (L.) Kunth subsp. *uninervia* (J. Presl) N.W. Snow, *Leptochloa uninervia* (J. Presl) Hitchc. &

Chase, *Megastachya uninervia* J. Presl,
Poa uninervia (J. Presl) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, NAS, PAI, PHA). URY(ART).

Disakisperma Steud.

Disakisperma dubium (Kunth) P.M. Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Chloris dubia* Kunth, *Diplachne dubia* (Kunth) Scribn., *Diplachne mendocina* (Phil.) Kurtz, *Eragrostis mendocina* (Phil.) Jedwabn., *Festuca obtusiflora* Willd. ex Spreng., *Iprum mendocinum* Phil., *Leptochloa dubia* (Kunth) Nees subsp. *patens* (J. Presl) Steibel & Covas, *Leptochloa dubia* (Kunth) Nees, *Rabdochloa dubia* (Kunth) Kuntze ex Stuck., *Schismus patens* J. Presl

Hierba. Nativa. 100-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Distichlis Raf.

Distichlis acerosa (Griseb.) H.L. Bell & Columbus

Sin.: *Halochloa acerosa* Griseb., *Monanthochloa acerosa* (Griseb.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU, SDE).

Distichlis australis (Speg.) Villamil

Sin.: *Monanthochloa australis* Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Distichlis humilis Phil.

Sin.: *Distichlis misera* Phil., *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *humilis* (Phil.) Kuntze

Hierba. Nativa. 2300-4300 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Distichlis laxiflora Hack.

Sin.: *Distichlis scoparia* (Kunth)

Arechav. f. *laxiflora* (Hack.) Beetle

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, SAL, SLU, SFE).

Distichlis scoparia (Kunth) Arechav. var. **erinacea** (Beetle) Nicora

Sin.: *Distichlis scoparia* (Kunth)

Arechav. f. *erinacea* Beetle

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR).

Distichlis scoparia (Kunth) Arechav. var. **scoparia**

Sin.: *Poa scoparia* Nees ex Kunth, *Uniola scoparia* (Nees ex Kunth) Steud.

Hierba. Endémica. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).

Distichlis spicata (L.) Greene var. **spicata**

Sin.: *Distichlis deserticola* Phil., *Distichlis hirsuta* Phil., *Distichlis hirta* Phil., *Distichlis marginata* Phil., *Distichlis maritima* Raf., *Distichlis mendocina* Phil., *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *andina* Beetle, *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *mendocina* (Phil.) Hack., *Distichlis thalassica* (Kunth) E. Desv., *Megastachya thalassica* Roem. & Schult., *Poa thalassica* Kunth, *Uniola spicata* L.

Hierba. Nativa. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO).

Distichlis spicata (L.) Greene var. **stricta** (Torr.) Scribn.

Sin.: *Distichlis araucana* Phil., *Distichlis prostrata* (Kunth) E. Desv., *Distichlis spicata* (L.) Greene var. *stricta* (Torr.) Beetle, hom. illeg., *Distichlis stricta* (Torr.) Rydb., *Distichlis tenuifolia* Phil., *Distichlis viridis* Phil., *Poa prostrata* Kunth, *Uniola stricta* Torr.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SCR, SFE). CHL(ANT).

Echinochloa P. Beauv., nom. cons.

Echinochloa chacoensis Michael ex Renvoize

Hierba. Nativa. 400-500 m.

Países: ARG(JUJ, SFE).

Echinochloa colona (L.) Link

Sin.: *Echinochloa colona* (L.) Link f. *zonalis* (Guss.) Wiegand, *Oplismenus colonus* (L.) Kunth, *Oplismenus muticus* Phil., *Panicum colonum* L. f. *maculatum* Arechav., *Panicum colonum* L.

Hierba. Cosmopolita. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PHA). URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SOR).

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. **crus-galli**

Sin.: *Panicum crus-galli* L.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CEN, COA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, FLA, MON, RIV, ROC, SAO, SOR).

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. **mitis** (Pursh) Peterm.

Sin.: *Panicum crus-galli* L. var. *mite* Pursh

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MON).

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. **zelayensis** (Kunth) Hitchc.

Sin.: *Oplismenus zelayensis* Kunth

Hierba. Introducida. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, JUJ, SAL). BRA (RGS). CHL(MAU).

Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schult.

Sin.: *Echinochloa crus-galli* (L.) P.

Beauv. var. *crus-pavonis* (Kunth) Hitchc., *Oplismenus crus-pavonis* Kunth, *Panicum crus-galli* L. var. *sabulicola* (Nees) Trin.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME). PRY(APY, APA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Echinochloa helodes (Hack.) Parodi
Sin.: *Panicum helodes* (Hack.) Hauman,
Panicum spectabile Nees ex Trin. var.
gracile Kuntze ex Hicken, nom. nud.,
Panicum spectabile Nees ex Trin. var.
helodes Hack., *Pseudechinoaena helodes*
(Hack.) Herter

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE,
ERI, FOR, SFE). PRY(APY). BRA(RGS).
URY(ART, CAS, COL, LAV, MAL, MON,
RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).

Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch
Sin.: *Panicum crus-galli* L. var.
grandiflorum Döll, *Panicum oryzoides* Ard.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(COA).

Echinochloa polystachya (Kunth)
Hitchc. var. **polystachya**
Sin.: *Oplismenus polystachyus* Kunth
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(PHA). URY(COL, MON).

Echinochloa polystachya (Kunth)
Hitchc. var. **spectabilis** (Nees) Mart.
Crov.
Sin.: *Echinochloa spectabilis* (Nees)
Link, *Panicum spectabile* Nees ex Trin.,
Pseudechinoaena spectabilis (Nees ex
Trin.) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI,
FOR, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(CEN,
ÑEE, PHA). URY(CAS, MON).

Echinolaena Desv.

Echinolaena inflexa (Poir.) Chase
Sin.: *Cenchrus inflexus* Poir.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Ehrharta Thunb., nom. cons.

Ehrharta longiflora Sm.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(VAL).

Ehrharta stipoides Labill.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(IPA).

Ehrharta villosa Schult. & Schult. f.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Eleusine Gaertn.

Eleusine indica (L.) Gaertn.
Sin.: *Cynosurus indicus* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS,
SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(IPA). PRY(AMA, CAA, CEN,
GUA). URY(MON, PAY, RNO, TAC).

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.
Sin.: *Cynosurus tristachyos* Lam.,
Eleusine indica (L.) Gaertn. var.
condensata Döll, *Eleusine oligostachya*
Link, *Eleusine tristachya* (Lam.) Kunth,
comb. superfl.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI,
MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT,
ATA, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
RME, JFE). PRY(CEN, MIE, ÑEE, PAI).
URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA,
MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO,
SJO, SOR).

Elionurus Humb. & Bonpl. ex
Willd., nom. cons.

Elionurus ciliaris Kunth
Sin.: *Elionurus tripsacoides* Humb. &
Bonpl. ex Willd. var. *ciliaris* (Kunth)
Hack.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: PRY(PHA).

Elionurus lividus Hack.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CAN, CEN, COA, SPE).

Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze
Sin.: *Anatherum megapotamicum*
Spreng., *Andropogon adustus* Trin.,
Andropogon candidus Trin., *Andropogon*
dubius Kunth, nom. superfl., *Andropogon*
latiflorus Nees ex Steud., *Andropogon*
megapotamicus Spreng., *Andropogon*
rostratus (Nees) Trin., *Elionurus*
adustus (Trin.) Ekman, *Elionurus*
adustus (Trin.) Ekman var. *calvescens*
(Hack.) Hicken, *Elionurus candidus*
(Trin.) Hack., *Elionurus candidus* (Trin.)

Hack. var. *bisetosus* Hack. & Lindm.,
Elionurus candidus (Trin.) Hack. var.
latiflorus (Nees ex Steud.) Roberty,
Elionurus latiflorus (Nees ex Steud.)
Hack., *Elionurus latiflorus* (Nees ex
Steud.) Hack. var. *adustus* (Trin.) Hack.,
Elionurus latiflorus (Nees ex Steud.)
Hack. var. *calvescens* Hack., *Elionurus*
latiflorus (Nees ex Steud.) Hack. var.
gracilescens Hack., *Elionurus latiflorus*
(Nees ex Steud.) Hack. var. *pectinatus*
Hack., *Elionurus megapotamicum*
(Spreng.) Herter, *Elionurus muticus*
(Spreng.) Kuntze var. *gracilescens*
(Hack.) Hack. ex Kuntze, *Elionurus*
planifolius Renvoize, *Elionurus rostratus*
Nees, *Elionurus viridulus* Hack., *Lycurus*
muticus Spreng.

Hierba. Nativa. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE,
SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, APA, PHA). URY(ART, CLA,
FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV,
SAO, SJO, SOR).

Elionurus tripsacoides Humb. &
Bonpl. ex Willd.

Sin.: *Andropogon tripsacoides* (Humb.
& Bonpl. ex Willd.) Steud., *Elionurus*
muticus (Spreng.) Kuntze var. *calvescens*
(Hack.) Hack. ex Kuntze, *Elionurus*
tripsacoides Humb. & Bonpl. ex Willd.
var. *brevidentatus* Hack., *Elionurus*
tripsacoides Humb. & Bonpl. ex Willd.
var. *subcandidus* Kuntze
Hierba. Nativa. 400-2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(AMA).

Elymus L., nom. cons.

Elymus angulatus J. Presl
Sin.: *Agropyron brevistaratum* Hitchc.,
Elymus agropyroides J. Presl, *Elymus*
agropyroides J. Presl var. *brevimucronatus*
Hauman, *Elymus albowianus* Kurtz,
Elymus andinus Poepp. ex Trin.,
Elymus antarcticus Hook. f., *Elymus*
antarcticus Hook. f. var. *fulvescens* Kurtz,
Elymus asper Nees ex Steud., *Elymus*
brevistaratus (Hitchc.) A. Löve, nom.
illeg., *Elymus chonoticus* Phil., *Elymus*
chubutensis Speg., *Elymus corralensis*
Phil., *Elymus gayanus* E. Desv., *Elymus*
gracilis Phil., *Elymus hitchcockii*
Davidse, *Elymus latiglumis* Phil., *Elymus*
leptostachyus Speg., *Elymus muticus* Phil.,
Elymus oreophilus Phil., *Elymus palenae*
Phil., *Elymus papsanus* Phil., *Elymus*

pratensis Phil., *Elymus rigescens* Poepp. ex Trin., *Elymus uniflorus* Phil., *Elymus vaginatus* Phil., *Elymus valdiviae* Steud., nom. inval., *Elytrigia antarctica* (Parodi) Covas, comb. illeg., *Elytrigia breviaristata* (Hitchc.) Covas ex J. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia breviaristata* (Hitchc.) Covas, nom. illeg., *Hordeum valdiviae* (Steud.) Schenck, comb. illeg.

Hierba. Nativa. 0-4400 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Elymus x lineariglumis Seberg & G. Petersen

Sin.: *Agropyron elymoides* Hack., *Cockaynea elymoides* (Hack.) Zotov

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(MEN, TDF).

Elymus magellanicus (E. Desv.) A. Löve

Sin.: *Agropyron antarcticum* Parodi, *Agropyron araucanum* (Parodi) Nicora, *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult. var. *araucanum* Parodi, *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult. var. *ruizianum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz f. *submutica* Kurtz, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *brachyatherum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *chaetophorum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *patagonicum* (Speg.) Hauman & Vanderveken, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *patagonicum* (Speg.) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *polystachyum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Macloskie, comb. illeg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *festuoides* (Speg.) Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *festuoides* (Speg.) Macloskie, comb. illeg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *glabrialva* (Speg.) Hauman & Vanderveken, comb. superfl., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *glabrialva* (Speg.) Macloskie & Dusén, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *lasiopodum* (Speg.) Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *lasiopodum* (Speg.) Macloskie, comb. illeg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var.

pubiflorum (Steud.) Speg. ex Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *secundum* (J. Presl) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi, *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi var. *australe* Parodi, *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi var. *festuoides* (Speg.) Parodi, *Agropyron patagonicum* (Speg.) Parodi var. *macrochaetum* (Parodi) Nicora, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *aristatum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *fragile* Parodi, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *megastachyum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *microstachyum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *tridentatum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy var. *trifidum* P. Candargy, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) Parodi, comb. superfl., *Agropyron remotiflorum* Parodi, *Agropyron remotiflorum* Parodi var. *macrochaetum* Parodi, *Agropyron secundum* J. Presl, *Elymus araucanus* (Parodi) A. Löve, *Elymus fuegianus* (Speg.) A. Löve, *Elymus glaucescens* Seberg, *Elymus notius* A. Löve, *Elymus remotiflorus* (Parodi) A. Löve, *Elytrigia araucana* (Parodi) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia fuegiana* (Speg.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia fuegiana* (Speg.) Covas, comb. illeg., *Elytrigia magellanica* (Desv.) Covas, comb. illeg., *Elytrigia patagonica* (Parodi) Covas, comb. illeg., *Elytrigia patagonica* (Speg.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia pubiflora* (Steud.) Tzvelev, *Triticum fuegianum* Speg. var. *patagonicum* Speg., *Triticum fuegianum* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *festuoides* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *glabrialva* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *lasiopoda* Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *patagonica* (Speg.) De Wild., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *pubiflorum* (Steud.) Speg., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *secundum* (J. Presl) Speg., *Triticum pubiflorum* Steud., *Triticum repens* L. var. *magellanicum* E. Desv., *Triticum secundum* (J. Presl) Kunth

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, SJU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

Elymus mendocinus (Parodi) A. Löve

Sin.: *Agropyron mendocinum* Parodi, *Elytrigia mendocina* (Parodi) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia mendocina* (Parodi) Covas, comb. illeg., *Leymus mendocinus* (Parodi) Dubcovsky
Hierba. Endémica. 1600-2700 m.
Países: ARG(MEN).

Elymus patagonicus Speg.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Elymus scabrifolius (Döll) J.H. Hunz.

Sin.: *Agropyron attenuatum* (Kunth) Roem. & Schult. var. *platense* Parodi, *Agropyron condensatum* J. Presl, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *condensatum* (J. Presl) Hauman & Vanderveken, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *condensatum* (J. Presl) Macloskie, nom. illeg., *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var. *scabrifolium* (Döll) Arechav., *Agropyron scabrifolium* (Döll) Parodi, *Elymus breviaristatus* (Hitchc.) A. Löve subsp. *scabrifolius* (Döll) A. Löve, *Elymus parodii* Seberg & G. Petersen, *Elytrigia scabrifolia* (Döll) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia scabrifolia* (Döll) Covas, comb. illeg., *Triticum condensatum* (J. Presl) Kunth, *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *condensata* (J. Presl) Speg., *Triticum repens* L. var. *scabrifolium* Döll
Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, NEU, RNE, SFE, TUC). URY(CAS, COL, MON, PAY, SJO, SOR).

Elymus scabriglumis (Hack.) A. Löve

Sin.: *Agropyron agroelymoides* (Hicken) J.H. Hunz., *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. var. *scabriglume* Hack., *Agropyron scabriglume* (Hack.) Parodi, *Agropyron tilcarensis* J.H. Hunz., *Elymus antarcticus* Hook. f. f. *agroelymoides* Hicken, *Elymus tilcarensis* (J.H. Hunz.) A. Löve, *Elytrigia scabriglumis* (Hack.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia scabriglumis* (Parodi) Covas, comb. illeg., *Elytrigia tilcarensis* (J.H. Hunz.) Covas ex J.H. Hunz. & Xifreda, *Elytrigia tilcarensis* (J.H. Hunz.) Covas, comb. illeg.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, TUC). CHL(ANT, LLA, AIS, MAG).

Elytrigia Desv.**Elytrigia repens** (L.) Nevski

Sin.: *Agropyron repens* (L.) P. Beauv.
var. *maritimum* (Koch & Ziz) Hack.,
Agropyron repens (L.) P. Beauv.,
Agropyron repens (L.) P. Beauv. var.
vulgare Doll, *Agropyron subulatum*
(Scherb. ex Schweigg. & Körte) Herter,
nom. illeg., *Elymus repens* (L.) Gould,
Triticum repens L., *Triticum repens* L. var.
subulatum Nees

Hierba. Introducida. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI,
NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). CHL(ARA,
LRI, LLA, MAG, RME).

Enneapogon Desv. ex P. Beauv.**Enneapogon desvauxii** P. Beauv.

Sin.: *Enneapogon desvauxii* P. Beauv. ex
Desv., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 900-3400 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,
MEN, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP,
TAR, ANT).

Eragrostis Wolf**Eragrostis acutiglumis** Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).
URY(ART, DUR, FLO, FLA, PAY, RNO,
SOR, TAC).

Eragrostis airoides Nees

Sin.: *Agrosticula brasiliensis* (Raddi)
Herter, *Aira brasiliensis* Raddi, *Airopsis*
millegrana Griseb., *Eragrostis triflora*
Ekman, *Poa airoides* (Nees) Kunth, hom.
illeg., *Sporobolus brasiliensis* (Raddi) Hack.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL,
SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CEN, GUA, MIE,
PAI, PHA, SPE). URY(ART, DUR, FLA,
LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO,
SJO, SOR, TAC).

Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn.
ex Nees

Sin.: *Eragrostis ciliaris* (L.) R. Br.
var. *patens* Chapm. ex Beal, *Eragrostis*
plumosa (Retz.) Link, *Eragrostis tenella*
(L.) Roem. & Schult., *Poa amabilis* L., *Poa*
tenella L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CEN, COA, SPE).

Eragrostis andicola R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 2000-3700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Eragrostis articulata (Schrank) Nees

Sin.: *Eragrostis articulata* (Schrank)
Nees var. *eglandulosa* Nicora, *Eragrostis*
articulata (Schrank) Nees var. *glabrescens*
Henrard, *Eragrostis articulata* (Schrank)
Nees var. *pauciflora* Döll, *Eragrostis*
glareosa Trin., *Eragrostis neesii* Trin. var.
laxa Jedwabn., *Eragrostis pilosissima*
Link, *Eragrostis villosa* Salzmann. ex Steud.,
Poa articulata Schrank

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COR, COS, FOR, JUJ,
LRI, MIS, SAL, SDE). BRA(PAR, RGS).
PRY(APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, COA,
GUA, SPE).

Eragrostis atrovirens (Desf.) Steud.

Hierba. Introducida.

Países: CHL(IPA).

Eragrostis attenuata Hitchc.

Sin.: *Sporobolus scaber* Phil.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult.

Sin.: *Eragrostis bahiensis* Schrad. ex
Schult. f. *riparia* Burkart, *Eragrostis*
bahiensis Schrad. ex Schult. var.
contracta Döll, *Eragrostis bahiensis*
Schrad. ex Schult. var. *laxiuscula* Döll,
Eragrostis blepharophylla Jedwabn.,
Eragrostis expansa Link, *Eragrostis*
firma Trin., *Eragrostis macra* Jedwabn.,
Eragrostis microstachya (Link) Link,
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. var.
bahiensis (Schrad. ex Schult.) Kuntze,
Eragrostis psammodes Trin., *Eragrostis*
psammodes Trin. var. *microstachya*
(Link) Döll, *Poa expansa* (Link) Kunth,
Poa microstachya Link, *Poa psammodes*
(Trin.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI,
PHA, SPE). URY(ART, CAS, CLA, DUR,
FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO,
RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Eragrostis barrelieri Daveau

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE,
JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC).
URY(CAS, MAL, MON).

Eragrostis cataclasta Nicora

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA,
COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RNO,
ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Eragrostis chiquitaniensis Killeen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo
ex Janch.

Sin.: *Briza eragrostis* L., *Eragrostis*
argentina Jedwabn., *Eragrostis cilianensis*
(All.) E.T. Hubb., hom. illeg., *Eragrostis*
major Host, *Eragrostis megastachya*
(Koeler) Link, *Eragrostis megastachya*
(Koeler) Link f. *nana* Lorentz & Niederl.,
Eragrostis megastachya (Koeler) Link
var. *cilianensis* (All.) Asch. & Graebn.,
Eragrostis multiflora Trin. var. *cilianensis*
(All.) Maire, *Erosion cilianensis*
(All.) Lunell, *Poa cilianensis* All., *Poa*
megastachya Koeler

Hierba. Introducida. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,
LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE,
SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA).
PRY(APY). URY(CLA, COL, MON, PAY,
RNO, SAO).

Eragrostis ciliaris (L.) R. Br.

Sin.: *Cynodon ciliaris* (L.) Raspail,
Eragrostis ciliaris (L.) Nees, comb. illeg.,
Macrolepharus contractus Phil., *Megastachya*
ciliaris (L.) P. Beauv., *Poa ciliaris* L.

Hierba. Introducida. 0-1600 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CEN).

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

Sin.: *Eragrostis chloromelas* Steud.,
Eragrostis filiformis (Thunb.) Nees, nom.
illeg., *Poa curvula* Schrad.

Hierba. Introducida. 0-2900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE,
SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(BIO, MAG). URY(COL, FLA,
SOR, TAC).

Eragrostis hackelii Hassl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, COA).

Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton,
Stern & Poggenb.

Sin.: *Eragrostis reptans* (Michx.) Nees
var. *pygmaea* Döll, *Erosion hypnoides*

(Lam.) Lunell, *Megastachya gounii* E. Fourn., *Megastachya hypnoides* (Lam.) P. Beauv., *Neeragrostis hypnoides* (Lam.) Bush, *Poa carinata* Poir., *Poa hypnoides* Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, PHA). URY(ART, CAS, PAY, ROC, SAO, SOR, TAC).

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.

Sin.: *Airopsis jubata* Griseb., *Diandrochloa glomerata* (Walter) Burkart, *Diandrochloa japonica* (Thunb.) A.N. Henry, *Eragrostis elegans* Nees, *Eragrostis glomerata* (Walter) L.H. Dewey, *Eragrostis interrupta* (Lam.) Döll, *Eragrostis tenella* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. var. *japonica* (Thunb.) Roem. & Schult., *Megastachya glomerata* (Walter) Schult., *Poa glomerata* Walter, *Poa japonica* Thunb., *Roshevitzia japonica* (Thunb.) Tzvelev

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, APA, CON, ÑEE, SPE). URY(ART, PAY, RNO, SAO).

Eragrostis kuschelii Skottsbl.

Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(IDE).

Eragrostis lehmanniana Nees

Hierba. Introducida. 500-800 m.
Países: ARG(MEN).

Eragrostis leucosticta Nees ex Döll

Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU).

Eragrostis lugens Nees

Sin.: *Eragrostis flaccida* Lindm., *Eragrostis lugens* Nees f. *pallida* Hack., *Eragrostis lugens* Nees subsp. *flaccida* (Lindm.) Hack., *Eragrostis lugens* Nees var. *glabrata* Döll, *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *lugens* (Nees) Griseb., *Poa lugens* (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Eragrostis macrothyrsa Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (SCA). PRY(AMA, CEN, CON).

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. **mexicana**

Sin.: *Eragrostis neomexicana* Vasey ex L.H. Dewey, *Eragrostis nigricans* (Kunth) Steud. var. *punensis* Nicora, *Poa chilensis* Moris, hom. illeg., *Poa mexicana* Hornem.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(AYP, TAR, ANT). URY(FLA, MON, RNO, SJO, TYT).

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. **virescens** (J. Presl) S.D. Koch & Sanchéz Vega

Sin.: *Eragrostis cordobensis* Jedwabn., *Eragrostis rahmeri* Phil., *Eragrostis virescens* J. Presl, *Eragrostis scabra* Phil., *Poa virescens* (J. Presl) Kunth, *Eragrostis leptantha* Trin., *Poa leptantha* (Trin.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(APY, CAU, CEN, ÑEE). URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SOR).

Eragrostis minor Host

Sin.: *Eragrostis eragrostis* (L.) P. Beauv., nom. inval., *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *minor* (Host) Kuntze, *Eragrostis poiformis* Link, nom. illeg., *Eragrostis poaeoides* P. Beauv. ex Roem. & Schult., nom. superfl., *Eragrostis poaeoides* P. Beauv., nom. nud., *Poa eragrostis* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI). BRA(SCA). URY(MON).

Eragrostis neesii Trin. var. **expansiflora** Nicora

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, MIS, SFE). PRY(GUA).

Eragrostis neesii Trin. var. **lindmanii** (Hack.) Ekman

Sin.: *Eragrostis lindmanii* Hack.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, MIE, PAI). URY(CLA, COL, FLA, PAY, RIV, SAO).

Eragrostis neesii Trin. var. **neesii**

Sin.: *Poa neesii* (Trin.) Kunth
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA, ITA, PAI). URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud.

Sin.: *Eragrostis nigricans* (Kunth) Steud. var. *tristis* (Jedwabn.) Pilg., *Eragrostis subatra* Jedwabn., *Eragrostis tristis* Jedwabn., *Megastachya nigricans* (Kunth) Roem. & Schult., *Poa nigricans* Kunth
Hierba. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Eragrostis orthoclada Hack.

Sin.: *Eragrostis longipila* Hack., *Eragrostis villamontana* Jedwabn.
Hierba. Nativa. 300-1200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PAI, PHA).

Eragrostis paniciformis (A. Braun) Steud.

Sin.: *Poa paniciformis* A. Braun
Hierba. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Eragrostis pastoensis (Kunth) Trin.

Sin.: *Eragrostis buchtienii* Hack., *Eragrostis montufari* (Kunth) Steud., *Eragrostis virescens* J. Presl f. *major* Hack., *Eragrostis virescens* J. Presl var. *trichophylla* (Benth.) Hack., *Megastachya montufari* (Kunth) Roem. & Schult., *Megastachya pastoensis* (Kunth) Roem. & Schult., *Poa montufari* Kunth, *Poa pastoensis* Kunth
Hierba. Nativa. 1400-3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(PAI).

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees var. **miserrima** (E. Fourn.) Reeder

Sin.: *Eragrostis purshii* Schrad. ex A. Gray var. *miserrima* E. Fourn., *Eragrostis tephrosanthos* Schult.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, DFE, ERI).

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees var. **pectinacea**

Sin.: *Eragrostis diffusa* Buckley, *Eragrostis pectinacea* (Michx.) Steud., hom. illeg., *Poa pectinacea* Michx.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, LPA). BRA(Fuera del área del proyecto). URY(CAS).

Eragrostis perennis Döll

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS). URY(PAY, RIV).

Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin.

Sin.: *Eragrostis deserticola* Phil., *Poa peruviana* Jacq.

Hierba. Nativa. 300-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, IDE).

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.

Sin.: *Eragrostis damiensiana* (Bonnet) Thell., *Eragrostis damiensiana* (Bonnet) Thell. var. *condensata* (Hack.) Thell., *Eragrostis gracilis* Schrad., *Eragrostis multicaulis* Steud., *Eragrostis peregrina* Wiegand, *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. subsp. *damiensiana* (Bonnet) Thell., *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *condensata* Hack., *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. var. *damiensiana* Bonnet, *Eragrostis verticillata* (Cav.) P. Beauv., *Poa pilosa* L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, MAU, BIO, MAG, RME). PRY(APA, COA). URY(ART, CAS, CLA, FLO, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Eragrostis plana Nees

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA).

Eragrostis polytricha Nees

Sin.: *Eragrostis floridana* Hitchc., *Eragrostis fragilis* Swallen, *Eragrostis lugens* Nees var. *villosa* Döll, *Eragrostis polytricha* Nees var. *glabrior* Döll, *Eragrostis polytricha* Nees var. *hirsutior* Döll, *Eragrostis trichocolea* Hack. & Arechav. var. *floridana* (Hitchc.) Withersp., *Poa conceptionis* Steud., *Poa polytricha* (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE,

TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(AMA, CAN, CON, MIE, PAI). URY(CLA, FLA, LAV, MAL, RNO, RIV, SJO, TAC, TYT).

Eragrostis purpurascens (Spreng.)

Schult.

Sin.: *Eragrostis megapotamica* (Spreng.) Schult., *Poa purpurascens* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CON). URY(ART, CAS, CLA, MAL, MON, RIV, ROC, TAC).

Eragrostis pycnantha (Phil.) Parodi ex Nicora

Sin.: *Poa pycnantha* Phil.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA).

Eragrostis retinens Hack. & Arechav.

Sin.: *Eragrostis retinens* Hack. &

Arechav. var. *pergaminiensis* Parodi

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SFE, SLU). BRA(RGS). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR, TAC).

Eragrostis rojasii Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU).

Eragrostis rufescens Schult.

Sin.: *Eragrostis acicularis* Trin., *Eragrostis affinis* Salzm. ex Steud., *Eragrostis cuspidata* (Schult.) Link, *Eragrostis multipes* S. Moore, *Eragrostis polyneura* Jedwabn.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Eragrostis seminuda Trin.

Sin.: *Eragrostis barbiglumis* Jedwabn., *Eragrostis seminuda* Trin. var. *hirta* Döll, *Eragrostis seminuda* Trin. var. *pilosissima* Döll, *Poa seminuda* (Trin.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(MIE).

Eragrostis solida Nees

Sin.: *Eragrostis eucampta* Pilg. *Eragrostis mattogrossensis* Pilg. f. *glabrescens* Pilg., *Eragrostis mattogrossensis* Pilg., *Eragrostis rufescens* Schult. var. *spiciramea* Döll, *Eragrostis solida* Nees var. *mattogrossensis* (Pilg.) Pilg., *Poa solida* (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Eragrostis spicata Vasey

Sin.: *Sporobolus tenuispica* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, ERI, FOR, SAL, SFE). PRY(APY).

Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter

Sin.: *Eragrostis abyssinica* (Jacq.) Link, *Poa tef* Zuccagni

Hierba. Introducida. 1200-1300 m.

Países: ARG(MEN, SLU). BRA(Fuera del área del proyecto).

Eragrostis tenuifolia (A. Rich.)

Hochst. ex Steud.

Sin.: *Poa tenuifolia* A. Rich.

Hierba. Introducida. 0-3500 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).

Eragrostis triangularis Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, APA, CAU).

Eragrostis trichocolea Hack. &

Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, ITA). URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).

Eragrostis weberbaueri Pilg.

Hierba. Nativa. 2300-3700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Eremium Seberg & Linde-Laursen**Eremium erianthum** (Phil.) Seberg & Linde-Laursen

Sin.: *Cryptochloris spathacea* Speg., nom. nud., *Elymus barbatus* Kurtz, nom. nud., *Elymus erianthus* Phil., *Elymus erianthus* Phil. var. *aristatus* Hicken, *Elymus erianthus* Phil. var. *spgazzinii* Kurtz ex Hauman, *Elymus spegazzinii* Kurtz, nom. nud., *Leymus erianthus* (Phil.) Dubcovsky

Hierba. Endémica. 1800-3400 m.

Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL).

Eriochloa Kunth**Eriochloa acuminata** (J. Presl) Kunth

Sin.: *Eriochloa gracilis* (E. Fourn.)
Hitchc., *Helopus gracilis* E. Fourn.,
Piptatherum acuminatum J. Presl
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR).

Eriochloa distachya Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Eriochloa grandiflora (Trin.) Benth.

Sin.: *Helopus grandiflorus* Trin.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAU, CON).

Eriochloa montevidensis Griseb.

Sin.: *Eriochloa montevidensis* Griseb.
f. *subcolorata* Hack., *Eriochloa punctata*
(L.) Desv. ex Ham. var. *montevidensis*
(Griseb.) Herter, *Helopus annulatus*
(Flüggé) Nees var. *montevidensis* Döll,
nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC).
BRA(RGS). CHL(AYP, TAR). PRY(APY,
CEN, PHA). URY(Desconocida).

Eriochloa nana Arriaga

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS, FOR).

Eriochloa polystachya Kunth

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Eriochloa pseudoacrotricha (Stapf ex

Thell.) J.M. Black

Sin.: *Eriochloa ramosa* (Retz.) Kuntze
var. *pseudoacrotricha* Stapf ex Thell.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(CHA, LRI, SAL, SLU).

Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham.

Sin.: *Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex
Ham. f. *intermedia* Parodi, *Eriochloa*
punctata (L.) Desv. ex Ham. var. *parodii*
Herter, *Milium punctatum* L.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS,
SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR,
RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, ÑEE,
PAI, PHA). URY(ART).

Eriochloa tridentata (Trin.) Kuhlmann

Sin.: *Paspalum tridentatum* Trin.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI,
FOR, SFE, SDE).

Eriochrysis P. Beauv.**Eriochrysis cayennensis** P. Beauv.

Sin.: *Eriochrysis glabrifolia* Swallen,
Saccharum cayennense (P. Beauv.) Benth.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN).
URY(DUR, RIV, TAC).

Eriochrysis filiformis (Hack.) Filg.

Sin.: *Andropogon filiforme* Hack. ex A.
Camus, nom. illeg., *Saccharum filiforme*
Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

Eriochrysis holcooides (Nees) Kuhlmann

Sin.: *Anatherum holcooides* Nees,
Saccharum holcooides (Nees) Hack.,
Saccharum holcooides (Nees) Hack. var.
brevipilum Hack., *Saccharum holcooides*
(Nees) Hack. var. *penicillare* Hack.
Hierba. Nativa. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAN, COA, GUA).

Eriochrysis laxa Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA).

Eriochrysis villosa Swallen

Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Erioneuron Nash**Erioneuron avenaceum** (Kunth)

Tateoka var. **kurtzianum** (Parodi)
Anton
Sin.: *Dasyochloa kurtziana* (Parodi)
Caro, *Tridens avenacea* (Kunth) Hitchc.
var. *kurtziana* Parodi
Hierba. Endémica. 1000-1800 m.
Países: ARG(LPA, SAL, SJU).

Erioneuron avenaceum (Kunth)

Tateoka var. **longiglume** (Parodi)
Anton
Sin.: *Dasyochloa longiglumis* (Parodi)
Caro, *Dasyochloa longiglumis* (Parodi)

Caro var. *cabrerarum* Caro, *Erioneuron*
avenaceum (Kunth) Tateoka var. *cabrerarum*
(Caro) E.A. Sánchez, *Tridens avenacea*
(Kunth) Hitchc. var. *longiglumis* Parodi
Hierba. Endémica. 1800-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, TUC).

Erioneuron avenaceum (Kunth)

Tateoka var. **pygmaeum** (Hack.) Anton
Sin.: *Dasyochloa pygmaea* (Hack.) Caro,
Tridens avenacea (Kunth) Hitchc. var.
pygmaea (Hack.) Parodi, *Triodia avenacea*
Kunth var. *pygmaea* Hack.
Hierba. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Erioneuron pilosum (Buckley) Nash

var. **longiaristatum** (Kurtz) Anton
Sin.: *Dasyochloa argentina* (Kuntze)
Caro, *Dasyochloa argentina* (Kuntze)
Caro var. *aristiglumis* Caro, *Dasyochloa*
argentina (Kuntze) Caro var. *parodiana*
(E.A. Sánchez) Caro, *Erioneuron pilosum*
(Buckley) Nash var. *argentinum* (Kuntze)
Nicora, *Erioneuron pilosum* (Buckley)
Nash var. *aristiglumis* (Caro) E.A.
Sánchez, *Erioneuron pilosum* (Buckley)
Nash var. *parodianum* E.A. Sánchez,
Sieglingia argentina Kuntze, *Tridens*
pilosus (Buckley) Hitchc. var. *argentina*
(Kuntze) Parodi, *Triodia argentina*
(Kuntze) K. Schum., *Triodia avenacea*
Kunth var. *longearistata* Kurtz
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(COR, LPA, LRI, MEN,
RNE, SDE, SJU, SLU).

Erioneuron pilosum (Buckley) Nash

var. **mendocinum** (Parodi) Nicora
Sin.: *Tridens pilosus* (Buckley) Hitchc.
var. *mendocina* Parodi
Hierba. Endémica.
Países: ARG(LPA, MEN).

Eustachys Desv.**Eustachys bahiensis** (Steud.) Herter

var. **robusta** A.M. Molina
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Eustachys brevipila (Roseng. & Izag.)

Caro & E.A. Sánchez
Sin.: *Chloris brevipila* Roseng. & Izag.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).
URY(FLA, MAL, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

Eustachys calvescens (Hack.) Caro & E.A. Sánchez
 Sin.: *Chloris calvescens* Hack.
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
 PRY(AMA, CAU, CON, COA, PAI, SPE).
 URY(CLA, RIV, TAC).

Eustachys distichophylla (Lag.) Nees
 Sin.: *Chloris confertifolia* Trin., *Chloris distichophylla* Lag. var. *acuminata* (Trin.) Hack., *Chloris distichophylla* Lag. var. *argentina* Hack., *Chloris distichophylla* Lag.
 Hierba. Nativa. 0-1200 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI,). URY(PAY).

Eustachys paranensis A.M. Molina
 Hierba. Endémica. 0-800 m.
 Países: BRA(PAR).

Eustachys paspaloides (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **caribaea** (Spreng.) Nowack
 Sin.: *Chloris bahiensis* Steud., *Chloris bahiensis* Steud. f. *glabrescens* Hack., *Chloris capensis* (Houtt.) Thell. var. *bahiensis* (Steud.) Parodi, *Chloris capensis* (Houtt.) Thell. var. *glabrescens* (Hack.) Parodi, *Chloris caribaea* Spreng., *Chloris glabrescens* (Hack.) Roseng. & Izag., *Eustachys bahiensis* (Steud.) Herter, *Eustachys caribaea* (Spreng.) Her., *Eustachys glabrescens* (Hack.) Caro & E.A. Sánchez
 Hierba. Nativa. 0-400 m.
 Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CAU, PAI, SPE). URY(CAS, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Eustachys retusa (Lag.) Kunth
 Sin.: *Chloris argentina* (Hack.) Lillo & Parodi, *Chloris retusa* Lag., *Eustachys argentina* (Hack.) Herter, hom. illeg., *Eustachys argentinensis* (Hack.) Herter
 Hierba. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ITA). URY(CLA, COL, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, TAC).

Eustachys swalleniana A.M. Molina
 Hierba. Endémica. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, RGS). URY(CLA).

Eustachys uliginosa (Hack.) Herter
 Sin.: *Chloris dusenii* Ekman, *Chloris swartziana* Döll, *Chloris uliginosa* Hack.
 Hierba. Nativa. 100-1200 m.
 Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA, ITA, PAI). URY(CLA, FLO, SAO, SJO, TYT).

Festuca L.

Festuca acanthophylla E. Desv. var. **acanthophylla**
 Sin.: *Festuca acanthophylla* E. Desv. f. *vivipara* St.-Yves, nom. nud., *Festuca acuta* Phil., *Festuca barrazi* Muñoz, *Festuca berteroniana* Steud., *Festuca coiron* Steud., *Festuca desvauxii* Phil., *Festuca desvauxii* Phil. var. *ampla* St.-Yves, *Festuca neuquenensis* St.-Yves, nom. nud., *Festuca neuquenensis* St.-Yves var. *parodiana* St.-Yves, *Festuca robusta* Phil., hom. illeg., *Festuca thermarum* Phil., *Festuca tunicata* E. Desv.
 Hierba. Nativa. 900-3600 m.
 Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, SJU, SLU, TDF). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Festuca acanthophylla E. Desv. var. **scabriuscula** (Phil.) J.C. Ospina, Aliscioni & S.S. Denham
 Sin.: *Festuca asperata* Phil., *Festuca cabreriae* Parodi, *Festuca morenensis* Matthei, *Festuca neuquenensis* St.-Yves var. *aspera* St.-Yves, *Festuca pasqua* Phil., *Festuca robusta* Phil. var. *scabriuscula* (Phil.) St.-Yves, *Festuca scabriuscula* Phil., *Festuca steudelii* Phil.
 Hierba. Endémica. 700-2000 m.
 Países: ARG(NEU, RNE). CHL(ANT, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Festuca antucensis (Trin.) Steud.
 Sin.: *Festuca eriolepis* E. Desv., *Festuca eriolepis* E. Desv. var. *nana* Hieron., *Vulpia antucensis* Trin., *Vulpia australis* (Nees ex Steud.) C.H. Blom var. *nana* (Hieron.) Parodi, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) Henrard, comb. superfl., *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom f. *glabrata* C.H. Blom, *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom f. *nana* (Hieron.) C.H. Blom
 Hierba. Endémica. 0-2000 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Festuca argentina (Speg.) Parodi
 Sin.: *Festuca cavillieri* St.-Yves, *Poa argentina* Speg.
 Hierba. Endémica. 200-700 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS).

Festuca argentinensis (St.-Yves) Turpe
 Sin.: *Festuca scirpifolia* (J. Presl) Kunth var. *argentinensis* St.-Yves
 Hierba. Nativa. 1500-4500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Festuca arundinacea Schreb.
 Sin.: *Bromus arundinaceus* (Schreb.) Roth, *Festuca elatior* L., *Festuca elatior* L. subsp. *arundinacea* (Schreb.) Hack., *Festuca elatior* L. var. *arundinacea* (Schreb.) Roth, *Lolium arundinaceum* (Schreb.) Darbysh., *Schedonorus arundinaceus* (Schreb.) Dumort.
 Hierba. Introducida. 0-600 m.
 Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, NEU, RNE, SLU, TDF). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU, BIO, LLA, MAG, RME, JFE). URY(MON).

Festuca australis Nees ex Steud.
 Sin.: *Vulpia australis* (Nees ex Steud.) C.H. Blom
 Hierba. Endémica. 0-2300 m.
 Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, RNE, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SJO).

Festuca bromoides L.
 Sin.: *Bromus dertonensis* All., *Festuca dertonensis* (All.) Asch. & Graebn., *Festuca geniculata* Willd. var. *monandra* Döll, *Festuca sciuroides* Roth, *Vulpia bromoides* (L.) Gray, *Vulpia dertonensis* (All.) Gola, *Vulpia myurus* (L.) C.C. Gmel. var. *bromoides* (L.) Parl., *Vulpia sciuroides* (Roth) C.C. Gmel.
 Hierba. Introducida. 0-1500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TYT).

Festuca buchtienii Hack.

Sin.: *Festuca scirpifolia* (J. Presl) Kunth subsp. *buchtienii* (Hack.) St.-Yves
Hierba. Nativa. 2700-4600 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Festuca chrysophylla Phil.

Sin.: *Festuca deserticola* Phil. var. *chrysophylla* (Phil.) St.-Yves, *Festuca deserticola* Phil. var. *juncea* St.-Yves, *Festuca eriostoma* Hack., *Festuca juncea* Phil., hom. illeg., *Festuca oligantha* Phil. ex St.-Yves
Hierba. Nativa. 3500-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

Festuca cirrosa (Speg.) Parodi

Sin.: *Festuca erecta* d'Urv. var. *cirrosa* Speg., *Festuca longidiurna* Parodi
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(CHU, TDF). CHL(MAG).

Festuca contracta Kirk

Sin.: *Festuca erecta* d'Urv., hom. illeg., *Festuca paludicola* Roiv.
Hierba. Nativa. 200-1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Festuca dissitiflora Steud. ex Griseb.

Sin.: *Festuca castilloniana* Túrpe, *Festuca circinata* Griseb., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. subsp. *eudissitiflora* St.-Yves, nom. inval., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. subsp. *loricata* (Griseb.) St.-Yves, *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *euloricata* St.-Yves, nom. inval., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *loricata* Griseb., *Festuca dissitiflora* Steud. ex Griseb. var. *villipalea* St.-Yves, *Festuca erecta* d'Urv. var. *aristulata* Griseb., *Festuca loricata* (Griseb.) Pilg., *Festuca villipalea* (St.-Yves) E.B. Alexeev
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Festuca distichovaginata Pilg.

Sin.: *Festuca distichovaginata* Pilg. f. *angustiflora* St.-Yves
Hierba. Nativa. 3900-4800 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Festuca dolichophylla J. Presl

Sin.: *Diplachne scirpifolia* J. Presl, *Festuca lasiorrhachis* Pilg., *Festuca laeteviridis* Pilg. var. *lasiorrhachis* (Pilg.)

St.-Yves, *Festuca scirpifolia* (J. Presl)

Kunth
Hierba. Nativa. 3900-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

Festuca fiebrigii Pilg.

Hierba. Nativa. 2200-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Festuca fimbriata Nees

Sin.: *Festuca ampliflora* Döll
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, ITA, MIE). URY(CLA, MON, TAC).

Festuca floribunda (Pilg.) P.M.

Peterson, Soreng & Romasch.
Sin.: *Bromus mandonianus* Henrard, *Dielsiochloa floribunda* (Pilg.) Pilg., *Trisetum floribundum* Pilg.
Hierba. Nativa. 4200-5000 m.
Países: ARG(JUU, LRI). CHL(AYP, TAR, ANT).

Festuca giraldoi J.C. Ospina & P.I.

Picca
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(COR).

Festuca gracillima Hook. f. var.

glacialis Rúgolo & Nicora
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Festuca gracillima Hook. f. var.

gracillima
Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. var. *brevifolia* Speg., *Festuca gracillima* Hook. f. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(BIO, AIS, MAG).

Festuca hieronymi Hack.

Sin.: *Festuca erecta* d'Urv. var. *mutica* Griseb., *Festuca hieronymi* Hack. f. *panicula expansa* Hack., nom. inval., *Festuca hieronymi* Hack. var. *expansa* (St.-Yves) Túrpe, *Festuca hieronymii* Hack. f. *subvar. expansa* St.-Yves
Hierba. Nativa. 400-3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Festuca humilior Nees & Meyen

Sin.: *Festuca haenkei* Kunth var. *humilior* (Nees & Meyen) St.-Yves, *Festuca proxima* R.E. Fr., *Festuca*

scirpifolia (J. Presl) Kunth subsp.

buchtienii (Hack.) St.-Yves
Hierba. Nativa. 3000-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, SJU).

Festuca hypsophila Phil.

Sin.: *Festuca deserticola* Phil. var. *hypsophila* (Phil.) St.-Yves
Hierba. Nativa. 3200-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Festuca juncifolia St.-Amans

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(MAG).

Festuca kurtziana St.-Yves

Hierba. Endémica. 600-3000 m.
Países: ARG(CAT, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, MAU, RME).

Festuca lilloi Hack.

Sin.: *Festuca lilloi* Hack. var. *breviaristata* Túrpe, *Festuca setifolia* Steud. ex Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval., *Festuca setifolia* Steud. ex Griseb. var. *lilloi* (Hack.) St.-Yves, *Festuca tucumanica* E.B. Alexeev
Hierba. Nativa. 1800-4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Festuca linigluma J.C. Ospina,

Sylvester & M. Sylvester
Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Festuca magellanica Lam.

Sin.: *Festuca hystricola* (Hack.) E.B. Alexeev, *Festuca ovina* L. subsp. *hystricola* Hack., *Festuca ovina* L. var. *antarctica* Hack., *Festuca ovina* L. var. *magellanica* (Lam.) Hack., *Festuca ovina* L. var. *wilczekii* St.-Yves, *Festuca rubra* L. subsp. *corcovadensis* St.-Yves, *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *recurvata* Hook.
Hierba. Endémica. 0-3900 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Festuca magensiana Potztal

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(MAG).

Festuca megalura Nutt.

Sin.: *Festuca commutata* Steud., hom. illeg., *Vulpia megalura* (Nutt.) Rydb., *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. f. *megalura*

(Nutt.) Stace & R. Cotton, *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *hirsuta* Hack., *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *megalura* (Nutt.) Auquier

Hierba. Introducida. 0-3800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TUC). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(CLA, COL, CLA, FLO, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, SJO, TYT).

Festuca monticola Phil.

Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. var. *monticola* (Phil.) St.-Yves, *Festuca subandina* Phil., *Poa monticola* Phil., nom. nud.

Hierba. Endémica. 1000-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

Festuca muralis Kunth

Sin.: *Festuca myuros* L. var. *muralis* (Kunth) Speg., *Vulpia muralis* (Kunth) Nees, *Vulpia muralis* (Kunth) Henrard, comb. superfl.

Hierba. Introducida. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, RME, JFE).

Festuca myuros L.

Sin.: *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. f. *myuros*, *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *myuros*

Hierba. Introducida. 0-3400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE, IPA). URY(CLA, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO).

Festuca nardifolia Griseb.

Sin.: *Festuca calchaquiensis* Hack., *Festuca nardifolia* Griseb. var. *calchaquiensis* (Hack.) St.-Yves, *Festuca nardifolia* Griseb. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval.

Hierba. Endémica. 3200-4900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Festuca nemoralis Túrpe

Hierba. Nativa. 1700-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Festuca octoflora Walter

Sin.: *Vulpia antofagastensis* Parodi, *Vulpia octoflora* (Walter) Rydb.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU, SCR). CHL(AYP, ANT, COQ).

Festuca orthophylla Pilg.

Sin.: *Festuca orthophylla* Pilg. var. *boliviana* Pilg., *Festuca orthophylla* Pilg. var. *eristoma* (Hack.) St.-Yves, *Festuca orthophylla* Pilg. var. *glabrescens* Pilg.

Hierba. Nativa. 3000-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT, COQ, MAU).

Festuca ovina L. subsp. **tenuifolia**

(Sibth.) Celak.

Sin.: *Festuca filiformis* Pourr., *Festuca ovina* L. var. *tenuifolia* (Sibth.) Sm., *Festuca tenuifolia* Sibth.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Festuca pallescens (St.-Yves) Parodi

Sin.: *Festuca gracillima* Hook. f. f. *scabra* St.-Yves, *Festuca gracillima* Hook. f. var. *patagonica* Speg., *Festuca gracillima* Hook. f. var. *ramosa* St.-Yves, *Festuca magniflora* E.B. Alexeev, *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi var. *foliosa* Parodi, *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi var. *grandiflora* Parodi, *Festuca pallescens* (St.-Yves) Parodi var. *scabra* (St.-Yves) Parodi

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Festuca pampeana Speg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(BAI, SLU).

Festuca panda Swallen

Hierba. Endémica. 2900-3400 m.

Países: CHL(AYP, TAR, COQ).

Festuca parodiana (St.-Yves ex Parodi)

Nicora

Sin.: *Festuca subulata* Trin. var. *parodiana* St.-Yves ex Parodi

Hierba. Nativa. 2000-2900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SJU, TUC).

Festuca parodii St.-Yves

Hierba. Endémica. 2500-3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Festuca purpurascens Banks & Sol. ex Hook. f.

Sin.: *Festuca davilae* Phil., *Festuca dumetorum* Phil., hom. illeg., *Festuca glaucophylla* Phil., *Festuca insularis*

Staud., *Festuca laxiflora* Phil., hom. illeg., *Festuca lechleriana* Steud., *Festuca platyphylla* Steud., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. f. *aristata* St.-Yves, *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. f. *scabrisucula* St.-Yves, *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. f. *submutica* E. Desv., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. var. *aristata* E. Desv., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook. f. var. *genuina* St.-Yves, nom. inval., *Festuca serranoi* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Festuca pyrogea Speg.

Sin.: *Festuca ovina* L. var. *pyrogea* (Speg.) Hack., *Festuca pyrogea* Speg. var. *elata* Parodi

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

Festuca rigescens (J. Presl) Kunth

Sin.: *Festuca deserticola* Phil., *Festuca deserticola* Phil. var. *paupera* (Phil.) St.-Yves, *Festuca oligantha* Phil. ex St.-Yves, *Festuca paupera* Phil., *Festuca petersonii* Renvoize, *Festuca saltana* St.-Yves

Hierba. Nativa. 2900-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Festuca roigii Dubcovsky & Rúgolo

Hierba. Endémica. 1500-2800 m.

Países: ARG(MEN).

Festuca rubra L.

Sin.: *Festuca ovina* L. var. *rubra* (L.) Ten., *Festuca ovina* L. subsp. *rubra* (L.) Hook. f.

Hierba. Introducida. 0-3300 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, TDF). CHL(COQ, VAL, AIS, MAG, RME).

Festuca simpliciuscula (Hack.) E.B. Alexeev

Sin.: *Festuca rubra* L. var. *simpliciuscula* Hack.

Hierba. Endémica. 800-2300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).

Festuca subantarctica Parodi

Sin.: *Festuca commersonii* Franch., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Festuca superba Parodi ex Türpe
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUJ).

Festuca tectoria St.-Yves
Hierba. Nativa. 3300-4000 m.
Países: CHL(TAR).

Festuca ulochaeta Nees ex Steud.
Sin.: *Festuca leptothrix* Trin. ex Steud.,
nom. nud., *Festuca leptothrix* Trin. ex Döll
Hierba. Nativa. 400-1800 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Festuca uninodis Hack.
Sin.: *Festuca binodis* (Hack. ex St.-
Yves) Lillo, *Festuca stuckertii* St.-Yves,
Festuca uninodis Hack. f. *binodis* Hack. ex
St.-Yves
Hierba. Endémica. 3600-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Festuca ventanica Speng.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(BAI).

Festuca weberbaueri Pilg.
Hierba. Nativa. 2000-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN,
NEU, SAL, SJU).

Festuca werdermannii St.-Yves
Hierba. Endémica. 2800-4200 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Festuca yalaensis Joch.Müll. & Catalán
Hierba. Endémica. 2200 m.
Países: ARG(JUJ).

Gastridium P. Beauv.

Gastridium phleoides (Nees &
Meyen) C.E. Hubb.
Sin.: *Lachnagrostis phleoides* Nees &
Meyen
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(CHU). CHL(ATA, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
RME, JFE, IPA).

Gastridium ventricosum (Gouan)
Schinz & Thell.
Sin.: *Agrostis ventricosa* Gouan,
Gastridium lendigerum (L.) Desv.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(JFE, IPA).

Gaudinia P. Beauv.

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
Sin.: *Avena fragilis* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(MAL).

Glyceria R. Br., nom. cons.

Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Sin.: *Festuca fluitans* L.
Hierba. Introducida. 0-1700 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA, MAG).

Glyceria multiflora Steud.
Sin.: *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. var.
stricta Desv.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI,
NEU, RNE, SCR, SFE). BRA(RGS, SCA).
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG, RME). URY(MON, ROC).

Glyceria saltensis Sulekic & Rúgolo
Hierba. Endémica. 2900-3100 m.
Países: ARG(SAL).

Gouinia E. Fourn. ex Benth. &
Hook. f.

Gouinia brasiliensis (S. Moore)
Swallen
Sin.: *Pogochloa brasiliensis* S. Moore
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL).
BRA(Fuera del área del proyecto).

Gouinia latifolia (Griseb.) Vasey
Sin.: *Diplachne latifolia* (Griseb.)
Hack., *Sieglingia latifolia* (Griseb.)
Kuntze, *Tricusps latifolia* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU,
SFE, SDE, TUC). PRY(CAN, CON, PAI).

Gouinia paraguayensis (Kuntze)
Parodi var. **paraguayensis**
Sin.: *Arundinaria paraguayensis*
Kuntze, *Sieglingia paraguayensis* Kuntze,
Triodia paraguayensis (Kuntze) Hack.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI,
FOR, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE,
TUC). PRY(APY).

Gouinia paraguayensis (Kuntze)
Parodi var. **tortuosa** (Swallen) Türpe
Sin.: *Gouinia tortuosa* Swallen
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, LRI,
SAL, SJU, SDE). PRY(APY).

Guadua Kunth

Guadua angustifolia Kunth
Hierba. ubleñosa. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Guadua chacoensis (Rojas) Londoño &
P.M. Peterson
Sin.: *Bambusa chacoensis* Rojas Acosta,
Guadua angustifolia Kunth subsp.
chacoensis (Rojas) S.M. Young & Judd
Hierba subleñosa. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAA, CEN, GUA, SPE). URY(ART).

Guadua paniculata Munro
Sin.: *Bambusa munroi* Hack., *Bambusa*
paniculata (Munro) Hack.
Hierba subleñosa. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).

Guadua paraguayana Döll
Sin.: *Bambusa paraguayana* (Döll)
Bertonio
Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,
SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CEN, COA).

Guadua tagoara (Nees) Kunth
Sin.: *Arundarbor distorta* (Nees)
Kuntze, *Bambusa barbata* Trin., *Bambusa*
distorta Nees, *Bambusa spinosissima*
Hack., *Guadua distorta* (Nees) Rupr.,
Guadua glaziovii (Hack.) E.G. Camus,
Guadua spinosissima (Hack.) E.G. Camus
Hierba subleñosa. Nativa. 200-400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr.
Sin.: *Arundarbor trinii* (Nees) Kuntze,
Bambusa riograndensis Dutra, *Bambusa*
tacuara Arechav., *Bambusa tomentosa*
(Hack. & Lindm.) McClure, *Bambusa*
trinii Nees, *Chusquea heterophylla*
Griseb., hom. illeg., *Guadua ribbentropii*
Herter, *Guadua riograndensis* (Dutra)
Herter, *Guadua tomentosa* Hack. &
Lindm., *Guadua trinii* (Nees) Nees ex
Rupr. var. *scabra* Döll
Hierba subleñosa. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, SAO, TAC).

Guadua variegata Lizarazu
Hierba subleñosa. Endémica. 400-600 m.
Países: ARG(MIS).

Gymnopogon P. Beauv.

Gymnopogon burchellii (Munro ex Döll) Ekman
Sin.: *Gymnopogon muticus* Hack., nom. nud., *Leptochloa burchellii* Munro ex Döll
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Gymnopogon glaber Caro
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Gymnopogon grandiflorus Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Sin.: *Gymnopogon brevisetus* (Hack.) J.P. Sm., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *brevisetus* Hack.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(FLA, MAL).

Gymnopogon legrandii Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Sin.: *Gymnopogon biflorus* Pilg. var. *ciliatilemma* Burkart, *Gymnopogon swallenii* J.P. Smith
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS).
BRA(RGS, SCA). PRY(ÑEE). URY(CAS).

Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze
Sin.: *Gymnopogon biflorus* Pilg., *Gymnopogon filiformis* Griseb., *Gymnopogon laevis* Nees, *Gymnopogon laevis* Nees var. *pluriflorus* Döll, *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *pluriflorus* (Döll) Parodi, comb. superfl., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *pluriflorus* (Döll) Rojas, comb. superfl., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *pluriflorus* (Döll) Stuck., *Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze var. *typicum* Parodi, nom. inval., *Muhlenbergia spicata* (Spreng.) Kunth, *Polypogon spicatus* Spreng., *Trichochloa spicata* (Spreng.) Schult.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA). URY(DUR, MON).

Gymnopogon toldensis Sulekic & Rógolo
Hierba. Endémica. 1600 m.
Países: ARG(SAL).

Gynerium P. Beauv.

Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv.
Sin.: *Arundo festucacea* Willd., *Arundo sagittata* (Aubl.) Pers., *Saccharum sagittatum* Aubl.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, SCA). CHL(TAR). PRY(APA, CEN, COA, ITA).

Hackelochloa Kuntze

Hackelochloa granularis (L.) Kuntze
Sin.: *Cenchrus granularis* L., *Mnesithea granularis* (L.) de Koning & Sosef, *Rottboellia granularis* (L.) Roberty
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(SAL). PRY(AMA, CON, PAI).

Hainardia Greuter

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter
Sin.: *Lepturus cylindricus* (Willd.) Trin., *Lolium cylindricum* (Willd.) Asch. & Graebn., *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. & Durieu, *Rottboellia cylindrica* Willd.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).
CHL(VAL, BIO). URY(MON).

Hemarthria R. Br.

Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E. Hubb.
Sin.: *Manisuris altissima* (Poir.) Hitchc., *Rottboellia altissima* Poir., *Rottboellia compressa* L. f. var. *fasciculata*
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).

Heteropogon Pers.

Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.
Sin.: *Andropogon contortus* L., *Andropogon secundus* Willd. ex Griseb.,

nom. nud., *Holcus contortus* (L.) Kuntze ex Stuck.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC).
PRY(CON, PHA).

Heteropogon melanocarpus (Elliot) Benth.

Sin.: *Andropogon melanocarpus* Elliott
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY).

Hildaea C. Silva & R.P. Oliveira

Hildaea nemorosa (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira
Sin.: *Echinolaena nemorosa* (Sw.) Kunth, *Ichnanthus nemorosus* (Sw.) Döll, *Ichnanthus venturii* K.E. Rogers, *Panicum nemorosum* Sw.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
PRY(APA).

Hildaea pallens (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira var. **major** (Nees) C. Silva & R.P. Oliveira
Sin.: *Ichnanthus pallens* (Sw.) Munro ex Benth. var. *majus* (Nees) Stieber, *Ichnanthus swallenii* K.E. Rogers, *Panicum pallens* Sw. var. *majus* Nees
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hildaea pallens (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira var. **pallens**

Sin.: *Ichnanthus pallens* (Sw.) Munro ex Benth. var. *pallens*, *Ichnanthus parodii* K.E. Rogers, *Panicum hemignostum* Steud., *Panicum pallens* Sw.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(RIV, TAC).

Hildaea ruprechtii (Döll) C. Silva & R.P. Oliveira

Sin.: *Ichnanthus exilis* K.E. Rogers, *Ichnanthus ramosissimus* K.E. Rogers, *Ichnanthus ruprechtii* Döll
Hierba. Nativa. 100-2100 m.
Países: ARG(JUJ, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Hildaea tenuis (J. Presl & C. Presl) C. Silva & R.P. Oliveira
Sin.: *Ichnanthus tenuis* (J. Presl)

Hitchc. & Chase, *Ichnanthus parodii* K.E. Rogers var. *villosissimus* K.E. Rogers, *Oplismenus tenuis* J. Presl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI).

Holcus L., nom. cons.

Holcus lanatus L.

Sin.: *Avena lanata* (L.) Koeler, *Ginannia lanata* (L.) F.T. Hubb., *Ginannia pubescens* Bubani

Hierba. Introducida. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON, SAO, SJO, SOR).

Homolepis Chase

Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr.

Sin.: *Panicum glutinosum* Sw.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(TYT).

Homolepis villaricensis (Mez)

Zuloaga & Soderstr.
Sin.: *Panicum villaricense* Mez
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Hordeum L.

Hordeum brachyatherum Phil.

Sin.: *Critesion brachyatherum* (Phil.) A. Löve
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, MAG).

Hordeum chilense Roem. & Schult.

Sin.: *Critesion chilense* (Roem. & Schult.) A. Löve, *Hordeum chilense* Brongn. var. *pseudosecalinum* Hauman, nom. illeg., *Hordeum chilense* Brongn., hom. illeg., *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *pilosum* Nevski, *Hordeum cylindricum* Steud., *Hordeum depauperatum* Steud., *Hordeum pratense* Huds. var. *brongniarti* Macloskie, nom.

illeg., *Hordeum pratense* Huds. var. *chilense* (Brongn.) Macloskie, *Hordeum secalinum* Schreb. var. *chilense* (Brongn.) Desv.

Hierba. Endémica. 0-4200 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Hordeum comosum J. Presl

Sin.: *Critesion comosum* (J. Presl) A. Löve, *Hordeum andinum* Trin., *Hordeum comosum* J. Presl var. *bifidum* Parodi ex Nicora, *Hordeum comosum* J. Presl var. *flavescens* E. Desv., *Hordeum comosum* J. Presl var. *humilis* E. Desv., *Hordeum comosum* J. Presl var. *rigida* E. Desv., *Hordeum divergens* Nees & Meyen ex Steud., nom. nud., *Hordeum jubatum* L. f. *flavidum* Kuntze, *Hordeum jubatum* L. f. *versicolor* Kuntze, p.p., *Hordeum jubatum* L. var. *comosum* (J. Presl) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-4300 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Hordeum cordobense Bothmer, N. Jacobsen & Nicora

Sin.: *Critesion cordobense* (Bothmer, N. Jacobsen & Nicora) A. Löve, *Hordeum compressum* Griseb. f. *tenuispicatum* (Hack. & Stuck.) Hack. & Stuck.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE, SJU, SLU, TUC).

Hordeum erectifolium Bothmer, N. Jacobsen & R.B. Jørg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Hordeum euclaston Steud.

Sin.: *Critesion pusillum* (Nutt.) A. Löve subsp. *euclaston* (Steud.) A. Löve, *Hordeum euclaston* Steud. var. *puberulum* Parodi & Nicora, *Hordeum euclaston* Steud. var. *pubescens* Nevski, *Hordeum fragile* Godr., hom. illeg., *Hordeum pusillum* Nutt. subsp. *euclaston* (Steud.) Covas, *Hordeum pusillum* Nutt. var. *euclaston* (Steud.) Hauman, *Hordeum subfastigiatum* Döll

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(MAL, MON).

Hordeum flexuosum Nees ex Steud.

Sin.: *Critesion flexuosum* (Nees ex Steud.) Á. Löve, *Hordeum bonariense* Parodi & Nicora, *Hordeum pusillum* Nutt. subsp. *flexuosum* (Nees ex Steud.) Covas
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, SCR). URY(Desconocida).

Hordeum fuegianum Bothmer, N. Jacobsen & R.B. Jørg.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Hordeum jubatum L.

Sin.: *Hordeum jubatum* L. var. *pampeanum* Hauman, *Hordeum pampeanum* (Hauman) Herter
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SFE, TDF). CHL(MAG).

Hordeum lechleri (Steud.) Schenck

Sin.: *Critesion lechleri* (Steud.) A. Löve, *Elymus lechleri* Steud., *Hordeum incognitum* Parodi & Nicora, nom. nud., *Hordeum jubatum* L. f. *violaceum* Kuntze, p.p., *Hordeum secalinum* Schreb. f. *intermedia* Hauman, p.p.
Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Hordeum marinum Huds. subsp. **gussoneanum** (Parl.) Thell.

Sin.: *Hordeum berterioanum* E. Desv. var. *pumila* E. Desv., *Hordeum gussoneanum* Parl., *Hordeum utriculatum* Bertero
Hierba. Introducida. 0-1600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Hordeum marinum Huds. subsp. **marinum**

Hierba. Introducida. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Hordeum murinum L. subsp. **glaucum** (Steud.) Tzvelev

Sin.: *Critesion glaucum* (Steud.) A. Löve, *Hordeum glaucum* Steud., *Hordeum stebbinsii* Covas
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF).

Hordeum murinum L. subsp.

leporinum (Link) Arcang.

Sin.: *Hordeum ambiguum* Döll, *Hordeum leporinum* Link, *Hordeum murinum* L. var. *chilense* Brongn., *Hordeum murinum* L. subsp. *leporinum* (Link) Asch. & Graebn., comb. superfl., *Hordeum murinum* L. var. *leporinum* (Link) A. Rich., *Hordeum murinum* L. var. *velutinum* Speg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO). URY(MAL).

Hordeum murinum L. subsp. **murinum**

Hierba. Introducida. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA).

Hordeum muticum J. Presl

Sin.: *Hordeum andicola* Griseb., *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *muticum* (J. Presl) Hauman, *Hordeum muticum* J. Presl var. *andicola* (Griseb.) Thell., *Hordeum secalinum* Schreb. var. *andicola* (Griseb.) Hauman, *Hordeum secalinum* Schreb. var. *parviflorum* Hack.

Hierba. Nativa. 400-4100 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, LRI, LLA).

Hordeum parodii Covas

Sin.: *Critesion parodii* (Covas) A. Löve, *Hordeum parodii* Covas var. *araucanum* Parodi & Nicora

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp. **magellanicum** (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen

Sin.: *Critesion magellanicum* (Parodi & Nicora) A. Löve, *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *magellanicum* Parodi & Nicora

Hierba. Endémica. 100-700 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ATA, AIS, MAG, RME).

Hordeum patagonicum (Hauman)

Covas subsp. **mustersii** (Nicora)

Bothmer, Giles & N. Jacobsen

Sin.: *Critesion mustersii* (Nicora) A. Löve, *Hordeum mustersii* Nicora

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(SCR).

Hordeum patagonicum (Hauman)

Covas subsp. **patagonicum**

Sin.: *Hordeum maritimum* (Huds.)

Stokes var. *patagonicum* Hauman

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, SCR).

Hordeum patagonicum (Hauman)

Covas subsp. **santacruzense** (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen

Sin.: *Critesion santacruzense* (Parodi & Nicora) A. Löve, *Hordeum santacruzense* Parodi & Nicora

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

CHL(AIS, MAG).

Hordeum patagonicum (Hauman)

Covas subsp. **setifolium** (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen

Sin.: *Critesion setifolium* (Parodi & Nicora) A. Löve, *Hordeum setifolium* Parodi & Nicora

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(SCR).

Hordeum procerum Nevski

Sin.: *Critesion procerum* (Nevski) A.

Löve, *Hordeum hexaploidum* Covas

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU, TDF).

Hordeum pubiflorum Hook. f.

subsp. **halophilum** (Griseb.) Baden & Bothmer

Sin.: *Critesion pubiflorum* (Hook. f.)

A. Löve subsp. *halophilum* (Griseb.)

A. Löve, *Hordeum halophilum* Griseb.,

Hordeum halophilum Griseb. subsp. *breviaristatum* (Parodi ex Nicora) Baden, *Hordeum jubatum* L. f. *viride* Kuntze,

Hordeum pubiflorum Hook. f. var.

intermedia (Hauman) Melderis, p.p.

Hierba. Nativa. 0-4200 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, LBO, BIO, AIS, MAG).

Hordeum pubiflorum Hook. f. subsp. **pubiflorum**

Sin.: *Critesion pubiflorum* (Hook.

f.) A. Löve, *Hordeum comosum* J.

Presl var. *pubiflorum* (Hook. f.) Thell.,

Hordeum jubatum L. var. *pilosulum*

Franch., *Hordeum secalinum* Schreb. var.

pubiflorum (Hook. f.) Hauman

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, MAG, RME).

Hordeum pusillum Nutt.

Sin.: *Critesion pusillum* (Nutt.) A.

Löve, *Hordeum pusillum* Nutt. var.

typicum Hauman, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SFE).

Hordeum stenostachys Godr.

Sin.: *Hordeum chilense* Brongn.

var. *compressum* (Griseb.) Hauman,

Hordeum chilense Brongn. f. *elongatum*

Hauman, *Hordeum chilense* Brongn.

f. *longearistatum* Hauman, *Hordeum*

compressum Griseb., *Hordeum*

compressum Griseb. var. *superatum*

Hack., *Hordeum compressum* Griseb.

var. *tenuispicatum* Hack. & Stuck.,

Hordeum muticum J. Presl var.

compressum (Griseb.) Thell., *Hordeum*

muticum J. Presl var. *superatum* (Hack.)

Thell., *Hordeum secalinum* Schreb.

var. *puberulum* Kuntze, *Hordeum*

secalinum Schreb. f. *scabriusculum*

Kuntze, *Hordeum stenostachys* Godr.

var. *superatum* (Hack.) Thell. ex Stuck.,

Hordeum stenostachys Godr. var.

tenuispicatum (Hack. & Stuck.) Stuck.,

comb. illeg.

Hierba. Nativa. 0-2300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,

COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN,

MIS, RNE, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

BRA(RGS, SCA). URY(FLA, LAV).

Hordeum tetraploideum Covas

Sin.: *Critesion tetraploideum* (Covas) A. Löve

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LLA, AIS).

Hordeum vulgare L. var. **trifurcatum** (Schltdl.) Alef.

Sin.: *Hordeum coeleste* Viborg ex

Kunth var. *trifurcatum* Schltdl.

Hierba. Introducida. 4000 m.

Países: ARG(JUJ).

Hordeum vulgare L. var. **vulgare**

Sin.: *Hordeum distichon* L., *Hordeum*

vulgare L. subsp. *distichum* (L.) Thell.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI,

LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SLU).

BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ,

BIO, ARA, RME). URY(Desconocida).

Hymenachne P. Beauv.**Hymenachne amplexicaulis** (Rudge) Nees

Sin.: *Agrostis monostachya* Poir.,
Panicum amplexicaule Rudge
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ,
CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA,
GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE).
URY(MON).

Hymenachne bresolinii (L.B. Sm. &

Wassh.) Zuloaga
Sin.: *Panicum bresolinii* L.B. Sm. &
Wassh.
Hierba. Endémica. 200-800 m.
Países: BRA(SCA).

Hymenachne condensata (Bertol.) Chase

Sin.: *Panicum condensatum* Bertol.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Hymenachne donacifolia (Raddi)

Chase
Sin.: *Panicum donacifolium* Raddi
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAN, CEN, CON, GUA,
PHA, SPE).

Hymenachne grumosa (Nees) Zuloaga

Sin.: *Panicum grumosum* Nees, *Panicum*
knuthii Herter, *Panicum pycnanthum*
Steud., *Panicum rivulare* Trin. var.
grumosum (Nees) Hack., *Panicum*
schoederi Herter
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA,
ITA, PAI, PHA). URY(CAS, COL, RNO,
ROC, SJO, TAC).

Hymenachne leptachne (Döll) Zuloaga

Sin.: *Panicum leptachne* Döll
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Hymenachne pernambucense

(Spreng.) Zuloaga
Sin.: *Agrostis pernambucensis* Spreng.,
Panicum excelsum Nees, *Panicum*
pernambucense (Spreng.) Mez ex Pilg.,
Panicum rivulare Trin., *Panicum urticans*
L.B. Sm. & Wassh.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA,
GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART).

Hyparrhenia Andersson ex E.
Fourn.**Hyparrhenia bracteata** (Humb. &

Bonpl. ex Willd.) Stapf
Sin.: *Andropogon bracteatus* Humb. &
Bonpl. ex Willd.
Hierba. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf

Sin.: *Trachypogon rufus* Nees
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN,
CON, PHA, SPE).

Ichnanthus P. Beauv.**Ichnanthus bambusiflorus** (Trin.) Döll

Sin.: *Panicum bambusiflorum* Trin.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Ichnanthus inconstans (Trin. ex
Nees) Döll

Sin.: *Ichnanthus pubescens* Swallen,
Ichnanthus reclinatus Swallen, *Ichnanthus*
subinclusus Swallen, *Panicum inconstans*
Trin. ex Nees
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, COA, PAI, SPE).

Ichnanthus leiocarpus (Spreng.)

Kunth
Sin.: *Ichnanthus fastigiatus* Brongn.,
Panicum leiocarpon Spreng.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ichnanthus nemoralis (Schrad.)

Hitchc. & Chase
Sin.: *Panicum nemorale* Schrad.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ichnanthus procurrens (Nees ex
Trin.) Stieber var. **subaequiglume**

(Hack.) Killeen & Kirpes
Sin.: *Panicum procurrens* Nees ex Trin.
var. *subaequiglume* Hackens
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, PAI).

Ichnanthus tarijjanus K.E. Rogers

Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Imperata Cirillo**Imperata brasiliensis** Trin.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU,
SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(BIO). PRY(COA). URY(SJO).

Imperata condensata Steud.

Sin.: *Imperata arundinacea* (L.) Cyr.
var. *condensata* (Steud.) Hack., *Imperata*
arundinacea (L.) Cyr. var. *condensata*
(Steud.) Macloskie, comb. superfl.,
Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. var.
condensata (Steud.) Hack.
Hierba. Nativa. 0-2300 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU,
SJU, SLU). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Imperata contracta (Kunth) Hitchc.

Sin.: *Imperata caudata* (G.L. Mey.)
Trin., *Imperata contracta* (Kunth)
Kuhl., comb. superfl., *Imperata*
exaltata (Roxb.) Brongn. var. *caudata*
(G.L. Mey.) Hack., *Saccharum caudatum*
G. Mey., *Saccharum contractum* Kunth,
Saccharum cylindricum (L.) Lam. var.
contractum (Kunth) Roberty
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, PAI).

Imperata minutiflora Hack.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Imperata parodii Acevedo

Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ARA).

Imperata tenuis Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA).

Ischaemum L.**Ischaemum minus** J. Presl

Sin.: *Ischaemum urvilleanum* Kunth ex
Brongn., *Paspalum axicilium* Steud.
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, ROC).

Ischaemum rugosum Salisb.

Hierba. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Jarava Ruiz & Pav.**Jarava academica** (Hicken) Peñailillo

Sin.: *Stipa academica* Hicken, *Stipa brachychaeta* Godr. var. *minor* Speg., nom. nud., *Stipa cordobensis* Mez, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR).

Jarava annua (Mez) Peñailillo

Sin.: *Stipa annua* Mez
Hierba. Nativa. 100-3700 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Jarava breviseta (Caro & E.A.

Sánchez) Peñailillo
Sin.: *Stipa breviseta* Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(SAL).

Jarava castellanosii (F.A. Roig)

Peñailillo
Sin.: *Stipa castellanosii* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 1900-3900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU, TUC).

Jarava durifolia (Parodi ex Torres)

Peñailillo
Sin.: *Stipa durifolia* Parodi ex Torres
Hierba. Endémica. 2500-3600 m.
Países: ARG(JUJ, SJU, TUC).

Jarava filifolia (Nees) Ciald.

Sin.: *Jarava megapotamica* (Spreng.) Peñailillo, comb. illeg., *Stipa filifolia* Nees
Hierba. Endémica. 0-3200 m.
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SJO, SJO).

Jarava hypsophila (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa hypsophila* Speg.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, SLU).

Jarava hystricina (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa hystricina* Speg.
Hierba. Endémica. 3500-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

Jarava ichu Ruiz & Pav. var. **ichu**

Sin.: *Jarava eriostachya* (Kunth) Peñailillo, *Jarava usitata* Pers., nom. superfl., *Stipa eriostachya* Kunth, *Stipa*

gynerioides Phil., *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth, *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth f. *interrupta* Hack., *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *gynerioides* (Phil.) Hack., *Stipa jarava* P. Beauv., nom. superfl.

Hierba. Nativa. 0-4200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Jarava ichu (Ruiz & Pav.) Kunth var. **pungens** (Nees & Meyen) Ciald.

Sin.: *Jarava pungens* (Nees & Meyen) Matthei, *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *pungens* (Nees & Meyen) Kuntze, *Stipa ichu* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *pungens* (Nees & Meyen) Pilg., comb. superfl., *Stipa pungens* Nees & Meyen
Hierba. Nativa. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Jarava illimanica (Hack.) F. Rojas

Sin.: *Stipa illimanica* Hack.
Hierba. Nativa. 2000-2500 m.
Países: ARG(SAL).

Jarava juncooides (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa flexibarbata* Mez, *Stipa juncooides* Speg., *Stipa megapotamia* Spreng. ex Trin. var. *juncooides* (Speg.) Speg., *Stipa megapotamia* Spreng. ex Trin. var. *typica* Speg., nom. inval.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE, SLU). URY(MAL, MON).

Jarava leptostachya (Griseb.) F. Rojas

Sin.: *Stipa andina* F.A. Roig, *Stipa capilliseta* Hitchc., *Stipa leptostachya* Griseb., *Stipa leptostachya* Griseb. var. *capilliseta* (Hitchc.) Parodi
Hierba. Nativa. 1200-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Jarava media (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa media* (Speg.) Caro, *Stipa plumosa* Trin. var. *media* Speg.
Hierba. Endémica. 2000-3900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Jarava neaei (Nees ex Steud.)

Peñailillo
Sin.: *Stipa bella* Phil., *Stipa neaei* Nees ex Steud., *Stipa neaei* Nees ex Steud. var. *altoandina* F.A. Roig, *Stipa pulchella* Munro ex Ball, nom. nud.
Hierba. Endémica. 1000-3800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(COQ, VAL, MAU, AIS, RME).

Jarava plumosa (Spreng.) S.W.L.

Jacobs & J. Everett
Sin.: *Achnatherum papposum* (Nees) Barkworth, comb. illeg., *Arundo plumosa* (Spreng.) Schult., *Calamagrostis plumosa* Spreng., *Stipa delilei* Steud., *Stipa papposa* Delile, hom. illeg., *Stipa papposa* Nees f. *major* Speg., *Stipa papposa* Nees f. *minor* Speg., *Stipa papposa* Nees, nom. illeg., *Stipa tenuiflora* Phil.
Hierba. Nativa. 0-3600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). URY(ART, CAS, LAV, MAL, MON, RIV, SJO).

Jarava plumosula (Nees ex Steud.) F.

Rojas
Sin.: *Stipa plumosa* Trin., *Stipa plumosa* Trin. var. *gracilis* Speg., *Stipa plumosa* Trin. var. *micrura* Speg., *Stipa plumosula* Nees ex Steud.
Hierba. Nativa. 0-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Jarava pogonathera (E. Desv.)

Peñailillo
Sin.: *Stipa buchtienii* Hack., *Stipa pogonathera* E. Desv., *Stipa uspallatensis* Hack., hom. Illeg.
Hierba. Endémica. 600-3700 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Jarava polyclada (Hack.) Peñailillo

Sin.: *Stipa polyclada* Hack.
Hierba. Nativa. 600-1900 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).

Jarava pseudoichu (Caro) F. Rojas

Sin.: *Stipa pseudoichu* Caro
Hierba. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SLU, TUC).

Jarava psylantha (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa argentea* Hitchc., *Stipa dasyantha* Speg., *Stipa psylantha* Speg.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(AIS, MAG).

Jarava pungionata (Caro & E.A. Sánchez) Matthei

Sin.: *Stipa pungionata* Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 3700-4200 m.
Países: ARG(CAT, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Jarava scabrifolia (Torres) Peñailillo

Sin.: *Jarava matthei* F. Rojas, *Stipa scabrifolia* Torres

Hierba. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(TAR, ANT).

Jarava scirpea (Speg.) Peñailillo

Sin.: *Stipa axilliflora* Parodi, nom. nud., *Stipa scirpea* Speg.

Hierba. Endémica. 2600-3300 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

Jarava subaristata (Matthei) Matthei

Sin.: *Stipa leptostachya* Griseb. var. *subaristata* Matthei, *Stipa subaristata* (Matthei) Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Endémica. 1800-4100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Jarava subplumosa (Hicken ex F.A. Roig) Peñailillo

Sin.: *Stipa subplumosa* Hicken ex F.A. Roig

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(SCR).

Jarava tortuosa (E. Desv.) Peñailillo

Sin.: *Stipa tortuosa* E. Desv.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Koeleria Pers.

Koeleria calderonii A.M. Molina

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Koeleria fueguina C.E. Calderón ex Nicora

Sin.: *Trisetum tomentosum* (E. Desv.) Nicora, *Trisetum tolucense* Kunth var. *tomentosum* E. Desv.

Hierba. Endémica. 200-1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, AIS, MAG).

Koeleria inaequaliglumis A.M. Molina

Hierba. Endémica. 1600-2400 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Koeleria kurtzii Hack. ex Kurtz emend. A.M. Molina

Sin.: *Koeleria argentina* Domin, *Koeleria bergii* Hieron. var. *fallacina* Domin, *Koeleria grisebachii* Domin var. *catamarcensis* Domin, *Koeleria grisebachii* Domin var. *riojensis* Domin, *Koeleria grisebachii* Domin var. *typica* Domin, nom. inval., *Koeleria hieronymi* Domin, *Koeleria kurtzii* Hack. ex Kurtz var. *mollis* Hack., *Koeleria lilloi* Hack., *Koeleria niederleinii* Domin, *Koeleria niederleinii* Domin var. *mutica* Domin, *Koeleria niederleinii* Domin var. *pseudobergii* Domin, *Koeleria pseudocristata* Domin var. *andicola* Domin, *Trisetum kurtzii* (Hack.) Zotov, *Trisetum subaristatum* E. Desv.

Hierba. Nativa. 500-4500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, MAU, MAG, RME).

Koeleria mendocinensis (Hauman)

C.E. Calderón & Nicora

Sin.: *Koeleria grisebachii* Domin var. *mendocinensis* Hauman

Hierba. Endémica. 500-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR).

Koeleria permollis Nees ex Steud.

Sin.: *Koeleria bergii* Hieron., *Koeleria bergii* Hieron. var. *aristulata* Domin, *Koeleria bergii* Hieron. var. *minor* Domin, *Koeleria bergii* Hieron. var. *typica* Domin, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-3900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, TDF). URY(SOR).

Koeleria praeandina A.M. Molina

Hierba. Endémica.
Países: ARG(MEN).

Koeleria ventanicola A.M. Molina

Hierba. Endémica. 400-1100 m.
Países: ARG(BAI).

Koeleria vurilochensis C.E. Calderón

ex Nicora var. **patagonica** (Domin) A.M. Molina

Sin.: *Koeleria bergii* Hieron. var. *patagonica* Domin

Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Koeleria vurilochensis C.E. Calderón

ex Nicora var. **vurilochensis**

Hierba. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Lachnagrostis Trin.

Lachnagrostis filiformis (G. Forst.) Trin.

Sin.: *Agrostis avenacea* J.F. Gmel., *Agrostis filiformis* (G. Forst.) Spreng., comb. illeg., *Agrostis lasiantha* Phil., *Agrostis leonii* Parodi, *Avena filiformis* G. Forst.

Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SFE). CHL(VAL, MAU, LLA, IPA).

Lagurus L.

Lagurus ovatus L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG). URY(MON).

Lamarckia Moench

Lamarckia aurea (L.) Moench

Sin.: *Cynosurus aureus* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, SFE). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Lasiacis (Griseb.) Hitchc.

Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. var.

austroamericana Davidse
Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, GUA, PAI, PHA).

Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.)

Hitchc. & Chase
Sin.: *Lasiacis guaranitica* (Speg.) Parodi, *Lasiacis patentiflora* Hitchc. & Chase, *Lasiacis sorghoidea* (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase var. *patentiflora* (Hitchc. & Chase) Davidse, *Panicum guaraniticum* Speg., *Panicum sorghoideum* Desv. ex Ham.

Hierba subleñosa. Nativa. 400 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Leersia Sol. ex Sw.**Leersia hexandra** Sw.

Sin.: *Asprella hexandra* (Sw.) P. Beauv., *Asprella mexicana* (Kunth) Roem. & Schult., *Homalocenchrus gouinii* (E. Fourn.) Kuntze, *Homalocenchrus hexandrus* (Sw.) Kuntze, *Leersia contracta* Nees, *Leersia gouinii* E. Fourn., *Oryza hexandra* (Sw.) Döll, *Oryza hexandra* (Sw.) Döll var. *grandiflora* Döll, *Oryza mexicana* (Kunth) Döll

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, PHA). URY(DUR, ROC).

Leersia ligularis Trin. var.**grandiflora** (Döll) Pyrah

Sin.: *Homalocenchrus grandiflorus* (Döll) Hitchc., *Leersia debilis* Balansa & Poitr., *Leersia distichophylla* Balansa & Poitr., *Leersia grandiflora* (Döll) Prodoehl, *Leersia hexandra* Sw. subsp. *grandiflora* (Döll) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Oryza monandra* (Sw.) Döll var. *grandiflora* Döll

Hierba. Nativa. 100-1200 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA). URY(MON).

Leersia virginica Willd.

Sin.: *Asprella virginica* (Willd.) P. Beauv., *Homalocenchrus virginicus* (Willd.) Britton, *Leersia virginica* Willd. var. *brasiliensis* Ekman

Hierba. Nativa. 800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Leptochloa P. Beauv.**Leptochloa chloridiformis** (Hack. ex

Stuck.) Parodi

Sin.: *Baldomiria chloridiformis* (Hack. ex Stuck.) Herter, *Diplachne chloridiformis* Hack. ex Stuck.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, CON, PHA). URY(RNO).

Leptochloa crinita (Lag.) P.M.

Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Chloris crinita* Lag., *Chloris mendocina* Phil., *Chloropsis blanchardiana* (E. Fourn. ex Scribn.) Kuntze, *Chloropsis crinita* (Lag.) Kuntze, *Chloropsis mendocina* (Phil.) Kuntze, *Trichloris*

blanchardiana E. Fourn. ex Scribn., *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi, *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi var. *triflora* Parodi, *Trichloris crinita* (Lag.) Parodi var.

typica Parodi, nom. inval., *Trichloris mendocina* (Phil.) Kurtz ex Seckt, hom. illeg., *Trichloris mendocina* (Phil.) Kurtz f. *blanchardiana* (E. Fourn. ex Scribn.) Kurtz, *Trichloris mendocina* (Phil.) Kurtz

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ). URY(RNO).

Leptochloa fusca (L.) Kunth subsp.**fascicularis** (Lam.) N.W. Snow

Sin.: *Cynodon fascicularis* (Lam.) Raspail, *Diplachne fascicularis* (Lam.) P. Beauv., *Diplachne procumbens* (Mühlent.) Nash, hom. illeg., *Diplachne procumbens* Arechav., *Diplachne uninervia* (J. Presl) Parodi var. *procumbens* (Arechav.) Parodi, *Festuca aquatica* Bosc ex Roem. & Schult., nom. inval., *Festuca fascicularis* Lam., *Festuca polystachya* Michx., *Leptochloa fascicularis* (Lam.) A. Gray, *Leptochloa polystachya* (Michx.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, SAL, SLU). PRY(BOQ, CHO).

Leptochloa fusca (L.) Kunth subsp.**fusca**

Sin.: *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult., *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Stapf, hom. illeg., *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Stuck., hom. illeg., *Diplachne malabarica* (L.) Merr., *Festuca fusca* L., *Leptochloa malabarica* (L.) Veldkamp, *Ottochloa malabarica* (L.) Dandy, *Poa malabarica* L., *Uralepis fusca* (L.) Steud.

Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, ERI, LRI, MIS, RNE, SJU). PRY(APY).

Leptochloa fusca (L.) Kunth subsp.**muelleri** (Benth.) N.W. Snow

Sin.: *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult., *Diplachne muelleri* Benth., *Diplachne reptatrix* (L.) Druce, *Festuca reptatrix* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(DFE).

Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi

subsp. **brachiata** (Steud.) N.W. Snow

Sin.: *Eleusine filiformis* Pers., *Festuca filiformis* Lam., hom. illeg., *Leptochloa*

brachiata Steud., *Leptochloa filiformis* (Pers.) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-2800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(CEN).

Leptochloa pluriflora (E. Fourn.) P.M. Peterson & N.W. Snow

Sin.: *Chloris pluriflora* (E. Fourn.) Clayton, *Chloropsis pluriflora* (E. Fourn.) Kuntze, *Trichloris lilloi* Parodi, *Trichloris pluriflora* E. Fourn. f. *macra* Hack., *Trichloris pluriflora* E. Fourn. f. *pluriflora*

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Leptochloa virgata (L.) P. Beauv.

Sin.: *Cynodon domingense* (Jacq.) Raspail, *Cynodon virgatus* (L.) Raspail, *Cynosurus domingensis* Jacq., *Cynosurus virgatus* L., *Diplachne domingensis* (Jacq.) Chapm., *Eleusine barbata* Desv., *Eleusine domingensis* (Jacq.) Pers., *Eleusine uniolooides* Willd. ex Steud., nom. inval., *Eleusine virgata* (L.) Pers., *Festuca domingensis* (Jacq.) Lam., *Festuca virgata* (L.) Lam., *Leptochloa barbata* (Desv.) Parodi ex Nicora, *Leptochloa domingensis* (Jacq.) Trin., *Leptochloa mutica* Steud., *Leptochloa procera* Nees, *Leptochloa virgata* (Jacq.) Chapm. var. *domingensis* (Jacq.) Link ex Griseb., *Leptochloa virgata* (L.) P. Beauv. var. *mutica* (Steud.) Döll, *Leptochloa virgata* (L.) P. Beauv. var. *puberula* Hack., *Leptostachys domingensis* (Jacq.) G. Mey., *Rabdochloa domingensis* (Jacq.) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, NAS, PAI, PHA, SPE).

Leptophyllochloa C.E. Calderón ex Nicora**Leptophyllochloa micrathera** (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora

Sin.: *Koeleria philippiana* E. Desv., nom. nud., *Koeleria micrathera* (E. Desv.) Griseb., *Trisetum araeanthum* Phil., *Trisetum brachyatherum* Phil., *Trisetum depauperatum* Phil., *Trisetum laxiflorum* Phil., *Trisetum laxum* Phil., *Trisetum micrathera* E. Desv., *Trisetum nemorosum* Phil.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE).

Lepturus R. Br.

Lepturus repens (G. Forst.) R. Br.
Sin.: *Rottboellia repens* G. Forst.
Hierba. Introducida.
Países: CHL(IPA).

Leymus Hochst.

Leymus arenarius (L.) Hochst.
Sin.: *Elymus arenarius* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(VAL, MAG).

Lithachne P. Beauv.

Lithachne pauciflora (Sw.) P. Beauv.
Sin.: *Lithachne axillaris* P. Beauv., *Olyra axillaris* Lam., *Olyra pauciflora* Sw.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(GUA).

Lolium L.

Lolium multiflorum Lam.
Sin.: *Lolium italicum* A. Braun, *Lolium multiflorum* Lam. var. *italicum* (A. Braun) R. Beck, *Lolium multiflorum* Lam. var. *muticum* DC.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME, JFE). PRY(CEN). URY(MAL).

Lolium perenne L.

Sin.: *Lolium brasilianum* Nees, *Lolium perenne* L. var. *brasilianum* (Nees) Kuntze
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). URY(MON).

Lolium remotum Schrank

Sin.: *Lolium linicolum* Sond., nom. nud.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Lolium rigidum Gaudin subsp.

lepturoides Sennen & Mauricio
Sin.: *Lolium loliaceum* (Bory & Chaub.) Hand.-Mazz., *Lolium subulatum* Vis.,

Rottboellia loliacea Bory & Chaub.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, RNE).

Lolium rigidum Gaudin subsp. **rigidum**

Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, RNE, SFE). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

Lolium temulentum L.

Sin.: *Craepalia temulenta* (L.) Schrank, *Festuca temulenta* (L.) Columbus & J.P. Sm., *Lolium arvense* With., *Lolium temulentum* L. f. *arvense* (With.) Junge, *Lolium temulentum* L. var. *leptochaeton* A. Braun
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MON).

Loudetia Hochst. ex Steud., nom. cons.

Loudetia flammida (Trin.) C.E. Hubb.
Sin.: *Arundinella flammida* Trin.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Loudetiopsis Conert

Loudetiopsis chrysothryx (Nees) Conert
Sin.: *Tristachya chrysothryx* Nees, *Tristachya chrysothryx* Nees f. *pallida* Hack.
Hierba. Nativa. 200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU).

Louisiella C.E. Hubb. & J. Léonard

Louisiella elephantipes (Nees ex Trin.) Zuloaga
Sin.: *Digitaria megapotamica* Mez, *Panicum elephantipes* Nees ex Trin.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, PHA).

Luziola Juss.

Luziola bahiensis (Steud.) Hitchc.
Sin.: *Caryochloa bahiensis* Steud., *Luziola contracta* Hack., *Luziola longivalvula* Döll, nom. superfl., *Luziola pusilla* S. Moore, *Luziola striata* Balansa & Poitr.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Luziola brasiliensis (Trin.) Swallen
Sin.: *Arrozia micrantha* Schrad. ex Nees, nom. nud., *Caryochloa brasiliensis* Trin., *Luziola micrantha* (Schrad.) Benth.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Luziola fragilis Swallen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Luziola gracillima Prodoehl
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, SAL). PRY(PHA).

Luziola peruviana Juss. ex J.F. Gmel.
Sin.: *Juncodes peruviana* (Desv.) Kuntze, *Luziola leiocarpa* Lindm., *Luziola mexicana* Kunth, *Milium natans* Spreng.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, PAI, PHA, SPE). URY(FLA, PAY, RNO, ROC, SOR, TAC, TYT).

Luziola spruceana Benth. ex Döll
Sin.: *Luziola spisiiformis* Andersson ex Balansa & Poit.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CEN, PHA).

Luziola subintegra Swallen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, PHA).

Megalachne Steud.

Megalachne berteroniana Steud.
Sin.: *Bromus fernandezianus* (Phil.) Skottsbl., *Bromus megalachne* Pilg., *Pantathera avenacea* Phil. ex Hemsl., nom. nud., *Pantathera fernandeziana* Phil.
Hierba. Endémica. 100-700 m.
Países: CHL(JFE).

Megalachne masafuerana (Skotts. & Pilg. ex Pilg.) Matthei

Sin.: *Bromus masafueranus* Skotts. & Pilg. ex Pilg., *Megalachne masafuerana* (Skotts. & Pilg.) H. Scholz, comb. superfl.

Hierba. Endémica. 300-1100 m.

Países: CHL(JFE).

Megalachne robinsoniana C. Peña

Hierba. Endémica. 300-400 m.

Países: CHL(JFE).

Megathyrsus (Pilg.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.

Simon & S.W.L. Jacobs var. **maximus**

Sin.: *Panicum maximum* Jacq., *Urochloa maxima* (Jacq.) R.D. Webster

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.

Simon & S.W.L. Jacobs var. **pubiglumis** (K. Schum.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs

Sin.: *Panicum maximum* Jacq. var. *pubiglume* K. Schum., *Panicum maximum* Jacq. var. *trichoglume* Robyns, *Urochloa maxima* (Jacq.) R.D. Webster var.

trichoglumis (Robyns) R.D. Webster

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, FOR, MIS). BRA(RGS). CHL(IPA).

Melica L., nom. cons.

Melica animarum Mujica-Sallés & M. Marchi

Hierba. Endémica. 400-500 m.

Países: URY(MAL).

Melica argentata E. Desv.

Sin.: *Melica ampla* Phil., *Melica argentata* E. Desv. var. *breviglumis* Papp, *Melica glabra* Steud., *Melica nitida* Phil., *Melica tortuosa* Phil., *Melica violacea* Cav. var. *argentata* Papp

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Melica argyrea Hack.

Sin.: *Melica argyrea* Hack. var. *pilosa* Papp, *Melica argyrea* Hack. f. *pilosa*

(Papp) Hempel, *Melica papilionacea* L. var. *laxiflora* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SJU, SLU, SFE, SDE). BRA(RGS). URY(CLA, COL, MON, PAY, RNO, SOR).

Melica arzivencoi Valls & Barcellos

Hierba. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Melica bonariensis Parodi

Sin.: *Melica papilionacea* L. var. *violacea* Hieron.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, LPA, RNE, SLU).

Melica brasiliana Ard.

Sin.: *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam., *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. f. *pallida* Papp, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. f. *violacea* Hack. ex Papp, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. subsp. *cymbara* Ekman, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var.

mucronata Papp, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *tandilensis* Kuntze, *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *typica*

Papp, nom. inval., *Melica brasiliana* Ard. f. *tandilensis* (Kuntze) Hempel, *Melica brasiliana* Ard. var. *aurantiaca* (Desr. ex Lam.) Hempel, *Melica mucronata* (Papp) Herter, *Melica papilionacea* L., *Melica tandilensis* (Kuntze) Herter

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

Melica brevicoronata Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS). URY(FLO, FLA, LAV, MAL, SJO, TYT).

Melica cepacea (Phil.) Scribn.

Sin.: *Bromelica cepacea* (Phil.) Nicora, *Festuca cepacea* Phil.

Hierba. Endémica. 1000-3500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, ARA, RME).

Melica chilensis J. Presl

Sin.: *Melica adhaerens* Hack., *Melica andina* Hauman, *Melica andina* Hauman var. *laxissima* Papp, *Melica andina* Hauman var. *trinervis* Papp, *Melica pilgeriana* Papp, *Melica popoviciana* Papp

Hierba. Nativa. 2500-3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Melica commersonii Nees ex Steud.

Sin.: *Melica commutata* Steud., *Melica violacea* Cav. var. *commersonii* (Nees ex Steud.) Papp, *Melica violacea* Cav. var. *commutata* (Steud.) Papp, *Melica violacea* Cav. var. *pallida* E. Desv.

Hierba. Endémica. 0-1900 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

Melica decipiens Caro

Sin.: *Melica violacea* Cav. var. *glabrior* Papp, *Melica violacea* Cav. f. *mucronata* Papp

Hierba. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(COR, SLU).

Melica eremophila Torres

Sin.: *Melica monantha* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, COL, LAV, MAL, MON, RIV, TAC, TYT).

Melica glabrescens (Torres) Torres

Sin.: *Melica violacea* Cav. var. *glabrescens* Torres

Hierba. Endémica. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, RNE).

Melica hyalina Döll

Sin.: *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *montevidensis* Papp, *Melica brasiliana* Ard. f. *truncata* (Papp) Hempel, *Melica hyalina* Döll f. *violacea* Papp, nom. nud., *Melica hyalina* Döll var. *truncata* Papp, *Melica montevidensis* (Papp) Herter, *Melica papilionacea* L. var. *hyalina* (Döll) Hack. ex Kneuck.

Hierba. Endémica. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TAC).

Melica lilloi Bech.

Sin.: *Melica decumbens* Papp, *Melica laxiflora* Cav. f. *macrior* Hack., nom. nud.

Hierba. Endémica. 3000-3500 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Melica longiflora Steud.

Sin.: *Melica berteroaana* Phil., *Melica berteroaana* Phil. f. *violaceae* Papp, *Melica berteroaana* Phil. var. *exaltata* (Phil.) Papp, *Melica berteroaana* Phil. var. *pilosula* Papp, *Melica berteroaana* Phil. var. *puberula* Papp, *Melica berteroaana* Phil. var. *typica* Papp, nom. inval., *Melica exaltata* Phil., *Melica flava* Nees ex Steud. var. *violaceae* Papp, *Melica hirta*

Phil., *Melica laxiflora* Cav. f. *hirta* (Phil.) Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *glabra* Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *hirsuta* E. Desv., *Melica laxiflora* Cav. var. *longiflora* (Steud.) Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *pilosula* Papp, *Melica laxiflora* Cav. var. *typica* Papp, nom. inval., *Melica laxiflora* E. Desv. ex M. Muñoz, nom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Melica macra Nees

Sin.: *Melica macra* Nees var. *pilosa* Papp
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).

Melica mollis Phil.

Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Melica parodiana Torres

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(CAS, LAV, MAL, RIV).

Melica patagonica Parodi

Sin.: *Melica stuckertii* Hack. var. *tenuis* Papp
Hierba. Endémica. 800-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Melica paulsenii Phil.

Sin.: *Melica litoralis* Phil. var. *paulsenii* (Phil.) Papp, *Melica litoralis* Phil. var. *werdermannii* Papp
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Melica poecilantha E. Desv.

Sin.: *Melica poecilantha* E. Desv. var. *umbrosa* E. Desv.
Hierba. Endémica. 500-1200 m.
Países: CHL(COQ).

Melica rigida Cav.

Sin.: *Melica aurantiaca* Desr. ex Lam. var. *rigida* (Cav.) Papp
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Melica riograndensis Longhi-Wagner & Valls

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Melica sarmentosa Nees var.

monticola Torres
Hierba. Endémica. 800-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Melica sarmentosa Nees var.

pilosula Döll
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA).

Melica sarmentosa Nees var.

sarmentosa
Sin.: *Melica sarmentosa* Nees var. *glabrior* Döll
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, PAI). URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Melica serrana Mujica-Sallés & M. Marchi

Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: URY(MAL).

Melica spartinoides L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Melica stuckertii Hack.

Sin.: *Melica cordobensis* Hack., *Melica stuckertii* Hack. var. *cordobensis* (Hack.) Hack.
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE).

Melica tenuis Hack. ex Arechav.

Sin.: *Melica hunzikeri* Nicora
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, ITA). URY(LAV, MAL, MON, PAY, SJO).

Melica violacea Cav.

Sin.: *Melica alata* Nees ex Steud., *Melica alata* Nees ex Steud. var. *filiculmis* (Desv.) Papp, *Melica alata* Nees ex Steud. var. *mollis* Papp, *Melica filiculmis* Desv., *Melica flava* Nees ex Steud., *Melica laxiflora* Cav., *Melica valdiviana* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Melinis P. Beauv.**Melinis minutiflora** P. Beauv.

Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(PAI).

Melinis repens (Willd.) Zizka

Sin.: *Rhynchelytrum repens* (Willd.) A. Berger, *Rhynchelytrum roseum* (Nees) Stapf & C.E. Hubb., *Saccharum repens* Willd., *Tricholaena repens* (Willd.) Hitchc.
Hierba. Introducida. 0-1300 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(SAO).

Merostachys Spreng.**Merostachys caucaiana** Send.

Hierba. Nativa. 100-900 m.
Países: BRA(RGS).

Merostachys ciliata McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Merostachys clausenii Munro

Sin.: *Merostachys burchellii* Munro
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, GUA).

Merostachys fischeriana Rupr. ex Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Merostachys glauca McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Endémica. 200-700 m.
Países: BRA(SCA).

Merostachys kleinii Send.

Hierba subleñosa. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Merostachys kunthii Rupr.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).

Merostachys multiramea Hack.

Sin.: *Merostachys anomala* Dutra
Hierba subleñosa. Nativa. 400-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Merostachys petiolata Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Merostachys pilifera Send.

Hierba subleñosa. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(RGS).

Merostachys pluriflora Munro ex E.G. Camus

Sin.: *Bambusa pubescens* Döll, hom. illeg., *Brasilocalamus pubescens* Nakai
Hierba subleñosa. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

Merostachys skvortzovii Send.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Merostachys speciosa Spreng.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Merostachys ternata Nees

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Merostachys vestita McClure & L.B. Sm.

Hierba subleñosa. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(SCA).

Mesosetum Steud.

Mesosetum agropyroides Mez

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mesosetum chaseae Luces

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Mesosetum comatum Swallen

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS).

Mesosetum exaratum (Trin.) Chase

Sin.: *Panicum exaratum* Trin.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Mesosetum ferrugineum (Trin.)

Chase
Sin.: *Panicum ferrugineum* Trin.
Hierba. Nativa. 1200 m.
Países: BRA(PAR).

Microchloa R. Br.

Microchloa indica (L. f.) P. Beauv.

Sin.: *Microchloa indica* (L. f.) Kuntze, comb. superfl., *Microchloa indica* (L. f.) P. Beauv. var. *tenuis* Hack., *Microchloa setacea* (Roxb.) R. Br., *Nardus indica* L. f.
Hierba. Nativa. 2300-2400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI,

JUU, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR).
PRY(PAI). URY(ART, LAV, PAY, RNO).

Microchloa kunthii Desv.

Hierba. Nativa. 200-3200 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR).

Miscanthus Andersson

Miscanthus sinensis Andersson

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). CHL(MAU).
URY(MON).

Mnesithea Kunth

Mnesithea aurita (Steud.) de Koning & Sosef

Sin.: *Coelorachis aurita* (Steud.) A. Camus, *Manisuris aurita* (Steud.) Kuntze, *Manisuris aurita* (Steud.) Hitchc. & Chase, comb. superfl., *Rottboellia aurita* Steud.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(PAI).

Mnesithea balansae (Hack.) de Koning & Sosef

Sin.: *Coelorachis balansae* (Hack.) A. Camus, *Coelorachis balansae* (Hack.) Herter, comb. superfl., *Manisuris balansae* (Hack.) Parodi, *Rottboellia balansae* Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Mnesithea parodiana (Henrard) de Koning & Sosef

Sin.: *Coelorachis parodiana* Henrard, *Rottboellia parodiana* (Henrard) Burkart
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, FOR, LRI, SLU, SDE). PRY(APY).

Mnesithea selloana (Hack.) de Koning & Sosef

Sin.: *Coelorachis selloana* (Hack.) A. Camus, *Coelorachis selloana* (Hack.) Henrard, comb. superfl., *Manisuris selloana* (Hack.) Kuntze, *Rottboellia selloana* Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,

ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA).
PRY(GUA, ÑEE). URY(FLA, MAL).

Mnesithea subgibbosa (Winkl. ex Hack.) de Koning & Sosef

Sin.: *Rhytachne subgibbosa* (Winkl. ex Hack.) Clayton, *Rottboellia loricata* Trin. subsp. *glaberrima* Hack., *Rottboellia loricata* Trin. subsp. *subgibbosa* Winkl. ex Hack.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).
PRY(AMA, CAU, ITA).

Moorochloa Veldkamp

Moorochloa eruciformis (Sm.)

Veldkamp
Sin.: *Brachiaria eruciformis* (Sm.) Griseb., *Echinochloa eruciformis* (Sm.) Rchb., *Panicum eruciforme* Sm., *Urochloa eruciformis* (Sm.) C. Nelson & Fern.Casas
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(ERI).

Morronea Zuloaga & Scataglini

Morronea trichidiachnis (Döll)

Zuloaga & Scataglini
Sin.: *Panicum trichidiachne* Döll
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA).

Muhlenbergia Schreb.

Muhlenbergia alopecuroides

(Griseb.) P.M. Peterson & Columbus
Sin.: *Lycurus alopecuroides* Griseb., *Lycurus phleoides* Kunth var. *glaucifolius* Beal, *Lycurus setosus* (Nutt.) C.Reeder, *Pleopogon setosum* Nutt.

Hierba. Nativa. 2000-3700 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Muhlenbergia angustata (J. Presl) Kunth

Sin.: *Epicampes coerulea* Griseb., *Epicampes coerulea* Griseb. var. *submutica* Hack., *Epicampes kunthiana* Griseb., *Epicampes phleoides* (Kunth) Griseb., *Muhlenbergia coerulea* (Griseb.) Mez, *Podosaemum angustatum* J. Presl
Hierba. Nativa. 2400-4900 m.
Países: ARG(COR, SAL, TUC).

Muhlenbergia angustata (J. Presl)

Kunth x M. rigida (Kunth) Kunth

Sin.: *Muhlenbergia breviaristata* (Hack.) Parodi, *Muhlenbergia phragmitoides* Griseb. var. *breviaristata* Hack.

Hierba. Endémica.

Países: ARG(LRI, SAL, TUC).

Muhlenbergia arenicola Buckley

Sin.: *Podosaemum arenicola* (Buckley) Bush

Hierba. Nativa. 1000-1800 m.

Países: ARG(CAT, LPA).

Muhlenbergia asperifolia (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi

Sin.: *Agrostis distichophylla* Phil., hom. illeg., *Agrostis eremophila* Speg., *Muhlenbergia asperifolia* (Nees & Meyen ex Trin.) Matthei, comb. superfl., *Sporobolus asperifolius* (Nees & Meyen ex Trin.) Nees, *Sporobolus copiapius* Phil., *Sporobolus deserticolus* Phil., *Sporobolus distichophyllus* Phil., *Sporobolus sarmentosus* Griseb., *Vilfa asperifolia* Nees & Meyen ex Trin.

Hierba. Nativa. 100-4700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, LLA, RME).

Muhlenbergia atacamensis Parodi

Sin.: *Chaboissaea atacamensis* (Parodi) P.M. Peterson & Annable, *Muhlenbergia atacamensis* Parodi var. *brachyanthera* Parodi

Hierba. Nativa. 2900-4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Muhlenbergia bryophilus (Döll) P.M. Peterson

Sin.: *Aegopogon argentinus* Mez, *Aegopogon bryophilus* Döll, *Aegopogon fiebrigii* Mez, *Aegopogon geminiflorus* Kunth var. *muticus* Pilg.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto).

Muhlenbergia ciliata (Kunth) Trin.

Sin.: *Muhlenbergia ciliata* (Kunth) Kunth, comb. superfl., *Podosaemum ciliatum* Kunth, *Polypogon ciliatus* (Kunth) Spreng., *Trichochloa ciliata* (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Muhlenbergia diversiglumis Trin.

Hierba. Nativa. 600-2500 m.

Países: ARG(JUJ).

Muhlenbergia fastigiata (J. Presl)

Henrard

Sin.: *Sporobolus fastigiatus* J. Presl

Hierba. Nativa. 3300-4300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR).

Muhlenbergia ligularis (Hack.)

Hitchc.

Sin.: *Muhlenbergia minuscula* H.

Scholz, *Sporobolus ligularis* Hack.

Hierba. Nativa. 1000-4500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Muhlenbergia paniculata (Nutt.)

Columbus

Sin.: *Lepturus paniculatus* Nutt., *Rottboellia paniculata* (Nutt.) Spreng., *Schedonnardus paniculatus* (Nutt.) Branner & Coville, *Schedonnardus texanus* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, SLU, SFE).

Muhlenbergia peruviana (P. Beauv.) Steud.

Sin.: *Agrostis peruviana* (P. Beauv.) Spreng., *Clomena peruviana* P. Beauv., *Muhlenbergia clomena* Kunth, nom. superfl., *Muhlenbergia herzogiana* Henrard, *Muhlenbergia nana* Benth., *Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. var. *elatior* Kuntze, *Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. var. *subcaespitosa* Kuntze, *Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. f. *versicolor* Kuntze, *Muhlenbergia peruviana* (P. Beauv.) Steud. f. *viridis* Kuntze

Hierba. Nativa. 2000-4600 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, MAU).

Muhlenbergia phalaroides (Kunth)

P.M. Peterson

Sin.: *Lycurus phalaroides* Kunth, *Lycurus phleoides* Kunth var. *brevifolius* Scribn. ex Beal, *Muhlenbergia lycuroides* Vasey ex Beal

Hierba. Nativa. 2000-3000 m.

Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

Muhlenbergia ramulosa (Kunth) Swallen

Sin.: *Agrostis ramulosa* (Kunth) Roem. & Schult., *Sporobolus ramulosus* (Kunth) Kunth, *Vilfa ramulosa* Kunth

Hierba. Nativa.

Países: ARG(TUC).

Muhlenbergia rigida (Kunth) Kunth

Sin.: *Agrostis quitensis* Spreng., *Muhlenbergia elegans* (Kunth) Trin.,

Muhlenbergia elegans (Kunth) Trin. var. *atroviolacea* Kuntze, *Muhlenbergia elegans* (Kunth) Trin. var. *subviridis* Kuntze, *Muhlenbergia phragmitoides* Griseb., *Muhlenbergia rigida* (Kunth) Trin., nom. inval., *Podosaemum rigidum* Kunth, *Trichochloa elegans* (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 1700-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Muhlenbergia schreberi J.F. Gmel.

Sin.: *Muhlenbergia diffusa* Willd., *Muhlenbergia diffusa* Schreb., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, DFE, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS, SCA). URY(MON).

Muhlenbergia tenuifolia (Kunth) Kunth

Sin.: *Arundo quitensis* (Kunth) Poir., comb. illeg., *Arundo tenuifolia* (Kunth) Poir., *Calamagrostis quitensis* Kunth, *Calamagrostis tenuifolia* Kunth, *Muhlenbergia quitensis* (Kunth) Hitchc., *Podosaemum tenuifolium* (Kunth) Nees & Schauer

Hierba. Nativa. 1200-2500 m.

Países: ARG(SAL).

Muhlenbergia torreyi (Kunth) Hitchc. ex Bush

Sin.: *Agrostis caespitosa* Torr., hom. illeg., *Agrostis torreyi* Kunth, *Muhlenbergia gracillima* Torr., *Muhlenbergia nardifolia* Griseb., *Podosaemum gracillimum* (Torr.) Bush

Hierba. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, MEN, SAL, SLU, TUC).

Munroa Torr.

Munroa andina Phil.

Sin.: *Hemimunroa andina* (Phil.) Parodi, *Hemimunroa andina* (Phil.) Parodi var. *brevisetata* (Hack.) Parodi, *Munroa andina* Phil. var. *brevisetata* Hack., *Munroa multiflora* Phil.

Hierba. Nativa. 2600-4200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(TAR, ANT).

Munroa argentina Griseb.

Hierba. Nativa. 1100-4000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT).

Munroa decumbens Phil.

Hierba. Nativa. 2500-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Munroa mendocina Phil.

Hierba. Endémica. 700-3300 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Nassella E. Desv., emend.
Barkworth**Nassella airoides** (Ekman) Barkworth

Sin.: *Stipa airoides* Ekman
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA).

Nassella arcaensis (Speg.) Torres

Sin.: *Stipa arcaensis* Speg., *Stipa paniculata* Hitchc.
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Nassella arcuata (R.E. Fr.) Torres

Sin.: *Stipa arcuata* R.E. Fr., *Nassella curviseta* (Hitchc.) Barkworth, *Stipa curviseta* Hitchc.
Hierba. Nativa. 400-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Nassella arechavaletae (Speg.)

Barkworth
Sin.: *Stipa arechavaletae* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(MAL, MON, RIV, SAO).

Nassella argentinensis (Speg.)

Peñailillo
Sin.: *Stipa argentinensis* Speg., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *virescens* Hack.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, SFE).

Nassella asplundii Hitchc.

Hierba. Nativa. 3600-4000 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Nassella barbinodis (Phil.) M. Muñoz,

Ciald. & Morrone
Sin.: *Stipa barbinodis* Phil.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Nassella brachychaetoides (Speg.)

Barkworth
Sin.: *Stipa brachychaetoides* Speg.

Hierba. Endémica. 0-3100 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Nassella brachyglumis (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa brachyglumis* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Nassella brachyphylla (Hitchc.)

Barkworth
Sin.: *Stipa brachyphylla* Hitchc.
Hierba. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Nassella brasiliensis (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo

Sin.: *Stipa brasiliensis* A. Zanin & Longhi-Wagner
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Nassella burkartii (Torres) Barkworth & Torres

Sin.: *Stipa burkartii* Torres
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI).

Nassella cabreriae Torres

Hierba. Nativa. 2700-3900 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Nassella caespitosa Griseb.

Sin.: *Nassella linearifolia* (E. Fourn.) R. W. Pohl, *Oryzopsis caespitosa* (Griseb.) Ball, *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg., *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *subtypica* Speg., *Stipa linearifolia* E. Fourn., *Stipa plagiostephana* Speg., *Stipa violacea* Hitchc.

Hierba. Nativa. 2600-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(ANT).

Nassella carettei (Hauman) Torres

Sin.: *Stipa carettei* Hauman
Hierba. Endémica. 1200-2100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Nassella catamarcensis Torres

Hierba. Endémica. 1600-2000 m.
Países: ARG(CAT).

Nassella charruana (Arechav.)

Barkworth
Sin.: *Stipa charruana* Arechav., *Stipa longicylindrica* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, COL, FLO, MAL, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).

Nassella chilensis (Trin.) E. Desv.

Sin.: *Nassella floribunda* Phil., *Nassella landbeckii* Phil. var. *eremophila* Phil., *Nassella landbeckii* Phil., *Nassella laxiflora* Phil., *Nassella major* (Trin. & Rupr.) E. Desv., *Nassella obscura* F. Phil., *Nassella planifolia* Phil., *Nassella ramosa* E. Desv., *Nassella sadae* Phil., *Piptatherum lindleyanum* Nees, *Piptatherum ramosum* Nees, *Urachne chilensis* Trin., *Urachne major* Trin. & Rupr., *Urachne ramosa* Steud., nom. superfl.

Hierba. Endémica. 2700-5000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Nassella coquimbensis (Matthei) Peñailillo

Sin.: *Stipa coquimbensis* Matthei
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(COQ).

Nassella cordobensis (Speg.)

Barkworth
Sin.: *Stipa cordobensis* Speg., *Stipa cordobensis* Speg. var. *tuberculata* F.A. Roig, *Stipa papillosa* (Hack.) Hitchc., *Stipa tenuis* Phil. var. *papillosa* Hack.
Hierba. Endémica. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE).

Nassella crassiflora (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth

Sin.: *Stipa crassiflora* Roseng. & B.R. Arrill.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MAL).

Nassella curamalalensis (Speg.)

Barkworth
Sin.: *Stipa curamalalensis* Speg., *Stipa tenuissima* Trin. var. *curamalalensis* (Speg.) Hack.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA). URY(SOR).

Nassella depauperata (Pilg.)

Barkworth
Sin.: *Nassella depauperata* (Pilg.) Barkworth var. *glabrata* (Pilg.) Torres, *Stipa depauperata* Pilg., *Stipa depauperata* Pilg. var. *glabrata* Pilg., *Stipa depauperata* Pilg. var. *humilis* Pilg., *Stipa leptothera* Speg. var. *atroviolacea* Hack., *Stipa pumila* Mez
Hierba. Nativa. 3200-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

Nassella duriuscula (Phil.) Barkworth
Sin.: *Stipa duriuscula* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Nassella elata (Speg.) Torres
Sin.: *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg.
var. *elata* Speg.
Hierba. Nativa. 2200-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(ATA).

Nassella entrerriensis (Burkart)
Peñailillo
Sin.: *Stipa entrerriensis* Burkart
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(CAS).

Nassella fabrisii Torres
Hierba. Endémica. 1300-2000 m.
Países: ARG(COR, TUC).

Nassella famatinensis Torres
Hierba. Endémica. 300-3500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Nassella filiculmis (Delile) Barkworth
Sin.: *Stipa cerasiensis* Kuntze, *Stipa filiculmis* Delile, *Stipa filiculmis* Delile var. *major* Speg., *Stipa filiculmis* Delile var. *minor* Speg., *Stipa leucogluma* Steud., *Stipa trichocaulos* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(LBO, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(FLA, LAV, MAL, PAY, SOR, TYT).

Nassella formicarum (Delile)
Barkworth
Sin.: *Stipa formicarum* Delile
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE). URY(SOR).

Nassella gibba (Phil.) M. Muñoz
Sin.: *Nassella exserta* Phil. var. *asperata* Parodi, *Piptochaetium gibbum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Nassella gigantea (Steud.) M. Muñoz
Sin.: *Nassella aemulans* F. Phil., nom. nud., *Nassella exserta* Phil., *Nassella fuscescens* Phil., *Nassella melanocarpa* Phil., *Nassella pugae* Phil., *Urachne aemulans* Steud. ex Lechler, nom. nud., *Urachne gigantea* Steud., *Urachne*

melanocarpa Phil.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Nassella glabripoda Torres var. **glabripoda**
Hierba. Endémica. 2600-4500 m.
Países: ARG(JUU, LRI, SJU).

Nassella glabripoda Torres var. **planifolia** Torres
Hierba. Endémica. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUU, LRI).

Nassella hirtifolia (Hitchc.)
Barkworth
Sin.: *Stipa hirtifolia* Hitchc.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Nassella holwayii (Hitchc.) Barkworth
Sin.: *Stipa holwayii* Hitchc.
Hierba. Nativa. 3500-4200 m.
Países: ARG(JUU).

Nassella hunzikeri (Caro) Barkworth
Sin.: *Stipa hunzikeri* Caro
Hierba. Endémica. 900-1500 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Nassella hyalina (Nees) Barkworth
Sin.: *Stipa hyalina* Nees
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS). URY(CAS, FLO, FLA, MON, PAY, SOR).

Nassella inconspicua (J. Presl)
Barkworth
Sin.: *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *lilloi* Hack., *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *subelata* Speg., *Stipa inconspicua* J. Presl
Hierba. Nativa. 1600-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Nassella juergensii (Hack.) Barkworth
Sin.: *Stipa juergensii* Hack.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). BRA(RGS, SCA). URY(FLO, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TYT).

Nassella juncea Phil.
Sin.: *Nassella chilensis* (Trin.) E. Desv. var. *juncea* (Phil.) M. Muñoz
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(COQ, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, RME).

Nassella lachnophylla (Trin.)
Barkworth
Sin.: *Stipa cumingiana* Trin. var. *lachnophylla* (Trin.) Trin. & Rupr., *Stipa cumingiana* Trin., *Stipa hirta* Phil., *Stipa lachnophylla* Trin., *Stipa laxa* E. Desv., *Stipa leiocarpa* Nees ex Steud.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, ARA, RME, JFE).

Nassella laevisissima (Phil.) Barkworth
Sin.: *Nassella longearistata* Phil., *Piptochaetium collinum* Phil., *Piptochaetium laevisissimum* Phil., *Stipa breviculmis* Hitchc., *Stipa collina* Phil., *Stipa laevisissima* (Phil.) Speg., *Stipa lahittei* Parodi
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

Nassella leptocoronata (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth
Sin.: *Stipa leptocoronata* Roseng. & B.R. Arrill.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(ART, COL, SAO).

Nassella leptothera (Speg.) Torres
Sin.: *Stipa leptothera* Speg.
Hierba. Nativa. 2600-3800 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Nassella longicoronata (Roseng. & B.R. Arrill.) Barkworth
Sin.: *Stipa longicoronata* Roseng. & B.R. Arrill.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(ART).

Nassella longiglumis (Phil.)
Barkworth
Sin.: *Nassella clarazii* (Ball) Barkworth, *Stipa clarazii* Ball, *Stipa clarazii* Ball var. *bulbosa* Speg., *Stipa clarazii* Ball var. *typica* Speg., nom. inval., *Stipa longiglumis* Phil., *Stipa quadrifaria* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, RNE, SAL, SLU, SDE, TUC). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO). URY(MON).

Nassella macrathera (Phil.)
Barkworth
Sin.: *Stipa macrathera* Phil., *Stipa rudolphii* Speg., nom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, JFE).

Nassella macrotricha (F.A. Roig) Ciald.
Sin.: *Stipa macrotricha* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 1400-1500 m.
Países: ARG(SJU).

Nassella manicata (E. Desv.)
Barkworth
Sin.: *Stipa manicata* E. Desv.
Hierba. Endémica. 0-2800 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Nassella megapotamia (Spreng. ex Trin.) Barkworth
Sin.: *Stipa latifolia* Hack. ex Arechav., hom. illeg., *Stipa latissimifolia* Kuntze, *Stipa manicata* E. Desv. var. *latifolia* Speg., *Stipa manicata* E. Desv. var. *media* Speg., *Stipa megapotamia* Spreng. ex Trin., *Stipa megapotamica* Trin. & Rupr., nom. inval., *Stipa quinquenervis* Hack.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, COL, FLO, LAV, MAL, MON, RIV, SJO, SJO, TAC, TYT).

Nassella melanosperma (J. Presl)
Barkworth
Sin.: *Nassella bonariensis* (Henrard & Parodi) Barkworth *Stipa bonariensis* Henrard & Parodi, *Stipa melanosperma* J. Presl, *Stipa melanosperma* J. Presl var. *erythrina* Hack.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, MIE). URY(FLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).

Nassella mexicana (Hitchc.) Pohl
Sin.: *Stipa mexicana* Hitchc.
Hierba. Nativa. 2500-3300 m.
Países: ARG(JUU, LRI, SAL, TUC).

Nassella meyeniana (Trin. & Rupr.) Parodi
Sin.: *Nassella corniculata* Hack., *Piptochaetium laeve* (Nees) Pilg., *Stipa laevis* (Trin. & Rupr.) Parodi, comb. superfl., *Urachne laevis* Trin. & Rupr., *Urachne meyeniana* Trin. & Rupr.
Hierba. Nativa. 2600-5000 m.
Países: ARG(JUU, LRI, SAL).
CHL(AYP, TAR).

Nassella meyeri Torres
Hierba. Endémica. 2400-3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Nassella mucronata (Kunth) Pohl
Sin.: *Stipa mucronata* Kunth, *Stipa setigera* J. Presl
Hierba. Nativa. 2100-2500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Nassella nardoides (Phil.)
Barkworth
Sin.: *Danthonia nardoides* Phil., *Stipa calchaquia* Speg., *Stipa nardoides* (Phil.) Hack. ex Hitchc.
Hierba. Nativa. 3000-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Nassella neesiana (Trin. & Rupr.)
Barkworth
Sin.: *Nassella ligularis* (Griseb.) Barkworth & Torres, *Stipa contracta* Phil., *Stipa eminens* Nees, hom. illeg., *Stipa fernandeziana* Phil., hom. illeg., *Stipa hispida* Phil., *Stipa ligularis* (Griseb.) Speg., *Stipa longiflora* Steud., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. f. *contorta* Hack., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. f. *depauperata* Hack., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *chilensis* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *fernandeziana* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *formicarioides* Burkart, *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *glabrata* Arechav., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *gracilior* Burkart, *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *hirsuta* Arechav., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *hispidula* (Speg.) Hack., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *ligularis* Griseb., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *longiaristata* Arechav., *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *sublaevis* (Speg.) Speg. ex Caro, *Stipa neesiana* Trin. & Rupr. var. *sublaevis* (Speg.) Speg., comb. superfl., *Stipa setigera* J. Presl f. *pallida* Speg., *Stipa setigera* J. Presl f. *purpurascens* Speg., *Stipa setigera* J. Presl f. *versicolor* Speg., *Stipa setigera* J. Presl var. *glabrata* (Arechav.) Speg., *Stipa setigera* J. Presl var. *hispidula* Speg., *Stipa setigera* J. Presl var. *longiaristata* (Arechav.) Roseng., *Stipa skottsbergii* Pilg., *Stipa sublaevis* Speg., *Stipa trachysperma* Phil., *Urachne longiflora* Steud., nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-2700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(COA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Nassella nidulans (Mez) Barkworth
Sin.: *Stipa nidulans* Mez
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Nassella niduloides (Caro) Barkworth
Sin.: *Stipa niduloides* Caro
Hierba. Endémica. 1800-3100 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU).

Nassella novari Torres
Hierba. Endémica. 2000-3900 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Nassella nubicola (Speg.) Torres
Sin.: *Stipa nubicola* Speg.
Hierba. Nativa. 2800-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Nassella nutans (Hack.) Barkworth
Sin.: *Stipa nutans* Hack.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).

Nassella pampagrandensis (Speg.)
Barkworth
Sin.: *Stipa pampagrandensis* Speg.
Hierba. Nativa. 1300-3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Nassella pampeana (Speg.) Barkworth
Sin.: *Stipa pampeana* Speg.
Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SCR).

Nassella paramilloensis (Speg.)
Torres
Sin.: *Stipa gilliesii* Hitchc., *Stipa paramilloensis* Speg., *Stipa perrigida* Speg.
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Nassella parodii (Matthei) Barkworth
Sin.: *Stipa parodii* Matthei
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(LBO, BIO).

Nassella parva Torres
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).

Nassella pauciciliata (Roseng. & Izag.)
Barkworth
Sin.: *Stipa megapotamia* Spreng. ex Trin. var. *pauciciliata* Roseng. & Izag., *Stipa pauciciliata* (Roseng. & Izag.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MAL, ROC).

Nassella pfisteri (Matthei) Barkworth

Sin.: *Stipa pfisteri* Matthei
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(COQ, MAU, BIO).

Nassella philippii (Steud.) Barkworth

Sin.: *Stipa bavioensis* Speg., *Stipa bavioensis* Speg. var. *minor* Speg., *Stipa lenta* Hitchc., *Stipa philippii* Steud.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(CLA, MAL, RIV, SOR).

Nassella planaltina (A. Zanin &

Longhi-Wagner) Peñailillo
Sin.: *Stipa planaltina* A. Zanin &
Longhi-Wagner
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nassella poeppigiana (Trin. & Rupr.)
Barkworth

Sin.: *Nassella amethystina* (Steud.)
Barkworth, *Stipa amethystina* Steud.,
Stipa araucana Phil., *Stipa curicoana*
Phil., *Stipa julietii* Phil., *Stipa latifolia*
Hack. ex Arechav. var. *grandiflora* Hack.,
Stipa manicata E. Desv. var. *typica* Speg.,
nom. inval., *Stipa megapotamia* Spreng.
ex Trin. var. *latiflora* Roseng. & Izag.,
Stipa montana Phil., *Stipa poeppigiana*
Trin. & Rupr. var. *pubescens* F.A. Roig,
Stipa poeppigiana Trin. & Rupr., *Stipa*
pratensis Phil.
Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,
NEU, RNE, SLU). CHL(COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(MAL).

Nassella pseudopampagrandensis
(Caro) Barkworth

Sin.: *Stipa pseudopampagrandensis* Caro
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(COR, SAL, SLU, TUC).

Nassella psittacorum (Speg.)
Peñailillo

Sin.: *Stipa psittacorum* Speg.
Hierba. Endémica. 1500 m.
Países: ARG(MEN).

Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) E.

Desv. var. **humilior** (Hack.) Torres
Sin.: *Nassella flaccidula* Hack. var.
humilior Hack.
Hierba. Nativa. 4000-4500 m.
Países: ARG(JUU).

Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) E.

Desv. var. **levipoda** Torres
Hierba. Endémica. 3000-3600 m.
Países: ARG(JUU).

Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) E.

Desv. var. **pubiflora**
Sin.: *Calamagrostis anomala* Steud. ex
Lechler, nom. nud., *Nassella deltoidea*
Hack., *Nassella flaccidula* Hack., *Stipa*
airoides Mez, hom. illeg., *Stipa meziana*
Hicken, *Stipa pflanzii* Mez, *Stipa*
pubiflora (Trin. & Rupr.) M. Muñoz,
Stipa tiraquensis Kuntze, *Urachne*
pubiflora Trin. & Rupr.
Hierba. Nativa. 2200-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU,
TUC). CHL(AYP, TAR, COQ).

Nassella punensis Torres

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Nassella pungens E. Desv.

Sin.: *Nassella humilis* Phil., *Nassella*
johnstonii Parodi
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
COQ, LBO, RME).

Nassella quinqueciliata (Roseng. &
Izag.) Barkworth & Torres

Sin.: *Stipa nutans* Hack. var.
quinqueciliata Roseng. & Izag., *Stipa*
quinqueciliata (Roseng. & Izag.) A. Zanin
& Izag.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(MAL).

Nassella ragonesei Torres

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(CAT).

Nassella rhizomata (A. Zanin &
Longhi-Wagner) Peñailillo

Sin.: *Stipa rhizomata* A. Zanin &
Longhi-Wagner
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Nassella rosenfurtii (Chase)

Barkworth
Sin.: *Stipa rosenfurtii* Chase
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(MON, SAO, SOR).

Nassella rupestris (Phil.) Torres

Sin.: *Nassella dasycarpa* (Hitchc.)
Torres, *Stipa dasycarpa* Hitchc., *Stipa*
rupestris Phil.
Hierba. Nativa. 3200-4600 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ANT).

Nassella sanluisensis (Speg.)

Barkworth
Sin.: *Stipa debilis* Mez, *Stipa*
debilis Mez var. *papillosa* Caro, *Stipa*
sanluisensis Speg., *Stipa sanluisensis*
Speg. var. *longispicula* Caro
Hierba. Endémica. 0-2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA,
LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SDE).

Nassella sellowiana (Nees ex Trin. &
Rupr.) Peñailillo

Sin.: *Stipa eminens* Cav. var. *sellowiana*
(Nees ex Trin. & Rupr.) Kuntze, *Stipa*
molfinoi Speg., *Stipa sellowiana* Nees ex
Trin. & Rupr.
Hierba. Nativa. 200-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Nassella spegazzinii (Arechav.)

Barkworth
Sin.: *Stipa spegazzini* Arechav., *Stipa*
uruguaycola Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). URY(RNO).

Nassella stuckertii (Hack.) Barkworth

Sin.: *Stipa stuckertii* Hack.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR).

Nassella subnitida (Roseng. & B.R.
Arrill.) Barkworth

Sin.: *Jarava subnitida* (Roseng. & B.R.
Arrill.) Peñailillo, *Stipa subnitida* Roseng.
& B.R. Arrill.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(PAY, SAO).

Nassella tenuiculmis (Hack.)
Peñailillo

Sin.: *Stipa tenuiculmis* Hack.
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, LPA, RNE).
BRA(RGS, SCA). URY(TYT).

Nassella tenuis (Phil.) Barkworth

Sin.: *Stipa argentina* Speg., *Stipa*
neesiana Kuntze, hom. illeg., *Stipa*
puelches Speg., *Stipa tenuis* Phil., *Stipa*
tenuis Phil. var. *argentina* (Speg.) Speg.
Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,
LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR).
CHL(AYP, TAR, ANT, BIO, ARA, MAG).

Nassella tenuissima (Trin.)
Barkworth

Sin.: *Stipa geniculata* Phil., *Stipa*
mendocina Phil., *Stipa oreophila*

Speg., *Stipa tenuissima* Trin., *Stipa tenuissima* Trin. f. *colorata* F.A. Roig, *Stipa tenuissima* Trin. f. *nana* Parodi, *Stipa tenuissima* Trin. var. *oreophila* (Speg.) Speg., *Stipa tenuissima* Trin. var. *planicola* Speg.

Hierba. Endémica. 0-2900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TUC).

Nassella torquata (Speg.) Barkworth

Sin.: *Stipa torquata* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). URY(PAY, SAO).

Nassella trichotoma (Nees) Hack. ex Arechav.

Sin.: *Agrostis trichotoma* (Nees) Nees ex Trin., *Oryzopsis trichotoma* (Nees) Druce, *Piptatherum macrantherum* Nees ex B.D. Jacks., *Piptochaetium trichotomum* (Nees) Griseb., *Stipa macrathera* (Nees ex Steud.) Speg., hom. illeg., *Stipa trichotoma* Nees, *Urachne macranthera* Nees ex Steud., *Urachne trichotoma* (Nees) Trin.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(MON, SJO, SOR).

Nassella tucumana (Parodi) Torres

Sin.: *Stipa tucumana* Parodi
Hierba. Nativa. 900-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Nassella uspallatensis (Speg.) Torres

Sin.: *Stipa uspallatensis* Speg.
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Nassella vallsii (A. Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo

Sin.: *Stipa vallsii* A. Zanin & Longhi-Wagner
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Nassella ventanica (Cabrera & Torres) Barkworth

Sin.: *Stipa ventanica* Cabrera & Torres
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(BAI).

Nassella yaviensis Torres

Hierba. Endémica. 3400-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Neobouteloua Gould

Neobouteloua lophostachya (Griseb.) Gould

Sin.: *Bouteloua lophostachya* Griseb., *Bouteloua nana* Griseb.
Hierba. Endémica. 400-900 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Neobouteloua paucirracemosa M.G.

López & Biurrun
Hierba. Endémica.
Países: ARG(LRI, SLU).

Nicoraepoa Soreng & L.J. Gillespie

Nicoraepoa andina (Trin.) Soreng & L.J. Gillespie subsp. **andina**

Sin.: *Deschampsia latifolia* Phil., hom. illeg., *Poa acrochaeta* Hack., *Poa andina* Trin., *Poa aristata* Phil., *Poa straminea* Steud., nom. nud.

Hierba. Endémica. 300-2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Nicoraepoa andina (Trin.) Soreng & L.J. Gillespie subsp. **chonotica** (Phil.) Finot, Soreng & Giussani

Sin.: *Nicoraepoa chonotica* (Phil.) Soreng & L.J. Gillespie, *Poa berningeri* Pilg., *Poa borchersii* Phil., *Poa chonotica* Phil., *Poa chubutensis* Speg., *Poa latifolia* Phil., hom. illeg., *Poa robusta* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Nicoraepoa erinacea (Speg.) Soreng & L.J. Gillespie

Sin.: *Poa erinacea* Speg.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CHU).

Nicoraepoa pugionifolia (Speg.)

Soreng & L.J. Gillespie
Sin.: *Poa acutissima* Pilg., *Poa pugionifolia* Speg.
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Nicoraepoa robusta (Steud.) Soreng & L.J. Gillespie

Sin.: *Festuca arenaria* Lam., hom. illeg., *Poa arenicola* St.-Yves, *Poa robusta* Steud.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(TDF). CHL(AIS, MAG).

Nicoraepoa stepparia (Nicora) Soreng

Sin.: *Poa stepparia* Nicora
Hierba. Endémica. 900-1200 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Nicoraepoa subenervis (Hack.)

Soreng & L.J. Gillespie subsp.
spgazziniana (Nicora) Soreng & L.J. Gillespie

Sin.: *Poa spgazziniana* Parodi, nom. nud., *Poa subenervis* Hack. var. *spgazziniana* Nicora
Hierba. Endémica. 2600-3400 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(LBO, RME).

Nicoraepoa subenervis (Hack.)

Soreng & L.J. Gillespie subsp.
subenervis

Sin.: *Poa subenervis* Hack.
Hierba. Endémica. 700-3200 m.
Países: ARG(MEN, SCR, SJU). CHL(MAG, RME).

Ocellochloa Zuloaga & Morrone

Ocellochloa rudis (Nees) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum albospiculatum* Swallen, *Panicum apricum* Swallen, *Panicum kleinii* Swallen, *Panicum rude* Nees, *Panicum secundum* Trin., *Panicum semitectum* Swallen, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 400-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ocellochloa stolonifera (Poir.)

Zuloaga & Morrone
Sin.: *Panicum frondescens* G. Mey., *Panicum stoloniferum* Poir.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Oedochloa C. Silva & R.P. Oliveira

Oedochloa minarum (Nees) C. Silva & R.P. Oliveira

Sin.: *Echinolaena minarum* (Nees) Pilg., *Ichnanthus lilloi* Hack., *Ichnanthus minarum* (Nees) Döll, *Oplismenus minarum* Nees
Hierba. Nativa. 500-2600 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR).

Oedochloa procurrens (Nees ex Trin.)

C. Silva & R.P. Oliveira

Sin.: *Echinolaena procurrens* (Nees ex Trin.) Kunth, *Ichnanthus procurrens* (Nees ex Trin.) Stieber, *Panicum procurrens* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, PAI).

Olyra L.

Olyra ciliatifolia Raddi

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, PAI).

Olyra fasciculata Trin.

Sin.: *Olyra heliconia* Lindm.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA).

Olyra glaberrima Raddi

Sin.: *Olyra corcovadensis* Warwa, *Olyra obliqua* Desv., *Olyra semiovata* Trin., *Olyra semiovata* Trin. var. *pubescens* Hack., *Olyra semiovata* Trin. var. *pubiflora* Hack.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Olyra humilis Nees

Sin.: *Olyra glaberrima* Raddi var. *humilis* (Nees) Mez, *Olyra humilis* Nees var. *angustifolia* Döll, *Olyra humilis* Nees var. *latifolia* Döll, *Olyra semiovata* Trin. var. *humilis* (Nees) Hack.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA).

Olyra latifolia L.

Sin.: *Olyra arundinacea* Kunth, *Olyra brevifolia* Schumach., *Olyra cordifolia* Kunth, *Olyra latifolia* L. var. *arundinacea* (Kunth) Griseb., *Olyra latifolia* L. var. *gabriuscula* Döll, nom. superfl., *Olyra latifolia* L. var. *pubescens* Döll, *Olyra latifolia* L. var. *vestita* Henrard, *Olyra media* Desv., *Olyra paniculata* Sw., *Olyra pubescens* Raddi, *Olyra scabra* Nees

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN).

Oncorachis Morrone & Zuloaga

Oncorachis macrantha (Trin.)

Morrone & Zuloaga
Sin.: *Panicum macranthum* Trin., *Streptostachys macrantha* (Trin.) Zuloaga & Soderstr.

Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Oplismenopsis Parodi

Oplismenopsis najada (Hack. & Arechav.) Parodi

Sin.: *Echinochloa najada* (Hack. & Arechav.) Parodi, *Panicum najadum* Hack. & Arechav.
Hierba palustre. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(COL).

Oplismenus P. Beauv., nom. cons.

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. subsp. **hirtellus**

Sin.: *Oplismenus loliaceus* (Lam.) P. Beauv., *Orthopogon loliaceus* (Lam.) Spreng., *Panicum hirtellum* L., *Panicum loliaceum* Lam., *Panicum setarium* Lam.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ROC).

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. subsp. **setarius** (Lam.) Mez ex Ekman

Sin.: *Oplismenus setarius* (Lam.) Roem. & Schult., *Orthopogon setarius* (Lam.) Spreng.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(MAL).

Ortachne Nees ex Steud.

Ortachne breviseta Hitchc.

Sin.: *Stipa breviseta* (Hitchc.) Martic. & Quezada, hom. illeg., *Stipa yatesensis* Martic. & Quezada
Hierba. Nativa. 1000-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LRI, LLA).

Ortachne rariflora (Hook. f.) Hughes

Sin.: *Muhlenbergia rariflora* Hook. f., *Ortachne retorta* Nees ex Steud., *Stipa rariflora* (Hook. f.) Benth., *Stipa retorta* (Nees ex Steud.) Mez, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(RNE, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Orthoclada P. Beauv.

Orthoclada laxa (Rich.) P. Beauv.

Sin.: *Aira laxa* Rich., *Poa rariflora* (Lam.) Roem. & Schult., *Panicum rariflorum* Lam., *Poa subumbellata* Roem. & Schult., *Orthoclada rariflora* (Lam.) P. Beauv., *Orthoclada rariflora* (Lam.) P. Beauv. var. *lanceolata* Döll, *Orthoclada rariflora* (Lam.) P. Beauv. var. *sesquiteria* Döll
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Oryza L.

Oryza latifolia Desv.

Sin.: *Oryza alta* Swallen, *Oryza latifolia* Desv. var. *grandispiculis* A. Chev., *Oryza sativa* L. var. *latifolia* (Desv.) Döll
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, BOQ, CON, COA, ÑEE, PHA).

Oryza rufipogon Griff.

Sin.: *Oryza paraguayensis* Wedd. ex E. Fourn., *Oryza sativa* L. var. *paraguayensis* Parodi, hom. illeg., *Oryza sativa* L. var. *savannae* Körn., *Oryza sativa* L. var. *sundensis* Körn.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(Desconocida).

Oryza sativa L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Oswaldoa J.R. Grande

Oswaldoa valida (Mez) J.R. Grande

Sin.: *Panicum validum* Mez
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(PAY).

Otachyrium Nees**Otachyrium versicolor** (Döll) Henrard

Sin.: *Otachyrium truncatum* (Nees)
Pilg., comb. superfl., *Panicum truncatum*
Nees, hom. illeg., *Panicum versicolor* Döll
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN,
CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Panicum L.**Panicum antidotale** Retz.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ). BRA(RGS).

Panicum aquaticum Poir.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Panicum bergii Arechav. var. **bergii**

Sin.: *Panicum bergii* Arechav. f. *convoluta*
R.A. Palacios, *Panicum burkartii* Zuloaga,
Panicum pilcomayense Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SLU, SFE,
SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, BOQ, CEN, CON, MIE, ÑEE,
PAI, PHA). URY(CAS, CLA, FLO, MAL,
PAY, ROC, SJO, SOR, TAC).

Panicum bergii Arechav. var.

pilosissimum Zuloaga
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA).

Panicum campestre Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 500-1400 m.
Países: BRA(PAR).

Panicum capillare L.

Sin.: *Chasea capillaris* (L.) Nieuwl.,
Leptoloma capillaris (L.) Smyth, *Milium*
capillare (L.) Moench, hom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, JUJ,
LPA, NEU, RNE, SLU, SFE). BRA(RGS).
CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA, RME). URY(MON).

Panicum cayennense Lam.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Panicum cervicatum Chase

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Panicum chasiae Roseng., B.R. Arrill.
& Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(RGS).
URY(MAL, RIV, SAO, SOR, TAC).

Panicum chloroleucum Griseb.

Sin.: *Panicum urvilleanum* Kunth var.
chloroleucum (Griseb.) Kuntze
Hierba. Endémica. 1800-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Panicum dichotomiflorum Michx.

Sin.: *Panicum aquaticum* Poir. var.
chloroticum (Nees ex Trin.) R.C. Foster,
Panicum chloroticum Nees ex Trin.,
Panicum proliferum Lam. var. *chloroticum*
(Nees ex Trin.) Hack., *Panicum*
proliferum Lam. var. *xanthochlorum*
Hack. ex Bertoni, nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, LPA, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, RME).
PRY(APY, APA, AMA, CEN, COA, GUA,
ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART,
MON, PAY, SAO).

Panicum exiguum Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CON).

Panicum glabripes Döll

Sin.: *Panicum glabripes* Döll subsp.
subjunceum (Ekman) Roseng., B.R. Arrill.
& Izag., *Panicum subjunceum* Ekman
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE). BRA(PAR,
RGS, SCA). URY(PAY, RNO, RIV).

Panicum gounii E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

Panicum hirsutum Sw.

Sin.: *Panicum chacoense* Parodi
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA).

Panicum longipedicellatum Swallen

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Panicum longissimum (Mez) Henrard

Sin.: *Sacciolepis longissima* Mez
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: PRY(PAI).

Panicum magnispicula Zuloaga,
Morrone & Valls

Hierba. Endémica. 1200 m.
Países: BRA(SCA).

Panicum miliaceum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,
ERI, LPA, LRI, MEN, SAL, SFE, TUC).
BRA(RGS, SCA). CHL(BIO). URY(CLA,
COL, MON).

Panicum millegrana Poir.

Sin.: *Panicum rugulosum* Trin., *Panicum*
rugulosum Trin. f. *effusum* Hack., *Panicum*
rugulosum Trin. var. *subvelutinum* Döll,
Panicum subglobosum Hack.
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,
CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Panicum olyroides Kunth var.

hirsutum Henrard
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA).
URY(RIV).

Panicum olyroides Kunth var.
olyroides

Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN,
CON, GUA, MIE, PAI).

Panicum pedersenii Zuloaga

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CEN, COA).

Panicum peladoense Henrard

Sin.: *Panicum bergii* Arechav. var.
leiophyllum Hack. & Lindm.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS,
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CON, GUA, PAI). URY(RIV, TAC).

Panicum quadriglume (Döll) Hitchc.

Sin.: *Panicum cayennense* Lam. var.
quadriglume Döll
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área
del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN,
CON, COA, PAI).

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.

Sin.: *Monachne racemosa* P. Beauv.,
Panicum montevidense Spreng. ex Döll,

Panicum reptans (Lam.) Kunth, comb. superfl., *Saccharum reptans* Lam., *Thalassium montevidense* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(COL, MON, ROC, SJO).

Panicum repens L.

Sin.: *Panicum nitidum* Hack. & Arechav., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Panicum rudgei Roem. & Schult.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Panicum sellowii Nees

Sin.: *Panicum rugulosum* Trin. var. *condensatum* Hack.

Hierba. Nativa. 100-1600 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, SPE). URY(TYT).

Panicum stramineum Hitchc. & Chase

Sin.: *Panicum caatingense* Renvoize, *Panicum capillare* L. var. *stramineum* (Hitchc. & Chase) Gould, *Panicum hirticaule* J. Presl var. *stramineum* (Hitchc. & Chase) Beetle

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL). BRA(SCA). PRY(APY, CON, COA, PHA).

Panicum trichanthum Nees

Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

Panicum trichoides Sw.

Hierba. Nativa. 900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Panicum tricholaenoides Steud. var. **flavomarginatum** (Mez) Zuloaga

Sin.: *Panicum flavomarginatum* Mez
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CAA, CEN, PAI, PHA).

Panicum tricholaenoides Steud. var. **tricholaenoides**

Sin.: *Panicum bambusoides* Speg. ex Arechav., hom. illeg., *Panicum junceum* Nees, hom. illeg., *Panicum junceum* Nees

var. *strictus* Döll, *Panicum junceum* Nees var. *subnutans* Döll, *Panicum pilgeri* Herter, nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, PHA, SPE). URY(ART, DUR, PAY, SAO).

Panicum urvilleanum Kunth

Sin.: *Monachne urvilleana* (Kunth) Herter, *Panicum patagonicum* Hieron., *Panicum reversipilum* Steud., *Panicum urvilleanum* Kunth f. *subpilosum* Kuntze, *Panicum urvilleanum* Kunth var. *versicolor* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). CHL(LBO, BIO, ARA, LRI, LLA).

Pappophorum Schreb.

Pappophorum caespitosum R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY).

Pappophorum hassleri Hack.

Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Pappophorum krapovickasii Roseng.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). PRY(APY).

Pappophorum macrospermum

Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(RNO, RIV).

Pappophorum pappiferum (Lam.)

Kuntze
Sin.: *Pappophorum alopecuroideum* Vahl, *Pappophorum alopecuroideum* Vahl var. *glabrum* Döll, *Pappophorum alopecuroideum* Vahl var. *pilosiusculum* Döll, *Pappophorum elongatum* Spreng., *Pappophorum laguroideum* Schrad. ex Schult., *Pappophorum macrostachyum* Schrad. ex Schult., *Pappophorum saccharoides* Griseb., *Saccharum pappiferum* Lam.

Hierba. Nativa. 1600-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CEN, PHA). URY(MON).

Pappophorum phillippianum Parodi

Sin.: *Pappophorum mucronulatum* Nees f. *intermedia* Hack., *Pappophorum mucronulatum* Nees var. *subsimplax* Hack., *Pappophorum mucronulatum* Nees var. *vaginatum* (Phil.) Hack., *Pappophorum vaginatum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 2800-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Pappophorum vaginatum Buckley

Sin.: *Pappophorum mucronulatum* Nees f. *elatior* Stuck., *Pappophorum subbulbosum* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, CON). URY(MON, PAY).

Pappostipa (Speg.) Romasch., P.M. Peterson & Soreng

Pappostipa ameghinoi (Speg.)

Romasch.
Sin.: *Jarava ameghinoi* (Speg.) Peñailillo var. *digona* (Parodi) Peñailillo, *Jarava ameghinoi* (Speg.) Peñailillo, *Pappostipa ameghinoi* (Speg.) Romasch. var. *digona* (Parodi) Romasch., *Stipa ameghinoi* Speg. var. *digona* Parodi, *Stipa ameghinoi* Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).

Pappostipa arenicola (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Jarava arenicola* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa arenicola* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(SCR).

Pappostipa atacamensis (Parodi) Romasch.

Sin.: *Jarava atacamensis* (Parodi) Peñailillo, *Stipa atacamensis* Parodi
Hierba. Endémica. 1900-4300 m.
Países: ARG(CAT). CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

Pappostipa barrancaensis (F.A. Roig) Romasch.

Sin.: *Jarava barrancaensis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Nassella barrancaensis* (F.A. Roig) Barkworth, *Pappostipa barrancaensis* (F.A. Roig) Romasch., nom. inval., *Stipa barrancaensis* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Pappostipa braun-blanqueti (F.A. Roig) Romasch.

Sin.: *Jarava braun-blanquetii* (F.A. Roig) Peñailillo, *Stipa braun-blanquetii* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(MEN).

Pappostipa choconensis (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa choconensis* F.A. Roig
Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU).

Pappostipa chrysophylla (E. Desv.) Romasch. var. **chrysophylla**

Sin.: *Jarava ameghinoi* (Speg.) Peñailillo var. *precordillerana* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo f. *minuta* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo f. *modica* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo var. *cordilleranum* (Parodi) Peñailillo, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo, *Pappostipa ameghinoi* (Speg.) Romasch. var. *precordillerana* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa chrysophylla* (E. Desv.) Romasch. f. *minuta* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa chrysophylla* (E. Desv.) Romasch. f. *modica* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa chrysophylla* (E. Desv.) Romasch. var. *cordillerarum* (Parodi) Romasch., *Stipa ameghinoi* Speg. var. *precordillerana* F.A. Roig, *Stipa chrysophylla* E. Desv. f. *minuta* F.A. Roig, *Stipa chrysophylla* E. Desv. f. *modica* F.A. Roig, *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *cordillerarum* Parodi, *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *major* E. Desv., *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *minor* Desv., *Stipa chrysophylla* E. Desv., *Stipa humilis* Cav. f. *chrysophylla* (Desv.) Kuntze, *Stipa kurtzii* Mez, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. subsp. *chrysophylla* (E. Desv.) Dusén, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *andina* Hauman, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *gymnostachya* Hauman
Hierba. Endémica. 500-4300 m.
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN,

NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF).
CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME).

Pappostipa chrysophylla (E. Desv.) Romasch. var. **crispula** (Kuntze)

Romasch.
Sin.: *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñailillo var. *crispula* (Kuntze) Peñailillo, *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *crispula* (Kuntze) Parodi, *Stipa humilis* Cav. f. *crispula* Kuntze
Hierba. Endémica. 1500-1800 m.
Países: ARG(MEN).

Pappostipa chubutensis (Speg.) Romasch.

Sin.: *Jarava chubutensis* (Speg.) Peñailillo var. *hirsutissima* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava chubutensis* (Speg.) Peñailillo, *Pappostipa chubutensis* (Speg.) Romasch. var. *hirsutissima* (F.A. Roig) Romasch., *Stipa chubutensis* Speg. var. *hirsutissima* F.A. Roig, *Stipa chubutensis* Speg., *Stipa dasyncnemis* Speg.
Hierba. Endémica. 0-2800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU, SCR).

Pappostipa colloncurensis (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa colloncurensis* F.A. Roig
Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU).

Pappostipa frigida (Phil.) Romasch. var. **frigida**

Sin.: *Jarava frigida* (Phil.) F. Rojas, *Stipa brevifolia* Phil., *Stipa frigida* Phil.
Hierba. Endémica. 3500-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU, RME).

Pappostipa frigida (Phil.) Romasch. var. **longifolia** (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa frigida* Phil. var. *longifolia* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.
Países: ARG(LRI).

Pappostipa frigida (Phil.) Romasch. var. **parvispicula** (Parodi) Romasch.

Sin.: *Jarava frigida* (Phil.) F. Rojas var. *parvispicula* (Parodi) Peñailillo, *Stipa frigida* Phil. var. *parvispicula* Parodi
Hierba. Endémica. 3000-4100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Pappostipa hieronymusii (Pilg.) Sin.: *Jarava hieronymusii* (Phil.)

Peñailillo, *Stipa hieronymusii* Pilg.
Hierba. Endémica. 2900-4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU).

Pappostipa humilis (Cav.) Romasch. var. **decrescens** (Kuntze) Romasch.

Sin.: *Jarava humilis* (Cav.) Peñailillo var. *decrescens* (Kuntze) Peñailillo, *Stipa humilis* Cav. var. *decrescens* Kuntze
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).

Pappostipa humilis (Cav.) Romasch. var. **humilis**

Sin.: *Jarava humilis* (Cav.) Peñailillo, *Stipa humilis* Cav., *Stipa humilis* Cav. var. *intermedia* Kuntze, *Stipa humilis* Cav. f. *major* Speg.
Hierba. Endémica. 0-1900 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Pappostipa humilis (Cav.) Romasch. var. **ruiziana** (Parodi) Romasch.

Sin.: *Jarava humilis* (Cav.) Peñailillo var. *ruiziana* (Parodi) Peñailillo, *Stipa humilis* Cav. var. *ruiziana* Parodi
Hierba. Endémica. 2000-3200 m.
Países: ARG(LPA, MEN, SJU).

Pappostipa ibarii (Phil.) Romasch. f. **ibarii**

Sin.: *Jarava ibarii* (Phil.) Peñailillo, *Jarava ibarii* (Phil.) Peñailillo var. *anomala* (Parodi) Peñailillo, *Pappostipa ibarii* (Phil.) Romasch. var. *anomala* (Parodi) Romasch., *Stipa ibarii* Phil., *Stipa ibarii* Phil. var. *anomala* Parodi
Hierba. Endémica. 100-900 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(MAG).

Pappostipa ibarii (Phil.) Romasch. f. **pallescens** (Parodi) Romasch.

Sin.: *Jarava ibarii* (Phil.) Peñailillo f. *pallescens* (Parodi) Peñailillo, *Stipa ibarii* Phil. f. *pallescens* Parodi
Hierba. Endémica. 2600-2800 m.
Países: ARG(MEN).

Pappostipa jucunda (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa jucunda* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 2800 m.
Países: ARG(MEN).

Pappostipa kieslingii (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa kieslingii* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 1700-2100 m.
Países: ARG(LRI, SJU).

Pappostipa maeviae (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava maeviae* (F.A. Roig)
Peñailillo, *Stipa maeviae* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 2900-3000 m.
Países: ARG(NEU).

Pappostipa malalhuensis (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava malalhuensis* (F.A. Roig)
Peñailillo, *Stipa malalhuensis* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN).

Pappostipa mapuche (F.A. Roig) Ciald.

Sin.: *Stipa mapuche* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 800 m.
Países: ARG(NEU).

Pappostipa marqueziana (F.A. Roig)

Ciald.

Sin.: *Stipa marqueziana* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(SJU).

Pappostipa nana (Speg.) Romasch.

Sin.: *Jarava nana* (Speg.) Peñailillo,
Stipa nana Speg.
Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: ARG(SCR). CHL(AIS).

Pappostipa nicorae (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava nicorae* (F.A. Roig)
Peñailillo, *Stipa nicorae* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 3300-3700 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU).

Pappostipa parodiana (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava parodiana* (F.A. Roig)
Peñailillo, *Stipa parodiana* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 500-1600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Pappostipa ruiz-lealii (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava ruiz-lealii* (F.A. Roig)
Peñailillo, *Stipa ruiz-lealii* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 2800-3700 m.
Países: ARG(CAT, MEN).

Pappostipa semperiana (F.A. Roig)

Romasch.

Sin.: *Jarava semperiana* (F.A. Roig)
Peñailillo, *Stipa semperiana* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 500-2800 m.
Países: ARG(LPA, MEN, SJU).

Pappostipa sorianoi (Parodi)

Romasch.

Sin.: *Jarava sorianoi* (Parodi)
Peñailillo, *Stipa sorianoi* Parodi
Hierba. Endémica. 400-600 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Pappostipa speciosa (Trin. & Rupr.)

Romasch.

Sin.: *Achnatherum speciosum* (Trin. & Rupr.) Barkworth, *Jarava patagonica* (Speg.) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo f. *abscondita* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo f. *horrida* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *atuelensis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *breviglumis* (Parodi) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *ciliata* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *major* (Speg.) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *manqueclensis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *media* (Torres) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo var. *parva* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava speciosa* (Trin. & Rupr.) Peñailillo, *Pappostipa major* (Speg.) Romasch., *Pappostipa patagonica* (Speg.) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. f. *abscondita* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. f. *horrida* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *atuelensis* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *breviglumis* (Parodi) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *ciliata* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *manqueclensis* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *media* (Torres) Romasch., *Pappostipa speciosa* (Trin. & Rupr.) Romasch. var. *parva* (F.A. Roig) Romasch., *Stipa diastrophica* F.A. Roig, *Stipa humilis* Cav. f. *minor* Speg., *Stipa humilis* Cav. var. *speciosa* (Trin. & Rupr.) Kuntze, *Stipa patagonica* Speg., *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *abscondita* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *atuelensis* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *horrida* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *major* Speg., *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. f. *minor* Speg., *Stipa speciosa* Trin.

& Rupr. var. *atuelensis* (F.A. Roig) F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *breviglumis* Parodi, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *ciliata* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *gualilanensis* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *major* (Speg.) Parodi, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *manqueclensis* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *media* Torres, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *parva* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *punae* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *rhomalea* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *uncinata* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. var. *vizcacharum* F.A. Roig, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr., *Stipa tehuelches* Speg., Hierba. Nativa. 0-4200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Pappostipa vaginata (Phil.) Romasch.

Sin.: *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas f. *contracta* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas f. *immersa* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas f. *laevis* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas f. *rigida* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas var. *argyroidea* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas var. *dilatata* (F.A. Roig) Peñailillo, *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas, *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. f. *contracta* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. f. *immersa* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. f. *laevis* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. var. *argyroidea* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Phil.) Romasch. var. *dilatata* (F.A. Roig) Romasch., *Pappostipa vaginata* (Pilg.) f. *rigida* (F.A. Roig) Romasch., *Stipa cacheutensis* Speg. var. *exserta* F.A. Roig, *Stipa cacheutensis* Speg., *Stipa formosa* Phil., *Stipa vaginata* Phil. f. *contracta* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. f. *immersa* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. f. *laevis* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. f. *rigida* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *argyroidea* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *dilatata* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *flexilifolia* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *linealis* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil. var. *serrana* F.A. Roig, *Stipa vaginata* Phil.

Hierba. Nativa. 1100-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Pappostipa vatroensis (F.A. Roig)
Romasch.

Sin.: *Jarava vatroensis* (F.A. Roig)
Peñailillo, *Stipa vatroensis* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU,
RNE, SCR).

Pappostipa zulmae (F.A. Roig) Ciald.
Sin.: *Stipa zulmae* F.A. Roig
Hierba. Endémica. 400-500 m.
Países: ARG(LPA, NEU).

Parapholis C.E. Hubb.

Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb.
Sin.: *Aegilops incurva* L., *Pholiurus*
incurvus (L.) Schinz & Thell.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, SLU,
SCR, SFE). CHL(COQ, VAL, BIO, RME).
URY(MON, SJO).

Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.
Hubb.

Sin.: *Lepturus strigosus* Dumort.
Hierba. Introducida. 0-200 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Parodiolyra Soderstr. & Zuloaga

Parodiolyra micrantha (Kunth)
Davidse & Zuloaga

Sin.: *Olyra micrantha* Kunth, *Olyra*
micrantha Kunth var. *decalvata* Döll,
Olyra micrantha Kunth var. *dioecia*
Döll, *Olyra micrantha* Kunth var.
lanceolata Döll, *Olyra micrantha* Kunth
var. *subvelutina* Döll, *Olyra urvillei*
Steud., *Olyra ventricosa* Nees
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, AMA, CAN, PAI).

Parodiophyllochloa Zuloaga &
Morrone

Parodiophyllochloa cordovensis (E.
Fourn.) Zuloaga & Morrone

Sin.: *Dichantherium cordovense* (E.
Fourn.) Davidse, *Panicum cordovense* E.
Fourn., *Panicum dusenii* Hack.
Hierba. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL,
TUC). BRA(PAR, SCA).

Parodiophyllochloa missiona

(Ekman) Zuloaga & Morrone
Sin.: *Panicum gracilipes* Hack., *Panicum*
gracilipes Hack. var. *pubiflorum* Hack.,
Panicum missionum Ekman, *Panicum*
unilineatum Mez
Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU,
ITA). URY(MAL, TAC).

Parodiophyllochloa ovulifera (Trin.)
Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum enneaneurum*
Griseb., *Panicum ovuliferum* Trin. var.
intermedium L.B. Sm. & Wassh., *Panicum*
ovuliferum Trin.
Hierba. Nativa. 0-2400 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
CEN, COA, ITA, MIE, PAI, SPE).
URY(CLA, LAV, MAL, ROC, TAC).

Parodiophyllochloa pantricha

(Hack.) Zuloaga & Morrone
Sin.: *Dichantherium pantrichum*
(Hack.) Davidse, *Panicum pantrichum*
Hack., *Panicum protractum* Mez, *Panicum*
warmingii Mez
Hierba. Nativa. 0-2400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA,
GUA, ÑEE).

Parodiophyllochloa rhizogona

(Hack.) Zuloaga & Morrone
Sin.: *Panicum rhizogonum* Hack.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum L.

Paspalum acuminatum Raddi

Sin.: *Paspalum serratum* Hitchc. &
Chase
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, ITA).

Paspalum alnum Chase

Sin.: *Paspalum hexastachyum* Parodi,
Paspalum ovale Nees ex Steud. var.
apiculatum Hack.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APY,
CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).
URY(ART, PAY).

Paspalum ammodes Trin.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

Paspalum approximatum Döll

Sin.: *Paspalum parinervium* Mez
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN).

Paspalum arenarium Schrad.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum arundinellum Mez

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
PRY(APA, APY, CAU, CEN, COA, GUA,
ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Paspalum atratum Swallen

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

Paspalum bertonii Hack.

Sin.: *Paspalum niederleinii* Mez,
Paspalum potamophilum Renvoize
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, CAU, CAN, ITA, MIE).

Paspalum buckleyanum Vasey

Sin.: *Paspalum alcalinum* Mez
Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR,
JUJ, SAL, SFE, SDE). PRY(APY, PHA).

Paspalum candidum (Humb. & Bonpl.
ex Flügge) Kunth

Sin.: *Paspalum depauperatum* J. Presl,
Paspalum lineispatha Mez, *Paspalum*
scabrum Scribn., *Paspalum vinosum* Mez,
Reimaria candida Humb. & Bonpl. ex
Flügge
Hierba. Nativa. 1000-4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(VAL).

Paspalum carinatum Humb. & Bonpl.
ex Flügge

Hierba. Nativa. 800-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paspalum ceresia (Kuntze) Chase

Sin.: *Ceresia elegans* Pers., *Ceresia*
membranacea (Lam.) P. Beauv., *Panicum*
ceresia Kuntze, *Paspalum elegans* (Pers.)
Roem. & Schult., comb. illeg., *Paspalum*
membranaceum Lam., hom. illeg.,
Paspalum membranaceum Lam. var.
aequiglume Döll
Hierba. Nativa. 400-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Paspalum chacoense Parodi

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY, BOQ, CON, GUA).

Paspalum chaseanum Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). PRY(APY).

Paspalum chilense Catanzaro & G.H. Rua

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LLA).

Paspalum cinerascens (Döll) A.G.

Burm. & C.N. Bastos

Sin.: *Panicum cinerascens* Döll, *Thrasya cinerascens* (Döll) Judz.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

Paspalum commune Lillo

Sin.: *Paspalum collinum* Chase,
Paspalum virgatum L. f. *oligostachyum*
Hack., nom. nud.

Hierba. Nativa. 800-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).

Paspalum compressifolium Swallen

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, MIE).

Paspalum conduplicatum Canto-

Dorow, Valls & Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum conjugatum P.J. Bergius

Sin.: *Paspalum renggeri* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(IPA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Paspalum conspersum Schrad.

Sin.: *Paspalum virgatum* L. var.
conspersum (Schrad.) Döll

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, COA, ÑEE, PHA).

Paspalum corcovadense Raddi

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum cordatum Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Paspalum crispatum Hack.

Hierba. Nativa. 0-200 m.
Países: PRY(AMA).

Paspalum cromyorrhizon Trin. ex Döll

Sin.: *Paspalum notatum* Flüggé var.
cromyorrhizon (Trin. ex Döll) Herter,
Paspalum notatum Flüggé var. *erionrhizon*
Griseb.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). URY(CLA, DUR, MON, RNO, SAO, SOR).

Paspalum dasypleurum Kunze ex E. Desv.

Sin.: *Paspalum cumingii* Nees ex
Steud., *Paspalum pachyrrhizum* Steud.,
Paspalum paradisiacum Steud.

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(NEU, SLU). CHL(ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE).

Paspalum dasytrichum Dusén ex

Swallen

Sin.: *Paspalum dasytrichum* Dusén ex
Swallen var. *glabrum* L.B. Sm. & Wassh.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paspalum decumbens Sw.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paspalum dedecae Quarín

Sin.: *Paspalum doellii* Chase ex
Dedecca, nom. inval., *Paspalum doellii*
Chase ex Filg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CAU, CAN, GUA).

Paspalum denticulatum Trin.

Sin.: *Paspalum hieronymii* Hack.,
Paspalum jujuyense Zuloaga, *Paspalum lividum* Trin. ex Schltld., *Paspalum proliferum* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA).
PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CHO, PHA).
URY(CAS, COL, MON, PAY, SAO, SOR).

Paspalum dilatatum Poir. subsp. **dilatatum**

Sin.: *Digitaria dilatata* (Poir.) Coste,
Panicum platense (Spreng.) Kuntze,
Paspalum dilatatum Poir. f. *paucispica*
Hack., nom. nud., *Paspalum dilatatum*

Poir. var. *sacchariferum* Arechav., *Paspalum eriophorum* Schult., *Paspalum lanatum* Spreng., hom. illeg., *Paspalum ovatum* Nees ex Trin., *Paspalum ovatum* Nees, hom. illeg., *Paspalum ovatum* Nees ex Trin. var. *grandiflorus* Nees, *Paspalum pedunculare* J. Presl, *Paspalum platense* Spreng., *Paspalum selloi* Spreng., nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, IPA).
PRY(PAI). URY(ART, COL, MAL, MON).

Paspalum dilatatum Poir. subsp.**flavescens** Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS). BRA(RGS, SCA). URY(MAL, MON).

Paspalum distichum L.

Sin.: *Anastrophus paspaloides* (Michx.)
Nash, *Paspalum chepica* Steud., *Paspalum distichum* L. var. *digitaria* (Poir.)

Hack., *Paspalum fernandezianum* Colla,
Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn.

Hierba. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(AYP, ANT, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, JFE). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, COA, ITA, PHA). URY(MON).

Paspalum durifolium Mez

Sin.: *Paspalum devincenzii* Parodi
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, SFE). BRA(RGS).
PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(TAC).

Paspalum ekmanianum Henrard

Hierba. Nativa. 400-2200 m.
Países: ARG(JUJ).

Paspalum ellipticum Döll

Sin.: *Paspalum ciliocinctum* Mez,
Paspalum proximum Mez
Hierba. Nativa. 100-1300 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Paspalum equitans Mez

Sin.: *Paspalum fasciculatum* Willd.
ex Flüggé var. *paraguayense* Hack.,
Paspalum pruinosum Hack., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CON, GUA, MIE, SPE). URY(CAS).

Paspalum erianthoides Lindm.

Sin.: *Paspalum duserii* Hack.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, GUA, PAI).

Paspalum erianthum Nees ex Trin.

Sin.: *Paspalum album* Swallen
Hierba. Nativa. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON). URY(ART, MON, PAY).

Paspalum eucomum Nees ex Trin.

Sin.: *Paspalum eucomum* Nees, hom. illeg., *Paspalum splendens* Hack.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Paspalum exaltatum J. Presl

Sin.: *Paspalum arechavaletae* Hack.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, COA, PAI). URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SJO).

Paspalum falcatum Nees ex Steud.

Sin.: *Paspalum falcatum* Nees ex Steud. subsp. *microcarpum* Ekman, *Paspalum leucotrichum* Steud.
Hierba. Nativa. 1100-1300 m.
Países: ARG(CHA, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, ITA). URY(TAC).

Paspalum fasciculatum Willd. ex Flügge

Sin.: *Paspalum delochei* Steud., *Paspalum orizaeforme* Steud.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, ÑEE, PHA). URY(MON).

Paspalum filifolium Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 900-1900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Paspalum flaccidum Nees

Sin.: *Paspalum vescum* Swallen
Hierba. Nativa. 200-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CON).

Paspalum flavum J. Presl

Sin.: *Paspalum cristatum* Trin.
Hierba. Nativa.
Países: CHL(Desconocida).

Paspalum foliiforme S.S. Denham

Sin.: *Panicum petrosum* Trin., *Thrasya petrosa* (Trin.) Chase

Hierba. Nativa. 200 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, PHA).

Paspalum forsterianum Flügge

Hierba. Endémica.
Países: CHL(IPA).

Paspalum gardnerianum Nees

Sin.: *Paspalum gardnerianum* Nees var. *oligostachyum* Döll
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Paspalum glabrinode (Hack.)

Morrone & Zuloaga
Sin.: *Brachiaria glabrinodis* (Hack.)
Henrard, *Paspalum concavum* Renvoize, *Panicum glabrinode* Hack.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, MIS). BRA(PAR). PRY(ITA).

Paspalum glaucescens Hack.

Sin.: *Paspalum caperatum* Swallen, *Paspalum pannuceum* Swallen, *Paspalum paranaense* Swallen, *Paspalum viale* Swallen, *Paspalum yaguaronense* Henrard
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(RIV, SJO).

Paspalum gracielae Sulekic

Hierba. Endémica. 1500-1600 m.
Países: ARG(SAL).

Paspalum guenoarum Arechav. var. **guenoarum**

Sin.: *Paspalum guenoarum* Arechav. var. *vestitum* Henrard, *Paspalum kempffii* Killeen, *Paspalum plicatulum* Michx. subsp. *guenoarum* (Arechav.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Paspalum plicatulum* Michx. var. *robustum* Hack.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(TAC).

Paspalum guenoarum Arechav. var. **rojasii** (Hack.) Parodi ex Burkart

Sin.: *Paspalum indutum* Swallen, hom. illeg., *Paspalum rhodopedum* L.B. Sm. & Wassh., *Paspalum rojasii* Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN).

Paspalum haumanii Parodi

Sin.: *Paspalum haumanii* Parodi var. *genuinum* Parodi, nom. inval., *Paspalum haumanii* Parodi var. *macranthum* Parodi, *Paspalum haumanii* Parodi var. *pilosum* Parodi, *Paspalum multiflorum* Döll f. *abbreviatum* Hack. ex Stuck., *Paspalum multiflorum* Döll
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, SPE). URY(FLA, SOR).

Paspalum humboldtianum Flügge

Sin.: *Paspalum ciliatum* Kunth, hom. illeg., *Paspalum humboldtianum* Flügge var. *stuckertii* (Hack.) Hack., *Panicum humboldtianum* (Flügge) Kuntze, *Paspalum stuckertii* Hack.
Hierba. Nativa. 1600-2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Paspalum hyalinum Nees ex Trin.

Sin.: *Paspalum abstrusum* Trin.
Hierba. Nativa. 200-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Paspalum inaequivalve Raddi

Sin.: *Panicum inaequivalve* (Raddi) Kuntze, *Paspalum glabriflorum* (Hack.) Herter, *Paspalum inaequivalve* Raddi var. *glabriflorum* Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA). URY(PAY).

Paspalum indecorum Mez

Sin.: *Paspalum stramineum* Ekman, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(GUA). URY(SAO).

Paspalum intermedium Munro ex Morong & Britton

Sin.: *Paspalum densum* Poir. var. *eliptico-oblongum* Hack., *Paspalum intermedium* Munro ex Morong & Britton var. *goyensis* Burkart
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

Paspalum ionanthum Chase

Sin.: *Paspalum guaraniticum* Parodi,
Paspalum guaraniticum Parodi var.
crovettoi Burkart, *Paspalum ionanthum*
Chase subsp. *guaraniticum* (Parodi)
Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).
PRY(APY, BOQ, CAU, CAN, CEN, CON,
COA, MIE, PAI). URY(RIV, ROC, TAC).

Paspalum jesuiticum Parodi

Sin.: *Paspalum perspicinervium*
Renvoize

Hierba. Endémica. 0-100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum juergensii Hack.

Sin.: *Paspalum agnesiae* L.B. Sm. &
Wassh.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). URY(TYT).

Paspalum lachneum Nees ex Steud.

Sin.: *Anthaenantiopsis racemosa*
Renvoize, *Paspalum obscurum* Nees ex
Steud., *Paspalum verrucosum* Hack.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Paspalum laurentii R.C. Oliveira & Valls

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Paspalum leptum Schult.

Sin.: *Paspalum arenicolum* Herter,
hom. illeg., *Paspalum nicorae* Parodi,
Paspalum plicatulum Michx. var.
arenarium Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CEN, CON, COA, GUA, MIE, SPE).
URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).

Paspalum lilloi Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, COA).

Paspalum limbatum Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). PRY(AMA, GUA, SPE).

Paspalum lineare Trin.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAN, CON).

Paspalum macranthecium Parodi

Sin.: *Eriochloa castanea* Hack.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Paspalum maculosum Trin.

Sin.: *Paspalum eburneum* Henrard,
Paspalum maculosum Trin. var. *multinode*
Barreto

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA,
MIE, PAI, SPE). URY(MON, RIV, TAC).

Paspalum malacophyllum Trin.

Sin.: *Anachyris paspaloides* Nees,
Panicum malacophyllum (Trin.) Kuntze,
hom. illeg., *Panicum malacophyllum*
(Trin.) Kuntze var. *cordobense* Kuntze,
Panicum malacophyllum (Trin.)
Kuntze var. *elongatum* (Griseb.)
Kuntze, *Paspalum bolivense* Chase,
Paspalum elongatum Griseb., *Paspalum*
malacophyllum Trin. f. *parviflora* Hack.,
Paspalum malacophyllum Trin. var.
genuinum Döll, nom. inval., *Paspalum*
malacophyllum Trin. var. *longipilum*
Hack., *Paspalum quadrifarium* Lam. var.
elongatum (Griseb.) Hack.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,
JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CEN,
CHO, CON, COA, GUA, NAS, PAI, SPE).

Paspalum mandiocanum Trin. var. **mandiocanum**

Sin.: *Paspalum mandiocanum* Trin. var.
ellipticum Döll, nom. superfl.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAN, GUA).
URY(MAL).

Paspalum mandiocanum Trin. var. **subaequiglume** Barreto

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN,
CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Paspalum minus E. Fourn.

Sin.: *Paspalum barretoi* Canto-Dorow,
Valls & Longhi-Wagner

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(ARA, LRI, LLA).
PRY(CEN, COA, PAI). URY(CAS, MON).

Paspalum modestum Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI, PHA).
URY(CLA, RIV).

Paspalum multicaule Poir.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: PRY(AMA).

Paspalum notatum Flügge var. **notatum**

Sin.: *Paspalum notatum* Flügge var.
latiflorum Döll, *Paspalum notatum*
Flügge var. *typicum* Parodi, nom. inval.,
Paspalum saltense Arechav., *Paspalum*
uruguayense Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN,
MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA,
BOQ, CAU, CAA, CEN, CON, COA,
GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).
URY(MAL, MON).

Paspalum notatum Flügge var. **saurae** Parodi

Sin.: *Paspalum saurae* (Parodi) Parodi

Hierba. Nativa. 1500-1700 m.

Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LRI,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). CHL(IPA).
PRY(CAA, CEN, COA, ITA, MIE).
URY(MON).

Paspalum nutans Lam.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Paspalum orbiculare G. Forst.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: CHL(IPA).

Paspalum orbiculatum Poir.

Sin.: *Paspalum pusillum* Vent. ex
Flügge

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS).
PRY(CAA, CEN, COA, ITA, PAI).

Paspalum ovale Nees ex Steud.

Sin.: *Paspalum ambustum* Swallen,
Paspalum epilis Parodi, hom. illeg.,
Paspalum parodianum Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS). PRY(GUA, ITA, MIE, PAI).

Paspalum palustre Mez

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR).
PRY(CEN, PHA).

Paspalum paniculatum L.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE,
PAI). URY(ART, RIV).

Paspalum pauciciliatum (Parodi)

Herter

Sin.: *Paspalum dilatatum* Poir. var.
pauciciliatum Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
CAU, GUA, MIE, PAI). URY(ART, SAO).

Paspalum paucifolium Swallen

Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(RGS). PRY(AMA, CEN, CON, GUA,
PAI). URY(ART).

Paspalum pectinatum Nees ex Trin.

Sin.: *Anastrophus pectinatus* (Nees ex
Trin.) Schltld. ex B.D. Jacks., *Paspalum*
pectinatum Nees, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 400-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CAN, PAI).

Paspalum pilosum Lam.

Sin.: *Panicum monostachyum* Kunth
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Paspalum planum Hack.

Sin.: *Paspalum oryzoides* Mez
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del
proyecto). PRY(CAU).

Paspalum plenum Chase

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CEN,
CON, COA, ÑEE, PHA).

Paspalum plicatulum Michx.

Sin.: *Panicum plicatulum* (Michx.)
Kuntze, *Paspalum lenticulare* Kunth f.
intumescens (Döll) Killeen, *Paspalum*
montevidense Spreng., *Paspalum*
plicatulum Michx. subsp. *montevidense*
(Spreng.) Roseng., B.R. Arrill. &
Izag., *Paspalum plicatulum* Michx. var.
genuinum Parodi, nom. inval., *Paspalum*
plicatulum Michx. var. *glabrum* Arechav.,
Paspalum plicatulum Michx. var.
intumescens Döll, *Paspalum plicatulum*
Michx. var. *longipilum* Hack., *Paspalum*
plicatulum Michx. var. *villosissimum*

Pilg., *Paspalum ramosum* Swallen

Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU,
SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(MAU). PRY(APA, APY, AMA, CAU,
CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE,
PAI, PHA, SPE). URY(MAL, MON, TAC).

Paspalum polyphyllum Nees ex Trin.

Sin.: *Paspalum bicilium* Mez, *Paspalum*
macroblepharum Hack., *Paspalum*
polyphyllum Nees, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,
AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA,
GUA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, PAY,
RIV, TAC).

Paspalum procurrens Quarín

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(SAL).

Paspalum pumilum Nees

Sin.: *Paspalum nitidum* Swallen
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CEN, COA). URY(CAS,
MAL, MON).

Paspalum pygmaeum Hack.

Sin.: *Paspalum lorentzianum* Mez,
Paspalum pygmaeum Hack. var. *genuinum*
Hack., nom. inval.
Hierba. Nativa. 2600-4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Paspalum quadrifarium Lam.

Sin.: *Paspalum ferrugineum* Trin.,
Paspalum quadrifarium Lam. var.
ferrugineum (Trin.) Herter, *Paspalum*
quadrifarium Lam. var. *major* Döll
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, LPA, MIS, SLU, SFE).
BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, COA, ITA,
MIE). URY(ART, MAL, MON, SJO).

Paspalum quarinii Morrone & Zuloaga

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA,
COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

Paspalum ramboi Barreto

Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum rawitscheri (Parodi) A.

Chase ex G.H. Rua & Valls
Sin.: *Panicum juergensii* Hack.,
Thrasypopsis juergensii (Hack.) Soderstr.
& A.G. Burm., *Thrasypopsis rawitscheri*
Parodi
Hierba. Endémica. 600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paspalum redondense Swallen

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Paspalum regnellii Mez

Sin.: *Paspalum mandiocanum* Trin.
var. *stenocarpum* Döll, *Paspalum regnellii*
Mez, nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI).

Paspalum remotum J. Remy

Sin.: *Paspalum scrobiculatum* L. var.
pubigluma Hicken
Hierba. Nativa. 1100-2100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Paspalum repandum (Nees) G.H. Rua & Valls

Sin.: *Panicum repandum* Nees ex Trin.,
Thrasypopsis repanda (Nees ex Trin.)
Parodi
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Paspalum repens Bergius

Sin.: *Cymatochloa repens* (Bergius) Schltld.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE,
ERI, FOR, SFE). BRA(PAR, RGS).
PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA,
PAI, PHA). URY(COL, SJO).

Paspalum rufum Nees ex Steud.

Sin.: *Paspalum giganteum* Arechav.,
hom. illeg., *Paspalum hassleri* Hack.,
Panicum ostenii Herter
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(CAU,
CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA,
SPE). URY(FLA, PAY, SOR).

Paspalum scrobiculatum L.

Sin.: *Paspalum boscianum* Flügge,
Paspalum commutatum Nees
Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Paspalum simplex Morong

Sin.: *Paspalum malacophyllum* Trin.
var. *linearifolium* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CEN, CHO, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(RIV).

Paspalum stagnophilum Morrone & Zuloaga

Sin.: *Agrostis brasiliensis* Spreng., *Reimaria actua* Flügge, *Reimarochloa acuta* (Flügge) Hitchc., *Reimarochloa brasiliensis* (Spreng.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, SPE).

Paspalum stellatum Humb. & Bonpl. ex Flügge

Sin.: *Paspalum stellatum* Humb. & Bonpl. ex Flügge f. *hirsuta* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(ART, SAO).

Paspalum telmatum Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Paspalum umbrosum Trin.

Sin.: *Paspalum densiflorum* Döll, *Paspalum paniculatum* L. subsp. *umbrosum* (Trin.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Paspalum unispicatum (Scribn. & Merr.) Nash

Sin.: *Panicum unispicatum* Scribn. & Merr.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ, CON, GUA, PHA). URY(PAY).

Paspalum urvillei Steud.

Sin.: *Paspalum larrañagai* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU,

TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV, SAO).

Paspalum usteri Hack.

Sin.: *Paspalum inaequiglume* Parodi, *Paspalum usteri* Hack. var. *villosum* Kuhlm.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(GUA, SPE).

Paspalum vaginatum Sw.

Sin.: *Paspalum distichum* L. var. *vaginatum* (Sw.) Griseb., *Paspalum gayanum* Desv.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CEN, COA). URY(MON, SJO, SOR).

Paspalum virgatum L.

Sin.: *Paspalum wettsteinii* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, PHA).

Paspalum volcanensis Zuloaga, Morrone & S.S. Denham

Hierba. Nativa. 2100-2300 m.

Países: ARG(JUJ).

Paspalum wrightii Hitchc. & Chase

Sin.: *Paspalum hydrophilum* Henrard, *Paspalum plicatulum* Michx. var. *multinode* Hack., *Paspalum virgatum* L. var. *subplicatum* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, ÑEE, PHA).

Phalaris L., nom. cons.**Phalaris amethystina** Trin.

Sin.: *Phalaris berteroniana* Steud., *Phalaris colchaguensis* Phil., *Phalaris robinsoniana* Nees ex Steud.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE).

Phalaris angusta Nees ex Trin.

Sin.: *Phalaris angusta* Nees ex Trin. f. *macra* Hack., *Phalaris chilensis* J. Presl, *Phalaris intermedia* Bosc ex Poir. var. *angusta* (Nees ex Trin.) Chapm., *Phalaris intermedia* Bosc ex Poir. var. *angustata* Beal, *Phalaris laxa* Spreng. ex Steud, nom. inval., *Phalaris ludoviciana* Torr. ex Trin., nom. inval., *Phalaris segetalis* Steud. ex Lechler, nom. nud.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE). PRY(GUA, ITA, PHA). URY(MAL).

Phalaris aquatica L.

Sin.: *Phalaris aquatica* L. var. *stenoptera* (Hack.) Burkart, *Phalaris stenoptera* Hack., *Phalaris tuberosa* L. var. *stenoptera* (Hack.) Hitchc., *Phalaris tuberosa* L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SFE). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). URY(MON).

Phalaris arundinacea L.

Sin.: *Baldingera arundinacea* (L.) Dumort.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(ARA, LLA, MAG). URY(MON).

Phalaris canariensis L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME). URY(MON).

Phalaris caroliniana Walter

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(VAL).

Phalaris coerulescens Desf.

Sin.: *Phalaris bulbosa* Cav., hom. illeg.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). CHL(BIO). URY(COL).

Phalaris minor Retz.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE). CHL(COQ, BIO).

Phalaris paradoxa L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE).
CHL(LBO). URY(MON).

Phalaris platensis Henrard ex Wacht.

Sin.: *Phalaris arechavaletae* Herter, nom. superfl., *Phalaris intermedia* Bosc ex Poir. var. *platensis* (Arechav.) Speg., *Phalaris intermedia* Bosc ex Poir. f. *platensis* Arechav., *Phalaris platensis* (Arechav.) Parodi ex Valencia, nom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SFE).
URY(MAL).

Pharus P. Browne**Pharus lappulaceus** Aubl.

Sin.: *Pharus angustifolius* (Nees) Döll, *Pharus brasiliensis* Raddi var. *angustifolius* Nees, *Pharus brasiliensis* Raddi, *Pharus glaber* Kunth, *Pharus glaber* Kunth var. *pubescens* Döll, *Pharus lancifolius* Desv. ex Ham., *Pharus micranthus* Schrad. ex Nees
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, ÑEE, PAI). URY(ART, ROC).

Pharus latifolius L.

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phippsia (Trin.) R. Br.**Phippsia wilczekii** Hack.

Hierba. Endémica. 3100 m.
Países: ARG(MEN).

Phleum L.**Phleum alpinum** L.

Sin.: *Phleum commutatum* Gaudin
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Phleum pratense L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

Phragmites Adans.**Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Steud.

Sin.: *Arundo australis* Cav., *Arundo occidentalis* Sieber ex Schult., *Arundo phragmites* L., *Phragmites chilensis* Steud., nom. nud., *Phragmites communis* Trin., *Phragmites communis* Trin. var. *flavescens* Custer, *Phragmites communis* Trin. var. *genuina* Stuck., nom. inval., *Phragmites dioica* Hack. ex Conert, hom. illeg., *Phragmites fissifolius* Steud., *Phragmites hispanicus* Nees, *Phragmites maximus* (Forssk.) Chiov., *Phragmites phragmites* (L.) H. Karst., nom. inval., *Phragmites phragmites* (L.) Speg., nom. inval.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(SJO).

Piptatherum P. Beauv.**Piptatherum miliaceum** (L.) Coss.

Sin.: *Agrostis miliacea* L., *Oryzopsis miliacea* (L.) Benth. & Hook. ex Asch. & Schweinf.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, DFE, LPA).
CHL(VAL, MAG, RME).

Piptochaetium J. Presl, nom. cons.**Piptochaetium alpinum** L.B. Sm.

Hierba. Endémica. 1000-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Piptochaetium angolense Phil.

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Piptochaetium bicolor (Vahl) E. Desv.

Sin.: *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg., *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg. var. *minor* Speg., *Piptochaetium bicolor* (Vahl) E. Desv. var. *minor* (Speg.) Parodi, *Piptochaetium bicolor* (Vahl) E. Desv. var. *typicum* Parodi, nom. inval., *Stipa bicolor* Vahl, *Stipa intermedia* Trin. & Rupr., *Stipa megalantha* Steud., *Urachne grandiflora* Steud. & Hochst., nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE).
BRA(RGS). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, SJO).

Piptochaetium brachyspermum

(Speg.) Parodi
Sin.: *Oryzopsis napostaensis* Speg. var. *brachysperma* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Piptochaetium burkartianum Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Piptochaetium cabreriae Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Piptochaetium calvescens Parodi

Hierba. Endémica. 600 m.
Países: ARG(BAI). URY(MON).

Piptochaetium confusum Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI). URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).

Piptochaetium cucullatum Roseng.,

B.R. Arrill. & Izag.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: URY(PAY, SAO).

Piptochaetium depressum (Steud.)

C. Peña
Sin.: *Oryzopsis verrucosa* (Phil.) Speg., *Piptochaetium granulatum* Phil., *Piptochaetium humile* Phil., *Piptochaetium moelleri* Phil., *Piptochaetium verrucosum* Phil., *Urachne depressa* Steud.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Piptochaetium fuscum (Nees ex

Steud.) Barkworth, Ciald. & Gandhi
Sin.: *Piptochaetium macrocarpum* Phil., *Piptochaetium pallidum* Phil. ex Griseb., p.p., *Piptochaetium purpuratum* Phil., *Piptochaetium setosum* (Trin.) Arechav., *Stipa pallida* (Phil. ex Griseb.) Kuntze, *Urachne fusca* Nees ex Steud., *Urachne setosa* Trin., nom. superfl.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Piptochaetium hackelii (Arechav.)

Parodi
Sin.: *Oryzopsis hackelii* (Arechav.) Speg., *Piptochaetium hackelii* (Arechav.) Herter, comb. superfl., *Stipa hackelii* Arechav., *Stipa tandilensis* Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA). URY(MAL, MON).

Piptochaetium hirtum Phil.

Sin.: *Piptochaetium brevifolium* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL, RME).

Piptochaetium indutum Parodi

Hierba. Nativa. 2500-4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Piptochaetium jubatum Henrard

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(CAS, MON, RIV).

Piptochaetium lasianthum Griseb.

Sin.: *Oryzopsis lasiantha* (Griseb.)
Speg., *Piptochaetium erianthum* Balansa
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). URY(ART,
CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, RNO, SAO,
SOR, TAC, TYT).

Piptochaetium leopodium (Speg.)

Henrard
Sin.: *Oryzopsis leopoda* Speg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(LAV, MAL).

Piptochaetium medium (Speg.)

Torres
Sin.: *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg. var.
media Speg.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS,
SLU). BRA(RGS). URY(FLA).

Piptochaetium montevidense

(Spreng.) Parodi
Sin.: *Caryochloa montevidensis*
Spreng., *Caryochloa montevidensis*
Spreng. var. *brasiliensis* (Trin. &
Rupr.) Döll ex Ekman, *Oryzopsis*
montevidensis (Spreng.) Hauman,
Oryzopsis montevidensis (Spreng.)
Speg. f. *brasiliensis* Speg., *Oryzopsis*
montevidensis (Spreng.) Speg.
f. *trachycarpa* Speg., *Oryzopsis*
montevidensis (Spreng.) Speg. f.
typica Speg., nom. inval., *Oryzopsis*
montevidensis (Spreng.) Speg., comb.
superfl., *Oryzopsis tuberculata* (E. Desv.)
Speg., *Piptochaetium montevidense*
(Spreng.) Herter, comb. superfl.,
Piptochaetium tuberculatum Desv., *Stipa*
panicoides Nees, nom. illeg., *Urachne*
panicoides Trin. var. *brasiliensis* Trin. &
Rupr., *Urachne panicoides* Trin.
Hierba. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU,

SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
RME). PRY(CAA, COA, GUA, ITA, MIE,
PAI). URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR,
FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO,
SAO, SJO, SOR).

Piptochaetium napostaense (Speg.)
Hack.

Sin.: *Oryzopsis napostaensis* Speg.
var. *brachyphylla* Speg., *Oryzopsis*
napostaensis Speg. var. *macrophylla*
Speg., *Oryzopsis napostaensis* Speg.,
Stipa capillifolia Hack., *Stipa hypogona*
Hack.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
LPA, MEN, RNE, SLU, TUC).

Piptochaetium palustre Mujica-Sallés
& Longhi-Wagner

Hierba. Endémica. 1600 m.
Países: BRA(SCA).

Piptochaetium panicoides (Lam.) E. Desv.

Sin.: *Oryzopsis leiocarpa* Speg. var.
major Speg., *Oryzopsis leiocarpa* Speg.,
Oryzopsis ovata (Trin.) Speg., *Oryzopsis*
panicoides (Lam.) Speg., *Oryzopsis setacea*
A. Rich., nom. superfl., *Oryzopsis setifolia*
(J. Presl) Henrard, *Piptatherum elegans* P.
Beauv., nom. nud., *Piptatherum panicoides*
Gibert, nom. nud., *Piptochaetium*
leiocarpum (Speg.) Hack. f. *subpapillosum*
Hack., *Piptochaetium leiocarpum* (Speg.)
Hack., *Piptochaetium panicoides* (Lam.)
E. Desv. f. *subpapillosum* (Hack.)
Parodi, *Piptochaetium panicoides* (Lam.)
E. Desv. var. *subpapillosum* (Hack.)
Petetin, *Piptochaetium setifolium* J. Presl,
Piptochaetium subnudum Phil., *Stipa*
lineolata Mez, *Stipa panicoides* Lam., *Stipa*
setifolia (J. Presl) Kunth, *Urachne simplex*
Trin. var. *peruviana* Trin. & Rupr.
Hierba. Nativa. 0-3700 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ,
NEU, SAL, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ,
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).
URY(CAS, COL, MAL, MON, RNO, SJO).

Piptochaetium ruprechtianum E.
Desv.

Sin.: *Oryzopsis bicolor* (Vahl) Speg. var.
major Speg., *Oryzopsis ruprechtiana* (E.
Desv.) Speg., *Stipa bicolor* Vahl var. *major*
Speg., *Stipa ruprechtiana* (E. Desv.) Herter
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MIS, SLU).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, DUR,
LAV, MAL, MON, RIV, SOR).

Piptochaetium stipoides (Trin. &
Rupr.) Hack. ex Arechav. var.**echinulatum** Parodi

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, LPA, SLU).
BRA(RGS). URY(SAO).

Piptochaetium stipoides (Trin. &
Rupr.) Hack. ex Arechav. var. **stipoides**

Sin.: *Oryzopsis grisebachii* Speg.,
Oryzopsis stipoides (Trin. & Rupr.)
Speg., *Piptatherum stipoides* Gibert,
nom. nud., *Piptochaetium chaetophorum*
Griseb., *Piptochaetium cuspidatum*
Phil., *Piptochaetium grisebachii* (Speg.)
Herter, *Piptochaetium ovatum* (Trin.)
Desv. f. *atrata* Hack., *Piptochaetium*
ovatum (Trin.) Desv. var. *chaetophorum*
(Griseb.) Hack., *Piptochaetium ovatum*
(Trin.) Desv. var. *purpurascens* Hack.,
Piptochaetium pallidum Phil. ex
Griseb., p.p., *Piptochaetium stipoides*
(Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav.
var. *chaetophorum* (Griseb.) Parodi,
Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.)
Hack. ex Arechav. var. *genuinum*
Parodi, nom. inval., *Piptochaetium*
stipoides (Trin. & Rupr.) Hack. ex
Arechav. var. *parviflorum* Parodi,
Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.)
Hack. ex Arechav. var. *purpurascens*
(Hack.) Parodi, *Piptochaetium stipoides*
(Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav.
var. *verruculosum* (Mez) Parodi,
Piptochaetium verruculosum (Mez)
Henrard, *Piptochaetium verruculosum*
(Mez) Herter, comb. superfl., *Stipa*
verruculosa Mez, *Urachne stipoides* Trin.
& Rupr.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, JUJ, MIS, RNE, SLU, SFE).
BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO,
MAU, BIO, ARA, LRI, RME). URY(CAS,
CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON,
PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

Piptochaetium uruguense Griseb.

Sin.: *Oryzopsis uruguayensis* (Griseb.)
Speg., *Piptochaetium uruguense* Griseb.
var. *microcarpum* Parodi, *Piptochaetium*
uruguense Griseb. var. *genuinum* Parodi,
nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS,
SAL, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(GUA,
MIE). URY(CLA, FLO, FLA, PAY, RIV,
ROC, TAC, TYT).

Poa L.**Poa acinaciphylla** E. Desv.

Sin.: *Poa villaruelii* Phil.
Hierba. Endémica. 2500-3700 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, RME).

Poa aequigluma Tovar

Hierba. Nativa. 2800-3000 m.
Países: ARG(SAL).

Poa alopecurus (Gaudich. ex Mirb.)Kunth subsp. **alopecurus**

Sin.: *Arundo alopecurus* Gaudich. ex Mirb.,
Arundo antarctica d'Urv., *Calamagrostis macloviana* Steud., *Festuca alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.) Brongn., nom. superfl., *Festuca antarctica* (d'Urv.) Kunth, hom. illeg., *Festuca arundo* Hook. f., *Poa antarctica* (d'Urv.) Pilg., comb. illeg., *Poa antarctica* (d'Urv.) Raspail, *Poa antarctica* (d'Urv.) St.-Yves, comb. superfl., *Poa flabellata* (Lam.) Raspail var. *alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.) Raspail, *Poa flabellata* (Lam.) Raspail var. *antarctica* (d'Urv.) Raspail, *Poa magellanica* (Phil.) Speg., *Poa rigidifolia* Steud.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Poa alopecurus (Gaudich. ex Mirb.)Kunth subsp. **fuegiana** (Hook. f.) D.M. Moore & Dogg.

Sin.: *Aira superbiens* Steud., *Deyeuxia vivipara* Phil., *Festuca fuegiana* Hook. f. var. *vivipara* Hook., nom. inval., *Festuca fuegiana* Hook. f., *Festuca pogonantha* Franch., *Poa commersonii* Franch., *Poa fuegiana* (Hook. f.) Hack., *Poa fuegiana* (Hook. f.) Hack. var. *involutrata* Hack., *Poa pogonantha* (Franch.) Parodi, *Poa superbiens* (Steud.) Hauman & Parodi
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Poa alopecurus (Gaudich. ex Mirb.)Kunth subsp. **shuka** (Speg.) Giussani & Soreng

Sin.: *Festuca shuka* Speg., *Poa shuka* (Speg.) Parodi
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(MAG).

Poa androgyna Hack.

Hierba. Nativa. 3400-4200 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Poa annua L.

Sin.: *Festuca tenuiculmis* Tovar, *Poa aestivalis* J. Presl, *Poa algida* Trin., *Poa annua* L. var. *erioletis* E. Desv., *Poa meyenii* Nees & Meyen
Hierba. Introducida. 0-3800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE, IPA). PRY(GUA, ITA, MIE, PAI). URY(MAL).

Poa arctica R. Br.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Poa arechavaletae Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MON).

Poa atropidiformis Hack. var. **atropidiformis**

Sin.: *Dissanthelium atropidiforme* (Hack.) Soreng
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Poa atropidiformis Hack. var.**patagonica** (Parodi) Nicora

Sin.: *Dissanthelium atropidiforme* (Hack.) Soreng var. *patagonica* (Parodi) Soreng, *Dissanthelium patagonicum* Parodi
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF).

Poa bergii Hieron.

Sin.: *Poa barrosiana* Parodi
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE). URY(COL).

Poa bonariensis (Lam.) Kunth

Sin.: *Festuca bonariensis* Lam., *Poa montevidensis* Arechav., *Poa pallens* Poir., *Schenodorus bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult.
Hierba. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, NEU, SFE). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME). URY(MAL, MON, ROC).

Poa bradei Pilg.

Hierba. Nativa. 2200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Poa bulbosa L. subsp. **bulbosa**

Hierba. Introducida.
Países: CHL(MAG).

Poa bulbosa L. subsp. **vivipara**

(Koeler) Arcang.
Sin.: *Poa bulbosa* L. var. *vivipara* Koeler, *Poa bulbosa* L. f. *vivipara* (Koeler) Maire, *Paneion bulbosum* (L.) Lunell var. *viviparum* (Koeler) Lunell
Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Poa cabreriana Anton & Ariza

Sin.: *Poa serotina* Ehrh. var. *purpurea* Griseb.
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.
Países: ARG(CAT, SAL).

Poa calchaquiensis Hack.

Sin.: *Poa buchtienii* Hack., *Poa buchtienii* Hack. var. *subacuminata* Hack.
Hierba. Nativa. 1000-4200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Poa chamaeclinis Pilg.

Hierba. Nativa. 3800-4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).

Poa compressa L.

Sin.: *Paneion compressum* (L.) Lunell
Hierba. Introducida. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(ARA, LLA, MAG).

Poa cumingii Trin.

Sin.: *Distichlis ammobia* Phil., *Distichlis volckmannii* Phil., *Poa conformis* Nees ex Steud., *Poa curva* Nees ex Steud., *Poa dialystostachya* Phil., *Poa phalaroides* Nees ex Steud., *Poa stachyodes* Phil.
Hierba. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Poa darwiniana Parodi

Sin.: *Poa antarctica* (Hook. f.) Stapf, comb. superfl., *Sieglingia antarctica* (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg., *Triodia antarctica* Hook. f.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Poa denudata Steud.

Sin.: *Koeleria rigidula* Steud., *Poa araucana* Phil., *Poa chiloensis* Phil., *Poa eligulata* Hack., *Poa fonkii* Phil., *Poa nahuelhuapiensis* Nicora, *Poa vaginiflora* Steud., *Trisetum rigidulum* (Steud.) Domin

Hierba. Endémica. 0-2800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS).

Poa dolichophylla Hack.

Sin.: *Poa calamagrostoides* Hack.,
nom. nud., *Poa pilcomayensis* Hack. var.
calamagrostoides Hack.

Hierba. Endémica. 800-2300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Poa durifolia Giussani, Nicora & F.A. Roig

Sin.: *Poa ligularis* Nees ex Steud. var.
stricta Nicora & F.A. Roig

Hierba. Endémica. 1200-2800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SJU, SCR).

Poa flabellata (Lam.) Raspail

Sin.: *Dactylis caespitosa* G. Forst.,
Festuca antarctica Spreng., *Festuca*
flabellata Lam., *Festuca urvilleana* Steud.,
Parodiocloa flabellata (Lam.) C.E. Hubb.,
Poa caespitosa (G. Forst.) Hook. ex Speg.,
Poa controversa Steud., *Poa controversa*
Steud. var. *minor* Steud., *Poa flabellata*
(Lam.) Hook. f., comb. superfl., *Poa*
forsteri Steud., nom. superfl., *Sesleria*
americana Nees ex Steud.

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Poa gayana E. Desv.

Hierba. Endémica. 400-3400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Poa glaberrima Tovar

Hierba. Nativa. 4100-4200 m.
Países: ARG(JUJ).

Poa glauca Vahl

Sin.: *Poa ayseniensis* Hack.
Hierba. Introducida. 300-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).
CHL(AIS, MAG).

Poa grisebachii R.E. Fr.

Hierba. Endémica. 3500-3700 m.
Países: ARG(JUJ).

Poa gymnantha Pilg.

Sin.: *Poa ovata* Tovar, *Poa*
pseudoaequigluma Tovar
Hierba. Nativa. 3900-5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP,
TAR, ANT).

Poa hachadoensis Nicora var.

hachadoensis
Hierba. Endémica. 1200-1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(MAU, BIO, ARA, LLA).

Poa hachadoensis Nicora var. **pilosa**
Nicora

Hierba. Endémica. 2500-2700 m.
Países: ARG(CHU, NEU). CHL(LBO).

Poa hieronymi Hack.

Hierba. Endémica. 1200-3300 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

Poa holciformis J. Presl

Sin.: *Festuca elliotii* Hack., *Koeleria*
poaeoides Nees ex Steud., *Poa chilensis* Trin.
var. *oligoclada* Phil., *Poa chilensis* Trin. var.
robustior Phil., *Poa chilensis* Trin.

Hierba. Endémica. 1200-3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Poa hubbardiana Parodi

Hierba. Endémica. 1400-2100 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Poa huecu Parodi

Sin.: *Poa indigesta* Parodi
Hierba. Endémica. 1000-3900 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).

Poa humillima Pilg.

Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
CHL(AYP, ANT).

Poa infirma Kunth

Hierba. Introducida. 0-3800 m.
Países: ARG(COR, SAL, TUC).
CHL(VAL, RME).

Poa iridifolia Hauman

Sin.: *Poa lanigera* Nees var. *tandilensis*
Hack.
Hierba. Endémica. 100-900 m.
Países: ARG(BAI).

Poa kurtzii R.E. Fr.

Sin.: *Poa asperiflora* Hack., *Poa*
munozensis Hack., *Poa pflanzii* Pilg.
Hierba. Nativa. 3200-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC). CHL(AYP, TAR).

Poa laetevirens R.E. Fr.

Sin.: *Poa atacamensis* Parodi, *Poa nana*
Phil., hom. illeg., *Puccinellia atacamensis*
(Parodi) Soreng
Hierba. Nativa. 3500-4800 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL). CHL(AYP,
TAR, ANT, ATA).

Poa lanigera Nees

Sin.: *Poa lanigera* Nees var. *vaginata*
Döll, *Poa vaginata* (Döll) Herter
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,
ERI, LPA, MEN, MIS, SLU, SFE).
BRA(RGS). PRY(APA, CAU). URY(DUR,
LAV, MAL, MON, ROC, SJO, TYT).

Poa lanuginosa Poir. var. **lanuginosa**

Sin.: *Festuca lanata* Spreng., *Poa bergii*
Hieron. var. *chubutensis* Speg., *Poa*
magellanica Phil. ex Macloskie, nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,
NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). CHL(ANT,
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA,
MAG). URY(COL, MAL, MON).

Poa lanuginosa Poir. var. **neuquina**

(Nicora) Giussani & Soreng
Sin.: *Poa patagonica* Phil. var. *neuquina*
Nicora
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU).

Poa lanuginosa Poir. var. **patagonica**

(Phil.) Giussani & Soreng
Sin.: *Poa alopecurus* (Gaudich. ex Mirb.)
Kunth subsp. *prichardii* (Rendle) Giussani
& Soreng, *Poa boecheri* Parodi, *Poa*
patagonica Phil., *Poa prichardii* Rendle
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR,
TDF). CHL(MAG).

Poa lepidula (Nees & Meyen) Soreng &
L.J. Gillespie

Sin.: *Anthochloa lepidula* Nees &
Meyen, *Anthochloa lepida* Nees & Meyen,
Anthochloa rupestris J. Remy
Hierba. Nativa. 4000-5000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL). CHL(AYP,
TAR, ANT).

Poa ligularis Nees ex Steud. var.

ligularis
Sin.: *Poa denudata* Steud. var. *minor*
Ball, nom. nud.
Hierba. Endémica. 0-3600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,
LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE,
SJU, SLU). CHL(BIO, AIS).

Poa ligularis Nees ex Steud. var.

resinulosa (Nees ex Steud.) Fernández
Pepi & Giussani
Sin.: *Poa decolorata* Pilg., *Poa resinulosa*
Nees ex Steud.
Hierba. Endémica. 200-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN,
NEU, RNE, SLU).

Poa lilloi Hack.

Sin.: *Poa jujuyensis* (Parodi ex Nicora) Giussani, Soreng & Anton, *Poa parviceps* Hack. var. *jujuyensis* Parodi ex Nicora
Hierba. Nativa. 3200-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR).

Poa macusaniensis (E.H.L. Krause) Refulio

Sin.: *Dissanthelium macusaniense* (E.H.L. Krause) R.C. Foster & L.B. Sm., *Dissanthelium minimum* Pilg., *Graminastrum macusaniense* E.H.L. Krause
Hierba. Nativa. 4100-4600 m.
Países: ARG(SAL). CHL(TAR).

Poa mendocina Nicora & F.A. Roig

Hierba. Endémica. 3000-3400 m.
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Poa myriantha Hack.

Hierba. Nativa. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Poa nemoralis L.

Sin.: *Agrostis alba* L.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).
CHL(ARA, AIS, MAG, RME).

Poa nubensis Giussani, Fernández Pepi & Morrone

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

Poa obvallata Steud.

Sin.: *Deyeuxia vulcanica* Phil., *Poa boelckeii* Nicora, *Poa julietii* Phil., *Poa pachypogon* Nees, *Poa subaristata* Phil., *Poa tristigmatica* E. Desv.
Hierba. Endémica. 200-2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Poa palustris L.

Hierba. Introducida.
Países: ARG(RNE). CHL(VAL, MAG, RME).

Poa paposana Phil.

Hierba. Endémica. 300-900 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Poa pearsonii Reeder

Hierba. Nativa. 3500-4600 m.
Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR).

Poa pedersenii Nicora

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU).

Poa perligulata Pilg.

Sin.: *Catabrosa burkartii* Hitchc.
Hierba. Nativa. 4200-5400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR).

Poa pfisteri Soreng

Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: CHL(BIO).

Poa pilcomayensis Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SDE). PRY(APA, APY, CAA, ITA, PHA). URY(MON, TAC).

Poa planifolia Kuntze

Sin.: *Colpodium planifolium* (Kuntze) K. Schum., *Poa acutifolia* Hauman, *Poa chilensis* Trin. var. *planifolia* (Kuntze) Hauman
Hierba. Endémica. 2600-3300 m.
Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Poa plicata Hack.

Sin.: *Poa glomerifera* Hack.
Hierba. Endémica. 3300-4300 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Poa pratensis L. subsp. **alpigena**

(Lindm.) Hiitonen
Sin.: *Poa alpigena* Lindm.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(MAG).

Poa pratensis L. subsp. **angustifolia** (L.) Lej.

Sin.: *Poa pratensis* L. var. *angustifolia* (L.) Gaudin, *Poa angustifolia* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, DFE, NEU, RNE).

Poa pratensis L. subsp. **pratensis**

Sin.: *Poa boliviensis* Hack., *Poa ianthoides* Roiv., *Poa magensiana* Potztl, *Poa oligeria* Steud.
Hierba. Introducida. 0-3800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, DFE, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR, TDF). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(MON).

Poa ragonesei Nicora

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Poa reitzii Swallen

Hierba. Endémica. 1000-1800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Poa scaberula Hook. f.

Sin.: *Festuca angustata* Griseb., *Poa anfamensis* Negritto & Anton, *Poa angustata* (Griseb.) Parodi, *Poa dactyliformis* Steud., *Poa micranthera* Hack., nom. nud., *Poa parviceps* Hack., *Poa scaberula* Hook. f. f. *nudiflora* Hauman
Hierba. Nativa. 1100-2200 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TDF, TUC). CHL(ANT, ATA, LLA, AIS, MAG).

Poa schizantha Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Poa schoenoides Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(LRI, LLA).

Poa secunda J. Presl subsp. **juncifolia** (Scribn.) Soreng

Sin.: *Poa ampla* Merr., *Poa juncifolia* Scribn.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Poa secunda J. Presl subsp. **secunda**

Sin.: *Festuca patagonica* Phil., *Festuca spaniantha* Phil., *Poa fallens* Pilg., *Poa fulvescens* Trin., *Poa gracillima* Vasey
Hierba. Nativa. 300-2700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, AIS, MAG, RME).

Poa sellowii Nees

Hierba. Endémica. 700-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(PHA). URY(MON).

Poa serpaiana Refulio

Sin.: *Dissanthelium peruvianum* (Nees & Meyen) Pilg., *Phalaridium peruvianum* Nees & Meyen
Hierba. Nativa. 1700-4200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR).

Poa spiciformis (Steud.) Hauman & Parodi var. **ibari** (Phil.) Giussani

Sin.: *Poa dusenii* Hack., *Poa ibari* Phil., *Poa rigidifolia* Steud. var. *ibari* (Phil.) Giussani
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Poa spiciformis (Steud.) Hauman & Parodi var. **spiciformis**

Sin.: *Aira spiciformis* Steud., *Koeleria sterilis* Steud., *Poa poecila* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG, RME).

Poa stenantha Trin.

Sin.: *Poa chorizantha* E. Desv.
Hierba. Introducida. 0-2200 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).
CHL(MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Poa stuckertii (Hack.) Parodi

Sin.: *Poa lanigera* Nees var. *stuckertii* Hack.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Poa superata Hack.

Hierba. Endémica. 2800-4300 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).
CHL(TAR).

Poa trachyantha Hack.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(AIS).

Poa tricolor Nees ex Steud.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Poa trivialis L.

Sin.: *Poa maullinica* Phil., *Poa ariguensis* Steud., *Poa modesta* Phil., hom. illeg.
Hierba. Introducida. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL, TDF). CHL(VAL, BIO, LRI, LLA, MAG, RME).

Poa tucumana Parodi

Hierba. Endémica. 3100-3500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Poa umbrosa Trin.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Poa uruguayensis Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(MON).

Poa yaganica Speg.

Sin.: *Poa breviculmis* Pilg., *Poa chrysantha* Lindm., *Poa limicola* Pilg.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Podagrostis (Griseb.) Scribn. & Merr.**Podagrostis sesquiflora** (E. Desv.)

Parodi ex Nicora
Sin.: *Agrostis sesquiflora* E. Desv., *Briza sesquiflora* (Desv.) Pilg., *Deyeuxia sesquiflora* (E. Desv.) Benth. & Hook. f. ex W.D. Jacks.

Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(MEN, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Podophorus Phil.**Podophorus bromoides** Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Polypogon Desf.**Polypogon australis** Brongn.

Sin.: *Polypogon adscensionis* Trin., *Polypogon chonoticus* Hook. f., *Polypogon crinitus* Trin., hom. illeg., *Polypogon elongatus* Kunth var. *patagonica* Speg., *Polypogon interruptus* Kunth var. *crinitus* (Trin.) Hack., *Polypogon radicans* Steud.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

Polypogon cachinalensis Phil.

Hierba. Endémica. 2600-3000 m.
Países: CHL(ANT, COQ).

Polypogon chilensis (Kunth) Pilg.

Sin.: *Agrostis muricata* (J. Presl) Kunth, *Agrostis pectinata* Hack. & Arechav., *Chaetotropis chilensis* Kunth, *Chaetotropis latifolia* Phil., *Polypogon chaetotropis* Trin, *Vilfa muricata* J. Presl
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, MIS, RNE, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, VAL, MAU, BIO, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(GUA, PAI). URY(FLO, MON, ROC, SJO).

Polypogon elongatus Kunth var. **elongatus**

Sin.: *Alopecurus elongatus* (Kunth) Poir., *Chaetotropis elongata* (Kunth) Björkman var. *elongata*, *Nowodworskya agrostoides* J. Presl, *Polypogon affinis* Brongn., *Polypogon inaequalis* Trin., *Polypogon intermedius* Carmich., *Polypogon mexicanus* Hort. ex Steud., nom. inval., *Raspailia agrostoides* J. Presl
Hierba. Nativa. 400-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, VAL, MAU, BIO, LRI, LLA, RME). URY(MAL, ROC).

Polypogon elongatus Kunth var.

longearistatus (Nicora) Finot
Sin.: *Chaetotropis elongata* (Kunth) Björkman var. *longearistata* Nicora
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(BAI).

Polypogon elongatus Kunth var.

strictus E. Desv.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ARA, LRI, LLA, RME).

Polypogon exasperatus (Trin.)

Renvoize var. **exasperatus**
Sin.: *Agrostis asperigluma* Steud., *Agrostis exasperata* Trin., *Agrostis exasperata* Trin. var. *viridis* Kuntze, nom. nud., *Agrostis hackelii* R.E. Fr. f. *viridiflora* Hack., *Agrostis hackelii* R.E. Fr., *Agrostis haenkeana* Hitchc., *Agrostis mucronata* J. Presl, *Agrostis patagonica* Phil., *Agrostis santacruzensis* Speg., *Agrostis speeiana* Mez, *Chaetotropis araucana* Phil., *Chaetotropis asperigluma* (Steud.) Nicora, *Chaetotropis exasperata* (Trin.) Björkman, *Chaetotropis hackelii* (R.E. Fr.) Björkman, *Polypogon hackelii* (R.E. Fr.) Renvoize, *Vilfa acutiglumia* Steud. ex Lechler, nom. nud.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, NEU, RNE, SCR, TUC). BRA(SCA). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Polypogon exasperatus (Trin.)

Renvoize var. **kuntzei** (Mez) Finot
Sin.: *Agrostis exasperata* Trin. var. *purpurascens* Kuntze, *Agrostis kuntzei* Mez
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, MEN, NEU, SJU, SCR). CHL(ATA, COQ, BIO, RME).

Polypogon imberbis (Phil.) Johow

Sin.: *Agrostis tehuelcha* Speg., *Chaetotropis imberbis* (Phil.) Björkman var. *bonariensis* Nicora, *Chaetotropis imberbis* (Phil.) Björkman var. *imberbis*, *Chaetotropis rioplatensis* (Herter) Björkman, *Nowodworskya imberbis* Phil., *Polypogon elongatus* Kunth f. *minor* Hack., *Polypogon elongatus* Kunth var. *muticus* Hack., *Polypogon imberbis* (Phil.) Johow f. *aristata* Skottsbo., *Polypogon imberbis* (Phil.) Pilg., comb. superfl., *Polypogon rioplatensis* Herter, *Polypogon rioplatensis* Herter f. *elegans* Herter, *Polypogon rioplatensis* Herter f. *robusta* Herter

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, RNE, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(COQ, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, JFE). URY(DUR, MON, SJO).

Polygogon interruptus Kunth

Sin.: *Alopecurus interruptus* (Kunth) Poir., *Polygogon brachyatherus* Phil., *Polygogon breviaristatus* Phil., *Polygogon interruptus* Kunth var. *breviaristatus* E. Desv., *Polygogon interruptus* Kunth var. *longearistata* E. Desv., *Polygogon littoralis* Sm. var. *interruptus* (Kunth) Kuntze, *Polygogon microstachys* Phil., *Polygogon purpurascens* Phil., *Polygogon tarapacanus* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3900 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Polygogon linearis Trin.

Sin.: *Polygogon longiflorus* Nees ex Trin., *Polygogon longiflorus* Nees ex Steud., *Polygogon longiflorus* Nees ex Steud., nom. nud.

Hierba. Endémica. 0-3900 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, RME).

Polygogon magellanicus (Lam.) Finot

Sin.: *Agrostis antarctica* Hook. f., *Agrostis araucana* Phil., *Agrostis chonotica* Phil., *Agrostis cognata* Steud., *Agrostis macrathera* Phil., *Agrostis magellanica* Lam., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook. f.) Franch., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook. f.) Pilg., comb. illeg., *Agrostis magellanica* Lam. var. *cognata* (Steud.) Macloskie & Dusén, *Agrostis multiculmis* Hook. f., *Agrostis rinihuensis* Phil., *Vilfa magellanica* (Lam.) P. Beauv.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Polygogon maritimus Willd.

Sin.: *Alopecurus maritimus* (Willd.) Poir., *Polygogon monspeliensis* (L.) Desf. var. *maritimus* (Willd.) Coss. & Durand, *Santia maritima* (Willd.) Fiori

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS). CHL(VAL, BIO). URY(MON, SJO).

Polygogon monspeliensis (L.) Desf.

Sin.: *Agrostis alopecuroides* Lam., *Alopecurus aristatus* Huds. var. *monspeliensis* (L.) Huds., *Alopecurus monspeliensis* L., *Polygogon monspeliensis* (L.) Desf. f. *argentinus* Hack., *Polygogon monspeliensis* (L.) Desf. f. *nana* Stuck., *Santia monspeliensis* (L.) Parl.

Hierba. Introducida. 0-3100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE). PRY(CEN). URY(ROC).

Polygogon parvulus Roseng., B.R.

Arrill. & Izag.
Sin.: *Chaetotropis parvula* (Roseng., B.R. Arrill. & Izag.) Nicora
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SFE). URY(TAC).

Polygogon viridis (Gouan) Breistr.

Sin.: *Agrostis semiverticillata* (Forssk.) C. Chr., *Agrostis verticillata* Vill., *Agrostis viridis* Gouan, *Phalaris semiverticillata* Forssk., *Polygogon semiverticillatus* (Forssk.) Hyl.

Hierba. Introducida. 0-3400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, RME). URY(MON).

Pseudechinolaena Stapf

Pseudechinolaena polystachya

(Kunth) Stapf
Sin.: *Echinolaena polystachya* Kunth, *Lappago oplismenoides* Speg., *Oplismenus oplismenoides* (Speg.) Speg.

Hierba. Cosmopolita. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI). URY(CLA, RIV, TAC).

Puccinellia Parl., nom. cons.

Puccinellia argentinensis (Hack.)

Parodi
Sin.: *Atropis argentinensis* Hack.
Hierba. Endémica. 2200-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ATA).

Puccinellia biflora (Steud.) Parodi

Sin.: *Atropis biflora* (Steud.) St.-Yves & A. Camus, *Festuca biflora* Steud., *Glyceria leptostachya* Speg., *Panicularia leptostachya* (Speg.) Macloskie, *Puccinellia biflora* (Steud.) A. Camus, comb. illeg.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Puccinellia frigida (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Catabrosa frigida* Phil., *Poa eremophila* Phil., *Poa hypsophila* Phil., *Poa oresigena* Phil., *Poa pumila* Phil., *Poa taltalensis* Pilg., *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Nicora, *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Parodi ex Spinosa, comb. illeg., *Puccinellia oresigena* (Phil.) Hitchc.
Hierba. Nativa. 2300-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Puccinellia glaucescens (Phil.) Parodi

Sin.: *Atropis osteniana* Pilg., *Catabrosa glaucescens* Phil., *Glyceria glaucescens* (Phil.) Benth., *Panicularia glaucescens* (Phil.) Kuntze, *Puccinellia glaucescens* (Phil.) Parodi var. *osteniana* (Pilg.) Parodi, *Puccinellia johnstonii* Muñoz, *Puccinellia osteniana* (Pilg.) Herter
Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, TDF). CHL(COQ, VAL, BIO, LLA, AIS, MAG, RME). URY(MON).

Puccinellia magellanica (Hook. f.)

Parodi
Sin.: *Atropis laxa* Pilg., *Atropis magellanica* (Hook. f.) Desv., *Catabrosa magellanica* Hook. f., *Glyceria antarctica* Speg., *Glyceria fuegiana* Speg., *Glyceria magellanica* (Hook. f.) Benth., *Panicularia antarctica* (Speg.) Macloskie, *Panicularia fuegiana* (Speg.) Macloskie, *Panicularia magellanica* (Hook. f.) Kuntze, *Panicularia magellanica* (Hook. f.) Macloskie, hom. illeg., *Puccinellia antarctica* (Speg.) Parodi, *Puccinellia laxa* (Pilg.) Parodi
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

Puccinellia mendozina (Hack.) Parodi

Sin.: *Atropis argentinensis* Hack. f. *mendezina* Hack., *Atropis convoluta* Griseb. var. *mendezina* Hack., *Puccinellia blomii* Jansen
Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, SAL, SJU, SCR).

Puccinellia parvula Hitchc.

Hierba. Nativa. 3500-4400 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Puccinellia preslii (Hack.) Ponert

Sin.: *Aira tenuifolia* (J. Presl) Steud.,
Atropis preslii Hack., *Atropis tenuifolia*
(J. Presl) Hauman, hom. illeg., *Atropis*
tenuifolia (J. Presl) Speg., hom. illeg.,
Catabrosa tenuifolia J. Presl, *Glyceria*
tenuifolia (J. Presl) Steud., *Panicularia*
tenuifolia (J. Presl) Kuntze, *Puccinellia*
parodii Nied., nom. superfl., *Puccinellia*
tenuifolia (J. Presl) Parodi, comb. illeg.
Hierba. Endémica. 500-4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR, SJU).
CHL(ATA, COQ).

Puccinellia pusilla (Hack.) Parodi

Sin.: *Atropis parviflora* Hack. ex Dusén,
Atropis preslii Hack. subsp. *breviculmis*
Hack., *Atropis preslii* Hack. subsp. *pusilla*
Hack., *Puccinellia parviflora* (Hack. ex
Dusén) Parodi
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Puccinellia skottsbergii (Pilg.) Parodi

Sin.: *Atropis skottsbergii* Pilg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(MAG).

Reitzia Swallen**Reitzia smithii** Swallen

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

Relchela Steud.**Relchela panicoides** Steud.

Sin.: *Agrostis asperula* Phil., *Agrostis*
corralensis Phil., *Agrostis limonias* Phil.,
Panicum oligistachyum Steud.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Rhipidocladum McClure**Rhipidocladum neumannii** Sulekic,

Rúgolo & L.G. Clark
Hierba subleñosa. Nativa. 400-1800 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Rhipidocladum racemiflorum

(Steud.) McClure
Sin.: *Arthrostyidium racemiflorum*
Steud., *Arundinaria racemiflora* (Steud.)
Hack., *Merostachys racemiflora* (Steud.)
E. Fourn.
Hierba subleñosa. Nativa. 500-1200 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Rhynchoryza Baill.**Rhynchoryza subulata** (Nees) Baill.

Sin.: *Oryza subulata* Nees
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, COA, PAI).
URY(RIV).

Rhytachne Desv.**Rhytachne rottboellioides** Desv. ex Ham.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Rostraria Trin.**Rostraria cristata** (L.) Tzvelev

Sin.: *Festuca cristata* L., *Festuca phleoides*
Vill., nom. superfl., *Koeleria campestris*
Phil., *Koeleria cristata* (L.) Bertol., *Koeleria*
phleoides (Vill.) Pers., comb. superfl.,
Lophochloa cristata (L.) Hyl., *Lophochloa*
phleoides (Vill.) Rchb., comb. superfl.,
Trisetum minutiflorum Phil.
Hierba. Introducida. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, LPA,
SJU, SFE, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR,
COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME,
IPA). URY(MAL).

Rostraria trachyantha (Phil.) Tzvelev

Sin.: *Koeleria trachyantha* Phil.,
Parodiochloa trachyantha (Phil.) A.M.
Molina, *Raimundochloa trachyantha*
(Phil.) A.M. Molina
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Rottboellia L. f., nom. cons.**Rottboellia cochinchinensis** (Lour.)

Clayton
Sin.: *Rottboellia exaltata* L. f., nom.
inval., *Stegosia cochinchinensis* Lour.
Hierba. Introducida. 600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(SCA).

Rugoloa Zuloaga**Rugoloa hylaeica** (Mez) Zuloaga

Sin.: *Panicum doellii* Mez, *Panicum*
hylaeicum Mez, *Panicum laxum* Sw. var.
amplissimum Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, CON, COA,
ÑEE, PHA). URY(ART, SAO, SJO).

Rugoloa pilosa (Sw.) Zuloaga

Sin.: *Panicum pilosum* Sw.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,
CAN, GUA, PAI).

Rugoloa polygonata (Schrad.) Zuloaga

Sin.: *Panicum boliviense* Hack., *Panicum*
pilosum Sw. var. *polygonatum* (Schrad.)
Döll, *Panicum polygonatum* Schrad.,
Panicum potamium Trin., *Panicum*
subpetiolatum Hack. ex Bertoni, nom.
nud., *Setaria polygonata* (Schrad.) Kunth
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA,
GUA, PAI, SPE).

Rytidosperma Steud.**Rytidosperma lechleri** Steud.

Sin.: *Danthonia glabra* Phil.,
Notodanthonia lechleri (Steud.) Veldkamp,
Rytidosperma glabrum (Phil.) Nicora
Hierba. Endémica. 800-3300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA, MAG, RME).

Rytidosperma paschale (Pilg.) Baeza

Sin.: *Danthonia paschalis* Pilg.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(IPA).

Rytidosperma pictum (Nees & Meyen)

Nicora var. **bimucronata** Nicora
Sin.: *Notodanthonia picta* (Nees &
Meyen) Veldkamp var. *bimucronata*
(Nicora) Veldkamp
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, AIS).

Rytidosperma pictum (Nees &

Meyen) Nicora var. **pictum**
Sin.: *Danthonia picta* Nees & Meyen,
Notodanthonia picta (Nees & Meyen)
Veldkamp
Hierba. Endémica. 900-3100 m.
Países: ARG(COR, MEN, NEU, RNE).
CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Rytidosperma quirihuense Baeza

Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(VAL, BIO).

Rytidosperma sorianoii Nicora

Sin.: *Notodanthonia sorianoii* (Nicora)
Veldkamp
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, RNE).

Rytidosperma violaceum (E. Desv.)

Nicora
Sin.: *Danthonia violacea* E. Desv.,
Notodanthonia violacea (E. Desv.)
Veldkamp
Hierba. Endémica. 900-2700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Rytidosperma virescens (E. Desv.)

Nicora var. **parvispiculum** Nicora
Sin.: *Notodanthonia virescens* (E. Desv.)
Veldkamp var. *parvispicula* (Nicora)
Veldkamp
Hierba. Endémica. 800-1200 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).

Rytidosperma virescens (E. Desv.)

Nicora var. **virescens**
Sin.: *Danthonia andina* Phil., *Danthonia picta* Nees & Meyen var. *patagonica* Speg., *Danthonia virescens* E. Desv., *Danthonia werdermanni* Pilg., *Notodanthonia virescens* (E. Desv.) Veldkamp, *Notodanthonia virescens* (E. Desv.) Veldkamp var. *patagonica* (Speg.) Veldkamp, *Rytidosperma virescens* (E. Desv.) Nicora var. *patagonica* (Speg.) Nicora
Hierba. Endémica. 0-3400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Saccharum L., nom. cons.**Saccharum angustifolium** (Nees) Trin.

Sin.: *Erianthus angustifolius* Nees, *Erianthus biaristatus* (Hack.) Swallen, *Erianthus divaricatus* (L.) Hitchc. var. *angustifolius* (Nees) Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. subsp. *angustifolius* (Nees) Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. subsp. *biaristatus* (Hack.) Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. var. *biaristatus* Hack., *Erianthus saccharoides* Michx. var. *neesii* Hack.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(DUR, MAL, MON, RIV, TAC).

Saccharum asperum (Nees) Steud.

Sin.: *Erianthus asper* Nees, *Erianthus asper* Nees var. *brasilianus* (Trin.) Hack., *Erianthus asper* Nees var. *typicus* Hack., nom. inval., *Erianthus brasilianus* (Trin.) Anders, *Saccharum brasilianum* Trin.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(MIE). URY(RIV).

Saccharum balansae (Hack.) Roberty

Sin.: *Erianthus balansae* Hack.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU).

Saccharum giganteum (Walter) Pers.

Sin.: *Anthoxanthum giganteum* Walter, *Erianthus giganteus* (Walter) P. Beauv., *Erianthus giganteus* (Walter) C.E. Hubb., comb. illeg.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Saccharum intermedium Welker & Peichoto

Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, ROC).

Saccharum trinii (Hack.) Renvoize

Sin.: *Erianthus clandestinus* Swallen, nom. Inval., *Erianthus glabrinode* (Hack.) Swallen, *Erianthus saccharoides* Michx. var. *trinii* Hack., *Erianthus purpureus* Swallen, *Erianthus trinii* (Hack.) Hack., *Saccharum villosum* Steud.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, GUA). URY(RIV, SJO).

Sacciolepis Nash**Sacciolepis myuros** (Lag.) Chase

Sin.: *Panicum myuros* Lam.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CEN, COA, PAI).

Sacciolepis vilvoides (Trin.) Chase

Sin.: *Hymenachne campestris* Nees, *Panicum vilvoides* Trin., *Panicum vilvoides* Trin. var. *campestre* (Nees) Döll, *Sacciolepis campestris* (Nees) Parodi ex Nicora, *Sacciolepis campestris* (Nees) Parodi ex Burkart, comb. superfl.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, PAI). URY(Desconocida).

Schedonorus P. Beauv.**Schedonorus pratensis** (Huds.) P. Beauv.

Sin.: *Festuca elatior* L. subsp. *pratensis* (Huds.) Hack., *Festuca pratensis* Huds.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, MEN, RNE, SLU, TDF).

Schismus P. Beauv.**Schismus arabicus** Nees

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR). CHL(COQ, VAL).

Schismus barbatus (L.) Thell.

Sin.: *Festuca barbata* L.
Hierba. Introducida. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE). CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Schizachyrium Nees**Schizachyrium angustispiculatum**

Peichoto & Welker
Hierba. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Schizachyrium bimucronatum

Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Schizachyrium brevifolium (Sw.)

Nees ex Büse
Sin.: *Andropogon brevifolius* Sw., *Andropogon floridus* Trin., *Pollinia brevifolia* (Sw.) Spreng., *Sorghum brevifolium* (Sw.) Kuntze
Hierba. Nativa. 1500-1600 m.
Países: ARG(SAL).

Schizachyrium condensatum

(Kunth) Nees
Sin.: *Andropogon condensatus* Kunth, *Andropogon condensatus* Kunth subsp. *corymbosus* Hack., *Andropogon condensatus* Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon lhotskyi* Steud., *Cymbopogon condensatus* (Kunth) Spreng., *Sorghum condensatum* (Kunth) Kuntze, *Schizachyrium mucronatum* Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, GUA, PAI, PHA). URY(MAL, RIV, TAC).

Schizachyrium glaziovii Peichoto

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, MIE, PAI). URY(ART, CLA, RIV, ROC, SAO, TAC).

Schizachyrium gracilipes (Hack.) A.

Camus

Sin.: *Andropogon gracilipes* Hack.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, GUA, MIE). URY(RIV, TAC).

Schizachyrium hatschbachii Peichoto subsp. **hatschbachii**

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Schizachyrium hatschbachii Peichoto subsp. **saltense** Sulekic & Peichoto

Hierba. Endémica. 1500-1900 m.

Países: ARG(SAL).

Schizachyrium lactiflorum (Hack.)

Herter

Sin.: *Andropogon condensatus* Kunth var. *subvar. lactiflorus* Hack., *Sorghum condensatum* (Kunth) Kuntze var. *lactiflorum* (Hack.) Hack. ex Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Schizachyrium microstachyum (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Sin.: *Andropogon condensatus* Kunth var. *paniculatus* (Kunth) Hack., *Andropogon microstachyus* Desv. ex Ham., *Andropogon paniculatus* Kunth, hom. illeg., *Andropogon paniculatus* Lam. var. *elongatus* (Hack.) Hack., *Andropogon scoparius* J. Presl, hom. illeg., *Schizachyrium microstachyum* (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag. subsp. *elongatum* (Hack.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Schizachyrium neoscoparium* Herter, *Schizachyrium paniculatum* (Kunth) Herter

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Schizachyrium paucispiculatum

Sulekic & Peichoto

Hierba. Nativa. 2500-3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Schizachyrium plumigerum (Ekman)

Parodi

Sin.: *Andropogon plumiger* Ekman

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC).

Schizachyrium salzmännii (Trin. ex Steud.) Nash var. **aristatum** (Hack.)

Peichoto

Sin.: *Andropogon imberbis* Hack., hom. illeg., *Andropogon salzmännii* (Trin. ex Steud.) Hack. var. *aristatus* Hack.,

Schizachyrium imberbe (Hack.) A. Camus

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, LRI, MIS, SLU, SDE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CAS, COL, LAV, MAL, MON, PAY, SAO, SJO, SJO, TAC, TYT).

Schizachyrium salzmännii (Steud.)

Nash var. **salzmännii**

Sin.: *Rottboellia salzmännii* Trin. ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, GUA).

Schizachyrium sanguineum (Retz.)

Alston

Sin.: *Andropogon caespitosus* Phil., *Andropogon hirtiflorus* (Nees) Kunth, *Andropogon hirtiflorus* (Nees) Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon hirtiflorus* (Nees) Kunth var. *semiberbis* (Nees) Stapf, *Andropogon luxurians* Ekman, *Andropogon riedelii* Trin., *Andropogon riedelii* Trin. var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon schottii* Rupr. ex Hack., *Andropogon semiberbis* (Nees) Kunth, *Andropogon semiberbis* (Nees) Kunth var. *incertus* Hack., *Rottboellia sanguinea* Retz., *Schizachyrium biciliatum* Roseng., B.R.

Arrill. & Izag., *Schizachyrium hirtiflorum* Nees, *Schizachyrium riedelii* (Trin.)

A. Camus, *Schizachyrium sanguineum* (Retz.) Alston var. *hirtiflorum* (Nees)

S.L. Hatch, *Schizachyrium semiberbe* Nees, *Sorghum hirtiflorum* (Nees)

Kuntze, *Sorghum riedelii* (Trin.) Kuntze, *Sorghum semiberbe* (Nees) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(VAL, BIO, RME). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(LAV, MAL, PAY, TAC, TYT).

Schizachyrium scabriflorum (Rupr.

ex Hack.) A. Camus

Sin.: *Andropogon scabriflorus* Rupr.

ex Hack., *Schizachyrium condensatum* (Kunth) Nees var. *scabriflorum* (Rupr.

ex Hack.) Roberty, *Sorghum scabriflorus* (Rupr. ex Hack.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CEN, MIE, PAI).

Schizachyrium spicatum (Spreng.)

Herter

Sin.: *Andropogon condensatus* Kunth subsp. *elongatus* (Hack.) Hack., *Andropogon consanguineus* Kunth, *Andropogon consanguineus* Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon consanguineus* Kunth var. *humilior* Hack., *Deyeuxia spicata* Spreng., *Schizachyrium intermedium* Nees, *Schizachyrium spicatum* (Spreng.) Herter

var. *breviarticulatum* Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Sorghum condensatum* (Kunth) Kuntze var. *intermedium* (Nees) Kuntze, *Sorghum consanguineum* (Kunth) Kuntze

Hierba. Nativa. 700-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(APY, AMA, BOQ, GUA). URY(ART, CLA, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).

Schizachyrium tenerum Nees var.

hirtiglume (Henrard) Peichoto

Sin.: *Andropogon tener* (Nees) Kunth var. *hirtiglumis* Henrard

Hierba. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL). BRA(SCA).

Schizachyrium tenerum Nees var. **tenerum**

Sin.: *Andropogon campestris* Kunth, hom. illeg., *Andropogon leptophyllus* Trin., nom. superfl., *Andropogon neesii* Trin., *Andropogon tener* (Nees) Kunth, *Andropogon tener* (Nees) Kunth var. *filiformis* (Nees) Hack., *Andropogon tener* (Nees) Kunth var. *genuinus* Hack., nom. inval., *Andropogon tener* (Nees) Kunth var. *neesii* (Trin.) Hack., *Andropogon tener* (Nees) Kunth var. *pilosus* Hack., *Schizachyrium filiforme* Nees, *Schizachyrium tenerum* Nees var. *filiforme* (Nees) Roberty, *Sorghum tenerum* (Nees) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, GUA, PAI). URY(ART, CLA, LAV, PAY, RIV, TAC).

Sclerochloa P. Beauv.**Sclerochloa dura** (L.) P. Beauv.

Sin.: *Cynosurus durus* L., *Eleusine dura* (L.) Lam., *Festuca dura* (L.) Vill., *Poa dura* (L.) Scop.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI).

Scleropogon Phil.**Scleropogon brevifolius** Phil.

Hierba. Nativa. 1600-4100 m.

Países: ARG(CAT, MEN, SAL, SJU).

Setaria P. Beauv., nom. cons.**Setaria alonsoi** Pensiero & Anton

Sin.: *Setaria onurus* (Willd. ex Trin.) Griseb. f. *grandiflora* Hack.

Hierba. Endémica. 500-700 m.

Países: ARG(COR, LRI).

Setaria cordobensis R.A.W. Herrm.

Sin.: *Panicum platycaule* Hack. & Stuck., nom. nud., *Setaria platycaulis* Stuck. & Hack.

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Setaria fiebrigii R.A.W. Herrm.

Sin.: *Setaria onurus* (Willd.) Griseb. f. *ramulosa* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, DFE,

ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, PAY, SAO, SOR).

Setaria geminata (Forssk.) Veldkamp

Sin.: *Echinochloa geminata* (Forssk.) Roberty, *Panicum paludivagum* Hitchc. & Chase, *Paspalidium geminatum* (Forssk.) Stapf, *Paspalidium geminatum* (Forssk.) Stapf var. *paludivagum* (Hitchc. & Chase) Gould, *Paspalidium paludivagum* (Hitchc. & Chase) Henrard, comb. superfl., *Paspalidium paludivagum* (Hitchc. & Chase) Parodi, *Paspalidium pilgeri* Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CON, PAI, PHA). URY(MON, ROC).

Setaria globulifera (Steud.) Griseb.

Sin.: *Panicum globuliferum* Steud., *Setaria berroi* Hack., *Setaria dura* R.A.W. Herrm., *Setaria paucifolia* (Morong) Lindm. var. *planifolia* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CEN, ITA, ÑEE, PHA, SPE). URY(CLA, DUR, RNO, SOR).

Setaria hassleri Hack.

Sin.: *Setaria hassleri* R.A.W. Herrm., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CAT, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Setaria hunzikeri Anton

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, BOQ, CEN, PAI, PHA).

Setaria italica (L.) P. Beauv.

Sin.: *Chaetochloa italica* (L.) Scribn., *Chamaeraphis italica* (L.) Kuntze, *Ixophorus italicus* (L.) Nash, *Panicum italicum* L., *Pennisetum italicum* (L.) R. Br.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, FOR, LPA, MEN, MIS, SFE, SLU). BRA(RGS).

Setaria lachnea (Nees) Kunth

Sin.: *Chaetochloa argentina* (R.A.W.

Herrm.) Hitchc., *Panicum lachneum* Nees, *Setaria argentina* R.A.W. Herrm., *Setaria leiantha* Hack., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *leiantha* Hack., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *microstachya* Hack.

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(COL).

Setaria leucopila (Scribn. & Merr.) K. Schum.

Sin.: *Chaetochloa leucopila* Scribn. & Merr., *Setaria commutata* Hack.

Hierba. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU).

Setaria macrostachya Kunth

Sin.: *Chaetochloa macrostachya* (Kunth) Scribn. & Merr., *Chamaeraphis macrostachya* (Kunth) Kuntze ex Stuck., *Chamaeraphis setosa* (Sw.) Kuntze var. *macrostachya* (Kunth) Kuntze, *Panicum macrostachyum* (Kunth) Nees, *Setaria inopinata* Toolin

Hierba. Nativa. 0-1900 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, GUA, NAS, PHA).

Setaria magna Griseb.

Sin.: *Chaetochloa magna* (Griseb.) Scribn., *Chamaeraphis magna* (Griseb.) Beal

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL). BRA(RGS).

Setaria megaphylla (Steud.) T.

Durand & Schinz

Sin.: *Panicum megaphyllum* Steud.

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: BRA(PAR).

Setaria mendocina Phil.

Sin.: *Setaria kuntzeana* R.A.W. Herrm., *Setaria villiglumis* Hicken

Hierba. Endémica. 0-3100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

Setaria nicorae Pensiero

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SAL, SDE, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, NAS, PHA).

Setaria oblongata (Griseb.) Parodi

Sin.: *Chaetochloa oblongata* (Griseb.) Hitchc., *Panicum lilloi* Hack., *Panicum oblongatum* Griseb., *Setaria leiocarpa* R.A.W. Herrm., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. var. *interrupta* Stuck.

Hierba. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Setaria palmifolia (J. Koenig) Stapf

Sin.: *Panicum palmifolium* J. Koenig

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR). CHL(IPA).

Setaria pampeana Parodi ex Nicora

Sin.: *Setaria caudata* (Lam.) Roem. & Schult. f. *ramosa* Hack., *Setaria hassleri* Hack. var. *aequalis* Hack.

Hierba. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(SAO).

Setaria paraguayensis Pensiero

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

Setaria parodii Nicora

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS, SFE).

BRA(RGS). URY(CLA, FLO, FLA).

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen

var. **brachytricha** Pensiero

Sin.: *Panicum brachytrichum* Steud. ex Lechl., nom. nud., *Setaria brachytricha* (Steud. ex Lechl.) Mez, comb. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen

var. **parviflora**

Sin.: *Cenchrus parviflorus* Poir., *Panicum flavum* Nees, *Panicum geniculatum* Poir., *Panicum imberbe* Poir. var. *dasyurum* (Willd. ex Nees) Döll, *Panicum imberbe* Poir. var. *latifolium* Döll, *Panicum imberbe* Poir., *Panicum penicillatum* Willd. ex Nees, hom. illeg., *Panicum tejucense* Nees, *Setaria discolor* Hack., *Panicum dasyurum* Willd. ex Nees, *Setaria flava* (Nees) Kunth, *Setaria geniculata* P. Beauv. var. *pauceseta* E. Desv., *Setaria geniculata* P. Beauv., *Setaria glauca* (L.) P. Beauv. var. *imberbis* (Poir.) Griseb., *Setaria glauca* (L.) P. Beauv. var. *penicillata* (Willd. ex Nees) Griseb., *Setaria gracilis* Kunth f.

breviglumis Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *brevisetata* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *brevispica* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *flaviseta* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *longiseta* Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *megalantha* Stuck., *Setaria gracilis* Kunth f. *purpurascens* (Kunth) Hack., *Setaria gracilis* Kunth f. *radicans* Hack., *Setaria gracilis* Kunth var. *glauco-caesia* Arechav., *Setaria gracilis* Kunth var. *purpurascens* (Kunth) Arechav., *Setaria gracilis* Kunth, *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *brevispica* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *flaviseta* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *longiseta* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *radicans* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *setislongioribus* Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. f. *uberius* Hack., nom. nud., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. var. *genuina* Hack., nom. inval., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. var. *gracilis* (Kunth) Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. var. *purpurascens* (Kunth) Hack., *Setaria imberbis* (Poir.) Roem. & Schult., *Setaria penicillata* (Willd. ex Nees) J. Presl, *Setaria purpurascens* Kunth, *Setaria tejucensis* (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, NAS, PAI, PHA). URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen

var. **pilosissima** (Hack.) Pensiero

Sin.: *Setaria barretoii* Boldrini, *Setaria gracilis* Kunth var. *pilosissima* Hack.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

Setaria paucifolia (Morong) Lindm.

Sin.: *Chamaeraphis paucifolia* Morong, *Setaria glaziovii* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Setaria pflanzii Pensiero

Hierba. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, PHA).

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.

Sin.: *Panicum imberbe* Poir. var. *pumilum* (Poir.) Nees, *Panicum pumilum* Poir., *Setaria glauca* (L.) P. Beauv. var. *pumila* (Poir.) Asch. & Graebn.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SFE). CHL(TAR, ATA, VAL, MAU, BIO, RME). PRY(APY, BOQ).

Setaria rosenfurtii Nicora var.

rosenfurtii

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(MAL, MON).

Setaria rosenfurtii Nicora var.

uruguayensis Pensiero

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(ART, MON, RIV, SAO).

Setaria scabrifolia (Nees) Kunth

Sin.: *Panicum scabrifolium* Nees

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Setaria scandens Schrad. ex Schult.

Sin.: *Chaetochloa scandens* (Schrad.)

Scribn., *Panicum scandens* (Schrad.)

Trin. var. *grandiflorum* Döll, *Panicum*

scandens (Schrad.) Trin. var. *longiseta*

Döll, *Panicum scandens* (Schrad.) Trin.

var. *vulgare* Döll, *Panicum scandens*

(Schrad.) Trin., *Setaria scandens* Schrad.

ex Schult. var. *sphacelata* Hack., *Setaria*

trinii Kunth

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, JUJ, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, GUA).

Setaria setosa (Sw.) P. Beauv.

Sin.: *Panicum setosum* Sw., *Setaria caudata* (Lam.) Roem. & Schult., *Setaria rariflora* J.C. Mikan ex Trin., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. var. *aestiva* Hack. ex Bertoni, nom. nud., *Setaria setosa* (Sw.) P. Beauv. f. *typica* Stuchlik, nom. inval.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

Setaria sphacelata (Schumach.)

Stapf & C.E. Hubb. var. **anceps** (Stapf)

Veldkamp

Hierba. Introducida.

Países: PRY(APA, AMA, ITA).

Setaria sphacelata (Schumach.)

Stapf & C.E. Hubb. var. **sericea** (Stapf) Clayton

Sin.: *Setaria anceps* Stapf var. *sericea* Stapf

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL).

BRA(RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, ITA).

URY(FLA, SOR).

Setaria stolonifera Boldrini

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(SFE). BRA(RGS).

Setaria sulcata Raddi

Sin.: *Agrostis flabellata* Salzm.

ex Steud., nom. nud., *Chaetochloa poiretiana* (Schult.) Hitchc., *Panicum elongatum* Poir., hom. illeg., *Panicum poiretianum* Schult., *Setaria poiretiana* (Schult.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Setaria tenax (A. Rich.) Desv.

Sin.: *Panicum tenax* A. Rich., *Setaria sphaerocarpa* (Salzm.) C.E. Hubb.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CEN, CON, COA, PAI).

Setaria vaginata Spreng. var.**bonariensis** Nicora

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(RGS). URY(MAL).

Setaria vaginata Spreng. var.**tandilensis** Nicora

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(BAI).

Setaria vaginata Spreng. var.**vaginata**

Sin.: *Setaria caespitosa* Hack. & Arechav., *Setaria onurus* (Willd. ex Trin.) Griseb., *Panicum onurus* Willd. ex Trin., *Panicum utriculatum* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PAI). URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SOR).

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

Sin.: *Chaetochloa verticillata* (L.) Scribn., *Chamaeraphis verticillata* (L.) Porter, *Ixophorus verticillatum* (L.)

Nash, *Panicum adhaerans* Forssk., *Panicum verticillatum* L. var. *parviflorum* Döll, *Panicum verticillatum* L., *Setaria adhaerans* (Forssk.) Chiov., *Setaria depauperata* Phil., *Setaria leiantha* Hack. f. *subhirsuta* Hack., *Setaria pratensis* Phil.

Hierba. Introducida. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, RME). PRY(CEN). URY(MON, PAY).

Setaria verticilliformis Dumort.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN).

Setaria viridis (L.) P. Beauv.

Sin.: *Chaetochloa viridis* (L.) Scribn., *Chamaeraphis viridis* (L.) Millsp., *Ixophorus viridis* (L.) Nash, *Panicum viride* L., *Pennisetum viride* (L.) R. Br., *Setaria italica* (L.) P. Beauv. subsp. *viridis* (L.) Thell.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SFE). BRA(RGS). CHL(ANT, ATA, VAL, BIO, RME, JFE). URY(SOR).

Setaria vulpiseta (Lam.) Roem.

& Schult. var. **reversipila** (R.A.W. Herrm.) Pensiero

Sin.: *Setaria reversipila* R.A.W. Herrm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. var. **vulpiseta**

Sin.: *Chaetochloa vulpiseta* (Lam.) Hitchc. & Chase, *Chamaeraphis composita* (Kunth) Kuntze, *Chamaeraphis setosa* (Sw.) Kuntze var. *vulpiseta* (Lam.) Kuntze, *Panicum macrourum* Trin., *Panicum vulpisetum* Lam., *Setaria lancifolia* R.A.W. Herrm., *Setaria liebmanii* E. Fourn. f. *trichorhachis* Hack., *Setaria polystachya* Schrad. ex Schult.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Sorghastrum Nash**Sorghastrum balansae** (Hack.) Dávila

Sin.: *Andropogon balansae* (Hack.) Hack., *Sorghum balansae* Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, MIE).

Sorghastrum contractum (Hack.)

Kuhlmann & A. Kuhn

Sin.: *Sorghum nutans* (L.) Nash subsp. *contractum* Hack.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR). A BASE.

Sorghastrum minarum (Nees) Hitchc.

Sin.: *Andropogon minarum* (Nees) Kunth, *Chrysopogon minarum* (Nees) Benth., *Chrysopogon stipoides* Trin., nom. superfl., *Sorghum minarum* (Nees) Hack., *Trachypogon minarum* Nees

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA).

Sorghastrum nutans (L.) Nash

Sin.: *Andropogon nutans* L. var. *avenaceus* (Michx.) Hack., *Andropogon nutans* L., *Holcus nutans* (L.) Kuntze ex Stuck. var. *avenaceus* Stuck., *Holcus nutans* (L.) Kuntze ex Stuck., *Sorghum nutans* (L.) A. Gray var. *genuinum* Hack., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi

Sin.: *Andropogon nutans* L. var. *albescens* (Hack.) Hack., *Andropogon nutans* L. var. *pellitus* (Hack.) Hack., *Andropogon pellitus* (Hack.) Herter, *Andropogon saccharoides* Sw. var. *polytrichus* Griseb., *Sorghastrum albescens* (Hack.) A.I.P. Flores, *Sorghastrum flexuosum* Swallen, *Sorghastrum nutans* (L.) Nash subsp. *albescens* (Hack.) Burkart, *Sorghastrum nutans* (L.) Nash subsp. *pellitum* (Hack.) Burkart, *Sorghastrum pilgeri* Herter, *Sorghum nutans* (L.) A. Gray subsp. *albescens* Hack., *Sorghum nutans* (L.) A. Gray subsp. *pellitum* Hack.

Hierba. Nativa. 1600-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(COA). URY(ART, FLA, MAL, ROC, SOR).

Sorghastrum scaberrimum (Nees)

Herter

Sin.: *Andropogon nutans* L. var. *scaberrimum* (Nees) Hack., *Andropogon scaberrimum* (Nees) Kunth, *Sorghum nutans* (L.) A. Gray subsp. *scaberrimum* (Nees) Hack., *Trachypogon scaberrimum* Nees

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sorghastrum setosum (Griseb.)

Hitchc.

Sin.: *Andropogon agrostoides* Speg., *Andropogon francavillanus* E. Fourn., *Andropogon nutans* L. var. *agrostoides* (Speg.) Hack., *Andropogon nutans* L. var. *submuticus* (Hack.) Hack., *Andropogon setosus* Griseb., *Sorghastrum agrostoides* (Speg.) Hitchc., *Sorghastrum francavillanum* (E. Fourn.) Hitchc., *Sorghastrum parviflorum* (Desv.) Hitchc. & Chase, *Sorghastrum stipoides* (Kunth) Nash subsp. *agrostoides* (Speg.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Sorghum nutans* (L.) A. Gray var. *submuticum* Hack., *Sorghum parviflorum* Desv. ex Ham., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, GUA). URY(RIV, TAC).

Sorghastrum stipoides (Kunth) Nash

Sin.: *Andropogon humboldtianum* Steud., nom. superfl., *Andropogon nutans* L. var. *burchellii* Hack., *Andropogon nutans* L. var. *stipoides* (Kunth) Hack., *Andropogon rufidulus* Steud., *Andropogon stipoides* Kunth, *Sorghum nutans* (L.) A. Gray var. *stipoides* Hack.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU). URY(DUR, TAC).

Sorghastrum viride Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, GUA, MIE, SPE). URY(RIV).

Sorghum Moench**Sorghum alnum** Parodi

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Sorghum bicolor (L.) Moench

Hierba. Introducida.

Países: CHL(IPA).

Sorghum halepense (L.) Pers. var. **halepense**

Sin.: *Andropogon halepensis* (L.) Brot., *Andropogon sorghum* (L.) Brot. var. *halepensis* (L.) Hack., *Holcus halepensis* L., *Sorghum halepense* (L.) Pers. var. *genuinum* Hack., nom. inval.

Hierba. Introducida. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, MAG, RME, IPA). PRY(CEN). URY(MON).

Sorghum halepense (L.) Pers. var. **muticum** (Hack.) Hayek

Sin.: *Sorghum halepense* (L.) Pers. var. *muticum* (Hack.) Parodi, comb. superfl., *Sorghum halepense* (L.) Pers. f. *muticum* (Hack.) C.E. Hubb.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, JUJ, LPA, MIS, NEU, SJU).

Sporobolus R. Br.**Sporobolus aeneus** (Trin.) Kunth var. **aeneus**

Sin.: *Sporobolus acuminatus* (Trin.) Hack., *Sporobolus acuminatus* (Trin.) Hack. var. *longispiculis* Boechat & Longhi-Wagner, *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth f. *parviflora* Parodi, *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth var. *barbicollis* Hack., *Sporobolus eximius* (Nees ex Trin.) Ekman var. *latifolius* Boechat & Longhi-Wagner, *Sporobolus sprengelii* Kunth, *Vilfa acuminata* Trin., *Vilfa aenea* Trin., *Vilfa aenea* Trin. var. *angustifolia* Döll, *Vilfa aenea* Trin. var. *latifolia* Döll, *Vilfa elatior* Nees

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, COA, SPE).

Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth var. **angustifolia** (Döll) S.S. Denham & Aliscioni

Sin.: *Sporobolus adustus* (Trin.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth f. *parviflora* Parodi, *Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth var. *subbulbosum* (Arechav.) Parodi, *Sporobolus camporum* Swallen, *Sporobolus subbulbosum* Arechav., *Vilfa adusta* Trin., *Vilfa aenea* Trin. var. *angustifolia* Döll

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, PAI). URY(DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, SJO, TAC).

Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth var. **eximius** (Nees ex Trin.) S.S. Denham & Aliscioni

Sin.: *Sporobolus eximius* (Nees ex Trin.) Ekman, *Sporobolus nudiramus* Boechat & Longhi-Wagner, *Vilfa eximia* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 600-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA).

Sporobolus alterniflorus (Loisel.)

P.M. Peterson & Saarela

Sin.: *Dactylis fasciculata* Lam., *Spartina alterniflora* Loisel., *Spartina brasiliensis* Raddi, *Spartina dissitiflora* Steud., *Spartina fasciculata* (Lam.) P. Beauv., *Spartina maritima* (Curtis) Fernald var. *alterniflora* (Loisel.) St.-Yves, *Spartina maritima* (Curtis) Fernald var. *brasiliensis* (Raddi) St.-Yves, *Trachynotia alterniflora* (Loisel.) DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON).

Sporobolus ciliatus J. Presl

Sin.: *Sporobolus rupestris* Kunth, *Vilfa ciliata* (J. Presl) Trin. var. *grandiflora* Döll, *Vilfa ciliata* (J. Presl) Trin. var. *parviflora* Döll, *Vilfa ciliata* (J. Presl) Trin., comb. illeg.

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Sporobolus coarctatus (Trin.) P.M.

Peterson & Saarela

Sin.: *Solenachne ciliata* (Brongn.) Herter, *Solenachne phalaroides* Steud., *Spartina ciliata* Brongn., *Spartina ciliata* Kunth, nom. nud., *Spartina coarctata* Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

Sporobolus cryptandrus (Torr.) A. Gray

Sin.: *Agrostis cryptandra* Torr., *Sporobolus cryptandrus* (Torr.) A. Gray var. *typicus* (Torr.) E.K. Jones & Fassett, nom. inval., *Sporobolus subinclusus* Phil. f. *panicula expansa* Stuck., nom. inval., *Sporobolus subinclusus* Phil. var. *expansus* Parodi, *Sporobolus subinclusus* Phil., *Vilfa cryptandra* (Torr.) Torr. ex Trin.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU, SFE).

Sporobolus densiflorus (Brongn.)

P.M. Peterson & Saarela

Sin.: *Chauvinia chilensis* Steud., *Spartina densiflora* Brongn., *Spartina juncea* Willd. var. *laxiflora* St.-Yves, *Spartina juncea* Willd. var. *montevicensis* (Arechav.) St.-Yves,

Spartina montevidensis Arechav.,
Spartina patagonica Speg., *Sporobolus montevidensis* (Arechav.) P.M. Peterson & Saarela

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, LPA, RNE, SLU, SCR, SFE).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA). URY(MON).

Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. **andinus** Renvoize

Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. **indicus**

Sin.: *Agrostis indica* L., *Axonopus poiretii* Roem. & Schult., *Sporobolus berterioanus* (Trin.) Hitchc. & Chase, ., *Sporobolus minor* Trin. ex Kunth, *Sporobolus poiretii* (Roem. & Schult.) Hitchc., *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. var. *exilis* (Trin.) T. Koyama, *Vilfa berterioana* Trin., *Vilfa exilis* Trin., *Vilfa indica* (L.) Trin. ex Steud., *Vilfa rupestris* Trin.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, IPA).
PRY(AMA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, COL, MAL, MON, RNO, ROC).

Sporobolus linearifolius Nicora

Sin.: *Sporobolus exilis* Renvoize, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 800-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Sporobolus × longispicus (Hauman & Parodi ex St.-Yves) P.M. Peterson & Saarela

Sin.: *Spartina longispica* Hauman & Parodi ex St.-Yves
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA). URY(CAS, MAL).

Sporobolus maximus Hauman

Hierba. Endémica. 1800-2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Sporobolus mendocinus E. Méndez

Hierba. Endémica. 1300-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Sporobolus metallicolus Longhi-

Wagner & Boechat
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Sporobolus monandrus Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART).

Sporobolus multinodis Hack.

Sin.: *Sporobolus multinodis* Hack. var. *exasperatum* Hack.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS). URY(RIV).

Sporobolus phleoides Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).

Sporobolus platensis Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(FLA, SAO).

Sporobolus pseudairoides Parodi

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(Desconocida).

Sporobolus pyramidalis P. Beauv.

Sin.: *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. var. *pyramidalis* (P. Beauv.) Veldkamp, *Sporobolus jacquemontii* Kunth, *Vilfa jacquemontii* (Kunth) Trin.
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc.

Sin.: *Agrostis pyramidata* Lam., *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth, *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth var. *tuberculatus* (Hack.) Hack., *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth f. *purpurascens* Hack., *Sporobolus tuberculatus* Hack., *Vilfa arguta* Nees
Hierba. Nativa. 0-1900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY). URY(CAS, MON).

Sporobolus rigens (Trin.) E. Desv. var. **atacamensis** (Parodi) Asteg.

Sin.: *Sporobolus rigens* (Trin.) E. Desv. f. *atacamensis* Parodi
Hierba. Endémica. 3500-3800 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Sporobolus rigens (Trin.) E. Desv. var. **expansa** E. Méndez

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

Sporobolus rigens (Trin.) E. Desv. var. **rigens**

Sin.: *Diachyrium arundinaceum* Griseb., *Diachyrium rigens* (Trin.) Mez, *Epicampes arundinacea* (Griseb.) Hack., *Epicampes rigens* (Trin.) Phil., hom. illeg., *Sporobolus arundinaceus* (Griseb.) Kuntze, *Vilfa rigens* Trin.
Hierba. Nativa. 0-3700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).

Sporobolus spartinus (Trin.) P.M.

Peterson & Saarela
Sin.: *Spartina argentinensis* Parodi, *Spartina densiflora* Brongn. var. *obtusa* Hack., *Spartina spartinae* (Trin.) Merr. ex Hitchc., *Spartina spartinae* (Trin.) Merr., nom. inval., *Vilfa spartinae* Trin.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, SFE). PRY(APY, BOQ).

Sporobolus virginicus (L.) Kunth

Sin.: *Agrostis littoralis* Lam., *Agrostis virginica* L., *Vilfa luxurians* Steud. ex Lechl., *Vilfa virginica* (L.) P. Beauv.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(AYP, TAR).

Stapfochloa H. Scholz

Stapfochloa berroi (Arechav.) P.M. Peterson

Sin.: *Chloris accumbens* Hack. ex Arechav., nom. nud., *Chloris berroi* Arechav.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, SFE). URY(MON, PAY, RNO, SJO, SJO).

Stapfochloa canterae (Arechav.) P.M. Peterson

Sin.: *Chloris canterae* Arechav.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS).
PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, CLA, COL, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Stapfochloa elata (Desv.) P.M. Peterson

Sin.: *Andropogon barbatus* L., *Andropogon polydactylon* L., nom. illeg., *Chloris barbata* (L.) Nash, hom. illeg., *Chloris dandyana* C.D. Adams, *Chloris*

elata Desv., *Chloris polydactyla* (L.) Sw. f. *pauciradiata* Kurtz, *Chloris polydactyla* (L.) Sw.

Hierba. Nativa. 0-2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, FLA, MAL, SJO, SOR, TAC).

Stapfchloa grandiflora (Roseng. & Izag.) Wipff & Shaw

Sin.: *Chloris canterae* Arechav. var.

grandiflora (Roseng. & Izag.) Anderson, *Chloris grandiflora* Roseng. & Izag.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, SLU, SFE). BRA(RGS). URY(ART, CLA, COL, FLO, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SJO, TAC).

Stapfchloa parodiana (Roseng. & Izag.) Wipff & Shaw

Sin.: *Chloris boliviensis* Renvoize,

Chloris parodiana Roseng. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(CEN, CON, PAI).

Stapfchloa parvispicula (Caro & E.A. Sánchez) P.M. Peterson

Sin.: *Chloris parvispicula* Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SDE, TUC). PRY(APY).

Steinchisma Raf.

Steinchisma decipiens (Nees ex Trin.) W.V. Br.

Sin.: *Panicum decipiens* Nees ex Trin. var. *parviflorum*, *Panicum decipiens* Nees ex Trin., Döll, *Panicum decipiens* Nees, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(LAV, MAL, ROC, TAC).

Steinchisma hians (Elliott) Nash

Sin.: *Panicum hians* Elliott, *Panicum megapotamicum* Spreng, *Panicum milioides* Nees ex Trin. var. *filifolium* R.A. Palacios, *Panicum milioides* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, DUR, FLA, MAL, SJO, SOR, TAC).

Steinchisma laxa (Sw.) Zuloaga

Sin.: *Panicum laxum* Sw., *Panicum laxum* Sw. var. *pubescens* Döll, p.p., *Panicum laxum* Sw. f. *minor* Hack., nom. nud., *Panicum laxum* Sw. var. *vestitum* L.B. Sm. & Wassh., *Panicum psilanthum* Steud.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(SJO).

Steinchisma spathellosa (Döll)

Renvoize

Sin.: *Panicum schenckii* Hack., *Panicum spathellosum* Döll, *Panicum turfosum* Mez

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, COA, PAI).

Stenotaphrum Trin.

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze

Sin.: *Ischaemum secundatum* Walter, *Stenotaphrum americanum* Schrank, *Stenotaphrum dimidiatum* (L.) Brongn. var. *americanum* (Schrank) Hack., *Stenotaphrum glabrum* Trin.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, BIO, LRI, LLA). PRY(CEN). URY(ROC).

Stephostachys Zuloaga & Morrone

Stephostachys mertensii (Roth)

Zuloaga & Morrone

Sin.: *Panicum megiston* Schult. f. *pauciflora* Hack., *Panicum megiston* Schult., *Panicum mertensii* Roth

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Streptochaeta Schrad.

Streptochaeta spicata Schrad. ex Nees

Sin.: *Lepideilema lanciflorum* Trin.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, GUA).

Taeniatherum Nevski

Taeniatherum caput-medusae (L.)

Nevski

Sin.: *Elymus caput-medusae* L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(LBO, MAU).

Themeda Forssk.

Themeda quadrivalvis (L.) Kuntze

Sin.: *Andropogon quadrivalvis* L., *Andropogon nutans* L., hom. illeg., *Anthistiria ciliata* L. f., nom. nud.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SFE). BRA(RGS). PRY(SPE).

Thinopyrum A. Löve

Thinopyrum ponticum (Podp.)

Barkworth & D.R.Dewey

Sin.: *Agropyron elongatum* (Host)

P. Beauv., *Elymus ponticus* (Podp.)

N. Snow, *Elytrigia elongata* (Host)

Nevski, *Elytrigia pontica* (Podp.)

Holub, *Lophopyrum elongatum* (Host)

A. Löve, *Lophopyrum ponticum* (Podp.)

A. Löve, *Thinopyrum elongatum* (Host)

D.R.Dewey, *Thinopyrum ponticum*

(Podp.) Z.W. Liu & R.R.-C. Wang, nom.

superfl., *Triticum elongatum* Host,

Triticum ponticum Podp.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(COR, LPA, NEU, SLU, TDF).

Trachypogon Nees

Trachypogon macroglossus Trin.

Sin.: *Trachypogon filifolius* (Hack.)

Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze

Sin.: *Andropogon montufarii* Kunth, *Stipa spicata* L. f., *Trachypogon canescens* Nees, *Trachypogon densus* Swallen,

Trachypogon mollis Nees, *Trachypogon montufarii* (Kunth) Nees var. *mollis* (Nees) Burkart, comb. superfl., *Trachypogon montufarii* (Kunth) Nees var. *mollis* (Nees) Andersson, *Trachypogon montufarii* (Kunth) Nees, *Trachypogon plumosus* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Nees, *Trachypogon polymorphus* Hack. var. *montufarii* (Kunth) Hack., *Trachypogon rigidifolius* Swallen
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA). URY(MAL).

Tragus Haller

Tragus andicola Zapater & Sulekic
Hierba. Endémica. 1900-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Tragus australianus Blake
Hierba. Introducida. 0-1100 m.
Países: ARG(FOR, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU). PRY(APY).

Tragus berteronianus Schult.
Sin.: *Lappago aliena* Spreng.
Hierba. Introducida. 200-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Tragus racemosus (L.) All.
Sin.: *Cenchrus racemosus* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Trichanthecium Zuloaga & Morrone

Trichanthecium caaguazuense (Henrard) Zuloaga & Morrone
Sin.: *Panicum caaguazuense* Henrard
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU).

Trichanthecium cyanescens (Nees ex Trin.) Zuloaga & Morrone
Sin.: *Panicum cyanescens* Nees ex Trin., *Panicum vinnulum* Swallen
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA).

Trichanthecium parvifolium (Lam.) Zuloaga & Morrone
Sin.: *Panicum parvifolium* Lam.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Trichanthecium pseudisachne (Mez) Zuloaga & Morrone
Sin.: *Panicum pseudisachne* Mez
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR).

Trichanthecium schwackeanum (Mez) Zuloaga & Morrone
Sin.: *Panicum helobium* Mez ex Henrard, *Panicum schwackeanum* Mez
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, MON).

Trichanthecium wettsteinii (Hack.) Zuloaga & Morrone
Sin.: *Panicum wettsteinii* Hack.
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Trichoneura Andersson

Trichoneura weberbaueri Pilg.
Hierba. Nativa. 2900-3200 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Tridens Roem. & Schult.

Tridens brasiliensis (Nees ex Steud.) Parodi
Sin.: *Triodia brasiliensis* (Nees ex Steud.) Lindm., *Triodia figueirae* Arechav., *Uralepis brasiliensis* Nees ex Steud.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(FLA, SAO, TAC).

Tridens hackelii (Arechav.) Parodi
Sin.: *Triodia hackelii* Arechav.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). URY(ART).

Tridens nicorae Anton
Sin.: *Antonella nicorae* (Anton) Caro
Hierba. Endémica.
Países: ARG(COR, SLU).

Tridens riograndensis Acedo & Llamas
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: BRA(RGS).

Tripogon Roem. & Schult.

Tripogon ekmanii Nicora & Rúgolo
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(AMA). URY(TYT).

Tripogon nicorae Rúgolo & A.S.Vega
Hierba. Nativa. 2900-3600 m.
Países: ARG(CAT, LRI). CHL(TAR).

Tripogonella P.M. Peterson & Romasch.

Tripogonella spicata (Nees) P.M. Peterson & Romasch.
Sin.: *Bromus spicatus* Nees, *Diplachne spicata* (Nees) Döll, *Sieglingia spicata* (Nees) Kuntze ex Stuck., *Triplasis setacea* Griseb., *Tripogon spicatus* (Nees) Ekman
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(AYP, TAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, COA, ITA, PAI, SPE). URY(ART, FLO, LAV, MAL, MON, RNO, SAO, SJO, TAC).

Tripsacum L.

Tripsacum australe H.C. Cutler & E.S. Anderson
Hierba. Nativa. 200 m.
Países: PRY(AMA).

Trisetum Pers., nom. cons.

Trisetum ambiguum Rúgolo & Nicora
Hierba. Endémica. 300-900 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Trisetum barbinode Trin. var. **barbinode**
Sin.: *Trisetum barbinode* Trin. var. *hirtiflorum* (Hack.) Louis-Marie, *Trisetum hirtiflorum* Hack.
Hierba. Endémica. 500-3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Trisetum barbinode Trin. var.**sclerophyllum** (Hack.) FinotSin.: *Trisetum sclerophyllum* Hack.

Hierba. Endémica. 1700-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Trisetum bulbosum Hitchc.Sin.: *Helictotrichon bulbosum* (Hitchc.)

Parodi

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: ARG(BAI). CHL(BIO).

Trisetum caudulatum Trin.Sin.: *Koeleria caudulata* (Trin.)

Griseb., *Koeleria grisebachii* Domin, nom. superfl., *Koeleria lechleri* Steud., *Trisetum caudulatum* Trin. var. *correae* Nicora, *Trisetum chiloense* Phil., *Trisetum chromostachyum* Desv., *Trisetum heterogamum* Steud., *Trisetum heteronymum* Steud., *Trisetum lechleri* (Steud.) Nicora, *Trisetum malacophyllum* Steud., *Trisetum monticola* Phil., *Trisetum ochrostachyum* Phil., *Trisetum splendulum* Steud., *Trisetum variabile* E. Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *chiloense* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum variabile* E. Desv. var. *flavescens* E. Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *vidali* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum variabile* E. Desv. var. *virescens* E. Desv., *Trisetum vidali* Phil.

Hierba. Endémica. 1100-3500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Trisetum cernuum Trin.Sin.: *Avena cernua* (Trin.) Kunth, *Avena leptostachya* Hook. f., *Trisetum fraudulentum* Steud.

Hierba. Nativa. 100-1600 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.Sin.: *Avena flavescens* L.

Hierba. Introducida.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAG).

Trisetum johnstonii (Louis-Marie)Finot subsp. **johnstonii**Sin.: *Trisetum oreophilum* Louis-Marie var. *johnstonii* Louis-Marie

Hierba. Endémica. 2900-4600 m.

Países: ARG(MEN, NEU, SJU).

CHL(ATA, COQ, RME).

Trisetum johnstonii (Louis-Marie)Finot subsp. **mattheii** (Finot) FinotSin.: *Trisetum mattheii* Finot

Hierba. Endémica. 4000-4100 m.

Países: CHL(TAR).

Trisetum juergensii Hack.Sin.: *Deschampsia juergensii* (Hack.)

Valencia

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Trisetum longiglume Hack. var.**glabratum** Nicora

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU).

Trisetum longiglume Hack. var.**longiglume**Sin.: *Deschampsia andicola* (Louis-Marie) Valencia, *Trisetum andicola*

Louis-Marie

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU).

CHL(RME).

Trisetum nancaguense Finot

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Trisetum preslei (Kunth) E. Desv.

Sin.: *Avena pilosa* J. Presl, hom. illeg., *Avena preslei* Kunth, *Deschampsia lasiantha* Phil., *Trisetum buchtienii* Hack., *Trisetum lasiolepis* E. Desv., *Trisetum preslei* (Kunth) E. Desv. var. *buchtienii* (Hack.) Louis-Marie, *Trisetum preslei* (Kunth) E. Desv. var. *lasianthum* (Phil.) Louis-Marie

Hierba. Endémica. 1800-4000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Trisetum pyramidatum Louis-Marie

ex Finot

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: ARG(RNE). CHL(AIS, MAG).

Trisetum spicatum (L.) K. Richt.subsp. **cumingii** (Nees ex Steud.) Finot

Sin.: *Koeleria cumingii* Nees ex Steud., *Trisetum cumingii* (Nees ex Steud.) Parodi ex Nicora, *Trisetum cumingii* (Nees ex Steud.) Parodi ex Nicora var. *santacruzense* Nicora, *Trisetum malacophyllum* Phil., hom. illeg., *Trisetum mollifolium* Louis-Marie, *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *cumingii* (Nees ex Steud.) Finot

Hierba. Endémica. 0-1100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, BIO, LLA, MAG, RME).

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. subsp.**dianthemum** (Louis-Marie) FinotSin.: *Trisetum biflorum* Phil., hom.illeg., *Trisetum dianthemum* (Louis-Marie) Finot, *Trisetum spicatum* (L.) K.Richt. var. *dianthemum* Louis-Marie

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHU). CHL(LLA).

Trisetum spicatum (L.) K. Richt.subsp. **phleoides** (d'Urv.) MacloskieSin.: *Avena phleoides* d'Urv.,*Trisetum hirsutum* Phil., hom. illeg.,*Trisetum phleoides* (d'Urv.) Kunth,*Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp.*phleoides* (d'Urv.) Hultén, hom. illeg.,*Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var.*hirsutum* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum**subspicatum* (L.) P. Beauv. var. *phleoides*

(d'Urv.) Hack.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Trisetum spicatum (L.) K. Richt.subsp. **spicatum**Sin.: *Aira spicata* L., *Aira subspicata*L., nom. illeg., *Avena airoides* Koeler,*Koeleria spicata* Rchb. ex Willk. &Lange, nom. inval., *Koeleria subspicata*(L.) Rchb., *Trisetum andinum* Phil.,hom. illeg., *Trisetum fuegianum* Gand.,*Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. subsp.*bolivianum* Hultén, *Trisetum spicatum*(L.) K. Richt. var. *fuegianum* (Hack.)Louis-Marie, *Trisetum spicatum* (L.)K. Richt. var. *spicatum*, *Trisetum**subspicatum* (L.) P. Beauv. var.*breviglume* Hack., *Trisetum subspicatum*(L.) P. Beauv. var. *fuegianum* Hack.,*Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv.var. *glabrifolium* Hack. ex Macloskie,*Trisetum subspicatum* (L.) P. Beauv.,

nom. superfl.

Hierba. Nativa. 0-4700 m.

Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Tristachya Nees**Tristachya leiostachya** Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Urochloa P. Beauv.**Urochloa adspersa** (Trin.) R.D.

Webster

Sin.: *Brachiaria adspersa* (Trin.) Parodi,*Brachiaria echinulata* (Mez) Parodi,

Panicum adspersum Trin. var. *exile* Lindm., *Panicum adspersum* Trin. var. *neesi* Lindm., *Panicum adspersum* Trin., *Panicum echinulatum* Mez var. *boliviense* Henrard, *Panicum echinulatum* Mez
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, MIE, PAI, PHA).

Urochloa arrecta (Hack. ex T. Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga
Sin.: *Brachiaria arrecta* (Hack. ex T. Durand & Schinz) Stent, *Panicum arrectum* Hack. ex T. Durand & Schinz
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(RGS, SCA).

Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster
Sin.: *Brachiaria brizantha* (Hochst. ex A. Rich.) Stapf, *Panicum brizanthum* Hochst. ex A. Rich.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ).

Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster
Sin.: *Brachiaria decumbens* Stapf
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, SPE).

Urochloa dictyoneura (Fig. & De Not.) Veldkamp
Sin.: *Brachiaria dictyoneura* (Fig. & De Not.) Stapf
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA). PRY(AMA).

Urochloa fusca (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin
Sin.: *Brachiaria fasciculata* (Sw.) Parodi, *Brachiaria fasciculata* (Sw.) S.T. Blake, comb. superfl., *Panicum fasciculatum* Sw., *Panicum fuscum* Sw., *Urochloa fasciculata* (Sw.) R.D. Webster
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

Urochloa humidicola (Rendle) Morrone & Zuloaga
Sin.: *Brachiaria humidicola* (Rendle) Schweick., *Panicum humidicolum* Rendle
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, SCA).

Urochloa lorentziana (Mez) Morrone & Zuloaga
Sin.: *Brachiaria lorentziana* (Mez) Parodi, *Panicum lorentzianum* Mez, *Panicum velutinosum* Nees f. *viride* Stuck., *Panicum velutinosum* Nees f. *violascens* Stuck.
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy
Sin.: *Panicum mosambicense* Hack.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE).

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen
Sin.: *Brachiaria mutica* (Forssk.) Stapf, *Brachiaria purpurascens* (Raddi) Henrard, *Panicum barbinode* Trin., *Panicum equinum* Salzm. ex Steud., *Panicum muticum* Forssk., *Panicum paraguayense* Steud. ex Döll, nom. inval., *Panicum purpurascens* Raddi
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA).

Urochloa panicoides P. Beauv.
Hierba. Introducida. 300-700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, SAL, SFE, SDE, TUC).

Urochloa paucispicata (Morong) Morrone & Zuloaga
Sin.: *Acroceras paucispicata* (Morong) Henrard, *Brachiaria paucispicata* (Morong) Clayton, *Panicum paucispicatum* Morong
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, PHA).

Urochloa plantaginea (Link) R.D. Webster
Sin.: *Brachiaria plantaginea* (Link) Hitchc., *Panicum plantagineum* Link
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, SPE). URY(ART, RNO, RIV).

Urochloa platyphylla (Munro ex C. Wright) R.D. Webster
Sin.: *Brachiaria extensa* Chase, *Brachiaria platyphylla* (Munro ex C. Wright) Nash, *Panicum platyphyllum* Munro ex C. Wright, *Paspalum platyphyllum* Griseb., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(CEN, ÑEE, PAI). URY(ART).

Urochloa ruziziensis (R. Germ. & Evrard) Crins
Sin.: *Brachiaria ruziziensis* R. Germ. & Evrard, *Urochloa ruziziensis* (R. Germ. & Evrard) Morrone & Zuloaga, comb. superfl.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vahlodea Fr.

Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fr. ex Hartmann
Sin.: *Aira atropurpurea* Wahlenb. var. *magellanica* (Hook. f.) Skottsbo., *Aira atropurpurea* Wahlenb., *Aira magellanica* Hook. f., *Avena atropurpurea* (Wahlenb.) Link, *Deschampsia atropurpurea* (Wahlenb.) Scheele, *Deschampsia brachyphylla* Phil., *Holcus atropurpureus* (Wahlenb.) Wahlenb., *Vahlodea atropurpurea* (Wahlenb.) Fr. ex Hartmann subsp. *magellanica* (Hook. f.) Hyl.
Hierba. Nativa. 400-2300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG, RME).

Willkommia Hack.

Willkommia texana Hitchc.
Sin.: *Craspedorhachis texana* (Hitchc.) Pilg. var. *stolonifera* (Parodi) Pilg., *Willbleibia stolonifera* (Parodi) Herter, *Willkommia texana* Hitchc. var. *stolonifera* Parodi
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). URY(RNO, RIV).

Zizaniopsis Döll & Asch.

Zizaniopsis bonariensis (Balansa & Poitr.) Speg.
Sin.: *Zizania bonariensis* Balansa & Poitr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MON, ROC, SJO).

Zizaniopsis longhi-wagnerae E.

Dalmolim, A. Zanin & R. Trevis.

Sin.: *Zizania microstachya* Nees ex Trin.

Países: BRA(SCA).

Zizaniopsis microstachya (Nees ex

Trin.) Döll & Asch.

Sin.: *Zizania microstachya* Nees ex Trin.

Hierba. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zizaniopsis villanensis Quarín

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, COS, SFE).

PODOSTEMACEAE

Apinagia Tul.**Apinagia fucoides** (Mart. & Zucc.) Tul.Sin.: *Lacis fucoides* Mart. & Zucc.

Hierba acuática. Nativa. 400-900 m.

Países: BRA(SCA).

Apinagia guairaensis Fiebrig

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAN).

Apinagia richardiana (Tul.) RoyenSin.: *Ligea richardiana* Tul.

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Apinagia riedelii (Bong.) Tul.Sin.: *Apinagia yguazuensis* Chodat & Vischer, *Lacis riedelii* Bong., *Neolacis riedelii* (Bong.) Wedd.

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN).

Blandowia Willd.**Blandowia striata** Willd.Sin.: *Apinagia striata* Griseb., p.p., *Apinagia willdenowii* (Tul.) Tul., *Dicraea willdenowii* Tul., *Lacis fallacissima* Bisch.

Hierba acuática. Endémica.

Países: CHL(Desconocida).

Castelnavia Tul. & Wedd.**Castelnavia princeps** Tul. & Wedd.

emend. Warm.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS).

Heterotristicha Tobler**Heterotristicha schroederi** Tobler

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: URY(RNO).

Marathrum Bonpl.**Marathrum azarensis** Tur

Hierba acuática. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(SCA).

PRY(ITA).

Mourera Aubl.**Mourera aspera** (Bong.) Tul.Sin.: *Lacis aspera* Bong., *Mourera penicillata* Hicken

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

Mourera weddelliana Tul.

Hierba acuática. Nativa.

Países: BRA(SCA).

Podostemum Michx.**Podostemum comatum** HickenSin.: *Podostemum undulatum* P. Royen var. *angustifolium* P. Royen, *Podostemum dimorphum* P. Royen, *Podostemum undulatum* P. Royen

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CON, GUA). URY(RNO, SAO).

Podostemum distichum (Cham.) Wedd.Sin.: *Lacis disticha* Cham., *Podostemum aguirensis* Chodat & Vischer, *Podostemum atrichum* Chodat & Vischer, *Podostemum chamissonis* Trin., nom. superfl., *Podostemum glaziovianum* Warm., *Podostemum schenkii* Warm., *Podostemum warmingii* Chodat & Vischer

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CON, COA, PAI). URY(RNO, SAO, SOR).

Podostemum irgangii C.T. Philbrick

& Novelo

Hierba acuática. Endémica. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Podostemum muelleri Warm.Sin.: *Podostemum dentatum* P. Royen, *Podostemum galvone* Warm., *Podostemum uruguayense* Warm.

Hierba acuática. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(SAO).

Podostemum rutifolium Warm.Sin.: *Podostemum ostenianum* Warm.

Hierba acuática. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CON).

URY(SAO, SOR).

Podostemum scaturiginum (Mart.)

C.T. Philbrick & Novelo

Sin.: *Crenias scaturiginum* (Mart.)C.D.K. Cook & Rutish., *Crenias scopulorum* Spreng., nom. illeg., *Mniopsis scaturiginum* Mart.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Podostemum weddellianum (Tul.) C.T.

Philbrick & Novelo

Sin.: *Crenias weddelliana* (Tul.) C.D.K.Cook & Rutish., *Mniopsis weddelliana* Tul.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Tristicha Thouars, nom. cons.**Tristicha trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng.Sin.: *Dufourea hypnoides* A. St.-Hil., *Dufourea trifaria* Bory ex Willd., *Tristicha hypnoides* (A. St.-Hil.) Spreng.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

CON, ITA). URY(RNO, SAO).

Wettsteiniola Suess.**Wettsteiniola apipensis** Tur

Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Wettsteiniola pinnata Suess.

Hierba acuática. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(PAR).

POLEMONIACEAE

Bryantiella J.M. Porter**Bryantiella glutinosa** (Phil.) J.M.

Porter

Sin.: *Gilia glutinosa* Phil.

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Cobaea Cav.**Cobaea scandens** Cav.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Collomia Nutt.**Collomia biflora** (Ruiz & Pav.) BrandSin.: *Collomia biflora* (Ruiz & Pav.)

Brand var. *lateritia* (Don) Brand, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn., *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *coccinea* (Lehm. ex Lindl.) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *lateritia* (Don) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *soehrensi* (Phil.) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. f. *stenosiphon* (Kunze) Wherry, *Collomia coccinea* Lehm. ex Lindl., *Collomia lateritia* Don, *Collomia soehrensi* Phil., *Collomia stenosiphon* Kunze, *Gilia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Phlox biflora* Ruiz & Pav., *Phlox unidentata* Bertero

Hierba. Nativa. 200-1300 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Collomia grandiflora Douglas ex Lindl.

Hierba. Introducida. 800 m.

Países: ARG(RNE).

Gilia Ruiz & Pav.**Gilia crassifolia** Benth.

Sin.: *Gilia andicola* Phil., *Gilia crassifolia* Benth. var. *andicola* (Phil.) Brand, *Gilia intermedia* Phil., *Gilia lanigera* Phil., *Gilia patagonica* Speg.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Gilia laciniata Ruiz & Pav.

Sin.: *Gilia alpina* (Wedd.) Brand, *Gilia erecta* Hieron., *Gilia laciniata* Ruiz & Pav. var. *alpina* Wedd., *Gilia laciniata* Ruiz & Pav. var. *erecta* (Hieron.) Brand

Hierba. Nativa. 0-4300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE). URY(COL).

Gilia valdiviensis Griseb.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(MEN, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, LLA, RME, JFE).

Giliastrum (Brand) Rydb.**Giliastrum castellanosii** J.M. Porter

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.

Países: ARG(CAT).

Giliastrum foetidum (Gillies ex

Benth.) J.M. Porter

Sin.: *Gilia foetida* Gillies ex Benth.

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, MEN, SAL, SJU).

Ipomopsis Michx.**Ipomopsis gossypifera** (Gillies ex Benth.) V.E. Grant

Sin.: *Gilia douglasii* Gillies ex Benth., *Gilia gossypifera* Gillies ex Benth., *Gilia involucrata* Phil.

Hierba. Nativa. 2400-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA).

Leptosiphon Benth.**Leptosiphon pusillus** (Benth.) J.M. Porter & L.A. Johnson

Sin.: *Gilia pusilla* Benth., *Linanthus pusillus* (Benth.) Greene

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Microsteris Greene**Microsteris gracilis** (Hook.) Greene

Sin.: *Collomia chubutensis* Speg., *Collomia eritrichoides* Griseb., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth. var. *congesta* Wedd., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth. var. *minuartioides* Franch., *Collomia micrantha* Kellogg, *Gilia gracilis* Hook., *Gilia gracilis* Phil., hom. illeg., *Gilia gracilis* Hook. var. *congesta* (Wedd.) Borsini, *Gilia gracilis* Hook. var. *eritrichoides* (Griseb.) Brand, *Gilia gracilis* Hook. var. *micrantha* (Kellogg) Brand, *Gilia gracilis* Hook. var. *minuartioides*

(Franch.) Borsini, comb. illeg., *Gilia micrantha* (Kellogg) A. Nelson, *Microsteris micrantha* (Kellogg) Greene, *Navarretia gracilis* (Hook.) Kuntze, *Phlox gracilis* (Hook.) Greene, *Polemonium morenonis* Kuntze

Hierba. Nativa. 0-4100 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Navarretia Ruiz & Pav.**Navarretia involucrata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Collomia navarretia* G. Don, *Gilia berterii* DC., *Gilia eryngoides* Lehm., *Gilia mucronata* Lehm., *Gilia navarretia* Steud., *Navarretia pusilla* Hort ex Steud.

Hierba. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, RME).

Polemonium L.**Polemonium micranthum** Benth.

Sin.: *Gilia diffusa* Phil., *Gilia gayana* Wedd., *Gilia arcuata* Hieron., *Gilia johowi* F. Meigen, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *arcuata* (Hieron.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *diffusa* (Phil.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *gayana* (Wedd.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *johowi* (F. Meigen) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *typica* Wherry, nom. inval., *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. f. *violascens* (Speg. ex Brand) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. var. *violascens* Brand, *Polemoniella micrantha* (Benth.) A. Heller, *Polemonium antarcticum* Griseb., *Polemonium antarcticum* Griseb. f. *violascens* Speg. ex Brand, *Polemonium gayanum* (Wedd.) Brand var. *violascens* (Speg.) Brand, *Polemonium gayanum* (Wedd.) Brand

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, AIS, MAG, RME).

POLYGALACEAE

Acanthocladus Klotzsch**Acanthocladus albicans** A.W. Benn.

Sin.: *Polygala albicans* (A.W. Benn.) Grondona, *Polygala bennetti* Chodat, nom. superfl.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

Acanthocladus brasiliensis (A. St.-Hil. & Moq.) Klotzsch ex Hassk.

Sin.: *Mundia brasiliensis* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala klotzschii* Chodat
Arbolito. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Asemeia Raf.**Asemeia acuminata** (Willd.) J.F.B.

Pastore & J.R. Abbott
Sin.: *Polygala acuminata* Willd., *Polygala fimbriata* A.W. Benn.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Asemeia extraaxillaris (Chodat) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott

Sin.: *Polygala extraaxillaris* Chodat, *Polygala extraaxillaris* Chodat f. *humilis* Hicken, *Polygala extraaxillaris* Chodat var. *conceptionis* Chodat, *Polygala extraaxillaris* Chodat var. *elata* Chodat, nom. nud., *Polygala fallax* Chodat f. *angustifolia* Chodat, *Polygala fallax* Chodat, nom. inval.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Asemeia hebeclada (DC.) J.F.B.

Pastore & J.R. Abbott
Sin.: *Polygala hebeclada* DC.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA).

Asemeia hirsuta (A. St.-Hil. & Moq.)

J.F.B. Pastore & J.R. Abbott
Sin.: *Polygala hirsuta* A. St.-Hil. & Moq.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).

Asemeia rhodoptera (A.W. Benn.)

J.F.B. Pastore & J.R. Abbott
Sin.: *Polygala rhodoptera* Mart. ex A.W. Benn.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Asemeia tobatiensis (Chodat) J.F.B.

Pastore & J.R. Abbott
Sin.: *Polygala tobatiensis* Chodat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA).

Asemeia violacea (Aubl.) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott

Sin.: *Polygala violacea* Aubl.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Bredemeyera Willd.**Bredemeyera brevifolia** (Benth.)

A.W. Benn.
Sin.: *Catocoma brevifolia* Benth.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Bredemeyera colletioides (Phil.) Chodat

Sin.: *Hualania colletioides* Phil.
Arbusto. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, TUC).

Bredemeyera floribunda Willd.

Arbusto o árbol. Nativa. 200-300 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).

Bredemeyera laurifolia (A. St.-Hil.)

Klotzsch ex A.W. Benn.
Sin.: *Comesperma laurifolium* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Bredemeyera microphylla (Griseb.)

Hieron. var. **adpressa** Norverto & R.L. Pérez-Mor.
Arbusto. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU).

Bredemeyera microphylla (Griseb.)

Hieron. var. **microphylla**
Sin.: *Acanthocladus microphyllus* Griseb., *Polygala chodatiana* A.W. Benn., *Polygala spinescens* Gillies ex Hook. & Arn. var. *aspalathoides* Ball
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, TUC).

Caamembeca J.F.B. Pastore**Caamembeca insignis** (Klotzsch ex

Chodat) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala insignis* Chodat
Subarbusto o arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Caamembeca laureola (A. St.-Hil. &

Moq.) J.F.B. Pastore
Sin.: *Polygala laureola* A. St.-Hil. & Moq.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY).

Caamembeca oxyphylla (DC.) J.F.B.

Pastore
Sin.: *Polygala oxyphylla* DC.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Monnina Ruiz & Pav.**Monnina cardiocarpa** A. St.-Hil.

Sin.: *Pteromonnina cardiocarpa* (A. St.-Hil.) B. Eriksen
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(PAR, RGS, SCA).

Monnina cuneata A. St.-Hil.

Sin.: *Monnina emarginata* A. St.-Hil., *Monnina hilairiana* Hassk., *Monnina retusa* C. Presl, *Pteromonnina retusa* (C. Presl) B. Eriksen
Hierba. Nativa. 0-100 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(MAL, MON, TAC).

Monnina dictyocarpa Griseb.

Sin.: *Monnina argentina* I.M. Johnst., *Monnina wilczekiana* Chodat, *Pteromonnina dictyocarpa* (Griseb.) B. Eriksen
Hierba. Endémica. 0-3400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR).

Monnina intermedia Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(RIV).

Monnina itapoanensis Vianna & Marques

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Monnina linearifolia Ruiz & Pav.

Sin.: *Pteromonnina linearifolia* (Ruiz & Pav.) B. Eriksen
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Monnina lorentziana Chodat

Sin.: *Pteromonnina lorentziana* (Chodat) B. Eriksen
Hierba. Endémica. 800-2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Monnina mucronata Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(Desconocida).

Monnina oblongifolia Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA). URY(RIV).

Monnina philippiana Chodat

Sin.: *Monnina pterocarpa* Ruiz & Pav. var. *angustifolia* (DC.) Hook. & Arn., *Pteromonnina philippiana* (Chodat) B. Eriksen
Hierba. Endémica. 100-1600 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Monnina pumila Ferreyra

Sin.: *Monnina humahuaguensis* Grondona
Hierba. Nativa. 3000 m.
Países: ARG(JUJ).

Monnina ramosissima Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(TAC).

Monnina resedoides A. St.-Hil.

Sin.: *Monnina resedoides* A. St.-Hil. var. *crispata* Hook. ex A.W. Benn., *Pteromonnina resedoides* (A. St.-Hil.) B. Eriksen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(ITA). URY(RNO).

Monnina richardiana A. St.-Hil.

Sin.: *Monnina cordata* A. St.-Hil., *Monnina richardiana* A. St.-Hil. var. *angustior* A. St.-Hil., *Monnina tristaniana* A. St.-Hil. subsp. *richardiana* (A. St.-Hil.) Marques, *Pteromonnina richardiana* (A. St.-Hil.) B. Eriksen
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Monnina rusbyi Chodat

Sin.: *Pteromonnina rusbyi* (Chodat) B. Eriksen
Hierba. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Monnina stenophylla A. St.-Hil.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Monnina tristaniana A. St.-Hil.

Sin.: *Monnina richardiana* A. St.-Hil. var. *angustifolia* Chodat, *Monnina tristaniana* A. St.-Hil. var. *robusta* Chodat, *Pteromonnina tristaniana* (A. St.-Hil.) B. Eriksen
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, ITA, PAI, SPE). URY(CLA).

Monnina virescens Arechav.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(Desconocida).

Monnina wrightii A. Gray

Sin.: *Monnina brachystachya* Griseb., *Pteromonnina wrightii* (A. Gray) B. Eriksen
Hierba. Nativa. 1300-2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). URY(TAC).

Polygala L.**Polygala adenophylla** A. St.-Hil. & Moq. var. **adenophylla**

Sin.: *Polygala paraguayensis* A.W. Benn.
Hierba subleñosa. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(AMA, COA, GUA, SPE). URY(PAY, RIV).

Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq. var. **parvifolia** A. St.-Hil. & Moq.

Sin.: *Polygala telephium* Chodat var. *gracilis* Chodat, *Polygala telephium* Chodat var. *robusta* Chodat
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, COA).

Polygala altomontana Lüdtke, Boldrini & Miotto

Subarbusto. Endémica. 900-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polygala aphylla A.W. Benn.

Sin.: *Polygala glaziouii* Chodat
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLA, LAV, RNO, RIV, TAC).

Polygala appendiculata Vell.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polygala argentinensis Chodat

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Polygala aspalatha L.

Sin.: *Polygala aspalatha* L. var. *comosa* Chodat, *Polygala cyparissias* A. St.-Hil. & Moq. var. *laxifolia* Chodat, *Polygala grondonae* Zuloaga & Morrone, *Polygala neaei* DC., *Polygala polycephala* A. St.-Hil. & Moq., *Polygala reflexa* Grondona, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, SPE). URY(CAS, MON, TAC).

Polygala australis A.W. Benn.

Sin.: *Polygala pamparum* Speg.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).

Polygala boliviensis A.W. Benn.

Hierba. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Polygala bonariensis Grondona

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). URY(CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Polygala brasiliensis L.

Sin.: *Polygala brasiliensis* L. var. *cordata* A.W. Benn., *Polygala dunaliana* A. St.-Hil. & Moq.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, MIE). URY(CLA, MON, RNO, RIV, SJO, TAC).

Polygala campestris Gardner

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, TAC).

Polygala celosioides Mart. ex A.W. Benn.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Polygala cneorum A. St.-Hil. & Moq.

Sin.: *Polygala pseudostricta* Chodat
Hierba. Nativa. 500-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN).

Polygala corralitae Tombesi & R.

Kiesling

Hierba. Endémica. 3000-3300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC).

Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq.Sin.: *Polygala corisoides* A. St.-Hil. & Moq.,*Polygala cyparissias* A. St.-Hil. & Moq. var.*corisoides* (A. St.-Hil. & Moq.) Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MON, ROC).

Polygala darwiniana A.W. Benn.Sin.: *Acanthocladus tehuelchum* Speg.,*Polygala tehuelchum* (Speg.) Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Polygala densiracemosa Lüdtke &

Miotto

Hierba. Endémica.

Países: BRA(RGS, SCA).

Polygala desiderata Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, SCR).

Polygala duarteana A. St.-Hil. & Moq.Sin.: *Polygala chacoensis* Chodat,*Polygala duarteana* A. St.-Hil. & Moq.var. *chacoensis* (Chodat) Chodat,*Polygala pseudolaurifolia* Chodat,*Polygala pseudolaurifolia* Chodat var.*pilcomayensis* Chodat, *Polygala villa-rica*Chodat, *Polygala villa-rica* Chodat var.*foliosa* Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA). URY(CLA, DUR, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).

Polygala equisetoides A. St.-Hil. & Moq.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Polygala gayi A.W. Benn.Sin.: *Polygala stricta* Gay, hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-1600 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Polygala glaziouii Chodat

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Polygala glochidiata KunthSin.: *Polygala glochidiata* Kunth var.*oxyrhynchos* (Chodat) Marques, *Polygala**oxyrhynchos* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR).

PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA,

ITA, MIE, PAI, SPE).

Polygala gnidioides Willd.Sin.: *Polygala eutaxoides* Turcz.,*Polygala gnidioides* Willd. var. *pubescenti-**pilosa* Hook. & Arn., *Polygala pratensis*Phil., *Polygala thesioides* Willd.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA,

LRI, LLA, AIS, RME).

Polygala gracilis KunthSin.: *Polygala chuitii* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del

proyecto). PRY(CAN).

Polygala guaranitica Chodat

Hierba. Endémica. 100-700 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Polygala hickeniana Grondona

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Polygala hieronymi Chodat

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(COR, SLU, TUC).

Polygala hygrophila KunthSin.: *Polygala weddelliana* Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CAA, CAN, ÑEE).

Polygala jujuyensis Grondona

Hierba. Endémica. 2600-2800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Polygala kurtzii A.W. Benn.

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(MEN).

Polygala lancifolia A. St.-Hil. & Moq.Sin.: *Polygala michelii* Chodat, *Polygala**virgata* Vell., hom. illeg.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Polygala leptocaulis Torr. & A. GraySin.: *Polygala paludosa* A. St.-Hil. &Moq. var. *angustocarpa* Chodat

Hierba. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

URY(CAS, MAL, MON, RIV, SJO, TAC).

Polygala leucantha A.W. Benn.Sin.: *Polygala graebiana* Chodat,*Polygala rubioides* Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, COA, PAI).

Polygala linoides Poir. var. **laxiflora**

Grondona

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Polygala linoides Poir. var. **linoides**Sin.: *Polygala linoides* Poir. var.*ambigua* Beauverd & Felipp., *Polygala**marplatensis* Grondona, *Polygala tristis*Chodat var. *apensis* Chodat

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS,

SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,

CAA, MIE, PAI, PHA). URY(CAS, COL,

DUR, FLA, MON, ROC, SOR).

Polygala longicaulis KunthSin.: *Polygala longicaulis* Kunth f.*minutiflora* Chodat, *Polygala longicaulis*Kunth var. *flavicomis* Chodat, *Polygala**longicaulis* Kunth var. *major* Chodat

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON,

COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Polygala lycopodioides ChodatSin.: *Polygala dusenii* Norl.

Hierba subleñosa. Nativa. 800-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Polygala minima Pohl ex A.W. Benn.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR). PRY(CAU, ITA,

PAI, SPE).

Polygala molluginifolia A. St.-Hil. & Moq.Sin.: *Polygala areguensis* A.W. Benn.,*Polygala molluginifolia* A. St.-Hil. & Moq.f. *albiflora* Kuntze, *Polygala molluginifolia*A. St.-Hil. & Moq. f. *rosea* Kuntze,*Polygala orthiocarpa* Chodat, *Polygala**verticillata* L. var. *molluginifolia* (A. St.-

Hil. & Moq.) Arechav.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,

JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA,). URY(ART, CLA, MON, RIV, SAO, TAC, TYT).

Polygala monosperma A.W. Benn.
Sin.: *Polygala pseudosericea* Chodat
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, PAI).

Polygala moquiniana A. St.-Hil.
Subarbusto. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Polygala obovata A. St.-Hil. & Moq.
Sin.: *Polygala albicoma* Arechav.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(SAO).

Polygala oedipus Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Polygala oreophila Speg.
Hierba. Endémica. 2100-2300 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Polygala paniculata L.
Sin.: *Polygala tenella* Willd.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA).

Polygala patagonica Phil.
Hierba subleñosa. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Polygala persistens A.W. Benn.
Sin.: *Polygala paradoxa* Chodat
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(MAU).

Polygala poaya Mart.
Sin.: *Polygala angulata* DC. var. *angustifolia* A.W. Benn.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Polygala pterolopha Chodat
Sin.: *Monrosia pterolopha* (Chodat) Grondona
Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Polygala pulchella A. St.-Hil. & Moq.
Sin.: *Polygala pulchella* A. St.-Hil. & Moq.
var. *robusta* Grondona, *Polygala pulchella* A. St.-Hil. & Moq. f. *major* Chodat, *Polygala stricta* Arechav., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, PAI, SPE). URY(ART, CLA, DUR, MAL, MON, RIV, ROC, SOR, TAC).

Polygala pumila Norl.
Hierba. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polygala punctata A.W. Benn.
Sin.: *Polygala hassleriana* Chodat, *Polygala wittrockiana* Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, AMA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI). URY(CLA).

Polygala resedoides A. St.-Hil. & Moq.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA).
BRA(RGS). URY(FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SOR).

Polygala riograndensis Lüdtké & Miotto
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Polygala rojasii Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(AMA, CAN, CEN).

Polygala rosei Hicken
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(RNE).

Polygala sabuletorum Skottsb.
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Polygala salasiana Gay
Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ATA, COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Polygala santacruzensis Grondona
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Polygala selaginoides A.W. Benn.
Sin.: *Polygala tristis* Chodat
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, ITA, SPE).

Polygala sellowiana A. St.-Hil. & Moq.
Sin.: *Polygala hatschbachii* Brade, *Polygala sabulosa* A.W. Benn.
Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polygala solieri Gay
Hierba. Endémica. 2800-3000 m.
Países: CHL(ATA).

Polygala spinescens Gillies ex Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 1500-3100 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, SJU).

Polygala stenophylla A. Gray
Sin.: *Polygala acutiappendiculata* Chodat, *Polygala bicarunculata* Chodat, *Polygala stenophylla* A. Gray var. *oxycarpa* Chodat
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

Polygala subandina Phil.
Sin.: *Polygala chloroneura* Griseb., *Polygala chloroneura* Griseb. var. *glabrescens* Chodat, *Polygala cordobensis* A.W. Benn., *Polygala grisea* A.W. Benn., *Polygala mendocina* Phil., *Polygala neaei* DC. f. *glabra* Griseb., *Polygala oxyantha* Phil., *Polygala philippiana* Chodat
Hierba. Nativa. 0-4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(LBO, BIO, ARA, RME).

Polygala subverticillata Chodat
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Polygala telephium Chodat
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAN).

Polygala tenuis DC.
Sin.: *Polygala amabayensis* Chodat
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, PAI).

Polygala timoutoides Chodat
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(RIV).

Polygala ventanensis Grondona
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI).

Polygala williamsii Böcher, Hjert. & Rahn

Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(MEN).

Securidaca L.

Securidaca diversifolia (L.) S.F. Blake

Sin.: *Polygala diversifolia* L.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Securidaca lanceolata A. St.-Hil.

Sin.: *Securidaca sellowiana* Klotzsch ex A.W. Benn.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, PAI, SPE).

Securidaca macrocarpa A.W. Benn.

Arbusto o liana. Nativa. 600-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Securidaca ovalifolia A. St.-Hil.

Sin.: *Securidaca fallax* Chodat,
Securidaca ovalifolia A. St.-Hil. f.
microphylla Chodat
Arbusto. Nativa. 200-300 m.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, COA, GUA, PAI).

Securidaca rivinifolia A. St.-Hil. & Moq.

Arbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

POLYGONACEAE

Antigonon Endl.

Antigonon leptopus Hook. & Arn.

Enredadera. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).
PRY(CEN, COA).

Chorizanthe R. Br. ex Benth.

Chorizanthe commissuralis J. Remy

Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(SJU). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Chorizanthe dasyantha Phil.

Sin.: *Chorizanthe fasciculata* Phil.,
Chorizanthe humilis Phil., *Chorizanthe*

illapelina Phil., *Chorizanthe intricata*

Phil., *Chorizanthe parviflora* Phil.,
Chorizanthe tenuis Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Chorizanthe densa Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-900 m.
Países: CHL(VAL).

Chorizanthe deserticola Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Chorizanthe flavescens Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ).

Chorizanthe frankenioides J. Remy

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chorizanthe gajardoi Teillier &

Macaya
Hierba. Endémica. 1900 m.
Países: CHL(COQ).

Chorizanthe glabrescens Benth.

Sin.: *Chorizanthe tenuis* Phil.,
Chorizanthe vaginata Benth. var. *arida* J.
Remy
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Chorizanthe kingii Phil.

Sin.: *Chorizanthe pauciflora* Phil.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chorizanthe mieresii Teillier &

Macaya
Subarbusto. Endémica. 100 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chorizanthe navasiae Teillier &

Macaya
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(COQ).

Chorizanthe novoana Teillier &

Macaya
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Chorizanthe paniculata Benth.

Sin.: *Chorizanthe macraei* Benth.,
Chorizanthe macraei Benth. var. *humilis*
Benth., *Chorizanthe ramosissima* Benth.,
Chorizanthe rosea Phil.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Chorizanthe peduncularis Benth.

Sin.: *Chorizanthe umbellata* Phil.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(ATA, COQ).

Chorizanthe rosasii Teillier & Macaya

Hierba. Endémica. 1700-2600 m.
Países: CHL(COQ).

Chorizanthe vaginata Benth.

Sin.: *Chorizanthe vaginata* Benth. var.
maritima J. Remy
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU).

Chorizanthe virgata Benth.

Sin.: *Chorizanthe virgata* Benth. var.
tomentosa Benth.
Subarbusto. Endémica. 900 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Chorizanthe viridis Phil.

Subarbusto. Endémica. 800-1100 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Coccoloba P. Browne

Coccoloba arborescens (Vell.) R.A.

Howard
Sin.: *Polygonum arborescens* Vell.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Coccoloba argentinensis Speg.

Sin.: *Coccoloba praecox* Herter, hom. illeg.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, PAI). URY(SAO).

Coccoloba cordata Cham.

Sin.: *Coccoloba candolleana* Meisn.,
Coccoloba cordata Cham. var. *praecox*
Hassl., *Coccoloba tiliacea* Lillo, hom. illeg.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAN, CEN, CON, ITA, ÑEE, PAI, PHA).

Coccoloba cujabensis Wedd.

Sin.: *Coccoloba longiochreata* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(APY).

Coccoloba glaziovii Lindau

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Coccoloba guaranitica Hassl.

Sin.: *Coccoloba guaranitica* Hassl. var. *opaca* Hassl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA).

Coccoloba paraguariensis Lindau

Sin.: *Coccoloba correntina* Rojas Acosta, *Coccoloba microphylla* Morong, *Coccoloba morongii* Hassl.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR).
PRY(APY, CEN, COA, ITA, PAI, PHA).

Coccoloba persicaria Wedd.

Arbusto o arbolito. Nativa.
Países: BRA(PAR, SC).

Coccoloba spinescens Morong

Sin.: *Coccoloba chacoensis* Standl., *Coccoloba paraguariensis* Lindau f. *intermedia* Hassl., *Coccoloba paraguariensis* Lindau f. *ovatifolia* Herzog, *Coccoloba paraguariensis* Lindau var. *grandifolia* Hassl., *Coccoloba paraguariensis* Lindau var. *spinescens* (Morong) Hassl., *Coccoloba sarmentosa* S. Moore
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Coccoloba tiliacea Lindau

Sin.: *Coccoloba peltata* Griseb., hom. illeg.
Árbol. Nativa. 300-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Coccoloba warmingii Meisn.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Emex Neck. ex Campd., nom. cons.**Emex spinosa** (L.) Campd.

Sin.: *Rumex spinosa* L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(COQ). URY(MON, PAY, SOR).

Eriogonum Michx.**Eriogonum divaricatum** Hook.

Sin.: *Eriogonum ameghinoi* Speg., *Sanmartinia ameghinoi* (Speg.) M. Buchinger
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Fallopia Adans.**Fallopia japonica** (Houtt.) Ronse Decr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(LLA, AIS).

Fallopia sachalinensis (F. Schmidt)

Ronse Decr.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(LLA).

Koenigia L.**Koenigia islandica** L.

Sin.: *Koenigia fuegiana* Dusén
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Lastarriaea J. Remy**Lastarriaea chilensis** J. Remy

Sin.: *Chorizanthe chilensis* (J. Remy) Goodman, *Chorizanthe lastarriaea* Parry, nom. illeg., *Lastarriaea linearis* Phil. ex Parry, *Lastarriaea stricta* Phil.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Muehlenbeckia Meisn., nom. cons.**Muehlenbeckia fruticulosa** (Walp.)

Standl.
Sin.: *Polygonum fruticosum* Walp.
Arbusto. Nativa. 3400-3500 m.
Países: CHL(AYP).

Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M.

Johnst. var. **fascicularis** (Meisn.) Brandbyge
Sin.: *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *brachybotrys* Meisn., p.p., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *fascicularis* Meisn.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(RNE). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M.

Johnst. var. **hastulata**
Sin.: *Calacinum chilense* (Meisn.) J.F. Macbr., *Karkinetron undulatum* Raf., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *brachybotrys* Meisn., p.p., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *injucunda* (Lindl.) Meisn., *Polygonum hastulatum* (Sm.) Kuntze, *Polygonum injucunda* Lindl.,

Rumex hastulatus Sm.

Arbusto. Endémica. 0-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Muehlenbeckia hastulata (Sm.)

I.M. Johnst. var. **rotundata** (Phil.) Brandbyge
Sin.: *Muehlenbeckia rotundata* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(BIO, AIS, MAG).

Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega)

Meisn.
Sin.: *Calacinum sagittifolium* (Ortega) J.F. Macbr., *Coccoloba sagittifolia* Ortega, *Karkinetron hastatum* Raf., *Polygonum sagittifolium* (Ortega) Kuntze
Arbusto. Nativa. 0-2800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PHA, SPE). URY(CAS, FLA, SJO).

Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth)

Meisn.
Sin.: *Muehlenbeckia tamnifolia* (Kunth) Meisn. var. *hartwegii* Meisn., *Muehlenbeckia tamnifolia* (Kunth) Meisn. var. *humboldtii* Meisn., *Polygonum tamnifolium* Kunth, *Polygonum tamnifolium* Kunth var. *xerocarpum* Kuntze
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Oxytheca Nutt.**Oxytheca dendroidea** Nutt. subsp. **chilensis** (J. Remy) Ertter

Sin.: *Brisegnoa chilensis* J. Remy, *Oxytheca apiculata* Miers ex Benth., nom. nud., *Oxytheca dendroidea* Nutt. var. *tonsiflora* I.M. Johnst., *Oxytheca spiculata* Miers
Hierba. Endémica. 2100-3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Persicaria Mill.**Persicaria sylvestris** Funez &

Hassemer
Hierba. Nativa. 200-1100 m.
Países: BRA(SCA).

Polygonum L., nom. cons.**Polygonum acuminatum** Kunth

Sin.: *Polygonum acuminatum* Kunth var. *glabrescens* Meisn., *Polygonum acuminatum* Kunth var. *microstemom* Mart. ex Meisn., *Polygonum acuminatum* Kunth var. *setigerum* (Wedd.) Meisn., *Polygonum alfredi* Pilg., *Polygonum bettfreundianum* Lindau, *Polygonum floribundum* Wedd., *Polygonum setigerum* Wedd.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, IPA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(LAV, ROC).

Polygonum amphibium L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, RNE).

Polygonum arenarium Waldst. & Kit.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(RNE).

Polygonum aviculare L.

Sin.: *Polygonum arenastrum* Boreau, *Polygonum berteroi* Phil., *Polygonum uruguense* H. Gross, *Polygonum striatum* K. Koch

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). PRY(PHA). URY(CAS, SJO).

Polygonum bowenkampii Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Polygonum brasiliense K. Koch

Sin.: *Polygonum aviculare* L. var. *montevidense* Cham. & Schltdl., *Polygonum camporum* Meisn. var. *australe* Meisn., *Polygonum camporum* Meisn.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(AIS, MAG). URY(SJO).

Polygonum campanulatum Hook. f.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(LLA, AIS).

Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don

Sin.: *Persicaria capitata* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross

Hierba. Introducida.

Países: ARG(COR). BRA(PAR, RGS, SCA).

Polygonum convolvulus L.

Sin.: *Bilderdykia convolvulus* (L.) Dumort., *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löve, *Tiniaria convolvulus* (L.) Webb & Moq.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SDE, SFE, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). PRY(COA, GUA, ITA).

Polygonum diospyrifolium Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Polygonum ferrugineum Wedd.

Sin.: *Polygonum gummifera* Wedd., *Polygonum spectabile* Mart. ex Meisn. var. *minor* Chodat, *Polygonum spectabile* Mart. ex Meisn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Polygonum glabrum Willd.

Sin.: *Polygonum densiflorum* Meisn., *Polygonum portoricense* Bertero ex Small

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LRI, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA). URY(CAS, COL, MON, RNO, ROC, SJO, TYT).

Polygonum hispidum Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, COA, ÑEE, PHA).

Polygonum hydropiper L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Países: CHL(MAU, BIO, LLA).

Polygonum hydropiperoides Michx. var. **hydropiperoides**

Sin.: *Polygonum hydropiperoides* Michx. var. *persicarioides* (Kunth) Stanford, *Polygonum persicarioides* Kunth, *Polygonum rivulare* Phil., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME, JFE). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL, PAY, ROC).

Polygonum hydropiperoides Michx. var. **setaceum** (Baldwin ex Elliott) Gleason

Sin.: *Polygonum hydropiperoides* Michx. var. *virgatum* (Cham. & Schltdl.) Meisn., *Polygonum setaceum* Baldwin ex Elliott, *Polygonum virgatum* Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA).

Polygonum lapathifolium L.

Sin.: *Polygonum ferrugineum* Wedd. var. *patagonicum* (Speg.) Macloskie, *Polygonum lanigerum* R. Br. *Polygonum persicaria* L. var. *vernicosum* Cham. & Schltdl., *Polygonum spectabile* Mart. ex Meisn. var. *patagonica* Speg., *Polygonum utriculatum* J. Remy

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU). CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). PRY(CON, PHA). URY(CAS).

Polygonum maritimum L.

Sin.: *Polygonum chilense* K. Koch, *Polygonum maritimum* L. var. *chilense* (K. Koch) Skottsb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, LPA, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF). CHL(COQ, VAL, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG).

Polygonum meisnerianum Cham. & Schltdl.

Sin.: *Polygonum beyrichianum* Cham. & Schltdl., *Polygonum chamissoeanum* Wedd., *Polygonum meisnerianum*

Cham. & Schltdl. var. *beyrichianum*
(Cham. & Schltdl.) Meisn., *Polygonum*
meisnerianum Cham. & Schltdl. var.
setosum Chodat

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CEN,
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).
URY(CLA, PAY, SJO).

Polygonum minus Huds.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MEN, MIS, RNE, SFE).

Polygonum mite Schrank

Hierba. Introducida.
Países: CHL(VAL).

Polygonum orientale L.

Sin.: *Polygonum cordobense* Lindau
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, MEN).
BRA(PAR, RGS). CHL(BIO, ARA, RME).
URY(MON).

Polygonum paraguayense Wedd.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
FOR, SFE). PRY(CEN, CON, COA, ÑEE,
PHA, SPE).

Polygonum persicaria L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS,
NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU,
TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Polygonum punctatum Elliott

Sin.: *Polygonum acre* Kunth, hom. illeg.,
Polygonum epilobioides Wedd., *Polygonum*
hydropiperoides Pursh, hom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, NEU,
SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA,
AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA,
GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(CAS, ROC, SJO, TAC).

Polygonum rubricaulae Cham.

Sin.: *Tracaulon rubricaulae* (Cham.) Greene,
Truellum rubricaulae (Cham.) Soják
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAU).

Polygonum sanguinaria J. Remy

Subarbusto. Endémica. 0-2200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, AIS, RME).

Polygonum stelligerum Cham.

Sin.: *Polygonum acanthophyllum*
Lindau, *Polygonum bonaerense* Speg.,
Tracaulon stelligerum (Cham.) Greene,
Truellum stelligerum (Cham.) Soják
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(ITA, MIE, PHA, SPE). URY(SJO).

Polygonum stypticum Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI,
LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE,
SJU, TUC). URY(RNO).

Rumex L.

Rumex acetosa L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE,
TDF). CHL(MAG).

Rumex acetosella L.

Sin.: *Acetosa angiocarpa* (Murb.)
Holub, *Rumex acetosella* L. subsp.
angiocarpus (Murb.) Murb., *Rumex*
angiocarpus Murb.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, JUJ,
MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, TDF,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP,
TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).
URY(DUR).

Rumex aquaticiformis Rchb. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(AIS).

Rumex argentinus Rech. f.

Sin.: *Rumex hasslerianus* Rech. f.,
Rumex polyklonos Rech. f.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR,
MEN, SFE). PRY(CEN). URY(CAS, CLA,
MAL, MON, SJO, SOR).

Rumex brasiliensis Link

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS, SCA).

Rumex conglomeratus Murray var.

borreri Trimen
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).

Rumex conglomeratus Murray var.
vulgaris Wallr.

Sin.: *Rumex foliosus* Rchb. f.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, ERI, JUJ,
LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE,
TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).
URY(CLA, MAL, MON, PAY, RNO, SOR).

Rumex crispissimus Kuntze

Sin.: *Rumex crispissimus* Kuntze var.
unigibbus Hauman, *Rumex decumbens* Dusén
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR, SJU,
TDF). CHL(VAL, MAG).

Rumex crispus L.

Hierba. Introducida. 0-3700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS,
ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU,
SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). BRA(RGS).
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE,
IPA). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY,
RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).

Rumex cristatus DC.

Hierba. Introducida. 400 m.
Países: CHL(LLA, RME).

Rumex cuneifolius Campd.

Sin.: *Rumex montevidensis* Spreng.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
JUJ, NEU, RNE, SAL, SFE, SLU).
BRA(RGS). CHL(ATA, VAL, BIO, ARA,
LLA, AIS, RME). URY(MON, ROC).

Rumex darwinianus Rech. f.

Sin.: *Rumex magellanicus* Campd. var.
donatii Rech. f.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).
CHL(LLA).

Rumex longifolius DC.

Hierba. Introducida. 0-400 m.
Países: ARG(TDF). CHL(LBO, MAU,
BIO, ARA, LLA, MAG, RME).

Rumex lorentzianus Lindau

Hierba. Endémica. 600-2800 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Rumex magellanicus Campd.

Sin.: *Rumex hippiatricus* J. Remy,
Rumex erosus Phil., *Rumex magellanicus*
Griseb., hom. illeg., *Rumex magellanicus*
Campd. var. *dusenii* Rech. f.

Hierba. Endémica. 1000-4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ, BIO, AIS, MAG).

Rumex maricola J. Remy

Sin.: *Rumex arenarius* Poepp. ex Endl.,
Rumex cuneifolius Campd. var. *maricola*
(J. Remy) Rech. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Rumex maritimus L.

Sin.: *Rumex fueginus* Phil., *Rumex maritimus* L. subsp. *fueginus* (Phil.)
Hultén, *Rumex maritimus* L. var. *fueginus*
(Phil.) Dusén

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, MAG, RME).

Rumex obovatus Danser

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). PRY(CEN, GUA, PHA).

Rumex obtusifolius L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Rumex paraguayensis D. Parodi

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, ERI, FOR, SFE, TUC). PRY(APY, CEN, COA, PHA).

Rumex patagonicus Rchb. f.

Sin.: *Rumex chilensis* Rchb. f.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ARA, LLA, AIS).

Rumex polycarpus Rech. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).

Rumex pulcher L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, RNE, SDE, SFE, TUC). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE). PRY(APA, CEN, COA, MIE). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SAO).

Rumex romassa J. Remy

Sin.: *Rumex asplundii* Rech. f.
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SAL). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Rumex sellowianus Rech. f.

Hierba. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).

Rumex uruguayensis Rech. f.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(FLA).

Ruprechtia C.A. Mey.

Ruprechtia apetala Wedd.

Sin.: *Magonia apetala* (Wedd.)
Kuntze, *Magonia corylifolia* (Griseb.)
Kuntze, *Magonia excelsa* (Griseb.)
Kuntze, *Magonia mollis* (Wedd.)
Kuntze, *Ruprechtia boliviensis* Herzog,
Ruprechtia corylifolia Griseb., *Ruprechtia excelsa* Griseb., *Ruprechtia mollis* Wedd.,
Triplaris corylifolia (Griseb.) Kuntze
Arbusto o árbol. Nativa. 100-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). PRY(APY).

Ruprechtia brachysepala Meisn.

Sin.: *Magonia brachysepala* (Meisn.)
Kuntze
Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, COA, PAI).

Ruprechtia exploraticis Sandwith

Arbusto o árbol. Nativa. 100-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CON).

Ruprechtia laxiflora Meisn.

Sin.: *Enneatypus nordenskoeldii* Herzog,
Enneatypus nordenskoeldii Herzog f.
glaberrimus Herzog, *Magonia laxiflora*
(Meisn.) Kuntze, *Magonia polystachya*
(Griseb.) Kuntze, *Magonia viraru* (Griseb.)
Kuntze, *Ruprechtia polystachya* Griseb.,
Ruprechtia viraru Griseb., *Triplaris polystachya* (Griseb.) Kuntze
Árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, DUR, PAY, RIV, SAO, SOR).

Ruprechtia paranensis Pendry

Arbusto o árbol. Endémica. 500-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Ruprechtia salicifolia (Cham. & Schltdl.) C.A.Mey.

Sin.: *Magonia salicifolia* (Cham. &

Schltdl.) Kuntze, *Triplaris salicifolia*
Cham. & Schltdl.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, DUR, PAY, SAO, SOR, TAC).

Salta Adr. Sánchez

Salta triflora (Griseb.) Adr. Sánchez

Sin.: *Magonia triflora* (Griseb.)
Kuntze, *Ruprechtia triflora* Griseb. var.
guaranitica Chodat & Hassl *Ruprechtia triflora* Griseb., *Triplaris triflora* (Griseb.)
Kuntze
Arbusto o árbol. Nativa. 200-1500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CHO, CON, NAS, PHA).

Triplaris Loefl. ex L.

Triplaris americana L.

Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Triplaris gardneriana Wedd.

Sin.: *Triplaris guaranitica* Chodat
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, APA, CEN, CON, ITA, PAI, PHA, SPE).

PONTEDERIACEAE

Heteranthera Ruiz & Pav.

Heteranthera catharinensis C.N.

Horn & M. Pell.
Hierba acuática. Endémica. 500-600 m.
Países: BRA(SCA).

Heteranthera limosa (Sw.) Willd.

Sin.: *Heteranthera alismoides* Humb.
ex Link, *Heteranthera limosa* (Sw.) Willd.
f. *albiflora* Benke, *Leptanthus ovalis*
Michx., *Lunania uniflora* Raf., nom.
illeg., *Phrynium limosum* (Sw.) Kuntze,
Pontederia limosa Sw., *Pontederia triandra*
Banks ex Mart., *Schollera limosa* (Sw.)
Raf., *Triaxstima uniflora* Raf.
Hierba acuática. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, ÑEE, PHA).

Heteranthera multiflora (Griseb.)

Horn

Sin.: *Heteranthera reniformis* Ruiz & Pav. var. *multiflora* Griseb.

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, PHA).

Heteranthera pumila M. Pell. & C.N.

Horn

Hierba acuática. Endémica. 700-1800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.Sin.: *Buchosia aquatica* Vell.,*Heterandra reniformis* P. Beauv.,*Heteranthera acuta* Willd., *Heteranthera**virginica* (Pers.) Steud., *Leptanthus**peruviana* Pers., *Leptanthus reniformis*(P. Beauv.) Michx., *Leptanthus virginica*Pers., *Phrynium reniformis* (Ruiz & Pav.)Kuntze, *Phrynium reniformis* (Ruiz & Pav.)Kuntze var. *acuta* (Willd.) Kuntze,*Schollera reniformis* (Ruiz & Pav.) Kuntze

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV).

Heteranthera zosterifolia Mart.Sin.: *Heteranthera osteniana* Herter,*Schollera zosterifolia* (Mart.) Kuntze

Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(ERI, MIS, SAL).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, PAI).

URY(LAV, RIV).

Pontederia L.**Pontederia azurea** Sw.Sin.: *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth, *Piaropus azureus* (Sw.) Raf., *Pontederia aquatica* Vell.

Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE,

ÑEE, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, MAL,

MON, RNO, ROC, SJO, TAC, TYT).

Pontederia cordata L.Sin.: *Narukila cordata* (L.) Nieuwl., *Pontederia angustifolia* Pursh, *Pontederia**cordata* L. f. *brasiliensis* Solms,*Pontederia cordata* L. var. *angustifolia*(Pursh) Torr., *Pontederia cordata* L. var.*lanceolata* Griseb., *Pontederia cordata* L.var. *lancifolia* (Muhl.) Torr., *Pontederia**lanceolata* Nutt. f. *brasiliensis* (Solms)Fernald, *Pontederia lanceolata* Nutt.,*Pontederia lancifolia* Muhl., *Pontederia**nymphaeifolia* Kunth, *Pontederia**rotundifolia* L. f. var. *nymphaeifolia*(Kunth) Solms, *Unisema cordata* (L.)Farw., *Unisema media* Raf.

Hierba palustre. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MEN, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, RNO, ROC, TAC).

Pontederia crassipes Mart.Sin.: *Eichhornia crassipes* (Mart.)Solms, *Eichhornia speciosa* Kunth,*Heteranthera formosa* Miq., *Piaropus**mesomelas* Raf., nom. illeg.

Hierba acuática. Nativa. 0-1600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, BIO). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON, ROC, TYT).

Pontederia meyeri (A.G. Schulz) M.

Pell. & C.N. Horn

Sin.: *Eichhornia meyeri* A.G. Schulz

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, MIS, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(APY, CHO, NAS, PHA).

Pontederia ovalis Mart. ex Schult. & Schult. f.Sin.: *Pontederia cordata* L. var.*ovalis* (Mart.) Solms, *Pontederia**lanceolata* Nutt. f. *ovalis* (C. Mart.) A.Cast., *Pontederia lanceolata* Nutt. var.*vichadensis* F.J. Herm.

Hierba palustre. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

PRY(CAN). URY(CAS, ROC).

Pontederia rotundifolia L. f.Sin.: *Pontederia cordifolia* Mart.,*Pontederia eriantha* Miq., *Pontederia**renniformis* Larrañaga, *Reussia grazielae*Machado, *Reussia rotundifolia* (L. f.) A. Cast.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, ROC).

Pontederia sagittata C. Presl

Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pontederia subovata (Seub.) LowdenSin.: *Eichhornia subovata* Seub.,*Reussia subovata* (Seub.) Solms

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

PORTULACACEAE

Amphipetalum Bacigalupo**Amphipetalum paraguayense**

Bacigalupo

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(APY).

Portulaca L.**Portulaca amilis** Speg.Sin.: *Portulaca amilis* Speg. var.*rosengurtii* D. Legrand, *Portulaca**catharinae* Poelln., *Portulaca glazioviana*D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. var.*paraguayensis* Hauman & Irigoyen,nom. nud., *Portulaca pilosa* L. var.*paraguayensis* Kuntze, *Portulaca**rubricaulis* J.F. Macbr., nom. illeg.,*Portulaca schenckii* Poelln., *Portulaca**striata* Poelln.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APY, CEN, CON, SPE). URY(ART).

Portulaca argentinensis Speg.

Hierba. Endémica. 500 m.

Países: ARG(SAL).

Portulaca chacoana D. LegrandSin.: *Portulaca fluvialis* D. Legrand var.*argentinensis* D. Legrand

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, PHA).

Portulaca confertifolia Hauman var. **confertifolia**Sin.: *Portulaca gilliesii* Speg., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

Portulaca confertifolia Hauman var. **cordobensis** D. Legrand
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Portulaca cryptopetala Speg.
Sin.: *Portulaca cryptopetala* Speg. f. *phenopetala* Speg., *Portulaca cryptopetala* Speg. var. *diversifolia* (Poelln.) D. Legrand, *Portulaca cryptopetala* Speg. var. *legrandii* (Poelln.) D. Legrand, *Portulaca diversifolia* D. Legrand, nom. illeg., *Portulaca diversifolia* Poelln. var. *legrandii* (Poelln.) D. Legrand, *Portulaca legrandii* Poelln.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, CAS, DUR, FLO, MON, PAY, ROC, SAO, TYT).

Portulaca diegoi Mattos
Hierba. Endémica. 1300 m.
Países: BRA(SCA).

Portulaca echinosperma Hauman
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).

Portulaca elongata Rusby var. **elongata**
Sin.: *Portulaca amboensis* J.F. Macbr., *Portulaca pedicellata* D. Legrand var. *cochabambensis* D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. f. *maxima* Kuntze
Hierba. Nativa. 2000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Portulaca elongata Rusby var. **pedicellata** (D. Legrand) D. Legrand
Sin.: *Portulaca amboensis* J.F. Macbr. var. *pedicellata* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca pedicellata* D. Legrand
Hierba. Nativa. 2000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Portulaca eruca Hauman
Hierba. Endémica. 100-2000 m.
Países: ARG(COR, SDE, SLU). PRY(APY).

Portulaca fulgens Griseb.
Sin.: *Portulaca pilosa* L. var. *fulgens* (Griseb.) Kuntze
Hierba. Endémica. 2500-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).

Portulaca gilliesii Hook.
Sin.: *Portulaca gilliesii* Hook. var. *chacoensis* D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. var. *eriophora* (Casar.) Hauman, *Portulaca tinctoria* Larrañaga
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, SLU, TUC). PRY(APY, CEN). URY(RNO).

Portulaca grandiflora Hook.
Sin.: *Portulaca fluvialis* D. Legrand var. *depressa* D. Legrand, *Portulaca fluvialis* D. Legrand, *Portulaca fluvialis* D. Legrand var. *tacuarembensis* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. f. *depressa* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. f. *granulata* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. subsp. *cisplatina* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. subsp. *ruizii* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. var. *cisplatina* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. var. *depressa* D. Legrand, *Portulaca grandiflora* Hook. var. *immerso-stellulata* (Poelln.) D. Legrand, *Portulaca immerso-stellulata* Poelln., *Portulaca immerso-stellulata* Poelln. var. *galanderi* Poelln., *Portulaca immerso-stellulata* Poelln. var. *uruguayensis* Poelln., *Portulaca multistaminata* Poelln., *Portulaca pilgeri* Poelln., *Portulaca pilosa* L. subsp. *cisplatina* D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. var. *cisplatina* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca pilosa* L. var. *osteniana* D. Legrand, *Portulaca ripicola* Poelln., *Portulaca rupicola* Poelln.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, MIE, PHA). URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC, TYT).

Portulaca hatschbachii D. Legrand
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Portulaca meyeri D. Legrand var. **meyeri**
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Portulaca meyeri D. Legrand var. **rodrigoii** D. Legrand
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Portulaca mucronata Link var. **mucronata**
Sin.: *Portulaca mucronata* Link var. *alba* Mattos
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Portulaca mucronata Link var. **paraguariensis** D. Legrand
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(COA, PAI).

Portulaca mucronulata D. Legrand var. **mucronulata**
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC). BRA(PAR).

Portulaca mucronulata D. Legrand var. **robusta** D. Legrand
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SFE).

Portulaca obtusa Poelln.
Sin.: *Portulaca obtusa* Poelln. var. *hauthalii* Poelln.
Hierba. Endémica. 500-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Portulaca obtusifolia D. Legrand var. **obtusifolia**
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR).

Portulaca obtusifolia D. Legrand var. **rubrisperma** D. Legrand
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS).

Portulaca oleracea L.
Sin.: *Portulaca cryptopetala* Speg. var. *poellnitziana* (D. Legrand) D. Legrand, *Portulaca marginata* Kunth, *Portulaca neglecta* Mack. & Bush, *Portulaca oleracea* L. var. *granulato-stellulata* Poelln., *Portulaca oleracea* L. var. *macrantha* Eggers, *Portulaca oleracea* L. var. *micrantha* Eggers, *Portulaca oleracea* L. var. *parviflora* (Haw.) Griseb., *Portulaca oleracea* L. var. *silvestris* (Montandon) Thell., *Portulaca poellnitziana* D. Legrand, *Portulaca retusa* Engelm.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(APY, PHA). URY(CLA, MON, SOR).

Portulaca papulifera D. Legrand
Sin.: *Portulaca papulosa* Schltld. subsp. *tuberculata* D. Legrand, p.p.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). URY(ART, RIV, TAC).

Portulaca papulosa Schltld.
Sin.: *Portulaca depauperata* Poelln., *Portulaca hirsutissima* Cambess., *Portulaca platensis* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS). URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC).

Portulaca perennis R.E. Fr.
Sin.: *Portulaca andicola* Poelln., *Portulaca arequipaensis* Poelln., *Portulaca peruviana* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

Portulaca philippii I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 500-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Portulaca ragonesei D. Legrand
Hierba. Endémica. 200-400 m.
Países: ARG(COR).

Portulaca rotundifolia R.E. Fr.
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Portulaca stellulato-tuberculata Poelln.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CEN).

Portulaca thellusonii Lindl.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Portulaca tingoensis J.F. Macbr. var. **andina** (D. Legrand) D. Legrand
Sin.: *Portulaca andina* D. Legrand
Hierba. Endémica. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Portulaca tingoensis J.F. Macbr. var. **tingoensis**
Sin.: *Portulaca andina* D. Legrand var. *bonetei* D. Legrand
Hierba. Nativa. 2500-3500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Portulaca umbraticola Kunth
Sin.: *Portulaca coronata* Small, *Portulaca denudata* Poelln., *Portulaca*

lanceolata Engelm., *Portulaca plano-perculata* Kuntze
Hierba. Nativa. 0-2200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PHA).

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton L.

Potamogeton crispus L.
Hierba acuática. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(BAI).

Potamogeton ferrugineus Hagstr.
Sin.: *Potamogeton apicalis* Hagstr., *Potamogeton illinoensis* Morong var. *ventanicolus* (Hicken) Horn ex Tur, *Potamogeton lucens* L. var. *ventanicolus* Hicken, *Potamogeton spoliatus* Hagstr.
Hierba acuática. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, RNE, SCR, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(AIS). URY(COL, FLA, ROC).

Potamogeton gayi A. Benn.
Sin.: *Potamogeton burkartii* Horn ex Tur
Hierba acuática. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ARA). PRY(CEN, MIE). URY(DUR, MAL, MON, ROC, SJO, TAC).

Potamogeton illinoensis Morong
Sin.: *Potamogeton dunicola* Tur, *Potamogeton pedersenii* Tur
Hierba acuática. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, ARA, LLA, MAG). PRY(CON). URY(ROC).

Potamogeton linguatus Hagstr.
Sin.: *Potamogeton badiovirens* Hagstr., *Potamogeton montanus* C. Presl
Hierba acuática. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Potamogeton montevidensis A. Benn.
Hierba acuática. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO). PRY(Desconocida). URY(SJO).

Potamogeton polygonus Cham. & Schltld.
Sin.: *Potamogeton pseudopolygonus* Hagstr.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(DUR, FLA, SAO).

Potamogeton pusillus L.
Sin.: *Potamogeton aschersonii* A. Benn., *Potamogeton berterioanus* Phil., *Potamogeton pusillus* L. var. *argentinus* A. Benn., *Potamogeton pusillus* L. var. *longepedunculatus* Hicken, *Potamogeton tenuifolius* F. Phil., *Potamogeton uruguayensis* A. Benn. & Graebn.
Hierba acuática. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CEN). URY(FLO, MON, ROC).

Potamogeton spirilliformis Hagstr.
Sin.: *Potamogeton reniacoensis* Sparre
Hierba acuática. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI). BRA(RGS). CHL(VAL). URY(ROC).

Potamogeton ulei K. Schum.
Hierba acuática. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stuckenia Börner

Stuckenia filiformis (Pers.) Boehm. subsp. **alpina** (Blytt) R.R. Haynes, Les & M. Král

Sin.: *Potamogeton aulacophyllum* K. Schum., *Potamogeton juncifolius* A. Kern. ex C. Fritsch, *Potamogeton marinus* L. f. *alpinus* Blytt, *Potamogeton strictus* Phil. var. *magellanicus* Hagstr., *Potamogeton strictus* Phil.

Hierba acuática. Nativa. 200-4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, BIO, MAG).

Stuckenia pectinata (L.) Börner
Sin.: *Coleogeton pectinatus* (L.) Les & R.R. Haynes, *Potamogeton diffusus* (Hagstr.) Herter, *Potamogeton pectinatus* L. var. *diffusus* Hagstr., *Potamogeton pectinatus* L.

Hierba acuática. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, MEN, RNE). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, RME).

Stuckenia striata (Ruiz & Pav.) Holub
Sin.: *Coleogeton striatus* (Ruiz & Pav.)

Les & R.R. Haynes, *Potamogeton australis* F. Phil., *Potamogeton dissimilis* A. Benn., *Potamogeton pectinatus* L. var. *striatus* (Ruiz & Pav.) Hagstr., *Potamogeton pectinatus* L. var. *ungulatus* Hagstr., *Potamogeton striatus* Ruiz & Pav.

Hierba acuática. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). CHL(VAL, LLA, RME). PRY(PHA). URY(MON).

Zannichellia L.

Zannichellia palustris L.

Hierba acuática. Nativa. 0-4400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SJU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME). URY(ROC).

PRIMULACEAE

Anagallis L.

Anagallis alternifolia Cav. var. *alternifolia*

Sin.: *Anagallis alternifolia* Cav. f. *laxa* R. Knuth, *Anagallis alternifolia* Cav. var. *angustifolia* Phil., *Anagallis alternifolia* Cav. var. *minor* R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Anagallis alternifolia Cav. var. *repens* (d'Urv.) Knuth

Sin.: *Anagallis alternifolia* Cav. var. *densifolia* Hook. f., *Anagallis alternifolia* Cav. var. *parvula* Phil., *Euparea amoena* Sol. ex Gaertn., *Euparea chilensis* Baudo, *Euparea linarina* Baudo, *Euparea parvula* Baudo, *Lysimachia pumila* Poepp. ex Pax & Knuth, *Lysimachia repens* d'Urv.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Anagallis arvensis L.

Sin.: *Anagallis arvensis* L. f. *coerulea* (Schreb.) Arechav., *Anagallis arvensis* L.

var. *coerulea* (Schreb.) Gren. & Godr., *Anagallis arvensis* L. var. *phoenica* (Scop.) Gren. & Godr., *Anagallis coerulea* Schreb., *Anagallis latifolia* L., *Lysimachia arvensis* (L.) U. Manns & Anderb.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE, IPA). URY(ART, COL, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SJO).

Anagallis pumila Sw.

Sin.: *Anagallis pumila* Sw. var. *longepedunculata* (Chodat & Hassl.) Knuth, *Centunculus pentandrus* R. Br. f. *longepedunculatus* Chodat & Hassl., *Centunculus pentandrus* R. Br. var. *stellatus* (St.-Hil.) Chodat & Hassl., *Centunculus pentandrus* R. Br.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COR, COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, CEN, PAI, SPE).

Androsace L.

Androsace salasii Kurtz

Sin.: *Androsace pusilla* (Dusén) Lourteig, *Collomia pusilla* Dusén
Hierba. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Ardisia Sw., nom. cons.

Ardisia guianensis (Aubl.) Mez
Sin.: *Icacorea guianensis* Aubl.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Centunculus L.

Centunculus minimus L.

Sin.: *Anagallis minima* (L.) E.H.L. Krause, *Lysimachia minima* (L.) U. Manns & Anderb.
Hierba. Introducida. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, RNE, SAL, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). PRY(CEN, COA, PAI). URY(FLO, MAL, MON).

Clavija Ruiz & Pav.

Clavija nutans (Vell.) B. Ståhl

Sin.: *Clavija boliviensis* Mez, *Clavija hassleri* Mez, *Clavija integrifolia* Mart. & Miq., *Zacintha nutans* Vell.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

Cybianthus Mart.

Cybianthus brasiliensis (Mez) G.

Agostini
Sin.: *Conomorpha peruviana* A. DC. var. *brasiliensis* Mez
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cybianthus peruvianus (A. DC.) Miq.

Sin.: *Conomorpha peruviana* A. DC.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lysimachia L.

Lysimachia barbata (P. Taylor) U. Manns & Anderb.

Sin.: *Anagallis pumila* Sw. var. *barbata* P. Taylor.
Hierba terrestre. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Lysimachia filiformis (Cham. & Schltdl.) U. Manns & Anderb.

Sin.: *Anagallis filiformis* Cham. & Schltdl., *Anagallis tenella* L. var. *filiformis* (Cham. & Schltdl.) A. St.-Hil. & Girard, *Anagallis tenella* L. var. *ascendens* A. St.-Hil. & Girard, *Anagallis uruguayensis* Arechav.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL, MON).

Lysimachia sertulata Baudo

Sin.: *Lysimachia chilensis* (Griseb.) Knuth, *Lysimachia febrifuga* Poepp. ex Klatt, nom. nud., *Lysimachia marginata* Macloskie, *Lysimachia mellico* Kuntze ex Klatt, nom. nud., *Lysimachia mellico* Poepp. ex Pax & Knuth, nom. nud., *Lysimachia umbellata* Phil., *Theopyxis chilensis* Griseb.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Lysimachia tenella L.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Myrsine L.**Myrsine altomontana** M.F. Freitas & Kin.-Gonv.

Arbusto. Nativa. 800-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrsine balansae (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea balansae* Mez
Árbol. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI).

Myrsine congesta (Schwacke ex Mez)

Pipoly
Sin.: *Rapanea congesta* Schwacke ex Mez
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br.

Sin.: *Caballeria ferruginea* Ruiz & Pav., *Myrsine paulensis* A. DC., *Rapanea coriacea* (Sw.) Mez, *Rapanea ferruginea* (Ruiz & Pav.) Mez, *Rapanea paulensis* (A. DC.) Mez, *Samara coriacea* Sw.
Árbol. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI). URY(LAV, MAL, RIV, ROC, TYT).

Myrsine gardneriana A. DC.

Sin.: *Rapanea gardneriana* (A. DC.) Mez
Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

Sin.: *Rapanea guianensis* Aubl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, COA, PAI). URY(ROC).

Myrsine laetevirens (Mez) Arechav.

Sin.: *Myrsine floribunda* Griseb., p.p., *Rapanea laetevirens* Mez
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA). URY(CAS, COL, MAL, PAY, ROC, SJO, TAC).

Myrsine lancifolia Mart.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrsine ligustrina (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea ligustrina* Mez
Árbol. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(APA, CAN, CAU).

Myrsine lineata (Mez) Imkhan.

Sin.: *Rapanea lineata* Mez
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SC).

Myrsine loefgrenii (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea loefgrenii* Mez, *Rapanea quaternata* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, SPE).

Myrsine matensis (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea matensis* Mez, *Rapanea perforata* Mez, *Rapanea perforata* Mez var. *rigida* Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Myrsine parvifolia A. DC.

Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ROC).

Myrsine parvula (Mez) Otegui

Sin.: *Myrsine floribunda* Griseb., p.p., *Myrsine lorentziana* (Mez) Arechav., *Rapanea lorentziana* Mez, *Rapanea megapota mica* Mez, *Rapanea parvula* Mez
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, MIE, PAI, SPE). URY(SAO, TAC, TYT).

Myrsine rubra M.F. Freitas & Kin.-Gonv.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myrsine squarrosa M.F. Freitas & Kin.-Gonv.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrsine umbellata Mart.

Sin.: *Rapanea umbellata* (Mart.) Mez
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, PAI). URY(MON, ROC).

Myrsine venosa A. DC.

Sin.: *Rapanea venosa* (A. DC.) Mez
Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Myrsine wettsteinii (Mez) Otegui

Sin.: *Rapanea wettsteinii* Mez
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pelletiera A. St.-Hil.**Pelletiera verna** A. St.-Hil.

Sin.: *Asterolinon serpyllifolium* (Poir.) Ball, *Asterolinon trinum* Baudo, *Lysimachia serpyllifolia* Poir., *Pelletiera serpyllifolia* (Poir.) Kuntze, comb. superfl., *Pelletiera serpyllifolia* (Poir.) Webb & Berthel.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, MIS, RNE). CHL(VAL, LBO, BIO, LLA, RME). URY(CAS, MON, SOR).

Primula L.**Primula comberi** W.W. Sm.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(ARA).

Primula magellanica Lehm.

Sin.: *Primula decipiens* Duby, *Primula farinosa* L. subsp. *magellanica* (Lehm.) W.W. Sm. & Forrest, *Primula farinosa* L. var. *decipiens* (Duby) DC., *Primula farinosa* L. var. *magellanica* (Lehm.) Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Primula malacoides Franch.

Hierba. Introducida. 1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Samolus L.**Samolus latifolius** Duby

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Samolus repens (J.R. Forst. & G.

Forst.) Pers.
Sin.: *Samolus littoralis* R. Br., *Scheffeldia repens* J.R. Forst. & G. Forst.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: CHL(BIO).

Samolus spathulatus (Cav.) Duby

Sin.: *Androsace spathulata* Cav., *Primula pistiifolia* Griseb., *Steirostemon spathulatus* Phil.
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Samolus subnudicaulis A. St.-Hil.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(MAL).

Samolus valerandi L.

Sin.: *Samolus bracteolosus* Phil., *Samolus parviflorus* Raf., *Samolus valerandi* L. var. *floribundus* (Kunth) Knuth
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL). PRY(CEN, SPE). URY(COL, MAL, MON).

Stylogyne A. DC.

Stylogyne pauciflora Mez

Sin.: *Ardisia catharinensis* Mez, *Icacorea catharinensis* (Mez) Lundell, *Stylogyne dusenii* Ricketson & Pipoly
Arbusto. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

PROTEACEAE

Embothrium J.R. Forst. & G. Forst.

Embothrium coccineum J.R. Forst. & G. Forst.

Sin.: *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. f. *lanceolatum* (Ruiz & Pav.) R.L. Pérez-Mor., *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *cavanillesii* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *lanceolatum* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *oblanceolatum* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *obovatum* Kuntze, *Embothrium gilliesii* Meisn., *Embothrium lanceolatum* Ruiz & Pav., *Embothrium valdivianum* Gand.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Euplassa Salisb. ex Knight

Euplassa cantareirae Sleumer
Árbol. Nativa. 900-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Euplassa nebularis Rambo & Sleumer
Árbol. Endémica. 900-1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Gevuina Molina

Gevuina avellana Molina

Sin.: *Quadria avellana* (Molina) Gaertn., *Quadria heterophylla* Ruiz & Pav.
Árbol. Endémica. 100-700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Grevillea R. Br. ex Knight, nom. cons.

Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br.
Árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).

Lomatia R. Br., nom. cons.

Lomatia dentata (Ruiz & Pav.) R. Br.
Sin.: *Embothrium dentatum* Ruiz & Pav., *Embothrium pinol* Dombey ex Meisn., nom. nud., *Embothrium sylvaticum* Poepp. ex Meisn., nom. nud., *Lomatia dentata* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *acutifolia* Meisn., *Lomatia dentata* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *obtusifolia* Meisn., *Lomatia sylvatica* Poepp., nom. nud., *Tricondylus dentatus* (Ruiz & Pav.) Kuntze
Arbusto o árbol. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Lomatia ferruginea (Cav.) R. Br.

Sin.: *Embothrium ferrugineum* Cav., *Lomatia pinnatifida* Hort ex Thornton, nom. nud., *Tricondylus ferrugineus* (Cav.) Salisb.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Lomatia hirsuta (Lam.) Diels subsp. **obliqua** (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.

Sin.: *Embothrium alnifolium* Poepp. ex Meisn., nom. nud., *Embothrium obliquum* Ruiz & Pav., *Embothrium rurale* Dombey ex Meisn., nom. nud., *Lomatia alnifolia* Poepp. ex Meisn., *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br., *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *alnifolia* (Poepp. ex Meisn.) Meisn., *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *subintegrifolia* Meisn., *Lomatia opaca* Klotzsch ex Meisn., nom. nud., *Tricondylus*

obliqua (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *alnifolia* (Poepp.) Macloskie, *Tricondylus obliqua* (Ruiz & Pav.) Kuntze
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Orites R. Br.

Orites myrtoidea (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.

Sin.: *Embothrium myrtifolium* Poepp. ex Meisn., nom. nud., *Lomatia alpina* Phil., nom. nud., *Lomatia chilensis* Gay, *Roupala myrtoidea* Poepp. & Endl., *Tricondylus chilensis* (Gay) Kuntze
Arbusto. Endémica. 700-1500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Roupala Aubl.

Roupala asplenioides Sleumer

Arbusto o arbolito. Nativa. 800-1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Roupala consimilis Mez

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Roupala meisneri Sleumer

Árbol. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA).

Roupala montana Aubl. var.

brasiliensis (Klotzsch) K.S. Edwards
Sin.: *Roupala brasiliensis* Klotzsch var. *velutina* (Klotzsch) Meisn., *Roupala brasiliensis* Klotzsch, *Roupala tomentosa* Pohl, *Roupala cataractarum* Sleumer, *Roupala pohlii* Meisn. var. *dimorphophylla* Meisn., *Roupala pohlii* Meisn., *Roupala velutina* Klotzsch
Árbol. Nativa. 0-1600 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA).

Roupala montana Aubl. var. **montana**

Árbol. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Roupala montana Aubl. var.

paraensis (Sleumer) K.S. Edwards
Sin.: *Roupala rhombifolia* Mart. ex Meisn. var. *paraensis* Sleumer
Arbusto o árbol. Nativa. 100-2300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Roupala pallida K. Schum.
Arbusto o árbol. Endémica.
Países: BRA(SCA).

QUILLAJACEAE

Quillaja Molina

Quillaja brasiliensis (A. St.-Hil. & Tul.) Mart.
Sin.: *Fontenella brasiliensis* A. St.-Hil. & Tul.
Árbol. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(RIV, ROC, TAC).

Quillaja saponaria Molina
Sin.: *Quillaja molinae* DC., *Quillaja poeppigii* Walp., *Smegmadermos emarginatus* Ruiz & Pav., *Smegmaria emarginata* (Ruiz & Pav.) Willd.
Árbol. Endémica. 800-1000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

QUIINACEAE

Quina Aubl.

Quina glaziouvii Engl.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

RANUNCULACEAE

Anemonastrum Holub

Anemonastrum antucense (Poepp.) Mosyakin & de Lange
Sin.: *Anemone antucensis* Poepp.
Hierba. Endémica. 100-1800 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

Anemone L., nom. cons.

Anemone decapetala Ard. var. **decapetala**
Sin.: *Anemone chilensis* Spreng. ex Eichler, nom. nud., *Anemone chilensis* Spreng. ex Pritz., nom. nud., *Anemone decapetala* Ard. f. *gigantea* Arechav.,

Anemone decapetala Ard. f. *majorina* Arechav., *Anemone decapetala* Ard. f. *petiolulata* Arechav., *Anemone decapetala* Ard. f. *primaria* Eichler, *Anemone decapetala* Ard. var. *grandifolia* Eichler, *Anemone polypetala* Larrañaga, *Anemone sphenophylla* Poepp., *Anemone stenophylla* Poepp., *Anemone trilobata* Juss.
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, MIS, NEU, RNE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE). URY(MON, SOR).

Anemone decapetala Ard. var. **foliolosa** Eichler
Sin.: *Anemone cicutifolia* I.M. Johnston., *Anemone decapetala* Ard. var. *triloba* Juss., *Anemone decapetala* Ard. var. *triternata* (Vahl) Kuntze, *Anemone fumariaefolia* Juss., *Anemone triternata* Vahl
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC). BRA(SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG). URY(MON, SOR).

Anemone hepaticifolia Hook.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(LRI, LLA).

Anemone moorei Espinosa
Subarbusto. Endémica. 500 m.
Países: CHL(MAU).

Anemone multifida Poir.
Sin.: *Anemone commersoniana* Richardson ex Spreng., *Anemone lanigera* Gay, *Anemone multifida* Poir. var. *commersoniana* (Richardson ex Spreng.) Ulbr., *Anemone multifida* Poir. var. *grandiflora* Rendle, *Anemone multifida* Poir. var. *hudsoniana* DC., *Anemone multifida* Poir. var. *lanigera* (Gay) Ulbr., *Anemone multifida* Poir. var. *magellanica* DC., *Anemone multifida* Poir. var. *uniflora* DC.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Anemone rigida Gay
Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Anemone sellowii Pritz.
Hierba. Nativa. 1000-1200 m.
Países: BRA(SCA).

Aquilegia L.

Aquilegia vulgaris L.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Barneoudia Gay

Barneoudia balliana Britton
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(COQ, RME).

Barneoudia chilensis Gay
Sin.: *Anemone barneoudia* Kuntze, *Anemone chilensis* (Gay) Kurtz, *Anemone chilensis* (Gay) Reiche, comb. illeg., *Anemone gayana* R. Wagner, *Barneoudia cyanoleuca* Leyb., *Barneoudia domeykoana* Leyb.
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Barneoudia major Phil. var. **major**
Sin.: *Anemone major* (Phil.) F. Meigen, *Anemone major* (Phil.) Reiche, comb. superfl.
Hierba. Endémica. 1000-4000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Barneoudia major Phil. var. **patagonica** (Skotts.) Lourteig
Sin.: *Barneoudia chilensis* Gay var. *patagonica* Skotts.
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Callianthemoides Tamura

Callianthemoides semiverticillata (Phil.) Tamura
Sin.: *Anemone myriophylla* Speng., *Ranunculus pseudosemiverticillatus* Espinosa & C. Rudolph, *Ranunculus semiverticillatus* Phil.
Hierba. Endémica. 100-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LLA).

Caltha L.

Caltha appendiculata Pers.
Sin.: *Caltha appendiculata* Pers. var. *chilensis* Huth, *Caltha holophylla* Leyb., *Caltha limbata* Schltdl., *Caltha paradoxa* Sol. ex T.F. Forst., *Psychrophila*

appendiculata (Pers.) Gay, *Psychrophila holophylla* Leyb.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Caltha dioneifolia Hook. f.

Sin.: *Psychrophila dioneifolia* (Hook. f.) Gay
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Caltha sagittata Cav.

Sin.: *Caltha alata* A.W. Hill, *Caltha andicola* (Gay) Walp., *Caltha involuta* A.W. Hill, *Caltha multicepsularis* Sol. ex T.F. Forst., *Caltha sagittata* Cav. var. *latifolia* Huth, *Psychrophila andicola* Gay, *Psychrophila sagittata* (Cav.) Gay
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Ceratocephalus Pers.

Ceratocephalus falcatus (L.) Pers.

Sin.: *Ranunculus falcatus* L.
Hierba. Introducida. 500-2000 m.
Países: ARG(MEN).

Clematis L.

Clematis bonariensis Juss. ex DC.

Sin.: *Clematis maldonadensis* Larrañaga
Liana. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(BIO, ARA). PRY(APA, COA, ITA, MIE, PAI). URY(RIV, TYT).

Clematis campestris A. St.-Hil.

Sin.: *Clematis dioica* L. var. *campestris* (A. St.-Hil.) Kuntze
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU).

Clematis dioica L. var. **australis**

Eichler
Sin.: *Clematis fluminensis* Vell., *Clematis perulata* Kuntze, *Clematis uruguayensis* Arechav.
Liana. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, GUA, SPE). URY(MAL).

Clematis dioica L. var. **brasiliiana**

(DC.) Eichler
Sin.: *Clematis brasiliiana* DC., *Clematis caripensis* Kuntze
Liana. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU).

Clematis haenkeana C. Presl

Sin.: *Clematis sericea* Kunth ex DC.
Liana. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Clematis montevidensis Spreng. var.

denticulata (Vell.) Bacigalupo
Sin.: *Clematis denticulata* Vell., *Clematis denticulata* Vell. var. *ulbrichiana* (Pilg.) Lourteig, *Clematis ulbrichiana* Pilg.
Liana. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Clematis montevidensis Spreng. var. **montevidensis**

Sin.: *Clematis campestris* A. St.-Hil. var. *mendocina* (Phil.) Hauman & Irigoyen, *Clematis hilarii* Spreng., *Clematis hilarii* Spreng. var. *guaranitica* A. St.-Hil. & Tul., *Clematis hilarii* Spreng. var. *montevidensis* (Spreng.) Speg., *Clematis hilarii* Spreng. var. *triloba* (A. St.-Hil.) Speg., *Clematis mendocina* Phil., *Clematis triloba* A. St.-Hil., hom. illeg.
Liana. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA). PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(FLA, MON, SAO).

Clematis ulbrichiana Pilg.

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Halerpestes Greene

Halerpestes cymbalaria (Pursh)

Greene
Sin.: *Halerpestes tridentata* (Kunth ex DC.) Greene, *Ranunculus cymbalaria* Pursh, *Ranunculus cymbalaria* Pursh var. *americanus* DC., *Ranunculus hemignostus* Steud., *Ranunculus maritimus* Phil., *Ranunculus microcarpus* J. Presl, *Ranunculus microcarpus* J. Presl var. *maritima* Phil., *Ranunculus minutus* Gay, *Ranunculus minutus* Gay var. *microphylla* Phil. ex Reiche, *Ranunculus pozoaefolius* Gay, *Ranunculus tridentatus* Kunth ex

DC., *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC. var. *major* DC., *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC. var. *minor* DC.

Hierba. Nativa. 0-4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, MAG, RME).

Halerpestes exilis (Phil.) Tamura

Sin.: *Ranunculus cymbalaria* Pursh f. *exilis* (Phil.) Lourteig, *Ranunculus cymbalaria* Pursh var. *exilis* (Phil.) R.E. Fr., *Ranunculus exilis* Phil., *Ranunculus minutus* Gay var. *exilis* (Phil.) Reiche, *Ranunculus minutusculus* Ulbr.
Hierba. Nativa. 2000-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Halerpestes uniflora (Phil. ex Reiche)

Emadzade, Lehnebach, P. Lockh. & Hörandl
Sin.: *Ranunculus arequipensis* Ulbr., *Ranunculus bolivianus* Phil., *Ranunculus bovei* Speg., *Ranunculus bovei* Speg. var. *potamogetonoides* (Speg.) Speg., *Ranunculus potamogetonoides* Speg., *Ranunculus pseudocaltha* Chodat & Wilczek, *Ranunculus pseudocaltha* Chodat & Wilczek f. *minor* Chodat & Wilczek, *Ranunculus uniflorus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus uniflorus* Phil. ex Reiche f. *bolivianus* (Phil.) Lourteig
Hierba. Endémica. 0-4500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, SAL, SCR, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, MAU, AIS, MAG).

Hamadryas Comm. ex Juss.

Hamadryas argentea Hook. f.

Sin.: *Hamadryas tomentosa* Hook. f., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Hamadryas delphinii Phil. ex Reiche

Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, SJU, TDF). CHL(MAG).

Hamadryas kingii Hook. f.

Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Hamadryas magellanica Lam. f. **magellanica**

Sin.: *Hamadryas magellanica* Lam. var. *tomentosa* (DC.) Hook. f., *Hamadryas tomentosa* DC.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Hamadryas magellanica Lam. f. **paniculata** (Hook. f.) Lourteig

Sin.: *Hamadryas paniculata* Hook. f.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(TDF).

Hamadryas sempervivoides Sprague

Hierba. Endémica. 700-1300 m.
Países: ARG(SCR). CHL(MAG).

Myosurus L.**Myosurus apetalus** Gay

Sin.: *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook. f., *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook. f. var. *apetalus* (Gay) Huth, *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook. f. var. *brachypoda* Speg., *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook. f. var. *gracilis* Speg., *Myosurus gracilis* (Speg.) Macloskie
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, MAG, RME).

Myosurus patagonicus Speg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, SCR, TDF). CHL(BIO, MAG, RME).

Ranunculus L.**Ranunculus acaulis** Banks & Sol. ex DC.

Sin.: *Ranunculus litoralis* Phil., *Ranunculus litoralis* Schltdl. ex Lechl., nom. nud., *Ranunculus skottsbergii* Gand., *Ranunculus stenopetalus* Hook.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Ranunculus apiifolius Pers.

Sin.: *Aphanostemma apiifolium* (Pers.) A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, LPA, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA). PRY(CEN). URY(CAS, MON, ROC).

Ranunculus aquatilis L.

Hierba acuática. Introducida. 0-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, BIO, ARA, LLA, MAG).

Ranunculus arvensis L.

Hierba. Introducida. 0-300 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Ranunculus biternatus Sm.

Sin.: *Ranunculus commersonii* DC. ex Poir., *Ranunculus crassipes* Hook. f., *Ranunculus exiguus* d'Urv., *Ranunculus flaccidus* Banks & Sol. ex Hook. f., *Ranunculus montteanus* Phil., *Ranunculus montteanus* Phil. var. *obtusilobus* Phil. ex Reiche

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Ranunculus bonariensis Poir. var. **bonariensis**

Sin.: *Casalea ascendens* A. St.-Hil., *Casalea ficarifolia* (Poir.) A. St.-Hil., *Ranunculus adscendens* Chodat & Hassl., *Ranunculus adscendens* Chodat & Hassl. var. *paraguariensis* Chodat, *Ranunculus cordifolius* Arechav., *Ranunculus montevidensis* Arechav., *Ranunculus ovalifolius* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, FLA, MON, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR).

Ranunculus bonariensis Poir. var. **januarii** Urb.

Hierba. Nativa. 0-1900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Ranunculus bonariensis Poir. var. **phyteumifolius** (A. St.-Hil.) Hicken ex Lourteig

Sin.: *Casalea phyteumaefolia* A. St.-Hil., *Casalea phyteumaefolia* A. St.-Hil. var. *bonariensis* A. St.-Hil., *Ranunculus bonariensis* Poir. f. *anomala* Hassl., nom. nud., *Ranunculus bonariensis* Poir. subsp. *phyteumifolius* (A. St.-Hil.) Molero, *Ranunculus phyteumaefolius* (A. St.-Hil.) Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SJU). BRA(PAR). PRY(CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA).

Ranunculus bonariensis Poir. var. **trisepalus** (Gillies ex Hook. & Arn.) Lourteig

Sin.: *Ranunculus berteronianus* Steud., nom. nud., *Ranunculus bonariensis* Poir.

subsp. *trisepalus* (Gillies ex Hook. & Arn.) Molero, *Ranunculus humilis* Hook. & Arn., p.p., *Ranunculus obtusatus* Poepp., *Ranunculus trisepalus* Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME). URY(CAS).

Ranunculus caprarum Skottsb.

Hierba. Endémica. 1200 m.
Países: CHL(JFE).

Ranunculus catharinensis Lourteig

Hierba. Endémica. 600-900 m.
Países: BRA(SCA).

Ranunculus chilensis DC.

Sin.: *Ranunculus berteronianus* Phil., *Ranunculus chilensis* DC. var. *gayi* Phil. ex Reiche, *Ranunculus chilensis* DC. var. *lasius* Phil. ex Reiche, *Ranunculus elatus* Steud., *Ranunculus protractus* Steud., *Ranunculus sericans* Steud., *Ranunculus valdivianus* Phil. ex Reiche

Hierba. Nativa. 0-3600 m.
Países: ARG(RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Ranunculus filamentosus Wedd.

Hierba. Nativa. 2000-4600 m.
Países: ARG(SAL).

Ranunculus flagelliformis Sm.

Sin.: *Casalea flagelliformis* (Sm.) A. St.-Hil., *Casalea flagelliformis* (Sm.) A. St.-Hil. var. *lutescens* A. St.-Hil., *Casalea hederacea* Mart. ex Eichler, *Ranunculus implicatus* Arechav.

Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, SJO, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, SAL, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(CEN, COA, PAI). URY(CAS, COL, MAL, MON, RIV, ROC, SOR).

Ranunculus fuegianus Speg.

Hierba. Endémica. 0-3700 m.
Países: ARG(SAL, SJU, SCR, TDF). CHL(COQ, AIS, MAG).

Ranunculus hillei Lourteig

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Ranunculus hydrophilus Gaudich.

Sin.: *Ranunculus humilis* Hook. & Arn., p.p.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Ranunculus lancipetalus Griseb.
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Ranunculus maclovianus d'Urv.
Sin.: *Ranunculus colliguensis* Steud.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, MAG).

Ranunculus minutiflorus Bertero ex Phil.
Sin.: *Casalea chilensis* A. St.-Hil.,
Hydrocotyle pauciflora Phil., *Ranunculus*
aysenensis Gand., *Ranunculus*
minutiflorus Bertero ex Phil. var. *miser*
(Phil.) Reiche, *Ranunculus miser* Phil.,
Ranunculus savatieri Franch., *Ranunculus*
saxifragaeifolius Steud.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF).
CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA,
AIS, MAG, RME).

Ranunculus muricatus L.
Sin.: *Ranunculus muricatus* L.
var. *tucumanensis* DC., *Ranunculus*
orbicularis Steud.
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE,
ERI, FOR, MIS, RNE, SJU). BRA(PAR,
RGS, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LLA, MAG, RME, JFE).
PRY(CEN). URY(CAS, MON).

Ranunculus parviflorus L.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: ARG(TUC). BRA(PAR, SCA).
CHL(BIO, ARA).

Ranunculus peduncularis Sm. var.
erodiifolius (Gay) Reiche
Sin.: *Ranunculus andinus* Phil.,
Ranunculus erodiifolius Gay, *Ranunculus*
peduncularis Sm. var. *polypetalus* (Gillies
ex Hook. & Arn.) Macloskie, *Ranunculus*
polypetalus Gillies ex Hook. & Arn.,
hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Ranunculus peduncularis Sm. var.
peduncularis
Sin.: *Ranunculus alboffii* Macloskie,
Ranunculus gilliesii Steud., *Ranunculus*
glandulifer Poepp., *Ranunculus*
patagonicus Poepp., *Ranunculus*
peduncularis Sm. var. *alboffiana* Speg.,
Ranunculus peduncularis Sm. var.
chillanensis Phil. ex Reiche, *Ranunculus*

peduncularis Sm. var. *glabrata* Reiche,
Ranunculus peduncularis Sm. var.
glandulifer (Poepp.) Reiche, *Ranunculus*
peduncularis Sm. var. *longavinus* Phil.
ex Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm.
var. *minor* Wedd. ex Franch., *Ranunculus*
peduncularis Sm. var. *patagonicus*
(Poepp.) Reiche, *Ranunculus peduncularis*
Sm. var. *saffordi* Phil. ex Reiche,
Ranunculus talquinus Phil. ex Reiche
Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Ranunculus platensis Spreng.
Sin.: *Casalea sessiflora* A. St.-Hil.,
Ranunculus hilarii Hieron., *Ranunculus*
sessiflorus (A. St.-Hil.) Spreng., hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, RNE, SFE, SLU, TUC).
URY(ART, DUR, FLO, MON, SAO).

Ranunculus praemorsus Kunth ex DC.
Sin.: *Ranunculus argemonifolius*
Griseb., *Ranunculus pseudophilonotis*
Griseb.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Ranunculus pseudotrullifolius
Skottsbo.
Sin.: *Ranunculus caespitosus* Dusén,
Ranunculus dusenii Lourteig, *Ranunculus*
trullifolius Dusén, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

Ranunculus psychophilus Wedd.
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ranunculus repens L. var. **flore-**
pleno DC.
Sin.: *Ranunculus repens* L. var.
pleniflorus Fernald
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN,
NEU). CHL(COQ, VAL, BIO, ARA, LLA).

Ranunculus repens L. var. **repens**
Sin.: *Ranunculus lucidus* Poir., *Ranunculus*
repens L. var. *erectus* DC., *Ranunculus*
repens L. var. *glabratus* DC., *Ranunculus*
repens L. var. *lucidus* (Poir.) Speg.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE,
TDF). BRA(PAR, RGS). CHL(ATA, COQ,
VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, MAG, RME).

Ranunculus sarmentosus Griseb.
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, TUC).

Ranunculus sceleratus L.
Sin.: *Hecatonia scelerata* (L.) Forreau
Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, RME).

Ranunculus sericocephalus Hook. f.
Sin.: *Ranunculus fueginus* Phil. ex
Reiche, *Ranunculus phillipianus* De Wild.,
Ranunculus sericocephalus Hook. f. var.
major Albov
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Ranunculus spagazzinii Lourteig
Sin.: *Ranunculus oligocarpus* Speg.,
hom. illeg.
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(ARA, AIS, MAG).

Ranunculus trichophyllus Chaix
Sin.: *Ranunculus curvirostris* Freyn
Hierba acuática. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, SJU,
TDF). CHL(LLA, MAG).

Ranunculus trullifolius Hook. f.
Sin.: *Ranunculus monanthos* Phil.,
Ranunculus monanthos Phil. var.
chiloensis Phil. ex Reiche
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(COQ, ARA, LLA, AIS, MAG).

Thalictrum L.

Thalictrum decipiens Boivin
Subarbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL,
SLU, TUC).

Thalictrum venturii Boivin
Sin.: *Thalictrum inuncans* Boivin
Subarbusto. Nativa. 1000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

RESEDACEAE

Reseda L.

Reseda decursiva Forssk.
Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(VAL).

Reseda lutea L.
Arbusto. Introducida.
Países: CHL(BIO).

Reseda luteola L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, NEU, SCR).
CHL(VAL, BIO).

Reseda odorata L.

Hierba. Introducida. 200-300 m.
Países: CHL(ATA).

Reseda phyteuma L.

Hierba. Introducida. 0-1100 m.
Países: CHL(ATA, BIO).

RESTIONACEAE

Apodasmia B.G. Briggs & L.A.S. Johnson**Apodasmia chilensis** (Gay) B.G. Briggs & L.A.S. Johnson

Sin.: *Calopsis chilensis* (Gay) Steud.,
Leptocarpus chilensis (Gay) Mast.,
Schoenodum chilense Gay
Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, MAG).

Gaimardia Gaudich.**Gaimardia australis** Gaudich.

Sin.: *Gaimardia pusilla* Gaudich.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LRI,
LLA, AIS, MAG).

RHAMNACEAE

Colletia Comm. ex Juss., nom. cons.**Colletia exserta** Klotzsch ex Reissek

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).

Colletia hystrix Clos

Sin.: *Colletia aciculata* Miers, *Colletia armata* Miers, *Colletia armata* Miers f. *subglabra* Sealy, *Colletia armata* Miers var. *insularis* Miers, *Colletia brevispina* Phil., *Colletia cataphracta* Miers, *Colletia dumosa* Miers, hom. illeg., *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *dumosa* (Miers) Suess., *Colletia ferox* Gillies

& Hook. var. *puberula* Speg., *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *veprecula* (Miers) Suess., *Colletia hystrix* Clos var. *bresvispina* (Phil.) Reiche, *Colletia pungens* Miers, *Colletia spinosa* Lam. var. *armata* (Miers) Reiche, *Colletia spinosa* Lam. var. *cataphracta* (Miers) Reiche, *Colletia spinosa* Lam. var. *pungens* (Miers) Reiche, *Colletia spinosa* Lam. var. *tomentosa* Phil., *Colletia spinosa* Lam. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Colletia spinosa* Lam. var. *veprecula* (Miers) Reiche, *Colletia spinosa* Lam., p.p., *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. var. *valdiviana* (Phil.) Escal., *Colletia tomentosa* Phil., *Colletia valdiviana* Phil., *Colletia veprecula* Miers, *Notophaena tomentosa* (Phil.) Miers

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Colletia paradoxa (Spreng.) Escal.

Sin.: *Colletia biconensis* Lindl., *Colletia cruciata* Gillies & Hook., *Colletia exserta* Klotzsch ex Reissek, *Condalia paradoxa* Spreng.
Arbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(BAI). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY(FLA, MAL, MON, ROC).

Colletia spartioides Bertero ex Colla

Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(JFE).

Colletia spinosissima J.F. Gmel.

Sin.: *Colletia assimilis* N.E. Br., *Colletia atrox* Miers, *Colletia ferox* Gillies & Hook., *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *infausta* (N.E. Br.) Suess., *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *intricata* (Miers) Reiche, *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *invicta* (Miers) Reiche, *Colletia horrida* Willd., *Colletia infausta* N.E. Br., *Colletia intricata* Miers, *Colletia invicta* Miers, *Colletia kunthiana* Miers, *Colletia polyacantha* Humb. & Bonpl., *Colletia spinosa* Lam., *Colletia spinosa* Lam. var. *assimilis* (N.E. Br.) Suess., *Colletia spinosa* Lam. var. *miersii* Suess., *Colletia spinosa* Lam. var. *trifurcata* (N.E. Br.) Suess., *Colletia tenuicola* Miers, *Colletia trifurcata* N.E. Br., *Colletia weddelliana* Miers

Arbusto. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU,
SLU, TUC). URY(COL).

Colletia ulicina Gillies & Hook.

Sin.: *Colletia valenzuela* Bertero ex Steud., nom. nud.
Arbusto. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Colubrina Brongn.**Colubrina glandulosa** Perkins var.

reitzii (M.C. Johnst.) M.C. Johnst.
Sin.: *Colubrina rufa* Reissek, *Colubrina rufa* Reissek var. *reitzii* M.C. Johnst.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(AMA, SPE).

Colubrina retusa (Pittier) R.S. Cowan var. **latifolia** (Reissek) M.C. Johnst.

Sin.: *Colubrina vellozii* R.S. Cowan var. *paranaensis* M.C. Johnst., *Colubrina vellozii* R.S. Cowan var. *latifolia* (Reissek) M.C. Johnst., *Cormonema spinosum* (Vell.) Reissek var. *latifolium* Reissek
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, CAN, ITA, MIE, PAI).

Condalia Cav.**Condalia buxifolia** Reissek

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA,
LRI, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY). URY(CLA, LAV, MON, RIV, SJO).

Condalia megacarpa A. Cast.

Arbusto. Endémica. 1100-1300 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Condalia microphylla Cav.

Sin.: *Condalia lineata* A. Gray, *Condalia lineata* A. Gray f. *erythrocarpa* Speg., *Condalia lineata* A. Gray f. *melanocarpa* Speg., *Condalia lineata* A. Gray f. *xanthocarpa* Speg., *Condalia microphylla* Cav. var. *lineata* (A. Gray) Chodat & Wilczek, *Ziziphus mirtooides* Ortega, nom. illeg.
Arbusto. Endémica. 0-2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR,
JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE,
SJU, SLU, TUC).

Condalia montana A. Cast.

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI).

Crumenaria Mart.**Crumenaria erecta** Reissek

Sin.: *Crumenaria choretroides* Mart. ex Reissek, *Crumenaria choretroides* Mart. ex Reissek var. *hirtella* Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek, *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *glabrescens* Hassl., nom. illeg., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *lancifolia* Chodat & Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek f. *lancifolia* (Chodat & Hassl.) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

Crumenaria lilloi Suess.

Sin.: *Crumenaria polygaloides* Reissek f. *glabrata* Chodat & Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *aurea* Chodat & Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *discolor* Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek var. *foliosa* Chodat & Hassl., *Crumenaria polygaloides* Reissek subsp. *paraguariensis* Hassl.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, SPE).

Discaria Hook.**Discaria americana** Gillies & Hook.

Sin.: *Colletia longispina* Hook. & Arn. var. *foliosa* Hook. & Arn., *Colletia longispina* Hook. & Arn., *Discaria exilis* (Miers) Herter, *Discaria febrifuga* Mart., *Discaria gracilentia* (Miers) Herter, *Discaria longispina* (Hook. & Arn.) Miers, *Discaria longispina* (Hook. & Arn.) Miers var. *foliosa* Griseb., *Discaria lycioides* Mart., *Discaria lycioides* Mart. var. *exilis* Miers, *Discaria spiculata* Miers, *Discaria spiculata* Miers var. *gracilentia* Miers

Arbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MEN, RNE, SFE, SLU). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(LAV, MAL, MON, RIV, TAC).

Discaria articulata (Phil.) Miers

Sin.: *Colletia articulata* Phil., *Discaria articulata* (Phil.) Kuntze, comb. superfl., *Retanilla articulata* (Phil.) Miers

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Discaria chacaye (G. Don) Tortosa

Sin.: *Colletia chacaye* G. Don, *Colletia crenata* Clos, *Colletia discolor* Hook., *Colletia dumosa* Phil., *Colletia montana* Phil., *Colletia nivalis* Phil., *Colletia serratifolia* Vent. var. *foliosa* Hook. & Arn., *Discaria cognata* (Miers) Reiche, *Discaria cognata* (Miers) Speg., comb. illeg., *Discaria crenata* (Clos) Regel, *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *discolor* (Hook.) Suess., *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *dumosa* (Phil.) Suess., *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *integrifolia* (Speg.) Suess., *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *magellanica* (Miers) Suess., *Discaria crenata* (Clos) Regel var. *montana* (Phil.) Suess., *Discaria discolor* (Hook.) Reiche, comb. illeg., *Discaria discolor* (Hook.) Speg., comb. illeg., *Discaria discolor* (Hook.) Weberb., *Discaria dumosa* (Phil.) Reiche, *Discaria foliosa* (Hook. & Arn.) Reiche, *Discaria foliosa* (Hook. & Arn.) Speg., comb. illeg., *Discaria integrifolia* Speg., *Discaria magellanica* (Miers) Reiche, *Discaria montana* (Phil.) Reiche, *Discaria serratifolia* (Vent.) Mart. var. *discolor* (Hook.) Escal., *Discaria serratifolia* (Vent.) Mart. var. *inermis* Escal., *Notophaena cognata* Miers, *Notophaena discolor* (Hook.) Miers, *Notophaena foliosa* (Hook. & Arn.) Miers, *Notophaena magellanica* Miers

Arbusto o árbol. Endémica. 0-2300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Gouania Jacq.**Gouania latifolia** Reissek

Sin.: *Gouania mollis* Reissek

Liana o epífita. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

Gouania lupuloides (L.) Urb.

Sin.: *Banisteria lupuloides* L., *Gouania domingensis* L., *Gouania virgata* Reissek, *Rhamnus domingensis* Jacq.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA).

Gouania polygama (Jacq.) Urb.

Sin.: *Gouania blanchetiana* Miq., *Gouania tomentosa* Jacq., *Gouania*

ursinicarpa Rusby, *Rhamnus polygamus* Jacq.

Liana o epífita. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC). PRY(APY).

Gouania ulmifolia Hook. & Arn.

Liana o epífita. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, GUA, SPE). URY(ART, RNO).

Hovenia Thunb.**Hovenia dulcis** Thunb.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).

Kentrothamnus Suess. & Overkott**Kentrothamnus weddellianus** (Miers) M.C. Johnst.

Sin.: *Colletia foliosa* Rusby, *Colletia foliosa* Rusby var. *microphylla* Kuntze, *Discaria weddelliana* (Miers) Escal., *Kentrothamnus foliosus* (Rusby) Suess., *Kentrothamnus penninervius* Suess. & Overkott, *Trevoa weddelliana* Miers

Arbusto. Nativa. 2500-3800 m.

Países: ARG(JUU).

Ochetophila Poepp. ex Endl.**Ochetophila nana** (Clos) J. Kellerm., Medán & Aagesen

Sin.: *Colletia nana* Clos, *Colletia stipellacea* Phil., *Discaria nana* (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb., *Discaria nana* (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb. var. *inermis* Kuntze, *Discaria nana* (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb. var. *prostrata* Hicken, *Discaria nana* (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb. var. *spinosa* Kuntze, *Discaria prostrata* (Miers) Reiche, nom. illeg., *Discaria prostrata* (Miers) Reiche var. *inermis* Chodat & Wilczek, nom. nud., *Discaria prostrata* (Miers) Reiche var. *nana* (Clos) Suess., nom. illeg., *Ochetophila parvifolia* Miers, *Ochetophila prostrata* Miers, nom. superfl.

Arbusto. Endémica. 1000-3800 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Ochetophila trinervis (Gillies ex Hook. & Arn.) Poepp. ex Miers

Sin.: *Ceanothus divergens* Poepp. ex Endl., nom. nud., *Ceanothus riparius* Poepp. ex Endl., nom. nud., *Chacaya trinervis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Escal., nom. superfl., *Colletia doniana* Clos, *Colletia inermis* Clos ex Miers, nom. inval., *Discaria doniana* (Clos) Weberb., *Discaria trinervis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche, *Ochetophila divergens* (Poepp. ex Endl.) Steud., nom. inval., *Ochetophila hookeriana* Reissek ex Clos, nom. superfl., *Ochetophila riparia* (Poepp. ex Endl.) Steud., nom. inval., *Rhamnus linearis* Clos, *Sageretia divergens* (Poepp. ex Endl.) Steud., nom. inval., *Sageretia riparia* (Poepp. ex Endl.) Steud., nom. inval., *Sageretia trinervis* Gillies ex Hook. & Arn.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-3500 m. Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, RME).

Reissekia Endl.

Reissekia smilacina (Sm.) Steud.

Sin.: *Gouania smilacina* Sm. Liana. Nativa. Países: BRA(PAR).

Retanilla (DC.) Brongn.

Retanilla ephedra (Vent.) Brongn.

Sin.: *Colletia ephedra* Vent., *Colletia obcordata* Vent., *Retanilla crassa* Phil., *Retanilla ephedra* (Vent.) Brongn. var. *crassa* (Phil.) Reiche, *Retanilla moelleri* Phil., *Retanilla obcordata* (Vent.) Brongn. Arbusto. Endémica. 0-1500 m. Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Retanilla patagonica (Speg.) Tortosa

Sin.: *Trevoa patagonica* Speg. Arbusto. Endémica. 0-1300 m. Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Retanilla stricta Hook. & Arn.

Sin.: *Retanilla affinis* Clos, *Trevoa frutilla* Steud., nom. nud. Arbusto. Endémica. 200-1500 m. Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Retanilla trinervia (Gillies & Hook.)

Hook. & Arn. Sin.: *Colletia trebu* Bertero ex Colla ap.

Savi, *Trevoa trinervia* Gillies & Hook., *Trevoa trinervis* Miers, nom. nud., *Trevoa trinervis* Miers, nom. illeg. Arbusto. Endémica. 0-1700 m. Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Rhamnidium Reissek

Rhamnidium elaeocarpum Reissek

Arbusto. Nativa. 0-300 m. Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Rhamnidium glabrum Reissek

Arbusto. Nativa. 0-800 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).

Rhamnidium hasslerianum Chodat

Arbusto. Endémica. 0-500 m. Países: PRY(APA, CAU, SPE).

Rhamnus L.

Rhamnus catharticus L.

Arbolito. Introducida. 0-200 m. Países: ARG(BAI, ERI).

Rhamnus diffusus Clos

Sin.: *Colletia maytenioides* Griseb., *Sciadophila maytenoides* Phil. Arbusto. Endémica. 0-1200 m. Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI).

Rhamnus sphaerosperma Sw. var.

pubescens (Reissek) M.C. Johnst. Sin.: *Rhamnus polymorpha* (Reissek) Weberb., *Rhamnus sectipetala* Mart. ex Reissek, nom. nud., *Frangula polymorpha* Reissek var. *pubescens* Reissek, *Frangula polymorpha* Reissek, *Frangula polymorpha* Reissek var. *latifolia* Chodat, *Ceanothus pubescens* Ruiz & Pav., *Frangula boliviana* (Rusby) Grubov, *Frangula chrysophylla* Reissek, *Frangula citrifolia* (Rusby) Grubov, *Frangula nervosa* Grubov, *Frangula peruviana* Grubov, *Frangula polymorpha* Reissek var. *tomentosa* Reissek, *Frangula pubescens* (Ruiz & Pav.) Grubov, *Rhamnus boliviana* Rusby, *Rhamnus citrifolia* Rusby, *Rhamnus chrysophylla* (Reissek) Weberb., *Rhamnus jelskii* Szyszyl., *Rhamnus polymorpha* (Reissek) Weberb. var. *glabra* (Reissek) Dusén, *Rhamnus pubescens* (Ruiz & Pav.) Triana & Planch. non Poir., *Rhamnus pubescens* (Ruiz & Pav.) Triana & Planch. var.

chrysophylla (Reissek) Kuntze, *Rhamnus pubescens* (Ruiz & Pav.) Triana & Planch. var. *glabrescens* Kuntze, *Rhamnus pubescens* (Ruiz & Pav.) Triana & Planch. var. *grandifolia* Perkins Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, ITA).

Sageretia Brongn.

Sageretia lehmanii (Hieron.) Radlk.

Sin.: *Gouania lehmanii* Hieron. Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(FOR, MIS). PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Sarcomphalus P. Browne

Sarcomphalus joazeiro (Mart.)

Hauenschild Sin.: *Ziziphus cotinifolia* Reissek, *Ziziphus gardneri* Reissek, *Ziziphus guaranítica* Malme, *Ziziphus joazeiro* C. Mart. Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, SPE).

Sarcomphalus mistol (Griseb.)

Hauenschild Sin.: *Ziziphus mistol* Griseb., *Ziziphus oblongifolia* S. Moore, *Ziziphus weberbaueri* Pilg. Árbol. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CHO, CON, NAS, PHA).

Scutia Brongn.

Scutia arenicola (Casar.) Reissek

Sin.: *Adolia arenicola* (Casar.) Kuntze, *Rhamnus arenicola* Casar. Arbusto. Nativa. 0-200 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Scutia buxifolia Reissek

Sin.: *Adolia buxifolia* (Reissek) Kuntze, *Rhamnus coronula* Larrañaga, *Scutia buxifolia* Reissek var. *acutifolia* Reissek, *Scutia buxifolia* Reissek var. *obtusifolia* Reissek, *Scutia fiebrigii* Perkins

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Trevoa Miers

Trevoa quinquenervia Gillies & Hook.

Sin.: *Colletia tralhuen* Bertero ex Colla ap. Savi, *Talguenea costata* Hook. & Arn., nom. illeg., *Talguenea costata* Miers, *Talguenea mollis* Miers, nom. illeg., *Talguenea quinquenervia* (Gillies & Hook.) I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-2200 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

RHIZOPHORACEAE

Rhizophora L.

Rhizophora mangle L.

Árbol. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

ROSACEAE

Acaena Mutis ex L.

Acaena alpina Poepp. ex Walp.

Sin.: *Acaena digitata* Phil., *Acaena digitata* Phil. var. *latifoliolata* Bitter, *Acaena digitata* Phil. var. *subpinnata* Bitter

Hierba. Endémica. 2200-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Acaena antarctica Hook. f.

Sin.: *Acaena antarctica* Hook. f. var. *argutidentata* Bitter, *Acaena microcephala* Schltld., *Acaena pearcei* Phil., *Acaena pearcei* Phil. var. *glabrinervis* Bitter, *Acaena pumila* Phil., hom. illeg., *Acaena tenuifolia* Bitter

Hierba. Endémica. 1000-1600 m.

Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(BIO, ARA, LLA, AIS, MAG).

Acaena argentea Ruiz & Pav.

Sin.: *Acaena argentea* Ruiz & Pav. f.

epargyrea Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. f. *nigricans* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. f. *viridis* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *breviscapa* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *coriacea* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *grandiceps* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *interrrupte-pinnata* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *lanigera* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *longifolia* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *subcalvescens* Bitter, *Ancistrum argenteum* (Ruiz & Pav.) Kunth

Hierba. Endémica. 700-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, JFE).

Acaena caespitosa Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Acaena chamaegeron* Bitter, *Acaena chubutensis* Bitter, *Acaena pulvinata* Kuntze, *Acaena tomentosa* Bitter

Hierba. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Acaena confertissima Bitter

Sin.: *Acaena confertissima* Bitter var. *breviscapa* Bitter, *Acaena confertissima* Bitter var. *intermedia* Bitter, *Acaena confertissima* Bitter var. *majuscula* Bitter

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Acaena eupatoria Cham. & Schltld.

Sin.: *Acaena montevidensis* Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, CLA, FLO, FLA, LAV, MON, SOR, TAC).

Acaena fuscescens Bitter

Hierba terrestre. Endémica.

Países: BRA(PAR, RGS).

Acaena integerrima Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Acaena adenocarpa* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *basiinermis* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *microphylla* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *pedicellata* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *tridentata* Bitter, *Acaena adenocarpa* Bitter var. *undiquearmata* Bitter, *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn. var. *erectifolia* Bitter, *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn. var. *latifrons* Bitter, *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn. var. *subpilosicupula* Bitter

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG, RME).

Acaena leptacantha Phil.

Sin.: *Acaena andina* Phil., *Acaena capitata* Phil., *Acaena leptacantha* Phil. var. *conferta* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. subsp. *connectens* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *longissima* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *negeri* (E. Duse) Bitter, *Acaena macrocephala* Poepp. var. *negeri* E. Duse

Hierba. Endémica. 1000-1700 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Acaena lucida (Aiton) Vahl

Sin.: *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg., *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg. var. *abbreviata* Bitter, *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg. var. *glabratula* Bitter, *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg. var. *intermedia* Bitter, *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg. var. *villosula* Bitter, *Acaena parvifolia* Phil., *Ancistrum lucidum* Aiton, *Ancistrum lucidum* Lam., nom. illeg.

Hierba. Endémica. 700-1100 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Acaena macrocephala Poepp.

Sin.: *Acaena macrocephala* Poepp. var. *caput-medusae* Bitter, nom. inval.

Hierba. Endémica. 900-2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI).

Acaena magellanica (Lam.) Vahl

Sin.: *Acaena acroglochis* Bitter, *Acaena acutifida* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl subsp. *georgiae-australis* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl subsp. *glabriscapa* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl var. *luxurians* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl var. *macrochaeta* Franch., *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl var. *semperpilosa* Bitter, *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl var. *utrinqueglabrescens* Bitter, *Acaena affinis* Hook. f., *Acaena alboffii* Macloskie, *Acaena brachyglochis* Bitter, *Acaena cadilla* Hook. f., *Acaena canescens* Phil., *Acaena chamaeacena* Bitter, *Acaena closiana* Gay, *Acaena colchaguensis* Bitter, *Acaena compacta* Hauman, *Acaena coxi* Phil., *Acaena depauperata*

Bitter, *Acaena exaltata* Bitter, *Acaena floribunda* Bitter, *Acaena glandulifera* Bitter, *Acaena glaucella* Bitter, *Acaena grandistipula* Bitter, *Acaena grossifolia* Bitter, *Acaena hirsuta* Phil., *Acaena hirta* Citerne, *Acaena humilis* Bitter, *Acaena ischnostemom* Bitter, *Acaena krausei* Phil., *Acaena krausei* Phil. var. *hirsuta* (Phil.) Reiche, *Acaena krausei* Phil. var. *massonandra* Bitter, *Acaena krausei* Phil. var. *meionandra* Bitter, *Acaena laevigata* Aiton var. *venulosa* (Griseb.) Reiche, *Acaena laevigata* Aiton, *Acaena longiaristata* H. Ross, *Acaena longistigma* Bitter, *Acaena longistipula* Bitter, *Acaena macrophytes* Bitter, *Acaena macropoda* Bitter, *Acaena macrostemon* Hook. f., *Acaena macrostemon* Hook. f. subsp. *closiana* (Gay) Bitter, *Acaena macrostemon* Hook. f. subsp. *latisejala* Bitter, *Acaena macrostemon* Hook. f. subsp. *longiaristata* (H. Ross) Bitter, *Acaena macrostemon* Hook. f. var. *basipilosa* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *grandiscapa* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *laevigata* (Aiton) Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *pygmaea* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *subtuspilosa* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *venulosa* (Griseb.) Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl var. *glabrescens* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl var. *pubescens* Bitter, *Acaena neglecta* Bitter, *Acaena nudicaulis* Albov, *Acaena obtusiloba* Bitter, *Acaena oligodonta* Bitter, *Acaena oligoglochin* Bitter, *Acaena oligomera* Skottsbg., *Acaena petiolulata* Phil., *Acaena philippii* Gand., *Acaena plioglochin* Bitter, *Acaena rubescens* Bitter, *Acaena sericascens* Bitter, *Acaena sericascens* Bitter var. *sexjuga* Bitter, *Acaena sericascens* Bitter var. *tenuibracteolata* Bitter, *Acaena subflaccida* Bitter, *Acaena subtusvillosula* Bitter, *Acaena tomentella* Bitter, *Acaena transitoria* Bitter, *Acaena venulosa* Griseb., *Ancistrum magellanicum* Lam.
 Hierba. Nativa. 100-3500 m.
 Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Acaena masafuerana Bitter

Hierba. Endémica. 1000-1100 m.
 Países: CHL(JFE).

Acaena myriophylla Lindl.

Sin.: *Acaena hieronymi* Kuntze, *Acaena hieronymi* Kuntze var. *elegantula* Bitter, *Acaena hieronymi* Kuntze var. *robusta* Bitter
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SFE, SLU, TUC).

Acaena ovalifolia Ruiz & Pav.

Sin.: *Acaena elegans* Gay, *Acaena micranthera* Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. subsp. *elegans* (Gay) Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. var. *chubutensis* Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. var. *elegans* (Gay) Reiche, *Acaena tenuipila* Bitter
 Hierba. Endémica. 500-2500 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL, SCR, TDF, TUC). CHL(COQ, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE).

Acaena patagonica A. Martic.

Hierba. Endémica. 0-1100 m.
 Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG, RME).

Acaena pinnatifida Ruiz & Pav.

Sin.: *Acaena multifida* Hook. f., *Acaena multifida* Hook. f. subsp. *multiglomerulans* Bitter, *Acaena multifida* Hook. f. var. *glaberrima* Speg., *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *aconcaguënsis* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *pliacantha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *depauperata* Bitter, *Acaena arthrotricha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *glabrata* Speg., *Acaena calcitrapa* Phil., *Acaena euacantha* Phil., *Acaena leptophylla* Phil., *Acaena longifolia* Phil., *Acaena multifida* Hook. f. subsp. *intercedens* Bitter, *Acaena multifida* Hook. f. subsp. *quinquefida* Bitter, *Acaena oligacantha* Phil., *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *macrura* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *heterotricha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *parvifrons* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *hypoleuca* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *liocarpa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *longifolia* (Phil.) Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *nudiscapa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *oligacantha* (Phil.) Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *intermedia* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *uspallatensis* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *calcitrapa*

(Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *euacantha* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *leptophylla* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *longifolia* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *oligacantha* (Phil.) Reiche, *Acaena multifida* Hook. f. subsp. *alaticonnata* Bitter, *Acaena multifida* Hook. f. var. *utrinquepilosa* Bitter
 Hierba. Endémica. 1300-4000 m.
 Países: ARG(CAT, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Acaena platyacantha Speg.

Sin.: *Acaena platyacantha* Speg. var. *brachyacantha* Bitter, *Acaena platyacantha* Speg. var. *parvifolia* Speg., *Acaena platyacantha* Speg. var. *trigonacantha* Bitter, *Acaena rahuensis* Kalela
 Hierba. Endémica. 900-2000 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(ARA, AIS, MAG).

Acaena poeppigiana Gay

Sin.: *Acaena pseudopoeppigiana* Kalela, *Acaena skottsbergii* Bitter
 Hierba. Endémica. 2400-3500 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, AIS, MAG, RME).

Acaena pumila Vahl

Sin.: *Acaena glaberrima* Phil., *Acaena pumila* Vahl var. *acrocoma* Bitter, *Acaena pumila* Vahl var. *glaberrima* (Phil.) Bitter
 Hierba. Endémica. 900-1100 m.
 Países: ARG(TDF). CHL(LRI, LLA, AIS, MAG).

Acaena sericea J. Jacq.

Sin.: *Acaena cuneata* Hook. & Arn., *Acaena fuegina* Phil.
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, SCR, SJU, TDF). CHL(VAL, LBO, MAG, RME).

Acaena splendens Hook. & Arn.

Sin.: *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *brachyphylla* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *brevisericea* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *gracilis* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *macrophylla* Bitter
 Hierba. Nativa. 0-3000 m.
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Acaena stricta Griseb.

Sin.: *Acaena anserinella* Bitter var. *elatissima* Bitter, *Acaena anserinella* Bitter, *Acaena anserinella* Bitter var. *stuckertii* Bitter, *Acaena polycarpa* Griseb., *Acaena polycarpa* Griseb. subsp. *lilloi* Bitter, *Acaena polycarpa* Griseb. var. *brevifilamentosa* Bitter, *Acaena polycarpa* Griseb. var. *longifilamentosa* Bitter, *Acaena stricta* Griseb. var. *latifoliolata* Bitter, *Acaena stricta* Griseb. var. *valdepilosa* Bitter
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Acaena tenera Albov

Sin.: *Acaena antarctica* Hook. f. var. *laxiuscula* Bitter
Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Acaena trifida Ruiz & Pav. var. **glabrescens** Regel & Körn.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, RME).

Acaena trifida Ruiz & Pav. var. **trifida**

Sin.: *Acaena quinquefida* Phil., *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *argentella* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *brachyphylla* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *mollissima* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *nanodes* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *plurifoliolata* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *quinquefida* (Phil.) Reiche, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *robusta* Bitter
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Agrimonia L.**Agrimonia hirsuta** Bong.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Agrimonia parviflora Sol.

Hierba. Introducida. 1000-2500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC).
BRA(PAR, SCA).

Agrimonia villosa Cham. & Schldtl.

Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Aphanes L.**Aphanes arvensis** L.

Sin.: *Alchemilla aphanes* Leers, *Alchemilla arvensis* (L.) Scop.
Hierba. Introducida. 1000-1700 m.
Países: ARG(MIS, NEU, RNE).
BRA(SCA). CHL(ANT, COQ, LBO, ARA, LLA, RME).

Aphanes berteroa Rothm. f. **berteroa**

Hierba. Endémica. 200-900 m.
Países: CHL(LBO).

Aphanes berteroa Rothm. f. **vegeta** Rothm.

Hierba. Endémica. 200-900 m.
Países: CHL(LBO).

Aphanes looseri (Rothm.) Rothm.

Sin.: *Alchemilla looseri* Rothm.
Hierba. Endémica. 500-700 m.
Países: CHL(RME).

Aphanes neglecta (Rothm.) Rothm.

Sin.: *Alchemilla neglecta* Rothm.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Aphanes parodii (I.M. Johnst.) Rothm.

Sin.: *Alchemilla parodii* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, LPA, SCR, SFE). BRA(RGS, SCA).
URY(RNO, ROC, SOR, TAC).

Cotoneaster Medik.**Cotoneaster franchetii** Bois

Arbusto. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL).

Cotoneaster glaucophyllus Franch.

Arbusto. Introducida. 900-1600 m.
Países: ARG(COR).

Cotoneaster horizontalis Decne.

Arbusto. Introducida. 1400-1600 m.
Países: ARG(COR).

Cotoneaster pannosus Franch.

Arbusto. Introducida. 1600-1700 m.
Países: ARG(COR).

Crataegus L.**Crataegus monogyna** Jacq.

Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Duchesnea Sm.**Duchesnea indica** (Andr.) Focke f. **albocaput** Naruh.

Hierba. Introducida. 1000 m.
Países: ARG(TUC).

Duchesnea indica (Andrews) Focke f. **indica**

Sin.: *Fragaria indica* Andrews
Hierba. Introducida. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, RME).
URY(MON).

Eriobotrya Lindl.**Eriobotrya japonica** (Thunb.) Lindl.

Sin.: *Mespilus japonicus* Thunb.
Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Geum L.**Geum andicola** (Phil.) Reiche

Sin.: *Siersversia andicola* Phil.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LLA).

Geum boliviense Focke

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS). URY(PAY).

Geum brevicarpellatum F. Bolle

Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(COR).

Geum involucreatum Juss. ex Pers.

Sin.: *Oncostylus involucreatus* (Pers.) F. Bolle, *Geum parviflorum* Comm. ex Sm.
Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LLA, AIS, MAG).

Geum lechlerianum Schldtl.

Sin.: *Oncostylus lechlerianus* (Schldtl.) F. Bolle
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ARA, LLA).

Geum magellanicum Comm. ex Pers.

Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).
CHL(LBO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Geum quellyon Sweet

Sin.: *Geum chilense* Lindl. var. *grandiflorum* Lindl., *Geum chiloense* Balb. ex Ser., *Geum coccineum* Lindl., hom. illeg., *Geum coccineum* Ser., hom. illeg., *Geum coccineum* Sibth. & Sm., *Geum grandiflorum* Steud., *Geum magellanicum* Hook. f., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-2600 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Geum riojense F. Bolle

Hierba. Endémica.
Países: ARG(LRI).

Kageneckia Ruiz & Pav.**Kageneckia angustifolia** D. Don

Árbol. Endémica. 0-3200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SDE, SLU, TUC).

Kageneckia oblonga Ruiz & Pav.

Sin.: *Kageneckia crataegifolia* Lindl., *Kageneckia crataegoides* D. Don, *Kageneckia ovata* Colla, *Lydaea lyday* Molina
Árbol. Endémica. 300-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Lachemilla (Kocke) Rydb.**Lachemilla asplenifolia** (Rothm.)

Rothm.
Sin.: *Alchemilla asplenifolia* Rothm.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(LRI, TUC).

Lachemilla bipinnatifida (L.M. Perry)

Rothm.
Sin.: *Alchemilla bipinnatifida* L.M. Perry
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(TUC).

Lachemilla diplophylla (Diels)

Rothm.
Sin.: *Alchemilla diplophylla* Diels
Hierba. Nativa. 3900-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Lachemilla frigida (Wedd.) Rothm.

Sin.: *Alchemilla frigida* Wedd.
Hierba. Nativa. 1500-4000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).

Lachemilla grisebachiana (L.M.

Perry) Rothm.
Sin.: *Alchemilla grisebachiana* L.M. Perry
Hierba. Endémica.
Países: ARG(TUC).

Lachemilla pedicellata (Rothm.)

Rothm.
Sin.: *Alchemilla pedicellata* Rothm.
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: ARG(TUC).

Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.)

Rothm.
Sin.: *Alchemilla alata* Ruiz & Pav. ex Steud., *Alchemilla calchaquina* Lillo, *Alchemilla pinnata* Ruiz & Pav., *Aphanes alata* Steud., *Aphanes pinnata* Pers., *Zygalmilla pinnata* (Ruiz & Pav.) Rydb.
Hierba. Nativa. 3600-4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Lachemilla sandienseis (Pilg.) Rothm.

Sin.: *Alchemilla sandienseis* Pilg.
Hierba. Nativa. 4500-4700 m.
Países: CHL(AYP).

Malus Mill.**Malus domestica** Borkh.

Sin.: *Pyrus malus* L.
Arbusto. Introducida.
Países: ARG(LPA, NEU, RNE).

Malus sylvestris Mill.

Árbol. Introducida. 1000-1500 m.
Países: ARG(NEU).

Margyricaena Bitter**Margyricaena skottsbergii** Bitter

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: CHL(JFE).

Margyricarpus Ruiz & Pav.**Margyricarpus digynus** (Bitter)

Skottsberg.
Sin.: *Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav. var. *digynum* Bitter
Subarbusto. Endémica. 100-500 m.
Países: CHL(JFE).

Margyricarpus pinnatus (Lam.)

Kuntze
Sin.: *Empetrum pinnatum* Lam., *Margyricarpus imberbis* C. Presl, *Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SLU, SCR, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). URY(MAL, ROC).

Polylepis Ruiz & Pav.**Polylepis australis** Bitter

Sin.: *Polylepis australis* Bitter var. *crenulata* Bitter, *Polylepis australis* Bitter var. *fuscotomentella* (Kuntze) Bitter, *Polylepis australis* Bitter var. *glabra* (Kuntze) Bitter, *Polylepis australis* Bitter var. *glabrescens* (Kuntze) Bitter, *Polylepis australis* Bitter var. *latifoliolata* Bitter, *Polylepis australis* Bitter var. *oblanceolata* Bitter, nom. illeg., *Polylepis australis* Bitter var. *subcalva* Bitter, p.p., *Polylepis australis* Bitter var. *tucumanica* Bitter, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *fuscotomentella* Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *glabra* Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *glabrescens* Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *pubescens* Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *pubinervia* Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *subresinosa* Kuntze
Árbol. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Polylepis crista-galli Bitter

Árbol. Nativa.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Polylepis hieronymi Pilg.

Sin.: *Polylepis australis* Bitter var. *bijuga* Bitter, nom. illeg., *Polylepis hieronymi* Pilg. var. *saltensis* Bitter, *Polylepis hypoleuca* (Wedd.) Bitter, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *albotomentella* Kuntze, *Polylepis racemosa* Ruiz & Pav. var. *hypoleuca* Wedd.
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Polylepis rugulosa Bitter

Sin.: *Polylepis tenuiruga* Bitter
Árbol. Nativa. 3000-4000 m.
Países: CHL(AYP).

Polylepis tarapacana Phil.

Sin.: *Polylepis tarapacana* Phil.
var. *brevifilamentosa* Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *multisquamata* Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *pyncnolopha* Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *sajamensis* Bitter
Árbol. Nativa. 3900-4700 m.
Países: ARG(JUJ). CHL(AYP, TAR, ANT).

Polylepis tomentella Wedd.

Sin.: *Polylepis tomentella* Wedd. subsp. *pentaphylla* Bitter, *Polylepis tomentella* Wedd. subsp. *tetragona* Bitter
Arbusto o árbol. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Potentilla L.**Potentilla anserina** L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Potentilla chilensis (L.) Mabb.

Sin.: *Fragaria chilensis* Ehrh., *Fragaria chilensis* Ehrh. var. *tincta* Ser., *Fragaria chilensis* (L.) Mill., *Fragaria chilensis* (L.) Duchesne, nom. inval., *Fragaria vesca* L. var. *chilensis* L.
Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Potentilla recta L.

Hierba. Introducida. 500-800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Potentilla reptans L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: CHL(RME).

Potentilla tucumanensis A.

Castagnaro & M. Arias
Hierba. Endémica. 300-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU, SLU, TUC).

Potentilla vesca (L.) Scop.

Sin.: *Fragaria vesca* L.
Hierba. Introducida. 0-1900 m.
Países: ARG(CAT, ERI, LPA, TUC).
BRA(SCA).

Prunus L.**Prunus armeniaca** L.

Árbol. Introducida. 100-200 m.
Países: ARG(LPA).

Prunus avium (L.) L.

Sin.: *Prunus cerasus* L. var. *avium* L.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.)

D. Dietr.
Sin.: *Cerasus brasiliensis* Cham. & Schltdl., *Prunus sphaerocarpa* Hook. f., *Prunus sphaerocarpa* Hook. f. f. *grandifolia* Chodat & Hassl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Prunus cerasifera Ehrh.

Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Prunus cerasus L.

Árbol. Introducida.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SCR).
CHL(JFE).

Prunus chamissoana Koehne

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAA).

Prunus domestica L.

Árbol. Introducida. 0-100 m.
Países: ARG(BAI).

Prunus instititia L.

Arbolito. Introducida. 700-800 m.
Países: ARG(COR).

Prunus laurocerasus L.

Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Prunus ligustrina Koehne

Árbol. Endémica. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, AMA, CAA, PAI).

Prunus mahaleb L.

Arbusto. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SLU).

Prunus sellowii Koehne

Árbol. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

Sin.: *Celastrus myrtifolia* L., *Prunus sellowii* Koehne
Arbolito o árbol. Nativa. 100-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Prunus oleifolia Koehne

Sin.: *Prunus douglasii* Basualdo & Zardini
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CON, PAI).

Prunus omissa Koehne

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(COA, PAI).

Prunus padus L.

Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Prunus persica (L.) Batsch var.

aposerca Burkart
Árbol. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, TUC).

Prunus persica (L.) Batsch var. **persica**

Sin.: *Amygdalus persica* L.
Arbusto o árbol. Introducida. 1000-2000 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, TUC).

Prunus ravenii Zardini & Basualdo

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APA, CAU, MIE, PAI, SPE).

Prunus subcoriacea (Chodat & Hassl.) Koehne

Sin.: *Prunus sphaerocarpa* Hook. f. f. *subcoriacea* Chodat & Hassl.
Árbol. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, ITA).
URY(RIV, TAC, TYT).

Prunus tucumanensis Lillo

Árbol. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Prunus ulei Koehne

Arbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pyracantha M. Roem.**Pyracantha angustifolia** (Franch.)

C.K. Schneid.
Sin.: *Cotoneaster angustifolius* Franch.
Arbusto o arbolito. Introducida. 1500-2000 m.
Países: ARG(COR, SAL).

Pyracantha atalantioides (Hance)

Stapf
Sin.: *Sportella atalantioides* Hance
Arbusto o arbolito. Introducida. 600-1300 m.
Países: ARG(COR).

Rosa L.**Rosa canina L.**

Arbusto. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(MAU, BIO, LLA, RME).

Rosa micrantha Sm.

Arbusto. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(RNE, TDF).

Rosa multiflora Thunb.

Arbusto. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Rosa rubiginosa L.

Sin.: *Rosa eglantheria* L., nom. ambig.
Arbusto. Introducida. 0-600 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE).
CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Rosa sicula Tratt.

Arbusto. Introducida.
Países: ARG(CHU, MEN).

Rubus L.**Rubus boliviensis Focke**

Liana. Nativa.
Países: BRA(RGS).

Rubus brasiliensis Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Rubus caesius L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(ERI).

Rubus constrictus P.J. Müll. & Lefèvre

Arbusto. Introducida. 0-1200 m.
Países: CHL(COQ, BIO, ARA, LRI, LLA).

Rubus erythroclados Mart.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-1400 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Rubus flagellaris Willd.

Arbusto. Introducida. 1100-1600 m.
Países: ARG(COR).

Rubus geoides Sm.

Hierba. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF).
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Rubus imperialis Cham. & Schltdl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Rubus nitidus Weihe & Nees

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, JUJ).

Rubus niveus Thunb.

Arbusto. Introducida.
Países: BRA(SCA).

Rubus paraguariensis (Chodat & Hassl.) Basualdo & Zardini

Sin.: *Rubus hassleri* Chodat var.
paraguariensis Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAA, SPE).

Rubus phoenicolasius Maxim.

Arbusto. Introducida. 1200-1300 m.
Países: ARG(COR).

Rubus praecox Bertol.

Arbusto. Introducida.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE).

Rubus radicans Cav.

Hierba. Introducida. 900-1500 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ARA, LLA, AIS, MAG).

Rubus rosaefolius J. Sm. var. coronarius Sims

Arbusto. Introducida. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rubus rosaefolius J. Sm. var. rosaefolius

Arbusto. Introducida. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Rubus rosifolius Baker

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Rubus schottii Pohl ex Focke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS).

Rubus sellowii Cham. & Schltdl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, ITA).

Rubus ulmifolius Schott

Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE, SJU). BRA(PAR, SCA). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE). URY(LAV).

Rubus urticifolius Poir.

Sin.: *Rubus hassleri* Chodat
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA, PAI).

Sanguisorba L.**Sanguisorba minor Scop.**

Sin.: *Poterium sanguisorba* L.
Hierba. Introducida. 0-1800 m.
Países: ARG(LPA, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Sorbus L.**Sorbus aucuparia L.**

Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Spiraea L.**Spiraea cantoniensis Lour.**

Arbolito. Introducida.
Países: BRA(RGS, SCA).

Spiraea douglasii Hook.

Arbusto. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).

Tetraglochin Poepp.**Tetraglochin acanthocarpa (Speg.) Speg.**

Sin.: *Margyricarpus acanthocarpa* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. f. *macropoda* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. var. *typica* Speg., nom. inval.

Subarbusto. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(MAG).

Tetraglochin alata (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. alata

Sin.: *Margyricarpus alatus* Gillies ex Hook. & Arn., *Margyricarpus strictus* (Poepp.) J.F. Macbr., *Tetraglochin alata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *patagonica* Grondona, *Tetraglochin microphylla* Phil., *Tetraglochin stricta* Poepp.

Arbusto. Nativa. 100-3100 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Tetraglochin alata (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. **ameghinoi** (Speg.) Ciald. & Pometti

Sin.: *Margyricarpus ameghinoi* Speg., *Tetraglochin ameghinoi* (Speg.) Speg.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-3000 m.

Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SCR, TUC). CHL(COQ, LBO, BIO, RME).

Tetraglochin andina Ciald.

Arbusto. Endémica. 1700-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU).

Tetraglochin caespitosa Phil.

Sin.: *Margyricarpus caespitosum* (Phil.) I.M. Johnst., nom. inval., *Margyricarpus clarazii* Ball, *Margyricarpus microphylla* Niederl., hom. illeg., *Margyricarpus niederleini* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. f. *dasycarpa* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. f. *lasiocarpa* Speg., *Tetraglochin acanthocarpa* (Speg.) Speg. f. *leiocarpa* Speg., *Tetraglochin clarazii* (Ball) Rothm.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 400-2100 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Tetraglochin cristata (Britton)

Rothm.

Sin.: *Margyricarpus cristatus* Britton, *Margyricarpus paucijugatus* I.M. Johnst., *Tetraglochin paucijugata* (I.M. Johnst.) Rothm., *Tetraglochin tragacantha* Rothm.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 2000-5000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR).

Tetraglochin inermis (I.M. Johnst.)

Rothm.

Sin.: *Margyricarpus inermis* I.M. Johnst.

Arbusto. Nativa. 3000-4800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

RUBIACEAE

Alibertia A. Rich. ex DC.

Alibertia edulis (Rich.) A. Rich.

Sin.: *Borojoa lanceolata* (Cham.) Cuatrec., *Genipa edulis* Rich., *Thieleodoxa lanceolata* Cham.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, PHA).

Alibertia latifolia (Benth.) K. Schum.

Sin.: *Cordia latifolia* Benth.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CEN, CON, COA, MIE, PAD).

Alseis Schott

Alseis floribunda Schott

Sin.: *Alseis floribunda* Schott var. *burchelliana* K. Schum., *Alseis floribunda* Schott var. *selloana* K. Schum., *Alseis floribunda* Schott var. *tomentosa* K. Schum.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Amaioua Aubl.

Amaioua guianensis Aubl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Amaioua intermedia Mart.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR; SCA).

Bathysa C. Presl

Bathysa australis (A. St.-Hil.) K. Schum.

Sin.: *Exostema australe* A. St.-Hil., *Bathysa meridionalis* L.B. Sm. & Downs, *Elaeagia glomiflora* Standl., *Voigtia australis* Klotzsch

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Borreria G. Mey.

Borreria alata (Aubl.) DC.

Sin.: *Spermacoce alata* Aubl.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Borreria argentea Cham.

Sin.: *Spermacoce argentea* (Cham.)

Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU).

Borreria brachystemonoides Cham.

& Schltdl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CEN, CON, ITA, ÑEE). URY(RIV, TAC).

Borreria brownii (Rusby) Standl.

Sin.: *Spermacoce brownii* Rusby, *Borreria staurochlamys* R.E. Fr., *Borreria vegeta* Standl. & Steyererm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ). BRA(Fuera del área del proyecto).

Borreria cupularis DC.

Sin.: *Spermacoce pusilla* Pohl

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, GUA).

Borreria dasycephala (Cham. & Schltdl.)

Bacigalupo & E.L. Cabral

Sin.: *Diodia dasycephala* Cham. & Schltdl., *Spermacoce dasycephala* (Cham. & Schltdl.) P.G. Delprete

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(FLA, MON, RIV, ROC).

Borreria krapocarmeniana E.L.

Cabral & L. Miguel

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(CAN, GUA, ITA, SPE).

Borreria loretiana E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Borreria marticrovettiana E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

PRY(CAU, CAN, CON, SPE).

Borreria multibracteata E.L. Cabral

& Bacigalupo

Subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Borreria nelidae E.L. Cabral

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS).

Borreria ocymifolia (Willd. ex Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L. Cabral

Sin.: *Diodia ocymifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) Bremek., *Hemidiodia ocymifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum., *Spermacoce ocymifolia* Willd. ex Roem. & Schult.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Borreria orientalis E.L. Cabral, R.

Salas & L. Miguel

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, ITA, PAI).

Borreria paranaensis E.L. Cabral &

Bacigalupo

Sin.: *Spermacoce paranaensis* (E.L.

Cabral & Bacigalupo) P.G. Delprete

Subarbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Borreria poaya (A. St.-Hil.) DC.Sin.: *Borreria asclepiadea* DC., *Borreria balansae* Standl., *Borreria flavescens* DC., *Borreria nervosa* DC., *Borreria poaya* (A. St.-Hil.) DC. var. *suffruticosa* K. Schum., *Borreria pratensis* DC., *Spermacoce balansae* (Standl.) Govaerts, *Spermacoce poaya* A. St.-Hil.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, PAI, SPE).

Borreria pulchristipula (Bremek.)

Bacigalupo & E.L. Cabral

Sin.: *Diodia macrophylla* K. Schum. var. *angustifolia* Chodat, *Diodia pulchristipula* Bremek., *Spermacoce pulchristipula* (Bremek.) P.G. Delprete

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, PAI, SPE).

Borreria quadrifaria E.L. Cabral

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Borreria runkii K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

Borreria schumannii (Standl. ex

Bacigalupo) E.L. Cabral & Sobrado

Sin.: *Borreria flavovirens* Bacigalupo & E.L. Cabral, nom. illeg., *Diodia gymnocephala* (DC.) K. Schum., *Diodia schumannii* Standl. ex Bacigalupo, nom. nud., *Spermacoce schumannii* (Standl. ex Bacigalupo) P.G. Delprete

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAU, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Borreria spinosa Cham. & Schltld. ex DC.Sin.: *Borreria densiflora* DC., *Borreria densiflora* DC. var. *perennis* Standl., *Borreria densiflora* DC. var. *villosa* Bacigalupo, *Spermacoce spinosa* L., nom. illeg.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, PHA).

Borreria suaveolens G. Mey.Sin.: *Spermacoce suaveolens* (G. Mey.)

Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Borreria sulcata (Bacigalupo) E.L. CabralSin.: *Borreria verticillata* (L.) G. Mey.var. *sulcata* Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI). BRA(PAR).

Borreria tenella (Kunth) Cham. &

Schltld.

Sin.: *Spermacoce tenella* Kunth

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, RIV, TYT).

Borreria tenera DC.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Borreria valens Standl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, ITA, PAI).

Borreria warmingii K. Schum.Sin.: *Spermacoce warmingii* (K.

Schum.) Kuntze

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Calycophyllum DC.**Calycophyllum multiflorum** Griseb.Sin.: *Calycophyllum spruceanum* Benth. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Calycophyllum spruceanum* Benth. var. *multiflorum* (Griseb.) Chodat & Hassl., *Pisonia combretifolia* Morong & Britton

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Cephalanthus L.**Cephalanthus glabratus** (Spreng.) K.

Schum.

Sin.: *Buddleja glabrata* Spreng.,*Cephalanthus sarandi* Cham. & Schltld.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Chiococca P. Browne**Chiococca alba** (L.) C.L. Hitchc.Sin.: *Chiococca anguifuga* Mart., *Chiococca brachiata* Ruiz & Pav., *Chiococca densifolia* Mart., *Chiococca racemosa* L., *Lonicera alba* L.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN). URY(ROC).

Chomelia Jacq.**Chomelia brasiliana** A. Rich.Sin.: *Anisomeris brasiliana* (A. Rich.) Standl., *Anisomeris catharinae* L.B. Sm. & Downs, *Caruelina brasiliana* (A. Rich.) Kuntze, *Chomelia catharinae* (L.B. Sm. & Downs) Steyerem.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI).

Chomelia hirsuta Gardner

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Chomelia obtusa Cham. & Schltld.Sin.: *Anisomeris obtusa* (Cham. & Schltld.) K. Schum., *Anisomeris obtusa* (Cham. & Schltld.) K. Schum. var. *inermis* Chodat & Hassl., *Chomelia obtusa* Cham. & Schltld. var. *pubescens* Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, APY, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA).

Chomelia parvifolia (Standl.)

Govaerts

Sin.: *Anisomeris parvifolia* Standl.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Chomelia parviflora (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Sin.: *Anisomeris parviflora* (Müll. Arg.)
Standl., *Malanea parviflora* Müll. Arg.
Arbusto. Endémica. 400 m.
Países: BRA(PAR).

Chomelia pedunculosa Benth.
Sin.: *Anisomeris pedunculosa* (Benth.)
Standl.
Arbusto. Nativa. 300-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Chomelia pohliana Müll. Arg.
Sin.: *Anisomeris pohliana* (Müll. Arg.)
Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Chomelia pubescens Cham. & Schltdl.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Coccocypselum P. Browne

Coccocypselum capitatum (Graham)
C.B. Costa & Mamede
Sin.: *Aeginetia capitata* Graham,
Hedyotis campanuliflora Hook. f.,
Coccocypselum campanuliflorum (Hook.)
Cham. & Schltdl., *Lipostoma capitatum*
(Graham) D. Don
Hierba. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Coccocypselum condalia Pers.
Sin.: *Coccocypselum umbellatum* Poir.,
Condalia repens Ruiz & Pav., *Oldenlandia*
cordata Vell.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA).

Coccocypselum cordifolium Nees &
Mart.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Coccocypselum geophiloides Wawra
Sin.: *Coccocypselum krauseanum*
Standl., *Coccocypselum sessiliflorum*
Standl.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Coccocypselum glabrifolium Standl.
Arbusto. Nativa. 700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Coccocypselum hasslerianum Chodat
Sin.: *Coccocypselum cordatum* K.
Krause
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, COA).

Coccocypselum lanceolatum (Ruiz &
Pav.) Pers.
Sin.: *Coccocypselum canescens* Willd.
ex Cham. & Schltdl., *Condalia lanceolata*
Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN,
COA, GUA, PAI).

Coccocypselum lyman-smithii
Standl.
Sin.: *Coccocypselum pumilio* Standl.
Hierba. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Coccocypselum monanthos L.B. Sm.
& Downs
Sin.: *Coccocypselum uniflorum* Hassl.,
hom. illeg.
Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: PRY(AMA).

Coccocypselum pulchellum Cham.
Sin.: *Coccocypselum reitzii* L.B. Sm. &
Downs
Hierba. Endémica. 300-1700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Coprosma J.R. Forst. & G. Forst.

Coprosma oliveri Fosberg
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Coprosma pyrifolia (Hook. & Arn.)
Skottsbo.
Sin.: *Psychotria pyrifolia* Hook. & Arn.
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Cordia A. Rich. ex DC.

Cordia concolor (Cham.) Kuntze
Sin.: *Alibertia concolor* (Cham.) K.
Schum., *Alibertia hassleriana* Chodat,
Alibertia stricta Zahlbr., *Alibertia*
vaccinioides K. Schum., *Gardeniola*
concolor Cham.
Arbolito o arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APY, CAU, CAN, COA, PAI).

Cordia humilis (K. Schum.) Kuntze
Sin.: *Alibertia humilis* K. Schum.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN,
CON, SPE).

Cordia myrciifolia (K. Schum.) C.H.
Perss. & Delprete
Sin.: *Alibertia myrciifolia* K. Schum.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cordia sessilis (Vell.) Kuntze
Sin.: *Alibertia sessilis* (Vell.) K. Schum.,
Gardenia sessilis Vell.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, AMA, CAN, CON,
COA, SPE).

Coussarea Aubl.

Coussarea contracta (Walp.) Benth. &
Hook. ex Müll. Arg.
Sin.: *Faramea contracta* Walp.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA).

Coussarea platyphylla Müll. Arg.
Sin.: *Coussarea paraguayensis* Chodat
& Hassl., *Coussarea platyphylla* Müll.
Arg. var. *longiflora* Chodat & Hassl.,
Coussarea platyphylla Müll. Arg. var.
vestita Chodat & Hassl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área
del proyecto). PRY(AMA, CAN, COA,
PAI, SPE).

Coutarea Aubl.

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
Sin.: *Coutarea alba* Griseb., *Coutarea*
hexandra (Jacq.) K. Schum. f. *albiflora*
Chodat & Hassl., *Coutarea hexandra*
(Jacq.) K. Schum. f. *grandiflora* Chodat
& Hassl., *Coutarea hexandra* (Jacq.) K.
Schum. f. *pubescens* (Pohl) Steyererm.,
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
f. *roseiflora* Chodat & Hassl., *Coutarea*
hexandra (Jacq.) K. Schum. var. *calycina*
Chodat & Hassl., *Coutarea hexandra*
(Jacq.) K. Schum. var. *fluminensis* K.
Schum., *Coutarea hexandra* (Jacq.)
K. Schum. var. *pubescens* K. Schum.,
Coutarea pubescens Pohl, *Coutarea*
speciosa Aubl., *Portlandia hexandra* Jacq.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA,
AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).

Cruckshanksia Hook. & Arn.

Cruckshanksia hymenodon Hook. & Arn.

Sin.: *Cruckshanksia bustillosii* Phil.,
Cruckshanksia hymenodon Hook. & Arn.
var. *bustillosii* (Phil.) Ricardi & Quezada,
Rotheria lanceolata Meyen
Hierba. Endémica. 1000-3500 m.
Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA,
COQ, VAL, RME).

Cruckshanksia lithiophila Ricardi

Hierba. Endémica. 3000-3600 m.
Países: CHL(ATA).

Cruckshanksia macrantha Phil.

Sin.: *Oreopolus macranthus* (Phil.)
Ricardi
Hierba. Endémica. 1000-4500 m.
Países: ARG(LRI, SJU). CHL(ATA,
COQ, VAL).

Cruckshanksia montiana Clos

Sin.: *Cruckshanksia capitata* Phil.,
Cruckshanksia densifolia Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Cruckshanksia palmae Clos

Sin.: *Oreopolus palmae* (Clos) Ricardi
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Cruckshanksia pumila Clos

Sin.: *Cruckshanksia chrysantha*
Phil., *Cruckshanksia darapskyana*
Phil., *Cruckshanksia geisseana* Phil.,
Cruckshanksia tripartita Phil.,
Hierba. Endémica. 800-2300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Cruckshanksia verticillata Phil.

Sin.: *Cruckshanksia capitata* Phil. var.
paradoxa (Phil.) Reiche, *Cruckshanksia*
paradoxa Phil.
Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Declieuxia Kunth

Declieuxia cordigera Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult. f. var. **angustifolia** Müll. Arg.

Sin.: *Declieuxia cordigera* Mart. & Zucc.
ex Schult. & Schult. f. var. *longifolia* Müll.
Arg., *Declieuxia polygaloides* Mart. &

Zucc. ex Schult. & Schult. f., *Declieuxia*
polygaloides Mart. & Zucc. ex Schult.
& Schult. f. var. *angustifolia* Müll. Arg.,
Declieuxia polygaloides Mart. & Zucc. ex
Schult. & Schult. f. var. *aristolochia* Müll.
Arg., *Declieuxia polygaloides* Mart. & Zucc.
ex Schult. & Schult. f. var. *latifolia* Müll.
Arg., *Declieuxia sclerophylla* Müll. Arg.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Declieuxia dusenii Standl.

Subarbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze

Sin.: *Houstonia fruticosa* Willd. ex
Roem. & Schult.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Declieuxia lysimachioides Zucc. ex Schult. & Schult. f.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Deppea Cham. & Schltdl.

Deppea blumenaviensis (K. Schum.) Lorence

Sin.: *Schenckia blumenaviensis* K.
Schum., *Schenckia blumenaviensis* K.
Schum. var. *macrocarpa* Standl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Diodia L.

Diodia kuntzei K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERD). BRA(PAR, SCA).
PRY(CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, SPE).

Diodia saponariifolia (Cham. & Schltdl.) K. Schum.

Sin.: *Borreria saponariifolia* Cham. &
Schltdl.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(AMA, COA).

Emmeorhiza Pohl ex Endl.

Emmeorhiza umbellata (Spreng.) K. Schum.

Sin.: *Borreria umbellata* Spreng., *Endlicheria*
umbellata (Spreng.) K. Schum.
Subarbusto apoyante. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN).

Eumachia DC.

Eumachia astrellantha (Wernham)

Delprete & J.H. Kirkbr.
Sin.: *Psychotria astrellantha* Wernham
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eumachia cephalantha (Müll. Arg.)

Delprete & J.H. Kirkbr.
Sin.: *Mapouria cephalantha* Müll. Arg.,
Margaritopsis cephalantha (Müll. Arg.)
C.M. Taylor, *Psychotria cephalantha*
(Müll. Arg.) Standl.
Arbusto. Nativa. 200-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Eumachia chaenotricha (DC.) C.M.

Taylor & Razafim.
Sin.: *Mapouria aemulans* Müll. Arg.,
Mapouria chaenotricha (DC.) Müll. Arg.,
Mapouria mandiocana Chodat & Hassl.,
Margaritopsis chaenotricha (DC.) C.M.
Taylor, *Psychotria aemulans* (Müll. Arg.)
Standl., *Psychotria chaenotricha* DC.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APA,
AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).

Eumachia cymuligera (Müll. Arg.)

C.M. Taylor & Razafim.
Sin.: *Mapouria cymuligera* Müll. Arg.,
Mapouria xanthophylloides Müll. Arg.,
Margaritopsis cymuligera (Müll. Arg.)
C.M. Taylor, *Psychotria birotula* L.B. Sm.
& Downs, *Psychotria xanthophylloides*
(Müll. Arg.) Standl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Eumachia hassleriana (Chodat) C.M.

Taylor & Razafim.
Sin.: *Mapouria hassleriana* (Chodat)
Hassl., *Margaritopsis hassleriana*
(Chodat) C.M. Taylor, *Rudgea hassleriana*
Chodat
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CON, SPE).

Faramea Aubl.

Faramea calyciflora A. Rich.

Sin.: *Faramea colorata* (Hook. f.)
Benth., *Faramea macrocalyx* Müll. Arg.,
Homaclados coloratus Hook. f.
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Faramea cyanea Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, CAU, CAN, GUA, PAI).

Faramea hassleriana Chodat
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(CAN).

Faramea hyacinthina Mart.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).

Faramea martiana Müll. Arg.
Sin.: *Faramea marginata* Cham.
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Faramea montevidensis (Cham. & Schltld.) DC.
Sin.: *Tetramerium montevidense* Cham. & Schltld.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
URY(MON).

Faramea multiflora A. Rich. ex DC.
Sin.: *Faramea multiflora* A. Rich. ex DC. var. *salicifolia* (C. Presl) Steyererm., *Faramea salicifolia* C. Presl
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Faramea oligantha Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 500-1300 m.
Países: BRA(SCA).

Faramea porophylla (Vell.) Müll. Arg.
Sin.: *Faramea fiebrigii* Krause, *Psychotria porophylla* Vell.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, PAI).

Faramea stenantha Müll. Arg.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Faramea stipulacea (Cham. & Schltld.) DC.
Sin.: *Tetramerium stipulaceum* Cham. & Schltld.
Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Galianthe Griseb.

Galianthe angustifolia (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria angustifolia* Cham. & Schltld.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Galianthe aurelii E.L. Cabral
Subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Países: PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).

Galianthe bisepala E.L. Cabral
Subarbusto. Nativa. 1200-1300 m.
Países: ARG(SAL).

Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo
Sin.: *Diodia anthospermoides* Cham. & Schltld., *Diodia brasiliensis* Spreng., *Diodia brasiliensis* Spreng. var. *microphylla* (Cham. & Schltld.) Standl., *Diodia polymorpha* Cham. & Schltld., *Diodia polymorpha* Cham. & Schltld. var. *macrophylla* Cham. & Schltld., *Diodia polymorpha* Cham. & Schltld. var. *microphylla* Cham. & Schltld.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA, ÑEE). URY(RNO).

Galianthe canindeyuensis E.L. Cabral
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Galianthe centranthoides (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. f. *glabrior* Chodat & Hassl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. f. *pubescens* Chodat & Hassl., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. var. *angustifolia* Cham. & Schltld., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. var. *latifolia* Cham. & Schltld., *Borreria centranthoides* Cham. & Schltld., *Galianthe clidemioides* Griseb., *Spermacoce centranthoides* (Cham. & Schltld.) Kuntze, *Spermacoce clidemioides* (Griseb.) Niederl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(ART, COL, FLA, LAV, MAL, RIV).

Galianthe chodatiana (Standl.) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria chodatiana* Standl., *Borreria thalictroides* K. Schum. var. *latifolia* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN).

Galianthe cymosa (Cham.) E.L. Cabral & Bacigalupo
Sin.: *Diodia cymosa* Cham.
Subarbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Galianthe cyperoides (Chodat & Hassl.) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria cyperoides* Chodat & Hassl., *Borreria leiophylla* K. Schum. var. *expansa* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, SPE).

Galianthe dichasia (Sucre & C.G. Costa) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria dichasia* Sucre & C.G. Costa, *Diodia cymosa* Cham. var. *aculeolata* Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, SPE). URY(RIV).

Galianthe elegans E.L. Cabral
Subarbusto. Endémica. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Galianthe equisetoides (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria equisetoides* Cham. & Schltld., *Spermacoce equisetoides* (Cham. & Schltld.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS).

Galianthe eupatorioides (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral
Sin.: *Borreria eupatorioides* Cham. & Schltld., *Spermacoce eupatorioides* (Cham. & Schltld.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU, CEN, CHO, CON, GUA, ITA, MIE, NAS). URY(ROC).

Galianthe fastigiata Griseb.
Sin.: *Borreria fastigiata* (Griseb.) K. Schum., *Borreria leiophylla* K. Schum., *Borreria verbenoides* Cham. & Schltld., *Spermacoce fastigiata* (Griseb.) Niederl., *Spermacoce leiophylla* (K. Schum.) Kuntze
Subarbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, COA, MIE, PAI). URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).

Galianthe gertii E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 1000-1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Galianthe guaranitica (Chodat & Hassl.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria guaranitica* Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 100-700 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Galianthe hassleriana (Chodat) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria hassleriana* Chodat, *Borreria hassleriana* Chodat f. *angustifolia* Chodat, *Borreria hassleriana* Chodat f. *latifolia* Chodat
Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: PRY(CAN, SPE).

Galianthe hispidula (A. Rich. ex DC.) E.L. Cabral & Bacigalupo

Sin.: *Diodia hispidula* A. Rich. ex DC., *Diodia paradoxa* Cham.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Galianthe krausei (Suess.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria corymbosa* (Ruiz & Pav.) DC. f. *microphylla* Chodat & Hassl., *Borreria krausei* Suess., *Borreria saxicola* K. Krause, nom. illeg.
Subarbusto. Endémica. 200-400 m.
Países: PRY(CAN, COA, PAI).

Galianthe latistipula E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Galianthe laxa (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral subsp. **laxa**

Sin.: *Borreria cristata* S. Moore, *Borreria laxa* Cham. & Schltld., *Borreria mitreoloides* Standl., *Galianthe cristata* (S. Moore) E.L. Cabral, *Spermacoce laxa* (Cham. & Schltld.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA). URY(COL, CLA, MON, SJO, SJO).

Galianthe laxa (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral subsp. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria laxa* Cham. & Schltld. var. *vestita* L.B. Sm. & Downs, *Borreria paraguariensis* Chodat & Hassl., *Borreria*

paraguariensis Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat, *Borreria paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *puberula* Chodat, *Galianthe paraguariensis* (Chodat & Hassl.) E.L. Cabral
Subarbusto. Endémica. 100-300 m.
Países: PRY(APY, AMA, CEN, COA, PAI, PHA).

Galianthe linearifolia E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(APA).

Galianthe longifolia (Standl.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria thalictroides* K. Schum. var. *longifolia* Standl.
Subarbusto. Nativa. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Galianthe montesii E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(MIS). PRY(APA).

Galianthe palustris (Cham. & Schltld.)

Cabaña Fader & E.L. Cabral
Sin.: *Borreria gymnocephala* DC., *Borreria palustris* (Cham. & Schltld.) Bacigalupo & E.L. Cabral, *Diodia alata* Nees & Mart., *Diodia palustris* Cham. & Schltld., *Spermacoce palustris* (Cham. & Schltld.) P.G. Delprete
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Galianthe parvula E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 300-1200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, SPE).

Galianthe pseudopeciolata E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 200-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU).

Galianthe reitzii E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.
Países: BRA(SCA).

Galianthe riograndensis J. Florentin & E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Galianthe thalictroides (K. Schum.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria thalictroides* K. Schum., *Borreria verbenoides* Cham. & Schltld. var. *thalictroides* (K. Schum.) Porto &

Miotto, *Spermacoce thalictroides* (K. Schum.) Kuntze

Subarbusto. Nativa. 100-900 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU). URY(Desconocida).

Galianthe valerianoides (Cham. & Schltld.) E.L. Cabral

Sin.: *Borreria luteovirens* Standl., *Borreria valerianoides* Cham. & Schltld., *Spermacoce valerianoides* (Cham. & Schltld.) Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA).

Galianthe verbenoides (Cham. & Schltld.) Griseb.

Sin.: *Borreria verbenoides* Cham. & Schltld., *Spermacoce verbenoides* (Cham. & Schltld.) Niederl., *Spermacoce verbenoides* (Cham. & Schltld.) Kuntze, comb. superfl.
Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Galium L.**Galium antarcticum** Hook. f.

Sin.: *Galium debile* Banks & Sol.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Galium aparine L.

Sin.: *Galium aparine* L. subsp. *spurium* (L.) Dusén, *Galium aparine* L. var. *microphyllum* Clos, *Galium aparine* L. var. *pseudoaparine* (Griseb.) Speg., *Galium aparine* L. var. *spurium* L., *Galium australe* Reiche, *Galium chilense* Hook. f., *Galium chonosense* Clos, *Galium pseudoaparine* Griseb., *Galium spurium* L.
Hierba. Introducida. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, TDF, TUC). BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, MON).

Galium araucanum Phil.

Sin.: *Galium suffruticosum* Hook. & Arn. var. *araucanum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-1900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Galium atherodes Spreng.

Sin.: *Galium ericoides* Lam. var. *atherodes* K. Schum., *Relbunium atherodes* (Spreng.) K. Schum., *Rubia uruguayensis* Arechav.
Hierba o subarbusto. Endémica.
0-1000 m.
Países: ARG(MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(COA, GUA, PAI). URY(RIV).

Galium bigeminum Griseb.

Sin.: *Relbunium bigeminum* (Griseb.) K. Schum.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SLU). BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Galium comberi Dempster

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU).

Galium corymbosum Ruiz & Pav.

Sin.: *Galium ciliatum* Ruiz & Pav. var. *weddellianum* Kuntze, *Galium hirsutum* Ruiz & Pav., *Galium leucocarpum* DC., nom. superfl., *Relbunium ciliatum* (Ruiz & Pav.) Hemsl., *Relbunium corymbosum* (Ruiz & Pav.) K. Schum., *Relbunium croceum* (Ruiz & Pav.) K. Schum. subsp. *involutratum* (Kunth) Ehrend., *Relbunium hirsutum* K. Schum.
Hierba. Nativa. 2000-5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, COQ).

Galium cotinoides Cham. & Schltdl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Galium diffusoramosum Dempster & Ehrend.

Sin.: *Galium diffusum* Clos
Hierba. Endémica. 100-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, MAU).

Galium diphyllum (K. Schum.)

Dempster
Sin.: *Relbunium diphyllum* K. Schum.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Galium divaricatum Pourr. ex Lam.

Sin.: *Galium aridicola* Briq., *Galium tenellum* Clos
Hierba. Introducida.
Países: CHL (Desconocida).

Galium equisetoides (Cham. & Schltdl.) Standl.

Sin.: *Relbunium equisetoides* (Cham. & Schltdl.) Ehrend., *Rubia equisetoides* Cham. & Schltdl.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CEN, COA, GUA, SPE). URY(Desconocida).

Galium ericoides Lam.

Sin.: *Galium ericoides* Lam. var. *intermedium* Cham. & Schltdl., *Relbunium ericoides* (Lam.) K. Schum.
Hierba. Endémica. 0-1300 m.
Países: BRA(RGS). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SOR).

Galium eriocarpum Bartl. ex DC.

Sin.: *Galium brevifolium* Phil., *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *leiocarpum* Kuntze, *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *normale* Kuntze, *Galium philippii* Briq.
Subarbusto. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Galium fuegianum Hook. f.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, AIS, MAG).

Galium gilliesii Hook. & Arn. subsp. **gilliesii**

Sin.: *Galium lanatum* Kuntze
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Galium gilliesii Hook. & Arn. subsp. **telanthos** (Phil.) Dempster

Sin.: *Galium telanthos* Phil., *Galium trichocarpum* DC. var. *telanthos* (Phil.) Reiche, *Galium volckmanni* Phil.
Hierba. Endémica. 1500-3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(COQ, LBO, MAU, RME).

Galium gracilicaule Bacigalupo & Ehrend.

Hierba. Endémica. 3200-4800 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Galium hatschbachii Dempster

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Galium hirtum Lam.

Sin.: *Galium reflexum* Pohl ex DC., *Relbunium hirtum* (Lam.) K. Schum., *Relbunium malmei* Standl.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, FLO, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SOR, TYT).

Galium humile Cham. & Schltdl.

Sin.: *Relbunium humile* (Cham. & Schltdl.) K. Schum.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, COA, ITA, MIE, PAI). URY(SJO).

Galium humilioides (M. Porto & Ehrend.) K. De Toni & Mariath

Sin.: *Relbunium humilioides* M.L. Porto & Ehrend.
Hierba. Endémica. 800-1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. subsp. **alluviale** (Ehrend.) Dempster

Sin.: *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl. subsp. *alluviale* Ehrend.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE).

Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. subsp. **hypocarpium**

Sin.: *Galium relbun* (Cham. & Schltdl.) Clos, *Relbunium croceum* (Ruiz & Pav.) K. Schum., *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl. subsp. *fluminense* (Vell.) Ehrend., *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl. subsp. *grandifolium* Ehrend., *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl. subsp. *nitidum* (Kunth) Ehrend., *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl., *Relbunium ovale* (Ruiz & Pav.) K. Schum., *Relbunium wettsteinii* Zahlbr. *Rubia relbun* Cham. & Schltdl., *Valantia hypocarpia* L.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, RNE, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, MAL, MON, RIV, ROC, TYT).

Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MIS, NEU, RNE, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME). PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(ART, CLA, MAL, MON, RIV, ROC, TYT).

Galium inconspicuum Phil.

Sin.: *Galium hypnoides* Clos var. *inconspicuum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(MAU, BIO, ARA).

Galium latoramosum Clos

Sin.: *Galium chapi* Wedd., *Galium ephedroides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze *Galium intricatum* Endl., hom. illeg., *Galium tetragonum* Griseb., *Rubia ephedroides* Cham. & Schltdl., hom. illeg., *Rubia intricata* Hook. & Arn., *Rubia tetragona* (Griseb.) K. Schum.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SFE, SLU, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, GUA). URY(CAS, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).

Galium leptum Phil.

Hierba. Endémica. 1800 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Galium lilloi Hicken

Hierba. Endémica. 300-1800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Galium longipedunculatum (Mariath & Ehrend.) K. De Toni & Mariath

Sin.: *Relbunium longipedunculatum* Mariath & Ehrend.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Galium magellanicum Hook. f.

Sin.: *Galium chonoense* Hook. f., *Galium chonoense* Hook. f. var. *valdivianum* Reiche, *Galium forsteri* Phil., *Galium nigricans* Clos, *Galium valdivianum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Galium masafueranum Skottsbo.

Hierba. Endémica. 1100-1400 m.
Países: CHL(JFE).

Galium megapotamicum Spreng.

Sin.: *Relbunium megapotamicum* (Spreng.) Ehrend., *Relbunium megapotamicum* (Spreng.) Ehrend. subsp. *camporum* Ehrend.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(MON).

Galium mollugo L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, NEU). URY(RIV).

Galium muelleri (K. Schum.)

Dempster
Sin.: *Relbunium muelleri* K. Schum.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Galium murale (L.) All.

Sin.: *Sherardia muralis* L.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Galium nigroramosum (Ehrend.)

Dempster
Sin.: *Relbunium nigroramosum* Ehrend.
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(CAT, COS, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, ITA, SPE). URY(DUR).

Galium noxium (A. St.-Hil.) Dempster subsp. **noxium**

Sin.: *Rubia noxia* A. St.-Hil.
Enredadera. Nativa. 600-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Galium noxium (A. St.-Hil.) Dempster subsp. **valantioides** (Cham. & Schltdl.) Dempster

Sin.: *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl. f. *denticulata* Chodat & Hassl., *Relbunium noxium* (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *pilcomayense* Hassl., *Relbunium valantioides* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Rubia valantioides* Cham. & Schltdl.
Enredadera. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE). URY(CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO).

Galium ostenianum (Standl.)

Dempster
Sin.: *Relbunium ostenianum* Standl.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). URY(CLA, TYT).

Galium ovalleanum Phil.

Subarbusto. Endémica. 1100-2600 m.
Países: CHL(COQ).

Galium palustre L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, RNE).

Galium parisiense L.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(RME).

Galium philippianum Dempster

Sin.: *Galium dasycarpon* Kunze ex Walp.
Subarbusto. Endémica. 1200-2200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Galium plumosum Rusby subsp.

flossdorfii (Hicken) Dempster
Sin.: *Galium flossdorfii* Hicken
Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).

Galium ramboi Dempster

Hierba. Endémica.
Países: BRA(SCA).

Galium richardianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. subsp. **haenkeanum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Dempster

Sin.: *Galium haenkeanum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp., *Rubia haenkeana* Gillies ex Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(MEN).

Galium richardianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. subsp.

pusillum (Gillies ex Hook. & Arn.) Dempster
Sin.: *Galium ciliatum* Ruiz & Pav. var. *pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Relbunium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken subsp. *pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Ehrend., *Rubia pusilla* Gillies ex Hook. & Arn.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

Galium richardianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp. subsp. **richardianum**

Sin.: *Galium chaetophorum* Griseb. var. *prostratum* Kuntze, *Galium chaetophorum* Griseb. var. *strictum* Kuntze, *Galium chaetophorum* Griseb., *Galium ciliatum* Ruiz & Pav. var. *pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Galium ciliatum* Ruiz & Pav. var. *richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Galium patagonicum* Kuntze, *Relbunium chaetophorum* (Griseb.) K. Schum., *Relbunium equinocarpum* Hassl. *Relbunium patagonicum* (Kuntze) K. Schum., *Relbunium pusillum* (Gillies ex Hook. & Arn.) K. Schum., *Relbunium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken subsp. *patagonicum* (Kuntze) Ehrend., *Relbunium richardianum*

(Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken, *Rubia richardiana* Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Endémica. 0-4000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, ÑEE). URY(COL, MON, SJO).

Galium rubidiflorum Dempster

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Galium saxatile L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(TDF).

Galium sellowianum (Cham.) Walp.

Sin.: *Relbunium selloanum* K. Schum., *Rubia sellowiana* Cham.

Hierba. Nativa. 1000-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Galium smithreitzii Dempster

Sin.: *Relbunium catarinense* Ehrend.

Hierba. Endémica. 1600 m.

Países: BRA(SCA).

Galium suffruticosum Hook. & Arn.

Sin.: *Galium andinum* Phil., *Galium chilense* Endl. ex Clos, hom. illeg., *Galium peteroanum* Phil., *Rubia margaritifera* Reiche

Subarbusto. Endémica. 0-2700 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Galium trichocarpum DC.

Sin.: *Galium chamissonis* Hook. & Arn., *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *trichocarpum* (DC.) Wedd. ex Hauman, *Galium lasiocarpum* Phil., *Galium scandens* Phil., *Galium laxum* Phil.

Hierba. Endémica. 400-2200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Galium tricorntutum Dandy

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(CHA). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(BIO).

Galium uruguayense Bacigalupo var.

echinulatus Bacigalupo

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). URY(MAL, TAC).

Galium uruguayense Bacigalupo var. **uruguayense**

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(LAV, MAL, TAC).

Galium verum L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(RNE).

Galium vile (Cham. & Schltdl.)

Dempster

Sin.: *Relbunium vile* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Relbunium vile* K. Schum. var. *tenuior* K. Schum., *Rubia vilis* Cham. & Schltdl.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SOR).

Galium werdermannii Standl.

Sin.: *Galium closianum* Briq., *Galium hypnoides* Clos

Hierba. Endémica. 1100 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Genipa L.

Genipa americana L.

Sin.: *Genipa americana* L. var. *caruto* (Kunth) K. Schum., *Genipa americana* L. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Genipa americana* L. f. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Genipa americana* L. f. *jorgensenii* Steyererm., *Genipa caruto* Kunth

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, PAI, PHA).

Geophila D. Don

Geophila macropoda (Ruiz & Pav.) DC.

Sin.: *Cephaelis violaefolia* Kunth, *Coccocypselum macropodum* (Ruiz & Pav.) Britton, *Geophila herbacea* (L.) K. Schum. var. *violaefolia* (Kunth) Chodat & Hassl., *Geophila violaefolia* (Kunth) DC., *Psychotria macropoda* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAN, CEN, PAI).

Geophila repens (L.) I.M. Johnst.

Sin.: *Carinta herbacea* (Jacq.) W. Wight, *Carinta repens* (L.) L.B. Sm. & Downs, *Geocardia herbacea* (Jacq.) Standl., *Geophila herbacea* (Jacq.) K. Schum., *Mapouria herbacea* (Jacq.) Müll. Arg. *Psychotria herbacea* Jacq., *Rondeletia repens* L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, ITA).

Guettarda L.

Guettarda pohliana Müll. Arg.

Sin.: *Matthiola pohliana* Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Guettarda uruguayensis Cham. & Schltdl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAN, CON).

Hamelia Jacq.

Hamelia patens Jacq.

Sin.: *Hamelia erecta* Jacq.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE).

Heterophyllaea Hook. f.

Heterophyllaea pustulata Hook. f.

Sin.: *Heterophyllaea lanceolata* Griseb.

Arbusto. Nativa. 1700-3000 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Hexasepalum Bartl. ex DC.

Hexasepalum apiculatum (Willd.)

P.G. Delprete & J.H. Kirkbr.

Sin.: *Diodella apiculata* (Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L. Cabral, comb. superfl. *Diodella apiculata* (Roem. & Schult.) P.G. Delprete, *Diodia apiculata* (Roem. & Schult.) K. Schum., *Diodia conferta* DC., *Diodia latiflora* DC., *Diodia rigida* (Roem. & Schult.) Cham. & Schltdl., *Diodia setigera* DC., *Spermacoce apiculata* Roem. & Schult.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU).

Hexasepalum radulum (Willd.) P.G.

Delprete & J.H. Kirkbr.

Sin.: *Diodia radula* (Roem. & Schult.) Cham. & Schltdl., *Diodella radula* (Roem. & Schult.) P.G. Delprete, *Spermacoce radula* Roem. & Schult.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hexasepalum teres (Walter) J.H.

Kirkbr.

Sin.: *Diodia teres* Walter, *Diodella teres* (Walter) Small, *Spermacoce diodina* Michx.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CON).

Hillia Jacq.**Hillia illustris** (Vell.) K. Schum.Sin.: *Saldanha illustris* Vell.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hillia parasitica Jacq.Sin.: *Cosmibuena acuminata* Ruiz & Pav., *Hillia brasiliensis* Cham. & Schltdl., *Hillia killippi* Standl., *Hillia maguire* Steyer., *Hillia parasitica* Jacq. var. *nobilis* (Vell.) Steyer., *Hillia weberbaueri* Standl., *Posoqueria montana* Mart., *Saldanha nobilis* Vell.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Hillia ulei K. Schum. ex Ule

Arbusto a subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Hindsia Benth. ex Lindl.**Hindsia longiflora** (Cham.) Benth.Sin.: *Rondeletia longiflora* Cham.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hindsia ramosissima GardnerSin.: *Hindsia breviflora* K. Schum.

Subarbusto. Endémica. 900-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Hoffmannia Sw.**Hoffmannia australis** Lillo

Arbusto. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Hoffmannia peckii K. Schum.Sin.: *Hoffmannia dusenii* Standl.,*Hoffmannia peckii* K. Schum. var. *selloana* K. Schum.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Ixora L.**Ixora gardneriana** Benth.Sin.: *Ixora heterodoxa* Müll. Arg.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ixora venulosa Benth.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

PRY(APA, CAA, CAN).

Leptostigma Arn.**Leptostigma arnottianum** Walp.Sin.: *Coprosma calycina* Gray, *Hedyotis repens* Clos, *Nertera arnottiana* (Walp.) B.L. Rob., *Oldenlandia uniflora* Ruiz & Pav. var. *repens* (Clos) Reiche, nom. illeg.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Machaonia Bonpl.**Machaonia acuminata** Humb. & Bonpl.Sin.: *Machaonia brasiliensis*(Hoffmanns. ex Humb.) Cham. & Schltdl. var. *vestita* Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APY, AMA, CEN, PHA).

Machaonia brasiliensis (Hoffmanns. ex Humb.) Cham. & Schltdl.Sin.: *Cinchona brasiliensis* Hoffmanns. ex Humb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, ITA, ÑEE, PHA).

Machaonia spinosa Cham. & Schltdl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CON, PAI, PHA).

Malanea Aubl.**Malanea evenosa** Müll. Arg.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Malanea forsteronioides Müll. Arg.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Manettia L.**Manettia chrysoderma** SpragueSin.: *Manettia cordifolia* Mart. var.*chrysoderma* (Sprague) I.C. Chung

Liana. Nativa. 400-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Manettia congestoides Wernham

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Manettia cordifolia Mart.Sin.: *Manettia boliviana* Wernham, *Manettia cordifolia* Mart. f. *boliviana* (Wernham) I.C. Chung, *Manettia cordifolia* Mart. f. *incana* (K. Schum.) I.C. Chung, *Manettia cordifolia* Mart. var. *filiformis* Wernham, *Manettia cordifolia* Mart. var. *glabra* (Cham. & Schltdl.) Standl., *Manettia cordifolia* Mart. var. *glabra* (Cham. & Schltdl.) Wernham, *Manettia glabra* Cham. & Schltdl., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum. var. *cordifolia* K. Schum., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum. var. *glabra* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum., *Manettia ignita* (Vell.) K. Schum. var. *incana* K. Schum., *Manettia leianthiflora* Griseb., *Manettia sublanata* Wernham

Liana. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, PAY, SAO).

Manettia glaziovii Wernham

Liana. Nativa. 500-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Manettia gracilis Cham. & Schltdl.Sin.: *Manettia burchellii* Wernham, *Manettia gracilis* Cham. & Schltdl. var. *glabra* Benth.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Manettia jorgensenii Standl.

Subarbusto. Endémica. 1500-2600 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth.Sin.: *Guagnebina luteo-rubra* Vell., *Manettia bradei* Standl., *Manettia*

filicaulis Wawra, *Manettia luteo-rubra* (Vell.) Benth. var. *paraguariensis* (Chodat) I.C. Chung, *Manettia paraguariensis* Chodat, *Manettia quinquenervia* Sprague, *Manettia samuelssoniana* Standl.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN).

Manettia paranensis Standl.

Sin.: *Manettia cordifolia* Mart. var. *paranensis* (Standl.) I.C. Chung

Liana. Endémica. 1000-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Manettia pubescens Cham. & Schltdl.

Sin.: *Manihot pubescens* Pohl var. *villosa* (Cham. & Schltdl.) K. Schum.

Liana. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Manettia rojasiana Chodat & Hassl.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA (PAR). PRY(AMA, CAA, CON, GUA, SPE).

Manettia tweediana K. Schum.

Sin.: *Manettia angustifolia* Wernham, *Manettia cordifolia* Mart. var. *hassleriana* (Chodat) I.C. Chung, *Manettia hassleriana* Chodat

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Manettia verticillata Wernham

Liana. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Mitracarpus Zucc. ex Schult. & Schult. f.

Mitracarpus bacigalupoe E.L.

Cabral, W.A. Medina & E.B. Souza

Subarbusto. Endémica. 200-400 m.

Países: PRY(CAU, CAN, SPE).

Mitracarpus brasiliensis M.L. Porto

& J.L. Waechter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Mitracarpus brevis K. Schum. & R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.

Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU).

Mitracarpus frigidus (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum.

Sin.: *Spermacoce frigida* Willd. ex Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(CAU, CAN).

Mitracarpus hasslerianus Chodat

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAU, CEN, COA, PAI).

Mitracarpus hirtus (L.) DC.

Sin.: *Mitracarpus villosus* (Sw.) DC., *Spermacoce hirta* L., *Spermacoce villosa* Sw.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, PAI). URY(PAY, RNO).

Mitracarpus megapotamicus

(Spreng.) Kuntze

Sin.: *Mitracarpium cuspidatum* DC., *Mitracarpium peladilla* Griseb., *Mitracarpus megapotamicus* (Spreng.) Standl., comb. superfl., *Mitracarpus sellowianum* Cham. & Schltdl., *Spermacoce megapotamica* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, GUA, MIE, PAI, PHA). URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).

Mitracarpus schininianus E.L.

Cabral, W.A. Medina & E.B. Souza

Subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Países: BRA (Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, SPE).

Nertera Banks & Sol. ex Graebn.

Nertera granadensis (Mutis ex L. f.)

Druce

Sin.: *Cunina sanfuentesii* Clos, *Gomozia granadensis* Mutis ex L.f., *Nertera depressa* Banks & Sol. ex Gaertn.

Hierba. Nativa. 500-3500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE).

Oldenlandia L.

Oldenlandia brachypetala (Phil.) E.L. Cabral & Bacigalupo

Sin.: *Hedyotis brachypetala* Phil., *Hedyotis minuta* Phil. ex Benth. & Hook., nom. nud.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(AIS).

Oldenlandia corymbosa L.

Sin.: *Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(SCA).

Oldenlandia dusenii Standl.

Sin.: *Hedyotis dusenii* (Standl.) L.B.

Sm. & Downs

Hierba. Endémica. 700-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC.

Sin.: *Hedyotis lancifolia* Schumach.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR).

Oldenlandia salzmännii (DC.) Benth. & Hook.

Sin.: *Anotis salzmännii* DC., *Hedyotis chiloensis* Phil., *Hedyotis inconspicua* F. Phil., *Hedyotis muscosa* A. St.-Hil., *Hedyotis perpusilla* Hook. & Arn., *Hedyotis pilosa* Poepp., *Hedyotis salzmännii* (DC.) Steud., *Hedyotis theesifolia* A. St.-Hil., *Hedyotis uniflora* DC., *Oldenlandia theesifolia* (A. St.-Hil.) K. Schum., *Oldenlandia uniflora* Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, ERI, MIS, NEU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LLA, JFE). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CLA, COL, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).

Oreopolus Schltdl.

Oreopolus glacialis (Poepp.) Ricardi

Sin.: *Cruckshanksia glacialis* Poepp., *Cruckshanksia patagonica* (Speg.) Macloskie, *Oreocaryon nivalis* Kuntze ex K. Schum., *Oreopolus citrinus* Schltdl., *Oreopolus glacialis* (Poepp.) Ricardi var. *pilosus* Ricardi, *Oreopolus patagonicus* Speg.

Hierba. Endémica. 300-3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Paederia L.

Paederia brasiliensis (Hook. f.) Puff

Sin.: *Lygodisodea brasiliensis* Hook. f., *Lygodisodea foetida* Ruiz & Pav.,

Manettia diffusa Britton, *Paederia diffusa* (Britton) Standl., *Paederia macropoda* Lillo, nom. nud., *Paederia olens* K. Schum., *Paederiopsis diffusa* (Britton) Rusby, *Poederiopsis diffusa* (Britton) Rusby
Enredadera. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(AMA).

Palicourea Aubl.

Palicourea australis C.M. Taylor
Arbusto. Endémica. 300-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Palicourea brevicollis (Müll. Arg.) C.M. Taylor
Sin.: *Psychotria brevicollis* Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 100-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS).
PRY(APA, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).

Palicourea crocea (Sw.) Roem. & Schult.
Sin.: *Palicourea platypodina* (Müll. Arg.) Standl., *Palicourea subulata* Huber, *Psychotria crocea* Sw., *Psychotria platypodina* Müll. Arg.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Palicourea croceoides Desv. ex Ham.
Arbusto a subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Palicourea jungiana C.M. Taylor
Sin.: *Psychotria longipes* Müll. Arg.
Arbolito o árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Palicourea macrobotrys (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.
Sin.: *Palicourea lasioneura* Krause, *Psychotria macrobotrys* Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAN).

Palicourea malaneoides (Müll. Arg.) C.M. Taylor
Sin.: *Psychotria malaneoides* Müll. Arg.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Palicourea marcgravii A. St.-Hil.
Sin.: *Psychotria marcgravii* (A. St.-Hil.) Spreng.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Palicourea rigida Kunth
Sin.: *Palicourea rigida* Kunth var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Psychotria noxia* A. St.-Hil.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Palicourea sessilis (Vell.) C.M. Taylor
Sin.: *Coffea sessilis* Vell., *Psychotria hancorniiifolia* Benth. var. *velutipes* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & Downs, *Psychotria vellosiana* Benth., *Psychotria velutipes* Müll. Arg., *Uragoga velutipes* (Müll. Arg.) Kuntze
Hierba, subarbusto o arbusto. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, PAI).

Pogonopus Klotzsch

Pogonopus tubulosus (A. Rich. ex DC.) K. Schum.
Sin.: *Calycophyllum tubulosum* DC., *Chrysoxylon febrifugum* Wedd., *Howardia febrifuga* (Wedd.) Wedd., *Macrocneum tubulosum* A. Rich. ex DC., *Pogonopus febrifugus* (Wedd.) Hook. f. var. *macrosema* Hutch., *Pogonopus febrifugus* (Wedd.) Hook. f.
Arbusto. Nativa. 500-2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
BRA(Fuera del área del proyecto).

Posoqueria Aubl.

Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult.
Sin.: *Solena latifolia* Rudge
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Posoqueria palustris Mart.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Psychotria L.

Psychotria anceps Kunth
Sin.: *Mapouria corymbifera* Müll. Arg., *Psychotria paracatuensis* Standl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, COA, PAI).

Psychotria argentinensis Bacigalupo
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Psychotria brachyceras Müll. Arg.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Psychotria brachypoda (Müll. Arg.) Britton
Sin.: *Mapouria brachypoda* Müll. Arg., *Palicourea brachypoda* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & Downs, *Psychotria brachypoda* (Müll. Arg.) Britton, *Psychotria umbellata* Vell.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Psychotria capillacea (Müll. Arg.) Standl.
Sin.: *Mapouria capillacea* Müll. Arg., *Psychotria paraguariensis* Chodat & Hassl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Psychotria capitata Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

Psychotria carthagenensis Jacq.
Sin.: *Mapouria catharinensis* Müll. Arg., *Psychotria foveolata* Ruiz & Pav.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(CLA, COL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TYT).

Psychotria deflexa DC.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(CAN).

Psychotria dusenii Standl.
Arbusto. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria fluminensis Vell.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Psychotria formosa Cham. & Schltdl.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Psychotria forsteronioides Müll. Arg.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria fractistipula L.B. Sm.,
R.M. Klein & P.G. Delprete
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(SCA).

Psychotria gracilentia Müll. Arg.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CAN).

Psychotria hastisepala Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria hoffmannseggiana
(Willd. ex Roem. & Schult.) Müll. Arg.
Sin.: *Cephaelis hoffmannseggiana*
Willd. ex Roem. & Schult., *Psychotria*
barbiflora DC.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CAN).

Psychotria laciniata Vell.
Sin.: *Psychotria kleinii* L.B. Sm. &
Downs, *Psychotria stenocalyx* Müll. Arg.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl.
Sin.: *Psychotria leiocarpa* Cham. &
Schltdl. var. *intermedia* Müll. Arg.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA,
GUA, PAI, SPE).

Psychotria lupulina Benth.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Psychotria mapourioides DC.
Arbolito o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria myriantha Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN).

Psychotria nemorosa Gardner
Sin.: *Psychotria pubigera* Schltdl.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria nitidula Cham. & Schltdl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS).
PRY(AMA, CAA, COA, PAI, SPE).

Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.)
Wawra
Sin.: *Cephaelis nuda* Cham. & Schltdl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Psychotria pubigera Schltdl.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria stachyoides Benth.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Psychotria suterella Müll. Arg.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Psychotria tenerior (Cham.) Müll. Arg.
Sin.: *Palicourea hassleriana* Chodat,
Patabea tenerior Cham., *Psychotria*
hassleriana (Chodat) Standl.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA,
CAN, CON, PAI).

Randia L.

Randia breviflora Judkevich & R.M.
Salas
Sin.: *Basanacantha spinosa* (Jacq.) K.
Schum. var. *macrocalyx* Chodat & Hassl.,
Basanacantha spinosa (Jacq.) K. Schum.
var. *parviflora* Chodat & Hassl.
Arbolito o árbol. Endémica. 100-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(CAN, CON).

Randia calycina Cham.
Sin.: *Basanacantha calycina* (Cham.) K.
Schum.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, FOR). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CON, PHA).

Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC.
Sin.: *Gardenia ferox* Cham. & Schltdl.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(ITA).

Randia micracantha (Lillo) Bacigalupo
Sin.: *Basanacantha micracantha* Lillo,
Basanacantha trispinosa Rojas Acosta,
nom. nud., *Randia micracantha* (Lillo)

Bacigalupo var. *glabra* Bacigalupo
Arbusto. Nativa. 600-2300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Richardia L.

Richardia brasiliensis Gomes
Sin.: *Richardia rosea* (A. St.-Hil.)
Schult., *Richardsonia brasiliensis* (B.A.
Gomes) Hayne, *Richardsonia brasiliensis*
(B.A. Gomes) Hayne var. *dubia* Beauverd
& Felipp., *Richardsonia rosea* A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE,
SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, BOQ, CAU, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).
URY(MON, ROC).

Richardia coldenioides Rusby
Sin.: *Richardsonia coldenioides* (Rusby)
Buchtien
Hierba. Nativa. 2700-4100 m.
Países: ARG(COR).

Richardia grandiflora (Cham. &
Schltdl.) Steud.
Sin.: *Richardia divergens* Pohl ex
DC., *Richardsonia grandiflora* Cham. &
Schltdl.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA,
CON, GUA, ITA, MIE, PAI).

Richardia humistrata (Cham. &
Schltdl.) Steud.
Sin.: *Richardsonia humistrata* Cham. &
Schltdl.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI).
BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS,
CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SAO,
SJO, SJO).

Richardia pedicellata (K. Schum.)
Kuntze
Sin.: *Richardsonia pedicellata* K. Schum.
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(GUA, SPE).

Richardia scabra L. var. **chacoensis**
E.L. Cabral & Bacigalupo
Subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: PRY(APY).

Richardia schumannii W.H. Lewis &
R.L. Oliv.
Hierba. Nativa. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Richardia stellaris (Cham. & Schltdl.) Steud.

Sin.: *Richardsonia astroites* K. Schum., *Richardsonia stellaris* Cham. & Schltdl., *Richardsonia stellaris* Cham. & Schltdl. f. *linearifolia* Chodat & Hassl., *Richardsonia stellaris* Cham. & Schltdl. f. *robusta* Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PAI). URY(CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, SAO).

Rosenbergiodendron Fagerl.

Rosenbergiodendron longiflorum

(Ruiz & Pav.) Fagerl.

Sin.: *Basanacantha macrocarpa* Rusby, *Gardenia longiflora* Ruiz & Pav., *Randia formosa* (Jacq.) K. Schum. var. *longiflora* (Ruiz & Pav.) K. Schum., *Randia ruiziana* DC., *Randia speciosa* DC., *Randia williamsii* Standl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR).

Rubia L.

Rubia tinctorum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MEN). CHL(RME).

Rudgea Salisb.

Rudgea coriacea (Spreng.) K. Schum.

Sin.: *Mussaenda coriacea* Spreng., *Rudgea villiflora* K. Schum. ex Standl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rudgea coronata (Vell.) Müll. Arg.

Sin.: *Psychotria coronata* Vell.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR).

Rudgea gardenioides (Cham.) Müll. Arg.

Sin.: *Coffea gardenioides* Cham.

Arbolito o árbol. Nativa. 1000-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rudgea jasminoides (Cham.) Müll.

Arg. subsp. **corniculata** (Benth.) Zappi

Sin.: *Rudgea corniculata* Benth.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rudgea jasminoides (Cham.) Müll.

Arg. subsp. **jasminoides**

Sin.: *Coffea jasminoides* Cham., *Coffea major* Cham., *Rudgea gaudichaudii* Müll. Arg., *Rudgea major* (Cham.) Müll. Arg., *Rudgea myrsinifolia* Benth.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, AMA, CAN, COA, PAI, SPE).

Rudgea nivosa (Linden ex Berk.) André

Sin.: *Psychotria nivosa* Linden ex Berk.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Rudgea parquiioides (Cham.) Müll.

Arg. subsp. **caprifolium** (Zahlbr.) Zappi

Sin.: *Gloneria jasminiflora* Linden & André ex André, *Rudgea caprifolium* Zahlbr.

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(SCA).

Rudgea parquiioides (Cham.) Müll.

Arg. subsp. **hirsutissima** Zappi

Arbusto. Nativa. 0-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Rudgea parquiioides (Cham.) Müll.

Arg. subsp. **parquiioides**

Sin.: *Coffea parquiioides* Cham., *Rudgea littoralis* L.B. Sm. & Downs, *Rudgea parquiioides* (Cham.) Müll. Arg. var. *longiflora* Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, ITA).

Rudgea recurva Müll. Arg.

Sin.: *Rudgea catharinae* Standl.

Arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Sabicea Aubl.

Sabicea villosa Roem. & Schult.

Arbusto. Nativa. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Schwendenera K. Schum.

Schwendenera tetrapyxis K. Schum.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Sherardia L.

Sherardia arvensis L.

Sin.: *Sherardia arvensis* L. f. *argentina* Hicken

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, NEU, RNE, TUC).

CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE). URY(CAS, MON).

Simira Aubl.

Simira corumbensis (Standl.)

Steyerm.

Sin.: *Sickingia corumbensis* Standl.

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Simira paraguayensis (Standl.)

Steyerm.

Sin.: *Sickingia paraguayensis* Standl.

Árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Simira sampaioana (Standl.) Steyerm.

Sin.: *Sickingia sampaioana* Standl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

PRY(APY).

Sipanea Aubl.

Sipanea hispida Benth. ex Wernham

Sin.: *Sipanea hispida* Benth. ex

Wernham var. *major* (Hassl.) Steyerm.,

Sipanea pratensis Aubl. var. *major* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del

proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Spermacoce L.

Spermacoce capitata Ruiz & Pav.

Sin.: *Borreria capitata* (Ruiz & Pav.)

DC., *Spermacoce elongata* Pohl

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(CAN).

Spermacoce eryngioides (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Sin.: *Borreria diffusa* DC., *Bigelovia*

eryngioides (Cham. & Schltdl.) Hook.

& Arn., *Borreria eryngioides* Cham. &

Schltdl. var. *eryngioides*

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ,

CAU, CEN, CHO, CON, GUA, MIE, ÑEE,

PAI, PHA). URY(FLA).

Spermacoce glabra Michx.

Sin.: *Diodia glabra* (Michx.) Pers., *Spermacoceodes glabrum* (Michx.) Kuntze, *Spermacoceodes glabrum* (Michx.) Kuntze var. *rectum* Bacigalupo Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, ÑEE, PAI, PHA). URY(FLA, ROC).

Spermacoce hassleri E.L. Cabral & J. Florentin

Sin.: *Borreria affinis* DC., *Borreria assurgens* (Ruiz & Pav.) Griseb., *Borreria assurgens* Hassl. var. *longisepala* Hassl., *Borreria chacoensis* Hassl. var. *glabrata* Hassl., *Borreria chacoensis* Hassl., *Borreria eryngioides* Cham. & Schltdl. var. *affinis* (DC.) K. Schum., *Borreria eryngioides* Cham. & Schltdl. var. *latifolia* Hassl., *Borreria parviflora* G. Mey. var. *scabra* Griseb.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CEN, GUA, PHA). URY(MAL).

Spermacoce latifolia Aubl.

Sin.: *Borreria fockeana* Miq., *Borreria latifolia* (Aubl.) K. Schum. f. *fockeana* (Miq.) Steyererm., *Borreria latifolia* (Aubl.) K. Schum., *Borreria latifolia* (Aubl.) K. Schum. f. *scabrida* (DC.) Steyererm., *Borreria latifolia* (Aubl.) K. Schum. f. *sideritis* (Cham. & Schltdl.) K. Schum., *Borreria platyphylla* DC., *Borreria scabrida* DC., *Borreria sideritis* Cham. & Schltdl.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Spermacoce multiflora (DC.) P.G.

Delprete
Sin.: *Borreria multiflora* (DC.) Bacigalupo & E.L. Cabral, *Diodia multiflora* DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Spermacoce ostenii (Standl.) E.L.

Cabral & J. Florentin
Sin.: *Borreria eryngioides* Cham. & Schltdl. var. *ostenii* (Standl.) E.L. Cabral & Bacigalupo, *Borreria ostenii* Standl.
Hierba o subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).

Spermacoce prostrata Aubl.

Sin.: *Borreria ocymoides* (Burm. f.) DC. f. *tenuis* Chodat & Hassl., *Borreria ocymoides* (Burm. f.) DC. var. *minima* Chodat & Hassl., *Borreria ovalifolia* M. Martens & Galeotti, *Borreria parviflora* G. Mey., *Borreria prostrata* (Aubl.) Miq., *Spermacoce ocymoides* Burm. f., *Spermacoce ovalifolia* (M. Martens & Galeotti) Hemsl., *Spermacoce parviflora* (G. Mey.) A. Gray

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, BOQ, CAU, CAN, CHO, CON, COA, MIE, PAI, PHA). URY(RNO).

Spermacoce riparia Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Spermacoce tenuior L.

Sin.: *Spermacoce confusa* Rendle ex Gillis., *Spermacoce remota* Rendle, hom. illeg., *Spermacoceodes tenuior* (L.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(SCA).

Spermacoce verticillata L.

Sin.: *Borreria verticillata* (L.) G. Mey.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, COA, ÑEE). URY(ART, CLA, COL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).

Spermacoce viridiflora (Chodat & Hassl.) Govaerts

Sin.: *Borreria viridiflora* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CON, PAI).

Sphinctanthus Benth.**Sphinctanthus hasslerianus** Chodat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY, CON).

Staelia Cham. & Schltdl.**Staelia juarezii** E.L. Cabral & Salas

Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(FOR).

Staelia nelidiae Salas & E.L. Cabral

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Staelia thymoides Cham. & Schltdl.

Sin.: *Staelia filifolia* Chodat & Hassl., nom. illeg., *Staelia hassleri* Standl.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, COA, PAI). URY(ART).

Staelia virgata (Link ex Roem. & Schult.) K. Schum. var. **correntina** E.L. Cabral & Salas

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(COS).

Staelia virgata (Link ex Roem. & Schult.) K. Schum. var. **virgata**

Sin.: *Borreria finitima* S. Moore, *Mitracarpus virgatus* (Link ex Roem. & Schult.) Cham. & Schltdl., *Spermacoce virgata* Link ex Roem. & Schult., *Staelia caespitosa* Griseb.

Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Tocoyena Aubl.**Tocoyena formosa** (Cham. & Schltdl.) K. Schum.

Sin.: *Gardenia formosa* Cham. & Schltdl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K. Schum.

Sin.: *Gardenia sellowiana* Cham. & Schltdl.
Árbol. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

RUPPIACEAE

Ruppia L.**Ruppia cirrhosa** (Petagna) Grande

Sin.: *Buccaferrea cirrhosa* Petagna, *Ruppia maritima* L. subsp. *spiralis* (L. ex Dumort.) Syme, *Ruppia spiralis* L. ex Dumort.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, LPA, SLU).

Ruppia filifolia (Phil.) Skottsdb.

Sin.: *Potamogeton filifolius* Phil., *Ruppia andina* Phil., *Ruppia obtusa* Hagstr., *Ruppia obtusa* Hagstr. var. *repens* Hagstr.

Hierba acuática. Nativa. 0-4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, NEU, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, MAG).

Ruppia maritima L. var. **longipes** Hagstr.

Sin.: *Ruppia maritima* L. f. *aculeata* Hagstr., *Ruppia maritima* L. f. *pectinata* (Rydb.) Hagstr., *Ruppia pectinata* Rydb.
Hierba acuática. Nativa.
Países: ARG(COR).

Ruppia maritima L. var. **maritima**

Sin.: *Ruppia maritima* L. var. *rostrata* C. Agardh, *Ruppia maritima* L. subsp. *rostellata* (Koch ex Rchb.) Asch. & Graebn., *Ruppia rostellata* Koch ex Rchb.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SDE, SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, ARA). PRY(APY).

RUTACEAE

Almeidea A. St.-Hil.**Almeidea rubra** A. St.-Hil.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Balfourodendron Corr. Méllo ex Oliv.**Balfourodendron riedelianum** (Engl.) Engl.

Sin.: *Balfourodendron eburneum* Corr. Méllo ex Oliv., *Esenbeckia riedelianum* Engl., *Helietta multiflora* Engl.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, ITA, PAI, SPE).

Citrus L.**Citrus aurantium** L.

Árbol. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, PAI).

Citrus reticulata Blanco.

Árbol. Introducida.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Conchocarpus J.C. Mikan**Conchocarpus gaudichaudianus** (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani

Sin.: *Galipea gaudichaudiana* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Conchocarpus pentandrus (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani

Sin.: *Galilea pentandra* A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Esenbeckia Kunth**Esenbeckia densiflora** (Chodat & Hassl.) Hassl.

Sin.: *Esenbeckia febrifuga* (A. St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. var. *densiflora* Chodat & Hassl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(SCA). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI).

Esenbeckia febrifuga (A. St.-Hil.) A. Juss. ex Mart.

Sin.: *Esenbeckia febrifuga* (A. St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. var. *fruticosa* Hassl., *Esenbeckia gracilis* (K. Schum.) R.S. Cowan, *Evodia febrifuga* A. St.-Hil., *Metrodorea gracilis* K. Schum.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Esenbeckia grandiflora Mart.

Sin.: *Esenbeckia grandiflora* Mart. var. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Polembrum jussieui* Schott
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, COA, PAI).

Esenbeckia hieronymi Engl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Esenbeckia leiocarpa Engl.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Helietta Tul.**Helietta apiculata** Benth.

Sin.: *Esenbeckia cuspidata* Engl., *Helietta cuspidata* (Engl.) Chodat, *Helietta cuspidata* Engl. f. *gracilis* Chodat & Hassl., *Helietta cuspidata* Engl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Helietta cuspidata* Engl. f. *subobtusa* Chodat & Hassl., *Helietta longifoliata* Britton
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Helietta puberula R.E. Fr.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY).

Metrodorea A. St.-Hil.**Metrodorea nigra** A. St.-Hil.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Pilocarpus Vahl**Pilocarpus pauciflorus** A. St.-Hil.

Sin.: *Pilocarpus breviracemosus* R.S. Cowan
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pilocarpus pennatifolius Lem.

Sin.: *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *brasiliensis* Hassl., nom. illeg., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *gracilis* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *intermedius* Hassl., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *latifoliolatus* Hassl., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *paraguariensis* Hassl., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. var. *genuinus* Hassl., nom. inval., *Pilocarpus pennatifolius* Lem. var. *selloanus* (Engl.) Hassl., *Pilocarpus selloanus* Engl. f. *brevipedicellata* Chodat & Hassl., *Pilocarpus selloanus* Engl. var. *gracilis* Chodat & Hassl., *Pilocarpus selloanus* Engl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Pilocarpus spicatus A. St.-Hil.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Pitavia Molina**Pitavia punctata** (Ruiz & Pav.) MolinaSin.: *Galvezia punctata* Ruiz & Pav.

Árbol. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Poncirus Raf.**Poncirus trifoliata** (L.) Raf.Sin.: *Citrus trifoliata* L.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, ERI).

Raulinoa R.S. Cowan**Raulinoa echinata** R.S. Cowan

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(SCA).

Ruta L.**Ruta chalepensis** L.

Arbusto. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME, JFE).

Zanthoxylum L.**Zanthoxylum armatum** DC.

Arbusto. Introducida. 700 m.

Países: ARG(COR).

Zanthoxylum caribaeum Lam. subsp.**rugosum** (A. St.-Hil. & Tul.) ReynelSin.: *Fagara caribaea* (Lam.) Krug& Urb., *Fagara chiloperone* (Mart. exEngl.) Engl. var. *angustifolia* (Engl.)Engl. ex Chodat & Hassl., *Zanthoxylum**caribaeum* Lam., *Zanthoxylum chiloperone*Mart. ex Engl. var. *angustifolium* Engl.,*Zanthoxylum chiloperone* Mart. ex Engl.,*Zanthoxylum rugosum* A. St.-Hil. & Tul.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA,

ITA, PAI, SPE).

Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & Arn.Sin.: *Fagara coco* (Gillies ex Hook. f.& Arn.) Engl., *Zanthoxylum stipitatum*

Engl.

Árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ,

LRI, SAL, SLU, TUC). PRY(PAI).

Zanthoxylum externum (Skotts.)

Stuessy

Sin.: *Fagara externa* Skotts.

Árbol. Endémica.

Países: CHL(JFE).

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. subsp.**culantrilo** (Kunth) ReynelSin.: *Zanthoxylum culantrilo* Kunth

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ,

MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA,

CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. subsp.**fagara**Sin.: *Fagara hyemalis* (A. St.-Hil.) Engl.,*Fagara nigrescens* R.E. Fr., *Fagara pterota*L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Fagara**pterota* L., *Schinus fagara* L., *Zanthoxylum**hyemale* A. St.-Hil., *Zanthoxylum pterota*(L.) Kunth var. *guaraniticum* (Chodat& Hassl.) P.G. Waterman, *Zanthoxylum**pterota* (L.) Kunth

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI,

FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU,

CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA,

MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART,

CLA, COL, LAV, MAL, RNO, RIV, ROC,

SJO, SOR, TAC, TYT).

Zanthoxylum kleinii (R.S. Cowan)

P.G. Waterman

Sin.: *Fagara kleinii* R.S. Cowan

Arbusto o árbol. Nativa. 100-1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Zanthoxylum mayu Bertero ex CollaSin.: *Fagara mayu* (Bertero ex Colla) Engl.

Árbol. Endémica.

Países: CHL(JFE).

Zanthoxylum monogynum A. St.-Hil.Sin.: *Zanthoxylum arenarium* Engl.,*Fagara monogyna* (A. St.-Hil.) Engl.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Zanthoxylum petiolare A. St.-Hil. & Tul.Sin.: *Fagara hieronymi* Engl., *Fagara**naranjillo* (Griseb.) Engl. var. *angustifolia*Lillo, *Fagara naranjillo* (Griseb.) Engl.var. *paraguariensis* (Chodat & Hassl.)Escal., *Fagara naranjillo* (Griseb.)Engl., *Fagara niederleinii* Engl., *Fagara**paraguariensis* Chodat & Hassl. f.*angustifolia* Chodat & Hassl., *Fagara**paraguariensis* Chodat & Hassl. f.*fruticosa* Chodat & Hassl., *Fagara**paraguariensis* Chodat & Hassl. f.*latifolia* Chodat & Hassl., *Fagara**paraguariensis* Chodat & Hassl., *Fagara**rhoifolia* (Lam.) Engl. var. *niederleinii*(Engl.) Nájera, *Zanthoxylum naranjillo*Griseb. var. *angustifolium* (Lillo) P.G.Waterman, *Zanthoxylum naranjillo*Griseb., *Zanthoxylum paraguariensis*

(Chodat & Hassl.) Standl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU,

CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA,

MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Zanthoxylum rhoifolium Lam.Sin.: *Fagara astrigera* R.S. Cowan,*Fagara coco* (Gillies) Engl. var. *formosana*Lillo, *Fagara regnelliana* (Engl.) Chodat& Hassl. var. *calvata* Chodat & Hassl.,*Fagara regnelliana* (Engl.) Chodat &Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. f.*angustifolia* Chodat & Hassl., *Fagara**rhoifolia* (Lam.) Engl. f. *intermedia*Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.)Engl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Fagara**rhoifolia* (Lam.) Engl. f. *paucijuga* Chodat& Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl.var. *intermedia* R.S. Cowan & L.B.Sm., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. var.*peltophora* (Turcz.) Chodat & Hassl.,*Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl. var.*petiolulata* (Engl.) Engl., *Fagara rhoifolia*(Lam.) Engl. var. *subparanaensis* Nájera,*Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl., *Fagara**sorbifolia* (A. St.-Hil.) Engl., *Pohlana**langsдорffii* Nees & Mart., *Zanthoxylum**acutifolium* Engl. var. *petiolulatum* Engl.,*Zanthoxylum astrigerum* (R.S. Cowan)P.G. Waterman, *Zanthoxylum langsdorffii*(Nees & Mart.) A. St.-Hil., *Zanthoxylum**obscurum* Engl., *Zanthoxylum**peltophorum* Turcz., *Zanthoxylum**regnellianum* Engl., *Zanthoxylum**rhoifolium* Lam. var. *formosanum* (Lillo)P.G. Waterman, *Zanthoxylum rhoifolium*Lam. var. *peltophorum* (Turcz.) Engl.,

Zanthoxylum rhoifolium Lam. var. *petiolulatum* Engl., *Zanthoxylum rhoifolium* Lam. var. *subparanaensis* (Nájera) P.G. Waterman, *Zanthoxylum sorbifolium* A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CAS, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, ROC, SJO, TAC).

Zanthoxylum riedelianum Engl.

Sin.: *Fagara cuyabensis* (Engl.) Engl., *Fagara riedeliana* (Engl.) Engl., *Fagara riedeliana* (Engl.) Engl. var. *pubescens* Chodat & Hassl., *Zanthoxylum cuiabense* Engl.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).

Zanthoxylum rigidum Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **hasslerianum** (Chodat) Reynel

Sin.: *Fagara hassleriana* Chodat var. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Fagara hassleriana* Chodat, *Zanthoxylum hasslerianum* (Chodat) Pirani

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Zanthoxylum tingoassuiba A. St.-Hil.

Sin.: *Fagara tingoassuiba* (A. St.-Hil.) Hoehne

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

SABIACEAE

Meliosma Blume

Meliosma sellowii Urb.

Sin.: *Meliosma sinuata* Urb.

Árbol. Nativa. 300-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

SALICACEAE

Abatia Ruiz & Pav.

Abatia angeliana M.H. Alford

Sin.: *Aphaerema spicata* Miers

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Abatia stellata Lillo

Arbusto. Nativa. 1300-2300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Azara Ruiz & Pav.

Azara alpina Poepp. & Endl.

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(NEU). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA).

Azara celastrina D. Don

Sin.: *Azara sparsiflora* Steud., nom.

nud., *Azara lilen* Bertero, nom. nud.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Azara dentata Ruiz & Pav.

Sin.: *Azara tomentosa* Bertero ex

Steud., *Azara celastrina* D. Don var.

tomentosa (Steud.) Reiche.

Arbolito. Endémica. 500-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Azara integrifolia Ruiz & Pav.

Sin.: *Azara berteroniana* Steud.,

Azara browneae F. Phil., *Azara hirtella*

Miq., *Azara integrifolia* Ruiz & Pav.

var. *browneae* (F. Phil.) Reiche, *Azara*

integrifolia Ruiz & Pav. var. *pycnophylla*

(Phil.) Reiche, *Azara intermedia*

Gay, *Azara lechleriana* Steud., *Azara*

pycnophylla Phil.

Arbusto. Endémica. 200-2000 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Azara lanceolata Hook. f.

Sin.: *Azara brumalis* Gand., *Azara*

chiloensis Hook. f., *Azara lanceolata*

Hook. f. var. *chiloensis* (Hook. f.) Reiche,

Azara serrata Ruiz & Pav. var. *chiloensis*

(Hook. f.) Reiche

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Azara microphylla Hook. f.

Sin.: *Azara borealis* F. Phil., *Azara*

valdiviae Lechl. ex Steud., *Myrtohyllum*

chilense Turcz.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Azara petiolaris (D. Don) I.M. Johnst.

Sin.: *Azara gilliesii* Hook. & Arn.,

Quillaja petiolaris D. Don

Árbol. Endémica. 600-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Azara salicifolia Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 1500-2000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE).

Azara serrata Ruiz & Pav. var.

fernandeziana (Gay) Reiche

Sin.: *Azara fernandeziana* Gay

Arbusto o arbolito. Endémica. 300-400 m.

Países: CHL(JFE).

Azara serrata Ruiz & Pav. var. **serrata**

Sin.: *Azara dubia* Steud., *Azara bergii*

F. Phil., *Azara subandina* Phil., *Azara*

umbellata Phil.

Arbusto o arbolito. Endémica. 200-

2000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,

BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Azara uruguayensis (Speg.) Sleumer

Sin.: *Arechavaletaia uruguayensis* Speg.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

URY(ART, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL,

PAY, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).

Banara Aubl.

Banara arguta Briq.

Sin.: *Banara guianensis* Aubl. var.

argentina Lillo.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE).

BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY,

AMA, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

Banara parviflora (A. Gray) Benth.

Sin.: *Kuhlia parviflora* A. Gray.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Banara tomentosa Clos

Sin.: *Banara bernandinensis* Briq.,

Banara flavovirens Briq., *Banara hassleri*

Briq., *Banara macrophylla* Briq.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,

CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA,

ITA, MIE, PAI, SPE). URY(CLA, RIV).

Banara umbraticola Arechav.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR,

SFE). URY(ART, TAC).

Casearia Jacq.**Casearia aculeata** Jacq.

Sin.: *Casearia boliviana* Briq., *Casearia hassleri* Briq.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR).
BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON, SPE).

Casearia arborea (Rich.) Urb.

Sin.: *Samyda arborea* Rich.
Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Casearia catharinensis Sleumer

Arbolito o árbol. Endémica. 300-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Casearia decandra Jacq.

Sin.: *Casearia floribunda* Briq., *Casearia parvifolia* Willd. var. *paraguariensis* Briq., *Casearia parvifolia* Willd., nom. illeg., *Casearia reflexa* Sleumer

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CLA, RIV).

Casearia gossypiosperma Briq.

Sin.: *Gossypiospermum paraguariense* Rehder

Árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR).
PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI). URY(SAO).

Casearia lasiophylla Eichler

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Casearia mariquitensis Kunth

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR).

Casearia obliqua Spreng.

Sin.: *Casearia inaequilatera* Cambess.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Casearia paranaensis Sleumer

Árbol. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).

Casearia pauciflora Cambess.

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Casearia sylvestris Sw. var. **lingua**

(Cambess.) Eichler
Sin.: *Casearia lingua* Cambess.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(ERI). BRA(PAR).

Casearia sylvestris Sw. var. **sylvestris**

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, CLA, PAY, RIV, ROC, SAO, TYT).

Laetia L.**Laetia americana** L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON, PHA).

Populus L.**Populus alba** L.

Árbol. Introducida. 500-1000 m.
Países: ARG(RNE, SFE).

Populus deltoides W. Bartram ex Marshall

Sin.: *Populus angulata* Aiton
Árbol. Introducida. 400-1300 m.
Países: ARG(COR).

Populus nigra L.

Árbol. Introducida.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO).

Prockia P. Browne ex L.**Prockia crucis** P. Browne ex L.

Sin.: *Prockia crucis* P. Browne ex L. var. *septemnervia* (Spreng.) Sleumer, *Prockia glabra* Briq., *Prockia grandiflora* Herzog, *Prockia hassleri* Briq., *Prockia septemnervia* Spreng.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

Salix L., nom. cons.**Salix alba** L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, MEN). CHL(BIO).

Salix babylonica L.

Árbol. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, MEN). CHL(COQ, BIO, ARA, RME, JFE).

Salix caprea L.

Arbusto. Introducida. 1000-1500 m.
Países: ARG(RNE). CHL(BIO).

Salix fragilis L.

Árbol. Introducida. 0-900 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE). URY(CAS).

Salix humboldtiana Willd. var. **humboldtiana**

Sin.: *Salix chilensis* Molina var. *crispa* Stuck. ex Seckt, *Salix magellanica* Lam.

Árbol. Nativa. 0-3900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, NEU, RNE, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME). PRY(CEN, ÑEE, PAI, SPE). URY(CAS, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Salix humboldtiana Willd. var. **martiana** (Leyb.) Andersson

Sin.: *Salix martiana* Leyb.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(COS, FOR). BRA(PAR, SCA). PRY(CEN, COA, PAI). URY(Desconocida).

Salix viminalis L.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(LBO, BIO, ARA, LRI, AIS, MAG, RME).

Xylosma G. Forst., nom. cons.**Xylosma ciliatifolia** (Clos) Eichler

Sin.: *Hisingera ciliatifolia* Clos, *Myroxylon ciliatifolium* (Clos) Kuntze, *Xylosma pou-orfilae* Herter, nom. nud.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA).

Xylosma glaberrima Sleumer

Sin.: *Hisingera salzmännii* Clos, p.p.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Xylosma longipetiolata Legname

Árbol. Nativa. 1500-1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Xylosma prockia (Turcz.) Turcz.

Sin.: *Hisingera lucens* Clos, *Hisingera prockia* Turcz., *Hisingera salzmännii* Clos, p.p., *Myroxylon salzmännii* (Clos) Kuntze, *Xylosma salzmännii* (Clos) Eichler, p.p.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). URY(CLA).

Xylosma pubescens Griseb.
Sin.: *Myroxylon pubescens* (Griseb.)
Warb., hom. illeg.
Arbusto o árbol. Nativa. 400-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).

Xylosma schroederi Sleumer ex
Herter
Sin.: *Xylosma herteri* Sleumer ex Herter
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: URY(ART, CLA, RIV, SJO, TAC,
TYT).

Xylosma tweediana (Clos) Eichler
Sin.: *Hisingera tweediana* Clos,
Myroxylon grayi Warb., *Myroxylon
tweedianum* (Clos) Kuntze, *Myroxylon
warburgii* Briq., *Xylosma grayi* (Warb.)
Gilg, *Xylosma sleumeri* Herter, nom.
nud., *Xylosma venosa* N.E. Br. var.
populneum Sleumer ex Lombardo,
Xylosma warburgii (Briq.) Briq.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS).
BRA(RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA,
COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON,
PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR,
TAC, TYT).

Xylosma venosa N.E. Br.
Sin.: *Xylosma balansae* Briq., *Xylosma
paraguayensis* Briq.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY,
APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA,
SPE). URY(ART, CLA, DUR, RIV, TYT).

SANTALACEAE

Myoschilos Ruiz & Pav.

Myoschilos oblongum Ruiz & Pav.
Sin.: *Myoschilos angusta* Phil.,
Myoschilos oblongum Ruiz & Pav. var.
angusta (Phil.) Macloskie
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

SAPINDACEAE

Allophylus L.

Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss.
& Cambess.) Hieron. ex Niederl.
Sin.: *Allophylus edulis* (A. St.-Hil., A.
Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl.
var. *gracilis* Radlk., *Allophylus edulis* (A.
St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex
Niederl. var. *rosae* F.A. Barkley & Villa,
Allophylus pauciflorus Radlk. var. *rojasii*
F.A. Barkley & Villa, *Schmidelia edulis* A.
St.-Hil., A. Juss. & Cambess., *Urvillea
seriana* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS,
ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY,
APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN,
CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).
URY(DUR, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC,
SAO, TAC, TYT).

Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.)
Radlk.

Sin.: *Allophylus guaraniticus* (A. St.-
Hil.) Radlk. var. *pilosus* F.A. Barkley &
Villa, *Schmidelia guaranítica* A. St.-Hil.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
CAA, CAN, CEN, GUA, ITA). URY(ART,
RIV, ROC).

Allophylus pauciflorus Radlk.

Sin.: *Allophylus pauciflorus* Radlk. var.
lilloi F.A. Barkley & Villa, *Allophylus
pauciflorus* Radlk. var. *schreiteri* F.A.
Barkley & Villa
Arbusto o arbolito. Nativa. 500-1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR). PRY(CON).

Allophylus petiolulatus Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Allophylus puberulus (Cambess.)
Radlk.

Sin.: *Schmidelia puberula* Cambess.
Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR).

Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk.

Sin.: *Schmidelia semidentata* Miq.
Árbol. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Athyana (Griseb.) Radlk.

Athyana weinmanniifolia (Griseb.)
Radlk.

Sin.: *Athyana weinmanniifolia*
(Griseb.) Radlk. f. *membranacea* Radlk.,
Athyana weinmanniifolia (Griseb.)
Radlk. f. *tomentella* Radlk., *Thouinia
weinmannifolia* Griseb.
Árbol. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, CON).

Averrhoidium Baill.

Averrhoidium paraguayense Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CON).

Bridgesia Bertero ex Cambess.

Bridgesia incisifolia Bertero ex
Cambess.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Cardiospermum L.

Cardiospermum corindum L. var.
corindum

Sin.: *Cardiospermum corindum* L.
f. *angustisectum* (Griseb.) Radlk.,
Cardiospermum corindum L. f. *elongatum*
Radlk., *Cardiospermum corindum* L. f.
loxense (Kunth) Radlk., *Cardiospermum
corindum* L. f. *subglabratum* Radlk.,
Cardiospermum corindum L. f. *villosum*
Radlk., *Cardiospermum corindum* L.
var. *angustisectum* (Griseb.) F.A.
Barkley, *Cardiospermum corindum* L.
var. *elongatum* (Radlk.) F.A. Barkley,
Cardiospermum corindum L. var. *loxense*
(Kunth) F.A. Barkley, *Cardiospermum
corindum* L. var. *subglabratum* (Radlk.)
F.A. Barkley, *Cardiospermum halicacabum*
L. var. *angustisectum* Griseb.

Liana. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR,
JUJ, SAL, SDE, SLU, TUC). BRA(Fuera
del área del proyecto). PRY(APY, PHA).

Cardiospermum corindum L. var.

parviflorum (Cambess.) Ferrucci
Sin.: *Cardiospermum parviflorum* Cambess.
Enredadera. Nativa. 0-400 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APY).

Cardiospermum grandiflorum Sw.

Sin.: *Cardiospermum duarteanum*
Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI,
FOR, MIS, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN,
CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI,
PHA, SPE). URY(CAS, COL, SOR).

Cardiospermum halicacabum L. var. **halicacabum**

Liana. Cosmopolita. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,
SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APY, PHA). URY(CAS,
CLA, SJO, SOR).

Cardiospermum halicacabum L. var. **microcarpum** (Kunth) Blume

Sin.: *Cardiospermum microcarpum*
Kunth
Liana. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,
SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
URY(ART, CLA, SAO, SOR).

Cupania L.**Cupania oblongifolia** Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cupania tenuivalvis Radlk.

Arbolito. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cupania vernalis Cambess.

Sin.: *Cupania uraguensis* Hook. & Arn.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI,
FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,
CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE,
PAI, SPE). URY(ART, CLA, PAY, RNO,
RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).

Diatenopteryx Radlk.**Diatenopteryx sorbifolia** Radlk.

Sin.: *Thouinia ornifolia* Griseb.
Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA,
CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Dilodendron Radlk.**Dilodendron bipinnatum** Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

Diplokeleba N.E. Br.**Diplokeleba floribunda** N.E. Br.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SFE). BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA,
ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Dodonaea Mill.**Dodonaea viscosa** Jacq.

Sin.: *Dodonaea arborea* Herter,
Dodonaea burmanniana DC., *Dodonaea*
jamaicensis DC., *Dodonaea viscosa* Jacq.
f. *burmanniana* (DC.) Radlk., *Dodonaea*
viscosa Jacq. subsp. *angustifolia* (L. f.)
J.G. West, *Dodonaea viscosa* Jacq. subsp.
burmanniana (DC.) J.G. West, *Dodonaea*
viscosa Jacq. var. *angustifolia* (L. f.)
Benth.

Arbusto o arbolito. Cosmopolita.
0-2800 m.

Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, SAL, SFE,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(COQ,
IPA). URY(CAS, LAV, MAL, MON, PAY,
ROC, SJO, TYT).

Guindilia Gillies ex Hook. & Arn.**Guindilia cristata** (Radlk.) Hunz.

Sin.: *Valenzuelia cristata* Radlk.,
Valenzuelia cristata Radlk. var. *irregularis*
Burkart
Arbusto. Endémica. 1200-2200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Guindilia dissecta (Covas & Burkart) Hunz.

Sin.: *Valenzuelia dissecta* Covas &
Burkart
Arbusto. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(MEN).

Guindilia trinervis Gillies ex Hook. & Arn.

Sin.: *Valenzuelia trinervis* Bertero ex
Cambess.
Arbusto. Endémica. 200-3000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL,
LBO, MAU, RME).

Houssayanthus Hunz.**Houssayanthus incanus** (Radlk.)

Ferrucci
Sin.: *Houssayanthus fiebrigii* (F.A.
Barkley) Hunz., *Serjania humifusa*
Radlk., *Serjania incana* Radlk., *Serjania*
incana Radlk. f. *glabriuscula* Radlk.,
Urvillea fiebrigii F.A. Barkley
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE).
PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).

Houssayanthus monogynus (Schltdl.)

Ferrucci
Sin.: *Houssayanthus sparrei* (F.A.
Barkley) Ferrucci, *Serjania monogyna*
Schltdl., *Urvillea sparrei* F.A. Barkley
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(FOR). BRA(Fuera del área
del proyecto). PRY(CEN, MIE, ÑEE, PAI).

Llagunoa Ruiz & Pav.**Llagunoa glandulosa** (Hook. & Arn.)

G. Don
Sin.: *Amirola glandulosa* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, RME).

Magonia A. St.-Hil.**Magonia pubescens** A. St.-Hil.

Sin.: *Magonia glabrata* A. St.-Hil.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY, AMA, CON).

Matayba Aubl.**Matayba cristae** Reitz

Arbusto o árbol. Endémica. 800-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Matayba elaeagnoides Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA,
CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI,
SPE). URY(ART, RIV).

Matayba guianensis Aubl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Matayba intermedia Radlk.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Matayba juglandifolia (Cambess.)

Radlk.

Sin.: *Sapindus juglandifolius* Cambess.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Matayba marginata Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 700-900 m.
Países: BRA(PAR).

Matayba obovata R. Coelho, V.C.

Souza & Ferrucci

Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Melicoccus P. Browne**Melicoccus lepidopetalus** Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Paullinia L.**Paullinia carpopodea** Cambess.Sin.: *Paullinia affinis* Cambess.,*Paullinia multiflora* Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Paullinia cristata Radlk.

Liana. Nativa. 100-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paullinia elegans Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, SAO, SOR).

Paullinia meliifolia Juss.Sin.: *Paullinia meliifolia* Juss. f.

subglabra Radlk., *Paullinia sericea* Cambess.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, ITA).

Paullinia pinnata L.Sin.: *Paullinia angusta* N.E. Br.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CAN, CEN, CON, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Paullinia revoluta Radlk.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Paullinia rhomboidea Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Paullinia seminuda Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Paullinia spicata Benth.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

Paullinia trigonia Vell.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Paullinia uloptera Radlk.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Sapindus L.**Sapindus saponaria** L.Sin.: *Sapindus divaricatus* Cambess.,*Sapindus inaequalis* DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR).

CHL(AYP, IPA). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).

Serjania Mill.**Serjania acoma** Radlk.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Serjania ampelopsis Planch. & LindenSin.: *Serjania areolata* Radlk.

Liana. Nativa. 400-1500 m.

Países: ARG(SAL).

Serjania caracasana (Jacq.) Willd.Sin.: *Paullinia caracasana* Jacq.,*Serjania caracasana* (Jacq.) Willd. f.

nitidula Radlk., *Serjania caracasana* (Jacq.) Willd. f. *puberula* Radlk., *Serjania platyptera* (Radlk.) F.A. Barkley

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,

MIS, SAL, SFE). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CEN, CHO, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Serjania cissoides Radlk.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Serjania clematidifolia Cambess.

Liana. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Serjania communis Cambess. var.**communis**Sin.: *Serjania communis* Cambess.

var. *mollis* Radlk., *Serjania communis* Cambess. var. *pilosula* Radlk., *Serjania hirsuta* Cambess., *Serjania stenopterygia* Radlk.

Liana. Nativa. 0-1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Serjania communis Cambess. var.**glabra** Radlk.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Serjania confertiflora Radlk. f.**subincana** Radlk.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). PRY(APY, CON).

Serjania cuspidata Cambess.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Serjania decemstriata Radlk.

Enredadera. Endémica. 0-700 m.

Países: BRA(RGS).

Serjania erecta Radlk.Sin.: *Paullinia grandiflora* Cambess.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Serjania eriocarpa Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del

proyecto). PRY(CON).

Serjania foveata Griseb.Sin.: *Serjania meridionalis* Cambess.

var. *borsiniae* F.A. Barkley, *Serjania meridionalis* Cambess. var. *foveata* Griseb.

Arbusto o liana. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Serjania fuscifolia Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Serjania glabrata Kunth

Sin.: *Paullinia brachystachya* Griseb.,
Serjania fulta Griseb., *Serjania glabrata*
Kunth f. *mollior* Radlk.
Liana. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, MIS, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Serjania glutinosa Radlk.

Sin.: *Serjania descolei* F.A. Barkley
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).

Serjania gracilis Radlk.

Liana. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Serjania hatschbachii Ferrucci

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Serjania hebecarpa Benth.

Sin.: *Serjania hebecarpa* Benth. f.
amblycephala Radlk., *Serjania hebecarpa*
Benth. f. *oxycephala* Radlk., *Serjania*
hebecarpa Benth. f. *platycephala* Radlk.
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, DUR, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

Serjania herteri Ferrucci

Sin.: *Paullinia australis* A. St.-Hil.,
Serjania australis (A. St.-Hil.) Herter,
nom. illeg.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS, SCA). URY(ART, SAO).

Serjania laruotteana Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, COA, GUA, PAI, SPE).

Serjania leptocarpa Radlk.

Liana. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).

Serjania lethalis A. St.-Hil.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Serjania longistipula Radlk.

Sin.: *Serjania araquei* F.A. Barkley
Liana. Nativa. 1000-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Serjania mansiana Mart.

Liana. Nativa. 600-800 m.
Países: BRA(PAR).

Serjania marginata Casar.

Sin.: *Serjania glabriuscula* (Radlk.)
F.A. Barkley, *Serjania marginata* Casar. f.
pluridentata Radlk.
Liana. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).

Serjania meridionalis Cambess.

Sin.: *Serjania meridionalis* Cambess.
var. *cuezzoi* F.A. Barkley, *Serjania*
meridionalis Cambess. var. *odonellii* F.A.
Barkley
Arbusto o liana. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE). URY(ART, COL, SAO, SOR).

Serjania minutiflora Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(COA).

Serjania multiflora Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Serjania neei Acev.-Rodr.

Enredadera. Nativa. 200-400 m.
Países: PRY(APY).

Serjania orbicularis Radlk.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Serjania paranensis Ferrucci & Acev.-Rodr.

Liana. Nativa. 600-800 m.
Países: BRA(PAR).

Serjania perulacea Radlk. var.

chacoensis Coulleri & Ferrucci
Liana. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(CHA, FOR). PRY(APY, PHA).

Serjania perulacea Radlk. var. **perulacea**

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Serjania perulacea Radlk. var.

krpovickasii Coulleri & Ferrucci
Sin.: *Serjania meyeri* F.A. Barkley
Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, COA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Serjania piscatoria Radlk.

Liana. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(PAR).

Serjania punctulata Radlk.

Liana. Endémica. 600-800 m.
Países: BRA(PAR).

Serjania reticulata Cambess.

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(SAL). BRA(PAR, SCA).

Serjania sufferruginea Radlk.

Liana. Nativa. 1000-2200 m.
Países: ARG(JUJ).

Serjania tripleuria Ferrucci

Liana. Nativa. 300-1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR).
PRY(AMA, CON).

Serjania tristis Radlk.

Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, PAI).

Serjania unidentata Acev.-Rodr.

Liana. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Talisia Aubl.**Talisia angustifolia** Radlk.

Sin.: *Talisia humilis* Mattos, *Talisia*
pygmaea Radlk.
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CON, SPE).

Talisia esculenta (Cambess.) Radlk.

Sin.: *Sapindus esculentus* Cambess.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

Thinouia Triana & Planch.**Thinouia compressa** Radlk.

Liana. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(GUA, SPE).

Thinouia mucronata Radlk.

Sin.: *Thinouia repanda* Radlk.
Liana. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Thinouia paraguayensis (Britton) Radlk.

Sin.: *Thouinia paraguayensis* Britton,
Thinouia sepium S. Moore
Liana. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Thinouia ventricosa Radlk.

Liana. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Toulicia Aubl.**Toulicia tomentosa** Radlk.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Urvillea Kunth**Urvillea chacoensis** Hunz.

Sin.: *Cardiospermum pterocarpum* Radlk. var. *balegnoi* F.A. Barkley, *Urvillea uniloba* Radlk. f. *dissecta* Radlk., *Urvillea uniloba* Radlk. f. *incana* Radlk.
Liana. Nativa. 0-1400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).
BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, PHA).

Urvillea filipes Radlk.

Liana. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CON, PHA).

Urvillea glabra Cambess.

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Urvillea laevis Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APY, APA, PAI).

Urvillea pterocarpa (Radlk.) Acev.-Rodr. & Ferrucci

Sin.: *Cardiospermum pterocarpum* Radlk.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).

Urvillea triphylla Radlk.

Liana. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Urvillea ulmacea Kunth

Sin.: *Serjania lanceolata* Cambess., *Urvillea berteriana* DC., *Urvillea ulmacea* Kunth f. *berteriana* (DC.) Radlk., *Urvillea ulmacea* Kunth var. *berteriana* (DC.) F.A. Barkley
Liana. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Urvillea uniloba Radlk.

Sin.: *Urvillea euryptera* Griseb., *Urvillea uniloba* Radlk. var. *debilis* F.A. Barkley, *Urvillea uniloba* Radlk. var. *incana* (Radlk.) F.A. Barkley
Liana. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS, SCA). PRY(APA, ITA, PAI). URY(ART, DUR, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).

SAPOTACEAE

Chrysophyllum L.**Chrysophyllum flexuosum** Mart.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl.

Sin.: *Chloroluma gonocarpa* (Mart. & Eichler) Baill. ex Aubrév., *Chrysophyllum lucumifolium* Griseb. f. *obtusata* Chodat & Hassl., *Chrysophyllum lucumifolium* Griseb., *Chrysophyllum nemoralis* Rojas Acosta, nom. nud., *Martiusella gonocarpa* (Mart. & Eichler) Pierre, *Sapota gonocarpa* Mart. & Eichler, *Sideroxylon bolivianum* Rusby, *Sideroxylon reticulatum* Britton
Árbol. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(RIV, ROC, TAC, TYT).

Chrysophyllum inornatum Mart.

Sin.: *Chrysophyllum dusenii* Cronquist
Árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. subsp. **marginatum**

Sin.: *Chrysophyllum ebenaceum* Mart. var. *longifolium* Miq., *Chrysophyllum ebenaceum* Mart., *Chrysophyllum grisebachii* (Hieron.) Mez, *Chrysophyllum martianum* A. DC., *Chrysophyllum maytenoides* Mart. var. *tenue* Kuntze, *Chrysophyllum maytenoides* Mart., *Chrysophyllum myrtifolium* Mart., *Cynodendron marginatum* (Hook. & Arn.) Baehni, *Micropholis paraguayensis* Dubard, *Myrsine grisebachii* Hieron., *Myrsine marginata* Hook. & Arn. var. *arboorea* Griseb., *Myrsine marginata* Hook. & Arn., *Sideroxylon myrtifolium* (Mart.) Speg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(ART, RNO, SAO).

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. subsp. **tomentosum**

(Miq.) T.D. Penn.

Sin.: *Chrysophyllum ebenaceum* Mart. var. *tomentosum* Miq., *Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk. var. *tomentosum* (Miq.) Cronquist

Arbusto o arbolito. Nativa. 500-800 m.
Países: BRA(PAR).

Chrysophyllum paranaense T.D. Penn.

Árbol. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR).

Chrysophyllum viride Mart. & Eichler

Sin.: *Chloroluma viridis* (Mart. & Eichler) Aubrév.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Diploön Cronquist**Diploön cuspidatum** (Hoehne)

Cronquist
Sin.: *Chrysophyllum cuspidatum* Hoehne
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Ecclinusa Mart.**Ecclinusa ramiflora** Mart.

Sin.: *Chrysophyllum ramiflorum* (Mart.) A. DC., *Passaveria obovata* Mart. & Eichler, nom. superfl.
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).

Manilkara Adans.**Manilkara salzmännii** (A. DC.) H.J.

Lam
Sin.: *Mimusops salzmännii* A. DC.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard

Sin.: *Mimusops subsericea* Mart.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pouteria Aubl.**Pouteria beaurepairei** (Glaz. &

Raunk.) Baehni
Sin.: *Labatia beaurepairei* (Glaz. & Raunk.) Engl., *Lucuma beaurepairei* Glaz. & Raunk., *Pseudolabatia beaurepairei* (Glaz. & Raunk.) Aubrév.
Arbolito. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pouteria bullata (S. Moore) Baehni

Sin.: *Lucuma bullata* S. Moore
Árbol. Nativa. 0-900 m.
Países: BRA(PAR).

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.

Sin.: *Achras caimito* Ruiz & Pav., *Guapeba laurifolia* Gomes, *Lucuma laurifolia* (Gomes) A. DC.
Árbol. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pouteria durlandii (Standl.) Baehni

Sin.: *Lucuma durlandii* Standl., *Paralabatia durlandii* (Standl.) Aubrév., *Peteniodendron durlandii* (Standl.) Lundell
Árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR).

Pouteria fragrans (Pierre) Dubard

Sin.: *Guapeba fragrans* Pierre, *Labatia odorata* Rojas Acosta, *Pseudolabatia fragrans* (Pierre) Aubrév.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(COA, PAI).

Pouteria gardneri (Mart. & Miq.)

Baehni
Sin.: *Chrysophyllum gardneri* Mart. & Miq., *Lucuma paraguayensis* Chodat & Hassl., *Lucuma paraguayensis* Chodat & Hassl. f. *fruticosa* Chodat & Hassl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk.

Sin.: *Labatia ostenii* Hassl., *Labatia sapota-anguai* Rojas Acosta, *Lucuma gardneriana* A. DC., *Pouteria suavis* Hemsl.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CON, COA, ÑEE, PAI). URY(PAY, RIV, SAO).

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk.

Sin.: *Labatia glomerata* Miq., *Lucuma glomerata* Miq., *Neolabatia glomerata* (Miq.) Aubrév., *Richardella glomerata* (Miq.) Baehni
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze

Sin.: *Achras lucuma* Ruiz & Pav., *Richardella lucuma* (Ruiz & Pav.) Aubrév.
Árbol. Nativa.
Países: CHL(ATA).

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

Sin.: *Labatia ramiflora* Mart., *Lucuma ramiflora* (Mart.) A. DC., *Paralabatia ramiflora* (Mart.) Aubrév.
Árbol. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk.

Sin.: *Labatia salicifolia* Mart., *Lucuma neriifolia* Hook. & Arn., *Lucuma sellowii* A. DC., *Pouteria neriifolia* (Hook. & Arn.) Radlk., *Pouteria salicifolia* (Spreng.) Radlk. var. *neriifolia* (Hook. & Arn.) Monach. & Moldenke, *Pouteria salicifolia* (Spreng.) Radlk. var. *typica* Baehni, nom. inval., *Pouteria sellowii* (A. DC.) Engl., *Roussea salicifolia* Spreng.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA, PAI). URY(CAS, COL, DUR, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TYT).

Pouteria splendens (A. DC.) Kuntze

Sin.: *Gayella splendens* (A. DC.) Aubrév. *Gayella valparadisaea* (Molina) Pierre, *Lucuma splendens* A. DC., *Lucuma valparadisaea* Molina, *Vitellaria valparadisaea* (Molina) Radlk. ex Dubard
Árbol. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Pouteria torta (Mart.) Radlk.

Sin.: *Guapeba torta* (Mart.) Pierre, *Labatia torta* Mart., *Lucuma torta* (Mart.) A. DC.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Pouteria venosa (Mart.) Baehni

Sin.: *Achras venosa* Mart., *Radlkoferella venosa* (Mart.) Pierre, *Vitellaria venosa* (Mart.) Radlk.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pradosia Liais**Pradosia brevipes** (Pierre) T.D. Penn.

Sin.: *Chrysophyllum pumilum* Chodat & Hassl., *Chrysophyllum pumilum* Chodat & Hassl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Ecclinusa brevipes* Pierre, *Ecclinusa pumila* (Chodat & Hassl.) Cronquist
Hierba. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN).

Pradosia lactescens (Vell.) Radlk.

Sin.: *Chrysophyllum bumelioides* Mart., *Pometia lactescens* Vell.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Sideroxylon L.**Sideroxylon obtusifolium** (Roem. & Schult.) T.D. Penn.

Sin.: *Bumelia excelsa* A. DC., *Bumelia obtusifolia* Roem. & Schult., *Bumelia obtusifolia* Roem. & Schult. subsp. *excelsa* (A. DC.) Cronquist, *Bumelia rhamnoides* Casar., *Bumelia sartorum* Mart.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, MIE, PAI, PHA). URY(ART, ROC).

SAXIFRAGACEAE

Chrysosplenium L.

Chrysosplenium macranthum Hook.
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: ARG(TDF). CHL(MAG).

Chrysosplenium valdivicum Hook.
Hierba. Endémica. 0-1600 m.
Países: ARG(NEU). CHL(ARA, LRI, LLA).

Hieronymusia Engl.

Hieronymusia alchemilloides
(Griseb.) Engl.

Sin.: *Saxifraga alchemilloides* Griseb.,
Suksdorfia alchemilloides (Griseb.) Engl.
Hierba. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Saxifraga L.

Saxifraga magellanica Poir.

Sin.: *Saxifraga chilensis* Gay ex sched.,
Saxifraga cordillerana C. Presl, *Saxifraga*
cordillerana J. Presl var. *magellanica*
(Poir.) Dusén, *Saxifraga magellanica*
Poir. var. *peruviana* (Sternb.) J.F. Macbr.,
Saxifraga pavonii D. Don
Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU, COR, JUJ, MEN,
NEU, RNE, SLU, SCR, TDF). CHL(MAU,
BIO, ARA, AIS, MAG).

Saxifraga umbrosa L.

Hierba. Introducida. 0-100 m.
Países: CHL(MAG).

Saxifragella Engl.

Saxifragella bicuspidata (Hook. f.)
Engl.

Sin.: *Saxifraga bicuspidata* Hook. f.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(TDF). CHL(LLA, MAG).

Saxifragodes D.M. Moore

Saxifragodes albowiana (Kurtz ex
Albov) D.M. Moore

Sin.: *Saxifraga albowiana* Kurtz ex
Albov, *Saxifragella albowiana* (Kurtz ex
Albov) Engl.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA,
AIS, MAG).

SCHLEGELIACEAE

Schlegelia Miq.

Schlegelia parviflora (Oerst.) Monach.
Sin.: *Dermatocalyx parviflorus* Oerst.
Liana. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

SCHOEPFIACEAE

Arjona Cav.

Arjona longifolia Phil.

Sin.: *Arjona linearis* Miers
Hierba. Endémica. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN,
NEU, RNE, SJU).

Arjona megapotamica Malme

Sin.: *Arjona brasiliensis* K. Schum.,
Arjona schumanniana Pilg.
Hierba. Endémica. 500-1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Arjona patagonica Hombr. & Jacq. ex
Decne.

Sin.: *Arjona andina* Phil., *Arjona*
chubutensis Dusén, *Arjona rigida* Miers,
Arjona ruscifolia Poepp., *Arjona tuberosa*
Cav. var. *patagonica* DC.
Hierba. Endémica. 0-4000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,
NEU, RNE, SCR, SJU, TDF). CHL(COQ,
VAL, LBO, ARA, MAG).

Arjona pusilla Hook. f.

Sin.: *Arjona ameghinoi* Speg., *Arjona*
glaberrima Pilg., *Arjona minima* Hieron.
Hierba. Endémica. 100-4200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR,
SJU, TDF). CHL(AIS, MAG).

Arjona tuberosa Cav. var. **tandilensis**
(Kuntze) G. Dawson

Sin.: *Arjona patagonica* Hombr.
& Jacq. ex Decne. var. *tandilensis*
(Kuntze) Speg., *Arjona tandilensis*
Kuntze
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA,
MEN, NEU, RNE). URY(MON).

Arjona tuberosa Cav. var. **tuberosa**

Sin.: *Arjona apressa* Phil., *Arjona*
pungens Phil., *Arjona tuberosa* Cav.
var. *lanata* Macloskie, *Quinchamalium*
patagonica Spreng.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE,
SCR, TDF). CHL(MAU, ARA, AIS, MAG).

Quinchamalium Molina

Quinchamalium chilense Molina

Sin.: *Quinchamalium andinum*
Phil., *Quinchamalium araucanum* F.
Meigen, *Quinchamalium berterooanum*
Phil., *Quinchamalium bracteosum*
Phil., *Quinchamalium breviflorum* C.
Presl, *Quinchamalium carnosum* Phil.,
Quinchamalium chilense Molina var.
gracile (Brongn.) Speg., *Quinchamalium*
chilense Molina var. *majus* (Brongn.)
Speg., *Quinchamalium chilense* Molina
var. *parviflorum* (Phil.) L.E. Navas, hom.
illeg., *Quinchamalium chilense* Molina
var. *parviflorum* A. DC., *Quinchamalium*
chilense Molina var. *patagonicum* (Berg)
Speg., comb. illeg., *Quinchamalium*
chilense Molina var. *procumbens*
(Ruiz & Pav.) Kuntze, *Quinchamalium*
chilense Molina var. *robustior* Hook. &
Arn., *Quinchamalium elegans* C. Presl,
Quinchamalium ericoides Brongn. ex
Gay, *Quinchamalium excrescens* Phil.,
Quinchamalium fruticulosum Steud.
ex Miers, *Quinchamalium gracile*
Brongn., *Quinchamalium linarioides*
Phil., *Quinchamalium linifolium* Meyen
ex Walp., hom. illeg. *Quinchamalium*
linifolium Miers, *Quinchamalium*
litorale Phil., *Quinchamalium majus*
Brongn. var. *spegazzinii* Macloskie,
Quinchamalium majus Brongn.,
Quinchamalium minutum Phil.,
Quinchamalium parviflorum Phil.,
Quinchamalium patagonicum Berg,
hom. illeg., *Quinchamalium pratense*
Phil., *Quinchamalium procumbens* Ruiz
& Pav., *Quinchamalium purpureum*
Phil., *Quinchamalium rugosum* Phil.,
Quinchamalium tarapacanam Phil.,
Quinchamalium thesioides Phil. var.
flaccidum Phil., *Quinchamalium*
thesioides Phil.

Hierba. Nativa. 0-3800 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, MEN, NEU,
RNE, SCR). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS, RME).

Schoepfia Schreb.**Schoepfia brasiliensis** A. DC.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Schoepfia lucida Pulle

Arbusto. Introducida. 0-300 m.
Países: BRA(SCA).

SCROPHULARIACEAE

Alonsoa Ruiz & Pav.**Alonsoa honoraria** Grau

Subarbusto. Endémica. 300-400 m.
Países: CHL(COQ).

Alonsoa meridionalis (L. f.) Kuntze

Sin.: *Alonsoa urticifolia* Steud.,
Scrophularia meridionalis L. f.
Hierba. Nativa.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, RME).

Buddleja L.**Buddleja angusticarpa** (E.M. Norman & L.B. Sm.) G.P. Coelho & Miotto

Sin.: *Buddleja thyrsoides* Lam. subsp.
angusticarpa E.M. Norman & L.B. Sm.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(GUA, MIE).
URY(ART, CLA, COL, CLA, LAV, MAL,
PAY, RIV, SJO).

Buddleja araucana Phil.

Sin.: *Buddleja globosa* Hope var.
araucana (Phil.) Reiche, *Buddleja nappii*
Lorentz
Arbusto. Endémica. 300-1600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
CHL(ATA, COQ, VAL, BIO).

Buddleja aromatica J. Remy

Sin.: *Buddleja andina* Britton ex Rusby,
Buddleja monocephala Kraenzl., *Buddleja*
tiraquiensis Kuntze
Arbusto. Nativa. 2900-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Buddleja bordignonii G.P. Coelho & Miotto

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Buddleja brachiata Cham. & Schltdl.

Arbusto. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CON).

Buddleja cestriflora Cham.

Arbusto. Endémica. 800-1400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Buddleja cordobensis Griseb.

Sin.: *Buddleja intermedia* Lorentz
Arbusto. Endémica. 700-1500 m.
Países: ARG(COR, LRI, SJU, SLU).

Buddleja cuneata Cham.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Buddleja davidii Franch.

Arbusto. Introducida. 200-400 m.
Países: ARG(CHU). BRA(PAR, RGS, SCA).

Buddleja diffusa Ruiz & Pav.

Sin.: *Buddleja coroicensis* Rusby
Arbusto. Nativa. 1000-2900 m.
Países: ARG(SAL).

Buddleja elegans Cham. & Schltdl. subsp. **angustata** (Benth.) E.M. Norman

Sin.: *Buddleja angustata* Benth.,
Buddleja cambara Arechav., *Buddleja*
fiebrigiana Kraenzl., *Buddleja grisea*
Kraenzl., *Buddleja malmei* Kraenzl.,
Buddleja vetula Cham. & Schltdl. var.
angustata (Benth.) Chodat, *Buddleja*
vetula Cham. & Schltdl. var. *major*
Schmidt
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA,
GUA, ITA, PAI, SPE). URY(RIV, TAC).

Buddleja elegans Cham. & Schltdl. subsp. **elegans**

Sin.: *Buddleja campestris* (Vell.) Walp.,
Buddleja glaziovii Taub., *Buddleja reitzii*
E.M. Norman & L.B. Sm., *Buddleja*
vetula Cham. & Schltdl., *Romana*
campestris Vell.
Arbusto. Nativa. 700-1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Buddleja globosa Hope

Sin.: *Buddleja capitata* Jacq., *Buddleja*
connata Ruiz & Pav., *Buddleja globifera*
Duhamel
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, RME).

Buddleja grandiflora Cham. & Schltdl.

Sin.: *Buddleja paludicola* Kraenzl.,
Buddleja sancti-leopoldi Kraenzl.
Arbusto. Nativa. 400-1400 m.
Países: ARG(COS, SFE). BRA(PAR,
RGS, SCA). URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

Buddleja hatschbachii E.M. Norman & L.B. Sm.

Subarbusto. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Buddleja hieronymi R.E. Fr.

Sin.: *Buddleja misera* Kraenzl.
Arbusto. Nativa. 2500-3900 m.
Países: ARG(JUJ).

Buddleja iresinoides (Griseb.)

Hosseus
Sin.: *Buddleja microcephala* Rusby,
Buddleja pendula R.E. Fr., *Buddleja*
pendula R.E. Fr. var. *concolor* Lor.B. Sm.,
Buddleja similis R.E. Fr., *Lippia iresinoides*
Griseb.
Arbusto. Nativa. 300-1600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ,
SAL, TUC). URY(RIV).

Buddleja kleinii E.M. Norman & L.B. Sm.

Arbusto. Endémica. 900-1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Buddleja madagascariensis Lam.

Arbusto. Introducida.
Países: BRA(RGS, SCA).

Buddleja mendozensis Benth.

Sin.: *Buddleja kurtzii* Kraenzl.,
Buddleja lucae Niederl., *Buddleja*
mendozaensis Benth. var. *tenuifolia*
(Griseb.) Hieron., *Buddleja tenuifolia*
Griseb.
Arbusto. Nativa. 600-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI,
MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Buddleja misionum Kraenzl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(GUA, ITA).

Buddleja oblonga Benth.

Arbusto. Nativa. 1000-2200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Buddleja ramboi L.B. Sm.

Arbusto. Endémica. 200-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl.

Sin.: *Buddleja alata* Larrañaga, hom. illeg., *Buddleja albotomentosa* R.E. Fr., *Buddleja australis* Vell., *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng., *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. subsp. *stachyoides* (Cham. & Schltdl.) E.M. Norman, *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. var. *glazioviana* Gilg, *Buddleja neemda* Link, hom. illeg., *Buddleja otophylla* Hassk.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(ART, PAY, RNO, SOR).

Buddleja suaveolens Kunth & Bouché

Sin.: *Buddleja gayana* Benth.

Arbusto. Endémica. 500-2900 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Buddleja thyrsoides Lam.

Sin.: *Buddleja chloroleuca* Kraenzl.,

Buddleja salicifolia Vahl

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CAS, MON, ROC, SJO, SJO, TAC, TYT).

Buddleja tubiflora Benth.

Sin.: *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var. *foliosa* Chodat & Hassl., *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var. *genuina* Chodat & Hassl., *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var. *paraguayensis* (Chodat) Chodat & Hassl., *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var. *tubiflora* (Benth.) Chodat & Hassl., *Buddleja paraguariensis* Chodat

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Buddleja tucumanensis Griseb.

Sin.: *Buddleja bangii* Kraenzl., *Buddleja canescens* Rusby, *Buddleja cochabambensis* Rusby, *Buddleja hypoleuca* Kraenzl., *Buddleja ignea* Kraenzl., *Buddleja inconspicua* Kraenzl., *Buddleja tucumanensis* Griseb. var. *serrata* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-3300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Capraria L.**Capraria biflora** L.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(FOR, JUJ, SAL).

PRY(APY).

Myoporum Sol. ex G. Forst.**Myoporum laetum** Sol. ex G. Forst.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI). CHL(COQ, VAL, MAU). URY(ROC).

Scrophularia L.**Scrophularia auriculata** L.

Hierba. Introducida. 0-900 m.

Países: CHL(MAU, ARA, RME).

Scrophularia peregrina L.

Hierba. Introducida.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbascum L.**Verbascum blattaria** L.

Hierba. Introducida. 200-500 m.

Países: ARG(BAI).

Verbascum densiflorum Bertol.

Sin.: *Verbascum thapsiforme* Schrad.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: CHL(ARA).

Verbascum thapsus L.

Hierba. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, MEN, MIS, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

Verbascum virgatum Stokes

Sin.: *Verbascum blattarioides* Lam.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(CAA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

SIMAROUBACEAE

Ailanthus Desf.**Ailanthus altissima** (Mill.) Swingle

Sin.: *Ailanthus glandulosa* Desf., *Toxicodendrum altissimum* Mill.

Árbol. Introducida. 0-800 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA, SAL, TUC). CHL(BIO, RME, JFE). URY(MON).

Castela Turpin**Castela coccinea** Griseb.

Sin.: *Ximeria americana* Linn var. *pubens* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, BOQ, CHO, CON, GUA, ITA, ÑEE, NAS, PHA).

Castela tweedii Planch.

Sin.: *Castela alaternifolia* Planch., *Castela tweedii* Planch. var. *dentata* Engl., *Castela tweedii* Planch. var. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Castela tweedii* Planch. var. *typica* Cronquist, nom. illeg.

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(PAY).

Homalolepis Turcz.**Homalolepis glabra** (Engl.) Devecchi & Pirani

Sin.: *Quassia glabra* (Engl.) Noot., *Simaba glabra* Engl., *Simaba glabra* Engl. var. *emarginata* Hassl., *Simaba glabra* Engl. var. *inaequilatera* Hassl., *Simaba glabra* Engl. subsp. *trijuga* Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAA, CON).

Homalolepis praecox (Hassl.)

Devecchi & Pirani

Sin.: *Quassia praecox* (Hassl.) Noot., *Simaba praecox* Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(APA, CAN, CAU).

Picrasma Blume**Picrasma crenata** (Vell.) Engl.

Sin.: *Aeschrion crenata* Vell., *Picraena vellozii* (Planch.) Engl., *Picraena palo-amargo* (Speg.) Speg., *Picramnia crenata* (Vell.) Hassl., *Picrasma vellozii* Planch., *Picrasma palo-amargo* Speg.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Simaba Aubl.**Simaba trichilioides** A. St.-Hil.

Sin.: *Quassia trichilioides* (A. St.-Hil.) D. Dietr., *Zwingera trichilioides* (A. St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

SIPARUNACEAE**Siparuna** Aubl.**Siparuna bifida** (Poepp. & Endl.) A. DC.

Sin.: *Citrosma bifida* Poepp. & Endl.

Arbusto o árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Siparuna guianensis Aubl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

SMILACACEAE**Smilax** L.**Smilax assumptionis** A. DC.

Liana. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PHA, SPE).

Smilax campestris Griseb.

Sin.: *Smilax campestris* Griseb. var. *marginulata* (Mart. ex Griseb.) A. DC., *Smilax campestris* Griseb. var. *rubiginosa* (Griseb.) A. DC., *Smilax marginulata* Mart. ex Griseb., *Smilax montana* Griseb., *Smilax rubiginosa* Griseb., *Smilax scalaris* Griseb., *Smilax viminea* Griseb.

Liana. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,

ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI). URY(COL, FLO, FLA, MAL, RNO, ROC, SAO, SJO).

Smilax cognata Kunth

Sin.: *Smilax montevidensis* Hort ex Steud., nom. nud.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, COA, GUA, ITA, ÑEE).

Smilax elastica Griseb.

Sin.: *Smilax brasiliensis* Spreng. var. *impresso-venosa* Mattos, *Smilax elastica* Griseb. var. *aculeata* A. DC., *Smilax ficifolia* Griseb.

Enredadera. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Smilax fluminensis Steud.

Sin.: *Smilax china* Vell., hom. illeg., *Smilax syringoides* Griseb., *Smilax syringoides* Griseb. var. *multiflora* Griseb.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, SPE).

Smilax goyazana A. DC.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Smilax lappacea Willd.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Smilax larvata Griseb.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Smilax pilcomayensis Guagl. & Gattuso

Liana. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). PRY(APY, CEN, CON, SPE).

Smilax polyantha Griseb.

Sin.: *Smilax macropoda* A. DC., *Smilax medicinalis* S. Moore

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Smilax quinquenervia Vell.

Sin.: *Smilax procera* Griseb., *Smilax tijucensis* A. DC., *Smilax tijucensis* A. DC. var. *gardneriana* A. DC., *Smilax tijucensis* A. DC. var. *pohliana* A. DC.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Smilax rufescens Griseb.

Sin.: *Smilax corcovadensis* Kunth, *Smilax havanensis* Jacq. var. *dentata* (Humb. & Bonpl.) A. DC., *Smilax nitida* Griseb.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Smilax staminea Griseb.

Sin.: *Smilax robusta* Griseb.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Smilax stenophylla A. DC.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

SOLANACEAE**Acnistus** Schott**Acnistus arborescens** (L.) Schtdl.

Sin.: *Atropa arborescens* L., *Dunalia arborescens* (L.) Sleumer

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aureliana Sendtn.**Aureliana brasiliana** (Hunz.) Barboza & Hunz.

Sin.: *Athenaea brasiliana* Hunz.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn. var. **fasciculata**

Sin.: *Aureliana fasciculata* (Vell.) Sendtn. var. *tomentella* (Sendtn.) Barboza & Hunz., *Aureliana lucida* (Moric.) Sendtn. var. *tomentellum* Sendtn., *Aureliana lucida* (Moric.) Sendtn., *Bassovia crassiflora* Dunal, *Bassovia fasciculata* (Vell.) Dunal, *Bassovia lucida* (Moric.) Sendtn. var. *pilosulum* Dunal, *Capsicum crassiflorum* (Dunal) Kuntze, *Capsicum fasciculatum* (Vell.) Kuntze, *Capsicum lucidum* (Moric.) Kuntze, *Solanum fasciculatum* Vell., *Solanum lucidum* Moric.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, GUA, PAI, SPE).

Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn.
var. **longifolia** (Sendtn.) Hunz. &
Barboza

Sin.: *Aureliana glomuliflora* Sendtn.
var. *longifolium* Sendtn.

Arbusto. Nativa. 300-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Aureliana picta (Mart.) I. M. C.
Rodrigues & Stehmann

Sin.: *Athenaea picta* (Mart.) Sendtn.,
Witheringia picta Mart.

Arbusto. Nativa. 300-400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aureliana tomentosa Sendtn.

Sin.: *Bassovia tomentosa* (Sendtn.)
Dunal, *Capsicum tomentosum* (Sendtn.)
Kuntze

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Aureliana wettsteiniana (Witasek)
Hunz. & Barboza

Sin.: *Bassovia wettsteiniana* Witasek
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Benthamiella Speg.

Benthamiella azurella (Skotts.)

A.Soriano
Sin.: *Saccardophyton azurella* Skotts.
Subarbusto. Endémica. 500-1200 m.
Países: ARG(NEU, SCR). CHL(MAG).

Benthamiella azurelloides Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.
Países: ARG(CHU).

Benthamiella chubutensis A. Soriano

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU).

Benthamiella graminifolia Skotts.

Subarbusto. Endémica. 0-3100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Benthamiella lanata A. Soriano

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU). CHL(MAG).

Benthamiella longifolia Speg.

Sin.: *Benthamiella acutifolia* Speg.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Benthamiella nordenskioldii Dusén
ex N.E. Br.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(MAG).

Benthamiella patagonica Speg.

Sin.: *Benthamiella abietina*
Skotts., *Benthamiella aurea* Skotts.,
Benthamiella intermedia Skotts.,
Benthamiella montana Dusén
Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
CHL(MAG).

Benthamiella pycnophylloides Speg.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Benthamiella skottsbergii A. Soriano

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Benthamiella sorianoii S.C. Arroyo

Subarbusto. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(SCR).

Benthamiella spegazziniana A.

Soriano
Sin.: *Saccardophyton pycnophylloides* Speg.
Subarbusto. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(SCR).

Bouchetia Dunal

Bouchetia anomala (Miers) Britton &
Rusby

Sin.: *Bouchetia anomala* (Miers)
Britton & Rusby subsp. *staticifolia*
(Sendtn.) Loes., *Bouchetia anomala*
(Miers) Loes., comb. illeg., *Nicotiana*
staticifolia (Sendtn.) Kuntze,
Nierembergia anomala Miers,
Nierembergia staticifolia Sendtn.,
Salpiglossis anomala (Miers) D'Arcy
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,
SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS,
SCA). PRY(ÑEE). URY(CAS, COL, FLA,
MAL, MON, SAO, TAC).

Brugmansia Pers.

Brugmansia suaveolens (Humb. &
Bonpl. ex Willd.) Sweet

Sin.: *Datura suaveolens* Humb. &
Bonpl. ex Willd.
Arbusto o arbolito. Introducida. 100-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CAA).

Brunfelsia L.

Brunfelsia australis Benth.

Sin.: *Brunfelsia hopeana* (Hook.)
Benth. var. *australis* (Benth.) J.A.
Schmidt, *Brunfelsia paraguayensis*
Chodat, *Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don
f. *intermedia* Hassl., *Brunfelsia uniflora*
(Pohl) D. Don f. *obovatifolia* Hassl.,
Brunfelsia uniflora Benth. f. *typica* Hassl.,
nom. inval., *Franciscea australis* (Benth.)
Miers, *Franciscea hopeana* Hook.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS,
SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI,
PHA, SPE). URY(Desconocida).

Brunfelsia brasiliensis (Spreng.) L.B.
Sm. & Downs subsp. **brasiliensis**

Sin.: *Brunfelsia acuminata* (Pohl)
Benth., *Brunfelsia brasiliensis* (Spreng.)
L.B. Sm. & Downs var. *acuminata* (Pohl)
L.B. Sm. & Downs, *Franciscea acuminata*
Pohl, *Gerardia brasiliensis* Spreng.
Arbusto. Nativa. 300-700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Brunfelsia brasiliensis (Spreng.)
L.B. Sm. & Downs subsp. **macrocalyx**
(Dusén) Plowman

Sin.: *Brunfelsia hopeana* (Hook.)
Benth. var. *macrocalyx* Dusén
Arbusto. Nativa. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Brunfelsia cuneifolia J.A. Schmidt
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Brunfelsia pauciflora (Cham. &
Schltdl.) Benth.

Sin.: *Brunfelsia calycina* Benth.,
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.)
Benth. var. *calycina* J.A. Schmidt,
Franciscea calycina (Benth.) Miers,
Franciscea pauciflora Cham. & Schltdl.
Arbusto. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Brunfelsia pilosa Plowman

Arbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA).

Brunfelsia plowmaniana N.

Filipowicz & M. Nees
Nativa. 1500-3200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don
 Sin.: *Brunfelsia hopeana* (Hook.)
 Benth. var. *pubescens* Benth., *Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth., *Brunfelsia mutabilis* (H.Jacq.) Vilm., *Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don var. *pubescens* (Benth.) R.E.D.Baker & N.W.Simmonds, *Franciscea mutabilis* H.Jacq., *Franciscea uniflora* Pohl
 Arbusto. Nativa. 1500-2000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA). PRY(COA), ÑEE, PAI, SPE).

Calibrachoa Cerv.

Calibrachoa caesia (Sendtn.) Wijsman
 Sin.: *Petunia caesia* Sendtn., *Petunia kleinii* L.B. Sm. & Downs.
 Subarbusto. Endémica. 500-1500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(PAI).

Calibrachoa cordifolia Stehmann & Aguilar
 Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
 Países: BRA(RGS).

Calibrachoa dusenii (R.E. Fr.) Stehmann & Semir
 Sin.: *Petunia dusenii* R.E. Fr.
 Subarbusto. Endémica. 900 m.
 Países: BRA(PAR).

Calibrachoa eglandulata Stehmann & Semir
 Arbusto. Endémica. 1200 m.
 Países: BRA(SCA).

Calibrachoa ericifolia (R.E. Fr.) Wijsman
 Sin.: *Petunia ericifolia* R.E. Fr.
 Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Calibrachoa excellens (R.E. Fr.) Wijsman
 Sin.: *Calibrachoa hassleriana* (R.E. Fr.) Wijsman, *Petunia excellens* R.E. Fr., *Petunia hassleriana* R.E. Fr., *Petunia variabilis* R.E. Fr.
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1300 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, GUA). URY(TAC).

Calibrachoa felipponei (Sandwith) Stehmann
 Sin.: *Petunia felipponei* Sandwith
 Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
 Países: URY(MON).

Calibrachoa heterophylla (Sendtn.) Wijsman
 Sin.: *Fabiana heterophylla* (Sendtn.)
 Dunal, *Petunia heterophylla* Sendtn.
 Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
 Países: BRA(RGS, SCA).

Calibrachoa humilis (R.E. Fr.) Stehmann & Semir
 Sin.: *Petunia humilis* R.E. Fr.
 Subarbusto. Endémica. 0-200 m.
 Países: ARG(COS). BRA(RGS). URY(SAO).

Calibrachoa irgangiana Stehmann
 Arbusto. Endémica. 100-300 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(RGS).

Calibrachoa linoides (Sendtn.) Wijsman subsp. *furcata* Greppi & Stehmann
 Subarbusto. Endémica. 400-900 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Calibrachoa linoides (Sendtn.) Wijsman subsp. *linoides*
 Sin.: *Calibrachoa macrodactylon* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman, *Petunia linoides* Sendtn., *Petunia macrodactylon* L.B. Sm. & Downs
 Subarbusto. Nativa. 0-1500 m.
 Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA). PRY(PAI).

Calibrachoa longistyla Stehmann & Greppi
 Arbusto. Endémica. 0-100 m.
 Países: ARG(COS).

Calibrachoa micrantha (R.E. Fr.) Stehmann & Semir
 Sin.: *Petunia micrantha* R.E. Fr.
 Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

Calibrachoa missionica Stehmann & Semir
 Arbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(ITA).

Calibrachoa ovalifolia (Miers) Stehmann & Semir
 Sin.: *Calibrachoa calycina* (Sendtn.)
 Wijsman, *Petunia calycina* Sendtn., *Petunia helianthemoides* Sendtn., *Petunia ovalifolia* Miers
 Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). URY(ART, CLA, RIV, TYT).

Calibrachoa paranensis (Dusén) Wijsman
 Sin.: *Calibrachoa rupestris* (Dusén)
 Wijsman, *Petunia paranensis* Dusén, *Petunia rupestris* Dusén
 Subarbusto. Nativa. 800-1000 m.
 Países: BRA(PAR).

Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy
 Sin.: *Calibrachoa parviflora* (Juss.)
 Wijsman, comb. superfl., *Calibrachoa procumbens* Cerv., *Leptophragma montevidensis* (Spreng.) Dunal, *Leptophragma prostrata* (Hook. & Arn.) Benth., *Lindernia montevidensis* Spreng., *Nicotiana parviflora* (Juss.) Lehm., *Nierembergia viscidula* Kunth, *Petunia parviflora* Juss., *Petunia parviflora* Juss. var. *glabriuscula* Dunal, *Petunia parviflora* Juss. var. *villosa* Dunal, *Petunia viscidula* (Kunth) Miers, *Salpiglossis prostrata* Hook. & Arn.
 Hierba. Nativa. 0-300 m.
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(VAL). PRY(COA). URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, SAO).

Calibrachoa pubescens (Spreng.) Stehmann
 Sin.: *Nierembergia graveolens* Dunal, hom. illeg., *Nierembergia pubescens* Spreng., *Petunia pubescens* (Spreng.) R.E. Fr., *Petunia serpyllifolia* Sendtn.
 Hierba. Nativa. 0-200 m.
 Países: ARG(COS). URY(MON).

Calibrachoa pygmaea (R.E. Fr.) Wijsman
 Sin.: *Petunia pygmaea* R.E. Fr.
 Hierba. Endémica. 0-300 m.
 Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(ART, CAS, DUR, FLO, FLA, MON, SAO, SOR, TAC).

Calibrachoa scabridula (C.V. Morton) Stehmann
 Sin.: *Petunia scabridula* C.V. Morton
 Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
 Países: URY(CAS).

Calibrachoa sellowiana (Sendtn.) Wijsman
 Sin.: *Fabiana sellowiana* (Sendtn.)
 Dunal, *Petunia alpicola* L.B. Sm. & Downs, *Petunia sellowiana* Sendtn.
 Subarbusto. Endémica. 500-1900 m.
 Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Calibrachoa sendtneriana (R.E. Fr.)

Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia sendtneriana* R.E. Fr.
Subarbusto. Endémica. 1400-1900 m.
Países: BRA(SCA).

Calibrachoa serrulata (L.B. Sm. &

Downs) Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia serrulata* L.B. Sm. &
Downs
Subarbusto. Endémica. 1400-1500 m.
Países: BRA(SCA).

Calibrachoa spathulata (L.B. Sm. &

Downs) Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia spathulata* L.B. Sm. &
Downs
Subarbusto. Endémica. 1000-1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Calibrachoa thymifolia (A. St.-Hil.)

Stehmann & Semir

Sin.: *Calibrachoa linearis* (Hook.)
Wijsman, *Fabiana thymifolia* A. St.-
Hil., *Nierembergia intermedia* Graham,
Petunia intermedia (Graham) G. Don,
Petunia linearis (Hook.) Paxton, *Petunia*
thymifolia (A. St.-Hil.) Sendtn., *Petunia*
thymifolia (A. St.-Hil.) Sendtn. f. *gracilis*
R.E. Fr., *Salpiglossis linearis* Hook.
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE).
BRA(RGS). PRY(ITA). URY(ART, COL,
PAY, SAO, SJO).

Capsicum L.**Capsicum baccatum** L. var. **baccatum**

Sin.: *Capsicum annuum* L. var.
microcarpum (Cav.) Voss, *Capsicum*
microcarpum Cav. var. *glabrescens*
Hassl., *Capsicum microcarpum* Cav. var.
tomentosum Chodat & Hassl., *Capsicum*
microcarpum Cav.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ,
MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA,
GUA, PAI, SPE). URY(RIV).

Capsicum baccatum L. var. **praetermissum** (Heiser & P.G. Sm.)

Hunz.
Sin.: *Capsicum praetermissum* Heiser &
P.G. Sm.
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(GUA, PAI).

Capsicum baccatum L. var. **pendulum**

(Willd.) Eshbaugh

Sin.: *Capsicum pendulum* Willd.
Nativa.
Países: PRY(COA, GUA, PAI).

Capsicum chacoense Hunz.

Sin.: *Capsicum chacoense* Hunz. var.
tomentosum Hunz.

Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS,
ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE,
SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, AMA,
BOQ, CON, ÑEE, PHA).

Capsicum eximium Hunz.

Arbusto. Nativa. 1000-2900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Capsicum flexuosum Sendtn.

Sin.: *Capsicum schottianum* Sendtn.
var. *flexuosum* (Sendtn.) Hunz.
Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN,
GUA, ITA, PAI, SPE).

Capsicum frutescens L.

Arbusto. Nativa.
Países: PRY(PHA).

Capsicum recurvatum Witasek

Arbusto. Nativa. 100-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cestrum L.**Cestrum auriculatum** L'Hér.

Arbusto. Nativa. 1800 m.
Países: CHL(TAR).

Cestrum axillare Vell.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Cestrum bracteatum Link & Otto

Sin.: *Cestrum amictum* Schltld. var.
parviflorum (Sendtn.) Dunal, *Cestrum*
amictum Schltld., *Cestrum bracteatum*
Link & Otto var. *amictum* (Schltld.)
Sendtn., *Cestrum bracteatum* Link &
Otto var. *parviflorum* Sendtn.
Arbusto. Nativa. 0-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Cestrum cordatum Schott ex Sendtn.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(COA).

Cestrum corymbosum Schltld. var. **corymbosum**

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA,
CAA, CAN, COA, PAI, SPE). URY(ART,
CLA, PAY, RNO, SJO, TAC, TYT).

Cestrum corymbosum Schltld. var. **hirsutum** Francey

Arbusto. Endémica. 800 m.
Países: BRA(SCA).

Cestrum euanthes Schltld.

Sin.: *Cestrum sellowianum* Sendtn.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(PHA).
URY(CAS, SJO).

Cestrum guaraniticum Chodat & Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
MIS, SFE). PRY(CON, PAI, PHA).

Cestrum hassleri Francey

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Cestrum intermedium Sendtn.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA).

Cestrum kunthii Francey

Arbusto. Endémica. 1000-1800 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Cestrum laevigatum Schltld.

Sin.: *Cestrum laevigatum* Schltld. var.
evolutum Schltld., *Cestrum laevigatum*
Schltld. var. *paraguayense* Francey,
Cestrum laevigatum Schltld. var.
pauperculum Francey
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera
del área del proyecto). PRY(CAA, GUA,
ÑEE, SPE).

Cestrum lorentzianum Griseb.

Sin.: *Cestrum pubens* Griseb.
Arbusto o árbol. Nativa. 500-1700 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Cestrum mariquitense Kunth

Sin.: *Cestrum laevigatum* Schltld. f.
flaviflora Chodat & Hassl., *Cestrum*
mariquitense Kunth var. *latifolium*
Standl. & C.V. Morton, *Cestrum*
paraguayense Hassl. ex Francey, nom.
nud., *Cestrum sendtnerianum* Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN,
CEN, CON, COA, ITA, PAI, SPE).

Cestrum parqui L'Hér.

Sin.: *Cestrum campestre* Griseb.,
Cestrum parqui L'Hér. f. *heterophyllum*
Kuntze, *Cestrum parqui* L'Hér. var.
glabriusculum Kuntze, *Cestrum parqui*
L'Hér. var. *longiflorum* Francey, *Cestrum*
parqui L'Hér. var. *oranense* Scolnik,
Cestrum parqui L'Hér. var. *poepigii* Dunal,
Cestrum virgatum Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS,
RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
BRA(RGS). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA,
COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI,
RME, IDE, JFE). PRY(COA, PHA).
URY(ROC, TAC).

Cestrum reflexum Sendtn.

Sin.: *Cestrum floribundum* Britton,
Cestrum reflexum Sendtn. var.
densiflorum Francey
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área
del proyecto).

Cestrum schlechtendalii G. Don

Sin.: *Cestrum coriaceum* Miers
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR).

Cestrum strictum Schott ex Sendtn.

Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cestrum strigilatum Ruiz & Pav.

Sin.: *Cestrum calycinum* Kunth var.
tenuiflorum Francey, *Cestrum calycinum*
Kunth, *Cestrum calycinum* Willd. ex
Roem. & Schult., hom. illeg., *Cestrum*
strigilatum Ruiz & Pav. var. *calycinum*
Kuntze, *Cestrum strigilatum* Ruiz &
Pav. var. *laxiflorum* Kuntze, *Cestrum*
viridiflorum Hook.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,
JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA,
CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI,
PHA). URY(RIV, TAC).

Cestrum tubulosum Sendtn.

Sin.: *Cestrum rojasianum* Hassl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Cestrum velutinum Hiern

Sin.: *Cestrum albotomentosum*
Dammer ex Francey
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(AMA).

Combera Sandwith

Combera minima (Phil.) Sandwith
Sin.: *Nicotiana minima* Phil., *Petunia*
minima (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 1800 m.
Países: CHL(LLA).

Combera paradoxa Sandwith

Hierba. Endémica. 1800-3200 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, AIS).

Datura L.

Datura ferox L.

Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA,
LRI, MIS, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE,
SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, LBO, MAU,
BIO, LLA, RME). PRY(ÑEE). URY(CAS,
COL, FLA, MON, SJO).

Datura innoxia Mill.

Sin.: *Datura guayaquilensis* Kunth
Hierba. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN,
MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).
BRA(Fuera del área del proyecto).
CHL(ANT, ATA). PRY(APY, CON, PAI).
URY(ART).

Datura stramonium L.

Sin.: *Datura inermis* Juss., *Datura*
tarapacana Phil., *Datura tatula* L.
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, NEU, SAL,
SJU). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP,
TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, RME, JFE).

Dunalia Kunth, nom. cons.

Dunalia brachyacantha Miers
Sin.: *Acnistus achalensis* Hieron.
ex Seckt, nom. nud., *Dierbachia*
brachyacantha (Miers) Kuntze,
Dierbachia lycioides (Miers) Kuntze f.

achalensis Kuntze, hom. illeg., *Dierbachia*
senticosa (Miers) Kuntze, *Dunalia*
achalensis Dammer, *Dunalia hauthalii*
Dammer, *Dunalia herzogii* Dammer,
Dunalia pflanzii Dammer, *Dunalia*
senticosa Miers

Arbusto o árbol. Nativa. 1500-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Dunalia spinosa (Meyen) Dammer

Sin.: *Atropa spinosa* Meyen, *Dierbachia*
lycioides (Miers) Kuntze, *Dunalia lycioides*
Miers, *Grabowskia meyeniana* (Nees)
Walp.
Arbusto. Nativa. 3500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Dysochroma Miers

Dysochroma longipes (Sendtn.) Miers

Sin.: *Markea longipes* (Sendtn.)
Cuatrec., *Solandra longipes* Sendtn.
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Dysochroma viridiflorum (Sims)

Miers
Sin.: *Solandra viridiflora* Sims
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Eriolarynx (Hunz.) Hunz.

Eriolarynx iochromoides (Hunz.)

Hunz.
Sin.: *Vassobia iochromoides* Hunz.
Arbusto o árbol. Endémica. 1500-0 m.
Países: ARG(CAT).

Eriolarynx lorentzii (Dammer) Hunz.

Sin.: *Acnistus lorentzii* Dammer,
Dunalia lorentzii (Dammer) Sleumer,
Vassobia lorentzii (Dammer) Hunz.
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Exodeconus Raf.

Exodeconus flavus (I.M. Johnst.)

Axelius & D'Arcy
Sin.: *Cacabus flavus* I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 2000-2500 m.
Países: CHL(TAR).

Exodeconus integrifolius (Phil.) Axelius

Sin.: *Cacabus integrifolius* Phil.
Hierba. Endémica. 2300-4000 m.
Países: ARG(CAT). CHL(AYP, TAR,
ANT, ATA).

Exodeconus pusillus (Bitter) Axelius
Sin.: *Cacabus pusillus* Bitter
Hierba. Nativa. 2500-3000 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Fabiana Ruiz & Pav.

Fabiana bryoides Phil.
Arbusto. Nativa. 2900-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
CHL(AYP, ANT, ATA, COQ).

Fabiana densa J. Remy
Sin.: *Fabiana clarenii* Dammer
Arbusto. Nativa. 2700-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
CHL(AYP, TAR, ATA).

Fabiana denudata Miers
Sin.: *Fabiana hieronymi* Niederl.
Arbusto. Endémica. 300-3700 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN,
NEU, RNE, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Fabiana foliosa (Speg.) S.C. Arroyo
Sin.: *Fabiana patagonica* Speg. var.
foliosa Speg.
Subarbusto. Endémica. 0-2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Fabiana friesii Dammer
Arbusto. Endémica. 1400-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Fabiana imbricata Ruiz & Pav.
Sin.: *Fabiana araucana* Phil., *Fabiana
biflora* J. Remy, *Fabiana imbricata* Ruiz
& Pav. var. *biflora* (J. Remy) Reiche,
Fabiana lutescens Phil.
Arbusto. Endémica. 2600-3200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU,
BIO, ARA, LRI, RME).

Fabiana nana (Speg.) S.C. Arroyo
Sin.: *Fabiana patagonica* Speg. var.
nana Speg.
Subarbusto. Endémica. 1500-1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Fabiana patagonica Speg.
Sin.: *Fabiana glandulosa* Dusén,
Fabiana kurtziana Dammer, *Fabiana
patagonica* Speg. var. *typica* Speg.,
nom. inval., *Fabiana peckii* Niederl. var.
patagonica (Speg.) Hauman
Arbusto. Nativa. 200-4100 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI,
MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR, TUC).

Fabiana peckii Niederl.
Sin.: *Fabiana patagonica* Speg. var.
brachyloba Speg., *Fabiana patagonica*
Speg. var. *gracilis* Speg.
Arbusto. Endémica. 200-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI,
MEN, NEU, RNE, SJU, SCR).

Fabiana punensis S.C. Arroyo
Arbusto. Endémica. 2200-4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Fabiana ramulosa (Wedd.) Hunz. &
Barboza
Sin.: *Fabiana densa* J. Remy var.
ramulosa Wedd., *Fabiana deserticola*
Reiche
Arbusto. Nativa. 3200-4000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Fabiana squamata Phil.
Arbusto. Nativa. 3000-4400 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Fabiana stephanii Hunz. & Barboza
Arbusto. Nativa. 3000-3900 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Fabiana viscosa Hook. & Arn.
Sin.: *Fabiana barrioi* Phil., *Fabiana
coridifolia* Dunal, *Fabiana ericoides* Dunal
Arbusto. Endémica. 100-2200 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Iochroma Benth., nom. cons.

Iochroma australe Griseb.
Sin.: *Acnistus australis* (Griseb.)
Griseb., *Acnistus australis* (Griseb.)
Griseb. var. *grandiflorus* Griseb.,
Dierbachia australis (Griseb.) Kuntze,
Dunalia australis (Griseb.) Sleumer
Arbusto. Nativa. 1000-3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Jaborosa Juss.

Jaborosa ameghinoi (Speg.) Macloskie
& Dusén
Sin.: *Himeranthus ameghinoi* Speg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU).

Jaborosa bergii Hieron.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI,
RNE, SJU, SLU).

Jaborosa cabreræ Barboza
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT).

Jaborosa caulescens Gillies & Hook.
var. **bipinnatifida** (Dunal) Reiche
Sin.: *Jaborosa bipinnatifida* (Dunal)
Meigen, *Lonchostigma caulescens* (Gillies &
Hook.) Dunal var. *bipinnatifidum* Dunal,
Lonchostigma bipinnatifidum (Dunal) Phil.,
Trechonaetes bipinnatifida Phil.
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN,
SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ, RME).

Jaborosa caulescens Gillies & Hook.
var. **caulescens**
Sin.: *Dorystigma caulescens* (Gillies &
Hook.) Miers, *Lonchostigma caulescens*
(Gillies & Hook.) Dunal
Hierba. Nativa. 2000-4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(AYP,
TAR, ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Jaborosa chubutensis Barboza &
Hunz.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU).

Jaborosa integrifolia Lam.
Sin.: *Jaborosa bonariensis* J.F. Gmel.,
nom. illeg., *Jaborosa integrifolia* Lam.
var. *brasiliensis* Dunal
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,
DFE, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE).
BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, PAI,
PHA). URY(RNO).

Jaborosa kurtzii Hunz. & Barboza
Sin.: *Jaborosa andina* Kurtz, nom. nud.
Hierba. Endémica. 500-1700 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).

Jaborosa laciniata (Miers) Hunz. &
Barboza
Sin.: *Trechonaetes bridgesii* Dunal,
Trechonaetes laciniata Miers
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Jaborosa lanigera (Phil.) Hunz. &
Barboza
Sin.: *Lonchostigma lanigerum* (Phil.)
Cabrera, *Trechonaetes lanigera* Phil.
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

Jaborosa leucotricha (Speg.) Hunz.

Sin.: *Jaborosa leptophylla* Speg.,
Trechonaetes leucotricha Speg.
Hierba. Endémica. 500-3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN,
RNE, SJU, TUC).

Jaborosa magellanica (Griseb.) Dusén

Sin.: *Himeranthus magellanicus*
Griseb., *Jaborosa magellanica* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Jaborosa odonelliana Hunz.

Hierba. Endémica. 700-1000 m.
Países: ARG(SAL, SDE, TUC).

Jaborosa oxipetala Speg.

Hierba. Endémica. 1100-1800 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Jaborosa parviflora (Phil.) Hunz. & Barboza

Sin.: *Jaborosa floccosa* Dammer,
Lonchostigma parviflorum (Phil.)
Cabrera, *Trechonaetes machucana* Phil.,
Trechonaetes parviflora Phil.
Hierba. Nativa. 3700-4500 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP,
TAR, ANT, ATA).

Jaborosa pinnata Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Jaborosa reflexa Phil.

Sin.: *Jaborosa araucana* Phil., *Jaborosa desiderata* Speg.
Hierba. Endémica. 200-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Jaborosa riojana Hunz. & Barboza

Hierba. Endémica. 3000-4300 m.
Países: ARG(CAT, LRI). CHL(ANT).

Jaborosa rotacea (Lillo) Hunz. & Barboza

Sin.: *Trechonaetes rotacea* Lillo
Hierba. Nativa. 1500-3700 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Jaborosa runcinata Lam.

Sin.: *Himeranthus erosus* Miers,
Himeranthus runcinatus (Lam.) Endl. var.
brevipes Dunal, *Himeranthus runcinatus*
(Lam.) Endl. var. *longipes* Dunal,
Himeranthus runcinatus (Lam.) Endl.,
Himeranthus tridentatus Miers, *Jaborosa sinuata* Larrañaga, nom. inval., *Jaborosa*

tridentata (Miers) Hicken

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI,
SFE). URY(FLA, MAL, MON, SJO).

Jaborosa sativa (Miers) Hunz. & Barboza

Sin.: *Trechonaetes floribunda* Phil.,
Trechonaetes sativa Miers
Hierba. Endémica. 300-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Jaborosa squarrosa (Miers) Hunz. & Barboza

Sin.: *Dorystigma crispum* Miers,
Dorystigma squarrosus Miers, *Jaborosa leiocalyx* Dammer, *Lonchostigma crispum* (Miers) Dunal, *Lonchostigma squarrosus* (Miers) Dunal
Hierba. Nativa. 3000-4700 m.
Países: ARG(JUU, LRI). CHL(AYP,
TAR, ATA).

Jaborosa volkmannii (Phil.) Reiche

Sin.: *Dolichosiphon volkmanni* Phil.
Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO, ARA).

Latua Phil.**Latua pubiflora** (Griseb.) Baill.

Sin.: *Latua venenosa* Phil., *Lycioplesium pubiflorum* Griseb.
Arbusto o arbolito. Endémica. 300-900 m.
Países: CHL(ARA, LLA).

Leptoglossis Benth.**Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.

Sin.: *Cyclostigma tenue* Phil.,
Leptoglossis schwenckioides Benth.
var. *linifolia* (Miers) Monach.,
Leptoglossis schwenckioides Benth. var.
tenuis (Phil.) Monach., *Leptoglossis schwenckioides* Benth. var. *xerophytica* Monach., *Leptoglossis tenuis* (Phil.) B.D. Jacks., *Nierembergia linifolia* Miers, *Nierembergia linifolia* Miers var. *macrophylla* Dunal, *Nierembergia linifolia* Miers var. *parviflora* Dunal, *Salpiglossis linifolia* (Miers) Wettst., *Salpiglossis tenuis* (Phil.) Wettst., *Schwenckia tenuis* (Phil.) Griseb.

Hierba. Endémica. 300-1200 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI,
MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Lycianthes (Dunal) Hassl., nom. cons.**Lycianthes asarifolia** (Kunth & Bouché) Bitter

Sin.: *Solanum asarifolium* Kunth & Bouché, *Solanum chodatianum* Huber, *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. f. *chacoense* Hassl., *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. f. *decadantum* Hassl., *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. f. *lilaciniflora* Hassl., *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. var. *asarifolium* (Kunth & Bouché) Hassl., *Solanum violaeifolium* Schott ex Spreng. var. *majus* Dunal
Hierba. Nativa. 500-1400 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR). PRY(CEN, GUA).

Lycianthes fasciculata (Rusby) Bitter

Sin.: *Brachistus fasciculatus* Rusby, *Lycianthes saltensis* Bitter, *Solanum fundatum* C.V. Morton, *Solanum fasciculatum* (Rusby) Bitter, nom. illeg., *Solanum saltense* (Bitter) C.V. Morton, hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 500-1500 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC).

Lycianthes lycioides (L.) Hassl.

Sin.: *Lycianthes lycioides* (L.) Hassl. subsp. *parvifolia* (Wedd.) Bitter, *Lycianthes lycioides* (L.) Hassl. var. *brachyphylla* Bitter, *Solanum lyciiforme* Dammer, *Solanum lycioides* L. var. *parvifolium* Wedd., *Solanum lycioides* L., *Solanum pseudolycioides* Rusby
Arbusto. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC). PRY(APA).

Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter

Sin.: *Lycianthes australe* (C.V. Morton) Hunz. & Barboza, comb. illeg., *Lycianthes pseudolycioides* Bitter, *Solanum australe* C.V. Morton, *Solanum pauciflorum* Vahl, *Solanum pseudolycioides* Chodat & Hassl., hom. illeg., *Solanum urbanum* Morong var. *ovatifolium* Chodat
Arbusto. Nativa. 200-300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter

Sin.: *Solanum corniculatum* Hieron., *Solanum muticum* N.E. Br., *Solanum rantonnetii* Carrière, *Solanum urbanum*

Morong var. *foliosum* Chodat, *Solanum urbanum* Morong var. *nervosum* Chodat, *Solanum urbanum* Morong var. *subtomentosum* Chodat, *Solanum urbanum* Morong var. *typicum* Chodat, nom. inval., *Solanum urbanum* Morong Arbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(COS, DFE, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

Lycianthes repens (Spreng.) Bitter
Sin.: *Boldoa repens* Spreng.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(CEN).

Lycium L.

Lycium ameghinoi Speg.
Sin.: *Grabowskia ameghinoi* (Speg.) Speg., *Grabowskia spegazzinii* Dusén, *Lycium durispina* Dusén
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Lycium americanum Jacq.
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *paraguariense* Hassl., *Lycium confusum* R.E. Fr., *Lycium floribundum* Dunal var. *pruinatum* (Griseb.) A. Terracc., *Lycium pruinatum* Griseb., *Lycium subtridentatum* Dammer, *Lycium tweediana* Griseb. var. *pruinatum* (Griseb.) Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, PHA).

Lycium athium Bernardello
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(FOR, SDE).

Lycium barbarum L.
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Lycium boerhaviaefolium L. f.
Sin.: *Citharexylum mendocinum* Phil., *Grabowskia boerhaviifolia* (L. f.) Schltld., *Grabowskia cuneifolia* Dunal, *Grabowskia duplicata* Arn. var. *balansae* Chodat, *Grabowskia duplicata* Arn. var. *grandiflora* Dammer, *Grabowskia duplicata* Arn., *Grabowskia glauca* (Phil.) I.M. Johnst., *Grabowskia lindleyi* Miers, *Grabowskia megalosperma* Speg., *Grabowskia obscura* Dunal, *Grabowskia*

obtusata Arn., *Grabowskia schizocalyx* Dammer, *Grabowskia schlechtendalii* Sendtn., *Lycium glaucum* Phil.
Arbusto. Nativa. 300-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(TAR, ANT). PRY(APY, CEN, CON, PHA). URY(PAY, RNO).

Lycium bridgesii (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello
Sin.: *Alona microphylla* Miers, *Phrodus breviflorus* Phil., *Phrodus bridgesii* Miers, *Phrodus microphyllus* (Miers) Miers, *Phrodus nodosus* Miers, *Phrodus pendulus* (Phil.) Phil., *Phrodus thymifolius* (Phil.) Phil.
Arbusto. Endémica. 500-2900 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Lycium cestroides Schltld.
Sin.: *Acnistus cestroides* (Schltld.) Miers, *Lycium cestroides* Schltld. var. *normale* A. Terracc.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). URY(MON, SJO).

Lycium chanar Phil.
Sin.: *Lycium crassispira* Phil., *Lycium decipiens* Dammer
Arbusto. Nativa. 2000-4200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

Lycium chilense Miers ex Bertero var. **chilense**
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *normale* Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *gelidum* (Wedd.) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *odonelli* F.A. Barkley, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *ovatum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *petiolatum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *tomentosulum* Phil., *Lycium fimbriatum* C.L. Hitchc., *Lycium gelidum* Wedd., *Lycium grevilleanum* Miers, *Lycium hunzikeri* F.A. Barkley, *Lycium lasiopetalum* Speg., *Lycium pulverulentum* Skottsb., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *chilense* (Bertero) Kuntze, *Lycium scoparium* Miers subsp. *normale* A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *affine* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *divaricatum* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *grevilleanum* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *lineare* (Miers) A. Terracc., *Lycium*

scoparium Miers
Arbusto. Endémica. 0-4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Lycium chilense Miers ex Bertero var. **comberi** (C.L. Hitchc.) Bernardello
Sin.: *Lycium comberi* C.L. Hitchc.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Lycium chilense Miers ex Bertero var. **confertifolium** (Miers) F.A. Barkley
Sin.: *Lycium melanopotamicum* Niederl., *Lycium patagonicum* Miers var. *melanopotamicum* (Niederl.) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *confertifolium* Miers
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(COQ, VAL, RME).

Lycium chilense Miers ex Bertero var. **descolei** F.A. Barkley
Sin.: *Lycium comberi* C.L. Hitchc. var. *donatii* F.A. Barkley, *Lycium patagonicum* Miers, *Lycium patagonicum* Miers var. *normale* A. Terracc., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *patagonicum* (Miers) Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, RNE, SCR). PRY(PHA).

Lycium chilense Miers ex Bertero var. **filifolium** (Gillies ex Miers) Bernardello
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *capillare* (Miers) A. Terracc., *Lycium filifolium* Gillies ex Miers
Arbusto. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SDE, SJU, SLU). CHL(ATA, COQ).

Lycium chilense Miers ex Bertero var. **glaberrimum** Phil.
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero f. *glaberrimum* (Phil.) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *gracile* (Meyen) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *glabriusculum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *gracile* (Meyen) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *peruviense* F.A. Barkley, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rhadinum* (Phil.) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *venosum*

(Phil.) Reiche, *Lycium gracile* Meyen, *Lycium rhadinum* Phil., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *gracile* (Meyen) Kuntze, *Lycium sessiliflorum* Phil., *Lycium sparrei* F.A. Barkley, *Lycium venosum* Phil.
Arbusto. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ, VAL).

Lycium chilense Miers ex Bertero var. **minutifolium** (Miers) F.A. Barkley
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero f. *minutifolium* (Miers) A. Terracc., *Lycium filifolium* Gillies ex Miers var. *minutifolium* Miers, *Lycium microphyllum* Phil., hom. illeg., *Lycium minutifolium* Phil., *Lycium philippianum* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE). CHL(ATA, COQ).

Lycium chilense Miers ex Bertero var. **vergarae** (Phil.) Bernardello
Sin.: *Lycium vergarae* Phil.
Arbusto. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU). CHL(TAR, ATA, COQ).

Lycium ciliatum Schltld.
Sin.: *Lycium argentinum* Hieron., *Lycium scoparium* Miers var. *argentinum* (Hieron.) Griseb., *Lycium schickendantzii* F.A. Barkley, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *meyeri* F.A. Barkley, *Lycium ciliatum* Schltld. var. *cordobense* Kuntze, *Lycium ciliatum* Schltld. var. *heteromorphum* Kuntze, *Lycium ciliatum* Schltld. var. *saltense* Kuntze, *Lycium erosum* Miers, *Lycium floribundum* Dunal var. *ciliatum* (Schltld.) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *argentinum* (Hieron.) A. Terracc., *Withania pulvinata* Dunal, *Lycium ignarum* Miers, *Lycium floribundum* Dunal var. *grisebachii* A. Terracc., *Salpichroa ciliata* (Schltld.) Miers
Arbusto. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Lycium ciliatum x cestroides Hieron.
Sin.: *Lycium hitchcockii* F.A. Barkley
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(COR).

Lycium ciliatum x elongatum Bernardello
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(COR).

Lycium cuneatum Dammer
Sin.: *Lycium cuneatum* Dammer var. *rojassii* F.A. Barkley, *Lycium pruinosum* Griseb. var. *puberulum* Griseb.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE). PRY(APY, AMA, PHA).

Lycium cyathiforme C.L. Hitchc.
Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Lycium deserti Phil.
Sin.: *Lycium breanum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc., p.p., *Lycium pachyclados* Phil.
Arbusto. Nativa. 500-3200 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Lycium distichum Meyen
Sin.: *Grabowskia disticha* (Meyen) Nees ex Dunal
Arbusto. Nativa. 2000 m.
Países: CHL(TAR).

Lycium elongatum Miers
Sin.: *Lycium confertum* Miers, *Lycium floribundum* Dunal var. *confertum* (Miers) A. Terracc., *Lycium floribundum* Dunal var. *elongatum* (Miers) A. Terracc.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU, TUC).

Lycium elongatum x cestroides Hieron.
Sin.: *Lycium hieronymi* F.A. Barkley
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR).

Lycium fuscum Miers
Sin.: *Lycium elongatum* Miers var. *riojana* Hieron. ex Hauman, nom. nud., *Lycium gilliesianum* Miers var. *fuscum* (Miers) F.A. Barkley, *Lycium longiflorum* Phil. var. *riojana* Hieron. ex Hauman, nom. nud., *Lycium miersii* F.A. Barkley, *Lycium penduliflorum* I.M. Johnst., *Lycium scoparium* Miers var. *fuscum* (Miers) A. Terracc.
Arbusto. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).

Lycium gilliesianum Miers
Sin.: *Lycium acanthocladium* Speg., *Lycium elongatum* Miers var. *longiflorum* (Phil.) Hauman, *Lycium floribundum* Dunal var. *gilliesianum* (Miers) A. Terracc., *Lycium gilliesianum* Miers var. *longitubum* (Dammer) C.L. Hitchc.,

Lycium gilliesianum Miers var. *ruiz-lealii* F.A. Barkley, *Lycium longiflorum* Phil., *Lycium longitubum* Dammer, *Lycium patagonicum* Miers var. *longiflorum* (Phil.) A. Terracc., *Lycium rigidum* Gillies ex Miers, *Lycium wilkesii* Ball
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SCR).

Lycium glomeratum Sendtn.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR). PRY(APY, APA, CEN, PHA).

Lycium humile Phil.
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc., p.p.
Arbusto. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA, RME).

Lycium infaustum Miers
Sin.: *Lycium floribundum* Dunal var. *infaustum* (Miers) A. Terracc., *Lycium halophilum* Speg., hom. illeg., *Lycium tweedianum* Griseb.
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Lycium leiostemum Wedd.
Sin.: *Lycium biesei* F.A. Barkley
Arbusto. Nativa. 1000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Lycium minutifolium J. Remy
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc., p.p., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *implexum* (Miers) A. Terracc., *Lycium horridum* Phil., *Lycium implexum* Miers, *Lycium rhudolphi* Speg.
Arbusto. Endémica. 1000-3200 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Lycium morongii Britton
Sin.: *Lycium morongii* Britton f. *parvifolium* C.L. Hitchc., *Lycium morongii* Britton var. *indutum* Hassl., p.p., *Lycium morongii* Britton var. *parvifolium* (C.L. Hitchc.) F.A. Barkley, *Lycium morongii* Britton var. *typicum* Hassl., nom. inval.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Lycium nodosum Miers

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *heterophyllum* (Hassl.) Hassl., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *nodosum* (Miers) A. Terracc., *Lycium tweedianum* Griseb. var. *heterophyllum* Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, TUC). PRY(APY, PHA).

Lycium pubitubum C.L. Hitchc.

Sin.: *Lycium minutifolium* J. Remy var. *major* Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(SCR).

Lycium rachidocladum Dunal

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *rachidocladum* (Dunal) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rachidocladum* (Dunal) A. Terracc.
Arbusto. Endémica. 0-3500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Lycium repens Speng.

Sin.: *Lycium o'donellii* F.A. Barkley
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Lycium schreiteri F.A. Barkley

Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU, TUC).

Lycium stenophyllum J. Remy

Sin.: *Lycium fragosum* Miers
Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Lycium tenuispinosum Miers var.

calycinum (Griseb.) Bernardello
Sin.: *Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc., *Lycium scoparium* Miers var. *calycinum* Griseb.
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(LLA).

Lycium tenuispinosum Miers var.

friesii (Dammer) C.L. Hitchc.
Sin.: *Lycium friesii* Dammer, *Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc. var. *sleumeri* F.A. Barkley, *Lycium venturii* C.L. Hitchc.
Arbusto. Endémica. 300-3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, TUC).

Lycium tenuispinosum Miers var. **tenuispinosum**

Sin.: *Lycium chubutense* Dusén,

Lycium floribundum Dunal var. *normale* A. Terracc., *Lycium floribundum* Dunal var. *tenuispinosum* (Miers) A. Terracc., *Lycium floribundum* Dunal, hom. illeg., *Lycium patagonicum* Miers var. *pubescens* (Miers) A. Terracc., *Lycium pubescens* Miers, *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *floribundum* (Dunal) Kuntze, *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *pubescens* (Miers) Kuntze, *Lycium spinulosum* Miers var. *parvifolium* Gillies ex Miers, *Lycium spinulosum* Miers

Arbusto. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). PRY(APY).

Lycium vimineum Miers

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *vimineum* (Miers) A. Terracc.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE). URY(DUR).

Melananthus Walp.**Melananthus multiflorus** Carvalho

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS).

Nicandra Adans., nom. cons.**Nicandra physalodes** (L.) Gaertn.

Sin.: *Atropa physalodes* L.
Hierba. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, COQ, VAL, RME).

Nicotiana L.**Nicotiana acaulis** Speng.

Sin.: *Petunia humifusa* Speng., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Nicotiana acuminata (Graham) Hook. var. **acuminata**

Sin.: *Nicotiana copiapina* Phil., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *oligantha* (Phil.) Millán, *Nicotiana modesta* Phil., *Nicotiana oligantha* Phil., *Nicotiana uspallatensis* Phil., *Petunia acuminata* Graham
Hierba. Endémica. 100-3400 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Nicotiana acuminata (Graham) Hook. var. **compacta** Goodsp.

Hierba. Endémica. 2700-3500 m.
Países: CHL(COQ).

Nicotiana acuminata (Graham) Hook. var. **multiflora** (Phil.) Reiche

Sin.: *Nicotiana angustifolia* Ruiz & Pav., *Nicotiana heterophylla* Phil., *Nicotiana multiflora* Phil.
Hierba. Endémica. 100-3100 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Nicotiana alata Link & Otto

Sin.: *Nicotiana affinis* Hort ex Moore, *Nicotiana alata* Link & Otto var. *grandiflora* Comes, *Nicotiana persica* Lindl.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA). URY(FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TYT).

Nicotiana ameghinoi Speng.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Nicotiana azambujae L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(SCA).

Nicotiana bonariensis Lehm.

Sin.: *Nicotiana angustifolia* Ruiz & Pav. var. *parviflora* Dunal, *Nicotiana bonariensis* Lehm. var. *spathulata* Sendtn., *Nicotiana flexuosa* Jeffrey, *Nicotiana tristis* Sm.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, CAS, CLA, MAL, RIV, ROC, SJO, SOR).

Nicotiana cordifolia Phil. subsp. **cordifolia**

Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(JFE).

Nicotiana cordifolia Phil. subsp. **sanctaclarae** Danton

Arbusto. Endémica.
Países: CHL(JFE).

Nicotiana corymbosa J. Remy var. **australis** Goodsp.

Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SJU, SCR).

Nicotiana corymbosa J. Remy var. **corymbosa**

Sin.: *Nicotiana corymbosa* J. Remy var. *typica* Millán, nom. inval., *Nicotiana monticola* Dunal, *Nicotiana oulophylla* Dunal, *Nicotiana scapigera* Phil.
Hierba. Nativa. 700-3700 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SCR). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, MAG, RME).

Nicotiana forgetiana Hemsl.

Hierba. Endémica. 700-1300 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Nicotiana glauca Graham

Sin.: *Acnistus virgatus* Griseb., *Nicotiana glauca* Graham f. *lateritia* Lillo, *Nicotiana glauca* Graham var. *angustifolia* Comes, *Nicotiana glauca* Graham var. *decurrens* Comes, *Nicotiana glauca* Graham var. *grandiflora* Comes, *Nicotiana glauca* Graham var. *typica* Millán, nom. inval., *Nicotidendron glauca* (Graham) Griseb., *Siphaulax glabra* Raf.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APY, BOQ, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(MON, SAO, SOR).

Nicotiana langsдорffii Weinm.

Sin.: *Nicotiana ruralis* Vell.
Hierba. Nativa. 200-2000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Nicotiana linearis Phil.

Sin.: *Collomia patagonica* Speg., *Nicotiana alpina* Dunal var. *deserticola* Speg., *Nicotiana alpina* Dunal var. *patagonica* (Speg.) Speg., *Nicotiana corymbosa* J. Remy var. *deserticola* (Speg.) Speg.
Hierba. Nativa. 200-2100 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU). CHL(COQ, MAU).

Nicotiana longibracteata Phil.

Sin.: *Nicotiana frigida* Phil.
Hierba. Nativa. 3400-3700 m.
Países: ARG(CAT, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA).

Nicotiana longiflora Cav.

Sin.: *Nicotiana acutiflora* A. St.-Hil., *Nicotiana acuta* Griseb., *Nicotiana*

longiflora Cav. var. *acutiflora* (A. St.-Hil.) Comes, *Nicotiana longiflora* Cav. var.

breviflora Comes, nom. inval., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *grandifolia* Morong
Hierba. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, CON, COA, PAI, PHA). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

Nicotiana miersii J. Remy var.**lychnoides** (J. Remy) Goodsp.

Sin.: *Nicotiana floribunda* (Phil.) Reiche, *Nicotiana lychnoides* J. Remy, *Waddingtonia floribunda* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Nicotiana miersii J. Remy var. **miersii**

Sin.: *Nicotiana collae* Phil., *Nicotiana coquimbana* Phil., *Nicotiana parviflora* Phil., hom. illeg., *Petunia viscosa* Colla, hom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-1400 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Nicotiana mutabilis Stehmann & Semir

Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).

Nicotiana noctiflora Hook.

Sin.: *Dittostigma mendocinum* Phil., *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *noctiflora* (Hook.) Millán, *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *typica* Millán, nom. inval., *Nicotiana mendocina* Phil.
Hierba. Nativa. 0-2400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SDE, TUC).

Nicotiana otophora Griseb.

Sin.: *Lehmannia otophora* (Griseb.) Comes, *Nicotiana friesii* Dammer ex R.E. Fr.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500-2100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Nicotiana paa Mart. Crov.

Sin.: *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *albiflora* (Comes) Millán, *Nicotiana noctiflora* Hook. var. *albiflora* Comes
Hierba. Nativa. 100-1600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). CHL(ATA).

Nicotiana pauciflora J. Remy

Sin.: *Nicotiana caudigera* Phil., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *pauciflora* (J. Remy) Comes
Hierba. Endémica. 500-2500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Nicotiana petunioides (Griseb.)

Millán
Sin.: *Fabiana petunioides* Griseb., *Nicotiana crispa* Phil., hom. illeg., *Nicotiana deserticola* Speg., *Nicotiana pampasana* Kuntze, *Nicotiana philippii* Millán
Hierba. Nativa. 3700-4600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA).

Nicotiana plumbaginifolia Viv.

Sin.: *Nicotiana cavanillesii* Dunal
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, JUJ, SAL). PRY(APY).

Nicotiana solanifolia Walp.

Sin.: *Nicotiana breviloba* Phil., *Nicotiana cardiophylla* Phil.
Arbustiforme. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Nicotiana spegazzini Millán

Hierba. Endémica. 0-3200 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

Nicotiana sylvestris Speg. & Comes

Hierba. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Nicotiana tabacum L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(JFE, IPA). PRY(PAI).

Nicotiana undulata Ruiz & Pav.

Sin.: *Nicotiana brachysolen* Phil., *Nicotiana chilensis* Millán, nom. inval.
Hierba. Nativa. 2700-4200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(AYP, TAR, ANT).

Nierembergia Ruiz & Pav.**Nierembergia aristata** D. Don

Sin.: *Nierembergia angustifolia* Kunth var. *intermedia* Hassl., *Nierembergia aristata* D. Don var. *stricta* (Miers)

Griseb., *Nierembergia prostrata* Millán, *Nierembergia stricta* Miers

Hierba. Endémica. 0-1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(SCA). PRY(PHA). URY(FLA).

Nierembergia browallioides Griseb.

Sin.: *Nierembergia graveolens* A. St.-Hil. var. *grandiflora* Kuntze, *Nierembergia parodii* Millán
Hierba. Nativa. 1500-3300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Nierembergia calycina Hook.

Sin.: *Siphonema longiflora* Raf., nom. inval.
Hierba. Endémica. 200-1200 m.
Países: ARG(ERI). URY(CAS, COL, FLO, SOR).

Nierembergia ericoides Miers

Hierba. Endémica. 200-900 m.
Países: ARG(BAI).

Nierembergia graveolens A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(CLA, SOR).

Nierembergia hatschbachii A.

Cocucci & Hunz.
Hierba. Endémica. 200-800 m.
Países: BRA(PAR).

Nierembergia linariaefolia Graham var. **glabriuscula** (Dunal) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia aristata* D. Don var. *montana* Griseb., *Nierembergia hippomanica* Miers var. *densa* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *dubia* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *elata* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *glabriuscula* Dunal, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *montana* (Griseb.) Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *violacea* Millán, *Nierembergia montana* (Griseb.) Hieron.

Hierba. Endémica. 1200-2400 m.
Países: ARG(CAT, COR, SLU).

Nierembergia linariaefolia Graham var. **linariaefolia**

Sin.: *Nierembergia angustifolia* Kunth var. *filicaulis* (Lindl.) Hassl., *Nierembergia caerulea* Miers, *Nierembergia filicaulis* Lindl., *Nierembergia gracilis* Hook. var. *guaranitica* Millán, *Nierembergia gracilis* Hook., *Nierembergia hippomanica* Miers var. *caerulea* (Miers) Millán,

Nierembergia hippomanica Miers var. *mesopotamica* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *scabridopilosa* Dunal, nom. inval., *Nierembergia hippomanica* Miers var. *typica* Millán, nom. inval., *Nierembergia hippomanica* Miers, *Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *glaberrima* Millán, *Siphonema filicaulis* (Lindl.) Raf., *Stimenes gracilis* (Hook.) Raf.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SLU, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(ITA, PHA). URY(MON).

Nierembergia linariaefolia Graham var. **pampeana** (Millán) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia hippomanica* Miers var. *pampeana* Millán
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SLU).

Nierembergia linariaefolia Graham var. **pinifolioides** (Millán) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia hippomanica* Miers var. *crispa* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *pinifolioides* Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *rubricaulis* Millán
Hierba. Endémica. 500-1200 m.
Países: ARG(COR, SLU, SDE).

Nierembergia micrantha Cabrera

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV, TYT).

Nierembergia pinifolia Miers

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS). URY(ART, CLA, LAV, MAL).

Nierembergia pulchella Gillies ex Miers var. **longistyla** (Millán) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia longistyla* Millán
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).

Nierembergia pulchella Gillies ex Miers var. **macrocalyx** (Millán) A. Cocucci & Hunz.

Sin.: *Nierembergia famatinensis* Millán, *Nierembergia grandiflora* Millán, *Nierembergia macrocalyx* Millán, *Nierembergia pilosa* Millán, *Nierembergia vivacissima* Millán

Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).

Nierembergia pulchella Gillies ex Miers var. **pulchella**

Sin.: *Nierembergia andina* Millán, *Nierembergia boliviana* Millán, *Nierembergia canescens* Millán, *Nierembergia catamarcensis* Millán
Hierba. Nativa. 1000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU).

Nierembergia repens Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA, LRI).

Nierembergia rigida Miers

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, LPA, LRI, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SLU, TUC).

Nierembergia riograndensis Hunz. & Cocucci

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Nierembergia rivularis Miers

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, SAL). URY(COL, SOR).

Nierembergia scoparia Sendtn.

Sin.: *Nierembergia angustifolia* Kunth f. *frutescens* (Durieu) Kuntze, *Nierembergia frutescens* Durieu, *Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *breviflora* Millán, *Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *longipedicelata* Millán
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, RIV, SJO, SOR, TAC).

Nierembergia tandilensis (Kuntze) Cabrera

Sin.: *Nierembergia ericoides* Miers var. *tandilensis* (Kuntze) Millán, *Nierembergia graveolens* A. St.-Hil. var. *tandilensis* Kuntze
Hierba. Endémica. 700-1900 m.
Países: ARG(BAI).

Nierembergia tucumanensis Millán

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Nierembergia veitchii Hook.

Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Nolana L. f.

Nolana acuminata (Miers) Miers ex Dunal

Sin.: *Nolana angustifolia* Phil., *Nolana lanceolata* (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana navarri* Phil., *Nolana rupestris* Phil., *Sorema acuminata* Miers, *Sorema lanceolata* Miers

Hierba. Endémica. 0-900 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Nolana adansonii (Roem. & Schult.) I.M. Johnst.

Sin.: *Tula adansonii* Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: CHL(TAR).

Nolana albescens (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia albescens* (Phil.)

I.M. Johnst., *Dolia albescens* Phil., *Dolia albescens* Phil. ex Wettst.

Arbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Nolana aplocaryoides (Gaudich.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alona pusilla* Phil., *Bargemontia aplocaryoides* (Gaudich.) I.M. Johnst., *Leloutrea aplocaryoides* Gaudich., *Nolana sedifolia* Poepp. var. *aplocaryoides* (Gaudich.) Mesa

Hierba. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Nolana arenicola I.M. Johnst.

Hierba. Nativa. 200-700 m.

Países: CHL(TAR).

Nolana baccata (Lindl.) Dunal

Sin.: *Alona baccata* Lindl., *Gubleria baccata* Gaudich., *Nolana alba* Phil.

Nolana carrera Phil. var. *leucantha* (Phil.) Reiche, *Nolana carrera* Phil., *Nolana leucantha* Phil., *Nolana linearis* (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana stans* Phil., *Periloba stans* (Phil.) I.M. Johnst., *Sorema linearis* Miers

Hierba. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Nolana balsamiflua (Gaudich.) Mesa

Sin.: *Alona balsamiflua* Gaudich.

Subarbusto. Endémica. 500 m.

Países: CHL(ANT).

Nolana carnosa (Lindl.) Miers ex Dunal

Sin.: *Alona carnosa* Lindl., *Alona lepidophylla* (Phil.) Reiche *Alona sedifolia*

Phil., *Alona vernicosa* Phil., *Nolana rostrata* (Lindl.) Miers ex Dunal var. *carnosa* (Lindl.) Mesa, *Osteocarpus lepidophyllus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(TAR, ATA).

Nolana clivicola (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia clivicola* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana coelestis (Lindl.) Miers ex Dunal

Sin.: *Alona coelestis* Lindl., *Alona coelestis* Lindl. var. *ericifolia* (Miers) F.H. Brandt, *Alona ericifolia* Miers, *Alona floribunda* Phil., *Nolana ericifolia* (Miers) Miers ex Dunal

Subarbusto. Endémica. 100-800 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Nolana crassulifolia Poepp.

Sin.: *Alibrexia philippii* A. Braun, *Alibrexia rupicola* Miers, *Alona micrantha* Phil., *Alona tomentosa* Lindl., *Bargemontia crassulifolia* (Poepp.) I.M. Johnst., *Bargemontia eremobia* (Phil.) I.M. Johnst., *Bargemontia micrantha* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia atacamensis* F.H. Brandt, *Dolia canescens* Phil., *Dolia crassifolia* Kuntze, *Dolia eremobia* Phil., *Dolia grandiflora* Phil., *Dolia micrantha* (Phil.) Reiche, *Dolia philippii* (Braun) F.H. Brandt, *Dolia rupicola* (Miers) Benth. & Hook. ex Wettst., *Dolia tomentosa* (Lindl.) Benth., *Nolana grossulifolia* Kunze ex Gay

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-1500 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Nolana deflexa (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia deflexa* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana diana M.O. Dillon

Hierba. Endémica. 300-600 m.

Países: CHL(ANT).

Nolana diffusa I.M. Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(ANT).

Nolana divaricata (Lindl.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alona rigida* Phil., *Alona xerophila* Phil., *Aplocarya divaricata*

Lindl., *Bargemontia clavata* (Miers) I.M.

Johnst., *Bargemontia divaricata* (Lindl.)

I.M. Johnst., *Dolia clavata* Miers var.

puberula (Phil.) Reiche, *Dolia clavata*

Miers, *Dolia divaricata* (Lindl.) Hook. &

Arn. ex W. Brandt, *Dolia hirsutula* Phil.,

Dolia puberula Phil., *Nolana peruviana*

(Gaudich.) I.M. Johnst. subsp. *divaricata*

(Lindl.) Mesa, *Osteocarpus clavatus* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-4100 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Nolana elegans (Phil.) Reiche

Sin.: *Sorema elegans* Phil.

Hierba. Endémica. 0-600 m.

Países: CHL(ANT, ATA, VAL).

Nolana filifolia (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alona filifolia* (Hook. & Arn.) I.M.

Johnst., *Convolvulus filifolius* Hook. &

Arn., *Nolana chastenayana* Gaudich.,

Alona glandulosa Lindl., *Ipomoea*

cruckshanskii Choisy, *Fabiana grandiflora*

Dunal, *Nolana glandulosa* (Lindl.) Miers

ex Dunal, *Osteocarpus foliolosus* Phil.,

Alona chastenayana (Gaudich.) Gaudich.

ex Wettst.

Subarbusto. Endémica. 0-1300 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Nolana foliosa (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia foliosa* (Phil.) I.M.

Johnst., *Dolia foliosa* Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(TAR).

Nolana glauca (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia glauca* I.M. Johnst.,

Nolana peruviana (Gaudich.) I.M.

Johnst. var. *glauca* (I.M. Johnst.) Mesa

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Nolana gracillima (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia gracillima* I.M.

Johnst., *Nolana sedifolia* Poepp. subsp.

confinis (I.M. Johnst.) Mesa, p.p.

Hierba. Nativa. 0-2400 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Nolana incana (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alibrexia incana* Phil., *Dolia incana* (Phil.) Wettst., *Dolia incana* (Phil.)

Benth. & Hook. ex F.H. Brandt

Arbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana inconspicua (I.M. Johnst.)
I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia inconspicua* I.M.
Johnst.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT).

Nolana intonsa I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 200-800 m.
Países: CHL(TAR).

Nolana jaffuelii I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Nolana lachimbensis M.O. Dillon &
Luebert
Arbusto. Endémica. 500 m.
Países: CHL(ANT).

Nolana leptophylla (Miers) I.M.
Johnst.
Sin.: *Alona deserticola* Phil., *Alona
dubia* Phil., *Bargemontia deserticola*
(Phil.) I.M. Johnst., *Bargemontia
leptophylla* (Miers) I.M. Johnst., *Dolia
deserticola* (Phil.) W. Brandt, *Dolia
leptophylla* Miers, *Velpeaulia alibrexioides*
Gaudich.
Hierba. Endémica. 0-4200 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Nolana linearifolia Phil.
Sin.: *Bargemontia linearifolia* (Phil.)
I.M. Johnst., *Nolana decemloba* Herzog
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana lycioides I.M. Johnst.
Sin.: *Bargemontia confinis* I.M. Johnst.,
Nolana sedifolia Poepp. subsp. *confinis*
(I.M. Johnst.) Mesa
Hierba. Nativa. 200-2100 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Nolana mollis (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Alona mollis* Phil., *Bargemontia mollis*
(Phil.) I.M. Johnst., *Dolia macrocalyx* Phil.,
Nolana leptophylla (Miers) I.M. Johnst.
subsp. *mollis* (Phil.) Mesa
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana onoana M.O. Dillon & M.
Nakaz.
Hierba. Endémica. 100-600 m.
Países: CHL(ANT).

Nolana paradoxa Lindl.
Sin.: *Nolana atriplicifolia* D. Don var.

cuneifolia Dunal, *Nolana atriplicifolia* D.
Don, *Nolana geminiflora* Phil., *Nolana
grandiflora* Herzog, *Nolana grandiflora*
Lehm. ex G. Don, *Nolana litoralis* (Miers)
Dunal, *Nolana napiformis* Phil., *Nolana
ochrocarpa* Phil. ex Wettst., *Nolana
paradoxa* Lindl. subsp. *atriplicifolia* (D.
Don) Mesa, *Nolana paradoxa* Lindl. var.
glaberrima Dunal, *Nolana paradoxa* Lindl.
var. *violacea* Van Houtte, *Nolana petiolata*
(Phil.) Reiche, *Periloba paradoxa* (Lindl.)
Raf., *Sorema atriplicifolia* (D. Don) Lindl.,
Sorema litoralis Miers, *Sorema paradoxa*
(Lindl.) Lindl. var. *atriplicifolia* (D. Don)
Miers, *Sorema paradoxa* (Lindl.) Lindl.,
Sorema petiolata Phil.
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, MAU,
BIO, ARA, LRI, LLA).

Nolana parviflora (Phil.) Phil.
Sin.: *Periloba parviflora* (Phil.) I.M.
Johnst., *Sorema parviflora* Phil.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana patachensis J. Hepp & M.O.
Dillon
Hierba. Endémica. 700-800 m.
Países: CHL(TAR).

Nolana patula (Phil.) Mesa ex M.O.
Dillon
Sin.: *Alona patula* Phil., *Nolana patula*
(Phil.) Mesa, comb. illeg.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).

Nolana peruviana (Gaudich.) I.M.
Johnst.
Sin.: *Bargemontia peruviana* Gaudich.,
Dolia macrocalyx Phil. ex Herzog
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Nolana philippiana M.O. Dillon &
Luebert
Hierba. Endémica. 700-1600 m.
Países: CHL(ANT).

Nolana pterocarpa Phil. ex Wettst.
Sin.: *Nolana debilis* Phil., *Nolana
pulchella* Phil. ex Reiche, *Nolana
pterosperma* Phil., *Periloba pterosperma*
(Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(TAR, ATA).

Nolana ramosissima I.M. Johnst.
Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT).

Nolana reichei M.O. Dillon & Arancio
Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(COQ).

Nolana rhombifolia Martic. &
Quezada
Hierba. Endémica. 1800-1900 m.
Países: CHL(AYP).

Nolana rostrata (Lindl.) Miers ex
Dunal
Sin.: *Alona fonckii* Phil., *Alona
miersii* Phil., *Alona obtusa* Lindl., *Alona
phylicifolia* Phil., *Alona rostrata* Lindl.,
Nolana lepidophylla (Phil.) I.M. Johnst.,
Nolana obtusa (Lindl.) Miers ex Dunal,
Osteocarpus brevifolius Phil., *Osteocarpus
rostratus* (Lindl.) Phil., *Rayera teretifolia*
Gaudich.
Subarbusto. Endémica. 500-4100 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Nolana rupicola Gaudich.
Sin.: *Alona longifolia* Lindl., *Nolana
bracteosa* (Phil.) Reiche, *Nolana glutinosa*
(Phil.) Reiche, *Nolana longifolia* (Lindl.)
Miers ex Dunal, *Nolana triquetra* Koch &
Bouché, *Periloba longifolia* (Lindl.) I.M.
Johnst., *Sorema bracteosa* Phil., *Sorema
glutinosa* Phil., *Sorema longifolia* (Lindl.)
Miers
Hierba. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Nolana salsoloides (Lindl.) I.M.
Johnst.
Sin.: *Dolia salsoloides* Lindl.,
Osteocarpus spathulatus Phil.
Arbusto. Endémica. 0-900 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Nolana sedifolia Poepp.
Sin.: *Alibrexia brevifolia* Phil.,
Bargemontia sedifolia (Poepp.) I.M.
Johnst., *Dolia brevifolia* (Phil.) Phil.
ex Wettst., *Dolia vermiculata* Lindl.,
Fabiana lanuginosa Hook. & Arn., *Salsola
glomerulata* Meyen
Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL).

Nolana sessiliflora Phil.
Sin.: *Nolana sessiliflora* Phil. ex I.M.
Johnst., *Periloba sessiliflora* (Phil.) I.M.
Johnst.
Hierba. Endémica. 2000-2100 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana sphaerophylla (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon

Sin.: *Alona flaccida* Phil., *Alona sphaerophylla* Phil., *Bargemontia flaccida* (Phil.) I.M. Johnst., *Bargemontia sphaerophylla* (Phil.) I.M. Johnst., *Nolana flaccida* (Phil.) I.M. Johnst.
Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana stenophylla I.M. Johnst.

Sin.: *Alona stenophylla* (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Arbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana tarapacana (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Dolia tarapacana* Phil.
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Nolana tocopillensis (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sin.: *Bargemontia tocopillensis* I.M. Johnst.
Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(ANT).

Nolana villosa (Phil.) I.M. Johnst.

Sin.: *Alibrexia villosa* Phil., *Dolia villosa* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 0-1700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Nolana werdermannii I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Pantacantha Speg.

Pantacantha ameghinoi Speg.

Arbusto. Endémica. 1700-2400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).

Petunia Juss.

Petunia altiplana Ando & Hashim.

Hierba. Endémica. 700-1400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Petunia axillaris (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **axillaris**

Sin.: *Nicotiana axillaris* Lam. var. *nyctaginiflora* (Juss.) Kuntze, *Nicotiana axillaris* Lam. var. *propinqua* (Miers) Kuntze, *Nicotiana axillaris* Lam., *Nicotiana nyctaginiflora* (Juss.) Lehm., *Petunia nyctaginiflora* Juss., *Petunia*

propinqua Miers, *Stimoryne axillaris* (Lam.) Wijsman

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, LPA).
BRA(RGS, SCA). URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR, TYT).

Petunia axillaris (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **parodii** (Steere) Cabrera

Sin.: *Petunia parodii* Steere, *Stimoryne axillaris* (Lam.) Wijsman subsp. *parodii* (Steere) Wijsman

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE). BRA(RGS). PRY(APY). URY(ART, COL, DUR, FLO, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).

Petunia axillaris (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **subandina** Ando

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Petunia bajeensis Ando & Hashim.

Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: BRA(RGS).

Petunia bonjardinensis Ando & Hashim.

Hierba. Endémica. 900-1400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Petunia exserta Stehmann

Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: BRA(RGS).

Petunia inflata R.E. Fr.

Sin.: *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. subsp. *inflata* (R.E. Fr.) Wijsman, *Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman subsp. *inflata* (R.E. Fr.) Wijsman

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA, ITA, ÑEE).

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **depauperata** (R.E. Fr.) Stehmann

Sin.: *Petunia dichotoma* Sendtn., *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. var. *depauperata* (R.E. Fr.) L.B. Sm. & Downs, *Petunia violacea* Lindl. subsp. *depauperata* R.E. Fr.
Hierba. Endémica. 100-1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ROC).

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **integrifolia**

Sin.: *Nicotiana integrifolia* (Hook.) Kuntze, *Nierembergia punicea* Sendtn., *Petunia littoralis* L.B. Sm. & Downs, *Petunia phoenicea* D. Don ex Loudon, *Petunia riograndensis* Ando & Hashim., *Petunia violacea* Lindl., *Salpiglossis integrifolia* Hook., *Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, COA). URY(RNO, ROC).

Petunia interior Ando & Hashim.

Hierba. Endémica. 200-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Petunia occidentalis R.E. Fr.

Sin.: *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. subsp. *occidentalis* (R.E. Fr.) Wijsman, *Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman subsp. *occidentalis* (R.E. Fr.) Wijsman
Hierba. Endémica. 600-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Petunia patagonica (Speg.) Millán

Sin.: *Nierembergia patagonica* Speg.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Petunia reitzii L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Stimoryne reitzii* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman
Hierba. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(SCA).

Petunia saxicola L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica. 900 m.
Países: BRA(SCA).

Petunia scheideana L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Petunia guarapuavensis* Ando & Hashim., *Stimoryne scheideana* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman
Hierba. Endémica. 200-1300 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).

Petunia secreta Stehmann & Semir

Hierba. Endémica. 300-400 m.
Países: BRA(RGS).

Physalis L.

Physalis angulata L.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, PHA, SPE). URY(RIV).

Physalis cordata Mill.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Physalis lagascae Roem. & Schult.

Sin.: *Physalis parviflora* Lag., nom. illeg., *Physalis rydbergii* Rusby
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(JUJ). BRA(Fuera del área del proyecto).

Physalis nicandroides Schlttdl.

Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: PRY(PAI).

Physalis peruviana L.

Hierba. Nativa.
Países: CHL(AYP, COQ, VAL, LBO, RME, JFE).

Physalis pruinosa L. var. **argentina**

J.M. Toledo & Barboza
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC). PRY(APY).

Physalis pubescens L. var.**hygrophila** (Mart.) Dunal

Sin.: *Physalis hygrophila* Mart., *Physalis neesiana* Sendtn.
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA).

Physalis pubescens L. var. **pubescens**

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, CAN, CEN, GUA, PHA). URY(ART, RNO, SAO, SOR, TYT).

Physalis subilsiana J.M. Toledo

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(SAL). PRY(APY, PHA).

Physalis victoriana J.M. Toledo

Hierba. Endémica. 800-900 m.
Países: ARG(JUJ).

Physalis viscosa L.

Sin.: *Physalis mendocina* Phil.
Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ATA, COQ, VAL, BIO, ARA, RME, IPA). PRY(APY, BOQ, CEN, COA, PHA, SPE). URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR).

Reyesia Gay**Reyesia cactorum** (I.M. Johnst.)

D'Arcy
Sin.: *Salpiglossis cactorum* I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 2900-3500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Reyesia chilensis Gay

Sin.: *Pteroglossis laxa* Miers, *Reyesia laxa* (Miers) D'Arcy, *Salpiglossis brachysiphon* I.M. Johnst., *Salpiglossis chilensis* (Gay) Wettst.
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Reyesia juniperoides (Werderm.)

D'Arcy
Sin.: *Salpiglossis juniperoides* Werderm.
Hierba. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Reyesia parviflora (Phil.) Hunz.

Sin.: *Salpiglossis parviflora* Phil.
Hierba. Endémica. 2900-3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, RME).

Salpichroa Miers**Salpichroa organifolia** (Lam.) Baill.

Sin.: *Atropa organifolia* (Lam.) Desf., *Atropa rhomboidea* Hook., *Jaborosa montevidensis* Casar., *Physalis organifolia* Lam., *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *divaricata* Miers, *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *mollis* Dammer, *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *pubescens* Miers, *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers, *Salpichroma rhomboidea* (Hook.) Miers var. *mollis* Dammer
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). CHL(VAL, BIO). PRY(AMA, CEN, ÑEE, PAI). URY(ROC).

Salpichroa ramosissima Miers

Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Salpichroa scandens Dammer

Arbusto. Nativa. 2000-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). CHL(AYP).

Salpichroa tristis Miers var.**lehmanni** (Dammer) Keel

Sin.: *Salpichroma alata* Dammer, *Salpichroma foetida* Dammer, *Salpichroma lehmanni* Dammer
Arbolito. Nativa. 3500-4500 m.
Países: ARG(JUJ). CHL(TAR).

Salpichroa tristis Miers var. **tristis**

Sin.: *Salpichroma mandoniana* Wedd., *Salpichroa mandonianum* Wedd. var. *tucumanensis* Griseb.
Arbusto. Nativa. 2000-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Salpiglossis Ruiz & Pav.**Salpiglossis sinuata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Salpiglossis atropurpurea* Graham, *Salpiglossis barclayana* Sweet, *Salpiglossis coccinea* Lindl., *Salpiglossis fulva* Courtois, *Salpiglossis picta* Sweet, *Salpiglossis purpurea* Miers var. *atropurpurea* (Graham) Miers, *Salpiglossis purpurea* Miers, *Salpiglossis straminea* Hook. var. *picta* (Sweet) Hook. *Salpiglossis straminea* Hook.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Salpiglossis spinescens Clos

Arbusto. Endémica. 700-2800 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Schizanthus Ruiz & Pav.**Schizanthus alpestris** Poepp.

Sin.: *Schizanthus alpestris* Poepp. var. *glandulifera* Phil., *Schizanthus angustifolius* Phil., *Schizanthus glanduliferus* Phil.
Hierba. Endémica. 900-2900 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Schizanthus candidus Lindl.

Sin.: *Schizanthus albiflorus* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Schizanthus coccineus (Phil.) J.M.

Watson
Sin.: *Schizanthus grahami* Gillies ex Hook. var. *coccinea* Phil.
Hierba. Endémica. 2600-2800 m.

Schizanthus grahamii Gillies ex Hook.

Sin.: *Schizanthus araucanus* Phil., *Schizanthus diazii* Phil., *Schizanthus gilliesii* Phil., *Schizanthus incanus* Hort. ex C. Morr., *Schizanthus retusus* Hook.

Hierba. Endémica. 1200-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Schizanthus hookeri Gillies ex Graham

Sin.: *Schizanthus calycosus* Phil.
Hierba. Endémica. 1300-3000 m.
Países: ARG(NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Schizanthus integrifolius Phil.

Hierba. Endémica. 700-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Schizanthus lacteus Phil.

Sin.: *Schizanthus sanromanii* Phil.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Schizanthus laetus Phil.

Sin.: *Schizanthus fallax* I.M. Johnst.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA).

Schizanthus litoralis Phil.

Sin.: *Schizanthus splendens* Sudzuki
Hierba. Endémica. 100-800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).

Schizanthus parvulus Sudzuki

Hierba. Endémica. 300-600 m.
Países: CHL(COQ).

Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav.

Sin.: *Schizanthus gayanus* Phil., *Schizanthus gracilis* Clos, *Schizanthus heterophyllus* Phil., *Schizanthus humilis* Phil., *Schizanthus lacinosus* Phil., *Schizanthus latifolius* Phil., *Schizanthus lilacinus* Kunze, *Schizanthus pinnatifidus* Lindl., *Schizanthus tenuifolius* Phil., *Schizanthus tenuis* Phil.

Hierba. Endémica. 100-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Schizanthus porrigens Graham

Sin.: *Schizanthus floribundus* Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Schizanthus tricolor Grau & Gronbach

Sin.: *Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav. var. *humilis* Lindl.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Schwenckia D. Royen ex L.

Schwenckia americana D. Royen ex L. var. **americana**

Sin.: *Schwenckia americana* D. Royen ex L. var. *hirta* (Klotzsch) Carvalho, *Schwenckia hirta* Klotzsch
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CEN, COA, PAI, PHA).

Schwenckia americana L. var. **angustifolia** Schmidt

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Schwenckia curviflora Benth.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MAL).

Schwenckia grandiflora Benth.

Sin.: *Schwenckia ulei* Dammer
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).

Schwenckia juncoides Chodat

Hierba palustre. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Schwenckia volubilis Benth.

Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Sclerophylax Miers

Sclerophylax adnatifolia Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1900-2400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Sclerophylax arnottii Miers

Sin.: *Sclerophylax gilliesii* Miers
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

Sclerophylax caducifructus Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, SJU).

Sclerophylax cocuccii Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).

Sclerophylax cuyanus Di Fulvio

Hierba. Endémica. 700-1000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Sclerophylax cynocrambe (Griseb.) Griseb.

Sin.: *Sterrhymenia cynocrambe* Griseb., *Sclerophylax cynocrambe* (Griseb.) Kuntze, comb. superfl.
Hierba. Endémica. 1500-2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI).

Sclerophylax difulvioi Del Vitto & Petenatti

Subarbusto. Endémica. 700-900 m.
Países: ARG(SLU).

Sclerophylax hunzikeri Di Fulvio

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, LRI).

Sclerophylax kurtzii Di Fulvio

Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).

Sclerophylax lorentzianus O. Hoffm.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI). URY(RNO).

Sclerophylax ruiz-lealii Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1000-2100 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Sclerophylax spinescens Miers

Sin.: *Tetragonia horrida* Britton
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(APY, PHA).

Sclerophylax tenuicaulis Di Fulvio

Hierba. Endémica. 1600-2600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Sclerophylax trispermus Di Fulvio

Hierba. Endémica. 300-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

Sessea Ruiz & Pav.

Sessea regnellii Taub.

Sin.: *Cestrum capsulare* Carvalho & Schnoor
Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Sessea vestioides (Schltdl.) Hunz.

Sin.: *Cestrum vestioides* Schltdl., *Sessea vischeri* Chodat, *Sessepopsis vestioides* (Schltdl.) Bitter, *Sessepopsis vischeri* (Chodat) Hassl.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS).
PRY(PAI). URY(SAO, TAC).

Solanum L.**Solanum abutiloides** (Griseb.) Bitter & Lillo

Sin.: *Cyphomandra abutiloides* Griseb., *Solanum hibiscifolium* Rusby
Arbusto o árbol. Nativa. 500-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Solanum acaule Bitter

Sin.: *Solanum acaule* Bitter f. *incuyo* Ochoa, *Solanum acaule* Bitter subsp. *punae* (Juz.) Hawkes & Hjert., *Solanum acaule* Bitter var. *caulescens* Bitter, *Solanum acaule* Bitter var. *checcae* Hawkes, *Solanum acaule* Bitter var. *punae* (Juz.) Hawkes, *Solanum acaule* Bitter var. *subexinterruptum* Bitter, *Solanum depexum* Juz. var. *chorruense* Hawkes, *Solanum depexum* Juz., *Solanum punae* Juz., *Solanum schreiteri* Bukasov, nom. nud., *Solanum uyunense* Cárdenas
Hierba. Nativa. 2000-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Solanum aculeatissimum Jacq.

Arbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(GUA).

Solanum adscendens Sendtn.

Sin.: *Solanum amarantoides* Dunal var. *hirtellum* Douglas ex Lindl.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(CON).

Solanum adpersum Witasek

Arbusto. Nativa. 0-100 m.
Países: BRA(PAR).

Solanum x aemulans Bitter & Wittm.

Sin.: *Solanum acaule* Bitter subsp. *aemulans* (Bitter & Wittm.) Hawkes & Hjert., *Solanum acaule* Bitter var. *aemulans* (Bitter & Wittm.) Correll, *Solanum x indunii* Okada & Clausen
Hierba. Endémica. 2600-4100 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).

Solanum aenictum C.V. Morton

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). PRY(GUA, ITA).

Solanum affine Sendtn.

Sin.: *Solanum jatrophifolium* Dunal, *Solanum micans* Witasek, *Solanum spectabile* Steud. var. *subhastatum* Sendtn.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum alatirameum Bitter

Arbusto. Endémica. 800-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum albidum Dunal

Sin.: *Solanum incanum* Ruiz & Pav., hom. illeg., *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. subsp. *carabayense* Bitter, *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. var. *dryophyllum* Bitter, *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. var. *tardecavescens* Bitter, *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg., *Solanum paniculatum* L. var. *chulumani* Dunal
Árbol. Nativa. 400-2500 m.
Países: ARG(SAL).

Solanum aligerum Schltdl.

Sin.: *Solanum grossum* C.V. Morton, *Solanum paraneurotrichum* Bitter, nom. nud., *Solanum pterocladum* Van Heurck & Müll. Arg.
Arbusto o arbolito. Nativa. 1500-3300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum aloysiifolium Dunal

Sin.: *Solanum bermejense* Bitter, *Solanum cochabambense* Bitter, *Solanum collectaneum* C.V. Morton, *Solanum filiforme* Ruiz & Pav. var. *lanceolatum* Kuntze, *Solanum filiforme* Ruiz & Pav. var. *subdentatum* Kuntze, *Solanum lorentzii* Bitter, *Solanum lorentzii* Bitter var. *montigenum* C.V. Morton, *Solanum lorentzii* Bitter var. *tucumanicum* Bitter, *Solanum montigenum* (C.V. Morton) Cabrera, *Solanum oligodontum* Bitter, *Solanum polystrichostylum* Bitter var. *lorentzii* (Bitter) Edmonds
Hierba o arbusto. Nativa. 400-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SFE, TUC).

Solanum alphonsei Dunal

Sin.: *Solanum alphonsei* Dunal var. *taguatagua* Dunal, *Solanum germainii* Phil., *Solanum tenuicaule* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-3000 m.
Países: CHL(LBO, MAU).

Solanum alternatopinnatum Steud.

Sin.: *Solanum juciri* Mart. ex Sendtn.

f. *paraguariense* Hassl., *Solanum juciri* Mart. ex Sendtn., *Solanum oleraceum* Vell., hom. illeg., *Solanum viridipes* Dunal var. *intermedium* Hassl. *Solanum viridipes* Dunal
Hierba. Nativa. 100-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA).

Solanum americanum Mill.

Sin.: *Solanum adventitium* Polg., *Solanum americanum* Mill. var. *nodiflorum* (Jacq.) Edmonds, *Solanum curtipes* Bitter, *Solanum nigrum* L. subsp. *aguaraquiya* Sendtn. *Solanum nigrum* L. var. *americanum* (Mill.) O.E. Schulz, *Solanum nigrum* L. var. *virginicum* L., *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *acuminatum* Chodat, *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *petiolostrum* Dunal, *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *sapucayense* Chodat, *Solanum nodiflorum* Jacq., *Solanum oleraceum* Dunal, *Solanum sciaphilum* Bitter, *Solanum tenellum* Bitter

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, SJU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(ANT, COQ, VAL, LBO, RME). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(MON, TAC).

Solanum amygdalifolium Steud.

Sin.: *Solanum angustifolium* Lam. var. *macrophyllum* Dunal, *Solanum angustifolium* Lam., hom. illeg., *Solanum brittonianum* Morong, *Solanum handelianum* Morong, *Solanum persicifolium* Mart., hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(COL, MON, TAC).

Solanum angustifidum Bitter

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).

Solanum annuum C.V. Morton

Sin.: *Solanum micrantherum* Cabrera
Hierba. Endémica. 2100-3300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Solanum anoacanthum Sendtn.

Arbusto. Nativa. 500-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Solanum apaense Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Solanum aparadense L.A. Mentz & M. Nee

Arbusto. Endémica. 800-1300 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Solanum apiahense Witasek

Hierba. Nativa. 600-900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum arenarium Sendtn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).

Solanum argenteum Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR). CHL(JFE).

Solanum argentinum Bitter & Lillo

Sin.: *Solanum argentinum* Bitter & Lillo var. *chroniotrichum* Bitter, *Solanum chroniotrichum* (Bitter) C.V. Morton
Arbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APA, APY, BOQ, CAA, CEN, PHA).

Solanum aridum Morong

Sin.: *Solanum aridum* Morong var. *pusillum* Hassl., *Solanum conditum* C.V. Morton, *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *ovalifolium* Kuntze
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Solanum atriplicifolium Gillies ex

Nees
Sin.: *Solanum haarupii* Bitter
Hierba. Nativa.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Solanum atropurpureum Schrank

Sin.: *Solanum atropurpureum* Schrank var. *aureimicans* Bitter, *Solanum atropurpureum* Schrank var. *diaphanadenium* Bitter, *Solanum atropurpureum* Schrank var. *ochrochlorum* Dunal, *Solanum vernicatum* Lindl.
Hierba o arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE). URY(TAC).

Solanum berthaultii Hawkes

Sin.: *Solanum berthaultii* Hawkes f. *zudaniense* (Cárdenas) Correll, *Solanum litusinum* Ochoa, *Solanum tarijense* Hawkes var. *pojoense* (Cárdenas) Correll, *Solanum tarijense* Hawkes, *Solanum trigalense* Cárdenas, *Solanum vallegrandense* Cárdenas var. *pojoense* Cárdenas, *Solanum vallegrandense* Cárdenas, *Solanum x flavoviridens* Ochoa, *Solanum zudaniense* Cárdenas
Hierba. Nativa. 1200-4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Solanum betaceum Cav.

Sin.: *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendtn., *Cyphomandra crassifolia* (Ortega) J.F. Macbr., hom. illeg., *Cyphomandra crassifolia* (Ortega) Kuntze, *Pionandra betacea* (Cav.) Miers, *Solanum crassifolium* Ortega, hom. illeg.
Árbol. Nativa. 500-3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum bistellatum L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum boliviense Dunal

Sin.: *Solanum alticola* Bitter var. *xanthotrichum* Hawkes, *Solanum alticola* Bitter, *Solanum astleyi* Hawkes & Hjert., *Solanum boliviense* Dunal subsp. *astleyi* (Hawkes & Hjert.) D. M. Spooner, M. Ugarte & P. W. Scroch, *Solanum decurrentilobum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum ellipsifolium* Cárdenas & Hawkes, *Solanum megistacrolobum* Bitter f. *purpureum* Ochoa, *Solanum megistacrolobum* Bitter subsp. *toralapanum* (Cárdenas & Hawkes) R.B. Giannattasio & D.M. Spooner, *Solanum megistacrolobum* Bitter var. *toralapanum* (Cárdenas & Hawkes) Ochoa, *Solanum megistacrolobum* Bitter, *Solanum sanctae-rosae* Hawkes, *Solanum tilcareense* Hawkes, *Solanum toralapanum* Cárdenas & Hawkes var. *subintegrifolium* Cárdenas & Hawkes, *Solanum toralapanum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum ureyi* Cárdenas
Hierba. Nativa. 1600-4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum bonariense L.

Sin.: *Solanum arborescens* Moench, *Solanum astroites* Jacq., *Solanum fastigiatum* Willd., *Solanum saponaceum* Dunal var. *uruguense* Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, MIS). BRA(PAR). PRY(ITA). URY(CLA, MON, SOR).

Solanum brachyantherum Phil.

Sin.: *Solanum geissei* Phil.
Hierba. Endémica. 100-800 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, IDE).

Solanum brevicaule Bitter

Sin.: *Solanum alandiae* Cárdenas, *Solanum anomalocalyx* Hawkes var. *brachystylum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum anomalocalyx* Hawkes var. *llallaguanianum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum anomalocalyx* Hawkes var. *murale* Cárdenas & Hawkes, *Solanum anomalocalyx* Hawkes, *Solanum avilesii* Hawkes & Hjert., *Solanum boliviense* Dunal subsp. *virgultorum* Bitter, *Solanum brevimucronatum* Hawkes, *Solanum candelarianum* Cárdenas, hom. illeg., *Solanum colominense* Cárdenas, *Solanum famatinae* Bitter & Wittm., *Solanum gourlayi* Hawkes subsp. *pachytrichum* (Hawkes) Hawkes & Hjert., *Solanum gourlayi* Hawkes subsp. *saltense* A.M. Clausen & K.A. Okada, *Solanum gourlayi* Hawkes subsp. *vidaurrei* (Cárdenas) Hawkes & Hjert., *Solanum gourlayi* Hawkes, *Solanum hondelmannii* Hawkes & Hjert., *Solanum hoopesii* Hawkes & Okada, *Solanum incamayoense* K.A. Okada & A.M. Clausen, *Solanum lapazense* Hawkes, *Solanum leptophyes* Bitter f. *gourlayi* (Hawkes) Correll, *Solanum leptophyes* Bitter, *Solanum liriunianum* Cárdenas & Hawkes, *Solanum mollepujroense* Cárdenas & Hawkes, *Solanum oplocense* Hawkes, *Solanum pachytrichum* Hawkes, *Solanum puberulo-fructum* Correll, *Solanum ruiz-zeballosii* Cárdenas, *Solanum setulosistylum* Bitter, *Solanum sleumeri* Correll, *Solanum sparsipilum* (Bitter) Juz. & Bukasov var. *llallaguanianum* (Cárdenas & Hawkes) Correll, *Solanum sparsipilum* (Bitter) Juz. & Bukasov, *Solanum spegazzinii* Bitter, *Solanum subandigenum* Hawkes var. *camarguense* Cárdenas, *Solanum sucrense* Hawkes, *Solanum torrecillasense* Cárdenas, *Solanum tuberosum* L. subsp. *sparsipilum* Bitter, *Solanum ugentii* Hawkes & Okada, *Solanum vidaurrei* Cárdenas, *Solanum virgultorum* (Bitter) Cárdenas & Hawkes
Hierba. Nativa. 1500-4200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Solanum brevipedunculatum Rusby
Arbusto. Nativa. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Solanum x brucheri Correll
Sin.: *Solanum x viirsooi* K.A. Okada & A.M. Clausen
Hierba. Endémica. 3100-4000 m.
Países: ARG(JUJ).

Solanum bullatum Vell.
Sin.: *Solanum macropus* Dunal
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum caavurana Vell.
Sin.: *Solanum caavurana* Vell. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Solanum caavurana* Vell. f. *pauciflora* Chodat, *Solanum megalocarpon* C.V. Morton
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Solanum caesium Griseb.
Sin.: *Solanum oranense* Bitter
Hierba. Endémica. 400-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Solanum calileguae Cabrera
Arbusto. Endémica. 1600-1900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Solanum campaniforme Roem. & Schult.
Sin.: *Solanum caeruleum* Vell., *Solanum dusenii* L.B. Sm. & Downs, *Solanum microrbitum* L.B. Sm. & Downs
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum canoasense L.B. Sm. & Downs
Sin.: *Solanum cataractae* L.B. Sm. & Downs
Arbusto. Endémica. 1300-1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum capsicoides All.
Sin.: *Solanum arrebenta* Vell., *Solanum ciliare* Willd., *Solanum ciliatum* Lam., *Solanum sinuatifolium* Vell., *Solanum sphaerocarpum* Moric.
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE).

Solanum cassioides L.B. Sm. & Downs
Arbusto o arbolito. Endémica. 300-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum castaneum Carvalho
Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: BRA(PAR).

Solanum chacoense Bitter
Sin.: *Solanum arnezii* Cárdenas, *Solanum bitteri* Hassl., nom. superfl., *Solanum boergeri* Bukasov, *Solanum caipipendense* Cárdenas, *Solanum calvescens* Bitter, *Solanum chacoense* Bitter f. *caipipendense* (Cárdenas) Correll, *Solanum chacoense* Bitter f. *gibberulosum* (Juz. & Bukasov) Correll, *Solanum chacoense* Bitter f. *glabrescens* (Hassl.) Hassl., *Solanum chacoense* Bitter f. *plurijugum* Hassl., nom. nud., *Solanum chacoense* Bitter subsp. *muelleri* (Bitter) Hawkes, *Solanum chacoense* Bitter subsp. *subtilius* (Bitter) Hawkes, *Solanum chacoense* Bitter var. *angustisectum* (Hassl.) Hassl., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Hook. f., p.p., *Solanum cordobense* Bukasov, *Solanum cuevoanum* Cárdenas, *Solanum dolichostigma* Bukasov, nom. nud., *Solanum emmeae* Juz. & Bukasov, *Solanum garciae* Juz. & Bukasov, *Solanum gibberulosum* Juz. & Bukasov, *Solanum guaraniticum* Hassl. f. *glabrescens* Hassl., *Solanum guaraniticum* Hassl. f. *plurijugum* Hassl., *Solanum guaraniticum* Hassl. var. *angustisectum* Hassl., *Solanum guaraniticum* Hassl., hom. illeg., *Solanum horovitzii* Bukasov var. *glabristylum* Hawkes, nom. nud., *Solanum horovitzii* Bukasov var. *multijugum* Hawkes, *Solanum horovitzii* Bukasov, *Solanum jamesii* Torr. var. *grandifrons* Bitter, *Solanum jujuyense* Hawkes, *Solanum knappei* Juz. & Bukasov, *Solanum laplaticum* Bukasov, *Solanum limense* Correll, *Solanum muelleri* Bitter f. *densipilosum* Correll, *Solanum muelleri* Bitter, *Solanum parodii* Juz. & Bukasov, *Solanum premaglia* L. Planch., nom. nud., *Solanum saltense* Hawkes, *Solanum schickii* Juz. & Bukasov, *Solanum subtilius* Bitter, *Solanum tuberosum* L. subsp. *guaraniticum* Bertoni, *Solanum tuberosum* L. subsp. *yanacochense* Ochoa, *Solanum tuberosum* L. var. *glabriusculum* Dunal, *Solanum yanacochense* (Ochoa) Gorbat.
Hierba. Nativa. 0-3700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS,

SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(SOR).

Solanum chamaesarachidium Bitter
Sin.: *Chamaesaracha boliviensis* Dammer
Hierba. Nativa. 2100-4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Solanum chenopodioides Lam.
Sin.: *Solanum aguaraquiya* Piso ex Sendtn., *Solanum chenopodifolium* Dunal, *Solanum gracile* Dunal var. *microphyllum* Dunal, *Solanum gracile* Dunal, hom. illeg., *Solanum gracilius* Herter, *Solanum isabellii* Dunal, *Solanum nigrum* L. var. *aguaraquiya* (Sendtn.) Reiche, p.p., *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *microphyllum* Hassl., *Solanum ottonis* Hyl., *Solanum pterocaulon* Dunal var. *aguaraquiya* (Piso ex Sendtn.) Dunal, *Solanum sublobatum* Willd. ex Roem. & Schult., *Solanum subspatulatum* Sendtn., *Solanum vile* Bitter, *Witheringia chenopodioides* (Lam.) J. Rémy
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE, PHA). URY(COL, FLA, MON, ROC, SJO).

Solanum chilense (Dunal) Reiche
Sin.: *Lycopersicon atacamense* Phil., *Lycopersicon bipinnatifidum* Phil., *Lycopersicon chilense* Dunal, *Lycopersicon puberulum* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Solanum cinnamomeum Sendtn.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Solanum commersonii Dunal ex Poir.
Sin.: *Solanum acroleucum* Bitter, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. f. *mechoguense* (Bukasov) Correll, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabratum* Hook., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pubescens* Sendtn., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *violaceum* Herter, nom. nud., *Solanum compactum* Bukasov, nom. nud., *Solanum debile* Dunal, *Solanum henryi* Bukasov & Lechn. f. *laticalix* Lechn., *Solanum henryi* Bukasov & Lechn. f. *pubescens* Lechn., *Solanum henryi* Bukasov & Lechn., *Solanum mechonguense* Bukasov, *Solanum mercedense* Bukasov, *Solanum ohronidii*

Carrière, *Solanum rionegrinum* Lechn., *Solanum sorianum* Bukasov, *Solanum tenue* Sendtn. var. *raphanifolium* Dunal, *Solanum tenue* Sendtn.

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(CAS, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Solanum compressum L.B. Sm. & Downs

Arbolito o árbol. Endémica. 400-1400 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ITA).

Solanum comptum C.V. Morton

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(APY, APA, CEN).

Solanum concarense Hunz.

Hierba. Endémica. 500-1000 m.

Países: ARG(SLU).

Solanum concinnum Sendtn.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum confusum C.V. Morton

Sin.: *Cyphomandra adelpha* (C.V. Morton) A. Child ex Bohs, *Solanum adelphum* C.V. Morton

Arbusto o arbolito. Nativa. 900-4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum consimile C.V. Morton

Sin.: *Solanum ledesmense* Cabrera

Arbusto. Nativa. 400-2700 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Solanum coquimbense J.R. Benn.

Subarbusto. Endémica.

Países: CHL(COQ).

Solanum corumbense S. Moore

Sin.: *Cyphomandra verruculosa* Hassl., *Solanum tumescens* S. Knapp, *Solanum verruculosum* (Hassl.) Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 300-400 m.

Países: ARG(SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CON).

Solanum corymbiflorum (Sendtn.)

Bohs subsp. **corymbiflorum**

Sin.: *Cyphomandra corymbiflora* Sendtn., *Cyphomandra kleinii* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra macrophylla* L.B. Sm. & Downs

Arbusto o árbol. Endémica. 200-1300 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum corymbiflorum (Sendtn.)

Bohs subsp. **mortoniana** (L.B. Sm. & Downs) Bohs

Sin.: *Cyphomandra corymbiflora* Sendtn. subsp. *mortoniana* (L.B. Sm. & Downs) Bohs, *Cyphomandra mortoniana* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra patrum* L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 900-2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum crispum Ruiz & Pav.

Sin.: *Solanum angustifolium* Lam. var. *brevifolium* Dunal, *Solanum berteroanum* (J. Rémy) Phil., hom. illeg., *Solanum concavum* Lindl., *Solanum congestiflorum* Dunal var. *longifolium* Dunal, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *pannosum* (Phil.) Reiche, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *syringaeifolium* (Kunth & Bouché) Reiche, *Solanum congestiflorum* Dunal, *Solanum crispum* Ruiz & Pav. var. *ligustrinum* (Lodd.) Dunal, *Solanum gayanum* (J. Remy) F. Phil., *Solanum izquierdii* Phil., *Solanum landbeckii* Phil., *Solanum ligustrinum* Lodd., *Solanum pannosum* Phil., *Solanum pugae* Phil., *Solanum pyrrocarpum* Phil., *Solanum sadae* Phil., *Solanum syringaeifolium* Kunth & Bouché, *Solanum tagua* Kuntze, *Solanum tomatillo* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia berteroana* J. Remy, *Witheringia crispa* (Ruiz & Pav.) J. Remy, *Witheringia gayana* J. Remy, *Witheringia tomatillo* J. Remy

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME, JFE).

Solanum cylindricum Vell.

Sin.: *Cyphomandra cylindrica* (Vell.) Sendtn., *Cyphomandra elliptica* (Vell.) Sendtn., *Cyphomandra subhastata* (L.B. Sm. & Downs) A. Child ex Bohs, *Pionandra cylindrica* (Vell.) Miers, *Pionandra elliptica* (Vell.) Miers, *Solanum catanduvae* L.B. Sm. & Downs, *Solanum ellipticum* Vell., hom. illeg., *Solanum iraniense* L.B. Sm. & Downs, *Solanum johannae* Bitter, *Solanum subhastatum* L.B. Sm. & Downs, hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 300-1100 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum decompositiflorum Sendtn.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Solanum delicatulum L.B. Sm. & Downs

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA).

Solanum delitescens C.V. Morton

Sin.: *Solanum delitescens* C.V. Morton var. *amphidoxum* C.V. Morton.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 400-2600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum didymum Dunal

Sin.: *Solanum didymum* Dunal var. *subglabrum* Dunal, *Solanum didymum* Dunal var. *tomentosum* Dunal, *Solanum gemellum* Mart. ex Sendtn., *Solanum gemellum* Mart. ex Sendtn. var. *racemiforme* Witasek

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum diploconos (Mart.) Bohs

Sin.: *Cyphomandra diploconos* (Mart.) Sendtn., *Cyphomandra fragans* (Hook.) Sendtn., *Witheringia diploconos* Mart.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA).

Solanum echegarayi Hieron.

Sin.: *Solanum andicola* C.V. Morton, *Solanum juncalense* Reiche, *Solanum juncalense* Reiche subsp. *aconcaguae* Bitter, *Solanum riojense* Bitter

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

Solanum elaeagnifolium Cav.

Sin.: *Solanum dealbatum* Lindl., *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *angustifolium* Kuntze, *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *argyrocroton* Griseb., *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *grandiflorum* Griseb., *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *leprosum* (Ortega) Dunal, *Solanum leprosum* Ortega, *Solanum saponaceum* Hook., hom. illeg.

Hierba. Nativa. 200-3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME). PRY(APY, CEN, PHA). URY(COL, MON, PAY, SOR).

Solanum endoadenium Bitter

Sin.: *Solanum endoadenium* Bitter var. *robustius* Bitter, *Solanum incurvipilum* Bitter

Arbusto. Nativa. 1500-3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SDE, TUC).

Solanum etuberosum Lindl.

Sin.: *Solanum bustilloi* Phil., *Solanum etuberosum* Lindl. var. *antucense* Bitter, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *bustilloi* (Phil.) Witasek, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *chillanense* Bitter, *Solanum kunzei* Phil., *Solanum looseri* Juz., *Solanum subandinum* F. Meigen, *Solanum tuberosum* L. var. *polemoniifolium* Hook. f.
Hierba. Endémica. 400-2500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Solanum euacanthum Phil.

Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Solanum excisiorhombeum Bitter

Sin.: *Solanum myriadenium* Bitter
Hierba. Nativa. 3500 m.
Países: ARG(JUJ).

Solanum fernandezianum Phil.

Sin.: *Solanum brevistylum* Wittm., nom. nud., *Solanum tuberosum* L. var. *fernandezianum* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 100-1700 m.
Países: CHL(JFE).

Solanum fiebrigii Bitter

Sin.: *Solanum codonanthum* Bitter
Hierba o subarbusto. Nativa. 600-3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum flaccidum Vell.

Sin.: *Solanum convolvulus* Sendtn., *Solanum flaccidum* Vell. var. *heterophyllum* Witasek
Enredadera. Nativa. 0-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, SPE).

Solanum fragile Wedd.

Sin.: *Solanum grandidentatum* Phil., *Solanum tarapacanam* Phil.
Hierba. Nativa. 3500-4000 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Solanum furcatum Dunal

Sin.: *Solanum andinum* Reiche, *Solanum arequipense* Bitter, *Solanum bridgesii* Phil. var. *bridgesii*, *Solanum bridgesii* Phil. var. *ocellatum* (Phil.) Witasek ex Reiche, *Solanum caudiculatum* Phil., *Solanum coxii* Phil., *Solanum crenato-dentatum* Dunal, p.p., *Solanum furcatum* Dunal var. *acutedentatum* Nees, *Solanum*

furcatum Dunal var. *obtusidentatum* Nees, *Solanum furcatum* Dunal var. *subintegerrimum* Nees, *Solanum masafueranum* Bitter & Skottsbl., *Solanum muricatum* Bertero ex Dunal, nom. nud., *Solanum ocellatum* Phil., *Solanum rancaguense* Dunal, *Solanum rancaguinum* Phil., *Solanum robinsonianum* Bitter, *Solanum spretum* C.V. Morton, *Solanum subandinum* Phil., hom. illeg., *Solanum tredecimgranum* Bitter, *Witheringia furcata* (Dunal) J. Rémy

Hierba o subarbusto. Nativa. 200-1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME, JFE).

Solanum fusiforme L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Cyphomandra fusiformis* (L.B. Sm. & Downs) A. Child ex Bohs
Arbusto. Nativa. 500-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Solanum gaudichaudii Dunal

Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Solanum gertii S. Knapp

Arbusto o arbolito. Endémica. 800-900 m.
Países: BRA(PAR).

Solanum gilioides Rusby

Sin.: *Solanum nicandricalyx* Cabrera
Hierba. Nativa. 3000-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Solanum glandulosipilosum Bitter

Sin.: *Solanum adeno-chlamys* Bitter, *Solanum fabrisii* Cabrera
Hierba. Endémica. 600-1300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Solanum glaucophyllum Desf.

Sin.: *Solanum glaucescens* Baclé ex Dunal, nom. nud., *Solanum glaucum* Bertol., *Solanum glaucum* Dunal, hom. illeg., *Solanum glaucumfruticosum* Larrañaga, *Solanum malacoxylon* Sendtn. f. *albomarginatum* (Chodat) Hassl., *Solanum malacoxylon* Sendtn. f. *vulgare* Hassl., *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *albomarginatum* Chodat, *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *angustissimum* Kuntze, *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *genuinum* Hassl., *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *latifolium* Kuntze, *Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *subvirescens* Hassl., *Solanum malacoxylon* Sendtn., *Solanum melanoxylon* Sendtn.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(CAS, CLA, COL, MON, ROC, SJO).

Solanum gnaphalocarpon Vell.

Arbusto. Nativa. 700-1300 m.
Países: BRA(PAR).

Solanum granulosum-leprosum Dunal

Sin.: *Solanum verbascifolium* L. f. *eupulverulentum* Hassl., *Solanum verbascifolium* L. f. *granuloso-leprosum* (Dunal) Hassl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ROC, SJO).

Solanum guaraniticum A. St.-Hil.

Sin.: *Solanum bonariense* L. f. *intermedium* Hassl., *Solanum bonariense* L. f. *leptophyllum* Chodat, *Solanum bonariense* L. f. *lobatum* (Hassl.) Chodat, *Solanum bonariense* L. f. *subintegrum* (Hassl.) Chodat, nom. illeg., *Solanum bonariense* L. f. *typicum* Hassl., nom. inval., *Solanum bonariense* L. var. *paraguariense* (Chodat) Chodat, *Solanum bonariense* L. var. *villaricense* (Morong) Chodat, *Solanum fastigiatum* Willd. var. *acicularium* Dunal, *Solanum paraguariense* Chodat, *Solanum villaricense* Morong f. *lobatum* Hassl., *Solanum villaricense* Morong f. *subintegrum* Hassl., *Solanum villaricense* Morong var. *paraguariense* (Chodat) Hassl., *Solanum villaricense* Morong var. *typicum*, *Solanum villaricense* Morong
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

Solanum hasslerianum Chodat

Sin.: *Solanum balansae* Hassl. var. *lyratifidum* Hassl., *Solanum balansae* Hassl. var. *typicum* Hassl., nom. inval., *Solanum balansae* Hassl., *Solanum brownii* Chodat, hom. illeg., *Solanum hasslerianum* Chodat f. *euinerme* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat f. *oblongifolium* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat f. *quercifolium* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *ambiguum* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *aureomicans* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *horridum* Chodat & Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *subinerme* Hassl. *Solanum rizzinianum* Mattos

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI, PHA, SPE).

Solanum hastatilobum Bitter

Sin.: *Solanum glaberrimum* C.V. Morton, *Solanum hastatilobum* Bitter subsp. *brachyphyllum* Bitter
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).

Solanum heleonastes S. Knapp

Arbusto o arbolito. Nativa. 100-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE). PRY(CAA, ÑEE).

Solanum herbabona Reiche

Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(ATA).

Solanum hieronymi Kuntze

Sin.: *Solanum pocote* Hieron. ex Millán
Hierba. Nativa. 400-1800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). PRY(APY).

Solanum hirtellum (Spreng.) Hassl.

Sin.: *Atropa hirtella* Spreng., *Solanum gracillimum* Sendtn., *Solanum hirtellum* (Spreng.) Hassl. var. *diminutum* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).

Solanum hoehnei C.V. Morton

Sin.: *Solanum alatum* Dunal, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum homalospermum Chiarini

Hierba. Endémica. 700-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR).

Solanum huayavillense Del Vitto & Petenatti

Sin.: *Solanum pachyantherum* Bitter, hom. illeg.
Hierba. Nativa. 1200-2200 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).

Solanum incarceratum Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 400 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN, CEN).

Solanum indivisum Witasek ex J.R. Benn.

Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Solanum infundibuliforme Phil.

Sin.: *Solanum glanduliferum* Hawkes, *Solanum infundibuliforme* Phil. var. *albiflorum* Ochoa, *Solanum infundibuliforme* Phil. var. *angustepinnatum* Bitter, *Solanum microphyllum* Hawkes, hom. illeg., *Solanum pinnatifidum* Cárdenas, hom. illeg., *Solanum platypterum* Hawkes, *Solanum xerophyllum* Hawkes
Hierba. Nativa. 2500-4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR).

Solanum inodorum Vell.

Sin.: *Solanum decorticans* Sendtn., *Solanum laurinum* Dunal
Enredadera. Nativa. 800-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum julocrotonoides Hassl.

Arbusto. Nativa. 300-900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU).

Solanum juvenale Thell.

Sin.: *Solanum meloncillo* Parodi
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY). URY(PAY, RNO).

Solanum kleinii L.B. Sm. & Downs

Arbusto o subarbusto. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum kurtzianum Bitter & Wittm.

Sin.: *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glanduloso-pubescens* Hook. f., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pilosiusculum* Hook. f., *Solanum improvidum* Brücher, *Solanum juanense* Wittm. ex Hawkes & Hjert., nom. nud., *Solanum macolae* Bukasov, *Solanum mendozianum* Bukasov, nom. nud., *Solanum ruiz-lealii* Brücher, *Solanum velascanum* Bitter & Wittm.
Hierba. Endémica. 700-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU).

Solanum lacerdae Dusén

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum laxum Spreng.

Sin.: *Solanum boerhaviifolium* Sendtn. var. *calvum* C.V. Morton, *Solanum boerhaviifolium* Sendtn., *Solanum jasminoides* Paxton var. *boerhaviifolium*, *Solanum jasminoides* Paxton var. *glaberrimum* Kuntze, *Solanum jasminoides* Paxton var. *pilosum* Kuntze, *Solanum jasminoides* Paxton var. *pubinerve* Kuntze, *Solanum jasminoides* Paxton
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, MEN, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE). URY(CAS, COL, FLA, MON, RIV, ROC, SAO, SJO, SJO, TAC).

Solanum luridifuscescens Bitter

Hierba o arbusto. Nativa. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Solanum lycocarpum A. St.-Hil.

Sin.: *Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. f. *apaense* Chodat & Hassl., *Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl. *Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. var. *macrocarpum* Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, AMA, CAN, CON, SPE).

Solanum lycopersicoides Dunal

Arbusto. Nativa. 1500-3600 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Solanum maglia Schltldl.

Sin.: *Solanum collinum* Dunal, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Hook. f., p.p., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* J. Remy, hom. illeg., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Walp., p.p., *Solanum maglia* Molina, nom. nud., *Solanum maglia* Schltldl. var. *brevifrons* Bitter, *Solanum maglia* Schltldl. var. *collinum* (Dunal) Bitter, *Solanum maglia* Schltldl. var. *witasekianum* Bitter, *Solanum sabinii* (A. DC.) Berthault, p.p., *Solanum tuberosum* L. var. *maglia* (Schltldl.) A. DC., *Solanum tuberosum* L. var. *sabinii* A. DC., p.p.
Hierba. Endémica. 700-1800 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, LLA).

Solanum malmeanum Bitter

Sin.: *Solanum chacoense* Bitter f. *pilosulum* (Hassl.) Hassl., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. f. *malmeanum* (Bitter) Correll, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. subsp. *malmeanum* (Bitter) Hawkes & Hjert., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. subsp. *pseudostipulatum* Hassl., nom. nud., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pubescens* Chodat, hom. illeg., *Solanum guaraniticum* Hassl. f. *pilosulum* Hassl., *Solanum millanii* Bukasov & Lechn., *Solanum pseudostipulatum* (Hassl.) Bukasov

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, ITA, PHA). URY(COL, MAL, MON, SAO, SJO).

Solanum marginatum L. f.

Arbusto. Introducida. 0-100 m.

Países: ARG(SJU). CHL(VAL, MAU, BIO, JFE).

Solanum matadori L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 800-1200 m.

Países: BRA(SCA).

Solanum maturecalvans Bitter

Sin.: *Solanum kieslingii* Cabrera

Arbusto o arbolito. Nativa. 1000-3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Solanum mauritianum Scop.

Sin.: *Solanum auriculatum* Aiton, *Solanum tabacifolium* Vell., *Solanum verbascifolium* L. var. *auriculatum* (Aiton) Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). URY(MON, PAY, RIV, ROC, SAO, TAC).

Solanum medians Bitter

Sin.: *Solanum tacnaense* Ochoa

Hierba. Nativa. 3100-3600 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Solanum megalochiton Mart.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum melissarum Bohs

Sin.: *Cyphomandra divaricata* (Mart.)

Sendtn., *Cyphomandra divaricata* (Mart.)

Sendtn. var. *herbacea* Sendtn.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum microdontum Bitter

Sin.: *Solanum bijugum* Bitter, *Solanum cevallos-tovarii* Cárdenas, *Solanum gigantophyllum* Bitter, *Solanum higuieranum* Cárdenas, *Solanum microdontum* Bitter subsp. *gigantophyllum* (Bitter) Hawkes & Hjert., *Solanum microdontum* Bitter var. *gigantophyllum* (Bitter) Ochoa, *Solanum microdontum* Bitter var. *metriophyllum* (Bitter) Ochoa, *Solanum microdontum* Bitter var. *montepuncoense* Ochoa, *Solanum simplicifolium* Bitter subsp. *gigantophyllum* (Bitter) Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter subsp. *microdontum* (Bitter) Hawkes, nom. inval., *Solanum simplicifolium* Bitter var. *gigantophyllum* (Bitter) Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter var. *metriophyllum* Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter var. *mollifrons* Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter var. *trimerophyllum* Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter var. *variabile* Brücher & H. Ross, *Solanum simplicifolium* Bitter, *Solanum tafiense* Lillo ex Hawkes & Hjert., nom. nud.

Hierba. Nativa. 1400-3900 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Solanum montanum L.

Sin.: *Solanum phyllanthum* Cav.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Solanum mortonii Hunz.

Arbusto. Endémica. 700-900 m.

Países: ARG(CAT).

Solanum multispinum N.E. Br.

Sin.: *Solanum multispinum* N.E. Br. var. *grandiflorum* Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SFE). PRY(APY, PHA).

Solanum neei Chiarini & L.A. Mentz

Arbusto. Endémica.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum neorossii Hawkes & Hjert.

Hierba. Endémica. 2500-3800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Solanum nigrum L.

Hierba. Introducida. 0-3600 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Solanum nitidibaccatum Bitter

Sin.: *Solanum patagonicum* C.V. Morton, *Solanum styleanum* Dunal, *Solanum physalifolium* Rusby var. *nitidibaccatum* (Bitter) Edmonds

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SDE, TUC). CHL(MAG).

Solanum nitidum Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 3000-3500 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Solanum odoriferum Vell.

Sin.: *Solanum pachyantherum* Witasek

Enredadera. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum olympicum Hassl.

Sin.: *Solanum sparcistrigosum* Bitter

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).

Solanum opacum A. Braun & Bouché

Sin.: *Solanum forsteri* Seem., *Solanum insulae-paschalis* Bitter

Subarbusto. Nativa.

Países: CHL(VAL, IPA).

Solanum pabstii L.B. Sm. & Downs

Arbolito o árbol. Endémica. 600-1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum palinacanthum Dunal

Sin.: *Solanum claviceps* Griseb.,

Solanum palinacanthum Dunal

var. *acutilobum* Dunal, *Solanum*

palinacanthum Dunal f. *velutinum*

Chodat, *Solanum vexans* S. Moore

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Solanum palitans C.V. Morton

Hierba. Nativa. 0-3700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Solanum palustre Schldtl.

Sin.: *Solanum brevidens* Phil. var. *glabrescens* (Dunal) Hawkes, *Solanum brevidens* Phil., *Solanum bridgesii* A. DC., hom. illeg., *Solanum caldasii* Dunal var. *glabrescens* (Walp.) A. DC., *Solanum palustre* Schldtl. var. *glabrescens* Walp., *Solanum pearcei* Phil., hom. illeg., *Solanum tuberosum* L. var. *brevdens* (Phil.) Reiche, *Solanum tuberosum* L. var. *pearcei* (Phil.) Reiche

Hierba. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LLA).

Solanum paniculatum L.

Sin.: *Solanum chloroleucum* Dunal, *Solanum jubeba* Vell., *Solanum macronema* Sendtn., *Solanum manoelii* Moric., *Solanum paniculatum* L. f. *canescens* Hassl., *Solanum paniculatum* L. f. *flavescens* Hassl., *Solanum paniculatum* L. f. *repandum* Hassl., *Solanum paniculatum* L. subsp. *pseudoauriculatum* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Solanum paniculatum* L. var. *ellipticum* Chodat, *Solanum paniculatum* L. var. *integrifolium* Dunal, *Solanum pseudoauriculatum* Chodat & Hassl., hom. illeg.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, ITA, MIE, SPE).

Solanum paposanum Phil.

Sin.: *Solanum aberrans* Phil., *Solanum crassipes* Phil. var. *aberrans* (Phil.) Bitter, *Solanum crassipes* Phil., *Solanum phyllanthum* Cav. var. *aberrans* (Phil.) Witasek ex Reiche, *Solanum phyllanthum* Cav. var. *crassipes* (Phil.) Witasek ex Reiche
Hierba. Endémica. 200-3500 m.

Solanum paranense Dusén

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum pedersenii Cabrera

Arbusto o arbolito. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, ERI).

Solanum pelagicum Bohs

Sin.: *Cyphomandra cornigera* Dunal, *Cyphomandra maritima* L.B. Sm. & Downs, *Pionandra cornigera* (Dunal) Miers
Hierba o arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Solanum pennellii Correll var.

elachistus Martic. & Quezada
Arbusto. Endémica. 1500 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Solanum pentlandii Dunal subsp.

interandinum (Bitter) Edmonds
Sin.: *Solanum interandinum* Bitter
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Solanum pentlandii Dunal subsp. **pentlandii**

Hierba o subarbusto. Nativa.
Países: CHL(TAR).

Solanum peruvianum L.

Sin.: *Lycopersicon peruvianum* (L.) Mill.
Hierba. Nativa. 0-400 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Solanum physalifolium Rusby

Sin.: *Solanum nitidibaccatum* Bitter
var. *robusticalyx* Bitter
Hierba. Nativa. 300-2000 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, SJU, TUC).

Solanum pilcomayense Morong

Sin.: *Solanum basilobum* Bitter, *Solanum crenato-dentatum* Dunal, p.p., *Solanum deltaicum* Cabrera, *Solanum maioranthum* L.B. Sm. & Downs, *Solanum maracayuense* Bitter, *Solanum nigrum* L. f. *brevipetiolare* (Chodat) Chodat, *Solanum nigrum* L. f. *floribundum* Hassl., *Solanum nigrum* L. f. *longepedunculatum* Hassl., *Solanum nigrum* L. f. *longepetiolatum* Hassl., *Solanum nigrum* L. subsp. *chacoense* Hassl., *Solanum nigrum* L. subsp. *pilcomayense* (Morong) Hassl., *Solanum nigrum* L. var. *brevipetiolare* (Chodat) Hassl., *Solanum nigrum* L. var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Solanum nigrum* L. var. *pilcomayense* (Morong) Chodat, *Solanum nigrum* L. var. *subhastatum* Hassl., *Solanum pilcomayense* Morong var. *brevipetiolare* Chodat, *Solanum pilcomayense* Morong var. *vicinum* C.V. Morton, *Solanum pulchrilobum* Bitter var. *longepetiolatum* (Hassl.) Parodi, *Solanum pulchrilobum* Bitter var. *paucilobum* Bitter, *Solanum pulchrilobum* Bitter, *Solanum rojasii* Chodat, *Solanum syringoideum* Bitter subsp. *pilcomayense* (Morong) Hassl., *Solanum syringoideum* Bitter var. *pyncostichanthum* Bitter, *Solanum syringoideum* Bitter

Hierba o subarbusto. Nativa. 400-1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAN, CEN, CON, COA, PHA).

Solanum piluliferum Dunal

Sin.: *Solanum densiflorum* Sendtn., hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum pimpinellifolium L.

Sin.: *Lycopersicon pimpinellifolium* (L.) Mill., *Lycopersicon pissisi* Phil., *Solanum pissisi* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: CHL(ATA).

Solanum pinetorum (L.B. Sm. & Downs) Bohs

Sin.: *Cyphomandra angustifolia* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra hispida* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra pinetorum* L.B. Sm. & Downs
Arbusto o arbolito. Nativa. 700-2100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum pinnatum Cav.

Sin.: *Solanum albiflorum* Phil., *Solanum cavanillesii* Dunal var. *subintegrifolium* Dunal, *Solanum cavanillesii* Dunal, hom. illeg., *Solanum feuillei* Dunal, *Solanum gaudichaudiana* (J. Remy) Phil., *Solanum gaudichaudii* Dunal var. *viride* Dunal, *Solanum maritimum* Meyen ex Nees, *Solanum novemlobum* Dunal var. *pauciflorum* Dunal, *Solanum novemlobum* Dunal, *Solanum pinnatum* Cav. var. *subintegrifolium* (Dunal) Reiche, nom. inval., *Solanum pinnatum* Cav. var. *tomentosum* Reiche, *Solanum runcinatum* Ruiz & Pav., *Solanum septemlobum* Phil., hom. illeg., *Witheringia gaudichaudiana* J. Remy, *Witheringia pinnata* (Cav.) J. Remy
Hierba o arbusto. Endémica. 0-2300 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME, JFE).

Solanum platense Dieckman

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS). BRA(RGS, SCA). URY(MAL, RIV, ROC, TYT).

Solanum platycypellon S. Knapp

Arbusto. Nativa. 1600-1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Solanum polyphyllum Phil.

Hierba. Endémica.
Países: CHL(TAR).

Solanum premnifolium (Miers) Bohs

Sin.: *Cyphomandra premnifolia* (Miers) Dunal, *Pionandra premnifolia* Miers
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR).

Solanum profusum C.V. Morton

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Solanum pseudocapsicum L.

Sin.: *Solanum capsicastrum* Link ex Schauer var. *caaguazuense* Chodat,

Solanum capsicastrum Link ex Schauer, *Solanum diflorum* Vell. var. *angustifolium* Kuntze, *Solanum diflorum* Vell., *Solanum ipecacuanha* Chodat var. *calvescens* Chodat, *Solanum pavimentum* L.B. Sm. & Downs, *Solanum pseudocapsicum* L. f. *calvescens* (Chodat) Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. f. *pilosulum* Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. f. *pilosum* Kuntze, *Solanum pseudocapsicum* L. subsp. *diflorum* (Vell.) Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *ambiguum* Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *hygrophilum* (Schltdl.) Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *normale* Kuntze, *Solanum pseudocapsicum* L. var. *parvifolium* Kuntze, *Solanum pseudocapsicum* L. var. *sendtnerianum* Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *typicum* Hassl., nom. inval.

Subarbusto. Nativa. 0-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SLU, SFE), BRA(PAR, RGS, SCA), CHL(ANT, COQ, VAL, BIO, RME, JFE), PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PHA, SPE), URY(CAS, FLA, LAV, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR).

Solanum pseudodaphnopsis L.A.

Mentz & Stehmann

Arbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum pseudoquina A. St.-Hil.

Sin.: *Cyphomandra flagrans* (Ten.)

Walp., *Pionandra flagrans* (Ten.) Miens, *Solanum flagrans* Ten., *Solanum inaequale* Vell., *Solanum ramosissimum* Dunal, *Solanum undatifolium* Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS), BRA(PAR, RGS, SCA), PRY(APA, CAN, COA, SPE).

Solanum pygmaeum Cav.

Sin.: *Solanum deterrimum* C.V. Morton, *Solanum pygmaeum* Cav. var. *hastatum* Bontea ex Aellen, *Solanum pygmaeum* Cav. var. *suspensum* C.V. Morton

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, NEU, SLU, SFE, SDE).

Solanum radicans L. f.

Sin.: *Solanum ruderales* (J. Remy) F.

Phil., *Witheringia ruderalis* J. Remy

Subarbusto. Nativa. 500-2800 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ATA, COQ, LBO).

Solanum ramulosum Sendtn.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS, MIS), BRA(PAR, RGS, SCA), PRY(APA, CAU, GUA, PAI).

Solanum reductum C.V. Morton

Subarbusto. Endémica. 200-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Solanum x rechei Hawkes & Hjert.

Hierba. Endémica. 1200-4000 m.

Países: ARG(LRI).

Solanum reflexum Schrank

Subarbusto. Nativa. 0-1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum reineckii Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Solanum reitzii L.B. Sm. & Downs

Arbolito o árbol. Endémica. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum remyanum Phil.

Sin.: *Solanum flexuosum* (J. Rémy)

Phil., hom. illeg., *Witheringia flexuosa* J. Remy

Hierba. Endémica. 200-2200 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Solanum riparium Pers.

Sin.: *Solanum carnosipes* Rusby,

Solanum dichotomum Ruiz & Pav., nom. illeg., *Solanum verbascifolium* L. var.

caducum Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, SAL, TUC).

Solanum robustum H.L. Wendl.

Sin.: *Solanum alatum* Seem. &

J.A. Schmidt, hom. illeg., *Solanum conceptionis* Chodat & Hassl. var. *robustius* Chodat, *Solanum conceptionis* Chodat & Hassl. var. *typicum* Chodat, nom. inval., *Solanum conceptionis* Chodat & Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *decurrens* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *rupestre* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *typicum* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *conceptionis* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *decurrens* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *laxepilosum* Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS), BRA(PAR, SCA), PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Solanum rostratum Dunal

Hierba. Introducida.

Países: ARG(SLU).

Solanum rufescens Sendtn.

Sin.: *Solanum xiphocephalum* L.B. Sm. & Downs

Arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum salamancae Hunz. &

Barboza

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Solanum saldanhae Glaz.

Arbusto. Nativa. 200 m.

Países: BRA(PAR).

Solanum salicifolium Phil.

Sin.: *Solanum crebrum* C.V. Morton

ex L.B. Sm., *Solanum incisum* Griseb.

var. *incisum*, *Solanum incisum* Griseb.

var. *paucilobatum* C.V. Morton, *Solanum*

incisum Griseb. var. *septatopilosum* C.V.

Morton, *Solanum incisum* Griseb. var.

tenuisectum (Kuntze) Bitter ex C.V.

Morton, *Solanum ratum* C.V. Morton,

Solanum restrictum C.V. Morton,

Solanum sericeum Ruiz & Pav. var.

strigillosum Griseb., *Solanum tenuisectum*

Kuntze, *Solanum verwoortii* C.V. Morton

Arbusto. Endémica. 900-4100 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA,

LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).

PRY(APY, COA, PHA), URY(LAV).

Solanum sanctae-catharinae Dunal

Sin.: *Solanum citrifolium* Willd. ex

Roem. & Schult. f. *intermedium* Hassl.

Solanum citrifolium Willd. ex Roem. &

Schult. var. *ochandrum* (Dunal) Hassl.,

Solanum citrifolium Willd. ex Roem. &

Schult. var. *typicum* Hassl., nom. inval.,

Solanum ochrandrum Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.

Países: ARG(MIS), BRA(PAR, RGS,

SCA), PRY(APA, APY, CAN, COA, PAI).

URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

Solanum sanfurgoi Phil.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(MAU).

Solanum sarrachoides Sendtn.

Sin.: *Solanum atriplicifolium* Gillies ex

Nees var. *minus* Gillies ex Nees, *Solanum*

sarachidium Bitter, *Solanum sarrachoides*

Sendtn. var. *sarachidium* (Bitter) C.V.

Morton, *Solanum sidaefolium* Speg.

Hierba. Nativa. 200-2300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI,

FOR, MEN, NEU, SAL, SJU). BRA(RGS).
CHL(VAL, LBO, MAU). PRY(APY, PHA).
URY(FLA, MAL, MON, SJO).

Solanum schlechtendalianum Walp.

Sin.: *Solanum geminifolium* Schltldl. & Cham., hom. illeg.

Arbusto. Nativa. 300-1000 m.

Países: ARG(JUU, MIS, SAL).

Solanum schwackeanum L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Solanum schwackei* Glaz.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum sciadostylis (Sendtn.) Bohs

Sin.: *Cyphomandra reitzii* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn., *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn. var. *hirsuta* Witasek, *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn. var. *ovato-lanceolata* Dunal, *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn. var. *trichocarpa* Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 200-1600 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, GUA).

Solanum scuticum M. Nee

Sin.: *Solanum tabacifolium* Dunal, hom. illeg.

Arbolito. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Solanum seaforthianum Andrews

Liana. Introducida. 0-600 m.

Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CEN, COA).

Solanum sellowianum Sendtn.

Sin.: *Solanum heliotropifolium* Dunal var. *sellowianum* (Sendtn.) Dunal

Arbusto. Nativa. 800 m.

Países: BRA(PAR).

Solanum setosissimum Bitter ex L.A.

Mentz & M. Nee

Arbusto. Endémica. 100-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum sinuatiexcisum Bitter

Sin.: *Solanum deltoideum* Rusby,

Solanum hyosiamoides Bitter

Hierba o arbusto. Nativa. 1500-3100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum sinuatirecurvum Bitter

Sin.: *Solanum metarsium* C.V. Morton,

Solanum pulchellum Phil., hom. illeg.,

Solanum sinuatirecurvum Bitter subsp.

crispellum Bitter

Hierba. Nativa. 3000-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

CHL(ANT).

Solanum sisymbriifolium Lam.

Sin.: *Solanum balbisii* Dunal var. *bipinnata* Hook., *Solanum balbisii* Dunal var. *oligospermum* Sendtn., *Solanum balbisii* Dunal var. *purpureum* Hook., *Solanum balbisii* Dunal, *Solanum bipinnatifidum* Larrañaga, *Solanum decurrens* Balb., *Solanum sisymbriifolium* Lam. f. *albiflorum* Kuntze, *Solanum sisymbriifolium* Lam. f. *lilacinum* Kuntze, *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *acutilobum purpureiflorum* Dunal, *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *brevilobum* Dunal, *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *heracleifolium* Sendtn., nom. inval., *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *macrocarpum* Kuntze, *Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *oligospermum* (Sendtn.) Dunal, *Solanum subviscidum* Schrank

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, BIO). PRY(APY, CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(COL, MON).

Solanum sitiens I.M. Johnst.

Sin.: *Solanum rickii* Correll

Arbusto. Endémica. 2500-3400 m.

Países: CHL(ANT).

Solanum stipulatum Vell.

Sin.: *Solanum rivulare* Mart. ex Sendtn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum stuckertii Bitter

Sin.: *Cyphomandra stuckertii* (Bitter) D'Arcy, *Solanum stuckertii* Bitter var.

atrachostylum Bitter, *Solanum stuckertii*

Bitter var. *angustifrons* Bitter, *Solanum*

stuckertii Bitter var. *obrutum* C.V.

Morton, *Solanum stuckertii* Bitter var.

pilosistylum C.V. Morton, *Solanum*

stuckertii Bitter var. *trichostylum* Bitter

Arbusto o arbolito. Nativa. 200-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

Solanum subsylvestris L.B. Sm. &

Downs

Arbusto. Endémica. 500-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum swartzianum Roem. & Schult.

Sin.: *Solanum hatschbachii* Carvalho, *Solanum swartzianum* Roem. & Schult.

subsp. *chrysophyllum* (Dunal) Carvalho,

Solanum swartzianum Roem. & Schult.

var. *chrysophyllum* Dunal

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum symmetricum Rusby

Sin.: *Solanum nudum* Dunal var.

pseudoindigoferum Hassl., *Solanum*

versabile C.V. Morton

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-1000 m.

Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, SCA).

PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

Solanum tenuispinum Rusby

Sin.: *Solanum chaetophorum* C.V.

Morton

Subarbusto. Nativa. 500-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum toldense Matesevach &

Barboza

Arbusto. Nativa. 1700-1900 m.

Países: ARG(SAL).

Solanum torvum Sw.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Solanum trachytrichium Bitter

Arbusto o subarbusto. Endémica. 100-600 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(APA, CAN, GUA, ITA).

Solanum trichoneuron Lillo

Arbusto o arbolito. Nativa. 700-1500 m.

Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Solanum triflorum Nutt.

Sin.: *Solanum calophyllum* Phil.,

Solanum gaudichaudii Dunal var.

pyrethrifolium (Griseb.) Kuntze,

Solanum mendocinum Phil., *Solanum*

pyrethrifolium Griseb., *Solanum*

triflorum Nutt. var. *calophyllum* (Phil.)

Bitter, *Solanum triflorum* Nutt. var.

pyrethrifolium (Griseb.) Probst

Hierba. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TUC).

Solanum trinominum J.R. Benn.

Sin.: *Solanum gaudichaudii* Dunal var. *canescens* Dunal, *Solanum heterantherum* Witasek ex Reiche, hom. illeg., *Solanum tomentosum* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia tomentosa* J. Remy
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: CHL(ATA, COQ, VAL).

Solanum tripartitum Dunal

Sin.: *Solanum quadripartitum* Dunal
Hierba. Nativa. 2000-3900 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Solanum tuberosum L.

Sin.: *Solanum andigenum* Juz. & Bukasov, *Solanum aquinas* Bukasov, nom. nud., *Solanum argentinicum* Lechn., *Solanum chiloense* (A. DC.) Berthault, *Solanum chilotanum* Hawkes, nom. nud., *Solanum cultum* (A. DC.) Berthault, *Solanum diemii* Brücher, *Solanum fonckii* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Solanum leptostigma* Juz. ex Bukasov, *Solanum maglia* Schltld. subsp. *meridionale* Bitter, *Solanum maglia* Schltld. var. *chubutense* Bitter, *Solanum maglia* Schltld. var. *guaytecarum* Bitter, *Solanum molinae* Juz., *Solanum oceanicum* Brücher, *Solanum ochoanum* Lechn., *Solanum sanmartiniense* Brücher, *Solanum tascalense* Brücher, *Solanum tuberosum* L. subsp. *andigenum* (Juz. & Bukasov) Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var. *chiloense* A.DC., *Solanum tuberosum* L. var. *chubutense* (Bitter) Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var. *cultum* A. DC., *Solanum tuberosum* L. var. *guaytecarum* (Bitter) Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var. *vulgare* Hook. f., *Solanum tuberosum* L. var. *vulgare* Macloskie, hom. illeg., *Solanum zykini* Lechn.

Hierba. Nativa. 500-3000 m.

Países: CHL(ANT, VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS, RME).

Solanum tucumanense Griseb.

Sin.: *Solanum diflorum* Vell. var. *pulverulentum* Chodat, *Solanum ipecacuanha* Chodat, *Solanum ipecacuanha* Chodat var. *obovata* Chodat
Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC).

Solanum turneroides Chodat

Sin.: *Solanum flavistrigosum* Bitter, *Solanum geniculatistrigosum* Bitter, *Solanum gonatotrichum* Bitter
Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(JUU, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).

Solanum tweedianum Hook.

Sin.: *Solanum atriplicoides* Herter, *Solanum meizonanthum* Bitter, *Solanum physalidicalyx* Bitter, *Solanum physalidicalyx* Bitter var. *integrescens* Bitter, *Solanum physalidicalyx* Bitter var. *plurilobulatum* Bitter, *Solanum sidifolium* Speg.,

Hierba. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC). CHL(VAL). PRY(APY, BOQ). URY(MON).

Solanum uncinellum Lindl.

Sin.: *Solanum ipomoea* Sendtn., *Solanum ipomoea* Sendtn. var. *ipomoeoides* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Solanum ipomoea* Sendtn. var. *macrostachyum* Hassl., *Solanum ipomoeoides* Chodat & Hassl., *Solanum pensile* Sendtn., *Witheringia pendula* Roem. & Schult.

Enredadera. Nativa. 0-2200 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APA, APY, COA, PAI, PHA, SPE).

Solanum vaillantii Dunal

Sin.: *Solanum acerosum* Sendtn., *Solanum tejucense* Dunal
Arbusto. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum valdiviense Dunal

Sin.: *Solanum cyrtopodium* Dunal, *Solanum evonymoides* J. Remy, hom. illeg., *Solanum krauseanum* Phil., *Solanum poeppigianum* Dunal, nom. nud., *Solanum puberulum* Phil., *Solanum sembarto* Kuntze var. *pubescens* Kuntze, *Solanum sembarto* Kuntze var. *varians* Kuntze, *Solanum sembarto* Kuntze, *Solanum spiraeoides* Dunal, *Solanum subnervium* Dunal

Arbusto. Endémica. 100-2000 m.

Países: ARG(NEU). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Solanum variabile Mart.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Solanum velleum Thunb.

Arbusto. Nativa. 200-800 m.
Países: BRA(SCA).

Solanum venturii Hawkes & Hjert.

Sin.: *Solanum simplicifolium* Bitter subsp. *venturii* Hawkes, nom. nud.
Hierba. Endémica. 1900-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Solanum vernei Bitter & Wittm.

Sin.: *Solanum ballsii* Hawkes, *Solanum vernei* Bitter & Wittm. subsp. *ballsii* (Hawkes) Hawkes & Hjert.
Hierba. Endémica. 2200-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Solanum viarum Dunal

Sin.: *Solanum chloranthum* DC., hom. illeg., *Solanum viridiflorum* Schltld.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE). URY(MON, RIV, TAC, TYT).

Solanum viscosissimum Sendtn.

Enredadera. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum wacketii Witasek

Sin.: *Solanum brusquense* L.B. Sm. & Downs
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Solanum weddellii Phil.

Hierba o subarbusto. Endémica. 4000-4200 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Solanum zuloagae Cabrera

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1100-1700 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Vassobia Rusby**Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.

Sin.: *Acnistus bornmulleri* Dammer, *Acnistus breviflorus* Sendtn. f. *glabratus* Hassl., *Acnistus breviflorus* Sendtn. f. *indutus* Hassl., *Acnistus breviflorus* Sendtn. var. *glabrata* Sendtn., *Acnistus breviflorus* Sendtn. var. *spinescens* Sendtn., *Acnistus breviflorus* Sendtn., *Acnistus galanderi* Dammer, *Acnistus glabratus* (Sendtn.) Dammer, *Acnistus hauthalii*

Dammer, *Acnistus lycioides* Dammer, *Acnistus mollis* Dammer, *Acnistus parviflorus* Griseb. var. *arborens* (Griseb.) Griseb., *Acnistus parviflorus* Griseb., *Acnistus schunckii* Dammer, *Acnistus sellowii* Dammer, *Acnistus spinescens* (Sendtn.) Dammer, *Acnistus spinosus* Dammer, *Acnistus ulei* Dammer, *Bassovia pyraster* Dunal var. *glabriusculum* Dunal, *Bassovia pyraster* Dunal, *Bassovia spina-alba* (Dunal) Griseb., *Capsicum breviflorum* (Sendtn.) Hunz., *Capsicum glandulosum* Dunal, *Capsicum pyraster* (Dunal) Kuntze, *Dierbachia breviflora* (Sendtn.) Kuntze, *Dierbachia parviflora* (Griseb.) Kuntze, *Dunalia breviflora* (Sendtn.) Sleumer, *Fregirardia spina-alba* Dunal, *Iochroma arboreum* Griseb.

Árbol. Nativa. 500-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(PAY, SAO).

Vestia Willd.

Vestia foetida Hoffmanns.

Sin.: *Vestia lycioides* Willd.

Arbusto. Endémica. 200 m.

Países: CHL(VAL, LBO, BIO, ARA, LRI).

SPHENOCLEACEAE

Sphenoclea Gaertn., nom. cons.

Sphenoclea zeylanica Gaertn.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(ERI, FOR, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN).

STYLIDIACEAE

Donatia J.R. Forst. & G. Forst., nom. cons.

Donatia fascicularis J.R. Forst. & G. Forst.

Sin.: *Donatia magellanica* Lam., *Polycarpon magellanicum* L. f.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(TDF). CHL(ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Phyllachne J.R. Forst. & G. Forst.

Phyllachne uliginosa J.R. Forst. & G. Forst.

Sin.: *Forstera muscoides* Willd., *Forstera uliginosa* (J.R. Forst. & G. Forst.)

Hombr. & Jacquinet

Subarbusto. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

STYRACACEAE

Styrax L.

Styrax acuminatus Pohl

Sin.: *Strigilia acuminata* (Pohl) Miers, *Styrax acuminatus* Pohl var. *alutaceus* (Seub.) Perkins, *Styrax alutaceus* (Seub.) Perkins

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN). URY(MON).

Styrax camporum Pohl

Sin.: *Strigilia camporum* (Pohl) Miers, *Strigilia chrysastera* (Pohl) Miers, *Strigilia gardneriana* (A. DC.) Miers, *Strigilia obliquinervia* (A. DC.) Miers, *Strigilia subcordata* (Moric.) Miers, *Styrax camporum* Pohl f. *aureovelutinus* Perkins, *Styrax camporum* Pohl f. *gardnerianus* (A. DC.) Perkins, *Styrax camporum* Pohl f. *lanceolatus* Perkins, *Styrax candollei* (A. DC.) Seub., *Styrax chrysasterus* Pohl var. *sellowianus* A. DC., *Styrax chrysasterus* Pohl, *Styrax floridus* Pohl var. *communis* A. DC., *Styrax gardnerianus* A. DC. var. *ovatifolius* Chodat & Hassl., *Styrax gardnerianus* A. DC. var. *pallidior* Chodat & Hassl., *Styrax gardnerianus* A. DC., *Styrax obliquinervius* A. DC., *Styrax subcordatus* Moric., *Styrax varians* Seub.

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAA, CAN, CON, PAI, SPE).

Styrax ferrugineus Nees & Mart.

Sin.: *Strigilia ferruginea* (Nees & Mart.) Miers, *Strigilia florida* (Pohl) Miers, *Strigilia nervosa* (A. DC.) Miers, *Strigilia parvifolia* (Pohl) Miers, *Strigilia reticulata* (Mart.) Miers, *Styrax burchellii* Perkins var. *longifolius* Perkins, *Styrax ferrugineus* Nees & Mart. var. *grandifolius* Perkins, *Styrax floridus* Pohl,

Styrax nervosus A. DC. var. *elongatus* Seub., *Styrax nervosus* A. DC., *Styrax parvifolius* Pohl, *Styrax reticulatus* Mart. Árbol. Nativa. 0-1000 m. Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, COA).

Styrax glabratus Schott

Sin.: *Epigenia integerrima* Vell., *Strigilia glabrata* (Spreng.) Miers, *Strigilia laevis* Miers, *Strigilia leiophylla* (Miers) Miers, *Strigilia psilophylla* (A. DC.) Miers, *Styrax erymophyllus* Pohl, *Styrax lauraceus* Perkins, *Styrax leiophyllus* Miers, *Styrax psilophyllus* A. DC., *Styrax squamulosus* M.F. Silva Árbol. Nativa. 0-100 m. Países: BRA(PAR, SCA).

Styrax latifolius Pohl

Sin.: *Strigilia alba* (Mart. ex Spreng.) Miers, *Strigilia latifolia* (Pohl) Miers, *Strigilia longiflora* (A. DC.) Miers, *Styrax albus* Mart. ex Spreng., *Styrax klotzschii* Seub., *Styrax latifolius* Pohl f. *klotzschii* (Seub.) Perkins, *Styrax latifolius* Pohl f. *longiflorus* (A. DC.) Perkins, *Styrax longiflorus* A. DC.

Árbol. Nativa. 100-700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Styrax leprosus Hook. & Arn.

Sin.: *Strigilia leprosa* (Hook. & Arn.) Miers, *Styrax leprosus* Hook. & Arn. f. *latifolia* Chodat & Hassl.

Árbol. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA). URY(CLA, MAL, RIV, TYT).

Styrax martii Seub.

Sin.: *Styrax martii* Seub. var. *microphyllus* Perkins

Arbusto o árbol. Nativa. 600-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Styrax pohlii A. DC.

Sin.: *Strigilia pohlii* (A. DC.) Miers, *Strigilia punctata* (A. DC.) Miers, *Styrax ambiguus* Seub. ex Chodat & Hassl., *Styrax bogotensis* Perkins, *Styrax discolor* M.F. Silva, *Styrax pachyphyllus* Pilg., *Styrax pohlii* A. DC. f. *calvescens* Perkins, *Styrax punctatus* A. DC., *Styrax tafelbergensis* Maguire

Árbol. Nativa. 200-800 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Styrax subargenteus Sleumer

Árbol. Nativa. 900-1800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

SYMPLOCACEAE

Symplocos Jacq.**Symplocos bidana** Aranha

Arbusto o árbol. Endémica. 900-1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Symplocos celastrinea Mart. ex Miq.

Sin.: *Barberina celastrinea* (Mart. ex Miq.) Miers, *Barberina ramentacea* (Mart. ex Miq.) Miers, *Symplocos dusenii* Brand, *Symplocos ramentacea* Mart. ex Miq., *Symplocos variabilis* Mart. ex Miq. f. *parvifolia* Miq., *Symplocos verrucosa* Brand
Árbol. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA).
PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, PAI, SPE).

Symplocos corymboclados Brand

Sin.: *Symplocos corymboclados* Brand
var. *micromorpha* Sleumer, *Symplocos hatschbachii* A. Bidá, nom. nud.
Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 800-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Symplocos estrellensis Casar.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Symplocos glandulosomarginata

Hoehne
Arbolito o árbol. Nativa. 400-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symplocos incrassata Aranha

Arbusto o arbolito. Endémica. 1500-2000 m.
Países: BRA(PAR).

Symplocos kleinii Aranha

Subarbusto. Endémica. 800-1100 m.
Países: BRA(PAR).

Symplocos lanceolata (Mart.) A. DC.

Sin.: *Barberina estrellensis* (Casar.) Miers, *Barberina lanceolata* Mart., *Symplocos cipoensis* A. Bidá, nom. nud., *Symplocos lanceolata* (Mart.) A. DC. f. *cricophloea* Mart. ex Miq., *Symplocos lanceolata* (Mart.) A. DC. f. *integerrima* Mart. ex Miq., *Symplocos oblongifolia* Casar.

Arbusto o arbolito. Nativa. 800-1500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(APA, CAN, PHA).

Symplocos laxiflora Benth.

Sin.: *Mongezia glabra* Vell.
Árbol. Nativa. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Symplocos nitens (Pohl) Benth.

Sin.: *Stemmatosiphum nitens* Pohl, *Symplocos clausenii* A. DC., *Symplocos nitens* (Pohl) Benth. var. *clausenii* (A. DC.) Brand
Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 300-1700 m.
Países: BRA(PAR). PRY(PAI).

Symplocos nitidiflora Brand

Arbolito o árbol. Nativa. 700-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Symplocos oblongifolia Casar.

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, SPE).

Symplocos pentandra (Mattos)

Occhioni ex Aranha
Sin.: *Symplocos itatiaiae* Wawra var. *pentandra* Mattos, *Symplocos pentandra* (Mattos) Occhioni, comb. inval.
Arbusto o arbolito. Nativa. 800-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symplocos pubescens Klotzsch ex Benth.

Sin.: *Mongezia pilosa* Vell., *Symplocos martii* A. DC., *Symplocos pubescens* Klotzsch ex Benth. var. *humilis* Brand, *Symplocos pubescens* Klotzsch ex Benth. var. *pauciflora* Brand
Arbolito. Nativa. 800-1200 m.
Países: BRA(PAR). PRY(CAN).

Symplocos pustulosa Aranha

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Symplocos revoluta Casar.

Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Symplocos tenuifolia Brand

Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symplocos tetrandra Mart. ex Miq.

Sin.: *Barberina tetrandra* Mart.
Árbol. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Symplocos trachycarpus Brand

Sin.: *Symplocos hirtella* Brand
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(RGS, SCA). PRY(AMA).

Symplocos uniflora (Pohl) Benth.

Sin.: *Stemmatosiphum uniflorum* Pohl, *Symplocos catarinensis* Mattos, *Symplocos klotzschii* Brand, *Symplocos padus* Benth., *Symplocos parviflora* Benth., *Symplocos uniflora* (Pohl) Benth. var. *paleacea* Miq., *Symplocos uruguensis* Brand
Arbolito o árbol. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, SPE). URY(CLA, RIV, TAC).

Symplocos variabilis Mart. ex Miq.

Árbol. Nativa. 0-2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

TALINACEAE

Talinum Adans., nom. cons.**Talinum fruticosum** (L.) Juss.

Sin.: *Portulaca fruticosa* L., *Portulaca racemosa* L., *Portulaca triangularis* Jacq., *Talinum racemosum* (L.) Rohrb., *Talinum triangulare* (Jacq.) Willd.
Subarbusto. Introducida. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, COA, PAI, PHA).

Talinum nocturnum Bacigalupo

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(APY).

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

Sin.: *Portulaca paniculata* Jacq., *Portulaca patens* L., *Talinum patens* (L.) Willd.
Hierba. Introducida. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE). URY(RNO).

Talinum polygaloides Gillies ex Arn.

Sin.: *Calandrinia chromantha* Griseb.
Subarbusto. Nativa. 200-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, LRI, MEN, SAL, SFE, SJU, SLU).
PRY(APY, COA, PHA).

Talinum porphyreum M. Mend. &

J.R.I. Wood
Hierba. Nativa. 100-200 m.
Países: PRY(APY, AMA).

TAMARICACEAE

Tamarix L.

Tamarix ramosissima Ledeb.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SCR, SDE, TUC).

TECOPHILAEACEAE

Conanthera Ruiz & Pav.

Conanthera bifolia Ruiz & Pav.

Sin.: *Conanthera passeriflora*
Ravenna f. *coelestis* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *immaculata* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *lilacina* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *melananthera* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna f. *nocticolor* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna, *Sisyrinchium illmu* Molina

Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Conanthera campanulata Lindl.

Sin.: *Conanthera alba* Grau, *Conanthera sabulosa* Ravenna *Conanthera simsii* Sweet, *Conanthera tenella* (Kunth) Ravenna, *Conanthera variegata* Fenzl ex Reichardt, *Cummingia campanulata* D. Don, *Cummingia tenella* D. Don
Hierba. Endémica. 0-3200 m.
Países: CHL(TAR, ANT, COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Conanthera parvula (Phil.) M. Muñoz

Sin.: *Conanthera johowii* Espinosa, *Conanthera minima* Grau, *Cummingia parvula* Phil.
Hierba. Endémica. 100-500 m.
Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA).

Conanthera trimaculata (D. Don) F. Meigen

Sin.: *Cummingia trimaculata* D. Don
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(VAL, LBO, BIO, RME).

Conanthera urceolata Ravenna

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(ATA).

Tecophilaea Bertero ex Colla

Tecophilaea cyanocrocus Leyb.

Sin.: *Zephyra cyanocrocus* (Leyb.)
Ravenna
Hierba. Endémica. 700-900 m.
Países: CHL(RME).

Tecophilaea violiflora Bertero ex Colla

f. *polyantha* Skottsbo.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Tecophilaea violiflora Bertero ex Colla f. violiflora

Sin.: *Zephyra violiflora* (Bertero ex Colla) Ravenna
Hierba. Endémica. 0-800 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Zephyra D. Don

Zephyra compacta C. Ehrh.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Zephyra elegans D. Don

Sin.: *Dicolus caerulescens* Phil., *Zephyra amoena* D. Don
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

TETRACHONDRACEAE

Tetrachondra Petrie ex Oliv.

Tetrachondra patagonica Skottsbo.
Sin.: *Tetrachondra patagonica* Skottsbo. subsp. *fuegiana* D.M. Moore
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF).
CHL(MAG).

THEACEAE

Camellia L.

Camellia sinensis (L.) Kuntze
Sin.: *Thea sinensis* L.
Arbusto o árbol. Introducida. 100-500 m.
Países: ARG(COS, MIS).

Gordonia Ellis

Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng

Sin.: *Laplacea fruticosa* (Schrad.) Kobuski, *Laplacea semiserrata* Cambess., *Wikstroemia fruticosa* Schrad.
Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

THESIACEAE

Thesium L.

Thesium aphyllum Mart. ex A.DC.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA).

Thesium brasiliense A. DC.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

THISMIACEAE

Thismia Griff.

Thismia prataensis Mancinelli, C.T.

Blum & E.C. Smidt
Saprófita. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).

THYMELAEACEAE

Daphnopsis Mart.

Daphnopsis brasiliensis Mart.

Árbol. Nativa. 500-700 m.
Países: BRA(PAR).

Daphnopsis coriacea Taub.

Arbusto. Nativa. 700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Daphnopsis fasciculata (Meisn.)

Nevling
Sin.: *Daphnopsis beta* Taub., *Daphnopsis longifolia* Taub., *Funifera fasciculata* Meisn.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Daphnopsis pseudosalix Domke

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Daphnopsis racemosa Griseb.

Sin.: *Daphnopsis leguizamonis* Lorentz, nom. nud., *Daphnopsis leguizamonis* Griseb. ex Gilg, *Daphnopsis longiracemosa* Gilg ex Domke, *Daphnopsis racemosa* Griseb. var. *leptostachys* Chodat, *Daphnopsis umbelluligera* Domke
 Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
 Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, TAC, TYT).

Daphnopsis sellowiana Taub.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1000 m.
 Países: BRA(PAR, RGS).

Drapetes Lam.**Drapetes muscosus** Lam.

Sin.: *Drapetes muscoides* Pers.
 Hierba. Endémica. 0-1000 m.
 Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, AIS, MAG).

Ovidia Meisn.**Ovidia andina** (Poepp. & Endl.) Meisn.

Sin.: *Daphne andina* Poepp. & Endl., *Daphne tenera* Phil., *Ovidia tenera* (Phil.) Macloskie
 Arbusto. Endémica. 700-2300 m.
 Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Ovidia pillo-pillo (Gay) Meisn.

Sin.: *Daphne pillo-pillo* Gay, *Ovidia parviflora* Meisn.
 Arbusto. Endémica.
 Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

TRIGONIACEAE

Trigonia Aubl.**Trigonia boliviana** Warm.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: PRY(SPE).

Trigonia nivea Cambess. var. **nivea**

Sin.: *Trigonia nivea* Cambess. f. *paniculata* Chodat & Hassl.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, CON, SPE).

Trigonia nivea Cambess. var.

pubescens (Cambess.) Lleras
 Sin.: *Trigonia pubescens* Cambess.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Países: BRA(PAR, SCA).

TRIURIDACEAE

Peltophyllum Gardner**Peltophyllum luteum** Gardner

Sin.: *Hexuris gardneri* Miers, nom. illeg., *Triuris lutea* (Gardner) Benth. & Hook., *Triuris macella* Bertoni, *Triuris mycoides* Fiebrig
 Saprófita. Nativa. 0-800 m.
 Países: ARG(COS, MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, CAA).

Sciaphila Blume**Sciaphila schwackeana** Johow

Saprófita. Nativa. 0-800 m.
 Países: BRA(SCA).

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum L.**Tropaeolum argentinum** Buchenau

Enredadera. Endémica. 1000-2200 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Tropaeolum atropicillare Sparre

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
 Países: ARG(SAL).

Tropaeolum austropurpureum (J.M.

Watson & A.R. Flores) J.M. Watson & A.R. Flores
 Sin.: *Tropaeolum hookerianum* Barnéoud subsp. *austropurpureum* J.M. Watson & A.R. Flores
 Hierba. Endémica. 0-200 m.
 Países: CHL(COQ).

Tropaeolum azureum Bertero ex Colla

Sin.: *Rixea azurea* (Colla) Morren, *Tropaeolum aureum* C.A. Muell., *Tropaeolum azureum* Bertero ex

Colla var. *angustilobum* Buchenau, *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *grandiflorum* Van Houtte, *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *oblongilobum* Buchenau, *Tropaeolum lepidum* Phil. ex Buchenau var. *luteum* Reiche, *Tropaeolum lepidum* Phil. ex Buchenau, *Tropaeolum luteum* (Reiche) Buchenau, *Tropaeolum reicheanum* Buchenau ex Reiche, *Tropaeolum violaeiflorum* A. Dietr.

Hierba. Endémica. 0-2500 m.
 Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Tropaeolum beuthii Klotzsch

Sin.: *Tropaeolum benthamii* Van Houtte, *Tropaeolum leptoceras* I.M. Johnst.

Hierba. Endémica. 300-1000 m.
 Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Tropaeolum brachyceras Hook. & Arn.

Sin.: *Chymocarpus brachyceras* (Hook. & Arn.) Heynh., *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *genuinum* Buchenau, *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *grandiflorum* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *sulphureum* Walp., *Tropaeolum chilense* Bertero ex Colla, *Tropaeolum minimum* Miers, *Tropaeolum tenellum* G. Don
 Hierba. Endémica. 0-1400 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Tropaeolum brasiliense Casar.

Liana. Nativa.
 Países: BRA(PAR).

Tropaeolum capillare Buchenau

Enredadera. Nativa. 700-1500 m.
 Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC).

Tropaeolum ciliatum Ruiz & Pav.

subsp. **ciliatum**
 Enredadera. Endémica. 400-1000 m.
 Países: CHL(COQ, VAL, MAU, BIO, ARA, RME).

Tropaeolum ciliatum Ruiz & Pav.

subsp. **septentrionale** Sparre
 Sin.: *Tropaeolum venosum* Phil. ex Buchenau
 Enredadera. Endémica. 400-2000 m.
 Países: CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Tropaeolum hookerianum Barnéoud

subsp. **hookerianum**
 Sin.: *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *hookerianum* (Barnéoud) Buchenau
 Hierba. Endémica. 0-700 m.
 Países: CHL(COQ).

Tropaeolum hookerianum Barnéoud
subsp. **pilosum** J.M. Watson & A.R.
Flores
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(COQ).

Tropaeolum incisum (Speg.) Sparre
Sin.: *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var.
incisum Speg., *Tropaeolum polyphyllum*
Cav. f. *schizophyllum* H. Ross ex Neger,
nom. nud.
Hierba. Endémica. 1000-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(ATA, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA).

Tropaeolum jilesii Sparre
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Tropaeolum kingii Phil.
Sin.: *Tropaeolum buchenau* Phil.
Hierba. Endémica. 900-1500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Tropaeolum leptophyllum G. Don
subsp. **gracile** (Hook. & Arn.) Sparre
Sin.: *Tropaeolum gracile* (Hook. & Arn.)
Sparre, *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var.
gracile Hook. & Arn.
Hierba. Endémica. 0-1900 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Tropaeolum leptophyllum G. Don
subsp. **leptophyllum**
Sin.: *Tropaeolum bridgesii* Field &
Gardner, *Tropaeolum chilense* Bertero ex
Colla var. *eximium* Steud., *Tropaeolum*
edule Bridges, *Tropaeolum linearifolium*
Steud.
Hierba. Endémica. 1000-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Tropaeolum looseri Sparre
Hierba. Endémica. 800-2400 m.
Países: CHL(COQ).

Tropaeolum majus L.
Hierba. Introducida. 0-800 m.
Países: ARG(SFE). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(VAL, BIO, RME, JFE).
URY(CAS, MON).

Tropaeolum meyeri Sparre
Enredadera. Endémica. 700-1500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).

Tropaeolum myriophyllum (Poepp. &
Endl.) Sparre
Sin.: *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var.

myriophyllum Poepp. & Endl.
Hierba. Endémica. 400-3500 m.
Países: CHL(MAU, BIO).

Tropaeolum nubigenum Phil.
Hierba. Endémica. 3000-4000 m.
Países: CHL(RME).

Tropaeolum nuptae-jucundae Sparre
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(MAU, BIO, ARA).

Tropaeolum patagonicum Speg.
Sin.: *Tropheastrum patagonicum*
(Speg.) Sparre
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).

Tropaeolum pentaphyllum Lam.
subsp. **megapetaloides** Sparre
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Tropaeolum pentaphyllum Lam.
subsp. **pentaphyllum**
Sin.: *Chymocarpus pentaphyllus*
(Lam.) D. Don, *Tropaeolum chymocarpus*
Morong, *Tropaeolum quinatum* Hellenius
Enredadera. Nativa. 0-700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI,
FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).
URY(COL, MAL, MON, ROC, SJO).

Tropaeolum polyphyllum Cav.
Sin.: *Chymocarpus polyphyllus* (Cav.)
Heynh., *Tropaeolum floribundum*
Turcz., *Tropaeolum paniculatum* Meyen,
Tropaeolum prostratum Miers
Hierba. Endémica. 2000-3700 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(COQ,
VAL, LBO, MAU, RME).

Tropaeolum porifolium (Cav.) L.
Andersson & S.Andersson
Sin.: *Magallana cavanillesii* Scala,
Magallana porifolia Cav., *Magallana*
porrifolia Pers.
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE,
SCR). CHL(AIS).

Tropaeolum rhomboideum Lem.
Sin.: *Tropaeolum tenuirostre* Steud. var.
majus Buchenau
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: CHL(RME).

Tropaeolum sanctae-catharinae
Sparre
Sin.: *Tropaeolum gaertnerianum* Regel
Enredadera. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(SCA).

Tropaeolum sessilifolium Poepp. & Endl.
Hierba. Endémica. 1500-3400 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Tropaeolum slanisii Bulacio
Hierba. Endémica. 2800-2900 m.
Países: ARG(SAL).

Tropaeolum speciosum Poepp. & Endl.
Sin.: *Anisocentra cardiopetala* Turcz.,
Chymocarpus speciosus (Poepp. & Endl.)
Walp., *Tropaeolum lechleri* Steud.
Hierba. Endémica. 0-1500 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA, AIS).

Tropaeolum trialatum (Suess.) L.
Andersson & S. Andersson
Sin.: *Magallana trialata* Suess.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE).

Tropaeolum tricolor Sweet
Sin.: *Chymocarpus tricolor* (Sweet)
Heynh., *Tropaeolum coccineum* Miers,
Tropaeolum elegans G. Don, *Tropaeolum*
incrassatum Steud., *Tropaeolum*
jarrattii Youell ex Paxton, *Tropaeolum*
subincrassatum Steud., *Tropaeolum*
tricolor Sweet var. *aurantiacum*
Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet
var. *grandiflorum* Morren, *Tropaeolum*
tricolor Sweet var. *grandiflorum*
Reinecke ex Walp., *Tropaeolum tricolor*
Sweet var. *jarrattii* (Paxton) Lem.,
Tropaeolum tricolor Sweet var. *majus*
Marnock, *Tropaeolum tricolor* Sweet
var. *pallescens* Barnéoud, *Tropaeolum*
tricolor Sweet var. *regelianum* Möhring
ex Regel, *Tropaeolum tricolor* Sweet
var. *schultzii* Regel, *Tropaeolum tricolor*
Sweet var. *splendens* Reinecke ex
Walp., *Tropaeolum tricolor* Sweet var.
venustum Paxton ex Otto, *Tropaeolum*
tricolor Sweet var. *versicolor* Morren,
Tropaeolum violaceum Steud.
Hierba. Endémica. 0-2800 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav.
subsp. **silvestre** Sparre
Hierba. Nativa. 2500-3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).

Tropaeolum warmingianum Rohrb.
Enredadera. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APA).

Tropaeolum willinkii Sparre
Enredadera. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

TURNERACEAE

Oxossia L. Rocha

Oxossia capitata (Cambess.) L. Rocha
Sin.: *Turnera capitata* Cambess.
Arbusto. Nativa. 300-400 m.
Países: BRA(SCA).

Piriqueta Aubl.

Piriqueta cistoides (L.) Griseb.
Sin.: *Piriqueta cistoides* (L.) Griseb.
var. *latifolia* Urb., *Piriqueta cistoides* (L.)
Griseb. var. *micrantha* Urb., *Piriqueta*
villosa Aubl., *Turnera cistoides* L., *Turnera*
helianthemoides A. St.-Hil., A. Juss. &
Cambess., *Turnera hirta* Willd. ex Schult.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(FOR, MIS). BRA(PAR).
PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CON,
PHA, SPE).

Piriqueta grandifolia (Urb.) Arbo
Sin.: *Piriqueta duarteana* (Cambess.)
Urb. var. *grandifolia* Urb.
Subarbusto. Nativa. 100-300 m.
Países: ARG(FOR, SAL). BRA(Fuera
del área del proyecto). PRY(APY).

Piriqueta morongii Rolfe
Sin.: *Piriqueta australis* (Urb.) Arbo,
Piriqueta viscosa Griseb. subsp. *australis*
Urb., *Piriqueta viscosa* Griseb. var.
australis (Urb.) Urb.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área
del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN,
CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Piriqueta nitida Urb.
Sin.: *Piriqueta leucantha* Urb., *Piriqueta*
leucantha Urb. var. *brachyantha* Urb.
Hierba. Nativa. 200-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CAN, SPE).

Piriqueta ochroleuca Urb.
Hierba. Endémica. 200-300 m.
Países: PRY(COA, PAI).

Piriqueta pampeana Cabrera &
Miotto
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Piriqueta racemosa (Jacq.) Sw.
Sin.: *Piriqueta ovata* (Bello) Urb.,
Turnera hispidissima Colla, *Turnera ovata*
Bello, *Turnera racemosa* Jacq.
Hierba. Nativa. 100-200 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CON).

Piriqueta rosea (A. St.-Hil., A. Juss. &
Cambess.) Urb.
Sin.: *Piriqueta rosea* (A. St.-Hil., A.
Juss. & Cambess.) Urb. var. *occidentalis*
Urb., *Piriqueta serrulata* Urb., *Turnera*
rosea A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

Piriqueta sidifolia (A. St.-Hil., A. Juss.
& Cambess.) Urb.
Sin.: *Piriqueta sidifolia* (A. St.-Hil.,
A. Juss. & Cambess.) Urb. var. *genuina*
Urb., *Piriqueta sidifolia* (A. St.-Hil., A.
Juss. & Cambess.) Urb. var. *angustifolia*
Urb., *Piriqueta sidifolia* (A. St.-Hil., A.
Juss. & Cambess.) Urb. var. *ignatii* Urb.
Hierba. Nativa. 500-600 m.
Países: BRA(RGS).

Piriqueta suborbicularis (A. St.-Hil.
& Naudin) Arbo
Sin.: *Piriqueta alba* Mattos, *Piriqueta*
selloi Urb., *Sida suborbicularis* A. St.-Hil.
& Naudin
Hierba. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).
PRY(CAU, GUA, ITA, PAI). URY(CLA).

Piriqueta subsessilis Urb.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(CAU, CAN, SPE).

Piriqueta tamberlikii Urb.
Hierba o subarbusto. Nativa. 300 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA).

Piriqueta taubatensis (Urb.) Arbo
Sin.: *Piriqueta selloi* Urb. var. *hirsuta* Urb.,
Piriqueta selloi Urb. var. *taubatensis* Urb.
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CAA, MIE, PAI).
URY(RIV).

Turnera L.

Turnera aurelii Arbo
Arbusto o subarbusto. Endémica.
0-100 m.
Países: ARG(FOR). PRY(CEN, COA, PHA).

Turnera blanchetiana Urb. var.
subspicata Urb.
Arbusto. Nativa. 400-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(APY).

Turnera concinna Arbo
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(CON, SPE).

Turnera dolichostigma Urb.
Sin.: *Turnera pumileoides* Urb.
Hierba. Nativa. 200-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CON).

Turnera fernandezii Arbo
Arbusto. Nativa. 100-300 m.
Países: BRA(Fuera del área del
proyecto). PRY(AMA, CON).

Turnera grandidentata (Urb.) Arbo
Sin.: *Turnera ulmifolia* L. var.
grandidentata Urb.
Hierba. Endémica. 100-300 m.
Países: PRY(CAU, CEN, CON, COA,
MIE, PAI, SPE).

Turnera grandiflora (Urb.) Arbo
Sin.: *Turnera ulmifolia* L. var.
grandiflora Urb.
Hierba. Nativa. 100-1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL,
SFE). BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON,
COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA,
SPE).

Turnera hassleriana Urb.
Sin.: *Turnera hassleriana* Urb. var.
lobulata Urb.
Subarbusto. Nativa. 100-400 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(Fuera
del área del proyecto). PRY(AMA, CEN,
CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Turnera hilaireana Urb.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Turnera krapovickasii Arbo
Subarbusto. Nativa. 100-900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
PRY(APY, PHA).

Turnera melochioides Cambess.

Subarbusto. Nativa. 200-300 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Turnera nervosa Urb.

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(CAU, CAA, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Turnera oblongifolia Cambess.

Sin.: *Turnera hilaireana* Urb. var.

lanceolata (Cambess.) Urb., *Turnera*

hilaireana Urb. var. *oblongifolia*

(Cambess.) Urb., *Turnera hilaireana* Urb.

var. *ovatifolia* Urb.

Hierba. Nativa. 600-1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Turnera orientalis (Urb.) Arbo

Sin.: *Turnera ulmifolia* L. var. *orientalis* Urb.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS). BRA(PAR). PRY(APA, CAU, CAN, CON, ITA, MIE, ÑEE, PHA, SPE).

Turnera pumilea L.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Países: ARG(COS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, CEN, CHO, CON, COA, NAS, PHA).

Turnera serrata Vell. var. *brevifolia* Urb.

Subarbusto. Nativa. 500-800 m.

Países: BRA(PAR).

Turnera sidoides L. subsp. *carnea*

(Cambess.) Arbo

Sin.: *Turnera pinnatifida* Juss. ex Poir.

var. *carnea* Cambess.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS). PRY(GUA, ITA, MIE). URY(ART, CLA, CLA, FLO, FLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SJO, TAC).

Turnera sidoides L. subsp.

holosericea (Urb.) Arbo

Sin.: *Turnera holosericea* (Urb.) Herter, comb. illeg., *Turnera sidoides* L. var.

holosericea Urb.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: BRA(RGS). URY(ART, CLA, FLA, PAY, RIV, TAC, TYT).

Turnera sidoides L. subsp.

integrifolia (Griseb.) Arbo

Sin.: *Turnera grisebachiana* Urb.

ex Herter, *Turnera setosa* Sm. var.

integrifolia Griseb., *Turnera sidoides* L.

var. *grisebachiana* Urb.

Hierba. Endémica. 0-300 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS). PRY(APA, MIE). URY(ART, DUR, FLA, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).

Turnera sidoides L. subsp.

pinnatifida (Juss. ex Poir.) Arbo

Sin.: *Turnera pinnatifida* Juss. ex Poir.,

Turnera pinnatifida Juss. ex Poir. var.

angustiloba DC., *Turnera pinnatifida*

Juss. ex Poir. var. *lycopifolia* DC., *Turnera*

setosa Sm. var. *entreriana* Griseb.,

Turnera setosa Sm., *Turnera sidoides*

L. var. *angustiloba* (DC.) Urb., *Turnera*

sidoides L. var. *incisa* Urb., *Turnera*

sidoides L. var. *lycopifolia* (DC.) Urb.

Hierba. Nativa. 0-2700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,

COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, RNE,

SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY).

URY(ART, CAS, COL, DUR, FLA, MON,

PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).

Turnera sidoides L. subsp. **sidoides**

Sin.: *Turnera herteri* (Urb.) Herter, comb.

illeg., *Turnera sidoides* L. var. *herteriana*

Urb. ex Herter, *Turnera sidoides* L. var.

hispida Urb., nom. superfl.

Hierba. Endémica. 0-400 m.

Países: BRA(RGS). URY(CAS, FLA,

LAV, MAL, MON, TAC).

Turnera subulata Sm.

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Turnera weddelliana Urb. ex Rolfe

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Países: ARG(MIS, SAL). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).

TYPHACEAE

Typha Juss.**Typha angustifolia** L.

Hierba. Cosmopolita. 0-1100 m.

Países: ARG(CHA, RNE). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, VAL, MAU, BIO, ARA, LRI).

Typha domingensis Pers.

Sin.: *Typha tenuifolia* Kunth

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS,

ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, VAL, BIO, ARA). PRY(APY, AMA, BOQ, CEN, CHO, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, COL, MON, ROC, SJO).

Typha latifolia L.

Hierba. Cosmopolita. 0-100 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS, SFE, SJU). BRA(PAR, RGS). CHL(BIO). PRY(APA, AMA, CON, PHA).

Typha subulata Crespo & R.L. Pérez-Mor.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SJU, SLU). URY(MON, ROC).

ULMACEAE

Phyllostylon Capan. ex Benth. & Hook. f.**Phyllostylon rhamnoides** (J. Poiss.) Taub.

Sin.: *Samaroceltis rhamnoides* J. Poiss.

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).

Ulmus L.**Ulmus minor** Mill.

Árbol. Introducida.

Países: CHL(RME).

URTICACEAE

Boehmeria Jacq.**Boehmeria caudata** Sw.

Sin.: *Boehmeria arborescens* Gardner,

Boehmeria arguta Mart. ex Miq.,

Boehmeria caudata Sw. var. *arborescens*

(Gardner) Wedd.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, GUA, MIE).

Boehmeria cylindrica (L.) Sw.

Sin.: *Urtica cylindrica* L.
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI). URY(CAS, CLA, MON, SJO, SOR).

Boehmeria excelsa (Bertero ex Steud.) Wedd.

Sin.: *Procris excelsa* Bertero ex Steud., *Splitgerbera denudata* Gay
Árbol. Endémica. 0-400 m.
Países: CHL(JFE).

Boehmeria nivea (L.) Hook. f. & Arn.

Sin.: *Urtica nivea* L.
Arbusto. Introducida. 0-500 m.
Países: BRA(SCA). PRY(APA).

Boehmeria pavonii Wedd.

Sin.: *Boehmeria ramiflora* Jacq. var. *paraguariensis* Hassl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Boehmeria ramiflora Jacq.

Arbusto o árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Cecropia Loeffl.**Cecropia glaziovii** Snethl.

Árbol. Nativa. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Cecropia pachystachya Trécul

Sin.: *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq., *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq. var. *lyratiloba* (Miq.) Hassl., *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq. var. *macrophylla* Hassl., *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq. var. *vulgaris* Hassl., nom. inval., *Cecropia catarinensis* Cuatrec., *Cecropia cinerea* Miq., *Cecropia glauca* Rojas Acosta, *Cecropia lyratiloba* Miq.
Árbol. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI).

Coussapoa Aubl.**Coussapoa microcarpa** (Schott) Rizzini

Sin.: *Coussapoa fontanesiana* Trécul, *Coussapoa schottii* Miq., *Coussapoa schottii* Miq. var. *lanceolata* Miq., *Coussapoa*

schottii Miq. var. *longifolia* Miq.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Laportea Gaudich.**Laportea aestuans** (L.) Chew

Sin.: *Urtica aestuans* L.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Myriocarpa Benth.**Myriocarpa stipitata** Benth.

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.
Países: ARG(JUU, MIS, SAL). BRA(PAR).

Parietaria L.**Parietaria debilis** G. Forst.

Sin.: *Freirea erecta* Phil., *Freirea humifusa* Gay, *Parietaria debilis* G. Forst. var. *diffusa* Wedd., *Parietaria debilis* G. Forst. var. *gracilis* (Lowe) Wedd., *Parietaria debilis* G. Forst. var. *micrantha* (Ledeb.) Wedd., *Parietaria fernandeziana* (Steud.) L.E. Navas, *Parietaria gracilis* Lowe, *Parietaria humifusa* (Gay) Blume, *Parietaria micrantha* Ledeb., *Urtica fernandeziana* Steud., *Urtica parietariaefolia* Bertero ex Steud.
Hierba. Cosmopolita. 0-2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, RME, JFE). PRY(APY, APA, CAA, PAI). URY(CAS, FLA, LAV, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR).

Parietaria feliciana Phil.

Hierba. Endémica. 0-100 m.
Países: CHL(IDE).

Parietaria judaica L.

Sin.: *Parietaria diffusa* Mert. & W.D.J. Koch
Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(DFE, ERI, SFE). CHL(VAL, RME). URY(MON).

Phenax Wedd.**Phenax laevigatus** Wedd.

Sin.: *Boehmeria hirta* Sw., *Phenax hirtus*

(Sw.) Wedd., *Phenax urticifolius* Wedd.
Arbusto o árbol. Nativa. 500-2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Phenax sonneratii (Poir.) Wedd.

Sin.: *Parietaria sonneratii* Poir., *Phenax vulgaris* Wedd., *Procris sonneratii* (Poir.) Spreng.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAA).

Pilea Lindl.**Pilea aparadensis** P. Brack

Hierba. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Pilea astrogramma Miq.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin

Hierba. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pilea elegans Gay

Sin.: *Pilea elliptica* Hook. f. f. *gayana* Wedd.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI).

Pilea elliptica Hook. f.

Sin.: *Pilea chilensis* Wedd., *Pilea pedunculata* Blume, *Pilea uliginosa* Phil.
Hierba. Endémica. 0-1100 m.
Países: CHL(ARA, LRI, LLA, AIS).

Pilea flammula P. Brack

Hierba. Endémica. 900-1600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Pilea hilariana Wedd.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Pilea hyalina Fenzl

Sin.: *Pilea hyalina* Fenzl var. *longipes* Miq.
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR). CHL(LBO).

Pilea hydra P. Brack

Hierba. Endémica. 700-1100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Pilea jujuyensis Sorarú

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Pilea microphylla (L.) Liebm.

Sin.: *Parietaria microphylla* L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA).

Pilea pubescens Liebm.

Sin.: *Pilea grossocrenata* Miq.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA).

Pilea rhizobola Miq.

Hierba o arbustos. Nativa
Países: BRA(PAR, SCA).

Pourouma Aubl.**Pourouma guianensis** Aubl.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Pouzolzia Gaudich.**Pouzolzia amambaiensis** Friis &

Wilmot-Dear
Subarbusto. Endémica. 0-600 m.
Países: PRY(AMA).

Soleirolia Gaudich.**Soleirolia soleirolii** (Req.) Dandy

Sin.: *Helxine soleirolii* Req.
Hierba. Introducida. 0-900 m.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, ARA,
LRI, RME).

Urera Gaudich.**Urera altissima** Lillo

Arbusto. Nativa. 300-2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Urera aurantiaca Wedd.

Sin.: *Urera aurantiaca* Wedd. var.
scandens (D. Parodi) Hassl., *Urera*
scandens D. Parodi
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR,
JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(CEN, COA, ÑEE, PAI, PHA).

Urera baccifera (L.) Gaudich.

Sin.: *Urera horrida* (Kunth) Miq.,
Urera baccifera L., *Urera grandidentata*
Liebm., *Urera horrida* Kunth

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,
JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS,
SCA). PRY(APA, APY, CAA, CAN, CEN,
ÑEE, PAI, SPE).

Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex
Griseb.

Sin.: *Urera caracasana* Jacq., *Urera*
jacquini Wedd.
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, SAL,
TUC). BRA(PAR). PRY(APA, ÑEE, PAI).

Urera nitida (Vell.) P. Brack

Sin.: *Urera baccifera* (L.) Gaudich. var.
angustifolia Wedd., *Urera denticulata*
Miq., *Urera nitida* Vell.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Urtica L.**Urtica berteriana** Phil.

Sin.: *Urtica echinata* Benth. var.
berteriana (Phil.) Wedd., *Urtica echinata*
Benth. var. *lamifolia* Wedd.
Hierba. Endémica. 0-600 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Urtica chamaedryoides Pursh subsp.
microsperma Hauman

Sin.: *Urtica chamaedryoides*
Pursh f. *hygrophila* Hauman, *Urtica*
chamaedryoides Pursh f. *xerophila*
Hauman, *Urtica minutifolia* Griseb.
Hierba. Nativa. 0-4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL,
SJU, TUC).

Urtica circularis (Hicken) Sorarú

Sin.: *Urtica chamaedryoides* Pursh
var. *circularis* (Hicken) Hauman, *Urtica*
spatulata Sm. var. *circularis* Hicken
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR,
COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL,
SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(CEN, COA, SPE).
URY(CLA, LAV, MAL, MON, SJO).

Urtica dioica L.

Arbusto. Introducida. 0-300 m.
Países: ARG(COR). BRA(PAR, RGS,
SCA). CHL(BIO, ARA, LLA).

Urtica echinata Benth.

Sin.: *Urtica andicola* Wedd., *Urtica*
echinata Benth. var. *punctulata* Hauman

Hierba. Nativa. 3600-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL,
TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Urtica flabellata Kunth

Hierba. Nativa. 4000-4500 m.
Países: ARG(JUJ). CHL(AYP).

Urtica glomeruliflora Steud.

Sin.: *Boehmeria fernandeziana* Gay,
Urtica fernandeziana (Gay) H. Ross ex
Skottsbo., comb. illeg.
Hierba. Endémica. 200-1300 m.
Países: CHL(JFE).

Urtica gracilis Aiton subsp. **mollis**
(Steud.) Weigend

Sin.: *Urtica buchtienii* R. Ross, *Urtica*
dioica L. var. *mollis* (Steud.) Wedd.,
Urtica dioica L. var. *diplotricha* (Phil.)
Wedd., *Urtica diplotricha* Phil., *Urtica*
mollis Steud.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU,
COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL,
SJU, TUC). CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, ARA, LLA, AIS, MAG, RME).

Urtica lilloi (Hauman) Geltman

Sin.: *Urtica magellanica* Poir. subsp.
lilloi Hauman
Hierba. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Urtica magellanica Poir.

Sin.: *Urtica bracteata* Steud., *Urtica*
darwinii Hook. f., *Urtica dioica* L. var.
steudelii Wedd., *Urtica magellanica* Poir.
subsp. *bracteata* (Steud.) Geltman,
Urtica magellanica Poir. var. *bracteata*
(Steud.) Wedd., *Urtica pseudodioica*
Steud.

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR,
TDF). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Urtica masafuerae Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(JFE).

Urtica spathulata Sm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS,
DFE, ERI, LPA, SCR, SDE, SFE, SLU,
TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN).
URY(CLA, FLO, MON, SJO).

Urtica trichantha (Wedd.) Acevedo & L.E. Navas

Sin.: *Urtica echinata* Benth. var. *trichantha* Wedd.

Hierba. Nativa. 3400-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Urtica urens L.

Hierba. Introducida. 0-1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR, SFE, SDE, TDF, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME, JFE). URY(CAS, FLA, MON, RNO, SOR).

VELLOZIACEAE

Barbacenia Vand.

Barbacenia paranaensis L.B. Sm.

Sin.: *Aylthonia paranaensis* (L.B. Sm.) N.L. Menezes
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Barbaceniopsis L.B. Sm.

Barbaceniopsis boliviensis (Baker) L.B. Sm.

Sin.: *Barbacenia boliviense* (Baker) Hauman, *Vellozia boliviense* Baker, *Xerophyta boliviense* (Baker) N.L. Menezes
Hierba. Nativa. 1400-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Barbaceniopsis castillonii (Hauman)

Ibisch
Sin.: *Barbacenia castillonii* Hauman
Hierba. Nativa.
Países: ARG(TUC).

Barbaceniopsis humahuaquensis

Noher
Hierba. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(JUJ).

VERBENACEAE

Aloysia Palau

Aloysia brasiliensis Moldenke
Arbusto. Endémica. 700-900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aloysia castellanosi Moldenke

Sin.: *Aloysia castellanosi* Moldenke var. *magna* Moldenke, *Aloysia decorticans* Ravenna

Subarbusto. Endémica. 2500-2800 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

Aloysia catamarcensis Moldenke

Subarbusto. Endémica. 1000-1800 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE).

Aloysia chamaedryfolia Cham.

Sin.: *Lippia chamaedryfolia* (Cham.) Steud.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV, TAC, TYT).

Aloysia citrodora Palau

Sin.: *Aloysia citrodora* Ortega ex Pers., hom. illeg., *Aloysia sleumeri* Moldenke, *Aloysia triphylla* (L'Hér.) Britton f. *serrulata* Moldenke, *Aloysia triphylla* (L'Hér.) Britton, hom. illeg., *Lippia citrodora* (Ortega ex Pers.) Kunth, comb. illeg., *Lippia triphylla* (L'Hér.) Kuntze, *Verbena citrodora* Cav., hom. illeg., *Verbena triphylla* L'Hér., *Zappania citrodora* Lam., hom. illeg.
Arbusto. Nativa. 500-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, COA).

Aloysia cordata Siedo

Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).

Aloysia crenata Moldenke

Sin.: *Aloysia krapovickasii* Moldenke
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR). PRY(APA, CAA).

Aloysia decipiens Ravenna

Sin.: *Aloysia chacoensis* Moldenke var. *angustifolia* Tronc., *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *angustifolia* (Tronc.) Botta
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC).

Aloysia deserticola (Phil.) Lu-Irving & O'Leary

Sin.: *Acantholippia deserticola* (Phil.) Moldenke, *Acantholippia punensis* Botta, nom. superfl., *Lippia deserticola* Phil., *Lippia microphylla* Phil., nom. illeg.

Arbusto. Nativa. 2300-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Aloysia dusenii Moldenke

Sin.: *Aloysia ternifolia* Moldenke, *Aloysia ternifolia* Moldenke f. *oppositifolia* Moldenke
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aloysia fiebrigii (Hayek) Moldenke

Sin.: *Aloysia arcuifolia* G.L. Nesom, *Lippia fiebrigii* Hayek
Arbusto. Nativa. 1900-3400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. **gratissima**

Sin.: *Aloysia chacoensis* Moldenke, *Aloysia famatinensis* Ravenna, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *chacoensis* (Moldenke) Botta, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *paraguariensis* (Briq.) Moldenke, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *revoluta* (Moldenke) Moldenke, *Aloysia ligustrina* (Lag.) Small var. *paraguariensis* (Briq.) Moldenke, *Aloysia lycioides* Cham. var. *paraguariensis* (Briq.) Moldenke, *Aloysia lycioides* Cham. var. *revoluta* Moldenke, *Aloysia lycioides* Cham., *Lippia gratissima* (Gillies & Hook.) L.D.Benson, *Lippia ligustrina* (Lag.) Kuntze var. *lasiodonta* Briq., *Lippia ligustrina* (Lag.) Kuntze var. *paraguariensis* Briq., *Lippia lycioides* (Cham.) Steud., *Verbena gratissima* Gillies & Hook. ex Hook.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(DUR, MAL, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).

Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. **sellowii** (Briq.) Botta

Sin.: *Aloysia pulchra* (Briq.) Moldenke, *Aloysia sellowii* (Briq.) Moldenke, *Aloysia uruguayensis* Moldenke, hom. illeg., *Lippia affinis* Briq., hom. illeg., *Lippia pulchra* Briq., *Lippia sellowii* Briq.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, GUA, ITA, PAI). URY(ART, RIV, TAC).

Aloysia hatschbachii Moldenke

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Aloysia oblanceolata Moldenke

Sin.: *Aloysia beckii* Moldenke, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.)

Tronc. var. *oblanceolata* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS). PRY(APY, CEN, COA, ITA).

Aloysia ovatifolia Moldenke

Sin.: *Xeroaloyisia ovatifolia* (Moldenke)

Tronc.

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Aloysia polygalifolia Cham.

Sin.: *Lippia polygalifolia* (Cham.) Steud.

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Aloysia polystachya (Griseb.)

Moldenke

Sin.: *Lippia polystachya* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, LRI, SAL, SJU, SDE). PRY(CEN, PHA).

Aloysia riojana (Hieron. ex Moldenke)

Lu-Irving & O'Leary

Sin.: *Acantholippia riojana* Moldenke

Arbusto. Endémica. 500-1800 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SJU).

Aloysia salsoloides (Griseb.) Lu-Irving

& O'Leary

Sin.: *Acantholippia hastulata* Griseb., *Acantholippia salsoloides* Griseb., *Lippia hastulata* (Griseb.) Hieron., *Lippia salsoloides* (Griseb.) Briq.

Arbusto. Nativa. 1000-3200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Aloysia salviifolia (Hook. & Arn.)

Moldenke

Sin.: *Aloysia chilensis* (Schauer) Moldenke, *Lippia chilensis* Schauer, *Verbena salviifolia* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 0-1600 m.

Países: ARG(MEN). CHL(ATA, COQ).

Aloysia schulziana Moldenke

Sin.: *Aloysia casadensis* Hassl. ex Moldenke, *Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. var. *schulziana* (Moldenke) Botta, *Aloysia lomaplatae* Ravenna, *Aloysia looseri* Moldenke,

Aloysia meyeri Moldenke, *Lippia looseri* (Moldenke) Looser

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). PRY(APY, PHA).

Aloysia scorodonioides (Kunth)

Cham. var. **mathewsii** (Briq.) Moldenke

Sin.: *Aloysia scorodonioides* (Kunth)

Cham. var. *lopez-palacii* Moldenke,

Lippia scorodonioides Kunth var.

mathewsii Briq.

Arbusto. Nativa. 900-2600 m.

Países: ARG(CHA, JUJ, LRI, SAL).

Aloysia scorodonioides (Kunth)

Cham. var. **scorodonioides**

Sin.: *Aloysia boliviensis* Moldenke, *Aloysia scorodonioides* (Kunth) Cham.

var. *detonsa* (Briq.) Moldenke,

Aloysia scorodonioides (Kunth) Cham.

var. *hypoleuca* (Briq.) Moldenke,

Lippia scorodonioides Kunth, *Lippia*

scorodonioides Kunth var. *detonsa*

Briq., *Lippia scorodonioides* Kunth var.

hypoleuca Briq.

Arbusto. Nativa. 200-2800 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC). PRY(APY, BOQ).

Aloysia tarapacana (Botta) Lu-Irving

& O'Leary

Sin.: *Acantholippia tarapacana* Botta

Arbusto. Endémica. 3000-3400 m.

Países: CHL(AYP).

Aloysia trifida (Gay) Lu-Irving &

O'Leary

Sin.: *Acantholippia trifida* (Gay)

Moldenke var. *reichei* Moldenke,

Acantholippia trifida (Gay) Moldenke,

Aloysia fonckii (Phil.) Moldenke, *Aloysia*

gracilis (Phil.) Acevedo, comb. illeg.,

Aloysia reichei Moldenke var. *trilobata*

Moldenke, *Aloysia reichei* Moldenke,

Lippia floribunda Phil., hom. illeg., *Lippia*

fonckii Phil., *Lippia gracilis* Phil., hom.

illeg., *Lippia trifida* Gay var. *gracilis*

(Phil.) Reiche, *Lippia trifida* Gay

Arbusto. Endémica. 1500-2500 m.

Países: ARG(LRI, SJU). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. var.

platyphylla (Briq.) Moldenke

Sin.: *Aloysia naviculata* Ravenna,

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. var.

elliptica (Briq.) Moldenke, *Lippia virgata*

(Ruiz & Pav.) Steud. var. *elliptica* Briq.,

Lippia virgata (Ruiz & Pav.) Steud. var. *platyphylla* Briq.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. var. **virgata**

Sin.: *Aloysia urticoides* Cham., *Aloysia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var.

argutedentata Moldenke, *Aloysia virgata*

(Ruiz & Pav.) Pers. var. *laxa* (Chodat)

Moldenke, *Lippia arborea* Rojas Acosta,

Lippia urticoides (Cham.) Steud. var. *laxa*

Chodat, *Lippia urticoides* (Cham.) Steud.,

Lippia virgata (Ruiz & Pav.) Steud. var.

laxa (Chodat) Briq., *Priva virgata* (Ruiz

& Pav.) Spreng., *Verbena virgata* Ruiz &

Pav., *Zappania virgata* (Ruiz & Pav.) Poir.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR,

JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS,

SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAU,

CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE,

PAI, PHA, SPE).

Bouchea Cham.**Bouchea boliviana** (Kuntze) Moldenke

Sin.: *Valerinoides boliviana* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 600 m.

Países: ARG(JUJ).

Bouchea fluminensis (Vell.) Moldenke

f. **albiflora** Moldenke

Subarbusto. Endémica. 100 m.

Países: BRA(RGS).

Bouchea fluminensis (Vell.) Moldenke

var. **fluminensis**

Sin.: *Bouchea fluminensis* (Vell.)

Moldenke var. *pilosa* Moldenke, *Bouchea*

pseudogervao (A. St.-Hil.) Cham.,

Verbena fluminensis Vell., *Verbena*

pseudogervao A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY).

Casselia Nees & Mart.**Casselia chamaedryfolia** Cham.

Sin.: *Casselia hassleri* Briq., *Casselia*

hymenocalyx Briq., *Timotocia hassleri*

(Briq.) Moldenke, *Timotocia hymenocalyx*

(Briq.) Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Citharexylum L.**Citharexylum amabilis** (Bocq.)

Christenh. & Byng

Sin.: *Baillonia amabilis* Bocq. var. *heterophylla* Kuntze, *Baillonia amabilis* Bocq. var. *longifolia* Kuntze, *Baillonia amabilis* Bocq. var. *pubescens* Moldenke, *Baillonia amabilis* Bocq., *Citharexylum linearifolium* Moldenke, *Stachytarpheta amabilis* (Bocq.) Ravenna

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). PRY(APY, BOQ, CON, PHA).

Citharexylum andinum Moldenke

Sin.: *Citharexylum andinum* Moldenke var. *beckii* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(JUJ).

Citharexylum glaziovii Moldenke

Árbol. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Citharexylum joergensenii (Lillo)

Moldenke

Sin.: *Duranta joergensenii* Lillo

Arbusto o árbol. Nativa. 500-1500 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Citharexylum montevidense

(Spreng.) Moldenke

Sin.: *Citharexylum barbinerve* Cham., *Ehretia montevidense* Spreng.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, MIE, PAI). URY(MAL, RIV, ROC, SOR, TAC, TYT).

Citharexylum myrianthum Cham.Sin.: *Citharexylum macranthum*

Hayek, *Citharexylum myrianthum* Cham. var. *acuminatum* Briq., *Citharexylum myrianthum* Cham. var. *rigidum* Briq.,

Citharexylum rigidum (Briq.) Moldenke

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA, MIE, SPE).

Citharexylum solanaceum Cham.Sin.: *Citharexylum solanaceum* Cham.var. *macrocalyx* Moldenke

Árbol. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Diostea Miers**Diostea juncea** (Gillies & Hook. ex

Hook.) Miers

Sin.: *Baillonia juncea* Benth. & Hook.

f., *Citharexylum germaini* Briq., *Diostea chamaedryfolia* Hort ex Hook. f., nom. illeg., *Diostea infusata* Miers, *Diostea valdiviana* (Phil.) Miers, *Dipyrena dentata* Phil., *Dipyrena infusata* (Miers) Ravenna, *Dipyrena juncea* (Gillies & Hook. ex Hook.) Ravenna, *Dipyrena spartioides* Ravenna, *Dipyrena valdiviana* Phil., *Lippia juncea* (Gillies & Hook. ex Hook.) Schauer, *Verbena juncea* Gillies & Hook. ex Hook.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, RME).

Dipyrena Hook.**Dipyrena glaberrima** (Gillies & Hook. ex Hook.) Hook.

Sin.: *Wilsonia glaberrima* Gillies & Hook. ex Hook.

Arbusto. Endémica. 0-2500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Duranta L.**Duranta erecta** L. var. **erecta**

Sin.: *Duranta ellisia* Jacq., *Duranta plumieri* Jacq., *Duranta plumieri* Jacq. var. *strigillosa* Schauer, *Duranta repens* L.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

PRY(GUA).

Duranta erecta L. var. **grandiflora**

(Moldenke) Caro

Sin.: *Duranta repens* L. var. *grandiflora* Moldenke

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(MIS).

Duranta serratifolia (Griseb.) Kuntze

Sin.: *Duranta lorentzii* Griseb., nom. illeg., *Duranta serratifolia* (Griseb.)

Kuntze var. *punctata* Caro, *Myrtus serratifolia* Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Duranta vestita Cham.

Sin.: *Duranta vestita* Cham. var. *glabrescens* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Glandularia J.F. Gmel.**Glandularia andalgalensis**

(Moldenke) P. Peralta

Sin.: *Verbena andalgalensis* Moldenke

Hierba. Endémica. 2700-2900 m.

Países: ARG(CAT).

Glandularia andina (Griseb.) P. Peralta

Sin.: *Glandularia santiaguensis* Covas & Schnack, *Verbena erinoides* L. var.

andina Griseb., *Verbena santiaguensis* (Covas & Schnack) Moldenke

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SLU, SDE, TUC). PRY(PHA).

Glandularia araucana (Phil.) Botta

Sin.: *Verbena araucana* Phil., *Verbena chilensis* Moldenke, *Verbena glabrata* Phil., nom. illeg.

Subarbusto. Endémica. 900-3000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(MAU, BIO, ARA, RME).

Glandularia aristigera (S. Moore)

Tronc.

Sin.: *Glandularia tenuisecta* (Briq.)

Small, *Verbena aristigera* S. Moore, *Verbena tenuisecta* Briq.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(Desconocida).

Glandularia atacamensis (Reiche)

J.M. Watson & A. Hoffm.

Sin.: *Verbena atacamensis* Reiche, *Verbena trifida* Kunth var. *deserticola* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA).

Glandularia aurantiaca (Speg.) Bottavar. **aurantiaca**

Sin.: *Verbena aurantiaca* Speg., *Verbena aurantiaca* Speg. f. *rosea* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Glandularia aurantiaca (Speg.) Bottavar. **glabra** (Hicken) P. PeraltaSin.: *Glandularia aurantiaca* (Speg.)

Botta var. *glaberrima* (Moldenke) Botta, *Verbena aurantiaca* Speg. var. *glaberrima* Moldenke, *Verbena flava* Gillies ex Hook. f. *abortiva* Hicken, *Verbena radicans*

Gillies & Hook., hom. illeg. var. *glabra*
Hicken, *Verbena radicata* Moldenke var.
glabra (Hicken) Moldenke
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Glandularia balansae (Briq.) N.
O'Leary
Sin.: *Verbena balansae* Briq.
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR,
RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN,
COA, GUA, SPE).

Glandularia berteroi (Schauer) M.
Muñoz
Sin.: *Glandularia reichei* (Acevedo) L.E.
Navas, *Shuttleworthia berteroi* Meisn.,
Verbena berteroi Schauer, *Verbena*
berteroi Schauer f. *albiflora* Moldenke,
Verbena reichei Acevedo
Hierba. Endémica. 100-3400 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, RME).

Glandularia cabreræ (Moldenke)
Botta
Sin.: *Verbena cabreræ* Moldenke,
Verbena dissecta Willd. ex Spreng. f. *alba*
Moldenke
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SDE).

Glandularia catharinae (Moldenke)
N. O'Leary & P. Peralta
Sin.: *Verbena catharinae* Moldenke
Hierba. Endémica. 500-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Glandularia cheitmaniana
(Moldenke) Botta & Poggio
Sin.: *Verbena cheitmaniana* Moldenke
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).

Glandularia corymbosa (Ruiz & Pav.)
N. O'Leary & P. Peralta
Sin.: *Verbena corymbosa* Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
CHL(LBO, BIO, ARA, LLA). URY(CAS).

Glandularia dissecta (Willd. ex
Spreng.) Schnack & Covas
Sin.: *Verbena dissecta* Willd. ex
Spreng., *Verbena dissecta* Willd. ex
Spreng. f. *capitata* Moldenke, *Verbena*
pulchella Sweet f. *latilobata* Moldenke
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI). BRA(RGS).
URY(COL, MON, SJO).

Glandularia dusenii (Moldenke) N.
O'Leary & P. Peralta
Sin.: *Verbena dusenii* Moldenke
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR).

Glandularia flava (Gillies & Hook. ex
Hook.) Schnack & Covas
Sin.: *Glandularia glutinosa* (Kuntze)
Covas & Schnack, *Verbena flava* Gillies
ex Hook., *Verbena flava* Gillies ex Hook.
var. *angustiloba* Speg., *Verbena flava*
Gillies ex Hook. var. *latiloba* Speg.,
Verbena glutinosa Kuntze
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI,
MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).

Glandularia guaibensis P. Peralta &
Thode
Subarbusto. Endémica. 0-100 m.
Países: BRA(RGS).

Glandularia guaranitica Tronc.
Sin.: *Verbena guaranitica* (Tronc.)
Moldenke
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).
BRA(RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAN,
CEN, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

Glandularia gynobasis (Wedd.) N.
O'Leary & P. Peralta
Sin.: *Verbena bella* Phil., *Verbena*
gynobasis Wedd., *Verbena gynobasis*
Wedd. var. *strigosa* Phil.
Hierba o subarbusto. Nativa. 1900-
4000 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Glandularia hasslerana (Briq.) Tronc.
Sin.: *Glandularia pulchra* (Moldenke)
Botta, *Verbena hasslerana* Briq., *Verbena*
pulchra Moldenke
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU,
GUA, MIE, PAI). URY(RIV).

Glandularia hatschbachi (Moldenke)
N. O'Leary & P. Peralta
Sin.: *Verbena hatschbachii* Moldenke
Hierba. Endémica. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Glandularia herteri (Moldenke)
Tronc.
Sin.: *Verbena herteri* Moldenke
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS, SCA). URY(ART, RIV).

Glandularia humifusa (Cham.) Botta
Sin.: *Verbena humifusa* Cham., *Verbena*
reineckii Moldenke
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS).

Glandularia jordanensis (Moldenke)
N. O'Leary & P. Peralta
Sin.: *Verbena campestris* Moldenke,
Verbena jordanensis Moldenke, *Verbena*
lobata Vell. var. *sessilis* Moldenke,
Verbena subpetiolata N. O'Leary
Hierba. Nativa. 500-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Glandularia kuntzeana (Moldenke)
Tronc.
Sin.: *Verbena kuntzeana* Moldenke
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(SCA). PRY(APA, AMA,
COA, PAI, PHA).

Glandularia laciniata (L.) Schnack &
Covas
Sin.: *Erinus laciniatus* L., *Verbena*
erinoides Lam. var. *sabini* D. Don,
Verbena erinoides Lam., *Verbena erinoides*
Willd. ex Spreng., hom. illeg., *Verbena*
laciniata (L.) Briq. var. *contracta* (Lindl.)
Moldenke, *Verbena laciniata* (L.) Briq.
var. *sabini* (D. Don) Moldenke, *Verbena*
laciniata (L.) Briq., *Verbena multifida*
Ruiz & Pav. var. *contracta* Lindl., *Verbena*
multifida Ruiz & Pav., *Verbena odorata*
Meyen, *Verbena trachea* Phil.
Hierba. Nativa. 0-2100 m.
Países: BRA(SCA). CHL(COQ, VAL,
LBO, MAU, BIO, ARA, RME).

Glandularia landbeckii (Phil.) P.
Peralta
Sin.: *Verbena landbeckii* Phil.
Hierba. Endémica. 300-1500 m.
Países: CHL(COQ, VAL).

Glandularia lilloana (Moldenke) Botta
Sin.: *Verbena lilloana* Moldenke
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Glandularia lipozygioides (Walp.)
L.E. Navas
Sin.: *Verbena lipozygioides* Walp., *Verbena*
lipozygioides Walp. var. *minima* Walp.
Hierba. Endémica. 1200-1400 m.
Países: CHL(COQ, RME).

Glandularia lobata (Vell.) P. Peralta
& Thode var. **glabrata** (Moldenke) P.
Peralta & Thode

Sin.: *Verbena lobata* Vell. var. *glabrata* Moldenke

Hierba. Endémica. 900-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Glandularia lobata (Vell.) P. Peralta & Thode var. **lobata**

Sin.: *Verbena buchnera* Vell., *Verbena corymbosa* Cham., hom. illeg., *Verbena lobata* Vell., *Verbena lobata* Vell. var. *hirsuta* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Glandularia macrosperma (Speg.) Tronc.

Sin.: *Glandularia sulphurea* (D. Don) Schnack & Covas var. *intermedia* (Kuntze) L.E. Navas, *Verbena macrosperma* Speg., *Verbena sulphurea* D. Don var. *intermedia* Kuntze

Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL).

Glandularia marrubioides (Cham.) Tronc.

Sin.: *Verbena humifusa* Cham. var. *reticulata* Moldenke, *Verbena marrubioides* Cham.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Glandularia megapotamica (Spreng.) Cabrera & G. Dawson

Sin.: *Verbena megapotamica* Spreng., *Verbena phlogiflora* Cham. var. *macilentata* Schauer

Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI). URY(RNO, SAO).

Glandularia mendocina (Phil.) Covas & Schnack

Sin.: *Verbena mendocina* Phil.
Hierba. Endémica. 500-2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).

Glandularia microphylla (Kunth) Cabrera

Sin.: *Verbena microphylla* Kunth, *Verbena nivea* Moldenke, *Verbena nivea* Moldenke f. *rosea* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).

Glandularia multiglandulosa (Moldenke) P. Peralta

Sin.: *Verbena multiglandulosa* Moldenke
Hierba. Endémica. 1300 m.
Países: CHL(COQ).

Glandularia nana (Moldenke) Tronc.

Sin.: *Verbena nana* Moldenke, *Verbena pulchra* Moldenke var. *paludicola* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, GUA, PHA).

Glandularia paraguariensis (Moldenke) N. O'Leary

Sin.: *Verbena paraguariensis* Moldenke
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Glandularia parodii Covas & Schnack

Sin.: *Verbena parodii* (Covas & Schnack) Moldenke
Hierba. Endémica. 0-3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SJU, SLU).

Glandularia peruviana (L.) Small

Sin.: *Erinus peruvianus* L., *Verbena chamaedryfolia* Juss. var. *melindres* (Gillies) Schauer, *Verbena chamaedryfolia* Juss. var. *melindroides* (Cham.) Schauer, *Verbena chamaedryfolia* Juss., *Verbena melindres* Gillies, *Verbena melindres* Larrañaga, *Verbena melindroides* Cham., *Verbena peruviana* (L.) Britton f. *rosea* Moldenke, *Verbena peruviana* (L.) Britton var. *grabienscula* Kuntze, *Verbena peruviana* (L.) Britton, *Verbena sanguinea* Larrañaga

Hierba. Nativa. 0-1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS, SCA). PRY(CAN, COA, PAI, PHA). URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).

Glandularia phlogiflora (Cham.)

Schnack & Covas
Sin.: *Verbena cunha* Vell., *Verbena hasslerana* Briq. var. *ovatifolia* Moldenke, *Verbena hassleriana* Briq. var. *ovatifolia* Moldenke, *Verbena megapotamica* Spreng. var. *phlogiflora* (Cham.) Kuntze, *Verbena phlogiflora* Cham. f. *alba* Moldenke, *Verbena*

phlogiflora Cham. var. *vulgaris* Schauer, nom. inval., *Verbena phlogiflora* Cham.

Hierba. Nativa. 200-1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAN, GUA, ITA).

Glandularia platensis (Spreng.)

Schnack & Covas
Sin.: *Verbena chamaedryfolia* Juss. f. *foliosa* Chodat, *Verbena chamaedryfolia* Juss. f. *strigosa* Chodat, *Verbena chamaedryfolia* Juss. var. *latiuscula* Briq., *Verbena platensis* Spreng. f. *violacea* Moldenke, *Verbena platensis* Spreng. var. *latiuscula* Briq., hom. illeg., *Verbena platensis* Spreng. var. *stenodes* Briq., *Verbena platensis* Spreng., *Verbena scordioides* Cham., *Verbena teucroides* Gillies & Hook.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SJU, TUC). BRA(RGS). PRY(COA). URY(COL, FLO, MAL, MON, PAY, SAO, SOR, TAC).

Glandularia porrigens (Phil.) J.M. Watson & A. Hoffm.

Sin.: *Verbena cumingii* Moldenke, *Verbena paulsenii* Phil., *Verbena porrigens* Phil.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Glandularia radicata (Moldenke) Tronc. ex Múlgura

Sin.: *Glandularia radicans* (Gillies ex Hook.) Schnack & Covas, comb. illeg., *Verbena radicans* Gillies & Hook., hom. illeg., *Verbena radicata* Moldenke
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SLU, TUC).

Glandularia rectiloba (Moldenke) P. Peralta & Thode

Sin.: *Verbena rectiloba* Moldenke
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: BRA(RGS).

Glandularia ribifolia (Walp.) P. Peralta

Sin.: *Verbena foetida* Phil., *Verbena longavina* Phil., *Verbena ribifolia* Walp., *Verbena ribifolia* Walp. f. *alba* Acevedo, *Verbena ribifolia* Walp. f. *longavina* (Phil.) Acevedo, *Verbena ribifolia* Walp. var. *foetida* (Phil.) Acevedo

Hierba o subarbusto. Nativa. 500-2500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, RME).

Glandularia rupestris V. Thode &

Bordignon

Hierba o subarbusto. Endémica. 700-800 m.

Países: BRA(RGS).

Glandularia scrobiculata (Griseb.)

Tronc.

Sin.: *Glandularia moricolor* (Moldenke)Tronc., comb. illeg., *Verbena hunzikeri* Moldenke, *Verbena moricolor* Moldenke, *Verbena scrobiculata* Griseb.

Hierba. Nativa. 200-2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(RGS).

Glandularia selloi (Spreng.) Tronc.Sin.: *Shuttleworthia selloi* (Spreng.)Walp., *Verbena selloi* Spreng.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, ERI). BRA(RGS). URY(CAS, CLA, MON, PAY, ROC, SJO).

Glandularia sessilifolia V. Thode &

Bordignon

Hierba o subarbusto. Endémica. 9-400 m.

Países: BRA(RGS).

Glandularia sessilis (Cham.) Tronc.Sin.: *Glandularia tristachya* (Tronc. & Burkart) Schnack & Covas, *Verbena kuhlmannii* Moldenke, *Verbena morongii* Britton, *Verbena schulzii* Moldenke, *Verbena sessilis* (Cham.) Kuntze, *Verbena stellarioides* Cham. var. *sessilis* Cham., *Verbena tristachya* Tronc. & Burkart

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR). BRA(RGS). PRY(APY, CAA, CON, ITA, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, RNO).

Glandularia stellarioides (Cham.)

Schnack & Covas

Sin.: *Verbena stellarioides* Cham., *Verbena stellarioides* Cham. var. *decurrens* Cham., nom. inval.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(RGS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, ITA).

Glandularia subincana Tronc.Sin.: *Verbena subincana* (Tronc.)

Shinners

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). URY(ART, SAO, SOR).

Glandularia sulphurea (D. Don)Schnack & Covas var. **pedunculata**

(Clos) L.E. Navas

Sin.: *Verbena sulphurea* D. Don f. *alba* Moldenke ex Skotts., *Verbena sulphurea* D. Don var. *fuscovubra* Skotts., *Verbena sulphurea* D. Don var. *pedunculata* Clos

Hierba. Endémica. 0-1000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Glandularia sulphurea (D. Don)Schnack & Covas var. **sulphurea**Sin.: *Shuttleworthia sulphurea* (D. Don) Meisn., *Uwarowia sulphurea* (D. Don) Meisn., *Verbena sulphurea* D. Don, *Verbena sulphurea* D. Don var. *longituba* Kuntze, *Verbena sulphurea* D. Don var. *scabra* Acevedo, *Verbena sulphurea* D. Don var. *taltalensis* Moldenke

Hierba. Endémica. 2600-3300 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, ARA, RME).

Glandularia tecticaulis (Tronc.) N.

O'Leary

Sin.: *Verbena tecticaulis* Tronc.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APA).

Glandularia tenera (Spreng.) CabreraSin.: *Glandularia pulchella* (Sweet) Tronc. var. *clavellata* Tronc., *Glandularia pulchella* (Sweet) Tronc. var. *gracilior* Tronc., *Glandularia pulchella* (Sweet) Tronc. var. *pulchella*, *Shuttleworthia pulchella* (Sweet) Meisn., *Verbena pulchella* Sweet var. *clavellata* (Tronc.) Shinners, *Verbena pulchella* Sweet var. *gracilior* (Tronc.) Shinners, *Verbena pulchella* Sweet, *Verbena santiaguensis* (Covas & Schnack) Moldenke f. *albiflora* Moldenke, *Verbena tenera* Spreng. f. *albiflora* (Kuntze) Moldenke, *Verbena tenera* Spreng. var. *albiflora* Kuntze, *Verbena tenera* Spreng.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, ITA, PHA). URY(ART, PAY, ROC, SJO).

Glandularia tessmannii (Moldenke) P.

Peralta & Thode

Sin.: *Verbena tessmannii* Moldenke

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Glandularia thymoides (Cham.) N.

O'Leary

Sin.: *Verbena thymoides* Cham., *Verbena thymoides* Cham. f. *albiflora* Moldenke

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, MAL, RIV, TAC).

Glandularia tomophylla (Briq.) P.

Peralta

Sin.: *Glandularia spectabilis* (Moldenke) Botta, *Verbena calliantha* Briq. var. *microsoma* Briq., *Verbena calliantha* Briq., *Verbena megapotamica* Spreng. var. *pinnatiloba* Kuntze, *Verbena pinnatiloba* (Kuntze) Moldenke, *Verbena ramboi* Moldenke, *Verbena spectabilis* Moldenke, *Verbena storeoclada* Briq., *Verbena tomophylla* Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(RGS). PRY(APA, APY, CAU, CEN, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI).

Glandularia tweedieana (Niven ex

Hook.) P. Peralta

Sin.: *Glandularia incisa* (Hook.) Tronc., *Verbena incisa* Hook., *Glandularia tessmannii* (Moldenke) P. Peralta & Thode, *Verbena megapotamica* Spreng. var. *truncatula* Briq., *Verbena megapotamica* Spreng. var. *tweediana* (Niven ex Hook.) Kuntze, *Verbena tessmannii* Moldenke, *Verbena tweediana* Niven ex Hook., *Verbena tweedieana* Niven var. *arriana* Niven ex Maund

Hierba. Nativa. 100-2600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MIS, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(PAY, RNO, SAO).

Glandularia venturii (Moldenke)

Botta

Sin.: *Glandularia glandulifera* (Moldenke) Ragonese, *Glandularia perakii* Covas & Schnack, *Verbena arenaria* Moldenke, *Verbena dissecta* Willd. ex Spreng. f. *glandulifera* (Osten ex Sanzin) Moldenke, *Verbena erinoides* Lam. var. *glandulifera* Osten ex Sanzin, *Verbena glandulifera* Moldenke, *Verbena perakii* (Covas & Schnack) Moldenke, *Verbena venturii* Moldenke

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Junellia Moldenke**Junellia aretioides** (R.E. Fr.)

Moldenke

Sin.: *Junellia pygmaea* (R.E. Fr.) Moldenke, *Verbena aretioides* R.E. Fr., *Verbena pygmaea* R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 2700-4400 m.
Países: ARG(JUU, SAL). CHL(AYP, TAR).

Junellia azorelloides (Speg.)

Moldenke

Sin.: *Verbena azorelloides* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR).

Junellia ballsii (Moldenke) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Glandularia ballsii* (Moldenke)
Botta, *Verbena ballsii* Moldenke
Hierba. Endémica. 1000-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Junellia bisulcata (Hayek) Moldenke var. **bisulcata**

Sin.: *Verbena bisulcata* Hayek
Arbusto. Nativa. 2000-3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Junellia bisulcata (Hayek) Moldenke var. **campestris** (Griseb.) Botta

Sin.: *Junellia juniperina* (Lag.)
Moldenke var. *campestris* (Griseb.)
Moldenke, *Verbena juniperina* Lag. var. *campestris* Griseb.
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(COR, SDE, TUC).

Junellia bryoides (Phil.) Moldenke

Sin.: *Verbena bryoides* Phil.
Arbusto. Endémica. 3100-3900 m.
Países: CHL(AYP, TAR).

Junellia caespitosa (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke

Sin.: *Junellia comberi* (Sandwith)
Moldenke, *Verbena caespitosa* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena comberi* Sandwith
Arbusto. Endémica. 1400-3600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU).
CHL(ATA, COQ).

Junellia congesta (Tronc.) Moldenke

Sin.: *Verbena congesta* Tronc.
Arbusto. Endémica. 1000-2000 m.
Países: ARG(NEU).

Junellia connatibracteata (Kuntze) Moldenke

Sin.: *Junellia dolychothyrsa* (Sandwith)
Moldenke, *Verbena connatibracteata* Kuntze f. *glomerata* Monticelli, nom. inval., *Verbena connatibracteata* Kuntze f. *rosulata* Monticelli, nom. inval., *Verbena connatibracteata* Kuntze, *Verbena dolichothyrsa* Sandwith

Arbusto. Endémica. 100-1100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).

Junellia crithmifolia (Gillies & Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Glandularia crithmifolia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Schnack & Covas, *Verbena crithmifolia* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena crithmifolia* Gillies & Hook. ex Hook. var. *latiloba* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(COQ).

Junellia digitata (Phil.) Moldenke var. **digitata**

Sin.: *Junellia nubigena* (Speg.)
Moldenke, comb. illeg., *Junellia punctulata* Hieron. ex Moldenke, *Junellia spgazzinii* Moldenke, *Junellia tridactyla* (Phil.) Moldenke, *Verbena digitata* Phil., *Verbena nubigena* Speg., nom. illeg., *Verbena spgazzinii* (Moldenke) Tronc., *Verbena tridactyla* Phil., *Verbena triternata* Phil.

Arbusto. Endémica. 3500-4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT).

Junellia digitata (Phil.) Moldenke var. **integerrima** (Botta) Botta

Sin.: *Verbena digitata* Phil. var. *integerrima* Botta
Hierba. Endémica. 3200-4500 m.
Países: ARG(JUU). CHL(TAR, ANT).

Junellia erinacea (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke

Sin.: *Verbena erinacea* Gillies & Hook. ex Hook.
Arbusto. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, RNE, SJU).

Junellia hookeriana (Covas & Schnack) N. O'Leary & P. Peralta var. **catamarcensis** (Moldenke) P. Peralta & N. O'Leary

Sin.: *Verbena catamarcensis* Moldenke
Hierba. Endémica. 1000-1100 m.
Países: ARG(CAT).

Junellia hookeriana (Covas & Schnack) N. O'Leary & P. Peralta var. **hookeriana**

Sin.: *Glandularia hookeriana* Covas & Schnack, *Verbena crithmifolia* Gillies & Hook. ex Hook. f. *minor* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena hookeriana* (Covas & Schnack) Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU).

Junellia juniperina (Lag.) Moldenke

Sin.: *Junellia juniperina* (Lag.)
Moldenke var. *grisea* (I.M. Johnst.)
Moldenke, *Verbena juniperina* Lag., *Verbena juniperina* Gillies & Hook. ex Hook., hom. illeg., *Verbena juniperina* Lag. var. *grisea* I.M. Johnst.
Arbusto. Nativa. 1900-3600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR, RME).

Junellia lavandulaefolia (Phil.) Moldenke

Sin.: *Junellia lavandulaefolia* (Phil.)
Moldenke var. *colchaguensis* (Phil.)
Moldenke, *Verbena colchaguensis* Phil., *Verbena lavandulaefolia* Phil. var. *colchaguensis* (Phil.) Reiche, *Verbena lavandulaefolia* Phil.
Arbusto. Endémica. 1000-3200 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Junellia micrantha (Phil.) Múlgura

Sin.: *Junellia chubutensis* (Speg.)
Moldenke, *Junellia micrantha* (Phil.)
Moldenke, nom. inval., *Junellia serpyllifolia* (Speg.) Moldenke, *Junellia wilczekii* (Briq.) Moldenke, *Monopyrena serpyllifolia* Speg., *Verbena chubutensis* Speg., *Verbena micrantha* Phil., *Verbena ramulosa* Phil., *Verbena serpyllifolia* (Speg.) Speg., *Verbena wilczekii* Briq.
Arbusto. Endémica. 0-3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(LBO, RME).

Junellia minima (Meyen) Moldenke

Sin.: *Junellia minima* (Meyen)
Moldenke var. *strigosa* Moldenke, *Junellia stragulooides* Moldenke, *Verbena minima* Meyen, *Verbena stragulooides* (Moldenke) Tronc., comb. illeg.
Arbusto. Nativa. 2800-4600 m.
Países: ARG(JUU, LRI, MEN, SJU, TUC). CHL(AYP, TAR).

Junellia odonellii Moldenke

Sin.: *Verbena o'donelli* (Moldenke)
Tronc., comb. illeg.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).
CHL(AIS, MAG).

Junellia origenes (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Glandularia origenes* (Phil.)

Schnack & Covas, *Verbena deserticola* Phil., *Verbena origenes* Phil., *Verbena origenes* Phil. var. *glabriflora* Moldenke, *Verbena origenes* Phil. var. *semperi* Moldenke, *Verbena palmata* Reiche
Hierba. Endémica. 0-4000 m.
Países: ARG(COR, LRI, MEN, SAL, SJU). CHL(ANT, ATA, COQ).

Junellia pappigera (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Urbania egañioides* Phil., *Urbania pappigera* Phil.
Arbusto. Nativa. 3100-4800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL). CHL(TAR, ANT, ATA).

Junellia patagonica (Speg.) Moldenke

Sin.: *Verbena morenonis* Kuntze, *Verbena patagonica* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Junellia pseudojuncea (Gay)

Moldenke
Sin.: *Thryothamnus junciformis* Phil., *Verbena junciformis* (Phil.) Reiche, *Verbena pseudojuncea* Gay, *Verbena spathulata* Gillies & Hook. ex Hook. var. *pseudojuncea* (Gay) Reiche
Arbusto. Endémica. 2000-2500 m.
Países: CHL(ATA, COQ).

Junellia selaginoides (Kunth ex Walp.) Moldenke var. **illapelina** (Phil.) Botta

Sin.: *Junellia illapelina* (Phil.) Moldenke, *Verbena illapelina* Phil., *Verbena selaginoides* Kunth ex Walp. var. *illapelina* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémica. 600-1500 m.
Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Junellia selaginoides (Kunth ex Walp.) Moldenke var. **selaginoides**

Sin.: *Verbena alternifolia* Hort ex Schauer, *Verbena polycephala* Turcz., *Verbena selaginoides* Kunth ex Walp.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, COQ).

Junellia seriphioides (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke

Sin.: *Junellia seriphioides* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *glabra* Moldenke, *Junellia seriphioides* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *tomentosa* Moldenke, *Verbena briquetii* J.F. Macbr., *Verbena echinata* Phil., *Verbena hystrix* Briq., hom. illeg.,

Verbena seriphioides Gillies & Hook. ex Hook. var. *glabra* Moldenke, *Verbena seriphioides* Gillies & Hook. ex Hook. var. *lanigera* Hieron., *Verbena seriphioides* Gillies & Hook. ex Hook. var. *tomentosa* Moldenke, *Verbena seriphioides* Gillies & Hook. ex Hook.

Arbusto. Nativa. 1300-4200 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU). CHL(AYP, TAR, ANT).

Junellia silvestrii (Speg.) Moldenke

Sin.: *Verbena silvestrii* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(MAG).

Junellia spathulata (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. **glauca** (Gillies & Hook. ex Hook.) Botta

Sin.: *Diostea filifolia* Miers, *Junellia glauca* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *cisandina* (Niederl.) Moldenke, *Junellia glauca* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke, *Junellia spathulata* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *grandiflora* (Schauer) Botta, *Verbena glauca* Gillies & Hook. ex Hook. var. *cisandina* Niederl., *Verbena glauca* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena ochreata* Briq., *Verbena spathulata* Gillies & Hook. ex Hook. var. *grandiflora* Schauer
Arbusto. Endémica. 500-2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, VAL, MAU, RME).

Junellia spathulata (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. **spathulata**

Sin.: *Diostea stenophylla* Miers, *Lantana clarazii* Ball, *Verbena spathulata* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena spathulata* Gillies & Hook. ex Hook. var. *parviflora* Schauer
Arbusto. Endémica. 1900-2200 m.
Países: ARG(MEN, NEU). CHL(COQ, LBO, MAU, RME).

Junellia spissa (Sandwith) Moldenke

Sin.: *Verbena spissa* Sandwith
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).

Junellia succulentifolia (Kuntze) Moldenke

Sin.: *Junellia scabridoglandulosa* (Turrill) Moldenke, *Verbena scabridoglandulosa* Turrill, *Verbena succulentifolia* Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-1200 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE).

Junellia thymifolia (Lag.) Moldenke

Sin.: *Verbena thymifolia* Lag.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR). CHL(MAG).

Junellia tonini (Kuntze) Moldenke var. **mulinoides** (Speg.) Múlgura & P. Peralta

Sin.: *Junellia mulinoides* (Speg.) Moldenke, *Verbena mulinoides* Speg.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Junellia tonini (Kuntze) Moldenke var. **tonini**

Sin.: *Verbena tonini* Kuntze
Arbusto. Endémica. 0-1100 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Junellia tridactylites (Lag.) Moldenke

Sin.: *Junellia minutifolia* (Phil.) Moldenke, *Junellia rosulata* Moldenke f. *alba* Moldenke, *Junellia rosulata* Moldenke f. *rosulata*, *Junellia struthionum* (Speg.) Moldenke, *Verbena bonariensis* Rendle, hom. illeg., *Verbena microphylla* Phil., hom. illeg., *Verbena minutifolia* Phil., *Verbena patagonica* Moldenke, hom. illeg., *Verbena philippiana* Kuntze, nom. illeg., *Verbena prichardi* Rendle, *Verbena struthionum* Speg., *Verbena tridactylites* Lag.
Arbusto. Endémica. 2300-2400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Junellia trifurcata (Phil.) Moldenke

Sin.: *Verbena trifurcata* Phil.
Subarbusto. Endémica. 2300-3400 m.
Países: CHL(RME).

Junellia ulicina (Phil.) Moldenke

Sin.: *Junellia ameghinoi* (Speg.) Moldenke, *Junellia intricata* (Briq.) Moldenke, *Verbena ameghinoi* Speg., *Verbena intricata* Briq., *Verbena ulicina* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).

Junellia uniflora (Phil.) Moldenke

Sin.: *Junellia uniflora* (Phil.) Moldenke var. *grabiuscula* (Kuntze) Moldenke, *Lycium nanum* Phil., *Verbena uniflora* Phil., *Verbena uniflora* Phil. var. *grabiuscula* Kuntze
Arbusto. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, MAU, RME).

Lampayo F. Phil. ex Murillo**Lampayo castellani** Moldenke

Sin.: *Lampayo aratae* Molfino, nom. nud., *Lampaya aratae* Molfino ex Domínguez
Arbusto. Nativa. 3000-4000 m.
Países: ARG(JUU).

Lampayo hieronymi K. Schum. ex Moldenke

Sin.: *Lampayo schickendantzii* Moldenke ex J.H. Hunz., nom. nud.
Arbusto. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).
CHL(ANT).

Lampayo medicinalis F. Phil.

Arbusto. Endémica. 2000-4500 m.
Países: CHL(AYP, TAR, ANT).

Lantana L. nom. cons.**Lantana achyranthifolia** Desf.

Sin.: *Lantana bernardinensis* Briq., *Lantana cabreriae* Moldenke, *Lantana purpurea* Benth. & Hook. f., nom. illeg., *Lippia imbricata* Kuntze, *Lippia purpurea* J. Jacq., nom. illeg.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUU, SAL). PRY(APY, AMA, CON, COA, ITA, SPE).

Lantana balansae Briq.

Sin.: *Lantana balansae* Briq. f. *albiflora* Osten & Moldenke, *Lantana balansae* Briq. var. *peduncularis* Briq.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, LRI, MIS, SFE). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, ÑEE, PHA).
URY(LAV).

Lantana camara L.

Sin.: *Camara aculeata* (L.) Kuntze, *Lantana aculeata* L., *Lantana camara* L. f. *mista* (L.) Moldenke, *Lantana camara* L. var. *aculeata* (L.) Moldenke, *Lantana camara* L. var. *flava* (Medik.) Moldenke, *Lantana camara* L. var. *mista* (L.) L.H. Bailey, *Lantana camara* L. var. *nivea* (Vent.) L.H. Bailey, *Lantana flava* Medik., *Lantana foetida* Rusby, *Lantana hirsuta* M. Martens & Galeotti subsp. *amazonica* R.W. Sanders, *Lantana hirsuta* M. Martens & Galeotti, *Lantana horrida* Kunth subsp. *tiliifolia* (Cham.) R.W. Sanders, *Lantana minasensis* Moldenke var. *hispidula* Moldenke, *Lantana mista*

L., *Lantana nivea* Vent., *Lantana planaltensis* R.W. Sanders, *Lantana tiliifolia* Cham. f. *albiflora* Moldenke, *Lantana tiliifolia* Cham. f. *tiliifolia*, *Lantana triplinervia* Turcz. var. *hispidula* (Moldenke) Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(VAL, IPA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).
URY(LAV).

Lantana canescens Kunth

Sin.: *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *cabreriae* Moldenke, *Lantana canescens* Kunth f. *grandifolia* Moldenke, *Lantana canescens* Kunth f. *parvifolia* Moldenke, *Lantana lamiifolia* Otto & D. Dietr., *Lantana venosa* (Rusby) D. Liesner & S. Hirth, *Lippia venosa* Rusby
Arbusto. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
BRA(PAR). PRY(APY).

Lantana entrerriensis Tronc.

Arbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS).

Lantana fucata Lindl.

Sin.: *Camara lilacina* (Desf.) Kuntze var. *parvifolia* Kuntze, *Lantana balansae* Briq. var. *hatschbachii* Moldenke, *Lantana czermakii* Briq., *Lantana fucata* Lindl. var. *albiflora* Moldenke, *Lantana fucata* Lindl. var. *longipes* Moldenke, *Lantana lilacina* Desf. var. *media* (Kuntze) Briq., *Lantana lilacina* Desf. var. *parvifolia* (Kuntze) Briq., *Lantana lilacina* Desf.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA).
URY(PAY, RIV, TAC).

Lantana grisebachii Stuck. ex Seckt

Sin.: *Camara spicata* (Griseb.) Kuntze, *Lantana cordobensis* Moldenke, nom. superfl., *Lantana grisebachii* Stuck. ex Seckt var. *brachyrachis* Tronc., *Lantana spicata* (Griseb.) Benth. & Hook. ex Kuntze, *Tamonopsis spicata* Griseb.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, TUC).

Lantana hypoleuca Briq.

Sin.: *Lantana mollis* Moldenke, nom. illeg., *Lantana velutinoides* Moldenke
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON).

Lantana lundiana Schauer

Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, MIE, PAI).

Lantana magnibracteata Tronc.

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Lantana megapotamica (Spreng.)

Tronc.
Sin.: *Lantana grisebachii* Stuck. ex Seckt var. *violacea* Tronc., *Lantana reineckii* Briq., *Lantana velutinoides* Moldenke var. *bruchii* Moldenke, *Lippia megapotamica* Spreng.
Arbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, SJU, SLU, SFE, SDE).
BRA(RGS). PRY(APY, BOQ). URY(LAV, RIV, ROC, TAC, TYT).

Lantana micrantha Briq.

Sin.: *Lantana micrantha* Briq. f. *violacea* Moldenke, *Lantana micrantha* Briq. var. *armata* Moldenke
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Lantana montevidensis (Spreng.) Briq.

Sin.: *Camara montevidensis* (Spreng.) Kuntze, *Camara sellowiana* (Link & Otto) Kuntze, *Lantana montevidensis* (Spreng.) Briq. f. *albiflora* Moldenke, *Lantana planifolia* (Cham.) Briq., *Lantana sellowiana* Link & Otto f. *planifolia* Cham., *Lantana sellowiana* Link & Otto, *Lippia montevidensis* Spreng.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, LRI, MIS, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, MIE, ÑEE).
URY(MAL, RNO, SJO).

Lantana ramboi (Moldenke) Salimena & Múlgura

Sin.: *Lippia ramboi* Moldenke, *Lippia ramboi* Moldenke var. *pilosa* Moldenke
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Lantana tilcarensis Tronc.

Arbusto. Endémica. 2500-3000 m.
Países: ARG(JUU, SAL, TUC).

Lantana trifolia L. f. **hirsuta**

Moldenke

Arbusto. Endémica. 500-1500 m.
Países: ARG(JUU, SAL).

Lantana trifolia L. f. **trifolia**

Sin.: *Camara trifolia* (L.) Kuntze, *Lantana celtidifolia* Kunth, *Lantana fiebrigii* Hayek, *Lantana trifolia* L. f. *albiflora* Moldenke, *Lantana trifolia* L. var. *pluripedunculata* Moldenke, *Lantana trifolia* L. var. *vulgata* Briq., *Lantana undulata* Schrenk var. *saltensis* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR). PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Lantana undulata Schrank

Arbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Lantana velutina M. Martens &

Galeotti

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR, SAL). PRY(APY, PHA).

Lantana xenica Moldenke

Subarbusto. Endémica. 500-2000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, SDE, TUC).

Lippia L.**Lippia aberrans** (Briq.) Tronc.

Sin.: *Lippia tristis* Briq. var. *aberrans* Briq.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CAU, CAN).

Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson var. **alba**

Sin.: *Camara alba* (Mill.) Kuntze, *Lantana alba* Mill., *Lantana geminata* (Kunth) Spreng., *Lippia citrata* Cham., *Lippia geminata* Kunth var. *microphylla* Griseb., *Lippia geminata* Kunth, *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze var. *geminata* (Kunth) Kuntze, *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze var. *normalis* Kuntze, *Zappania geminata* (Kunth) Gibert

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SDE).

BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, ÑEE, PHA). URY(MAL, RNO, SAO, SJO).

Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson var. **lanceolata** (Griseb.) Múlgura

Sin.: *Lippia chacensis* Moldenke, *Lippia geminata* Kunth var. *lanceolata* Griseb., *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze f. *incana* Kuntze, *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze var. *lanceolata* (Griseb.) Kuntze, *Lippia lorentzii* Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI, FOR, SAL). PRY(APY, PHA).

Lippia angustifolia Cham.

Sin.: *Lippia bothriura* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR). PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, MIE, ÑEE, SPE).

Lippia arechavaletae Herter ex

Moldenke

Sin.: *Lippia arechavaletae* Herter ex Moldenke var. *microphylla* Moldenke Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(CLA, PAY, RNO, SAO, SOR).

Lippia aristata Schauer

Sin.: *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *angustifolia* (Kuntze) Moldenke, *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *aristata*, *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *brachypoda* Briq., *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *genuina* Briq., *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *longipedunculata* Moldenke, *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *pluripedunculata* (Kuntze) Moldenke, *Lantana aristata* (Schauer) Briq. var. *subsessilis* Moldenke, *Lippia aristata* Schauer f. *pluripedunculata* Kuntze, *Lippia aristata* Schauer var. *angustifolia* Kuntze, *Lippia aristata* Schauer var. *latifolia* Kuntze

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(PAR). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, PHA, SPE).

Lippia asperrima Cham.

Sin.: *Lippia asperrima* Cham. f. *angustifolia* Moldenke, *Lippia asperrima* Cham. var. *rotundata* Moldenke, *Lippia contermina* Briq. var. *contermina*, *Lippia*

contermina Briq. var. *hirsuta* Moldenke, *Lippia phaeocephala* Briq., *Lippia rodriguezii* Moldenke, *Lippia turnerifolia* Cham. var. *camporum* Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA). URY(CLA, FLA).

Lippia balansae Briq.

Sin.: *Lantana jorgenseni* Moldenke, *Lippia callicada* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Lippia brasiliensis (Link) T. Silva

Sin.: *Lantana brasiliensis* Link

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, GUA, SPE).

Lippia campestris Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: BRA(PAR).

Lippia coarctata Tronc.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(RGS).

URY(ART, FLA, PAY, TAC).

Lippia coriacea Briq.

Sin.: *Lippia coriacea* Briq. f. *angustifolia* Briq., nom. inval., *Lippia coriacea* Briq. f. *latifolia* Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(CEN, SPE).

Lippia ekmanii Moldenke

Sin.: *Lippia sclerophylla* Briq. var. *lorentzii* Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(RGS).

Lippia felicei Moldenke

Sin.: *Lippia lupulina* Cham. var. *paraguariensis* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAN, SPE).

Lippia fragrans Turcz.

Sin.: *Buddleja geisseana* Phil., *Lippia geisseana* (Phil.) Soler.

Arbusto. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ).

Lippia grandiflora Mart. & Schauer ex Schauer

Sin.: *Lantana chamaedrifolia* Cham., *Lantana hassleri* Briq., *Lippia pusilla* T. Silva & Salimena

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
BRA(PAR). PRY(APA, CAU, COA, MIE).

Lippia grata Schauer

Sin.: *Lippia dumetorum* Herzog, *Lippia hickenii* Tronc., *Lippia laxibracteata* Herzog

Arbusto. Nativa. 300-1600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, BOQ).

Lippia grisebachiana Moldenke

Sin.: *Lantana brachypoda* Hayek, *Lantana venturi* Moldenke, *Lippia brachypoda* (Hayek) Tronc., *Lippia lantanifolia* Griseb., hom. illeg.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Lippia hassleriana Chodat

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).

Lippia hieracifolia Cham.

Sin.: *Lippia alegrensis* Briq. ex Augusto, nom. nud., *Lippia intermedia* Cham., *Lippia intermedia* Cham. var. *parvifolia* Moldenke, *Lippia scaposa* Briq., *Lippia scaposa* Briq. var. *melanocaulos* Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(APA, CAU, CAA, COA, MIE, SPE). URY(RIV).

Lippia hirta (Cham.) Schauer

Sin.: *Dipterocalyx glabrescens* Cham., *Dipterocalyx hirtus* Cham., *Lippia glabrescens* (Cham.) Meisn.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron.

Sin.: *Lippia boliviana* Rusby var. *angusta* Moldenke, *Lippia boliviana* Rusby var. *integrifolia* Moldenke, *Lippia boliviana* Rusby, *Lippia integrifolia* (Griseb.) Hieron. var. *beckii* Moldenke, *Lippia turbinata* Griseb. var. *integrifolia* Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).

Lippia junelliana (Moldenke) Tronc.

Sin.: *Lantana junelliana* Moldenke, *Lippia crenata* (Griseb.) Kuntze, comb. illeg., *Lippia lantanifolia* Griseb. var. *crenata* Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Lippia lamiana (Moldenke) Moldenke

Sin.: *Lantana lamiana* Moldenke
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Lippia lasiocalycina Cham.

Sin.: *Lippia lasiocalycina* Cham. var. *sainthilaire* Moldenke, *Lippia phryxocalyx* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CON).

Lippia lasiocalyx Herzog

Sin.: *Lippia trollii* Moldenke, *Lippia trollii* Moldenke var. *inermis* Moldenke
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Lippia lippioides (Cham.) Rusby

Sin.: *Camara lippioides* (Cham.) Kuntze, *Lantana chamissonis* (D. Dietr.) Benth. & Hook., *Lantana chamissonis* (Schauer) Briq., comb. illeg.

Lippia chamissonis D. Dietr., nom. superfl., *Riedelia lippioides* Cham.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Lippia longepedunculata Kuntze

Sin.: *Lippia heterophylla* Briq., *Lippia heterophylla* Briq. var. *ciliatifolia* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAU, CEN, CON, PAI, PHA).

Lippia lupulina Cham.

Sin.: *Lippia lupulina* Cham. f. *alba* Moldenke, *Lippia lupulina* Cham. var. *albiflora* Tronc., *Lippia paraguayensis* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR).
PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, SPE).

Lippia organoides Kunth

Sin.: *Lippia affinis* Schauer, *Lippia candicans* Hayek, *Lippia microphylla*

Cham., *Lippia obscura* Briq., *Lippia pendula* Briq., *Lippia polycephala* Briq. var. *aemilii* Briq., *Lippia polycephala* Briq., *Lippia salviifolia* Cham., *Lippia sidoides* Cham.

Arbusto. Nativa. 100-1800 m.
Países: ARG(MIS, SAL). BRA(PAR).
PRY(APY, AMA, CON, COA, PAI).

Lippia paranensis (Moldenke) T. Silva & Salimena

Sin.: *Lantana paranensis* Moldenke
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: BRA(PAR).

Lippia pumila Cham.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Lippia recolletae Morong

Sin.: *Lippia pickellii* Moldenke, *Lippia recolletae* Morong var. *balansae* Chodat, *Lippia recolletae* Morong var. *pickellii* (Moldenke) Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR).
PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Lippia salsa Griseb.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).

Lippia sandwithiana Moldenke

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: PRY(AMA).

Lippia sclerophylla Briq.

Sin.: *Lippia sclerophylla* Briq. var. *crenato-dentata* Briq., *Lippia sclerophylla* Briq. var. *subintegra* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA).

Lippia seriphioides A. Gray

Sin.: *Acantholippia seriphioides* (A. Gray) Moldenke, *Lippia foliolosa* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, SCR).

Lippia suffruticosa (Griseb.) Kuntze

Sin.: *Lippia geminata* Kunth var. *suffruticosa* Griseb.
Arbusto. Nativa. 700-2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Lippia tegulifera Briq.

Sin.: *Lippia tegulifera* Briq. var. *grisea* Briq., *Lippia tegulifera* Briq. var. *ovata* Briq., *Lippia tegulifera* Briq. var. *parvifolia* Briq., *Lippia tegulifera* Briq. var. *pedunculata* Briq.

Hierba o subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS). PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).

Lippia tristis Briq.

Sin.: *Lippia tristis* Briq. var. *normalis* Briq., nom. inval.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CEN, PAI, SPE).

Lippia turbinata Griseb. f.**magnifolia** Moldenke

Sin.: *Lippia fissicalyx* Tronc.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Lippia turbinata Griseb. f. **turbinata**

Sin.: *Lippia aprica* Phil., *Lippia disepala* Phil., *Lippia globiflora* (L'Hér.) Kuntze f. *glabriuscula* Kuntze, *Lippia turbinata* Griseb. f. *angustifolia* Osten ex Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(ATA). PRY(APY, PHA).

Lippia turnerifolia Cham. var.**polytricha** (Briq.) Múlgura

Sin.: *Lippia polytricha* Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI). URY(RIV).

Lippia turnerifolia Cham. var.**turnerifolia**

Sin.: *Lippia modesta* Briq., *Lippia morongii* Kuntze, *Lippia turnerifolia* Cham. var. *angusta* Kuntze, *Lippia turnerifolia* Cham. var. *sessilifolia* Moldenke

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1700 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(RGS). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).

Lippia villafloridana Kuntze

Sin.: *Lippia asperrima* Cham. var.

longepedunculata Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE). PRY(CAU, MIE, PAI). URY(CLA, PAY, SAO).

Mulguraea N. O'Leary & P.

Peralta

Mulguraea arequipensis (Botta) N.

O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Diphyrena arequipensis* (Botta)

Ravenna, *Junellia arequipense* (Botta)

Botta, *Verbena arequipense* Botta

Arbusto. Nativa. 2200-4300 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Mulguraea asparagoides (Gillies &

Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia asparagoides* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke, *Junellia diversifolia* (Kuntze) Moldenke, *Verbena asparagoides* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena diversifolia* Kuntze

Arbusto. Endémica. 2000-2800 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC). CHL(ATA, COQ, VAL).

Mulguraea aspera (Gillies & Hook.

ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta var.

aspera

Sin.: *Junellia aspera* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke, *Junellia longidentata* Moldenke var. *glandulosa* Botta, *Junellia tripartita* Moldenke, *Verbena aspera* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena ourostachya* Briq.

Arbusto. Endémica. 200-2200 m.

Países: ARG(CAT, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU). CHL(TAR).

Mulguraea aspera (Gillies & Hook.

ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta var.

longidentata (Moldenke) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia aspera* (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. *longidentata* (Moldenke) Múlgura & P. Peralta, *Junellia longidentata* Moldenke, *Verbena aspera* Gillies & Hook. ex Hook. var.

longidentata (Moldenke) Botta

Arbusto. Endémica. 1000-3000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Mulguraea cedroides (Sandwith) N.

O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia cedroides* (Sandwith)

Moldenke, *Verbena cedroides* Sandwith

Arbusto. Endémica. 1200 m.

Países: ARG(NEU, RNE).

Mulguraea cinerascens (Schauer) N.

O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Diostea cinerascens* (Schauer)

Moldenke, *Diphyrena cinerascens*

(Schauer) Ravenna, *Junellia cinerascens*

(Schauer) Botta, *Verbena cinerascens*

Schauer

Arbusto. Endémica. 1000-1500 m.

Países: CHL(COQ, VAL).

Mulguraea echegarayi (Hieron.) N.

O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Junellia echegarayi* (Hieron.)

Moldenke, *Junellia echegarayi* (Hieron.)

Moldenke var. *cordifolia* Moldenke,

Junellia echegarayi (Hieron.) Moldenke

var. *puberulenta* Moldenke, *Verbena*

echegarayi Hieron.

Arbusto. Endémica. 1900-3000 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Mulguraea hystrix (Phil.) N. O'Leary

& P. Peralta

Sin.: *Junellia hystrix* (Phil.) Moldenke,

Verbena hystrix Phil.

Arbusto. Endémica. 2600-3700 m.

Países: ARG(SJU). CHL(ANT, ATA).

Mulguraea ligustrina (Lag.) N.

O'Leary & P. Peralta var. **ligustrina**

Sin.: *Aloysia ligustrina* (Lag.) Small,

Junellia ligustrina (Lag.) Moldenke,

Lippia ligustrina (Lag.) Britton, *Lippia*

ligustrina (Lag.) Kuntze, comb. superfl., *Verbena ligustrina* Lag.

Arbusto. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).

Mulguraea ligustrina (Lag.) N.

O'Leary & P. Peralta var. **lorentzii**

(Niederl. ex Hieron.) N. O'Leary & P.

Peralta

Sin.: *Junellia alatocarpa* (Tronc.)

Moldenke, *Junellia chubutensis* Moldenke,

hom. illeg., *Junellia ligustrina* (Lag.)

Moldenke var. *lorentzii* (Niederl. ex

Hieron.) Moldenke, *Junellia lorentzii*

(Niederl. ex Hieron.) Moldenke, *Verbena*

alatocarpa Tronc., *Verbena inconcinna* Briq.,

Verbena lorentzii Niederl. ex Hieron.

Arbusto. Endémica. 0-2200 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN,

NEU, RNE, SCR).

Mulguraea scoparia (Gillies & Hook.

ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sin.: *Diostea scirpea* (Phil.) Miers,

Diostea scoparia (Gillies & Hook. ex

Hook.) Miers var. *puberula* (Tronc.)

Moldenke, *Diostea scoparia* (Gillies

& Hook. ex Hook.) Miers, *Dipyrena scoparia* (Hook.) Ravenna, *Junellia scoparia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Botta var. *puberula* (Tronc.) Botta, *Junellia scoparia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Botta, *Lippia aphylla* Phil., *Lippia scirpea* Phil., *Neosparton scirpeum* (Phil.) Ravenna, nom. inval., *Verbena scoparia* Gillies & Hook. ex Hook. var. *aphylla* (Phil.) Acevedo, comb. illeg., *Verbena scoparia* Gillies & Hook. ex Hook. var. *puberula* Tronc., *Verbena scoparia* Gillies & Hook. ex Hook., *Verbena scoparia* Tausch, hom. illeg.
Arbusto. Endémica. 1800-3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU). CHL(COQ, VAL, RME).

Mulguraea tetragonocalyx (Tronc.) N. O'Leary & P. Peralta
Sin.: *Junellia tetragonocalyx* (Tronc.) Moldenke, *Verbena tetragonocalyx* Tronc.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).

Mulguraea tridens (Lag.) N. O'Leary & P. Peralta
Sin.: *Junellia tridens* (Lag.) Moldenke, *Verbena carroo* Speg., *Verbena tridens* Lag.
Arbusto. Endémica. 0-800 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR). CHL(MAG).

Neosparton Griseb.

Neosparton aphyllum (Gillies & Hook. ex Hook.) Kuntze
Sin.: *Diostea scoparia* (Gillies & Hook. ex Hook.) Miers var. *subulata* Moldenke, *Verbena aphylla* Gillies & Hook. ex Hook.
Arbusto. Endémica. 0-2600 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).

Neosparton ephedroides Griseb.
Sin.: *Lippia darwinii* (Benth. & Hook. f.) Speg., *Neosparton darwinii* Benth. & Hook. f., *Neosparton striatum* Phil.
Arbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, MEN, NEU, SAL, TUC).

Neosparton patagonicum Tronc.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Parodianthus Tronc.

Parodianthus capillaris Tronc.
Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Países: ARG(COR).

Parodianthus ilicifolius (Moldenke) Tronc.
Sin.: *Casselia ilicifolia* Moldenke, *Timotocia ilicifolia* (Moldenke) Moldenke
Arbusto. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COR, LRI, SLU).

Petrea L.

Petrea volubilis L.
Sin.: *Petrea racemosa* Nees
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, SCA). PRY(AMA).

Phyla Lour.

Phyla betulifolia (Kunth) Greene
Sin.: *Lippia betulifolia* Kunth
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, BOQ, CON, ÑEE).

Phyla nodiflora (L.) Greene var. **minor** (Gillies & Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta
Sin.: *Lippia caespitosa* Rusby, *Lippia canescens* Kunth, *Lippia filiformis* Schrad., *Lippia litoralis* Phil., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *minor* Gillies & Hook. ex Hook., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *pusilla* Briq., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *rosea* (D. Don) J.F. Macbr., hom. illeg., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *rosea* (D. Don) Munz, *Lippia subterranea* Rusby, *Lippia uncinuligera* Nees ex Walp., *Phyla caespitosa* (Rusby) Moldenke, *Phyla canescens* (Kunth) Greene, *Phyla nodiflora* (L.) Greene f. *copiapina* Acevedo, *Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *canescens* (Kunth) Moldenke, *Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *pusilla* (Briq.) Moldenke, *Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *rosea* (D. Don) Moldenke, *Phyla subterranea* (Rusby) Moldenke, *Zappania canescens* Gilbert, *Zappania nodiflora* (L.) Lam. var. *rosea* D. Don

Hierba. Nativa. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(RGS). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(APY, BOQ, ÑEE, NAS, PHA). URY(ART, LAV, MON, ROC, SJO).

Phyla nodiflora (L.) Greene var. **nodiflora**

Sin.: *Blairia nodiflora* (L.) Gaertn., *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *normalis* Kuntze, nom. inval., *Lippia nodiflora* (L.) Michx., *Platonia nodiflora* (L.) Raf., *Verbena nodiflora* L., *Zappania nodiflora* (L.) Lam.

Hierba. Nativa.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). CHL(TAR, ATA). PRY(PHA). URY(ROC).

Phyla nodiflora (L.) Greene var. **reptans** (Kunth) Moldenke

Sin.: *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *reptans* (Kunth) Kuntze, *Lippia reptans* Kunth, *Phyla reptans* (Kunth) Greene, *Phyla strigulosa* (M. Martens & Galeotti) Moldenke var. *sericea* (Kuntze) Moldenke, *Phyla strigulosa* (M. Martens & Galeotti) Moldenke, *Verbena fruticosa* Mill.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SDE). BRA(RGS). CHL(TAR, ANT, ATA, COQ, VAL). PRY(APY, BOQ, CEN, CON, PHA). URY(ROC).

Pitreaea Turcz.

Pitreaea cuneato-ovata (Cav.) Caro
Sin.: *Bouchea copiapensis* Gay, *Castelia cuneato-ovata* Cav., *Phelloderma cuneato-ovata* (Cav.) Miers, *Pitreaea chilensis* Turcz., *Priva cuneato-ovata* (Cav.) Rusby, *Priva laevis* Juss.

Hierba. Nativa. 0-3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, CHU, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME).

Priva Adans.

Priva boliviana Moldenke
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(FOR, SAL, SDE). PRY(APY, BOQ, PHA).

Recordia Moldenke

Recordia reitzii (Moldenke) Thode & N. O'Leary

Sin.: *Citharexylum reitzii* Moldenke, *Verbenoxylum reitzii* (Moldenke) Tronc. Árbol. Endémica. 0-400 m. Países: BRA(RGS, SCA).

Rhaphithamnus Miers

Rhaphithamnus spinosus (Juss.) Moldenke

Sin.: *Citharexylum cyanocarpum* Hook. & Arn., *Citharexylum ovatum* Turcz., *Duranta umbellata* Miers, *Duranta umbilicata* Miers, *Rhaphithamnus amoenus* Miers, *Rhaphithamnus buxifolius* Miers, *Rhaphithamnus cyanocarpum* (Hook. & Arn.) Miers, *Rhaphithamnus macranthus* Gand., *Rhaphithamnus parvifolius* Miers, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke f. *albiflorus* G. Kunkel, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke f. *microphyllus* G. Kunkel, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke var. *inermis* G. Kunkel, *Volkameria spinosa* Juss., *Volkameria verticillata* Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(CHU, NEU, RNE). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, RME).

Rhaphithamnus venustus (Phil.) B.L. Rob.

Sin.: *Citharexylum venustum* Phil., *Rhaphithamnus longiflorus* Miers, *Rhaphithamnus serratifolius* Miers, *Rhaphithamnus venustus* (Phil.) Skottsb., comb. superfl. Árbol. Endémica. 0-1000 m. Países: CHL(JFE).

Stachytarpheta Vahl

Stachytarpheta angustifolia (Mill.) Vahl

Sin.: *Stachytarpheta angustissima* Moldenke, *Stachytarpheta elatior* Schrad. ex Schult., *Verbena angustifolia* Mill. Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(APY).

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl

Sin.: *Stachytarpheta australis* Moldenke, *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl f. *alba* Moldenke ex Tronc. & Botta, *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl f. *albiflora* Moldenke, *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl

var. *candicans* Briq., *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl var. *virescens* Briq., *Stachytarpheta dichotoma* (Ruiz & Pav.) Vahl, *Stachytarpheta maximiliani* Schauer var. *ciliaris* Moldenke, *Stachytarpheta patens* Moldenke, *Verbena cayennensis* Rich., *Verbena dichotoma* Ruiz & Pav.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(ART).

Stachytarpheta fiebrigii Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(CON).

Stachytarpheta gesnerioides Cham.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m. Países: PRY(AMA).

Stachytarpheta hassleri Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(COA).

Stachytarpheta laevis Moldenke

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Stachytarpheta paraguariensis

Moldenke Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(SCA). PRY(APY).

Stachytarpheta polyura Schauer

Arbusto. Nativa. 0-500 m. Países: BRA(PAR).

Tamonea Aubl.

Tamonea curassavica (L.) Pers. var. **cardenasii** (Moldenke) N. O'Leary, P. Peralta & Múlgura

Sin.: *Ghinia cardenasii* Moldenke, *Tamonea cardenasii* (Moldenke) Tronc. Subarbusto. Nativa. 0-500 m. Países: PRY(APY).

Verbena L.

Verbena alata Otto ex Sweet

Sin.: *Verbena alata* Cham., hom. illeg. Hierba. Nativa. 0-1600 m. Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbena bonariensis L. var. **bonariensis**

Sin.: *Verbena bonariensis* L. f. *albiflora* Moldenke, *Verbena bonariensis* L. var. *brevibracteata* Kuntze, *Verbena elongata* Salisb., *Verbena incompta* P.W. Michael, *Verbena litoralis* Kunth var. *brasiliensis* (Vell.) Briq., nom. inval., *Verbena litoralis* Kunth var. *brevibracteata* (Kuntze) N. O'Leary, *Verbena trichotoma* Moench Hierba. Nativa. 0-2100 m. Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME). PRY(APA, APY, CAA, CEN, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE). URY(COL, FLA, MON).

Verbena bonariensis L. var. **conglomerata** Briq.

Sin.: *Verbena inamoena* Briq. Hierba. Endémica. 0-1000 m. Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE). BRA(RGS). PRY(CAA, GUA, SPE). URY(PAY, ROC, SAO, SJO).

Verbena caniuensis Moldenke

Hierba. Endémica. 800 m. Países: BRA(PAR).

Verbena cuneifolia Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. 2000-4000 m. Países: CHL(RME).

Verbena ephedroides Cham.

Sin.: *Verbena ephedroides* Cham. var. *entrierensis* Tronc. Hierba. Endémica. 0-500 m. Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(ÑEE).

Verbena filicaulis Schauer

Sin.: *Verbena australis* Moldenke, *Verbena filicaulis* Schauer var. *australis* (Moldenke) Moldenke, *Verbena filicaulis* Schauer var. *pinnatisecta* (Schauer) Moldenke, *Verbena pinnatisecta* Schauer, *Verbena regnelliana* Moldenke Hierba. Nativa. 0-1000 m. Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbena gracilescens (Cham.) Herter var. **gracilescens**

Sin.: *Verbena officinalis* L. var. *gracilescens* Cham., *Verbena parvula* Hayek Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). PRY(APY, CON, PAI, PHA). URY(ART, CLA, FLA, PAY, SJO, TAC).

Verbena gracilescens (Cham.) Herter var. **swiftiana** (Moldenke) N. O'Leary
Sin.: *Verbena swiftiana* Moldenke
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(RGS, SCA).

Verbena hirta Spreng. var. **gracilis** Dusén
Sin.: *Verbena reitzii* Moldenke var. *castrensis* Moldenke, *Verbena strigosa* Cham.
Hierba. Nativa. 0-1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbena hirta Spreng. var. **hirta**
Sin.: *Verbena hirta* Spreng. var. *dusenii* Moldenke, *Verbena paranensis* Moldenke Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbena hispida Ruiz & Pav. var. **hispida**

Sin.: *Verbena glandulosa* Moris, *Verbena intermedia* Gillies & Hook. ex Hook. var. *lanuginosa* Moldenke, *Verbena parvula* Hayek f. *albiflora* Moldenke
Hierba. Nativa. 0-3500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). CHL(AYP, TAR, VAL, LBO, BIO, RME). PRY(APY).

Verbena hispida Ruiz & Pav. var. **obovata** (Moldenke) N. O'Leary
Sin.: *Verbena bangiana* Moldenke, *Verbena parvula* Hayek var. *obovata* Moldenke
Hierba. Nativa. 1500-3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Verbena intercedens Briq.

Sin.: *Verbena bonariensis* L. var. *hispida* Moldenke
Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(COS). BRA(RGS). PRY(GUA, PAI).

Verbena intermedia Gillies & Hook. ex Hook.

Sin.: *Verbena bonariensis* L. f. *gracilis*, *Verbena bonariensis* L. var. *longibracteata* Kuntze, *Verbena carollata* Briq., *Verbena chamissonis* Walp., nom. illeg., *Verbena*

gracilis Cham., hom. illeg., *Verbena intermedia* Gillies & Hook. ex Hook. f. *albiflora* Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth var. *melanopotamica* Hauman, *Verbena tandilensis* Speg., *Verbena tenuis* Steud.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU). BRA(RGS, SCA). PRY(MIE). URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, RNO, TAC).

Verbena lindbergii Moldenke

Sin.: *Verbena alata* Otto ex Sweet f. *alba* Moldenke, *Verbena malmii* Moldenke, *Verbena reitzii* Moldenke
Hierba. Nativa. 200-1900 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbena litoralis Kunth var. **litoralis**

Sin.: *Verbena affinis* M. Martens & Galeotti, *Verbena approximata* Briq., *Verbena bonariensis* L. var. *litoralis* (Kunth) Gillies & Hook., *Verbena caracasana* Kunth, *Verbena cordobensis* Briq., *Verbena integrifolia* Sessé & Moç. f. *albiflora* Moldenke, *Verbena integrifolia* Sessé & Moç., *Verbena litoralis* Kunth f. *albiflora* (Moldenke) Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth f. *angustifolia* Chodat, *Verbena litoralis* Kunth var. *albiflora* Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth var. *caracasana* (Kunth) Briq., *Verbena litoralis* Kunth var. *glabrior* Benth., *Verbena litoralis* Kunth var. *leptostyachya* Schauer, *Verbena litoralis* Kunth var. *pyncnostachya* Schauer, nom. inval., *Verbena nudiflora* Nutt. ex Turcz.

Hierba. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(AYP, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME, JFE, IPA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE). URY(PAY, SAO).

Verbena litoralis Kunth var.

subglabrata (Moldenke) N. O'Leary & Múlgura

Sin.: *Verbena brasiliensis* Vell. var. *subglabrata* Moldenke, *Verbena brasiliensis* Vell., *Verbena chacensis* Moldenke, *Verbena hanseni* Greene, *Verbena intermedia* Gillies & Hook. ex Hook. f. *glabrescens* Hauman, *Verbena litoralis* Kunth f. *congesta* (Moldenke)

Moldenke, *Verbena litoralis* Kunth var. *brasiliensis* (Vell.) Munir, *Verbena litoralis* Kunth var. *congesta* Moldenke, *Verbena paucifolia* Turcz., *Verbena quadrangularis* Vell.

Hierba. Nativa.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE). BRA(PAR, RGS, SCA).

Verbena montevidensis Spreng.

Sin.: *Verbena isabellei* Briq., *Verbena minutiflora* Briq. ex Moldenke, *Verbena minutiflora* Briq. ex Moldenke var. *peruviana* Moldenke
Hierba. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SLU, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA). URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, SAO).

Verbena officinalis L.

Hierba. Introducida.
Países: CHL(COQ, MAU, BIO, ARA, LRI).

Verbena ovata Cham.

Sin.: *Verbena bonariensis* L. f. *robustior* Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, ITA, PAI, SPE).

Verbena rigida Spreng.

Sin.: *Verbena bonariensis* L. f. *venosa* (Gillies & Hook.) Voss, *Verbena bonariensis* L. var. *rigida* (Spreng.) Kuntze, *Verbena bonariensis* L. var. *venosa* (Gillies & Hook.) Chodat, *Verbena doniana* Steud., *Verbena rigida* Spreng. f. *alba* (Trivetts) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. f. *lilacina* (Benary & Bodger ex G. Harrow) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. f. *obovata* Hayek, *Verbena rigida* Spreng. f. *paraguayensis* Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *alba* (Trivetts) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *glandulifera* Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *lilacina* (Benary & Bodger ex G. Harrow) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *obovata* (Hayek) Moldenke, *Verbena rigida* Spreng. var. *reineckii* (Briq.) Moldenke, *Verbena rugosa* D. Don, hom. illeg., *Verbena scaberrima* Cham., *Verbena scabra* Marnock, *Verbena venosa* Gillies & Hook. ex Hook. var. *alba* Trivetts, *Verbena venosa* Gillies & Hook. ex Hook. var. *lilacina* Benary & Bodger ex G.

Harrow, *Verbena venosa* Gillies & Hook. ex Hook. var. *reineckii* Briq., *Verbena venosa* Gillies & Hook. ex Hook.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, MIE, PAI). URY(CAS, LAV, MAL, SJO, TAC).

Verbena sagittalis Cham.

Sin.: *Verbena lindmanii* Briq.

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA).

VIBURNACEAE

Sambucus L.

Sambucus australis Cham. & Schltld.

Sin.: *Sambucus pentagynia* Larrañaga

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CEN, GUA, ITA, PAI). URY(MON, ROC, TYT).

Sambucus nigra L.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG).

Sambucus peruviana Kunth

Sin.: *Sambucus graveolens* Willd.,

Sambucus nigra L. subsp. *peruviana* (Kunth) R. Bolli

Arbusto o árbol. Nativa. 1000-2700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Viburnum L.

Viburnum seemenii Graebn.

Sin.: *Viburnum glabratum* Kunth var.

sphaerocarpum Griseb., *Viburnum seemenii* Graebn. f. *minus* Killip & A.C. Sm.

Arbusto o arbolito. Nativa. 1000-2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

VIOLACEAE

Anchietea A. St.-Hil.

Anchietea exalata Eichler

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Anchietea pyrifolia (Mart.) G. Don

Sin.: *Anchietea parvifolia* Hallier f.,

Anchietea roquefeuillana (A. St.-Hil.)

Spreng., *Anchietea salutaris* A. St.-Hil.,

Noisettia pyrifolia Mart., *Noisettia*

roquefeuillana A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAN, GUA, ITA). URY(ART, RIV, SAO, TAC).

Hybanthus Jacq., nom. cons.

Hybanthus melchiorianus Schulze-

Menz

Subarbusto. Endémica. 0-400 m.

Países: PRY(APY, PHA).

Hybanthus nanus (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Sin.: *Ionidium nanum* A. St.-Hil., *Solea nana* (A. St.-Hil.) Spreng.

Subarbusto. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS). BRA(RGS). URY(MON, RNO, SOR).

Noisettia Kunth

Noisettia orchidiflora (Rudge) Ging.

Sin.: *Ionidiopsis fruticulosa* C. Presl,

Ionidium longifolium (Poir.) Schult.,

Ionidium orchidiflorum (Rudge) Schult.,

Noisettia galeopsifolia A. St.-Hil.,

Noisettia longifolia (Poir.) Kunth, *Viola*

longifolia Poir., *Viola lutea* Vell., *Viola*

orchidiflora Rudge

Subarbusto. Nativa. 700-900 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Pombalia Vand.

Pombalia atropurpurea (A. St.-Hil.)

Paula-Souza

Sin.: *Alsodeia regnellii* Walp.,

Calceolaria atropurpurea (A. St.-Hil.)

Kuntze, *Ionidium atropurpureum* A.

St.-Hil., *Hybanthus atropurpureus* (A.

St.-Hil.) Taub., *Solea atropurpurea* (A.

St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE).

BRA(PAR). PRY(CON).

Pombalia bicolor (A. St.-Hil.) Paula-

Souza

Sin.: *Calceolaria bicolor* (A. St.-Hil.)

Kuntze, *Hybanthus bicolor* (A. St.-Hil.)

Baill. var. *genuinus* (Chodat & Hassl.)

Hassl., nom. illeg., *Hybanthus bicolor*

(A. St.-Hil.) Baill., *Ionidium bicolor* A.

St.-Hil. var. *genuinum* Chodat & Hassl.,

nom. illeg., *Ionidium bicolor* A. St.-Hil.,

Ionidium paraguariense Chodat var.

balansae Chodat, *Solea bicolor* (A. St.-

Hil.) Spreng.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS).

BRA(RGS). PRY(CAU, GUA, MIE, PAI).

URY(MON).

Pombalia bigibbosa (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Sin.: *Calceolaria bigibbosa* (A. St.-Hil.)

Kuntze, *Hybanthus bigibbosus* (A. St.-

Hil.) Hassl. var. *paraguariensis* (Chodat)

Hassl., *Hybanthus bigibbosus* (A. St.-Hil.)

Hassl., *Ionidium bigibbosum* A. St.-Hil.

var. *paraguariensis* Chodat, *Ionidium*

bigibbosum A. St.-Hil., *Solea bigibbosa* (A.

St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS, SAL). BRA(PAR,

RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAA, CAN,

CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI, SPE).

Pombalia brevicaulis (Mart.) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus brevicaulis* (Mart.)

Baill., *Hybanthus scariosus* (A. St.-Hil.)

Baill. var. *brevicaulis* (Mart.) Hassl.,

Hybanthus scariosus (A. St.-Hil.) Baill.,

Ionidium brevicaule Mart., *Ionidium*

scariosum A. St.-Hil., *Solea scariosa* (A.

St.-Hil.) Spreng.

Subarbusto. Nativa. 200-1500 m.

Países: BRA(PAR).

Pombalia calceolaria (L.) Paula-Souza

Sin.: *Calceolaria hirsuta* Rusby,

Calceolaria ipecacuanha (L.) Kuntze,

Calceolaria villosissima (A. St.-Hil.)

Kuntze, *Hybanthus calceolaria* (L.) Oken,

Hybanthus calceolaria (L.) Schulze-

Menz, *Hybanthus indecorus* (A. St.-Hil.)

Baill., *Hybanthus ipecacuanha* (L.) Baill.,

Hybanthus villosissimus (A. St.-Hil.)

Taub., *Ionidium calceolarium* (L.) Vent.,

Ionidium indecorum A. St.-Hil., *Ionidium*

ipecacuanha (L.) Vent. f. *grandiflora*

Chodat & Hassl., nom. inval., *Ionidium*

ipecacuanha (L.) Vent., *Ionidium itoubu*

(Aubl.) Kunth, *Ionidium villosissimum*

A. St.-Hil., *Pombalia ipecacuanha* Vand.,

Pombalia itoubu (Aubl.) Ging., *Solea*

calceolaria (L.) Spreng., *Solea ipecacuanha*

(L.) Spreng., *Solea itoubu* (Aubl.) Spreng.,

Viola calceolaria L., *Viola ipecacuanha* L.,
Viola itoubu Aubl.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(APY, AMA, BOQ, CAN, CON, SPE).

Pombalia chodatii (Hassl.) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus chodati* Hassl.,
Hybanthus hasslerianus (Chodat) Hassl.,
Ionidium chodatii Hassl., *Ionidium*
guaraniticum Chodat & Hassl., hom.
illeg., *Ionidium hasslerianum* Chodat,
Pombalia hassleriana (Chodat) Paula-Souza

Subarbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI).

Pombalia communis (A. St.-Hil.)

Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. f. *circaeoides* (Chodat) Schulze-Menz, *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. f. *glabrifolius* (Chodat) Schulze-Menz, *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. var. *circaeoides* (Chodat) Hassl., *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. var. *glabrifolius* (Chodat) Hassl., *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub. var. *typicus* Hassl., nom. inval., *Hybanthus communis* (A. St.-Hil.) Taub., *Hybanthus guaraniticus* (A. St.-Hil.) Baill., *Ionidium commune* A. St.-Hil. var. *circaeoides* Chodat, *Ionidium commune* A. St.-Hil. var. *glabrifolium* Chodat, *Ionidium commune* A. St.-Hil. var. *typicum* Chodat, nom. inval., *Ionidium commune* A. St.-Hil., *Ionidium guaraniticum* A. St.-Hil., *Ionidium sylvaticum* A. St.-Hil., *Solea commune* (A. St.-Hil.) Spreng., *Solea guaranítica* (A. St.-Hil.) Spreng., *Solea sylvatica* (A. St.-Hil.) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, SPE). URY(SAO).

Pombalia glauca Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus glaucus* Schulze-Menz, *Hybanthus oppositifolius* (L.) Taub. var. *glaucus* (Chodat) Hassl., *Ionidium glaucum* Chodat, hom. illeg., *Ionidium oppositifolium* (L.) Roem. & Schult. var. *glaucum* (Chodat) Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-400 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL). BRA(PAR). PRY(APY, SPE).

Pombalia graminifolia (Chodat)

Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus graminifolius* (Chodat) Schulze-Menz, *Hybanthus oppositifolius* (L.) Taub. var. *graminifolius* (Chodat) Hassl., *Ionidium graminifolium* Chodat, *Ionidium oppositifolium* (L.) Roem. & Schult. var. *graminifolium* (Chodat) Chodat & Hassl.

Subarbusto. Endémica. 0-800 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR). PRY(APY, AMA, BOQ, PAI, PHA).

Pombalia lanata (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus lanatus* (A. St.-Hil.) Baill., *Ionidium lanatum* A. St.-Hil., *Solea lanata* (A. St.-Hil.) Spreng.

Hierba. Nativa. 100-1300 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Pombalia leucopogon (Sparre) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus leucopogon* Sparre

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS).

Pombalia longistyla (Schulze-Menz) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus longistylus* Schulze-Menz

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS). PRY(COA, PHA).

Pombalia oppositifolia (L.) Paula-Souza

Sin.: *Calceolaria circaeoides* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Kuntze, *Calceolaria hieronymi* (Griseb.) Kuntze, *Hybanthus angustifolius* (Kunth) Standl., *Hybanthus circaeoides* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Baill., *Hybanthus hieronymi* (Griseb.) Hassl., *Hybanthus oppositifolius* (L.) Taub., *Hybanthus teucriifolius* (Turcz.) Hassl., *Hybanthus urticaefolius* (Mart.) Baill., *Ionidium angustifolium* Kunth, *Ionidium barzelonense* H. Karst., *Ionidium circaeoides* Humb. & Bonpl. ex Schult., *Ionidium glaziovii* Eichler ex Glaz., nom. nud., *Ionidium hieronymi* Griseb., *Ionidium oppositifolium* (L.) Roem. & Schult., *Ionidium teucriifolium* Turcz., *Ionidium urticifolium* Mart., *Ionidium viscidulum* Kunth, *Pombalia hieronymi* (Griseb.) Paula-Souza, *Solea circaeoides* (Humb. & Bonpl. ex Schult.)

Spreng., *Solea oppositifolia* (L.) Spreng., *Solea urticaefolia* (Mart.) Spreng., *Solea viscidula* (Kunth) Spreng., *Viola oppositifolia* L.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC). BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(APY, AMA, CEN, COA, PHA).

Pombalia paraguariensis (Chodat) Paula-Souza

Sin.: *Hybanthus bicolor* (A. St.-Hil.) Baill. var. *campestris* (Chodat & Hassl.) Hassl. *Hybanthus paraguariensis* (Chodat) Schulze-Menz, *Ionidium bicolor* A. St.-Hil. var. *campestris* Chodat & Hassl., *Ionidium paraguariense* Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL). BRA(RGS). PRY(APA, CEN, PAI, SPE).

Pombalia parviflora (Mutis ex L.f.) Paula-Souza

Sin.: *Calceolaria bangii* Rusby, *Calceolaria parviflora* (Mutis ex L.f.) Kuntze, *Hybanthus glutinosus* (Vent.) Taub., *Hybanthus maytencillo* Baill., *Hybanthus microphyllus* (Schult.) Baill., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. f. *membranaceus* Schulze-Menz, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *argentinensis* Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *bangii* (Rusby) Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *chamaedrifolius* (C. Presl) Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *glutinosus* (Vent.) Hassl., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *latifolius* (Eichler) Hassl., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill. var. *typicus* Hassl., nom. inval., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L. f.) Baill., *Ionidium chamaedrifolium* C. Presl, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *angustifolium* Eichler, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *latifolium* Eichler, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *paraguayense* Chodat, *Ionidium glutinosum* Vent., *Ionidium microphyllum* Kunth, *Ionidium parviflorum* (Mutis ex L.f.) Vent., *Solea glutinosa* (Vent.) Spreng., *Solea parviflora* (Mutis ex L. f.) Spreng., *Viola glutinosa* (Vent.) Poir., *Viola microphylla* Willd. ex Roem & Schult., nom. nud., *Viola parviflora* Mutis ex L.f., *Viola parvifolia* Schult., *Viola parvifolia* Willd. ex Roem. & Schult., *Viola venezuelensis* Steyererm.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-3500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). CHL(LBO, BIO). PRY(APY, CEN, COA, ÑEE, PHA, SPE). URY(ART, CAS, COL, CLA, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO).

Pombalia rivalis (Arech.) Paula-Souza
Sin.: *Hybanthus rivalis* (Arechav.)
Herter, *Ionidium rivale* Arechav.
Hierba. Endémica. 0-200 m.
Países: URY(RIV, TAC).

Pombalia serrata (Phil.) Paula-Souza
Sin.: *Acentra serrata* Phil., *Calceolaria lorentziana* (Eichler & Griseb.) Kuntze, *Calceolaria serrata* (Phil.) Kuntze, *Hybanthus lorentzianus* (Eichler ex Griseb.) Taub., *Hybanthus serratus* (Phil.) Hassl. f. *longifolius* Sparre, *Hybanthus serratus* (Phil.) Hassl. f. *lorentzianus* (Eichler ex Griseb.) Schulze-Menz, *Hybanthus serratus* (Phil.) Hassl., *Ionidium lorentzianum* Eichler ex Griseb.
Subarbusto. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, SDE, TUC).

Pombalia velutina (Schulze-Menz) Paula-Souza
Sin.: *Hybanthus velutinus* Schulze-Menz
Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS). PRY(CAU, CAA, CAN, ITA, PHA).

Schweiggeria Spreng.

Schweiggeria fruticosa Spreng.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Viola L.

Viola acanthophylla Leyb. ex Reiche
Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).

Viola aizoon Reiche
Hierba. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA).

Viola angustifolia Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(LBO, RME).

Viola anitae J.M. Watson
Hierba. Endémica. 2200-2300 m.
Países: ARG(NEU).

Viola araucaniae W. Becker
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ARA).

Viola argentina W. Becker
Hierba. Endémica. 3000-3200 m.
Países: ARG(COR, LRI, SJU).

Viola arvensis Murray subsp. **andina**
W. Becker
Hierba. Nativa.
Países: CHL(LLA).

Viola arvensis Murray subsp. **arvensis**
Sin.: *Viola tricolor* L. var. *arvensis* (Murray) Ging.
Hierba. Introducida. 0-1100 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU, SCR, SFE, TDF, TUC). CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Viola atropurpurea Leyb.
Hierba. Endémica. 2000-4300 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Viola aurantiaca Leyb.
Hierba. Endémica. 2600-3000 m.
Países: CHL(RME).

Viola aurata Phil.
Hierba. Endémica. 900-1100 m.
Países: CHL(COQ).

Viola auricolor Skottsdb.
Hierba. Endémica. 700-1600 m.
Países: ARG(CHU, SCR). CHL(AIS).

Viola auricula Leyb.
Hierba. Endémica. 2200-2500 m.
Países: CHL(RME).

Viola beati J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.
Países: ARG(CAT).

Viola beckeriana J.M. Watson & A.R. Flores
Subarbusto. Endémica. 2900-3000 m.
Países: ARG(MEN).

Viola brachypetala Gay
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL).

Viola bustillosia Gay
Hierba. Endémica. 2100-2400 m.
Países: CHL(LBO).

Viola calchaquiensis W. Becker
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(TUC).

Viola calderensis W. Becker
Sin.: *Viola psammophila* Phil., *Viola pseudasterias* Reiche, *Viola pseudasterias* Reiche var. *psammophila* (Phil.) Reiche
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Viola canobarbata Leyb.
Hierba. Endémica. 2500-4000 m.
Países: ARG(MEN). CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Viola capillaris Pers. var. **araucana** (Phil.) Reiche
Sin.: *Viola dumetorum* Phil. var. *araucana* Phil.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(BIO, ARA).

Viola capillaris Pers. var. **capillaris**
Sin.: *Viola stipularis* Cav.
Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Viola capillaris Pers. var. **dumetorum** (Phil.) Reiche
Sin.: *Viola dumetorum* Phil.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(BIO).

Viola cerasifolia A. St.-Hil.
Sin.: *Viola balsaminoides* Gardner, *Viola conferta* A. St.-Hil., *Viola diffusa* Vell., *Viola tenuis* W. Becker, *Viola tenuis* W. Becker var. *geralensis* W. Becker
Hierba. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Viola chamaedrys Leyb.
Hierba. Endémica. 1500-1900 m.
Países: CHL(VAL, RME).

Viola columnaris Skottsdb.
Hierba. Endémica. 500-3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE). CHL(AIS, MAG).

Viola comberi W. Becker
Hierba. Endémica. 2000-2100 m.
Países: ARG(NEU).

Viola commersonii DC. ex Ging.
Hierba. Endémica. 0-700 m.
Países: ARG(SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

- Viola congesta** Gillies ex Hook. & Arn.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(MAU, RME).
- Viola coronifera** W. Becker
Sin.: *Viola coronifera* W. Becker var.
minoriflora W. Becker
Hierba. Endémica. 600-2300 m.
Países: ARG(NEU).
- Viola corralensis** Phil.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(LRI).
- Viola cotyledon** Ging.
Sin.: *Viola petraea* W. Becker, *Viola petraea* W. Becker f. *albida* W. Becker
Hierba. Endémica. 900-3300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, RME).
- Viola curicoensis** W. Becker
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: CHL(MAU).
- Viola cyathiformis** W. Becker
Hierba. Endémica. 600-700 m.
Países: CHL(BIO).
- Viola dasphylla** W. Becker
Sin.: *Viola cotyledon* Ging. subsp.
lologensis W. Becker, *Viola lologensis* (W. Becker) J.M. Watson
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: ARG(NEU).
- Viola decipiens** Reiche
Hierba. Endémica. 2700-3500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, BIO, RME).
- Viola domeikoana** Gay
Hierba. Endémica. 3000-4200 m.
Países: ARG(MEN, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, RME).
- Viola escarpela** J.M. Watson & A.R. Flores
Sin.: *Viola pulchella* Leyb. ex Reiche
Hierba. Endémica. 0-2000 m.
Países: CHL(COQ, VAL, MAU).
- Viola escondidaensis** W. Becker
Hierba. Endémica. 1900-2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
- Viola evae** Hieron. ex W. Becker var.
evae
Hierba. Endémica. 3000-4500 m.
Países: ARG(LRI, SAL).
- Viola evae** Hieron. ex W. Becker var.
flossdorffii (Hicken) Nicola
Sin.: *Viola flos-evae* Hieron. var.
flossdorffii Hicken
Hierba. Endémica. 3000-5000 m.
Países: ARG(LRI).
- Viola exsul** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 4200-4300 m.
Países: ARG(SJU).
- Viola farkasiana** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 1400-2100 m.
Países: ARG(NEU). CHL(BIO).
- Viola flavicans** Wedd.
Sin.: *Viola castillonii* (W. Becker) Xifreda & Sanso, *Viola exigua* W. Becker, *Viola exigua* W. Becker var. *castillonii* W. Becker
Hierba. Endémica. 2800-3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
- Viola flos-evae** Hieron.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(SJU).
- Viola flos-idae** Hieron.
Sin.: *Viola flos-idae* Hieron. var.
pseudovolcanica Hieron.
Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: ARG(MEN, SAL, SJU, TUC).
- Viola fluehmannii** Phil.
Hierba. Nativa. 1700-1900 m.
Países: ARG(NEU, RNE). CHL(BIO, ARA, LLA).
- Viola friderici** W. Becker
Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).
- Viola frigida** Phil.
Sin.: *Viola borchersi* Phil., *Viola frigida* Phil. var. *borchersii* (Phil.) Reiche, *Viola molfinoana* W. Becker
Hierba. Endémica. 3000-4100 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
CHL(ANT, ATA, COQ, VAL).
- Viola gelida** J.M. Watson, M.P. Cárdenas & A.R. Flores
Hierba. Endémica. 4700-4900 m.
Países: CHL(ATA).
- Viola germainii** Sparre
Sin.: *Viola nivalis* Phil.
Hierba. Endémica. 3000 m.
Países: CHL(RME).
- Viola glacialis** Poepp. & Endl.
Hierba. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO, RME).
- Viola glechomoides** Leyb.
Hierba. Endémica. 2200-2800 m.
Países: CHL(RME).
- Viola godoyae** Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ATA).
- Viola gracillima** A. St.-Hil.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
- Viola granulosa** Wedd.
Hierba. Nativa. 4000-4500 m.
Países: CHL(AYP).
- Viola hieronymi** W. Becker
Hierba. Endémica. 3300-3400 m.
Países: ARG(JUJ, LRI).
- Viola huesoensis** Martic.
Sin.: *Viola litoralis* Phil., nom. illeg.
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT).
- Viola huidobrii** Gay
Sin.: *Viola lechlerii* Griseb.
Hierba. Endémica. 100-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LLA).
- Viola johnstonii** W. Becker
Hierba. Endémica.
Países: CHL(ANT).
- Viola karlreicheana** Sanso, Seo & Xifreda
Sin.: *Viola bicolor* Reiche, hom. illeg.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).
- Viola lanifera** W. Becker
Hierba. Endémica. 3000-3200 m.
Países: CHL(COQ).
- Viola leyboldiana** Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(VAL, MAU).
- Viola lilloana** W. Becker
Hierba. Endémica. 4000-4500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
- Viola llullaillacoensis** W. Becker
Hierba. Endémica. 4000-4200 m.
Países: CHL(ANT, ATA).

Viola maculata Cav. var. **maculata**

Sin.: *Viola buchtienii* Gand., *Viola grandidentata* Kalela, *Viola macloviana* Gand., *Viola maculata* Cav. f. *chilensis* Weibel, *Viola maculata* Cav. f. *chillanensis* Sparre, *Viola maculata* Cav. f. *constitucionensis* Sparre, *Viola maculata* Cav. f. *grandidentata* (Kalela) Weibel, *Viola maculata* Cav. f. *munozii* Sparre, *Viola maculata* Cav. f. *typica* Weibel, nom. inval., *Viola maculata* Cav. f. *valdiviana* (Kalela) Weibel, *Viola maculata* Cav. var. *buchtienii* (Gand.) Weibel, *Viola maculata* Cav. var. *megaphylla* Ging., *Viola maculata* Cav. var. *pubescens* Reiche, *Viola pyrolifolia* Poir., *Viola valdiviana* Kalela

Hierba. Endémica. 0-1800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Viola maculata Cav. var. **microphyllus**

(Poir.) DC. ex Ging.

Sin.: *Viola buchtieniana* W. Becker, *Viola fimbriata* Steud., *Viola maculata* Cav. f. *fimbriata* (Steud.) Weibel, *Viola maculata* Cav. f. *septentrionalis* (Kalela) Weibel, *Viola maculata* Cav. subsp. *microphyllus* (Poir.) Weibel, *Viola microphyllus* Poir. f. *macropoda* Speg., *Viola microphyllus* Poir. f. *septentrionalis* Kalela, *Viola microphyllus* Poir.

Hierba. Endémica. 0-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(AIS, MAG).

Viola maculata Cav. var. **popetae**

Sparre

Hierba. Endémica.

Países: CHL(LBO).

Viola magellanica G. Forst.

Sin.: *Viola magniflora* Molina

Hierba. Endémica. 0-700 m.

Países: ARG(SCR, TDF). CHL(LLA, MAG).

Viola metajaponica Nakai

Hierba. Introducida. 0-1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).

Viola micranthella Wedd.

Hierba. Nativa. 2500-4700 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Viola minutiflora Phil.

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Países: CHL(BIO, ARA).

Viola montagnei Gay

Sin.: *Viola flos-mariae* Hieron., *Viola flos-mariae* Hieron. var. *nivea* Hieron., *Viola flos-mariae* Hieron. var. *virescens* Hieron., *Viola montagnei* Gay var. *glandulosa* Phil.

Hierba. Endémica. 2900-4200 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SJU). CHL(ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, RME).

Viola muscoides Phil.

Hierba. Endémica. 700 m.

Países: CHL(AIS).

Viola nassauvioides Phil.

Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).

Viola niederleinii W. Becker

Hierba. Endémica.

Países: ARG(LRI).

Viola nubigena Leyb.

Hierba. Endémica. 2500-3000 m.

Países: CHL(RME).

Viola odorata L.

Hierba. Introducida. 0-2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LPA, MIS, RNE, SAL, SLU, SFE, TUC). CHL(VAL, LBO, BIO).

Viola ovalleana Phil.

Hierba. Endémica. 2600-2800 m.

Países: CHL(COQ).

Viola pachysoma Sheader & J.M.

Watson

Hierba. Endémica. 2000-2100 m.

Países: ARG(NEU).

Viola philippii Leyb. var. **arbuscula**

(Phil.) Reiche

Sin.: *Viola arbuscula* Phil.

Hierba. Endémica. 2000-4000 m.

Países: CHL(RME).

Viola philippii Leyb. var. **philippii**

Sin.: *Viola microphylla* Phil., hom. illeg.

Hierba. Endémica. 2500-4000 m.

Países: ARG(MEN). CHL(VAL, LBO, MAU, RME).

Viola poly poda Turcz.

Hierba. Endémica. 0-3500 m.

Países: CHL(TAR, ANT, ATA, COQ).

Viola portalesia Gay var. **integerrima**

(Phil.) Reiche

Sin.: *Viola integerrima* Phil.

Subarbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU).

Viola portalesia Gay var. **portalesia**

Subarbusto. Endémica. 0-1800 m.

Países: CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA).

Viola portulacea Leyb.

Hierba. Endémica. 2500-4500 m.

Países: CHL(LBO, RME).

Viola pulvinata Reiche

Hierba. Endémica. 1900 m.

Países: CHL(RME).

Viola pusilla Poepp.

Sin.: *Viola asterias* Hook. & Arn.,

Viola asterias Hook. & Arn. var. *genuina*

Reiche, *Viola miersii* Bertero ex Steud.,

Viola stellata Miers

Hierba. Endémica. 0-2700 m.

Países: CHL(ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, RME).

Viola pygmaea Juss. ex Poir.

Sin.: *Viola orbignyana* J. Rémy

Hierba. Nativa. 3000-4900 m.

Países: ARG(JUU, SAL).

Viola reichei Skottsbo.

Sin.: *Viola maculata* Cav. subsp. *reichei*

(Skottsbo.) Weibel, *Viola reichei* Skottsbo.

f. *gunckelii* Sparre

Hierba. Endémica. 200-2000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG).

Viola rhombifolia Leyb.

Hierba. Endémica. 1500-2000 m.

Países: CHL(ATA, COQ, VAL, RME).

Viola rodriguezii W. Becker

Sin.: *Viola munozensis* W. Becker

Hierba. Endémica. 3500-4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Viola roigii Rossow

Hierba. Endémica. 3000-3200 m.

Países: ARG(SJU).

Viola rossowiana J.M. Watson & A.R.

Flores

Hierba. Endémica. 1600-2800 m.

Países: ARG(NEU).

Viola rosulata Poepp. & Endl.

Hierba. Endémica. 2000-2200 m.

Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Viola rubella Cav.

Sin.: *Viola rubella* Cav. var. *angustifolia* Ging., *Viola rubella* Cav. var. *latifolia* Ging.

Subarbusto. Endémica. 0-300 m.
Países: CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Viola rubromarginata J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Endémica. 1200-1500 m.
Países: ARG(NEU).

Viola rudolphii Sparre

Hierba. Endémica. 1100 m.
Países: CHL(LRI, LLA).

Viola rugosa Phil. ex W. Becker

Hierba. Endémica.
Países: ARG(NEU). CHL(MAU).

Viola sacculus Skottsb.

Sin.: *Viola auritella* W. Becker, *Viola patagonica* W. Becker, *Viola squamulosa* W. Becker
Hierba. Endémica. 1500-2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
CHL(AIS).

Viola santiagoensis W. Becker

Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).

Viola sempervivum Gay

Hierba. Endémica. 2000-3500 m.
Países: CHL(COQ, VAL, RME).

Viola skottsbergiana W. Becker

Hierba. Endémica. 2000-3000 m.
Países: CHL(LBO, MAU, BIO).

Viola spegazzinii W. Becker

Hierba. Endémica. 3000-4100 m.
Países: ARG(SAL).

Viola subandina J.M. Watson

Sin.: *Viola pusilla* Hook. & Arn. ex Hook., hom. illeg.
Hierba. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
CHL(LBO, MAU, BIO, RME).

Viola subdimidiata A. St.-Hil.

Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Viola taltalensis W. Becker var.

glaberrima W. Becker
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT).

Viola taltalensis W. Becker var.

taltalensis
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT).

Viola tectiflora W. Becker

Hierba. Endémica. 900-1800 m.
Países: ARG(MEN, NEU).

Viola toroensis Martic.

Sin.: *Viola chrysantha* Phil., nom. illeg.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(COQ).

Viola tricolor L.

Hierba. Introducida. 0-2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, SAL, SCR, TUC). BRA(PAR). CHL(VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, RME).

Viola tridentata Sm.

Hierba. Endémica. 0-1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
CHL(LLA, AIS, MAG).

Viola triflabellata W. Becker

Sin.: *Viola joergensenii* W. Becker, *Viola tucumanensis* W. Becker
Hierba. Endémica. 2000-4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Viola trochlearis J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Endémica. 1600-1700 m.
Países: ARG(NEU).

Viola truncata Meyen var.

glaberrima W. Becker
Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).

Viola truncata Meyen var.

glandulifera W. Becker
Hierba. Endémica. 2000-2500 m.
Países: CHL(MAU).

Viola truncata Meyen var. **truncata**

Hierba. Endémica. 300-2300 m.
Países: CHL(LBO, RME).

Viola vallenarensis W. Becker

Hierba. Endémica. 4000 m.
Países: CHL(ATA).

Viola volcanica Gillies ex Hook. & Arn.

var. **chillanensis** (Phil.) Reiche
Sin.: *Viola chillanensis* Phil.
Hierba. Endémica. 1300-1400 m.
Países: CHL(BIO).

Viola volcanica Gillies ex Hook. & Arn.

var. **exilis** (Phil.) Reiche
Sin.: *Viola exilis* Phil.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(RME).

Viola volcanica Gillies ex Hook. & Arn.

var. **volcanica**
Sin.: *Viola pseudovulcanica* W. Becker
Hierba. Endémica. 1200-4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU, TUC). CHL(LBO, MAU, BIO).

Viola werdermannii W. Becker var.

glaberrima W. Becker
Hierba. Endémica. 700 m.
Países: CHL(TAR, ANT).

Viola werdermannii W. Becker var.

werdermannii
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Países: CHL(ANT).

VISCACEAE

Phoradendron Nutt.**Phoradendron argentinum** Urb.

Sin.: *Phoradendron meliae* Trel.,
Phoradendron pruinosum Urb.,
Phoradendron rubrum (L.) Griseb. f. *latior*
Chodat & Hassl.
Arbusto parásito. Nativa. 0-2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SDE, TUC).
BRA(RGS). PRY(APY, CEN, CON, PHA).
URY(RNO).

Phoradendron bathyoryctum Eichler

Sin.: *Phoradendron balansae* Trel. f.
hassleri Trel., *Phoradendron balansae*
Trel. f. *morongii* Trel., *Phoradendron*
balansae Trel., *Phoradendron hieronymi*
Trel., *Phoradendron lindemanii*
Kuijt, *Phoradendron pachyneuron*
Kuijt, *Phoradendron paraguari* Kuijt,
Phoradendron ulophyllum Eichler
Arbusto parásito. Nativa. 0-800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SFE, SDE, TUC).
BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, GUA, ÑEE, PAI, PHA).

Phoradendron berterioanum (DC.)

Griseb.
Sin.: *Viscum berterioanum* DC.
Arbusto parásito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).

Phoradendron burkartii Rizzini & Ulibarri
Hierba hemiparásita. Endémica.
0-500 m.

Países: ARG(COS, ERI). BRA(PAR, RGS, SCA). URY(ART, RIV).

Phoradendron chrysocladon A. Gray
Hierba hemiparásita. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Phoradendron coriaceum Mart. ex Eichler
Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA).

Phoradendron craspedophyllum Eichler
Hierba parásita. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler
Sin.: *Viscum crassifolium* Pohl ex DC.
Arbusto parásito. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).

Phoradendron dipterum Eichler
Sin.: *Phoradendron casimiranum* Trel., *Phoradendron glaziouvi* Urb., *Phoradendron hypericifolium* Trel., *Phoradendron multifoventatum* Eichler, *Phoradendron tetrapterum* Krug & Urb.
Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(CAT, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, PAI).

Phoradendron ensifolium (Pohl ex DC.) Eichler
Sin.: *Phoradendron falcifrons* (Hook. & Arn.) Eichler, *Phoradendron interruptum* (DC.) B.D. Jacks., *Phoradendron linearifolium* Eichler, *Phoradendron subfalcatum* Abbiatti, *Viscum ensifolium* Pohl ex DC., *Viscum falcifrons* Hook. & Arn., *Viscum interruptum* DC.
Arbusto parásito. Nativa. 500-1100 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, GUA, PAI). URY(LAV, RIV, TAC).

Phoradendron habrostachyum Eichler
Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS). PRY(APA).

Phoradendron hexastichum (DC.) Griseb.
Sin.: *Viscum hexastichum* DC.
Arbusto parásito. Nativa. 0-600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Phoradendron holoxanthum Eichler
Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Phoradendron inaequidentatum Rusby
Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(RGS).

Phoradendron mucronatum (DC.) Krug & Urb.
Sin.: *Phoradendron emarginatum* Eichler, *Phoradendron obovatifolium* Morong, *Viscum mucronatum* DC.
Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, SAL, SDE). BRA(PAR). PRY(AMA, CAU, CEN, COA, PAI, PHA, SPE).

Phoradendron obtusissimum (Miq.) Eichler
Sin.: *Phoradendron acinacifolium* Mart. ex Eichler f. *microcarpum* Kuntze, *Phoradendron acinacifolium* Mart. ex Eichler, *Phoradendron craspedophylloides* Trel., *Phoradendron reductum* Trel., *Viscum obtusissimum* Miq.
Arbusto parásito. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SLU, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, CEN, CHO, COA, GUA, PAI, PHA). URY(RNO).

Phoradendron pellucidulum Eichler
Arbusto parásito. Nativa. 0-1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(CEN).

Phoradendron perrottetii (DC.) Eichler
Sin.: *Viscum perrottetii* DC.
Arbusto hemiparásito. Nativa. 0-1000 m.
Países: ARG(JUJ). BRA(PAR, SCA).

Phoradendron piperoides (Kunth) Trel.
Sin.: *Loranthus piperoides* Kunth, *Phoradendron latifolium* (Sw.) Griseb., *Viscum latifolium* Sw.
Arbusto parásito. Nativa. 0-1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).

Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb.
Sin.: *Loranthus quadrangularis* Kunth, *Phoradendron affine* (Pohl ex DC.) Engl. & Krause, *Phoradendron liga* (Gillies ex Hook. & Arn.) Eichler, *Phoradendron*

martianum Trel., *Viscum affine* Pohl ex DC., *Viscum liga* Gillies ex Hook. & Arn.
Arbusto parásito. Nativa. 0-1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, SFE, SDE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APY, BOQ, CAU, CEN, CHO, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Phoradendron rusbyi Britton
Hierba parásita. Nativa. 0-600 m.
Países: ARG(JUJ).

Phoradendron tucumanensis Urb.
Arbusto parásito. Nativa. 500-1700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Phoradendron undulatum (Pohl ex DC.) Eichler
Sin.: *Phoradendron hamatifolium* Rizzini, *Viscum undulatum* Pohl ex DC.
Arbusto parásito. Nativa. 300-1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

VITACEAE

Cissus L.

Cissus campestris (Baker) Planch.
Sin.: *Vitis campestris* Baker
Arbusto o liana. Nativa. 100-1000 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON).

Cissus duarteana Cambess.
Sin.: *Vitis duarteana* (Cambess.) Baker
Arbusto o liana. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CON, SPE).

Cissus erosa Rich.
Sin.: *Cissus erosa* Rich. var. *guaranitica* (Chodat) Hassl., *Cissus guaranitica* Chodat
Liana. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Cissus gongylodes (Burch. ex Baker) Planch.
Sin.: *Vitis gongylodes* Burch. ex Baker
Liana. Nativa.
BRA(PAR).

Cissus palmata Poir.
Sin.: *Cissus bonariensis* Hook. & Arn., *Cissus gibertii* (Baker) Planch., *Cissus palmata* Poir. var. *balansana* Planch.,

Cissus paraguayensis Planch., *Vitis bakeri* Herter, *Vitis gibertii* Baker, *Vitis palmata* (Poir.) Baker

Liana. Nativa. 0-600 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE). BRA(PAR, RGS). PRY(APY, BOQ, CEN, CHO, CON, ITA, MIE, ÑEE, PHA, SPE). URY(CAS, FLA, MON).

Cissus paulliniifolia Vell.

Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cissus simsiana Schult. & Schult. f.

Sin.: *Cissus quinquefolia* Sol. ex Sims, *Vitis simsiana* (Schult. & Schult. f.) Baker

Liana. Nativa. 0-1400 m.

Países: ARG(JUJ, SAL). BRA(PAR). PRY(CON).

Cissus spinosa Cambess.

Sin.: *Cissus hasslerianus* Chodat

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(FOR). BRA(PAR). PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PHA).

Cissus stipulata Vell.

Sin.: *Cissus macrocarpa* Dunaiski

Liana. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Cissus striata Ruiz & Pav. subsp.

argentina (Suess.) Lombardi

Sin.: *Cissus lanceolata* Malme, nom. illeg., *Cissus striata* Ruiz & Pav. var. *argentina* Suess.

Liana. Nativa. 100-3100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, ITA). URY(COL, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).

Cissus striata Ruiz & Pav. subsp.

striata

Sin.: *Adenopetalum palmatum* Turcz., *Cissampelos striata* Ruiz & Pav. var. *deficiens* (Hook. & Arn.) Reiche *Cissus deficiens* Hook. & Arn., *Cissus striata* Ruiz & Pav. var. *chilensis* Suess.

Liana. Endémica. 0-1700 m.

Países: ARG(CHU). CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Cissus subrhomboidea (Baker)

Planch.

Sin.: *Cissus scabricaulis* (Baker) Planch., *Vitis scabricaulis* Baker, *Vitis subrhomboidea* Baker

Liana. Nativa. 200-500 m.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN).

Cissus sulcicaulis (Baker) Planch.

Sin.: *Cissus gongylodes* (Baker) Planch. f. *alata* Planch. ex Chodat & Hassl., *Vitis pterophora* Baker, *Vitis sulcicaulis* Baker

Liana. Nativa. 100-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Cissus tweediana (Baker) Griseb.

Sin.: *Ampelopsis tweediana* (Baker)

Pamp., *Cissus pruinosa* Herzog, hom. illeg., *Vitis tweediana* Baker

Liana. Nativa. 400-2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC). PRY(SPE).

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.

Jarvis

Sin.: *Cissus canescens* Lam., *Cissus compressicaulis* Ruiz & Pav., *Cissus ovata* Lam., *Cissus sicyoides* L. f. *apensis* Chodat & Hassl., *Cissus sicyoides* L. f. *aristolochiifolia* Planch., *Cissus sicyoides* L. f. *balansae* Planch., *Cissus sicyoides* L. f. *foliolata* Chodat & Hassl., *Cissus sicyoides* L. f. *marmorata* Chodat & Hassl., *Cissus sicyoides* L. f. *paraguayensis* Chodat & Hassl., *Cissus sicyoides* L. var. *palmata* Hassl., *Cissus sicyoides* L., *Cissus smilacina* Kunth, *Cissus tamoides* Cambess., *Cissus tucumana* Suess., *Cissus umbrosa* Kunth, *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E. Jarvis subsp. *laciniata* (Baker) Lombardi, *Viscum verticillatum* L., *Vitis sicyoides* (L.) Baker, comb. superfl., *Vitis sicyoides* (L.) Miq. f. *laciniata* Baker, *Vitis sicyoides* (L.) Miq. f. *lobata* Baker, *Vitis sicyoides* (L.) Miq., *Vitis sicyoides* (L.) Morales, comb. superfl.

Liana. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, APY, AMA, BOQ, CAA, CAN, CEN, CHO, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, NAS, PAI, PHA, SPE). URY(RIV, SAO).

Parthenocissus Planch.

Parthenocissus quinquefolia (L.)

Planch.

Sin.: *Hedera quinquefolia* L.

Liana. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(DFE, LPA).

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.

Sin.: *Ampelopsis tricuspidata* Siebold & Zucc.

Liana. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(BAI, DFE).

Vitis L.

Vitis vinifera L.

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Países: ARG(LPA). CHL(LBO, MAU, BIO, JFE).

VOCHYSIACEAE

Callisthene C. Mart.

Callisthene castellanosii H.F. Martins

Árbol. Nativa. 0-400 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Callisthene hassleri Briq.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: PRY(AMA).

Callisthene kuhlmannii H.F. Martins

Árbol. Endémica. 0-100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Qualea Aubl.

Qualea cordata (Mart.) Spreng.

Sin.: *Amphilochia cordata* Mart., *Qualea cordata* (Mart.) Spreng. f. *rupestris* Hassl.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(PAR, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Qualea cryptantha (Spreng.) Warm.

Sin.: *Agardhia cryptantha* Spreng.

Árbol. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Qualea grandiflora C. Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA, CAN, CON).

Qualea multiflora C. Mart. subsp.

multiflora

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Qualea multiflora C. Mart. subsp. **pubescens** (C. Mart.) Stafleu
Sin.: *Qualea multiflora* C. Mart. var. *pubescens* C. Mart., *Qualea pilosa* Warm.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR). PRY(AMA).

Qualea parviflora C. Mart.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA, CAN, CON).

Vochysia Poir.

Vochysia bifalcata Warm.
Árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vochysia cinnamomea Pohl
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Vochysia magnifica Warm.
Árbol. Nativa. 0-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Vochysia tucanorum C. Mart.
Sin.: *Cucullaria tucanorum* Spreng.
Árbol. Nativa. 400-1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA). PRY(APY, AMA, CAN, CON, PHA, SPE).

WINTERACEAE

Drimys J.R. Forst. & G. Forst., nom. cons.

Drimys andina (Reiche) R. Rodr. & Quezada
Sin.: *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. f. *andina* (Reiche) Hauman, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *andina* Reiche, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *quinoensis* Kuntze
Arbusto o arbolito. Endémica. 800-1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
CHL(BIO, ARA, LRI, LLA).

Drimys angustifolia Miers
Sin.: *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. f. *angustifolia* (Miers) Eichler
Arbusto o arbolito. Endémica. 800-1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Drimys brasiliensis Miers subsp. **brasiliensis**

Sin.: *Drimys brasiliensis* Miers var. *campestris* (A. St.-Hil.) Miers, *Drimys granadensis* L. f. var. *campestris* A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Drimys brasiliensis Miers subsp. **sylvatica** (A. St.-Hil.) Ehrend. & Gottsb

Sin.: *Drimys brasiliensis* Miers var. *montana* (Miers) Hauman, *Drimys brasiliensis* Miers var. *sylvatica* (A. St.-Hil.) Miers, *Drimys granadensis* L. f. var. *axillaris* A. St.-Hil., *Drimys granadensis* L. f. var. *sylvatica* A. St.-Hil.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
PRY(GUA).

Drimys confertifolia Phil.

Sin.: *Drimys fernandeziana* Steud., *Drimys fernandezianus* Miers, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *confertifolia* (Phil.) Johow, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var.

fernandeziana (Steud.) Reiche
Árbol. Endémica. 100-1200 m.
Países: CHL(JFE).

Drimys winteri J.R. Forst. & G. Forst. var. **chilensis** (DC.) A. Gray

Sin.: *Drimys chilensis* DC., *Drimys chilensis* DC. var. *latifolia* Miers, *Drimys paniculata* Steud., *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. f. *chilensis* Eichler

Árbol. Endémica. 0-1700 m.
Países: CHL(COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

Drimys winteri J.R. Forst. & G. Forst. var. **winteri**

Sin.: *Drimys aromatica* Descourt. ex Baill., *Drimys polymorpha* Spach ex Baill., *Drimys punctata* Lam., *Drimys wintera* Thell., *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. f. *magellanica* Eichler, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *morenonis* Kuntze, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *punctata* (Lam.) DC., *Wintera aromatica* Murray, hom. illeg., *Winterania aromatica* Sol. ex Foth.
Arbusto o árbol. Endémica. 0-2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF). CHL(COQ, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, RME).

XYRIDACEAE

Abolboda Bonpl.

Abolboda poarchon Seub.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(AMA).

Xyris L.

Xyris asperula Mart.
Sin.: *Xyris simulans* A. Nilsson var. *subtortula* Malme
Hierba. Nativa. 600-1200 m.
Países: BRA(PAR).

Xyris capensis Thunb.
Hierba. Nativa. 0-1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xyris cervii E.D. Lozano & Wand.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Xyris dissitifolia Kral & Wand.
Hierba. Endémica. 1500-1700 m.
Países: BRA(PAR).

Xyris dusenii Malme
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).

Xyris filifolia L.A. Nilsson
Hierba. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xyris glandacea L.A. Nilsson
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).

Xyris guaranitica Malme
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Países: ARG(COS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).

Xyris hatschbachii L.B. Sm. & Downs
Hierba. Nativa. 900-1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).

Xyris hymenachne Mart.
Hierba. Nativa. 400-800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xyris jupicai Rich.

Sin.: *Xyris jupicai* Rich. var. *brachylepis* Malme, *Xyris jupicai* Rich. var. *major* (Mart.) L.B. Sm. & Downs, *Xyris laxifolia* Mart. var. *minor* Mart., *Xyris macrocephala* Vahl var. *minor* (Mart.) L.A. Nilsson, *Xyris sellowiana* Kunth f. *humilis* Kunth

Hierba. Nativa. 0-1300 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI). URY(CAS, CLA, MAL, MON, RIV, ROC, TAC).

Xyris lacerata Pohl ex Seub.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS). BRA(Fuera del área del proyecto).

Xyris laxifolia Mart.

Sin.: *Xyris laxifolia* Mart. var. *major* Mart.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE). URY(CAS).

Xyris lucida Malme

Hierba. Nativa. 700-1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Xyris macrocephala Vahl

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Países: BRA(RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).

Xyris metallica Klotzsch & Seub.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Xyris neglecta L.A. Nilsson

Hierba. Nativa. 800-1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Xyris piraquarae L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR).

Xyris regnellii L.A. Nilsson

Hierba. Nativa. 0-1500 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAN, ITA, MIE). URY(RIV, TAC).

Xyris reitzii L.B. Sm. & Downs

Hierba. Endémica.

Países: BRA(PAR, SCA).

Xyris rigida Kunth

Hierba. Nativa. 200-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xyris rigidiformis Malme

Hierba. Nativa.

Países: BRA(Fuera del área del proyecto). PRY(CAU, CAN).

Xyris savanensis Miq.

Sin.: *Xyris savanensis* Miq. var.

glabrata Seub., *Xyris tenella* Molino

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).

Xyris schizachne Mart.

Hierba. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, MIS). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN).

Xyris sororia Kunth

Hierba. Nativa. 1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Xyris stenophylla L.A. Nilsson

Hierba. Nativa. 700-1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xyris tenella Kunth

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Países: BRA(PAR, SCA). PRY(AMA, CAU, CAN).

Xyris teres L.A. Nilsson

Hierba. Nativa. 500-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Xyris tortula Mart.

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(AMA, CAU, CAA, PAI).

Xyris uninervis Malme

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Xyris vacillans Malme

Hierba. Nativa. 200-1200 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

ZINGIBERACEAE

Hedychium J. König**Hedychium coronarium** J. König

Hierba. Introducida. 0-1200 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, TUC). BRA(PAR, RGS, SCA). PRY(CAA, CAN, CEN, COA, GUA, SPE).

Renealmia L.f.**Renealmia petasites** Gagnep.

Hierba. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

ZOSTERACEAE

Zostera L.**Zostera chilensis** (J. Kuo) S.W.L.

Jacobs & D.H. Les

Sin.: *Heterozostera chilensis* J. Kuo

Hierba. Endémica. 0-200 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

ZYGOPHYLLACEAE

Bulnesia Gay**Bulnesia chilensis** Gay

Sin.: *Gonoptera chilensis* Turcz.

Arbusto. Endémica. 100-4000 m.

Países: CHL(ATA, COQ).

Bulnesia foliosa Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC). PRY(APY).

Bulnesia retama (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb.

Sin.: *Bulnesia macrocarpa* Phil.,

Zygophyllum retama Gillies ex Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 500-2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU).

Bulnesia schickendantzii Hieron. ex Griseb.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 1000-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Fagonia L.**Fagonia chilensis** Hook. & Arn.

Sin.: *Fagonia aspera* Gay, *Fagonia chilensis* Hook. & Arn. var. *aspera* (Gay)

I.M. Johnst., *Fagonia subaphylla* Phil.

Hierba. Nativa. 0-4000 m.

Países: CHL(AYP, TAR, ANT, ATA, COQ).

Gonopterodendron (Griseb.)
A.C. Godoy-Bürki**Gonopterodendron bonariensis**

(Griseb.) A.C. Godoy-Bürki

Sin.: *Bulnesia bonariensis* Griseb.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SLU, SDE, TUC).
PRY(APY, BOQ, PHA).**Gonopterodendron sarmientoi**

(Lorentz ex Griseb.) A.C. Godoy-Bürki

Sin.: *Bulnesia gancedoi* Rojas Acosta,*Bulnesia sarmientoi* Lorentz ex Griseb.

Árbol. Nativa. 0-200 m.

Países: ARG(CHA, FOR, SAL).

BRA(Fuera del área del proyecto).

PRY(APY, BOQ, PHA).

Kallstroemia Scop.**Kallstroemia tribuloides** (Mart.)

Steud.

Sin.: *Ehrenbergia tribuloides* Mart.,*Tribulus brasiliensis* Spreng., nom.
superfl.

Hierba. Nativa. 0-1800 m.

Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, TUC).
BRA(Fuera del área del proyecto).
PRY(APY, PHA).**Kallstroemia tucumanensis** Descole,

O'Donell & Lourteig

Hierba. Nativa. 0-900 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
PRY(APY, BOQ, PHA).**Larrea** Cav.**Larrea ameghinoi** Speg.Sin.: *Covillea ameghinoi* (Speg.) Briq.

Arbusto. Endémica. 200-800 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Larrea cuneifolia Cav.Sin.: *Neoschroetera cuneifolia* (Cav.)Briq., *Schroeterella cuneifolia* (Cav.) Briq.

Arbusto. Endémica. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Larrea divaricata Cav.Sin.: *Larrea monticelli* Perrone & Caro,*Neoschroetera divaricata* (Cav.) Briq.,*Schroeterella divaricata* (Cav.) Briq.

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
CHL(ATA, VAL, BIO, RME).**Larrea nitida** Cav.Sin.: *Covillea nitida* (Cav.) Vail, *Larrea balsamica* (Molina) I.M. Johnst., *Mimosa balsamica* Molina

Arbusto. Endémica. 0-3400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU).
CHL(ATA, COQ, VAL, RME).**Metharme** Phil. ex Engl.**Metharme lanata** Phil. ex Engl.

Hierba. Endémica. 2100-2200 m.

Países: CHL(AYP, TAR).

Pintoa Gay**Pintoa chilensis** Gay

Arbusto. Endémica. 200-1500 m.

Países: CHL(ATA).

Plectrocarpa Gillies ex Hook. & Arn.**Plectrocarpa rougesii** Descole,

O'Donell & Lourteig

Arbusto o subarbusto. Endémica.

1400-2600 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).

Plectrocarpa tetraantha Gillies ex

Hook. & Arn.

Arbusto. Endémica. 300-1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI,

MEN, SDE, SJU, SLU).

Porlieria Ruiz & Pav.**Porlieria chilensis** I.M. Johnst.

Arbusto o árbol. Endémica. 0-1400 m.

Países: CHL(COQ, VAL, LBO, RME).

Porlieria microphylla (Baill.) Descole,

O'Donell & Lourteig

Sin.: *Guaicum microphyllum* Baill.,*Porlieria lorentzii* Engl., *Porlieria**steinbachii* Standl.

Arbusto. Nativa. 0-3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
URY(COL).**Tribulus** L.**Tribulus terrestris** L.Sin.: *Tribulus lanuginosus* L.

Hierba. Introducida. 0-3600 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
CHL(TAR, ANT, ATA, RME).
URY(CAS, FLA, MON).